

Teredo megotara Forbes & Hanley. "Scheepsworm".

Nu we toch op het chapiter "paalworm" terecht zijn gekomen, is het wel interessant even de vondsten van een zeldzame paalworm aan onze kust te vermelden. De gewone paalworm, *Teredo navalis* (L.), spoelt elk jaar natuurlijk in ongekende hoeveelheden aan; vaak is haast elk stuk drijfhout ermee aangetast. Maar daarnaast is ook een andere paalworm-soort welks naam aan de kop van deze alinea prijkt, hier enkele keren gevonden en wel in rompen van houten vissersschepen en in drijfhout. Misschien komt het omdat we niet zoveel op de *Teredo*'s letten, ik weet het niet, maar in het C.S. stonden tot dusverre slechts 2 meldingen van *Teredo megotara* te boek, één uit April 1930 van Scheveningen en één uit October 1937, van een stuk drijfhout bij IJmuiden.

In elk geval zijn er deze herfst 4 meldingen binnen gekomen van deze "Big-eared shipworm" zoals hij in Amerika heet - een toepasselijke naam - en wel van de volgende vindplaatsen:

Petten - Callantsoog, 10.IX.50, in plankje, C.den Hartog.
 Huisduinen, 10.IX.50, vrij veel, in balkje, J.Lucas.
 Huisduinen, 24.IX.50, uit balk, C.Swennen.
 P. 98-96, 22.X.50, in plank, 1 ex., doch met afwijkende
 paletten. Deze soort ?? D.J.Bcerman.

Ik hoopt, dat dit lijstje een stimulans zal zijn voor iedereen,
 die nog waarnemingen van *Teredo megotara* heeft sluimeren in
 zijn logboek, archief of collectie.

=====

Let op boorpissebedden !! Van de paalworm als houtvernieler
 springen we over op de Boorpissebed als Houtverknoeier nummer
 twee. Zijn gangen zijn kleiner dan die van de paalworm, ze zullen
 ongeveer 1 tot 3 mm. middellijn hebben. Ondanks dit is de ver-
 nieling even erg, want in één klein plankje zitten duizenden
 vernielers bij elkaar. De dieren zijn zelf ook ongeveer van
 die grootte, erg onaanzienlijk dus. Tot 1948 dachten we, dat
 we steeds met één soort te maken hadden, n.l. *Linnoria lignorum*
 (Rathke), doch in dat jaar bleek het aan Dr Hulthuis te Leiden,
 dat er in drijfhout nog een soort voorkwam, die nog nooit be-
 schreven was. Hij noemde het dier *Linnoria quadripunctata*
 (quadripunctata wil zeggen: met 4 puntjes). En inderdaad, deze
 soort is het eenvoudigste gekenmerkt tegenover *L.lignorum* door
 het feit dat zij 4 pukkeltsjes op het telson heeft. We hebben
 dit afgelopen jaar erg gezocht of we de soort met de 4 knob-
 beltjes ook ergens autochtoon, dus niet in drijfhout, maar
 ergens op onze havenwerken, konden vinden, maar we zijn daar -
 gelukkig voor het hout van die havenwerken - niet in geslaagd.
 De oorspronkelijke soort, *Linnoria lignorum*, werd wel autoch-
 thoon aangetroffen, maar *L.quadripunctata* werd ons alleen be-
 kend uit aangespoeld hout, en wel:

- 23.IX.50, IJmuiden - Bloemendaal, vele in een balk samen met
Teredo navalis, de vlokreeft *Chelura*, en de
 eigenlijke *Linnoria lignorum*. J.Stock.
 23.IX.50. Huisduinen, vele in een balkje van zuidelijke oer-
 spreng (bezet met de paarse zeepok *Balanus perforatus*).
 C.Swennen.
 10.XII.50. Hondsbosse. Vele in een aangespoeld blok hout.
 C.Swennen.

=====