
ANAPAGURUS HYNDMANNI (BELL, 1846), UN CRUSTACÉ DÉCAPODE RAREMENT SIGNALÉ DANS LE BOULONNAIS.

C. D'UDEKEM D'ACQZ

Les signalements du bernard l'hermite *Anapagurus hyndmanni* (BELL, 1846) dans le Boulonnais sont très peu nombreux. BONNIER (1887) l'y signale de la manière suivante: "M. BETENCOURT m'a communiqué un exemplaire pris par lui à marée basse à Equihen (près de Boulogne) et qui diffère du type par la brièveté de ses antennes internes". BOUVIER (1891) le signale sans précision du Pas-de-Calais et SELBIE (1921) le signale sans commentaires de Boulogne, apparemment d'après une communication personnelle de GIARD. Ces deux derniers signalements sont en fait peut-être basés sur le spécimen mentionné par BONNIER (1887). GLAÇON (1977) liste cette espèce comme vivant au large dans le Boulonnais et DAVOULT & RICHARD (1988) la signale au large de Boulogne sur le haut-fond rocheux des Ridens.

Nous en avons observé personnellement deux spécimens sur le flanc Nord de la Pointe de la Crêche à Boulogne-sur-Mer: un exemplaire dans la grande mare profonde du haut de la frange infralittorale près de la partie proximale du môle le 16-IV-1988 et un exemplaire dans une anfractuosité un peu plus bas le 7-IV-1989. Nos deux exemplaires se trouvaient dans des coquilles de *Hinia incrasata* (STROEM, 1768). Cette espèce n'est certainement pas commune dans le Boulonnais mais elle n'y est probablement pas non plus vraiment très rare. Si elle a si rarement été signalée dans cette région, c'est sans doute qu'elle passe facilement inaperçue en raison de sa taille discrète.

A. hyndmanni est connu sur presque toutes les côtes des Îles Britanniques, depuis les Shetlands (SELBIE, 1921), descend jusqu'au Sud du Portugal (NEVES, 1977) et atteint les côtes espagnoles de l'extrême Ouest de la Méditerranée (GARCIA RASO, 1982). Si l'espèce fréquente la côte Nord-Ouest de la Mer du Nord (SELBIE, 1921), elle ne semble avoir été signalée ni sur la côte Sud ni sur la côte Est de cette mer. En Bretagne où elle est très commune, l'espèce se rencontre depuis la zone intertidale jusqu'à 90 mètres sur

des fonds variés: rochers, zostères, sables fins et grossiers, coquilles et maërl (BOURDON, 1965).

Samenvatting.

De heremietkreeft Anapagurus hyndmanni (BELL, 1846) is tot nog toe slechts zeer sporadisch en vaak op onduidelijke wijze uit de Boulonnais gerapporteerd. In het getijdengebied van de Boulonnais vond de auteur 2 levende exemplaren. De betreffende soort is mogelijks minder zeldzaam in deze streek dan vermoed wordt. Omwille van haar kleine afmetingen wordt ze echter moeilijk opgemerkt.

Bibliographie.

- BONNIER, J., 1887. Catalogue des Crustacés Malacostracés recueillis dans la baie de Concarneau.- Bull. Sc. dép. Nord, 2ième sér., 10: 199-262.
- BOURDON, R., 1965. Décapodes - Stomatopodes.- Inventaire de la faune marine de Roscoff. Editions de la Station biologique de Roscoff, 45 p.
- BOUVIER, E.-L., 1891. Etude sur quelques Paguriens recueillis par M.J. de GUERNE sur les côtes de France et de Norvège.- Mém. Soc. zool. France, 4: 393-407.
- DAVOULT, D. & A. RICHARD, 1988. Les Ridens, haut-fond rocheux isolé du Pas de Calais: un peuplement remarquable.- Cah. Biol. Mar., 29: 93-107.
- GARCIA RASO, J.E., 1982. Contributio al estudio de los paguridos (Crustacea Decapoda Anomura) en el litoral sudmediterraneo.- Inv. Pesq., 46(3): 493-508.
- GLAÇON, R., 1977. Faune et Flore du littoral du Pas-de-Calais et de la Manche Orientale.- Editions de l'Institut de Biologie marine et régionale de Wimereux, 51 p.
- NEVES, A.M., 1977. Crustaceos decapodes marinhos de Portugal Continental existentes no Museu Bocage. III. Anomura.- Arq. Mus. Bocage, 2ième sér., 6(10): 153-215.
- SELBIE, C.M., 1921. The Decapoda Reptantia of the Coasts of Ireland. II: Paguridea.- Fish. Ireland Sci. Invest., 1921(1): 1-68, pl. 1-10.

Avenue du bois des collines, 34
1420 Braine l'Alleud
Belgique