

FICHES D'IDENTIFICATION DES MALADIES ET PARASITES DES POISSONS, CRUSTACÉS ET MOLLUSQUES

Préparées sous les auspices du Groupe de Travail CIEM sur la Pathologie
et les Maladies des Organismes marins

Éditées par
CARL J. SINDERMANN

NOAA National Marine Fisheries Service
Northeast Fisheries Center, Sandy Hook Laboratory
Highlands, New Jersey 07732, USA

FICHE N° 13

PORTUGUESE OYSTER VIROSIS VIROSE DE L'HUÎTRE PORTUGAISE

par


M. COMPS

IFREMER, Laboratoire de Pathologie
1, rue Jean Vilar, 34200 Sète, France



CONSEIL INTERNATIONAL POUR L'EXPLORATION DE LA MER
Palægade 2-4, DK-1261 Copenhagen K, Danemark

Janvier 1985

ISSN 0109-2510



Histology /
histologie



Ultrastructure /
ultrastructure

Figures 1-3.

PORTUGUESE OYSTER VIROSIS

Host species

Crassostrea angulata Lmk (very susceptible), Portuguese oyster; *Crassostrea gigas* Th. (very resistant, 1 case noted in 1977 at Arcachon), Pacific oyster.

Disease name

Portuguese oyster virosis

Etiology

Mortalities are associated with viral lesions located in the interstitial cells: the virus is related to *Iridovirus*.

Associated environmental conditions

Major mortalities occur in periods of warm water (summer 1970)

Geographical distribution

Atlantic coast of France; Marennes-Oléron basin and Arcachon Basin

Significance

This viral disease was associated with massive mortalities which occurred from August 1970 to July 1971 (90 % of the mortalities occurred in November 1970 in the Marennes-Oléron basin). The disease remained endemic until 1973 (on the natural beds at Verdon). These mortalities have led to the disappearance of the Portuguese oyster from French coastal waters.

Control

Change to the culture of a resistant species, *Crassostrea gigas*.

Gross clinical signs

In vivo, no external manifestation.

Histopathology

Histology (Figs. 1–2). Generalized haemocytic infiltration (il); destruction of connective tissue which leaves lacunae; presence in these spaces of atypical cells containing fuchsinophilic cytoplasmic inclusions, 2 to 3 μm in diameter (if); presence of basophilic granules (gb) in the cytoplasm of the atypical cells (semi-fine sections).

Ultrastructure (Fig. 3). Intracytoplasmic viral inclusions in the atypical cells; dense virogenic plaque (pl. v) (which corresponds to the fuchsinophilic inclusion); icosahedral viral particles, 380 nm in size (v) (corresponding to the basophilic granulations).

VIROSE DE L'HUÎTRE PORTUGAISE

Espèces hôtes

Crassostrea angulata Lmk (très sensible), huître portugaise; *Crassostrea gigas* Th. (peu sensible, 1 cas en 1977, Arcachon), huître du Pacifique.

Nom de la maladie

Virose de l'huître portugaise

Étiologie

Mortalités associées à des lésions virales localisées dans les cellules interstitielles: virus pouvant être rapproché des *Iridovirus*.

Conditions de milieu

Mortalités plus importantes en période chaude (été 1970)

Distribution géographique

Côte atlantique de France; bassin de Marennes-Oléron et Bassin d'Arcachon

Importance

Virose associée à des mortalités massives du mois d'août 1970 au mois de juillet 1971 (mortalités de 90 % en novembre 1970 dans le bassin de Marennes-Oléron). État endémique de la maladie jusqu'en 1973 (gisements naturels du Verdon). Les mortalités ont entraîné la disparition de l'huître portugaise des côtes françaises.

Prophylaxie et traitement

Remplacement par la culture de *Crassostrea gigas*, espèce «résistante»

Signes cliniques macroscopiques

In vivo, aucune manifestation externe caractéristique

Histopathologie

Histologie (Figs. 1–2). Infiltration leucocytaire généralisée (il); dégradation du tissu conjonctif avec formation de lacunes; présence dans les espaces lacuneux de cellules atypiques caractérisées par une inclusion cytoplasmique fuchsinophile de 2 à 3 μm de diamètre (if); présence de granulations basophiles (gb) dans le cytoplasme des cellules atypiques (coupes semi-fines).

Ultrastructure (Fig. 3). Lésions virales intracytoplasmiques dans les cellules atypiques; plage virogène dense (pl. v) (correspondant à l'inclusion fuchsinophile); virions icosédriques de 380 nm (v) (correspondant aux granulations basophiles).

Key references
Références bibliographiques

- COMPS, M. 1972. Observations sur la résistance d'huîtres du genre *Crassostrea* au cours de la mortalité massive de 1970–1971 dans le bassin de Marennes-Oléron. ICES CM 1972/K:22, 9 pp. (mimeo).
- COMPS, M., BONAMI, J. R., VAGO, C., and CAMPILLO, A. 1976. Une virose de l'huître portugaise (*Crassostrea angulata*). C.r. Acad. Sci. Paris, 282 (D): 1991–1993.
- COMPS, M., and MASSO, R. M. 1978. Study with fluorescent technics of the virus infections of the Portuguese oyster *Crassostrea angulata* Lmk. Proc. Internat. Colloq. on Invert. Path., 11–17 Sep. 1978, Prague, Czechoslovakia.

Key laboratories
Laboratoires de référence

- IFREMER, Laboratoire de Pathologie
1, rue Jean Vilar
34200 Sète, France
- Laboratoire de Pathologie comparée
Université des Sciences et Techniques du Languedoc
place Eugène Bataillon
34060 Montpellier CEDEX, France