

Die kluwens leverden wel wat aardigheidjes op. Van poliepjes bleken er in te zitten: zeespriet, -den, -cypres, gokromde -borstel, -pluim (Aglaophenia pluma) op een hauwtje van hauw- wier, Laomedea longissima, Eudendrium spec. Er bleken ook wat roodwiertjes in verstrengeld: Gracilaria verrucosa, Corallina officinalis, Plocamium coccineum, iers mos (Chondrus crispus) waarop het mosdiertje Electra pilosa, Griffithsia flosculosa, Phyllophora epiphylla, deze laatste twee gedeter- mineerd door Martine Meert. Ik heb ook nog wat spulletjes vergeten uit de vloedlijn: geweisspons (Haliclona oculata), ruwe zeerasp op wulk en tepelhoren o.a., zeevinger (Alcyoni- dum cf. gelatinosum), bladachtig hoornwier (Flustra folia- cea), Membranipora membranacea en, net als vorig jaar, een stuk barsteen, groot 39,75 mm.

Guido

67410

Het weekendje in 't Zwin, 19 en 20 maart.

Met z'n zessen (van de afdelingen Gent, Oostende en Heist, waar bleef Blankenberge????) moesten we dit weekend maken. Het laagtij was erg vroeg, zodat we eigenlijk wel te laat wa- ren begonnen met kruien. Daar de lichaamslengte van de deel- nemers toen ter plaatse enigszins een beperkende factor was, werd Erwina geslachtofferd het drie meter brede net te helpen sleuren. De lezer dient nu niet zijn fantasie de vrije loop te laten gaan wat betreft Erwina's maten. Om alle dubbelzin- nigheden weg te nemen, wil ik benadrukken dat ik het heb over lengte en pk. Met twee 'waterdichte' pakken stevenden we door de schuimende golven. Dat schuim was overigens niet wit, maar bruin, door de enorme hoeveelheid slib. De zeebodem was ook zalig zacht, zodat we menigmaal het net mochten uit- graven. In de eerste sleep zat een tong (Solea solca) of zes, pladijs (Pleuronectes platessa), meun (Ciliata mustelus), gar- naal (Crangon crangon) uiteraard, maar niet voldoende voor een maaltijd, een fluwelen zwemkrab (Macroipus puber) zonder schild, enkele kamkwalletjes (Pleurobranchia pileus) en strandkrabben (Carcinus maenas), 11 m., 11 vr. zonder en 4 vr. met eieren. 1 ex. was geparasiteerd door een kraboozakje (Sacculina carcini). Bij de 2e sleep haalden we het net, dat overigens zijn beste tijd gekend had, zo lelijk open aan een roeste prikkeldraad, anno 40-45, dat we wel een kruis konden maken over ons kruien. Enkele mensen hadden wat op de gb 31 geneusd en noemden de geschubde zeerups (Lepidonotus squamatus) talrijk. Verder mel- den ze nog Nereis diversicolor, 2 noordzeekrabben (Cancer pa- gurus), van resp. 119,9 en 61,4 mm. Erg laag was het water nog niet, 't was pas springtij de maandag. 's Namiddags, bij hoog water, gingen we wandelen in het vogelreservaat. Het water was zo diep, de stroming zo sterk en de grachten zo breed dat er voor sommigen nattigheid en voor een onkeling zelfs een fles wijn mee te verdienen viel. Er lagen ook nogal wat doden, o.a. een ooievaar, die fol gegeord werd door een deelneemster voor een vriend van haar die in schedels doet. Zorg maar dat je er zelf het hoofd niet bij verliest. Andere lijken waren dat van een koperviek, ekster, adult en juv. zilvermeeuw en een schou- dergordel, van een juv. drieteenmeeuw. Deens lepelblad stond in bloei. We keerden langs het strand terug en noteerden pen- horen (Turritella communis) en slangzige mantelkieren (Hydrobia ul- na).

deri), wadslakje (*Hydrobia ulvae*), wenteltrap (*Epitonium clathrus*), enkele schilden van de gewone zwemkrab (*Macropipus holsatus*) en een horsmakreel (*Trachurus trachurus*) van 34 cm. Het laatste eind liepen we weer door 't Zwin. Vanop de dijk konden we in de kokmeeuwenkolonie mooi het koppeltje zwartkopmeeuwen bewonderen. In totaal schatten we het aantal bergeenden op 250. Dit voor de conservator die ons vroeg die beesten eens te tellen. 's Avonds gingen we op audiëntie bij ouwe sok en swger Luc van Rillaer. Hij heeft nl. een ferme kollektie schelpen en ook nog ander zeespul. D'er zaten enkele dingetjes tussen die men niet alle dagen te zien krijgt, o.a. twee kleine soorten zwemkrabben, *Macropipus pusillus* en *M. marmoreus*, en *Astacilla spec.*, een bizarre isopood, om van de schelpen nog te zwijgen. De zondagvoormiddag probeerden we nog wat te vissen met een kleiner steeknetje en we haalden er waarachtig een smalle zee-pissebed (*Idotea linearis*) mee boven. Ook tarbot (*Scophthalmus maximus*) is 't vermelden waard. Op gb 31 zeeanjelier (*Metridium senile*), gorgelpijpje (*Tubularia larynx*), noordzeekrab en zeedraad spec. (*Laomedea spec.*). Op 30 vonden we, na lang zoeken, aan de oostkant nog 1 schaalhoren (*Patella vulgata*). Ook opnieuw noordzeekrab en een soort buiswier (*Polysiphonia spec.*). Dat was het. Volgende keer hopelijk meer volk.

Guido

67412

#### KWALLENOPROEF.

In de vorige Tuimelaar verscheen een oproep i.v.m. kwal-lenwaarnemingen. Daar wilde ik nog even op terugkomen.

We zullen nl. proberen dit jaar, aan de hand van zoveel mogelijk waarnemingen, min of meer een overzicht te krijgen van de massale aanspoelingen, die de strandwandelaars onder ons allicht bekend zijn, maar ook van de dooie enkeling die je vindt.

Rond welke tijd spoelen ze aan ? Wat voor soort ? enz...

Om 't jullie gemakkelijk te maken laat ik de stoet nog eens passeren.

Erg algemeen is de oorkwal (*Aurelia aurita*), die vrijwel altijd makkelijk herkend kan worden aan de 4, veelal witte, oorvormige gonaden ( voortplantingsorganen). Aan de onderzijde bevinden zich 4 mondlappen, waartussen de mondopening zit.

Een kwal die eveneens makkelijk herkenbaar is, is de kompaskwal (*Chrysaora hyoscella*). Op het scherm heeft ie nl. 24 bruine driehoekige tekeningen ( in de vorm van een kompasroos) en de gelobde rand draagt ook nog eens vlekken van dezelfde kleur.