

LISTE

DES

BRYOZOAIRES DU POUDINGUE DE CIPLY (1)

par A. HOUZEAU DE LEHAIE.

— SÉANCE DU 3 AOÛT 1873. —

<i>Cellaria inæqualis</i> , d'Orb.	<i>Eschara Ægle</i> , d'Orb.
" 1 esp. indéterminée (2).	" <i>Callirhœ?</i> , d'Orb.
<i>Cellarina</i> 1 esp. ind.	" <i>Delia</i> , d'Orb.
—	" <i>Delaruena?</i> , d'Orb.
<i>Vincularia bella</i> , Hag.	" <i>stigmatophora</i> , Gold.
" <i>canalifera</i> , Hag.	" <i>cypræa</i> , d'Orb.
" <i>disparilis</i> , d'Orb.	" <i>Clito</i> , d'Orb.
" 1 esp. ind.	" <i>Cydippe?</i> , d'Orb.
<i>Eschara pusilla</i> , Hag.	" <i>Cressida</i> , d'Orb.
" <i>bixa?</i> , d'Orb.	" <i>Arsinæ</i> , d'Orb.
" <i>Elea</i> , d'Orb.	" <i>Crithea</i> , d'Orb.
" <i>subcyclostoma</i> , d'Orb.	" 4 esp. ind.
" <i>propinqua</i> , Hag.	<i>Semieschara grandis</i> , d'Orb.
" <i>sexangularis</i> , Hag.	" <i>disparilis</i> , d'Orb.
" <i>Nerei?</i> , d'Orb.	" 3 esp. ind.

(1) N'ayant entrepris l'étude des Bryozoaires que depuis quelques semaines, je n'ai pu examiner qu'une petite partie des matériaux dont je dispose. Il m'a également été impossible de me rendre compte de la valeur des caractères dans ce groupe. Cette liste est donc très-incomplète et devra subir de profonds remaniements. Mon but principal en la publiant, un peu prématurément je le crains, est d'attirer l'attention sur le nombre prodigieux d'espèces différentes enfouies ensemble. C'est au point qu'un décimètre cube de roche dans le poudingue renferme en certains endroits plus de cinquante espèces. Jusqu'à présent, je ne me suis pas occupé des Bryozoaires des autres assises crétacées.

(2) Parmi les espèces indiquées comme indéterminées, il y en a un certain nombre pour la détermination desquelles le temps m'a manqué et quelques autres qui paraissent nouvelles.

(1) Ce genre différerait des *Biflustra*, principalement en ce que les cellules sont groupées autour d'un axe solide, plein, cylindrique ou aplati.

(2) Les espèces fossiles de ce genre n'avaient été rencontrées jusqu'ici que dans les terrains tertiaires. Le *M. ciplyana* forme de grandes colonies (8 à 10 centimètres) à lames verticales plissées, comme froncées, s'anastomosant en larges mailles.

<i>Cyrtopora elegans</i> , Hag.	1 esp. ind.
<i>Osculipora repens</i> , d'Orb.	<i>Carea flexuosa</i> , d'Orb.
" <i>truncata</i> , d'Orb.	" 1 esp. ind.
<i>Filifascigera dichotoma</i> , d'O.	<i>Sparsicarea undulata</i> , d'Orb.
<i>Theconia radians</i> , Haime.	" <i>dichotoma</i> , d'Orb.
—	<i>Lichenopora cariosa</i> , d'Orb.
<i>Peripora Ligeriensis</i> , d'Orb.	" 1 esp. ind.
<i>Spiropora antiqua</i> , Lamour.	<i>Radioecarea elliptica</i> , d'Orb.
" " Var. α <i>verticil-</i>	" <i>diadema</i> , d'Orb.
<i>lata</i> , Gold.	<i>Multicarea magnifica</i> , d'Orb.
" " Var. β <i>Reussi</i> , Hag.	<i>Domopora cochloides</i> , d'Orb.
<i>Clavitubigera convexa</i> , d'Orb.	—
<i>Idmonia ramosa</i> , d'Orb.	<i>Filicea regularis</i> , d'Orb.
" <i>dorsata</i> , Hag.	<i>Ceriocara ramulosa</i> , d'Orb.
" <i>pseudo-disticha</i> , Hag.	<i>Cara</i> 2 esp. ind.
" <i>Cypris</i> , d'Orb.	<i>Sulcocava sulcata</i> , d'Orb.
" <i>sulcata</i> , Hag.	" 1 esp. ind.
" 3 esp. ind.	<i>Retecara clathrata</i> , d'Orb.
<i>Discotubigera</i> 1 esp. ind.	" 1 esp. ind.
<i>Reptotubigera dichotoma</i> , d'O.	<i>Semicara variabilis</i> , d'Orb.
<i>Actinopora diademoides</i> , d'O.	<i>Reptomulticara theloidea</i> , d'O.
" <i>Gaudryana</i> , d'Orb.	" <i>micropora</i> , d'Orb.
<i>Entalophora</i> 3 esp. ind.	" <i>cavernosa</i> , d'Orb.
<i>Bidiastopora</i> 2 esp. ind.	" 1 esp. ind.
<i>Mesinteripora compressa</i> , d'O.	<i>Plethopora truncata</i> , Håg.
<i>Filisparsa tubulifera</i> , d'Orb.	" <i>verrucosa</i> Hag.
<i>Stomatopora reticulata</i> , d'Orb.	<i>Semicytis rugosa</i> , d'Orb.
<i>Proboscina</i> 1 esp. ind.	" 2 esp. ind.
<i>Berenicca oceanica</i> , d'Orb.	<i>Truncatula aculeata</i> , d'Orb.
<i>Crisina lichenoides</i> , d'Orb.	<i>Heteropora crassa</i> , Hag.
" <i>triangularis</i> , d'O.	" <i>dichotoma</i> , Hag.
" 3 esp. ind.	" 2 esp. ind.