

NOTES SUR LES *BLEDIUS* MANN. (*Staphylinidae*)

par J. Bondroit

**Bledius pallipes** ER., Gen., 772.

? *pallipes* GRAV., Mon., 197.

Sous le nom de *Bledius pallipes* on a confondu un certain nombre d'espèces plus ou moins distinctes, la description de GRAVENHORST étant des plus élastiques je propose d'appeler *pallipes* le *Bledius* décrit par ERICHSON.

**Bledius vilosus** MÄKL., Oefv. Vet. Soc. Förh., XIX, 1876, 22.

D'après la description, cette espèce est fort distincte de *pallipes* ER. par la taille plus forte, le pronotum à sillon très fin, les élytres moitié plus longues que le pronotum. Il me semble que MÄKLIN a pris pour le *B. subterraneus* un *Bledius* du groupe *pallipes*.

**Bledius Annæ** SHARP, Ent. M. Mag., XXII, 1911, p. 32.

Noir, appendices et extrémité de l'abdomen brun jaune, pubescence grise.

Tête mate, fortement chagrinée, front faiblement relevé en bosse longitudinale, de chaque côté des points fins, épars. Labre faiblement échancré au milieu du bord antérieur.

Prothorax sensiblement plus large que la tête et les yeux, environ d'un quart plus large que long, côtés très faiblement rétrécis du milieu en avant, plus fortement vers l'arrière, angles postérieurs redressés, antérieurs bien marqués, tous à peine obtus. Surface du pronotum très mate, fortement chagrinée, ponctuation faible, peu dense, un très fin sillon longitudinal.

Elytres à peine plus larges que le prothorax, environ d'un cinquième plus longues que larges, densément et assez fortement ponctuées.

Abdomen assez densément ponctué sur les côtés des premiers tergites, éparsément sur leurs disques et sur les derniers tergites.

L'abdomen non rétracté le *B. Annæ* doit avoir de 4.2 à 4.5 mill.

Cette espèce diffère du *pallipes* par la taille plus grande, l'aspect plus mat, les élytres plus courtes, elle semble voisine du *vilosus*.

L'individu sur lequel est basée cette description est un cotype que m'a prêté, très obligeamment, M. H. DONISTHORPE.

**Bledius fuscipes** RYE, Ent. M. Mag., 1866, II, p. 154.

SHARP, Ent. M. Mag., 1911, XXII, p. 33.-

Noir, appendices brun jaune, extrémité de l'abdomen brun sombre, élytres d'un noir légèrement rougeâtre.

Tête mate, fortement chagrinée, front à peine relevé, cinq ou six points très faibles de chaque côté. Labre légèrement échancré et peu profondément sillonné.

Prothorax plus large que la tête et les yeux, au moins d'un quart plus large que long, côtés très faiblement rétrécis du milieu vers l'avant, plus fortement vers l'arrière, angles postérieurs redressés. Surface du pronotum chagrinée, mate, ponctuation peu profonde, éparses, un fin sillon longitudinal.

Elytres à peine plus larges que le prothorax, aussi longues que larges, ponctuation peu profonde, assez dense, l'intervalle de deux points ayant environ le diamètre d'un point.

Abdomen présentant seulement quelques points piligères.

Long. 3.8 mill. (l'abdomen non rétracté).

Description d'après un exemplaire de la collection DONISTHORPE, détermination de SHARP.

FAUVEL a prétendu (1) que le *Bl. fuscipes* n'était autre chose que la ♀ du *pallipes*, mais il semble bien que ce soit par erreur.

SHARP met en synonymie du *fuscipes* le *rastellus* SCHIÖDTE.

**Bledius terebrans** SHARP, Ent. M. Mag., 1911, pp. 33 et 59.

? *terebrans* SCHIÖDTE, Nat. Tidsskr., 1866, p. 199.

Noir, appendices brun jaune, extrémité de l'abdomen brun sombre.

Tête assez mate, chagrinée, front longitudinalement relevé, un peu luisant, de chaque côté de huit à dix points fins et nets. Labre largement et peu profondément échancré.

Prothorax un peu plus large que la tête et les yeux, d'un cinquième plus large que long, côtés légèrement arrondis, assez rétréci vers la base, angles postérieurs assez saillants. Surface du pronotum chagrinée, mate, ponctuation peu forte, éparses, l'intervalle de deux points étant en moyenne supérieur à deux fois le diamètre d'un point, un sillon longitudinal assez fin.

Elytres plus larges que le prothorax, à peine plus longues que larges, ponctuation forte et assez dense, l'intervalle de deux points étant très légèrement supérieur au diamètre d'un point.

Abdomen présentant des points piligères.

Long. 3.9 mill.

(1) Bull. Soc. Linn. Norm. (2) 7, p. 127.

Diagnose d'après un exemplaire déterminé par SHARP et provenant de la collection DONISTHORPE.

Cette espèce diffère du *fuscipes* par le front assez luisant et relevé et surtout par la ponctuation plus nette et plus profonde du pronotum et des élytres; peut-être faudra-t-il le réunir à mon *B. campi* qui s'en distingue à peine par la chagrination et la ponctuation plus fortes.

Le *B. terebrans* SCHIÖDTE était mis en synonymie du *pallipes*, je ne connais pas sa description originale et m'en rapporte à l'autorité de M. SHARP. Je pense qu'il faut réunir à l'espèce ci-dessus décrite le *B. pallipes* SEIDL. (Faun. balt. 1891, p. 358) et peut-être le *B. pallipes* var. *subnitidus* REY (Ann. Soc. Agr. Lyon, 1877, X, p. 588, note).

**Bledius filipes** SHARP, Ent. M. Mag., XXII, 1911, p. 32.

Noir, appendices brun clair, les hanches et la massue des antennes rembrunies, extrémité de l'abdomen brun sombre, bord antérieur du pronotum marginé de brun.

Tête male, chagrinée, front très faiblement relevé en bosse longitudinale un peu luisante, en arrière de cette protubérance une petite fossette, de chaque côté huit à dix points fins. Labre faiblement échancré et sillonné.

Prothorax sensiblement plus large que la tête et les yeux, côtés presque parallèles à peine rétrécis du tiers postérieur vers l'avant, assez fortement étranglés vers la base, aussi long que large ou transverse. Surface du pronotum fortement chagrinée, mate, ponctuation assez fine et peu dense, un fin sillon longitudinal.

Elytres à peine plus larges que le prothorax, au plus d'un quart plus longues que larges, densément et assez fortement ponctuées.

Abdomen assez faiblement et éparsément ponctué sur les côtés des premiers tergites, très éparsément sur leurs disques et sur les derniers tergites.

Long. 3.8-4 mill.

Diffère à première vue du *pallipes* par la forme plus étroite, les articles de la massue des antennes plus transverses, les élytres un peu plus courtes et plus densément ponctuées, etc.

M. DONISTHORPE m'a communiqué deux cotypes de cette espèce.

**Bledius defensus** FAUV.

Forêt de Soignes (près de Bruxelles).

**Bledius elongatus** MANN., Brach., p. 45.

ER., Gen., p. 779.

SHARP, Ent. M. Mag., XXII, 1911, p. 58.

M. SHARP a constaté avec raison que la description de cet insecte

ne convenait pas au *B. fracticornis* PAYK, d'après ERICHSON c'est une espèce valable (in MOTSCH. Et. Ent., 1857, p. 71).

**Bledius nigricans** Er., Gen., 769.

*simpliciventris* APF., Wiss. Mitt. Bosn., X, 1907, p. 638.

La description du *nigricans* convient tout à fait au *simpliciventris*.

**Bledius nanus** Er., Gen., 773.

Cette espèce est vraiment très distincte du *B. atricapillus* GERM., elle est beaucoup moins répandue que celle-ci, ce qui fait supposer que les entomologistes qui mettent le *nanus* en synonymie de l'*atricapillus* prennent les variétés foncées de celui ci pour le vrai *nanus*.

**Bledius bosnicus** BERNH.

Apennino Bolognese (DE BERTOLINI), deux exemplaires provenant des collections du Musée de Bruxelles. Cette espèce est nouvelle pour la faune italienne.

**Bledius frater** KR. Nat., p. 827.

REY, ANN. S. Agr., Lyon, X, 1877, p. 653.

*Fiorii* BERNH., Münch. Kol. Zeitschr., I, 1902, p. 60.  
*flexicornis* APF., Wiss. Mitt. Bosn., X, 1906, p. 638.

**Bledius talpa** GYL.

Environs de Lyon (DESBROCHERS).

**Bledius Doderoi** nov. sp.

Noir, élytres d'un brun noir vers la base, testacées vers l'extrémité, ces teintes dégradées, appendices d'un brun assez clair.

Tête peu luisante, chagrinée, assez densément et fortement ponctuée de chaque côté entre la base et les cornicules antennaires, antennes à faible massue de trois articles.

Prothorax un peu plus large que la tête et les yeux, environ d'un tiers plus large que long, côtés latéraux presque droits, parallèles, fortement ou assez fortement retrécis au quart postérieur. Pronotum peu luisant, chagriné, sillonné, à ponctuation assez éparsé ou assez dense, faible ou peu forte.

Elytres de la largeur ou à peine plus larges que le prothorax, environ deux fois aussi longues que lui, à ponctuation assez fine, peu profonde et peu nette, assez dense.

Abdomen assez luisant, chagriné, parsemé de points piligères peu profonds.

Pilosité très fine à la tête et au corselet, plus forte et plus longue à l'abdomen, pubescence des élytres courte.

Long. 2.8-3.1 mill.

Loc. : Cyclades.

Cette espèce est très distincte du *B. Devillei* par la forme plus étroite et plus parallèle, les antennes plus allongées, plus pâles, les élytres autrement colorées, plus éparsément ponctuées, etc.

Je dédie cette espèce à M. A. DODERO qui me l'a gracieusement offerte.



Pronotum du *B. Doderoi* BONDR. *B. Devillei* BONDR. *B. secernendus* JOY. *B. arenarius* PAYK.

### **Bledius Devillei** nom. nov.

*arenarius minor* REY, Ann. Soc. Agr. Lyon, X, 1877, p. 634.

Noir, extrémité des élytres et bord externe jusque près des épaules largement testacés, antennes brunes, pattes brun clair vers l'extrémité, brun sombre vers la base.

Tête peu luisante, chagrinée, le clypeus plus fortement, ponctuation forte et assez dense depuis le niveau des cornicules jusqu'au vertex mais très éparses ou nulle au centre, antennes à massue de trois articles, bien nette.

Prothorax généralement d'un tiers plus large que long, plus large que la tête et les yeux, finement sillonné, la base plus ou moins arrondie ou rétrécie avec les angles faiblement saillants. Pronotum assez faiblement luisant, peu nettement chagriné, assez densément et assez fortement ponctué, l'intervalle de deux points ayant en moyenne la dimension d'un diamètre et demi de points.

Elytres à peine plus larges que le pronotum, près de deux fois aussi longues que lui, la ponctuation dense, fine et assez nette.

Abdomen assez luisant, parsemé de points piligères peu profonds.

Pilosité très fine à la tête et au pronotum, plus forte et plus longue à l'abdomen; pubescence courte aux élytres.

Long. 2.6-3 mill.

Loc. : Pescara (A. FIORI); Aigues-Mortes, Saint-Raphaël (SAINTE CLAIRE DEVILLE); Cette (REY).

M. SAINTE CLAIRE DEVILLE m'a confié avec la plus grande obligeance les exemplaires de sa collection.

Obs. : REY avait déjà décrit sous le nom de *minor* une variété du *B. fracticornis* PAYK.

**Bledius secernendus** Joy, Ent. M. Mag. (2), XXII, 269.

Côtes de Bretagne.

**Bledius arenarius** PAYK., Faun. Suec., III, 382.

Côtes continentales de la Manche et de la Mer du Nord, Scandinavie.

**Bledius juvencus** ER., Gen. 763.

*monoceros* Ros., Thier. Andal., 78.

*Winkleri* BERNH., Verh. zool. Ges. Wien, 1905, p. 588.

**Bledius secessus** nov. spec.

Noir ou brun de poix, les cornicules antennaires brun clair, corselet parfois rougeâtre, élytres testacées ou rousses, région scutellaire rembrunie, appendices brun clair.

Tête assez convexe, chagrinée, légèrement ponctuée entre les cornicules antennaires et la base, une fossette vers le milieu du vertex, antennes à faible massue de trois articles, le scape des antennes environ aussi long que les trois articles suivants réunis, le second article presque aussi long que les deux articles suivants réunis.

Prothorax un peu plus large que la tête et les yeux, environ d'un quart plus large que long, côtés latéraux plus ou moins parallèles en avant puis largement arrondis vers la base dont les angles sont très obtus ou nuls.

Pronotum chagriné, à peine luisant, sillonné, le sillon s'arrêtant avant le bord antérieur le long duquel court une dépression, ponctuation assez forte et peu dense, souvent un petit espace presque lisse de chaque côté du sillon.

Elytres aussi longues et pas plus larges que le corselet, élargies de la base vers l'arrière, à ponctuation assez fine ou presque obsolète, éparses.

Abdomen rhopaliforme, assez luisant, parsemé de points piligères.

Pilosité longue et fine sur la tête et le pronotum, longue et assez dense à l'abdomen.

Long. 3-3.3 mill.

Loc. : Emilie (FIORI).

Cette espèce diffère de l'*obsoletus* FAUV. par la coloration plus pâle, le pronotum nettement sillonné, largement arrondi à la base, les élytres un peu plus courtes, elle semble se distinguer par les mêmes caractères du *B. ignobilis* EPP. que je ne connais que par la description.

---