

Staphylinides exotiques nouveaux

3^e Partie (1)

Par ALBERT FAUVEL

OXYTELUS Gravenhorst

A. — ESPÈCES D'INDO-MALAISIE

O. punctipennis *.

♂. *Ox. laqueato* Marsh. affinis, sed dimidio minor, angustior, mandibulis rufis, palpis piceis, articulo ultimo testaceo, elytris albidis, basi extrema inflexa et epipleuris vix infuscatis; capite minore, frontis margine antico angustiore, angustius incrassato, vertice haud sulcato, parcius punctato; thorace antice minus angustato, angulis anticis subrectis, posticis magis indicatis, dorso 5-sulcato, sulcis externis internis latioribus, profundis, disco et lateribus punctis aliquot tantum notatis; elytris magis transversis, punctura sat densa, licet quam in *laqueato* fortiore et parcior; abdomine fere impunctato; segmento 6^o ventrali apice medio obsolete bidenticulato, inter dentes vix emarginato; 7^o apice medio in patellam rufam, parum incrassatam producto amplissime distinctus. ♀ latet. — Long., 4 mill.

Sikkim : Darjeeling (*Christie*).

Unique.

O. barbatus *.

♂. *Ox. lucenti* (Fvl.) Bernh. vicinus, nitidissimus, niger, elytrorum disco squalide testaceo, palpis piceolis, articulo ultimo, mandibulis, ano summo pedibusque testaceis, tuberculis anten-

(1) Voir *Revue d'Entomologie*, 1904, p. 76 à 112.

nariis antennarumque articulis 4 primis rufulis. Antennæ ut in *lucenti*, sed articulo 5° paulo latiore, 11° multo majore, apice obtuso, tribus præcedentibus fere longiore. Caput brevius, fortius punctatum, fronte haud porrecta, margine apicali parum arcuatim truncato et medio vix perspicue denticulato, impressione inter tubercula antennaria transversa, alutacea, subopaca. Thorax minor, longior, capite sat angustior, antice magis rotundatus, postice magis sinuatus, angulis posticis magis indicatis, sulcis tribus dorsalibus antice abbreviatis, lateralibus basin non attingentibus. Elytra paulo longiora, dimidia parte antica fere impunctata. Abdomen segmentorum marginibus apicalibus vix perspicue asperato-punctatis, segmento 6° ventrali medio apice leviter producto, ibi rufo, dense subtiliter punctulato et longe aureo-piloso: 7° apice late parum profunde triangulariter emarginato. ♀ latet. — Long., 4 1/2 mill.

Java.

Unique.

Envoyé par le D^r O. Staudinger.

O. cribrum *.

♂. In vicinitate *Ox. nitiduli* Grav. collocandus, sed omnino diversus. Paulo major, nigerrimus, nitidus, pedibus picescentibus. Antennæ capitis thoracisque longitudine, clavatæ, articulo 4° minimo, moniliformi, sequentibus sensim latioribus, fortiter transversis, 11° majore, obconico. Caput sat convexum, transversum, fortiter sat dense aequaliter punctatum, utrinque juxta oculos medioeres sulcatulum, fronte parum umbonata, polita, apice truncata. Thorax capite paulo latior, sat transversus, capite adhuc fortius subrugose punctatus, medio sulco longitudinali profundo, integro, sulcis 2 aliis deletis, impressione obsoleta indicatis, lateribus subtilissime crenulatis, parum rotundatis, angulis omnibus fere rotundatis. Elytra sat transversa, thorace tertia parte latiora, paulo subtilius striolatim punctata, extus striis tribus notata. Abdomen punctis aliquot subtilissimis notatum, segmento 7° apice medio obtuse producto. — Long., 2 3/4 mill.

Sikkim: Darjeeling (*Christie*); Bengale: Kurseong.

O. uncifer *.

♂. Facie quadam parvi *Platystethi*, sed tarsis ut in *Oxytelis*. Nitidissimus, nigro-piceus, tuberculis antennariis, antennarum articulis 4 primis thoraceque plus minusve piceis, mandibulis palpisque squalide testaceis, his articulo ultimo pedibusque flavis. Caput magnum, transversim subquadratum, convexum, parce omnium subtilissime punctulatum, post oculos mediocres oblique striolatum, vertice utrinque leviter unifoveolato, fronte tota excavata, læviuscula, margine apicali truncato, medio spinulis duabus parvis uncatis, productis armato. Thorax antice capite paulo angustior, sat transversus, trapeziformis, lateribus leviter sinuatis, angulis omnibus subrectis, parce obsolete punctulatus, dorso sulcis 3 obsoletis, brevibus, intermedio antice tantum impresso, duobus aliis medio sitis, lateribus perspicue striolatum punctulatis, ante medium fossa profunda notatis. Elytra vix transversa, subtiliter parce punctata, punctis vix striolatis. Abdomen fere læve, segmento 7° ventrali apice medio triangulariter producto. ♀. Capite minore, transversim orbiculato, fronte inter tubercula antennaria transversim breviter striolata, margine antico medio truncato, inermi. — Long., 2 1/2 mill.

Java : Buitenzorg ; M^{ts} Tengger, à 1.350^m d'alt.

O. Sikkimi *.

♂. *Ox. vicino* Sharp proximus, similiter coloratus, licet antennarum basi nigro-picea elytrisque dilutius piceolis. Antennæ articulo 3° paulo longiore. Caput brevius, inter oculos transversim abrupte depressum, fronte inter tubercula antennaria transversim elevata, antice polita, margine antico medio arcuato, vertice postice haud sulcato, lateribus fortius striatis, foveis 4 transversim notatis, duabus externis minimis. Thorax elytrorum latitudine, circa basin paulo magis angustatus, fortius strigosus, sulcis, præsertim duobus externis, profundioribus. Elytra fortius et paulo densius rugosa. Abdomen in fundo læve, segmentis 2-5 sat fortiter parum dense punctatis, 6° ventrali medio apice tuberculis 2 minimis, subdentatis, approximatis, armato. ♀. Capite minuto, transversim orbiculato, vertice medio fossulato; thorace parvulo, elytris multo angustiore, antice posticeque fere æqualiter angustato. — Long., 3 3/4 mill.

Sikkim : Darjeeling (*Christie*).

O. tenuicornis *.

♂. In vicinitate *Ox. gabonensis* Fvl. collocandus. Brevis, sat latus, nitidissimus, nigro-piceus, thorace et aliquando elytris piceis, antennis rufulis, articulo 1°, palpis pedibusque testaceis. Antennae capite thoraceque parum breviores, graciles, articulis 3-4 longioribus quam latioribus, 5° quadrato, 6-10 parum transversis, 11° duobus praecedentibus aequali apice acuminato. Caput subtriangulare, latum, transversum, medio triangulariter profunde impressum, parce subtiliter punctatum, prope oculos parum oblique sulcatulum, sulco postice foveato, depressione frontali medio parum convexa, polita, margine apicali truncato, oculis minutis, genis post hos fortiter rotundatim ampliatis. Thorax capite sat latior, fortiter transversus, trapeziformis, ante angulos posticos parum obtusos sat emarginatus, medio longitudinaliter profunde et late sulcatus, sulcis 2 externis obsoletis, utrinque late transversim impressis, carinula juxtalaterali sat longe ante basin margini conjuncta. Scutellum medio foveatum. Elytra thorace vix latiora, fortiter transversa, fortiter striolatim punctata. Abdomen laeviusculum, segmento 7° ventrali medio apice triangulariter productum. ♀. Capite minore, medio vix arcuatim impresso, vertice sulcato; thorace antice angustiore. — Long., 3 1/3-3 2/3 mill.

Java : Sukabumi.

O. occipitalis *.

♂. *Ox. nitidifrons* Woll. affinis, sed minor et angustior, nitidus, rufopiceus, ore, antennarum basi, tuberculis antennariis, thoracis lateribus explanatis, elytrorum dimidia parte basali, segmentorum marginibus apicalibus pedibusque testaceis. Antennae breviores, tenuiores, articulo 4° moniliformi, 5° transverso, 6-10 fortius quam in *nitidifrons* transversis, 11° brevior. Caput transversim orbiculatum, longitudinaliter striolatum, fronte tota concava, impunctata, margine antico medio sat producto, apice truncato et sat crasse elevato, oculis minoribus, vertice medio haud sulcato. Thorax paulo longior, angustior, magis trapeziformis, sulco medio antice minus lato, duobus externis minus profundis, excavatione laterali utrinque minus profunda, angulis anticis subrectis. Elytra paulo breviora, fortius et parcius strigello-punctatis. Abdomen

similiter punctulatum, segmento 7° ventrali apice medio profunde bisinuato. ♀. Capite minuto, oculis majoribus. — Long., 2 1/2 mill.

Java: Malang, Pasuruan, M^t Smerou.

O. Raffrayi *.

♂. *Ox. pulchro* Kr. vicinus, sed dimidio minor, capite opaco, thorace elytrisque subopacis, rufotestaceis, elytris a medio ad apicem segmentisque abdominis præter apicem plus minusve fuscis, ore, antennarum basi, ano pedibusque testaceis. Antennæ breves, tennes, articulo 4° minimo, transverso, 5-10 gradatim latioribus, etiam transversis, 11° majore, conico. Caput brevissimum, latum, alutaceum, medio vix foveolatum, fronte impressione brevi, lata, postice subareolata excavata, margine antico truncato, sulco intraoculari ad verticem arcuatim prolongato, oculis minutis, genis post hos fere parallelis, angulis posticis omnino rotundatis. Thorax antice capitis latitudine, brevissimus, trapeziformis, sat parce fortiter rugellus, trisulcatus, sulco medio antice latiore, duobus externis abbreviatis, fossa magna utrinque sat profunda, angulis anticis subacutis, posticis parum obtusis. Elytra thorace parum latiora, similiter rugella, fortiter transversa. Abdomen fere laxe, segmento 7° sat arcuato, apice summo vix emarginato. ♀. Capite minore, oculis majoribus. — Long., 2 1/4 mill.

Singapore (*Raffray*). Java.

B. — ESPÈCES D'AFRIQUE

O. crenulifer *.

In vicinitate *Ox. strigifrons* Hochh. collocandus, sed omnino dissimilis. Magnitudine et forma satis *Ox. rugosi* Fabr., sed fronte nec excavata, nec alutacea sicut colore primo visu distinguendus. Sat convexus, nitidus, piceus, capite nigro, antennarum articulis 2-4, mandibulis tuberculisque antennariis plus minusve rufis, palpis, elytrorum maxime parte, segmentorum 6-7 marginibus apicalibus late translucide, femoribus apice, tibiis tarsisque auran-
tiacis. Antennæ quam in *rugoso* paulo breviores, minus crassæ, articulo 4° minimo, moniliformi, 5-10 hoc multo latioribus, fortiter transversis, 11° sat breviter obconico. Caput subtriangulare, æqualiter subconvexum, sat dense et fortiter, licet fronte paulo parcius, punctulatum, margine antico dentibus duobus minimis

approximatis armato, oculis mediocribus, genis post hos parum angustatis, angulis posticis rotundatis. Thorax capite tertia parte latior, fortiter transversus, totus marginatus, fortiter trisulcatus, utrinque longitudinaliter sat anguste impressus, grossa subrugose parce punctatus, lateribus obsolete crenulatis, antice breviter parum, postice fortiter angustatis, angulis anticis subrectis, posticis obtusis. Elytra basi thorace haud latiora, postice rotundatim parum ampliata, duplo latiora quam longiora, fortiter subrugose et substrigoso-punctata, extus a medio ad apicem picea, apice colore piceo anterieus nebulose producto. Abdomen supra punctis dispersis subtilibus, subtus paulo fortioribus, notatum, segmento 7° ventrali medio apice triangulariter producto. — Long., 5 1/3 mill.

Sexus differentia latet.

Gabon : Loango (*Mocquerys*).

A cause des deux petits denticules du front, je suis porté à croire que mon exemplaire unique est un ♂, bien que le 6° segment ventral n'offre aucun caractère sexuel.

O. foraminosus *.

♂. In sectione *Ox. fulcipes* Er. collocandus, sed totus alius. Elongatus, capite thoraceque angustis, nitidus, niger, mandibulis palpisque rufulis, his articulo ultimo antennarumque articulis 2 primis rufotestaceis, harum articulo 1° supra et apice, 2° apice latius infuscatis, pedibus testaceis. Antennæ robustæ, elytrorum fere medium attingentes, articulis omnibus longioribus quam latioribus, 4° 5° parum longiore, 5-10 inter se æqualibus, 11° oblongo, apice obtuso. Caput suborbiculatum, sat dense fortiter rugosule punctatum, fronte impressa, inter antennis fere lævi, margine antico arcuato. vertice longitudinaliter sulcato, basi et juxta sulcum lævi, oculis mediocribus, genis post hos rotundatis. Thorax capite quarta parte latior, parum transversus, subtrapeziformis, dense fortiter cribrato-punctatus, sulco medio longitudinali sat profundo, duobus externis sat obsoletis, postice abbreviatis, lateribus parum impressis. Elytra thorace plus quam tertia parte latiora, quadrata, vix fortius et densius cribrata, dorso late longitudinaliter sat depressa. Abdomen fortiter minus dense punctatum, punctis segmentorum 5-6 medio parciore et subtilioribus, 6° ventrali medio apice translucide rufo-testaceo, 7° medio longitudinaliter concavo, excavatione rufo-testacea, lateraliter profunde et anguste emargi-

nata. ♀. Capite paulo minore, oculis paulo majoribus distincta. — Long., 4-4 1/2 mill.

Haut-Sénégal: Badumbé, janvier à mai (*Nodier*); Afrique orientale anglaise; Rift Valley, Nakuro, décembre (*Alluaud*).

Très remarquable par sa forte ponctuation, surtout à l'abdomen.

O. pubiventris *.

♂. In sectione *Ox. inusti* Grav. collocandus, sed totus alius. Angustas, nitidus, abdomine opaculo, alutaceo, supra et subtus pube densa, omnium subtilissima et brevissima, subsericea, aureola insignis. Niger, mandibulis, antennarum articulis 4 primis elytrisque dorso rufis, labro flavo-pubescenti, palpis pedibusque testaceis. Antennæ curvæ, validæ, articulo 4^o transverso, moniliformi, 5-10 hoc multo latioribus, transversis, 11^o longo, tribus præcedentibus fere æquali. Caput parvum, breviter transversum, sat dense rugosule striolato-punctatum, fronte vix excavata, margine antico obuse producto, rufescente, sulco verticis longo, licet sat obsoleto, oculis sat magnis, genis post hos angustatis, angulis posticis rotundatis. Thorax convexus, capite quarta parte latior, parum transversus, subtrapeziformis, sat dense fortiter punctatus, anteangulos posticos subacutos anguste sed profunde emarginatus, trisulcatus, sulcis 2 externis antice abbreviatis, impressione laterali utrinque sat profunda. Elytra thorace haud latiora, vix transversa, fortiter strigoso-punctata, lateribus et apice piceis. Abdomen supra obsoleto, licet basi fortius et densius, punctulatum, subtus adhuc fortius punctulatum, segmento 7^o ventrali obconice producto. ♂ latet. — Long., 3 1/3 mill.

Gabon : Loango (*Mocquerys*).

Unique.

O. sericeiventris *.

♂. Præcedenti abdomine subopaco, pube subsericea fuscula adhuc densiore et brevior induto vicinus, sed omnino diversus. Fere opacus, capite thoraceque angustis, piceus, capite nigropiceo, mandibulis antennarumque articulis 3-4 rufis, his articulis 1-2, frontis margine antico, elytris pedibusque testaceis, elytrorum sutura et epipleuris piceolis. Antennæ ut in *Ox. pubiventris*, licet paulo crassiores. Caput parvum, transversum, crebre subtiliter

rugosule punctatum, fronte parum concava, vertice obsolete longitudinaliter sulcatulo, oculis sat grossis, genis post hos parum rotundato-angustatis. Thorax capite vix quarta parte latior, parum transversus antice vix quam postice angustior, lateribus vix rotundatis, ante angulos posticos bene indicatos anguste sinuatis, trisulcatus, sulcis 2 externis latis, antice abbreviatis, impressionibus lateralibus parum profundis, dense sat fortiter et æqualiter rugoso-punctatus. Elytra thorace plus quam tertia parte latiora, sat transversa, alutella, crebre subtiliter strigello-punctata. Abdomen supra crebre subtilius, subtus parcius et fortius, punctulatum, segmento 6° ventrali late parum profunde apice emarginato, incisura longius dense griseo-pubescenti, 7° medio apice in patellam latam, rufam, apice truncatam, fortiter producto, juxta patellæ basin utrinque profunde emarginato. — Long., 3 1/3 mill.

Transvaal.

Unique.

O. alutellus *.

♂. *Ox. grandi* Epp. proximus, sed capite thoraceque minus nitidis, in fundo alutaceis, densius paulo subtilius punctatis, fronte magis punctulata, margine antico magis angulatim producto, vertice medio sulco sat longo impresso, genis post oculos minus dilatatis; thorace brevior, lateribus a medio ad basin parum bisinuatis, angulis posticis magis indicatis; elytris densius strigellis, disco toto rufo-piceis; abdomine punctis aliquot subtilissimis notato, segmento 6° ventrali apice late arcuatim parum expanso, parte expansa flavida, declivi, medio fossulata, 7° parum spatulato, spatula apice parum emarginata; ♀ ut in *grandi* conformata, sed capite thoraceque alutaceis et punctura subtiliore et densiore distinguenda. — Long., 4 1/4-5 mill.

Gabon : Loango (*Mocquerys*).

O. fusicornis *.

♂. Angustus, nitidissimus, rufo-aurantiacus, elytris abdominisque segmentorum 5-6 marginibus apicalibus piceis, pedibus albidis. Antennæ capite thoraceque parum breviores, tenues, fusiformes, articulo 4° sat transverso, 5-7 haud, 8-10 leviter transversis, 11° elongato, obconico. Caput convexum, suborbiculatum, punctis

aliquot minimis notatum, fronte vix impressa, margine antico arcuatim producto, vertice foveola oblonga notato, oculis parvis, genis post hos vix ampliatis, rotundatis. Thorax antice capite vix lator, trapeziformis, convexus, sat transversus, parce subtiliter punctulatus, sulco unico longitudinali parum profundo, medio interrupto, notatus, lateribus post medium vix sinuatis, angulis anticis fere rectis, posticis obtusis. Elytra thoracis longitudine, vix fortius et parcius punctulata. Abdomen segmentis 5-6 punctis aliquot subtilissimis notatum, segmento 7° ventrali medio apice breviter conice spatulato, spatula apice vix emarginata. ♀ latet. — Long., 3 1/2 mill.

Zambèse.

Unique.

O. parcepunctus *.

Ad sectionem *Ox. nitiduli* Grav. referendus, sculptura præsertim insignis. Minimus, nitidissimus, rufotestaceus, capite abdominalisque segmento 6° præter apicem piceis, thorace pedibusque testaceis. Antennæ breves, clavatæ, articulis 5-9 sensim latoribus, maxime transversis, 11° sat magno, obconico. Caput fortiter transversim quadratum, læve, tuberculis antennariis alte elevatis, postice quasi carina longa continuatis, fronte postica profunde transversim sulcata, margine antico late truncato, oculis mediocribus, genis post hos parallelis, angulis posticis obtusis. Thorax convexus, lævis, capitis latitudine, fortiter transversus, trapeziformis, lateribus ab apice ad basin fortiter oblique angustatis, angulis anticis rotundatis, posticis obtusis, sulcis et impressionibus vix indicatis. Elytra thorace tertia parte latiora, quadrata, parce sat fortiter punctata, circa scutellum parum infuscata. Abdomen læve. — Long., 2 mill.

Sexus differentia latet.

Congo : Kinchassa, février, avril.

O. galla *.

♂. In vicinitate præcedentis collocandus, licet totus alius. Nitidissimus, rufopiceus, thorace rufo, antennarum articulis 3 primis pedibusque testaceis. Antennæ breves, crassæ, articulis 4-10 fortiter transversis, 11° breviter obconico. Caput transversim fortiter

orbiculatum, subtiliter parce punctatum, inter tubercula antennaria transversim sulcatum, fronte lævi, margine antico late truncato, vertice medio sulcatulo, oculis sat magnis, genis post hos parum angustatis, angulis posticis rotundatis. Thorax capite paulo latior, sat transversus, antice rotundatus, postice fortius angustatus, angulis omnibus obtusis, trisulcatus, sulcis 2 externis medio tantum notatis, intervallis lævibus, impressionibus lateralibus parum profundis, parce sat fortiter punctatis. Elytra thorace quarta parte latiora, parum transversa, sat dense fortiter strigello-punctata. Abdomen parce obsolete punctulatum, segmento 7° ventrali medio apice in patellam sat latam, apice truncatam et utrinque denticulo subtilissimo terminatam producto. — Long., 3 mill.

Variat plus minusve rufus, capite abdomineque plus minusve infuscatis (minus maturus).

Abyssinie : Bogos, à 1.500^m d'alt. ; juin à août (*Raffray*).

O. hamacenus *.

♂. Juxta præcedentem collocandus, sat brevis, nitidus, nigropiceus, thorace dilutiore, palpis, tuberculis antennariis antennarumque basi rufis vel rufotestaceis, elytris squalide testaceis, pedibus flavis. Antennæ sat incrassatæ, articulo 4° fortiter transverso, 5-10 latioribus, etiam fortiter transversis, 11° pyriformi, duobus præcedentibus æquali. Caput transversim quadratum, breve, fortiter parce punctatum, fronte parum depressa, lævi, medio antice inter oculos sulcata, margine antico fere truncato, medio vertice brevissime sulcato, oculis medioeribus, genis post hos parum dilatatis, angulis posticis rotundatis. Thorax capite sat latior, convexus, fortiter transversus, trisulcatus, sulcis angustis, æqualibus, 2 externis vix antice abbreviatis, spatio inter sulcos fere lævi, utrinque parce fortiter vix striolatim punctatus et vix perspicue impressus, postice magis quam antice angustatus, angulis anticis obtusis, posticis sat rotundatis. Elytra vix transversa, intus sat fortiter punctata, extus striolata, stria longitudinali intra humerum præcipue perspicua. Abdomen punctis aliquot tantum notatum, segmento 6° ventrali medio postice testaceo, translucido, lævi, margine postico late arcuatim sat producto, 7° breviter spatulato, spatula apice truncata. ♀. Capite minus quadrato, oculis paulo majoribus distincta. — Long., 2 2/3 mill.

Abyssinie : Hamacen, Azéga, à 2.500^m d'alt. ; juillet (*Raffray*).

Un ♂ et une ♀.

O. fulgidus *.

♂. Præcedenti affinis, sed angustior, sublævis, aliter coloratus et antennis elongatis, fusiformibus, minus crassis primo visu distinctus. Nitidissimus, convexulus, piceus, capite abdomineque nigro-piceis, palpis, antennarum basi pedibusque testaceis. Antennæ articulo 4° quadrato, 5-8 parum transversis, 9-10 longioribus, 11° longo, duobus præcedentibus æquali. Caput transversim subquadratum, parce subtiliter punctatum, fronte lævi, inter tubercula antennaria rufula transversim sulcata, margine antico parum arcuato, oculis medioeribus, genis post hos parallelis, angulis posticis rotundatis. Thorax capite vix latior, leviter transversus, antice breviter rotundatus, dein versus basin fortiter angustatus, angulis omnibus rotundatis, anguste et profunde trisulcatus, sulcis 2 externis antice abbreviatis, utrinque parum et anguste impressus, punctis aliquot dispersis, in impressione numerosioribus. Elytra thorace tertia parte latiora, vix transversa, punctis aliquot notatis, intra humerum late impressa. Abdomen fere læve, segmento 6° punctis aliquot subtilibus notato, 7° ventrali medio apice in spatulam sat latam, apice vix emarginatam, producto. ♀. Capite minore, oculis paulo majoribus distincta. — Long., 2 3/4-3 mill.

Zambèse. Afrique orientale anglaise : Naivasha, décembre ; Nairobi (Wa-Kikuyu et Masai) (*Alluaud*).

O. megalomerus *.

♀. Præcedentibus iterum vicinus, sed colore, elytris brevissimis et præsertim antennarum articulo ultimo prælongo primo visu distinctus. Nitidissimus, angustulus, niger, ore antennarumque articulis 4 primis rufis, his apice infuscatis, elytris pedibusque testaceis, illis apice, præsertim prope angulos externos piceis. Antennæ elongatæ, robustæ, subfusiformes, articulo 4° sat parvo, transverso, 4-10 latis, minus transversis, 11° oblongo, tribus præcedentibus fere longiore. Caput parvum, transversim orbiculatum, parce punctatum, punctis verticis strigellis, hoc medio subtiliter sulcato, fronte parum concava, fere lævi, margine antico obtuse producto, tuberculis antennariis rufulis, oculis majoribus, genis post hos rotundatim angustatis. Thorax convexus, sat transversus, antice breviter rotundatim angustatus, inde versus basin sat angustatus, angulis omnibus parum indicatis, trisulcatus, sulco medio

profundo, 2 externis minoribus, antice abbreviatis, lateribus utrinque sat anguste et profunde impressis. Elytra basi thorace vix latiora, dein versus apicem sat ampliata, fortiter transversa, parce fortiter striolatim punctata. Abdomen minus nitidum, in fundo alutaceum, segmento 6° punctis aliquot vix perspicuis. ♂ latet. — Long., 3 1/3 mill.

Gabon, Cap Saint-Jean. 7 (*Mocquerys*).

Unique.

O. curticollis *.

Ad sectionem *Ox. picei* Linn. pertinens, sed oculis adhuc majoribus, thorace inter omnes brevissimo, colore et cæteris totus differens. Sat nitidus, abdomine parum opaculo, dilute piceo-testaceus, capite nigro, tuberculis antennariis rufulis, palpis pedibusque albidis. Antennæ ut in *piceo*, licet articulis 5-10 paulo brevioribus. Caput inter oculos multo augustius, sat nitidum, paulo fortius punctatum, vertice profundius sulcato, fronte haud alutacea, medio fossata, margine antico obtuse producto, haud truncato, oculis maximis, genis post hos nullis. Thorax capite quarta parte latior, duplo latior quam longior, antice fortiter rotundatus, postice sat angustatus, angulis posticis obtusis, trisulcatus, sulcis 2 externis brevibus, antice et postice abbreviatis, impressionibus externis profundis, antice transversim limitatis, fere ut in *piceo* punctatus. Elytra strigis paulo minus elongatis, breviora, sat transversa. Abdomen adhuc subtilius alutaceum, impunctatum. — Long., 3 1/2 mill.

Sexus differentia latet.

Gabon.

Unique.

O. reductus *.

Ox. fusciceps Fvl. vicinus, sed brevior et multo latior, paulo crebrius et subtilius punctatus, abdomine minus nitidulo et præsertim thorace abbreviato, fortiter transverso distinctus. Ferrugineus, capite nigro, antennarum articulis 4 primis, fronte antica tuberculisque antennariis rufis, palpis pedibusque testaceis. Antennæ ut in *fusciceps*, licet paulo crassiores, articulis 7-10 brevioribus, parum

transversis. Caput latius, oculis magis proeminentibus. Thorax multo latior, capite tertia parte latior, antice maxime rotundatus, angulis posticis obtusis, trisulcatus, sulcis 2 externis latis, antice abbreviatis. Elytra parum transversa. Abdomen subtilissime alutaceum, segmento 6° ventrali medio apice late et profunde emarginato, emarginatione quasi crenulata, 7° medio apice in patellam apice truncatam producto. — Long., 3 1/3-3 2/3 mill.

Sexus differentia latet.

Afrique orientale allemande. Congo : Luiki.

O. bidentulus *.

♂. *Ox. piceo* Linn. vicinus, ejusdem formæ et magnitudinis ac similiter coloratus, licet fronte inter tubercula antennaria et thorace nigris; capite transversim subquadrato, fronte tota alutacea, magis excavata, sulculo inter oculos antice transverso, margine antico medio emarginato, emarginatura utrinque denticulata, vertice toto subtiliter crebre strigello, medio haud striato, oculis dimidio fere minoribus, genis post hos sulparallelis; thorace vix longiore et angustiore, antice et postice minus angustato, angulis anticis magis, posticis minus indicatis, trisulcato, sulcis 2 externis rectoribus, lateribus totis usque ad hos sulcos dense rugellis, disco medio punctato, fere strigello; elytris similiter strigosis; abdomine omnium subtilissime alutaceo, lævi, segmento 6° ventrali apice medio anguste vix emarginato, 7° apice obtuse spatulato, spatula medio impressa. ♀ latet. — Long., 4 mill.

Natal.

O. viator *.

♀. Ad sectionem *Ox. tetracarinati* Block pertinens, licet omnino diversus. Depressus, opacus, abdomine fronteque antica sat nitidis, niger, capite thoraceque piceis, tuberculis antennariis antennarumque articulis 4 primis dilutioribus, palpis pedibusque testaceis. Antennæ breves, claviformes, articulo 4° minimo, fortiter transverso, 5-10 sensim latioribus, maxime transversis, 11° tribus præcedentibus æquali, obconico. Caput minutum, transversim orbiculatum, subtilissime strigellum, utrinque longitudinaliter sulcatum, sulculo medio obsoleto, vertice ad basin sulci utrinque vix nitidulo, fronte parum impressa, alutacea, margine antico parum arcuato,

oculis mediocribus, genis post hos angustatis, angulis posticis rotundatis. Thorax sat transversus, capite quarta parte latior, subsemilunaris, dense strigellus, punctis interjectis rarioribus, trisulcatus, sulcis 2 externis latis, parum profundis, extus latissime parum impressus, impressionibus ante medium oblique profundioribus, angulis anticis parum, posticis maxime obtusis. Elytra thorace tertia parte latiora, quadrata, thorace vix subtilius et densius strigello-punctata, carinellis duabus subtilissimis extus longitudinalibus. Abdomen dense subtiliter punctatum, subtilissime fusco pubescens, segmento 7° ventrali apice parum rotundato. ♂ latet. — Long., 2 1/2 mill.

Abyssinie : Bogos, à 1.500^m d'alt., juin à août (*Raffray*). Zambèse.

Deux exemplaires.

C. — ESPÈCES DE L'AMÉRIQUE TROPICALE

O. Jelskii *.

♀. *Ox. laqueato* Marsh. sat vicinus, sed omnino alius, duplo major, antennis multo longioribus, robustis, articulis 9-10 haud transversis praesertim distinctus. Similiter nitidus et coloratus, licet tuberculis antennariis antennarumque articulis 4 primis pro maxima parte picescentibus, 4° moniliformi, minuto, 5° multo latiore, fortiter transverso, 6-8 latioribus, parum transversis. Caput depressum, parvum, subtriangulare, fortiter parce vix rugosule punctatum, utrinque longitudinaliter sulcatum, sulco medio vix perspicuo, fronte alutacea, punctis aliquot subtilibus notata, margine apicali medio truncato, oculis mediocribus, genis post hos fortiter angustatis. Thorax capite tertia parte latior, convexus, profunde trisulcatus, sulcis integris, intervallis fere laevibus, impressionibus lateralibus latis, maxime profundis, arcuatis, ante medium interruptis, sulcis et impressionibus dense punctatis, angulis posticis vix denticulatis. Elytra basi thorace parum latiora, dein sat ampliata, parum transversa, dense strigello-punctata. Adomen impunctatum. ♂ latet. — Long., 5 1/2 mill.

Cordillère du Pérou : Pumamarca (*C. Jelski*).

Unique.

O. apicicornis *.

♂. *Ox. deraso* Sharp proximus, similiter nitidus et coloratus, licet elytris flavidis, lateribus et angulis posticis externis tantum fuscis; antennarum articulis 4-10 brevioribus, 11° omnino alio, praelongo, tribus praecedentibus simul sumptis longiore; capite minore, angustiore, fronte multo minus producta, margine antico medio minus denticulato, oculis paulo majoribus, genis post hos minus dilatatis; thorace longiore, postice minus angusto, lateribus a medio ad basin profundius sinuatis, angulis posticis magis indicatis, sat acutis; elytris paulo brevioribus; abdominis segmento 6° ventrali apice medio parum emarginato, 7° basi media tuberculato, apice spatulato, spatula sat brevi, apice truncata. ♀ ut in *deraso*, ser oculis paulo majoribus, antennarum articulo 11° praelongo et thoracis forma distincta. — Long., 4 mill.

Colombie : Chimbo, à 330^m d'alt., août (*Rosenberg*).

O. inæqualis *.

♂. Prope *Ox. sulciferum* Fvl. collocandus, minor et angustior, similiter coloratus, licet antennis dilutioribus, rufis, articulis 4 primis testaceis, his antennis caeterum multo brevioribus et tenuioribus, articulis 4-10 fortiter transversis, 11° ovali; capite angustiore, transversim quadrato, utrinque multo minus longitudinaliter impresso, sulco parvo obliquo a vertice producto, antice interrupto, punctis et strigulis aliquot vix perspicuis notato, fronte minus producta, medio apice dente sat valido, apice obtuso, armato, oculis vix magis depressis, genis post hos parallelis; thorace medio laevigato, utrinque punctis aliquot notato, multo subtilius trisuleato, sulcis 2 externis longe ante basin abbreviatis, impressionibus lateralibus obsoletis; elytris parce dimidio subtilius punctulatis omnino distinctus. ♀ latet. — Long., 2 1/3 mill.

République Argentine : province de Buenos-Aires, février (*C. Bruch*).

O. hamuliger *.

♂. Prope *armatifrons* Sharp collocandus, licet antennis et capite omnino aliis praesertim distinctus. Latiusculus, nitidissimus,

piceus, capite nigro, antennarum articulis 4 primis et tuberculis antennariis rufescentibus, mandibulis totis et cornu apice rufis, palpis testaceis, elytris pedibusque albidis, illis lateraliter fusco-piceis. Antennæ sat elongatæ, parum crassæ, articulo 3° 2° paulo longiore, 4° paulo longiore quam latiore, gracili, 5-10 multo latioribus, sat transversis, 11° sat longo, apice attenuato. Caput maximum, subquadratum, convexum, læve, a tuberculis antennariis usque ad collum sulco maxime profundo, arcuato, medio breviter furcato impressum, striolis aliquot intus juxta sulcum et extus post oculos parvulos insertis, fronte late impressa, licet medio parum umbonata, margine antico triangulariter producto et medio apice cornu valido apice emarginato et bidenticulato, extus truncato armato, genis post oculos prælongis, parum dilatatis. Thorax antice capitis latitudine, maxime transversus, trapeziformis margine antico triangulariter producto, magnopere trisulcatus, punctis aliquot notulatis, sulcis integris, medio præsertim latissimo, impressionibus lateralibus fossatis, brevibus, ante medium transversim interruptis, lateribus bisinuatis, angulis posticis sat acute productis. Elytra brevissima, thorace vix longiora, sat dense fortiter subtrigoso punctata. Abdomen læve, segmentis 5 primis medio ante marginem apicalem punctis 2 tantum notatis, 6° ventrali apice late emarginato, 7° quasi triangulariter producto. ♀. Capite mediocri, transversim orbiculato, inæquali, vertice sulcato distincta. — Long., 3 1/3-3 2/3 mill.

Guyane sud : Rivière Lunier ; bassin du Carsevenne (Geay).

O. lævissimus *.

Corpore toto supra glabro, lævissimo, nitidissimo elytrisque fortiter convexis in genere unicus. *Ox. incili* Sharp parum vicinus, licet paulo minor et angustior. Squalide rufo testaceus, mandibulis rufis, capite præter frontem anticam et tubercula antennaria picescente, elytris segmentisque abdominis 3-6 nigro-piceis, palpis, antennarum articulo 1° pedibusque testaceis. Antennæ breves, robustæ, claviformes, articulo 4° parum, 5-10 paulo magis transversis, 11° oblongo, apice acuminato, duobus præcedentibus paulo longiore. Caput breve, latum, convexum, transversim orbiculatum, utrinque longitudinaliter sulcatulum, vertice medio subfossato, fronte juxta tubercula antennaria oblique parum impressa, antierius medio transversim parum depressa, margine antico triangulariter producto, oculis mediocribus, genis post hos parum angustatis,

angulis posticis rotundatis. Thorax antice capite vix angustior, fortiter transversus, trapeziformis, magnopere æqualiter trisulcatus, sulcis 2 externis basi interruptis, fossa laterum lata, maxime profunda, abrupta, lateribus haud vere sinuatis, angulis posticis rotundatis. Elytra thorace quarta parte latiora, parum transversa, a medio ad apicem sat ampliata. Abdomen segmento 7° ventrali medio apice obconico. — Long., 2 2/3 mill.

Sexus differentia latet.

Ega (*de Mathan*).

Unique.

O. striolicollis *.

♂. *Ox. insignito* Grav. proximus, sed capite brevior et latior, præsertim antice fortiter alutaceo, utrinque sulco profundo a tuberculis antennariis usque ad collum oblique impresso, frontis margine antico truncato, vix sinuato, medio apice in spinam validiorem producto; thorace piceo, trapeziformi, fere brevior, postice minus angustato, profundius et angustius trisulcato, intervallis antice et postice rugellis, utrinque fortiter densius strigoso, lateribus oblique angustatis, angulis posticis bene indicatis; elytris densius et profundius strigosis; abdominis segmento 6° ventrali haud sinuato, 7° medio apice obtuse producto, disco longitudinaliter carinulato satis distinctus. ♀ latet. — Long., 2 3/4 mill.

Brésil : province de S^{ta} Catharina, Blumenau.

Unique.

O. Vulcanus *.

♂. Ad sectionem *Ox. insigniti* Grav. referendus, sed triplo major et totus alius. Forma brevi et lata *gibbuli* Epp., piceus, capite antennisque nigris, palpis, antennarum articulis 2 primis, elytris disco abdominisque lateribus rufo-piceis, palporum articulo ultimo, macula parva basali elytrorum pedibusque rufotestaceis. Antennæ breves, claviformes. articulo 3° 2° tertia parte longiore, 4° fortiter, 5-10 adhuc sensim fortius transversis, 11° brevi, conico. Caput maximum, obconicum, nitidum, mandibulis longe porrectis, fronte planata, lævi, prope tubercula antennaria unifoveata, margine antico triangulariter producto, apice bidentato, inter dentes emarginato, vertice utrinque ab oculis minutis oblique fortiter strigoso,

impunctato, medio ante basin in V formam striato, genis post oculos rotundatim ampliatis. Thorax capitis latitudine, nitidulus, brevissimus, antice parum, postice fortiter vix sinuatim angustatus, fortiter rugosus, profunde trisulcatus, sulco medio latissimo, antice dilatato ibique vix rugello, sulcis 2 externis integris, basi fortiter dilatatis, impressionibus lateralibus latis, sat profundis, basi ipsa profunde bisinuata, lateribus parum crenulatis, angulis anticis acutis, posticis leviter indicatis. Elytra thoracis latitudine, sat fortiter transversa, a medio parum ampliata, nitidula, dense fortiter rugoso-strigosa. Abdomen nitidum, omnium subtilissime parce fusco-pubescent, segmentis 2-5 sat dense subtiliter, 6° parcius subtilissime, punctatis, 7° ventrali apice medio truncato. ♀. Capite multo minore, disco sat fortiter punctato, fronte alutacea, apice vix perspicue bidenticulata, utrinque inter tubercula antennaria oblique obsolete sulcata, vertice medio fossato, oculis vix majoribus, abdomine densius et fortius punctulato distincta. — Long., 4 3/4 mill.

Bolivie : territoire des Yuracaris (*Germain*).

Un ♂ et une ♀.

O. monodon *.

♂. *Ox. dentifrons* Fvl. affinis, sed latior, nitidior, capite, abdomine antennisque præter articulos 1-4 rufopiceos, nigris; antennarum articulis 5-10 brevioribus; capite latiore, utrinque sulco profundo a tuberculo antennario usque ad collum subarcuatim producto, lateribus fortius strigosis, sat nitidis, fronte oblique, haud transversim, impressa, alutacea, dente marginis antici subtiliore, vertice nitido, subtiliter punctulato, foveolato, genis post oculos vix angustatis; thorace majore, sat nitido, minus brevi, lateribus ab apice ad basin multo minus angustatis, sulcis fere parallelis, profundioribus, intervallis parum punctulatis, impressionibus lateralibus minus profundis, angulis posticis indicatis; elytris parcius, duplo fortius strigosulis, minus transversis, nitidis; abdomine alutaceo, magis nitido, segmento 7° ventrali medio apice parum producto, expansione apice emarginata; ♀ a *dentifrons* ♀ corpore sat nitido, thoracis forma, sulcis aliis, elytris longioribus et fortius strigosis omnino differens. — Long., 2 1/2 mill.

Bolivie : territoire des Yuracaris (*Germain*); Colombie: Paramba, 1150^m d'alt., mai (*Rosenberg*).

O. obscurellus *.

♂. *Ox. dentifrons* Fvl. etiam vicinus, sed latior et brevior, corpore antico fere opaco, abdomine vix nitidulo, antennis paulo brevioribus; capite multo latiore, fronte subplana, alutacea, margine antico vix denticulato, sulco obliquo utrinque a tuberculo antennario usque ad collum parum arcuato, lateribus fortius, vertice subtilissime, strigellis, hoc fossulato sulcato, genis post oculos dilatatis; thorace latiore, minus profunde, sed latius trisulcato, lateribus latius impressis, angulis posticis paulo magis indicatis; elytris fere brevioribus; abdominis segmento 6° ventrali medio apice impresso et parum emarginato; 7° in patellam apice triangulariter incisam producto. ♀. A *dentifrons* ♀ præsertim capite multo majore, transversim quadrato thoracisque sculptura optime distinguenda. — Long., 2 3/4 mill.

Guyane française sud : Rivière Lunier; Oyapock, environs de Saint-Georges (*Geay*).

O. Championi *.

♀. *Ox. sculpturato* Grav. parum vicinus, major, latior, corpore antico opaco, abdomine solo nitido, capite thoraceque angustis, depressis, in fundo alutaceis elytrisque longis, quadratis, præsertim distinctus. Niger, ore elytrorumque disco maxima parte piceis, pedibus rufo-testaceis. Antennæ elongatæ, sat crassæ, articulo 3° 2° parum brevior, 4° 3° latiore, vix brevior, haud transversus, 5-10 multo latioribus, parum transversis, 11° ovato-acuminato, duobus præcedentibus æquali. Caput suborbiculatum, dense subtilissime strigellum, utrinque obsolete longitudinaliter sulcatum, fronte tota alutacea, apice vix truncata, genis post oculos mediocres parallelis, angulis posticis rotundatis. Thorax fortiter transversus, subquadratus, postice parum angustatus, dense fortius strigellus, late breviter trisulcatus, sulcis postice deletis, medio solo alutaceo, impressionibus lateralibus latis, sat profundis, angulis posticis obtusis. Elytra dense subtiliter strigella, in fundo alutacea. Abdomen sat dense subtilissime punctulatum. ♂ latet. — Long., 4 2/3 mill.

Guatemala.

Unique.

Je dédie avec grand plaisir cette espèce à M. G. C. Champion, bien connu pour ses belles recherches dans l'Amérique centrale.

Aucune des espèces décrites dans la *Bioiogia* ne peut se référer à celle-ci.

O. rhopalocerus *.

♀. Magnitudine, colore et forma lata, brevi *Ox. intricati* Er., sed adhuc latior, thorace convexo, fronte alutacea excepta sat nitidus; antennis similibus; capitis lateribus et vertice sat parce subtiliter strigoso-punctatis, fronte tota aequali, nec excavata, nec sulcata, medio postice vix bifoveolata, margine antico rotundato; thorace capite tertia parte latiore, similiter transverso, profunde trisulcato, sicut caput strigoso-punctato, sulcis profundis, angustis, integris, fere parallelis, impressionibus lateralibus latis, sat obsoletis, angulis posticis omnino rotundatis; elytris similiter transversis, nigris, dense fortiter strigosis; abdomine nitidulo, in fundo alutaceo, punctis aliquot subtilissimis notatis. ♂ latet. — Long., 2 1/2 mill.

Bolivie: territoire des Yuracarís (*Germain*).

Unique.

O. Magdalenæ *.

♂. *Ox. complanato* Er. vicinus, sed major. Latus, niger, capite thoraceque opacis, frontis apice elytrisq. vix nitidulis, his piceis, lateribus vix infuscatis, mandibulis rufulis, antennarum basi vix picescente, abdomine sat nitido, pedibus squalide rufo-testaceis. Antennæ sat clavatæ, articulo 4° haud transverso, 5-10 multo latioribus, fortiter transversis, 11° obconico. Caput latum, breviter obconicum, densissime subtilissime strigellum, disco late longitudinaliter utrinque impresso, vertice longe sulcato, basi media bipunctato, fronte alutacea, sulcalo arcuato divisa, apice medio truncata, tuberculis antennariis latis, vix elevatis, oculis parvis, genis post hos parum rotundato-ampliatis. Thorax capitis latitudine, fortiter transversus, medio subtiliter, extus fortius rugello-strigosus, trisulcatus, sulcis latis, medio integro. antice dilatato, 2 externis postice abbreviatis, lateribus circa basin sat fortiter vix rotundatim angustatis, angulis posticis maxime obtusis. Elytra thorace sat latiora, tertia fere parte latiora quam longiora, dense

strigello-punctata. Abdomen subtilissime et brevissime pubescens, subtiliter sat dense punctulatum, segmento 6° ventrali apice vix emarginato, 7° conice producto. ♀ latet. — Long., 3 1/2 mill.

Colombie : Rio Magdalena. Équateur : Pichincha.

J'ai changé le nom inédit de *scabrosus*, que j'avais donné jadis à cet insecte, à cause de noms très analogues donnés depuis à d'autres espèces du genre.

O. speculiceps *.

In sectione *Ox. speculifrons* Kr. inserendus. ♂. Parva species, vertice profunde trifossato et sculptura elytrorum omnino singularis. Magnitudine, forma et colore *speculifrons*, licet latior. Antennæ longiores et robustiores, articulis 9-10 vix transversis, 11° longo, his duobus fere longiore. Caput transversim subquadratum, convexum, utrinque omnium subtilissime densissime opaco-strigellum, medio toto plaga longitudinali polita, nitidissima, vertice medio profunde trifossato, fossis triangulariter positus, media majore, in plaga polita sita, frontis parte antica umbonata, basi sulco transverso limitata, apice summo truncata, tuberculis antennariis crassis, politis, oculis mediocribus, genis post hos rotundatim sat ampliatis. Thorax opacus, brevissimus, capite vix angustior, circa basin parum angustatus, angulis omnibus rotundatis, sicut caput strigellus, trisulcatus, sulcis latis, medio sat profundo, 2 externis obsoletis, postice abbreviatis, carinis sulcos limitantibus angustissime politis. Elytra elongata, plana, quarta parte longiora quam latiora, opaca, strigis adeo subtilibus et densis ut velutino-sericea et quasi minime sculpturata videantur, sutura carinulata, nitella. Abdomen nitidum, in fundo alutaceum, punctis aliquot subtilissimis notatum, segmento 7° ventrali medio apice bifossulato, irideo. ♀. Capite dimidio minore, transversim subquadrato, fronte antica, tuberculis antennariis et plaga parva verticis parum nitentibus, fossis tribus frontis etiam minoribus distincta. — Long., 2 1/4-2 1/2 mill.

Bolivie : territoire des Yuracaris (*Germain*); Colombie : San Carlos (*Steinheil*), Chimbo, à 335^m d'alt., août (*Rosenberg*); Venezuela : Caracas (*Sallé*), Colonie Tovar, mars (*E. Simon*).

OSORIUS Latreille.

O. frontalis *.

O. rufipes Mots. vicinus, similiter coloratus et pilosus, sed capite omnino alio, nitido, laud strigoso, fronte et plagis duabus inter oculos densius fortiter rugoso-punctatis, spatio medio longitudinali et tuberculis antennariis laevibus, margine frontali antico parce crenato; thorace paulo parcius et fortius punctato; elytris duplo fortius, abdomine fere duplo densius punctatis optime distinguendus. — Long., $4\frac{3}{4}$ - $5\frac{1}{3}$ mill.

Sumatra : Deli; Padang. Java : Buitenzorg; Kemanglen, Tegal, décembre.

PARAGONUS Fauvel.

P. acuticollis *.

P. birmano Fvl. affinis, tertia parte minor et angustior, similiter coloratus, subtilius fusco-pubescens, thoracis lateribus medio acute denticulatis elytrisque brevissimis, thoracis longitudine omnino distinctus. Similiter punctatus, licet abdomine paulo densius, subtilius punctulato. Thorax angustior, angulis anticis multo magis indicatis, fossula ante angulos posticos minore. Elytra basi thorace sat angustiora, versus apicem parum dilatata. Abdomen parum clavatum. — Long., $2\frac{1}{2}$ - $2\frac{2}{3}$ mill.

Variat corpore castaneó.

Penang (*Raffray*). Sumatra : Palembang. Java : Teibodas.

P. heterocerus *.

P. birmano Fvl. paulo minor et angustior, punctura subtilissima et creberrima duplo crebriore et dimidio subtiliore primo visu distinctus. Nitidulus, sat dense fusco-pubescens, nigro-piceus, ore, antennis, tuberculis antennariis, segmentorum marginibus apicalibus pedibusque rufo-piceis. Antennæ capite thoraceque vix longiores, vix sensim incrassatæ, articulis penultimis parum transversis. Caput convexum, fronte alutacea, apice vix truncata, oculis

sat parvis, genis post hos parallelis. Thorax fortiter transversus, capite haud longior, tertia parte latior, medio ante basin late parum profunde, utrinque fortius oblique impressus, lateribus a medio angulatò ad apicem oblique fortiter angustatis, inde ad angulos posticos obtusos magnopere arcuatim strangulatis. Elytra thorace tertia parte latiora, parum longiora, fortiter transversa. Abdomen omnium creberrime subtilissime punctulatum. — Long., 2 2/3-3 1/3 mill.

Variat piceus, capite nigricante, ore, antennis pedibusque rufis.

Sumatra : Palembang. Java : Buitenzorg.

HOLOTROCHUS Erichson

H. minor

Fauv., *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1863, 437

Minutus, parallelus, cylindricus, niger sen nigro piceus, nitidus, haud coriaceus, ore, antennis pedibusque rufis, licet antennis apice rufo testaceis, thoracis margine antico et postico vix, elytris sæpius circa humeros suturamque præsertim, segmentorum marginibus sextique fere dimidia parte apicali castaneo-rufis. Antennæ sat incrassatæ, articulis 8-10 fortiter transversis, 11° breviter conico. Caput semicirculare, convexum, thorace sat angustius, parce subtilissime punctulatum, vertice punctis duobus majoribus, sat distantibus, transversim notato. Thorax quinta parte latior quam longior, vix densius subtiliter punctulatus, lateribus subtiliter marginatis, antice parum, postice paulo magis angustatis, medio vix arcuatis, basi circa angulos posticos rectiusculos obsolete impressa, spatio medio anguste lævi. Scutellum læve. Elytra thorace paulo longiora et angustiora, parallela, basi intra humerum sat impressa, paulo fortius haud densius punctulata, haud perspicue coriacea, stria suturali satis arcuata. Abdomen elytrorum latitudine, circa apicem vix latius, sicut thorax punctulatus. Tibiæ anticae subtus prope basin angulato-emarginatæ. — Long., 2 2/3 mill.

Caracas (*Sallé*). Cuba (*Poey*). Antilles : Grenada, Balthazar (*Smith*). Guyane sud : Cunani (*Geay*).

Obs. 1. — L'exemplaire de Cunani a la ponctuation généralement plus forte, surtout aux élytres, mais ne diffère pas autrement du type de Caracas.

Obs. 2. — J'ai fait à nouveau cette description sur le type.

L'espèce est voisine du *punctulatus* Scriba, du Venezuela, qui m'est inconnu ; elle en diffère toutefois, d'après la description, par son corselet un peu plus large que les élytres, à côtés non parallèles ; celles-ci non coriacées ; l'abdomen non claviforme, etc.

Il est malheureusement probable que le type de ce *punctulatus* est perdu ; car, peu de temps avant sa mort, notre regretté collègue Scriba m'envoya gracieusement ce qu'il possédait de Staphylinides exotiques et cette espèce ne s'y trouvait pas.

H. brachypterus *.

Minor * Le Conte, *Trans. Amer. Ent. Soc.*, 1877, VI, 216 (non Fauv.).

H. minori vicinus, sed paulo major et latior, corpore medio nigro-piceo, caeterum praeter abdominis segmentorum partem basalem piceam rufulus, antennarum clava tarsisque dilutioribus, illis articulo 7° paulo latiore ; capite quarta parte majore et latiore, duplo fortius punctato, fronte magis rotundato-producta, verticis punctis 2 majoribus deficientibus ; thorace paulo fortius punctato, angulis anticis minus indicatis, prope angulos posticos multo fortius sat profunde et late impresso, spatio medio laevi nullo ; elytris thoracis latitudine, hoc paulo brevioribus, fortiter transversis, triplo fortius parce subrugosule punctatis, circa suturam multo profundius impressis ; abdomine parcius punctulato ; tibiis anticis in ♂ subtus medio tantam emarginato denticulatis. — Long., 2 4/5 mill.

Floride : Enterprise ; Cedar Keys, sur les fleurs, juin, très rare (*Schwarz*) ; Caroline du Sud (*Le Conte*).

Obs. — C'est le *minor* cité par Schwarz (*Trans. Amer. Phil. Soc.*, 1878, XVII, 104).

J'ajoute, pour comparaison, la description d'une seconde espèce des Etats-Unis :

H. laevicauda

Le Conte, *Proc. Acad. Sc. Philad.* 1866, 376 ; *Trans. Amer. Ent. Soc.*, 1877, VI, 216

Convexus, piceo-niger, nitidus, antennis longioribus, circa apicem minus incrassatis ; capite parce punctulato, thorace elytrisque convexis subtiliter parce punctatis, illo versus angulos posticos

fovea parva impresso ; his thorace dimidio fere longioribus, minus profunde punctatis, stria suturali profunde impressa ; abdominis parte conspicua elytris fere haud longiore, segmentis piceo-marginatis ; palpis pedibusque ferrugineis. — Long., 3 $\frac{4}{10}$ mill.

Illinois (*Ulke*) ; New Mexico ; Louisiane (*Le Conte*).

Collections Ulke et Le Conte.

Obs. — Je ne connais aucune espèce se référant à la description de celle-ci, que Le Conte dit très voisine de la précédente (*brachypterus* FvI. — *minor* Le Conte), mais distincte par ses antennes, ses élytres très longues, leur ponctuation et celle de l'abdomen.

EDAPHUS Le Conte.

E. dentiventris *.

E. sumatrensi Schauf. vicinus, sed duplo major, corpore antico, praesertim capite, latiore, rufus antennis validioribus, articulis 3 ultimis infuscatis, 9° latiore, 10° fortius transverso ; capite inter oculos profunde sulcato, ante sulcum profunde oblique utrinque sulcato, unde trilobatum apparet ; frontis margine apicali breviter subangulatum producto ; thorace post medium magis abrupte strangulato disco medio longius et profundius fossato, fossis quatuor basalibus multo majoribus et profundioribus, basi ipsa trisinuata, unde medio emarginata apparet ; elytris paulo amplioribus, impunctatis, parce longius flavo-pubescentibus ; abdomine singulari, supra segmento 2° basi media acute carinato ; 3° medio fossula geminata impresso, 4-5 latius geminatim fossatis, 4° (antice viso) plaga minima triangulariter elevata ornato, unde segmentum quasi dente acuto minuto medio armatum apparet, 7° maxime angustato, apice truncato amplissime distinctus. — Long., 1 $\frac{1}{2}$ mill.

Singapore (*Raffray*). Java : Buitenzorg.

Obs. — Il est possible que la singulière sculpture de l'abdomen soit un caractère sexuel du ♂ : mais cela reste douteux les nombreuses espèces du genre n'offrant rien d'analogue.

STENUS Latreille

S. azeganus *.

S. mendico Er. parum affinis, fere duplo major, minus nitidus, longius griseo-pubescentibus, antennis minus gracilibus et magis elon-

gatis, praesertim articulis 4 ultimis longioribus quam latioribus; capite paulo parcius et fortius punctato; thorace multo longiore, antice minus dilatato, postice minus angustato, linea media angusta laeviuscula carinulata; elytris omnino aliis, praelongis, parallelis, tertia parte longioribus quam latioribus, haud inaequalibus; abdomine similiter, licet paulo crebrius quam *in mendico* punctulato, segmentis basi transversim sulcatis, haud crenulatis; σ^7 segmento 7° apice late parum profunde arcuatim emarginato facillime distinguendus. — Long., 4 mill.

Abyssinie: Hamacen, Azega, à 2.500 ^m d'alt., juillet (*Raffray*); d'Asmara à Keren, octobre (*Tellini*).

STILICOPSIS Sachse

S. breviceps *.

S. trinotatae Kr. sat vicina, sed minor et, praesertim thorace, angustior, rufa, ore, antennis, ano pedibusque testaceis; antennis brevioribus, articulis 7-10 fortius transversis; capite post oculos paulo longiore, minus parallelo, angulis posticis magis rotundatis; thorace tertia parte angustiore; elytris concoloribus, densius et subtilius punctatis; abdominis apice parcius punctulato distincta. — Long., 3-3 1/3 mill.

Java: Bandoeng; Buitenzorg. Borneo: Pagate.

Obs. — Comme chez *trinotata* et quelques autres, on trouve des exemplaires à élytres raccourcies, s'élargissant de la base à l'extrémité, et qui paraissent aptères.

MEDON Stephens

M. praeustus *.

M. opacello Fvl. affinis, sed nitidulus, longius subtilissime fulvo-pubescent, capite opaco, nigro, elytris basi diffuse, ore, antennis pedibusque rufis, segmentorum 6-7 marginibus apicalibus translucide rufo-testaceis; antennis articulis penultimis paulo brevioribus; capite minus convexo, creberrime rugello-punctato, haud strigello; thorace paulo longiore, quadrato, capite fortius dense punctato, haud asperulo, lateribus parallelis, antice et postice

æqualiter angustatis; elytris omnium creberrime subtiliter punctulatis, haud asperulis; abdomine vix fortius punctulato; ♂ segmento 6° ventrali basi media parum impresso ibique parum calloso. — Long., 4-4 1/3 mill.

Birmanie (*Helper*). Java: Batavia, Buitenzorg,

M. latecinctus *.

In vicinitate *M. ruficollis* Kr., licet totus alius. Parallelus, capite thoraceque nigro-piceis, nitidissimis, vix nigro pilosis, elytris abdomineque nitidulis, sat dense fusco-pubescentibus, piceus, ore, frontis margine apicali, tuberculis antennariis, antennis, elytris basi et apice sat late transversim, segmentorum marginibus apicalibus, 6° et 7° apice late pedibusque rufotestaceis. Antennæ mediocres, articulo 4° longiore quam latiore, 5° quadrato, 6-7 parum, 8-10 fortius transversis, 11° duobus præcedentibus aequali, acuminato. Caput transversim quadratum, lateribus subtiliter, fronte sat fortiter, punctatum, genis post oculos parallelis, angulis posticis subrectis. Thorax capite vix angustior, quadratus, convexus, parce sat subtiliter punctulatus, lateribus versus basin vix angustatis, angulis omnibus obtusis. Elytra paulo longiora quam latiora, thorace quarta parte latiora, subtilius densiusque subasperulo-punctulata. Abdomen parce subtilissime punctulatum. — Long., 3 3/4 mill.

Sexus differentia latet.

Tenasserim. Java: Teibodas.

M. nanus *.

Ad sectionem *M. infuscati* Er., sed minor et gracilior. Angustus, minutissimus, antennis brevissimis, capite thoraceque opacis, elytris abdomineque nitidulis a cæteris distinguendus. Rufo-testaceus, capite elytrorumque dimidia fere parte apicali infuscatis, vix perspicue flavo-pubescentibus. Antennæ capitis fere longitudine, articulo 3° vix longiore quam latiore, 4-5 satis, 6-10 fortiter transversis, 11° brevi, apice acuminato. Caput quadratum, alutaceo-punctulatum, fronte vix impressa, genis post oculos minulos parallelis, angulis posticis rotundatis. Thorax capite sat angustior, paulo longior quam latior, vix magis perspicue alutaceo-punctulatus, lateribus fere parallelis, antice fortiter oblique, postice paulo

minus et brevius angustatis, sulculo medio postico omnium tenuissimo, basin haud attingente. Elytra thorace duplo fere longiora, quarta pare longiora quam latiora, crebre subtilissime punctulata. Abdomen quasi creberrime alutaceum. — Long. 2 1/4 mill.

Sexus differentia latet.

Borneo : Pagate. Java : Buitenzorg.

Staphylinus notativentris *.

S. caffro Boh. proximus, pube fusca vel aureo-fusca, oculis paulo minoribus, abdominis segmentis subtus parcius et fortius aequaliter punctatis, 2-5 supra medio bifariam tomento atro, rarius aureo, obtectis, elytris saepe ferrugineis vel rufulis unice distinctis. — Long., 13-14 mill.

Abyssinie : Hamacen, Azéga, à 2.500^m d'alt., juillet (*Raffray*) ; d'Asmara à Keren, octobre (*Tellini*).

Obs. — Cet insecte n'est peut-être qu'une race du *caffer* Boh. Il en est au moins bien distinct par la double série de ses taches abdominales.

Philonthus cinctus *.

Colore *Ph. discoidei* Grav. sed quadruplo major, capite transversim orbiculato, elytris aeneis, sutura rufa, margine apicali et lateribus inflexis testaceis, abdomine laete irideo omnino distinctus. Caeterum nigro-piceus, capite nigro, ore antennisque squalide rufis, femoribus squalide testaceis, tibiis rufo-piceis, tarsis squalide rufis. Antennae elongatae, sat robustae, articulo 3° 2° quarta parte longiore, 4-6 longioribus quam latioribus, 7° quadrato, 8-10 vix transversis, 11° brevi, apice profunde emarginato. Caput punctis 3 majoribus utrinque arcuatim, punctis aliquot subtilibus post oculos magnos notatis. Thorax quadratus, angulis anticis omnino, posticis obtuse rotundatis, seriebus dorsalibus ut in *discoideo* tripunctatis. Elytra thorace paulo longiora, crebre fortiter punctata, flavo-puberula. Abdomen crebrius subtilissime punctulatum, densius flavo-pubescent. ♂. Capite majore, latiore, fronte transversim impressa, medio foveolata, segmento 7° ventrali apice anguste et parum profunde inciso, post incisuram triangulariter impresso et laevi. — Long., 8-10 mill.

Abyssinie : Massouah, Moncullo, Archico, décembre, janvier (*Tellini*) ; Bogos : Lebka (*Raffray*). Sénégal : Saint-Louis ; Bissao.

Obs. — J'en ai acquis des exemplaires du Sénégal, avec la collection Gory, où il figurait sous le nom inédit de *cinctipennis* Dej. Gory.

Anchocerus *.

Insectum facie *Quedium* omnino simulans, sed antennis ut in *Acylophoro* maxime fractis, articulo 2° prælongo, plus quam dimidiam partem 1ⁱ æquante ; capite inserto, magno, oblongo, fronte media punctis 2 grossis, umbilicatis, setigeris, approximatis notato ; palpis maxillaribus elongatis, articulo ultimo fusiformi, precedente parum longiore ; mandibulis prælongis, falciformibus, tenuibus, acutissimis, apice parum incurvis ; palpis labialibus latis, brevibus, articulo ultimo transverso, subsecuriformi, apice truncato ; prosterno carinato ; metasterno triangulari ; stylis analibus robustis, fortiter postice productis ; tibiis omnibus extus spinosis ; tarsis 5-articulatis, anticorum articulis 1-4 fere longitudine æqualibus, 5° precedentibus simul sumptis parum brevioribus ; tarsis intermediis et posticis elongatis, subtus longe pilosis, articulo 1° cæteris simul sumptis fere longiore ; unguiculis tenuibus, simplicibus optime distinguendum.

Ce genre se place avant les *Acylophorus* Nordm. ; il a pour type l'espèce suivante :

A. birmanus *.

Nitidus, capite thoraceque nitidissimis, parcissime nigro-setosis, clytris abdomineque parum dense griseo-pubescentibus, niger, palpis rufo-testaceis, antennarum articulis 3 primis et ultimo, abdominalis segmenti 6ⁱ apice, ano, stylis analibus basi pedibusque squallide rufis, tibiis piceis, tarsis apice subtestaceis. Antennæ sat elongatæ et graciles, articulis 4-6 elongatis, inter se æqualibus, 7-10 longitudine decrescentibus, 10° haud transverso, 11° oblongo, precedente vix longiore. Caput fortiter convexum, æquale, subtilissime dense punctulatum, post oculos magnos parum ampliatum, lateribus punctis 4 grossis setigeris, basi fere lævi, medio punctis 4 grossis etiam notata. Thorax convexus, sat transversus, postice capite tertia parte latior, paulo parcius et subtilius punctulatus, a basi ad apicem attenuatus, antice extus punctis tribus notatus, angulis anticis obtusis, posticis rotundatis, dorso ante medium

punctis duobus inter se distantibus impressis. Scutellum crebre punctulatum. Elytra quadrata, sat dense fortiter rugosule punctata. Abdomen apice attenuatum, subtiliter sat dense vix asperulopunctatum ; ♂ segmento 7° ventrali apice subtruncato, subtilissime crenulato. — Long., 9 1/2-13 mill.

Birmanie (*Heifer*). Tenasserim. Java : Buitenzorg ; Malang.

Erchomus planus *.

E. melanuro Er. (*subdepresso* Kr.) affinis, sed tertia parte major et latior, similiter coloratus et nitidus, sed antennis longioribus, articulis 4-7 subquadratis, 8-10 vix transversis, 11° longiore ; capite lævi ; thorace fere lævi ; elytris multo brevioribus, fortiter transversis, dimidio subtilius punctulatis ; abdomine contra fortius punctulato optime distinctus. — Long. 3 1/3 mill.

Tonkin (*de Beauchêne*). Birmanie (*Heifer*). Sumatra : Pajakumbo. Java : Sukabumi, mai, juin, juillet (*Rouyer*).

Alianta pictipennis *.

A. plumbea Wat. parum vicina, sed tertia parte vel dimidio minor, antice latior, subtilius et brevius griseo-pubescens, labro et palpis maxillaribus dilute piceis, antennis pedibusque squalide testaceis, macula communi elytrorum ad suturæ apicem diffusa aurantiaca ; antennis multo brevioribus et tenuioribus, articulo 4° quadrato, 5-10 sensim brevioribus, transversis, 11° brevi, crasso, conico ; thorace toto alio, minus convexo, fortiter transversim subquadrato, lateribus antice multo minus rotundatis, dorso deplanato, medio versus basin late depresso ibique vix perspicue bifoveolato ; elytris multo brevioribus, parum transversis, dorso deplanatis, alutaceis, parce subtilissime punctulatis ; abdomine sat nitido, parce subtiliter punctato maxime distincta. — Long., 2 mill.

Perim, octobre (*D^r Cameron*). Djibouti (*D^r Martin*). Erythrée littorale : Ghedem, janvier (*Tellini*).

Amaurodera *.

Insectum facie præsertim *Stenagriæ* Sharp vicinus, sed corpore elongato, gracili, nitidissimo, capite fere similiter exserto, licet

collo paulo minus tenui; thorace praelongo, supra deplanato, alutaceo, opaco, ante medium maxime dilatato, plus minusve angulato, dein versus basin strangulato; antennis setulosis, minime incrassatis, longissimis; palpis maxillaribus robustis, praelongis, articulo 3° 2° aequali, sed multo latiore, inverse obconico, apice truncato, ultimo longo, sat robusto, a basi ad apicem parum attenuato; capite antice quasi in rostrum triangulare producto; mandibulis porrectis, validis, simplicibus; labro producto, arcuato, convexo; prosterno ante coxas anticassat distantes brevissimo, post hos lato, postice arcuato; mesosterno lato, postice subrotundato, coxis intermediis distantibus; metasterno antice obconico, medio elevato-subcarinato, postice obtuse producto, coxis posticis fere contiguis; abdomine medio dilatato, segmento 7° supra granulato, apice crenulato; pedibus gracilibus, maxime elongatis, tarsis gracillimis, anticis 4-articulatis, articulis 3 primis inter se fere aequalibus, 4° his simul sumptis aequali, intermediis 5-articulatis, articulo 1° 2° tertia parte longiore, 2-4 sensim longitudine decrescentibus, posticis 5-articulatis, articulis longissimis, 1° 2° fere duplo longiore, 2-4 longitudine decrescentibus, 5° 1° sat brevior, unguiculis medioeribus, simplicibus amplissime distinctum.

Ce beau genre rappelle encore par son facies certains *Astilbus*. Il se distingue à première vue par la forme et la sculpture de son corselet très allongé, dilaté-anguleux avant le milieu, déprimé en dessus et alutacé-mat.

Les espèces qu'il renferme sont au nombre de six, dont trois déjà décrites, savoir : *Falagria veluticollis* Mots., de Birmanie (à laquelle on a réuni à tort la *Falagria opacicollis* Kr., de Ceylan); *Drusilla Bomfordi* Epp., de l'Himalaya et *Astilbus opacicollis* Epp., du Sikkim.

Eppelsheim a considéré à tort les granulations et crénelures du 7° segment dorsal de l'abdomen comme un caractère sexuel ♂; ce caractère s'observe chez tous les exemplaires que j'ai vus des espèces décrites ou inédites.

Zyras compressicornis *.

♂. Sat latus et parallelus, crassus, nitidus, capite solo fere opaco, in fundo alutaceo, squalide rufus, capite piceo, abdomine plus minusve infuscato, pedibus rufotestaceis. Antennae crasse lateraliter compressae, capite thoraceque breviores, articulo 1° brevi, fortiter clavato, 2° minimo, 3° inverse conico, 4-10 (a latere visis)

dilatatis, maxime transversis, duplo latioribus quam longioribus, 11° conico, duobus præcedentibus simul sumptis æquali. Caput vix convexum, utrinque sat fortiter parum dense punctatum, oculis magnis, genis post hos brevibus, angustatis. Thorax convexulus, capite tertia vix parte latior, fortiter transversus, longe parce fulvo-pubescentis, medio tenuiter longitudinaliter sulcatus, prope sulcum utrinque impressione longitudinali fortiter punctata insignis, versus latera et margine antico parcius fortius punctatus, lateribus parum rotundatis, vix postice magis quam antice angustatis, angulis anticis fere acutis, posticis fere rotundatis. Elytra thoracis latitudine, rarius infuscata, parum transversa, fortiter sat dense punctata, longe fulvo-pubescentia. Abdomen sat dense vix perspicue punctulatum, punctis aliquot majoribus asperatis additis, supra segmento 2° medio vix carinello, 4° apice triemarginato, unde medio obtuse bidentatum apparet, 5° fere toto concavo, 6° medio apice tuberculo obliquo, apice dentiformi armato, 7° parce fortiter asperato, apice truncato. Tibiæ intermediæ et posticæ fortiter arcuatim dilatatæ, extus dense spinosæ. ♀. Major, præsertim latior, capite nitido, abdomine simplici, densius asperulo distincta. — Long., 7-9 mill.; latit. elytr., 2-3 mill.

Chine meridionale : Hong-Kong. Bornéo : Tameang-Lajang, novembre (*Grabowsky*). Sumatra : Deli. Java : Batavia, Buitenzorg, Malang, Mt. Smerou.

Obs. — Chez certains individus, les caractères ♂ de l'abdomen s'atténuent ou même disparaissent presque complètement, comme il arrive chez les autres espèces.

SILUSA Erichson

S. leptocera *.

S. (Stenusæ) ceylanicæ Kr. vicina, sed tota alia. Nitida, corpore antico flavo pubescente, rufa, elytris, femoribus posticis præter basin iisdemque tibiis plus minusve infuscatis, abdominis segmentis 4-5 antennarumque articulis 3-10 piceis, 11° albido, 2 primis, ore pedibusque testaceis. Antennæ multo longiores, articulis longioribus quam latioribus, 9° quadrato, 10° parum transverso. Caput et thorax lævia, hoc cæterum ut in *ceylonica*, sed fortius æqualiter convexo, æquali, sulco longitudinali tenui, vix perspicuo. Elytra subtilius vix rugose punctata. Abdomen læve, nigro-setosum, segmentis 2-3 basi magis impressis, crenulis 4 v. 5 elevatis. ♂.

Segmento 2° dorsali medio ante apicem vix perspicue bidenticulato, 4-5 apice asperatis, 6° subtiliter pluriplicatello, apice leviter 4-calloso, 7° parum plicatulo, apice truncato. — Long , 2 1/3 mill.

Java : Sukabumi, juillet; Buitenzorg.

Eustenia *.

Genus *Sipaliæ* Rey proximum, sed palpis maxillaribus articulo penultimo latiore et brevior, ovato; antennarum articulo 2° 1° fere latiore, robusto; capite antice minus producto; thorace ante medium fortiter dilatato, dein versus basin maxime strangulato; scutello minimo, vix perspicuo; abdomine singulari, lato, clavato, basi elytris pedunculo angusto adfixo, supra segmento 2° basi concavo, 3-4 basi transversim profunde sulcatis; coxis anticis contignis, intermediis vix, posticis parum distantibus; prosterno brevi, inter coxas parum angulatim producto, carinulato; mesosterno etiam carinulato; metasterno angusto, apice truncato; pedibus sat robustis, tarsis brevibus, anticis et intermediis 4, posticis 5-articulatis, his articulo 1° 2° haud longiore optime distinguendum.

Ce genre est remarquable surtout par son abdomen pédonculé à la base, et son corselet étranglé en arrière presque comme chez les *Amaurodera*; il renferme une demi-douzaine de petites espèces offrant assez le faciès de quelques *Falagria* et *Borboropora*.

E. aspera *.

Squalide rufa, capite præter frontem abdominisque segmentis 5-6 piceis, elytris nigris, basi summa, rufescentibus, ore pedibusque rufo-testaceis. Antennæ capitis thoracisque longitudine, robustæ, articulis 1-2 æqualibus, 3° angustiore, paulo longiore quam latiore, 4 et 6 parum transversis, 5° quadrato, 7-10 sat fortiter transversis, 11° majore, obconico. Caput parvum, fortiter transversum, sat nitidum, utrinque parum impressum et sat dense fortiter punctulatum, medio longitudinaliter cum fronte antica lævi, oculis sat magnis, genis post hos angustatis. Thorax capite sat latior, nitidior, ante medium fortiter rotundatim dilatatus, dein maxime strangulatus, ante basin dilatatus, sulco medio longitudinali præsertim postice lato et profundo, disco juxta sulcum fortius subrugose punctato, parte expansa fere lævi, angulis posticis sat obtusis, fossa elongata laterali ante basin leviter marginatam. Elytra nitida, lata, thoracis basi duplo latiora, sat fortiter transversa, convexa,

parallela, fortiter asperato-punctata. Abdomen nitidum, parce fusco-pubescent, segmentis 2-4 laevibus, medio longitudinaliter subtilissime carinulatis, 5-6 parce subaspero-punctatis, 5° basi media vix carinulato. — Long., 1 3/4 mill.

Sexus differentia latet.

Java : Teibodas.

Unique.

E. opacicollis *.

Præcedente paulo minor, capite thoraceque opacis, creberrime subtilissime rude punctatis, elytris abdomineque nitidis, fronte antica nitella, laeviuscula. Picea, antennarum articulo 1°, palpis, abdominis segmentis 2-4 obscure pedibusque testaceis; antennarum articulo 11° multo longiore, conico; thorace ante medium rotundatum dilatato, dein minus strangulato, sulco longitudinali multo minore, angusto, postice vix dilatato; elytris minoribus, a basi ad apicem rotundatum sat angustatis, sat parce vix perspicue punctulatis, fusco pubescentibus; abdomine longius pubescente, dense subtilissime punctulato, segmentis basalibus haud carinulatis, 6° laeviusculo facillime distinguenda. — 1 1/2-1 2/3 mill.

Sexus differentia latet.

Birmanie (*Helper*). Java : Buitenzorg.

PHYTOSUS Curtis

P. obockianus *.

Minimus, antice opaculus, abdomine nitido, nigro, parce longe flavo-pilosulo, dense subtilissime fulvo-pubescent piceus, ore, antennis, elytris pedibusque flavis, antennarum articulo 11° fuscule, segmento 6° versus apicem 7°que pallidis, elytris basi plus minusve infuscat. Antennæ articulis 2 primis crassis, 2° 1° vix brevior, 3° inverse conico, 4° parum, 5-10 sensim fortius transversis. Caput convexum, crebre subtilissime punctulatum, oculis mediocribus, sat depressis. Thorax capitis latitudine, parum transversus, circa basin parum angustatus, angulis posticis subrectis,

dorso late obsolete, basi multo latius sulcatus, capite adhuc densius et subtilius punctulatus. Elytra parum transversa, magis perspicue parcius punctulata. Abdomen parce subtilissime, apice adhuc parcius, punctulatum. — Long., 1 2/3 mill.

Sexus differentia latet.

Perim, octobre (*D^r Cameron*); Djibouti (*D^r Martin*); Abyssinie : Ghedem, sous les détritns du littoral, janvier (*Tellini*).

HOMALOTA Mannerheim

H. nigrescens *.

Major, elongata, depressa, corpore antico opaco, abdomine sat nitido, dense fusco-pubescens, picea, palpis, tuberculis antennariis, antennarum articulis 1 et 4-11, elytris plus minusve, abdominis segmentis 2-4 et ano squalide rufulis, ore cæterum pedibusque testaceis. Antennæ elongatæ, fusiformes, articulo 3° 2° parum longiore, 4-10 haud transversis, 11° apice flavo. Caput crebre subtilissime punctulatum, vertice medio vix foveolato, oculis magnis, genis post hos oblique fortiter angustatis. Thorax capite quarta parte latior, vix transversus, lateribus parum rotundatis, angulis anticis parum, posticis fortiter obtusis, alutaceus, dorso longitudinaliter latissime impressus. Elytra quadrata, thoracis longitudine, hoc quarta parte latiora, omnium creberrime subtilissime punctulata. Abdomen segmentis 2-4 crebre sat fortiter, 5-6 parcius punctatis, 2-4 fortiter, 5° subtiliter basi transversim sulcatis. ♂. Segmento 7° apice truncato. — Long., 2-2 1/2 mill.

Sumatra : Pajakumbo. Ile Nias. Java : Buitenzorg, Sukabumi, Malang, Pasuruan, M^t-Smerou.
