



RAPPORT ANNUEL SUR LES CETACES ET PINNIPÈDES
TROUVÉS SUR LES CÔTES DE FRANCE - ANNÉE 1990*

Digitalization sponsored
by Thünen-Institut

par R. DUGUY

Centre National d'Etude des Mammifères Marins, Musée Océanographique
Port des Minimes, 17000 LA ROCHELLE

SUMMARY

Four hundred sixty nine cetaceans (466 Odontoceti and 3 Mysticeti) have been recorded during the year 1990 : 19 in the Channel, 268 in the Atlantic and 180 in the Mediterranean.

They belong to the following species : *Stenella coeruleoalba* (150), *Delphinus delphis* (149), *Lagenorhynchus acutus* (1), *Tursiops truncatus* (9), *Globicephala melas* (11), *Phocoena phocoena* (5), *Kogia breviceps* (2), *Physeter macrocephalus* (2), *Balaenoptera physalus* (3), and unidentified Odontoceti (137).

One hundred sixty two sightings of Pinnipedia have been recorded : 26 *Phoca vitulina*, 71 *Halichoerus grypus* and 65 unidentified. One hundred forty of them have been recorded in the Channel and 22 in the Atlantic.

Au cours de l'année 1990, les observations de Cétacés se sont élevées à 469 individus, au total (466 Odontocètes et 3 Mysticètes) dont 19 ont été trouvés en Manche, 268 en Atlantique et 180 en Méditerranée. La fréquence par espèce est la suivante : *Stenella coeruleoalba* (150), *Delphinus delphis* (149), *Lagenorhynchus acutus* (1), *Tursiops truncatus* (9), *Globicephala melas* (11), *Phocoena phocoena* (5), *Kogia breviceps* (2), *Physeter macrocephalus* (2), *Balaenoptera physalus* (3) et Odontocètes indéterminés (137).

En comparaison avec l'année 1989, le nombre total d'échouages sur les côtes de France est très nettement plus faible (469 au lieu de 835). Cette diminution provient des observations en Atlantique (268 au lieu de 769), tandis qu'en Manche l'ordre de grandeur est le même (19 au lieu de 16). Par contre, en Méditerranée, le nombre d'échouages est passé de 50 à 180. Cette brutale augmentation est la conséquence de l'épizootie virale qui a atteint *Stenella coeruleoalba* : apparue en septembre, elle a atteint un maximum en octobre et disparu en fin décembre.

Cent soixante-deux observations de Pinnipèdes, isolés ou en groupes, ont été signalées, dont 26 *Phoca vitulina*, 71 *Halichoerus grypus* et 65 phoques indéterminés. Cent quarante observations proviennent de la Manche et 22 de l'Atlantique.

*Le rapport détaillé a été publié dans : Ann. Soc. Sci. nat. Charente-Maritime, 1991, 7(9) : 1017-1048.

