



M É M O I R E

S U R

L' O R I G I N E

*Des Fossiles accidentels des Provinces
Belgiques.*

LORSQUE tant de naturalistes étrangers faisoient valoir les pétrifications de la Suisse, de l'Allemagne, de l'Angleterre & de la France, nous nous imaginions qu'il falloit fortir de notre pays pour apprendre à connoître toutes ces productions singulieres; & nous ignorions qu'après avoir examiné plus attentivement l'intérieur de notre sol, nous montreriens à notre tour des pierres figurées qui offriroient ce que cette classe de fossiles renferme en général, de plus curieux & de plus intéressant.

C'est presque à la fois & depuis peu, qu'on a commencé à découvrir une quantité étonnante de pétrifications dans le Tournaisis, le Brabant, le Hainaut, le Limbourg, le Luxembourg, &c. A la vue de tant de dépouilles du regne animal & du regne végétal, de tant de coquilles & d'autres productions marines enfouies par-tout sous nos pieds, nous nous demandons si ce

Tome II.

T t t

font-là les vestiges d'un déluge universel, de quelque inondation particulière, ou les marques d'un séjour naturel de la mer qui, depuis des temps reculés, auroit abandonné une portion de son ancien domaine? Telles sont les trois causes qui se présentent naturellement lorsqu'on envisage le phénomène dont il s'agit; mais, est-ce à une seule d'entre-elles que tient ce phénomène? faudra-t-il pour l'expliquer, admettre le concours de deux de ces causes, ou devra-t-on le faire dériver de toutes les trois ensemble? Le résultat des observations diverses que j'ai à exposer, pourra, en le décidant, me faire atteindre le but des recherches qui forment l'objet de ce Mémoire. Je commence par exposer en raccourci le tableau général de nos fossiles accidentels.

Les coquilles qui se déterrent dans l'étendue de nos Provinces, offrent des suites de la plupart des familles désignées par les lithologistes : parmi ces coquilles, il en est qui se trouvent vraiment pétrifiées, d'autres qui sont presque dans leur état primitif; on en remarque même qui ont encore conservé toute leur fraîcheur : enfin, des noyaux (1) dépouillés du têt qui leur a servi de moule, font reconnoître nombre d'autres coquilles qui ont pareillement été enfouies au milieu de notre sol. Dans la classe des coquillages univalves ou leurs noyaux, se remarquent des Patellites, des Buccinites, des Turbinites, des Volutites, des Cochlites, des Toninites, des Porcellanites, des Néritites, des Nautilites, des Cornes d'Ammon ou Ammonites, des Numismales (2), des Vermiculites, des Dentaies, des Belemnites.

(1) Les noyaux sont des pierres dont la matière molle encore, s'est insinuée dans des coquilles. Celles-ci s'étant détruites, ont laissé à la matière durcie & à laquelle elles avoient servi de moule, l'empreinte de leur configuration intérieure.

(2) Je place ici nos Numismales ou pierres lenticulaires, parce que dans leur espèce, elles sont des vraies Ammonites. Voyez Gesner *de petrificatis* pag. 50.

tes (1). Les coquilles bivalves sont pour la plupart les suivantes : des Ostreacites, des Gryphites, des Pectinites, des Musculites, des Pinnites, des Tellinites, des Solenites, des Térébratules de plusieurs espèces, d'une entre autres qui n'a encore été décrite par aucun lithogiste (2), & qui se rencontre aux environs de Bruxelles.

Dans la classe des multivalves, on trouve des Balanites, des Pholadites, une suite variée d'Ourfins & leurs parties détachées, telles que des écussions, des mammelons & ces pétrifications appelées *pierres de Judée*. Je ne m'arrêterai pas aux variétés très-multipliées dans les genres & les espèces, que présentent la plupart de nos coquilles fossiles ; ce seroit-là un détail superflu ; passons à ce que nous offre la comparaison de ces coquilles avec leurs analogues marins.

Quelques-uns de ces analogues se voient sur nos côtes de Flandre & de Hollande : d'autres ne sont actuellement connus que dans quelques parages des mers éloignées, & ne le sont même que dans ceux de l'océan des grandes Indes. Quant aux coquilles dont les analogues marins n'ont pas encore été découverts, & tout lithogiste aura remarqué ci-dessus, que nous en avons de cette espèce, on fait d'après la distinction des

& *seq. Lugd. Bat. 1759*. Nous en avons qui n'excedent pas en grosseur un grain de millet : celles-ci sont sphériques : quant aux autres qui ont la forme que leur nom désigne, elles font voir leur organisation intérieure lorsqu'on les sépare en deux ; c'est à quoi on peut parvenir aisément lorsqu'on les a chauffées & jetées ensuite dans de l'eau froide.

(1) Les Belemnites trouvent ici leur place, parce qu'il est presque démontré que ce sont des coquillages dont les analogues marins sont encore inconnus.

(2) Il en est de même de plusieurs autres de nos pétrifications : il seroit à souhaiter que quelqu'un de nos curieux entreprit d'en faire une description exacte : on y trouveroit bien des choses curieuses & nouvelles ; bien des pétrifications sur lesquelles des naturalistes très-habiles ayant été consultés, ont dû convenir qu'ils ne sauroient que répondre, dès qu'on leur demanderoit plus que de simples conjectures.

coquilles en pélagiennes & en littorales , que c'est au nombre des premières , comme on l'explique communément , que doivent se trouver les analogues de celles qui ne se sont encore observées que parmi les fossiles accidentels. Ces analogues , c'est-à-dire , ces coquillages pélagiens , habitans de la haute mer , & occupant des endroits très-profonds , où les eaux , dans les plus grandes tempêtes , demeurent toujours tranquilles ; ces analogues , dit-on , doivent nous rester inconnus ; au lieu que les coquilles littorales , plus voisines des côtes , y sont jettées durant les tempêtes , ou y sont apportées & abandonnées ensuite à chaque flux & reflux.

Je continue le tableau de nos fossiles accidentels. A la suite des coquillages viennent se ranger quelques crustacées. Des dépouilles du homard & du crabe , & des noyaux moulés dans l'intérieur de ce dernier , voilà ce que nos curieux ont rencontré plus d'une fois. Je viens à ce qui regarde les dépouilles de poissons , éparfés au milieu des couches qui composent notre sol.

Ici se remarque un squelette tout entier ; là , quelques vertebres , &c. Les dents seules présentent de quoi former une collection très-nombreuse & très-variée : tantôt on reconnoît celles , tant inférieures que supérieures , du requin ou de quelque autre espèce de chien de mer , tantôt celles de la dorade ou d'un poisson absolument inconnu. Particulièrement aux environs de Bruxelles , on rencontre ces pétrifications singulieres , trouvées pour la première fois près de Montpellier , & que M. de Jussieu a reconnues pour des restes de la mâchoire d'un poisson qu'on ne trouva qu'à la Chine & à la Cayenne : ce poisson est du genre des raies (1). Je ne puis omettre de parler ici de ce

(1) Voyez l'Hist. de l'Acad. de Paris année 1721 , pag. 2 , Mém. pag. 71 & 332. Année 1723 , Mém. page 206. Les pétrifications dont il s'agit , se présentent sou-

prétendu squelette de crocodile, découvert passé quelques années dans la montagne de S. Pierre près de Maestricht, & qu'on a su ensuite avoir appartenu à l'épaular ou dorque, en latin *orca*, espece de baleine que les Anglois appellent *witlepoole* (1) Je cite ici un fossile de la montagne de S. Pierre, & je le ferai encore tout-à-l'heure, n'hésitant pas à placer les pétrifications des environs de Maestricht parmi celles de nos contrées Beligiques. Au reste, on a trouvé entre Louvain & Tirlemont, une côte à demi-pierreuse, longue d'environ six pieds, & qui se reconnoît visiblement pour avoir appartenu à la baleine : & aux environs d'Anvers, où se rencontrent d'ailleurs beaucoup de coquilles fossiles, on a déterré plusieurs fragmens d'os de cétacées.

Une de nos pétrifications, propre à attirer particulièrement les regards des curieux, c'est celle de la tortue de mer. L'on a trouvé de ses dépouilles non-seulement à l'endroit où se trouve actuellement le village de Melsbroeck, situé environ à deux lieues de Bruxelles;

la forme de petits parallépipèdes d'environ six lignes de longueur sur deux lignes de largeur, & deux à trois lignes d'épaisseur : ils sont bruns ou noirs, lisses & polis en dessus, quelquefois grisâtres en dessous, & cannelés transversalement de plusieurs stries parallèles ; à leurs côtés ils ont des moulures par lesquels ils s'engagent les uns dans les autres, & sont un tout ensemble comme cela s'observe quelquefois : alors on remarque que les petits parallépipèdes qui occupent le milieu, sont terminés par des triangles isocèles. Quelques fragmens d'une forme un peu différente de celle que je viens de décrire, & qui ont aussi été découverts aux environs de Bruxelles, paroissent appartenir à la même espece de pétrification.

(1) On lit dans les *Mélanges de Berlin* tome I, page 99, qu'un squelette de crocodile pétrifié & métallisé, a été trouvé dans la Turinge, où l'on a encore rencontré, comme il se voit dans les actes des savants de Leipsic, année 1718, page 188, un squelette semblable, simplement pierreux. Après ce que j'ai dit touchant le squelette trouvé dans la montagne de S. Pierre, on peut croire naturellement que ceux qui ont été découverts dans la Turinge, ont également appartenu à un cétacé.

mais encore dans la montagne de S. Pierre. On peut juger de la rareté de cette pétrification, lorsqu'on se rappelle qu'aucun lithologiste n'en a parlé, à l'exception de Boccone (1), sur la foi duquel M. Bertrand a inséré dans son Dictionnaire oryctologique, un article qui ne contient que cette indication; *La tortue ou quelques-unes de ses parties pétrifiées.*

Je viens à présent à certaines dépouilles marines, que nos fossiles accidentels offrent encore, & en abondance: leurs analogues sont ces productions singulières que les naturalistes modernes ont reconnues pour des amas de loges ou de cellules occupées par diverses espèces de polypes: ces loges rassemblées par masses, ont pris, comme on fait, le nom de polypiers ou de productions à polypes.

Parmi les productions de cette espèce qui se découvrent au milieu de nos contrées, on remarque ici des Madréporites, des Rétéporites, des Milléporites, des Astroïtes, des Fongites, des Ficoïdes; là, des parties branchues de la tête de Méduse & du palmier marin, ou des articulations du dernier de ces zoophytes, connues sous les noms de Trochides & d'Entroques. Enfin, on distingue en outre, une quantité de ces corps compris sous les dénominations générales de lithophytes & de coralloïdes.

Puisque les débris de l'océan ne sont pas les seuls fossiles accidentels qu'on aperçoive dans l'intérieur de la terre, & que des dépouilles de quadrupèdes & de végétaux s'y découvrent encore; il falloit à un sol aussi fécond que le nôtre en curiosités naturelles, que des fossiles de ces deux espèces s'y trouvassent aussi rassemblés. On dit qu'autrefois des os d'élé-

(1) *Mus. di Fisica*, page 181.

phant ont été déterrés en Flandre : c'est un fait ancien ; en voici un plus récent. Dans les environs de la ville d'Alost, on a rencontré en creusant une tourbiere, différens restes de quadrupedes , entre autres, la partie osseuse d'une tête de sanglier, inconnu en Europe, vu la taille extraordinaire qu'a dû avoir l'animal vivant , à en juger par les os de cette tête. Ce qui a principalement fait reconnoître l'espece de quadrupede auquel a appartenu la partie osseuse dont il s'agit, c'étoient les défenses qui l'accompagnoient : celles-ci, de même que d'autres trouvées dans la même tourbiere , avoient une longueur tout-à-fait remarquable. J'ajouterai une dent inconnue, d'une grandeur assez extraordinaire, & voilà à quoi je dois me borner dans cet article, n'ayant pu apprendre d'autres particularités , parce que les ouvriers qui ont exploité la tourbiere, ont dispersé la plupart des ossemens qu'ils y trouvoient sous la main. Voici maintenant ce que présentent les restes du regne végétal parmi nos fossiles accidentels.

Dans plusieurs endroits de nos Provinces on rencontre des bois pétrifiés , ou bien conservés, à leur couleur près, dans leur état naturel lorsque c'est des tourbieres qu'on les retire. Quant à nos tourbes elles-mêmes, comme en général toute substance de cette espece , n'est qu'un composé de végétaux détruits, elles doivent sans doute obtenir ici une place parmi nos fossiles accidentels.

On connoît ces empreintes de plantes sur des pierres feuilletées. Plus d'un endroit de nos Provinces fournit de pareils vestiges du regne végétal, sur-tout une couche de schiste, qui accompagne une charbonniere des environs de Valenciennes : la quantité d'empreintes que fait appercevoir cette couche , est véritablement prodigieuse ; & en les examinant attentivement, on

reconnoît qu'elles sont presque toutes, celles de certaines plantes étrangères à l'Europe, & propres seulement aux climats de la zone torride : souvent même quelques-unes de ces empreintes représentent des végétaux absolument inconnus. L'observateur se rappelle le phénomène découvert par M. de Jussieu à S. Chaumont (1); & à chaque pas, il croit herboriser dans un monde nouveau.

Tel est le tableau en raccourci des différentes productions animales & végétales, renfermées au sein de la terre dans l'étendue de nos contrées Beligiques. Voyons comment pourra s'expliquer l'origine de tous ces fossiles. Un phénomène parmi eux, a déjà particulièrement fixé notre attention; c'est celui que présentent toutes ces productions des Indes & des autres climats chauds, ensevelies au milieu de notre sol: mais ce phénomène a été observé depuis long-temps dans plusieurs endroits de l'Europe, & il a fourni à plusieurs naturalistes, la matière de bien des recherches.

Par une supposition assez accréditée aujourd'hui, quelques physiciens prétendent rendre raison de ce même phénomène, & expliquer à la fois & en général, l'origine de tous ces débris de l'océan abandonnés au milieu des terres. On connoît l'idée du Chevalier de Louville touchant l'obliquité de l'écliptique par rapport à l'équateur; il la croyoit toujours décroissante, de sorte qu'un jour le premier de ces cercles viendrait à se mettre dans le plan du second. M. de Louville ne se contenta pas de faire usage, pour appuyer son opinion, de tout ce qui pouvoit appartenir directement ou indirectement à son sujet d'après ce qu'il ramassa depuis

(1) Voyez l'Histoire de l'Académie de Paris, années 1718, page 3, & 1721, page 1.

depuis l'antiquité la plus reculée; mais il alla exprès à Marseille pour observer si l'obliquité de l'écliptique étoit encore telle qu'elle y avoit été fixée deux mille ans auparavant; & il la trouva moindre de vingt minutes. A quelques exceptions près, tout aboutissoit à rendre l'obliquité décroissante, souvent d'une manière assez juste, à raison d'une minute par siècle, ou d'un degré sur six mille ans. Enfin, M. de Louville crut même pouvoir prouver dans certaines circonstances heureuses, que le décroissement dont il s'agit, avoit été exactement de trois secondes en cinq ans, & c'est ce qu'il falloit ensuite de la proportion fixée par cet Académicien. D'après tout cela, voici comme on raisonne. » Il est » évident, dit-on, que la terre, outre le mouvement » que nous lui connoissons, en a encore un qui la fait » tourner sur elle-même avec une extrême lenteur, » d'un pôle à l'autre, en sorte que l'écliptique, qui, » dans les siècles les plus reculés, coïncidoit avec l'é- » quateur, se trouvera un jour encore une fois con- » fondu avec lui; & c'est en déplaçant ses pôles, que » le globe a opéré le changement dont il s'agit; chan- » gement qui a produit l'angle d'intersection qu'occa- » sionne l'obliquité actuelle de l'écliptique. Delà, notre » globe a dû prendre successivement une autre position » par rapport au soleil; ceci a influé sur les climats & » leurs différentes productions : les zones glaciales & » les zones tempérées ayant été autrefois sous l'équa- » teur, il faut naturellement que les dépouilles d'ani- » maux & les vestiges de plantes qui se retrouvent dans » le sein de la terre au milieu de notre continent, ap- » partiennent à des espèces propres aujourd'hui aux cli- » mats que comprennent les tropiques. Enfin, & voici » comme on vient à une conséquence qui cependant » n'est pas bien aisée à concevoir; par le déplacement

» des pôles , dit-on , les eaux qui vont toujours occuper
 » les lieux les plus bas , se déplacèrent aussi , & se por-
 » terent successivement vers les divers points du globe.
 » La mer ayant envahi des animaux terrestres & des
 » végétaux , elle les recouvrit de toutes ces terres , de
 » tous ces fables que les eaux charient sans cesse , &
 » continuant son mouvement progressif , elle laissa à
 » sec toutes ces contrées qui offrent des amas de corps
 » marins , en même temps que plusieurs restes de qua-
 » drupèdes & de végétaux : & c'est ainsi qu'au mi-
 » lieu de l'Europe , conclut-on , des fossiles accidentels
 » doivent présenter nécessairement des productions
 » analogues à un ancien climat qui s'est insensiblement
 » changé « .

Toute cette hypothèse est assurément ingénieuse ;
 présentée d'ailleurs avec un certain art , sous un certain
 dehors séduisant , comment n'auroit-elle pas acquis des
 suffrages ? j'essayerai cependant de la réfuter , & on me
 permettra la digression suivante.

Examinons en premier lieu ce qui concerne l'opi-
 nion du Chevalier de Louville , indépendamment de
 la conséquence qu'en ont tirée ensuite quelques phy-
 siciens.

J'observerai d'abord qu'une suite d'observations fai-
 tes à diverses époques pendant un espace d'au-delà de
 2000 ans , doit faire envisager la diminution d'obli-
 quité de l'écliptique , comme un fait dont il n'est plus
 question de douter aujourd'hui (1). D'un côté il n'est
 guère possible d'attribuer une variation , ou plutôt une
 diminution aussi régulière , à l'inexactitude des obser-

(1) Voyez ce que dit M. de la Lande dans la nouvelle édition de son *Astro-
 nomie* , depuis le N^o. 2715 jusqu'au N^o 2746 : il y traite la matière à fond ,
 & il montre que l'obliquité de l'écliptique a diminué de 26 minutes , 40 secondes
 dans l'espace de 1900 ans , ou depuis Hipparque jusqu'à nous.

vations ; on a reconnu de l'autre , que les latitudes des étoiles , prises par Ptolomée & comparées avec celles qu'on a prises de nos jours , offrent une différence entièrement conforme à cette même diminution d'obliquité. Mais que peut prouver tout cela en faveur de l'opinion du Chevalier de Louville , c'est-à-dire quant à la manière dont il concevoit la chose ? Le voyant Euler a fait voir par la théorie de la gravitation Newtonienne , que l'attraction des planetes sur la terre doit produire tant la diminution d'obliquité de l'écliptique , que l'accroissement de la précession des équinoxes , & que ces effets ne sont qu'une suite de la gravitation universelle des corps : car toutes les fois que deux planetes tournent autour d'un même centre dans le même sens & dans des plans différens , l'une fait nécessairement rétrograder le nœud de l'autre.

Cet effet par rapport à la terre sur la lune , est très-connu ; il est tel , qu'il fait faire à l'orbite lunaire une révolution en 19 ans. On connoît également l'effet que produit la lune sur notre globe , dans ce qu'on appelle la nutation de l'axe de la terre : tout consiste en ce que cet axe décrit un petit cercle d'environ 18 secondes en 19 ans , ou pendant la révolution périodique des nœuds de la lune. Mais voici un passage qui peut tenir lieu de tout , & que je me bornerai à transcrire ; il se trouve dans les Époques de la Nature , par M. de Buffon (1).

» Le changement de l'obliquité de l'écliptique , dit-il ,
 » n'est pas une diminution ou une augmentation succes-
 » sive & constante ; ce n'est au contraire qu'une varia-
 » tion limitée , (*une espece de balancement*) & qui se fait
 » tantôt en un sens & tantôt en un autre , laquelle par

(1) Tome XIII , pages 33 , 34 & 35 , Ed. in-12. de 1778.
 V v v ij

» conséquent n'a jamais pu produire en aucun sens
» ni pour aucun climat une différence seulement de
» 45 degrés d'inclinaison; car la variation de l'obli-
» quité de l'axe de la terre est causée par l'action des
» planetes, qui déplacent l'écliptique sans affecter l'é-
» quateur. En prenant la plus puissante de ces attrac-
» tions, qui est celle de Vénus, il faudroit douze
» cens soixante mille ans pour qu'elle pût faire chan-
» ger de 180 degrés la situation de l'écliptique sur
» l'orbite de Vénus, & par conséquent produire un
» changement de 6 degrés, 47 minutes dans l'obli-
» quité réelle de l'axe de la terre, puisque 6 degrés,
» 47 minutes sont le double de l'inclinaison de l'or-
» bite de Vénus. De même l'action de Jupiter ne
» peut, dans un espace de neuf cens trente-six mille
» ans, changer l'obliquité de l'écliptique que de 2
» degrés, 38 minutes; & encore cet effet est-il en
» partie compensé par le précédent; en sorte qu'il
» n'est pas possible que ce changement de l'obliquité
» de l'axe de la Terre aille jamais à 6 degrés; à moins
» de supposer que toutes les orbites des planetes chan-
» geront elles-mêmes; supposition que nous ne pou-
» vons ni ne devons admettre, puisqu'il n'y a aucune
» cause qui puisse produire cet effet. Et, comme on
» ne peut juger du passé que par l'inspection du pré-
» sent & par la vue de l'avenir, il n'est pas possible,
» quelque loin qu'on veuille reculer les limites du
» temps, de supposer que la variation de l'écliptique
» ait jamais pu produire une différence de plus de six
» degrés dans les climats de la terre: ainsi, conclud
» M. de Buffon, cette cause est tout-à-fait insuffi-
» sante, & l'explication qu'on voudroit en tirer, doit
» être rejetée".

Après ce premier examen qui ne concerne qu'un

point purement astronomique, passons à une réflexion que tout le monde peut faire. Il s'agit d'une conséquence qui résulte naturellement de l'hypothèse dont j'ai entrepris la réfutation : cette conséquence seule paroît bien propre à révolter tout esprit que n'entraîne pas l'enthousiasme de système. Je veux parler de cette prétendue antiquité du monde, de cette énorme révolution de siècles, dont il faut se former l'idée pour expliquer ce qu'on envisage comme une suite du mouvement des pôles.

Ceux qui soutiennent l'hypothèse, ne laissent pas de prétendre, que des dépouilles marines se trouvent dans tous les endroits de la terre : ainsi la mer doit, selon eux, avoir déjà fait tout le tour du globe : voilà donc que les pôles ont fait une révolution complète : mais ce n'est pas tout ; à cette période entière il faut ajouter encore la partie de celle qui est recommencée, & qui correspond à la valeur d'environ vingt-trois degrés & demi, ou à leur valeur de l'angle que forme actuellement l'écliptique avec l'équateur. Le mouvement des pôles est supposé à raison d'un degré sur fix mille ans ; voici donc pour les 360 degrés d'une révolution entière, un nombre de 2,160,000 ans, & pour les vingt-trois degrés & demi ou environ de la révolution recommencée, un second nombre de 141,000 ans : ces deux sommes prises ensemble donnent celle de 2,301,000 ; c'est donc depuis ce dernier nombre d'années que le monde existe.

Mais notre globe seroit-il si ancien ? Pour adopter une hypothèse bâtie d'ailleurs sur un fondement qui doit être abandonné en bonne astronomie, faudroit-il renchérir sur les rêveries des Babyloniens, des Egyptiens & des Chinois, dont la chronologie ancienne n'est autre chose que le monument de la folle vanité.

de ces différens peuples? Et quand il ne s'agiroit que d'une suite de siècles à peu près conforme à cette même chronologie, vaudroit-il mieux s'en tenir à celle-ci, plutôt que de s'en rapporter à cette autre qui doit être pour nous d'une autorité si respectable, qui est si parfaitement d'accord avec les monumens historiques les plus certains, avec la tradition constante des peuples les plus sages, avec l'origine commune des peuplades, des sciences & des arts? En voilà assez quant à un objet sur lequel il est inutile de s'appesantir : passons à un argument que fournit contre l'hypothèse, ce que nous savons touchant la figure de notre globe, si sagement déterminée par quelques physiciens modernes.

Cette figure qu'avoit assignée le grand Newton, a été ensuite reconnue par ces illustres voyageurs (1) qui observerent qu'un degré du méridien terrestre, est plus grand d'environ mille toises du côté des pôles, que du côté de l'équateur. Il résulte de-là, que notre planète est un sphéroïde élevé sous l'équateur & sensiblement applati vers les pôles. La terre, mise en mouvement sur son axe, a pris cette forme lorsque la matière terrestre étoit encore dans un état de mollesse par une suite du séjour universel des eaux : dans ce même état, les parties voisines de l'équateur, qui subissent le plus grand mouvement dans la rotation, se sont le plus élevées ; celles qui sont voisines des pôles, où ce mouvement est moindre ou nul, se sont abaissées dans la proportion juste & précise qu'exigent les lois de la pesanteur, combinées avec celles de la force centrifuge. Telle est donc la forme de notre globe qui doit nécessairement se trouver renflé sur l'équateur & applati sous les pôles. Mais comment concilier cela avec le prétendu mouvement

Epoques de
la nature.

(1) MM. de Maupertuis, Clairaut, le Camus, le Monnier, l'Abbé Outhier, Celsius, Bouguer, de la Condamine & Godin.

de ces derniers & le déplacement successif de l'équateur , de la maniere qu'on suppose l'un & l'autre dans l'hypothese bâtie sur le changement d'obliquité de l'écliptique ?

Pour admettre cette hypothese , il faut supposer nécessairement que la terre n'a rien de stable dans sa forme , puisqu'elle doit la changer sans cesse à mesure que les pôles se déplacent , & céder tantôt dans un endroit , tantôt dans un autre , à la force du mouvement centrifuge , & cela pour s'élever & s'abaisser successivement vers tous les endroits du globe. Mais celui-ci a acquis depuis un grand nombre de siècles , une solidité telle , qu'à moins d'un bouleversement général , il n'est plus possible que la matiere terrestre , ces énormes chaînes de montagnes graniteuses , ces couches durcies , pétrifiées , puissent se prêter à l'effort d'une force centrifuge combinée avec une force gravitante & toujours variable , toujours passant d'une latitude à l'autre. Représentons-nous le mouvement graduel des pôles , & nous devons nous représenter en même temps un globe qui , dans toute son étendue , n'est plus qu'un amas de ruines & de décombres.

Après une réflexion qui renverse l'idée du prétendu mouvement des pôles , & qui s'offre naturellement à l'esprit , du moment qu'on veut réfléchir à la forme de notre globe & à la cause dont elle est nécessairement une suite , voyons ce que nous apprendra l'expérience , ce qu'elle nous dira par rapport au phénomène qu'on prétend expliquer par l'hypothese du changement de l'écliptique. Parmi les faits dont je dois faire mention , il en est qui pourront servir à la fois , & à combattre toujours d'avantage cette même hypothese , & à rendre insuffisante cette autre bien plus nouvelle , que je n'ai pas voulu réfuter dans les formes , parce qu'elle

me paroît encore trop peu accréditée : je parle de l'opinion de ce génie hardi & sublime , qui décrit l'origine de notre globe ainfi que celles des autres planètes , en fupposant des masses enflammées & liquéfiées , qu'une comete auroit détachées du foleil.

Je commence par ce qui concerne ces os , ces défenses , ces squelettes prefqu'entiers d'éléphants , enfin ces offemens d'autres animaux étrangers , qu'on découvre tous les jours en Europe. Pour fixer nos idées , représentons-nous ce qui fuit.

Un animal meurt dans les forêts , les chairs fe corrompent , fe détruiſent bientôt ; la charpente offeuſe ſubſiſte quelque temps , & on en retrouve çà & là les parties éparſes ; mais à la longue elles ſe détruiſent enfin elles-mêmes , & parce qu'elles ſont expoſées en plein air , jamais elle ne peuvent parvenir à l'état de pétrification. Ceci poſé , remontons à cette époque imaginaire où nos climats du nord doivent s'être trouvés ſous l'équateur , ou bien à celle qui doit avoir exiſté ſelon le ſyſtème de M. de Buffon , lorſque notre globe , autrefois une maſſe embrasée & liquide , conſervoit encore vers les pôles , où le refroidiſſement a commencé , une chaleur analogue à celle qu'ont actuellement les climats voifins de l'équateur ; en forte que des éléphants & d'autres animaux aujourd'hui étrangers pour nous , trouvoient dans nos contrées ſeptentrionales le degré de chaleur qui leur eſt convenable. Mais quand tous les quadrupèdes dont on trouve les offemens foſſiles , ſeroient venus mourir au bord de la mer , encore paroît-il impoſſible de concevoir comment leurs os ne ſe ſeroient pas entièrement détruits , avant que la mer , changeant de place d'une manière tout-à-fait inſenſible , eût pu non ſeulement les renfermer dans ſes nouvelles limites , mais encore les recouvrir ſuffiſamment de ſable & de terre , &
former

former sur le terrain nouvellement occupé, des couches au milieu desquelles ces mêmes os eussent trouvé moyen de se pétrifier ou de se conserver presque dans leur état naturel, comme cela est arrivé quelquefois à l'ivoire fossile. Et que reste-t-il à dire après ce que nous savons du phénomène assez récemment découvert par M. Pallas, qui a trouvé en Sibérie, dans les terres glacées des bords du Viloui, la carcasse d'un rhinocéros, avec la peau entière, des restes de tendons, de ligamens & de cartilages?

Le sujet m'amène à toucher ici quelque chose de ces zoolites découverts depuis peu dans le Margraviat de Bareith, & dont M. Esper nous a donné la description. L'Auteur y parle de certaines cavernes où se trouvent des os de quadrupèdes, rassemblés par tas qui se mesurent à la toise. Outre ces tas, il nous représente des amas de dents de différentes espèces, des côtes, des vertèbres, des phalanges, &c. en un mot, les différentes parties entières ou en fragmens de la charpente osseuse de certains quadrupèdes, le tout incorporé à des masses pierreuses d'un volume considérable. Bien plus, M. Esper nous parle de quelques cavernes, dont le sol, jusqu'à la profondeur de cinq à six, & même de dit-huit pieds, n'est autre chose qu'un résidu de substances animales, dénaturées par la putréfaction. C'est de quoi l'Auteur s'est convaincu par les procédés chimiques auxquels il a eu recours. Je laisse à juger ici de la quantité énorme de quadrupèdes dont les corps entassés les uns sur les autres, ont formé par la putréfaction un sol d'une telle épaisseur. Au reste, si on demande quels peuvent avoir été ces quadrupèdes, je répondrai d'après M. Esper, que c'est là une question qui reste problématique. Les recherches que cet observateur a faites à cet égard, ne lais-

sont rien à désirer : il a consulté plusieurs savans naturalistes , entre autres , le célèbre Linnée dont les décisions seront à jamais respectables ; tous se sont bornés à dire qu'il étoit impossible de rapporter à aucun animal connu , les zoolites dont il s'agit : ce qu'on a seulement pu appercevoir , c'est que les quadrupèdes auxquels ont appartenu tous ces ossemens , formoient huit ou neuf especes différentes ; qu'ils étoient carnassiers , & que parmi eux il y en avoit de la taille à peu près du cheval. M. Esper ajoute qu'on a trouvé en Transylvanie , en Hongrie près des Carpates & encore dans un endroit à trois lieues de ces montagnes , comme aussi dans plusieurs cavernes du Hartz , des zoolites exactement les mêmes que ceux qui ont été découverts dans le Bareith. Je ne dirai pas que toute cette quantité énorme de dépouilles animales provient de certains quadrupèdes qui n'existent plus sur la surface du globe , & que l'espece s'en est détruite ; je ne poserai pas cette assertion , parce qu'il suffit d'observer que là même où se rencontrent les zoolites que décrit M. Esper , on trouve aussi des os d'éléphans , & que de pareils os se déterrent en Hongrie dans les mêmes endroits où l'on découvre des zoolites semblables à ceux du Bareith : & il pourra s'inférer de là , que puisque c'est certainement par une suite d'une même révolution , que des éléphans & tant d'animaux inconnus ont laissé leurs dépouilles au milieu de l'Europe , ces mêmes animaux inconnus ont habité , comme l'éléphant , certains climats lointains où leur race se découvrira peut-être un jour. A propos des dépouilles fossiles de ce dernier animal , voici encore ce qui ne doit pas être passé sous silence.

D'après l'hypothese fondée sur le prétendu mouvement des pôles , on suppose que des éléphans trouvoient

autrefois, successivement en plusieurs contrées de l'Europe, un climat pareil à celui qui leur est propre aujourd'hui en Asie. Mais en Amérique, où tous les climats de l'Asie sont répétés, il n'y a pas d'éléphants, & cependant on y a trouvé les dépouilles fossiles de cet animal : ces dépouilles ont été découvertes entre autres en Canada, dans le pays des Illinois ; & Rudbeck rapporte dans son *Atlantica* tome I, page 35, qu'on a déterré des défenses d'éléphants au Mexique, c'est-à-dire dans un climat précisément analogue à celui qu'habite ce quadrupède en Asie.

Je viens maintenant au phénomène que présentent en plusieurs endroits de l'Europe, ces empreintes de plantes exotiques dont j'ai parlé ci-dessus. Il est une réflexion à faire à l'occasion de ce phénomène : elle sera dans son espèce, la même que nous ont fournie ces dépouilles animales qui nous ont occupés tout-à-l'heure.

Lorsqu'on soutient que toutes ces plantes étrangères dont nous découvrons les vestiges en Europe, ont anciennement été propres aux climats de cette partie du monde, il faut supposer qu'il y eut un temps où elles se sont trouvées croissant au bord de la mer ; car celle-ci, par une suite de l'explication du phénomène, ayant toujours gagné du terrain, comme on le suppose, doit les avoir détachées successivement pour les porter à quelque distance, & les incorporer dans l'une ou l'autre de ces couches qui se forment tous les jours dans son sein par le sédiment des eaux. Mais à mesure que la mer étendoit ses limites par un mouvement imperceptible, la plupart de ces plantes ne devoient-elles pas dégénérer à cause du nouveau voisinage de l'océan, & périr enfin de proche en proche, ayant même que les eaux eussent pu les atteindre ? car on sait que le voisinage de la mer est nuisible à presque tous les végétaux, &

l'on n'ignore pas ce que l'expérience apprend en général à cet égard. Je me bornerai à rapporter ici l'exemple suivant ; c'est celui que présente un parc qui se trouve près de Southampton, vers la partie méridionale de la Grande-Bretagne ; ce parc (1) est à peu de distance de la mer, & vu de la côte, il offre un vrai amphithéâtre, en sorte que les arbres, depuis l'extrémité la plus éloignée de la mer, diminuent graduellement de hauteur jusque vers la partie la plus voisine de la côte, où ils n'ont plus que la taille des arbrisseaux.

En persistant toujours dans l'idée de ces anciens climats de l'Europe, qu'on veut avoir été tels que le sont aujourd'hui ceux de la zone torride, l'unique moyen auquel on pourra maintenant avoir recours pour se tirer d'embarras, sera, comme je me l'imagine, de supposer que tant de dépouilles d'animaux étrangers, tant d'empreintes de plantes exotiques sont des vestiges de quelques anciennes inondations : on soutiendra que la mer en différens temps & en différens endroits, sortant tout-à-coup de son lit, a pu s'étendre fort loin, & couvrir subitement des terrains peuplés d'animaux & couverts de plantes. Soit que les eaux n'aient quitté qu'à la longue ces terrains envahis, ou que, chargées de dépouilles animales & végétales, elles soient, peu après leur éruption, retournées dans leur ancien lit devenu long-temps après une terre habitable : dans l'un comme dans l'autre cas, on croira pouvoir expliquer comment ces mêmes dépouilles se sont incorporées dans des couches formées ensuite & successivement au moyen des terres & des sables chariés par les eaux.

Mais chaque pays où l'on découvre des dépouilles d'animaux étrangers, ou des vestiges de plantes exotiques,

(1) Il a appartenu autrefois à Mylord Peterborough : le Général Mordaunt en est aujourd'hui possesseur.

auroit-il donc été autrefois sujet à un débordement de la mer ? qui pourroit le croire de bonne foi ? & partout où l'on trouve de ces fossiles accidentels, quelle étendue n'auroient pas dû couvrir les eaux pour entraîner une quantité si prodigieuse de quadrupèdes, d'arbres & de plantes ! Plusieurs raisons pourroient s'alléguer contre la supposition de tous ces déluges particuliers ; mais cette supposition ne mérite guère qu'on s'y arrête : lorsque les premiers principes sur lesquels se fonde une hypothèse, tombent d'eux-mêmes, à quoi bon s'épuiser en raisonnemens pour combattre seulement une conjecture accessoire que ces principes exigent encore ? Au reste, il ne manque plus qu'un fait propre à démontrer à la fois, & la futilité de l'hypothèse qui fait voir l'Europe autrefois entre les tropiques, & l'insuffisance de cette supposition dont je viens de parler.

Le résultat d'une observation propre à remplir ce double objet, se trouve sans peine ; il ne faut qu'avoir recours à l'*Herbarium diluvianum* de Scheuchzer : ce naturaliste nous y apprend qu'un tronc d'arbre très-gros a été découvert au sommet d'une des plus hautes montagnes des Alpes. Ce fait, accompagné de quelques circonstances qui seront rapportées ci-après, va fournir matière aux réflexions suivantes (1).

Quelque voisine que soit de l'équateur une montagne du premier ordre, son sommet, toujours environné & couvert de neiges & de glaçons, doit présenter une température d'air analogue à celle de nos contrées les plus septentrionales, où la rigueur du froid ne souffre aucun arbre. On connoît l'observation de Tournefort, qui, après avoir trouvé au pied

(1) Scheuchzer parle d'un autre tronc d'arbre qui a aussi été trouvé au sommet des Alpes ; mais ce qu'il en dit n'est accompagné d'aucune circonstance, & il ne fait que rapporter ce qu'il a entendu de quelques montagnards.

du Mont Ararat les végétaux propres à l'Arménie , rencontra à différentes hauteurs , les plantes de l'Italie , de la France & de la Suede , jusqu'à ce que , parvenu à peu de distance du sommet , il observa enfin parmi les neiges , les plantes de la Laponie. On ne peut donc pas disconvenir que même sous la zone torride , les sommets des hautes montagnes doivent être dépourvus d'arbres , quand même , outre l'obstacle qui résulte de la température de l'air , & peut-être de quelques autres causes contraires à la végétation , ces sommets ne présenteroient pas d'ailleurs , de simples roches dépourvues de terre végétale. Laissons maintenant supposer à quelques physiciens , que les Alpes se sont trouvées autrefois sous l'équateur , jamais ils ne prouveront que des arbres ont pu croître au sommet de ces montagnes. C'est à 4000 pieds au-dessus de l'endroit où l'on cesse de rencontrer des arbres , que le tronc dont parle Scheuzcher a été observé ; & couché à une hauteur de plus de 1000 toises , il n'a pu y avoir été transporté par quelque inondation particuliere : voilà donc un fait qui , tenant sans doute au phénomène qu'on veut expliquer par le prétendu mouvement des pôles , écarte toute idée de quelque inondation locale , en même temps qu'il présente de quoi renverser de plus en plus l'hypothese dont on vient de voir la réfutation.

Mais d'où & comment a été apporté à une hauteur si prodigieuse , un tronc dont le volume & le poids étoient tels , que pour le placer à l'endroit où il a été découvert , toutes les forces humaines réunies n'auroient servi de rien , vu la roideur extraordinaire qu'a la montagne vers ce même endroit. Pour répondre à cette question , & expliquer en général l'origine de toutes ces productions du regne animal & du regne végétal déterrées en Europe & propres à des climats éloignés ,

nous aurons beau tourmenter notre imagination & nous épuiser en vaines hypothèses , il nous faudra toujours revenir à cette idée assez ancienne , & que la plupart de nos physiciens dédaignent d'adopter aujourd'hui , savoir , que par-tout on reconnoît les traces de cette révolution terrible qui couvrit d'eau tout le globe , sans excepter les plus hautes montagnes : révolution dont la réalité s'appuie sur une autorité divine , & dont le souvenir s'est conservé chez tous les peuples , même parmi les nations les plus sauvages. C'est le déluge qui , outre plusieurs changemens qu'il a fait essuyer au globe que nous habitons , a laissé par-tout des dépouilles animales & végétales , comme autant de monumens les plus reconnoissables de cette catastrophe universelle ; c'est le déluge qui a entraîné jusque vers les contrées septentrionales de l'Europe , des productions étrangères , dont les restes se découvrent au milieu des couches formées par les terres & les sables que les eaux avoient charriées avec elles. Et parce que cette inondation fut si violente & si rapide , des animaux se trouverent emportés jusque vers les climats glacés du nord , avant que la corruption ait eu le temps de détruire toutes leurs parties molles ; alors , par la rigueur du froid , se purent conserver pendant un grand nombre de siècles , même des restes de peau , de tendons & de cartilages , ainsi que cela est arrivé au rhinoceros découvert en Sibérie , seulement à quelques pieds de profondeur , par M. Pallas : & à plus forte raison doit-on rencontrer dans cette partie septentrionale de la Russie , de l'ivoire encore bien conservé. Lorsque certains endroits du globe présentent maintenant des os rassemblés en une quantité prodigieuse (1) , c'est que

(1) On a vu quelle est la quantité d'ossements qui se trouve rassemblés dans les cavernes du Bareith : à cet exemple il faut ajouter qu'en Sibérie , l'ivoire fossile est si abondant , qu'il y fait un objet de commerce.

dans ces mêmes endroits plutôt qu'ailleurs, diverses circonstances réunies ont arrêté nombre d'animaux entraînés par des torrens de dessus certaines contrées où ces animaux s'étoient réfugiés par troupes, cherchant un dernier asyle afin de se garantir de l'inondation qui les menaçoit. Enfin, par l'impétuosité des eaux du déluge, des arbres ont été arrachés; des forêts entières ont été détruites; des campagnes ont été dépouillées de leurs plantes, ou plutôt des portions de terre couvertes de végétaux, ont été enlevées tout-à-la fois. Delà, une quantité d'arbres & de plantes ont dû flotter au loin jusqu'à ce que le tout, ainsi qu'il est arrivé aux dépouilles d'animaux, s'est enfin incorporé parmi des terres qui devoient un jour présenter au milieu de l'Europe, les vestiges de quantité de plantes propres aux Indes, & dans les climats les plus septentrionaux, des arbres fossiles qui n'ont pu croître que sous la zone torride & sous les zones tempérées. Et comme les eaux du déluge ont surpassé les plus hautes montagnes, il n'y a rien que de naturel si on trouve aux sommets de celles-ci, des arbres qui, les premiers, ont été abandonnés par les eaux, lorsqu'elles ont commencé à diminuer de dessus la surface du globe. Telle est l'explication la plus simple & par conséquent la plus plausible d'un phénomène que tout autre moyen que le déluge universel, laissera toujours inexplicable. Je me suis arrêté à une digression qu'on aura peut-être trouvé trop longue; mais elle étoit nécessaire à mon sujet. Je reviens aux fossiles accidentels de nos Provinces.

Pour expliquer l'origine de ces fossiles, c'est déjà quelque chose, que parmi eux nous en reconnoissons qui proviennent du déluge. Ce sont les eaux de cette inondation générale qui ont apporté en Flandre les dépouilles d'éléphant & de cette espece de sanglier in-

connu

connu qu'on y a déterrées : c'est à cette même inondation qu'il faut nécessairement attribuer nos couches de schiste voisines des charbonnières, & chargées d'empreintes de plantes exotiques. Pour se former une idée de la quantité énorme de végétaux que les eaux du déluge ont laissés au milieu de notre sol, il faut seulement avoir vu une couche de l'espece dont il s'agit, & qui se trouve, comme je l'ai dit ailleurs, aux environs de la ville de Valenciennes : là, parmi une multitude étonnante d'empreintes parfaitement caractérisées, un curieux pourroit former un herbier bien plus intéressant que celui qu'a publié Scheuchzer. Un tel travail enrichiroit la botanique de nombre de végétaux inconnus ; & il en feroit du regne végétal comme du regne animal, que nous connoissons mieux à mesure qu'on donne plus de soin à l'étude des pierres figurées.

Comme on n'a pas reconnu jusqu'à présent, des especes étrangères parmi nos bois fossiles, il ne s'agira pas d'attribuer ceux-ci au déluge, & on verra ailleurs ce qu'il faut penser de leur origine. Mais puisque nous avons des couches de charbon minéral, il convient de dire ici quelque chose de cette substance que plusieurs naturalistes regardent comme une production due à des bois résineux qui se sont décomposés au sein de la terre. Une telle opinion, aujourd'hui fort en vogue, demeurera toujours sujette à des difficultés insurmontables, ainsi qu'on peut s'en convaincre d'après ce que dit l'un des plus savans minéralogistes de notre siècle, le célèbre Wallerius. Je me contente de renvoyer ici à sa nouvelle minéralogie, tome II, page 103 & suiv. de l'édition de 1778, publiée à Vienne en Autriche. Ne pouvant que souscrire au sentiment d'un aussi habile homme, je dirai ici après lui, qu'il faut regarder comme

réelle, l'existence d'un bitume minéral ; que celui-ci ayant rencontré dans l'intérieur du globe, des matières terreuses ou pierreuses, souvent même des substances ligneuses, il les a pénétrées, il s'est mêlé intimement avec elles, & que de-là est résulté le charbon fossile : or, comme les mines où se trouve cette substance ne sont pas toujours accompagnées d'un schiste chargé d'empreintes de plantes, quoique plusieurs naturalistes veuillent le faire croire, je poserai donc que, par-tout où de telles empreintes se rencontrent dans le voisinage de certaines charbonnières, alors il est de toute vraisemblance que la base du charbon que fournissent ces mines, est un bois décomposé & faturé par un bitume minéral, par le pétrole dont Wallerius explique si bien la formation : ailleurs, ajouterai-je, où le charbon fossile ne fait voir dans sa contexture aucune apparence ligneuse, & dans le voisinage duquel on ne remarque aucun vestige de plantes : ailleurs, dis-je, où le bitume minéral a rencontré une matière terreuse ou pierreuse, également propre à en être faturée, il s'est pareillement formé du charbon fossile : de cette manière, je crois qu'on expliquera, sans s'exposer à des argumens vraiment insurmontables, l'origine de cette substance & des phénomènes qui y ont rapport ; & ainsi on pourra avancer que dans plusieurs mines, quoique pas dans toutes, cette même substance a pour base une matière ligneuse, le résidu d'une quantité d'arbres qui ont été enfouis au milieu des terres par quelque révolution. En envisageant ici les seules charbonnières accompagnées d'un schiste chargé d'empreintes de plantes exotiques, on conclura donc que les mines de cette espèce, sont autant d'endroits où les eaux du déluge ont abandonné une quantité d'arbres qui sont demeurés ensevelis au milieu des terres.

Nous avons, dans l'étendue de nos contrées, des charbonnières de cette même espèce, comme on l'a vu ailleurs : les arbres qui doivent avoir été enfouis dans les endroits qu'occupent ces mines, ont sans doute une origine commune avec les plantes qui ont laissé leur empreinte au voisinage ; & puisque nous savons ce qu'il faut penser touchant l'origine des plantes exotiques dont il s'agit, l'origine des bois qui ont été abandonnés dans la plupart des endroits d'où nous tirons nos charbons fossiles, est donc pareillement connue ; ainsi voilà parmi nos terres, encore des restes du déluge universel. Je vais maintenant passer à l'examen de toutes ces productions marines, abandonnées au milieu de notre sol.

Si l'on jette une coup d'œil sur cette quantité de coquilles & d'autres corps marins rassemblés par-tout dans l'intérieur de nos terres, ou répandus à leur superficie : si l'on vient ensuite à examiner quelques-unes de nos carrières, celles entre autres, qui fournissent par masses prodigieuses, une espèce de pierre-porc (1) qui n'est, en grande partie, qu'un composé de corps marins ; alors on se rappelle ce que Donati nous apprend du fond de l'océan, qu'il nous représente rempli de coquillages, de madrépores, &c. entassés, ensevelis dans la vase ; & une idée qui s'offre en même temps, c'est que tout notre sol pourroit bien avoir été autrefois un fond de mer ; mais cette idée n'est encore que vague, tant qu'elle ne se trouve pas fondée sur quelques observations faites de plus près. Voici celles que j'ai à rapporter.

(1) *Lapis Suillus* ; c'est le *Kalk-Stein* des minéralogistes Allemands. Nous employons cette pierre pour bâtir. Les principales carrières où elle se trouve, sont celles des environs de Felluy, d'Arquenne & d'Escauffine, trois villages peu éloignés de la petite ville de Nivelles.

Ce qui frappe d'abord, lorsqu'on examine l'intérieur de nos couches remplies de coquilles, ou lorsqu'on fait seulement attention à nos pierres coquillieres, c'est cet ordre invariable que conservent toujours ensemble, des coquillages de certaines familles, & cela exclusivement à tout individu dont l'espece n'est pas faite pour être comprise dans cette association. Souvent il ne faut s'arrêter qu'à deux ou trois coquilles d'un amas ou d'une masse pierreuse, pour juger des especes qui doivent encore s'y rencontrer (1) : voilà donc parmi nos coquilles fossiles, une analogie parfaite avec ce qui est propre aux testacées que renferment les mers, où certaines especes, comme on sait, se tiennent constamment ensemble, de même que cela se voit aussi sur la terre parmi les végétaux, dont certaines familles croissent constamment dans le voisinage les unes des autres.

On découvre particulièrement aux environs de Bruxelles, certaines masses pétrifiées, disposées par lits souvent assez étendus, & composées de numismales ou pierres lenticulaires, qui sont, comme je l'ai dit ailleurs, des especes d'ammonites. Ces petits coquillages se trouvent placés pour la plupart dans une situation horizontale, la même qu'ils doivent avoir eue au fond de la mer; & tout prouve que c'est dans l'endroit même où ils se rencontrent, qu'ils se sont multipliés peu à peu jusqu'à cette quantité énorme que présentent les masses dont il s'agit.

Parmi nos dépouilles de l'océan, on remarque une multitude de noyaux de coquilles, formés constamment du même sable ou de telle autre substance que présente la couche d'où on les retire. Ils offrent toujours avec la plus grande exactitude, l'intérieur des

(1) M. Rouelle a fait le premier une pareille observation parmi les coquilles fossiles de la France.

coquillages qui leur ont servi de moule , & la matiere moulée renferme souvent de très-petites coquilles. Pour concevoir l'origine de ces noyaux , il ne faut que se représenter ce qui suit. Quelque substance très-déliée , un sable très-fin charié par les eaux de la mer , & mêlé de fois à autre de quelques petites coquilles , s'introduit peu à peu dans l'intérieur de certains testacées vuides , couchés sur la vase : leur cavité se remplit au moyen de petits dépôts successifs ; le sable , la terre , la matiere en un mot qui s'est infinuée dans la même cavité , se durcit , se pétrifie à la longue , les coquilles renfermant la substance étrangere se détruisent , & voilà autant de noyaux qui représentent l'intérieur de ces coquilles , jusqu'aux plus petits traits , le tout avec la plus grande exactitude. Tel est le résultat d'un ouvrage lent , qui n'a pu s'exécuter qu'au fond de la mer , & à l'endroit même où se rencontrent les noyaux que nous trouvons parmi nos fossiles accidentels.

Voici une observation qui a été faite sur deux noyaux de cochlites , découverts dans les environs de Bruxelles. Ces noyaux étoient attachés à des masses pierreuses , qui elles-mêmes faisoient partie d'une couche entiere ; ils portoient à leur superficie chacun une coralloïde , de la maniere que cela s'observe tous les jours sur ces pierres & ces rochers baignés de la mer , & qui sont chargés de semblables productions. On sait que les coralloïdes sont des especes de polypiers marins , des vrais zoopyhtes qui ne s'attachent que sous les eaux aux corps qu'ils y rencontrent. C'étoit donc au milieu de la mer que les coralloïdes adhérentes à ces deux noyaux , sont venues s'y fixer. Un sable fin , charié par les eaux , s'est d'abord infiné dans quelques coquilles vuides , des noyaux se sont formés de la ma-

niere que je l'ai dit tout-à-l'heure : les coquilles qui ont servi de moules , se sont détruites lorsque ces noyaux , d'une matiere unie par un suc pierreux , avoient déjà sous les eaux une certaine dureté ; & couchés sur la vase , ils ont de même que d'autres pierres , présenté à des polypes , des surfaces qui leur étoient propres pour s'y fixer (1). Ainsi s'est opéré un phénomène qui prouve d'une maniere si évidente , que l'endroit même où se sont trouvés les deux noyaux chargés de coralloïdes , a autrefois fait partie du bassin de la mer , de même que le reste de nos provinces qui par-tout offrent de quoi reconnoître , dès qu'on en vient à des observations particulieres , les traces d'un ancien séjour de l'océan.

Il seroit inutile de rassembler ici un plus grand nombre d'observations : tout parle déjà le langage de l'évidence ; tout confirme la premiere idée qu'a fait naître un coup d'œil général sur tant de productions marines que présente notre sol. On pourroit cependant former ici une difficulté , qui ne laisseroit pas d'avoir un dehors assez spécieux. J'ai observé ailleurs , que dans le nombre de ces productions , il en est dont les analogues vivans ne sont connus que dans des mers fort éloignées.

» Voilà , dira-t-on , un fait absolument identique avec
 » celui qui a été attribué ci-dessus au déluge. Si l'on
 » a recours à cette inondation générale pour expliquer
 » l'origine de ces os de quadrupedes étrangers , & de
 » ces empreintes de plantes exotiques , qui se découvrent
 » parmi nos terres comme dans d'autres contrées
 » de l'Europe ; il faut , pour ne pas tomber dans

(1) Le fait que présentent ces deux noyaux , est le même dans son espece , que celui dont la découverte due à M. de Jussieu , a été trouvée si intéressante : un savant naturaliste a remarqué à Chaumont en Vexin , un litrophyte adhérent à une pierre qui n'étoit qu'un assemblage de coquilles antérieurement pétrifiées

» une inconféquence , attribuer à la même révolution ,
 » ces productions des mers des Indes , qui s'observent
 » parmi nos fossiles accidentels , ainsi que parmi ceux
 » de quelques autres endroits de notre continent. Et
 » comme tous les corps marins que renferme notre
 » sol , ont assurément une origine commune , il faudra , conclura-t-on , les envisager tous pour autant
 » de restes du déluge ».

Pour répondre à cette objection , je vais emprunter une idée de M. Pallas. » On a souvent agité la question , dit cet infatigable observateur , pourquoi les pétrifications qu'on trouve dans les montagnes calcaires de l'Europe , sont pour la plupart originaires des mers des Indes ? Cette supposition elle-même paroît fautive. Les productions que l'on croit particulières aux mers éloignées , sont pour la plupart les mêmes dans les mers du nord ; mais elles ne viennent par-tout que dans les abymes , parce que leur existence semble demander la pression d'une grande masse d'eau. Telles sont entre autres les anomies , les palmiers de mer ou encrinites. La méditerranée , d'ailleurs , produit dans ses abymes , la plupart des productions entassées dans nos couches calcaires , (celles de la Russie). La raison pourquoi la mer du nord nous en fournit si peu , pourroit être son atterrissement par le déluge , dont une suite est le peu de profondeur de ces mers à de grandes distances de terre , ce qui les rend en même temps si peu fertiles en coraux , lesquels demandent un fond de roche à des profondeurs considérables ».

Observations
sur la formation des montagnes , &c.
page 34 à la note.

D'après les réflexions du savant Académicien , voici ce qu'il y a à observer.

Si l'Europe entière , comme je le dirai ailleurs , semble être un continent nouveau , un composé d'atter-

riffemens fucceffifs, formés par les eaux de la mer, & peut-être encore par celles du déluge, qui aura laiffé d'un côté & d'autre dans cette vafte mer autrefois exiftante là où fe trouve aujourd'hui l'Europe, une infinité de fubftances terreftres mêlées d'animaux & de végétaux étrangers, il eft donc probable que les mers qui fe font retirées de deffus ce continent, & qui actuellement lui fervent de bornes, renferment une fuite, une continuité de ces atterriffemens dont notre continent eft formé : & ainfi ces mers, ou plutôt ces refte d'un grand océan, doivent fe trouver beaucoup moins profondes qu'elles l'étoient dans des fiecles fort éloignés de nous : par une fuite naturelle, elles n'ont plus été propres à nourrir, finon dans certains abymes, différentes productions qui exigent une grande maffe d'eau. Une mer qui diminue de profondeur, peut fe comparer, relativement aux animaux & aux zoophytes qui l'habitent, à un fol qui perd infenfiblement de fa fertilité : peu-à-peu certaines efpeces de végétaux dégénèrent, elles périffent enfin faute d'une nourriture convenable ; & il ne refte plus d'autres plantes que celles qui s'accommodent d'une terre ftérile.

C'eft par ce que la méditerranée a encore confervé une certaine profondeur, qu'elle produit des coraux, & outre cela une quantité de teftacées qui ne fe trouvent pas dans la mer qui baigne nos côtes : & fi on pêchoit à des profondeurs convenables, on découvrira fans doute des coquilles que les conchyologiftes croient n'exifter que dans l'océan des Indes.

Quoique je fois perfuadé que les foffiles marins qu'on s' imagine avoir appartenu à ce même océan, ont été propres à celui qui couvroit autrefois l'Europe, je n'ignore cependant pas qu'en général, il en eft des productions marines comme des animaux & des végétaux

gétaux qui appartiennent à la terre ; & que si indépendamment de la différence des climats , c'est seulement pour telle ou telle contrée que quelques especes semblent être faites , de même il doit y avoir dans la mer , aussi indépendamment de la différence des latitudes , certains testacées , certains poissons , &c. qui n'occupent que tel ou tel parage. Mais il restera toujours constant , qu'on n'auroit pas dû avancer avec tant de confiance , que la plupart des fossiles marins de l'Europe , n'ont leurs analogues que dans les mers des Indes & des pays chauds. Nous ne connoissons pas toutes les productions de nos mers voisines , nous ne connoîtrons jamais celles des mers éloignées , & cette ignorance nous laissera toujours dans l'impossibilité de discerner au juste , quelles sont les productions propres uniquement à certains parages.

Je reviens à l'idée de cet habile naturaliste que j'ai cité en dernier lieu. L'océan qui s'étendoit autrefois sur l'Europe , ayant eu la même profondeur qu'ont aujourd'hui quelques mers fort éloignées de nous , il renfermoit par conséquent des productions , qui devenues fossiles accidentels , devoient n'avoir leurs analogues que dans ces mêmes mers éloignées. Et comme dans le nombre de ces productions , il se trouvoit des coquilles pélagiennes , de ces testacées que l'océan ne jette jamais sur les côtes , il falloit bien qu'on découvrit un jour parmi les terres , des coquillages dont les analogues marins demeureroient inconnus. Nous ne devons donc plus être surpris si , en examinant nos fossiles accidentels , nous trouvons tantôt des Ammonires , des Anomies , des Belemnites , ou d'autres coquillages qui ne se découvrent pas dans les mers ; tantôt certaines coquilles , certains polypiers qu'on ne pêche actuellement qu'aux Indes ou dans la méditerranée : ici

quelques dents d'un poisson encore inconnu , là des parties de mâchoire d'une espece de raie qui ne se trouve qu'à la Chine & à la Cayenne.

De tous les corps marins , inconnus sur nos côtes & enfouis au milieu de notre sol , il n'en est pas qui doive moins nous étonner que cette pétrification rare , dont j'ai parlé ailleurs , la tortue fossile. Bien que cet amphibie , seulement commun en Afrique & en Amérique , n'ait pas besoin d'une mer profonde pour y vivre , il peut cependant avoir existé dans les parages qui occupoient autrefois l'étendue de nos contrées , vu qu'on le rencontre quelquefois dans la mer Baltique , dans la Manche & dans l'océan sur les côtes de France. Prenons cependant qu'il n'ait pas habité cette mer qui couvroit notre sol , ne se peut-il pas que les dépouilles trouvées à Melsbroeck ainsi que dans la montagne de S. Pierre , aient appartenu à des tortues apportées de fort loin par les eaux durant une tempête , à l'exemple de ce qui arriva en 1752 , lorsque la mer jeta dans le port de Dieppe , une tortue d'une espece inconnue en Europe. Ce fait m'en rappelle un autre qui nous touche particulièrement , je veux parler de cette baleine que les flots ont abandonnée , aussi en 1752 , sur nos côtes de Blanckenberg. D'après cela , puisque des dépouilles de baleine se trouvent enfouies au milieu de notre sol , on pourra dire que , quand même des cétacées n'eussent pas été propres à cette mer dont nos contrées offrent les débris , il doit suffire pour expliquer l'origine de ces dépouilles fossiles , de supposer , comme cela se peut avec tant de vraisemblance , que des baleines du nord aient été jettées jusque vers ces endroits de nos provinces , où on a découvert des restes de ces poissons monstrueux.

On vient de voir que si plusieurs de nos fossiles ma-

rins présentent un caractère étranger, ce n'est pas là une raison qui doive engager à les regarder comme des monumens du déluge, non plus que toutes les autres productions de la mer, que renferme notre sol : & puisque les observations rapportées ci-dessus démontrent que tant de corps marins qu'offre ce même sol, sont autant de vestiges d'un séjour naturel de l'océan, il en résulte par une preuve négative, qu'ils ne proviennent pas du déluge. Cette inondation universelle a laissé, je veux le croire, quelques coquilles dans plus d'un endroit du globe; mais ce ne sont pas celles qu'on retrouve dans cet ordre, cet arrangement qu'elles n'ont pu avoir conservé qu'au fond de la mer. N'étendons pas les effets du déluge au-delà des justes bornes que la raison & l'expérience nous prescrivent : contentons-nous d'envisager comme une suite de cette révolution, quelques-uns de nos fossiles accidentels dont l'origine restera toujours inexplicable, dès qu'on voudra se servir de tout autre moyen; mais n'allons pas adopter une opinion qui est, comme dit un homme célèbre, la superstition du commun des naturalistes. On a vu ailleurs quels sont parmi nos fossiles ceux qui ne peuvent s'attribuer qu'au déluge : quelles sont les dépouilles animales & végétales que les eaux de cette inondation ont abandonnées au milieu de notre sol, lorsqu'il étoit encore un fond de mer. D'un côté ces dépouilles s'incorporerent à la longue parmi des couches que produisit le sédiment de la mer; d'un autre côté les eaux du déluge, chargées d'une quantité de terre, de sable, &c. ont aussi formé quelques couches sur ce fond de mer, qui est aujourd'hui notre sol; & différentes productions organisées & emmenées de loin ont été abandonnées dans ces mêmes couches qui ont haussé çà & là le lit de l'océan. Plusieurs siècles s'écoulent pendant lesquels

les eaux accumulent sans cesse des sédimens qui se mêlent avec une quantité innombrable de corps marins : il se forme des atterrissemens successifs ; l'océan recule insensiblement ses bornes ; & voilà une terre nouvelle, celle que nous habitons , & où nous remarquons à la fois des phénomènes produits par le déluge , & d'autres que présente naturellement toute contrée qui a autrefois fait partie du bassin de la mer.

C'est sans doute la mer d'Allemagne qui a couvert autrefois toutes les terres qui forment aujourd'hui l'étendue de nos provinces Belghiques. Ces terres sont sorties peu à peu du sein des ondes , de même que probablement toutes les contrées de l'Europe , qui seront devenues habitables à mesure que l'océan aura abandonné d'un côté ou d'autre , des portions de son ancien domaine. (1) Je ne m'arrêterai pas à ce qu'on a dit d'Aigues-mortes , de Fréjus , de Ravenne & de tant d'autres endroits qui ont fourni des exemples mille fois rebattus par divers écrivains : je me bornerai seulement à quelques faits qui nous intéressent en particulier , parce qu'ils concernent nos provinces , & viennent à l'appui des preuves physiques qui servent à démontrer l'origine de tous ces corps marins qui se trouvent sous nos pieds. Les faits suivans seront pour nous des monumens précieux , & propres à nous donner une idée de ce qu'auroient pu nous transmettre , s'ils avoient été historiques , ces siècles ensevelis pour nous dans la nuit des temps.

Tout le monde connoît cette tradition constante , & conservée par les habitans de Tongres , qui croient que la mer aujourd'hui éloignée de 37 lieues de cette ville , en baignoit autrefois les murs. Il est certain qu'on a

(1) Voyez la note qui se trouve à la suite de ce Mémoire.

trouvé dans les environs de Tongres, des ancrs de vaisseaux & des coquilles marines enfouies au milieu de la terre. Une montagne proche de la même ville porte encore à présent le nom de *bord de la mer*, & pas loin de là on reconnoit une digue qui a visiblement été faite de la main des hommes. Après de telles preuves je m'abstiendrai volontiers de citer l'autorité d'Hubert Thomas, écrivain assez décrié actuellement parmi nos érudits. J'observerai cependant, quant au fait, qu'on lui reproche entre autres d'avoir avancé, savoir, que de son temps on voyoit encore aux murs de Tongres des anneaux de fer, qui servoient à attacher les vaisseaux; j'observerai, dis-je, quant à ce fait, qu'il ne présente rien d'unique dans son espece, puisque de pareils anneaux se remarquent encore aujourd'hui à Ravenne que nous savons avoir été un port de mer du temps d'Auguste.

On trouve dans l'histoire des Comtes de Flandre par Vredius, que sous le regne de Charlemagne, Gand étoit un port de mer.

La ville de Damme en Flandre avoit aussi, suivant le même historien, un port encore célèbre au treizieme siecle. A cela on peut ajouter que les habitans de cette ville montrent certaines marques qui ont été faites aux murs pour désigner la hauteur des marées.

Suivant une tradition constante, la mer s'étendoit autrefois jusqu'à Dixmude, & y faisoit un bras fréquenté par des vaisseaux marchands qu'attiroient les franchises accordées à cette ville par les anciens Comtes de Flandre.

Ortelius & d'autres historiens croient que l'océan formoit autrefois un golfe à St. Omer: c'étoit là peut-être le *Portus Iccius*.

La Hollande, la dernière des contrées Beligiques que

la mer a abandonnées , est encore presque de niveau avec le fond de l'océan , & anciennement plusieurs endroits de cette province se trouvoient à cinquante pieds en dessous de ce niveau. Enfin tout prouve que la Hollande s'est haussée successivement ; & ce haussément continue encore d'une manière sensible dans le Zuyderzée & le détroit du Texel , qui ne peuvent plus recevoir des vaisseaux aussi grands qu'autrefois.

Un tel pays a dû nécessairement être exposé à de fréquentes inondations causées par des irrptions subites de la mer. L'histoire nous fait envisager la Hollande toujours à la veille de perdre des parties autrefois conquises sur les eaux. La Flandre a essuyé de même plusieurs inondations ; & il ne seroit pas difficile de rassembler une quantité de faits qui présenteroient d'effroyables ravages causés dans l'une & l'autre de ces provinces par des débordemens de la mer. Je citerai seulement quelques exemples , car je crains de grossir inutilement ce Mémoire qui peut-être est déjà trop long.

En 1225 la mer sortant de ses limites forma avec le lac *Flevum* un golfe connu aujourd'hui sous le nom de Zuyderzée , & qui a trente lieues de longueur. L'océan envahit en 1277 une étendue où se trouvoient trente-trois villages ; & il s'y forma un golfe qui porte aujourd'hui le nom de Dollaert. En 1421 une inondation produisit le lac Biesbos ; les eaux couvrirent soixante & douze villages , dont vingt-deux demeurèrent submergés avec deux monastères. Pour ce qui regarde la Flandre en particulier , Meyer rapporte dans ses annales , qu'en 1334 le village de Terstrep près d'Ostende , & dont à peine il reste quelque souvenir , est demeuré la proie des eaux. Le même Auteur parle encore d'un autre endroit qu'il nomme Steland & qui n'étoit pas éloignée d'Ysendick & de Perbome , deux villages

du pays de Catland : cet endroit , dit-il , n'étoit pas encore submergé en 1321.

Voilà autant de débordemens de la mer ensuite desquels celle-ci s'est maintenue sur une partie des terres qu'elle avoit envahies : dans d'autres inondations qui ont désolé tantôt la Flandre , tantôt la Hollande , plus souvent cette dernière contrée , & quelquefois toutes les deux ensemble , il ne s'est pas formé un nouveau fond de mer , mais les eaux , après avoir fait de très-grands ravages , sont rentrées dans leur lit. L'histoire nous a conservé le souvenir des désastres de cette espèce , arrivés entre autres en 1170. 1377. 1551. 1651. 1675. 1682. 1717. &c. &c. En se représentant de telles inondations , on trouve encore un moyen pour expliquer l'origine de quelques-uns de nos fossiles accidentels. Je parlerai donc ici d'une troisième cause qui pourra servir à me faire atteindre le but de mes recherches. Il est vrai que je n'ai pas à envisager cette cause d'une manière proprement indépendante du séjour naturel de la mer sur l'étendue de nos provinces ; mais en considérant l'origine des fossiles dont je vais faire mention , il faut au moins se former l'idée de quelques débordemens des eaux qui auront entraîné de dessus des terres habitables , certaines productions qui se seront ensuite trouvées engagées parmi les couches qui occupoient le fond de l'océan , lorsque celui-ci couvroit encore notre sol.

Les fossiles que j'ai actuellement en vue , sont nos bois pétrifiés. Ceux qu'on découvre entre autres dans les environs de Bruges , présentent le phénomène suivant , qui prouve d'une manière évidente , qu'ils ont long-temps séjourné dans la mer.

Rien n'est plus commun parmi ces bois fossiles des environs de Bruges , que la vermoulure qui s'y remar-

que de toute part : des restes de têts ou de coquilles , dont elle est accompagnée , font reconnoître qu'elle est l'ouvrage du taret , insecte redoutable par les ravages qu'il fait dans les digues & les pilotis que baigne la mer. En comparant les bois dont il s'agit , avec quelques-uns de ceux qui forment les digues sur nos côtes de Flandre , on apperçoit une analogie parfaite : plusieurs de ces derniers présentent les mêmes vermoulures , les mêmes traces du taret , enfin les mêmes débris de la coquille qui a couvert cet insecte destructeur.

Si les bois pétrifiés des environs de Bruges ont servi de retraite à un animal marin , il est incontestable qu'ils se sont trouvés au milieu des eaux de la mer : c'est là qu'ils ont été attaqués par le taret , qui ne manque jamais de se loger dans le bois dès qu'il en trouve l'occasion (1). Ceux dont il s'agit , déjà percés de toute part & abandonnés ensuite au milieu des terres par la retraite des eaux , se pétrifierent à la longue , pour offrir après une suite de siècles , les vestiges de leur ancien séjour parmi des productions de l'océan.

Comme il est naturel de croire que d'autres bois pétrifiés , qui ne présentent pas les traces du taret , & qui se déterrent dans plusieurs de nos contrées , auront aussi flotté sur cette mer dont notre sol fait voir des dépouilles (2) , il faudra donc envisager tous nos bois pétrifiés comme devant leur origine à quelques anciennes inondations produites par des débordemens de la mer
lorsque

(1) M. Adanson a prouvé que le taret ne perce le bois que pour se loger & non pas pour se nourrir , comme l'ont prétendu tous ceux qui ont donné l'histoire de cet insecte.

(2) Il en aura été de cette partie de l'océan qui a couvert l'étendue de nos provinces , comme de celle qui borde aujourd'hui l'Islande , & qui fournit aux habitans de cette île , une quantité d'arbres flottans qui leur servent pour le chauffage.

lorsque la plus grande partie de nos terres étoit encore le séjour de l'océan. Alors, de même que dans ces temps postérieurs dont notre histoire Belgique nous a conservé le souvenir, les eaux de la mer se répandant de fois à autre & au loin sur des terrains habitables & couverts de végétaux, elles firent par-tout les plus grands ravages; & rentrant dans leurs limites, elles entraînent des arbres de dessus les endroits qu'elles avoient inondés. Ces arbres, après avoir flotté quelque temps, furent couverts par les sables & le limon que les eaux charient sans cesse; ils se trouverent peu à peu renfermés dans diverses couches: là, plusieurs morceaux de bois, même des arbres entiers ayant passé à l'état de pétrification, se conserverent jusqu'à nos jours.

Outre les inondations passagères auxquelles nous devons nos bois pétrifiés, il se peut que quelques-uns d'entre eux, de même que d'autres fossiles accidentels, soient une suite de certaines inondations qui, dans les siècles passés, auront formé quelques nouveaux golfes; d'où il résulteroit que des terres autrefois le séjour naturel de l'océan, & devenues ensuite habitables, auroient été une seconde fois un fond de mer, jusqu'à ce que ces terrains inondés s'étant élevés insensiblement, l'océan ait de nouveau reculé ses bornes. Ceci arrivera peut-être un jour au Zuyderzée & au Dollaert; & alors on rencontrera au milieu des terres qu'auront abandonnées les eaux, non-seulement une quantité de corps marins qui devront leur origine à un second séjour de l'océan; mais on découvrira aussi, comme il est probable, quelques productions terrestres, quelques bois fossiles provenant de certains arbres qui auront crû sur le sol qu'occupent aujourd'hui les deux golfes que je viens de nommer. Mais les ob-

servations n'ont pas encore appris, si parmi nos fossiles accidentels, il en est dont l'origine appartienne à un nouveau séjour de l'océan qui, ayant franchi ses limites, aura formé dans l'un ou l'autre de nos cantons, quelques golfes dont les eaux se sont retirées à la longue, pour rendre au continent les terrains qui antérieurement avoient déjà été abandonnés par la mer. Au reste, voici un fait qui nous touche & que rapporte M. de Buffon. » Auprès de Bruges en Flandre, en » fouillant à 40 ou 50 pieds de profondeur, on trouve » une très-grande quantité d'arbres aussi près les uns » des autres que dans une forêt; les troncs, les rameaux, & les feuilles sont si bien conservés, qu'on » distingue aisément les différentes espèces d'arbres. » Il y a 500 ans que cette terre où l'on trouve des arbres, étoit une mer, & avant ce temps-là on n'a » point de mémoire ni de tradition que jamais cette » terre eut existé : cependant, ajoute M. de Buffon, » il est nécessaire que cela ait été ainsi dans le temps » que ces arbres ont crû & végété; ainsi le terrain » qui, dans les temps les plus reculés, étoit une terre » ferme couverte de bois, a été ensuite couvert par » les eaux de la mer, qui y ont amené 40 ou 50 » pieds d'épaisseur de terre, & ensuite ces eaux se sont » retirées «.

Le passage que je viens de transcrire, devoit trouver ici place : mais le fait qu'il renferme n'est-il pas exagéré ? & bien plus, quelle preuve avons-nous pour croire qu'il est véritable ? Il n'a rien de commun, comme on voit bien, avec ces bois, ces arbres fossiles qu'on découvre aujourd'hui aux environs de Bruges, & qui sont parvenus à l'état de pétrification ; qui sont abandonnés çà & là & placés indifféremment, ou plutôt couchés sans autre ordre que celui que le hasard

a produit. Je forme un doute sur la vérité du fait rapporté par M. de Buffon, & je ne crois pas que j'aie tort. Si d'un côté on peut se demander pourquoi les habitans des environs de Bruges n'ont aucune connoissance du fait dont il s'agit ; de l'autre il doit paroître inconcevable comment il auroit échappé aux recherches des observateurs qui ont visité ces endroits-là. Mais pour revenir à ce qui m'a engagé à rapporter le phénomène dont parle M. de Buffon, je me bornerai à observer que c'est l'expérience qui pourra nous apprendre avec le temps, si au moins dans quelque autre canton qu'aux environs de Bruges, il n'existe pas des bois fossiles, & outre cela des corps marins qui doivent leur origine à un second séjour de l'océan sur un sol qui avoit déjà été autrefois un fond de mer.

Une cause à laquelle peuvent se rapporter encore quelques-uns de nos fossiles accidentels, va nous occuper quelques instans : elle fera la quatrième qui m'aura servi dans le cours de mes recherches. Je vais en parler à l'occasion de nos tourbieres & de ces arbres entiers qu'on y découvre presque dans leur état naturel, à leur couleur près.

Parmi les tourbes en général, il en est qui se forment tous les jours ; elles sont produites par des racines pourries des plantes qui croissent sur les terrains marécageux ; d'autres sont des résidus de végétaux aussi pourris à la longue, & que les eaux, dans des temps d'orage, ont entraînés de dessus la superficie des montagnes & des vallées, & rassemblés ensuite dans des bas-fonds : une troisième espèce provient de certains amas de plantes marines qu'ont abandonnées au milieu des terres, les eaux de l'océan. On trouve ces différentes tourbes dans l'étendue des provinces Beligiques : je ne m'arrêterai cependant qu'à celles qui ne se re-

produisant plus sous nos yeux, offrent au milieu de nos terres, des restes de quelques anciennes révolutions. C'est parmi les tourbes de la seconde espèce qu'on rencontre les arbres fossiles dont je viens de faire mention.

Les Auteurs anciens, qui ont parlé du pays des premiers Belges, le représentent couvert de broussailles & de marais, durant les six premiers siècles de l'ère vulgaire. Les rivières qui nulle part n'étoient munies de digues, & les eaux grossies par les pluies, se répandant au loin, devoient entraîner avec elles nombre de plantes, une quantité de broussailles, même des arbres entiers. Tous ces végétaux ont été déposés dans des lieux-bas où se sont formés différens marais : là, une quantité énorme de feuilles, de racines, de branches d'arbres & d'arbrisseaux entassés successivement & mêlés de terre limoneuse, se décomposa peu à peu & produisit cette substance d'un brun noirâtre & d'une contexture fibreuse, qui porte avec elle le caractère du regne végétal. Parmi cette substance, douée d'une qualité bitumineuse, se conserverent quelques arbres entiers, le chêne entre autres; on fait qu'il résiste à l'eau : aussi reconnoît-on pour des arbres de cette espèce, ceux qui se tirent de nos tourbieres. Ils n'ont subi d'autre altération qu'en ce qu'ils sont par-tout d'un noir aussi beau que celui de l'ébène. On les recherche pour des ouvrages de menuiserie, & les ouvriers les appellent *des bois du déluge* (1).

(1) On lit dans les *Epoques de la nature*, Hist. Nat. Tome XIII de l'édition in-12. pag. 174 & 175, le passage suivant qu'a fourni un Mémoire pour la subdélégation de Dunkerque, relativement à l'histoire naturelle de ce canton. „ Dans les châtellenies & subdélégations de Bergues-saint-Winoc, Furnes & Bourbourg, „ on trouve de la tourbe à trois ou quatre pieds sous terre; ordinairement ces

Dans l'étendue de nos provinces comme dans plusieurs autres contrées, au lieu de ces anciens marais où se sont rassemblés les végétaux qui ont produit la tourbe, on trouve souvent des prairies imbibées d'eau, ou des terrains qui semblent trembler sous les pieds : c'est un indice qu'en perçant la terre à plus ou moins de profondeur, on rencontrera un lit de tourbe. La couche qui le recouvre, peut s'être formée insensiblement au moyen des terres & des sables que les pluies détachent des endroits élevés, & entraînent ensuite dans les plaines. On peut observer ici que des couches formées de cette manière, sont en général assez communes dans différens endroits du globe : en voici un exemple rapporté par M. de Buffon d'après le Docteur Plot. Ce dernier dit dans son histoire naturelle de Stafford, qu'on a trouvé dans la terre à une profondeur de dix-

» lits de tourbes ont deux pieds d'épaisseur, & sont composés de bois pourris,
 » d'arbres même entiers, avec leurs branches & leurs feuilles dont on connoît
 » l'espèce, & particulièrement des coudriers, qu'on reconnoît à leurs noisettes
 » encore existantes, entre-mêlées de différentes espèces de roseaux faisant corps
 » ensemble. D'où viennent, se demande M. de Buffon, ces lits de tourbes qui
 » s'étendent depuis Bruges par tout le plat-pays de la Flandre jusqu'à la rivière
 » d'Aa, entre les dunes & les terres élevées des environs de Bergues, &c? Il
 » faut que, dans les siècles reculés, lorsque la Flandre n'étoit qu'une vaste
 » forêt, une inondation subite de la mer, ait submergé tout le pays, & en se
 » retirant ait déposé tous les arbres, bois & roseaux qu'elle avoit déracinés &
 » détruits dans cet espace de terrain, qui est le plus bas de la Flandre ». Je
 me bornerai à dire ici, qu'effectivement je n'ai aucun doute que parmi les végétaux terrestres qui ont produit par leur décomposition, certaines tourbieres dans l'une ou l'autre des contrées de l'Europe, il n'y en ait qui ont été rassemblés par des inondations de la mer : je dirai même qu'il se peut qu'en Flandre certaines couches de tourbe sont des restes de pareilles inondations : & alors ce seroit à la troisième des causes envisagées dans mon Mémoire, que de pareilles couches devroient se rapporter. Cependant, comme aucune observation ne m'a encore appris jusqu'à présent, si quelques tourbieres de nos provinces offrent d'une manière bien reconnoissable, les vestiges de l'océan, j'ai eu recours à une cause qui m'a paru suffisante pour un pays tel que le nôtre a été dans ces siècles dont nous parlent les historiens Romains. Cette même cause est d'ailleurs celle dont M. de Buffon a cru pouvoir se contenter dans les preuves de sa Théorie de la terre, art. XVIII, pour expliquer en général l'origine de la tourbe.

huit pieds, plusieurs pieces de monnoie frappées sous le regne d'Edouard IV, c'est-à-dire deux cens ans avant qu'on eût fait cette découverte : d'où il résulte que le terrain s'est élevé d'environ un pied en onze ans, ou d'un pouce & un douzieme par an.

Pour ce qui est de ces tourbes connues sur-tout en Hollande, & qui ont été formées par la décomposition d'une quantité de plantes marines, il est inutile de dire qu'elles n'appartiennent pas ici ; mais on fait, d'ailleurs, comment peuvent s'être formés certains amas de ces mêmes plantes qu'auront rassemblées les eaux de l'océan dans certains endroits des provinces Beligiques, lorsque toute leur étendue faisoit encore partie du bassin de la mer.

Je borne ici mes recherches sur l'origine de nos fossiles accidentels. Je ne prétends pas avoir donné partout des explications exemptes de difficultés : cet aveu me servira d'apologie, si le succès n'a pas toujours répondu à mes efforts. Je crois cependant avoir rencontré quelques vérités assez intéressantes : ceux qui travailleront après moi, pourront les mettre dans un plus grand jour, en ajoutant de nouvelles observations à celles dont j'ai présenté le résultat. Je crois, au reste, avoir mis en évidence la nécessité du principe qui m'a servi de guide. Ce Mémoire a prouvé que, pour s'occuper à une matiere dépendante de la théorie de notre globe, c'est à plusieurs causes qu'il faut avoir recours ; c'est une distribution de phénomènes par classes, qu'il faut envisager afin de ne pas méconnoître les véritables agens dont ils sont les effets, & ne point tomber dans le défaut reproché à tant de physiciens qui n'ont manqué leur but, que pour avoir confondu les phénomènes, & les avoir tous fait dériver d'une seule & unique cause. On a remarqué, dans le cours

de mes recherches , comment chaque espece de phénomène est venue se ranger dans la classe qui lui est propre. Un déluge universel , un séjour naturel des eaux de l'océan sur l'étendue de nos contrées , des inondations particulieres , des effets produits par les pluies , les eaux stagnantes & les marécages , voilà les causes qu'il me falloit examiner : & j'ai dû les employer toutes pour remplir mon objet , pour expliquer ce qui dans l'histoire naturelle de nos provinces Beligues , paroît d'abord le plus propre à fixer notre attention.

