

nota DDMI-79.20

titel : De flora en vegetatie van een aantal schorren langs de Westerschelde in 1978.
auteur(s) : T.J. de Kogel
datum : 19-11-1979

In 1978 is door de Deltadienst afd. Milieu-onderzoek een vegetatie-kartering gemaakt van de schorren in het Oosterscheldegebied (DE JONG & DE KOGEL 1980 in prep.). In aansluiting hierop zijn een aantal oriënterende bezoeken gebracht aan de schorren langs de Westerschelde. Bij deze bezoeken zijn waarnemingen over flora, vegetatie, beheer en mate van erosie/aangroei vastgelegd. Hoewel het hier slechts een globale inventarisatie betreft, is besloten deze gegevens hierbij te publiceren omdat er slechts weinig bekend is van de flora en vegetatie van deze gebieden.

In totaal zijn van 16 schorgebieden gegevens verzameld (zie fig. 1). De schorren van het Verdrongen Land van Saeftinge, de verdrongen Zwarte Polder en het Zwin zijn niet bij de inventarisatie betrokken. Dit i.v.m. de grote omvang van deze gebieden. Er zijn van deze gebieden wel recente inventarisatiegegevens. Van Saeftinge is in 1971 een vegetatiekaart gemaakt door LEEMANS & VERSPAANDONK (1975) en in 1979 door de Meetkundige Dienst van Rijkswaterstaat (VAN STOKKOM 1980 in prep). Van het Zwin is in 1979 door JANSEN een vegetatiekaart gemaakt voor de Stichting het Zeeuwse Landschap. Van de verdrongen Zwarte Polder zijn vegetatiegegevens bij de Stichting het Zeeuwse Landschap.

Op de gebieden 10 en 14 na zijn alle inventarisaties uitgevoerd tussen 20 en 25 september 1978. De gebieden 10 en 14 zijn op 26 oktober 1979 geïnventariseerd.

Van alle bezochte schorren is een floralijst gemaakt (tabel 1), waarbij van iedere soort de bedekking is geschat volgens de schaal van Tansley & Chipp. Hierbij is: r = rare, o = occasional, f = frequent, A = abundant en VA = very abundant.

Daarnaast is globaal het voorkomen van de belangrijkste vegetatie-typen in een schaal van 1 t/m 5 weergegeven (tabel 2). Voor de namen van de vegetatie-typen is, voorzover niet anders vermeld, steeds gebruik gemaakt van WESTHOFF & DEN HELD (1969). In tabel 3 en 4 zijn verder nog gegevens over resp. beweiding en aangroei/afslag van de schorren vermeld.

De kleine schorren zijn vrij intensief geïnventariseerd, de grotere meer steekproefsgewijs. De floralijst is dus ongetwijfeld niet geheel volledig. Van gebied 1 (opgespoten gebied ten westen van fort Rammekens) en van gebied 3 (de Kaloot) zijn alleen de gedeelten die onder invloed van het Westerscheldewater staan geïnventariseerd. De duintjes zijn buiten beschouwing gelaten. Gegevens hierover zijn wel verzameld door de PPD-Zeeland in het kader van de milieukartering.

LITERATUUR

- Anonymous, 1973 Saeftinge-boek, een bundel artikelen over de geschiedenis van de flora en fauna van "Het Verdrongen land van Saeftinge" Vogelwacht Oost Zeeuwsch-Vlaanderen "De Steltkluut".
- Beeftink, W.G., 1957. De buitendijkse terreinen van de Westerschelde en de Zeeschelde - natuurwetenschappelijke betekenis, bedreiging door het Deltaplan en behoud voor de toekomst. Natuur en Landschap 11 (1957) no. 2.
- Beeftink, W.G. 1965. De zoutvegetatie van Z-W Nederland beschouwd in Europees verband. Meded. L.H. Wageningen 65-1 (1965).
- Leemans, J. en B. Verspaandonk, 1975. Het verdrongen land van Saeftinghe - een vegetatiekundige studie m.b.v. luchtfoto's. Studentenverslag Delta Instituut voor Hydrobiologisch Onderzoek D4-1975
- Stokkom, H. van, 1980. in prep. Vegetatiekaart Verdrongen land van Saeftinge 1979. Rijkswaterstaat, Meetkundige Dienst, Delft.
- Visser, A. de, 1956. De Zwarte Polder. De Levende Natuur 1956, pp. 12-16.
- Westhoff, V. en A.J. den Held, 1969. Plantengemeenschappen in Nederland. NV W.J. Thieme & Cie. Zutphen 1969.




Fig. 1 Ligging schorren Westerschelde

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 opgespoten gebiedje ten westen van Fort Rammekens | 9 schor voor de Hellegatpolder |
| 2 schor ten oosten van Fort Rammekens | 10 schor voor de Nijspolder |
| 3 de Kaloot | 11 Biezelingse Ham |
| 4 schor bij Hoofdplaat | 12 schor voor de Kruispolder |
| 5 Hoge Springer | 13 schor bij Waarde |
| 6 schor voor de Paulinapolder | 14 schor voor de Zimmermanpolder |
| 7 schor bij Ellewoutsdijk | 15 schor ten westen van Bath |
| 8 schor bij Baarland | 16 schor bij de Appelzak |

TABEL 1. Floralist van de schorren langs de Westerschelde in 1978

Plantengemeenschap	Wetenschappelijke naam	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Nederlandse naam
		Opgevoeten ge- bied ten w. van fort Rammekeus	Schor ten o. v. fort Rammekeus	de Kaloet	schor bij Hoofd- plaat	Hoge Springer	schor voor de Paulinapolder	schor bij Elle- woutsdijk	schor bij Baar- lang	schor voor de Hellegatpolder	schor voor de Nijspolder	Biezelingse Ham	schor voor de Kruispolder	Schor bij Waarde	Schor voor de Zimmermanpolder	schor ten westen van Bath	schor bij Appel- zak	
Spartinion	Spartina anglica		A	A	A	A	VA	A	A	A	VA	VA	A	VA	A	f/A	O	Engels slijkgras
Thero-Salicornion	Salicornia europaea	O	A	A	O	A	A	A	A	A	O	A	A	O	O	A	O	Zeekraal
Thero-Suaedion	Suaeda maritima	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	O	Schorrekruid
	Aster tripolium	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Zeeaster
	Puccinellia maritima	A	VA	A	A	A	A	A	A	A	A	VA	A	A	A	A	A	Gewoon kweldergras
	Triglochin maritima	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	O	Schorrezoutgras
Puccinellion mariti- mae	Halimione portulacoides	A	A	A	VA	O	A	VA	VA	A	A	A	A	A	A	A	A	Gewone zoutmelde
	Limonium vulgare	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	O	Lamsoor
	Plantago maritima	O	A	A	O	A	A	A	A	A	A	O	A	A	O	O	A	Zeeveegbree
	Spergularia media	O	A	A	O	A	A	A	A	A	O	O	O	A	O	O	A	Gerande schijnspurrie
	Festuca rubra	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	O	O	A	O	O	O/f	Roodzwenkgras
	Artemisia maritima	A	O	A	A	A	A	A	A	A	O	A	A	A	A	A	A	Zeealsem
Armerion maritimae	Glaux maritima	A	O	A	A	A	A	A	A	A	A	O	O	O	O	O/f	A	Melkkruid
	Armeria maritima	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Engels gras
	Juncus gerardii	A	O	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Zilte rus
Atriplicion litora- lis	Atriplex littoralis	A	O	A	O	A	A	A	A	O	A	A	A	A	A	A	A	Strandmelde
	Matricaria maritima	O	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Reukeloze kamille
	Elytrigia pungens	VA	A	VA	A	A	A	A	O	A	A	A	A	VA	O/f	A	A	Strandkweek
	Atriplex hastata	A	O	O	A	A	A	A	O	O	O	A	A	A	A	A	A	Spiesmelde
Angelicion litoralis	Cirsium arvense	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Akkardistel
soorten uit brak- watermilieu	Cochlearia officinalis	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Echt lepelblad
	Scirpus maritimus	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Zeebies
Halo-scirpion	Phragmites australis	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Riet
Puccinellio-	Spergularia marina	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Zilte schijnspurrie
Spergularion salinae	Puccinellia distans	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Stomp kweldergras
	Parapholis strigosa	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Dunstaart
Saginion maritimae	Sagina maritima	O	A	O	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Zeevetmuur
	Plantago coronopus	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Hertshoornweegbree
	Centaurium pulchellum	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Fraai duizendguldenkruid
Centaurio Saginetum moniliformis	Sagina nodosa	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Sierlijke vetmuur
	Beta maritima	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Strandbiet
Salsolo-Honkenyon	Honkenya pepioides	O	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Zeepestelein
pepioides	Cakile maritima	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Zeeaster
	Salsola kali	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Loogkruid
	Agrostis stolonifera	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Fioringras
	Lotus tenuis	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Smaibladige roiklaver
	Leontodon autumnalis	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Herfstleuwestand
	Potentilla anserina	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Zilver schoon
	Trifolium fragiferum	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Aardbeiklaver
	Trifolium repens	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Witte klaver
Agropyro-Rumicion crispi	Ononis spinosa	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Kattadoorn
	Plantago major	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Grote weegbree
	Lolium perenne	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Engels raaigras
	Polygonum aviculare	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Varkensgras
	Rumex crispus	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Krulduring
	Festuca arundinacea	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Rietzwenkgras
	Ammophila arenaria	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Helm
	Calystegia sepium	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Haagwinde
	Cerastium holosteoides	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Gewone hoornbloem
	Chenopodium album	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Melganzevoet
	Chenopodium glaucum	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Zeegroene ganzervoet
	Crepis capillaris	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Klein streepzaad
	Daucus carota	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Wilde peen
	Elytrigia junceaformis	O	A	O	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Biestarwegras
	Eriogon canadensis	A	A	O	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Canadese fijnstraal
	Eupatorium cannabinum	A	A	O	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Leverkruid
	Juncus bufonius	O	A	O	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Greppelrus
	Lepidium draba	A	A	O	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Pijlkruidkors
Overigen	Medicago arabica	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Gevlekte rupsklaver
	Medicago lupulina	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Hopklaver
	Poa annua	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Straatgras
	Poa pratensis	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Veldbeemdgras
	Poa trivialis	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Ruwbeemdgras
	Salix alba	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Schietwilg
	Sedum acre	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Muurpeper
	Senecio vulgaris	O	A	O	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Klein kruiskruid
	Solanum dulcamara	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Bitterzoet
	Solanum nigrum	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Zwarte nachtschade
	Sonchus arvensis	A	A	O	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Akkermelkdistel
	Sonchus asper	A	A	O	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Brosse melkdistel
	Sonchus oleraceus	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Gewone melkdistel
	Taraxacum spec.	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Paardbloem
	Trifolium pratense	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Rode klaver
	Urtica dioica	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Grote brandnetel
	Totaal aantal soorten	36	27	45	27	8	28	21	16	22	7	14	13	33	19	21	26	

TABEL 2. De mate van voorkomen van een aantal vegetatie-typen op de schorren langs de Westerschelde in 1978

gebied	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	dominerende soorten
vegetatietype																	
<i>Spartinetum townsendii</i>		4	2	3	4	4	3	1	3	4	5	5	4	5	3		Engels slijkgras
<i>Salicornietum strictae</i>		3	2	1	4	1	2	3			2		1				Zeekraal
<i>Aster-tripolium</i> sociatie (Beeftink 1965)		1			3	1	1		3			2	2	3	3/4	3	Zeeaster
<i>Triglochin maritima</i> sociatie (")								4	2			2	4		2		Schorrezoutgras
<i>Puccinellietum maritimi</i>		5	2	2	1	4	3	4	3	2	5	3	4	2/3	1		Gewoon kweldergras
<i>Plantagini limonietum</i>		2		1		3	1	3	3				2				Lamsoor, Zeewegbree
<i>Halimionetum portulacoides</i>		3		5		4	5	5	3				2				Gewone zoutmelde
<i>Artemisietum maritimae</i>		2	2	3		3	1	3	3/4		1		1	1	1		Roodzwenkgras/Zeealsem
<i>Juncetum gerardii</i>		2	3					2					1				Roodzwenkgras, Zilte rus
<i>Atriplici-Elytigitum pungentis</i>		4	4	2		3	4	2	3/4			2	3/4	2	4	4	Strandweeg, Spiesmelde
<i>Phragmites australis</i> vegetaties			1											1	3	2	Riet
<i>Halo-Scirpetum maritimi</i>												2	1	3/4	4/5	4	Zeebies
<i>Sagino maritimae-Cochlearietum danicae</i>	1	1	1														Zeevetmuur, Dunstaart

1 = zeer kleine opp. (enkele m²)

2 = kleine opp.

3 = vrij veel voorkomend

4 = veel voorkomend

5 = dominant

TABEL 3. De beweiding van de schorren langs de Westerschelde (% oppervlakte geschat) in 1978

gebied	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
% beweide door:																
schapen	-	-	-	-	-	-	5	50	-	5	100	-	5	-	-	-

TABEL 4. De mate van erosie/aangroei van de schorren langs de Westerschelde in 1978

gebied	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
sterke afslag								x								x
zowel afslag als aangroei		x		x		x			x				x			
stabiel			x							x					x	
vnl. aangroei					x		x				x	x		x		