

Rehabilitated Common Scoters which were collected during the Sea Empress incident in Wales have been ringed before their release. For those engaged in beached bird surveys it is therefore recommended to carefully check scoter corpses for rings. □

DIEP DUKENDE ZEEKOET OP VIDEO DEEP DIVING GUILLEMOT VIDEOED

In een artikel in *Auk* in 1985 werd de duikdiepte van vier soorten alkachtigen beschreven op grond van in netten verstrikte vogels (Piatt & Nettleship 1985. Diving depths of four alcids. *Auk* 102: 293-297). Zeekoet, Alk, Papegaaiduiker en Zwarte Zeekoeten bereikten kennelijk diepten van respectievelijk tenminste 180, 120, 60 en 50 meter. Deze waarden werden afgeleid van verstrikte vogels in netten die op een dergelijke diepte waren geplaatst, maar het bleef natuurlijk mogelijk dat de dieren in de netten terechtgekomen waren tijdens schieten of halen. Interessant was daarom de waarneming van een langszwemmende Alk in de Noordzee vanuit een duikklok op 140 meter diepte (Jury 1988. Deep-diving auk: Razorbill at 140 metres. NSBC Report for 1986: 54. North Sea Bird Club, Aberdeen). Kortgeleden werd een nieuwe waarneming gepubliceerd, nu van een langszwemmende Zeekoet, opnieuw in de Noordzee. Deze vogel werd geregistreerd door een videocamera op 100 meter diepte en leidde tot totale verwarring bij de 'camera-operator', die meende een pinguin te hebben gezien (The Times en The Independent 9 mei 1996). Net als eerder bij de waargenomen Alk kon worden vastgesteld "It was swimming about like a fish, perfectly happily" en de waarneming ondersteunt de suggestie dat deze alkachtigen op meer dan 100 meter diepte kunnen fourageren.

The Times and The Independent report on a Guillemot videoed at 300 feet depth. This video and an earlier record of a swimming Razorbill at 360 feet depth support earlier suggestions from entangled birds that auks may forage at great depth. □

SULA THEMANUMMER KLEINE ALK NEXT ISSUE OF SULA REPORTS ON LITTLE AUKS

In november 1995 werden opvallend veel dode Kleine Alken op de Nederlandse kust gevonden. Ook de zeetrekwaarnemers registreerden wat meer Kleine Alken dan normaal en op verschillende plaatsen in ons land konden deze doorgaans zo zeldzame vogels van dichtbij en langdurig bekeken worden. Invasies van Kleine Alken zijn al lang een bekend verschijnsel in het Noordatlantische gebied, maar het leek de redactie van *Sula* aardig om de meest recente influx wat uitgebreider te beschrijven. Hiertoe werden waarnemers in verschillende landen rondom de Noordzee uitgenodigd om de re-



Zwarte Zeeëend ♀ *Common Scoter* ♀, Brouwersdam

foto P. de Knijff, archief NSO

Zeeëenden. Ter vergelijking: er werden 'slechts' 1800 Alken en Zeekoeten gevonden (The Seabird Group Newsletter 74, April 1996). Met de beoliede zeeëenden is een experiment uitgevoerd. Ten minste 700 en mogelijk ruim 1000 nog levende Zwarte Zeeëenden zijn schoongemaakt, geringd en losgelaten. Dit is voor het eerst dat grote aantallen van deze soort in West-Europa zijn geringd. Sommige van deze vogels zijn aan in het Kanaal (Lyme Bay) en zelfs aan de oostkust van Engeland losgelaten. Het is zeer wel mogelijk dat deze vogels de Nederlandse kust zullen passeren, actief of passief. Waarnemers op het strand worden dus aangemoedigd om gevonden Zwarte Zeeëenden, die normaal nooit een ring hebben, in het vervolg goed op ringen te controleren!