

VI.

Over det
kostfaldte Slægt Tellinerne.

af
Konstforvalter Spengler.

(Oplæst den 6 Martii 1795.)

Efter Planen af min lige fra Begyndelsen fattede Beslutning at vælge det angennemme og tillokkende Fag, Conchyliologien, til Gjenstand for mine Forelæsninger i Selskabet, og (som jeg hidindtil ogsaa har gjort) følge Ordenen i det Linnéiske Natursystem, og ledsage Arterne i det foretagne Slægt (hvor der formedelst den methodiske Beskrivelses Korthed udfordres Forklaring) med Anmærkninger, som og for at berigtige de mange forekommende slet valgte Citationer af Skribenterne; men fornemmelig for at indsatte paa behørigt Sted ved omstændelige Beskrivelser blandt de Linnéiske Arter de mange og hyppige nye Arter, som deels ikke ere komne den store Linné for Øjne, deels ogsaa siden den Tid ere nye opdagede. I Følge denne ovenmeldte Orden kommer jeg denne gang til det store Familie-Slægt Tellinerne. Allerede de gamle og især de nyere Forsattere af con-

chyliologiske Verker have under dette Navn forestillet sig en toskallet ganske flad og langagtig Muskel, og dette Slægtnavn har ogsaa Linné beholdt. Man bør ikke undres over, at ikke allene de gamle, men endog de nyere, især de franske, Conchyliologer har blandet under Slægtnavnet Telline saavel Muslingerne som deres Came (hvilke for endeel udgjøre Linné's Venus-Muskeler) og endnu flere Arter. De manglede bestemte Kjendemerker til behørig at skjelne dem fra andre, som i udvortes Skikkelse komme dem noget nær. En Linné var det forbeholdet at udvikle disse Kjendemerker, og overhoved at ordne de toskallede Muskler efter deres indvendige Sammenlægnings-Lænder, Laas eller Charniere, og inddele dem i Slægter. Fandt han ved den udvortes Skikkelse noget ejendommeligt, saa tog han dette til Hjælp; thi jo flere Adskillelser-Legn der træffes hos et Slægt, destomindre staaer man Fare for at tage Fejl af det, og denne Fordeel har han ogsaa søgt at nytte ved Tellinerne. Denne Muskel er i den forreste smale Ende ligesom ved et Tryk fladt ophævet, hvorved nær hos Kanten en smal Rng stiger i Høiden, og dette er og bliver ved dette Slægt et fast og usvigeligt Kjendemerke; under dette Sted er i den underste Skæl en dyb udhulet Fure. Det andet er Sammenlægningsgen eller Laasen. Under Hvirvelen (nates) i den ene Skæl staaer indvendig to smaa Lænder i afmaalt Fræstand fra hinanden, saa at den noget bredere og spaltede

tede Tand i den anden Skal kan tæt indslutte dem begge. Foruden disse 3 Tænder, som udgjøre Tellinerne's egentlige Sammenlænkning, gives der mange blant dem, som i den ene Skal have flade og foran tilspidsede Sidetænder, som gaae ind under Kanden af den anden Skal, uden at have der Fordybning eller modsvarende Tænder. I øvrigt ere Laasens Tænder hos Slægten Tellinerne overordentlig smaa.

Formedelt Arternes store Forskjellighed har Linné fundet for godt at gjøre 3 Underafdelinger, jeg har beholdt disse, men tillige for at indføre en bedre Orden, forøget dem med 2de nye. Man vil finde, at der blant Tellinerne gives nogle, som ere lange og smale, i begge Ender noget aabne og have ingen Sidetænder; herved nærme de sig Slægten Solen uden at høre til det, men ere at ansees som en Overgang mellem begge Slægter. Disse maatte altsaa bringes under en egen Afdeling og naturligtvis følge efter Solen. Den anden Afdeling (Elongatæ) indbefatter de med lang udtrakt Fordeel forsynede Telliner.

- A. Saleniformes.
- B. Elongatæ.
- C. Ovatae crassiusculæ.
- D. Ovatae compressæ.
- E. Suborbiculatæ.

A. Soleniformes.

No. 1. *Tellina gari*. a. Testa ovali striis transversis recurvatis, dentibus lateralibus obsoletis.

Linné No. 48.

Chemnitz Tom. 6. fig. 93.

Anmærkning:

Denne Telline er fra mere end en Side betragtet mærkværdig. Den er i sit Slægt den eneste Art, som tilligemed alle Kjendetegn paa sit Slægt fremviser en modsat Figur i Omridset, eftersom alle ovaldannede Telliner ere i den forreste Deel smale, og i den modsatte Ende brede; denne derimod er før til bredest, derhos er den bageste Ende lang og smal, afrundet og paa begge Sider aaben, og ligner altsaa høi meget Solen. I den forreste Ende har den et dobbelt Indtræk, hvorefter den fremkommer 2de Vinkler eller Hjørner, i hvis Midte den forreste Deel af Musfelen danner en Spidse. Overfladen af begge Skallerne er paa en ret jærlig Maade overdraget med regelmæssige Linier og fine Scriber, men som ere vanskelige at beskrive. Fra Hvirvelen af, som næsten har sit Sæde i Midten af Musfelen, begynde fordybede Linier efter Bredden, hvilke efter Musfelens Omrids ere dragne lige ned til den skarpe Kant. Fra den bageste smale afrundede Ende til nær ved Midten af Musfelen fordoble disse Linier sig, da det glatte Rum mellem de første Linier bliver atter gjennemdraget med en ny Linie, hvormed da den øvrige Deel af Musfe-

len

len belægges over begge Vinklerne og Indrykkene ganske med disse fine Striber. Saaledes ere de 2 Par Musfeler beskafne, som jeg nu beskrev; men jeg har endnu 3 Slags Varieteter, hvoraf enhver i noget er forskjellig; men deri ere de dog hinanden lige, at Stedet, hvor de fine Pinier skulle fordoble de første, har en ganske skjev Stilling, hvorved de gennemkrydse de lige horizontale Pinier, og derved faae Mellemrummene en skæl-sigende Figur, hvilket ogsaa Linné har omtalt, da han med saa megen Nøjagtighed vidtløstlig beskriver denne sjeldne Musfel i Museo Reginae Ulricæ pag. 478, saa at enhver, der ser Musfelen, ikke kan miskjende den; men i Citationerne har Linné feilet, da denne Musfel hverken er afbildet i Kumph. eller d'Argenw. Eller noget andet Verk, foruden i det Chemnitzske og i Schröters Einl. 2ter Band. Forledet ved de anførte Citationer har ogsaa en v. Horn antaget en ganske anden Musfel, ja endog ladet den forestille i Kobber. Hvad ellers Linné endnu paa ovennævnte Sted anfører om de 3 spaltede Tænder, og Mangelen af Side-tænder har den fuldkomneste Rigtighed.

Farven er udvendig skøn fiolet, indvendig er den saa glindsende, som poleret Agat, af samme Farve som udvendig. Dens Længde er $2\frac{1}{2}$ Tomme, men Bredden kun 1 Tomme og 2 Linier.

Fra Niquebar.

Artforandring b.

Chemnitz Tom. 6. Fig. 92.

I Omrids er denne Telline lig den foregaaende. Her er Hvirvelen fuldkommen i Midten af Musfelen: det Bæsenligste, hvori den er forskjellig fra den færrige, bestaaer dert, at, paa den forreste halve Deel af Musfelen, de fine horizontale fordybde Linier atter andre diagonal eller skjeve fra Hvirvelen nedløbende Linier gjennemkrydse de første, og give derved Musfelen det skjæl-lignende Udseende, som jeg allerede oven for har sagt. Da alle ommeldte Linier ere yderst svage og fine, saa kan man, til at betragte dem, ikke vel undvære Forstørrelses-Glasset.

Denne Tellines Farve er lysblaa, blandet med noget fiolet og eensfarvet. Indvendig er denne Farve noget stærkere, og Skallen af høj Glands. Den har en Længde af 1 Tomme og 8 Linier, og Bredde af 10 Linier.

Fra ovenmeldte Sted.

Artforandring c.

Chemnitz. Tom. 6. fig. 94.

Schröters Einleit. 2ter Band Tab. 7. fig. 9.

Ogsaa denne Muskel har paa det næjeste alle de foregaaendes Kjendetegn, kun med den Forskjel, at den er meer tytffallet, og de forskjellige Linier, hvormed Overfladen er bedækket, ere meget dybere indgravne og videre fra hinanden staaende, følgerig fremstille tydelige Striber, hvortil ikke behøves noget For-

Forrælses-Glas. Musselens Farve er hvid med røde brune afbrudte Straaler, som løbe ned fra Hvirvelen lige mod den underste Kant; indvendig er den glindsende hvid, og kun nede ved Randen finne de ydre Flekker igiennem. 2 Mussel-Flekker, som ere forenede med en glindsende Kanal, sidde paa begge Enderne under den øverste Kant. I Længden er det $1\frac{1}{2}$ Tomme, og dens Brede 10 Linier.

Fra samme Sted.

Artforandring d.

Saa smaa endog disse Musseler maatte være, saa ere de dog i alle og enhver Deel deres Slægts Art tro. Man maa forundre sig, naar man betragter dem giennem Forrælses-Glasset, hvorledes Stillingerne af de forskjellige Linier beholde deres regelmæssige Sted. Kun Farven gjør Forskjellen. Det ene Exemplar er smul højrødt med smaa indblandede hvide Flekker. Indvendig hersker en lige Farve, kun i Midten er den hvid. Det andet Exemplar er citron-gult, blandet med smaa hvide Flekker; indvendig er det hvidt med en gul Rand rundt om Kanten. Da ogsaa Linné i Museo R. Ulr. anfører ikke mindre end 4 Artforandringer, som allene vare forskjellige i Farven, stadfæster denne Omstændighed Rigtigheden af at han ikke har meent nogen anden, end just denne Mussel under Tellina Gari. Den længste af begge disse Musseler er 1 Tom. 1 Linie lang, Bredden $\frac{1}{2}$ T.

Fra samme Sted.

No. 2. *Tellina glabra*. Testa ovali, antice & postice hiante, antice hinc ad alterum latus vix flexa sed simpliciter carinata. Obs. variat colore carneo & coeruleo radiata.

Begge Musselskallerne, som have eens Størrelse, og ere fuldkommen af eens Stikkelse, have den største Lighed med de foregaaende, kun at den forreste Side ikke har noget dobbelt Indtryk, og følgelig blot en Vinkel eller Rng, som udmærker Tellinernes Slægt. Derhos er dens Overflade ganske glat uden de ringeste Finter eller Rifter. Sammenlænkningen eller Skarneringen er som hos alle Telliner, kun ere Tænderne meget smaa, og Skallerne gabe i begge Enden.

Den ene Doublet har en rød Farve udvendig og indvendig, denne sidste Deel er sinuø glindsende. Den anden Mussel er blaa, Hvirvelen med gule og blaa Straaler, neden under omkring Kanden hvid, indvendig dunkel fiolet. De have en Længde af 1 Tom. og 2 Finter. Bredden er 7 Finter.

Fra Kysten Guinea.

No. 3. *Tellina Coccinea*. Testa tenui rubro ovali planata antice & postice hiante, transversim striata.

Chemnitz Tom. 6. fig. 109.

Denne skønne carmosinfarvede Mussel er langagtig rund i Omrids, meget fladtrykt og i begge Enden gabende. De 2 Tænder i den ene Skal staae meget

meget vidt fra hinanden. De yderst tynde gjennemskinnende Skaller ere paa tværs fint riflede paa hele Overfladen, og have fremstaaende Nympher. Længden er 1 Tom. 3 Linier, Bredden 10 Linier.

Fra det middellandske Hav.

No. 4. *Tellina Semiplanata*. *Tellina rufescens* fennonica operculata, testa oblonga inæquivalvicum valvularum altera valde convexa, altera fere planata sit. Chemnitz Tom. 6. p. 105.

Chemnitz Tom. 6. fig. 97.

Denne sjældne Telline har en langagtig ægdannet Figur. Hvirvelen, som staaer frem over Skallerne, er langt borte fra Midten af Muskelen, og har sit Sæde meer mod den bageste afrundede Ende. Nympherne ere lange og ligge dybt under Hvirvelen, og derfra forlænger Muskelen sig mod den forreste Ende, formedelst Indtrykket, som er Tellinerne saa eget, i en smal Spids, hvor begge Skallerne ere bøjede skjev nedad. Begge Skallerne have eens Grundrids, men heri udmærke de sig fra andre Telliner, at den øverste Skal er uden Hulning ganske lige og flad, og kan tjene den underste Skal, som er meget fordybet, ligesom til et Dæksel, hvilken Omstændighed gjør den til et meget sjældent Species. ¹⁾

3

¹⁾ Vel har Linné ved No. 56 indført en liden perlemor-
der Muskel under Navnet *Tellina inæquivalvis*, som
lige-

I den underste dybe Skal sidde 2 Sammenslæknings-Tænder temmelig nær hos hinanden, hvor for da den enkelte Tand i Dødsfælet er meget smal, for at kunne træde ind mellem de 2 andre. Sideslænder har denne Tælline ikke; i begge Ender staae Skallerne noget aabne. Skallerne Overflade ere fra Hvirvelen af yderst svagt paa tværs belagt med tætt i hinanden sluttede fine Striber, som igjen blive gjennemtrængte af lige Linier fra oven ned ad. Mod den skarpe Kant neden under ere de ligesom Gitterværk dannende Linier tydeligst at see. Musseleens Farve er cinoberrød paa begge Sider, i Midten gjennemtruffet med et hvidt Bånd; dens Længde er 1 Tom. 8 Linier, Bredden 1 Tom. 4 Linier 2de Exempl. Endnu et 3die Exempl. som er ulige større, nemlig 3 Tom. 2 Linier lang, og 1 Tom. 8 Linier bred.

Fra Niquebat.

Favanne Catal. Paif. de la Tour d'Auvergne
pag. 303. No. 1479.

No. 5. Tellina magna. Testa alba ovali plana margine postice rotundato antice attenuato natibus luteis.

Denne

ligeledes ogsaa har et saa fladt Dødsfælet til Overflad; men, ikke at tale om, at der under Tellin-Slaget ikke gives nogen Mussele af Perlemøder, saa anviser allerede Skarneringen dens egentlige Slægt, nemlig at den hører til Anomierne.

Denne anseelige store og skønne Telline har jeg ikke kunnet finde hos nogen Forfatter. I Omrids er den oval, flad sammentrøkt, i den bageste Ende afrundet, og i den forreste Deel noget smalere, med et fladt Indtryk, hvorved begge Skallerne ere bøjede til Siden, hvilket saa kjendelig udmærker Tellin-Slægten. I begge Ender er Musfelen noget aaben. Hjørvelen er gult, temmelig ophævet, og staaer uden for Midten nær mod den smale forreste Ende. Nympherne ere smaa og ligge dybt under Skallerne Rand. De 2de Sammenlæknings-Tænder i den ene Skæl staae vidt fra hinanden, for at de kan op- tage den brede spaltede Tand fra den anden Skæl mellem sig. Den hele Musfel er uden og inden glindsende hvid, og naar man undersøger den ydre Glade med et godt Forstørrelses-Glas, saa finder man, at den paa tværs og efter Længden er overmaade fint riflet. Dens Længde er 3 Tom. 8 Lin., Bredden 2 Tom.

Fra det middellandske Hav.

B. Elongata.

No. 6. Tellina Spengleri. Testa elonga, alba, antice recurvata, inflexa & plicata, transversim striata, in margine vulvæ, flexuræ & indentata. Chemnitz T. 6. p. 98.

Beschäftigungen Naturf. Freunde in Berlin.

Tom. 1. Tab. 9. fig. 1. 2. 3.

Chemnitz Tom. 6. fig. 88-90.

Nogle af de evangeliske Brødre i Tranquebar forsøgte at oprette et Etablissement paa de Niquebariske Øer, og disse gjorde os bekendt med en Mængde sjældne og nye Conchylier, som disse Øer frembringe. Paa denne Maade erholdt jeg 2de Exemplarer af denne nye Art Telline, som jeg hverken har truffet hos nogen Conchyl-Forfatter, heller ikke i noget Kabinet, og troede derfor, at de til den Tid kunne være de første, som vare komne til Europa. Jeg forsømte ikke at bekendtgjøre den ved en nøje Beskrivelse, som er indført i ovenanførte Berliner Beschäftigung; jeg kaldte den paa det Sted, Elfenbeens Dameskallet. Dr. Martini, som den gang var beständig Secretair og Udgiiver af Selskabets Skrifter, forandrede dette Navn til det ovenanførte. Da tilmed ogsaa Hr. Chemnitz i det nye System Conchyl. Cabinet har afbildet og beskrevet den, saa ansæer jeg det for overflødigt at sige noget mere herom. Det største af mine nærværende Exemplarer har en Længde af 3 Tom., og Brede af 11 Linier, af hvilken Proportion man kan udlede dens sjældne lang udstrakte Figur.

No. 7. *Tellina rostrata*. Testa oblonga, antice angulato-rostrata, angulis subdentatis.

Linn. S. N. pag. 1118. No. 55.

Chemnitz Tom. 6. fig. 105.

Knorr Tom. 4. Tab. 2. fig. 3 og 5.

Rumph. Tab. 45. Lit. L.

d'Argenv. Tab. 22. Lit. O.

Da

Da Linné omstændelig har beskrevet denne nydelige Muskel saavel i sit Syft. Nat., som og i Dronningens Museum, samme ogsaa forekommer næsten i alle conchyliologiske Verker, saa er dens videre Beskrivelse ganske unyttig. Den mindste ponceerøde *Tellina rostrata* i min Samling har en Længde af 2 Tom. 1 Lin., og Brede 9 Lin. En anden større med den skønneste Glands udvendig og indvendig purpursøde Muskelskal er 2 Tom. 7 Lin. lang, og 11 Lin. bred.

Fra Ostindien.

No. 8. *Tellina Perna*. Testa ovali, antice inflexa, angulata in rostrum hiantem elongata, longitudinaliter & transversaliter subtilissime substriata, postice ovali. Chemnitz T. 6. p. 112.

Chemnitz Tom. 6. fig. 104.

v. Born Tab. 2. fig. 10.

Den foregaaende liden Telline har Rumph givet Navnet Confekt-Skinke, formodt Skabningens Lighed, hvilket mange Conchyliologer har beholdt, derved er jeg blevet foranlediget til at tillægge denne Muskel, som ogsaa Rumph paa ovenansførte Sted p. 148. ommelder, Navnet den hvide Skinke. Dens Figur er rund oval med en smal udstrakt Fordeel eller Snabel med et stærkt og dybt Indtryk, som mod den øverste Rand danner en opbøjet Krog, unden fra opbøjet og tilspidset i Enden. Herudi ligner

denne

denne snabeldannede Deel af Muskelen for saavidt den foregaaende liden Confekt-Skinke, kun at den er noget kortere. Muskelen selv er ogsaa bredere og hvelvet, opblæst og rind i Skallerne, aldeles glat, (thi de svage Striber, som kun sees ved Forstørrelses-Glas, kunne ikke komme i Betragtning). Indvendig, hvor Muskelen kun har een Tand, seer man ogsaa smaa Sidetænder. Nympherne ligge dybt i Skallerne og slutte sig tæt mod Tænderne i begge Skallerne. Farven er nødvendig hvid, og allene om Hvirvelen gul; men indvendig ere de, den underste Rand undtagen, som er hvid, ganske svovelsgule. Længden er $2\frac{1}{2}$ Lom., Bredden 1 Lom. 3 Lin.

Fra Ostindien.

Varietet b. af Tell. Perna.

Efter den udvortes Etikkelse adskiller denne Telline sig kun lidet fra den nysbeskrevne. Den har allene paa dens forreste Deel, som man hos denne Slægt-Art kalder Snabelen, fra Hvirvelen til den yderste Spidse en buedannet Figur, da hos de foregaaende en lige Linie udgjorde dette Sted. Paa den underste Kant lige over for Hvirvelen, til den forreste Spidse er Muskelen buedannet udskaaet; men den allerstørste Forskellighed fra de sidste gjør Farven. Den er eensfarvet, smul carminrød. Hvirvelen og endeel af Snabelen er af mørkere Farve. Ogsaa Rumph taler om denne røde Telline paa ovenanførte Sted i XI. S.

C.

C. Ovata Crassiuscula.

No. 9. *Tellina virgata*. a. Testa ovali, striis transversis, recurvatis antice angulata, dentibus lateralibus prominulis. Linné p. 1116. No. 46.

Chemnitz Tom. 6. fig. 67. 68.

Knorr. Tom. 2. Tab. 21. fig. 4.

Rumph Tab. 45. fig. H.

De mange efterfølgende Artsforandringer af denne Telline tilkjendegive, hvor forskjellig den er deels i dens Grundfarve, deels og fornemmelig i Fordelingen af dens Straaler, som løbe ud fra Hvirvelen mod den ydre Kant. Da Linné i S. N. og endnu omstændeligere i Dronningens Museum har beskrevet denne med nogle Artsforandringer, saa vil jeg her alene omtale den første Forandring. Grunden er lysgul med mange brede og smale højrøde Straaler, med mange afværlende Bånd paa tværs af lige Farve. Disse skønne Muskler have en Længde af 3 Tom., og Brede af 1 Tom. 10 Lin.

Fra Java.

Artsforandringer af *Tellina virgata*.

b. Med rød Grund med gule smale Straaler.

Chemnitz Tom. 6. fig. 7.

c. Grunden gul med røde Straaler.

d. Rød med hvide paa den ene, og paa den anden med gule Straaler, begge med et rødt Bånd ned under ved Kanten.

82. VI. Over det toskallede

- a. Hvid Grund med smale højrøde Straaler og dunkelrød Hvirvel. Samtidig fra Java.

Chemnitz Tom. 6. fig. 66.

- f. En smuk Art af Tell. virgata, i Stedet for Straallerne, som fra Hvirvelen løbe mod den underste Kant, staae her i en afbrudt Række af lutter Zirkelfigurer, saaledes, som man iagttager dem paa Venus castrensis. Disse Figurer ere fiolet, og Skallerne Grund er hvid. Indvendig er Muskelen gul. Den har en Længde af 2 Tom. 8 Lin., Bredden er $1\frac{1}{2}$ Tom. Fra Kysten Guinea.

Lister Tab. 399. fig. 238.

Chemnitz Tom. 6. fig. 73.

- g. Denne Tranqueb. Telline har i sit Omfang en ganske kort Oval, en ophøjet Hvirvel, som ikke holder Midten, men sidder meer mod den forreste smale Ende; de ere ganske hvide, men hos nogle seer man noget af blege og ligesom udslattede røde Straaler, som dog ikke ere udblegede. Skallerne ere tykke med dybere Tverstriber end de andre, og mere høvelde; dog fortjener at anmærkes, at Tverstriberne paa den underste Skal ikke række over den ganske Skal, men afbryde mod den forreste smale Ende, saa at omtrent en fjerde Deel af Skallen bliver glat og glindsende. Sidetænderne indvendig ere brede og stærke. Den største blant dem har en Længde af 2 Tom. 2 Lin., Bredden er 1 Tom. 5 Lin.

L. Denne Forandring er fuldkommen lig de forrige i Skikkelse, og det endog deri, at de dybe Tverstriber paa den underste Skal ikke række til den skieve og for til overbøjede Deel, saa at ligeledes, som hos de forrige, en fjerde Deel af Skallen er ganske glat. Denne Telline har ingen farvede Straaler, men med den hvide Grund afvejlende smale carmoisinrøde Bænd, som løbe paa tværs. Hymen sidder højt frem over Skallerne, er rund hvælvet, og af Farve glindsende lysbrun. Den er kun 1 Tom. 10 Lin. lang, og 1 Tom. 1 Lin. bred.

Fra Niquebar.

No. 10. *Tellina cruciata.* Testa ovali striata antice angulata, natibus rubro-cruciatis.

Denne Muskel har al Lighed med den oven anførte Artforandring Litr. e. af Tell. virgata, kun at de røde Straaler paa den hvide Grund ere noget blege og ikke saa livagtige; men det mærkværdigste er dette, at Skallerne omkring Hvirvelen isteden for røde ere her ganske hvide, og at 2de højrede Linier saaledes gennemkrydse Hvirvelen, at de paa Skallerne afbilde et ordentlig Kryds. Det største Ex. har 1 Tom. 10 Lin. Længde. Fra Niquebar.

No. 11. *Tellina rosea.* Testa ovali æquivalvi, transversim leviter striata, antice inflexa, cardinis dente unico bifido, lateralibus obsoletis elongatis. Chemn. T. 6. p. 105.

Chemn. T. 6. fig. 96.

Denne Tellines Omrids er ægdannet. Den er meget flad; fra Hvirvelen, som har sit Sæde nøje i Midten, lige til Spidsen i den forreste smale Deel af Muskelen gjør Spalten en lige Linie, og begge Kanter ere fordybet skarp udskaarne. Hymen ligger dybt i Skallerne, er smal og af en guul glindsende Farve. Det skieve Indtryk er dybt rund udhulet; derimod er den ophøjede Kæg ganske smal og nær hos den yderste Kant. Den yderste Overflade af begge Skallerne synes vel glat, men under Forstørrelses-Glasset vise sig svage Striber saavel i Bredden som i Længden. Farven er angennem lysrød, men indvendig er den hejponcerød. Den er $2\frac{1}{2}$ Tom. lang, og 1 Tom. 5 Lin. bred. Fra Niquebar.

No. 12. *Tellina punicea*. Testa lata ovali, subæquilatera, glabra, striis transversis approximatis. von Born, Mus. Cæs. pag. 33.

von Born Tab. 2. fig. 8.

Den udvortes Figur af denne Muskel er ægdannet. Hvirvelen rækker frem over Skallerne, og sidder uden for Midten, nærmere mod den bageste afrundede Ende. Fra Hvirvelen mod den anden smale Side hos Hymens Sæde er Muskelen buul udskaaet og drager sig efter en Cirkelbue ned under til den yderste Spidse. Kæggen af det skieve Indtryk er bred, ophøjet, og taber sig i en bred skarp Rand, som, forbundet med den underste Skal, ligner Eggen af en Kniv. Nympherne ligge formedelst ovenmedte

Hul-

Hulhed meget dybt indvendig under Skallerne Rand. Sidetænder har Musfelen ikke. Overfladerne kan ansees som glatte, hvorvel man gjennem Forstørrelses-Glasset kan opdage svage Striber, som gaae ned under saavel paa tværs som efter Længden. Farven er om Hvirvelen ned ad højred, mod Randen derimod kun bleg. Den indvendige Flade af begge Skallerne er høj carminrød. Paa begge Sider under den øverste Kant sidde de fordybede Musfellekker af besynderlig Størrelse, og begge ere ved en glindsende Kanal, som drages omkring nær hos den underste Rand forenede med hinanden. Deres Længde er 2 Tommer 7 Lin., og Bredden 1 Tom. 7 Lin.

Fra Niquebar.

No. 13. *Tellina succinea*. Testa lata, ovata, compressa, transversim substriata, marginibus acutis. von Born p. 33.

von Born Tab. 2. fig. 9.

I det Hele taget er Figuren af denne sjældne Niquebarske Telline oval; men naar den skal bestemmes nøjere, viser den sig triangeldannet. Fra Hvirvelen af, som, nøje i Midten af den øverste Rand, yderst siden og tilspidset staaer op i Højden, gaae efter begge Sider af Ryggen en bøjlet skraa nedunder løbende Linie, den ene til Enden af den forreste Spidse, den anden til den længste Kant af den afrundede bageste Ende, og den 3die Side udgjør Musfelens underste Rand, den er meget flad. Det flevende Indtryk og

den dermed forbundne Ring er her kun liden. Rømp-
perne ligge i lige Højde med Skallerne. I den
største Orden ere de yderste Glader af Skallerne bedat-
tede med fine Etriber, som ere kjendelige nok uden
Forstørrelses-Glas. Farven er smul kjødsfarvet rød,
og piset med et Par højrøde Baand efter Breden.
Landskænkningen er som hos de forrige, og hvad som
er Tellinerne ejendommeligt. Sidetænderne ere næ-
sten umærkelige. Musfelflekterne ere dybe, store,
og har en glindsende dunklere rød Farve, end Bæg-
gene i Musfelen. Den har 2 Tom. 2 Lin. Længde.
Breden er $1\frac{1}{3}$ Tom. Fra Niquebar.

No. 14. *Tellina Gargadia*. Testa subrotunda com-
pressa, antice rugosa, rima dentata.

Linné S. N. pag. 1116. No. 44.

Chemn. Tom. 6. fig. 63. 64.

Rumph. Tab. 43. Lit. N.

Klein Tab. 10. fig. 55. (Har her copieret
Rumphs Figur. Begge Afbildinger ere
elendige og ubrugbare).

Anmærkning:

Denne Tellines Omfang er kort oval, og er flad
sammentrykt. Hvirvelen er liden og gaaer i en
Spids frem over Skallerne. I den forreste Ende,
hvor sædvanlig Tellinernes Fierve Indtryk plejer fin-
des, bliver Musfelen under fra op ad paa begge
Skallerne piset med ophøjede, vinklede og bølgedan-
nede, fra oven afrundede tværslebende Folder, som
ende

ende sig hos Spalten, som er huul udskaaet, i stumpe stærke Tænder. Den øvrige og største Deel af Skallerne er ligeledes efter Bredden bedækket lige til nær hos Hvirvelen, med svage bølgedannede Rifter, men som først sees gennem Forstørrelses-Glasset. Den anden Side bag Hvirvelen er ligesaa, men endnu meget dybere og længere udskaaet, end Spalten. Rhympberne ligge dybt under Skallerne. Denne Muskel savnes i mange af de største Samlinger. Den pleier, som man ser hos Rumph, kun at være liden; denne derimod har i Tom. 8 Liniers Længde, og i Tom. 3 Lin. Brede.

Fra Nivebar.

No. 15. *Tellina lingva felis*. Testa subovata scabra: squamulis lunatis quincuncialibus.

Linné S. N. pag. 1116. No. 45.

Chemn. Tom. 6. fig. 65.

Knorr Tom. 2. Tab. 2. fig. 1.

Rumph. Tab. 45. fig. G.

Gualt. Tab. 76. B.

Anmærkning:

Denne udmærket skønne Muskel, som Rumph først har benævnet med Trivial-Navnet: Kattetunge, hvilket Linné og endeel andre Skribenter har beholdt, er paa dens hele Overflade paa en saaa ganske fortræffelig Maade dækket med smaa opstående, triangelformede Knopper, i den regelmæssigste Orden, saa at Naturens opmærksomme Jagttager ikke uden Be-

undring kan betragte den. Denne fine skjælbannede Bællædning er paa den skjæve Fordeel langs Spalten og ligesaa paa den anden Side af den ophejede Hvirvel indfattet med vinkel- og bølgebannede Folder lige som med en Søm; de mildroede Straaler hos den høiroede Hvirvel paa Musselskallernes snechvide Grund forhøje dens Skjønhed endnu mere. Mit største Ex. har i Længden 2 Tom. 4 Lin., i Bredden $1\frac{1}{4}$ Tom.

Fra Triquebar.

No. 16. *Tellina rugosa*. Testa subovata lata, rugis membranaceis transversis, rima hiant. von Born pag. 29.

von Born Tab. 2. fig. 4.

Chemn. Tom. 6. fig. 62.

d'Argenv. 3die Edition Pl. 49. fig. Q.

Denne Telline har en noget bred agdannet Skjælfelse. Dens Figur nærmer sig meget de forhen beskrevnes. Dens Overflade er udjæret paa tværs med vinkel- og bølgebannede ophejede Folder, som hos nogle ere flint og regelmæssig afmaalte. Andre derimod have stærkere Folder og ulige Forhold eller Proportion. Den smale tilspidsede Hvirvel stöder næje i Midten af Musselen. Nympherne ligge højt og ere smale. Paa den bageste Side af Hvirvelen er Stedet for Anus skraa udskaaet og belagt med et smalt Ligament, hvilket er et ganske usædvanligt Syn. Begge Skallerne have Sidetænder; i den ene, som har 2de Rænkings-Tænder, ere de brede og fortil

til

tilspidsede; i den anden kun smaa og stumpe. Farven er gemeenlig hvid udvendig og indvendig; dog gives der nogle som allene indvendig ere gule. Men jeg har dog ogsaa saadanne, som udvendig og indvendig har en skøn citrongul Farve. Det største Ex. holder $2\frac{1}{4}$ Tom. i Længden, Bredden er $1\frac{3}{4}$ Tom. Vi faae dem her fra Niquebar, som og blant Sydsøe-Conchylier.

No. 17. *Tellina angulata*. Testa subovata striis transversis recurvatis antice angulata, dentibus lateralibus nullis. Linné S. N. pag. 1116.

No. 47.

Chemn. Tom. 6. fig. 77. *Tellina polygona*, den mangelante Telline.

Det ydre Omfang af denne Muskel er ægdannet. Den har egentlig kun en Vinkel eller (ved det i den forreste smale Ende fordybede Indtryk) en ophøiet Rng; men efterdi Muskelen er i Midten mod den underste Rand af begge Siderne noget udhulet, saa giver dette den et Anseende, som om den havde en dobbelt Vinkel eller Kant. Overfladen af begge Skallerne er aldeles overtrukket med vinkel- og bølgedannede Løvstriber. Nympherne med det overdragne Pigament ere meget smaa og korte; deres Farve er udvendig ganske hvid, indvendig opad mod Hvirvelen gul. Den ene Skal har 2de Lænkings-Tænder, den anden (som Kiendetegnet fordrer) kun en eneste.

Til Sidetænder findes intet Spor. Det største Ex. er $2\frac{1}{2}$ Tom. lang, og 1 Tom. 4 Lin. breed.

Fra Niquebar.

No. 18. *Tellina Abildgaardiana*. Testa ovata, crassiuscula alba transversim striata, antice rugosa; angulata, dentibus mediis crassis lateralibus nullis.

Denne mærkværdige Mussel har blant Tellinerne, hvortil den besidder alle de af Linne udfordrede Kendetegn, alligevel meget ejendommeligt. Efter dens ydre Omrids er den ægdannet: ikke tynd og flad som andre Telliner, men tyk og stærk hvælvet, og, hvilket er ganske ualmindeligt, man finder ikke paa den hele Mussel nogen skarp Kant, Side eller Hjørne; alting er her stumpt eller stærkt afrundet. Ligesaa er ogsaa Hvirvelen stærk breed og opbøjet, og sidder nær ind mod den bageste Ende. De 2de Spidser (nates) støde sammen, og deres Stilling gaaer mod den bageste Side, hvilket sjelden forekommer, og de blive derfor kaldte Rinds-Muskler, eller, som de Franske kalde dem, à contre-sens. Den forreste Side, hvor Spalten forekommer, er ganske flad, lige og besynderlig breed. Begge Skallerne slutte tæt mod hinanden, isteden for hos andre Telliner paa dette Sted begge Skallerne pleje være saa tynde som Eggen af en Kniv, og i Midten vendt op ad i Højden. Ellers har den det almindelige Indtryk, og er paa den underste Deel ogsaa, hvorvel lidt opad bøjet. Den

hele

hele udvendige Overflade af begge Skallerne er paa
 ivers besat med regelmæssige fine opstående bladlig-
 nende Riser og Gladen i Grunden derimellem er fint
 farved. Nympherne ere korte og smale, bedækkede
 med et tyndt Ligament eller Hymen. Sammenlæn-
 ningen eller Charnier er med stærke Tænder forsynet.
 I den øverste Skal under Hvirvelen fremkomme 2de
 opad bøjede Tænder, mellem hvilke indlænktes fra den
 anden Skal en større Tand, end de opstående, og som
 ligner den hos Mya-Slægten. Hos denne uvidede
 Tand sidder ved Siden ogsaa endnu en ganske liden
 Tand. Muskulens Farve er hvid, allene hos Hvir-
 velen er den cinnoberrod, indvendig er den smul gulds-
 gul. Pastor Chemnitz har i 10de Tome af Sys-
 tem. Conchylien-Kabinet fig. 1651-53 afbildet og be-
 skrevet en Mussel fra Kysten Guinea, som har megen
 Lighed med denne; men da den daværende Afbildning
 ikke er lykket got, og afviger alt for meget fra den nær-
 værende, saa kunde den ikke blive citeret. Dens
 Længde er $1\frac{1}{2}$ Tomme, og Bredden $1\frac{1}{4}$ Tom. Fra
 Angola. Jeg har Hr. Professor Abildgaards
 Godhed, som har medbragt dem fra sin Italienske
 Reise, at takke for 2de Exempl. af denne tilligemed
 flere sjældne Conchylier.

No. 19. *Tellina lævigata*. 2. *Tellina ovata lævi-
 gata*, dentibus lateralibus marginatis, pube
 striata scabra, nymphis inflexis. Linné pag.
 1117. No. 53.

Chemn.

Chemn. Tom. 6. fig. 111.

Rumph. Tab. 45. fig. 1.

Da Linné i sit S. N. og endnu vidtløftigere i Dronningens Museum har beskrevet denne Telline, saa vil jeg allene anføre 2de Varieteter af den.

Artforandring:

- b. Indvendig og udvendig høj svovelgul; paa Kanten af Ryggen til begge Sider af Hvirvelen rød. Rumph pag. 148, hvor han beskriver den gde Art af *Tellina lævigata*, anfører denne Varietet.
- c. Ganske hvid, noget tynd af Skaller. Rumph siger paa det anførte Sted, at dette Slags var de rareste. Det største Exempl. i min Samling med rød Indfatning og Straaler har en Længde af 2½ Tom., Bredden er 2 Tom. 1 Lin. Varieteterne ere noget mindre.

Fra Vestindien.

No. 20. *Tellina rudis*. *Testa ovata plana transversim rude striata, dentibus lateralibus obsoletis.*

Lister Tab. 386. fig. 233. Efter hans Anmærkning den største Art. Madagascar.

Denne Tellines Omrids er ganske agdannet, den har i øvrigt megen Lighed med den foregaaende *Lævigata*. Disse 2de Muskelers modsatte Navne give tilkjende, hvori tildeels deres Forskjellighed bestaaer. Det synes som de største Tverstriber mod den underste skarpe Kant af Musfelen, i hvor ordentlig de end vise sig, hidrøre af Musfelens Bort. Alligevel ere den

Den bageste runde Kant saavel som Fordelen tillige med den overbøjede Ring girede med synlige regelmæssige Tverstriber; men Midten af Musfelen til over Hvirvelen er glat, og de under Forstørrelses-Glasset sig visende lige underløbende Linier kunne ikke komme i nogen Betragtning. Hvirvelen er umærkelig liden og sidder i Midten af Musfelen. Begge Skallerne ere ulige dybe, og den øverste, som er noget mindre, da den paa Ringgen bliver bedækket af den underste, kan ansees som Dækslet. Nympherne ligge dybt i Skallerne og ere lange. Sammensænkningen er som Slægtet fordrer. Sidetænder har denne Musfel ikke. Musfelflekterne ere store og dybt indtrykte. Mellem begge ligger en tyk steen skalagtig rød Masse udbredt i Musfelen. Med denne Rødsfarve ere ogsaa begge Skallerne udvendig farvede fra Hvirvelen nedad. De ere $2\frac{1}{2}$ Tom. lange, og $1\frac{3}{4}$ Tom. brede.

Fra det Middellandske Hav.

No. 21. *Tellina nitida*. Testa ovata lævi candida crassiuscula, nymphis inflexis.

Denne Telline fortiener sit smukke Navn. Den er eensfarvet, sneehvid og glindsende; efter dens Skikkelse er den ægdannet med spids opbøjet Hvirvel, som optager Midten af Musfelen. Begge Skallerne ere temmelig stærke, men derhos dog gjennemskinnende. Den forreste smale Side, hvor Spalten sidder, er fra Hvirvelen noget huul udtrakt, gaaer her paa lige til den yderste Spids i en Bue tynd og

stjær

Fjærende. Nympherne ligge meget dybt ned i Skallen og ere lange. I Skallen, som har 2de Rænkings-Tænder, hvoraf den ene er spaltet, men den anden temmelig lille, sidde ogsaa 2de smaa Sidetænder. Saa glat ogsaa de ydre Flader ere paa denne Muskel, saa ere de dog paa toers fiint riflede, hvilket best kiendes oven hos Hvirvelen. Dens Længde er 2 Tom. 7 Lin., Bredden 1 Tom. 7 Lin.

No. 22. *Tellina radiata*. Testa oblonga longitudinaliter subtilissime substriata nitida, futura analis canaliculata. Linné S. N. p. 1117. No. 54. Regenfus Tom. I. Tab. 3. fig. 28. og Tab. 8. fig. 22.

Chemn. Tom. 6. fig. 102.

Knorr Tom. I. Tab. 19. fig. 1. Tom. 4. t. 2. fig. 4.

d'Argenv. Pl. 22. fig. A.

Denne Telline, som Linné i sit S. N. og Dronningens Museum og tillige alle conchyliologiske Skribenter have beskrevet, og som saa hyppig og med utallige Artforandringer kommer til os fra Vestindien, behøver her ingen ny Beskrivelse.

No. 22. A. *Tellina Brasiliana*. Testa oblonga nitida longitudinaliter subtilissime substriata, transversim coeruleo fasciata intus rubra.

Iblant den hele og temmelig store Familie af Tellinerne, kiender jeg ingen som har den Størrelse, som den nærværende Brasilianske; og betragter man
tils

ellige denne Musfelen's fortræffelige Glands, som er med de sjeldneste Farver baade ud- og indvendig indsynkket, saa maae Kjendere falde i Forundring over dens Usædvanlighed. Med *Tellina radiata* Linné har denne Musfel (naar man fratager nogle smaa Afvigelser, som deres Størrelse tildeels forarsager) den nærmeste Lighed.

Dens Figur i Omridset er en lang Oval. Musfelen's øverste Rand eller Rykke udgjør en Deel af en stor Cirkelbue. Dens forreste og smaleste Deel er særdeles stærk og skiev indad bøjet, hvilket er Hovedkiende-Mærket af Linné's *Tellina* Slægt; tillige er denne Deel fra Hvirvelen af indtil den underste Rand paa begge Skaller dybt udhulet, som forvolder en stærk opbøjet rund Kant, som viser sig fra den indvendige Side lige saa stærk fordybet.

Hvirvelen er ikke i Midten af Musfelen, men nærmer sig mere til Fordelen, hvor begge Spidser støde til hinanden. Herfra og noget over Midten er Musfelen temmelig tyn opløst, derimod gaaer den øvrige Deel ind til den øverste Rand smalsidig ud. Rympherne udspringe tæt under Hvirvelen, de ere baade lange og brede, og ligge dybt imellem begge Skallerne, som slutte fra alle Sider tæt paa hverandre. Uagtet den høje Glands, hvormed den øverste Overflade af denne Musfel er prydet, saa seer man dog fine fordybede Striber, som gaae over tværs, og ere meest synlige ved den nederste Kant af Skallerne.

Far-

Farven af denne Tellina er baade udvendig og indvendig af en usædvanlig sjelden Skjønhed. Fra den underste Kant af over den halve Deel af Skallen er den med lysrøde blaa og hvide Baand eller Stri-ber vekselsviis efter Bredden konstmæssig udmaled. Den øverste Deel er lysere, og Hvirvelen lysrød. Indvendig ere begge Skallene heelt mørk purpurrød, og kun ved den underste Rand med et hvidt Baand indfattet. Tænderne ere i alle Maader som Tellina Slægtet medfører. Længden af denne Muskel er rigelig 4 Tom., og Bredden 2 Tom. 1 Lin. Fra Brasilien, hvor saa mange rare Conchylier høret hjemme.

No. 23. Tellina albida. Testa ovali lævi, nymphis prominentibus. Linné S. N. p. 1117.
No. 50.

Ogsaa denne Telline har Linné udførlig beskrevet i S. N. og især i Dronningens Museum. Dens Længde er 2 Tom., og Bredden 1 Tom. 4 Lin.
Fra Vestindien.

No. 24. Tellina edentula. Testa alba subtriangulari, antice inflexa & sinuosa, dentibus lateralibus nullis. Chemn. Tom. 6. pag. 89.

Chemn. Tom. 6. fig. 74. 75.

Schröters Einleitung 2ter Band Tab. 7. fig. 8.

Lister Hist. Conch. Tab. 406. fig. 252.

Bygningen af denne Telline har en ganske anden Plan, og ligner ingen af de foregaaende. Naar
man

man undtager den højt i Bejret stigende Hvirvel, saa er Dmidsæt af Muffelen en rigtig Oval. Begge Ender ere afrundede, og den forreste, hvor det skjæve Indtryk findes, som udmærker Tellingerne, udgjør med den opbøjede Hvirvel, som har sit Sæde hos den yderste Ende, en skraa Linie. Den bageste Side fra Hvirvelen neden under er hul udtrakt, og gjør Der- ved den forlængede Deel af Muffelen smal i Enden. Hos den skarpe og skjæve Rand af Ryggen, hvor begge Skallerne passe paa hinanden, bemærker man hvorledes Muffelen er bøjet forud og tilbage. Den øverste Skæl tilligemed Hvirvelen er mere opblæst og indvendig dybere udhulet end den underste. Epid- serne af Hvirvelen har deres Stilling mod den bageste Side, hvilket er saa siældent, saa at disse Muskeler derfor kan ansees som Pinks, eller, som allerede oven- meldt, Franske kalde dem a contre Sens. Det er kun den forreste skjævophøjede og unden fra indtrækte Win- tel, som er overdraget med Følger og Striber; det øvrige af Overfladen er vel ogsaa overdraget med Tværstriber, men de ere saa fine, at de først blive kjendelige under Forstørrelses-Glasset. De 3 Sam- menlæknings-Lænder i begge Skallerne ere yderst smale og korte. Isteden for Nympher viser sig lodret under Hvirvelen en udhulet Grube, ligesom hos Maha Slægtet, og i denne ligger Ligamentet, som skal forbinde begge Skallerne. Hele Muffelen er yderst tynd og brækkelig, gjennemsigtig og af Farve

melkhvid. Længden af det største Exemplar er 2½ Tom., Bredden fra Hvirvelen ned ad 2 Tom.

Fra Tranquebar.

No. 25. *Tellina papyracea*. *Tellina pallide admodum rufescens lata, ex altera parte sinuosa.*

Lister Hist. Conch. Tab. 395. fig. 242.

Denne Mussel har i mange Dele Lighed med den foregaaende, kun at her Hvirvelen ikke er ophøjet over Kanten af Ryggen, men sidder alligevel som hos hin hos den yderste Ende af den forreste Deel; denne løber ikke ud i nogen Spidse som hos andre Telliner, men er lige saa stærkt afrundet som den bageste Deel af Musselen. Kanten af begge Skallerne, hvor Spalten sidder, er dybt indad bøjet. Det skjære Indtryk er her kun enkelt og kun lidet under fra overbøjet. Musselen er udvendig overtrukket med en gul Epidermis, melkhvid af Farve, og besynderlig tynd af Skal. Den største blant dem har en Længde af 2 Tom. 2 Lin., og er 1 Tom. 7 Lin. breed.

Fra Tranquebar.

No. 26. *Tellina strigilata*. *Testa antice obtusissima, umbone glaberrimo, versus marginem inferiorem & angulum reflexum leviter corrugata.*

Chemnitz T. 6. p. 96.

Chemn. Tom. 6. Fig. 85.

Omridsen af denne flade Telline er ægdannet. Hvirvelen er uden for Midten og nær mod den bageste Ende, som er cirkeldannet, afrundet. Ogsaa den underste

berste skarpe Deel af Musselen er ligeledes i Form af en Cirkelbue rundbannet. Den forreste og længste Deel af Musselen gaaer fra Hvirvelen af lige til Spidsen i en lige Linie. Skallerne gaae her ikke over hinanden, men have en breed med skjeve Striber jiret Glade, hvor Spaltens Sæde er. De har intet Indtryk, men ere allene hos den underste Ende krum opad bøjet. Paa denne Deel seer man (dog kun paa den øverste Skal allene) nær hos Kanten efter Længden neden under skjeve Striber, som forenes sammen mod den underste Kant atter med Tverstriber, og drages om Kanten af Musselen og den bageste Endelige til Hvirvelen. Middeltænderne ere som almindelig. Sidetænder findes her ikke. Musselen er udvendig hvid med en tynd gul Epidermis, kun Hvirvelen er noget gul tilligemed noget af det indvendige. Længden af det største Exemplar er $2\frac{1}{4}$ Tomme, Bredden 1 Tomme 8 Linier.

Fra Kysten Guinea.

No. 27. *Tellina inflata*. a. *Tellina inflata*, dente intermedio emarginato, lateralibus remotis, testâ triangulari, crassiuscula, alba, antice haud inflexa nec plicata, longitudinaliter subtilissimo striata. Chemnitz Tom. 6. p. 91.

Chemnitz Tom. 6. fig. 76.

Figuren af denne Mussel er en kort Oval. Den høje fremstaaende og noget mod den forreste Side henvendte Hvirvel, hvis 2de Spidser eller Snabler ere

rettede mod den bageste Side, give tydelig tilkiende, at denne Telline hører under de sjældne Links-Musfeler. Ved den bageste Side og nedan under lige til nær hos den forreste Spids er Muskelens Omrids en rigtig Cirkelbue. Den forreste Side fra Hvirvelen til den spidsede Ende er mestendeels lige og flad. Hos Nympherne, som ligge dybt ind i Skallerne, ere Kanterne indad bøiede. Det almindelige Indtryk er meget fladt, og den opbøjede Winkel, som staaer uden for, er smalt og tæt hos Spaltens Rand. Hvad der endnu mere forskjønner denne Telline, er den glatte glindsende, ligesom efter et optisk Segment højt hvelvede Overfal, som allene hos den øverste Kant er belagt med Tverstriber. Den underste Skal af Musfelen er ulige fladere og mindre hvelvet. Foruden den sædvanlige Længselsskæbning sidder ogsaa i den øverste Skal 2de Sidetænder. Farven er ganske hvid og gjennemsigtig, omendstjænt Skallerne ere stærke og tykke. Dens Længde er 2 Tom., Bredden $1\frac{1}{2}$ Tom.

Fra Niquebar.

Artforandring:

- b. Denne er tynd af Skaller, og Spidserne af Hvirvelen staaer til høire. De have paa den forreste Rand et dybt Indtryk og en høj overbøjet Winkel eller Kng. Den øverste Skal er som hos den foregaaende rund opbøjet og hvelvet; den underste Skal er derimod noget flad. Længselsskæbningerne ere som hos de andre Telliner; Sidetænderne mangle.

Ind-

Indvendig er Musfelen hvid og glindsende med to højsule Flekker i enhver Skal, som udvendig skinne igjennem. De ere noget mindre end de forrige, nemlig 1 Tom. 10 Lin. lange, og 1 Tom. 4 Lin. brede. Fra Guinea.

- c. En mindre Art med dybt Indtryk og ophejet Vinksel. Denne er jiret paa Overfladen med fine Løvstriber fra den underste Rand lige til Hvirvelen, og har ligesledes ingen Sidetænder; de ere sneehvide og kun 1 Tom. 5 Lin. lange, og 1 Tom. 1 Lin. brede. Fra Kysten af Guinea.

No. 28. *Tellina pellucida*. Testa ovata tenui antice angulato-truncata, dentibus lateralibus nullis.

Figuren af denne tyndskallede og gjennemsigtige Telline er en rigtig Oval. Hvirvelen sidder mestensdeels i Midten af Ryggen. Bag Hvirvelen, hvad der forestiller Anus, er Kanten af begge Skallerne rund indbøjet. Den forreste Ende har ingen fremstaaende Spidse, men er afstumpet, kun lidet indtrykt og under fra overbøjet, og har altsaa kun en flad Vinkel. Den bageste Ende er afrundet efter en Cirkelbue. Begge Overflader ere overdragne med Løvsribes, som mod den underste Kant ere meest synlige. Sidetænder har Musfelen ikke. Den er hvid af Farve, men fra Hvirvelen ned efter ere begge ind- og udvendig rødfarvede. Denne kiden Musket har en Længde af 1 Tom. 5 Lin., og Brede 1 Tom.

Fra Kysten af Guinea.

- No. 29. *Tellina fragilis*. Testa ovata alba gibba: striis transversis recurvatis; natibus flavescens. Linné S. N. pag. 1117. No. 49.
- No. 30. *Tellina solida*. Testa ovata crassa, margine antice sinuato, dentibus mediis crassis, laterali-
bus marginatis.

Denne liden toskallede Muskel er agdannet. Hvirvelen sidder uden for Midten nær hos den forreste Ende, hvor begge Skallerne har et Indtryk, hvorved Muskelen er adskaaet mellem den underste Kant af den stærkt afrundede Bug og den forreste Spids. Vinkelen er breed og hverken skjev eller overbøjet. Begge ndre Glader ere rundhvelvede, betrukne med fine Løvstriber, som paa Fordelen, hvor Spalten er, ere dybere og stærkere. Nympherne ere smaa, Sammenlæknings-Lænderne store og stærke, og i den øverste Skæl sidde 2de Sidetænder. Farven er hvid med adspredte brunnrode Flekker. Dens Længde er 1 Tom. 2 Lin., og Bredden 11 Lin.

Fra Kysten Guinea.

- No. 31. *Tellina fissi*. Testa ovali crassiuscula transversim striata antice rugosa truncata, nymphis & ano profundis.

Denne med ualmindelige Zirater udsmykkede Telline er i Omrids ganske agdannet. Hvirvelen er uden for Midten nær hos den forreste Ende, hvor det sædvanlige Tellin-Indtryk slutter sig med en stærk opbøjet dobbelt smal Vinkel. Disse Vinkler ere paa
begge

Begge Skaller beklædte med fine vinkeldannede højt fremstaaende Skjæl, og disse slutte atter med fine op-
 højede Tverstriber, hvormed begge Overflader ere ud-
 zirede, og disse Tverstriber, saa fine de ogsaa ere,
 ere alle paa deres øverste Kant fint udtaggede, hvil-
 ket giver Musfelen et ganske eget jirligt Udseende,
 især naar denne Deel betragtes med Forstørrelses-
 Glas. Hos den forreste Side bliver Spalten ved
 den mindre med Skjæl besatte Vinkel indfattet fra
 begge Sider, og Spalten selv er ganske dybt udskaa-
 ret, ligesom og den bageste Side, hvad der udgjør
 Anus. Selv Nympherne ligge dybt i Skallerne,
 hvilken Omstændighed har givet Anledning til Nav-
 net. Foruden de almindelige 3 Pæknings-Tænder
 har den øverste Skal ogsaa 2de Sidetænder. Den
 er $1\frac{1}{2}$ Tom. lang, og 1 Tom. breed. I Henseende
 til Farven er den udvendig hvid, indvendig gul.

Fra Ostindien.

No. 32. *Tellina Ehippium*. Testa rotundata con-
 torta, natibus inversis, dentibus obsoletis.

Denne anseelige ualmindelig sjældne Telline er i
 sit Omfang oval. Dens Hvirvel, som bestemt bøjer
 sig mod den bageste Side, sætter den blant Flids-
 Tellinernes Tal. Der er hos denne Telline ganske
 overordentlige Ind- og Udbøjninger paa dens Over-
 flade. Fra Hvirvelen, som nærmer sig noget meer
 den forreste Deel, hæver sig en rund hvelvet Rng i
 Fjer Stilling i maadelig Graad mod den bageste

cirkelrunde Ende. Ved den forreste Side, og tæt hos Hvirvelen udspringer en skarp efter en fjerd højet Linie højt fremskaaende Vinkel; mellem denne og den høvelvede Røg er Muffelen imod den bageste Side udbøjet efter en vid Cirkelbue, hvilken Fordybning rækker formindstet lige bøg Hvirvelen. Fra Vinkelen til den yderste forreste Kant er endnu en fingersbred Glade, som i begge Ender er stærk afrundet. Ved den store Fordybning i Midten og de 2de ulige Forhøjninger mod begge Ender, faaer Muffelen en ret konstig Anseelse, da de stærke Ind- og Udhøjninger nøje udgjøre Cirkelbuer. Muffelen er ganske glat, undtagen at hele Overfladen er furet med meget fine Striber paa tværs. Af Farve er den hvid og gjennemskinnende. Saumensanfætnings-Lænderne ere som almindelig, men Sidelænder har den ikke. Længden af det største Exemplar er 3 Tom., Bredden 2 Tom. 4 Lin. Fra Ostindien. Tab. 12. fig. 5.

D. *Ovatæ compressæ.*

No. 33. *Tellina foliacea.* Testa ovali, pube scabra, rimæ ferrata.

Linn. S. N. pag. 1117. No. 51.

Chemnitz Tom. 6. fig. 95.

Knorr Tom. 5. Tab. 29. fig. 2.

Citationerne af denne sjeldne Telline hos Linné og andre Forfattere, s. Ex. hos Kumpb, d'Argenx, Klein, ere saa slet tegnede, at de ganske mangskabe Muffelen, da de ere forefillede en tredie

Deel

Deel for forte. Mit Exemplar høder i Længden 3 Tom., og i Bredden $1\frac{1}{2}$ Tom.

No. 34. *Tellina striata*. Testa ovali planiuscula antice inflexa & angulata, pallide rosacea, transverse dense striis exarata, cardinis dente unico bifido, lateralibus remotis. Chemn. Tom. 6. pag. 349.

Chemnitz Tom. X. fig. 1654. 55.

Denne Telline er i sit Omfang ægdannet. Den er tynd af Skaller og smal sammenpresset. Hvirvelen er mestendeels i Midten, og fra den forreste og bageste Side ophavet i Højden; den første gaaer i en lige Linie lige til den underste Kant, som er lidet afrundet. Vinkelen er smal, kun maadelig ophejet, og sidder nær hos Spaltens Rand. Nympherne ligge højt, ere lange og kun bedækkede med et tyndt Pigament. Begge Overfladerne samt Vinkelen ere fra Spidsen af Hvirvelen lige til den underste Rand færdede med synlige Tverstriber i den skønneste Orden. Tandlænningen er som hos alle Telliner. Hos den underste Skal bemærker man 2 smale smaa Sidetænder. Som noget ualmindeligt sees her i begge Skallerne mod den bageste afrundede Side, paa det Sted, hvor ellers den ene Musflesket sidder, en lang ophejet Ribbe, som kommer frem under den øverste Rand. Af Farve ere de største Exempl. bleg-, de mindre derimod højrøde paa begge Sider og derhos gjennemskinnende.

nende. Den længste er $1\frac{1}{2}$ Tom. lang, og 1 Tom. breed. Fra Rode Island i Nordamerica.

No. 35. *Tellina opalina*. *Tellina opalina diaphana* intus costata. Chemn. Tom. 6. pag. 118.

Chemnitz. Tom. 6. fig. 107. 8.

Denne Telline ligner i Omfang den forrige, kun at Hvirvelen staaer nærmere mod den bageste afrundede Deel. Den er ogsaa endnu tyndere af Skal, og mere sammenpresset end hiin. Den øverste Skæl er noget dylbere end den underste, som er mere flad. Vinkelen hos den forreste Side er meget lav og afrundet. Tverstriberne over de øverste Flader ere ulige finere, end som hos den forrige. Indvendig komme her, med den forreste Side i enhver Skæl, 2 fra hinanden staaende Ribber under Kanden frem, som ere stærkest mod den yderste Kant; ellers ere de indvendige Flader zirede paa det netteste med fine Striber fra den øverste Rand nedad. Farven giver desuden denne Mussel et besynderligt Værd, da den ligesom Opalen pranger med Regnbue-Farver. Den er $1\frac{1}{2}$ Tomme lang, og 1 Tomme breed.

Fra Niquebar.

No. 36. *Tellina lanceolata*. Testa ovali oblonga, tenuissima, pellucida, valde compressa, transversim subtilissime striata, albida & subincarnata, antice reflexa rostrata seu linguiformi, postice ovali. Chemn. Tom. 6. pag. 111.

Chemnitz Tom. 6. fig. 103.

En

En lang og smal ægdannet Figur udgjør Omridset af denne fine og tyndskallede Telline. Hvirvelen har sit Sæde i Midten, og fra den skarpe Vinkel lige til Spaltens Kant ere begge Skallerne saa tynd udtrukte, som Eggen af en Kniv, og ende sig med Vinklerne hos den forreste Ende i en skjærende Spids, lig en Lanzet; den bageste Deel af Muskelen er afrundet. Den hele Overflade af begge Skallerne ere paa det allerfineste paa tværs stribede; dog bemærker man, at Striberne paa den øverste Skal ere noget stærkere. Indvendig nær hos den forreste Ende hæver sig i begge Skallerne en Ribbe, som hos de foren beskrevne. Den har de almindelige Lænkningstænder, og ingen paa Siderne. Farven er hvid gennemtrængt med rødt, klar, gennemskinnende, tynd og fin. Den er 1 Tomme 5 Linier lang, og 8 Linier breed.

No. 37. *Tellina truncata*. Testa ovali compressa; subftriata, parte antica truncata futuraque distincta. Linné S. N. pag. 1118. No. 6p.

Lister Hist. Conch. Tab. 394. fig. 241.

Dens Længde er 1 Tomme 8 Linier, Bredden 11 Linier. Fra Norge.

No. 38. *Tellina polita*. Testa ovali lævigata, apice acuminata pube striato, nymphis inflexis.

Figuren af denne skønne Telline er ægdannet. Hvirvelen er uden for Midten, mere vendt mod den forreste smale Ende, som er tynd sammentrykket i en

skarpe

Skarp skjærende Kant, hvor Spalten har sit Ende. Vinkelen er liden og flad, og ender sig foran i en Spidse. Den bageste Ende af Muskelen er cirkelrund; ligesledes er ogsaa den underste Rand afrundet efter en Cirkeltue, derhos tynd og skarp. I Midten under Hvirvelen ere begge Skallerne rund ophøjede eller hvelvede, dog den øverste Skal mere end den underste. Dens Overflader ere uden Striber, uden Hjørner eller Følde, men glindsende glat, som poleret Agat. Over hele Muskelen hersker kun en eneste Farve, nemlig Rødsfarven. Tilligemed Længnings-Tænderne har den ogsaa smaa Siderænder. Længden er 1 Tom. 7 Lin., Bredden 1 Tom.

Fra Kysten Guinea.

No. 39. *Tellina planata*. Testa ovata compressa, transversim substriata, lævi; marginibus acutis, pube subtomentosa. Linné S. N. pag. 1117. No. 52.

Chemnitz Tom. 6. fig. 99.

De Citationer af denne Muskel, som Linné anfører, ere aabenbar urigtige; imidlertid har han beskrevet denne Telline i sit S. N. og i Dronningens Museum, saa at den er kjendelig nok endog uden Kobber. Det største af mine Exemplarer har en Længde af $3\frac{1}{4}$ Tom., og 1 Tom. 10 Lin. breed.

Fra Kysten Guinea.

No. 40. *Tellina sinuata*. Testa ovata compressa transversim sulcato-friata, margine antice sinu excisa, dentibus lateralibus obsoletis.

Omrisset af denne nye Art Telline er ganske oval, og lige breed i begge Ender. Hvirvelen staar langt fra Midten nær mod den bageste afrundede Ende. Langs den forreste Side fra Hvirvelen af er Kanten eller Ryggen rund udskaaet efter Længden af Ligamentet, som her staar højt i Bejret og er rundhvelvet. Det øvrige af den forreste Deel gaaer afrundet fort med den underste Rand, som her er ud- og indad bøjet. Den første Udhuulning fremkommer af det Tryk, som Musfelen har faaet ved en dyb Huvulning fra begge Sider, næsten fra Hvirvelen nedad. Overfladerne af begge Skallerne ere paa tværs, samt tillige Grundlinien af deres underste Kant overdragne med ind- og udhøjede dybe Striber, hvoraf Musfelen er ganske røe at føle paa. Den underste Skal har en stor Lænkings-Tand, som er indlænket mellem de 2de i den øverste Skal, men som staae vidt fra hinanden. Siderænder findes her ikke. I øvrigt er denne Telline temmelig fladtrykt og tryk af Skal, ganske hvid og gjennemsfiinende, og hos den underste Rand bedækket med en tynd Epidermis. Det største Exempl. er $2\frac{1}{2}$ Tom. lang, og 1 Tom. 7 Lin. breed.

Fra Tranquebar. Tab. 12. fig. 6.

No. 41. *Tellina achatina*. Testa ovali gibba, transversim striata, margine postice excisa, antice sinuata, fulco macula fulva picto.

Det udvendige Omrids af denne nye Art er fuldkommen ægdannet. Den flade Hvirvel er noget lidet uden for Midten og mere henvendt mod den bageste runde Ende. Den forreste Deel er smal, og ender sig i en afrundet Spidse. Hymen ligger med Hvirvelen i lige Højde, er rund glat og gulifarvet. Begge Skallerne have ligesom de forrige paa Hordelen et fordybet Indtryk (Sutura) som frembringer paa den underste Kant, der er udbojet i en Cirkel, en udskaaet Hulsning. Som noget ganske usædvanligt har denne Muskel ogsaa hos den bageste Side fra Anus af nær hos den skarpe Kæg et fladt Indtryk, som ender sig paa den yderste Rand med en liden Udhuulsning. Skallerne ere tynde, opblæste og under fra opad paa tværs ristede lige med Midten henimod Hvirvelen, hvor de da ere glindsende glatte. Alle 3 Rænkningstænder ere spaltede og slutte tæt i hinanden, uden videre Sidetænder. Farven er gennemskinnende hvid, med en gul Flek paa den øverste Skal i den ovenbeskrevne Suture. Længden er 2 Tom. 2 Lin., Bredden 1 Tom. 4 Lin.

Fra Kysten Guinea.

No. 42. *Tellina Carinata*. Testa ovata substriata lævi margine antice sinuato-truncata valvula altera dente laterali prominulo.

Figur

Figuren af denne Mussel er en lang Ovak. Hvirvelen sidder yderst hos den forreste Ende. Den bageste afrundede Deel af Musselen er meget smalere end den forreste, hvor mod den yderste Kant, som bliver kaldet Spalten, begge Skallerne ere affatte bueformet og udtrakte i runde som en skarp Kniv. Nympherne med deres Hymen ere korte, og ligge i lige Højde med Hvirvelen. Læknings-Lænderne ere smaa, og hos den øverste Skal bag Hvirvelen sidder en liden Sidetand. Musselen er flad, og udvendig og indvendig smukt rød, hos den underste Kant hvid. Dens Længde er $1\frac{1}{4}$ Tom., Bredden $\frac{3}{4}$ Tom.

Fra Kysten Guinea.

No. 43. *Tellina trifasciata*. Testa ovata læviuscula sanguineo-triradiata, pube rugosa. Linné S. N. pag. 1118. No. 57.

Chemn. Tom. 6. fig. 114. Litr. a. b.

Den har 1 Tom. 1 Lin. Længde, og 10 Lin. Brede.
Fra det middellandske Hav.

No. 44. *Tellina incarnata*. Testa ovata, antice productiore, compresso-planiuscula, natibus submucronatis. Linné S. N. p. 1118. No. 58.

Chemnitz Tom. 6. fig. 110.

v. Born Tab. 2. fig. 13.

Den er 1 Tom. lang, og $\frac{3}{4}$ Tom. bred.

Fra det middellandske Hav.

No.

No. 45. *Tellina balauscina*. Testa dilato-orbiculata
læviuscula, valvula altera, dentibus lateralibus.

Linné S. N. pag. 1119. No. 61.

Chemn. Tom. 6. fig. 117.

Fra det middellandske Hav.

No. 46. *Tellina donacina*. Testa ovata compresso-
planiuscula læviuscula: antice obtusissima.

Linné S. N. pag. 1118. No. 59.

Chemn. Tom. 6. fig. 119.

Fra det middellandske Hav.

No. 47. *Tellina hyalina*.

Denne liden, papirrynede glennemskinnende Telline er ganske ægdannet. Hvirvelen sidder mere mod den bageste afrundede Side. Den forreste Ende gaaer smal ud i en stump Spidse. Den underste Kant eller Bugen af Musfelen er buedannet. De udvendige Sideflader ere rundhvoetvede og ganske overdækkede med ophejede rynkede Rifter, som foran hos Vinkelen tager deres Bending i Høiden. Mellem disse Rifter er den flade Grund fint kærvet. De 3de Pænkings-Tænder ere som hos andre Telliner og uden Sidetænder. Farven er indvendig noget gul, alt det øvrige er hvidt. Den er $\frac{2}{3}$ Tomme lang, og $\frac{1}{3}$ Tomme breed.

Fra Tunis.

No. 48. *Tellina cristallina*. Testa subtriangulari, alba, pellucida, antice inflexa, transversim costata, valvulo solitaria. Chemn. T. II. fig. 1947. 48. p. 210.

Chemn. Tom. II. tab. 199. fig. 1947. 48.

Under et lidet *Partie Conchylier*, som jeg fik fra Nordamerika, fandt jeg disse 2de Overskaller af en liden *Telline*, som fortjener at opbevares. Dens Skaller ere lige saa fine, tynde og gjennemsigtige, og belagte med ligedanne opbøjede Rifter, som den foregaaende *Muskel*. Dens Omrids er oval, den tilspidsede Hvirvel er i Midten og staaer vidt frem over *Muskelen*. Paa den forreste Side har den et dybt Indtryk, hvorved Vinkelen, som sidder mod den nederste Kant, er højt opbøjet og under fra overbøjet. Den underste Rand af *Muskelen* fra den forreste Spidse lige til den runde Bagdeel danner en Cirkelbue. Efter denne Bue ere ogsaa Tverrifterne dannede. De staae højt og regelmæssig vidt fra hinanden; Grunden derimellem er glat. Paa disse Overskaller, som ere ganske flade, og hvor formodentlig de underste skulle være dybere, sidde, foruden de 2de Ræknings-Tænder, ogsaa endnu 2de Sidetænder. Farven er hvid og gjennemsigtig som Glas. Dens Længde er 10 Lin., Bredden 7 Lin.

Fra Newport Long-Island.

No. 49. *Tellina fabulosa*. Testa ovato-rotundata, rude striata, margina antico-truncata.

Denne liben Sand-Telline er oval og temmelig flad. Hvirvelen staaer hos den yderste Rand af Foredelen. Begge Enderne ere lige brede og afrundede, dog har den forreste Ende sit skjeve Tellin-Indtryk. Pigamentet er bredt og ligger i lige Højde med Hvirvelen. Sidetænder har Musfelen ikke, den har hverken Rifter eller andre Zirater, men er ganske glat og kalkagtig hvid, udvendig og indvendig uden mindste Glands. De har en Længde af 11, og Brede af 8 Linier. Fra Tronhiem, hvor de opholde sig i Sandet.

E. Suborbiculatæ.

No. 50. *Tellina Remies*. a. Testa suborbiculata, compressa, rugosa. Linné S. N. p. 1119. No. 62.

Rumph. Tab. 43. fig. 1.

Chemn. Tom. 6. fig.

Anmærkning:

Disse Citationer henhøre til den Ostindiske Remies, hvis Figur er mere rund end den Vestindiske, og som isteden for Tverstriberne har Folder og Rynker.

Varietet b. af *Tellina Remies*.

Chemn. Tom. 6. fig. 12.

von Born Tab. 2. fig. 12.

Denne Vestindiske Art bliver større og er bredere end den Ostindiske. De ere finstribede, nogle deraf

deraf have endog en Glands som Elfenbeen. Begge Skallerne ere indvendig af en smul gul Farve. Den er 3 Tommer lang og $2\frac{1}{2}$ Tomme bred.

No. 51. *Tellina reticulata*. Testa lentiformi, compressa, reticulata. Linné S. N. pag. 1119. No. 63.

Chemnitz Tom. 6. fig. 118.

Længden er 2 Tom., Bredden $1\frac{3}{4}$ Tom.

Fra Vestindien.

No. 52. *Tellina scobinata*. Testa lenticulari scabra: squamis lunatis quincuncialibus. Linné S. N. p. 1119. No. 64.

Chemn. Tom. 6. fig. 122-124.

Gualt. Tab. 76. fig. E.

Knorr. Tom. 6. Tab. 37. fig. 3.

Den er 2 Tom. 2 Lin. lang og bred.

Fra Ostindien.

No. 53. *Tellina lactea*. Testa lentiformi, gibba, pellucida, lævi. Linné S. N. pag. 119. No. 65.

Gualt. Tab. 71. fig. D.

Chemn. Tom. 6. fig. 125.

Anmærkning:

Andre Conchyliologer har nægtet denne Muskel Tæknings-Lander, men den har sine 3 Lander, som betegne Tellin-Slægten i største Fuldkommenhed.

No. 54. *Tellina carnaria*. Testa suborbiculata, lævi, utrinque incarnata oblique striata, striis hinc reflexis. Linné p. 1119. No. 66.

De største ere $1\frac{1}{2}$ Tom. lange, Bredden er 1 Tom. 1 Lin. Fra det middellandske Hav og Vestindien.

Lifter Tab. 339. fig. 176.

Chemnitz Tom. 6. fig. 126.

von Born Tab. 2. fig. 14.

No. 55. *Tellina flavescens*. Testa suborbiculata gibba crassiuscula transversim sulcato-striata, dentibus lateralibus nullis.

Denne liden citrongule Telline er efter Midten stærkt opblåst. Hvirvelen sidder i Midten. Den bagste Ende tilligemed Bugens underste Rand er cirkelfrund. Paa den forreste Deel har den et fladt Indtryk med en opbøjet Vinkel. Nympherne sidde i lige Højde med Hvirvelen. Den har de almindelige 3 Længnings-Tænder, uden Sidetænder, og er i øvrigt ganske glat. 1 Tom. er Længden, og $\frac{3}{4}$ Tom. Bredden.

Fra Vestindien.

No. 56. *Tellina faba*. Testa ovato-dilatata, crassiuscula, striis transversis recurvatis, postice gibba antice compressa, pube prominulo.

Denne Muskel har næsten al muelig Lighed med den foregaaende, kun er den noget større og tykkere af Skaller, paa den forreste smale Ende dybere indtrykt og Vinkelen stærkere overbøjet. Begge Sidefladerne ere besatte med Tverstriber, som ere stærkest paa

paa den underste Rand. Lænkings-Lænderne ere meget smaa, Sidetænder har Musfelen ikke. Farven er hvid, Hvirvelen er rød. Indvendig ere nogle gule, andre hvide. Den største er 1 Tom. 1 Lin.

Fra Kysten Guinea.

No. 57. *Tellina bimaculata*. Testa triangulo-subrotunda, latiore, lævi, albida: intus maculis duobus sanguineis oblongis. Linné S. N. pag. 1120. No. 67.

Chemn. T. 6. fig. 127.

No. 58. *Tellina balthica*. Testa subrotunda lævi, extus incarnata. Linné S. N. pag. 1120. No. 68.

Chemn. Tom. 6. fig. 128.

Her ved Strandbredden af Østersøen.

No. 59. *Tellina pisiformis*. Testa subglobosa, lævi, intus incarnata, oblique substriata: striis antice angulo acuto reflexis. Linné S. N. p. 1120. No. 69. Fra Østersøen.

No. 60. *Tellina divaricata*. a. Testa subglobosa alba bifariam oblique striata. Linné S. N. pag. 1120. No. 70.

Fra det middellandske Hav.

-d' Argenv. Edit. 3. af Favane Tab. 48. E. I.

Artforandring af *Tellina divaricata* b.

Den af Linné forhen angivne lille *Tellina divaricata* bliver aldrig større end en stor Ert, ellers kunde man troe at den ved Væxt kunde opnaae den Størrelse

denne Varietet har. Men denne sidste er et ganske andet Slags, den har til begge oven mod Hvirvelen paa Kanten skarpe indskkaarne Tænder, og noget mindre indvendig paa hele Kanden omkring, som samtlig gribe fat i den modsvarende Skal. Den har ogsaa ingen Sidetænder, hvilke dog det lille Slags har, men i de vinkeldannede Striber, som gire Overfladerne, ere de hinanden lige. Da de ere runde, saa er Længde og Brede 1 Tomme og 2 Lin.

Fra Bestindien.

Lister Hist. Conch. Tab. 301. fig. 142.

Mus. Kircher. No. 104.

Chemnitz Tom. 6. fig. 129.

Artforandring c.

Dette Slags er formodentlig dens højt ophævede hvalvede Figur kugeldannet. Den store opblæste Hvirvel bøjer sig i en Spidse oven fra ned under. I Midten af Overfladerne under fra opad lige til Hvirvelen gaar de triangelldannede Figurer i afmaalte store ophøjede Folder udbredte mod begge Sider frem, uden at antage nogen skjev Stilling og uden flere Vinkler, som de andre. Af Farve ere de ganske hvide; den blaa-graa Farve paa det største Exemplar hidrører formodentlig fra Søegrunden, hvor Musken har lagt. Den er 1 Tom. 2 Lin. stor.

Fra Kysten Guinea.

Chemn. Tom. 6. fig. 130.

No. 61. *Tellina digitaria*. Testa subglobosa, pallida, cincta, striis obliquis, uniformibus. Lin.

S. N. pag. 1120. No. 71.

Chemn. Tom. 6. fig. 120.

Denne Linnés Beskrivelse passer ganske til nærværende Exemplar, hvorvel det er ulige større. Foruden de midterste Tænder har ogsaa Muskelen mærkelig store Sidetænder. Skallerne ere indvendig glindsende, glatte og højrøde af Farve. Udvendig ere de blegrode blandet med hvide Flekker. De har 13 Lin. i Længden, og 11 Lin. i Bredden.

Fra Niquebar.

No. 62. *Tellina cuneata*. Testa subglobosa, orbiculata, intus colore violaceo infecta. Chemn.

Tom. 6. pag. 135.

Chemn. Tom. 6. fig. 131.

Denne Muskel har paa den forreste Side et neppe mærkeligt Indtryk, som udmærker dens Slægt. Hvirvelen staaer i Midten, og dens Epider ere vendte mod den bageste Side, saa at den derved maae regnes blant Lins-Tellinerne. Den er udvendig ganske glat, efter den underste Rand fisedannet, og dens fiolette Farve er bedækket med en lysebrun Epidermis. Enhver Skal har 2de Rænkings-Tænder, af hvilke den ene er meget bred, den anden derimod meget liden. Muskelflekterne ere hos denne Telline mærkelig dybe, og i begge Skaller fra Hvirvelen nedad

seer man en ophøjet Ribbe. Fargen er indvending
hvid med en fiolet Bue. Den største er $\frac{1}{2}$ Tom.

Fra Kysten Guineæ.

No. 63. *Tellina muricata*. *Tessa orbiculari*, compressa, alba, longitudinaliter dense striata, striis imbricatis, cardinis dentibus mediis duobus, lateralibus insertis, natibus recurvatis ad anum. Chemn. Tom. II. fig. 1945. 46. pag. 209.

Chemn. Tom. II. Tab. 199. fig. 1945. 46.

Denne nye Art Telline har et cirkelrundt Omrids og er flad sammentrykt. Hvirvelen sidder i Midten, og begge Spidserne bøje sig henover mod den bageste Side, saa det er ingen Tvivl underkastet, at denne Muskel er Links. Det almindelige Tellin-Indtryk paa den forreste Side gaaer fra Hvirvelen nedad, og er hvørvel kort, dog bestemt. Vinkelen er admærket ved en ophøjet Ræd af forlængede store Skjæl eller Pigge. Det lille Ligament samt Spalten er indfattet med fremstaaende Skjæl. Hele Overfladen af begge Skallerne er fra Hvirvelen af paa det regelmæssigste udjiret med ophøjede Rifter, som ere be-
dækkede med Skjæl. Lænkings-Lænderne ere uuner-
kelig smaa, men desto større og stærkere ere Sidetæn-
derne i begge Skallerne. Fargen er gennemsigtig
hvid. Den største holder 10 Linier.

Fra Lagveira i Vestindien.

No.

No. 64. *Tellina cornea*. Testa globosa, glabra cornei coloris, fulco transversali. Linné S. N. pag. 1120. No. 72.

Chemn. Tom. 6. fig.

Lister Hist. Conch. Tab. 159. fig. 14.

Schröters Fluss-Conch. Tab. 4. fig. 3. 4. 5.

I stillestående fersk Vand. Her hyppig.

Forklaring over Tab. 12.

- Fig. 1. *Tellina magna*, No. 5.
 — 2. *Tellina punicea* No. 12.
 — 3. *Tellina Abildgaardiana*, No. 18.
 — 4. *Tellina Brasilliana*, No. 22. a.
 — 5. *Tellina ephippium*, No. 32.
 — 6. *Tellina Sinuata*, No. 40.