

**DESCRIPTION**  
**DE**  
**QUELQUES COLÉOPTÈRES NOUVEAUX**  
**ET OBSERVATIONS DIVERSES**

Par M. E. PEYRON.

---

(Séance du 23 Septembre 1857.)

---

Les descriptions et observations qui suivent avaient été placées par moi dans des notes jointes au Catalogue des Coléoptères de Tarsous, mais ayant réfléchi qu'elles formeraient avec l'ensemble de ce travail un effet disparate, j'ai résolu de les en séparer et de les donner ici. Ainsi ai-je fait d'ailleurs déjà pour des descriptions de genres et d'espèces provenant d'Orient, insérées dans les Annales de 1856 et pour la Monographie du genre *Thorictus*; ainsi ferai-je encore par la suite.

**1. BEMBIDIUM (TACHYS) METALLICUM.**

*Oblongum; nigrum, obscure metallescens, ore, antennis pedibusque testaceis; thorace transverso, subcordato, angulis*

*posticis obtusis utrinque basi foveolato; clytris ter punctato striatis; stria suturali apice incurvata.* (Div. 15<sup>a</sup>, J. du Val.)

Long. 2 1/2; lat. 3/4 mill.

Oblong, peu allongé et très légèrement convexe; noir un peu métallique avec les palpes, les antennes et les pattes d'un testacé obscur. Tête imponduée; sillons frontaux fortement carénés, parallèles. Prothorax deux fois aussi large que long, à angles antérieurs et côtés arrondis en avant, rétrécis en arrière pour former des angles un peu obtus, presque droits; il est longitudinalement sillonné au milieu et marqué à la base de deux impressions larges et profondes paraissant imponduées, qu'un sillon transversal fortement imprimé réunit entre elles. Elytres en ovale oblong, plus larges à leur base que le milieu du corselet et deux fois et demie plus longues que lui, ayant les trois stries rapprochées de la suture entières, ponctuées, les autres nulles, sauf les deux externes réunies en avant et en arrière; la première stria suturale est régulièrement recourbée à sa partie inférieure et non contournée en crosse à l'extrémité; on voit aussi sur chaque élytre trois points un peu plus forts que les autres et situés: le premier et le troisième aux quart et trois quarts de la troisième stria, le deuxième à moitié de la seconde.

Cette espèce est très voisine du *B. pumilum* Dej.; elle en diffère par sa forme plus courte, ses antennes entièrement testacées et le nombre des stries des élytres.

Le Caire, au bord du Nil.

## 2. CHOLEVA FORMICETORUM.

♂. *Oblonga; pubescens; picea, palpis, antennis, pedibus,*

*thoracis anguste elytrorum late marginibus fusco-testaceis; antennis apice modice incrassatis, articulo octavo sequente nullo modo angustiore; thorace laxe et subtiliter punctato, basi utrinque subsinuato, angulis posticis obtusis; elytris subtiliter striatis, interstitiis elevatis, rugose punctatis, stria suturali profunda antice vix abbreviata. (Div. 2<sup>a</sup>, Kraatz.)*

Long. 3; lat. 1 3/4 mill.

♂. Ovale oblongue assez courte, à pubescence roussâtre assez longue et assez épaisse; brun foncé, palpes plus clairs, antennes testacées avec les articles intermédiaires plus obscurs, pattes testacées, avec les quatre cuisses postérieures brunâtres, bords latéraux et base du corselet assez étroitement ferrugineux; élytres entièrement de cette couleur, sauf le disque qui est plus foncé. Tête très finement ponctuée; antennes graduellement en massue, à peine plus longues que la tête et le corselet, à huitième article plus court, mais pas plus étroit que les septième et neuvième, dernier acuminé à l'extrémité, presque aussi long que les trois précédents réunis. Prothorax court, à angles antérieurs obtus; côtés arrondis; angles postérieurs obtus, émoussés; base faiblement sinuée de chaque côté; ponctuation assez fine et peu serrée. Elytres pas plus larges que le corselet et deux fois plus longues que lui, à stries fines, mais bien marquées, la suturale fortement enfoncée, un peu raccourcie en avant; les intervalles entre les stries sont un peu élevés et très rugueusement ponctués. Le mésosternum est dépourvu de carène. Les tarses antérieurs et intermédiaires sont simples, ainsi que les hanches postérieures.

Cette espèce doit être placée auprès de la *Ch. Alpina* Gyll.

Malgré la forme du huitième article des antennes, elle doit entrer dans le genre *Choleva* et non dans celui de *Catopsimorphus*, ce dernier différant surtout des *Choleva* par la brièveté des antennes et la pression de leurs articles les uns contre les autres.

J'en ai pris un seul individu à Montudon, près Marseille, sous une pierre, au milieu des fourmis.

3. J'ai pris dans la même localité, mais je ne saurais dire dans quelles conditions, le *Catopsimorphus arenarius* Hampe (*pilosus* Muls.).

4. J'ai trouvé, sur la plage du Prado, un seul exemplaire d'une espèce de Staphylinien fort rare en France, le *Philonthus cicatricosus* Er. Cet individu est remarquable par son corselet n'ayant qu'une seule fossette grande et profonde de chaque côté du disque au lieu des trois normales.

##### 5. LITHOCHARIS POCOFERA.

*Villosa; parum nitida; nigra, ore, antennis, pedibus, thoracis lateribus anguste, elytris, abdominis segmentorum margine inferiore apiceque ferrugineis; capite brevi autrorsum angustato, rugose punctato; thorace punctato, basi modice coarctato, angulis anticis obtusis posticis rotundatis, basi carinato; elytris thorace sesqui longioribus.*

Long. 5; lat. 3/4 mill.

Taille à peine inférieure à celle de la *Lith. castanea* Grav. Corps épais, entièrement et longuement couvert d'une villosité lanugineuse noire, ce qui la rend peu brillante, noire, avec la bouche, les antennes, les pattes, une bordure étroite

autour du prothorax, les élytres, le bord postérieur de chaque segment de l'abdomen en dessous, la moitié postérieure du pénultième et le dernier en entier ferrugineux. Tête assez courte, plus large que le prothorax, rétrécie en avant, à ponctuation forte et formant des rides bien prononcées; antennes à troisième article seulement un peu plus long que le deuxième. Prothorax plus étroit que les élytres, à peu près aussi long que large, sensiblement plus étroit en arrière, à angles antérieurs obtus, côtés droits, angles postérieurs arrondis; dessus densément et fortement ponctué, sauf sur une carène courte et assez saillante située à la base. Elytres d'un tiers plus longues que le prothorax, à ponctuation peu serrée et peu profonde, voilée par la villosité, déprimées le long de la suture. Cuisses assez épaisses, arquées.

♂. Sixième segment (*Sec. Er.*) inférieur de l'abdomen triangulairement entaillé.

♀. Cinquième segment inférieur très largement échancré; sixième trilobé à l'extrémité.

Voisine de la *Lith. fuscula* Mann.; elle en diffère par la taille plus grande, la couleur différente et la forme de la tête.

Prise à Marseille, avec le précédent, sur la plage du Prado.

6. Le genre *Telopes*, fondé par M. L. Redtenbacher dans ses *Russeger's Reisen*, n'a pas été adopté par les entomologistes, mais il constitue une division bien tranchée dans le genre *Attagenus*, se distinguant sans peine des espèces typiques par sa forme en général courte et convexe, les palpes et les mâchoires allongés, les jambes robustes, denticulées en dehors et terminées par de fortes épines.

Cette coupe sous-générique comprenait jusqu'ici trois espèces, auxquelles j'ai dû en adjoindre une nouvelle, découverte par moi en Caramanie. En voici les diagnoses et distinctions sommaires.

#### A. ATTAGENUS REDTENBACHERI Mihi.

*Oblongus, sericeo-pubescens, fuscus, pectore abdomineque obscurioribus; thorace semilunari, in medio baseos quadratum multum producto, supra æquali; clytris plus minusve sensim 4-costatis; tibiis robustis, externe denticulatis, apice bispinosis.*

Long. 3-5; lat. 1 1/4-2 1/2 mill.

Diffère de tous ses congénères par son corps un peu plus allongé, de forme plus rapprochée de celle des vrais *Attagenus*, son peu de convexité et la forme du prolongement postérieur du prothorax; se distingue en outre du *Tel. dispar* par ses pattes fauves.

Tarsous (Caramanie), dans les maisons.

#### B. ATTAGENUS MARITIMUS Géné.

Géné; De quibusdam Ins. Sard. nov. aut min. cogn., fasc. II, p. 20, n° xx, tab. II, fig. 7.

*Breviter ovatus, valde convexus, brunneus, dense cinereo-pubescens, antennis pedibusque testaceis, tibiis latis, extus serratis.*

Long. 1 1/4 lin.; lat. 2/3 lin. (Géné).

Diffère du précédent par sa forme plus courte et plus convexe ainsi que par sa couleur plus foncée.

Sardaigne.

## C. ATTAGENUS DISPAR.

*Telopus dispar* L. Redt. Russeg. Reis. II, p. 984, tab. A, fig. 15.

*Ovatus, niger, griseo tomentosus; elytris brunneis, basi nigris; tarsis rufescentibus.*

Long. 2 lin.

Var. A. *Pallide fuscus, abdomine, capite, thoraceque piceis.*

Var. B. *Totus pallide ferrugineus* (L. Redtenbacher).

Diffère des deux précédents par la couleur noire des pattes.

Syrie.

## D. ATTAGENUS OBTUSUS.

*Dermestes obtusus* Gyll. in Schönherr, Syn. Ins. II, p. 88, n° 10.

*Brevior ovalis fusco niger pubescens, thorace punctis, elytris fasciis subtribus obsoletis cinereo-villosis. D. trifasciato valde affinis, sed brevior, magis obtusus, etc.* (Gyll).

Diffère des trois espèces qui précèdent par sa coloration.

Portugal, Piémont, Allemagne.

D'après les diagnoses que je viens de citer, on voit que, d'une part, la division se rattache aux *Attagenus* dont les types sont les *pellio* L. et *megatoma* F., et, de l'autre, à ceux qui ont pour les leurs les *verbasci* L. et *bifasciatus* Rossi.

## 7. ANTHIRENUS ALBIDUS.

Dejean, Cat., 3<sup>e</sup> éd., p. 140.

*Breviter ovatus, subrotundatus, infra convexus; niger antennis pedibusque fuscis; dense obsitus squamis albidis quæ in capite, thorace, clytrorum basi et apice, pedibusque cum fuscis immixtæ sunt; antennæ vero et abdominis maculæ nigrae sunt etiam squamosæ; thorace lateribus depresso, in medio bascos angulatin producto; clytrorum lateribus antice tantummodo marginatis.*

Sectio : *Antennis 11 articulatis, articulis tribus ultimis clavatis.*

Long. 3-3 1/2; lat. 2 1/2-2 3/4 mill.

Très brièvement ovale, presque arrondi, très convexe en dessous, médiocrement en dessus; noir, couvert d'écailles serrées en dessus et en dessous. Antennes de onze articles, les trois derniers formant une massue grossissant à l'extrémité, à articles premier et deuxième transversaux, troisième carré, aussi grand que les deux précédents réunis; rousses, à écailles noires; tête rousse, avec une tache blanche entre les antennes et une autre de chaque côté au-dessus du labre : celui-ci noir ainsi que les yeux. Prothorax très échancré en devant avec les angles antérieurs aigus, les côtés rabattus antérieurement, bisinués, déprimés et rebordés; angles postérieurs émoussés; milieu de la base prolongé en arrière en pointe émoussée; dessus blanc avec douze taches rousses, savoir : une à chaque angle; une située entre elles, mais un peu plus éloignée des côtés; une un peu noirâtre au bord antérieur, en dedans des yeux : quatre en carré au milieu. Elytres trois fois plus longues

que les côtés du prothorax, leurs côtés continuant la courbe qu'il forme, arrondies à l'extrémité, obtuses à l'angle apical, rebordées seulement le long du sinus antérieur; elles sont blanches avec les épaules rousses jusqu'à la région scutellaire : cette bande rousse est suivie de trois grandes taches noires, situées sur une même ligne; les deux premières presque réunies près du bord externe, la troisième vers le milieu de la largeur; le bord externe et le milieu de l'élytre sont nuancés de roux vers l'extrémité. Dessous blanc, avec une tache noire de chaque côté au bord externe des quatre derniers segments abdominaux et une sur l'anus. Pattes grêles, rousses, à face supérieure nue, inférieure mélangée de blanc, de roux et de noir; cuisses postérieures arquées, reçues dans des dépressions du premier segment abdominal.

Marseille, sur les ombellifères.

8. *Zonitis mutica* Fabr. Olivier a décrit cet insecte avant Fabricius sous le nom d'*Apalus immaculatus*. Il faudra donc lui restituer son véritable nom ainsi qu'il suit :

*Zonitis immaculata*.

*Apalus immaculatus* Oliv. Enc. méth. IV, p. 166, n° 4 (1789) (Conf. X, p. 820).

*Zonitis mutica* Scriba Journ. p. 23, 10 (1790). — Fabr. Ent. Syst. I, II, p. 49, 3 (1792). — Syst. El. II, p. 23, 5. — Panz. Ent. Germ. I, p. 369, 1. — Schœnh. Syn. Ins. II, 340, 4. — Redtenb. Faun. Austr. 617.

*Mylabris fulva* Rossi Mant. I, p. 94, 210, Tab. 2. f. F. (1792). — Ed. Helwig. I, p. 440, 210.

