

tiliter, crebre punctulatum, parce cinereo-pubesceus, pone medium maculis duabus, rotundis, nigris notatum. Corpus subtus valde convexum, nigrum, subtiliter, crebre punctulatum, tenuiter cinereo-pubesceus. Pedes rufo-testacei, punctati; femoribus posticis parum incrassatis, subtus muticis, a basi ultra medium infuscatis.

238. *Bruchus luculentus*.

Ovatus, parum convexus, ferrugineus, pube albida dense obsitus et variegatus; antennis maris longe pectinatis; prothorace breviter triangulari, punctulato; elytris evidenter punctato-striatis, interstitiis planis, confertim punctulatis; pygidio linea longitudinali maculaque parva utrinque, dense albo-pubescentibus; femoribus posticis modice clavatis, muticis. — Long. 2½, lat. 1½ millim.

Patria: Insula Puna.

Caput sub-triangulari, deflexum, ferrugineum, subtiliter, crebre punctulatum, tenuiter pubescens. Palpi ferruginei. Oculi magni, ovati, sub-reniformes, convexi, nigri, antice conniventes. Antennae longitudine dimidii corporis, rufo-ferrugineae, articulo primo sub-conico, secundo brevi, tertio longiore, obconico, quarto inferne triangulariter producto, 5—11 radiis longis, duobus primis nonnihil brevioribus instructis. Prothorax breviter sub-conicus, apice truncatus, basi utrinque leviter bi-sinuatus, lobo medio parum producto, sub-truncato; lateribus basin versus oblique ampliatis, angulis posticis sub-acuminatis; superne leviter convexus, ferrugineus, rufo-opacus, crebre, evidenter punctulatus, pube brevi, depressa, albida inaequaliter vestitus. Scutellum sub-quadratum, dense albido-pubesceus. Elytra antice singulatim leviter sinuata, prothorace vix latiora, quam lata parum longiora, callo suprahumerali leviter elevato, obtuso; lateribus infra medium nonnihil angustata, apice singulatim leviter rotundata, superne paullo convexa, ferruginea, pube albida, basi et ad suturam densiore vestita, evidenter punctato-striata, interstitiis planis, crebre punctulatis. Pygidium ovale, deflexum, leviter convexus, obscure ferrugineum, subtiliter, crebre punctulatum, breviter, parce cinereo-pubesceus, linea tenui, longitudinali, basi latiore maculaque utrinque parva, dense albo-pubescentibus ornatum. Corpus subtus valde convexum, ferrugineum, subtiliter, crebre punctulatum, dense, inaequaliter albido-pubesceus. Pedes rufo-ferruginei, punctulati; femoribus posticis modice incrassatis, subtus muticis.

239. *Bruchus obtusus*.

Ovatus, parum convexus, niger, squamis setiformibus cinereis dense adpersus; antennis pedibusque rufo-testaceis, femoribus posterioribus a basi ultra medium nigris, posticis incrassatis, subtus ante apicem breviter dentatis; prothorace sub-conico, confertim punctulato; elytris ferrugineis, tenuiter striatis, ad suturam et ad marginem inaequaliter infuscatis. — Long. 2½—2¾, lat. 1¼—1½ millim.

Patria: Montevideo.

Caput deflexum, leviter convexus, nigrum, sub-opacum, subtiliter, crebre punctulatum, vix pubescens. Palpi nigri. Oculi ovati, sub-reniformes, modice convexi, nigri. Antennae ad prothoracis basin vix pertingentes, rufo-testaceae, tenuiter pubescentes, articulis quatuor basalibus tenuioribus, reliquis crassis. Prothorax sub-conicus, longitudine latior, apice truncatus, basi utrinque sinuatus, lobo medio lato, parum producto, apice truncato; lateribus ab apice basin versus oblique ampliatis, angulis anticis deflexis, rotundatis, posticis rectis, sub-acuminatis; superne convexus, niger, crebre, evidenter punctulatus, squamis setiformibus cinereis dense adpersus. Scutellum sub-quadratum, nigrum, dense cinereo-squamosum. Elytra antice singulatim nonnihil rotundato-producta, prothorace non latiora at illo fere duplo longiora, pone humeros leviter rotundatos ad medium perparum rotundato-ampliata, dein apicem versus nonnihil angustata, apice singulatim rotundata, superne leviter convexa, ferruginea, parum nitida, ad suturam et marginem lateralem inaequaliter infuscata, undique squamis piliformibus, densis, cinereis obsita, parum profunde striata,

striis in fundo punctulatis, interstitiis planis, vix coriaceis. Pygidium sub-cordatum, ferrugineum, subtiliter, crebre punctulatum, tenuiter cinereo-squamosum. Corpus subtus convexum, nigrum, subtiliter, crebre punctulatum, tenuiter cinereo-pubescent. Pedes rufo-testacei, parce pubescentes; femoribus posterioribus a basi ultra medium nigris, posticis incrassatis, subtus ante apicem dente parvo, acuto armatis.

240. *Bruchus californicus*.

Ovatus, nigro-piceus, parum nitidus, supra cinereo-pubescent, subtus griseo-squamosus; antennis pedibusque rufo-testaceis, illis brevibus, extrorsum sensim incrassatis; prothorace breviter conico, confertim punctulato; elytris rufo-ferrugineis, minus profunde punctato-striatis, sutura, praesertim antice, infuscata; femoribus posticis subtus muticis. — Long. 2, lat. $1\frac{1}{2}$ millim.

Patria: California, Insula Puna.

Caput deflexum, nigro-piceum, parum nitidum, subtiliter, crebre punctulatum, pube tenui, brevi, cinerea obsitum, collo brevi, convexo prothoraci adfixum; fronte inter oculos obsolete carinata; ore ferrugineo. Palpi nigro-picei. Antennae dimidio corpore breviores, sat valide, rufo-testaceae, cinereo-pubescentes, extrorsum sensim incrassatae, articulo ultimo breviter ovato, acuminato. Prothorax latitudine brevior, anterieus attenuatus, apice utrinque oblique truncatus, lateribus basin versus ampliatis; basi bisinuatus, lobo medio lato, producto, apice leviter emarginato, angulis posticis acuminatis; superne modice convexus, subtiliter, crebre punctulatus, nigro-piceus, dense cinereo-pubescent. Scutellum parvum, sub-quadratum, nigrum, pube cinerea adpersum. Elytra antice singulatim leviter rotundato-producta, prothorace nonnihil latiora et illo duplo longiora, pone basin oblique ampliata, infra medium sensim angustata, apice singulatim rotundata, superne parum convexa, tenuiter, regulariter punctato-striata, interstitiis planis, subtilissime punctulatis; rufo-ferruginea, pube densa, brevi, cinerea sat dense obsita, sutura plus minusve, antice semper latius infuscata. Pygidium sub-cordatum, ferrugineum, crebre punctulatum, dense cinereo-squamosum. Corpus subtus valde convexum, nigro-piceum, subtiliter, crebre punctulatum, dense griseo-squamosum. Pedes rufo-testacei, parce pubescentes, anteriores tenues, postici crassiores; femoribus subtus muticis.

241. *Bruchus funebris*.

Ovatus, niger, parum nitidus, parce, breviter cinereo-pubescent; pedibus anterioribus, basi excepta, flavis; antennis sat longis, validis, extrorsum sensim incrassatis; prothorace sub-conico, subtiliter, crebre punctulato; elytris minus profunde punctato-striatis, interstitiis planis, subtilissime punctulatis; femoribus posticis subtus muticis. — Long. 1 $\frac{1}{2}$, lat. 1 millim.

Patria: Rio Janeiro.

Caput deflexum, nigrum, parum nitidum, subtiliter, crebre punctulatum, breviter cinereo-pubescent, collo longo, convexo prothoraci adfixum. Frons inter oculos carinata. Oculi lunati, valde prominuli, nigri. Antennae dimidio corpore longiores, valide, totae nigrae, breviter cinereo-pubescentes, articulo ultimo ovato, sub-acuminato. Prothorax conicus, anterieus attenuatus, apice truncatus, lateribus basin versus sensim oblique ampliatis, basi utrinque sinuatus, lobo medio lato, producto, apice leviter emarginato; angulis posticis acuminatis; superne modice convexus, subtiliter, confertim punctulatus, niger, parum nitidus, pube brevi, cinerea adpersus. Scutellum breve, nigrum, sub-opacum, parce pubescens. Elytra prothorace arete applicata, illo duplo longiora, antice singulatim leviter rotundato-producta, pone basin oblique ampliata, infra medium nonnihil angustata, apice singulatim rotundata, superne parum convexa, postice declivia, nigra, parum nitida, pube tenui, depressa, cinerea adpersa, regulariter, minus profunde punctato-striata, interstitiis planis, subtilissime punctulatis. Pygidium sub-triangulare, nigrum, creberrime punctulatum, cinereo-pube-

scens. Corpus subtus valde convexum, nigrum, punctulatum, cinereo-pubescent. Pedes quatuor anteriores, tenues, flavi, tibiis rectis, tarsis nigris; postici validiores, femoribus valde incrassatis, tibiis basi tenuioribus, leviter arcuatis.

242. *Brachus atomarius*.

Oblongo-ovatus, parum convexus, niger, vix nitidus, parce, breviter cinereo-pubescent; antennis basi, geniculis anterioribus, tibiis tarsisque omnibus rufo-testaceis; capite prothoraceque subtiliter, crebre punctulatis; elytris tenuiter striatis, striis subtiliter punctulatis. — Long. $1\frac{1}{2}$, lat. $\frac{3}{4}$ millim.

Patria: Valparaiso, California (St Francisco).

Caput deflexum, modice convexum, subtiliter, crebre punctulatum, nigrum, parum nitidum, vix pubescens, inter oculos tenuiter, longitudinaliter carinatum. Palpi nigri. Oculi ovati, sub-reniformes, modice convexi, nigri. Antennae capite cum prothorace breviores, nigrae, extrorsum crassiores, basi rufo-ferrugineae. Prothorax longitudine nonnihil latior, apice truncatus, basi bisinuatus, lobo medio parum producto, rotundato, lateribus pone apicem magis, basin versus minus ampliatis, angulis posticis sub-rectis; superne modice convexus, niger, vix nitidus, subtiliter, crebre punctulatus, pube cinerea adpersus. Scutellum sub-quadratum, nigrum, parce cinereo-pubescent. Elytra antice singulatim parum rotundato-producta, prothorace vix latiora at illo duplo longiora, pone humeros rotundatos vix ampliata, apice singulatim rotundata, superne parum convexa, nigra, vix nitida, pube brevi, cinerea adpersa, tenuiter striata, striis subtiliter punctulatis, interstitiis planis. Pygidium sub-cordatum, leviter convexum, nigrum, crebre punctulatum, cinereo-pubescent. Corpus subtus convexum, nigrum, punctulatum, parce pubescens. Pedes rufo-testacei; femoribus anterioribus fere ad apicem, posticis totis nigris.

243. *Brachytarsus pulicarius*.

Oblongo-ovatus, convexus, ferrugineus, pube cinerea adpersus; oculis convexus; prothorace subtiliter, creberrime punctulato, antice producto, sub-rotundato, basi elevato-marginato, angulis retrorsum productis; elytris mediocriter punctato-striatis, parcius pubescentibus, interstitiis sub-convexis, punctulatis. — Long. $1\frac{1}{2}$, lat. 1 millim.

Patria: Rio Janeiro.

Individuis minoribus *B. vari* statura similis. Caput breve, deflexum, modice convexum, obscure ferrugineum, subtiliter, crebre punctulatum, pube cinerea parce, ad oculos densiore obsitum. Oculi semiglobosi, nigri. Rostrum breve, capite parum angustius, planum, colore et indumento capitis. Antennae prothoracis basin vix attingentes, ferrugineae, clava majuscula, nigro-fusca. Prothorax latitudine brevior, apice productus, sub-rotundatus, angulis compressis, lateribus basin versus sensim oblique ampliatis; basi leviter bi-sinuatus, elevato-marginatus, angulis retrorsum nonnihil productis, acuminatis; superne convexus, obscure ferrugineus, subtiliter, crebre punctulatus, pube cinerea hinc illinc maculatim condensata adpersus. Scutellum minutissimum, rotundatum, ferrugineum. Elytra antice sub-truncata, prothorace non latiora et illo vix duplo longiora, lateribus infra medium nonnihil ampliata, apice conjunctim rotundata, superne valde convexa, postice declivia, ferruginea, pube cinerea parce adpersa, mediocriter punctato-striata, interstitiis sub-convexis, punctulatis. Pygidium piceum, punctulatum, tenuiter pubescens, apice sub-truncatum. Corpus subtus nigrum, subtiliter, crebre punctulatum, parce cinereo-squamulosum. Pedes mediocres, rufo-ferruginei, parce cinereo-pubescentes.

244. *Tropideres tessellatus*.

Oblongus, convexus, nigro-fuscus, sub-opacus, supra maculis cinereo-pubescentibus variegatus; antennis basi pedibusque testaceis; prothorace subtiliter, crebre punctulato, basi elevato-marginato; elytris subtiliter punctato-striatis. — Long. $1\frac{1}{2}$, lat. $\frac{3}{4}$ millim.

Patria: Insula Mauritius.

Caput latitudine vix longius, leviter convexum, nigro-fuscum, opacum, subtiliter, crebre punctulatum, cinereo albido-pubescent; vertice transversim denulato. Oculi ovati, convexi, nigri. Rostrum capite brevius et parum angustius, superne planum, medio leviter impressum, colore et indumento capitis. Antennae ad prothoracis basin pertinentes, tenues, testaceae, clava magna, oblonga, nigro-fusca, acuminata. Prothorax latitudine vix brevior, apice productus, sub-rotundatus, angulis compressis, lateribus modice rotundato-ampliat; basi truncatus, elevato-marginatus, superne convexus, nigro-fuscus, opacus, subtiliter, crebre punctulatus, basi apiceque inaequaliter cinereo-pubescent maculisque nonnullis rotundis in medio, transversim positis, similiter pubescentibus notatus. Scutellum vix conspicuum. Elytra antice truncata, prothorace vix latiora at illo dimidio longiora, lateribus recta, apice conjunctim rotundata, superne convexa, postice delivra, nigro-fusca, opaca, subtiliter punctato-striata, maculis parvis e pube cinereo-albida seriatim locatis tessellata. Pygidium depressum, nigro-fuscum, punctulatum, apice obtusum. Corpus subtus nigrum, subnitidum, subtiliter, crebre punctulatum. Pedes testacei, punctulati; femoribus apicem versus leviter infuscatis.

245. *Caranistes variegatus*.

Oblongus, modice convexus, testaceus, pube grisescente variegatus; capite, articulis primo et tribus ultimis antennarum piceis; prothorace confertim granulato, postice leviter transversim carinato; elytris mediocriter punctato-striatis, parce cinereo-tessellatis. — Long. 5, lat. 2 millim.

Patria: Insula Mauritius.

C. longulus nonnihil minor, praesertim angustior. Caput parum convexum, piceum, sub-opacum, creberrime granulato-punctulatum, breviter griseo-pubescent. Oculi sat magni, seniglobosi, brunnei. Rostrum capite molto brevius, colore, sculptura et indumento capitis. Antennae corpore longiores, tenues, testaceae, articulis primo et tribus ultimis piceis. Prothorax breviter sub-conicus, latitudine vix longior, basi apiceque truncatus, ab apice basin versus sensim ampliat, mox ante basin carinula transversa utrinque versus medium laterum arcuatim producta; superne parum convexus, creberrime punctulatus, testaceus, pube tenui grisescente adpersus. Scutellum parvum, rotundatum, testaceum. Elytra antice sub-truncata, marginata, prothorace paullo latiora at illo duplo longiora, humeris non elevatis, rotundatis, lateribus vix ampliata, apice conjunctim rotundata, superne modice convexa, mediocriter punctato-striata, testacea, pube tenui, concolore parce variegata, maculis parvis cinereo-pubescentibus tessellata. Pygidium oblongum, attenuatum, testaceum, cinereo-pubescent, apice acuminatum. Corpus subtus ferrugineum, subtiliter, crebre punctulatum, sat dense cinereo-squamosum. Pedes longiuseculi, testacei, fusco-annulati; femoribus parum incrassatis, tarsorum articulo tertio nigro-fusco.

246. *Araocerus subnotatus*.

Sub-ovatus, testaceus, pube depressa cinereo-albida obsitus; prothorace crebre punctulato, antice brunneo-variegato, basi sub-truncato; elytris subtiliter punctato-striatis, obsolete brunneo-maculatis. — Long. 2½, lat. 1½ millim.

Patria: Insula Keeling.

Statura fere *A. suturalis*, multo minor. Caput latitudine longius, superne planum, testaceum, crebre punctulatum, pube depressa, cinereo-albida dense vestitum, medio tenuiter canaliculatum. Oculi parvi, convexi, nigri. Antennae longitudine capitis cum prothorace, tenues, dilutius testaceae, articulis tribus ultimis sat magnis, clavam elongatam efficientibus. Prothorax longitudine dimidio latior, apice leviter rotundatus, anterioribus modice angustatus, lateribus pone medium rotundato-ampliat; basi vix sinuatus, sub-truncatus, reflexo-marginatus, angulis anticis rotundatis, posticis fere rectis; superne convexus, testaceus, subtiliter, creberrime punctulatus, ante basin breviter cinereo-squamosus, antrorsum magis denudatus, brunneo-variegatus. Scutellum parvum, rotundatum, cinereo-squamosum. Elytra antice sub-truncata, tenuiter elevato-marginata, prothorace vix latiora, quam lata duplo longiora, lateribus recta, apice conjunctim rotun-

data, superne convexa, testacea, subtiliter punctato-striata, pube depressa cinereo-albida tecta, maculis plurimis, parvis, obsoletis, dilute brunneis variegata. Pygidium testaceum, punctulatum, parce pubescens, apice rotundatum. Corpus subtus rufo-testaceum, subtiliter punctulatum, minus dense cinereo-pubescens. Pedes pallide testacei, pube cinerea adpersi; femoribus modice clavatis, muticis.

FAM. CURCULIONIDES.

247. *Euops puncticollis*.

Ferrugineus, parum metallico-micans, glaber; capite, pygidio corporeque subtus caeruleis; antennis nigris; prothorace lato, crebre, profunde punctato; elytris profunde punctato-sulcatis, interstitiis angustis, transversim rugulosis. — Long. 6–6½, lat. 3¼–3½ millim.

Patria: Nova Hollandia (Sidney).

Femina nobis tantum visa. Statura et summa similitudo *E. australasiae*, dimidio major, prothorace latiore, profundius punctato, antice posticeque non caeruleo-marginato ab illo certe distinctus. Caput porrectum, elongatum, cylindricum, caeruleum, parum nitidum, postice subtiliter, transversim aciculatum, antice et ad latera crebre punctulatum, ante oculos leviter foveolatum. Oculi majusculi, modice convexi, glauci, superne connati. Rostrum capite brevius, deflexum, ferrugineum, sub-nitidum, apice dilatatum, subtiliter punctulatum. Antennae nigrae, clava fusco-holosericæ. Prothorax latitudine bascos vix longior, apice truncatus, basi leviter bi-sinuatus, lateribus pone apicem oblique ampliatis, dein fere rectis, angulis posticis subangulatis; superne modice convexus, ferrugineus, parum nitidus, modique crebre, sat profunde punctatus, intra basin transversim impressus. Scutellum parvum, obtusum, laev. caeruleum. Elytra sub-quadrata, latitudine parum longiora, antice singulatim leviter sinuata, humeris elevatis, obtuse angulatis, lateribus recta, apice conjunctim sub-rotundata, superne parum convexa, dorso fere plana, tota ferruginea, parum metallico-micans, glabra, sulcis novem profundis, confertim punctatis exarata, interstitiis angustis, convexis, transversim rugulosis. Pygidium sub-inflexum, nigro-caerulescens, crebre punctatum, apice rotundatum. Corpus subtus convexum, crebre punctulatum, nigro-caeruleum. Pedes mediocres, ferruginei, antici vix longiores; femoribus clavatis; tibiis, tennibus, rectis, intus ante medium nonnihil incrassatis; tarsis saturatius ferrugineis, subtus griseo-spongiosis.

248. *Rhyechites humeralis*.

Oblongo-ovatus, modice convexus, niger, tenuiter pubescens; antennis tibiisque ferrugineis; prothorace confertissime punctulato, lateribus parum ampliato; elytris crebre punctato-striatis, macula humerali rufo-testacea ornatis. — Long. 2, lat. 1½ millim.

Var. *a*: elytris rufo-ferrugineis, dorso infuscatis.

Patria: California (St Francisco).

Rh. minuto statura subsimilis, nonnihil minor. Caput sub-quadratum, modice convexum, confertim punctulatum, breviter cinereo-pubescens. Oculi semi-globosi, nigro-brunnei. Rostrum longitudine fere capitatis cum prothorace, tenue, cylindricum, fere rectum, nigrum, sub-nitidum, parce punctulatum et pubescens, basi leviter, longitudinaliter carinatum. Antennae prothoracis medium superant, ferrugineae, parce pubescentes. Prothorax latitudine dimidio fere longior, apice truncatus et intra apicem leviter constrictus, basi truncatus, antice posticeque nonnihil angustatus, lateribus medio modice rotundato-ampliatis; superne modice convexus, equalis, confertissime punctatus, niger, sub-nitidus, pube brevi, cinerea parce adpersus. Scutellum sub-rotundatum, nigrum. Elytra ampla, sub-quadrata, antice prothoracis basi fere duplo latiora, humeris vix elevatis, obtusis, lateribus hand ampliata, apice rotundata, quam lata nonnihil longiora, posterius convexa, pone scutellum leviter transversim impressa, crebre, mediocriter punctato-striata, stria suturali evidentiore; nigra, sub-nitida, pube brevi, tenui, cinerea adpersa, pone humeros macula majore vel

minore rufa-testacea ornata. Pygidium breve, punctulatum, apice rotundatum. Corpus subtus convexum, nigrum, confertim punctulatum, breviter cinereo-pubescent. Pedes mediocres, ferruginei; femoribus plus minusve infuscatis; tarsis elongatis, subtus pallido-spongiosis.

249. *Belus cyaneipennis*.

Elongatus, niger, squamis piliformibus, flavescentibus variegatus; antennis testaceis; prothorace confertim rugoso-punctato, medio canaliculato, flavescenti-trilineato; elytris cyaneis, nitidis, confertim sub-seriatim punctatis, juxta suturam leviter impressis, apice productis, attenuatis, linea suturali aliaque disci antice abbreviata e punctis flavescentibus; subtus flavescenti-tomentosus, medio late, longitudinaliter denudatus; pedibus rufis, femoribus anticis acute bidentatis. — Long. 10–12, lat. 2½–3 millim.

Patria: Nova Hollandia (Sidney).

B. hemistictico GERM. certe affinis, aliter coloratus, femoribus anticis ante apicem acute bidentatis ab illo mox distinctus. Caput breve, convexum, ante basin leviter constrictum, crebre, subtiliter rugoso-punctatum, nigro-piceum, orbitis oculorum et subtus flavescenti-squamosum. Oculi semiglobosi, nigri. Rostrum longitudine fere capitis cum prothorace, tenue, cylindricum, sub-arcuatum, nigrum, sub-opacum, subtilissime, crebre punctulatum. Antennae tenues, testaceae, apicem versus sensim crassiores. Prothorax latitudine bascos parum longior, apice truncatus, intra apicem leviter constrictus, lateribus postice nominil ampliat, basi profunde bi-sinuatus, superne convexus, undique confertim rugoso-punctatus, dorso tenuiter canaliculatus, in canalicula et subtus dilute flavescenti-squamosus. Scutellum breve, transversum, dense flavescenti-pubescent. Elytra elongata, antice singulatim rotundato-producta, prothorace paullo latiora at illo fere triplo longiora, lateribus recta, apicem versus attenuata, acuminata, supra parum convexa, prope suturam leviter impressa, confertim punctata, punctis sub-seriatis; cyanea, nitida, vitta suturali e maculis formata lineisque disci antice valde abbreviatis e punctis dense flavescenti-pubescentibus. Corpus subtus ferrugineum, obsolete, parce punctatum, pube dilute flavescenti vestitum, medio late, longitudinaliter denudatum. Pedes rufo-ferruginei, parce griseo-pubescentes; femoribus anticis crassioribus, ante apicem subtus bispinosi, tibiis ejusdem paris intus subtiliter denticulatis.

250. *Belus gracilis*.

Elongatus, piceus; antennis, rostro apice pedibusque ferrugineis; prothorace confertim granulato, canaliculato; elytris cyanescentibus, dorso subtiliter, crebre punctato-striatis, lateribus sub-seriatim punctatis, apice productis, acuminatis; subtus vitta laterali dilute flavescenti-tomentosa; femoribus anticis incrassatis, subtus breviter sedentatis; tibiis anticis intus acute, crebre denticulatis. — Long. 10, lat. 1½ millim.

Patria: Nova Hollandia (Sidney).

Statura *B. phaeopteri*, minor, armatura pedum a reliquis facile distinctus. Caput breve, parum convexum, ante basin leviter constrictum, piceum, sub-opacum, crebre rugoso-punctatum, ad oculos et subtus dilute flavescenti-tomentosum. Oculi semiglobosi, nigri. Rostrum prothorace nominil longius, cylindricum, parum arcuatum, basi piceum, crebre, subtiliter rugoso-punctatum, dein rufo-ferrugineum, sub-laeve, nitidum. Antennae tenues, rufo-ferruginae, apicem versus sensim crassiores. Prothorax latitudine postica parum longior, apice truncatus, intra apicem constrictus, dein leviter, basin versus parum ampliat, basi profunde bisinuatus, superne modice convexus, piceus, crebre granulatus, dorso obsolete canaliculatus, vitta utrinque laterali dilute flavescenti-tomentosa. Scutellum breve, transversum, parce tomentosum. Elytra elongata, antice singulatim rotundato-producta, prothorace parum latiora at illo triplo longiora, lateribus recta, apicem versus attenuata, acuminata, superne parum convexa, cyanescentia, dorso crebre punctato-striata, lateribus sub-seriatim punctata. Corpus subtus ferrugineum, obsolete, parce punctulatum, vitta la-

terali dilute flavescenti-squamosa. Pedes ferruginei, parce pubescentes; femoribus anticis incrassatis, subtus a medio apicem versus denticulis 5 vel 6 parvis, posterioribus denticulis 2 vel 3 armatis; tibiis anticis intus crebre, acute denticulatis.

251. *Eurhynchus bellicosus*.

Oblongus, convexus, rufo-ferrugineus, parum nitidus, subtus pube cervina adpersus; rostro capite nonnihil longiore; prothorace sub-cylindrico, confertim rugoso-granulato, dorso tenuiter canaliculato; elytris punctato-sulcatis, intus granularis, medio valide quadrituberculatis, antice linea longitudinali et pone medium lineis quatuor cervino-pubescentibus ornatis. — Long. 13, lat. 5½ millim.

Patria: Nova Hollandia (Sidney).

E. quadridentati Ekt. affinis, multo major, aliter signatus. Caput oblongum, modice convexum, rufo-ferrugineum, sat crebre rugoso-granulatum. Frons linea impressa, antice profundiori, antice parce cervino-pubescenti. Oculi parvi, rotundati, leviter convexi, glauci. Rostrum capite nonnihil longius, subarcuatum, cylindricum, rufo-ferrugineum, crebre punctulatum, apice nigro, parcius punctulato. Antennae capituli prothoracisque longitudine, sub-tenuis, rufo-ferrugineae, clava elongata, acuminata, pubescente. Prothorax capite vix latior, latitudine nonnihil longior, cylindricus, basi apiceque truncatus, intra apicem constrictus, crebre rugoso-granularis, rufo-ferrugineus, sub-opacus, squamis cervinis superne vix, subtus densius adpersus, medio tenuiter, longitudinaliter canaliculatus. Scutellum parvum, ferrugineum, crebre punctulatum, medio impressum. Elytra oblongo-ovata, convexa, antice singulatim sub-triangulariter producta, prothorace dimidio latiora et illo fere triplo longiora, humeris parum elevatis, obtuse rotundatis; lateribus inflexa, apicem versus sensim ampliata, apice conjunctim rotundata, rufo-ferruginea, profunde sulcato-punctata, interstitiis exterioribus angustis, levigatis, interioribus latioribus, granularis; singulo elytro basi sub-cristata, crista parum elevata, granulis acuminatis muricata; medio tuberculis binis, validis, breviter conicis, dense granularis, oblique positis, exteriore nonnihil majore instructo, antice in interstitio tertio linea una et pone tubercula lineis quatuor dense cervino-pubescentibus. Corpus subtus piceum, crebre rugoso-punctulatum; pectore cervino-, abdomine cinereo-pubescentibus. Pedes longiusculi, ferruginei, parce cinereo-pubescentes.

252. *Pachyrhynchus Australasiae*.

Sub-ovatus, convexus, ater, sub-nitidus; capite parce aureo-squamoso, postice levigato, inter oculos canaliculato; rostro basi profunde impresso; prothorace parce, parum profunde punctato, squamis aureis adperso; elytris irregulariter, sat rude rugoso-punctatis, maculis plurimis parvis, rotundatis e squamulis viridi-argenteis ornatis. — Long. 10½, lat. 5½ millim.

Patria: Nova Hollandia (Sidney).

Otioryncho gemmato subsimilis. Caput rotundatum, modice convexum, atrum, sub-nitidum, postice levigatum, antice parce, sat profunde punctatum, squamis aureo-micantibus adpersum, inter oculos longitudinaliter canaliculatum. Oculi rotundati, modice convexi, nigri. Rostrum capite vix longius sed nonnihil angustius, crassum, parum arcuatum, atrum, sub-nitidum, parce punctatum, aureo-squamosum et pallido pubescens, basi fovea sat magna impressum. Antennae breves, valide, nigrae, tenuiter cinereo-pilosa, clava oblonga, acuminata, fusco-pubescente. Prothorax latitudine dimidio fere longior, apice utrinque oblique, basi recte truncatus, antice posticeque nonnihil angustatus, lateribus medio leviter rotundato-ampliat; superne convexus, ater, sub-nitidus, parce, parum profunde punctatus, squamis aureis vel viridi-argenteis pilisque brevibus albidis adpersus, ante basin leviter impressus. Scutellum haud conspicuum. Elytra antice conjunctim leviter emarginata, reflexo-marginata, prothorace parum latiora, quam lata dimidio longiora, pone basin subito rotundato-ampliata, superne valde convexa, fornicata, atra, sub-nitida, minus crebre, sat rude sed minus profunde rugoso-punctata, maculis plurimis parvis, rotundis, inaequalibus, e squamis viridi-argen-

teis formatis adpersa. Corpus subtus nigrum, sub-nitidum, parce punctulatum, setis pallidis parce adpersum. Pectus antice posticeque viridi-argenteo-squamosum. Pedes longiusculi, atri, nitidi, parce albido-pubescentes; femoribus clavatis, interdum squamis nonnullis viridi-argenteis obsitis; tibiis sub-compressis, apicem versus nonnihil inflexis, intus obsolete crenulatis.

253. *Thylacites puberulus*.

Oblongus, convexus, niger, pube depressa grisea obsitus pilisque erectis pallidis adpersus; antennis pedibusque piceis; rostro basi canaliculato; prothorace confertim, subtiliter punctulato, medio longitudinaliter, obsolete canaliculato, lateribus modice rotundato-ampliato; elytris medioeriter punctato-striatis, interstitiis leviter convexis. — Long. 4, lat. 3 millim.

Patria: Peruvia (Callao).

Magnitudo *Thyl. lasii*. Caput breve, supra parum convexus, nigrum, sub-nitidum, sat crebre, parum profunde punctulatum, pube grisea parce adpersum; orbitis albido-squamosis. Oculi parvi, rotundati, prominuli, nigri. Rostrum capite nonnihil longius et angustius, crassum, parum arenatum, supra planum, nigrum, sub-nitidum, sat crebre punctulatum, squamulis dilute virescentibus pubeque cinerea parce adpersum, basi longitudinaliter canaliculatum. Antennae piceae, parce pubescentes, clava ovata, acuminata, densius pubescente. Prothorax latitudine nonnihil brevior, basi apiceque truncatus, anterieus angustior, lateribus pone apicem modice rotundato-ampliat; superne convexus, niger, sub-nitidus, subtiliter, crebre punctulatus, pube cinerea, ad latera densiore, adpersus, dorso tenuiter, longitudinaliter canaliculatus. Scutellum parvum, triangulare, nigrum, leve, glabrum. Elytra antice truncata, prothorace dimidio latiora, quam lata duplo longiora, humeris rotundatis; lateribus ad medium recta, dein sensim angustata, apice conjunctim sub-acuminata, superne convexa, medioeriter punctato-striata, interstitiis leviter convexis; nigra, pube depressa grisea sat dense pilisque erectis pallidioribus parcius adpersa, in ipsa basi maculis nonnullis e pube densiore, albida ornata. Corpus subtus nigrum, sub-nitidum, sat crebre punctulatum, pube depressa, grisea adpersum. Pedes picei, crebre punctulati, griseo-pubescentes; femoribus modice clavatis, muticis.

254. *Blosyrus chinensis*.

Ovatus, convexus, niger, squamulis griseis adpersus; fronte tri-canaliculata; rostro angustiore, late impresso, in impressione utrinque foveolato; prothorace crebre tuberculato; elytris rude sed minus profunde punctato-sulcatis, medio fascia maculari e squamis dilutioribus ornatis, interstitiis convexis, seriatim granulatis. — Long. 9½, lat. 5 millim.

Patria: China (Hongkong).

Statura et similitudo *B. Onisei*, capite prothoraceque angustioribus, hoc crebrius tuberculato, elytris aliter signatis. Caput breve, latum, crassum, superne sub-planum, nigrum, crebre rugoso-punctatum, squamis griseis parce obsitum, longitudinaliter tri-sulcatum, ad oculos elevatum, linea recta, impressa a rostro distinctum. Oculi parvi, semiglobosi, nigri. Rostrum capite nonnihil longius et latitudine aequale, crassum, superne planum, utrinque profunde impressum, medio carinatum, nigrum, rugoso-granulatum, squamulis metallico-micantibus dense adpersum, apice triangulariter emarginatum, ciliatum. Prothorax latitudine vix longior, basi apiceque truncatus, anterieus nonnihil angustior, lateribus medio modice rotundato-ampliat; superne convexus, niger, parum nitidus, tuberculis parvis, obtusis, nitidis, sat crebre obsitus, squamis griseis, metallico-micantibus dense adpersus. Scutellum parvum, rotundatum, nigrum. Elytra antice truncata, prothorace vix latiora, quam lata dimidio longiora, pone basin subito rotundato-amplata, infra medium sensim angustata, apice conjunctim sub-rotundata, superne convexa, postice valde declivia, nigra, parum nitida, sat late et profunde sulcata, in sulcis parum profunde punctata, interstitiis convexis, seriatim gra-

nulatis; pube grisea undique adpersa, medio dorsi fascia maculari, retrorsum flexa, suturam non attingente, e squamis pallidioribus ornata. Corpus subtus nigrum, crebre rugoso-punctatum, squamis griseis sat dense obsitum. Pedes nigri, squamis griseis metallico-micantibus tecti; femoribus modice clavatis, muticis.

255. *Naupactus propinquus*.

Oblongus, convexus, niger, sub-nitidus, setis brevissimis albidis adpersus; rostro longitudinaliter canaliculato; prothorace confertim, subtiliter rugoso-punctato, antice leviter canaliculato; elytris parum profunde punctato-striatis, interstitiis planis, subtiliter coriaceis; tibiis anticis intus parce denticulatis. — Long. ♂ $8\frac{1}{2}$, ♀ $7\frac{1}{2}$, lat. 3 millim.

Mas: pedibus anticis longis, femoribus medio valde incrassatis; prothorace latiore, convexiore, utrinque magis rotundato-ampliato.

Femina: pedibus anticis reliquis vix longioribus, femoribus medio modice incrassatis; prothorace angustiore, minus convexo, utrinque modice rotundato-ampliato.

Patria: Insula Puna.

Statura et summa similitudo *N. laecerosi* Er. elytris leviter punctato-striatis, punctis striarum remotioribus et interstitiis omnino planis ab illo bene distinctus. Caput minus latum, parum convexum, nigrum, sub-nitidum, sat crebre punctulatum, ad oculos longitudinaliter aciculatum. Oculi rotundati, convexi, nigri. Rostrum longitudine capitis at illo nonnihil angustius, crassum, parum arcuatum, nigrum, sub-nitidum, superne planum, longitudinaliter aciculatum, medio canalicula longitudinali usque in fronte continuata impressum. Antennae ad prothoracis basin pertinentes, nigro-piceae, parce cinereo-pubescentes, clava ovata, acuminata. Prothorax latitudine nonnihil brevior, apice truncatus, basi utrinque leviter rotundato-emarginatus, superne niger, sub-nitidus, subtiliter, crebre rugoso-punctulatus, antice leviter canaliculatus. Scutellum parvum, sub-triangulare, nigrum. Elytra antice singulatim leviter rotundato-producta, prothorace dimidio fere latiora et illo duplo longiora, humeris vix elevatis, sub-rotundatis; lateribus non ampliata, a medio apicem versus sensim angustata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, postice declivia, nigra, sub-nitida, setulis brevissimis, albidis adpersa, parum profunde punctato-striata, punctis striarum remotis, interstitiis planis, subtiliter coriaceis. Corpus subtus nigrum, crebre ruguloso-granulatum, pube brevi, grisea parce adpersum. Pedes nigri, crebre punctulati, parce cinereo-pubescentes; tibiis anticis intus remote denticulatis, apicem versus nonnihil inflexis.

256. *Pantoplaeus viridisquamosus*.

Oblongus, convexus, niger, squamis dilute viridi-nitidis tectus setisque brevissimis albidis adpersus; capite rostroque canaliculatis, hoc apice aureo-squamoso; prothorace confertim punctulato, fusco-trivittato; elytris parum profunde punctato-striatis, interstitiis planis, septimo viridiflavescenti-squamoso; tibiis anticis obsolete crenulatis. — Long. 84. lat. 3 millim.

Patria: Buenos Ayres.

Caput breve, latum, modice convexum, nigrum, punctulatum, sat dense dilute viridi-squamosum, breviter albido-setulosum, canalicula longitudinali usque ad apicem rostri continuata insculptum. Oculi ovati, convexi, nigri. Rostrum capite vix longius sed nonnihil angustius, crassum, vix arcuatum, supra planum, nigrum, punctulatum, squamis viridi-nitidis setisque brevissimis albidis obsitum, lateribus sub-argenteo-, apice aureo-squamosum. Antennae ad prothoracis basin pertinentes, sub-tenuae, nigrae, parce cinereo-pubescentes. Prothorax latitudine nonnihil brevior, basi apiceque truncatus, lateribus pone apicem parum, dein haud ampliatis; superne convexus, niger, crebre punctulatus, squamis dilute virescentibus, nitidis setisque brevissimis albidis obsitus, dorso tenuiter canaliculatus, vittis tribus fuscis parcius squamosis, una dorsali

angustiori et binis lateralibus, latioribus notatus. Scutellum parvum, triangulare, nigrum, sub-nudum. Elytra antice truncata, prothorace parum latiora at illo duplo fere longiora, lateribus ultra medium nonnihil ampliata, dein angustata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, postice declivia, nigra, squamis densis dilute viridibus, nitidis setisque brevissimis, albidis obsita, parum profunde, minus crebre punctato-striata, interstitiis planis, septimo viridiflavescenti-squamoso. Corpus subtus ferrugineum, subtiliter, crebre punctulatum, squamis sub-argenteis minus dense vestitum. Pedes obscure ferruginei, minus dense subargenteo-squamosi et albido-setulosi, antei nonnihil longiores et validiores; femoribus modice incrassatis, subtus muticis; tibiis sub-rectis, intus obsolete crenulatis.

257. *Cyphometopus cylindricollis*.

Oblongus, convexus, niger, squamis cinereo-albidis dense vestitus setisque albidis parce adpersus; fronte rostroque canaliculatis; prothorace latitudine longiore, sub-cylindrico, dorso longitudinaliter griseo-squamoso; elytris parum profunde, sub-remote punctato-striatis, interstitiis sub-planis. — Long. 6, lat. 2½ millim.

Patria: Valparaiso.

Caput breve, modice latum, parum convexus, nigrum, punctulatum, squamis densis cinereo-albidis vestitum. Frons plana, canalicula tenui usque ad apicem rostri fere continuata insculpta. Oculi ovati, haud convexi, nigri. Rostrum capite nonnihil longius et angustius, crassum, sub-rectum, superne planum, medio transversim leviter impressum, nigrum, punctulatum, squamis cinereo-albidis dense setisque brevibus pallidis parce obsitis. Antennae ultra prothoracis medium pertingentes, nigrae, cinereo-pubescentes. Prothorax latitudine dimidio longior, apice utrinque leviter rotundato-emarginatus, lobis ocularibus modice productis; sub-cylindricus, lateribus vix ampliatus, basi truncatus, superne convexus, niger, crebre punctulatus, dorso obsolete canaliculatus, longitudinaliter griseo-. utrinque cinereoalbido-squamosus. Scutellum parvum, cinereo-albido-squamosum, apice rotundatum. Elytra antice fere truncata, vix rotundato-emarginata, prothorace paulo longiora, pone basin fere ad medium sensim ampliata, dein magis angustata, apice conjunctim sub-acuminata, superne convexa, postice declivia, parum profunde, sub-remote punctato-striata, interstitiis haud convexis; nigra, cinereoalbido-squamosa, setis albidis sub-seriatis parce adpersa. Corpus subtus nigrum, punctulatum, subargenteo-squamosum. Pedes medioeres, subargenteo-squamosi; femoribus modice clavatis, muticis; tibiis anterioribus intus parce crenulatis.

258. *Promecops pulchellus*.

Oblongo-ovatus, convexus, ferrugineus, supra brunneo-, subtus dilute viridiargenteo-squamulosus; antennis pedibusque testaceis; prothorace parce punctato, lateribus sordide albido-squamoso, posterius angustato; elytris sat profunde punctato-striatis, interstitiis alternis elevatioribus; singulo elytro antice arcu tenui fasciaque pone medium sat lata, pallido-squamosis notato. — Long. 3½, lat. 1½ millim.

Patria: Brasilia (Rio Janeiro).

E minoribus. Caput breve, sub-deflexum, parum convexus, ferrugineum, punctulatum, dense brunneo-squamosum. Frons tenuiter canaliculata. Oculi sat magni, oblongo-ovati, depressi, nigri. Rostrum capite paulo angustius et longius, crassum, sub-quadratum, depressum, obsolete canaliculatum, colore et indumento capitis. Antennae ultra prothoracis medium pertingentes, testaceae, parce pubescentes. Prothorax latitudine longior, apice leviter rotundato-emarginatus, pone apicem fere ad medium oblique modice ampliatus, dein basin versus sensim magis angustatus, basi leviter bi-sinuatus, superne modice convexus, ferrugineus, parce, sat profunde punctatus, dorso brunneo-, lateribus sordide albido-squamosus. Scutellum parvum, sub-rotundatum, brunneo-squamosum. Elytra antice singulatim parum rotundato-producta, prothorace dimidio latiora et illo duplo longiora, humeris vix elevatis, obtusis; lateribus ultra medium haud ampliata,

dein apicem versus angustata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, postice declivia; ferruginea, brunneo-squamosa, sat profunde punctato-striata, interstitiis alternis fere planis, aternis elevatioribus, subconvexis; singulo elytro areu tenui, ab humero orto, introrsum arcuatim versus suturam ducto fasciaeque inaequali pone medium, pallido-squamosis. Corpus sultus ferrugineum, crebre punctulatum, dense, dilute viridiargenteo-squamosum. Pedes testacei, punctulati, albido-squamulosi et pubescentes; femoribus parum clavatis, muticis, posticis extus medio denudatis.

259. *Cratopus murinus*.

Oblongus, niger, pube depressa grisea sat dense vestitus; antennis ferrugineis, clava nigro-fusca; rostro brevi, supra plano; fronte foveolata; prothorace crebre granulato, lateribus densius pubescente; elytris apice rotundatis, mediocriter punctato-striatis, interstitiis subtiliter granulatis; femoribus anticis modice incrassatis, subtus breviter, acute dentatis. Long. $4\frac{1}{2}$ — $6\frac{1}{2}$, lat. $1\frac{1}{4}$ — $2\frac{1}{4}$ millim.

Patria: Insula Mauritius.

E minoribus. *C. muno* proximus, rostro breviori, latiori, elytris apice rotundatis ut et colore pedum ab illo distinctus. Caput oblongum, superne modice convexum, nigrum, nitidum, subtiliter, crebre rugoso-granulatum, pube depressa, grisea sat dense adpersum; fronte foveola parva profunda insculpta. Oculi ovati, parum prominuli, nigri. Rostrum capite dimidio brevius et nonnihil angustius, superne planum, margine elevato; nigrum, crebre punctulatum, basi cinereo-pubescent. Antennae prothoracis basin vix attingentes, sub-tenues, obscurae ferrugineae, parce pilosae, clava ovata, nigro-fusca. Prothorax latitudine postica brevior, apice truncatus, intra apicem haud constrictus, pone apicem modice amplius, lateribus medio paullo amplius, basi leviter emarginatus, tenue reflexo-marginatus, superne modice convexus, niger, confertim granulatus, pube depressa grisea, dorso parcius, lateribus densius obsitus. Scutellum dense cinereo-squamosum, apice rotundatum. Elytra oblonga, antice conjunctim leviter rotundato-emarginata, prothorace nonnihil latiora et illo plus triplo longiora, humeris rotundatis, non elevatis; ultra medium perparum ampliata, dein sensim angustata, apice rotundata, in dorso parum convexa, postice declivia; nigra, pube depressa grisea sat dense vestita, mediocriter punctato-striata, interstitiis haud convexus, subtiliter granulatis. Corpus subtus nigrum, sub-nitidum, subtiliter coriaceum, pube grisen adpersum. Abdomen basi medio denudatum. Pedes nigri vel picci, parce cinereo-pubescentes; femoribus anticis magis incrassatis, subtus dente brevi, acuto armatis, posticis extus apicem versus saepe fascia transversa e squamulis albidis ornatis; tibiis non crenulatis.

260. *Hypsonotus languidus*.

Oblongo-ovatus, convexus, nigro-piceus, parum nitidus, supra parce, subtus dense albido-squamosus; rostro longitudinaliter rugoso, medio carinato, prothorace minus crebre granulato, medio tenuiter canaliculato; scutello dense albido-squamoso; elytris mediocriter punctato-striatis, transversim rugulosis, punctis pupillatis; lateribus et maculis dorsì sparsis, albido-squamosis. Long. 12—14½, lat. 6—7 millim.

Patria: Insula Puna.

Magnitudo et statura *H. chrysendelis*, rostro crassiore, longitudinaliter rugoso et prothorace latiore ab illo mox distinctus. Caput rotundatum, modice convexum, nigro-piceum, parum nitidum, rugoso-granulatum, squamis cinereis adpersum, inter oculos foveola parva insculptum. Oculi ovati, parum convexi, nigri. Rostrum capite parum angustius sed duplo longius, validum, parum arcuatum, nigro-piceum, minus dense cinereoalbido-squamosum, superne planum, longitudinaliter rugosum, medio tenuiter carinatum. Antennae longitudine fere capitis prothoracisque, minus tenues, piceae, parce cinereo-pilosae, clava oblonga, acuminata. Prothorax latitudine nonnihil brevior, basi apiceque truncatus, antèrius magis, postice minus angustatus, lateribus modice rotundato-amplius, superne convexus, sat crebre granulatus, squamis cinereo-

albidis dorso parcius, lateribus densius adpersus, medio longitudinaliter tenuiter canaliculatus. Scutellum parvum, dense albedo-squamosum, apice rotundatum. Elytra antice conjunctim leviter rotundato-emarginata, prothorace latiora, quam lata duplo longiora, pone basin oblique ampliata, humeris lateraliter perparum extensis, obtusis; lateribus hand ampliata, infra medium sensim angustata, apice conjunctim sub-acuminata, superne convexa, postice declivia, nigro-picea, medioeriter punctato-striata, punctis papillatis, interstitiis dorsalibus planis, transversim rugulosis; squamis cinereo-albidis, dorso parce, hinc inde maculatum condensatis, lateribus apiceque dense obsita. Corpus subtus piceum, sub-nitidum, crebre coriaceum, squamulis albidis, subargenteo-micantibus sat dense vestitum. Pedes nigro-picei, squamis oblongis, sub-argenteis parce, femoribus posticis pone medium densius obsiti; tibiis intus crenulatis, anticis apicem versus inflexis.

261. *Perperus marginalis*

Oblongus, convexus, niger, griseo-squamosus; antennis pedibusque ferrugineis; rostro parum arcuato; prothorace ovato, crebre granulato, lateribus albedo-squamoso; elytris parum profunde punctato-striatis, sutura et vitta laterali argenteo-squamosis, interstitiis modice convexis, alutaceis. — Long. $5\frac{1}{4}$ —6, lat. $1\frac{3}{4}$ —2 $\frac{1}{4}$ millim.

Patria: Nova Hollandia (Sidney).

Caput rotundatum, modice convexum, nigrum, subtiliter, crebre punctulatum, squamis parvis, rotundis, subargenteo-micantibus vestitum. Oculi ovati, parum promiculi, nigri. Rostrum capite duplo longius et dimidio angustius, validiusculum, sub-teres, parum arcuatum, sat crebre punctulatum, colore et indumento capitis. Antennae longae, tenues, ferrugineae, parce cinereo-squamosae et pubescentes, clava oblonga, acuminata. Prothorax oblongus, latitudine media longior, basi apiceque truncatus, antice posticeque angustatus, lateribus sat rotundato-ampliatus, superne convexus, crebre, distincte rugoso-granulatus, dorso parcius, lateribus densius albedo-squamosus. Scutellum nullum. Elytra antice conjunctim leviter rotundato-emarginata, ibique prothoracis basi parum latiora, quam lata duplo longiora, angulo humerali sub-acuminata; pone basin ad medium sensim nonnihil ampliata, dein apicem versus angustata, apice conjunctim sub-rotundata; superne convexa, postice declivia, medioeriter punctato-striata, interstitiis modice convexis, alutaceis; nigra, griseo-squamosa, apicem versus brevissime, parce, seriatim albedo-setulosa, sutura anguste, interdum obsolete vittaque laterali a margine remota, subargenteo-squamosis. Corpus subtus nigrum, punctulatum, squamulis subargenteo-micantibus tectum. Pedes ferruginei vel picei, parce subargenteo-squamosi et cinereo-pubescentes.

262. *Myllocerus brevicollis*.

Oblongus, convexus, niger, squamis cinereo-albidis dense vestitus; fronte tenuiter canaliculata; prothorace brevi, parce punctulato, utrinque vitta obsoleta fusca ornato, ante basin leviter impresso, lateribus sub-recto, basi profunde bi-sinnato; elytris medioeriter punctato-striatis, setis albidis sat dense adpersis; femoribus subtus dente parvo, acuto armatis. — Long. 5— $5\frac{1}{4}$, lat. $2\frac{1}{4}$ —2 $\frac{1}{2}$ millim.

Patria: China (Hongkong).

Caput breve, crassum, superne parum convexum, obsolete punctulatum, nigrum, dense cinereoalbedo-squamosum. Frons plana, tenuiter, longitudinaliter canaliculata. Oculi ovati, hand convexi, nigri. Rostrum capite parum longius et angustius, crassum, sub-rectum, superne planum, colore et indumento capitis, apice triangulariter emarginatum. Antennae minus tenues, piceae, cinereo-pubescentes. Prothorax latitudine brevior, apice late sed parum profunde rotundato-emarginatus, lobis ocularibus productis, lateribus hand ampliatis, fere rectis; basi sat profunde bisinuatus, superne modice convexus, niger, sat crebre punctulatus, squamulis cinereo-albidis vestitus, utrinque vitta sub-denudata notatus, ante basin leviter impressus. Scutellum parvum, rotundatum, nigrum, cinereoalbedo-squamosum. Elytra antice singulatim rotundato-producta, prothorace latiora et triplo longiora, pone basin oblique ampliata, dein ultra medium nonnihil ampliata,

apice conjunctim rotundata, superne convexa, postice declivia; nigra, mediocriter punctato-striata, squamis densis cinereo-albidis obsita, interstitiis parum convexus, setis brevibus albidis adspersis. Corpus subtus nigrum, subtiliter crebre punctulatum, sat dense cinereoalbido-squamosum. Pedes nigri, punctulati, cinereo-albido-squamulosi; femoribus parum clavatis, subtus ante apicem dente brevi armatis; tibiis teretibus, rectis.

Rhynchuchus

(a *ῥύγχος* rostrum et *ἔζω* habeo).

Tab. II. fig. 3.

Antennae sat longae, sub-tenuēs; scapus clavatus, oculos superans; articulis funiculi primo parvo, sequentibus crasiore, secundo elongato, reliquis brevissime obconicis; clava oblongo-ovata, acuminata.

Rostrum breve, crassum, capite angustius, superne planum, scrobes lineares, curvatos.

Oculi parvi, semiglobosi.

Prothorax parvus, basi apiceque truncatus, lateribus modice rotundatus, anterie paullo angustior, intra apicem vix constrictus.

Elytra oblonga, modice convexa, basi truncata, infra medium attenuata, apice acuminata; humeris sub-elevatis, obtuse angulatis.

Pedes mediocres; femoribus modice incrassatis, muticis; tibiis rectis, muticis; unguiculis parvis, divaricatis, non dentatis.

263. **Rhynchuchus acuminatus.**

Oblongus, modice convexus, nigro-piceus, pube grisea parce adspersus; antennis pedibusque rufo-ferrugineis; fronte rostroque canaliculatis; prothorace crebre granulato; elytris ferrugineis, mediocriter punctato-striatis, interstitiis sub-levibus. — Long. $3\frac{1}{2}$ — $3\frac{3}{4}$, lat. 1— $1\frac{1}{4}$ millim.

Patria: Insula Puna.

Magnitudo *Polydrosi cervini*. Mas femina multo angustior. Caput breve, latum, superne parum convexum, nigro-piceum, sub-nitidum, subtiliter, crebre punctulatum, subtus subargenteo-squamosum. Frons canalicula tenui, usque ad apicem rostri continuata insculpta. Oculi parvi, semiglobosi, nigri. Rostrum capite vix longius sed nonnihil angustius, crassum, superne planum, colore, punctura et indumento capitis. Antennae ad prothoracis basin fere pertingentes, dilute rufo-ferrugineae, parce pilosae, clava cinereo-pubescente. Prothorax parvus, latitudine nonnihil brevior, basi apiceque truncatus, anterie nonnihil angustior, lateribus pone apicem leviter rotundato-ampliatus, nigro-piceus, granulis sat magnis, crebris pubeque depressa, tenui grisea obsitus. Scutellum parvum, sub-triangulare, nigro-piceum. Elytra antice fere truncata, prothorace dimidio latiora et fere triplo longiora, humeris elevatis, rotundatis; lateribus ultra medium non ampliata, dein attenuata, apice acuminata, superne modice convexa, ferruginea, sub-nitida, pube sat longa grisea adspersa, mediocriter punctato-striata, interstitiis sub-planis, levibus. Corpus subtus piceum, nitidum, subtiliter punctulatum, squamulis cinereis parce adspersum. Pedes mediocres, dilute rufo-ferruginei, parce cinereo-pubescentes.

Tab. II. fig. 3. a. magn. auct., b. magn. nat., c. caput et rostrum superne vis., d. antenna, e. tars. antic.

264. **Peritelus sellatus.**

Oblongo-ovatus, modice convexus, piceus, cinereo-squamosus et breviter, parce albidio-setulosus; antennis pedibusque ferrugineis; prothorace angusto, sub-cylindrico, dorso parce punctato, dilute brunneo-squamoso; elytris subtiliter punctato-striatis, interstitiis planis, dorso antico plaga magna, communi, postice dilatata, dilute brunnea, apice umbrino-marginata. — Long. $5\frac{1}{2}$ — $6\frac{1}{4}$, lat. $2\frac{1}{4}$ — $2\frac{3}{4}$ millim.

Patria: California (St. Francisco).

P. griseo longitudine aequalis, sed angustior, aliter coloratus, antennis prothoraceque longioribus. Caput breve, sat latum, superne fere planum, piceum, subtiliter punctulatum, squamulis griseis dense vestitum. Frons canalicula tenui, usque ad apicem rostri continuata notata. Oculi sub-rotundati, convexi, nigri. Rostrum capite paullo longius et angustius, crassum, supra planum, punctulatum, griseo-squamosum, utrinque leviter carinatum, apice denudatum, emarginatum, ciliatum. Antennae dimidio corpore longiores, subtenues, ferrugineae, griseo-pilosae, articulo primo parce cinereo-squamoso; clava oblongo-ovata, acuminata, pubescente. Prothorax latitudine vix longior, basi apiceque truncatus, antice posticeque vix angustatus, medio parum rotundato-amplius, superne modice convexus, piceus, squamis cinereis pubesque brevi albidis obsitus, dorso late, dilute brunneo-squamosus, parce, sat profunde punctatus. Scutellum nullum. Elytra oblongo-ovata, antice sub-truncata, prothorace haud latiora, quam lata dimidio longiora, pone humeros subito rotundato-amplata, infra medium angustata, apice obtuse acuminata; superne modice convexa, postice declivia, lateribus inflexa, subtiliter punctato-striata, interstitiis planis; picea, dense cinereo-squamosa, setulis brevibus albidis parce, seriatim adspersa, dorso a basi ultra medium plaga magna, communi, postice valde dilatata, dilute brunneo-squamosa, apice undulatum umbrino-marginata ornata. Corpus subtus crebre punctulatum, sat dense cinereo-squamosum. Pedes ferruginei, cinereo-squamulosi et albidopubescentes; femoribus modice clavatis, muticis; tibiis teretibus, rectis.

265. *Celeuthetes deplanatus*.

Oblongo-ovatus, sub-depressus, obscure ferrugineus, squamis brunneis cinereisque mixtis metallico-micantibus vestitus; prothorace remote rugoso-punctato, dorso antico obsolete carinato; elytris dorso planis, apice compressis, emarginatis, medioeriter punctato-striatis, interstitiis sexto septimoque elevatis, ante apicem conjunctis, abbreviatis, illo crenulato. — Long. $8\frac{1}{2}$ –10, lat. $4\frac{1}{2}$ –5 millim.

Patria: Insula Punijpet.

Caput breve, modice convexum, subtiliter, crebre ruguloso-punctatum, piceum, squamulis dilute brunneis metallico-micantibus obsitum, stria transversa, arcuata, impressa a rostro distinctum. Oculi modice rotundati, convexi, nigri. Rostrum porrectum, piceum, capite parum longius et angustius, crassum, parum arcuatum, supra fere planum, crebre punctulatum, parcius viridiargenteo-squamosum, a basi ultra medium tenuiter carinatum. Antennae dimidio corpore longiores, validae, piceae, cinereo-squamulosae et pilosae, clava oblonga, acuminata, pubescente. Prothorax latitudine postica nonnihil longior, basi apiceque truncatus, antice angustior, leviter coarctatus, ad medium magis, dein minus angustatus; superne parum convexus, obscure ferrugineus, crebre rugoso-punctatus, dorso antico obsolete carinatus, squamis dilute brunneis, ad latera cinerascensibus sat dense obsitus, utrinque prope basin macula sat magna e squamis pallidis. Scutellum haud conspicuum. Elytra antice conjunctim leviter rotundato-emarginata, prothoracis basi parum latiora, quam lata duplo longiora, pone basin modice rotundato-amplata, infra medium sensim angustata, apice ipso sat profunde emarginata, in dorso fere plana, ad latera valde inflexa, tota obscure ferruginea, squamis rotundis, dilute brunneis, cupreo-micantibus vestita, maculis sparsis, indeterminatis, parvis, cinereis variegata, ante apicem rare pallido-setulosa; medioeriter, punctato-striata, interstitiis planis, sexto et septimo elevatis, ante apicem conjunctis, abbreviatis, illo antice obsoletius, postice evidentius crenulato. Corpus subtus piceum, subtiliter punctulatum; pectore dense, abdomine parce cupreo-squamosis, hoc parce setosum. Pedes longiusculi, validi, picei, cupreo-squamulosi et parce albidopubescentes; femoribus crasse clavatis, muticis; tibiis teretibus, rectis.

266. *Celeuthetes subfasciatus*.

Ovatus, modice convexus, niger, cinereo-squamosus; antennis validioribus; prothorace oblongo, sat crebre punctato; elytris medioeriter punctato-striatis, fascia ante me-

dium, retrorsum obliqua apiceque brunneo-squamosis, interstitiis leviter convexis, subtiliter, confertim alutaceis, parce breviter albido-setulosis. — Long. 6, lat. 3 millim.

Patria: Insula Guam.

C. cinerascens magnitudine et fere statura aequalis. Caput transversum, leviter convexum, subremote punctulatum, nigrum, dense cinereo-subargenteo-squamosum, postice transversim denudatum, stria arcuata impressa a rostro distinctum. Oculi parvi, semiglobosi, nigri. Rostrum capite paullo angustius sed vix longius, crassum porrectum, superne planum, nigrum, punctulatum, non canaliculatum, basi cinereo-squamosum. Antennae longitudine dimidii corporis, validae, piceae, parce griseo-squamosae et pilosae. Prothorax latitudine media fere dimidio longior, basi apiceque truncatus, antice magis, postice minus angustatus, lateribus paullo rotundato-ampliatus, superne parum convexus, niger, sat crebre punctatus, squamis cinereis dense vestitus, basi utrinque macula oblonga, plus minusve distincta, sub-denudata notatus. Scutellum nullum. Elytra antice truncata, prothoracis basi haud latiora, pone basin oblique ampliata, infra medium attenuata, apice conjunctim sub-acuminata, quam lata dimidio longiora, in dorso paullo convexa, postice declivia, mediocriter punctato-striata, interstitiis leviter convexis, confertim, subtiliter alutaceis; nigra, dense cinereo-squamosa et parce breviter albido-setulosa, ante medium fascia modice lata, retrorsum obliqua apiceque toto sat late brunneo-squamosis. Corpus subtus punctulatum, nigro-piceum, cinereo-squamosum. Pedes longiusculi, validi, nigri, griseo-squamulosi et pubescentes; femoribus clavatis, muticis; tibiis teretibus, rectis.

267. *Ceonthetes impurus*.

Ovatus, convexus, niger, squamulis griseis sat densis setisque raris albidis obsitus; antennis tibiisque ferrugineis; prothorace oblongo, profunde, minus crebre punctato; elytris mediocriter punctato-striatis, interstitiis, praesertim tertio et quinto, pone medium convexis, subtiliter, crebre alutaceis. — Long. $4\frac{1}{2}$ — $4\frac{3}{4}$, lat. 2 — $2\frac{1}{2}$ millim.

Patria: Insula Guam.

Statura fere *C. insularis*, minor, aliter coloratus, prothorace parcius, profundius punctato; elytris subtilius punctato-striatis. Caput modice convexum, nigrum, sat crebre punctulatum, squamulis griseis, postice viridi-argenteis obsitum, stria transversa, arcuata, impressa a rostro distinctum. Oculi parvi, semiglobosi, nigri. Rostrum capite paullo angustius sed vix longius, crassum, porrectum, superne planum, punctulatum, non canaliculatum, nigrum, griseo-squamosum, apice denudatum. Antennae dimidio corpore longiores, validae, obscure ferrugineae, cinereo-pilosae, clava oblonga, dense pubescenti. Prothorax latitudine media nonnihil longior, basi apiceque truncatus, antice magis, postice minus angustatus, lateribus leviter rotundato-ampliatus, superne paullo convexus, niger, minus crebre, sat profunde punctatus, squamis griseis sat dense obsitus. Scutellum nullum. Elytra antice truncata, ibique prothoracis basi haud latiora, pone basin oblique ampliata, infra medium attenuata, apice ipso conjunctim sub-acuminata, quam lata dimidio longiora, in dorso paullo convexa, postice declivia, mediocriter punctato-striata, interstitiis, praesertim tertio et quinto, pone medium convexis, subtiliter, crebre alutaceis; nigra, sat dense griseo-squamosa, setis raris, pallidis adpersa. Corpus subtus nigro-piceum, crebre punctulatum, parce griseo-squamosum. Pedes longiusculi, validi, obscure ferruginei, parce griseo-squamulosi et pubescentes; femoribus clavatis, muticis; tibiis teretibus, rectis.

268. *Otiorynchus setulosus*.

Oblongo-ovatus, convexus, piceus, sub-nitidus, setulis brevibus, depressis, albidis sat dense adpersus; antennis pedibusque ferrugineis; rostro leviter carinato; prothorace crebre granulato, dorso obsolete canaliculato, utrinque modice rotundato-ampliato; elytris ferrugineis, sat profunde punctato-striatis, interstitiis crebre rugoso-granulatis; femoribus subtus muticis. — Long. $4\frac{1}{4}$, lat. $2\frac{1}{4}$ millim.

Patria: Montevideo.

Caput sub-rotundatum, modice convexum, piceum, crebre, postice subtilissime, antice evidentius punctulatum. Oculi rotundati, parum convexi, nigri. Rostrum vix longitudine capitis at illo angustius, crassum, haud arcuatum, crebre punctulatum, superne planum, parce albedo-setulosum, medio leviter, longitudinaliter carinatum. Antennae fere ad prothoracis basin pertinentes, ferrugineae, parce fusco-pilosa, clava oblonga, acuminata, pubescente. Prothorax latitudine nonnihil longior, apice leviter rotundato-productus, antice magis, postice minus angustatus, medio modice rotundato-ampliatus, basi truncatus, superne modice convexus, piceus, sub-nitidus, crebre granulatus, setulis brevibus albidis sat dense adpersus, dorso obsolete, longitudinaliter canaliculatus. Scutellum vix conspicuum. Elytra antice sub-truncata, prothorace parum latiora at illo dimidio longiora, pone basin modice rotundato-ampliata, infra medium angustata, apice conjunctum rotundata, superne convexa, postice declivia, ferruginea, sub-nitida, setulis brevibus, albidis, minus dense vestita, sat profunde punctato-striata, interstitiis planis, subtiliter, crebre rugoso-granulatis. Corpus subtus piceum, parum nitidum, crebre rugoso-granulatum, parce albedo-setulosum. Pedes mediocres, ferruginei, punctulati, parce albedo-setulosi; femoribus modice clavatis, muticis; tibiis teretibus, rectis.

269. *Lixus inaequalis*.

Oblongus, convexus, niger, sub-nitidus, pube cinerea parce, inaequaliter obsitus; antennis ferrugineis; rostro brevi, crasso, parum arcuato; prothorace sub-conico, crebre rugoso-punctato, longitudinaliter canaliculato, utrinque ante basin leviter impresso, medio obsolete tuberculato; elytris subtiliter coriaceis, mediocriter punctato-striatis, pone scutellum et supra humeros leviter impressis, apice rotundatis, femoribus subtus muticis. — Long. 10, lat. 3 millim.

Patria: Nova Hollandia (Sidney).

Statura fere et similitudo *L. auriculati*, rostro brevior, crassior ab illo mox distinctus. Caput breve, crassum, modice convexum, nigrum, parum nitidum, subtiliter, crebre rugoso-punctatum, pube tenui, cinerea adpersum, inter oculos foveola parva, parum profunda notatum. Oculi oblongi, parum convexi, nigri. Rostrum capite vix duplo longius, crassum, cylindricum, parum arcuatum, punctura et indumento capitis. Antennae breviusculae, validae, ferrugineae, parce cinereo-pubescentes, clava oblonga, acuminata. Prothorax sub-conicus, latitudine dimidio fere longior, apice utrinque leviter emarginatus, lobis antocularibus parum productis, obtusis; ab apice ad basin sensim oblique ampliatus, basi leviter bi-sinuatus, superne convexus, niger, parum nitidus, crebre rugoso-punctatus, pube tenui, cinerea parce inaequaliter adpersus, dorso canalicula longitudinali, antice abbreviata insculptus, utrinque ante basin leviter impressus et medio tuberculo parvo, obsolete instructus. Scutellum nullum. Elytra antice sub-truncata, prothorace parum latiora at illo plus duplo longiora, pone basin nonnihil ampliata, dein lateribus recta, apice conjunctum rotundata, superne modice convexa, nigra, parum nitida, pube brevi, depressa, cinerea adpersa, subtiliter coriacea, mediocriter punctato-striata, ante apicem callo obsolete instructa. Corpus subtus nigrum, sub-nitidum, subtilissime, crebre punctulatum, pube cinerea sat dense obsitum. Pedes nigri, cinereo-pubescentes; femoribus parum clavatis, muticis.

Acanthobrachium

(ab *āzarḡa* spina et *βραχίον* brachium).

Tab. II. fig. 4.

Antennae longiusculae, tenues, non procul ab apice rostri insertae; funiculo septem-articulato, articulis duobus basalibus longiusculis, obconicis, reliquis brevibus nodosis; clava oblonga, valde acuta.

Rostrum cylindricum, modice arcuatum, capite cum prothorace vix longius.

Prothorax latitudine longior, apice rotundato-emarginatus, pone oculos distincte lobatus, anterieus angustior, basi leviter bi-sinuatus.

Scutellum parvum, apice rotundatum.

Elytra oblonga, antice conjunctim leviter rotundato-emarginata, prothorace parum latiora, superne modice convexa, apicem versus obsolete callosa, apice ipso singulatim rotundata, humeris parum elevatis, obtusis.

Pedes sat longi, validi; femoribus omnibus incrassatis, anterioribus subtus ante apicem deute valido, acuto, posticis dente maximo, triangulari armatis; tibiis, praesertim posticis, basi inflexis; tarsis modice dilatatis, subtus spongiosis; unguiculis brevibus, divaricatis, subtus obsolete dentatis.

Corpus oblongum, modice convexum, squamosum, mediocris magnitudinis.

Generi *Eribrano* primo intuitu simillimum, praecipue tamen differt structura prothoracis et armatura pedum.

270. *Acanthobrachium crassipes*.

Oblongus, modice convexus, piceus, sub-nitidus, squamis parvis, cinereis obsitus; antennis pedibusque obscure ferrugineis; rostro tenui, modice arcuato, leviter carinato; prothorace subtiliter, crebre punctulato, medio obsolete carinato; elytris subtiliter punctato-striatis, interstitiis subtilissime, crebre punctulatis. — Long. 6½, lat. 2½ millim.

Patria: Brasilia (Rio Janeiro).

Magnitudo *Eribrini* *Scirpü*. Caput parvum, rotundatum, convexum, piceum, parum nitidum, subtiliter, crebre punctulatum, squamis cinereis sat dense obsitum. Oculi ovati, parum convexi, nigri. Rostrum longitudine capitis cum prothorace, sub-tenuis, cylindricum, modice arcuatum, piceum, subtiliter, crebre punctulatum, squamulis cinereis sat dense adpersum, medio longitudinaliter anguste carinatum. Antennae obscure ferrugineae, parce cinereo-pubescentes. Prothorax latitudine brevior, apice rotundato-emarginatus, anteriore angustior, pone apicem ad medium rotundato-ampliatum, dein fere rectus, basi utrinque leviter sinuatus, superne modice convexus, piceus, sub-nitidus, subtiliter, creberrime punctulatus, squamis parvis cinereis sat dense vestitus, medio leviter, longitudinaliter carinatus. Scutellum parvum, piceum, punctulatum, cinereo-squamosum. Elytra antice conjunctim leviter rotundato-emarginata, prothorace parum latiora, quam lata duplo longiora, ad basin oblique ampliata, dein ultra medium fere recta, tum sensim angustata, apice singulatim rotundata, superne modice convexa, picea, sub-nitida, squamis parvis, cinereis dense tecta, subtiliter, regulariter punctato-striata, interstitiis planis, subtilissime, creberrime punctulatis, singulo elythro ante apicem tuberculo parvo, obsolete, albido-squamoso instructo. Corpus subtus piceum, sub-nitidum, subtiliter, creberrime punctulatum, squamis cinereis sat dense adpersum, segmentis duobus ultimis abdominis confuse ferrugineis. Pedes validi, ferruginei, crebre punctulati, cinereo-squamulosi.

271. *Eribrinus longirostris*.

Oblongus, convexus, rufo-ferrugineus; rostro prothorace longiore, cylindrico, arcuato; prothorace corporeque subtus nigris, illo subtiliter, crebre punctulato, pone apicem rotundato-ampliato; elytris mediocriter punctato-striatis, squamis parvis, cinereis parce, inaequaliter adpersis; femoribus muticis. — Long. 2, lat. 1 millim.

Patria: Nova Hollandia (Sidney).

Caput rotundatum, convexum, rufo-ferrugineum, sub-opacum, subtiliter, crebre punctulatum. Oculi rotundati, parum convexi, nigri. Rostrum longitudine fere prothoracis cum capite, minus tenue, cylindricum, arcuatum, rufo-ferrugineum, parum nitidum, subtiliter, crebre punctulatum. Antennae sub-tenues, rufo-ferrugineae. Prothorax latitudine vix longior, basi apiceque truncatus, anteriore angustior, lateribus pone apicem rotundato-ampliatum, superne convexiusculus, niger, sub-opacus, subtiliter, crebre punctulatus. Scutellum parvum, rotundatum, nigrum, vix nitidum. Elytra antice truncata, prothorace dimidio fere latiora, quam lata dimidio longiora, humeris vix elevatis, obtusis; lateribus non ampliata, infra medium sensim an-

gustata, apice conjunctim rotundata, medioeriter punctato-striata, interstitiis leviter convexis; rufo-ferruginea, parum nitida, squamis parvis, cinereis parce, inequaliter adspersa. Corpus subtus nigrum, crebre punctulatum. Pedes rufo-ferruginei, sub-nitidi, punctulati; femoribus modice incrassatis, subtus muticis.

272. *Notiodes nanus*.

Oblongus, niger, indumento griseo dense tectus; antennis pedibusque ferrugineis; rostro brevi, modice arcuato; prothorace confertim punctato, intra apicem leviter constricto; elytris punctato-striatis, haud convexis, non tuberculatis. — Long. $1\frac{1}{2}$, lat. $\frac{3}{4}$ millim.

Patria: Montevideo.

Notiod. nigrostri proximus, minor, praesertim angustior, prothorace antice parum constricto, dorso non canaliculato ab illo distinctus. Caput rotundatum, modice convexum, nigrum, subtiliter, crebre punctulatum, indumento griseo dense tectum. Oculi ovati, parum convexi, nigri. Rostrum vix longitudine prothoracis, crassum, breve, cylindricum, modice arcuatum, subtiliter, confertim punctulatum, indumento griseo vestitum, apice rufo-ferrugineo. Antennae sub-tenues, ferrugineae, clava ovata, cinereo-pubescente. Prothorax latitudine nonnihil brevior, apice truncatus, intra apicem leviter constrictus, lateribus parum ampliatus, basi sub-truncatus, superne parum convexus, niger, crebre punctulatus, indumento griseo dense tectus. Scutellum vix conspicuum. Elytra antice singulatum vix rotundato-producta, prothorace dimidio latiora et longiora, humeris non elevatis, rotundatis; lateribus ultra medium recta, dein sensim angustata, apice conjunctim rotundata, superne modice convexa, postice declivia, parum profunde punctato-striata, nigra, indumento griseo dense vestita, interstitiis haud convexis, non tuberculatis. Corpus subtus nigrum, confertim punctulatum, indumento griseo tectum. Pedes ferruginei, indumento griseo tecti; femoribus clavatis, muticis; tibiis teretibus, rectis.

273. *Anthonomus vestitus*.

Oblongo-ovatus, convexus, nigro-piceus, squamis piliformibus, cinereis dense vestitus; antennis pedibusque flavo-testaceis; femoribus clavatis, subtus unidentatis, apice late infuscat; rostro prothorace fere duplo longiore, leviter arcuato; prothorace sub-conico, confertim punctulato; elytris ferrugineis, medioeriter punctato-striatis, interstitiis sub-convexis, laevibus. — Long. $3\frac{1}{2}$, lat. 2 millim.

Patria: Insula Puna.

4. *Ulni* magnitudine aequalis. Caput parvum, rotundatum, modice convexum, nigro-piceum, subtiliter, crebre punctulatum, squamis setiformibus cinereis dense vestitum. Oculi parvi, rotundati, convexi, nigri. Rostrum prothorace fere duplo longius, tenue, cylindricum, leviter arcuatum, piceum, punctulatum, apice dilutius, basi parce cinereo-squamosum, leviter longitudinaliter carinatum. Antennae ad medium prothoracis pertingentes, tenues, pallide testaceae, clava ovata, fusca, cinereo-pubescente. Prothorax latitudine postica brevior, apice truncatus, anterieus angustior, pone apicem oblique, dein basin versus parum ampliatus, basi bisinuatus, superne convexusculus, nigro-piceus, crebre punctulatus, squamis piliformibus cinereis dense vestitus. Scutellum parvum, dense cinereo-squamosum. Elytra antice sub truncata, prothorace dimidio latiora et duplo longiora, humeris parum elevatis, rotundatis; lateribus inflexa, ultra medium perparum ampliata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, postice declivia, medioeriter, regulariter punctato-striata, interstitiis sub-convexis, laevibus; ferruginea, squamis piliformibus cinereis dense obsita. Corpus subtus nigro-piceum, punctulatum, dense cinereo-squamosum. Pedes longiusculi, flavo-testacei, cinereo-squamosi; femoribus clavatis, basi excepta, infuscat, subtus ante apicem dente parvo, acuto armatis; tibiis teretibus, sub-rectis.

274. *Anthonomus sparsus*.

Oblongo-ovatus, convexus, ferrugineus, pube cinerea parce, inaequaliter adpersus; antennis pedibusque flavo-testaceis; rostro capite cum prothorace nonnihil longiore, leviter arcuato; prothorace sub-conico, confertim punctulato, intra apicem constricto; elytris medioeriter punctato-striatis, interstitiis sub-convexis, laevibus; femoribus anticis, basi excepta, infuscatiss, subtus bidentatis, dente exteriori minutissimo, posticis ante apicem macula fusca ornatis, subtus breviter unidentatis. — Long. 2 $\frac{3}{4}$, lat. 1 $\frac{1}{4}$ millim.

Patria: Montevideo.

Magnitudine *A. Pyri*. Caput parvum, rotundatum, modice convexum, ferrugineum, subtiliter, crebre punctulatum, pube cinerea sat dense adpersum. Oculi parvi, rotundati, parum convexi, nigri. Rostrum capite cum prothorace nonnihil longius, tenue, cylindricum, leviter arcuatum, subtiliter punctulatum, ferrugineum, apice dilutius, ultra medium parce cinereo-squamulosum. Antennae ultra prothoracis medium pertinentes, tenues, testaceae, clava ovata, dilute fusca, cinereo-pubescente. Prothorax latitudine postica nonnihil brevior, apice truncatus, antice angustior, intra apicem leviter coarctatus, pone medium vix amplius, basi bi-sinuatus, superne modice convexus, obscure ferrugineus, subtiliter, crebre punctulatus, pube cinerea parce, inaequaliter adpersus. Scutellum parvum, cinereo-squamosum. Elytra antice sub-truncata, prothorace dimidio latiora et duplo longiora, humeris parum elevatis, rotundatis; lateribus inflexa, ultra medium ampliata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, postice declivia, medioeriter, regulariter punctato-striata, interstitiis parum convexis, laevibus; tota rufo-ferruginea, sub-nitida, pube depressa, cinerea parce, inaequaliter adpersa. Corpus subtus ferrugineum, punctulatum, squamis cinereis sat dense adpersum. Pedes longiusculi, flavo-testacei, parce pubescentes; femoribus anticis clavatis, basi excepta, infuscatiss, subtus deute valido et extus denticulo minuto armatis, posticis minus incrassatis, ante apicem macula fusca ornatis, subtus dente brevi, acuto instructis; tibiis intus medio paullo ampliatis.

275. *Anthonomus rubricosus*.

Oblongo-ovatus, convexus, niger, sub-nitidus, supra parce, subtus densius albido-squamosus; antennis pedibusque testaceis; rostro et clava antennarum nigris, illo longo, leviter arcuato, punctulato; prothorace ferrugineo, breviter conico, confertissime punctulato; elytris ferrugineis, medioeriter punctato-striatis, interstitiis laevibus; femoribus clavatis, subtus breviter unidentatis. — Long. 1 $\frac{1}{2}$, lat. 1 $\frac{1}{4}$ millim.

Var. *a*: femoribus medio plus minusve infuscatiss.

Patria: Brasilia (Rio Janeiro).

Statura et similitudo *A. Rubi* var. *a*, prothorace evidentius punctato, femoribus medio magis incrassatis. Caput parvum, rotundatum, modice convexum, nigrum, subtilissime punctulatum, parce albido-pubescent. Oculi parvi, rotundati, parum convexi, nigri. Rostrum capite cum prothorace nonnihil longius, tenue, cylindricum, leviter arcuatum, subtiliter punctulatum, nigrum, sub-nitidum, glabrum, apicem versus ferrugineum. Antennae fere ad basin prothoracis pertinentes, tenues, testaceae, clava ovata, nigra, pubescente. Prothorax latitudine postica nonnihil brevior, apice truncatus, antice angustior, lateribus basin versus oblique ampliatus, basi leviter bi-sinuatus, superne modice convexus, ferrugineus, subtiliter, creberrime rugoso-granulatus, squamis albidis dorso parce, ad latera densius adpersus. Scutellum dense albido-squamosum. Elytra antice sub-truncata, prothorace dimidio latiora et illo duplo longiora, humeris parum elevatis, rotundatis; lateribus inflexa, ultra medium perparum ampliata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, postice declivia, medioeriter, regulariter punctato-striata, interstitiis laud convexis, laevibus; tota ferruginea, nitida, pube albida parce adpersa. Corpus subtus nigrum, crebre, subtiliter punctulatum; squamis albidis sat dense obsitum. Pedes longiusculi, testacei, parce pallido-pubescentes; femoribus medio valde incrassatis, subtus ante apicem dente parvo, acuto armatis; tibiis teretibus, sub-rectis.

276. *Anthonomus gracilipes*.

Oblongo-ovatus, convexus, testaceus, squamis piliformibus silaceis dense vestitus; capite et clava antennarum nigris; rostro longo, leviter arcuato, punctulato; prothorace conico, confertissime punctulato; elytris medioeriter punctato-striatis, interstitiis laevibus; femoribus modice clavatis, subtus breviter unidentatis. — Long. 1½, lat. 1¼ millim.

Patria: Insula Taiti.

Magnitudo et similitudo *A. vulvicosi*, dilutius coloratus, undique dense silaceo-squamosus, femoribus anticis minus clavatis. Caput parvum, rotundatum, modice convexum, nigrum, subtilissime punctulatum, antice squamis piliformibus, silaceis dense vestitum. Oculi parvi, rotundati, parum convexi, nigri. Rostrum capite cum prothorace nonnihil longius, tenue, cylindricum, leviter arcuatum, subtiliter punctulatum, rufo-testaceum, fere glabrum. Antennae ad prothoracis basin fere pertingentes, tenues, testaceae, clava ovata, nigro-fusca, pubescente. Prothorax latitudine postica vix brevior, apice truncatus, antice angustior, basin versus oblique ampliatus, basi bi-sinuatus, superne modice convexus, rufo-testaceus, subtiliter, creberrime rugoso-granulatus, squamis piliformibus silaceis dense obsitus. Scutellum parvum, dense squamosum. Elytra antice sub-truncata, prothorace dimidio latiora et duplo longiora, humeris parum elevatis, rotundatis; lateribus inflexa, ultra medium perparum ampliata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, postice declivia, medioeriter, regulariter punctato-striata, interstitiis haud convexis, laevibus, tota rufo-testacea, squamis piliformibus silaceis dense obsita. Corpus subtus testaceum, punctulatum, parcius squamosum. Pedes longiusculi, testacei, parce pallido-pubescentes; femoribus modice incrassatis, subtus ante apicem dente parvo, acuto armatis; tibiis teretibus, sub-rectis.

277. *Anthonomus inermis*.

Oblongus, convexus, obscure ferrugineus, squamulis parvis cinereis dense vestitus; antennis basi testaceis; rostro capite cum prothorace vix longiore, leviter arcuato; prothorace conico, crebre punctulato; elytris medioeriter, regulariter punctato-striatis, interstitiis parum convexis, laevibus; femoribus subtus muticis. — Long. 1½, lat. 1 millim.

Patria: California (St. Francisco).

Affinis certe *A. gracilipedi*, minus latus, obscurius coloratus, cinereo-squamosus, rostro brevior, femoribus anticis muticis. Caput parvum, rotundatum, modice convexum, obscure ferrugineum, subtiliter, crebre punctulatum, dense cinereo-squamosum. Oculi parvi, rotundati, parum convexi, nigri. Rostrum vix capite cum prothorace longius, tenue, cylindricum, leviter arcuatum, subtiliter punctulatum, obscure ferrugineum, basi cinereo-squamosum. Antennae ad prothoracis basin vix pertingentes, tenues, testaceae, clava fusca, cinereo-pubescente. Prothorax conicus, latitudine postica nonnihil brevior, apice truncatus, antice angustior, lateribus basin versus oblique ampliatus, basi bi-sinuatus, superne modice convexus, obscure ferrugineus, subtiliter, crebre punctulatus, dense cinereo-squamosus. Scutellum cinereo-albido-squamosum. Elytra antice sub-truncata, prothorace nonnihil latiora et illo duplo longiora, humeris parum elevatis, rotundatis; lateribus inflexa, ultra medium nonnihil ampliata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, obscure ferruginea, dense cinereo-squamosa, medioeriter, regulariter punctato-striata, interstitiis haud convexis, laevibus. Corpus subtus nigro-piceum, punctulatum, sat dense cinereo-squamulosum. Pedes longiusculi, ferruginei, cinereo-squamulosi; femoribus modice clavatis, muticis; tibiis teretibus, rectis.

Omoides.

(α ὀμόιδης qui tumidis est humeris).

Tab. II. fig. 5.

Antennae sat longae, sub-tenues, ante medium rostri insertae; funiculo septemarticulato, articulo primo longo, reliquis crassiori, sequentibus brevibus, parvis; clava oblongo-ovata, acuminata.

Rostrum longitudine prothoracis, cylindricum, sub-tenuë, leviter arcuatum.

Oculi mediocres, rotundati, modice convexi.

Prothorax breviter sub-conicus, apice truncatus, intra apicem constrictus, basi leviter rotundatus.

Scutellum parvum, rotundatum.

Elytra obovata, antice truncata, lateribus non ampliata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, postice declivia, humeris elevatis, acuminatis.

Pedes mediocres subæquales; femoribus modice incrassatis, subtus muticis; tibiis teretibus, rectis.

278. *Omoides humeralis*.

Oblongo-ovatus, convexus, niger, parum nitidus; antennis, pedibus elytrisque ferrugineis; prothorace breviter conico, confertim punctulato, intra apicem constricto; scutello albido-pubescente; elytris sat crebre, regulariter punctato-striatis, interstitiis angustis, modice convexis, laevibus, humeris elevatis, acuminatis. — Long. 1½, lat. ¾ millim.

Patria: Chili (Valparaiso).

Caput parvum, oblongum, superne modice convexum, nigrum, parum nitidum, subtiliter, crebre punctulatum. Oculi rotundati, modice convexi, nigri. Rostrum longitudine prothoracis, sub-tenuë, cylindricum, leviter arcuatum, nigrum, sub-opacum, subtiliter, crebre punctulatum. Antennæ ante medium rostri insertæ, ad prothoracis basin pertingentes, ferrugineæ, clava ovata, acuminata, obscuriore. Prothorax breviter sub-conicus, apice truncatus, intra apicem leviter constrictus et transversim impressus, basin versus sensim ampliatus, postice leviter rotundatus, superne convexus, nigro-piceus, parum nitidus, subtiliter, crebre punctulatus. Scutellum parvum, rotundatum, pube albida dense vestitum. Elytra antice truncata, prothorace duplo latiora et longiora, humeris nonnihil elevatis, acuminatis; lateribus ultra medium recta, dein sensim angustata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, postice declivia, ferruginea, parum nitida, crebre distincte, regulariter punctato-striata, interstitiis angustis, modice convexis, laevibus. Corpus subtus nigrum, subtiliter, crebre punctulatum, teniter, breviter cinereo-pubescent. Pedes mediocres, rufo-ferruginei; femoribus modice clavatis, subtus muticis; tibiis teretibus, rectis.

Tab. II. fig. 5. a. magn. auct., b. magn. nat., c. caput et rostrum sup. vis., d. antenna, e. tibia et tars. antic.

279. *Tychius minutissimus*.

Oblongus, convexus, niger, squamis cinereis dense tectus; antennis totis, rostro apice pedibusque flavo-testaceis; prothorace sub-cylindrico, confertim punctulato; elytris medio-criter punctato-striatis. — Long. 1, lat. ½ millim.

Patria: Nova Hollandia (Sidney).

Caput sub-rotundatum, convexus, nigrum, subtiliter, crebre punctulatum, squamis cinereis dense obsitum. Oculi rotundati, modice convexi, nigri. Antennæ tenues, flavo-testaceæ, clava obscuriore. Rostrum longitudine fere prothoracis, cylindricum, modice arcuatum, crebre punctulatum, a basi ad medium nigrum, parce squamosum, dein testaceum, glabrum. Prothorax latitudine fere dimidio longior, basi apiceque truncatus, antérie nonnihil angustior, ante medium parum rotundato-ampliatus, superne convexus, niger, subtiliter, crebre punctulatus, dense cinereo-squamosus. Scutellum rotundatum, cinereo-squamosum. Elytra antice sub-truncata, prothorace dimidio latiora et fere duplo longiora, ultra medium recta, dein sensim angustata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, nigra, medio-criter punctato-striata, dense cinereo-squamosa, interstitiis haud convexis. Corpus subtus nigrum, punctulatum, parce squamosum. Pedes mediocres, flavo-testacei; femoribus modice incrassatis, muticis.

280. *Orchestes puberulus*.

Ovalis, modice convexus, niger, parum nitidus, pube pallida adpersus; antennarum articulis 2 et 3 testaceis; prothorace sub-conico, sat profunde, crebre punctato; elytris sat

profunde, crebre punctato-striatis, interstitiis leviter convexis; femoribus posticis subtus obsolete crenulatis. — Long. 2, lat. $1\frac{1}{2}$ millim.

Patria: California (St Francisco).

Magnitudo et statura *O. Signae*, pube albida adpersus ut et colore antennarum ab illo mox distinctus. Caput parvum, sub-globosum, nigrum, sub-opacum, crebre punctulatum, tenuiter albido-pubescent. Oculi magni, convexi, nigri, in fronte valde approximati. Rostrum prothorace nonnihil longius, cylindricum, parum arcuatam, tenue, nigrum, subtiliter, crebre punctulatum, pube brevi, depressa, albida adpersum. Antennae breviusculae, nigrae, parce pilosae, funiculo septem-articulato, articulis duobus basalibus testaceis. Prothorax sub-conicus, latitudine nonnihil longior, apice truncatus, antice dimidio angustior, basin versus sensim oblique ampliatus, basi bi-sinuatus, superne modice convexus, niger, parum nitidus, sat profunde, crebre punctulatus, pube brevi, cinereo-albida adpersus. Scutellum triangulare, nigrum, parce pubescens. Elytra antice sub-sinuata, prothorace dimidio latiora et plus duplo longiora, humeris elevatis, rotundatis; lateribus non ampliata, apice ipso conjunctim obtuse rotundata, superne parum convexa, nigra, haud nitida, pube albida adpersa, sat profunde, crebre punctato-striata, interstitiis leviter convexis. Corpus subtus crebre punctulatum, nigrum, minus dense albido-pubescent. Pedes validiusculi, nigri, pube albida obsiti; femoribus modice incrassatis, posticis subtus obsolete crenulatis; tibiis sub-compressis, rectis.

281. *Haplonyx Schönherrii*.

Breviter ovatus, convexus, nigro-piceus, squamositate cinerea parce adpersus; prothorace breviter conico, crebre granulato, basi canaliculato; elytris rude punctato-sulcatis, interstitiis convexis, granulatis, pone medium fascia communi densius albido-squamosa; femoribus subtus breviter dentatis. — Long. $5\frac{1}{4}$ — $6\frac{1}{4}$, lat. $3\frac{1}{4}$ —4 millim.

Patria: Nova Hollandia (Sidney).

H. fusciculato nonnihil major. Caput rotundatum, convexum, nigro-piceum, crebre punctulatum, squamulis cinereis parce adpersum. Oculi rotundati, depressi, brunnei. Rostrum prothorace nonnihil longius, validum, perparum arcuatum, crebre rugoso-punctatum, basi leviter carinatum, nigro-piceum, sub-nitidum. Antennae nigro-piceae, cinereo-setulosae, et pubescentes. Prothorax breviter conicus, antice duplo angustior quam basi, apice utrinque leviter emarginatus, lateribus oblique ampliatis; basi profunde bi-sinuatus, lobo antescutellari emarginato; superne convexus, pulvinatus, sat crebre granulatus, postice longitudinaliter canaliculatus, nigro-piceus, squamis cinereis dorso parce, lateribus densius adpersus. Scutellum rotundatum, nigro-piceum, parce squamosum. Elytra ampla, antice singulatim leviter sinuata, prothorace fere duplo latiora, quam lata vix longiora, pone basin oblique ampliata, angulum obtusum, lateraliter extensum formantia, lateribus dein perparum angustata, apice conjunctim rotundata, superne valde convexa, rude, profunde, regulariter punctato-sulcata, interstitiis angustis, convexis, granulatis; picea, squamis cinereis parce, ad basin densius adpersa, pone medium fascia sat lata, transversa e squamis dilutioribus ornata. Corpus subtus nigro-piceum, sat crebre punctulatum, squamulis cinereis dense adpersum. Pedes validi, picei, punctati, cinereo-squamulosi; femoribus clavatis, subtus dente parvo, acuto armatis.

282. *Aleides adpersus*.

Longatus, piceus, pube depressa albida adpersus; rostro prothorace vix longiore, rugoso-punctato, leviter carinato; prothorace confertim, subtiliter granulato; elytris ferrugineis, sat profunde punctato-striatis, interstitiis rugulosis; tibiis anticis intus medio ampliatis. — Long. $5\frac{1}{4}$, lat. $2\frac{1}{4}$ millim.

Patria: Promontorium Bonae Spei.

A. rufo statura similis, aliter coloratus, rostro brevior, carinato, ab illo facile distinctus. Caput parvum, rotundatum, superne modice convexum, nigro-piceum, subtiliter, crebre punctulatum, pube tenuis-

sima, pallida adpersum. Oculi ovati, haud prominuli, nigri. Rostrum prothorace non longius, crassiusculum, teres, parum arcuatum, piceum, glabrum, undique evidenter, crebre rugoso-punctatum, medio leviter, longitudinaliter carinatum. Antennae piceae, parce pubescentes, clava ovata, acuminata. Prothorax longitudine basos brevior, apice leviter emarginatus, pone apicem constrictus, dein modice rotundato-amplius, lateribus fere rectis, basi profunde bi-sinuatus, superne modice convexus, piceus, sub-opacus, subtiliter, crebre rugoso-granulatus, squamulis pallidis adpersus. Scutellum minutum, rotundatum, sub-elevatum, piceum. Elytra antice singulatim valde rotundato-producta, prothorace vix latiora at illo plus duplo longiora, humeris vix elevatis, rotundatis; lateribus medio nonnihil angustata, apice conjunctim obtuse rotundata, superne modice convexa, intra basin transversim leviter impressa, sat profunde punctato-striata, punctis striarum oblongis, interstitiis planis, confertim rugulosis; ferruginea, pube depressa, albida inaequaliter adpersa. Corpus subtus piceum, punctulatum, squamis cinereis sat dense obsitum. Pedes longiusculi, ferruginei, crebre punctati, pube pallida dense adpersi; antici longiores et validiores; femoribus omnibus modice clavatis, subtus pone medium dente acuto armatis; tibiis sub-compressis, anticis arcuatis, intus medio ampliatis.

283. *Baridius linearis*.

Elongatus, leviter convexus, parallelus, niger, nitidus; rostro, antennis pedibusque rufo-ferrugineis, illo tenui, modice arcuato; prothorace latitudine longiore, sat crebre punctulato, pone apicem subito rotundato-ampliato, dein basin versus sensim angustato; elytris mediocriter punctato-striatis, basi apiceque rufescentibus, interstitiis sub-seriatim punctulatis. — Long. $3\frac{1}{4}$, lat. 1 millim.

Patria: Brasilia (Rio Janeiro).

Statura *B. longuli*, sed minor, aliter coloratus. Caput rotundatum, convexum, nigrum, nitidum, subtiliter, crebre punctulatum, glabrum. Oculi sat magni, parum convexi, nigri. Rostrum longitudine prothoracis, sub-tenuis, cylindricum, modice arcuatum, rufo-ferrugineum, nitidum, sub-laevae, glabrum. Antennae in medio rostri insertae, ad prothoracis medium pertingentes, minus tenues, rufo-testaceae, clava ovata, sub-acuminata. Prothorax latitudine dimidio longior, apice truncatus, mox pone apicem subito rotundato-amplius, dein lateribus basin versus sensim perparum angustatus, basi leviter bisinuatus, superne parum convexus, niger, nitidus, sat crebre, distincte punctulatus, glaber. Scutellum parvum, nigro-piceum, nitidum, laeve. Elytra antice singulatim vix rotundato-producta, prothorace haud latiora at illo fere duplo longiora, lateribus recta, apice conjunctim rotundata, superne leviter convexa, nigra, nitida, basi apiceque confuse rufescentia, mediocriter punctato-striata, interstitiis planis, punctis parvis seriatim impressa. Corpus subtus nigrum, sub-nitidum, minus crebre punctatum. Pectus postice impressum. Pedes rufo-ferruginei, nitidi, crebre punctulati; femoribus muticis, anticis reliquis longioribus et crassioribus.

284. *Baridius adpersus*.

Oblongus, modice convexus, niger, parum nitidus, supra parce, inaequaliter, subtus densius albo-squamosus; antennis pedibusque rufo-ferrugineis; rostro valde arcuato, longitudine capitis prothoracisque, hoc sat crebre, mediocriter punctulato, linea longitudinali, laevi notato; elytris mediocriter striatis, basi et pone medium densius albo-squamosis, interstitiis planis, creberrime punctulatis. — Long. $3\frac{1}{4}$, lat. $1\frac{1}{4}$ millim.

Patria: Montevideo.

Caput rotundatum, convexum, nigrum, parum nitidum, glabrum, subtiliter, crebre punctulatum, inter oculos foveola parva insculptum. Oculi parum convexi, nigri. Rostrum longitudine capitis prothoracisque, minus tenue, basi valde arcuatum, nonnihil crassiore, sub-compressum, subtiliter, crebre punctulatum, lateribus parce albo-squamosum. Antennae in medio rostri insertae, sub-tenuis, ferrugineae, parce cinereo-pubescentes, clava ovata, sub-acuminata. Prothorax latitudine vix longior, apice truncatus, intra apicem

leviter constrictus, dein modice rotundato-amplius, lateribus fere rectis; basi bisinuatus, angulis rotundatis; superne modice convexus, niger, parum nitidus, mediocriter, sat crebre punctulatus, dorso linea angusta, longitudinali, vix elevata instructus, utriusque vitta longitudinali e squamis sat densis, albis ornata. Scutellum albido-squamosum. Elytra antice conjunctim vix rotundato-emarginata, prothorace parum latiora et illo dimidio longiora, humeris hand elevatis, rotundatis; lateribus recta, apice conjunctim rotundata, dorso parum convexa, distincte striata, interstitiis planis, subtilissime, creberrime punctulatis; nigra, sub-nitida, basi et pone medium squamis setiformibus, albis sat dense adspersa. Corpus subtus nigrum, crebre punctulatum, squamis rotundis, albis sat dense vestitum. Pedes rufo-ferruginei, crebre punctulati, sat dense albo-squamulosi; femoribus modice clavatis, muticis.

285. *Baridius oblongus*.

Oblongus, leviter convexus, niger, parum nitidus, subtus parce albido-squamosus; antennis tibiisque ferrugineis; rostro modice arcuato, prothorace fere brevior, hoc oblongo, conferim punctato, dorso carinula brevi, levi, antice posticeque valde abbreviata instructo; elytris mediocriter punctato-striatis, interstitiis planis, sub-seriatim punctulatis. — Long. 3, lat. 1 millim.

Patria: Montevideo.

Statura *B. adspersi*, rostro breviori, prothorace longiori, profundius punctato, ab illo facile distinctus. Caput rotundatum, convexum, nigrum, sub-opacum, glabrum, subtiliter, crebre punctulatum. Oculi ovati, parum convexi, nigri. Rostrum prothorace nonnihil brevius, minus tenue, cylindricum, modice arcuatum, nigrum, parum nitidum, crebre punctulatum, a basi ultra medium tenuiter carinatum. Antennae in medio rostri insertae, sub-tenues, ferrugineae, parce cinereo-pubescentes. Prothorax latitudine dimidio longior, apice truncatus, intra apicem leviter constrictus, dein modice rotundato-amplius, basin versus rectus; basi leviter bisinuatus, superne parum convexus, niger, sub-opacus, crebre, sat profunde punctatus, dorso linea media sub-elevata, levi, antice posticeque valde abbreviata instructus, ad latera parce albido-squamulosus. Scutellum nigrum, sub-opacum, punctulatum. Elytra antice singulatim leviter rotundato-producta, prothorace paullo latiora et illo vix dimidio longiora, humeris parum elevatis, rotundatis; lateribus recta, apice conjunctim rotundata, in dorso parum convexa, distincte punctato-striata, interstitiis planis, sub-seriatim punctulatis. Corpus subtus nigrum, parum nitidum, crebre punctulatum, parce albido-squamosum. Pedes punctulati, parce squamulosi; femoribus nigris, muticis; tibiis tarsisque ferrugineis.

286. *Baridius versicolor*.

Oblongus, leviter convexus, niger, subtus densius, supra parcius albido-squamosus; rostro longo, tenui, arcuato; antennis pedibusque rufo-ferrugineis; prothorace sat crebre, mediocriter punctato; elytris rufo-testaceis, mediocriter punctato-striatis, interstitiis punctulatis, sutura leviter infuscata; singulo elytro prope suturam maculis duabus parvis e squamis albis ornato. — Long. 2½, lat. 1¼ millim.

Patria: Java.

Caput rotundatum, convexum, nigrum, nitidum, glabrum, subtilissime, crebre punctulatum, postice sub-laeve. Oculi sat magni, parum convexi, nigri. Rostrum latitudine capitis prothoracisque, sub-tenue, cylindricum, inflexum, arcuatum, rufo-ferrugineum, nitidum, glabrum, sub-laeve. Antennae in medio rostri sitae, ad prothoracis medium pertingentes, minus tenues, rufo-ferrugineae, clava ovata, acuminata, cinereo-pubescente. Prothorax latitudine vix longior, apice truncatus, intra apicem leviter constrictus, pone stricturam rotundato-amplius, dein lateribus fere rectis; basi leviter bi-sinuatus, superne convexusculus, niger, nitidus, mediocriter, sat crebre punctatus, dorso longitudinaliter late denudatus, lateribus et subtus sat dense albido-squamosus. Scutellum piceum, punctulatum, apice sub-emarginatum. Elytra antice singulatim leviter

rotundato-producta, prothorace nonnihil latiora et longiora, humeris rotundatis, obtusis; lateribus fere recta, apice conjunctim rotundata, in dorso parum convexa, rufo-testacea, sub-nitida, sutura leviter infuscata, medioeriter punctato-striata, interstitiis planis, punctulatis, squamis parvis, setiformibus, pallidis, sub-seriatis obsitis; singulo elytro prope suturam maculis duabus parvis e squamis albidis formatis notato, una in ipsa basi, altera mox pone medium. Pygidium sub-triangulari, ferrugineum, crebre rugoso-punctatum. Corpus subtus piceum, sub-nitidum, crebre punctatum, squamis albidis adpersum. Pedes rufo-ferruginei, crebre punctulati, parce albedo-squamulosi, geniculis infuscatis.

287. *Baridius californicus*.

Ovatus, modice convexus, nigro-piceus, nitidus, glaber; antennis pedibusque rufo-ferrugineis; rostro ferrugineo, modice arcuato, prothorace vix longiore, hoc brevi, sat crebre punctulato, pone apicem valde rotundato-ampliato; elytris castaneis, medioeriter punctato-striatis, punctis striarum minus crebris, interstitiis planis, laevibus. — Long. 1½, lat. 1¼ millim.

Patria: California (St Francisco).

Caput rotundatum, convexum, nigro-piceum, nitidum, glabrum, subtiliter, crebre punctulatum, glabrum. Oculi parum convexi, nigri. Rostrum longitudine prothoracis, minus tenue, cylindricum, modice arcuatum, ferrugineum, nitidum, subtiliter, crebre punctulatum. Antennae fere in medio rostri insertae, ad prothoracis medium attingentes, minus tenues, rufo-ferrugineae, clava ovata, acuminata, cinereo-pubescente. Prothorax latitudine dimidio brevior, apice truncatus, pone apicem subito rotundato-amplius, dein lateribus fere rectis; basi utrinque oblique truncatus, superne modice convexus, niger, nitidus, glaber, medioeriter, sat crebre punctulatus. Scutellum nigro-piceum, laeve. Elytra antice conjunctim parum rotundato-emarginata, prothorace nonnihil latiora, quam lata vix dimidio longiora, pone apicem leviter rotundato-ampliata, infra medium sensim perparum angustata, apice conjunctim rotundata, superne modice convexa, castanea, nitida, glabra, medioeriter punctato-striata, punctis striarum minus crebris, interstitiis planis, laevibus. Corpus subtus nigro-piceum, sub-nitidum, subtiliter, crebre punctulatum. Pedes rufo-ferruginei, punctulati; femoribus modice clavatis, muticis.

288. *Baridius picipennis*.

Ovatus, leviter convexus, niger, nitidus, glaber; antennis pedibusque ferrugineis; rostro modice arcuato, prothorace vix longiore, hoc brevi, sat crebre punctulato, pone apicem valde rotundato-ampliato; elytris piceis, medioeriter striatis, interstitiis planis, subtiliter punctulatis. — Long. 1½, lat. 1 millim.

Patria: Buenos Ayres.

Parvus. Caput rotundatum, convexum, nigrum, nitidum, glabrum, subtiliter, crebre punctulatum. Oculi parum convexi, nigri. Rostrum longitudine prothoracis, minus tenue, cylindricum, modice arcuatum, piceum, nitidum, glabrum, subtiliter, crebre punctulatum. Antennae fere in medio rostri insertae, ad prothoracis medium pertingentes, ferrugineae, clava ovata, acuminata. Prothorax latitudine nonnihil brevior, apice truncatus, pone apicem subito rotundato-amplius, dein lateribus fere rectis; basi utrinque leviter sinuatus, superne convexiusculus, niger, nitidus, glaber, medioeriter, sat crebre punctulatus. Scutellum nigrum, laeve. Elytra antice conjunctim leviter rotundato-emarginata, prothorace nonnihil latiora, quam lata vix dimidio longiora, pone basin nonnihil ampliata, dein lateribus recta, apice conjunctim rotundata, superne nonnihil convexa, picea, nitida, medioeriter profunde striata et in striis obsolete punctulata, interstitiis planis, subtilissime punctulatis. Corpus subtus nigrum, sub-nitidum, glabrum, crebre punctulatum. Pedes obscure ferruginei, punctulati; femoribus modice incrassatis, muticis.

Oodemas

(ab ὠδὴ ovum et δέμας corpus).

Tab. II. fig. 6.

Antennæ mediocres, sub-tenues; funiculo septem-articulato, articulis duobus basalibus reliquis nonnihil longioribus, sub-obconicis, clava parva, oblongo-ovata, acuminata.

Rostrum breve, crassiusculum, cylindricum, fere rectum.

Oculi parvi, rotundati, haud convexi.

Prothorax breviter sub-conicus, apice truncatus, basi leviter rotundatus.

Scutellum minutissimum, triangulare.

Elytra ovata, antice conjunctim leviter rotundato-emarginata, medio modice rotundato-ampliata, infra medium sensim angustata, apice conjunctim rotundata.

Pedes breviusculi, sub-aequales; femoribus parum incrassatis, subtus muticis, tibiis extus apice calcare brevi, inflexo armatis.

Generi *Baridlo* primo intuitu simile est hoc genus; rostro brevi, crasso, sub-recto ab illo bene distinctum.

289. Oodemas aeneus.

Ovatus, convexus, aeneus, nitidus, glaber; antennis, tibiis tarsisque piceis; rostro prothorace brevior, crasso, sub-recto, subtiliter punctulato; prothorace obsoletissime punctulato; elytris sat profunde, regulariter punctato-striatis, interstitiis haud convexis, laevibus. — Long. 3, lat. 1 $\frac{3}{4}$ millim.

Patria: Insula Oahu (Honolulu).

Caput rotundatum, convexum, nigro-aeneum, nitidum, subtilissime punctulatum. Oculi parvi, rotundati, haud convexi. Rostrum capite nonnihil longius et angustius, crassum, cylindricum, fere rectum, aeneum, nitidum, subtiliter, crebre punctulatum. Antennæ ante medium rostri insertæ, sub-tenues, piceæ, clava parva, ovata, acuminata, cinereo-pubescente. Prothorax sub-conicus, latitudine postica parum brevior, antice truncatus, postice leviter rotundatus, ab apice basin versus sensim oblique ampliatus, superne convexus, aeneus, nitidus, obsolete, crebre punctulatus. Scutellum parvum, triangulare, aeneum. Elytra antice conjunctim leviter rotundato-emarginata, prothorace parum latiora at illo duplo longiora, pone basin rotundato-ampliata, infra medium sensim angustata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, postice declivia, tota aenea, glabra, sat profunde, regulariter punctato-striata, punctis striarum minus crebris, interstitiis haud convexis, laevibus. Corpus subtus nigro-aeneum, nitidum, punctulatum. Pedes breviusculi, obsolete punctulati; femoribus nigro-aeneis, parum incrassatis, subtus muticis; tibiis tarsisque nigro-piceis, illis extus apice calcare brevi, inflexo armatis.

Tab. II. fig. 6. a. magn. auct., b. magn. nat., c. caput et rostrum sup. vis., d. antenna, e. tars. antic.

290. Centrinus urbanus.

Ellipticus, sub-depressus, niger, squamulis parvis dilute grisescentibus undique vestitus; antennis, rostro apicem versus pedibusque rufo-ferrugineis; prothorace crebre punctato, anterieus sensim angustato, leviter constricto; elytris tenuiter punctato-striatis, interstitiis planis; femoribus muticis. — Long. 5 $\frac{1}{2}$, lat. 1 $\frac{3}{4}$ millim.

Patria: Buenos Ayres.

Caput parvum, rotundatum, convexum, nigrum, sub-nitidum, subtiliter, crebre punctulatum, inter oculos squamis raris, pallidis adpersum. Oculi ovati, depressi, nigro-brunnei. Rostrum dimidio corpore fere longius, tenue, cylindricum, valde arcuatum, nigrum, sub-nitidum, laeve, basi parce squamulosum, a medio usque ad apicem ferrugineum, sub-deplanatum. Antennæ in medio rostri insertæ, tenues, rufo-ferru-

gineae, clava nigro-fusca. Prothorax latitudine postica brevior, antice multo angustior, apice sub-truncatus et intra apicem leviter constrictus, pone stricturam paullo rotundato-, dein sensim oblique amplius, basi utrinque leviter sinuatus, superne perparum convexus, niger, crebre punctulatus, squamis dilute grisescentibus dense vestitus. Scutellum rotundatum, nigrum, squamosum. Elytra antice sinuata, prothorace nonnihil latiora, quam lata paullo longiora, pone humeros attenuata, sub-triangularia, apice conjunctim rotundata, superne in dorso fere plana, mediocriter striata, striis in fundo punctatis, interstitiis planis, alutaceis; ferruginea, squamulis dilute grisescentibus undique obsita. Corpus subtus nigrum, crebre punctulatum, dense subargenteo-squamosum. Pedes mediocres, rufo-ferruginei, parcius pallido-squamulosi; femoribus parum crassis, muticis.

291. *Cryptorhynchus longimanus*.

Ovatus, convexus, dense griseo-squamosus; antennis ferrugineis; rostro brevi, modice arcuato; prothorace crebre punctulato, intra apicem constricto; elytris mediocriter punctato-striatis, punctis pupillatis, interstitiis sub-convexis, alternis obsolete fusco-granulatis; singulo elythro tuberculis duobus obtusis instructo; humeris lateraliter productis; pedibus longis, femoribus muticis; tibiis anticis intus apicem versus crenulatis. — Long. 10, lat. 5½ millim.

Patria: Nova Hollandia (Sidney).

Caput rotundatum, modice convexus, nigrum, punctulatum, dense griseo-squamosum. Oculi sub-ovati, modice convexi, nigri. Rostrum capite dimidio longius et angustius, crassum, modice arcuatum, apicem versus nonnihil ampliatum, crebre punctatum, griseo-squamosum, medio longitudinaliter, obsolete carinatum. Antennae non procul ab apice rostri insertae, breves, ferrugineae, parce pubescentes, clava oblongo-ovata, acuminata, nigro-fusca. Prothorax latitudine media vix brevior, apice utrinque leviter sinuatus, lobis antocularibus haud prominulis; intra apicem constrictus, pone stricturam rotundato-amplius, basin versus nonnihil angustatus, basi sub-truncatus, tenuiter reflexo-marginatus, superne convexus, niger, crebre punctulatus, squamis densis griseis vestitus. Scutellum parvum, oblongo-triangulari, parcius griseo-squamosum. Elytra antice conjunctim leviter rotundato-emarginata, prothorace dimidio latiora et illo duplo et dimidio longiora, pone basin oblique ampliata, callo humerali lateraliter producto, sub-acuminato; lateribus non ampliata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, postice declivia, nigra, dense griseo-squamosa, mediocriter punctato-striata, punctis pupillatis, interstitiis sub-convexis, alternis remote fusco-granulatis; singulo elythro tuberculis duobus obtusis instructo, uno validiore, in medio dorsi non procul a sutura, altero versus apicem a sutura magis distante. Corpus subtus nigrum, squamis griseis submetallico-micantibus tectum. Pedes longi, nigri, squamis griseis, sub-metallicis vestiti; femoribus medio incrassatis, subtus muticis; tibiis anticis intus infra medium crenulatis.

292. *Cryptorhynchus bicallosus*.

Oblongus, convexus, ferrugineus, squamis fusco-griseis pubesque brevi, erecta concolore obsitus; antennis pedibusque dilutioribus; rostro crasso, modice arcuato, medio tenuiter carinato; prothorace crebre punctato et parce granulato, ante medium rotundato-ampliato; elytris sat profunde punctato-striatis, fascia antica obliqua plagaque apicali, communi, pallido-squamosis; singulo longe ante apicem callo brevi, acuto instructo; femoribus muticis; tibiis posticis extus ante apicem fascia albo-squamosa ornatis. — Long. 7½, lat. 3½ millim.

Patria: Insula Puna.

Caput rotundatum, convexus, obscure ferrugineum, crebre punctatum, sat dense fuscogriseo-squamosum, inter oculos sat profunde foveolatum. Oculi sub-rotundati, parum convexi, nigri. Rostrum capite du-

plo longius at parum angustius, crassum, modice arcuatum, obscure ferrugineum, crebre punctulatum, fusco-griseo-squamosum, medio obsolete, longitudinaliter carinatum. Antennæ non procul ab apice rostri insertæ, breves, rufo-ferrugineæ, parce pilosæ, clava ovata sub-acuminata. Prothorax latitudine parum brevior, apice leviter rotundato-emarginatus, lobis anteoecularibus antrorsum prominulis, rotundatis, intra apicem constrictus, pone stricturam subito oblique ampliatus, dein rotundatus et basin versus sensim angustatus, basi leviter rotundatus, superne parum convexus, crebre punctulatus et parce granulatus, obscure ferrugineus, squamis fusco-griseis dense pubeque concolore parce obsitus. Scutellum ferrugineum. Elytra antice sub-truncata, prothorace dimidio latiora et illo fere triplo longiora, humeris rotundatis, non elevatis; lateribus longe ultra medium recta, dein angustata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, sat profunde punctato-striata, squamis fuscis dense pubeque brevi, concolore parcius obsita; in dorso antico fascia obsoleta retrorsum obliqua plagaque magna communi apicali pallido-squamosis, longe ante apicem in medio tuberculo brevi, acuto instructa. Corpus subtus rufo-ferrugineum, crebre punctulatum, parce pubescens. Pedes mediocres, rufo-ferruginei, parce pilosi; femoribus modice clavatis, muticis, posticis extus ante apicem transversim albidio-squamosis; tibiis anticis apicem versus nonnihil inflexis.

293. *Cryptorhynchus setulosus*.

Oblongus, parum convexus, niger, opacus, squamis albidis variegatus setisque brevibus, crassis, fuscis adpersus; rostro mediocriter longo, modice arcuato; prothorace inæquali, intra apicem profunde constricto, lateribus dense pallido-squamoso; elytris fasciis duabus retrorsum obliquis, pallido-squamosis, una ante, altera pone medium ornatis; femoribus subtus muticis. — Long. $3\frac{1}{4}$, lat. $1\frac{1}{4}$ millim.

Patria: Insula Guam.

Caput parvum, rotundatum, convexus, crebre punctulatum, nigrum, opacum, setis brevibus, crassis, nigro-fuscis obsitum. Oculi ovati, parum convexi, nigri. Rostrum longitudine fere capitis cum prothorace, minus crassum, modice arcuatum, nigrum, basi punctulatum, setosum, dein nonnihil deplanatum, nigrum, nitidum, sub-levé. Antennæ sub-tenues, obscure ferrugineæ, parce pilosæ, clava oblongo-ovata, acuminata. Prothorax latitudine vix longior, apice medio rotundato-productus, utrinque leviter sinuatus, lobis anteoecularibus modice prominulis, rotundatis; intra apicem sat profunde constrictus, pone stricturam leviter rotundato-ampliatus, dein fere rectus, basi parum bisinuatus, superne fere planus, inæqualis, crebre punctulatus, niger, dorso fusco-, lateribus sordide albidio-squamosus setisque brevibus, crassis, fuscis adpersus. Scutellum rotundatum, nigrum. Elytra antice sub-truncata, prothorace vix dimidio latiora, quam lata duplo longiora, humeris non elevatis, rotundatis; lateribus ultra medium recta, apice conjunctim rotundata, superne modice convexa, mediocriter punctato-striata, nigra, opaca, fasciis duabus retrorsum obliquis, una ante, altera pone medium e squamis pallidis formatis. Corpus subtus nigrum, crebre punctulatum, griseo-squamosum. Pedes nigri, squamis fuscis cinereisque variegati; femoribus modice clavatis, subtus muticis; tibiis teretibus, rectis.

294. *Cryptorhynchus gracilis*.

Elongatus, convexus, supra ferrugineus, sub-nitidus, pube cinerea adpersus, subtus nigro-piceus; rostro modice arcuato; prothorace oblongo, profunde, crebre punctato, intra apicem leviter constricto; elytris profunde, crebre punctato-striatis, dorso parce nigro-variegatis, postice albidio-fasciculatis, interstitiis angustis, convexis; femoribus subtus obsolete dentatis. — Long. $3\frac{1}{4}$, lat. 1 millim.

Patria: California (St Francisco).

Caput rotundatum, convexus, ferrugineum, sub-nitidum, crebre, mediocriter punctulatum. Oculi ovati, haud convexi, nigri. Rostrum longitudine prothoracis, minus tenue, modice arcuatum, ferrugineum, sub-nitidum, crebre punctulatum, pube brevi, cinerea parce adpersum. Antennæ rufo-ferrugineæ, clava ovata, di-

lutiore, dense cinereo-pubescente. Prothorax oblongus, latitudine dimidio longior, basi apiceque truncatus, antèrius nonnihil angustior, intra apicem leviter constrictus, medio modice rotundato-amplius; superne convexus, ferrugineus, sub-nitidus, crebre, profunde punctatus, basi tenuiter, longitudinaliter canaliculatus, pube cinerea parce adpersus. Scutellum parvum, nigro-piceum. Elytra antice sub-truncata, prothorace vix latiora at illo plus duplo longiora, pone humeros sensim nonnihil ampliata, a medio apicem versus attenuata, apice ipso conjunctim rotundata, superne convexa, postice declivia, crebre, sat profunde punctato-striata, interstitiis angustis, convexis; ferruginea, dorso maculis irregularibus nigris variegata, undique pube brevi, tenui, cinerea adpersa, postice in fasciculis nonnullis parvis condensata. Corpus subtus nigro-piceum, crebre punctulatum, vix squamosum. Pedes mediocres, ferruginei, punctati, parce pubescentes; femoribus antè apicem clavatis, subtus dente obsoleto armatis.

295. *Coelosternus apicalis*.

Oblongo-ovatus, convexus, niger, squamis grisescentibus vestitus; rostro sub-recto, medio linea longitudinali laevi notato; prothorace minus crebre punctato, intra apicem constricto, dorso antico fasciculis quatuor e setis brevibus, crassis, umbrinis instructo, lateribus linea albido-squamosa ornato; elytris parum profunde punctato-striatis, pone medium plaga magna, albido-squamosa insignitis, interstitiis alternis convexis, breviter setosis; femoribus subtus leviter dentatis. — Long. $4\frac{1}{2}$, lat. 2 millim.

Patria: Brasilia (Rio Janeiro).

Caput rotundatum, convexus, punctulatum, dense brunneo-squamosum, vertice transversim, fronte medio albo-squamosis. Oculi rotundati, distantes, parum convexi, nigri. Rostrum capite nonnihil longius et angustius, latum, planum, haud arcuatum, crebre punctatum, piceum, glabrum, medio linea longitudinali, vix elevata, laevi instructum. Antennae piceae, parce pubescentes. Prothorax latitudine postica nonnihil brevior, apice valde rotundato-productus, intra apicem late, transversim impressus, pone impressione modice rotundato-amplius, dein lateribus fere rectis; basi utrinque minus profunde sinuatus, superne modice convexus, minus crebre punctatus, niger, squamis grisescentibus dense tectus, dorso tenuiter canaliculatus, antice fasciculis quatuor e setis brevibus, crassis, umbrinis, duobus in margine apicali binisque in medio magis distantibus instructus, linea laterali albido-squamosa notatus. Scutellum parvum, rotundatum, elevatum, cinereo-squamosum. Elytra antice singulatim leviter rotundato-producta, prothorace dimidio latiora et illo fere duplo longiora, lateribus non ampliata, infra medium sensim angustata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, postice declivia, mediocriter punctato-striata, interstitiis alternis elevatioribus, sub-carinatis, breviter setosis; nigra, grisescenti-squamosa, a medio ad apicem plaga magna, communi, albido-squamosa. Corpus subtus nigro-piceum, parce punctatum, squamis raris cinereis adpersum. Pedes picei, punctulati, pallido-squamosi; femoribus parum clavatis, subtus medio dente parvo, acuto armatis; tibiis teretibus, rectis.

Acanthinomernus

(ab *ἀκανθίος* spinosus et *μήρ* femur).

Tab. II. fig. 7.

Antennae breviusculae, validae; funiculo quinque-articulato, articulo basali breviter obconico, reliquis latis, brevibus, clava sub-ovata, obtusa.

Rostrum validum, sub-cylindricum, leviter arcuatum, prothorace brevius.

Prothorax oblongus, convexus, antèrius angustior, apice leviter rotundato-productus, basi truncatus, pone oculos non lobatus, subtus vix canaliculatus.

Scutellum nullum.

Elytra oblongo-ovata, convexa, apice conjunctim rotundata.

Pedes mediocres, sat validi, femoribus clavatis, anterioribus muticis, posticis superne ante basin dente brevi, acuto armatis; tibiis teretibus, parum inflexis; unguiculis brevibus, divaricatis, inflexis, muticis.

Generi *Analei* affine sed differt præcipue antennarum funiculo quinque-articulato et armatura femorum posteriorum.

296. *Acanthinomerus armatus*.

Oblongo-ovatus, convexus, aeneus, nitidus, glaber; tibiis tarsisque ferrugineis; capite rostroque subtiliter, crebre punctulatis; prothorace sat crebre punctulato; elytris parum profunde punctato-striatis, interstitiis parce, disperse punctulatis. — Long. 3½, lat. 1½ millim.

Patria: Insula St Helena.

Analei aeneo primo intuitu sub-similis, sed nonnihil major, præsertim longior. Caput rotundatum, convexus, aeneum, nitidum, subtiliter, crebre punctulatum. Oculi parvi, rotundati, parum convexi, nigri. Rostrum prothorace nonnihil brevius, crassum, cylindricum, parum arcuatum, subtiliter, crebre punctulatum. nigrum aeneum, sub-nitidum, glabrum. Antennæ breviusculæ, sat validæ, in medio rostri insertæ, piceæ, clava parva, ovata, dilutior, obtusa, cinereo-pubescente. Prothorax latitudine dimidio fere longior, apice leviter rotundato-productus, pone oculos non lobatus, anterie angustior, lateribus modice rotundato-amplius, basi truncatus, superne convexus, aeneus, nitidus, glaber, crebre punctulatus. Scutellum nullum. Elytra antice conjunctim leviter rotundato-emarginata, prothorace nonnihil latiora et illo dimidio longiora, pone basin modice rotundato-ampliata, infra medium magis angustata, apice ipso conjunctim rotundata, superne convexa, postice declivia, aenea, nitida, glabra, parum profunde punctato-striata, interstitiis sparse punctulatis. Pedes validi; femoribus clavatis, crebre rugoso-granulatis, nigris, posticis superne ante basin dente brevi, acuto armatis; tibiis tarsisque ferrugineis.

Tab. II. fig. 7. *a.* magn. auct., *b.* magn. nat., *c.* caput et rostrum sup. vis., *d.* antenna, *e.* femora postica, *f.* tib. et tars. antic.

297. *Celiodes albovarius*.

Ovatus, modice convexus, niger, sub-opacus, squamis parvis, albidis variegatus; antennis pedibusque ferrugineis; prothorace crebre punctulato, dorso leviter sulcato, pone medium utrinque tuberculo acuto instructo, intra apicem constricto; elytris sat profunde punctato-striatis, interstitiis leviter convexis; femoribus muticis. — Long. 1½, lat. 1 millim.

Patria: Brasilia (Rio Janeiro).

Statura *C. dilyni*, sed minor. Caput rotundatum, convexus, nigrum, opacum, crebre punctulatum, squamulis cinereis parce adpersum, medio obsolete, longitudinaliter carinatum. Oculi modice convexi, nigro-brunnei. Rostrum latitudine fere capitis cum prothorace, cylindricum, modice arcuatum, nigrum, sub-nitidum, læve. Antennæ ante medium rostri insertæ, tenues, rufo-testaceæ, parce pubescentes, clava parva, ovata, acuminata. Prothorax latitudine vix brevior, apice rotundato-productus, reflexus, medio utrinque nonnihil elevatus, intra apicem constrictus, pone stricturam rotundato-amplius, basi bi-sinuatus, superne convexus, niger, opacus, crebre punctulatus, dorso leviter, longitudinaliter sulcatus, antice utrinque nonnihil elevatus, pone medium tuberculis duobus parvis, sub-acuminatis obsitus, squamis parvis albidis, in sulco dorsali et ad latera densioribus adpersus. Scutellum parvum, rotundatum, nigrum, opacum. Elytra antice leviter sinuata, prothorace nonnihil latiora, quam lata parum longiora, ad humeros rotundato-ampliata, a medio sensim angustata, apice singulatim rotundata, superne modice convexa, nigra, opaca, mediocriter punctato-striata, squamis albidis inæqualiter, submaculatim condensatis variegata, interstitiis planis, subtiliter coriaceis. Corpus subtile nigrum, crebre punctulatum, squamis parvis, albidis adpersum. Pedes punctati, albidum-squamulosi; femoribus nigris, modice clavatis, subtus muticis; tibiis tarsisque ferrugineis.

298. *Conotrachelus vilis*.

Oblongo-ovatus, convexus, piceus, parum nitidus, squamis parvis griseis parce adspersus; antennis pedibusque ferrugineis; rostro longitudine capitis prothoracisque, arcuato, crebre, longitudinaliter rugoso, prothorace crebre, medioeriter punctato, dorso longitudinaliter carinato; elytris medioeriter punctato-striatis, interstitiis alternis carinatis; femoribus subtus breviter midentatis. — Long. 5, lat. 2½ millim.

Patria: Buenos Ayres.

Caput rotundatum, convexum, piceum, sub-opacum, crebre granulatum, utrinque parce griseo-squamosum. Oculi parum convexi, nigro-brunnei. Rostrum longitudine capitis cum prothorace, minus tenue, arcuatum, rufo-piceum, sub-opacum, crebre longitudinaliter rugosum, medio obsolete carinatum. Antennae non procul ab apice rostri insertae, ferrugineae, parce pubescentes. Prothorax latitudine dimidio brevior, apice utrinque levissime sinuatus, lobis antocularibus parum promiulis, obtusis, antice quam basi multo angustior, intra apicem leviter constrictus, pone stricturam subito rotundato-amplius, lateribus dein rectis; basi bi-sinuatus, superne modice convexus, piceus, sub-opacus, medioeriter crebre punctatus, squamis raris piliformibus griseis adspersus, dorso longitudinaliter, distincte carinatus, carina levi, ante medium nomihil ampliata. Scutellum parvum, piceum, medio sub-carinatum. Elytra antice singulatim leviter rotundato-producta, prothorace dimidio latiora et illo plus duplo longiora, humeris non elevatis, rotundatis; lateribus ultra medium sensim, dein magis angustata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, postice declivia, medioeriter punctato-striata, interstitiis alternis planis, alternis carinatis; picea, sub-opaca, squamis parvis, griseis parce, inaequaliter adspersa. Corpus subtus piceum, crebre, sat profunde punctatum, squamis cervinis adpersum. Pedes validi, ferruginei, crebre punctati; femoribus modice clavatis, subtus pone medium dente brevi armatis.

299. *Conotrachelus histrio*.

Oblongo-ovatus, convexus, niger, parum nitidus, squamis albidis inaequaliter vestitus; antennis, tibiis tarsisque rufo-ferrugineis; rostro sat valido, modice arcuato, basi carinato; prothorace parce punctato, medio transversim impresso, breviter, longitudinaliter carinato; prothorace parce punctato, medio transversim impresso, breviter, longitudinaliter carinato; elytris densius albo-squamosis, parum profunde punctato-striatis, apice inaequaliter demidatis, interstitiis alternis leviter carinatis, internis antice interruptis; femoribus fusco-alboque variegatis, subtus breviter midentatis. — Long. 5, lat. 2¾ millim.

Patria: Buenos Ayres.

Caput rotundatum, convexum, crebre punctulatum, nigrum, squamis albidis sat dense adpersum, inter oculos transversim leviter impressum. Oculi ovati, parum convexi, nigri. Rostrum prothorace nomihil longius, sat validum, compressum, modice arcuatum, subtiliter, crebre punctulatum, basi ferrugineum, parce albedo-squamosum, ultra medium leviter carinatum, apicem versus nigrum, glabrum, sub-nitidum. Antennae sub-tenues, testaceae, parce pubescentes, clava ovata, acuminata. Prothorax latitudine nomihil brevior, apice utrinque sinuatus, medio leviter rotundato-productus, lobis antocularibus obtusis; antice quam basi dimidio angustior, intra apicem constrictus, pone stricturam modice rotundato-amplius, dein lateribus rectis; basi bi-sinuatus, angulis sub-elevatis, acuminatis; superne modice convexus, niger, squamis parvis, albidis inaequaliter adpersus, parce punctatus, dorso medio transversim impressus et breviter longitudinaliter carinatus. Scutellum parvum, rotundatum, piceum. Elytra antice singulatim leviter sinuata, prothorace duplo latiora, quam lata dimidio longiora, humeris non elevatis, obtusis; apicem versus sensim perparum angustata, apice ad suturam singulatim breviter producta, superne convexa, postice declivia, parum profunde punctato-striata, interstitiis alternis leviter elevatis, duobus internis antice interruptis; nigra, dense,

dorso antico parcius albo-squamosa, apice inaequaliter denudata. Corpus subtus nigrum, nitidum. Pectus dense albido-squamosum. Abdomen basi sat profunde punctatum. Pedes mediocres, punctulati; femoribus modice clavatis, albido-fuscoque variegatis, subtus dente brevi armatis; tibiis tarsisque rufo-ferrugineis.

300. *Conotrachelus bisignatus*.

Ovatus, convexus, rufo-piceus, squamis lutescentibus parce adpersus; antennis, rostro pedibusque rufo-ferrugineis, illo modice arcuato, leviter carinato, prothorace punctulato, areis tribus parvis, elevatis, laevibus, nitidis notato, intra apicem constricto; elytris dense albido-squamosis, mediocriter punctato-striatis, interstitiis alternis leviter carinatis; singulo elytro pone medium macula sat magna laterali, sub-denudata ornato; femoribus subtus breviter unidentatis. — Long. 4½, lat. 3 millim.

Patria: Buenos Ayres.

Caput rotundatum, convexum, ferrugineum, crebre punctulatum, squamis setiformibus lutescentibus adpersum. Oculi sub-ovati, parum convexi, nigri. Rostrum longitudine capitis cum prothorace, sub-tenuae, cylindricum, modice arcuatum, rufo-ferrugineum, punctulatum, parvisime squamosum, a basi ultra medium leviter carinatum. Antennae rufo-ferrugineae, parce pubescentes, clava ovata, acuminata. Prothorax latitudine nonnihil brevior, apice sub-truncatus, intra apicem distincte, transversim impressus, lateribus ante medium modice rotundato-ampliatis, dein fere rectis; basi truncatus, superne modice convexus, punctulatus, piceus, squamulis lutescentibus sat dense adpersus, areis tribus parvis, elevatis, laevibus, nitidis, una in medio dorsi binisque in disco basin versus propioribus instructus. Scutellum parvum, sub-triangulare, albido-squamosum. Elytra antice singulatim vix rotundata, prothorace fere duplo latiora, quam lata vix dimidio longiora, humeris non prominulis, obtusis; infra medium sensim angustata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, mediocriter punctato-striata, interstitiis alternis leviter carinatis; rufo-picea, squamis densis albidis tecta, singulo pone medium macula laterali transversa, sat magna, fere denudata. Corpus subtus piceum, parce punctulatum, squamulis raris lutescentibus adpersum. Pedes rufo-ferruginei, squamis lutescentibus et albidis variegati; femoribus modice clavatis, subtus dente parvo armatis.

301. *Conotrachelus lepidus*.

Oblongo-ovatus, convexus, piceus, squamis albidis inaequaliter vestitus; antennis, tibiis tarsisque rufo-testaceis; rostro tenui, modice arcuato; prothorace angusto, intra apicem constricto, apice fasciulis duobus parvis e setis lutescentibus instructo; elytris mediocriter punctato-striatis, interstitiis alternis leviter carinatis; sutura ultra medium late, dilute cervino-squamosa; femoribus subtus breviter unidentatis. — Long. 3½, lat. 1½ millim.

Patria: Montevideo.

Caput rotundatum, convexum, squamis setiformibus, albidis, ad oculos cervinis vestitum. Oculi ovati, parum convexi, nigri. Rostrum longitudine capitis prothoracisque, sub-tenuae, fere cylindricum, modice arcuatum, subtiliter punctulatum, piceum, nitidum, glabrum, apice ferrugineum. Antennae sub-tenuae, testaceae, parce pubescentes, clava ovata, acuminata. Prothorax angustus, latitudine vix brevior, apice utrinque leviter emarginatus, lobis antocularibus productis, rotundatis; intra apicem constrictus, lateribus pone stricturam leviter rotundato-ampliatis, dein rectis; basi bi-sinuatus, superne modice convexus, piceus, crebre punctulatus, squamis piliformibus albidis obsitus, margine apicali fasciulis duobus parvis, approximatis e setulis crassis lutescentibus instructus. Scutellum parvum, rotundatum, parcius squamosum. Elytra antice singulatim parum rotundato-producta, prothorace duplo latiora, quam lata fere dimidio longiora, humeris vix elevatis, rotundatis; lateribus ad medium recta, dein angustata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, postice declivia, mediocriter punctato-striata, interstitiis alternis leviter carinatis; picea, squamis pili-

formibus albidis, medio paucioribus obsita, sutura a basi ad medium sat late, dilute cervino-squamosa. Corpus subtus piceum, crebre punctatum, parce squamosum. Pedes punctulati; femoribus piceis, modice clavatis, subtus dente parvo armatis; tibiis tarsisque rufo-testaceis.

302. *Conotrachelus infirmus*.

Oblongo-ovatus, convexus, nigro-piceus, sub-nitidus; rostro sat longo, compresso, arcuato, cinereo-squamoso, medio leviter carinato; prothorace angusto, dense cervino-squamoso, utrinque nigro-vittato, dorso carina modice elevata, denudata instructo; clytris medioeriter punctato-striatis, basi plaga magna, communi, triangulari, cervino-squamosa ornatis, interstitiis alternis carinatis, carinis antierius interruptis; femoribus subtus breviter unidentatis. — Long. $3\frac{1}{4}$, lat. $1\frac{1}{2}$ millim.

Patria: Brasilia (Rio Janeiro).

Caput rotundatum, convexus, nigrum, opacum, crebre rugoso-granulatum. Oculi parvi, convexi, nigri. Rostrum capite cum prothorace nonnihil longius, minus tenue, compressum, arcuatum, nigrum, subopacum, crebre punctulatum, cinereo-squamosum, medio longitudinaliter carinatum, apice denudatum. Antennae piceae, parce pubescentes. Prothorax latitudine vix brevior, apice utrinque sinuatus, medio rotundato-productus, lobis anteocularibus prominulis, rotundatis; intra apicem leviter constrictus, lateribus pone stricturam paulo ampliatis, dein fere rectis; basi leviter bi-sinuatus, superne modice convexus, niger, subtiliter punctulatus, squamis piliformibus cervinis vestitus, utrinque vitta laterali fusca, sub-denudata ornata, dorso longitudinaliter, anguste carinatus, carina denudata. Scutellum parvum, ovatum, nigrum, opacum. Elytra antice sub-truncata, prothorace duplo latiora, quam lata dimidio longiora, humeris leviter rotundatis; pone humeros apicem versus sensim angustata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, postice declivia, medioeriter punctato-striata, interstitiis 2, 4, 6 et 8 carinatis, duobus interioribus interruptis; nigro-picea, squamis griseis parce adpersa, plaga magna basali, communi, triangulari maculaque parva ante-apicali e squamis piliformibus cervinis ornata. Corpus subtus nigrum, nitidum, punctulatum, parce cinereo-pubescent. Pedes nigri, opaci, crebre punctulati; femoribus modice clavatis, subtus pone medium dente parvo armatis; tarsis obscure ferrugineis.

303. *Conotrachelus variegatus*.

Ovatus, modice convexus, piceus, parum nitidus, squamulis cinereo-albidis variegatus; rostro longo, tenui, cylindrico, arcuato; prothorace crebre punctulato, intra apicem constricto; clytris tenuiter punctato-striatis, interstitiis omnibus planis; femoribus parum clavatis, subtus acute unidentatis. — Long. $1\frac{1}{4}$, lat. 1 millim.

Patria: Brasilia (Rio Janeiro).

Parvus. *C. rubicundulo* statura non dissimilis sed minor, non pilosus. Caput rotundatum, convexus, piceum, subtiliter, crebre punctulatum, postice denudatum, antice cinereo-squamosum. Oculi ovati, parum convexi, nigri. Rostrum capite cum prothorace dimidio longius, tenue, cylindricum, arcuatum, ferrugineum, sub-nitidum, fere glabrum, basi obsolete punctulatum, vix carinatum. Antennae tenues, ferrugineae, parce pubescentes. Prothorax latitudine nonnihil brevior, apice sub-truncatus, intra apicem leviter constrictus, pone stricturam parum rotundato-, dein sensim oblique ampliatus, basi bi-sinuatus, superne modice convexus, piceus, subtiliter, crebre punctulatus, squamis cinereis dense vestitus, dorso maculis quatuor transversis, sub-denudatis, duabus ante binisque pone medium notatis. Scutellum parvum, sub-rotundatum, piceum. Elytra antice singulatim leviter rotundato-producta, prothorace dimidio latiora, quam lata paulo longiora, humeris vix elevatis, rotundatis; pone humeros ultra medium sensim, dein magis angustata, apice conjunctim rotundata, superne modice convexa, postice declivia, picea, sub-opaca, squamis cinereis inaequa-

liter condensatis variegata, tenuiter punctato-striata, interstitiis omnibus planis. Corpus subtus crebre punctulatum, piceum, dense cinereo-squamosum. Pedes sat longi, minus validi, obscure ferruginei, squamis cinereis sat dense adpersi; femoribus parum clavatis, subtus dente parvo acuto armatis.

304. *Copturus rufinusus*.

Ovatus, parum convexus, niger, sub-opacus, supra parce, subtus densius albido-squamosus; antennis, rostro arcuato a medio ad apicem tarsisque testaceis; prothorace subtiliter, crebre punctulato, intra apicem leviter constricto; elytris sat profunde punctato-striatis, margine apicali testaceis, interstitiis crebre punctulatis; femoribus subtus dente valido armatis. — Long. 2, lat. $1\frac{1}{3}$ millim.

Patria: Java.

Caput globosum, nigrum, punctulatum, subtus sat dense albido-squamosum. Oculi majusculi, ovati, convexi, nigri, in fronte valde approximati. Rostrum prothorace nonnihil longius, minus tenue, sub-compressum, arcuatum, punctulatum, a basi ad medium nigrum, albido-squamosum, dein apicem versus testaceum, glabrum. Antennae fere medio rostri insertae, sub-tenues, testaceae, clava ovata, sub-obtusa. Prothorax latitudine vix brevior, apice truncatus, lobis anticis non prominulis, intra apicem leviter constrictus, pone stricturam modice rotundato-amplius, basi utrinque introrsum oblique truncatus, superne modice convexus, niger, sub-opacus, squamulis albidis parce adpersus, crebre punctulatus. Scutellum parvum, rotundatum, nigrum. Elytra antice introrsum oblique truncata, prothorace latiora at illo vix dimidio longiora, pone basin subito rotundato-ampliata, dein apicem versus sensim angustata, apice conjunctim rotundata, obtusa, superne parum convexa, nigra, sub-opaca, squamis albidis parce adpersa, sat profunde punctato-striata, margine apicali anguste testacea, interstitiis planis, subtiliter, crebre punctulatis. Corpus subtus nigrum, punctulatum, sat dense albido-squamosum; segmento ultimo abdominis utrinque breviter dentato. Pedes longi, validi, nigri, punctulati, squamis albidis adpersi; femoribus subtus ante apicem dente valido armatis; tarsi testaceis.

305. *Centorhynchus sellatus*.

Ovatus, modice convexus, piceus, parce, inaequaliter pallido-squamosus; antennis, rostro pedibusque rufo-testaceis; prothorace sub-conico, confertim punctulato; elytris medio-criter punctato-striatis, dense pallido-squamosis, dorso plaga sat magna communi, denudata notatis; femoribus subtus muticis. — Long. $2\frac{1}{4}$, lat. $1\frac{1}{3}$ millim.

Patria: Buenos Ayres.

Caput rotundatum, convexum, crebre punctulatum, piceum, squamis pallidis sat dense adpersum. Oculi rotundati, parum convexi, nigri. Rostrum longitudine capitis cum prothorace, tenue, cylindricum, modice arcuatum, rufo-testaceum, basi punctulatum, parce squamosum, apicem versus laeve, glabrum. Antennae sub-tenues, rufo-testaceae, clava oblongo-ovata, acuminata, nigro-fusca. Prothorax sub-conicus, latitudine postica vix longior, apice sub-truncatus, intra apicem constrictus, pone stricturam sensim oblique amplius, basi utrinque leviter sinuatus, superne modice convexus, piceus, sub-opacus, utrinque vitta minus lata e squamulis pallidis ornatus. Scutellum parvum, rotundatum, piceum. Elytra antice conjunctim vix rotundato-emarginata, prothorace dimidio latiora, quam lata nonnihil longiora, humeris vix elevatis, obtusis; lateribus fere ad medium recta, dein sensim angustata, apice singulatim rotundata, superne modice convexa, medio-criter punctato-striata, interstitiis planis; picea, sub-nitida, squamis pallidis dense vestita, pone medium plaga sat magna, communi, denudata, antice rotundata, postice sub-truncata insignita. Corpus subtus piceum, crebre punctulatum, dense albido-squamosum. Pedes medio-cres, rufo-testacei, albido-squamosi; femoribus modice clavatis, muticis; tibiis teretibus, rectis.

306. *Nanophyes nigrifolus*.

Ovatus, convexus, niger, nitidus, parce cinereo-pubescent; antennis femoribusque basi flavo-testaceis; rostro leviter arcuato, basi carinato; prothorace breviter conico, confertim punctulato; elytris subtiliter punctato-striatis, interstitiis planis, laevibus; femoribus subtus muticis. — Long. $1\frac{1}{2}$, lat. $\frac{1}{3}$ millim.

Patria: Malacca.

Caput parvum, oblongum, modice convexus, nigrum, sub-nitidum, subtiliter, crebre punctulatum, vix pubescens. Oculi rotundati, parum convexi, nigri. Rostrum longitudine capitis cum prothorace, validiusculum, cylindricum, leviter arcuatum, nigrum, fere glabrum, punctulatum, a basi ultra medium tenuiter canaliculatum, medio leviter carinatum. Antennae sub-tenues, nigro-fuscae, articulo primo flavo-testaceo, clava oblonga, acuminata, cinereo-pubescente. Prothorax sub-conicus, latitudine postica brevior, antice plus duplo angustior quam basi, apice utrinque oblique sub-truncatus, basin versus oblique ampliatus, postice vix sinuatus, elevato-marginatus, superne modice convexus, niger, sub-nitidus, pube brevi, tenui, grisea adspersus, crebre punctulatus. Scutellum parvum, nigrum, sub-nitidum. Elytra ovata, antice sub-truncata, prothorace parum latiora et illo duplo longiora, humeris vix elevatis, rotundatis; lateribus medio perparum rotundato-ampliata, dein sensim angustata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, nigra, sub-nitida, tenuiter pubescentia, subtiliter punctato-striata, interstitiis sub-planis, laevibus. Corpus subtus nigrum, subtiliter, crebre punctulatum. Pedes longiusculi, nigri, nitidi; femoribus subtus muticis, basi flavo-testaceis; tibiis teretibus, rectis.

307. *Nanophyes nigriceps*.

Ovatus, convexus, pallide-testaceus, tenuiter cinereo-pubescent; antennarum clava capiteque nigris; rostro leviter arcuato; prothorace conico, obsolete punctulato; elytris medioeriter punctato-striatis, interstitiis convexus, laevibus; femoribus subtus obsolete dentatis. — Long. $1\frac{1}{2}$, lat. $\frac{1}{3}$ millim.

Patria: China (Hongkong).

Caput oblongum, modice convexus, nigrum, sub-nitidum, subtilissime, crebre punctulatum, tenuiter cinereo-pubescent. Oculi rotundati, parum convexi, nigri. Rostrum longitudine capitis prothoracisque, validiusculum, cylindricum, leviter arcuatum, flavo-testaceum, subtiliter, crebre punctulatum, tenuiter pubescens, apice infuscatum. Antennae sub-tenues, testaceae, clava oblonga, acuminata, nigra, cinereo-pubescente. Prothorax breviter conicus, latitudine postica dimidio brevior, apice oblique truncatus, antice quam basi plus duplo angustior, basin versus oblique ampliatus, postice utrinque vix sinuatus, elevato-marginatus, superne modice convexus, flavo-testaceus, nitidus, obsolete punctulatus, pube tenui, depressa, cinerea adspersus. Scutellum parvum, pallide-testaceum, parce pubescens. Elytra antice sub-truncata, prothorace parum latiora at illo duplo fere longiora, humeris parum elevatis, obtusis; lateribus haud ampliata, pone medium sensim angustata, apice rotundata, superne convexa, postice declivia, pallide testacea, tenuiter cinereo-pubescentia, medioeriter punctato-striata, interstitiis sub-convexis, laevibus. Corpus subtus testaceum, subtiliter, crebre punctulatum, tenuiter cinereo-pubescent. Pedes longiusculi, dilute flavo-testacei, parce pubescentes; femoribus modice clavatis, subtus obsolete unidentatis; tibiis teretibus, rectis.

308. *Nanophyes Pusio*.

Ovatus, convexus, rufo-testaceus, nitidus, tenuiter cinereo-pubescent; rostro leviter arcuato; prothorace conico, subtiliter, crebre punctulato, elytris medioeriter punctato-striatis, dorso postico infuscat, interstitiis haud convexus, laevibus; femoribus subtus obsolete unidentatis. — Long. $\frac{2}{3}$, lat. $\frac{1}{4}$ millim.

Patria: Promontorium Bonae Spei.

E minoribus. Caput oblongum, modice convexum, ferrugineum, sub-nitidum, subtilissime, crebre punctulatum, parce cinereo-pubescent. Oculi rotundati, parum convexi, nigri. Rostrum longitudine capitis cum prothorace, validiusculum, cylindricum, rufo-ferrugineum, nitidum, fere glabrum, subtilissime punctulatum. Antennae rufo-testaceae, clava oblonga, acuminata, fusca, cinereo-pubescente. Prothorax breviter conicus, latitudine postica brevior, apice utrinque oblique truncatus, antice quam basi duplo angustior, basin versus oblique ampliatus, basi levissime bi-sinuatus, elevato-marginatus, superne modice convexus, subtiliter, crebre punctulatus, rufo-testaceus, nitidus, pube tenui, brevi, cinerea adpersus. Scutellum parvum, ferrugineum, parce pubescens. Elytra antice sub-truncata, prothorace parum latiora at illo dimidio longiora, humeris vix elevatis, rotundatis; lateribus inflexa, ultra medium nonnihil ampliata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, postice declivia, mediocriter punctato-striata, interstitiis haud convexis, laevibus; rufo-testacea, nitida, parce, breviter cinereo-pubescentia, dorso plaga sat magna, obscuriore notata. Corpus sub-tus ferrugineum, subtiliter, crebre punctulatum, parce cinereo-squamosum. Pedes longiusculi, rufo-testacei, parce pubescentes; femoribus clavatis, subtus dente parvo, acuto armatis; tibiis teretibus, rectis.

309. *Sphenophorus insularis*.

Oblongus, angustus, depressus, ferrugineus, opacus, parce griseo-squamosus; capite, rostroque longo, arcuato, nigris; prothorace minus crebre, dorso postico leviter impresso, profundius punctato, vitta media utrinque abbreviata, nigra notato; elytris punctato-sub-sulcatis, singulo macula media obsoleta, nigra ornato. — Long. 12, lat. $4\frac{1}{2}$ millim.

Patria: Insula Taiti.

Sph. maculato proximus, aliter signatus, capite rostroque nigris, prothorace postice leviter impresso, profundius punctato ab illo bene distinctus. Caput sub-globosum, nigrum, subtiliter, crebre, postice evidentius punctulatum, inter oculos foveola parva impressum. Oculi oblongi, haud convexi, nigri. Rostrum longitudine fere capitis cum prothorace, tenue, valde arcuatum, nigrum, sub-nitidum, basi paullo crassius, punctulatum, extrorsum sub-compressum, fere leve. Antennae valide, nigrae, clava compressa, obtusa. Prothorax latitudine baseos dimidio longior, antice quam basi angustior, apice truncatus, intra apicem constrictus et distincte transversim impressus, lateribus pone stricturam versus medium oblique ampliatis, dein fere rectis; basi leviter bi-sinuatus, superne fere planus, disperse, minus crebre, dorso postico leviter impresso profundius punctatus, punctis lateralibus annulo cinereo cinctis; rufo-ferrugineus, sub-opacus, vitta dorsali, antice posticeque abbreviata, laevi, in medio dilatata, nigra notatus. Scutellum oblongum, angustum, ferrugineum, griseo-squamosum. Elytra antice conjunctim leviter rotundato-emarginata, prothorace nonnihil latiora et illo dimidio longiora, pone basin oblique ampliata, callo humerali parum elevato; posterius sensim angustata, apice singulatim obtuse rotundata, superne fere plana, parum profunde sulcato-punctata, rufo-ferruginea, squamis griseis antice parcius, pone medium densius obsita; singulo in medio disci macula obsoleta, nigra. Pygidium oblongo-triangulare, sub-carinatum, elevato-marginatum, parce punctatum, piceum, opacum, apice rotundatum. Corpus subtus nigro-piceum, sub-nitidum, sat profunde, minus crebre, abdominis segmentis 2—4 medio parcius, subtilius punctatis. Pedes breviusculi, rufo-ferruginei, punctati; tarsis elongatis, articulo penultimo valde dilatato.

310. *Sphenophorus interstitialis*.

Oblongus, sub-depressus, niger, sub-opacus, indumento griseo obsitus; rostro minus tenue, vix longitudine prothoracis, modice arcuato; prothorace subtilissime coriaceo, rude sed minus profunde punctato, dorso leviter carinato; elytris parum profunde punctato-striatis, interstitiis parce punctulatis, alternis elevatioribus. — Long. 10, lat. 4 millim.

Patria: Nova Hollandia (Sidney).

Caput globosum, nigrum, sub-nitidum, postice subtiliter, antice evidentius punctulatum, inter oculos foveola parva impressum. Oculi oblongi, parum convexi, nigri. Rostrum vix longitudine prothoracis, mi-

nus tenue, modice arcuatum, nigrum, sub-nitidum, basi paullo crassius, punctulatum, extrorsum sub-compressum, fere laeve. Antennae validae, nigro-piceae, clava compressa, obtusa, apice cinereo-pubescente. Prothorax latitudine postica dimidio longior, anteriùs angustior, apice truncatus, intra apicem constrictus et transversim impressus, lateribus pone stricturam fere ad medium oblique ampliatis, dein fere rectis; basi leviter rotundatus, superne parum convexus, subtilissime coriaceus, niger, parum nitidus, disperse, sat rude, minus profunde, crebre punctatus, punctis annulo griseo cinctis, dorso longitudinaliter, leviter carinatus. Scutellum oblongum, angustum, nigrum, nudum. Elytra antice conjunctim rotundato-emarginata, prothorace nonnihil latiora at illo vix dimidio longiora, pone basin oblique ampliata, callo humerali parum elevato; posterius vix angustata, apice singulatim obtuse rotundata, superne leviter convexa, nigra, indumento griseo dense tecta, parum profunde punctato-striata, interstitiis parce punctulatis, leviter, alternis magis convexus. Corpus subtus nigrum, parce punctatum, indumento griseo tectum. Pedes nigri, parce punctati, cinereo-pruinosi; tarsi anticis articulo primo superne spinoso, penultimo sat ampliato.

311. *Cossonus insularis*.

Elongatus, sub-depressus, niger, nitidus, glaber; antennis basi pedibusque piceis; fronte punctata, leviter foveolata; rostro brevior, apice valde ampliato; prothorace profunde punctato, dorso longitudinaliter, late, postice profundius impresso, medio carinato, basi bi-sinuato; elytris medioeriter, crebre punctato-striatis, interstitiis angustis, sub-convexis, levibus. — Long. $4\frac{1}{2}$, lat. 1 millim.

Patria: Insula St Joseph.

Caput oblongum, convexum, nigrum, nitidum, postice levigatum, antice crebre punctulatum, foveola parva insculptum. Oculi rotundati, parum convexi, nigri. Rostrum capite vix longius, porrectum, parum arcuatum, a basi ad medium cylindricum, modice crassum, apicem versus valde ampliatum, superne utrinque leviter impressum, nigrum, nitidum, crebre punctulatum. Antennae minus tenues, nigro-piceae, clava ovata, cinereo-pubescente. Prothorax latitudine longior, apice truncatus, anteriùs angustior, intra apicem leviter constrictus, lateribus pone stricturam modice ampliatis, a medio basin versus sub-rectis; basi sat profunde bi-sinuatus, superne fere planus, niger, nitidus, sat profunde, minus crebre punctatus, dorso longitudinaliter, late, postice profundius impressus, medio distincte carinatus. Scutellum parvum, rotundatum, nigrum, laeve. Elytra antice conjunctim leviter tri-sinuata, prothorace paullo latiora at illo dimidio longiora, humeris vix elevatis, obtuse rotundatis; lateribus recta, apice conjunctim rotundata, dorso planiuscula, nigra, nitida, glabra, medioeriter, crebre punctato-striata, interstitiis angustis, sub-convexis, levibus. Corpus subtus ferrugineum, nitidum, minus crebre, distincte punctatum. Pedes breviusculi, picei, nitidi, obsolete punctulati.

312. *Rhyncobus longulus*.

Lineari-elongatus, modice convexus, nigro-piceus, nitidus; antennis pedibusque ferrugineis; rostro crebre punctulato, apicem versus ampliato, utrinque impresso; prothorace oblongo, medioeriter, minus crebre punctato, antice leviter, transversim impresso; elytris punctato-striatis, apice obtusis, interstitiis levibus. — Long. 5—5 $\frac{1}{2}$, lat. 1—1 $\frac{1}{4}$ millim.

Patria: Insula Oahu (Honolulu).

Rh. procerus primo intuitu similis, rostro apicem versus ampliato, ibique superne utrinque leviter impresso, prothorace antice parum constricto, punctis elytrorum minus crebris ab illo bene distinctis. Caput porrectum, oblongum, modice convexum, nigro-piceum, nitidum, postice levigatum, antice sat crebre punctulatum. Frons foveola parva insculpta. Oculi parvi, rotundati, leviter convexi, nigri. Rostrum capite longius, crassiusculum, parum arcuatum, sat crebre punctulatum, nigro-piceum, nitidum, basi cylindricum, apicem versus ampliatum, ibique superne utrinque leviter impressum. Antennae medio rostri insertae, crassiusculae, ferrugineae, clava ovata, acuminata, cinereo-pubescente. Prothorax oblongus, apice truncatus, intra

apicem leviter coarctatus et transversim impressus, antice posticeque nonnihil angustatus, lateribus parum rotundato-amplius, basi levissime bi-sinuatus, superne leviter convexus, nigro-piceus, nitidus, glaber, sat profunde, minus crebre punctatus. Scutellum parvum, rotundatum, nigro-piceum. Elytra antice conjunctim truncata, prothorace nonnihil latiora et illo dimidio longiora, humeris rotundatis, lateribus recta, longe pone medium sensim angustata, apice obtusa, superne leviter convexa, nigro-picea, interdum ferruginea, nitida, glabra, mediocriter punctato-striata, punctis striarum minus crebris, interstitiis laevibus. Corpus subtus piceum, nitidum, sat profunde punctatum. Abdomen basi longitudinaliter impressum. Pedes breviusculi, ferruginei, nitidi, punctulati; femoribus parum clavatis, muticis.

313. *Rhyacolus gracilis*.

Lineari-elongatus, leviter convexus, nigro-piceus, nitidus; antennis tarsisque ferrugineis; rostro crebre punctulato, parum arcuato, apice non ampliato; prothorace oblongo, crebre punctulato, intra apicem utrinque constricto; elytris crebre punctato-striatis, apice obtusis, interstitiis angustis, convexis, laevibus. — Long. 3, lat. $\frac{1}{4}$ millim.

Patria: Insula Oahu (Honolulu).

Statura *Rh. longuli* sed multo minor, rostro apice non ampliato, elytris crebrius, evidentius punctato-striatis et interstitiis convexis ab illo bene distinctus. Caput oblongum, nigro-piceum, sub-nitidum; vertex elevato, convexo, levi: fronte parum convexa, subtiliter, crebre punctulata. Oculi parvi, rotundati, leviter convexi, nigri. Rostrum capite dimidio longius, cylindricum, crassiusculum, parum arcuatum, nigro-piceum, sub-nitidum, subtiliter, crebre punctulatum. Antennae medio rostri insertae, rostro nonnihil longiores, crassiusculae, ferrugineae, clava ovata, acuminata, cinereo-pubescente. Prothorax oblongus, latitudine multo longior, basi apiceque truncatus, antrorsum magis, postice parum angustatus, lateribus pone medium modice rotundato-amplius; superne leviter convexus, nigro-piceus, sub-nitidus. Scutellum parvum, rotundatum, nigro-piceum. Elytra antice conjunctim truncata, prothorace parum latiora at illo fere duplo longiora, lateribus recta, apice obtusa, superne leviter convexa, nigro-picea, sub-nitida, distincte striata et in striis crebre punctata, interstitiis angustis, convexis, laevibus. Corpus subtus nigro-piceum, sub-nitidum, sat crebre punctulatum. Abdomen basi medio leviter impressum, segmento ultimo foveolato. Pedes breviusculi, nigro-picei, punctulati; tarsis ferrugineis.

FAM. LONGICORNIA.

314. *Eburia amabilis*.

Elongata, modice convexa, testacea, parum nitida, parce fusco-pubescent; prothorace subtiliter, crebre punctulato, breviter, longitudinaliter carinato, utrinque medio tuberculo parvo, nigro instructo; elytris evidentius, sat crebre punctulatis, singulo lineolis quatuor albidis, elevatis notato, duabus basalibus brevibus, apice connexis, puncto nigro terminatis binisque fere in medio, longioribus, approximatis, antice posticeque nigro-terminatis, interiore brevior. — Long. 13, lat. $3\frac{1}{4}$ millim.

Patria: Insulae Gallapagos.

Caput sat magnum, rotundatum, parum convexum, testaceum, haud nitidum, obsolete punctulatum, inter oculos tenuiter, longitudinaliter canaliculatum, antice impressum. Mandibulae apice nigrae. Palpi testacei. Oculi magni, reniformes, convexi, nigri, antice superne profunde emarginati. Antennae corpore dimidio fere longiores, testaceae, parce pilosae. Prothorax capite parum latior, latitudine dimidio longior, apice truncatus, basi utrinque leviter sinuatus, lateribus ultra medium modice rotundato-amplius, ibique spina acuta armatis, dein basin versus nonnihil angustatus, superne modice convexus, testaceus, sub-opacus, obsolete, sat crebre punctulatus, pube depressa, pallida sat dense obsitus, intra basin transversim leviter con-

strictus, medio dorsi tuberculis duobus modice elevatis nigris instructus. Scutellum semicirculare, testaceum, breviter pubescens. Elytra antice truncata, prothorace vix dimidio latiora at illo fere triplo longiora, humeris parum elevatis, rotundatis; lateribus recta, apice singulatim truncata, angulo exteriori spina acuta armato; superne modice convexa, testacea, parum nitida, parce, breviter fusco-pubescentia, subtiliter, sat crebre, postice obsolete punctulata; singulo lineis quatuor elevatis, albidis ornato, duabus basalibus brevibus, postice connexis, puncto nigro adjecto binisque fere in medio, multo longioribus, stria impressa separatis, antice posticeque nigro-marginatis, interiore, praesertim postice, brevior. Corpus subtus testaceum, subtilissime punctulatum, breviter pallido-pubescens. Pedes longi, testacei; femoribus parum clavatis, posterioribus intus apice spina acuta armatis.

315. *Eburia sexnotata*.

Elongata, modice convexa, testacea, parum nitida, parce fusco-pubescens; prothorace evidenter, sat crebre punctato, breviter, obsolete carinato, ante medium tuberculis duobus parvis, obtusis instructo; elytris mediocriter, sat crebre punctatis; singulo in disco leviter bicostato, maculis tribus parvis, oblongis, albidis, una basali binisque pone medium, approximatis, ornato. — Long. 9—10½, lat. 1½—2¼ millim.

Patria: California, Insula Puna.

Caput sat magnum, rotundatum, leviter convexum, testaceum, sub-nitidum, subtiliter, crebre punctulatum, ante antennis linea tenui, transversa, retrorsum nonnihil flexa impressum. Mandibulae apice infuscatae. Palpi testacei. Oculi magni, reniformes, convexi, nigri, antice superne profunde emarginati. Antennae corpore dimidio fere longiores, testaceae, parce pilosae. Prothorax latitudine dimidio longior, apice truncatus, reflexo-marginatus, basi utrinque leviter sinuatus, lateribus ultra medium sensim ampliatis, ibique spina brevi, acuta armatis, dein basin versus angustatis, sub-sinuatis; superne modice convexus, testaceus, parum nitidus, evidenter, crebre punctulatus, parce pubescens, medio carinula brevi, longitudinali, utrinque abbreviata et mox ante medium tuberculis duobus parvis, obtusis, transversim positis instructus, antice posticeque leviter constrictus. Scutellum testaceum, breviter pubescens. Elytra antice truncata, prothorace vix dimidio latiora at illo triplo longiora, humeris parum elevatis, rotundatis; lateribus recta, apice singulatim truncata, angulo exteriori spina acuta armata, superne modice convexa, testacea, parum nitida, parce fusco-pubescentia, sat crebre, mediocriter, postice nonnihil parcius punctata; singulo in disco costis duabus angustis instructo, maculis tribus parvis, oblongis, albidis, una basali binisque pone medium, approximatis, interiore minore, interdum rotundata, ornato. Corpus subtus rufi-testaceum, sub-nitidum, sat crebre, subtiliter punctulatum, tenuiter pubescens. Pedes longi, testacei, parce pubescentes; femoribus parum clavatis, posterioribus intra apicem spina acuta armatis.

316. *Comptosoma quadriplagiata*.

Ovata, convexa, obscure ferruginea, griseo-squamosa, parce, breviter albido-pilosa; antennis, palpis pedibusque dilutius ferrugineis; capite dense albido-squamoso; prothorace ante basin transversim canaliculato, dorso postico tuberculo elevato, canalicula diviso; elytris remote, sub-seriatim punctatis, plagis quatuor magnis, albido-squamosis ornatis. — Long. 8, lat. 4½ millim.

Patria: Buenos Ayres.

Caput magnum, sub-triangulare, superne planum, obscure ferrugineum, squamis piliformibus albidis dense vestitum, basi tenuiter, longitudinaliter canaliculatum. Palpi dilute ferruginei. Oculi oblongi, sub-reniformes, parum convexi, nigri. Antennae corpore parum breviores, ferrugineae, articulis basi albido-pubescentibus. Prothorax latitudine dimidio latior, basi apiceque truncatus, lateribus ultra medium oblique ampliatus, ibique tuberculo acuto utrinque instructus, dein basin versus nonnihil angustatus, superne inaequalis,

obscure ferrugineus, squamis piliformibus, depressis, griseis dense vestitus, ante basin transversim canaliculatus, dorso postico tuberculo parum elevato, obtuso, medio canalicula longitudinali diviso instructus. Scutellum breve, sub-quadratum, dense griseo-squamosum. Elytra antice truncata, prothorace dimidio fere latiora et illo duplo et dimidio longiora, callo suprahumerali leviter elevato, rotundato; lateribus sensim nonnihil angustata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, sub-seriatim, remote, parum profunde punctata, dense griseo-squamosa, singulo plagis duabus magnis, irregularibus e squamis albidis ornato, una mox pone basin, altera prope apicem, postice emarginata. Corpus subtus piccum, dense griseo-squamosum. Pectus valde remote nigro-granulatum. Abdomen medio longitudinaliter denudatum. Pedes sat longi, validi, ferruginei, pube brunnea et albida annulatum variegati.

317. *Saperda versicolor*.

Elongata, modice convexa, nigro-fusca, breviter pubescens; capite inter oculos canaliculato, ibique et antice dense cinereo-pubescente; prothorace helvolo-pubescente, utrinque macula basali magna sub-quadrata, atro-holosericea, ramulum antrorsum emittente notato elytris minus crebre, sub-seriatim punctulatis, sutura anguste, lateribus pectoris et abdomine albido-pubescentibus. — Long. 7—9, lat. 1½—2¼ millim.

Patria: Buenos Ayres, Montevideo.

Caput rotundatum, convexum, nigrum, opacum, punctulatum, parce fusco-pubescent, inter oculos tenuiter, longitudinaliter canaliculatum, ibique et antice pube densa, depressa, cinereo-albida obsitum. Palpi nigro-fusci. Oculi sub-reniformes, convexi, nigri. Antennae corpore longiores, nigrae, parce pilosae, articulis 3—8 a basi ultra medium dense cinereo-pubescentibus. Prothorax latitudine nonnihil longior, basi apiceque truncatus, lateribus pone apicem vix ampliatis, infra medium paullo angustatis; superne modice convexus, punctulatus, dense helvolo-pubescent, utrinque macula magna, sub-quadrata, basali, atro-holosericea, antice inferne ramulum sat latum concolorem fere ad apicem continuatum emittente notatus. Scutellum sub-triangulari, cinereo-pubescent. Elytra antice sub-truncata, prothorace dimidio latiora et illo fere triplo longiora, humeris non elevatis, sub-rotundatis; lateribus fere recta, apice singulatim rotundata, superne paullo convexa, minus crebre, sub-seriatim punctulata, nigro-fusca, parum nitida, pube cinerea sat dense obsita, sutura anguste, densius cinereo-albido-pubescentia. Corpus subtus nigrum, nitidum, subtilissime punctulatum, tenuiter cinereo-pubescent. Pectus et abdomen ad latera densius cinereo-albido-pubescentia. Pedes nigro-fusci, cinereo-pubescentes.

FAM. CHRYSOMELINÆ.

318. *Megascelis subtilis*.

Elongata, parallela, modice convexa, subtus nigra; antennis, palpis pedibusque flavis, illarum articulis 5—11 apice late infuscat; capite pulchre cyaneo, minus crebre punctulato; prothorace oblongo, viridi-nitido, confertim punctulato, utrinque leviter impresso, basin versus nonnihil angustiore; elytris viridibus, nitidis, crebre punctato-striatis; pygidio testaceo. — Long. 2½, lat. ¾ millim.

Patria: Insula Oahu (Honolulu).

Caput rotundatum, modice convexum, pulchre cyaneum, nitidum, subtiliter, minus crebre punctulatum. Palpi flavi. Oculi sat magni, rotundati, valde convexi, nigri. Antennae tenues, dimidio corpore multo longiores, dilute flavae, articulis 5—11 apice late infuscat. Prothorax latitudine longior, basi apiceque truncatus, lateribus pone apicem leviter rotundato-ampliatis, dein basin versus sensim nonnihil angustatis, angulis anticis obtusis, posticis rectis; superne modice convexus, viridis, nitidus, subtiliter, crebre punctulatus, utrinque medio leviter impressus. Scutellum sub-quadratum, viridi-nitidum, subtiliter, crebre punctulatum.

Elytra elongata, antice truncata, prothorace dimidio latiora et illo plus duplo longiora, humeris parum rotundatis, callo suprahumerali vix elevato; lateribus recta, apice conjunctim rotundata, superne parum convexa, viridia, nitida, crebre punctato-striata, interstitiis angustis, vix elevatis, antice transversim rugulosis. Pygidium triangulare, convexum, testaceum, subtiliter, crebre punctulatum. Corpus subtus nigrum, subnitidum, crebre punctulatum. Pedes flavi, parce, breviter pallido-pubescentes.

319. *Lema quadrivittata*.

Oblongo-parallelum, modice convexum; capite corporeque rufo-ferrugineis, hoc breviter albo-pubescente; antennis pedibusque nigris; femoribus basi, geniculis anticis tibiisque basi rufo-testaceis; prothorace nigro, dorso lateribusque parce punctulatis, postice leviter coarctato, transversim impresso; elytris nigris, inaequaliter punctato-striatis, vitta prope suturam margineque laterali, flavis, apice conjunctis; stria nona medio valde interrupta. — Long. $4\frac{1}{2}$, lat. $1\frac{3}{4}$ millim.

Patria: Buenos Ayres.

Caput superne planum, rufo-ferrugineum, crebre punctulatum, pube brevissima, albida adpersum, postice longitudinaliter trisulcatum, sulco medio recto, lateralibus arcuatis, collo cylindrico, sub-levi prothoraci adfixum. Clypeus nigro-piceus. Palpi rufo-ferruginei. Oculi sub-rotundati, convexi, nigri, antice leviter emarginati. Antennae minus tenues, nigrae, parce pubescentes. Prothorax longitudine nonnihil latior, basi apiceque truncatus, pone apicem modice rotundato-amplius, basin versus constrictus, angulis anticis obtusis, posticis rectis; superne modice convexus, niger, nitidus, dorso lineatim, lateribus anticis parce punctulatus, ante basin transversim impressus. Scutellum sub-triangulare, flavo-testaceum, nitidum, laeve, apice truncatum. Elytra antice sub-truncata, prothoracis basi duplo latiora, quam lata dimidio longiora, humeris rotundatis, parum elevatis; lateribus recta, apice conjunctim rotundata, superne modice convexa, nigra, nitida, ad suturam profundius, extrorsum minus profunde punctato-striata, stria nona medio valde interrupta, interstitio secundo reliquis nonnihil latiore, sub-elevato; singulo elytro vittis duabus flavis ornato, una prope suturam, antice latiore, altera marginali, apice connexis, in medio inter strias 8 et 10 macula parva oblonga, concolore. Corpus subtus rufo-ferrugineum, sub-nitidum, crebre, subtiliter punctulatum, pube brevissima albida adpersum. Pedes nigri, tenuiter pubescentes; femoribus basi, geniculis anticis tibiisque omnibus fere ad medium testaceis.

320. *Crioceris russula*.

Oblongo-parallelum, rufo-testaceum, nitidum; antennis nigris, articulo primo rufo-testaceo; capite sub-levi, postice triangulariter elevato, utrinque profunde oblique canaliculato, canaliculis antice conjunctis; prothorace antice obsolete, parce punctulato, pone medium profunde coarctato, transversim impresso; elytris mediocriter punctato-striatis, interstitiis laevibus; singulo elytro inter basin et medium impresso. — Long. $5\frac{1}{4}$, lat. $2\frac{1}{4}$ millim.

Patria: China (Hongkong).

Caput sat latum, parum convexum, rufo-testaceum, nitidum, sub-laeve, antrorsum angustatum; vertice triangulariter elevato, triangulo postice breviter, longitudinaliter canaliculato, utrinque canalicula profunda, introrsum obliqua, antice cum opposita conjuncta. Palpi rufo-testacei. Oculi sat magni, sub-rotundati, valde convexi, nigri. Antennae dimidio corpore longiores, nigrae, articulo primo toto, secundo et tertio basi rufo-testaceis. Prothorax longitudine vix latior, basi apiceque truncatus, lateribus pone apicem subito, sub-angulariter ampliatis, dein sinuatis et pone medium coarctatis, angulis anticis obtusis, posticis fere rectis; superne rufo-testaceus, nitidus, antice modice convexus, subtilissime, parce punctulatus, mox pone medium transversim sulcatus, sulco medio foveola parva insculpta. Scutellum parvum, rufo-testaceum, nitidum, sub-laeve. Elytra antice sub-truncata, prothorace fere duplo latiora, quam lata dimidio longiora, humeris rotun-

dati, callo suprahumerali parum elevato, obtuso; lateribus recta, apice conjunctim rotundata, superne modice convexa, rufo-testacea, nitida, medioeriter punctato-striata, punctis striarum minus crebris, interstitiis modice latis, planis, levibus; singulo elytro inter basin et medium prope suturam foveola sat magna notata. Corpus subtus rufo-testaceum, parum nitidum, crebre coriaceum. Pedes dilutius rufo-testacei, breviter pallido-pubescentes, tibiis articulisque tarsorum apice infuscati.

321. *Clythra egregia*.

Oblongo-ovata, cylindrica, caerulea, nitida, subtus breviter albido-sericea; antennis basi, tibiis tarsisque testaceis; prothorace rufo-testaceo, antice sub-levi, postice punctato, basi macula parva caerulea notata; elytris sat profunde, minus crebre, sub-seriatim punctatis, rufo-testaceis, singulo macula parva suprahumerali fasciaque media sat lata, recta, caeruleis. — Long. $4\frac{1}{2}$, lat. $2\frac{1}{4}$ millim.

Patria: Malacca.

Caput sub-rotundatum, parum convexum, caeruleum, nitidum, parce punctulatum, vertice tenuiter canaliculatum, ad oculos æneum, breviter pallido-setulosum. Palpi rufo-testacei. Oculi ovati, parum convexi, brunnei, antice inferne leviter emarginati. Antennæ breves, crassæ, nigro-fuscae, pubescentes, articulis tribus basalibus rufo-testaceis. Prothorax longitudine fere duplo latior, apice truncatus, antice quam basi multo angustior, basi tenuiter reflexo-marginatus, utrinque sinuatus, lateribus anguste marginatis, pone apicem ultra medium rotundato-ampliatis, angulis anticis fere rectis, posticis rotundatis; superne convexus, rufo-testaceus, nitidus, dorso antico sub-levi, lateribus posticeque minus crebre punctatus, ante scutellum macula parva, caerulea notatus. Scutellum breviter triangulare, caeruleum, nitidum, basi punctulatum, medio carinatum. Elytra antice singulatim introrsum oblique truncata, prothorace vix angustiora, quam lata nonnihil longiora, humeris vix elevatis, rotundatis; apicem versus perparum angustata, apice singulatim rotundata, superne convexa, rufo-testacea, nitida, sat profunde, minus crebre, sub-seriatim punctata, singulo macula parva, rotunda, suprahumerali fasciaque media transversa, sat lata, recta, suturam non attingente, caeruleis. Corpus subtus caeruleum, sub-nitidum, crebre punctulatum, setulis brevibus, albidis dense adpersum. Pedes punctulati, breviter setulosi; femoribus caeruleis; tibiis tarsisque testaceis, his interdum infuscati.

322. *Clythra brevicollis*.

Ovata, convexa, nigra, nitida, pube brevi, albida adpersa; antennis basi, pedibus abdomineque apice rufo-testaceis; capite magno, crebre punctato, antice confuse ferrugineo; prothorace brevissimo, sat crebre punctato, lateribus late, confuse ferrugineis; elytris caeruleis, sat profunde, crebre punctatis. — Long. 3, lat. $1\frac{1}{2}$ millim.

Patria: Brasilia (Rio Janeiro).

Caput magnum, sub-rotundatum, modice convexum, nigrum, sub-opacum, crebre punctatum, pube brevi, pallida adpersum, antice confuse ferrugineum. Palpi ferruginei. Oculi ovati, modice convexi, nigri. Antennæ breves, nigrae, extrorsum incrassatae, basi rufo-testaceae. Prothorax brevissimus; longitudine quadruplo latior, apice leviter rotundato-emarginatus, basi tenuiter marginatus, utrinque leviter sinuatus, lateribus anguste marginatis, basin versus perparum oblique angustatis, angulis anticis deflexis, antrorsum productis, obtusis, posticis rectis; superne modice convexus, niger, nitidus, pube albida adpersus, sat crebre, medioeriter punctatus, extrorsum sat late, confuse ferrugineo-marginatus. Scutellum breviter triangulare, nigrum, sub-nitidum, crebre punctulatum. Elytra antice truncata, prothorace vix latiora, quam lata haud longiora, humeris rotundatis, callo suprahumerali parum elevato; lateribus longe ultra medium recta, dein angustata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, caerulea, nitida, pube brevi, albida adpersa, evidenter, crebre, vage punctata. Corpus subtus nigrum, sub-nitidum, sat crebre punctatum, parce pubescens; segmentis tribus ultimis abdominis rufo-testaceis. Pedes rufo-testacei, punctulati, breviter pubescentes.

323. *Cryptocephalus (Cadmus) litigiosus*.

Oblongo-quadratus, sub-cylindricus, convexus, niger, opacus; capite confertim punctato, inter oculos maculis duabus luteis ornato; prothorace confertim rugoso-punctato, postice utrinque leviter impresso, medio carinato, lateribus subtiliter crenulato; elytris lutescentibus, sat profunde, minus crebre, sub-seriatim punctatis, macula pone scutellum elevata tribusque in singulo, una suprahumerali binisque pone medium oblique positis et sutura anguste, nigris. — Long. $6\frac{1}{2}$ —8, lat. $3\frac{2}{3}$, lat. $4\frac{1}{3}$ millim.

Mas: minor, antennis longioribus, articulo apicali tenui, segmento ultimo abdominis apice impresso.

Femina: major, antennis nonnihil brevioribus, articulo apicali crassiore, segmento ultimo abdominis apice profundius impresso.

Patria: Nova Hollandia (Sidney).

Caput rotundatum, parum convexus, nigrum, opacum, crebre punctatum, utrinque macula parva lutea ornatum. Oculi reniformes, antice medio profunde emarginati, nigro-brunnei. Antennae maris corpore longiores, feminae nonnihil breviores, nigrae, vix pubescentes. Prothorax longitudine fere duplo latior, apice leviter rotundato-emarginatus, basi bi-sinuatus, lateribus tenuiter reflexo-marginatus, subtiliter crenulatus, pone apicem magis, medio parum rotundato-amplius, angulis anticis obtusis, posticis fere rectis; superne convexus, niger, sub-opacus, crebre rugoso-punctatus, ante scutellum utrinque leviter impressus, medio tenuiter carinatus. Scutellum sub-quadratum, nigrum, nitidum, laeve, apice elevatum. Elytra antice singulatim leviter rotundato-producta, prothorace parum latiora at illo plus duplo longiora, humeris vix elevatis, lateribus ad medium recta, dein sensim perparum angustata, apice singulatim rotundata, superne convexa, lutea, sub-nitida, sat profunde minus crebre, sub-seriatim punctata, macula communi pone scutellum elevata tribusque maculis in singulo, sub-rotundis, prima suprahumerali, secunda pone medium non procul a margine, parva, tertia inter medium et apicem non procul a sutura, reliquis saepe majore, interdum ovata et sutura tota anguste, nigris. Corpus sub-nigrum, crebre punctulatum, setis brevibus, albidis, versus apicem abdominis densioribus adpersum. Pedes nigri, sub-nitidi, parcius punctulati, setis brevibus, albis adpersi.

324. *Cryptocephalus dapsilis*.

Breviter ovatus, convexus, sub-niger; capite, antennis, apice excepto, tibiis tarsisque lutescentibus; prothorace subtiliter punctulato, margine apicali anguste, laterali et basali latius luteo, dorso antico plaga magna, transversa maculisque duabus basalibus triangularibus nigris; elytris luteis, tenuiter punctato-striatis, interstitiis subtilissime, crebre punctulatis, sutura vittaque sat lata disci nonnihil obliqua, ante apicem abbreviatis, nigris. — Long. 4, lat. $2\frac{1}{4}$ millim.

Patria: Java.

Statura omnino *C. Billiardieri*, nonnihil major, prothorace aliter colorato. Caput rotundatum, parum convexus, luteum, nitidum, distincte, sat crebre punctulatum, postice tenuiter, longitudinaliter canaliculatum; ore nigro. Palpi ferruginei. Oculi reniformes, parum convexi, nigri. Antennae flavo-testaceae, extrorsum fuscescentes. Prothorax longitudine fere duplo latior, antice quam basi multo angustior, apice leviter rotundato-emarginatus, tenuiter marginatus, basi utrinque sinuatus, lateribus anguste reflexo-marginatis, pone apicem subito rotundato-amplius, angulis anticis deflexis, obtusis, posticis retrorsum productis, acuminatis; superne convexus, subtiliter sat crebre punctulatus, nitidus, margine apicali anguste, laterali et postico latius luteus, dorso plaga magna, sub-ovata, transversa maculisque duabus parvis, remotis, basalibus, sub-triangularibus, nigris. Scutellum nigrum, sub-laeve. Elytra antice singulatim nonnihil rotundato-producta, prothorace vix latiora, quam lata paullo longiora, callo suprahumerali parum elevato, obtuso; lateribus infra medium sensim nonnihil angustata, apice singulatim sub-rotundata, superne convexa, tenuiter punctato-striata,

interstitiis subtilissime, crebre punctulatis; lutea, nitida, sutura vittaque disci sat lata, a basi apicem versus sensim introrsum obliqua, pone basin extus nonnihil emarginata, ante apicem abbreviatis, nigris. Pygidium nigrum, sub-opacum, crebre punctatum, tenuiter pubescens, utrinque obsolete ferrugineo-marginatum. Corpus subtus nigrum, crebre punctulatum, parce pubescens. Abdomen anguste luteo-marginatum. Pedes punctulati; femoribus nigris, anticis ima basi, tibiis tarsisque lutescentibus.

325. *Cryptocephalus picturatus*.

Oblongo-ovatus, convexus, ferrugineus, nitidus, subtus parce, breviter albido-setulosus; capite maculis tribus flavis, lateralibus longis, ornato; prothorace sat crebre punctato, margine apicali, maculis duabus basalibus, obliquis postice conjunctis binisque lateralibus antica sub-quadrata, postica subtriangulari, flavis; elytris flavis, profunde punctato-striatis, callo suprahumerali maculisque nonnullis disci ferrugineis. — Long. $4\frac{1}{2}$, lat. $2\frac{1}{2}$ millim.

Patria: Insula Puna.

Caput rotundatum, parum convexus, ferrugineum, sub-nitidum, punctulatum, maculis tribus flavis ornatum, media sub-quadrata, lateralibus prope oculos sitis, longis arcuatis. Oculi reniformes, parum convexi, nigri. Antennae dimidio corpore longiores, sub-tenues, parce pilosae, rufo-testaceae. Prothorax longitudine dimidio latior, antice quam basi multo angustior, apice leviter rotundato-emarginatus, basi utrinque sinuatus, lateribus tenuiter reflexo-marginatis, pone apicem fere ad medium sub-oblique ampliatis, angulis anticis deflexis, obtusis, posticis retrorsum productis, acuminatis; superne convexus, ferrugineus, nitidus, sat crebre punctatus, margine apicali anguste, medio nonnihil latius, postice maculis binis obliquis, basi conjunctis, ferrum equinum fere referentibus maculisque duabus lateralibus sat magnis, antica sub-quadrata, margini apicali connexa, postica sub-triangulari, flavis. Scutellum sub-cordatum, flavo-testaceum, nitidum, laeve, basi impressum, apice infuscatum. Elytra antice vix producta, prothorace non latiora, quam lata parum longiora, callo suprahumerali parum elevato, obtuso; lateribus apicem versus nonnihil angustata, apice singulatim rotundata, superne convexa, flava, nitida, rude punctato-striata, punctis fundo maculisque nonnullis sparsis ante et pone medium, ferrugineis, striis postice profundioribus 4 et 5, 6 et 7 ante, 2 et 8 prope apicem conjunctis. Pygidium flavo-testaceum, crebre punctatum. Corpus subtus ferrugineum, crebre, subtiliter punctulatum, setulis brevibus, albidis adpersum. Pedes ferruginei, sub-nitidi, punctulati, parce breviter albido-pubescens.

326. *Monachus biplagiatus*.

Breviter ovatus, convexus, nigro-caerulescens, sub-nitidus; antennis basi flavo-testaceis; prothorace subtiliter, sat crebre, basi evidenti punctulato; elytris medioeriter punctato-striatis, interstitiis planis, levibus, singulo elytro plaga magna, sub-ovata, transversa, antrorsum in marginem nonnihil dilatata, sanguinea decorato. — Long. $2\frac{1}{2}$ —3, lat. $1\frac{1}{4}$ millim.

Patria: Montevideo, Buenos Ayres.

Caput sub-rotundatum, modice convexus, nigro-caeruleum, sub-nitidum, minus crebre punctulatum, inter antennas canalicula tenui, transversa insculptum, ore testaceo. Oculi reniformes, parum convexi, brunnei. Antennae ad prothoracis basin vix pertingentes, nigrae, extrorsum incrassatae, articulis quatuor basalibus flavo-testaceis. Prothorax latitudine postica dimidio brevior, antice quam basi multo angustior, apice leviter rotundato-emarginatus, basi utrinque bi-sinuatus, lateribus tenuiter reflexo-marginatis, pone apicem subito rotundato-ampliatis, angulis anticis deflexis, obtusis, posticis retrorsum nonnihil productis, sub-acuminatis; superne convexus, nigro-caerulescens, parum nitidus, subtiliter, sat crebre, basi nonnihil evidenti punctulatus, ante scutellum transversim, leviter impressus. Scutellum oblongo-triangulare, nigrum, nitidum, sub-laeve. Elytra antice singulatim nonnihil rotundata, prothorace vix latiora, quam lata parum longiora, callo humerali modice elevato, obtuso; lateribus infra medium sensim angustata, apice singulatim

rotundata, dehiscentia, superne convexa, nigro-cerulescentia, sub-nitida, mediocriter, minus crebre punctato-striata, striis duabus primis ad suturam oblique ductis, interstitiis planis, laevibus; singulo elytro plaga magna, sub-ovata, obliqua, sanguinea, margini laterali adfixa, ibique infra callum humeralem continuata, suturam non attingente. Corpus subtus nigrum, parum nitidum, subtiliter, crebre punctulatum. Pedes nigri, nitidi, punctulati.

327. *Monachus modestus*.

Breviter ovatus, convexus, subtus niger; antennis et femoribus anticis basi tibiisque totis testaceis; prothorace testaceo, subtiliter, crebre punctulato, medio maculis duabus rotundis, nigris notato; scutello nigro; elytris testaceis, mediocriter punctato-striatis, plaga basali, communi, triangulari, nigra ornatis, interstitiis planis, sub-laevibus. — Long. 3—3½, lat. 1¾—2½ millim.

Var. α: elytris basi tantum anguste nigro-marginatis.

Patria: Montevideo.

Statura *M. contracti*, aliter coloratus, prothorace evidentius punctulato. Caput rotundatum, parum convexum, nigrum, haud nitidum, subtiliter, sat crebre punctulatum; ore piceo. Palpi ferruginei. Oculi reniformes, parum convexi, nigri. Antennae ad prothoracis basin vix pertingentes, nigrae, extrorsum crassiores, articulis quinque basalibus rufo-testaceis. Prothorax longitudine dimidio latior, antice quam basi multo angustior, apice leviter rotundato-emarginatus, basi utrinque sinuatus, lateribus tenuiter reflexo-marginatis, pone apicem subito rotundato-ampliat, angulis anticis deflexis, obtusis, posticis retrorsum nonnihil productis, acuminatis; superne convexus, testaceus, nitidus, subtiliter, crebre, evidentius punctulatus, medio maculis duabus parvis, rotundis margineque basali anguste nigris. Scutellum oblongo-triangulare, nigrum, sub-nitidum, laeve, pone basin obsolete impressum. Elytra omnino ut in *M. contracto* formata, mediocriter punctato-striata, interstitiis planis, sub-laevibus; testacea, nitida, basi plaga magna, triangulari, nigra notata. Pygidium nigrum, sub-nitidum, minus dense punctatum. Corpus subtus nigrum, crebre punctulatum. Pedes nigri, punctulati, femoribus basi et subtus tibiisque totis testaceis, tarsis nigro-fuscis.

328. *Monachus contractus*.

Breviter ovatus, convexus, subtus niger; capite, antennis et femoribus anticis basi, tibiis omnibus apice tarsisque totis rufo-testaceis; prothorace rufo-testaceo, subtilissime, crebre punctulato; scutello, elytrorum plaga magna, basali, triangulari, callo suprahumerali, sutura anguste fasciaque communi ante apicem, utrinque abbreviata nigris. — Long. 2½—3, lat. 1¾—2 millim.

Patria: Brasilia (Rio Janeiro).

Statura et similitudo *M. rubropustulati*, capite rufo-testaceo, prothorace immaculato ut et colore elytrorum ab illo bene distinctus. Caput rotundatum, parum convexum, rufo-testaceum, sub-nitidum, subtiliter, crebre punctulatum; ore piceo. Palpi rufo-ferruginei. Oculi reniformes, parum convexi, nigri. Antennae ad prothoracis basin vix pertingentes, nigrae, pubescentes, extrorsum crassiores, articulis quinque basalibus rufo-testaceis. Prothorax longitudine dimidio latior, antice quam basi multo angustior, apice leviter rotundato-emarginatus, basi utrinque sinuatus, lateribus tenuiter reflexo-marginatis, pone apicem subito rotundato-ampliat, angulis anticis deflexis, obtusis, posticis retrorsum nonnihil productis, acuminatis; superne convexus, rufo-testaceus, nitidus, subtilissime, crebre punctulatus. Scutellum triangulare, nigrum, nitidum, laeve. Elytra antice vix rotundata, prothorace non latiora, quam lata parum longiora, lateribus apicem versus sensim angustata, apice singulatim rotundata, dehiscentia, superne convexa, mediocriter punctato-striata, striis interioribus versus suturam oblique ductis, interstitiis planis, laevibus; rufo-testacea, nitida, basi plaga magna, triangulari, callo suprahumerali, sutura anguste fasciaque ante apicem, transversa, com-

muni, utrinque abbreviata, nigris. Pygillum ferrugineum, crebre punctatum. Corpus subtus nigrum, subtiliter, crebre punctulatum. Pectus antice rufo-testaceum. Pedes nigri, punctulati; femoribus anticis basi, tibiis apice tarsisque totis rufo-testaceis.

329. *Monachus viridiæneus*.

Oblongo-ovatus, convexus, viridi-æneus, nitidus; antennis basi pedibusque flavo-testaceis; prothorace sub-lævi, ante basin transversim profunde canaliculato; elytris evidenter punctato-striatis, interstitiis planis, lævibus. — Long. $1\frac{1}{4}$, lat. $\frac{3}{4}$ millim.

Patria: Brasilia (Rio Janeiro).

Caput sub-rotundatum, parum convexum, nigro-æneum, sub-nitidum, subtiliter, crebre punctulatum; ore palpisque rufo-testaceis. Oculi reniformes, parum convexi, nigro-brunnei. Antennæ ultra prothoracis basin pertingentes, nigrae, extrorsum modice incrassatæ, articulis quatuor basalibus flavo-testaceis. Prothorax longitudine dimidio latior, antice quam basi multo angustior, apice leviter rotundato-emarginatus, basi utrinque sinuatus, lateribus tenuiter reflexo-marginatis, pone apicem subito rotundato-ampliatis, angulis anticis deflexis, obtusis, posticis retrorsum prominulis, acuminatis; superne convexus, viridi-æneus, nitidus, sub-lævis, ante basin canalicula transversa, sat profunda, utrinque valde abbreviata in sculptus. Scutellum triangulare, viridi-æneum, nitidum, læve. Elytra antice singulatim nonnihil rotundato-producta, prothoracis basi non latiora, quam lata vix dimidio longiora, callo suprahumerali parum elevato, obtuso; lateribus infra medium perparum angustata, apice singulatim rotundata, superne convexa, viridi-ænea, nitida, sat profunde punctato-striata, striis interioribus versus suturam oblique ductis, interstitiis planis, lævibus; singulo elytro mox pone basin transversim impresso. Corpus subtus nigro-æneum, sub-nitidum, crebre punctulatum. Pedes flavo-testacei, nitidi, punctulati.

330. *Monachus picipes*.

Breviter ovatus, convexus, obscure æneus, nitidus; antennis basi pedibusque testaceis; prothorace subtiliter, sat crebre, basi nonnihil evidentius punctulato; elytris evidenter punctato-striatis, interstitiis planis, sub-lævibus. — Long. $1\frac{1}{2}$ —2, lat. $1\frac{1}{4}$ — $1\frac{1}{2}$ millim.

Patria: Brasilia (Rio Janeiro).

Caput rotundatum, parum convexum, obscure æneum, sub-nitidum, subtiliter, crebre punctulatum; ore palpisque ferrugineis. Oculi sub-reniformes, parum convexi, brunnei. Antennæ ad prothoracis basin pertingentes, nigrae, extrorsum modice incrassatæ, articulis quinque basalibus flavo-testaceis. Prothorax latitudine postica dimidio brevior, antice quam basi multo angustior, apice leviter rotundato-emarginatus, basi utrinque sinuatus, lateribus tenuiter reflexo-marginatis, angulis anticis deflexis, obtusis, posticis retrorsum nonnihil prominulis, acuminatis; superne convexus, obscure æneus, nitidus, subtiliter, crebre, basi nonnihil evidentius punctulatus, ante scutellum leviter, transversim impressus. Scutellum oblongo-triangulare, obscure æneum, nitidum, læve. Elytra antice singulatim nonnihil rotundato-producta, prothoracis basi vix latiora, quam lata nonnihil longiora, callo suprahumerali haud elevato, obtuso; lateribus pone medium perparum angustata, apice singulatim rotundata, deliscentia, superne convexa, obscure ænea, interdum nonnihil cyaneonitida, nitida, evidenter punctato-striata, striis suturæ proximis introrsum oblique ductis. Corpus subtus nigro-æneum, nitidum, subtiliter, crebre punctulatum. Pedes fusco-testacei, nitidi, punctulati; femoribus interdum obscurioribus.

331. *Monachus nigrifolius*.

Breviter ovatus, convexus, niger, nitidus; antennis basi, ore, tibiis tarsisque rufo-testaceis; prothorace subtilissime, sat crebre, basi nonnihil evidentius punctulato; elytris subtiliter punctato-striatis, interstitiis planis, lævibus. — Long. $1\frac{1}{2}$ —2, lat. $1\frac{1}{4}$ — $1\frac{1}{2}$ millim.

Patria: Montevideo, Buenos Ayres.

Statura omnino præcedentis, aliter coloratus, prothorace elytrisque subtilius punctatis, femoribus nigris. Caput rotundatum, parum convexum, nigrum, sub-nitidum, crebre, subtiliter punctulatum; ore palpisque ferrugineis. Oculi sub-reniformes, parum convexi, brunnei. Antennæ prothoracis basin attingentes, nigrae, extrorsum modice incrassatae, articulis quatuor vel quinque basalibus rufo-testaceis. Prothorax omnino ut in præcedenti formatus, niger, nitidus, subtilius, crebre, basi nonnihil evidentius punctulatus, ante scutellum vix impressus. Scutellum oblongo-triangulare, nigrum, nitidum, læve. Elytra antice parum rotundato-ampliata, transversim leviter impressa, prothoracis basi vix latiora, quam lata nonnihil longiora, callo suprahumerali modice elevato, obtuso; lateribus pone medium perparum angustata, apice singulatim rotundata, dehiscentia, superne convexa, nigra, nitida, subtiliter punctato-striata, striis interioribus oblique ad suturam ductis, interstitiis planis, lævibus. Corpus subtus nigrum, nitidum, subtiliter, crebre punctulatum. Pedes punctulati, nitidi; femoribus nigris, tibiis tarsisque rufo-testaceis.

332. *Pachybrachys nigronotatus*.

Sub-ovatus, convexus, testaceus, sub-nitidus, subtus niger; capite prothoraceque sat crebre punctatis, illo basi infuscato, hoc dorso lineis duabus sub-approximatis, postice conjunctis, nigris ornato; elytris minus crebre, hinc inde sub-seriatim punctatis, singulo maculis sex oblongis nigris notato. — Long. 4½, lat. 2½ millim.

Var. α: capite basi vix infuscato, prothoracis lincis dorsalibus nigris obsoletis.

Patria: Montevideo.

Caput rotundatum, parum convexum, testaceum, parum nitidum, crebre punctatum, basi transversim, anguste infuscatum, inter oculos longitudinaliter impressum. Oculi ovati, parum convexi, nigri. Antennæ ad prothoracis basin pertingentes, testaceæ, extrorsum modice incrassatae, nigro-fuscae. Prothorax longitudine dimidio latior, apice truncatus, basi utrinque leviter sinuatus, lateribus tenuiter marginatis, pone apicem modice rotundato-ampliat, angulis anticis deflexis, rectis, posticis retrorsum non productis, acuminatis; superne convexus, testaceus, parum nitidus, crebre, profunde punctatus, dorso lineis duabus approximatis, postice conjunctis, interdum obsoletis, nigris ornatus, inter lineas antice parum elevatus, sub-lævigatus, ante scutellum leviter impressus. Scutellum ferrugineum, subtiliter punctulatum, ante apicem transversim impressum, apice rotundatum. Elytra antice truncata, prothoracis basi non latiora, quam lata nonnihil longiora, humeris rotundatis, callo suprahumerali haud elevato; lateribus recta, apice conjunctim rotundata, superne convexa, testacea, parum nitida, subtiliter, minus crebre, hinc inde sub-seriatim, apice parcius punctata, singulo maculis sex oblongis, nigris ornato, nempe: tribus non procul a sutura, ultima introrsum magis locata totidemque prope marginem lateralem. Pygidium testaceum, crebre punctulatum. Corpus subtus nigrum, crebre, subtiliter punctulatum, lateribus abdominis confuse testaceis. Pedes punctulati, testacei.

333. *Pachybrachys flavovarius*.

Oblongo-ovatus, convexus, niger, parum nitidus; antennis, femoribus basi geniculisque testaceis; capite crebre punctato, orbitis, macula antica apiceque flavis; prothorace crebre punctato, linea media, vitta utrinque dorsali margineque flavis; scutello elytrisque flavis, his irregulariter punctato-striatis, punctis fundo nigris, striis dorsalibus ante apicem conjunctis ibique striolis duabus brevibus, antice posticeque cum stria e callo humerali exeunte connexis. — Long. 3, lat. 1½ millim.

Patria: Brasilia (Rio Janeiro).

Caput rotundatum, parum convexum, nigrum, sub-opacum, crebre punctatum, orbitis oculorum anticis, macula parva, triangulari inter antennas apiceque flavis, nigro-punctatis. Oculi reniformes, nigro-brunnei, parum convexi. Antennæ dimidio corpore longiores, sub-tenuis, nigrae, extrorsum leviter incrassatae, articulis quatuor basalibus rufo-testaceis. Prothorax longitudine vix dimidio latior, antice truncatus, basi

utrinque leviter sinuatus, lateribus anguste marginatis, pone apicem oblique nonnihil ampliatis, dein leviter rotundatis; angulis anticis deflexis, sub-rectis; superne modice convexus, crebre, sat profunde punctatus, niger, sub-opacus, linea media longitudinali, vittis duabus dorsalibus margineque toto tenuiter, flavis. Scutellum sub-quadratum, flavum, laeve. Elytra antice sub-truncata, prothoracis basi nonnihil latiora, quam lata longiora, humeris rotundatis, callo suprahumerali parum elevato, obtuso; lateribus recta, apice singulatim rotundata, superne convexa, flava, sat profunde, irregulariter punctato-striata, punctis striarum nigris, striis dorsalibus longe ante apicem conjunctis, striolis duabus brevibus prope apicem, utrinque cum stria e callo humerali exeunte connexis, interstitiis alternis dorsalibus elevatis. Pygidium crebre punctulatum, flavum, pubescens, basi macula oblongo-triangulari nigra notatum. Corpus subtus nigrom, sub-nitidum, subtiliter, crebre punctulatum, setulis brevibus albidis adpersum. Abdomen ad latera testaceo-marginatum. Pedes nigri, punctulati, parce setulosi; femoribus basi apiceque tibiisque basi testaceis; femoribus anticis ante medium macula rotunda flava notatis.

334. *Pachybrachys insularis*.

Oblongo-ovatus, convexus, ferrugineus, sub-nitidus; antennis basi pedibusque testaceis, femoribus medio infuscatis; capite prothoraceque crebre punctulatis, hoc dorso saturatiore, utrinque rugula sub-laevi, parum elevata instructo; elytris lutescentibus, ad suturam vage punctatis, disco minus regulariter, pone medium profundius punctato-striatis, punctis nigris. — Long. 24, lat. 1½ millim.

Patria: Insula Taiti.

Caput rotundatum, parum convexum, ferrugineum, sub-nitidum, crebre, evidentius punctulatum, inter oculos leviter impressum. Palpi ferruginei, apice infuscati. Oculi sub-reniformes, parum convexi, nigri. Antennae dimidio corpore longiores, sub-tenuis, nigrae, extrorsum leviter incrassatae, articulis quinque basalibus testaceis. Prothorax longitudine vix dimidio latior, apice truncatus, basi utrinque leviter sinuatus, lateribus anguste marginatis, pone apicem sensim nonnihil ampliatis, dein leviter rotundatis, angulis anticis deflexis, omnibus rectis; superne modice convexus, crebre, mediocriter punctatus, ferrugineus, sub-nitidus, medio saturatiore, dorso utrinque et ad latera rugulis parum elevatis, sub-laevibus, magis nitidis. Scutellum sub-triangulari, nigro-piceum, nitidum, laeve. Elytra antice truncata, prothoracis basi nonnihil latiora, quam lata longiora, humeris rotundatis, callo suprahumerali parum elevato, obtuso; lateribus recta, apice singulatim rotundata, superne convexa, lutescentia, sub-nitida, prope suturam vage punctata, disco reliquo minus regulariter, pone medium profundius punctato-striata, striis postice arcuatis, hinc inde connexis, punctis striarum nigris, interstitiis alternis elevatioribus. Pygidium sub-triangulari, crebre punctulatum, breviter albidose-tulosum, nigrum, margine laterali et apicali flavo-testaceum. Corpus subtus ferrugineum, crebre punctulatum, breviter setulosum. Abdomen apice dilutius. Pedes testacei, punctulati; femoribus medio infuscatis.

335. *Loxopleurus impressicollis*.

Ovatus, convexus, rufo-testaceus, sub-opacus; antennis extrorsum ferrugineis; abdomine dilute flavescens; prothorace confertim punctulato, antice valde convexo, ante basin arcuatum impresso, margine apicali et laterali maculisque quatuor posticis flavis; elytris crebre, vage punctulatis, leviter costatis, margine basali ruga communi ante apicem apiceque dilute flavis. — Long. 3, lat. 1¼ millim.

Patria: Nova Hollandia (Sidney).

Caput rotundatum, parum convexum, rufo-testaceum, sub-opacum, crebre, mediocriter punctatum; ore piceo. Oculi reniformes, nigri, modice convexi. Antennae dimidio corpore longiores, rufo-testaceae, extrorsum crassiores, obscuriores. Prothorax longitudine dimidio latior, apice utrinque oblique truncatus, medio modice productus, basi utrinque sinuatus, medio leviter emarginatus, lateribus tenuiter marginatis, subtiliter crenulatis, pone apicem modice rotundato-ampliatis, angulis anticis sub-rectis, posticis retrorsum productis.

acuminatis; superne, praesertim antice convexus, rufus, sub-opacus, subtiliter, crebre punctulatus, ante basin impressione utrinque auctorsum arcuatim ducta impressus, margine apicali et marginali maculisque posticis quatuor, interioribus elongatis, exterioribus rotundis, flavis; margine basali leviter infusato, subtiliter crenulato. Scutellum medioere, sub-elevatum, rufo-testaceum, punctatum, apice truncatum. Elytra antice singulatim leviter rotundata, prothorace parum latiora at illo dimidio longiora, humeris rotundatis, callo supra-humerali vix elevato, obtuso; lateribus recta, apice singulatim rotundata, superne convexa, rufo-testacea, sub-opaca, crebre, evidentius punctulata, costis angustis, parum elevatis instructa, margine basali, ruga communi ante apicem apiceque dilute flavis. Pygidium crebre punctulatum, dilute flavescens, sub-opacum. Corpus subtus crebre punctulatum. Pectus rufo-testaceum. Abdomen dilute flavescens. Pedes flavo-testacei, punctulati.

336. *Loxopleurus rufescens*.

Oblongo-ovatus, convexus, rufo-testaceus, sub-opacus; capite, antennis extrorsum scutelloque nigris; prothorace convexo, crebre punctulato, pone medium utrinque leviter impresso, apice medio producto; elytris evidentius, crebre punctatis, leviter costatis, margine basali tenuiter maculisque duabus parvis disci pone medium, nigris. — Long. 1½, lat. 1 millim.

Patria: Nova Hollandia (Sidney), Malacca.

Caput rotundatum, parum convexus, nigrum, opacum, subtiliter, crebre punctulatum; ore ferrugineo. Oculi sub-ovati, parum convexi, nigri. Antennae ultra prothoracis basin pertinentes, minus tenues, extrorsum modice incrassatae, nigrae, articulis quinque basalibus rufo-testaceis. Prothorax longitudine vix dimidio latior, apice utrinque leviter sinuatus, medio sub-rotundato-productus, basi sub-truncatus, lateribus marginatis, pone apicem parum ampliatis, angulis anticis deflexis, obtusis, posticis fere rectis; superne convexus, rufo-testaceus, sub-opacus, subtiliter, crebre punctulatus, utrinque pone medium fovea longitudinali, postice impressione lavi cum opposita conjuncta. Scutellum sub-quadratum, nigrum, opacum. Elytra antice truncata, prothoracis basi haud latiora, quam lata vix dimidio longiora, callo suprahumerali parum elevato, obtuso; lateribus fere recta, apice singulatim rotundata, superne convexa, rufo-testacea, sub-opaca, crebre, evidentius punctata, costis quatuor longitudinalibus leviter elevatis, angustis instructa, margine basali tenuiter maculaque parva in singulo elytro pone medium disci, nigris. Pygidium planum, rufo-testaceum, crebre punctatum. Corpus subtus saturatius rufo-testaceum, sub-nitidum, crebre punctatum. Pedes rufo-testacei, punctulati.

337. *Nyochrous denticollis*.

Oblongus, convexus, supra nigro-fuscus, sub-opacus, griseo-squamosus, subtus aeneus, nitidus, parce setulosus; clypeo, antennis palpisque rufo-testaceis, capite prothoraceque crebre rugoso-granulatis, hoc utrinque breviter tridentato; elytris crebre punctato-striatis, interstitiis angustis, parum elevatis; tibiis anticis intus ante apicem dente aucto instructis. — Long. 6—7, lat. 3—3½ millim.

Patria: Brasilia (Rio Janeiro).

Caput sub-rotundatum, parum convexus, nigro-fuscum, opacum, crebre rugoso-granulatum, squamis griseis adpersum, obsolete, longitudinaliter canaliculatum. Clypeus et palpis rufo-testaceis. Oculi rotundati, convexi, nigri. Antennae ultra prothoracis basin pertinentes, ferrugineae, parce pilosae, extrorsum sensim modice incrassatae. Prothorax longitudine vix latior, apice medio rotundato-productus, utrinque oblique truncatus, basi marginatus, utrinque oblique truncatus, lateribus anguste marginatis, pone apicem ampliatis, denticulis tribus parvis armatis, angulis anticis deflexis, obtusis, posticis sub-rectis; superne convexus, nigro-fuscus, opacus, crebre rugoso-granulatus, squamis griseis sat dense adpersus. Scutellum rotundatum, nigropiceum, sub-nitidum, glabrum. Elytra antice truncata, prothorace latiora et illo plus duplo longiora, humeris

rotundatis; lateribus recta, apice conjunctim rotundata, superne convexa, nigro-fusca, sub-opaca, squamis griseis sat dense obsita, crebre, mediocriter profunde punctato-striata, interstitiis angustis, parum elevatis. Corpus subtus æneum, nitidum, crebre punctatum, setulis brevibus, albidis adpersum. Pedes ænei, nitidi, parcius punctati, setulis albidis adpersi; femoribus clavatis, muticis; tibiis canaliculatis, anticis intus ante apicem dente aucto armatis.

338. *Typophorus australis*.

Ovatus, convexus, niger, sub-nitidus; antennis testaceis, articulis quinque ultimis basi infuscatis; clypeo, palpis pedibusque testaceis, geniculis infuscatis; capite postice subtiliter, antice evidentius punctulato, inter oculos breviter canaliculato, orbitis rufo-testaceis; prothorace subtiliter, minus crebre punctulato, lateribus confuse ferrugineis; elytris mediocriter punctato-striatis, linea dorsali lata, pone medium lineola nigra divisa vittaque intramarginali rufo-testaceis ornatis. — Long. 54, lat. 34 millim.

Patria: Nova Hollandia (Sidney).

Caput sub-rotundatum, nigrum, sub-nitidum, postice parum convexum, crebre, subtiliter, antice planum evidentius punctatum, inter oculos canalicula brevi, longitudinali insculptum, orbitis superne sat late rufo-testaceis. Clypeus et palpi testacei. Oculi sub-ovati, convexi, nigri, antice leviter emarginati. Antennæ sub-tenues, testaceæ, articulis quinque ultimis basi late infuscatis. Prothorax longitudine dimidio latior, apice truncatus, basi tenuiter marginatus, utrinque leviter sinuatus, lateribus anguste reflexo-marginatis, ultra medium rotundato-ampliat, dein nonnihil angustatis, angulis anticis deflexis, sub-acuminatis, posticis obtusis; superne convexus, niger, nitidus, subtiliter, minus crebre punctulatus, lateribus confuse ferrugineo-marginatus. Scutellum mediocre, ferrugineum, nitidum, læve, apice sub-rotundatum. Elytra antice conjunctim vix emarginata, prothorace nonnihil latiora, quam lata dimidio longiora, callo suprahumerali parum elevato, obtuso; lateribus pone medium perparum ampliata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, nigra, nitida, sat profunde punctato-striata, interstitiis sub-planis, levibus, singulo elytro vittisque duabus rufo-testaceis ornato, una non procul a sutura, sat lata, pone medium lineola nigra divisa et extus ante apicem abbreviata, altera angustiore, intramarginali, ad apicem cum suturali connexa. Corpus subtus nigrum, nitidum, obsolete punctulatum. Pedes testacei, nitidi, punctulati; femoribus medio clavatis, muticis; tibiis posterioribus extus apice-emarginatis.

339. *Typophorus ruficeps*.

Breviter ovatus, convexus, niger, nitidus; antennis basi pedibusque flavo-testaceis; capite subtiliter, crebre punctulato, inter oculos transversim canaliculato, rufo-testaceo; prothorace creberrime punctulato, margine apicali rufescente; elytris confertim punctato-striatis, interstitiis angustis, leviter convexus. — Long. 24, lat. 14 millim.

Patria: Java.

Caput sat magnum, sub-rotundatum, parum convexum, rufo-testaceum, sub-nitidum, crebre punctulatum, inter oculos transversim tenuiter canaliculatum. Palpi flavo-testacei. Oculi rotundati, convexi, nigri. Antennæ longitudine fere dimidii corporis, nigre, articulis quinque basalibus testaceis, tribus ultimis modice incrassatis. Prothorax longitudine parum latior, apice truncatus, basi leviter rotundatus, lateribus non marginatis, ultra medium sensim rotundato-ampliat, dein basin versus nonnihil angustatis, angulis anticis obtusis, posticis rotundatis; superne convexus, creberrime punctulatus, niger, sub-nitidus, antice anguste, indeterminate rufescenti-marginatus. Scutellum sub-quadratum, nigrum, parum nitidum, subtiliter, crebre punctulatum. Elytra antice truncata, prothorace duplo latiora, quam lata nonnihil longiora, humeris rotundatis, callo suprahumerali modice elevato, obtuso; lateribus pone basin leviter sinuata, dein perparum rotundato-ampliat, apice conjunctim rotundata, superne convexa, postice declivia, tota nigra, sub-nitida, crebre, medio-

criter punctato-striata, interstitiis angustis, leviter convexis, impunctatis. Corpus subtus nigrum, sub-nitidum, punctulatum. Pedes flavo-testacei, nitidi, parce, breviter pubescentes.

340. *Typhorus biplagiatus*.

Ovatus, convexus, rufo-testaceus, nitidus; antennis basi pedibusque dilutioribus; vertice sub-triangulariter elevato, fere levi: prothorace parce punctulato; scutello nigro; elytris sat profunde punctato-striatis, sutura et plaga singuli media, sat magna, margini laterali adfixa, nigris. — Long. $2\frac{3}{4}$, lat. $1\frac{3}{4}$ millim.

Patria: Brasilia (Rio Janeiro).

Caput sub-ovatum, parum convexus, rufo-testaceum, vertice sub-triangulariter elevatum, laeve, nitidum. Mandibulae nigrae. Palpi rufo-testacei. Oculi ovati, modice convexi, nigri. Antennae ultra prothoracis basin pertingentes, rufo-testaceae, basi tenuiores, dilutiores, extrorsum sensim incrassatae. Prothorax longitudine vix latior, antice quam basi nonnihil angustior, apice utrinque sinuatus, medio rotundato-productus, basi utrinque leviter sinuatus, lateribus tenuiter marginatis, pone apicem paullo ampliatis, angulis anticis antrosum productis, obtusis, posticis lateraliter nonnihil prominulis, acuminatis; superne convexus, rufo-testaceus, nitidus, parce, evidenter punctulatus. Scutellum sub-triangulare, nigrum, nitidum. Elytra antice conjunctim leviter rotundato-emarginata, prothorace dimidio latiora et illo duplo longiora, humeris rotundatis, callo suprahumerali parum elevato, obtuso; lateribus ultra medium sensim nonnihil ampliata, apice rotundata, superne convexa, postice declivia, rufo-testacea, nitida, sat profunde, regulariter punctato-striata, interstitiis planis, laevibus, sutura tota plagaque singuli in medio, magna, transversa margini laterali adfixa ibique antrosum nonnihil continuata nigris. Corpus subtus parum nitidum, subtiliter, crebre punctulatum. Pectus ferrugineum. Abdomen dilutius rufo-testaceum. Pedes dilute rufo-testacei, punctulati; tibiis posterioribus extus apice emarginatis.

341. *Typhorus nigronotatus*.

Oblongo-ovatus, rufo-testaceus, nitidus; antennis extrorsum nigro-fuscis; prothorace parce punctulato, dorso maculis duabus oblongis nigris notato; elytris medioeriter punctato-striatis, striis apicem versus subtilioribus, sutura, fascia pone medium, communi, utrinque abbreviata maculaque basali elongata singuli nigris; femoribus posterioribus subtus dentatis. — Long. $2-2\frac{1}{2}$, lat. $1\frac{1}{4}-1\frac{1}{2}$ millim.

Var. α : signaturis prothoracis elytrorumque dilutioribus, ferrugineis, harum fascia postica interdum deficiente.

Patria: Java.

Caput rotundatum, convexus, rufo-testaceum, nitidum, subtiliter, minus crebre punctulatum, inter oculos canalicula tenui, transversa insculptum. Oculi rotundati, convexi, nigri. Antennae longitudine dimidii corporis, flavo-testaceae, extrorsum sensim incrassatae, articulis quinque ultimis nigro-fuscis. Prothorax longitudine vix latior, apice utrinque leviter sinuatus, medio nonnihil rotundato-productus, basi parum profunde bi-sinuatus, lateribus tenuiter marginatis, pone apicem modice rotundato-ampliatis, angulis anticis declivis, sub-obtusis, posticis rotundatis; superne convexus, rufo-testaceus, nitidus, parce punctulatus, maculis duabus oblongis, nigris ornatus. Scutellum sub-triangulare, rufo-ferrugineum, nitidum, laeve. Elytra antice sub-truncata, prothorace dimidio latiora et illo plus duplo longiora, humeris rotundatis, callo suprahumerali parum elevato, obtuso; lateribus vix ampliata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, postice declivia, rufo-testacea, nitida, medioeriter, minus crebre punctato-striata, striis apicem versus subtilioribus, sutura, fascia pone medium, transversa, communi, utrinque nonnihil obliqua, valde abbreviata maculaque singuli basali elongata, nigris vel ferrugineis. Corpus subtus rufo-testaceum, nitidum, subtiliter, crebre punctulatum. Pedes rufo-testacei, nitidi; femoribus incrassatis, posterioribus subtus dente brevi, acuto armatis; tibiis posterioribus extus ante apicem emarginatis.

342. *Aeis vestita.*

Rotundata, convexa, obscure cupreo-anea, sub-nitida, dense, breviter cinereo-pubescentis; antennis basi pedibusque rufo-testaceis; capite magno, rotundato prothoraceque crebre punctulatis; clytris mediocriter punctato-striatis, interstitiis lateralibus sub-carinatis. — Long. 1½, lat. 1½ millim.

Patria: Insula Mauritius.

Caput magnum, rotundatum, modice convexum, cupreo-aneum, sub-nitidum, subtiliter, crebre punctulatum, pube depressa, cinerea sat dense obsitum. Oculi rotundati, convexi, nigri. Antennae longitudine dimidii corporis, nigro-fuscae, extrorsum sensim modice incrassatae, articulis quinque basalibus rufo-testaceis. Prothorax longitudine duplo latior, apice utrinque leviter sinuatus, basi parum profunde bi-sinuatus, lateribus tenuiter marginatis, pone apicem subito rotundato-ampliatis, angulis anticis deflexis, obtusis, posticis leviter rotundatis; superne convexus, cupreo-aneus, sub-nitidus, subtiliter, crebre punctulatus, pube depressa, cinerea sat dense vestitus. Scutellum triangulare, concolor, punctulatum, dense pubescens. Elytra antice truncata, prothoracis basi non latiora, quam lata parum longiora, humeris rotundatis; apicem versus perparum angustata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, cupreo-anea, sub-nitida, mediocriter, sat crebre punctato-striata, interstitiis dorsalibus planis, lateralibus sub-convexis, pube depressa cinerea obsitis. Corpus subtus nigro-aneum, sub-nitidum, fere glabrum, crebre punctulatum. Pedes sat longi, rufo-testacei, nitidi; femoribus medio incrassatis, subtus muticis.

343. *Dia patagonica.*

Oblongo-ovata, convexa, nitida, supra cuprea, subtus nigro-anea; antennis pedibusque rufo-testaceis, illis apice infuscatis; prothorace sat profunde, minus crebre punctulato; clytris sat profunde punctato-striatis. — Long. 2, lat. 1 millim.

Patria: Patagonia (Port Famine).

Caput sub-rotundatum, leviter convexum, cupreum, nitidum, subtiliter, crebre punctulatum, antice viridi-aneum. Oculi rotundati, parum convexi, nigro-brunnei. Antennae dimidio corpore breviores, minus tenues, rufo-testaceae, parce pubescentes, extrorsum sensim modice incrassatae, articulis brevibus, ultimo acuminato. Prothorax longitudine nonnihil latior, basi apiceque truncatus, lateribus tenuiter reflexo-marginatis, medio modice rotundato-ampliatis, angulis anticis obtusis, posticis fere rectis; superne convexus, cupreus, nitidus, sat profunde, minus crebre punctulatus. Scutellum triangulare, cupreum, nitidum, laeve. Elytra antice truncata, prothoracis basi parum latiora, quam lata dimidio longiora, callo suprahumerali non elevato; lateribus pone basin nonnihil ampliata; a medio sensim nonnihil angustata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, cuprea, sat profunde punctato-striata, interstitiis planis, laevibus. Corpus subtus nigro-aneum, nitidum, subtiliter, crebre punctulatum. Pedes rufo-testacei, nitidi, punctulati; femoribus posticis modice incrassatis, sub-compressis.

344. *Noda proxima.*

Oblongo-ovata, modice convexa, cuprea, nitida; antennis basi palpisque testaceis; prothorace crebre, subtiliter punctulato, lateribus antice subito, pone medium modice rotundato-ampliato; clytris irregulariter punctato-striatis, pone humeros vage, crebrius punctatis, striis usque ad apicem continuatis. — Long. 4, lat. 2 millim.

Patria: Nova Hollandia (Sidney).

Statura fere et summa similitudo *N. oblongae*, magis cupreo-nitida, lateribus prothoracis rotundatis, elytrorum striis usque ad apicem extensis etc. ab illa bene distincta. Caput sub-rotundatum, parum convexum, sat crebre, evidenter punctulatum, cupreum, sub-nitidum, postice breviter, longitudinaliter canaliculatum. Palpi testacei, apice infuscati. Oculi rotundati, modice convexi, nigri. Antennae ultra prothoracis

basin nonnihil pertingentes, testaceae, articulis quinque ultimis crassioribus, nigro-fuscis. Prothorax longitudine fere duplo latior, apice utrinque vix sinuatus, basi reflexo-marginatus, sub-bisinuatus, lateribus tenuiter marginatis, pone apicem ultra medium subito, dein modice rotundato-ampliat, angulis anticis deflexis, obtusis, posticis sub-rotundatis; superne modice convexus, cupreus, nitidus, sat crebre, subtiliter punctatus. Scutellum mediocre, cupreum, nitidum, sub-laeve, apice rotundatum. Elytra antice vix emarginata, prothorace parum latiora at illo duplo longiora, humeris rotundatis; lateribus recta, pone medium nonnihil angustata, apice conjunctim rotundata; superne modice convexa, cuprea, nitida, minus regulariter punctato-striata; striis usque ad apicem continuatis; supra callum humeralem leviter, longitudinaliter impressa, pone callum crebre, vage rugoso-punctata. Corpus subtus cupreo-aeueum, sub-nitidum, crebre, pectore evidentius, abdomine subtilius punctulatis. Pedes cupreo-aeui, nitidi, punctulati; femoribus medio modice clavatis, muticis.

315. *Noda oblonga*.

Oblongo-ovata, modice convexa, nitida; antennis basi palpisque testaceis; tibiis apice tarsisque ferrugineis; prothorace minus crebre, subtiliter punctulato, pone apicem ultra medium oblique ampliato, ibique sub-angulariter dilatato; elytris parum profunde punctato-striatis, striis ante apicem desinentibus. — Long. $2\frac{1}{2}$ —4, lat. $1\frac{1}{4}$ — $2\frac{1}{4}$ millim.

Patria: Montevideo, Buenos Ayres.

Caput sub-rotundatum, parum convexus, aeneum, sub-cupreo-micans, minus crebre, evidenter punctulatum. Palpi testacei, articulo ultimo nigro-piceo. Oculi rotundati, modice convexi, nigri. Antennae ad prothoracis basin pertingentes, nigro-piceae, extrorsum incrassatae, articulis 2—6 testaceis. Prothorax longitudine duplo latior, antice quam basi multo angustior, apice leviter rotundato-emarginatus, basi tenuiter marginatus, utrinque parum sinuatus, lateribus anguste reflexo-marginatis, ultra medium oblique ampliat, ibique sub-angulariter dilatatis, deinde basin versus nonnihil angustatis, angulis anticis deflexis, lateraliter nonnihil productis, acuminatis, posticis fere rectis; superne modice convexus, aeneus, nitidus, minus crebre, subtiliter punctulatus. Scutellum mediocre, cupreo-aeueum, nitidum, laeve, apice utraque oblique truncatum. Elytra antice leviter rotundato-emarginata, prothorace parum latiora at illo duplo longiora, humeris rotundatis; lateribus vix ampliata, pone medium sensim angustata, apice sub-rotundata, superne modice convexa, parum profunde, minus regulariter punctato-striata, striis ante apicem desinentibus, quinta et sexta longe ante apicem connexis; apice ipso sub-elevata, supra callum humeralem longitudinaliter, leviter impressa. Corpus subtus aeneum, nitidum, sat crebre, subtiliter punctulatum. Pedes aeni, nitidi, punctulati; femoribus medio modice incrassatis, subtus muticis; tibiis apice tarsisque ferrugineis.

316. *Noda cuprescens*.

Rotundata, convexa, nitida, supra cuprea, subtus aenea; antennis palpisque rufo-ferrugineis; capite antice aeneo prothoraceque parce, sat profunde punctulatis; elytris sub-geminatim punctatis, stria suturali antice valde abbreviata impressis. — Long. $3\frac{1}{4}$, lat. $2\frac{1}{4}$ millim.

Patria: Buenos Ayres.

Caput sub-ovatum, leviter convexus, cupreum, nitidum, parce, evidentius punctulatum, antrorsum angustatum, viridi-aeueum, apice emarginatum. Palpi rufo-ferruginei, apice nigro-picei. Oculi rotundati, modice convexi, nigri. Antennae ultra prothoracis basin pertingentes, minus tenues, nigrae, extrorsum incrassatae, articulis quatuor basalibus rufo-testaceis. Prothorax longitudine fere duplo latior, antice quam basi multo angustior, apice utrinque leviter sinuatus, medio nonnihil rotundato-productus, basi sub-bisinuatus, lateribus tenuiter reflexo-marginatis, pone apicem subito rotundato-ampliat, angulis anticis deflexis, antrorsum nonnihil prominulis, sub-acuminatis, posticis retrorsum parum productis, acutis; superne convexus, cupreus, nitidus, parce, sat profunde punctulatus. Scutellum mediocre, cupreum, nitidum, laeve, apice sub-rotundatum. Elytra antice vix rotundato-emarginata, prothoracis basi haud latiora, quam lata non longiora,

humeris rotundatis; lateribus vix ampliata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, cuprea, nitida, sub-geminatim punctata, stria suturali antice valde abbreviata impressa. Corpus subtus viridi-aneum nitidum, subtiliter, crebre punctulatum. Pedes viridi-anei, nitidi, subcupreo-micantes, punctulati, tenuiter, breviter pubescentes.

347. *Noda vagabunda*.

Rotundata, convexa, viridi-anea, nitida, subtus carulea; antennis basi, tibiis tarsisque rufo-testaceis; capite prothoraceque subtiliter, parce punctulatis, hoc basi leviter bisinuato; elytris sat profunde, minus crebre, hinc inde sub-seriatim punctatis. — Long. $2\frac{1}{2}$ —3, lat. $1\frac{1}{4}$ —2 millim.

Var. α : supra cupreo-anea, nitida.

Var. β : supra carulea, nitida.

Var. γ : ut genuina, sed pedibus totis rufo-testaceis.

Patria: Insulae Puna, Oahu et Taiti.

Caput ovatum, leviter convexum, aneum, nitidum, minus crebre punctulatum, antrorsum angustatum, vertice tenuiter, longitudinaliter canaliculatum. Clypeus testaceus. Mandibula nigro-picea. Oculi rotundati, modice convexi, nigri. Antennae longitudine dimidii corporis, sub-tenues, flavo-testaceae, articulis quinque ultimis modice incrassatis, nigro-fuscis. Prothorax longitudine duplo latior, anterieus quam basi multo angustior, apice utrinque leviter sinuatus, medio parum rotundato-productus, basi bi-sinuatus, lateribus tenuiter reflexo-marginatis, pone apicem subito rotundato-ampliatis, angulis anticis deflexis, nonnihil prominulis, sub-acuminatis, posticis retrorsum modice productis, acutis; superne convexus, viridi-aneus, nitidus, subtiliter, minus crebre punctulatus. Scutellum medioere, viridi-aneum, nitidum, laeve, apice rotundatum. Elytra antice conjunctim leviter rotundato-emarginata, prothoracis basi vix latiora, quam lata non longiora, humeris rotundatis; lateribus haud ampliata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, viridi-anea, nitida, profunde, parcius, minus regulariter, sub-seriatim punctata. Corpus subtus nigrum, sub-nitidum, vix punctulatum. Pedes medioeres; femoribus medio modice incrassatis, nigro-carulescentibus, subtus muticis; tibiis tarsisque rufo-testaceis.

Obs. In specimina nonnulla elytra subtilius punctata, ceterum omnino ut in genuina.

348. *Noda pumila*.

Rotundata, convexa, supra viridi-anea, subtus nigro-carulea, nitida; antennis basi palpisque testaceis; capite subtiliter, crebre punctulato, basi tenuiter sulcato; prothorace parcius, profundius punctato; elytris profunde; minus regulariter, sub-seriatim punctatis. — Long. 2½, lat. 1¼ millim.

Patria: Brasilia (Rio Janeiro).

Statura et summa similitudo *N. vagabunda*, nonnihil minor, prothorace profundius punctato, pedibus totis viridi-aneis ab illa mox distincta. Caput sub-ovatum, parum convexum, viridi-aneum, sub-nitidum, subtiliter, crebre punctulatum, postice tenuiter, longitudinaliter carinatum, antrorsum angustatum. Palpi testacei. Oculi sub-rotundati, modice convexi, nigri. Antennae ultra prothoracis basin pertingentes, flavo-testaceae, articulis quinque ultimis crassioribus, nigris. Prothorax longitudine fere duplo latior, antice quam basi multo angustior, apice utrinque leviter sinuatus, medio parum rotundato-productus, basi sub-bisinuatus, lateribus tenuiter reflexo-marginatis, pone apicem rotundato-ampliatis, angulis anticis deflexis, antrorsum nonnihil prominulis, sub-acuminatis, posticis retrorsum parum productis, acutis; superne convexus, viridi-aneus, nitidus, parce, sat profunde punctatus. Scutellum medioere, viridi-aneum, nitidum, laeve, apice rotundatum. Elytra antice vix rotundato-emarginata, prothoracis basi haud latiora, quam lata non longiora, humeris rotundatis; lateribus fere recta, apice conjunctim rotundata, superne convexa, viridi-anea, nitida, profunde, minus crebre, sub-seriatim punctata. Corpus subtus nigro-caruleum, nitidum, subtiliter punctulatum. Pedes nigro-carulescentes, nitidi, parce punctulati; femoribus medio modice incrassatis, muticis.

349. *Edusa puberula*.

Oblongo-ovata, nitida, supra prasina, dense flavescenti-pubescens, subtus cuprea; antennis, clypeo pedibusque testaceis, illis articulo ultimo apice nigro; capite subtiliter punctulato, postice tenuiter canaliculato, antice denudato, pulchre viridi-nitente; prothorace subtiliter punctulato; elytris parum profunde punctato-striatis, interstitiis crebre, subtiliter rugulosis; femoribus anticis incrassatis, subtus dente brevi, valido, sub-obtusio armatis. — Long. 4—4½, lat. 2—2½ millim.

Patria: Nova Hollandia (Sidney).

Caput sub-rotundatum, parum convexum, prasinum, sub-nitidum, subtiliter, crebre punctulatum, pube flavescenti dense obsitum, postice tenuiter, longitudinaliter canaliculatum, antice denudatum, pulchre viridinitens. Clypeus et palpi testacei. Oculi ovati, convexi, nigri. Antennae dimidio corpore longiores, tenues, filiformes, testaceae, parce pubescentes, articulo ultimo apice nigro. Prothorax longitudine duplo latior, apice truncatus, basi leviter bi-sinuatus, lateribus antice posticeque angustatis, medio rotundato-ampliatis, angulis anticis deflexis, obtusis, posticis rotundatis; superne modice convexus, prasinus, sub-nitidus, subtiliter, crebre punctulatus, pube brevi, densa, flavescenti obsitus. Scutellum mediocri, prasinum, pubescens, apice rotundatum. Elytra antice truncata, prothorace nonnihil latiora et illo plus triplo longiora, humeris rotundatis; lateribus recta, longe pone medium nonnihil angustata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, prasina, nitida, pube densa, dilute flavescenti obsita, parum profunde punctato-striata, interstitiis subtiliter, crebre rugulosis. Corpus subtus cupreum, nitidum, crebre granulato-punctatum, pube cinerea sat dense vestitum. Pedes flavo-testacei, crebre punctulati, tenuiter cinereo-pubescentes; femoribus medio incrassatis, anticis subtus medio dente brevi, valido, obtuso armatis.

350. *Edusa viridipennis*.

Oblongo-ovata, cuprea, nitida, pube brevi, cinerea dense obsita; clypeo, antennis pedibusque rufo-testaceis; capite prothoraceque crebre, subtiliter punctulatis; elytris prasinis, parum profunde punctato-striatis, crebre, transversim rugulosis; femoribus anticis muticis. — Long. 3, lat. 1½ millim.

Patria: Nova Hollandia (Sidney).

Caput sub-rotundatum, parum convexum, cupreum, sub-nitidum, crebre punctulatum, pube cinerea obsitum, antice sub-denudatum, magis nitidum. Clypeus et palpi rufo-testacei. Oculi sub-rotundati, convexi, nigri. Antennae dimidio corpore longiores, sub-tenues, filiformes, testaceae, parce pubescentes, extrorsum saturiores. Prothorax longitudine vix duplo latior, apice truncatus, basi leviter rotundatus, antice posticeque angustatus, medio rotundato-amplius, angulis anticis deflexis, obtusis, posticis rotundatis; superne modice convexus, cupreus, nitidus, subtiliter, crebre punctulatus, pube brevi, densa cinerea obsitus. Scutellum mediocri, cupreum, punctulatum, pubescens, apice rotundatum. Elytra antice truncata, prothorace nonnihil latiora et illo fere triplo longiora, ad humeros rotundatos nonnihil ampliata, lateribus recta, longe pone medium nonnihil angustata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, prasina, nitida, pube densa, cinerea obsita, parum profunde punctato-striata, interstitiis crebre, transversim rugulosis. Corpus subtus cupreum, nitidum, punctatum, tenuiter cinereo-pubescens. Pedes rufo-testacei, punctulati, breviter pubescentes; femoribus medio incrassatis, omnibus muticis.

351. *Edusa evanescens*.

Oblongo-ovata, modice convexa, viridi-sericea, parum nitida, pube brevi, albidaspersa; antennis longis, clypeo, palpis pedibusque flavo-testaceis; prothorace crebre punctulato, lateribus rotundato; elytris crebre, vage punctulatis. — Long. 2, lat. 1½ millim.

Patria: Nova Hollandia (Sidney).

Caput sub-rotundatum, parum convexum, viridi-sericeum, haud nitidum, crebre, evidenter punctulatum, breviter pubescens. Clypeus et palpi flavo-testaceis. Oculi rotundati, convexi, nigri. Antennae corpore nonnihil breviores, minus tenues, flavo-testaceae, parce pubescentes, extrorsum sensim leviter incrassatae. Prothorax longitudine vix dimidio latior, apice truncatus, basi rotundatus, lateribus medio rotundato-ampliatis, angulis anticis deflexis, obtusis, posticis rotundatis; superne modice convexus, viridi-sericeus, parum nitidus, subtiliter, crebre punctulatus, pube brevi, albida obsitus. Scutellum mediocre, viridi-sericeum, punctulatum, apice rotundatum. Elytra antice truncata, prothorace vix dimidio latiora, quam lata nonnihil longiora, ad humeros rotundatos nonnihil ampliata, lateribus recta, pone medium angustata, apice conjunctim rotundata, superne modice convexa, viridi-sericea, parum nitida, subtiliter, crebre, vage punctulata, pube brevi, albida adpersa. Corpus subtus viridi-aneum, nitidum, glabrum, evidentius, crebre punctulatum. Pedes flavo-testacei, punctulati, breviter pubescentes; femoribus medio incrassatis, omnibus subtus muticis.

352. *Colaspis geminata*.

Oblongo-ovata, convexa, cupreo-anea, nitida; antennis, palpis pedibusque testaceis; capite crebre punctato, tenuiter canaliculato; prothorace sat crebre punctato, lateribus medio sub-dentato; elytris mediocriter, crebre, geminatum punctatis, interstitiis alternis costatis. — Long. $5\frac{1}{2}$ — $7\frac{1}{2}$, lat. 3 — $4\frac{1}{2}$ millim.

Patria: Brasilia (Rio Janeiro).

Caput rotundatum, convexum, cupreo-aneum, nitidum, crebre punctatum, postice medio tenuiter canaliculatum. Clypeus testaceus. Palpi flavo-testacei, articulo ultimo infuscat. Oculi sub-ovati, convexi, nigri. Antennae longitudine fere elytrorum, tenues, testaceae, parce pubescentes, articulis septimo et duobus ultimis leviter infuscat. Prothorax longitudine dimidio latior, antice quam basi multo angustior, apice vix rotundato-emarginatus, basi marginatus, utrinque sinuatus, lateribus anguste reflexo-marginatis, ultra medium oblique ampliatis ibique angulariter nonnihil productus, tum subito angustatis, angulis anticis deflexis, sub-obtusis, posticis in dentem parvum excurrentibus; supra convexus, cupreo-aneus, nitidus, sat crebre, profunde, dorso postico nonnihil parcius punctatus. Scutellum sub-triangulare, cupreum, nitidum, laeve. Elytra antice sub-truncata, prothoracis basi nonnihil latiora, quam lata dimidio longiora, humeris rotundatis; lateribus haud ampliata, pone medium sensim angustata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, cupreo-anea, nitida, sat crebre, mediocriter, geminatum punctata, interstitiis alternis latioribus, costatis, laevibus. Corpus subtus cupreo-aneum, nitidum, parce punctulatum. Pedes testacei, nitidi, vix punctati; femoribus parum incrassatis, muticis; tibiis parce breviter pubescentibus.

353. *Colaspis pallidula*.

Oblongo-ovata, convexa, dilute flavo-testacea, sub-nitida; oculis et antennarum articulis quinque ultimis nigris; capite parce punctato, inter oculos canaliculato; prothorace parce, inequaliter punctato, ad latera leviter impresso, lateribus medio parum sinuatis, obsolete bidentatis; elytris ad suturam punctato-striatis, disco minus regulariter, sub-seriatim punctatis, interstitiis alternis sub-costatis. — Long. $6\frac{1}{2}$, lat. $3\frac{1}{2}$ millim.

Patria: Brasilia (Rio Janeiro).

Caput sub-rotundatum, modice convexum, pallide flavo-testaceum, sub-nitidum, parce, sat profunde punctatum, inter oculos longitudinaliter canaliculatum, antice sub-laevigatum. Mandibulae apice infuscae. Palpi flavo-testacei. Oculi ovati, convexi, nigri, antice leviter emarginati. Antennae dimidio corpore longiores, sub-tenues, filiformes, articulis sex basalibus flavo-testaceis, sexto obscuriore, quinque ultimis nigris. Prothorax longitudine dimidio latior, apice truncatus, basi leviter rotundatus, lateribus pone apicem oblique ampliatis, dein leviter sinuatis, obsolete bidentatis, basin versus oblique angustatis, angulis anticis nonnihil reflexis, acuminatis, posticis obtusis; superne modice convexus, dilute flavo-testaceus, nitidus, parce, inequaliter, sat profunde punctatus, utrinque ad latera impressus. Scutellum sub-triangulare, pallide testaceum,

nitidum, parce punctulatum, apice rotundatum. Elytra antice truncata, prothorace nonnihil latiora et illo duplo et dimidio longiora, humeris rotundatis, callo suprahumerali parum elevato, obtuso; lateribus haud ampliata, pone medium angustata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, dilute flavo-testacea, sub-nitida, ad suturam sat regulariter punctato-striata, interstitiis planis, extrorsum minus regulariter sub-seriatim punctata, interstitiis alternis sub-costatis. Corpus subtus dilute flavo-testaceum, nitidum, sub-læve. Pedes dilute flavo-testacei, nitidi, obsolete punctulati.

354. *Colaspis castanea*.

Ovata, convexa, castanea, nitida; antennis, palpis pedibusque dilutioribus; capite postice sub-lævigato, inter oculos longitudinaliter, breviter canaliculato, antice impresso, punctulato; prothorace parce punctato; clytris profunde, minus crebre punctato-striatis, interstitiis levibus, dorsalibus nonnihil convexis. — Long. 5—6, lat. 3—3½ millim.

Patria: Insula Puinipet.

Caput sub-rotundatum, leviter convexum, castaneum, nitidum, postice sub-lævigatum, inter oculos breviter, longitudinaliter canaliculatum, antice impressum, minus crebre punctatum. Palpi rufo-testacei. Oculi ovati, convexi, nigri, antice leviter emarginati. Antennae longitudine dimidii corporis, sub-tenuis, filiformes, testaceae, parce pilosae. Prothorax longitudine fere duplo latior, apice truncatus, postice utrinque leviter sinuatus, tenuiter marginatus, lateribus anguste reflexo-marginatis, pone apicem ultra medium modice rotundato-ampliat, dein nonnihil angustatis, angulis anticis reflexis, acuminatis, posticis fere rectis; superne convexus, castaneus, nitidus, parce, mediocriter, vage punctatus. Scutellum mediocre, castaneum, nitidum, læve, apice rotundatum. Elytra antice truncata, prothorace parum latiora, quam lata dimidio longiora, humeris rotundatis, callo suprahumerali parum elevato, obtuso; lateribus haud ampliata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, castanea, nitida, profunde, minus crebre punctato-striata, interstitiis modice latis, levibus, dorsalibus perparum elevatis. Corpus subtus dilute castaneum, nitidum, læve. Pedes rufo-testacei, nitidi, obsolete punctulati, geniculis leviter infusatis.

355. *Colaspis trivialis*.

Oblongo-ovata, convexa, viridi-aenea, nitida; antennis flavo-testaceis; articulis 7, 10 et 11 nigris; capite sat crebre punctato, postice tenuiter canaliculato, antice impresso; prothorace profunde, crebre punctato, lateribus ultra medium oblique ampliat, ibique breviter dentatis; clytris geminatim punctato-striatis, pone medium lutescentibus, interstitiis alternis elevatis, pedibus flavo-testaceis, geniculis leviter infusatis. — Long. 6—6½, lat. 3—3½ millim.

Var. *a*: clytris fere totis sordide lutescentibus, basi parum aenco-micantibus.

Patria: Brasilia (Rio Janeiro).

Caput sub-rotundatum, parum convexum, viridi-aeneum, nitidum, sat profunde et crebre punctatum, postice tenuiter, longitudinaliter canaliculatum, apice profunde, rotundatum impressum. Clypeus flavo-testaceus, apice leviter emarginatus. Palpi flavo-testacei, articulo ultimo leviter infusato. Prothorax longitudine fere duplo latior, apice truncatus, postice tenuiter marginatus, utrinque leviter sinuatus, lateribus anguste reflexo-marginatis, pone apicem ultra medium oblique ampliat, ibique dente brevi armatis, dein basin versus oblique angustatis, angulis anticis sub-reflexis, lateraliter nonnihil prominulis, sub-acuminatis, posticis parum productis, acutis; superne convexus, viridi-aeneus, nitidus, profunde, minus crebre punctatus. Scutellum mediocre, sub-triangulare, viridi-aeneum, nitidum, læve. Elytra antice singulatim parum rotundato-producta, prothorace nonnihil latiora et illo duplo et dimidio longiora, humeris rotundatis; lateribus ultra medium recta, dein apicem versus sensim angustata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, ultra medium viridi-

ænea, nitida, dein ad apicem sordide lutescentia, sat profunde, geminatim punctato-striata, interstitiis alternis modice elevatis, sub-costatis. Corpus subtus viridi-æneum, nitidum, sub-læve, segmento ultimo abdominis rufo-testaceo. Pedes dilute flavo-testacei, nitidi, vix punctati, geniculis leviter infuscatis; tibiis posticis intus medio ampliatis.

356. *Colaspis rustica*.

Oblongo-ovata, convexa, supra æneo-cuprea, subtus obscure ænea, nitida; antennis nigris, artienlis 2—4 ferrugineis; capite sat crebre punctato, tenuiter, longitudinaliter canaliculato, antice leviter impresso; prothorace mediocriter, minus crebre punctato, lateribus pone medium obsolete dentatis; elytris mediocriter, seriatim punctatis. — Long. 4½, lat. 2½ millim.

Var. *α*: supra tota viridi-ænea.

Patria: Brasilia (Rio Janciro).

Caput sub-rotundatum, parum convexum, æneum, nitidum, sat crebre, mediocriter punctatum, postice longitudinaliter, tenuiter canaliculatum, antice leviter impressum. Clypeus niger, nitidus, lævis. Palpi nigropicei. Oculi ovati, convexi, nigri, antice non emarginati. Antennæ longitudine dimidii corporis, nigrae, articulis 2—4 ferrugineis, extrorsum nonnihil incrassatae. Prothorax longitudine dimidio latior, apice truncatus, basi tenuiter marginatus, utrinque leviter sinuatus, lateribus anguste marginatis, ad medium obliquis ibique breviter unidentatis, dein basin versus sensim angustatis, angulis anticis nonnihil reflexis, posticis lateraliter nonnihil productis, acuminatis; superne convexus, æneo-cupreus, nitidus, mediocriter, minus crebre punctatus. Scutellum mediocriter, cupreo-æneum, nitidum, læve, apice sub-rotundatum. Elytra antice truncata, prothorace latiora et illo plus duplo longiora, humeris rotundatis, callo suprahumerali parum elevato, obtuso; lateribus ultra medium recta, dein sensim angustata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, æneo-cuprea, nitida, minus crebre, seriatim punctata, interstitiis angustis, lævibus. Corpus subtus obscure æneum, vix punctatum, Pedes ænei, nitidi, vix punctulati; tibiis teretibus, rectis; tarsis fusco-ferrugineis.

357. *Colaspis fuscitarsis*.

Oblongo-ovata, convexa, viridis, nitida; antennis basi, palpis, apice excepto, pedibusque flavis, tarsis nigro-fuscis; capite parce, postice subtilius, antice evidentius punctulato; vertice longitudinaliter canaliculato; prothorace brevi, minus crebre, mediocriter punctato, lateribus medio leviter emarginatis, obsolete bidentatis; elytris sat profunde, minus regulariter, seriatim punctatis. — Long. 4½, lat. 2½ millim.

Patria: Brasilia (Rio Janciro).

Caput sub-rotundatum, parum convexum, viride, nitidum, parce, postice subtiliter, antice evidentius punctulatum; vertice longitudinaliter, inter oculos transversim canaliculato. Palpi flavi, articulo ultimo piceo. Oculi sub-ovati, convexi, nigro-brunnei. Antennæ dimidio corpore longiores, sub-tenuis, nigrae, articulis quatuor basalibus flavis. Prothorax longitudine duplo latior, apice truncatus, basi tenuiter marginatus, utrinque leviter sinuatus, lateribus fere ad medium oblique ampliatis ibique leviter sinuatis, obsolete bidentatis, basin versus angustatis, angulis anticis nonnihil reflexis, acuminatis, posticis rectis; superne convexus, viridis, nitidus, mediocriter, minus crebre punctatus. Scutellum sub-triangulari, viride, nitidum, læve. Elytra antice truncata, prothorace latiora et illo triplo longiora, humeris rotundatis, callo suprahumerali parum elevato, obtuso; lateribus ultra medium recta, dein sensim angustata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, viridia, nitida, sat profunde, minus crebre, sub-seriatim punctata, interstitiis lævibus. Corpus subtus æneum, nitidum, obsolete punctulatum. Pedes flavi, nitidi, vix punctulati; tarsis nigro-fuscis.

358. *Colaspis smaragdula*.

Oblonga, convexa, supra smaragdina, subtus nigra, nitida; antennis basi, palpis pedibusque flavo-testaceis; capite minus crebre punctulato, postice longitudinaliter canali-

culato, inter oculos triangulariter impresso; prothorace minus crebre punctulato, lateribus modice rotundatis; clytris crebre, sat profunde punctato-striatis, striis dorsalibus pone medium profundioribus; femoribus anticis crassioribus, subtus medio breviter dentatis. — Long. $4\frac{1}{2}$, lat. $2\frac{1}{4}$ millim.

Patria: China (Hongkong).

Caput sub-rotundatum, parum convexum, smaragdinum, nitidum, minus crebre punctulatum, postice tenuiter, longitudinaliter canaliculatum, inter oculos triangulariter impressum. Clypeus testaceus. Palpi flavo-testacei. Oculi ovati, convexi, nigri. Antennae in individuum descriptum mutilatae, basi flavo-testaceae. Prothorax longitudine duplo fere latior, apice sub-truncatus, basi marginatus, utrinque leviter sinuatus, lateribus anguste reflexo-marginatis, antice magis, postice minus angustatis, medio modice rotundato-ampliat, angulis anticis deflexis, sub-acuminatis, posticis fere rectis; superne convexus, smaraglinus, nitidus, minus crebre, medioeriter punctatus. Scutellum sub-triangulare, smaragdinum, nitidum, leve. Elytra antice truncata, prothorace nonnihil latiora et illo duplo et dimidio longiora, humeris rotundatis, callo suprahumerali parum elevato, obtuso; lateribus recta, pone medium sensim angustata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, smaragdina, nitida, sat profunde, crebre, minus regulariter punctato-striata, striis dorsalibus pone medium profundioribus, interstitiis angustis, antice ad suturam transversim rugosis. Corpus subtus nigrum, sub-nitidum, punctulatum. Abdomen apice obscure ferrugineum. Pedes flavo-testacei, nitidi, postici longiores; femoribus anticis crassioribus, subtus medio dente brevissimo armatis.

359. *Colaspis californica*.

Oblongo-ovata, convexa, supra aenea, nitida, subtus nigra; antennis, palpis pedibusque flavo-testaceis; capite medioeriter, minus crebre punctato, inter oculos canaliculato; prothorace medioeriter, minus crebre punctato, lateribus medio sub-angulariter dilatatis; clytris crebre, ultra medium profunde, dein subtilius punctato-striatis. — Long 3, lat. $1\frac{1}{2}$ millim.

Patria: California (St. Francisco).

Caput sub-rotundatum, parum convexum, aeneum, nitidum, medioeriter, minus crebre punctatum, pone oculos transversim, leviter, arcuatim impressum, inter oculos tenuiter, longitudinaliter canaliculatum. Clypeus et palpi flavo-testacei. Oculi rotundati, convexi, nigri. Antennae dimidio corpore longiores, tenues, flavo-testaceae, extrorsum parum incrassatae. Prothorax longitudine dimidio latior, apice truncatus, basi marginatus, utrinque leviter sinuatus, lateribus anguste reflexo-marginatis, ad medium oblique ibique sub-angulariter ampliat, dein basin versus angustatis, angulis anticis lateraliter nonnihil productis, acuminatis, posticis fere rectis; superne convexus, aeneus, nitidus, minus crebre, medioeriter punctatus. Scutellum sub-triangulare, aeneum, nitidum, leve. Elytra antice truncata, prothoracis basi nonnihil latiora, quam lata dimidio longiora, humeris rotundatis, callo suprahumerali obtuso, lateribus recta, longe pone medium sensim angustata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, aenea, nitida, ultra medium minus regulariter, crebre, profunde, dein subtilius punctato-striata. Corpus subtus nigrum, nitidum, subtiliter punctulatum. Pedes flavo-testacei, nitidi; femoribus modice clavatis, muticis.

360. *Colaspis puberula*.

Ovata, convexa, supra aenea, nitida, subtus nigra, pube grisea dense adpersa; antennis basi, palpis pedibusque flavo-testaceis; capite subtilius, prothorace evidentius, crebre punctulatis; clytris sat crebre, medioeriter punctato-striatis, interstitiis angustis, parce punctulatis. — Long. $2\frac{1}{4}$, lat. $1\frac{1}{4}$ millim.

Patria: Insula Mauritius.

Caput rotundatum, parum convexum, aeneo-cupreum, nitidum, subtiliter, crebre punctulatum, pube brevi, grisea adpersum. Palpi flavo-testacei. Oculi rotundati, convexi, nigri. Antennae longitudine dimidii

corporis, nigræ, extrorsum sensim incrassatæ, articulis quatuor primis testaceis. Prothorax longitudine vix dimidio lator, apice truncatus, basi utrinque leviter sinuatus, antice quam basi angustior, lateribus tenuiter marginatis, medio modice rotundato-ampliatis, angulis anticis deflexis, obtusis, posticis fere rectis; superne convexus, crebre evidenter punctulatus, æneus, nitidus, pube grisea adpersus. Scutellum sub-triangularè, æneum, sub-nitidum, pubescens, vix punctatum. Elytra antice truncata, prothoracis basi latiora, quam lata parum longiora, humeris rotundatis, callo suprahumerali parum elevato, obtuso; lateribus vix ampliata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, ænea, nitida, pube sat longa grisea adpersa, mediocriter punctato-striata, interstitiis minus latis, parce punctulatis. Corpus subtus nigrum, sub-nitidum, subtiliter, crebre punctulatum. Pedes flavo-testacei, nitidi; femoribus modice clavatis, muticis.

361. *Paropsis vittipennis*.

Sub-rotundata, convexa, nigra, nitida; antennis basi, femoribus capiteque picco-ferrugineis, hoc parce, subtiliter punctulato, postice medio sulcato; prothorace picco, subtiliter, minus crebre punctulato, utrinque ante medium profunde impresso; clytris subtilissime, parce, sub-seriatim punctulatis, sutura vittisque singuli quinque rufo-ferrugineis. — Long. $1\frac{1}{2}$, lat. $10\frac{1}{2}$ millim.

Patria: Nova Hollandia (Sidney).

P. alternata GERM. affinis videtur, multo major, prothorace subtilissime punctulato ut et colore capitis, ab illa certe distincta. Caput breve, picco-ferrugineum, subtilissime, minus crebre punctulatum, postice sulco lato, longitudinali insculptum; antice breviter, triangulariter impressum. Palpi obscure ferruginei, articulo ultimo nigro. Oculi ovati, convexi, nigro-brunnei. Antennæ sat longæ, sub-tenues, nigræ, extrorsum leviter incrassatæ, articulo primo subtus, 2 et 4 totis rufo-ferrugineis. Prothorax longitudine triplo lator, apice tenuiter marginatus, utrinque leviter rotundato-emarginatus, basi parum rotundatus, lateribus tenuiter marginatis, pone apicem magis, medio modice rotundato-ampliatis, angulis anticis deflexis, antrorsum prominulis, sub-obtusis, posticis fere rectis; superne convexus, piceus, nitidus, subtilissime, minus crebre punctulatus, utrinque ad latera punctis nonnullis evidentioribus foveolæque sat magna impressus. Scutellum sub-triangularè, nigrum, nitidum, læve, apice sub-rotundatum. Elytra antice truncata, prothoracis basi latiora, quam lata vix dimidio longiora, humeris obtusis; lateribus non ampliata, longe pone medium conjunctim rotundata, superne convexa, postice declivia, subtiliter, parce, sub-seriatim punctulata, nigra, nitida, singulo vittis quinque suturaque rufo-testaceis. Corpus subtus nigrum, nitidum. Abdomen utrinque parce aciculatum. Pedes nitidi; femoribus piceis, tibiis tarsisque nigris.

362. *Paropsis rubrosignata*.

Sub-rotundata, convexa, nigra, nitida; capite, antennis basi pedibusque ferrugineis; prothorace subtiliter, minus crebre, extrorsum parcius, evidentius punctato, margine laterali late ferrugineo, leviter foveolato; clytris tenuiter punctato-striatis, interstitiis parce, subtiliter punctulatis, margine laterali, apice ramulum antrorsum emittente fasciisque duabus sanguineis. — Long. 11, lat. 8 millim.

Patria: Nova Hollandia (Sidney).

Affinis certe *P. sexpustulata*, sed elytris aliter signatis. Caput breve, parum convexus, ferrugineum, subtiliter, medio parcius punctulatum, postice leviter canaliculatum, antice obsolete impressum. Palpi ferruginei, articulo ultimo picco. Oculi ovati, modice convexi, nigro-brunnei. Antennæ sat longæ, sub-tenues, nigro-piceæ, articulis quatuor basalibus testaceis. Prothorax omnino ut in præcedenti formatus, niger, sub-nitidus, utrinque sat late sanguineo-marginatus, minus crebre, dorso subtiliter, lateribus evidentius punctatus, his foveola modice profunda impressis. Scutellum sub-triangularè, nigrum, nitidum, læve, apice parum rotundatum. Elytra antice truncata, prothoracis basi latiora, humeris obtusis; lateribus non ampliata, pone medium angustata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, nigra, nitida, tenuiter punctato-striata, inter-

stittiis parce, subtiliter punctulatis, singulo elytro margine laterali, ante apicem ramulum obliquum introrsum emittente fasciisque duabus inaequalibus, nec marginem, nec suturam attingentibus sanguineis, una mox pone basin, extrorsum antice emarginata alteraque infra medium, introrsum postice nonnihil dilatata. Corpus subtus nigrum, nitidum. Pedes ferruginei, nitidi; femoribus posterioribus plus minusve infuscatis.

363. *Paropsis biplagiata*.

Rotundata, convexa, rufo-testacea, nitida; pectore abdomineque nigris; prothorace dorso levi, antice posticeque parce, subtiliter, lateribus crebrius, evidentius punctato; elytris minus crebre, sat profunde, sub-scriatim, lateribus crebrius, vage punctatis, pone scutellum arca levi notatis, singulo vitta lata disci, utrinque abbreviata, nigra. — Long. 10½, lat. 8 millim.

Var. a: femoribus posterioribus basi nigris.

Patria: Nova Hollandia (Sidney).

Statura omnino *P. immaculate*, saepe nonnihil minor, aliter colorata, prothorace antice posticeque punctulato. Caput rufo-testaceum, sub-nitidum, evidenter, sat crebre, postice medio parce punctulatum, inter oculos tenuiter, longitudinaliter canaliculatum, antice transversim impressum. Palpi rufo-testacei. Oculi ovati, convexi, nigro-brunnei. Antennae longitudine fere elytrorum, sub-tenuis, rufo-testaceae, articulo ultimo apice nigro. Prothorax longitudine triplo latior, apice leviter rotundato-emarginatus, basi rotundatus, lateribus tenuiter marginatis, basin versus oblique ampliatis, angulis anticis nonnihil productis, obtusis, posticis rotundatis; superne convexus, rufo-testaceus, sub-nitidus, dorso medio sub-laevis vel subtilissime punctulatus, antice posticeque parce, subtiliter, lateribus profundius, crebrius punctatus. Scutellum sub-triangulare, rufo-testaceum, nitidum, leve. Elytra antice truncata, prothoracis basi nonnihil latiora, humeris obtusis; lateribus pone medium perparum ampliata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, nitida, postice declivia, sat profunde, minus crebre, lateribus crebrius, vage punctata, pone scutellum area sat magna, communi, levi notata, singulo vitta lata, antice parum, postice magis abbreviata, nigra, sutura angustius, margine laterali latius rufo-testacea. Corpus subtus nigrum, nitidum, extus undique sat late rufotestaceo-marginatum, Pedes rufo-testacei, parce punctulati; femoribus posterioribus interdum basi nigris.

364. *Paropsis pictipennis*.

Sub-ovata, convexa, flavo-testacea, nitida; antennis nigris, articulis tribus basalibus flavis; prothorace minus crebre, lateribus profundius punctato, his foveolatis; elytris sat profunde punctato-striatis, obscure lividis, margine laterali, fasciis duabus macularibus maculisque parvis, numerosis, inaequalibus, flavescens. — Long. 7, lat. 5 millim.

Patria: Nova Hollandia (Sidney).

Caput breve, parum convexus, flavo-testaceum, sub-nitidum, minus crebre punctulatum, postice tenuiter, longitudinaliter canaliculatum, antice transversim impressum. Clypeus brevis, dilute flavescens. Palpi testacei. Oculi ovati, convexi, nigro-brunnei. Antennae longitudine fere elytrorum, sub-tenuis, nigrae, articulis quatuor basalibus flavis. Prothorax longitudine vix triplo latior, apice truncatus, utrinque leviter sinuatus, basi sub-rotundatus, lateribus tenuiter marginatis, pone apicem modice rotundato-ampliatis, dein fere rectis, angulis anticis antrorsum prominulis, obtusis, posticis fere rectis, superne modice convexus, flavo-testaceus, nitidus, undique minus crebre, dorso subtilius, lateribus profundius punctatus, his ante medium foveola minus profunda impressis. Scutellum sub-triangulare, testaceum, nitidum, leve. Elytra antice truncata, prothoracis basi nonnihil latiora, quam lata dimidio longiora, humeris obtusis; lateribus non ampliata, apice conjunctim rotundata, superne valde convexa, postice declivia, sat profunde, regulariter punctato-striata, interstitiis planis, obsolete, minus crebre punctulatis; obscure livida, nitida, margine laterali, fasciis duabus singuli e maculis inaequalibus formatis, una ante medium, nonnihil arcuata, secunda pone medium,

sub-recta maculisque numerosis, inæqualibus flavescentibus. Corpus subtus flavo-testaceum, nitidum, sub-læve. Pedes flavo-testacei, nitidi, vix punctati.

365. *Paropsis sublineata*.

Rotundata, convexa, ferruginea, nitida; capite postice, antennis extrorsum pectoreque nigro-piceis; prothorace in dorso subtiliter, sat crebre, lateribus profundius punctato, his arcuatim impressis; elytris punctis majoribus et minoribus inixtis sat crebre impressis, longitudinaliter testaceo-lineatis, lineis hinc inde sub-interruptis. — Long. 6, lat. 5 millim.

Patria: Nova Hollandia (Sidney).

Caput breve, parum convexum, ferrugineum, nitidum, crebre, evidenter punctatum, basi transversim infuscatum, inter oculos obsolete canaliculatum, antice transversim leviter impressum. Palpi rufo-ferruginei. Oculi ovati, convexi, nigro-brunnei. Antennæ sat longæ, tenues, nigro-piceæ, articulis quatuor basalibus rufo-ferrugineis. Prothorax longitudine fere triplo latior, apice utrinque sinuatus, basi leviter rotundatus, lateribus anguste marginatis, antice posticeque angustatis, medio modice rotundato-ampliatis, angulis anticis antrorsum prominulis, sub-acuminatis, posticis obtusis; superne convexus, ferrugineus, nitidus, dorso subtilius, lateribus profundius punctatus, his sat profunde, arcuatim impressis. Scutellum sub-triangulare, ferrugineum, nitidum, basi punctis nonnullis parvis impressum. Elytra antice truncata, prothoracis basi nonnihil latiora, quam lata vix longiora, humeris rotundatis; lateribus pone medium leviter ampliata, apice conjunctim late rotundata, superne convexa, postice declivia, punctis majoribus minoribus mixtis sat crebre impressa, ferruginea, nitida, lineis in singulo novem angustis, hinc inde interruptis, testaceis ornata; callo suprahumerali nigro-fusco; margine laterali dilutius ferrugineo. Corpus subtus nitidum. Pectus nigro-piceum. Abdomen obscure ferrugineum. Pedes dilutius ferruginei, nitidi, punctati; tarsi fuscis.

366. *Paropsis M-fuscum*.

Rotundata, convexa, pallide-flavescens, nitida; capite basi, macula frontali subquadrata, linea transversa inter antennisque articulis 5 ultimis medio fusco-ferrugineis; prothorace minus crebre, ad latera profundius punctato ibique impresso, ante basin signo fusco litteram M referente ornato; elytris parce, irregulariter, sub-seriatim punctatis; callo suprahumerali leviter infuscato. — Long. 6, lat. 5 millim.

Patria: Nova Hollandia (Sidney).

Caput breve, parum convexum, dilute flavescens, nitidum, evidenter, sat crebre punctulatum, antice leviter transversim impressum, basi anguste, macula magna frontali lineaque transversa inter antennis fusco-ferrugineis. Palpi testacei. Oculi ovati, convexi, nigri. Antennæ sat longæ, tenues, dilute flavescens, articulis quinque ultimis medio late infuscatis. Prothorax brevis, transversus, longitudine fere quadruplo latior, apice utrinque sinuatus, basi leviter rotundatus, lateribus tenuiter marginatis, antice posticeque angustatis, medio modice rotundato-ampliatis, angulis anticis antrorsum prominulis, sub-acuminatis, posticis rotundatis; superne convexus, minus crebre, ad latera profundius punctatus, ibique leviter impressus, dilute flavescens, nitidus, ante basin signo magno, brunneo, litteram M referente, ornatus. Scutellum triangulare, dilute flavescens, nitidum, læve. Elytra antice truncata, prothoracis basi nonnihil latiora, quam lata vix longiora, humeris rotundatis, lateribus pone medium nonnihil ampliata, apice conjunctim late rotundata, superne convexa, dilute flava, nitida, parce irregulariter, sub-seriatim punctata, callo suprahumerali dilute infuscato. Corpus subtus dilute flavo-testaceum, nitidum, sub-læve. Pedes dilute flavo-testacei, nitidi, vix punctati.

367. *Zygogramma Kinbergi*.

Breviter ovata, convexa, picco-aenescens, nitida; antennis pedibusque ferrugineis, illis basi dilutioribus; prothorace parce, lateribus profunde, crebrius punctato, his ante apicem

impressis; elytris cupreo-violacescentibus, dorso regulariter punctato-striatis, lateribus inaequaliter punctatis, singulo lineis duabus longitudinalibus, basi apiceque conjunctis, flavis, una dorsali, altera laterali, hac pone medium ramulum transversum concolorem emittente. — Long. $6\frac{1}{2}$, lat. 4 millim.

Patria: Insula Puna.

Caput parum convexum, aeneo-piceum, nitidum, parce punctatum, interdum antice posticeque dilutius, saepe totum ferrugineum. Oculi rotundati, modice convexi, nigri. Antennae piceae, parce pubescentes, extrorsum sensim incrassatae, articulis 2 vel 3 basalibus dilutioribus. Prothorax longitudine plus duplo latior, apice rotundato-emarginatus, basi utrinque oblique truncatus, medio leviter rotundatus, anterie nonnihil angustior, lateribus pone apicem paullo rotundato-ampliat, angulis anticis deflexis, obtusis, posticis fere rectis; superne modice convexus, piceo-aenescens vel ferrugineus, nitidus, dorso parce, irregulariter, lateribus crebrius, profundius punctatus, his ante apicem foveola sat magna, parum profunda impressis. Scutellum parvum, subtriangulare, aeneum, subtilissime punctulatum. Elytra antice leviter rotundato-emarginata, prothorace nonnihil latiora, quam lata dimidio longiora, humeris rotundatis; pone medium sensim angustata, apice conjunctum rotundata, superne convexa, postice declivia, dorso regulariter, medioeriter punctato-striata, lateribus inordinate punctata, cupreo-violacescentia, nitida, singulo lineis duabus longitudinalibus, flavis, basi apiceque connexis, una inter striis a sutura 2 et 3, altera marginali, hac pone medium ramulum transversum, concolorem in discum emittente. Corpus subtus piceum, aeneo-micans, nitidum, sub-laeve. Pedes ferruginei, nitidi, parce punctulati, interdum aeneo-micantes.

368. *Phaedon bonariense*.

Rotundatum, convexum, nigro-caeruleum, nitidum; capite, antennis basi pedibusque rubris; prothorace subtilissime, punctulato, antice angustiore, pone apicem subito rotundato-ampliato, lateribus minus late, confuse rubro; scutello apice rotundato; elytris tenuiter punctato-striatis, interstitiis subtilissime coriaceis. — Long. 5, lat. $3\frac{1}{2}$ millim.

Patria: Buenos Ayres.

Summa similitudo *Mh. semimarginati*, sed magis rotundatum, aliter coloratum, prothorace subtilius punctulato, antice angustiore, pone apicem citius rotundato-ampliato, lateribus angustius, confuse rufo-marginato. Caput rotundatum, leviter convexum, sanguineum, sub-nitidum, punctulatum, postice ante basin transversim leviter infuscatum, inter oculos canalicula brevi, longitudinali et inter antennas canalicula transversa medio retrorsum arcuata impressum; ore palpisque nigris. Oculi parvi, ovati, modice convexi, nigri. Antennae dimidio corpore breviores, nigrae, articulis quinque ultimis crassis, primo rufo-testaceo. Prothorax longitudine fere triplo latior, antice quam basi multo angustior, apice parum profunde rotundato-emarginatus, basi leviter rotundatus, lateribus tenuiter marginatis, pone apicem subito rotundato-ampliat, angulis anticis deflexis, rotundatis, posticis fere rectis; superne modice convexus, nigro-caerulescens, nitidus, subtilissime punctulatus, extrorsum minus late, confuse rufo-marginatus. Scutellum nigro-caeruleum, nitidum, sub-laeve, apice rotundatum. Elytra antice truncata, prothoracis basi haud latiora, pone basin ad medium rotundato-ampliat, dein cito angustata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, nigro-caerulescentia, tenuiter punctato-striata, interstitiis sat latis, planis, subtilissime coriaceis. Corpus subtus nigro-caeruleum, nitidum, obsolete punctulatum. Pedes sanguinei, nitidi; femoribus superne infuscat.

369. *Adorinm philippinense*.

Ovatum, modice convexum, dilute flavescens, nitidum; antennis nigris, basi testaceis; pectore, abdomine pedibusque nigro-fuscis, his testaceo-variegatis; femoribus basi et apice tibiisque basi testaceis; capite postice leviter impresso; prothorace brevi, obsolete punctulato; elytris sat crebre, subtiliter punctulatis. — Long. 9, lat. 6 millim.

Patria: Manilla.

Caput sub-rotundatum, parum convexum, dilute flavescens, nitidum, parce punctulatum, postice leviter impressum. Oculi parvi, sub-rotundati, modice convexi, nigri. Antennae dimidio corpore longiores, minus tenues, nigrae, pubescentes, articulis tribus primis totis quartoque ultra medium dilute flavo-testaceis, secundo brevi, reliquis oblongis, tertio sequente nonnihil brevior. Prothorax brevis, transversus, longitudine plus duplo latior, apice leviter rotundato-emarginatus, basi sub-rotundatus, lateribus modice rotundato-ampliatis, angulis anticis nonnihil productis, obtusis, posticis rotundatis; superne leviter convexus, dilute sordide flavescens, nitidus, obsolete punctulatus. Scutellum triangulare, concolor, punctulatum. Elytra ovata, antice sub-truncata, prothorace latiora et illo quintuplo fere longiora, ad humeros rotundato-ampliata, pone medium angustata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, dilute flavescencia, nitida, subtiliter, sat crebre punctulata. Corpus subtus nigrum, punctulatum, lateribus pectoris latius, abdominis angustius testaceis. Pedes nigri, nitidi, punctulati, femoribus basi apiceque, tibiis basi tarsisque testaceis.

370. *Adimonia illota*.

Oblongo-ovata, modice convexa, dilute flavo-testacea, nitida; capite, antennis pedibusque rufo-testaceis, his albido-pubescentibus; pectore nigro; prothorace subtiliter, crebre punctulato, medio transversim impresso, lateribus rotundato-ampliato; elytris crebre, vage punctulatis, abdomine brevioribus. — Long. $4\frac{3}{4}$ —5, lat. 2— $2\frac{1}{4}$ millim.

Patria: Promontorium Bonae Spei.

A. tumida: statura sub-similis, sed multo minor. Caput sat magnum, sub-rotundatum, modice convexum, rufo-testaceum, nitidum, laeve, supra antennis canalicula tenui, transversa insculptum. Palpi ferruginei. Oculi rotundati, convexi, nigro-brunnei. Antennae elytris nonnihil longiores, minus tenues, filiformes, rufo-testaceae, parce pubescentes, articulis secundo et tertio brevibus, obconicis, reliquis elongatis. Prothorax longitudine nonnihil latior, basi apiceque truncatus, lateribus tenuiter reflexo-marginatis, ab apice fere ad medium oblique ampliatis, dein leviter rotundatis et basin versus sensim angustatis, angulis omnibus obtusis; superne modice convexus, dilute flavo-testaceus, nitidus, subtilissime, crebre punctulatus, medio transversim sat late, arcuatim impressus. Scutellum parvum, sub-triangulare, dilute flavo-testaceum, nitidum, laeve. Elytra antice truncata, prothorace paullo latiora et illo plus duplo longiora, humeris parum elevatis, rotundatis; lateribus apicem versus parum ampliata, apice conjunctim rotundata, abdomine nonnihil breviora, superne modice convexa, dilute flavo-testacea, nitida, vage, sat crebre punctulata. Corpus subtus obsolete punctulatum. Pectus nigrum. Abdomen testaceum, basi saepe infuscatum. Pedes rufo-testacei, nitidi, pube albida sat dense adpersi.

371. *Galleruca australis*.

Oblongo-ovata, modice convexa, nigro-fusca, breviter, sat dense cinereo-pubescent; prothorace brevi, testaceo, punctulato, medio transversim arcuatim, ante basin rotundatim impresso ibique macula obsoleta, fusca notato; elytris fusco-testaceis, creberrime punctulatis, vitta intramarginali, obscuriore decoratis. — Long. 8— $10\frac{1}{2}$, lat. $4\frac{1}{2}$ —5 millim.

Galleruca australis DEJ. Cat. ed. 3. p. 377.

Patria: Nova Hollandia (Sidney).

Caput parum convexum, rufo-testaceum, sub-opacum, punctulatum, postice macula magna, antice sub-constricta, nigra notatum, vertice leviter impressum, inter oculos breviter canaliculatum. Oculi sub-ovati, modice convexi, nigro-brunnei. Antennae longitudine dimidii corporis, sat validae, filiformes, nigrae, pubescentes, articulo secundo breviter obconico, tertio sequenti nonnihil longiore. Prothorax longitudine duplo latior, apice magis, basi minus rotundato-emarginatus, lateribus tenuiter reflexo-marginatis, ultra medium nonnihil oblique ampliatis, dein profunde triangulariter emarginatis, angulis anticis minus prominulis, obtusis, posticis dente brevi, acuto armatis; superne parum convexus, sordide testaceus, nitidus, punctulatus, medio transversim arcuatim et ante basin rotundatim impressus. Impressione media antice carinata, utrinque

retrosum nonnihil ampliata, postica fundo infusca. Scutellum mediocre, nigrum, crebre punctulatum, breviter pubescens, apice rotundatum. Elytra antice singulatim leviter rotundato-emarginata, prothorace dimidio latiora et illo fere quadruplo longiora, humeris rotundatis; lateribus apicem versus sensim nonnihil ampliata, apice conjunctim late rotundata, superne modice convexa, fusco-testacea, parum nitida, creberrime punctulata, pube brevissima, cinerea dense adpersa, vitta intramarginali, ante apicem abbreviata, fusca notata. Corpus subtus nigrum, sub-nitidum, subtiliter, crebre punctulatum, pube brevi, depressa, cinerea sat dense obsitum. Pedes nigro-fusci, punctulati, pubescentes; femoribus basi apiceque obscure ferrugineis.

372. *Galleruca phillipiensis*.

Oblonga, modice convexa, testacea, sub-nitida, pube brevi, cinerea adpersa; antennis nigro-fuscis, articulo primo ferrugineo; prothorace punctulato, antice leviter triangulariter, medio utrinque profunde, oblique impresso; elytris evidenter, sat crebre punctatis, lateribus non ampliatis. — Long. 5½, lat. 2½ millim.

Patria: Manilla.

Statura fere *G. sagittariae* sed magis oblonga, prothorace angustiore, aliter impresso. Caput subrotundatum, modice convexum, testaceum, parum nitidum, subtiliter, crebre punctulatum, pube brevi, cinerea adpersum, a basi ultra medium tenuiter canaliculatum. Oculi rotundati, modice convexi, nigri. Antennae longitudine dimidii corporis, filiformes, nigro-fuscae, parce pilosae, articulo primo ferrugineo, secundo brevi, tertio sequente dimidio longiore. Prothorax longitudine fere duplo latior, apice truncatus, basi medio leviter rotundato-emarginatus, lateribus pone apicem parum ampliatis, infra medium leviter sinuatis, angulis omnibus parum promiulis, sub-acuminatis; superne parum convexus, testaceus, paullo nitidus, punctulatus, breviter pubescens, pone apicem leviter, utrinque medio profunde oblique impressus. Scutellum mediocre, fusco-testaceum, subtiliter, crebre punctulatum, pubescens, apice rotundatum. Elytra antice leviter rotundato-emarginata, prothorace dimidio latiora et illo quadruplo longiora, humeris vix elevatis, rotundatis; lateribus recta, apice conjunctim rotundata, superne modice convexa, testacea, parum nitida, mediocriter, sat crebre punctata, pube brevi, sat densa, cinerea adpersa. Corpus subtus testaceum, subtiliter, crebre punctulatum, breviter pubescens. Pedes testacci, punctulati, breviter pubescentes.

373. *Galleruca nigropicta*.

Oblongo-ovata, modice convexa, nigro-fusca parum nitida, breviter cinereo-pubescentes; antennis medio incrassatis, basi testaceo-variegatis; prothorace testaceo, nigro-trinaculato; scutello elytrisque testaceis, his crebre punctatis, singulo maculis tribus oblongis prope suturam, vitta disci antice posticeque abbreviata lineaque intramarginali ante apicem abbreviata, nigris; geniculis testaceis. — Long. 5–6, lat. 2½–2¾ millim.

Var. *α*: elytrorum linea intramarginali nigra, pone medium abrupta.

Patria: Buenos Ayres.

Statura *G. notata*, aliter signata. Caput rotundatum, parum convexum, nigrum, sub-opacum, crebre punctulatum, margine apicali ferrugineum. Oculi rotundati, modice convexi, nigro-brunnei. Antennae dimidio corpore breviores, sat valide, nigro-fuscae, pubescentes, medio nonnihil incrassatae, articulis quatuor primis basi testaceis. Prothorax longitudine duplo latior, apice truncatus, basi medio parum rotundato-emarginatus, lateribus pone apicem leviter rotundato-ampliatis, angulis anticis obtusis, posticis fere rectis; superne modice convexus, testaceus, parum nitidus, breviter pubescens, crebre punctulatus, pone medium maculis tribus nigris ornatus, media ovata, lateralibus rotundatis. Scutellum testaceum, subtiliter, crebre punctulatum, pubescens, apice rotundatum. Elytra antice sub-truncata, prothorace latiora et illo triplo longiora, humeris elevatis, rotundatis; lateribus fere recta, apice conjunctim rotundata, superne modice convexa, testacea, parum nitida,

breviter cinereo-pubescentia, mediocriter, crebre punctulata, singulo maculis tribus oblongis prope suturam, prima basali, secunda ante medium et tertia ante apicem, vitta disci antice posticeque abbreviata lineaque intramarginali nigris. Corpus subtus subtiliter punctulatum, nigrum, breviter pubescens. Abdomen medio testaceum. Pedes nigro-fusci, pubescentes; femoribus apice tibiisque basi testaceis.

374. *Rhaphidopalpa serena*.

Oblongo-ovata, modice convexa, testacea, nitida; oculis nigris; capite postice cruciatim canaliculato; prothorace brevi, vix punctato, postice leviter transversim impresso; elytris subtiliter, minus crebre punctulatis, singulo non procul a margine laterali sulco longitudinali utrinque abbreviato, extrorsum carina leviter elevata instructo. — Long. $7\frac{1}{2}$, lat. $3\frac{1}{2}$ millim.

Patria: Java.

Affinis *Rhaph. similis*, corpore subtus pedibusque flavo-testaceis ut et singulo elytro non procul a margine laterali sulcato ab illa mox distincta. Caput rotundatum, modice convexum, testaceum, nitidum, sub-læve, pone oculos transversim, medio longitudinaliter canaliculatum, antice triangulariter nonnihil elevatum, ad antennarum basi impressum. Oculi rotundati, convexi, nigri. Antennæ longitudine elytrorum, minus tenues, testaceæ, parce pubescentes, articulo secundo brevi, obconico, reliquis elongatis. Prothorax longitudine fere duplo latior, apice vix rotundato-emarginatus, basi truncatus, tenuiter marginatus, lateribus anguste reflexo-marginatis, pone apicem nonnihil ampliatis, dein basin versus sensim perparum angustatis, angulis anticis parum prominulis, sub-acuminatis, posticis rectis; superne modice convexus, testaceus, nitidus, vix punctulatus, ante basin sat late, leviter impressus. Scutellum testaceum, nitidum, læve, apice rotundatum. Elytra antice sub-truncata, prothorace dimidio latiora et illo quadruplo longiora, humeris parum elevatis, rotundatis; lateribus ultra medium sensim perparum ampliata, apice conjunctim late rotundata, superne modice convexa, testacea, nitida, minus crebre punctulata, singulo non procul a margine laterali sulco longitudinali, antice minus, postice magis abbreviata et extrorsum carina modice elevata notato. Corpus subtus testaceum, sub-nitidum, obsolete punctulatum, parce pallido-pubescent. Pedes testacei, nitidi, punctulati, breviter, parce pubescentes.

375. *Diabrotica vittigera*.

Oblongo-ovata, modice convexa, nigra, sub-nitida; antennis articulis primis subtus, femoribus basi abdomineque dilute flavescentibus; prothorace sub-lævi, utrinque ante basin profunde impresso; elytris mediocriter, crebre, sub-seriatim punctatis, singulo lineis duabus antice connexis, pone medium abbreviatis, una dorsali, elevata, altera laterali maculaque apicali, triangulari, dilute flavescentibus. — Long. $5\frac{3}{4}$ —7, lat. $2\frac{1}{2}$ — $3\frac{1}{2}$ millim.

Patria: Buenos Ayres.

Caput sub-ovatum, leviter convexum, nigrum, sub-nitidum, obsolete punctulatum, inter oculos tenuiter, breviter canaliculatum. Oculi sub-rotundati, convexi, nigri. Antennæ dimidio corpore parum longiores, minus tenues, nigre, pubescentes, articulo primo basi et subtus, secundo et tertio inferne dilute flavescentibus, hoc sequente nonnihil brevior. Prothorax longitudine nonnihil angustior, basi apiceque truncatus, lateribus tenuiter reflexo-marginatis, basin versus sensim angustatis, angulis anticis deflexis, obtusis, posticis lateraliter nonnihil productis, acuminatis; superne convexus, niger, nitidus, obsolete punctulatus, utrinque pone medium foveola sat magna, profunda insculptus. Scutellum triangulare, nigrum, nitidum, sub-læve. Elytra antice truncata, prothorace dimidio latiora et illo triplo longiora, humeris vix elevatis, rotundatis; lateribus apicem versus sensim ampliata, apice conjunctim late rotundata, singulo ad suturam in dentem brevem, acutum producto; superne modice convexa, mediocriter, crebre, sub-seriatim punctata, nigra, sub-opaca, singulo lineis duabus longitudinalibus antice conjunctis, longe pone medium abbreviatis, una non procul a sutura, elevata, altera laterali maculaque apicali, sub-triangulari, dilute flavescentibus. Corpus subtus subtiliter,

crebre punctulatum, breviter cinereo-pubescent. Pectus nigrum. Abdomen dilute testaceum. Pedes nigri, parce pubescentes; femoribus anticis basi, posterioribus fere ad medium dilute flavescentibus.

376. *Diabrotica quadriplagiata*.

Oblongo-ovata, testacea, nitida; antennarum articulo primo subtus et apice, vertice pectoreque medio nigro-fuscis; prothorace subtiliter, crebre punctulato, utrinque in medio leviter impresso; elytris mediocriter, sub-seriatim punctatis, singulo maculis duabus magnis, nigris notato, anteriore sub-quadrata, posteriore sub-rotundata. — Long. 6, lat. $3\frac{1}{4}$ millim.

Patria: Brasilia (Rio Janeiro).

Caput sub-ovatum, modice convexum, flavo-testaceum, nitidum, subtiliter, crebre punctulatum, vertice transversim infuscatum, ante antennis impressum. Oculi rotundati, convexi, glauci. Antennae dimidio corpore longiores, sub-tenuis, nigro-fuscae, pubescentes, articulis quinque basalibus dilute flavescentibus, primo subtus leviter infuscatum, secundo brevi, reliquis elongatis, tertio sequente vix longiore. Prothorax longitudine vix dimidio latior, basi apiceque truncatus, lateribus tenuiter reflexo-marginatis, pone apicem nonnihil ampliatis, dein rectis, angulis anticis obtusis, posticis fere rectis; superne modice convexus, dilute flavescens, nitidas, subtiliter, sat crebre punctulatus, dorso medio utrinque foveola obliqua impressus. Scutellum triangulare, nigrum, nitidum, laeve, apice testaceum. Elytra antice sub-truncata, prothorace dimidio latiora et illo triplo longiora, callo suprahumerali leviter elevato, obtuso; lateribus a basi apicem versus sensim ampliatis, apice conjunctim late rotundata, superne convexa, mediocriter sub-seriatim punctulata, dilute flavescencia, singulo maculis duabus magnis, nigris ornato, una a basi fere ad medium extensa, sub-quadrata. antice extrorsum macula parva flava margini laterali connexa insignita, altera pone medium, sub-rotundata. Corpus subtus testaceum, punctulatum, breviter pubescens. Pectus medio nigro-fuscum. Abdomen ad latera fusco-variegatum. Pedes dilute flavescentes, punctulati, breviter pubescentes.

377. *Diabrotica scapularis*.

Ovata, modice convexa, dilute flavo-testacea, sub-nitida; antennis extrorsum pectoreque nigris; prothorace crebre, subtiliter punctulato, medio foveolis duabus insculpto; elytris evidenter, sat crebre punctulatis, macula suprahumerali alteraque parva disci pone medium, parvis, fusco-brunneis notatis. — Long. $6\frac{1}{2}$, lat. $3\frac{1}{4}$ millim.

Patria: Brasilia (Rio Janeiro).

Caput sub-rotundatum, leviter convexum, dilute flavo-testaceum, sub-nitidum, sat crebre punctulatum, ante antennis fere planum. Oculi sub-rotundati, modice convexi, nigri. Antennae longitudine elytrorum, sub-tenuis, filiformes, dilute-testaceae, pubescentes, articulis 5 vel 6 ultimis nigro-fuscis, secundo brevi, reliquis elongatis. Prothorax longitudine dimidio latior, apice parum rotundato-emarginatus, basi truncatus, lateribus tenuiter reflexo-marginatis, pone apicem leviter rotundato-ampliatis, dein sub-sinuatis, angulis anticis obtusis, posticis rectis; superne modice convexus, dilute flavo-testaceus, parum nitidus, subtiliter, sat crebre punctulatus, dorso medio utrinque foveola distincta nonnihil obliqua impressus. Scutellum triangulare, dilute flavo-testaceum, nitidum, laeve. Elytra antice sub-truncata, prothorace dimidio latiora et illo quadruplo longiora, humeris parum elevatis, rotundatis; lateribus ultra medium sat ampliatis, apice conjunctim late rotundata, superne modice convexa, dilute flavo-testacea, parum nitida, evidenter, crebre punctulata, macula suprahumerali, sub-rotunda alteraque inter medium et apicem in disco exteriori, elongata, interdum obsoleta, parvis, fusco-brunneis. Corpus subtus punctulatum, breviter, parce pubescens. Pectus nigrum. Abdomen flavo-testaceum. Pedes flavo-testacei, nitidi, punctulati, parce, breviter albedo-pubescentes.

378. *Diabrotica octonotata*.

Oblongo-ovata, convexa, nigra, nitida; antennis basi pedibusque flavo-testaceis; femoribus posticis apice nigris; prothorace vix punctato, medio utrinque leviter impresso; elytris

flavo-testaceis, sat crebre, medioeriter, sub-seriatim punctatis, singulo maculis quatuor inæqualibus, anteriore majore, nigris ornato. — Long. 5—5½, lat. 3¼—3½ millim.

Patria: Insula Puna, California (St. Francisco).

Caput nigrum, postice leviter convexum, nitidum, subtiliter punctulatum, pone oculos leviter transversim impressum, ad antennas utrinque parum arcuatim elevatum, antice fere planum, crebre, evidentius punctatum, sub-opacum, parce pubescens. Oculi sub-ovati, convexi, nigro-brunnei. Antennæ dimidio corpore longiores, nigro-fuscae, parce pubescentes, articulis quatuor basalibus flavo-testaceis, secundo brevi, tertio sequente dimidio longiore. Prothorax sub-quadratus, longitudine nonnihil latior, basi apiceque truncatus, lateribus tenuiter reflexo-marginatis, ante medium perparum rotundato-ampliatis, angulis anticis parum prominulis, deflexis, rotundatis, posticis rectis; superne modice convexus, niger, nitidus, vix vel obsolete punctulatus, dorso mox pone medium utrinque leviter impressus. Scutellum triangulare, nigrum, nitidum, sub-læve. Elytra antice sub-truncata, prothorace dimidio latiora et illo triplo longiora, humeris vix elevatis, rotundatis; lateribus a basi longe ultra medium sensim ampliata, apice conjunctim late rotundata, superne convexa, flavo-testacea, nitida, medioeriter, sat crebre, sub-seriatim punctata, singulo maculis quatuor inæqualibus, nigris ornato, prima ante medium, magna, antrorsum sinuata, postice truncata, secunda et tertia rotundis, prope suturam, illa mox pone medium, hac ante apicem locata quartaque pone medium prope marginem lateralem, sat magna, oblonga, antice truncata. Corpus subtus nigrum, sub-opacum, subtiliter, crebre punctulatum, pube brevi, cinerea parce adpersum. Pedes flavo-testacei, parce pubescentes; femoribus posticis apice sat late nigris.

379. *Diabrotica varipes*.

Oblongo-ovata, modice convexa, obscure cærulea, sub-nitida; prothorace punctulato, binpresso femoribusque anticis apice posterioribus basi testaceis; elytris crebre, vage punctulatis, margine inflexo medio testaceo. — Long. 5, lat. 2½ millim.

Patria: Brasilia (Rio Janeiro).

Caput sub-rotundatum, modice convexum, nigro-cæruleum, nitidum, subtilissime punctulatum, inter oculos leviter impressum, antice tenuiter longitudinaliter carinatum, utrinque sub-impressum. Oculi rotundati, convexi, nigri. Antennæ longitudine elytrorum, minus tenues, nigrae, pubescentes, articulo secundo brevi, reliquis oblongis, tertio sequente vix brevior. Prothorax longitudine vix dimidio latior, apice leviter rotundato-ampliatus, basi truncatus, lateribus reflexo-marginatis, pone apicem nonnihil ampliatis, dein fere rectis, angulis anticis lateraliter nonnihil productis, obtusis, posticis fere rectis; superne leviter convexus, testaceus, nitidus, subtilissime, sat crebre punctulatus, utrinque medio foveola sat profunda impressus. Scutellum triangulare, nigro-cæruleum, nitidum, læve. Elytra basi truncata, prothorace dimidio fere latiora et illo triplo longiora, humeris parum elevatis, rotundatis; lateribus apicem versus nonnihil ampliata, apice conjunctim rotundata; superne modice convexa, obscure cærulea, nitida, subtiliter, crebre, vage punctulata, margine laterali inflexo medio testaceo. Corpus subtus nigro-cæruleum, sub-nitidum, punctulatum, parce, breviter cinereo-pubescens. Pedes nigri, punctulati, pubescentes; femoribus anticis ima basi et apice, intermediis a basi fere ad medium, posticis ultra medium testaceis.

380. *Diabrotica amœnula*.

Oblongo-ovata, modice convexa, prasina, nitida; capite pectoreque nigris; tibiis tarsisque fuscis; prothorace aequali, sub-quadrato, subtilissime punctulato; elytris vage, subtiliter punctulatis; singulo macula magna, basali, testacea binisque parvis disci dilute flavescentibus, una in medio, minore, rotundata, altera intra medium et apicem, oblonga, transversa. — Long. 4¼—5, lat. 2¼—2½ millim.

Patria: California (St. Francisco), Insula Puna et Taiti.

Statura et similitudo *D. prasina*, capite nigro, maculis elytrorum aliter formatis et coloratis ab illa bene distincta. Caput sub-ovatum, parum convexum, nigrum, nitidum, postice medio leviter impressum. Oculi rotundati, convexi, nigri. Antennae dimidio corpore longiores, minus tenues, flavo-testaceae, pubescentes, articulis secundo et tertio brevibus, sub-obconicis, reliquis elongatis. Prothorax sub-quadratus, longitudine vix latior, basi apiceque truncatus, lateribus tenuiter reflexo-marginatis, pone apicem vix ampliatis, dein rectis, angulis anticis deflexis, obtusis, posticis fere rectis; superne modice convexus, aequalis, prasinus, nitidus, subtiliter, crebre punctulatus. Scutellum triangulare, nigrum, nitidum, sub-levé. Elytra antice truncata, prothorace dimidio latiora et illo triplo longiora, callo suprahumerali parum elevato, rotundato; lateribus apicem versus sensim ampliata, apice conjunctim rotundata, superne modice convexa, subtiliter, sat crebre punctulata, prasina, nitida, singulo macula basali magna, testacea, obscurius marginata maculisque binis parvis disci flavescentibus, una in medio, sub-rotundata, altera inter medium et apicem flavescentibus. Corpus subtus punctulatum, parce pubescens. Pectus nigrum. Abdomen prasinum. Pedes punctulati, breviter pubescentes; femoribus prasinis; tibiis tarsisque fuscis.

381. *Luperus thoracicus*.

Oblongo-ovatus, leviter convexus, niger, nitidus; antennis nigro-fuscis, basi ferrugineis; prothorace testaceo, subtiliter punctulato, longitudine nonnihil latiore, lateribus medio parum rotundato, dorso utrinque foveolato; elytris crebre, vage punctulatis. — Long. $3\frac{1}{2}$, lat. $1\frac{1}{4}$ millim.

Patria: California (St. Francisco).

Caput sub-rotundatum, leviter convexus, nigrum, nitidum, subtiliter, crebre punctulatum, pone antennas transversim, arcuatim canaliculatum. Palpi rufo-picei. Oculi rotundati, convexi, nigro-brunnei. Antennae longitudine elytrorum, sub-tenues, filiformes, nigro-fuscae, articulis tribus basalibus ferrugineis, secundo brevi, sub-obconico, tertio et quarto elongatis, fere aequalibus, reliquis nonnihil brevioribus. Prothorax sub-quadratus, longitudine nonnihil latior, apice leviter rotundato-emarginatus, basi truncatus, tenuiter marginatus, lateribus paullo reflexo-marginatis, medio leviter rotundato-ampliatis, angulis omnibus obtusis; superne leviter convexus, rufo-testaceus, nitidus, subtiliter punctulatus, dorso pone medium utrinque foveola rotunda inaequalis. Scutellum mediocre, nigrum, nitidum, levé, apice rotundatum. Elytra antice truncata, prothorace dimidio latiora et illo fere triplo longiora, humeris vix elevatis, rotundatis; lateribus fere recta, apice conjunctim rotundata, superne modice convexa, nigro-carulescentia, nitida, subtiliter, crebre, vage punctulata. Corpus subtus nigrum, sub-nitidum, subtiliter, crebre punctulatum, parce, breviter pubescens. Pedes nigri vel picei, punctulati, breviter pubescentes.

382. *Luperus vittipennis*.

Oblongo-ovatus, leviter convexus, niger, nitidus; antennis basi pedibusque flavo-testaceis; prothorace testaceo, sub-levi, pone medium utrinque leviter impresso; elytris subtiliter, crebre punctulatis, sutura margineque laterali et apicali dilute flavescentibus. — Long. $2\frac{3}{4}$, lat. $1\frac{1}{4}$ millim.

Patria: Insulae Puna et Taiti.

Caput rotundatum, leviter convexus, nigrum, nitidum, obsolete punctulatum, postice foveola parva impressum. Palpi testacei, apice infuscati. Oculi rotundati, convexi, nigro-brunnei. Antennae longitudine fere elytrorum, sub-tenues, filiformes, nigro-fuscae, pubescentes, articulis tribus primis flavo-testaceis, tertio secundo nonnihil longiore, sequente dimidio brevior. Prothorax latitudine nonnihil longior, basi apiceque truncatus, lateribus tenuiter marginatis, medio vix rotundato-ampliatis, angulis anticis deflexis, obtusis, posticis fere rectis; superne leviter convexus, testaceus, nitidus, levissimus, antice interdum medio nonnihil infuscatus, utrinque pone medium leviter impressus. Scutellum triangulare, nigrum, nitidum, levé. Elytra antice sub-truncata, prothorace vix dimidio latiora at illo fere triplo longiora, humeris vix elevatis, rotundatis;

apicem versus sensim perparum ampliata, apice conjunctim rotundata, nigra, nitida, subtiliter, crebre punctulata, sutura, margine laterali et apicali dilute flavescentibus. Corpus subtus nigrum, sub-nitidum, subtiliter, crebre punctulatum. Pedes dilute flavo-testacei, punctulati, breviter cinereo-pubescentes.

383. *Luperus insularis*.

Oblongus, modice convexus, niger, nitidus; antennis basi, capite, pedibus prothoraceque flavo-testaceis, hoc vix punctulato, medio transversim obsolete impresso; elytris subtiliter, crebre punctulatis, margine laterali antice flavo-testacco. — Long. 2½, lat. 1½ millim.

Patria: Insula Oahu (Honolulu).

Caput sub-rotundatum, modice convexum, testaceum, nitidum, subtiliter, crebre punctulatum, pone oculos leviter, transversim impressum, inter oculos nonnihil elevatum. Oculi rotundati, convexi, nigri. Antennæ corpore nonnihil breviores, nigro-fusce, pubescentes, extrorsum nonnihil incrassatæ, articulis quatuor basalibus flavo-testaceis, secundo brevi, tertio nonnihil longiore sequente dimidio brevior, reliquis elongatis. Prothorax sub-quadratus, longitudine parum latior, basi apiceque truncatus, lateribus tenuiter reflexo-marginatis, fere rectis, basin versus leviter sinuatis, angulis anticis obtusis, posticis sub-rectis; superne leviter convexus, dilute flavo-testaceus, nitidus, vix punctulatus, medio transversim obsolete impressus. Scutellum triangulare, fusco-testaceum, nitidum, læve. Elytra antice sub-truncata, prothorace nonnihil latiora et illo triplo longiora, humeris parum elevatis, rotundatis; lateribus recta, apice conjunctim rotundata, superne modice convexa, nigra, nitida, subtiliter, crebre punctulata, margine laterali ultra medium anguste, basin versus nonnihil latius flavo. Corpus subtus nigrum, nitidum, subtiliter, crebre punctulatum, breviter, parce pubescens. Pectus antice flavo-testaceum. Pedes dilute flavescentes, punctulati, parce pubescentes; tarsi leviter infuscatis.

384. *Monolepta concolor*.

Oblongo-ovata, modice convexa, dilute flavo-testacea, nitida; antennis longitudine fere corporis, articulo secundo brevi, tertio oblongo, reliquis elongatis; prothorace lævi, basi apiceque truncato; elytris subtiliter, crebre, vage punctulatis. — Long. 6, lat. 3 millim.

Patria: Manilla.

Caput rotundatum, modice convexum, dilute flavo-testaceum, nitidum, læve, pone oculos obsolete transversim, arcuatim canaliculatum. Oculi rotundati, convexi, nigri. Antennæ longitudine fere corporis, tenues, filiformes, dilute flavo-testaceæ, parce pubescentes, articulo secundo brevi, tertio antecedenti fere duplo longiore, sub-obconico, reliquis elongatis. Prothorax longitudine dimidio latior, basi apiceque truncatus, lateribus tenuiter reflexo-marginatis, pone apicem ad medium leviter rotundato-ampliat, dein basin versus sensim angustatis, angulis anticis obtusis, posticis fere rectis; superne modice convexus, dilute flavo-testaceus, lævis, nitidus. Scutellum triangulare, dilute flavo-testaceum, nitidum, læve. Elytra antice sub-truncata, prothorace vix dimidio latiora, at illo plus triplo longiora, humeris vix elevatis, rotundatis; lateribus longe ultra medium sensim ampliata, apice conjunctim rotundata, superne modice convexa, dilute flavo-testacea, nitida, subtiliter, crebre, vage punctulata. Corpus subtus dilute flavo-testaceum, nitidum, subtiliter punctulatum, parce, breviter pallido-pubescent. Pedes dilute flavo-testacei, nitidi, parce punctulati, breviter pubescentes.

385. *Monolepta rubrosignata*.

Oblongo-ovata, modice convexa, dilute flavo-testacea, nitida; antennis longis, articulo tertio sequenti nonnihil brevior; prothorace brevi, impunctato, angulis omnibus lateraliter nonnihil productis, sub-acuminatis; elytris minus crebre, evidenter punctulatis, basi maculaque singuli transversa, pone medium, rubro-castaneis. — Long. 5½, lat. 3 millim.

Patria: Manilla.

Caput sub-rotundatum, convexum, dilute flavo-testaceum, nitidum, laeve, inter oculos foveola parva insculptum. Oculi rotundati, convexi, nigri. Antennae longitudine fere corporis, tenues, filiformes, pubescentes, articulo secundo parvo, brevi, reliquis elongatis, tertio sequente paullo brevior, duobus ultimis apice infuscat. Prothorax brevis, longitudine plus duplo lator, basi apiceque truncatus, lateribus tenuiter reflexo-marginatis, basin versus parum ampliatis, angulis omnibus lateraliter nonnihil productis, sub-acuminatis; superne leviter convexus, dilute flavo-testaceus, nitidus, laevis. Scutellum triangulare, dilute flavo-testaceum, nitidum, laeve. Elytra antice sub-truncata, prothorace dimidio latiora et illo quadruplo longiora, humeris vix elevatis, rotundatis; lateribus longe ultra medium sensim nonnihil ampliata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, dilute flavo-testacea, nitida, minus crebre, evidenter, vage punctulata, basi maculae singuli mox pone medium, transversa, rubro-castaneis. Corpus subtile dilute flavescens, parum nitidum, subtiliter, crebre punctulatum, breviter cinereo-pubescent. Pedes dilute flavescens, punctulati, parce, breviter pubescentes.

386. *Monolepta pectoralis*.

Oblongo-ovata, modice convexa, dilute flavo-testacea, nitida; ore pectoreque nigris; prothorace brevi, obsolete, sat crebre punctulato, basi apiceque leviter rotundato-emarginato; elytris crebre, vage punctulatis. — Long. $4\frac{1}{2}$ —5, lat. 2— $2\frac{1}{2}$ millim.

Patria: Malacca.

Caput sub-rotundatum, modice convexum, testaceum, nitidum, sub-laeve, pone oculos canalicula tenui, transversa insculptum; ore nigro, mandibulis piceis. Palpi testacei. Oculi rotundati, convexi, nigri. Antennae longitudine elytrorum, sub-tenues, filiformes, dilute testaceae, parce pubescentes, articulis ultimis apice leviter infuscat, secundo brevi, reliquis elongatis, tertio sequente longitudine aequali. Prothorax longitudine dimidio lator, basi apiceque parum rotundato-emarginatus, lateribus tenuiter reflexo-marginatis, pone apicem ad medium leviter rotundato-ampliatis, dein nonnihil angustatis, angulis anticis deflexis, sub-obtusis, posticis fere rectis; superne leviter convexus, dilute flavo-testaceus, nitidus, subtilissime, sat crebre punctulatus. Scutellum triangulare, dilute flavo-testaceum, nitidum, sub-laeve. Elytra antice singulatim leviter rotundato-emarginata, prothorace latiora et illo triplo longiora, humeris parum elevatis, rotundatis; lateribus vix ampliata, apice conjunctim late rotundata, superne modice convexa, flavo-testacea, nitida, subtiliter, crebre, vage punctulata. Corpus subtile subtiliter, crebre punctulatum, breviter pallido-pubescent. Pectus nigrum. Abdomen testaceum. Pedes dilute flavo-testacei, nitidi, punctulati, parce, breviter pubescentes.

387. *Monolepta elegantula*.

Ovata, modice convexa, dilute flavescens, nitida; capite prothoraceque rufo-testaceis; antennis extrorsum, ore, scutello pectoreque nigris; elytris subtiliter, crebre punctulatis, margine basali, sutura, margine laterali fere ad medium fasciaque transversa inaequali, medio ramulum retrorsum emittente, nigris ornatis. — Long. $3\frac{1}{2}$, lat. 2 millim.

Patria: Malacca.

Caput rotundatum, modice convexum, rufo-testaceum, nitidum, laeve, pone antennas canalicula tenui, transversa insculptum; ore nigro. Palpi ferruginei. Oculi sub-rotundati, modice convexi, nigri. Antennae corpore nonnihil breviores, sub-tenues, filiformes, nigro-fuscae, parce pilosae, articulis tribus basalibus dilute flavescens, secundo brevi, tertio sequente dimidio brevior, reliquis elongatis. Prothorax longitudine dimidio lator, apice truncatus, basi leviter rotundatus, tenuiter marginatus, lateribus anguste reflexo-marginatis, pone apicem leviter ampliatis, dein fere rectis; superne modice convexus, rufo-testaceus, nitidus, subtilissime, sat crebre punctulatus. Scutellum sub-triangulare, nigrum, nitidum, laeve. Elytra antice sub-truncata, prothorace nonnihil latiora et illo triplo longiora, humeris parum elevatis, rotundatis; apicem versus sensim ampliata, apice conjunctim late rotundata, superne modice convexa, dilute flavescens, nitida, subtiliter, crebre punctulata, margine basali ad humeros retrorsum continuato, sutura et margine laterali fere

ad medium ibique fascia transversa, inaequali, medio ramulum retrorsum emittente, conjunctis, nigris, signaturis nigris ad humeros maculam ovata, emarginatam includentibus. Corpus subtus subtiliter, crebre punctulatum, breviter, parce cinereo-pubescent. Pectus nigrum. Abdomen testaceum. Pedes dilute flavescents, punctulati; tibiis apicem versus tarsisque infuscatis.

388. *Oedionychis nigrovittata*.

Ovata, modice convexa, supra dilute flavescens, subtus testacea; capite crebre, sat profunde punctato, postice antennisque, basi excepta, infuscatis; prothorace elytrisque subtiliter punctulatis, illo vittis tribus, his sutura vittisque quatuor ante apicem abbreviatis, nigris notatis. — Long. 6—8, lat. 3—4 millim.

Patria: Montevideo.

Caput rotundatum, parum convexum, flavo-testaceum, sub-nitidum, crebre, sat profunde punctatum, vertice infuscatum, inter oculos leviter carinatum, utrinque tuberculo parvo, nitido instructum. Palpi testacei. Oculi ovati, modice convexi, nigri. Antennae nigro-fuscae, parce pubescentes, articulis tribus basalibus testaceis. Prothorax longitudine duplo latior, apice rotundato-emarginatus, basi sub-truncatus, lateribus reflexo-marginatis, pone apicem ultra medium sensim rotundato-ampliatis, angulis anticis deflexis, antrorsum prominulis, acuminatis, posticis rectis; superne modice convexus, dilute flavescens, sub-nitidus, crebre punctulatus, vittis tribus modice latis, nigris decoratus, dorsali recta, lateralibus perparum obliquis. Scutellum triangulare, nigrum, nitidum, laeve. Elytra antice truncata, prothorace nonnihil latiora, quam lata dimidio longiora, humeris rotundatis, haud elevatis; a basi apicem versus sensim perparum ampliata, apice conjunctim late rotundata, superne modice convexa, dilute flavescens, sub-nitida, subtiliter, sat crebre punctulata, sutura anguste lineisque duabus in singulo, una in medio dorsi, altera prope marginem lateralem, ante apicem desinentibus, nigris. Corpus subtus testaceum, nitidum, minus crebre punctulatum. Pedes testacei, anteriores tenues; femoribus posticis magnis, ovatis, compressis.

389. *Oedionychis laetifica*.

Ovata, modice convexa, nigro-caerulea, sub-nitida; capite parce punctato, postice medio sub-laevigato; prothorace subtilissime punctulato, margine vittisque duabus dorsalibus lutescentibus; elytris subtilissime, creberrime punctulatis, limbo marginali anguste lineisque duabus dorsalibus ante apicem conjunctis et dein usque ad apicem continuatis, luteis. — Long. $8\frac{1}{2}$, lat. $4\frac{1}{4}$ millim.

Patria: Montevideo.

Individuis majoribus *Oed. nigrovittata* aequalis et statura similis. Caput rotundatum, parum convexum, nigro-caeruleum, nitidum, evidenter, minus crebre, postice medio parcius punctatum, inter oculos tuberculis duobus parvis, parum elevatis, nitidis obsitum. Oculi ovati, modice convexi, nigri. Antennae nigrae, parce pubescentes, articulis tribus basalibus nigro-piceis. Prothorax longitudine duplo latior, apice rotundato-emarginatus, basi truncatus, lateribus reflexo-marginatis, pone apicem leviter rotundato-ampliatis, angulis anticis deflexis, antrorsum prominulis, acuminatis, posticis rectis; superne modice convexus, subtilissime, crebre punctulatus, nigro-caeruleus, sub-nitidus, margine omni vittisque duabus rectis, luteis. Scutellum triangulare, nigro-caeruleum, sub-nitidum, subtilissime, crebre punctulatum. Elytra antice sub-truncata, prothoracis basi nonnihil latiora, quam lata dimidio longiora, humeris rotundatis, haud elevatis; lateribus apicem versus sensim nonnihil ampliata, apice conjunctim late rotundata, superne modice convexa, nigro-caerulea, nitida, subtilissime, creberrime punctulata, margine laterali anguste lineisque duabus dorsalibus in singulo, ante apicem conjunctis et dein usque ad apicem continuatis, luteis. Corpus subtus nigro-caerulescens, nitidum, subtiliter punctulatum. Pedes nigro-caerulei, nitidi, anteriores tenues; femoribus posticis magnis, ovatis, compressis, superne confertim, subtiliter punctulatis, inferne laevibus.

390. *Oedionychis lepida*.

Ovata, modice convexa, obscure cærulea, nitida; antennis basi ferrugineis; prothorace subtilissime punctulato, margine laterali sat late, macula basali transversa, antice sinuata alteraque apicali introrsum rotundata, dilute flavis; elytris subtilissime, sat crebre punctulatis, macula humerali, maculis quatuor inæqualibus pone medium fasciæque obliqua ante medium, medio constricta, dilute flavis. — Long. $4\frac{1}{2}$, lat. $2\frac{1}{2}$ millim.

Patria: Montevideo.

Caput rotundatum, parum convexum, cæruleum, nitidum, antice impressum, parce punctatum. Palpi picei. Oculi ovati, modice convexi, brunnei. Antennæ nigræ, parce pubescentes, extrorsum sensim incrassatæ, articulis tribus basalibus ferrugineis, primo tamen plus minusve infusato. Prothorax longitudine duplo latior, apice rotundato-emarginatus, basi truncatus, utrinque extrorsum sub-obliquus, lateribus reflexo-marginatis, modice rotundato-ampliatis, angulis anticis dellexis, modice prominulis, parum acuminatis, posticis fere rectis; superne modice convexus, subtiliter, crebre punctulatus, nitidus, medio cæruleus, lateribus sat late, macula transversa basali, antice medio profunde excisa alteraque apicali itidem transversa, introrsum leviter rotundata, dilute flavis. Scutellum triangulare, cæruleum, nitidum, vix punctatum. Elytra antice sub-truncata, prothoracis basi nonnihil latiora, quam lata dimidio longiora, humeris rotundatis, vix elevatis; posterius parum ampliata, apice conjunctim rotundata, superne modice convexa, cærulea, nitida, subtilissime, sat crebre punctulata, margine laterali anguste, macula humerali sub-ovata, fascia ante medium, medio constricta, quasi e maculis duabus sub-quadratis formata, interiore antrorsum magis locata maculisque pone medium quatuor inæqualibus, prima et secunda non procul a sutura, antica rotundata, postica oblonga, tertia in disco exteriori, reliquis nonnihil majore, semilunata et quarta in margine laterali ante apicem, introrsum rotundata, dilute flavis. Corpus subtus cæruleum, nitidum, punctulatum, tenuiter pubescens. Pedes cærulei, nitidi, anteriores tenues, femoribus basi obscure ferrugineis; postici femoribus magnis, compressis, parce punctulatis.

391. *Oedionychis insignita*.

Ovata, modice convexa, dilute flavo-testacea, nitida; antennis fuscis, basi apiceque dilutioribus; prothorace subtiliter, crebre punctulato, lateribus late explanato; elytris subtiliter, crebre punctulatis, dorso inter basin et medium leviter impressis. — Long. $3\frac{1}{2}$, lat. $1\frac{1}{2}$ millim.

Patria: Brasilia (Rio Janeiro).

Caput sub-rotundatum, parum convexum, dilute, sordide flavo-testaceum, nitidum, obsolete punctulatum. inter oculos transversim leviter impressum. Oculi rotundati, modice convexi, fuscii. Antennæ longitudine elytrorum, sub-tenues, filiformes, nigro-fuscae, parce pubescentes, articulis basalibus dilutioribus, tribus ultimis pallidis. Prothorax longitudine duplo latior, apice leviter rotundato-emarginatus, basi truncatus, lateribus late deplanatis, tenuiter reflexo-marginatis, pone apicem modice oblique ampliatis, angulis anticis haud prominulis, sub-rectis, posticis rectis; superne modice convexus, dilute sordide flavo-testaceus, nitidus, subtiliter, sat crebre punctulatus, ante basin leviter transversim impressus. Scutellum triangulare, dilute flavo-testaceum, nitidum, laeve. Elytra antice truncata, prothorace latiora, quam lata dimidio longiora, ad basin rotundato-ampliata, pone medium sensim angustata, apice conjunctim rotundata, superne modice convexa, sordide dilute flavo-testacea, nitida, subtiliter, sat crebre punctulata, dorso inter basin et medium transversim leviter impressa. Corpus subtus dilute flavo-testaceum, nitidum, subtiliter punctulatum. Pedes dilute flavo-testacei, subtilissime, crebre punctulati, anteriores tenues; femoribus posticis magnis incrassatis, compressis.

392. *Oedionychis verecunda*.

Ovata, modice convexa, dilute flavescens, nitida; pectore nigro; ore toto femoribusque posticis apice fuscis; prothorace brevi, subtiliter punctulato, ante basin transversim

canaliculato; elytris sat crebre, vage punctulatis, sutura pone medium lineisque duabus singuli, una basali, altera infra medium disci, nigro-fuscis. — Long. 5, lat. $2\frac{1}{4}$ millim.

Patria: Java.

Caput sub-rotundatum, modice convexum, dilute flavo-testaceum, nitidum, punctulatum, antice elevatum, inter oculos tuberculis duobus parum elevatis instructum; ore nigro-piceo. Palpi flavo-testacei. Oculi rotundati, convexi, nigro-brunnei. Antennæ dimidio corpore longiores, minus tenues, fuscae, parce pilosæ, extrorsum sensim incrassatæ, articulis quatuor basalibus flavo-testaceis. Prothorax longitudine duplo latior, apice leviter rotundato-emarginatus, basi truncatus, ad angulos leviter emarginatus, lateribus explanatis, tenuiter reflexo-marginatis, pone apicem rotundato-ampliatis, angulis anticis parum prominulis, sub-acuminatis, posticis rectis; superne leviter convexus, dilute flavo-testaceus, nitidus, subtiliter, crebre punctulatus, dorso medio leviter infuscatus, ante basin transversim canaliculatus. Scutellum triangulare, pallide-testaceum, nitidum, læve. Elytra antice truncata, prothoracis basi latiora, quam lata dimidio longiora, callo humerali parum elevato, obtuso; lateribus ultra medium sensim perparum ampliata, apice conjunctim rotundata, superne modice convexa, dilute sordide flavescentia, nitida, sat crebre, parum profunde punctata, sutura a medio ad apicem nigro-fusca, singulo elythro antice longitudinaliter impresso, lineis duabus brevibus nigro-fuscis notato, una in medio ad basin, altera in medio disci pone medium, nonnihil longiore et latiore. Corpus subtus sub-nitidum, subtiliter, crebre punctulatum. Pectus nigrum. Abdomen testaceum. Pedes flavo-testacei, punctulati; femoribus posticis magnis, crassis, sub-rotundatis, compressis, apice leviter infuscatis.

393. *Caporis maculicollis*.

Oblongo-ovata, modice convexa, nigra, sub-nitida; capite prothoraceque dilute flavescentibus, illo postice infuscato, hoc medio nigro-binnaculato; elytris subtilissime, crebre punctulatis, margine laterali suturaque albidis. — Long. 5, lat. $2\frac{1}{4}$ millim.

Patria: Buenos Ayres.

Statura et summa similitudo *C. Stigmula*, capite postice utrinque nigro, prothorace medio nigro-binnaculato et tibiis totis nigris ab illa bene distincta. Caput rotundatum, modice convexum, dilute flavescent, sub-nitidum, basi utrinque nigrum; ore palpisque nigris. Oculi rotundati, parum convexi, nigri. Antennæ tenues, nigre, parce pubescentes, articulis tribus primis obscure ferrugineis. Prothorax longitudine dimidio fere latior, apice leviter rotundato-emarginatus, basi truncatus, lateribus anguste reflexo-marginatis, fere rectis, angulis anticis vix prominulis, obtusis, posticis fere rectis; superne leviter convexus, vix punctulatus, dilute flavescent, nitidus, medio maculis duabus sub-rotundis, nigris notatus, ante basin leviter transversim impressus. Scutellum sub-triangulare, nigrum, nitidum, læve. Elytra antice truncata, prothoracis basi nonnihil latiora, quam lata dimidio longiora, humeris vix elevatis, rotundatis; apicem versus nonnihil ampliata, apice singulatim ad suturam sub-acuminata, superne leviter convexa, subtilissime, creberrime punctulata, nigro-cærulescentia, parum nitida, margine laterali, apicali et suturali tenuiter albidis. Corpus subtus nigrum, sub-nitidum, sat crebre punctulatum. Pedes nigri, punctulati, coxis dilute flavescentibus; femoribus posticis modice incrassatis.

Megistops.

(a $\mu\epsilon\gamma\iota\sigma\tau\omicron\varsigma$ maximus et $\omega\psi$ oculus.)

Tab. II. f. 8.

Corpus ovatum, modice convexum.

Caput exsertum, semiglobosum.

Oculi maximi, superne convexi, interstitio non distincto.

Antennæ dimidio corpore longiores, filiformes, articulis 2 et 3 brevibus, reliquis oblongis, ultimo acuminato.

Prothorax brevis, basi utrinque leviter sinuatus, lateribus basin versus oblique ampliatis.

Pedes modice elongati, anteriores tenues, postici femoribus valde incrassatis, sub-pyriformibus, tibiis apicem versus sensim dilatatis, subtus apice calcare valido, extrorsum nonnihil ampliati, apice emarginato instructis; tarsis nonnihil dilatatis, articulo secundo parvo, brevi.

394. *Megistops quadrinotatus*.

Ovatus, modice convexus, rufo-ferrugineus, nitidus; antennis, basi excepta, nigro-fuscis; prothorace pedibusque flavescentibus, illo subtiliter, minus crebre punctulato; elytris nigro-piceis, subtiliter, crebre punctulatis, singulo maculis duabus flavescentibus, una basali, oblonga, apicem versus extrorsum flexa, altera ante apicem, sub-rotunda, ornato. — Long. 3—3½, lat. 1½—2 millim.

Patria: California (St. Francisco).

Caput semiglobosum, exsertum, rufo-testaceum, nitidum, infra antennas leviter carinatum; ore piceo. Palpi rufo-testacei. Oculi maximi, ovati, antice conjuncti, nigri. Antennæ dimidio corpore longiores, minus tenues, nigro-fuscae, pubescentes, articulis tribus basalibus rufo-testaceis. Prothorax longitudine plus duplo brevior, apice vix vel leviter rotundato-emarginatus, basi utrinque parum sinuatus, lateribus tenuiter reflexo-marginatis, ab apice basin versus sensim oblique ampliatis, angulis anticis deflexis, haud prominulis, obtusis, posticis sub-rectis; superne modice convexus, flavo-testaceus, sub-nitidus, subtiliter, crebre punctulatus. Scutellum triangulare, nigro-piceum, nitidum, laeve. Elytra ovata, antice singulatim leviter rotundata, prothorace paullo latiora, quam lata vix dimidio longiora, humeris haud elevatis; pone basin rotundato-ampliata, infra medium sensim angustata, apice conjunctim rotundata, superne modice convexa, subtiliter, crebre punctulata, nigro-picea, nitida, singulo maculis duabus flavescentibus, una mox pone basin, oblonga, apicem versus extrorsum flexa, altera longe ante apicem, sub-rotunda, postice sub-oblique truncata ornato. Corpus subtus rufo-ferrugineum, sub-nitidum, subtiliter, crebre punctulatum. Pedes rufo-testacei, punctulati, anteriores tenues; femoribus posticis valde incrassatis, saturatoribus.

Tab. II. f. 8. a. magn. auct. b. magn. nat. c. caput sup. vis. d. palp. maxill. e. antenna. f. tib. et tars. postic.

395. *Megistops lugubrinus*.

Ovatus, modice convexus, nigro-piceus, sub-nitidus, antennis basi pedibusque testaceis; prothorace brevi, obscure ferrugineo, subtiliter, crebre punctulato, lateribus dilutioribus; elytris immaculatis, subtiliter, crebre punctulatis. — Long. 3—3½, lat. 1½—2 millim.

Patria: California (St. Francisco).

Magnitudine et statura omnino præcedentis, sed aliter coloratus. Caput semiglobosum, exsertum, testaceum, nitidum, infra antennas tenuiter carinatum; ore piceo. Palpi testacei. Oculi maximi, ovati, antice conjuncti, nigri. Antennæ dimidio corpore longiores, minus tenues, nigro-fuscae, pubescentes, articulis tribus vel quatuor basalibus flavo-testaceis. Prothorax omnino ut in præcedenti constructus, superne modice convexus, subtiliter, crebre punctulatus, obscure ferrugineus, sub-nitidus, lateribus confuse dilutioribus. Scutellum triangulare, nigro-piceum, nitidum, sub-leve. Elytra omnino ut in præcedenti formata, superne modice convexa, subtiliter, crebre punctulata, nigro-picea, nitida, apice interdum nonnihil dilutiora. Corpus subtus obscure ferrugineum, sub-nitidum, subtiliter, crebre punctulatum. Pedes testacei, punctulati, anteriores tenues; femoribus posticis valde incrassatis, saturatoribus.

396. *Graptozona verticalis*.

Ovata, modice convexa, nigro-cerulea, nitida; vertice, femoribus, basi excepta, anoque rufo-testaceis; prothorace subtilissime punctulato, postice non impresso; elytris smaragdinis, creberrime, parum profunde punctulatis. — Long. 4—5, lat. 2½—2¾ millim.

Patria: California, Insule Puna, Oahu et Taiti.

Caput sub-rotundatum, modice convexum, vix punctatum, nigro-cæruleum, nitidum, inter oculos fo-
veola parva impressum, antice medio leviter carinatum; vertice toto rufo-testaceo. Palpi nigro-piceï. Oculi
sub-ovati, modice convexi, nigro-brunnei. Antennæ dimidio corpore longiores, sub-tenuës, nigræ, parce pube-
scentes, articulis basalibus piceis. Prothorax longitudine duplo latior, apice leviter rotundato-emarginatus,
basi truncatus, lateribus tenuiter reflexo-marginatis, pone apicem leviter rotundato-ampliatis, angulis anticis
non prominulis, obtusis, posticis fere rectis; superne leviter convexus, cæruleus, nitidus, subtilissime punctu-
latus, ante basin non impressus. Scutellum triangulare, cæruleum, nitidum, læve. Elytra antice sub-trun-
cata, prothoracis basi latiora, quam lata dimidio longiora, humeris non elevatis, rotundatis, lateribus haud
ampliata, apice conjunctim rotundata, superne modice convexa, smaragdina, nitida, crebre, subtiliter punctu-
lata. Corpus subtus nigro-cæruleum, nitidum, subtiliter, crebre punctulatum, segmento ultimo abdominis
rufo-testaceo. Pedes nigro-cærulescentes, punctulati; femoribus a medio ad apicem rufo-testaceis, posticis
oblongo-ovatis, compressis, præsertim basi incrassatis.

397. *Graptodera flavipes*.

Oblongo-ovata, modice convexa, supra cuprea, nitida, subtus ænea, cinereo-sericea; antennis basi pedibusque flavo-testaceis; prothorace subtiliter, sat crebre punctulato, ante basin transversim leviter impresso; elytris subtiliter, sat crebre, postice obsoletius punctu-
latis. — Long. 4, lat. 2 millim.

Patria: Montevideo, Buenos Ayres.

Gr. olivacea magnitudine æqualis. Caput sub-rotundatum, modice convexum, cupreum, nitidum, pun-
ctatum, postice et inter oculos sub-levigatum; ore nigro-piceo. Palpi flavo-testacei. Oculi sub-rotundati,
convexi, nigri. Antennæ dimidio corpore longiores, sub-tenuës, filiformes, articulis 5 vel 6 basalibus flavo-
testaceis, reliquis fuscis. Prothorax longitudine vix dimidio latior, apice parum rotundato-emarginatus, basi
sub-truncatus, lateribus pone apicem modice rotundato-ampliatis, angulis anticis deflexis, vix prominulis,
posticis sub-rectis; superne modice convexus, cupreus, nitidus, subtiliter, sat crebre punctulatus, ante basin
leviter transversim impressus. Scutellum triangulare, cæruleum, nitidum, læve. Elytra antice truncata, pro-
thoracis basi latiora, quam lata dimidio longiora, humeris modice elevatis, rotundatis; apicem versus per-
parum ampliata, apice conjunctim rotundata, superne modice convexa, cuprea, nitida, ultra medium eviden-
tius, hinc inde sub-seriatim, dein obsoletius punctulata. Corpus subtus æneum, subtiliter, crebre punctu-
latum, cinereo-sericeum. Pedes flavo-testacei, subtilissime punctulati; femoribus posticis modice incrassatis.

398. *Graptodera columbina*.

Ovata, modice convexa, cyanea, nitida, subtus nigra; antennis, femoribusque anticis
basi testaceis; prothorace sub-lævi, ante basin profunde, transversim sulcato; elytris evi-
dentius, minus crebre, sub-seriatim punctatis. — Long. 3, lat. 1½ millim.

Patria: Montevideo.

Statura *Grapt. olivacea*, minor, antennis femoribusque anticis basi testaceis, prothorace postice pro-
fundius sulcato ab illa bene distincta. Caput sub-rotundatum, modice convexum, cyaneum, nitidum, postice
sub-læve, antice obsoletè punctulatum. Oculi rotundati, modice convexi, nigro-brunnei. Antennæ dimidio
corpore nonnihil longiores, minus tenuës, nigro-fuscae, parce pubescentes, extrorsum sensim modice incrassatae,
articulis quatuor basalibus rufo-testaceis. Prothorax longitudine dimidio latior, apice truncatus, basi utrinque
leviter sinuatus, lateribus tenuiter reflexo-marginatis, fere rectis, angulis omnibus lateraliter nonnihil pro-
ductis, sub-acuminatis; superne convexus, cæruleus, nitidus, sub-lævis, ante basin sulco transverso, profundo
insculptus. Scutellum triangulare, cæruleum, nitidum, læve. Elytra antice sub-truncata, prothoracis basi
latiora, quam lata dimidio longiora, callo humerali elevato, obtuso; ultra medium sensim perparum ampliata,
apice conjunctim rotundata, superne modice convexa, cyanea, nitida, evidentius, minus crebre, sub-seriatim
punctata. Corpus subtus nigrum, nitidum, subtiliter, crebre punctulatum. Pedes nigri, nitidi, punctulati;
femoribus anticis basi ferrugineis, posticis modice crassis, sub-compressis.

399. *Diphaulaca striata*.

Oblonga, modice convexa, caerulea, nitida; antennis basi, capite, prothorace pedibusque rufis; prothorace subtiliter, minus crebre punctulato, ante basin transversim, profunde canaliculato, angulis omnibus lateraliter, nonnihil productis, acuminatis; elytris medioeriter punctato-striatis. — Long. 6—6½, lat. 2½—3 millim.

Diphaulaca striata KLUG Dej. Cat. ed. 3. p. 388.

Patria: Montevideo.

Caput sub-rotundatum, modice convexum, rufum, nitidum, vix punctatum. Palpi rufi. Oculi parvi, sub-ovati, parum convexi, nigri. Antennae longitudine elytrorum, tenues, filiformes, nigrae, articulis quatuor basalibus rufo-testaceis. Prothorax longitudine dimidio latior, apice leviter rotundato-emarginatus, basi truncatus, utrinque leviter emarginatus, lateribus sat late reflexo-marginatis, pone apicem leviter rotundato-ampliat, angulis omnibus lateraliter nonnihil productis, acuminatis; superne modice convexus, rufus, nitidus, subtiliter, minus crebre punctulatus, ante basin sulco transverso, profundo, utrinque abbreviato ibique ad basin recte continuato, impressus. Scutellum triangulare, nigro-caeruleum, nitidum, laeve. Elytra antice truncata, prothoracis basi nonnihil latiora, quam lata dimidio longiora, humeris leviter elevatis, rotundatis; lateribus vix ampliata, apice rotundata, singulo ad suturam in dentem brevem excurrente; superne modice convexa, caerulea, nitida, parum profunde striata, striis minus regulariter, hinc inde confuse, sub-geminatim punctatis, interstitiis laevibus. Corpus subtus nigro-caeruleum, sub-nitidum, subtiliter punctulatum, parce, breviter cinereo-sericeum. Pedes rufi, punctulati, parce, breviter cinereo-pubescentes; femoribus anterioribus vix, posticis modice incrassatis.

400. *Diphaulaca setipennis*.

Oblonga, modice convexa, caerulea, nitida; antennis, capite, prothorace, scutello pedibusque sanguineis; prothorace sat profunde, parcius punctato, postice sub-laevigato, ante basin transversim, profunde canaliculato; elytris sat profunde, crebre punctato-striatis, seriatim breviter albidio-setulosis. — Long. 2½—2¾, lat. 1—1¼ millim.

Patria: Montevideo.

Caput sub-rotundatum, modice convexum, dilute sanguineum, nitidum, sat profunde punctatum. Palpi rufo-testacei. Oculi sub-rotundati, modice convexi, nigri. Antennae longitudine elytrorum, sub-tenues, filiformes, rufo-testaceae, parce pubescentes. Prothorax longitudine dimidio latior, basi apiceque truncatus, hoc extrorsum utrinque nonnihil obliquo; lateribus tenuiter reflexo-marginatis, parce pilosis, pone apicem ad medium sensim ampliatis, dein fere rectis, angulis anticis non prominulis, leviter rotundatis, posticis lateraliter nonnihil productis, sub-acuminatis; superne modice convexus, dilute sanguineus, nitidus, antice parce, sat profunde punctatus, postice sub-laevigatus, intra basin canalicula transversa, profunda, utrinque abbreviata insculptus. Scutellum triangulare, obscure sanguineum, nitidum, laeve. Elytra antice sub-truncata, prothoracis basi latiora, quam lata dimidio longiora, humeris leviter elevatis, obtusis; lateribus recta, apice conjunctim rotundata, superne modice convexa, caerulea, nitida, crebre, sat profunde punctato-striata, striis setis brevibus, albidis obsitis, interstitiis angustis, laevibus. Corpus subtus caeruleum, nitidum, crebre punctatum. Pedes rufo-testacei, nitidi, parce, breviter cinereo-pubescentes; femoribus anterioribus vix, posticis modice incrassatis.

401. *Strabala languida*.

Ovata, modice convexa, rufo-testacea, nitida; oculis nigris; prothorace brevi, subtiliter, crebre punctulato, angulis anticis lateraliter nonnihil productis, obtusis; elytris vage, subtiliter, minus crebre punctulatis. — Long. 4½, lat. 2½ millim.

Patria: Java.

Caput sub-rotundatum, modice convexum, testaceum, nitidum, vix punctulatum, inter oculos canalicula tenui, transversa insculptum. Oculi rotundati, convexi, nigri. Antennae longitudine elytrorum, subtenuis, filiformes, testaceae, parce pubescentes, articulo secundo brevi, ovato, reliquis elongatis. Prothorax longitudine fere triplo latior, apice leviter rotundato-emarginatus, basi truncatus, lateribus sat late reflexo-marginatis, pone apicem magis, medio modice rotundato-ampliat, angulis anticis lateraliter nonnihil productis, obtusis, posticis sub-rotundatis; superne modice convexus, testaceus, nitidus, subtiliter, crebre punctulatus. Scutellum triangulare, testaceum, nitidum, laeve. Elytra antice sub-truncata, prothoracis basi nonnihil latiora, quam lata vix dimidio longiora, callo humerali parum elevato, obtuso; pone basin rotundato-ampliata, ultra medium sensim nonnihil dilatata, apice conjunctim rotundata, superne modice convexa, rufo-testacea, nitida, subtiliter, vage, minus crebre punctulata. Corpus subtus testaceum, nitidum, subtiliter, crebre punctulatum. Pedes testacei, nitidi, punctulati; femoribus posticis incrassatis, sub-compressis.

402. *Strabala nigriceps*.

Ovata, modice convexa, rufo-testacea, nitida; capite, scutello, pectore abdomineque nigris; antennis nigro-fuscis, basi testaceis; prothorace transverso, subtiliter, crebre punctulato, ante basin leviter, transversim impresso; elytris subtiliter, crebre, vage punctulatis. — Long. 3, lat. 1½ millim.

Patria: Buenos Ayres.

Caput sub-rotundatum, modice convexum, nigrum, sub-nitidum, parce punctulatum; ore palpisque rufo-testaceis. Oculi sub-rotundati, modice convexi, nigro-brunnei. Antennae dimidio corpore longiores, minus tenues, nigro-fuscae, parce pubescentes, extrorsum nonnihil incrassatae, articulis tribus basalibus rufo-testaceis. Prothorax longitudine dimidio latior, basi apiceque truncatus, lateribus tenuiter reflexo-marginatis, pone apicem magis, medio modice rotundato-ampliat, angulis anticis vix prominulis, deflexis, rotundatis, posticis fere rectis; superne modice convexus, rufo-testaceus, nitidus, subtiliter, crebre punctulatus, ante basin leviter transversim impressus. Scutellum triangulare, nigrum, nitidum; laeve. Elytra antice truncata, prothoracis basi latiora, quam lata dimidio fere longiora, callo humerali parum elevato, obtuso; pone basin nonnihil rotundato-ampliata, ultra medium sensim perparum dilatata, apice conjunctim rotundata, superne modice convexa, rufo-testacea, nitida, subtiliter, crebre, vage punctulata. Corpus subtus nigrum; parum nitidum, subtiliter, crebre punctulatum. Pedes rufo-testacei, punctulati; femoribus posticis incrassatis, sub-compressis.

403. *Disonycha bicarinata*.

Oblonga, modice convexa, subtus nigra, supra dilute flavescens; femoribus subtus rufo-testaceis; vertice infuscato; prothorace sub-lavi, maculis quatuor rotundis et lineola brevi, longitudinali ante basin, nigris; elytris subtiliter, crebre punctulatis, sutura, carina longitudinali disci ante apicem abbreviata lineaque intramarginali, nigris. — Long. 6½, lat. 3¼ millim.

Patria: Buenos Ayres.

Caput rotundatum, modice convexum, flavo-testaceum, nitidum, parce punctulatum, inter oculos foveola parva impressum; vertice transversim infuscato. Palpi picci. Oculi ovati, modice convexi, nigro-brunnei. Prothorax longitudine fere duplo latior, apice parum rotundato-emarginatus, basi truncatus, extrorsum nonnihil obliquus, lateribus reflexo-marginatis, pone apicem leviter rotundato-ampliat, angulis anticis deflexis, lateraliter nonnihil prominulis, sub-acuminatis, posticis fere rectis; superne modice convexus, sub-lavis, dilute flavescens, nitidus, lineola brevi, longitudinali ante basin maculisque quatuor rotundis, transversim posit, nigris ornatus, interioribus minoribus, apicem versus nonnihil propioribus. Scutellum triangulare, nigrum, nitidum, vix punctatum. Elytra antice truncata, prothoracis basi nonnihil latiora, quam lata dimidio longiora, humeris laud elevatis, rotundatis; lateribus vix ampliata, longe pone medium sensim an-

gustata, apice conjunctim rotundata, superne modice convexa, subtiliter, crebre punctulata, dilute flavescens, sub-nitida, sutura, carina longitudinali modice elevata in medio disci, ante apicem abbreviata lineaque intramarginali nigris. Corpus subtus nigrum, parum nitidum, subtiliter, creberrime punctulatum, breviter cinereo-pubescentis; segmentis abdominis apice plus minusve late ferrugineo-marginatis. Pedes nigro-fusci; femoribus basi et subtus rufo-testaceis, posticis modice incrassatis.

404. *Disonychia vittipennis*.

Oblongo-ovata, modice convexa, ferruginea, nitida; femoribus basi antennisque extorsum nigris; capite parce punctato; prothorace sub-lævi, dorso plaga magna, nigro-fusca ornato; elytris subtiliter, crebre punctulatis, nigro-cæruleis, singulo vittis duabus ante apicem conjunctis, flavis. — Long. 5, lat. 2½ millim.

Patria: Insula Puna.

D. glabrata similima, pedibus obscurioribus et disco toto prothoracis infuscato ab illa mox distincta. Caput rotundatum, modice convexum, ferrugineum, parce punctatum, inter oculos tenuiter canaliculatum, postice leviter infuscatum. Palpi pieci. Oculi ovati, modice convexi, nigro-brunnei. Antennæ subtenuis, nigre, pubescentes, articulis tribus basalibus rufo-testaceis. Prothorax longitudine vix dimidio latior, apice leviter rotundato-emarginatus, basi truncatus; lateribus tenuiter reflexo-marginatis, pone apicem leviter rotundato-ampliatis, angulis anticis deflexis, parum prominulis, obtusis, posticis sub-rectis; superne leviter convexus, sub-lævis, nitidus, rufo-testaceus, disco toto nigro-fuscus. Scutellum triangulare, nigrum, nitidum, vix punctatum. Elytra antice sub-truncata, prothoracis basi parum latiora, quam lata dimidio longiora, humeris vix elevatis, rotundatis; lateribus non ampliata, apice conjunctim rotundata, superne modice convexa, subtiliter, sat crebre punctulata, nigro-cærulea, nitida, vittis duabus, una prope suturam, nonnihil latiore, altera intramarginali, ante apicem conjunctis, flavis. Corpus subtus ferrugineum, subtiliter, crebre punctulatum, medio longitudinaliter, late infuscatum. Pedes rufo-ferruginei; femoribus a basi ultra medium nigris; posticis sat magnis, oblongo-ovatis, compressis; tarsis fuscis.

405. *Systema connexa*.

Oblonga, leviter convexa, nigro-ænea, nitida, subtus cinereo-sericea; palpis antennisque basi testaceis; capite crebre punctato, postice sub-lævigato; prothorace sub-quadrato, punctis parvis, raris impresso, basi breviter canaliculato; elytris subtiliter, sat crebre punctulatis, singulo vittis duabus dilute flavescens, ante apicem conjunctis ornato. — Long. 5½, lat. 2 millim.

Patria: Brasilia (Rio Janeiro).

Caput rotundatum, modice convexum, æneum, nitidum, crebre, sat profunde punctatum, postice lævigatum, inter oculos foveola parva impressum. Palpi testacei. Oculi ovati, modice convexi, brunnei. Antennæ tenues, nigre, parce pubescentes, articulis tribus vel quatuor basalibus testaceis. Prothorax latitudine parum brevior, apice leviter rotundato-emarginatus, basi truncatus, lateribus tenuiter reflexo-marginatis, fere rectis, angulis anticis deflexis, parum prominulis, obtusis, posticis fere rectis; superne leviter convexus, æneus, nitidus, punctis parvis, raris impressis, basi canalicula brevi, longitudinali notatus. Scutellum breve, transversum, æneum, nitidum, ante apicem transversim impressum. Elytra antice truncata, prothoracis basi latiora, quam lata fere duplo longiora, humeris vix elevatis, rotundatis; lateribus recta, apice singulatim rotundata, superne leviter convexa, subtiliter, crebre punctulata, ænea, nitida, singulo vittis duabus ante apicem conjunctis ibique leviter excisis, dilute flavescens ornato, una non procul a sutura, lineari, altera intramarginali, medio nonnihil angustiore. Corpus subtus nigro-æneum, subtiliter, crebre punctulatum, cinereo-sericeum. Pedes nigro-ænei, punctulati, breviter cinereo-pubescentes, anteriores sub-tenuis; femoribus posticis modice incrassatis, oblongo-ovatis.

406. *Systema pallidula*.

Oblongo-ovata, leviter convexa, dilute flavo-testacea, nitida; oculis nigris; prothorace subtilissime punctulato, pone apicem leviter rotundato-ampliato, intra basin leviter, transversim impresso; elytris subtiliter, crebre punctulatis. — Long. 4, lat. $1\frac{1}{2}$ millim.

Patria: California (St. Francisco), Insula Puna.

Caput sub-rotundatum, convexum, subtiliter, crebre punctulatum, dilute flavo-testaceum, nitidum. Oculi rotundati, modice convexi, nigri. Antennae dimidio corpore longiores, tenues, filiformes, flavo-testaceae, parce pubescentes. Prothorax longitudine vix dimidio latior, apice leviter rotundato-emarginatus, basi truncatus, lateribus tenuiter reflexo-marginatis, pone apicem leviter rotundato-ampliat, angulis anticis non prominulis, rotundatis, posticis fere rectis; superne leviter convexus, subtilissime punctulatus, dilute flavo-testaceus, nitidus, intra basin leviter, transversim impressus. Scutellum triangulare, dilute flavo-testaceum, nitidum, laeve. Elytra antice truncata, prothoracis basi dimidio latiora, quam lata fere duplo longiora, humeris non elevatis, rotundatis, lateribus fere recta, pone medium sensim angustata, apice conjunctim rotundata, superne leviter convexa, subtiliter, crebre punctulata, tota dilute flavo-testacea, nitida. Corpus subtus dilute flavo-testaceum, crebre punctulatum. Pedes dilute flavo-testacei, punctulati; femoribus posticis incrassatis, oblongo-ovatis, compressis.

407. *Systema exclamationis*.

Oblongo-ovata, leviter convexa, nigra, nitida; fronte, antennis geniculisque rufo-testaceis; prothorace sub-laevi, postice obsolete testaceo-marginato; elytris subtiliter, crebre punctulatis, dilute virescentibus, sutura, margine, macula basali vittaque disci exterioris, antice magis, postice minus abbreviata, nigris. — Long. 5—6, lat. 2— $2\frac{1}{2}$ millim.

Var. a: prothorace elytrisque pallide testaceis, illo utrinque infuscato, his vitta disci brevi, interdum fere nulla.

Patria: Montevideo, Buenos Ayres.

Caput sub-rotundatum, modice convexum, vix punctatum, nigrum, nitidum, antice rufo-testaceum, inter oculos foveola parva insculptum; ore palpisque piceis. Oculi rotundati, convexi, nigro-brunnei. Antennae dimidio corpore longiores, tenues, rufo-testaceae, articulo singulo apice infuscato. Prothorax longitudine dimidio latior, apice leviter rotundato-emarginatus, basi truncatus, tenuiter marginatus, lateribus reflexo-marginatis, pone apicem modice rotundato-ampliat, angulis anticis haud prominulis, obtusis, posticis rectis; superne leviter convexus, niger, nitidus, vix punctulatus, margine basali obsolete, confuse testaceus. Scutellum triangulare, nigrum, nitidum, laeve. Elytra antice sub-truncata, prothoracis basi nonnihil latiora, quam lata dimidio longiora, humeris rotundatis; lateribus vix ampliata, apice conjunctim rotundata, superne leviter convexa, subtiliter, crebre punctulata, dilute virescentia, nitida, sutura, margine, macula basali sub-ovata, lineaque longitudinali disci exterioris, antice magis, postice minus abbreviata, nigris. Corpus subtus nigrum, nitidum, subtiliter punctulatum. Pedes nigri, nitidi; femoribus apice tibiisque basi ferrugineis; femoribus posticis incrassatis, inferne vix punctatis.

408. *Crepidodera inculta*.

Oblonga, modice convexa, ferruginea, nitida, subtus nigro-picea; antennis, pedibus prothoraceque dilutius ferrugineis, hoc sub-laevi, ante basin transversim profunde sulcato; elytris crebre, medioeriter punctato-striatis, interstitiis angustis, haud convexis, levibus. — Long. $3\frac{1}{2}$, lat. $1\frac{1}{2}$ millim.

Patria: Nova Hollandia (Sidney).

Caput rotundatum, modice convexum, ferrugineum, nitidum, subtiliter, crebre punctulatum, inter oculos leviter impressum. Oculi rotundati, convexi, brunnei. Antennae dimidio corpore longiores, minus

tenuis, rufo-testaceæ, parve pubescentes, extrorsum leviter incrassatæ, articulis quinque ultimis fuscis. Prothorax longitudine nonnihil latior, basi apiceque truncatus, lateribus tenuiter reflexo-marginatis, pone apicem subito ampliatis, dein basin versus sensim oblique angustatis, angulis anticis lateraliter nonnihil productis, sub-acuminatis, posticis fere rectis; superne convexus, dilutius rufo-ferrugineus, nitidus, sub-lævis, ante basin sulco profundo, transverso, utrinque nonnihil abbreviato insculptus. Scutellum triangulare, ferrugineum, nitidum, læve. Elytra antice truncata, prothoracis basi dimidio latiora, quam lata fere duplo longiora, callo suprahumerali parum elevato, obtuso; lateribus ad basin nonnihil rotundata, dein recta, apice conjunctim rotundata, superne modice convexa, dorso inter basin et medium leviter impressa, tota ferruginea, nitida, regulariter, crebre, mediocriter punctato-striata, interstitiis angustis, haud convexus, lævibus. Corpus subtus nigro-piceum, nitidum, subtiliter, crebre punctulatum. Pedes dilutius ferruginei, nitidi, punctulati; femoribus posticis incrassatis, sub-compressis.

409. *Crepidodera curtula*.

Sub-rotundata, convexa, cæruleo-virescens, nitida; antennis basi, palpis pedibusque rufo-testaceis; prothorace subtilissime, sat crebre punctulato, pone apicem subito rotundato-ampliato, ante basin transversim modice profunde sulcato; elytris crebre, sat profunde, sub-seriatim punctatis. — Long. $2\frac{1}{2}$, lat. $1\frac{1}{4}$ millim.

Patria: Buenos Ayres.

Magnitudo fere *Gruptodera mercurialis*. Caput sub-rotundatum, modice convexum, viridi-cæruleo-seens, nitidum, parce, subtiliter punctulatum; ore nigro-piceo. Palpi rufo-testacei. Oculi rotundati, modice convexi, brunnei. Antennæ vix longitudine elytrorum, minus tenues, nigro-fuscae, parce pubescentes, articulis septem basalibus testaceis, 5—7 apice infuscatis. Prothorax longitudine dimidio latior, apice sub-truncatus, basi utrinque leviter sinuatus, lateribus tenuiter reflexo-marginatis, pone apicem subito rotundato-ampliat, angulis anticis deflexis, rotundatis, posticis fere rectis; superne modice convexus, viridi-cæruleo-seens, nitidus, subtilissime, sat crebre punctulatus, ante basin sulco transverso, minus profunde insculptus. Scutellum triangulare, aeneum, nitidum, læve. Elytra antice sub-truncata, prothoracis basi latiora, quam lata vix dimidio longiora, humeris parum elevatis, obtusis; ad basin rotundato-ampliat, pone medium angustata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, viridi-cærulescentia, nitida, crebre, sat profunde, sub-seriatim punctata. Corpus subtus aeneum, sub-nitidum, subtiliter, crebre punctulatum. Pedes rufo-testacei, punctulati, parce, breviter pubescentes; femoribus posticis incrassatis, sub-compressis.

410. *Crepidodera anescens*.

Oblongo-ovata, convexa, viridi-aenea, nitida; antennis pedibusque flavo-testaceis; prothorace sub-lævi, ante basin sulco profundo, transverso insculpto; elytris profunde, sat crebre, sub-seriatim punctulatis. — Long. $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$, lat. 1 — $1\frac{1}{4}$ millim.

Patria: Brasilia (Rio Janeiro).

Caput ovatum, modice convexum, viridi-aeneum, nitidum, postice læve, antice punctulatum, tenuiter carinatum; ore ferrugineo. Palpi picei. Oculi rotundati, convexi, nigri. Antennæ longitudine elytrorum, sub-tenues, dilute flavo-testaceæ, parce pubescentes, extrorsum leviter infuscatæ. Prothorax longitudine dimidio latior, apice sub-truncatus, basi utrinque leviter sinuatus, lateribus tenuiter reflexo-marginatis, pone apicem leviter rotundato-ampliat, dein fere rectis, angulis anticis deflexis, rotundatis, posticis lateraliter nonnihil productis, sub-acuminatis; superne convexus, viridi-aeneus, nitidus, vix vel obsoletissime punctulatus, ante basin sulco sat profundo, transverso, utrinque haud abbreviato insculptus. Scutellum triangulare, viridi-aeneum, nitidum, læve. Elytra antice truncata, prothoracis basi latiora, quam lata dimidio longiora, humeris parum elevatis, obtusis; ad basin modice rotundato-ampliat, lateribus non dilatata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, viridi-aenea, nitida, sat crebre, profunde, seriatim punctulata. Corpus subtus nigro-

æneum, nitidum, subtiliter, crebre punctulatum. Pedes dilute flavo-testacei, punctulati; femoribus posticis incrassatis, sub-compressis.

411. *Crepidodera vafra*.

Oblonga, convexa, cærulea, nitida; antennarum articulis quatuor basalibus testaceis, articulo primo saepe infusato; prothorace subtilissime, crebre punctulato, ante basin transversim, profunde sulcato; elytris crebre, evidentius, sub-seriatim punctulatis. — Long. 2½ — 2¾, lat. 1¼ — 1½ millim.

Patria: California (St. Francisco).

Caput ovatum, modice convexum, cæruleum, nitidum, postice sub-lævigatum, inter oculos parce punctulatum, antice leviter carinatum. Oculi sub-ovati, modice convexi, glauci. Antennæ minus tenues, extrorsum sensim leviter incrassatæ, nigrae, parce pubescentes, articulis quatuor basalibus testaceis, articulo primo tamen saepe, apice excepto, fusco. Prothorax longitudine dimidio latior, apice leviter rotundato-emarginatus, basi truncatus, lateribus reflexo-marginatis, pone apicem leviter rotundato-ampliatis, angulis anticis deflexis, non prominulis, rotundatis, posticis fere rectis; superne convexus, cæruleus, nitidus, subtiliter, crebre punctulatus, ante basin sulco profundo, transverso, utrinque non abbreviato in sculptus. Scutellum triangulare, cæruleum, nitidum, læve. Elytra antice sub-truncata, prothoracis basi nonnihil latiora, quam lata dimidio longiora, humeris parum elevatis, obtusis; lateribus laud ampliata, pone medium sensim nonnihil angustata, apice conjunctim rotundata, superne modice convexa, cærulea, nitida, punctis quam in prothorace evidentioribus, sat crebris, sub-seriatis impressa. Corpus subtus nigro-cæruleum, nitidum, subtiliter, crebre punctulatum. Pedes nigro-cærulei, antice breviter, parce cinereo-pubescentes; femoribus posticis modice incrassatis.

412. *Crepidodera suturella*.

Oblonga, convexa, testacea, nitida; prothorace subtilissime, sat crebre punctulato, intra basin transversim, sat profunde sulcato; elytris crebre, subtiliter, sub-seriatim punctulatis, sutura anguste, leviter infusata. — Long. 2 — 2½, lat. 1¼ — 1½ millim.

Patria: California (St. Francisco), Insula Puna.

Magnitudine et statura *C. vafra*. Caput sub-ovatum, modice convexum, testaceum, nitidum, postice sub-lævigatum, inter oculos parce punctulatum; ore piceo. Palpi testacei. Oculi sub-rotundati, modice convexi, nigri. Antennæ longitudine elytrorum, minus tenues, testaceæ, parce pubescentes, extrorsum sensim nonnihil incrassatæ. Prothorax longitudine dimidio latior, basi apiceque truncatus, lateribus tenuiter reflexo-marginatis, pone apicem leviter rotundato-ampliatis, angulis anticis deflexis, obtusis, posticis extrorsum nonnihil productis, sub-acuminatis; superne convexus, testaceus, nitidus, subtilissime, crebre punctulatus, ante basin sulco sat profundo, transverso in sculptus. Scutellum triangulare, testaceum, nitidum, læve. Elytra ovata, antice truncata, prothoracis basi nonnihil latiora, quam lata dimidio longiora, humeris parum elevatis, obtusis; pone basin leviter rotundato-ampliata, infra medium sensim angustata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, subtiliter, crebre, sub-seriatim punctulata, testacea, nitida, sutura anguste leviter infusata. Corpus subtus rufo-testaceum, nitidum, subtiliter, crebre punctulatum. Pedes testacei, nitidi, punctulati; femoribus posticis incrassatis, compressis.

413. *Crepidodera vagabunda*.

Oblonga, convexa, cærulea, nitida; antennis, tibiis tarsisque testaceis; capite inter oculos carinato; prothorace sub-lævi, ante basin transversim profunde sulcato; elytris evidenter, crebre sub-seriatim punctulatis. — Long. 1¾ — 2, lat. 1 — 1½ millim.

Var. *α*: femoribus anterioribus fusco-ferrugineis.

Patria: Montevideo, Peruvia (Callao) et Insula Puna.

Statura et summa similitudo *C. vagra*, saepe minor, antennis, tibiis tarsisque testaceis, prothorace obsoletius punctulato ab illa distincta. Caput ovatum, modice convexum, cæruleum, nitidum, postice laevigatum, inter oculos punctulatum, tenuiter carinatum. Oculi sub-rotundati, modice convexi, nigri. Antennae longitudine elytrorum, minus tenues, parce pubescentes, testaceae, extrorsum sensim incrassatae. Prothorax longitudine dimidio latior, apice leviter rotundato-emarginatus, basi truncatus, lateribus tenuiter reflexo-marginatis, pone apicem leviter rotundato-ampliat, angulis anticis deflexis, rotundatis, posticis fere rectis; superne convexus, cæruleus, nitidus, vix vel obsolete punctulatus, ante basin sulco transverso, profundo, utrinque vix abbreviato in sculptus. Scutellum triangulare, cæruleum, nitidum, leve. Elytra antice subtruncata, prothoracis basi paullo latiora, quam lata dimidio longiora, humeris parum elevatis, obtusis; lateribus vix ampliata, pone medium sensim nonnihil angustata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, cærulea, nitida, punctis distinctis, sat crebris, sub-seriatis impressa. Corpus subtus nigro-cæruleum, nitidum, subtiliter, crebre punctulatum. Pedes parce punctulati; femoribus nigro-cærulescentibus, posticis modice incrassatis; tibiis tarsisque testaceis.

414. *Crepidodera coracina*.

Ovata, convexa, nigro-cærulea, nitida; antennis, palpis pedibusque flavo-testaceis; femoribus posticis basi infuscatis; prothorace subtiliter, crebre punctulato, ante basin sulco transverso, sat profundo in sculpto; elytris evidentius, sat crebre, sub-seriatim punctulatis. — Long. 1½, lat. 1¼ millim.

Var. α : picea, femoribus posticis basi vix infuscatis.

Patria: Brasilia (Rio Janeiro).

Magnitudo *C. nigritula*. Caput sub-rotundatum, modice convexum, nigro-cæruleum, nitidum, postice leve, antice punctulatum; ore ferrugineo. Palpi flavo-testacei. Oculi rotundati, convexi, nigro-brunnei. Antennae elytris nonnihil longiores, sub-tenues, flavo-testaceae, parce pubescentes, extrorsum leviter infuscae. Prothorax longitudine dimidio latior, apice parum rotundato-emarginatus, basi utrinque leviter sinuatus, lateribus tenuiter reflexo-marginatis, pone apicem rotundato-ampliat; superne convexus, nigro-cærulescens, nitidus, subtiliter, crebre punctulatus, ante basin sulco sat profundo, transverso, utrinque laud abbreviato in sculptus. Scutellum triangulare, nigrum, nitidum, leve. Elytra obovata, antice sub-truncata, prothoracis basi latiora, quam lata dimidio longiora, humeris parum elevatis, obtusis; lateribus parum ampliata, pone medium angustata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, nigro-cærulescentia, nitida, sat crebre, evidentius, sub-seriatim punctata. Corpus subtus nigrum, subtiliter, crebre punctulatum. Pedes flavo-testacei, punctulati; femoribus posticis incrassatis, sub-compressis, basi plus minusve infuscatis.

415. *Crepidodera bicolor*.

Ovata, convexa, testacea, nitida; pectore medio abdomineque toto nigro-piceis; prothorace subtiliter, crebre punctulato, ante basin sulco sat profundo, transverso in sculpto; elytris sat profunde, crebre punctato-striatis. — Long. 1½—1¾, lat. ¾—1 millim.

Patria: California (St. Francisco), Taiti.

Magnitudo et similitudo *Aphthona sulcariae*, prothorace ante basin transversim sulcato ab illa mox distincta. Caput sub-ovatum, modice convexum, testaceum, nitidum, sub-laevigatum, inter oculos tenuiter, breviter carinatum. Oculi rotundati, modice convexi, nigri. Antennae longitudine elytrorum, minus tenues, testaceae, parce pubescentes, extrorsum sensim leviter incrassatae. Prothorax longitudine vix dimidio latior, apice subtruncatus, basi utrinque leviter sinuatus, lateribus tenuiter reflexo-marginatis, pone apicem oblique ampliatis, dein rectis, angulis anticis deflexis, obtusis, posticis retrorsum nonnihil productis, sub-acuminatis; superne modice convexus, testaceus, nitidus, subtiliter, sat crebre punctulatus, ante basin sulco sat profundo, transverso, utrinque non abbreviato in sculptus. Scutellum testaceum; nitidum, leve. Elytra antice truncata, prothoracis basi latiora, quam lata vix dimidio longiora, humeris parum elevatis, obtusis; pone basin leviter

rotundato-ampliata, infra medium sensim angustata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, testacea, nitida, sat profunde, crebre, minus regulariter punctato-striata. Corpus subtus crebre punctulatum; pectore medio abdominaeque toto nigro-piceis. Pedes testacei, nitidi; femoribus posticis incrassatis, compressis.

416. *Crepidodera puberula*.

Ovata, convexa, nigra, nitida, breviter cinereo-puberula; antennis, apice excepto fusco, pedibusque flavo-testaceis; femoribus posticis nigris; prothorace subtiliter, sat crebre punctulato, ante basin transversim canaliculato; elytris sat profunde punctato-striatis, interstitiis levibus. — Long. $1\frac{1}{4}$, lat. $\frac{3}{4}$ millim.

Patria: Montevideo, California, Insulae Puna, Taiti et Oahu.

Statura et summa similitudo *C. pubescentis*, nonnihil minor, prothorace subtilius punctulato, elytrorum striis remotius punctatis ab illa fere unice distincta. Caput rotundatum, modice convexum, nigrum, nitidum, vix vel obsolete punctulatum, infra antennis tenuiter cinereo-pubescentibus. Oculi sub-rotundati, modice convexi, nigri. Antennae corpore nonnihil breviores, tenues, sub-filiformes, flavo-testaceae, parce pubescentes, articulis tribus ultimis fuscis. Prothorax longitudine dimidio latior, apice leviter rotundato-emarginatus, basi utrinque leviter sinuatus, lobo medio sub-triangulariter producto; lateribus pone apicem subito rotundato-amplatis, angulis anticis deflexis, obtusis, posticis rectis; superne convexus, niger, nitidus, pube brevi parce adpersus, subtiliter, sat crebre punctulatus, ante basin sulco transverso, utrinque abbreviato insculptus. Scutellum parvum, triangulare, nigrum, nitidum, laeve. Elytra antice singulatim leviter rotundato-producta, prothoracis basi nonnihil latiora, quam lata vix dimidio longiora, humeris modice elevatis, obtusis; lateribus pone medium sensim angustata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, postice declivia, nigra, nitida, pube brevi, cinerea parce, pone medium densius adpersa, sat profunde punctato-striata, punctis striarum minus crebris, interstitiis levibus. Corpus subtus nigrum, nitidum, subtiliter punctulatum. Pedes testacei; femoribus posticis totis nigris, anterioribus interdum basi plus minusve infuscat.

417. *Crepidodera vestita*.

Oblongo-ovata, ferruginea, nitida, pube sat densa cinerea vestita; antennis basi pedibusque dilutioribus; femoribus posticis fuscis; prothorace crebre, sat profunde punctato, ante basin sulco tenui, transverso insculpto; elytris profunde, sat crebre punctato-striatis. — Long. $1\frac{1}{4}$, lat. $\frac{3}{4}$ millim.

Patria: Montevideo, Buenos Ayres.

Affinis certe *C. pubescenti*, minor, praesertim angustior, aliter colorata, prothorace ante basin sulco tenuiori insculpto. Caput sub-rotundatum, modice convexum, ferrugineum, nitidum, pube brevi, cinerea adpersum, obsolete punctulatum. Palpi ferruginei. Oculi sub-rotundati, convexi, nigri. Antennae longitudine elytrorum, sub-tenues, parce pubescentes, extrorsum leviter infuscae. Prothorax longitudine vix dimidio latior, apice truncatus, basi leviter rotundatus, lateribus pone apicem nonnihil rotundato-amplatis, dein fere rectis, angulis anticis rotundatis, posticis rectis; superne convexus, ferrugineus, nitidus, crebre, distincte punctulatus, pube brevi, cinerea adpersus, ante basin sulco transverso, minus profundo, utrinque vix abbreviato insculpto. Scutellum triangulare, ferrugineum, nitidum, laeve. Elytra antice truncata, prothorace latiora, quam lata dimidio longiora, humeris non elevatis, rotundatis; lateribus recta, pone medium sensim angustata, apice conjunctim rotundata; superne convexa, ferruginea, nitida, profunde, sat crebre punctato-striata, pube brevi, cinerea sat dense adpersa. Corpus subtus ferrugineum, nitidum, subtiliter, crebre punctulatum. Pedes rufo-testacei, punctulati; femoribus posticis incrassatis, sub-compressis, plus minusve infuscat.

418. *Phyllotreta decora*.

Oblongo-ovata, modice convexa, testacea, nitida; capite postice, antennis extrorsum pectoreque nigris; prothorace subtiliter, crebre punctulato; elytris subtiliter, evidentius,

crebre punctulatis, nigris, singulo plaga magna, oblonga, longitudinali flavescenti ornato. — Long. $3\frac{1}{2}$, lat. $1\frac{3}{4}$ millim.

Patria: Manilla.

Caput sub-rotundatum, modice convexum, sub-læve, nitidum, postice nigrum, antice testaceum, inter oculos canalicula tenui, transversa. Oculi rotundati, convexi, brunnei. Antennae dimidio corpore nonnihil longiores, minus tenues, fuscae, parce pubescentes, articulis tribus basalibus testaceis. Prothorax longitudine vix dimidio lator, basi apiceque truncatus, lateribus tenuiter reflexo-marginatis, pone apicem leviter rotundato-ampliatis, angulis anticis deflexis, sub-acuminatis, posticis obtusis; superne modice convexus, testaceus, nitidus, subtiliter, sat crebre punctulatus. Scutellum sub-triangulare, nigrum, nitidum. Elytra antice truncata, prothoracis basi vix dimidio latiora, quam lata dimidio longiora, callo suprahumerali obsoleto, vix nullo; lateribus pone basin leviter rotundato-ampliata, apicem versus sensim angustata, apice conjunctim rotundata, superne modice convexa, nigra, nitida, subtiliter, evidentius, sat crebre punctulata, singulo in disco plaga magna, longitudinali, oblonga, dilute flavescente ornato. Corpus subtus creberrime punctulatum et aciculatum. Pectus nigrum. Abdomen rufo-testaceum. Pedes testacei, nitidi, crebre punctulati; femoribus posticis modice crassis, sub-compressis.

419. *Phyllotreta elongata*.

Oblonga, modice convexa, caerulea, nitida; antennis longis, fuscis, basi pedibusque fusco-testaceis; femoribus anterioribus medio, posticis totis nigris; prothorace longitudine vix latiore, minus crebre punctulato, medio transversim leviter impresso; elytris evidenter vage, hinc inde sub-seriatim punctulatis. — Long. $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$, lat. $1\frac{1}{4}$ — $1\frac{1}{2}$ millim.

Patria: Java, Manilla.

Caput rotundatum, modice convexum, caeruleum, nitidum, subtilissime, minus crebre punctulatum. Oculi sat magni, rotundati, convexi, nigri. Antennae corpore nonnihil breviores, sub-tenues, filiformes, nigro-fuscae, articulis secundo et tertio parvis, brevibus, ferrugineis, reliquis elongatis. Prothorax longitudine vix lator, basi apiceque truncatus, lateribus tenuiter reflexo-marginatis, medio parum rotundato-ampliatis, angulis anticis deflexis, sub-rectis, posticis leviter rotundatis; superne modice convexus, caeruleus, nitidus, minus crebre, parum profunde punctulatus, medio transversim leviter impressus. Scutellum triangulare caeruleum, nitidum, læve. Elytra antice sub-truncata, prothoracis basi vix dimidio latiora, quam lata fere duplo longiora, callo humerali vix elevato; lateribus recta, apice conjunctim rotundata, superne convexa, caerulea, nitida, evidenter, vage, minus crebre, hinc inde sub-seriatim punctulata. Corpus subtus nigrum, sub-nitidum, subtiliter, crebre punctulatum. Pedes fusco-testacei, punctulati; femoribus anterioribus medio plus minusve infuscatis, posticis incrassatis, sub-compressis, totis nigris.

420. *Phyllotreta cyanella*.

Oblonga, modice convexa, cyanea, nitida; antennis longis, articulis quatuor basalibus flavis; pedibus testaceis; femoribus anterioribus basi, posticis totis nigris; prothorace longitudine nonnihil latiore, subtilissime, crebre punctulato; elytris subtilissime confertim, vage punctulatis. — Long. $1\frac{1}{2}$, lat. $\frac{3}{4}$ millim.

Patria: Java.

Statura præcedentis, multo minor, subtilius punctulata, prothorace transversim non impresso, articulis antennarum secundo et tertio aliter formatis. Caput rotundatum, modice convexum, caeruleum, nitidum, sub-læve, ante oculos tenuiter, transversim canaliculatum. Oculi rotundati, convexi, nigro-brunnei. Antennae corpore nonnihil breviores, minus tenues, nigro-fuscae, parce pubescentes, articulis quatuor basalibus flavis, secundo sub-ovato, tertio sequente nonnihil brevior, reliquis elongatis. Prothorax latitudine vix dimidio brevior, basi apiceque truncatus, lateribus tenuiter reflexo-marginatis, medio modice rotundato-ampliatis,

angulis omnibus leviter rotundatis; superne modice convexus, cyaneus, nitidus, subtilissime, crebre punctulatus. Scutellum triangulare, caeruleum, nitidum, laeve. Elytra antice sub-truncata, prothoracis basi fere dimidio latiora, quam lata fere duplo longiora, callo humerali vix elevato; lateribus recta, apice conjunctim rotundata, superne modice convexa, cyanea, nitida, subtilissime, crebre, vage punctulata. Corpus subtus nigrum, nitidum, subtiliter, crebre punctulatum. Pedes testacei, nitidi, punctulati; femoribus anterioribus basi leviter infuscatis, posticis crassis, sub-compressis, totis nigris.

421. *Aphthona illota*.

Ovata, convexa, dilute flavescens, nitida; antennis extrorsum leviter infuscatis; prothorace subtiliter, crebre punctulato, longitudine vix dimidio latiore, basi truncato; elytris subtilissime punctato-striatis, interstitiis crebre, obsolete punctulatis; femoribus posticis superne apice leviter infuscatis. — Long. $2\frac{1}{2}$ —3, lat. $1\frac{1}{3}$ —2 millim.

Patria: Promontorium Bonae Spei.

Caput rotundatum, modice convexum, dilute flavo-testaceum, nitidum, obsolete, sat crebre punctulatum. Oculi sub-rotundati, parum convexi, nigri. Antennae dimidio corpore longiores, minus tenues, dilute flavescens, parce pilosae, extrorsum leviter incrassatae, fusciscentes. Prothorax longitudine vix dimidio latior, basi apiceque truncatus, lateribus tenuiter reflexo-marginatis, pone apicem modice rotundato-ampliatis, angulis anticis parum prominulis, sub-acuminatis, posticis obtusis; superne convexus, dilute flavescens, nitidus, subtiliter, crebre punctulatus. Scutellum parvum, sub-triangulare, dilute flavescens, nitidum, laeve. Elytra antice truncata, prothoracis basi latiora, quam lata dimidio longiora, callo humerali vix elevato; pone basin leviter rotundato-ampliata, infra medium sensim angustata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, dilute flavescens, nitida, subtiliter punctato-striata, interstitiis subtilissime, sat crebre punctulatis. Corpus subtus dilute flavo-testaceum, nitidum, subtiliter, crebre punctulatum. Pedes dilute flavescens, nitidi, punctulati; femoribus posticis crassis, sub-compressis, superne apice leviter infuscatis.

422. *Tenodactyla insularis*.

Oblongo-ovata, convexa, rufo-testacea, nitida; prothorace longitudine nonnihil latiore, obsolete punctulato; elytris vage, minus crebre, evidentius punctulatis; femoribus posticis apice superne leviter infuscatis. — Long. 1. lat. $\frac{1}{2}$ millim.

Patria: Insula Taiti.

T. pusilla magnitudine aequalis. Caput sub-rotundatum, leviter convexum, rufo-testaceum, nitidum, sub-laeve. Oculi rotundati, convexi, nigri. Antennae corpore nonnihil breviores, minus tenues, testaceae, parce pubescentes, extrorsum leviter incrassatae. Prothorax longitudine nonnihil latior, basi apiceque truncatus, lateribus tenuiter reflexo-marginatis, medio vix vel parum rotundato-ampliatis, angulis anticis deflexis, obtusis, posticis fere rectis; superne convexus, rufo-testaceus, nitidus, obsolete, sat crebre punctulatus. Scutellum triangulare, testaceum, nitidum, laeve. Elytra antice truncata, prothoracis basi latiora, quam lata dimidio longiora, callo suprahumerali parum elevato, obtuso; pone basin leviter rotundato-ampliata, infra medium sensim angustata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, rufo-testacea, nitida, subtiliter, evidentius, minus crebre, vage punctulata. Corpus subtus rufo-testaceum, nitidum, subtiliter, crebre punctulatum. Pedes rufo-testacei, nitidi, punctulati; femoribus posticis sat incrassatis, sub-compressis, superne apice leviter infuscatis.

423. *Psylliodes gracilis*.

Oblonga, convexa, supra caerulea, nitida, subtus nigra; antennis basi, pedibus anterioribus, tibiis tarsisque posticis fusco-testaceis; prothorace crebre, evidenter punctulato;

elytris sat crebre, profunde punctato-striatis, interstitiis obsolete punctulatis. — Long. 2½ lat. 1½ millim.

Patria: Malacca.

Affinis certe *Psyll. chrysocephala*, angustior, capite subtiliter punctulato, antice concolore. Caput ovatum, caeruleum, nitidum, subtiliter, sat crebre punctulatum, apice truncatum. Clypeus piceo-ferrugineus. Palpi nigro-picei. Antennae longitudine elytrorum, minus tenues, nigro-fuscae, parce pubescentes, extrorsum sensim nonnihil incrassatae, articulis quatuor basalibus testaceis. Prothorax longitudine parum latior, apice truncatus, basi tenuiter marginatus, utrinque leviter sinuatus, lateribus anguste marginatis, pone apicem oblique ampliatis, ante medium sub-dentatis, dein basin versus sensim angustatis, angulis anticis non prominulis, posticis rectis; superne modice convexus, caeruleus, nitidus, crebre, sat profunde punctatus. Scutellum triangulare, nigro-caeruleum, nitidum, laeve. Elytra antice sub-truncata, prothoracis basi nonnihil latiora, quam lata duplo longiora, callo suprahumerali parum elevato, obtuso; pone basin paulo rotundato-ampliata, lateribus non dilatata, a medio apicem versus attenuata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, caerulea, nitida, sat crebre, profunde punctato-striata, interstitiis angustis, obsolete punctulatis. Corpus subtus nigrum, nitidum, subtiliter, crebre punctulatum. Pedes fusco-testacei, punctulati; femoribus posticis crassis, sub-pyriformibus, nigro-caerulescentibus.

424. *Plectroscelis convexicollis*.

Oblongo-ovata, convexa, nitida, supra aenea, subtus nigra; antennis longis, basi pedibusque rufo-testaceis; femoribus posticis nigro-piceis; prothorace longitudine parum latiore, subtiliter, sat crebre punctulato; elytris evidentius punctato-striatis, interstitiis angustis, parum convexis, levibus; tibiis posticis extus apice emarginatis, ante medium dente brevi armatis. — Long. 1½, lat. 1 millim.

Patria: Promontorium Bonae Spei.

Caput magnum, sub-rotundatum, convexum, aeneum, nitidum, subtiliter, sat crebre punctulatum; ore palpisque rufo-ferrugineis. Oculi rotundati, convexi, nigro-brunnei. Antennae corpore parum breviores, subtenues, filiformes, nigro-fuscae, parce pubescentes, articulis quinque basalibus testaceis. Prothorax longitudine nonnihil latior, basi apiceque truncatus, lateribus leviter reflexo-marginatis, pone apicem parum rotundato-ampliatis, angulis anticis lateraliter nonnihil productis, sub-acuminatis, posticis fere rotundatis; superne valde convexus, aeneus, nitidus, subtiliter, sat crebre punctulatus. Scutellum triangulare, aeneum, nitidum, sublaeve. Elytra antice truncata, prothoracis basi parum latiora, quam lata dimidio longiora, callo suprahumerali obsolete vix nullo; pone basin leviter rotundato-ampliata, infra medium sensim angustata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, postice declivia, tota aenea, nitida, regulariter, sat profunde punctato-striata, interstitiis angustis, parum convexis, levibus. Corpus subtus nigrum, nitidum, subtiliter, crebre punctulatum. Pedes rufo-testacei, nitidi, punctulati; femoribus posticis magnis, crassis, sub-compressis, nigropiceis; tibiis posticis extus ante apicem leviter emarginatis, dein dente parvo brevi armatis.

425. *Plectroscelis armipes*.

Ovata, convexa, supra aenea, nitida, subtus nigra; antennis pedibusque testaceis, femoribus anterioribus basi, posticis totis nigris; prothorace latiore, sat crebre, profunde punctato; elytris profunde punctato-striatis, interstitiis convexis, levibus, tibiis intermediis extus ante apicem dente brevi armatis. — Long. 1½, lat. 1 millim.

Patria: Java.

Magnitudo et similitudo *Plectr. dentipedis*, ab illa prothorace latiore, evidentius punctulato elytrisque profundius punctato-striatis bene distincta. Caput rotundatum, convexum, aeneum, nitidum, subtilissime punctulatum; mandibulis palpisque rufo-testaceis. Oculi rotundati, convexi, nigro-brunnei. Antennae longitudine

elytrorum, sub-tenues, testaceæ, parce pubescentes, extrorsum parum incrassatæ, dilute fuscæ. Prothorax longitudine dimidio latior, apice leviter rotundato-emarginatus, basi tenuiter marginatus, utrinque vix sinuatus, lateribus tenuiter reflexo-marginatis, pone apicem oblique ampliatis, angulis anticis haud prominulis, rotundatis, posticis rectis; superne convexus, æneus, nitidus, sat crebre, profunde punctatus. Scutellum triangulare, æneum, nitidum, læve. Elytra antice truncata, prothoracis basi nonnihil latiora, quam lata vix dimidio longiora, callo suprahumerali parum elevato, obtuso; pone basin perparum rotundato-ampliata, infra medium sensim angustata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, ænea, nitida, profunde punctato-striata, interstitiis angustis, modice convexis, lævibus. Corpus subtus nigrum, nitidum, subtiliter, crebre punctulatum. Pedes testacei, punctulati; femoribus anterioribus basi plus minusve infuscatis, posticis crassis, sub-compressis, totis nigris; tibiis intermediis extus ante apicem dente brevi armatis.

426. *Plectroscelis lucidula*.

Oblongo-ovata, convexa, supra cuprea, nitida, subtus nigro-ænea; antennis ultra medium pedibusque testaceis; femoribus anterioribus basi, posticis totis nigris; prothorace subtiliter, minus crebre punctulato; elytris profunde punctato-striatis, interstitiis vix convexis, lævibus; tibiis intermediis extus ante apicem dente brevi armatis. — Long. $1\frac{1}{2}$, lat. $\frac{1}{4}$ millim.

Patria: Buenos Ayres.

Longitudo præcedentis, angustior, aliter colorata, prothorace subtilius punctulato. Caput sat magnum, rotundatum, convexum, cupreum, nitidum, subtiliter, sat crebre punctulatum. Palpi ferruginei. Oculi rotundati, convexi, nigro-brunnei. Antennæ elytris breviores, articulis sex basalibus testaceis, reliquis nigro-fuscis, sensim nonnihil crassioribus. Prothorax longitudine dimidio latior, antice truncatus, basi vix marginatus, utrinque leviter sinuatus, lateribus tenuiter reflexo-marginatis, pone apicem leviter rotundato-ampliatis, dein sub-rectis, angulis anticis non prominulis, obtusis, posticis rectis; superne convexus, cupreus, nitidus, subtiliter, minus crebre punctulatus. Scutellum triangulare, cupreum, nitidum, læve. Elytra antice truncata, prothoracis basi vix latiora, quam lata dimidio fere longiora, callo suprahumerali vix elevato, obtuso; pone basin leviter rotundato-ampliata, infra medium sensim angustata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, cuprea, nitida, profunde punctato-striata, interstitiis haud convexis, lævibus. Corpus subtus nigro-æneum, nitidum, subtiliter, crebre punctulatum. Pedes testacei, punctulati; femoribus anterioribus a basi ultra medium infuscatis, posticis incrassatis, sub-compressis, totis nigris; tibiis intermediis extus ante apicem dente brevi armatis.

427. *Argopus maculiceps*.

Rotundatus, convexus, cæruleus, nitidus; capite, antennis basi, prothorace pedibusque rufis, illo basi macula rotunda, cærulea notato; prothorace brevi, obsolete punctulato; elytris sub-seriatis, sat crebre punctulatis. — Long. 5, lat. $3\frac{1}{4}$ millim.

Patria: Promontorium Bonæ Spei.

Statura et summa similitudo *A. indicæ*, dimidio major, vertice macula cærulea notato, elytrorum punctis crebrioribus ab illa mox distincta. Caput rotundatum, modice convexum, rufum, nitidum, vix vel obsolete punctulatum; vertice macula parva cærulea, antice rotundata decorato; ore nigro-piceo. Palpi rufi. Oculi medioeres, ovati, convexi, nigri. Antennæ longitudine elytrorum, minus tenues, rufo-testaceæ, parce pubescentes, extrorsum vix incrassatæ, nigro-fuscæ. Prothorax longitudine duplo latior, apice parum rotundato-emarginatus, basi leviter rotundatus, lateribus tenuiter marginatis, medio nonnihil rotundato-ampliatis, angulis anticis deflexis, modice prominulis, sub-acuminatis, posticis fere rectis, superne convexus, rufus, nitidus, subtilissime, sat crebre punctulatus. Scutellum triangulare, nigro-cæruleum, nitidum, læve. Elytra antice sub-truncata, prothoracis basi nonnihil latiora, quam lata parum longiora, callo suprahumerali parum elevato, obtuso; pone basin rotundato-ampliata, infra medium sensim angustata, apice conjunctim rotundata,

superne convexa, caerulea, nitida, sat crebre, mediocriter, sub-seriatim punctulata. Corpus subtus nigro-caeruleum, nitidum, subtiliter, crebre punctulatum. Pedes rufi, nitidi, punctulati, parce, breviter pubescentes; femoribus posticis crassis, sub-compressis.

428. *Argopus hybridus*.

Rotundatus, modice convexus, niger, nitidus; antennis, palpis pedibusque rufo-testaceis; prothorace brevi, subtilissime, crebre punctulato, basi bisinuato; elytris subtiliter, minus crebre, sub-seriatim punctulatis. — Long. 2 $\frac{3}{4}$, lat. 1 $\frac{3}{4}$ millim.

Var. α : piceus, antennis, palpis pedibusque dilutioribus.

Patria: Brasilia (Rio Janeiro).

Caput rotundatum, modice convexum, nigrum, nitidum, sub-læve; ore palisque rufo-testaceis. Oculi sub-rotundati, modice convexi, nigro-brunnei. Antennae dimidio corpore longiores, sub-tenuae, rufo-testaceae, parce pubescentes. Prothorax longitudine plus duplo latior, antice parum rotundato-emarginatus, basi utrinque sinuatus, lateribus tenuiter marginatis, pone apicem modice rotundato-ampliatis, angulis anticis vix prominulis, obtusis, posticis sub-rotundatis; superne modice convexus, niger, nitidus, subtilissime, crebre punctulatus. Scutellum modice, sub-triangulare, nigrum, nitidum, læve, apice sub-rotundatum. Elytra rotundata, antice singulatim leviter, obtuse producta, quam lata vix longiora, callo suprahumerali parum elevato, obtuso; pone basin modice rotundato-ampliata, apice conjunctim late rotundata, superne modice convexa, nigra, nitida, subtiliter, minus crebre, sub-seriatim punctulata. Corpus subtus nigrum, sub-nitidum, subtilissime, crebre punctulatum. Pedes rufo-testacei, nitidi, punctulati, parce, breviter pubescentes; femoribus posticis crassis, sub-compressis.

429. *Argopus rubricosus*.

Rotundatus, modice convexus, ferrugineus, nitidus; antennis extrorsum fuscis; prothorace brevi, subtiliter, crebre punctulato, postice bi-sinuato; elytris subtiliter, minus crebre, sub-seriatim punctulatis; corpore subtus profunde, dense punctato. — Long. 2, lat. 1 $\frac{1}{2}$ millim.

Patria: Malaeca.

Statura præcedentis, minor, aliter coloratus, subtus profundius punctatus. Caput rotundatum, modice convexum, ferrugineum, nitidum, sub-læve, ante oculos utrinque oblique canaliculatum. Oculi sub-rotundati, modice convexi, nigro-brunnei. Antennae dimidio corpore longiores, minus tenuae, parce pubescentes, articulis quatuor basalibus ferrugineis, reliquis fuscis, sensim nonnihil incrassatis. Prothorax longitudine plus duplo latior, apice parum rotundato-emarginatus, basi utrinque sinuatus, lateribus tenuiter reflexo-marginatis, pone apicem modice rotundato-ampliatis, angulis anticis deflexis, haud prominulis, obtusis, posticis sub-rectis; superne modice convexus, ferrugineus, nitidus, subtiliter, crebre punctulatus. Scutellum sub-triangulare, ferrugineum, nitidum, læve. Elytra antice singulatim leviter rotundata, prothoracis basi nonnihil latiora, quam lata haud longiora, callo suprahumerali parum elevato, obtuso, pone basin modice rotundato-ampliata, apice conjunctim late rotundata, superne modice convexa, ferruginea, nitida, subtiliter, minus crebre, sub-seriatim punctulata. Corpus subtus ferrugineum, nitidum, crebre, sat profunde punctatum. Pedes ferruginei, nitidi, punctulati; femoribus posticis crassis, sub-compressis.

430. *Odontota costipennis*.

Oblonga, sub-parallelà, parum convexa, flavo-testacea, haud nitida; antennis, geniculis, femoribus anticis macula postica, tibiis apice, tarsis, lateribus pectoris abdomineque

medio, nigris; prothorace subtiliter, crebre punctulato, ante basin transversim impresso, margine apicali maculaque utrinque laterali, nigris; elytris subtiliter, crebre punctato-striatis, apice denticulatis; singulo bi-carinato, basi macula dilute rosca ornato. — Long. $5\frac{1}{2}$, lat. $1\frac{1}{8}$ millim.

Patria: Buenos Ayres.

Caput parvum, sub-rotundatum, modice convexum, dilute flavo-testaceum, sub-opacum, subtiliter, crebre punctulatum, postice transversim infuscatum; ore nigro. Oculi ovati, modice convexi, pallide flavi. Antennæ ad prothoracis basin pertingentes, sat validæ, nigrae, extrorsum sensim nonnihil crassiores, articulis septem basalibus distinctis, quatuor ultimis contiguis, apicali sub-acuminato. Prothorax parvus, longitudine nonnihil latior, apice truncatus, basi utrinque vix sinuatus, lateribus pone apicem leviter rotundato-ampliat, angulis anticis deflexis, obtusis, posticis rectis; superne parum convexus, dilute flavescens, sub-opacus, crebre punctulatus, ante basin transversim impressus, margine apicali maculaque utrinque laterali, ovata, nigris. Scutellum mediocre, nigro-piceum, sub-opacum, vix punctulatum, apice rotundatum. Elytra antice singulatim nonnihil rotundato-producta, prothorace paullo latiora, quam lata plus duplo longiora, ad basin oblique ampliata, dein recta, apice conjunctim rotundata, breviter, acute denticulata, superne parum convexa, sordide flavo-testacea, sub-opaca, crebre, mediocriter punctato-striata, punctis striarum pupillatis, interstitio secundo magis, octavo minus angustius elevato margineque laterali flavescens; præterea prope basin macula indeterminata dilute rosca. Corpus subtus vix punctatum, nitidum. Pectus flavo-testaceum, ad latera nigro-maculatum. Abdomen nigrum, margine laterali segmentorum apicibus testaceo. Pedes dilute flavo-testacei; coxis, trochanteribus, geniculis, femoribus anticis macula postica, tibiis omnibus apice tarsisque nigris.

431. *Hispa pungens*.

Oblongo-parallela, modice convexa, rufo-testacea; prothorace supra plano, crebre, sat profunde punctato, utrinque nigro-maculato, intra basin transversim, leviter impresso, dorso antico spinis duabus trichotomis, lateribus spinis quatuor, basi connatis, posteriore breviori instructo; elytris crebre, profunde punctato-striatis, dorso spinis validis, nigris parce, margine laterali spinis rufo-testaceis, apice infuscatis, crebrius obsitis. — Long. $4\frac{1}{2}$, lat. $2\frac{1}{4}$ millim.

Patria: China (Hongkong).

Statura et summa similitudo *H. echinata*, colore et armatura prothoracis ab illa bene distincta. Caput deflexum, rufo-testaceum, parum nitidum, supra antennis obsolete impressum; vertice laevigato, nitido. Oculi ovati, convexi, nigro-brunnei. Antennæ dimidio corpore fere longiores, rufo-ferrugineae, tenuiter pubescentes, articulo primo magno, crasso, basi tenuiore, mutico, secundo brevi, tertio secundo plus duplo longiore, reliquis oblongis, ad medium sensim incrassatis, dein apicem versus nonnihil tenuioribus, ultimo ovato, sub-acuminato. Prothorax latitudine media nonnihil brevior, basi apiceque truncatus, anterieus angustior, lateribus pone medium modice rotundato-ampliat; superne fere planus, rufo-testaceus, parum nitidus, crebre, sat profunde punctatus, maculis duabus approximatis, longitudinaliter positis, nigris ornatus, ante basin leviter, transversim impressus, in singulo latere spinis quatuor basi connatis, anterioribus porrectis, posterioribus rectis, postica brevi, in dorso antico spinis duabus trichotomis, spinis omnibus apice infuscatis. Scutellum obtuse triangulare, rufo-testaceum. Elytra antice subtruncata, prothorace dimidio latiora et illo duplo et dimidio longiora, humeris rotundatis; lateribus apicem versus parum ampliata, apice conjunctim rotundata, superne modice convexa, inaequalia, rufo-testacea, parum nitida, crebre, profunde punctato-striata, spinis plurimis erectis, validis, in disco nigris, inordinate sparsis, in margine crebrioribus, seriatis, rufo-ferrugineis, apice infuscatis, posticis brevioribus instructa. Corpus subtus rufo-ferrugineum, pectore ad latera parce, abdomine undique crebre punctulata. Pedes dilutius rufo-testacei, nitidi; femoribus modice incrassatis, muticis; tibiis rectis, extus apice oblique truncatis.

432. *Hispa nigrifula*.

Oblongo-parallela, modice convexa, nigra, sub-nitida; antennarum articulo primo unispinoso; prothorace crebre punctato, postice transversim impresso, dorso antico spinis duabus duplicatis, lateribus tribus, quarum duabus anticis basi connatis armato; elytris sat profunde punctato-striatis, spinosis. — Long. 2½, lat. 1¼ millim.

Patria: Java.

Statura et summa similitudo *H. atra*, dimidio minor, structura antennarum ab illa mox distincta. Caput rotundatum, convexum, nigrum, sub-opacum, subtiliter, crebre punctulatum, ante antennis tenuiter carinatum. Oculi ovati, modice convexi, nigro-brunnei. Antennae ultra prothoracis basin parum pertinentes, minus tenues, nigrae, pubescentes, articulo primo magno, ovato, superne spina sat longa, arcuata, porrecta instructo, secundo ovato, tertio nonnihil crassiore, 3—6 oblongis, 7—10 nonnihil crassioribus, brevibus, ultimo ovato, sub-acuminato. Prothorax latitudine nonnihil longior, basi apiceque truncatus, anterior angustior, lateribus medio modice rotundato-ampliatis; superne parum convexus, niger, sub-nitidus, subtiliter, crebre punctulatus, ante basin transversim sat profunde impressus, in singulo latere spinis tribus elongatis, anterioribus porrectis, basi connatis, spina posteriore fere recta, in dorso antico spinis duabus duplicatis, ramis elongatis, sub-rectis, divaricatis. Scutellum nigrum, obtuse rotundatum, sub-laeve. Elytra antice truncata, prothorace dimidio latiora et illo duplo longiora, lateribus recta, apice conjunctim rotundata, superne modice convexa, inequalia, profunde punctato-striata, nigra, spinis plurimis elongatis, sub-arcuatis, tenuibus, concoloribus, duabus suprahumeralibus ad basin approximatis. Corpus subtus nigrum, parum nitidum, punctulatum. Pedes nigri; femoribus modice iucrassatis muticis; tibiis anterioribus arcuatis.

433. *Psyllobora conspurcata*.

Rotundata, convexa, dilute flavescens, nitida, subtiliter, crebre punctulata; prothorace maculis quinque sub-rotundis, brunneis, duabus in medio tribusque ante basin notato; elytris fascia prope basin e maculis duabus magnis formata, maculis tribus laterilibus, plaga medio disci, lineola transversa flava quasi divisa maculisque duabus oblongis prope suturam, brunneis. — Long. 3—3½, lat. 2¼—3 millim.

Patria: California (St. Francisco).

Caput rotundatum, leviter convexum, dilute flavescens, nitidum, subtiliter, crebre punctulatum. Oculi rotundati, modice convexi, nigri. Antennae dilute flavescentes. Prothorax longitudine duplo latior, apice truncatus, basi utrinque leviter sinuatus, lateribus tenuiter reflexo-marginatis, pone apicem ultra medium subito, dein modice rotundato-ampliatis, angulis anticis rotundatis, posticis obtusis; superne modice convexus, dilute flavescens, nitidus, subtiliter, crebre punctulatus, maculis quinque obscure brunneis ornatus, duabus in medio, transversim positis, rotundis tribusque ante basin, media nonnihil minore, lateralibus sub-ovatis. Scutellum parvum, triangulare, nigro-piceum. Elytra antice sub-truncata, pone basin valde rotundato-ampliata, infra medium subito rotundato-angustata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, dilute flavescentia, nitida, evidenter, crebre punctulata, singulo fascia pone basin, sat lata, medio utrinque emarginata, quasi e maculis duabus subrotundis, connexis formata, extus breviter hamata, maculis tribus intramarginalibus, prima mox ante medium, ovata, inferne ramulum brevem in marginem emittente, secunda pone medium, sub-rotunda, tertia ante apicem, subtriangulari, ramulum antice dilatatum antorsum emittente, in medio disci plaga sat magna, linea transversa flavescenti fere divisa et prope suturam maculis duabus oblongis, una fere in medio, majore, altera mox pone illam, minore, brunneis. Corpus subtus rufo-testaceum, nitidum, subtiliter, crebre punctulatum. Pedes dilute flavo-testacei, punctulati, tenuiter pallido-pubescentes.

434. *Psyllobora bi-congregata*.

Rotundata, convexa, dilute flavescens, nitida, subtiliter, crebre punctulata; pectore nigro; prothorace maculis quinque inequalibus, nigro-brunneis, duabus ante medium, sub-

triangularibus, tribus ante basin, media parva notato; elytris maculis tribus pone basin, una prope suturam ante medium, tribus lateralibus, plagaque magna, irregulari, postica, brunneis. — Long. 2½, lat. 1½ millim.

Patria: Montevideo, Buenos Ayres.

Caput rotundatum, leviter convexum, dilute flavescens, nitidum, subtiliter, crebre punctulatum. Oculi rotundati, modice convexi, nigri. Antennæ dilute flavescens. Prothorax longitudine duplo latior, apice sub-truncatus, basi utrinque oblique truncatus, lateribus reflexo-marginatis, pone apicem infra medium subito, dein leviter rotundatis, angulis omnibus obtusis; superne modice convexus, dilute flavescens, nitidus, subtilissime, crebre punctulatus, maculis quinque inaequalibus, nigro-brunneis ornatus, duabus ante medium, oblongo-triangularibus, introrsum obliquis tribusque ante basin, media parva, rotundata, lateralibus majoribus, extus bi-sinuatis. Scutellum parvum, triangulare, nigro-piceum. Elytra antice truncata, pone basin subito rotundato-ampliata, infra medium rotundato-angustata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, dilute flavescens, nitida, subtiliter, crebre punctulata, singulo maculis septem inaequalibus, brunneis notato, nempe: tribus pone basin, inferiore oblonga, obliqua, media majore, rotundata, exteriori minuta, punctiformi, quarta inter basin et medium non procul a sutura, ovata, quinta et sexta in medio prope latera, inferiore majore, oblonga, exteriori parva, in margine locata, septima inter medium et apicem, a margine remota plagaque magna disci postici inaequali. Corpus subtus subtiliter, crebre punctulatum. Pectus medio nigrum, nitidum. Abdomen longitudinaliter, late infuscatum. Pedes flavescens, punctulati, tenuiter pubescentes.

435. *Psyllobora viginti-signata*.

Rotundata, convexa, dilute flavescens, nitida, subtiliter, crebre punctulata, subtus nigra; prothorace maculis quatuor inaequalibus, nigris ornato, una ante medium, ferrum equinum referente tribusque ante basin, media parva, lateralibus oblongis; elytro singulo maculis decem inaequalibus, nigris decorato. 2, 3, 3, 2. — Long. 2½—2¾, lat. 1¾—2 millim.

Var. α: macula antica prothoracis in duas divisa, maculis elytrorum nonnullis confluentibus.

Patria: Insula Taiti.

Caput rotundatum, leviter convexum, dilute flavescens, nitidum, subtiliter, crebre punctulatum. Oculi rotundati, modice convexi, nigri. Antennæ dilute flavescens. Prothorax longitudine duplo latior, apice truncatus, basi utrinque leviter sinuatus, lateribus tenuiter reflexo-marginatis, pone apicem ad medium subito, dein modice rotundato-ampliatis, angulis omnibus rotundatis; superne modice convexus, dilute flavescens, nitidus, subtiliter, crebre punctulatus, maculis quatuor nigris notatus, una ante medium, ferrum equinum referente tribusque ante basin, media parva, rotundata, lateralibus oblongis. Scutellum parvum, triangulare, nigrum, nitidum, sub-læve. Elytra antice truncata, pone basin subito rotundato-ampliata, infra medium valde rotundato-angustata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, dilute flavescens, nitida, subtiliter, crebre punctulata, singulo maculis decem inaequalibus nigris ornato, duabus pone basin, inferiore oblonga, exteriori rotundata, tribus mox ante medium, prima prope suturam, ovata, secunda in medio disci, retrorsum nonnihil magis locata, apice leviter emarginata, tertia non procul a margine, sub-rotundata, tribus pone medium, prima prope suturam, ovata, secunda antrorsum magis locata, tertia non procul a margine, rotundis binisque ante apicem, approximatis, interiori ob-pyriformi, exteriori rotundata. Corpus subtus nigrum, sub-nitidum, subtiliter, crebre punctulatum, segmento ultimo abdominis testaceo. Pedes flavo-testacei, punctulati, tenuiter pubescentes.

436. *Psyllobora interspersa*.

Rotundata, convexa, flavo-testacea, nitida, subtiliter, crebre punctulata, subtus nigra; prothorace immaculato; elytris dilute brunneo-flavoque variegatis, singulo maculis

tribus nigris ornato, prima pone basin prope suturam, secunda et tertia lateralibus, illa ante, hac pone medium. — Long. 2—2½, lat. 1¼—2 millim.

Var. α: elytris vix brunneo-variegatis.

Patria: California.

Caput rotundatum, leviter convexum, dilute flavescens, nitidum, subtiliter, crebre punctulatum. Oculi rotundati, parum convexi, nigri. Antennae dilute flavescentes. Prothorax longitudine duplo latior, apice subtruncatus, utrinque oblique truncatus, lateribus tenuiter reflexo-marginatis, pone apicem ad medium subito, dein basin versus modice rotundato-ampliat, angulis omnibus rotundatis; superne leviter convexus, flavo-testaceus, nitidus, subtiliter, crebre punctulatus, immaculatus. Scutellum parvum, sub-triangulare, nigrum, nitidum, laeve. Elytra antice truncata, pone basin subito rotundato-ampliata, infra medium valde rotundato-angustata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, dilute flavescencia, nitida, subtiliter, crebre punctulata; singulo in disco vitta inaequali, lata, dilute brunnea maculisque tribus sub-aequalibus, rotundis, nigris ornato, prima pone basin prope suturam et pone illam macula oblonga dilute brunnea, secunda et tertia lateralibus, illa ante, hac infra medium. Corpus subtus nigrum, nitidum, subtiliter, crebre punctulatum, segmento ultimo abdominis testaceo. Pedes dilute flavescentes, punctulati, breviter pubescentes.

437. *Hyperaspis annularis*.

Rotundata, modice convexa, nigra, nitida, subtiliter, crebre punctulata; antennis, pedibus margineque apicali et laterali prothoracis flavo-testaceis; elytris singulo margine antico plagaque magna postica flavo-testaceis, hac maculam magnam nigram includente. — Long. 1¼—2, lat. 1¼—1½ millim.

Mas: capite toto flavo-testaceo.

Femina: capite nigro, clypeo flavo-testaceo.

Patria: California (St. Francisco), Insula Oahu (Honolulu).

Caput rotundatum, leviter convexum, subtiliter, crebre punctulatum. Oculi rotundati, modice convexi, nigri. Antennae flavo-testaceae. Prothorax longitudine duplo latior, apice utrinque leviter sinuatus, medio vix rotundatus, basi utrinque sub-sinuatus, lateribus tenuiter reflexo-marginatis, pone apicem leviter rotundato-ampliat, dein sensim dilatatis, angulis anticis deflexis, antrorsum prominulis, obtusis, posticis fere rectis; superne modice convexus, niger, nitidus, subtiliter, crebre punctulatus, margine antico angustius, laterali nonnihil latius flavo-testaceus, flavedine ad basin utrinque continuata. Scutellum sub-triangulare, nigrum, nitidum, laeve. Elytra antice sub-truncata, pone basin fere ad medium subito rotundato-ampliata, dein apicem versus angustata, apice conjunctim rotundata, superne modice convexa, evidentius, crebre punctulata, nigra, nitida, singulo margine laterali plagaque magna postica, ante apicem cum opposita connexa, flavo-testaceis, hac maculam sat magnam, rotundam, nigram includente. Corpus subtus nigrum, nitidum, subtiliter, crebre punctulatum. Abdomen extus flavotestaceo-marginatum. Pedes flavo-testacei, punctulati.

438. *Hyperaspis lemniscata*.

Ovalis, leviter convexa; nigra, nitida, subtilissime, crebre punctulata; antennis pedibusque testaceis, femoribus posterioribus medio infuscatis; prothorace margine apicali et laterali undique, basali utrinque dilute flavescenti; elytris singulo vitta dorsali sat lata, utrinque abbreviata, infra medium angustiore lineaque marginali, medio et ante apicem introrsum sinuato-ampliata, dilute flavis. — Long. 1¼, lat. 1¼ millim.

Mas: capite toto dilute flavo.

Patria: Montevideo.

Caput latum, sub-rotundatum, leviter convexum, subtiliter, crebre punctulatum. Palpi flavo-testacei. Oculi rotundati, modice convexi, nigri. Antennae flavo-testaceae. Prothorax longitudine duplo latior, apice

utrinque leviter sinuatus, medio sub-truncatus, basi utrinque oblique truncatus, lateribus tenuiter reflexo-marginatis, pone apicem leviter rotundatis, dein basin versus oblique ampliatis, angulis anticis deflexis, antrorsum nonnihil prominulis, obtusis, posticis fere rectis; superne leviter convexus, subtilissime, crebre punctulatus, niger, nitidus, margine apicali et laterali toto, basali utrinque antrorsum rotundato-ampliato, dilute flavo. Scutellum triangulare, nigrum, nitidum, sub-leve. Elytra antice truncata, pone basin ad medium modice rotundato-ampliata, infra medium sensim angustata, apice conjunctim obtusa, superne leviter convexa, nigra, subtiliter, crebre punctulata, singulo vitta dorsali sat lata, antice posticeque nonnihil abbreviata, pone medium constricta lineaque marginali usque ad apicem non continuata, medio et ante apicem introrsum ampliata, dilute flavis. Corpus subtus nigrum, subtiliter, crebre punctulatum. Pedes flavo-testacei, punctulati, tenuiter pubescentes; femoribus posterioribus medio infuscatis.

439. *Cryptogonus centrognathus*.

Rotundatus, convexus, niger, nitidus, subtilissime, crebre punctulatus, pube brevi, depressa, grisea dense adpersus; antennis, palpis, tibiis tarsisque flavo-testaceis; prothorace lateribus macula antica introrsum rotundata, lutea; elytris in medio disci macula sat magna, rotunda, lutea. — Long. 2½, lat. 1½ millim.

Mas: capite rufo-testacco, nigro-marginato.

Femina: capite toto nigro.

Patria: Malacca.

Caput breve, antice rotundatum, superne leviter convexum, subtiliter, crebre punctulatum, pube depressa, grisea sat dense obsitum. Palpi flavo-testacei. Oculi rotundati, modice convexi, nigri. Antennæ rufo-testaceæ. Prothorax longitudine duplo latior, apice parum rotundatus, utrinque leviter sinuatus, basi sub-bisinuatus, lateribus ab apice oblique ampliatis, tenuiter reflexo-marginatis, angulis anticis deflexis, parum productis, obtusis, posticis rotundatis; superne modice convexus, niger, sub-nitidus, subtiliter, crebre punctulatus, pube brevi, depressa, grisea sat dense obsitus, lateribus macula sat magna, intus rotundata, basin non attingente lutea. Scutellum triangulare, nigrum, nitidum, obsolete punctulatum. Elytra antice sub-truncata, pone basin subito rotundato-ampliata, infra medium valde rotundato-angustata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, nigra, nitida, subtiliter, crebre punctulata, pube brevi, depressa, grisea dense adpersa, singulo in medio disci macula sat magna, rotunda, lutea ornato. Corpus subtus nigrum, nitidum, evidenter, crebre punctulatum, tenuiter griseo-pubescent. Pedes subtiliter punctulati, parce pubescentes; femoribus nigris, anticis superne, tibiis tarsisque totis flavo-testaceis.

440. *Cryptogonus fulvoterminalis*.

Rotundatus, convexus, niger, nitidus, subtiliter, crebre punctulatus, pube depressa, cinerea dense adpersus; capite, antennis, femoribus apice, tibiis et tarsis totis abdomineque extrorsum flavo-testaceis; prothorace margine apicali et macula laterali elytrisque apice luteis. — Long. 2½, lat. 1½ millim.

Patria: Java.

Caput breve, antice rotundatum, superne leviter convexum, flavo-testaceum, subtiliter, crebre punctulatum, pube cinerea dense adpersum. Palpi flavo-testacei. Oculi rotundati, modice convexi, nigri. Antennæ flavo-testaceæ. Prothorax longitudine duplo latior, apice leviter rotundatus, basi sub-bisinuatus, lobo medio lato, modice producto, apice sub-truncato; lateribus tenuiter reflexo-marginatis, ab apice basin versus oblique ampliatis, angulis anticis vix prominulis, rotundatis, posticis obtusis; superne modice convexus, niger, nitidus, subtiliter, crebre punctulatus, pube brevi, cinerea sat dense adpersus, margine apicali maculaque laterali luteis. Scutellum parvum, vix conspicuum. Elytra antice singulatim leviter sinuata, pone basin modice rotundato-ampliata, a medio apicem versus sensim angustata, apice conjunctim rotundata, superne

convexa, nigra, nitida, subtiliter, crebre punctulata, pube brevi, depressa, cinerea dense obsita, apice toto sat late lutea. Corpus subтус nigrum, nitidum, crebre punctulatum; pectore antice et lateribus abdominis flavo-testaceis. Pedes crebre punctulati, flavo-testacei; femoribus a basi ultra medium nigris.

441. *Seymnus atramentarius*.

Ovalis, convexus, niger, nitidus, subtiliter, crebre punctulatus, pube brevi, depressa, cinerea parcius obsitus; tibiis tarsisque obscure ferrugineis. — Long. 2, lat. 1½ millim.

Patria: California (St. Francisco).

Caput breve, antice rotundatum, leviter convexus, nigrum, nitidum, subtiliter, crebre punctulatum, tenuiter cinereo-pubescent. Oculi rotundati, modice convexi, nigri. Antennae nigrae. Prothorax longitudine duplo fere latior, apice leviter rotundatus, utrinque vix sinuatus, basi utrinque oblique truncatus, lateribus tenuiter reflexo-marginatis, ab apice basin versus leviter rotundato-ampliatis, angulis anticis deflexis, obtusis, posticis sub-rectis; superne modice convexus, niger, nitidus, subtiliter, crebre punctulatus, tenuiter et breviter cinereo-pubescent. Scutellum parvum, nigrum, sub-nitidum. Elytra antice sub-truncata, pone basin modice rotundato-ampliata, infra medium sensim angustata, apice conjunctim rotundata, superne modice convexa, nigra, nitida, subtiliter, crebre punctulata, dorso parcius, ad latera densius cinereo-pubescentia. Corpus subтус nigrum, nitidum, subtiliter, crebre punctulatum. Pedes punctulati, tenuiter pubescentes; femoribus nigris; tibiis tarsisque obscure ferrugineis.

442. *Seymnus vicinus*.

Rotundatus, convexus, niger, nitidus, breviter cinereo-pubescent, subtiliter, crebre punctulatus; antennis pedibusque flavo-testaceis; prothorace basi rotundato, angulis anticis flavo-testaceis. — Long. 2, lat. 1½ millim.

Patria: Brasilia (Rio Janeiro).

Caput breve, antice rotundatum, parum convexus, nigrum, nitidum, subtiliter, crebre punctulatum, tenuiter et breviter cinereo-pubescent. Mandibulae testaceae. Oculi sub-rotundati, leviter convexi, nigri. Antennae flavo-testaceae. Prothorax longitudine duplo latior, apice medio leviter rotundatus, utrinque parum sinuatus, basi leviter rotundatus, lateribus tenuiter marginatis, pone apicem subito rotundatis, dein sensim ampliatis, angulis anticis deflexis, obtusis, posticis rectis; superne modice convexus, niger, nitidus, subtiliter, crebre punctulatus, pube brevi, cinerea adpersus, antice ad angulos sat late flavo-testaceo-marginatus. Scutellum parvum, sub-triangulare, nigrum, sub-nitidum, subtiliter, crebre punctulatum. Elytra antice sub-truncata, pone basin ultra medium sensim leviter rotundato-ampliata, apice conjunctim late rotundata, superne convexa, nigra, nitida, subtiliter, crebre punctulata, dorso parcius, lateribus apiceque densius cinereo-pubescentia. Corpus subтус nigrum, parum nitidum, subtiliter, crebre punctulatum, breviter cinereo-pubescent. Pedes flavo-testacei, nitidi, punctulati, tenuiter pubescentes.

443. *Seymnus californicus*.

Rotundatus, convexus, niger, sub-nitidus, crebre punctulatus, pube brevi, cinerea adpersus; antennis tarsisque testaceis; prothorace basi utrinque oblique truncato; elytris evidentius punctulatis. — Long. 2½, lat. 1¼ millim.

Mas: capite toto prothoraceque flavo-testaceis, hoc macula basali, breviter triangulari, nigra.

Femina: capite nigro, clypeo flavo-testaceo, prothorace nigro, apice anguste, lateribus latius testaceo-marginato.

Patria: California (St. Francisco).

Caput breve, antice rotundatum, superne parum convexum, subtiliter, crebre punctulatum, pube tenui, cinerea adpersum. Oculi sub-rotundati, parum convexi, nigri. Antennae flavo-testaceae. Prothorax longitudine duplo latior, apice sub-truncatus, utrinque leviter emarginatus, basi utrinque oblique truncatus, lateribus tenuiter marginatis, pone apicem subito, medio leviter rotundatis, angulis anticis deflexis, obtusis, posticis fere rectis; superne modice convexus, subtiliter, crebre punctulatus, pube tenui, cinerea adpersus. Scutellum parvum, sub-triangulare, nigrum, punctulatum, puberulum. Elytra antice vix emarginata, pone basin leviter rotundato-ampliata, infra medium citius rotundato-angustata, apice conjunctim obtusa, superne convexa, nigra, nitida, crebre, quam prothorace evidentius punctulata, pube brevi, cinerea undique, dorso tamen parcius adpersa. Corpus subtus nigrum, sub-nitidum, creberrime punctulatum, cinereo-pubescentia. Pedes nigri, punctulati, pube brevi, cinerea vestiti; tarsi testacei.

444. *Seymnus binotulatus*.

Breviter ovalis, convexus, niger, nitidus, subtiliter, crebre punctulatus, pube brevi, cinerea adpersus; capite pedibusque testaceis, femoribus medio leviter infuscat; prothorace lateribus confuse testaceo-marginato; elytris singulo in disco macula oblonga, transversa, intus retrorsum obliqua, rufo-testacea. — Long. $1\frac{1}{2}$, lat. 1 millim.

Patria: Manilla.

Caput breve, antice rotundatum, superne parum convexum, testaceum, sub-nitidum, subtiliter, crebre punctulatum, tenuiter cinereo-pubescentia. Oculi sub-rotundati, parum convexi, nigri. Antennae testaceae. Prothorax longitudine duplo latior, apice truncatus, utrinque leviter sinuatus, basi utrinque oblique truncatus, lateribus tenuiter marginatis, pone apicem subito, dein modice rotundato-ampliat, angulis anticis deflexis, obtusis, posticis fere rectis; superne modice convexus, niger, nitidus, subtiliter, sat crebre punctulatus, pube brevi cinerea, dorso parce, ad latera densius adpersus, his confuse, sat late testaceo-marginatis. Scutellum parvum, sub-triangulare, nigrum, crebre punctulatum, parce puberulum. Elytra antice sub-truncata, pone basin ad medium modice rotundato-ampliata, dein sensim angustata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, nigra, nitida, subtiliter, crebre punctulata, dorso parce, lateribus apiceque densius cinereo-pubescentia; singulo mox ante medium macula sat magna, oblonga, transversa, intus retrorsum obliqua, rufo-testacea notata. Corpus subtus nigrum, sub-nitidum, creberrime punctulatum, vix pubescens. Pedes testacei, punctulati; femoribus anterioribus medio leviter, posticis evidentius infuscat.

445. *Seymnus infuscatus*.

Breviter ovalis, convexus, rufo-testaceus, crebre punctulatus, pube brevi, cinerea adpersus; corpore subtus nigro; prothorace apice transversim infuscato; elytris evidenter punctulatis, sutura antice anguste, medio latius infuscata. — Long. $2\frac{1}{2}$, lat. $1\frac{1}{2}$ millim.

Patria: California (St. Francisco).

Caput breve, antice rotundatum, superne parum convexum, rufo-testaceum, sub-nitidum, subtiliter, crebre punctulatum, pube tenui, cinerea adpersum. Palpi rufo-testacei. Oculi sub-rotundati, parum convexi, nigri. Antennae rufo-testaceae. Prothorax longitudine duplo latior, apice medio haud rotundatus, utrinque parum sinuatus, basi leviter bi-sinuatus, lateribus tenuiter marginatis, pone apicem modice rotundato-ampliat, dein sensim oblique dilatatis, angulis anticis deflexis, obtusis, posticis fere rectis; superne modice convexus, rufo-testaceus, nitidus, subtiliter, crebre punctulatus, pube brevi, cinerea parce adpersus, margine apicali infuscatus. Scutellum sub-triangulare, nigro-fuscum, punctulatum, puberulum. Elytra antice truncata, pone basin leviter rotundato-ampliata, infra medium subito rotundato-angustata, apice conjunctim obtusa, superne convexa, rufo-testacea, nitida, crebre, evidentius punctulata, parce cinereo-pubescentia, sutura antice angustius, medio latius indeterminate infuscata, fuscatione ante apicem desinente. Corpus subtus nigrum, sub-nitidum, creberrime punctulatum, vix pubescens. Pedes rufo-testacei, punctulati; femoribus posticis basi leviter infuscat.

446. *Seymnus Kinbergi*.

Breviter ovalis, convexus, niger, nitidus, subtiliter, crebre punctulatus, pube brevi, cinerea adpersus; capite, pedibus margineque prothoracis apicali angustius, laterali latius rufo-testaceis; elytris rufo-testaceis, dorso plaga magna, communi, sub-triangulari, ultra medium extensa, nigra. — Long. 2, lat. 1½ millim.

Patria: Insula Oahu (Honolulu).

Caput breve, antice rotundatum, parum convexum, rufo-testaceum, sub-nitidum, subtiliter, crebre punctulatum, pube brevi cinerea adpersum. Oculi sub-rotundati, modice convexi, glauci. Antennae rufo-testaceae. Prothorax longitudine duplo latior, apice sub-truncatus, utrinque vix sinuatus, basi leviter bi-sinuatus, lateribus tenuiter marginatis, pone apicem leviter rotundatis, dein sensim oblique ampliatis, angulis anticis deflexis, obtusis, posticis rectis; superne modice convexus, niger, nitidus, subtiliter, crebre punctulatus, pube brevi, cinerea adpersus, margine apicali angustius, laterali latius confuse rufo-testaceus. Scutellum sub-triangulare, nigrum, crebre punctulatum. Elytra antice singulatim introrsum oblique truncata, pone basin modice rotundato-ampliata, infra medium sensim angustata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, rufo-testacea, nitida, subtiliter, crebre punctulata, pube brevi, cinerea adpersa, a basi ultra medium plaga magna, communi, sub-triangulari, nigra notata. Corpus subtns nigrum, sub-nitidum, creberrime punctulatum, vix pubescens. Pedes rufo-testacei, punctulati; femoribus posticis ultra medium infuscati.

447. *Seymnus tenebricosus*.

Breviter ovalis, niger, nitidus, subtiliter, crebre punctulatus, pube brevi, cinerea adpersus; antennis, palpis, tibiis anticis tarsisque omnibus testaceis. — Long. 1½, lat. 1½ millim.

Patria: Nova Hollandia (Sidney).

Caput breve, antice rotundatum, superne parum convexum, nigrum, sub-nitidum, subtiliter, crebre punctulatum, tenuiter cinereo-pubescens. Palpi testacei. Oculi sub-rotundati, modice convexi, nigri. Antennae testaceae. Prothorax longitudine duplo latior, apice vix rotundatus, utrinque parum sinuatus, basi utrinque oblique truncatus, lateribus tenuiter marginatis, angulis anticis deflexis, obtusis, posticis sub-rectis; superne modice convexus, niger, nitidus, subtiliter, crebre punctulatus, pube brevi, cinerea, dorso parcius, lateribus densius adpersus. Scutellum parvum, triangulare, nigrum, punctulatum, puberulum. Elytra antice singulatim introrsum oblique truncata, pone basin modice rotundato-ampliata, infra medium nonnihil angustata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, nigra, nitida, subtiliter, crebre punctulata, pube brevi, cinerea, dorso parcius, lateribus apiceque densius adpersa. Corpus subtns nigrum, sub-nitidum, crebre punctulatum, vix pubescens. Pedes nigri, punctulati; tibiis anticis tarsisque omnibus testaceis.

448. *Seymnus fuscatus*.

Ovalis, convexus, nigro-fuscus, nitidus, subtiliter, crebre punctulatus, pube erecta, grisea sat dense obsitus; capite, antennis pedibusque rufo-testaceis; prothorace margine apicali et laterali confuse ferrugineo; elytris apice ipso dilutioribus. — Long. 2½, lat. 1½ millim.

Patria: Manilla, Java.

Caput breve, antice rotundatum, superne parum convexum, rufo-testaceum, sub-nitidum, subtiliter, crebre punctulatum, tenuiter griseo-pubescens. Palpi rufo-testacei. Oculi rotundati, modice convexi, nigri. Antennae rufo-testaceae. Prothorax longitudine duplo latior, apice sub-truncatus, basi leviter bi-sinuatus, lateribus tenuiter marginatis, ab apice ad basin sensim oblique ampliatis, angulis anticis deflexis, posticis rectis, superne modice convexus, nigro-fuscus, nitidus, subtiliter, crebre punctulatus, pube erecta, grisea sat dense adpersus, margine apicali et laterali confuse ferrugineo. Scutellum triangulare, nigro-fuscum, crebre

punctulatum, puberulum. Elytra antice sub-truncata, pone basin leviter rotundato-ampliata, infra medium sensim angustata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, nigro-fusca, apice dilutiora, ferruginea, undique subtiliter, crebre punctulata, pube erecta, grisea sat dense vestita. Corpus subtus fuscum, sub-nitidum, subtiliter, crebre punctulatum, vix pubescens. Pedes rufo-testacei, punctulati, breviter pubescentes.

449. *Seymnus quadrinotatus*.

Rotundatus, convexus, niger, nitidus, subtiliter, crebre punctulatus, pube brevi, cinerea adpersus; capite, antennis, pedibus margineque laterali prothoracis rufo-testaceis; elytro singulo maculis duabus rufo-testaceis ornato, una mox ante medium, majore, ovata, obliqua, altera inter medium et apicem, minore, rotunda. — Long. $1\frac{1}{2}$, lat. 1 millim.

Patria: Malacca.

Caput breve, antice rotundatum, rufo-testaceum, sub-nitidum, subtiliter, crebre punctulatum, tenuiter pubescens. Palpi rufo-testacci. Oculi sub-rotundati, modice convexi, glauci. Antennae rufo-testaceae. Prothorax longitudine duplo latior, apice sub-truncatus, utrinque leviter sinuatus, basi parum profunde bi-sinuatus, lateribus tenuiter marginatis, ab apice basin versus oblique ampliatis, angulis anticis deflexis, posticis rectis; superne modice convexus, niger, nitidus, subtiliter, crebre punctulatus, pube brevi, cinerea adpersus, margine laterali sat late rufo-testaceo. Scutellum parvum, sub-triangulare, nigrum, punctulatum, puberulum. Elytra antice sub-truncata, pone basin modice rotundato-ampliata, infra medium sensim angustata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, nigra, nitida, subtiliter, crebre punctulata, pube brevi, cinerea adpersa, singulo maculis duabus rufo-testaceis, in disco locatis, una ante medium, ovata, sat magna, intus retrorsum obliqua, altera inter medium et apicem, minore, rotundata ornato. Corpus subtus nigrum, sub-nitidum, subtiliter, crebre punctulatum, vix pubescens. Pedes flavo-testacei, nitidi, punctulati; femoribus posticis basi leviter infuscati.

450. *Seymnus insularis*.

Rotundatus, convexus, niger, nitidus, subtiliter, crebre punctulatus, pube brevi, cinerea adpersus; capite, antennis pedibusque flavo-testaceis; prothorace flavo-testaceo, basi plaga sat magna, antice rotundata, nigra; elytro singulo fasciis duabus, una ante medium postice profunde excisa, altera prope apicem, medio utrinque sinuata margineque apicali, flavo-testaceis. — Long. $1\frac{1}{2}$, lat. $1\frac{1}{4}$ millim.

Patria: Insula Taiti.

Caput latum, antice rotundatum, superne parum convexum, flavo-testaceum, sub-nitidum, subtiliter, crebre punctulatum, tenuiter cinereo-pubescent. Oculi rotundati, modice convexi, nigri. Antennae flavo-testaceae. Prothorax longitudine duplo latior, apice medio sub-truncatus, utrinque leviter emarginatus, basi sub-bisinuatus, lateribus tenuiter marginatis, pone apicem modice rotundato, dein sensim oblique ampliatis, angulis anticis deflexis, posticis rectis; superne modice convexus, flavo-testaceus, nitidus, subtiliter, crebre punctulatus, pube brevi, cinerea adpersus, basi plaga sat magna, antice rotundata, nigra notata. Scutellum sub-triangulare, nigrum, punctulatum, puberulum. Elytra antice sub-truncata, pone basin modice rotundato-ampliata, infra medium sensim angustata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, nigra, nitida, pube brevi, cinerea adpersa, singulo fasciis duabus, una ante medium, utrinque retrorsum arcuata, postice medio profunde excisa, altera prope apicem, cum opposita connexa, medio utrinque sinuata margineque laterali inflexo et apicali flavo-testaceis. Corpus subtus nigrum, subtiliter, crebre punctulatum, tenuiter pubescens. Pedes flavo-testacei, punctulati, parce pubescentes.

451. *Seymnus vittipennis*.

Breviter ovalis, convexus, flavo-testaceus, nitidus, subtiliter, crebre punctulatus, pube brevi grisea adpersus; pectore abdomineque basi nigro-fuscis, prothorace medio late

nigro; elytris vittis tribus latis, ultra medium continuatis, una suturali, communi binisque marginalibus, nigris. — Long. 2, lat. $1\frac{1}{2}$ millim.

Patria: Malacca.

Caput breve, antice rotundatum, superne parum convexum, flavo-testaceum, sub-nitidum, subtiliter, crebre punctulatum, tenuiter pubescens. Oculi sub-rotundati, modice convexi, nigri. Antennae flavo-testaceae, Prothorax longitudine duplo latior, apice medio truncatus, utrinque leviter sinuatus, basi utrinque introrsum oblique truncatus, lateribus tenuiter marginatis, pone apicem modice rotundato-, dein oblique ampliatis, angulis anticis deflexis, posticis rectis; superne modice convexus, subtiliter, crebre punctulatus, tenuiter pubescens, dorso a basi fere ad apicem late nigro. Scutellum sub-triangulari, nigrum, punctulatum, puberulum. Elytra antice sub-truncata, pone basin leviter rotundato-ampliata, infra medium sensim angustata, apice conjunctim rotundata, superne modice convexa, rufo-testacea, nitida, subtiliter, crebre punctulata, pube grisea adspersa, vittis tribus latis, ultra medium continuatis, una suturali, communi, postice nonnihil angustata et una utrinque marginali, medio introrsum nonnihil ampliata. Corpus subtus subtiliter, crebre punctulatum. Pectus nigro-fuscum, anguste ferrugineo-marginatum. Abdomen basi medio infuscatum. Pedes flavo-testacei, punctulati, tenuiter pubescentes.

452. *Seymus innocens*.

Ovalis, convexus, niger, nitidus, subtiliter, crebre punctulatus, parce cinereo-pubescentis; capite, antennis, pedibus margineque apicali prothoracis anguste, laterali late rufo-ferrugineis; elytris apice ipso obscure rufescentibus. — Long. $1\frac{3}{4}$, lat. $1\frac{1}{4}$ millim.

Patria: Insulae Keeling.

Caput breve, antice rotundatum, superne parum convexum, rufo-ferrugineum, sub-nitidum, subtiliter, crebre punctulatum, tenuiter pubescens. Oculi sub-rotundati, modice convexi, nigri. Antennae rufo-testaceae. Prothorax longitudine duplo latior, apice sub-truncatus, utrinque leviter sinuatus, basi utrinque introrsum sub-truncatus, lateribus tenuiter marginatis, pone apicem modice rotundato-, dein oblique ampliatis, angulis anticis deflexis, posticis fere rectis; superne modice convexus, subtiliter, crebre punctulatus, parce pubescens, medio late longitudinaliter niger, margine apicali anguste, laterali late rufo-testaceo. Scutellum sub-triangulari, nigrum, punctulatum, puberulum. Elytra antice sub-truncata, pone basin leviter rotundato-ampliata, infra medium sensim angustata, apice conjunctim rotundata, superne modice convexa, subtiliter, crebre punctulata, nigra, nitida, pube brevi, cinerea parce adspersa, apice ipso rufo-ferrugineo. Corpus subtus nigrum, nitidum, subtiliter, crebre punctulatum. Pedes rufo-testacei, punctulati.

FAM. EROTYLIDAE.

453. *Eucanthes gigantea*.

Oblonga, convexa, atra, nitida; vertice immaculato; prothorace subtiliter, parce punctulato, arcubus duobus diffornibus flavis ornato; elytris subtilissime, hinc inde sub-seriatim punctatis, flavis, sutura, margine tenui, fasciis tribus latis maculisque duabus rotundatis bascos nigris; tibiis anticis intus apice magis ampliatis. — Long. 2.4, lat. 1.2 millim.

Patria: Malacca.

Summa similitudo *E. verticali*, illo vix longior, sed latior, vertice immaculato, fasciis elytrorum nigris latioribus, minus acute dentatis, tibiis anticis intus apice magis ampliatis. Caput magnum, ovatum, nigrum, nitidum, subtiliter, parce punctulatum; vertice tenuiter, longitudinaliter canaliculato, medio sublævigato; antice sat late, quadrangulariter impressum, transversim tenuiter canaliculatum. Oculi ovati, modice convexi, nigri, antice leviter emarginati. Antennae nigrae, nitidae, clava fusco-pubescente. Prothorax longitudine nonnihil latior, apice leviter emarginatus, basi utrinque sinuatus, lateribus reflexo-marginatis, fere rectis vel posteriori perparum angustatis, angulis anticis rotundatis, posticis obtusis; superne parum convexus, niger, nitidus, subtilissime, parce punctulatus, dorso obsolete, longitudinaliter carinatus, arcubus duobus luteis, antice posticeque dentatis, ante basin abbreviatis ornatus. Scutellum nigrum, subtilissime pun-

etulatum. Elytra prothorace nonnihil latiora et illo fere triplo longiora, humeris parum elevatis obtusis; lateribus recta, longe infra medium sensim nonnihil angustata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, subtiliter, parce, hinc inde sub-seriatim punctulata, flava, nitida, sutura, margine laterali fasciisque tribus latis, communibus, modice dentatis, margini conjunctis, nigris, prima ante, secunda pone medium tertiaque apicali; praeterea prope basin maculis duabus parvis, rotundis, nigris, una in medio, altera in callo supra-humerali. Corpus subtus nigrum, nitidum, subtiliter, parce punctulatum. Pedes nigri, nitidi, parce punctulati; femoribus modice clavatis; tibiis anticis in mare intus basi levibus, apicem versus breviter multidentatis, apice magis ampliatis.

454. *Donbleidaia convexicollis*.

Elongata, nigra, nitida; capite, antennarum basi prothoraceque valde convexo, obscure sanguineis, illo sub-lavi, hoc dorso minus crebre punctulato, basi transversim impresso, utrinque canalicula brevi, longitudinali notato; elytris violaceis, mediocriter, postice subtilius punctato-striatis, apicem versus attenuatis. — Long. 13, lat. 3 millim.

Patria: Manilla.

Caput rotundatum, modice convexum, obscure sanguineum, nitidum, laeve, infra oculos oblique carinatum, antice transversim canaliculatum. Palpi ferruginei. Oculi rotundati, modice convexi, nigri. Antennae vix longitudine capitis cum prothorace, rufo-ferrugineae, clava quadri-articulata, nigra. Prothorax latitudine nonnihil longior, apice truncatus, basi tenuiter carinatus, utrinque leviter sinuatus, lateribus anguste reflexo-marginatis, medio modice rotundato-ampliatis, angulis posticis retrorsum vix prominulis, fere rectis; superne valde convexus, obscure sanguineus, nitidus, dorso parce, subtiliter punctulatus, ante basin transversim impressus, impressione utrinque in canalicula brevi, longitudinali terminata. Scutellum subtriangulare, nigrum, nitidum, laeve. Elytra antice singulatim leviter rotundato-producta, reflexa, prothorace non latiora at illo triplo longiora, humeris rotundatis; lateribus sensim attenuata, apice singulatim oblique subtruncata, superne parum convexa, violacea, nitida, mediocriter, postice subtilius punctato-striata. Corpus subtus nigrum, nitidum, subtiliter, minus crebre punctulatum. Pedes nigri, nitidi; coxis anticis ferrugineis; tarsis anterioribus valde, posticis modice dilatatis.

455. *Languria intermedia*.

Elongata, parum convexa, sanguinea, nitida; antennis extrorsum, femoribus apice, tibiis tarsisque nigris; capite parce, evidenter punctulato, postice transversim infusato; prothorace dorso parce punctulato, antice plaga magna, nigra decorato, ante basin transversim impresso, utrinque breviter canaliculato; elytris violaceis, sat crebre, mediocriter punctato-striatis. — Long. 5½, lat. 1½ millim.

Patria: Malacca.

E minoribus. Caput rotundatum, modice convexum, sanguineum, nitidum, parce, evidenter punctulatum, postice sat late, transversim canaliculatum, inter antennas obsoleto, transversim canaliculatum. Mandibulae apice infuscae. Palpi rufo-ferruginei. Oculi rotundati, convexi, nigri. Antennae nigrae, articulis tribus basalibus rufo-testaceis, clava sat magna quinque-articulata. Prothorax latitudine parum longior, apice truncatus, basi utrinque leviter sinuatus, lateribus tenuiter reflexo-marginatis, pone apicem leviter rotundatis, basin versus angustatis, angulis posticis retrorsum nonnihil productis, vix acuminatis; superne convexus, sanguineus, nitidus, dorso parce punctulatus, antice plaga sat magna, postice rotundata, nigro-fusca decoratus, intra basin transversim impressus, impressione utrinque canalicula brevi, longitudinali terminata. Scutellum triangulare, nigro-piceum, nitidum, laeve. Elytra antice vix rotundato-producta, prothorace paullo latiora et illo fere triplo longiora, humeris parum elevatis, rotundatis, lateribus apicem versus sensim perparum angustata, apice sub-truncata, superne leviter convexa, violacea, nitida, mediocriter punctato-striata. Corpus subtus sanguineum, nitidum, parce punctulatum. Pedes nigri; femoribus a basi non usque ad medium sanguineis.

INDEX ALPHABETICUS.

Nomina generum litteris majoribus.
 » specierum litteris minoribus.
 » synonyma litteris obliquis impressa sunt.

ACANTHINOMERUS		cæsiusignatus p. 104.		BLOSRYRUS	
<i>armatus</i> p. 142.		<i>nitidus</i> 105.		<i>chinensis</i> p. 120.	
ACANTHIOBRACHIUM		<i>taiticensis</i> 105.		BOSTRICHUS	
<i>crassipes</i> 129.		<i>troglodytes</i> 105.		<i>ferrugineus</i> 88.	
ACIS		ANTHONOMUS		BRACHINUS	
<i>vestita</i> 164.		<i>gracilipes</i> 132.		<i>bicolor</i> 3.	
ADIMONIA		<i>inermis</i> 132.		<i>Confucius</i> 3.	
<i>illota</i> 176.		<i>rubricosus</i> 131.		BRACHYPTERUS	
ADORETUS		<i>sparsus</i> 131.		<i>testaceus</i> 39.	
<i>vestitus</i> 56.		<i>vestitus</i> 130.		BRUCHUS	
ADORIUM		APHODIUS		<i>atomarius</i> 115.	
<i>philippinense</i> 175.		<i>ambigus</i> 51.		<i>californicus</i> 114.	
AGRILUS		<i>australasie</i> 50.		<i>funebis</i> 114.	
<i>micronatus</i> 63.		APHITONA		<i>luculentus</i> 113.	
<i>paradoxus</i> 64.		<i>illota</i> 198.		<i>obtusus</i> 113.	
<i>tenellus</i> 64.		APOGONTA		<i>pulicarius</i> 115.	
AGRIOTES		<i>splendida</i> 55.		<i>ramicornis</i> 112.	
<i>bonariensis</i> 71.		AREOCERUS		CALIODES	
ALCIDES		<i>subnotatus</i> 116.		<i>albovarius</i> 112.	
<i>adpersus</i> 134.		ARGOPUS		CAPORIS	
ALLECULA		<i>hybridus</i> 201.		<i>maculicollis</i> 186.	
<i>angusticollis</i> 100.		<i>maculiceps</i> 200.		CALLEIDA	
<i>laticollis</i> 100.		<i>rubricosus</i> 201.		<i>amœnula</i> 4.	
<i>puncticollis</i> 99.		ASPIDOSOMA		<i>geniculata</i> 4.	
<i>rubripes</i> 99.		<i>lateralis</i> 75.		<i>insularis</i> 4.	
AMARYGMUS		AULACOTHORAX		CALOPTERON	
<i>subhemisphaericus</i> 99.		<i>exilis</i> 35.		<i>lateritium</i> 74.	
AMMOPHORUS		BARIDIUS		CANTHON	
<i>denticollis</i> 89.		<i>adpersus</i> 135.		<i>balicatus</i> 41.	
<i>insularis</i> 89.		<i>californicus</i> 137.		<i>opacus</i> 50.	
ANÆDUS		<i>linearis</i> 135.		CARANISTES	
<i>corvinus</i> 97.		<i>oblongus</i> 136.		<i>variegatus</i> 116.	
ANCHOMENUS		<i>picipennis</i> 137.		CARDIOPHORUS	
<i>chinensis</i> 15.		<i>versicolor</i> 136.		<i>inumeratus</i> 70.	
<i>limbatus</i> 15.		BELUS		<i>insularis</i> 70.	
<i>scintillans</i> 16.		<i>cyanipennis</i> 118.		CASTIARINA	
ANOBIUM		<i>gracilis</i> 118.		<i>Hopci</i> 61.	
<i>pubicum</i> 86.		BEMBIDIUM		<i>Laportei</i> 61.	
ANTHICUS		<i>bonariense</i> 18.		<i>simulata</i> 62.	
<i>amplicollis</i> 106.		<i>callipygum</i> 17.		CELEUTHES	
<i>atomarius</i> 106.		BEROSUS		<i>deplanatus</i> 126.	
		<i>auriceps</i> 23.		<i>impurus</i> 127.	
		<i>sticticus</i> 24.		<i>subfasciatus</i> 126.	
		<i>variegatus</i> 23.			

PALAGRIA		HYPOLITHUS		MEZIUM	
vestita	p. 25.	Magus	p. 11	cristatum	p. 86
		pubipennis	12		
FERONIA		HYPSONOTUS		MONACHUS	
insularis	14.	languidus	123.	biplagiatus	156.
trivialis	14.			contractus	157.
FORMICOMUS		IPTHINUS		modestus	157.
armatus	103.	eupripennis	96.	nigritulus	158.
mandarinus	104.			picipes	158.
GALLERUCA		LACCOPHILUS		viridiceneus	158.
australis	176.	chinensis	21.	MONOCREPIIUS	
australis	176.	decoratus	20.	Germari	67.
nigropicta	177.	notatus	20.	suturalis	67.
philippinensis	177.				
GENIATES		LANGURIA		MONOLEPTA	
australasic	57.	intermedia	212.	concolor	182.
GLYCYPHANA		LATHROBIUM		elegantula	183.
nasalis	58.	chiuense	32.	pectoralis	183.
GRAPTODERA		LEBIA		rubrosignata	183.
columbina	188.	angulata	7.	MORDELLA	
flavipes	188.	bioculata	5.	albosignata	108.
verticalis	187.	chiuensis	6.	castanea	108.
HAPLONYX		copripennis	7.	exigua	109.
Schönherri	134.	insularis	6.	insularis	108.
HARPALUS		parellina	8.	ruficeps	109.
ignobilis	10.	pretiosa	5.		
HELEOGASTER		LEMA		MYLOCERUS	
brachypterus	82.	quadrivittata	153.	brevicollis	124.
cyanopterus	82.	LEMODES		MYCURUS	
impressifrons	83.	coccinea	103.	denticollis	161.
HETEROCREPIDIUS		LEPTOTRACHELUS		NACERDES	
puberulus	66.	brevicollis	2.	chinensis	111.
HETEROMASTIX		LEUCOTHYREUS		nigromotata	110.
bicolor	81.	insularis	56.	tenella	111.
HETEROPHAGA		LISSOMUS		NANOPHYES	
lateralis	94.	plagiatus	66.	nigriceps	147.
pullula	94.			nigritulus	147.
HISPA		LIXUS		Pusio	147.
nigritula	203.	immundus	128.	NAUPACTUS	
pungens	202.	LOXOPLEURA		propinquus	121.
HOMALOPYGUS		impressicollis	160.	NODA	
latipes	37.	rufescens	161.	euprescens	165.
HOPLIA		LUPERUS		oblonga	165.
vestita	53.	insularis	182.	proxima	164.
HYDATICUS		thoracicus	181.	pumila	166.
confusus	21.	vitipennis	181.	vagabunda	166.
HYDROCANTHUS		MEGASCELIS		NOTIODES	
rubripes	19.	subtilis	152.	nanus	130.
testaceus	19.	MEGISTOPS		NOTOXUS	
HYDROPORUS		lugubrinus	187.	indicus	81.
femoralis	19.	quadrinotatus	187.	ODONTOTA	
Gigas	18.	MELANIA		costipennis	201.
HYPERASPIS		carbonaria	94.	OEDIONYCHIS	
annularis	205.	cyaniipennis	59.	insignita	185.
lemniscata	205.	MELYRIS		laticula	184.
		subtilis	83.	lepida	185.
				nigrovittata	184.
				verecunda	185.
				OLIBRUS	
				bisignatus	38.
				parvulus	38.
				piceus	38.

OMOIDES		PHALACRUS		PTINUS	
humeralis	p. 133.	rufoeorus	p. 37.	binodulus	p. 86.
ONTIOPHAGUS		PHALERIA		insularis	p. 85.
convexicollis	46.	bisignata	93.	QUEDIUS	
dichrous	43.	inauicata	92.	pectoralis	31.
granulatus	48.	pusilla	93.	RHAPHIDOPALPA	
immundus	49.	PHANÆUS		serena	178.
insularis	47.	Achilles	42.	RHINOMACER	
lucidicollis	45.	PHILOTHIUS		pallipes	112.
luridipennis	45.	aeuipennis	30.	RHIPIPHORUS	
muticus	48.	delicatulus	29.	maenicolis	107.
pugionatus	44.	ulgrinus	30.	RHOPALOBRACHIUM	
rusticus	46.	puncticollis	31.	clavipes	110.
trinodosus	44.	quadriceps	28.	RHYNCHITES	
verticalis	44.	tenebrosus	28.	humeralis	117.
ODEMAS		varicolor	29.	RHYNCOLUS	
senescens	138.	PHOTINUS		gracilis	150.
OPHIONEÆ		pauperculus	75.	longulus	149.
Chandroi.	2.	PHOTURIS		RHYNCHUCHUS	
OPILUS		annulicoruis	76.	acuminatus	125.
impurus	84.	impura	76.	RHYZOPHAGUS	
ORCHESTES		innocua	77.	puncticollis	39.
puberulus	133.	patagonica	77.	SAPERDA	
OTIORHYNCHUS		trivialis	77.	versicolor	152.
setulosus	127.	PHYLOTOCUS		SCIRTES	
OXYPODA		margineicollis	54.	adustus	72.
cingulata	25.	oblongus	53.	SCOTOCHARES	
patagonica	25.	velutinus	54.	insularis	95.
OXYTELUS		PHYLOTRETA		SCYMNUS	
Pumilio	34.	cyarella	197.	alrauentarius	207.
PACHYBRACHYS		decora	196.	lipotulatus	208.
flavovarius	159.	elongatula	197.	californicus	207.
insularis	160.	PLATYMETOPUS		fuscatus	209.
nigronotatus	159.	melanarius	10.	infuscatus	208.
PACHYRHYNCHUS		PLETROSCELIS		innocuus	211.
australasie	119.	armipes	199.	insularis	210.
PÆDERUS		convexicollis	199.	Kinbergi	209.
cæruleipennis	33.	lucidula	200.	quadrinotatus	210.
intermedius	32.	PODALGUS		tenebriococcus	209.
PANTOPLANES		rubripes	57.	viciuus	207.
viridis-quantosus	121.	POPILIA		vittipennis	210.
PAROPSIS		carulea	55.	SELENOPHORUS	
bipagiata	173.	PROMECOPS		insularis	10.
M-fuscum	174.	pulchellus	122.	piciuus	11.
pietipennis	173.	PSAMMODIUS		SERICOSOMUS	
rubrosignata	172.	impressicollis	51.	rimosus	72.
sublineata	174.	PSYLLIODES		seriunctus	71.
vittipennis	172.	gracilis	198.	SILPHA	
PASSALUS		PSYLOBORA		capensis	36.
impressicollis	40.	bicongregata	203.	capensis	36.
PERITELUS		conspicua	203.	SPHENOPHORUS	
sellatus	125.	interspersa	204.	insularis	148.
PERPERUS		viginti-signata	204.	interstitialis	148.
marginialis	124.	PTILODACTYLA		STATYRA	
PHLEDON		ferruginea	73.	castanea	102.

STENOLOPHUS		pusillus p. 80.		Trox	
biplagiatus p. 12.	13.	ridibundus 79.	80.	chinensis p. 32	
cinctipennis 13.		rubricollis 80.			
STENUS		TEMNOGNATHA		Tychius	
Capucinus 34.	33.	egregia 60.		minutissimus 133	
chalybeus 33.		TESSAROMMA			
cylindricollis 34.		lugubris 91.		92.	
STRABALA		morio 92.			
languida 189.	190.	TETRAGONODERUS		TYPOPHORUS	
nigriceps 190.		inmaculatus 8.	australis 162.		
SUNIUS		THYLACITES		biplagiatus 163.	163.
tresignatus 32.		TRACHYS		nigronotatus 163.	
SYSTEMA		puberulus 120.	ruiceps 162.		
connexa 191.		curtula 65.	XANTHOLINUS		
exclamationis 192.		imptessa 65.	capensis 27.	27.	
pallidula 192.		TRECHUS			gracilis 27.
TACHYPORUS		fasciatus 17.	subtilis 27.		
evanescens 26.		levigatus 17.	taiiensis 26.		
TEINODACTYLA		Xyletinus			
insularis 198.		TROPIDERES		puberulus 88.	
TELEPHORUS		tessellatus 115.	XYLOPHILUS		
bilineatus 78.	80.	TROPISTERNUS		fasciatus 107.	107.
granulipennis 78.		levigatus 22.	XYLOTRETUS		
laticollis 79		nigrinus 22.	flavicornis 85.	85.	
peregrinus 80.		Tropideres			ZOPHOBAS
		tessellatus 115.	lugubris 97.	97.	
		Tropisternus			
		levigatus 22.	ZYGOGRAMMA		
		nigrinus 22.	Kinbergi 174.	174.	

