

2642

V

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 29:

M. Bernhauer et K. Schubert

Staphylinidae II.

Einzel-Preis: Mark 9.75

Subscriptions-Preis: Mark 8.50

W. Junk

Berlin W. 15, Kurfuerstendamm 201.

10. IV. 1911.

W. JUNK, Berlin W. 15.

Verlag und Antiquariat für Entomologie.

Coleopterorum Catalogus.

- Part 1: B. Gestro, Rhysodidae. 1910. 11 p.
(Mark 1) Mk. 0.65
- 2: F. Borchmann, Nilionidae, Othniidae, Aegialitidae,
Petriidae, Lagriidae. 1910. 32 p.
(Mark 3) Mk. 2.—
- 3: F. Borchmann, Alleculidae. 1910. 80 p.
(Mark 7.50) Mk. 5.—
- 4: M. Hagedorn, Ipidae. 1910. 134 p.
(Mark 12.75) Mk. 8.50
- 5: R. Gestro, Cupedidae, Paussidae. 1910. 31 p.
(Mark 3) Mk. 2.—
- 6: H. Wagner, Curculionidae: Apioninae. 1910. 81 p.
(Mark 7.50) Mk. 5.—
- 7: H. von Schönfeldt, Brenthidae. 1910. 57 p.
(Mark 5.25) Mk. 3.50
- 8: G. van Roon, Lucanidae. 1910. 70 p.
(Mark 6.50) Mk. 4.35
- 9: E. Olivier, Lampyridae. 1910. 68 p.
(Mark 6.35) Mk. 4.25
- 10: E. Olivier, Rhagophthalmidae, Drilidae. 1910. 10 p.
(Mark 1) Mk. 0.65
- 11: A. Lèveillé, Temnochilidae. 1910. 40 p.
(Mark 3.75) Mk. 2.50
- 12: E. Csiki, Endomychidae. 1910. 68 p.
(Mark 6.35) Mk. 4.25
- 13: E. Csiki, Scaphidiidae. 1910. 21 p.
(Mark 2) Mk. 1.30
- 14: M. Pic, Hylophilidae. 1910. 25 p.
(Mark 2.40) Mk. 1.60
- 15: H. Gebien, Tenebrionidae I. 1910. 166 p.
(Mark 15.60) Mk. 10.40
- 16: P. Pape, Brachyceridae. 1910. 36 p.
(Mark 3.40) Mk. 2.25
- 17: Ph. Zaitzev, Dryopidae, Cyathoceridae, Georyssidae,
Heteroceridae. 1910. 68 p.
(Mark 6.35) Mk. 4.25
- 18: E. Csiki, Platypsyllidae, Orthoperidae, Phaenocepha-
lidae, Discolomidae, Sphaeriidae. 1910. 35 p.
(Mark 3.30) Mk. 2.16

9. Tribus: **Oxytelini.**

- Oxytelini* Er. Käf. Mk. Brdb. I, 1837—1839 (1839), p. 576. — Kraatz, Natg. Ins. Dtschl. II, 1850—1858, p. 798 (excl. *Oxyporus*, *Osorius*, *Holotrochus*, *Euphanias*). — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 692.
- Oxytelini* Subtrib. *tertia Genuini* + Subtrib. quarta *Coprophilini* (excl. *Micralymma*) Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 814.
- Oxytelides* Sou-Trib. III: *Oxytelides* vrais (excl. *Trigonurus*) et Sou-Trib. IV: *Coprophilides* Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 132.
- Oxytelites* Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—1859, p. 54 (excl. *Trigonurus*).
- Oxytelina* Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 117.
- Oxytelini* Sect. I: *Oxyteli* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 124 (excl. *Pholidus*).
- Oxytéliens* Muls. et Rey, Ann. Soc. d'Agric. Lyon (5) VIII, 1875, p. 209; Hist. Nat. Col. Fr. Brévip. Oxyp. Oxytel. 1879, p. 11 (excl. *Prognatha*, *Glyptoma*, *Cylindrogaster*).
- Oxytelini* Group IV: *Oxyteli* J. Lec. et Horn, Classif. Col. North Am. 1883, p. 102.
- Oxytelinae* Group *Oxytelina* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 685 + Group *Thinobiina* Sharp l. c. p. 705.
- Oxytelinae* Reitt. Fn. Germ. II. 1909, p. 163.

1. Subtribus: **Coprophili.**

Syntomium Curt.


Curtis, Brit. Ent. V, 1828, t. 228. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 821. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 123. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 60. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 890. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 140. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 130. — Muls. et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Brévip. Oxyp., Oxytel., 1879, p. 381. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II. 1895, p. 679.

Biologie: Schiødte, Naturhist. Tidsskr. (3) VIII, 1872—1873, p. 559—563, t. 20, f. 1—12.

aeneum Müller in Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 216. — Nord- und Mittel-Europa
Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 821. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 892. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 23, f. 112. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 141. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 131. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 383. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 681.

nigroaeneum Curtis, Brit. Ent. V, 1828, t. 228.

confragosum Müll. Bull. Mosc. XXV, 1852, II, p. 319. Russ. Amerika



Coprostygnus Sharp.

Sharp, Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1886, t. 12, f. 14.

optandus Broun, Man. Nov. Zeal. Col. 1893, p. 1409. Neu-Seeland
sculptipennis Sharp, Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, „
 t. 12, f. 14.

2

Deleaster Er.

Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—1839 (1839), p. 610; Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 818. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 122. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 60. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. 1856—1858, p. 901. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 125. — Muls. et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Brévip. 1879, p. 376. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 677.

bactrianus Semen. Hor. Ross. XXXIV, 1899—1900, Buchara
 p. 684.

concolor J. Lec. Proc. Ac. Philad. 1866, p. 375.

dichrous Gravh. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 188. — Er. Kalifornien
 Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—1839, p. 611; Gen. Mittel-
 Spec. Staph. 1839—40, p. 819. — Kraatz, Europa,
 Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 902. — östl. Mittel-
 Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 23, meergebiet,
 f. 111. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 126. Marocco
 — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 378. —
 Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 678.

brassicae Schrank, Fn. Boica I, 1798, p. 644.

var. *Leachi* Curtis, Brit. Ent. VII, 1830, t. 303. — Süd-Europa,
 Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 678. Caucasus

adustus Küst. Käf. Eur. VII, 1846, p. 49.

var. *Erichsoni* Hochh. Bull. Mosc. XXIV, 1851, „
 III, p. 57.

pekinensis Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1893, p. 212. China

pectinatus Fauv. Rev. d'Ent. I, 1882, p. 129. Abessinien

5

Zalobius J. Lec.

J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, p. 49. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 259. — Horn, Proc. Cal. Ac. Sc. (2) V, 1895, p. 236.

serricollis J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1875, p. 170. Kalifornien
 — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 260.

spiniollis J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, p. 49. — Vancouver
 — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 259.

2

Asemobius Horn.

Horn, Proc. Calif. Ac. V, 1895, p. 238.

caelatus Horn, l. c. p. 238.

Kalifornien

1

Coprophilus Latr.

Latr. in Cuv. Règne anim. IV, 1829, p. 439. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I 1837—39 (1839), p. 609; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 815. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 139. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 77. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 893; Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 6. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 143. — Solsky, Hor. Ross. IV, 1866—67, p. 85. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) I, 1868, p. 44; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 129; Rev. d'Ent. XVI, 1897, p. 226. — Muls. et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Brévip. 1879, p. 240. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 177, 291. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 676. — Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1908, p. 327.

Elonium Samouelle, Entom. Compend. I, 1819, p. 175.

Homalotrichus Solier, Hist. Chile IV, 1849, p. 472.

Subgen. *Coprophilus* s. str. Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 677.

Subgen. *Zonoptilus* Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, 39 (*Zonyptilus*); l. c. XXX, 1857, IV, p. 502.

alticola Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 93.

Himalaya

impressicollis Sol. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 323, t. 6, f. 8. — Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 129; Bull. Soc. Linn. Norm. (2) I, 1868, p. 46.

Chile

impressus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 415.

Japan

longicornis Bernh. Münch. Kol. Ztsch. I, 1903, p. 188.

Turkestan

bimaculatus Luze, Hor. Ross. XXXVII, 1904, p. 6.

pennifer Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 39; l. c. XXX, 1857, IV, p. 502; l. c. XXXI, 1858, III, t. 1, f. 6. — Hochh. l. c. XXXV, 1862, III, p. 99. — Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1908, p. 328.

Turkestan,
Kaukasus

striatipennis Epp. Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 291.

var. *araxis* Reitt. l. c. p. 179.

Kaukasus,
Krim

obsoletus Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 292.

pennifer Solsky, Hor. Ross. IV, 1866—67, p. 86 (non Motsch.).

var. *dimidiatipennis* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 223.

Transkaspien

var. *lateralis* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1875, Cat. p. VIII; Rev. d'Ent. XVI, 1897, p. 227.

Persien,
Margelan

var. *marginalis* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 292.

Sibirien

Eppelsheimi Fauv. Rev. d'Ent. XVI, 1897, p. 227.

China

lateralis Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 177 (non Fauv.).

Mongolei

var. *obscurus* Reitt. l. c. p. 179.

Kaukasus

var. *cellula* Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 894.

Mesopo-
tamien,
Turkestan

pentatoma Fauv. Rev. d'Ent. XVI, 1897, p. 227.

Turkestan,

obscurus Luze, Hor. Ross. XXXVII, 1904, p. 79.

Baku

piceus Solsky, Hor. Ross. IV, 1866—67, p. 88. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 677. — Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1908, p. 328.

Österreich,
Ungarn,
Deutsch-
land,
Russland

1*

- rufipennis* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 178, 292.
Schuberti Motsch. Schrenck's Reise 1860, p. 120.
Reitteri Luze, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 69 (forte).
simplex Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 415.
Solskyi Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1908, p. 330.
lateralis Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 291 (non Fauv.).
striatulus F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 529. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39, p. 609; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 816. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 894. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 22, f. 110. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 143. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 130. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 243. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 677.
laesus Germ. Fn. Ins. Eur. XV, 1831, nr. 2.
rugosus Ol. Ent. III, 1794, 42, p. 30, t. 5, f. 43.
striatus Sol. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 323, t. 6, f. 7. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 6. — Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 129.
substriatus Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 16.
- Margelan
Süd-Russ-
land,
Turkestan
Japan
Dobrudja

Nord- und
Mittel-
Europa

Chile

Santiago

14

Sartallus Sharp.

Sharp, Ent. Monthly Mag. VII, 1871, p. 217.

- signatus* Sharp, l. c. p. 217; Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 205.
- Süd-
Australien

1

Oncophorus Eppelsh.

Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 46.

- miricollis* Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 96.
Pirazzolii Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 47.
- Tunis
..

2

Acrognathus Er.

Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 607; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 816. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 898. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 59. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 141. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 126. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. Oxyp. Oxyt. 1879, p. 235. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 674.

- mandibularis* Gyll. Ins. Suec. IV, 1827, p. 468. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1837), p. 608; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 817. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 900. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 22, f. 109. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 142. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 127. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 237. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 675.
- Mittel-
Europa,
Mittelmeer-
gebiet

1

2. Subtribus: Actochari.

Actocharis Fauv.

Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) V, 1869, p. 19. — Sharp, Ent. Monthly Mag. VI, 1870, p. 279. — Rye, Ent. Annual 1871, p. 27. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 133.

marina Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) V, 1869, p. 19; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 133, t. 2, f. 2. — Rye, Ent. Ann. 1871, p. 27. Frankreich,
England,
Istrien,
Sizilien,
Corsica,
Constantine
Readingi Sharp, Ent. Monthly Mag. VI, 1870, p. 279.

1

Corallis Fauv.

Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 212.

polyporum Fauv. l. c. p. 213, t. 1, f. 17.

Ins. Arn,
Key

1

3. Subtribus: Toxoderi.

Toxoderus Fauv.

Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 189.

Sharpi Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 488 (non Borage).

Ranksi Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 488. Victoria

1

Crymus Fauv.

Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 92.

antarecticus Fauv. l. c. p. 93.

Südl. Neu-
Georgien

1

4. Subtribus: Oxyteli.

Planeustomus Jacq. du Val.

Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—1859 (1859), p. 58. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 142. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 127. — Muls. et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Brévipennes Oxyt. Oxyt. 1879, p. 227. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 671.

Compsochilus Krantz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 895.

africanus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 338. Constantine,
Tunis

Bonnairei Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 94. Constantine
cephalotes Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 817. — Dalmatien,
Griechen-
land,
Cyperu,
Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 410. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 672.

- procerus* Eppelsh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXX, 1880, p. 211. Korfu, Kleinasien, Suditalien
- congoensis* Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 66. Kongogeb.
- curtipennis* Fauv. Mém. Soc. Linn. Norm. XV, 1869, p. 43; Fn. gallo-rhén. Cat. Staph. 1875, p. VIII. Algier, Oran, Marocco, — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 383. Tunis, Sardinien
- Weberi* Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 183. Mittelmeer-gebiet
- elegantulus* Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 896 nota. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 674.
- filiformis* Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 183.
- flavicollis* Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) V, 1869, p. 155; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 129. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 384. Belgien, Kaukasus, Asturien
- Heydeni* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 413. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 673. Ungarn, Kroatien, S.-Rußland, Kleinasien, Kaukasus
- indicus* Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 21. Birma
- Kahri* Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 897 nota. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 128. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 229. — Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 414. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 673. Mittelmeer-gebiet
- macellus* Kraatz in Heyden, Span. Reise 1870, p. 85.
- microphthalmus* Fauv. Rev. d'Ent. V, 1886, p. 17. Algier
- miles* Scriba, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 158. Italien, Algier, Tunis
- palpalis* Er. Käf. Mk. Brandb. 1837—39 (1839), p. 608; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 818. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 22, f. 108. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 896. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 142. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 128. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brév. 1879, p. 232. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 673. Nord- und Mittel-Europa
- Panciei* Matits, Wien. Ent. Zeit. XXIX, 1910, p. 142. Serbien
- Rosti* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1884, p. 105. Korfu, Italien

Ancyrophorus Kraatz.

- Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 886. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 139. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 139. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 666.
- Ochtheophilus* Mulsant et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon. III, 1856, p. 1; Opusc. Entom. VII. 1856, p. 1; Hist. Nat. Col. Fr. Brévip. Oxyp. Oxyt. 1879, p. 352 (nec *Ochtheophilum* Steph.).
- Biologie: Rupertsberger, Biol. Lit. Käf. Eur. 1894, p. 125.

Subgen. *Misancyrus* Gozis.

Gozis, Recherche. Montluçon 1886, p. 15.

Psilotrichus Luze, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 69.

- emarginatus** Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 141
nota. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 374. — Ganglb.
Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 667.
elegans Luze, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904,
p. 70.
Rosenhaueri Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879,
p. 358 (nec Kiesw., Kraatz).
- Süd-Frank-
reich,
Spanien,
Marokko,

Griechen-
land,
Kaukasus

Subgen. *Ancyrophorus* s. str.

- angustatus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 803. —
Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—1858,
p. 890. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 142,
nota. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879,
p. 374. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 669.
aureus Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) V, 1869, p. 168;
Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 142, t. 2, f. 5. —
Mars. Ab. VIII, 1871, p. 373.
oblitus Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879,
p. 364.

var. **ruficornis** Reitt. Fn. German. II, 1909,
p. 175 nota.
biimpressus Mäkl. Bull. Mosc. XXV, 1852, II, p. 319.

eurtipennis Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 65.
flum Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1875, Cat. p. IX, nota 2. —
Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878,
p. 401. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895,
p. 670.
flexuosus Fairm. et Laboulb. Fn. Fr. I, 1854, p. 614. —
Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 144. — Muls.
et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 355. —
Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 670.
forticornis Hochh. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 553;
l. c. XXXV, 1862, III, p. 97.
longipennis Fairm. et Laboulb. Fn. Fr. I, 1854—56,
p. 614. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II,
1856—58, p. 888. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III,
1872, p. 141. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip.
1879, p. 361. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II,
1895, p. 668.
♀ **praepositus** Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip.
1879, p. 370.
omalinus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 802. —
Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—1858,
p. 889. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 140.
— Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 143. —
Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 371.
— Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 669.
parvulus Eppelsh. Verh. Ver. Brünn XVI, 1877,
p. 124.
- Mittel-
Europa,
Marokko,
Algier,
Tunis
Südl. Mittel-
Europa,
Italien,
Korsika,
Marokko,
Algier
Görz

Russ.
Amerika,
Pyrenäen
Baikal
Portugal,
Böhmen,
Österreich,
Bosnien
Frankreich

Daurien

Mittel-
Europa,
Italien,
Korsika,
Sizilien

Nord- und
Mittel-
Europa,
Mittelmeer-
gebiet

- venustulus* Rosenh. Thiere Andal. 1856, p. 84. —
Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 366.
planus J. Lec. List Col. N. Amer. I, 1866, p. 26; Amer. Oberer See
Col. 1880, p. 242.
Rosenhaueri Kiesw. Stett. Ent. Zeit. XI, 1850, p. 220. — Tirol,
Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, Ungarn,
p. 887. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, Sieben-
p. 668. bürge-
serleinus Solsky, Fedtsch. Reise Turk. 1874, II, V, p. 206. Turkestan
— Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1875. Cat. p. IX
nota.

13

Trogophloeus Mannh.

- Mannh. Brach. 1830, p. 49. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—1839 (1839),
p. 599; Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 801. — Lacord. Gen. Col. II,
1854, p. 118. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 56. — Kraatz,
Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 868. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III,
1872, p. 144. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 134. — J. Lec. Trans.
Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 242. — Muls. et Rey, Hist. Nat. Col. Fr.
Brévipennes, Oxyp. Oxyt. 1879, p. 255. — Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2,
1882—1887 (1887), p. 697. — Casey, Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 322. —
Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 647. — Klima. Münch. Kol. Zeitschr.
II, 1904, p. 43.

Subgen. Thiodromus Kraatz.

- Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 866. — Muls. et Rey,
Hist. Nat. Col. Fr. Brévipennes, Oxyp. Oxyt. 1879, p. 247. — Ganglb.
Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 648. — Klima. Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904,
p. 44.

- angulicollis* Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) I. 1868, Chile
p. 36.
araucanus Fauv. l. c. p. 35.
areitenens Fauv. Mitt. Mus. Hamburg XXII, 1905, p. 78. Java
Bernhaueri Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 50. Ost-Sibirien
brevicornis Luze, Hor. Ross. XXXVII, 1904, p. 80. Turkestan
deceptor Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 416. Japan
dilatatus Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—1839 (1839), Mittel-
p. 599; Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 802. — Europa,
Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, Mittel-
p. 867. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, meergebiet
1858, t. 21, f. 104. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III.
1872, p. 146. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879,
p. 249. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 649,
— Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 50.
eminens Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 416. Japan
luseipalpis Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 94. Ceylon
hirticollis Muls. et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Brévip. 1879, Mittel-
p. 252. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, Europa,
p. 650. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, Kaukasus,
p. 50. Nord-Afrika
latipennis Fauv. Ann. Mus. Genova XV, 1879—80, p. 81. Neu-Guinea
lunatus Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 504. — Ost-Indien
Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 50 nota.
nitidifrons Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) I. 1868, p. 38. Chile

- Perrieri** Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 177; l. c. XXIII, 1904, p. 301. Madagaskar
segnis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 802.
sericatus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 415. Japan

Subgen. *Carpalimus* Steph.

- Steph. Ill. Brit. V. 1832, p. 324. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 133. —
 Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II. 1895, p. 648. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II,
 1904, p. 44.

Amisanimus Gozis. Recherche, Montluçon 1886, p. 14.

- Alluaudi** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 302. Madagaskar
americanus nom. nov. Kentucky,
anthracinus Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, Virginia
 p. 330 (nec Muls.).
arcifer J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 245. — Texas,
 Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 329. Florida
arcuatus Steph. Ill. Brit. V, 1827, p. 324. — Fauv. Fn. Nord- und
 gallo-rhén. III, 1872, p. 148. — Ganglb. Käf. Mittel-
 Mitt.-Eur. II, 1895, p. 650. — Klima, Münch. Europa,
 Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 53. Kaukasus,
scrobiculatus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, Algier,
 p. 805. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856— Tunis
 1858, p. 870. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 133.
 — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 148.
 — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 263.
 var. *nigricornis* Muls. et Rey, l. c. p. 265. —
 Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 650.
Motschulskyi Hochh. Bull. Mosc. XXXIII, 1860,
 I, p. 553. — Motsch. Bull. Mosc. XXXV. 1862,
 II, p. 93.
armicollis Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 95. — Klima, Algier,
 Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 54. Tunis
bicyclus Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 13. Brit. Ost-
 Afrika
Bodemeyeri Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, Kleinasiens,
 p. 701. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, Korfu,
 p. 52. Ungarn
corcyreus J. Sahlb. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh.
 1903, Sep. p. 8.
brasiliensis Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIV, 1904, Brasilien
 p. 21.
caloderinus J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, Texas
 p. 246. — Cas. Ann. N. York Ac. IV. 1889,
 p. 329.
centralis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), Guatemala,
 p. 701. Panama
corsicus Klima, Münch. Kol. Zeit. II, 1904, p. 51. Korsika
corvinus Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 331. Massachu-
 setts
croceipes Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) I, 1868, p. Kuba
arcuatus Fauv. Ann. Soc. Fr. (4) III, 1863, p. 438.
dilatocollis Eppelsh. Verh. Ver. Brünn XXII, 1886, p. 16. Lenkoran
 — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 54.
dilutus Woll. Col. Hesperid. 1867, p. 255.
distinctus Fairm. et Laboulb. Fn. Fr. I, 1854, p. 615. — Cap Verde
 Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 870 Westalpen,
 nota. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 147. Süd-Frank-
 reich,

- Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 258. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 650. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 51. Italien, Piemont
- episcopalis* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 354. Mexiko
- fortepunctatus* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIV, 1904, p. 22. Brasilien
- Kiesenwetteri* Hochh. Bull. Mosc. XXIV, 1851, III, p. 55. Kaukasus
— Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 52.
- luteipes* Solier in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 325. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 6. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) I, 1868, p. 36; Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 128. — Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 450. Chile, England
- andicola* Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 450.
- fuscus* Sol. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 325. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 6. — Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 451.
- spinicollis* Rye, Ent. Monthly Mag. VII, 1870, p. 8; Ent. Annual 1871, p. 36. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 374. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 148 nota. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 43.
- Mannerheimi* Kolen. Melet. Entom. III, 1846, p. 26, t. 12, f. 2. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 650. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 51. Frankreich, Piemont, Sizilien, Spanien, Kaukasus, Schweiz, Marokko, Algier, Tunis
- Brebiassoni* Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1864, p. 312.
- plagiatus* Kiesw. Stett. Ent. Zeit. XI, 1850, p. 221. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. 428. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 147. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 261.
- mollis* Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 702. Guatemala, Panama
- multivittatus* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 354. Mexiko
- obscurus* Solier in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 324, t. 6, f. 9. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) I, 1868, p. 37; Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 128. Chile
- mersus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 448.
- puncticollis* Solier in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 332 ♀. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 7.
- pauloensis* Bernh. Arch. Natg. 1908, p. 288. Brasilien
- pilosellus* Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 228. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 53. Kaukasus, Lenkoran
- pustulatus* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIV, 1904, p. 20. Brasilien
- signatus* Er. Act. Ac. Caes. Leop. XVI, 1834, Suppl. I, p. 229. — Meyen, Reise u. Erde III, 1834, p. 353. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 803. — Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 447. Chile
- singularis* Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 13. Kilimandjaro

- socius* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIV, 1904, p. 21.
tibialis Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 13.
transversalis Woll. Cat. Col. Mader. 1857, p. 202. —
 Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 52.
triangulum Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887),
 p. 701.
vittatus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887),
 p. 702.

Annam
 Brit. Ost-
 Afrika
 Madeira,
 Canar. Ins.,
 Oran,
 Algier
 Guatemala

Subgen. *Trogophloeus* s. str.

- Boopinus* Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 56.
Taeniosoma Mannh. Brachel. 1830, p. 50. — Steph. Ill. Brit. V,
 1832, p. 323. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 136. — Ganglb.
 Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 648. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr.
 II, 1904, p. 27.
aequalis Jacq. du Val, Hist. Cuba 1857, p. 44. — Fauv.
 Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 441.
agonus Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 356.
alutaceus Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 95. — Klima,
 Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 63.
anceps Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 194 (*Boo-*
pinus).
angulatus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 804.
angusticollis Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. LVII, 1907,
 p. 373.
anthracinus Muls. et Rey, Opusc. Ent. XII, 1861, p. 177.
 — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 150. —
 Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 274. —
 Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 652. —
 Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 56.
apacheanus Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 344.
apicalis Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 229. —
 Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 63.
apicleornis Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 67.
argentinus Bernh. Arch. Natg. 1908, p. 289.
argutus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887),
 p. 801.
aridus Jacq. du Val, Hist. Cuba 1857, p. 43.
rubripennis Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III,
 1863, p. 440 (veris).
arizonae Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 338.
armatus Cas. l. c. p. 335.
atramentarius Lynch, Estaf. Buen. Air. 1884, p. 371.
Augustae Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901,
 p. 654. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904,
 p. 55.
billneatus Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 324, t. 27, f. 4. —
 Sharp, Ent. Monthly Mag. VII, 1870, p. 181. —
 Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 149; Ann.
 Mus. Genova XIII, 1878, p. 489. — Ganglb. Käf.
 Mitt.-Eur. II, 1895, p. 651. — Klima, Münch.
 Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 55.

Kuba
 Tennessee
 Süd-Europa,
 Nord-
 Afrika,
 Australien
 Brasilien
 Japan
 Frankreich,
 Spanien,
 Ungarn,
 Turkestan
 Arizona
 Kaukasus,
 Korsika
 Zanzibar,
 Kongo
 Argentinien
 Mexico
 Kuba
 Arizona
 Kalifornien
 Buenos Aires
 Istrien,
 Algier
 Paläarktische
 Region,
 Nord-
 Amerika,
 Chile,
 Capland,

- caucasicus* Hochh. Bull. Mosc. XXII, 1849. 1, p. 194.
- corticinus* var. b Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 645.
- lathrobioides* Peyron. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VI, 1858, p. 433.
- riparius* Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 467. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 600; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 807. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 871. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 135. — Muls. et Rey. Col. Fr. Brévip. 1879, p. 267.
- sobrinus* Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 449.
- suspectus* Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. p. 270.
- hipuncticolis* Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 372.
- bledianus* J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 244.
— Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 375.
- bovinus* Bernh. Arch. Natg. 1908, p. 289.
- brachypterus* J. Lec. Trans. Am. Ent. Soc. VI, 1877, p. 240. — Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 361.
- breviceps* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 398.
- carbonarius* Fauv. Ann. Mus. Genova XIII, 1878, p. 490.
- Caseyi* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIV, 1904, p. 23.
- confinis* Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 369.
- confusus* Cas. l. c. p. 378.
- congener* Cas. l. c. p. 355.
- congoensis* Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 67.
- conjunctus* Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 342.
- convexus* J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 244. — Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 374.
- cordavensis* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 356.
- corticinus* Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 192. — Er. Käf. Mk. Brandb. 1837—39 (1839), p. 603; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 809. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 876. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 137. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 153. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 301. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 653. — Khma, Münch. Kol. II, 1904, p. 59.
- atratus* Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 327.
- exiguus* Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p. 600.
- minimus* Runde, Brach. Hal. 1835, p. 20.
- nanus* Woll. Ins. Mad. 1857, p. 611.
var. *fulvipennis* Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 440.
- curtulus* Sharp. Biol. Centr.-Am. I. 2, 1882—87 (1887), p. 699.
- debilis* Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 374.
- decoloratus* Cas. l. c. p. 382.
- delleatus* Cas. l. c. p. 365.
- Australien
- Texas
Kalifornien
- Argentinien
Michigan
- Amazon.
Victoria
Michigan
Kalifornien
New Jersey
Pennsylvanien
- Kongo
Oregon
Kansas
- Mexiko
- Paläarkt.
Reg., Nord- und Mittel-Amerika.
Kuba
- Guatemala,
Panama
Kalifornien
Pennsylvanien
Michigan,
Pennsylvanien,
Indiana

- dentiger* Cas. l. c. p. 333.
detractus Cas. l. c. p. 361.
dieganus Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 302.
diffilis Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 354.
- diffusus* Cas. l. c. p. 350.
duplex Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 248.
- egregius* Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 352.
elongatulus Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 601; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 807. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 874. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 136. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 154. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 304. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 654. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 58.
brevipennis Hochh. Bull. Mosc. XXII, 1849, 1, p. 199.
excellens Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 699.
facetus Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 378.
fallax Cas. l. c. p. 375.
ferrugineus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 804.
filarius Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 698.
filum Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 381.
flavipes Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 808.
- fontinalis* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 52; Fn. Hawaiens. III, V, 1908, p. 544.
foveicollis Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1859, I, p. 180.
- foveolatus* Sahlb. Ins. Fenn. I, 1834, p. 419. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 810. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 878. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 138. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 156. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 291. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 655. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 60.
- fuliginosus* Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 102. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 602; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 808. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 875. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 139. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 152. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 283. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 653. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 58.
- fulvipes* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 804. — Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 697. — Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 71.
texanus Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 334.
- Arizona
 Iowa
 Madagaskar
 Nord-
 Carolina,
 Maryland
 Kalifornien
 Neu-Kale-
 donien
 Rhode Island
 Nord- und
 Mittel-
 Europa,
 Italien
- Guatemala
- Rhode Island
 Oberer See
 Venezuela
 Guatemala
- Kalifornien
 Antillen,
 Mexiko
 Hawai
- Ost-Indien,
 Sunda-I.,
 Neu-Guinea
 Europa,
 Kaukasus,
 Mittelmeer-
 gebiet
- Mittel-
 Europa,
 Italien,
 Kaukasus
- Antillen,
 Nord- und
 Mittel-
 Amerika,
 Süd-
 Amerika,
 Hawai

- Ganglbaueri** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 653. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 59.
- genalis** Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 67.
- gilae** Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 335.
- globicollis** Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 145.
- globulicollis** Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital. LX, 1908, p. 231.
- gracilis** Mannh. Brach. 1830, p. 51. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 657. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 65.
- litoralis** Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 314.
- tenellus** Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 605; Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 811. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 880. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 137. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 160. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 311.
- graphicus** Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 362.
- halophilus** Kiesw. Stett. Ent. Zeit. V, 1844, p. 373 nota. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 877. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 138. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 158. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 298. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 656. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 63. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 63.
- curtipennis** Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 300.
- subrugulosus** Rey, l. c. p. 301.
- var. **simplicicollis** Woll. Ins. Mader. 1857, p. 203.
- Heydeni** Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 59.
- hilaris** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 399.
- imbellis** Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 346.
- impressipennis** Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 448.
- impressus** Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 467. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 153. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 653. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 59.
- affinis** Heer, Fn. Helv. I, 1838—1842, p. 202.
- bilineatus** var. Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 806.
- incrassatus** Kiesw. Stett. Ent. Zeit. XI, 1850, p. 221.
- inquilinus** Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 603. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 874. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 295.
- obsoletus** Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 279.
- incertus** Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 364.

N. Öster-
reich,
Ungarn
Kongo,
Natal
Nord-
Amerika
West-Afrika
Argentinien
Europa,
Kaukasus,
Nord-
Amerika,
Marokko,
Oran,
Algier,
Tunis,
Azoren
Missouri
Europa,
Kaukasus,
Mittel-
meergebiet
Turkestan,
Kaukasus
Amazon.
Iowa
Chile
Europa,
Kaukasus,
Constantine
Nord-
Amerika

- indicus** Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1859, I, p. 179. — Fauv. Rev. d'Ent. V, 1886, p. 144; l. c. VIII, 1889, p. 247.
ceylonicus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 44.
flavipes Motsch. Bull. Mosc. XXXIV, 1861, p. 43. — Fauv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 150.
- ingens** Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 363.
- inquisitus** Cas. l. c. p. 377.
- insignellus** Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 700.
- insolitus** Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 380.
- Klimai** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 593. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 55.
- Koppi** Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 146.
- languidus** Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 371.
- lapsus** Cas. l. c. p. 350.
- latifrons** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 399.
- lepidicornis** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 94.
- lepidus** Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 347.
- litthocharinus** J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 245. — Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 353.
- longicollis** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVII, 1907, p. 373.
- macropterus** Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 180.
- malgaceus** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 303.
- maritimus** Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. XI, 1903, p. 615.
- medioeris** nom. nov.
mexicanus Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 356 (nec Casey).
- memnonius** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 806. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 61.
- mexicanus** Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 333.
- misellus** Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 700.
- modestus** Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 359.
- monachus** Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital. LX, 1908, p. 232.
- morio** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 805. — Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 342.
- mundus** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 397.
- nanulus** Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 358.
- nigrellus** Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 699.
- nigrita** Woll. Cat. Col. Mader. 1857, p. 202. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 61. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 57.
bilineatus Woll. Cat. Canar. 1864, p. 599.
insularis Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 127.
oculatus Woll. Col. Atlant. 1865, App. p. 74.
- Ost-Indien,
 Ceylon,
 Sunda-
 Inseln
- Iowa,
 Illinois
 Texas
 Guatemala
- Kalifornien
 Kleinasien
- West-Afrika
- Texas
 Kalifornien
 Amazon.
 Celebes
 Iowa
 Kalifornien
- Japan
- Constantine
 Madagaskar
 Neu-Seeland
 Mexiko
- Ägypten
- Mexiko
 Guatemala
- Texas
 Argentinien
 Pennsylvanien,
 Michigan,
 Kansas
 Amazon.
 Texas
 Guatemala
- Madeira,
 Mittel-
 meergeb.,
 Madagaskar
 Canar.,
 Reunion,
 Kaukasus,
 Neu-
 Guinea,
 Ostindien

- niloticus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 808. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 64. Ägypten, Algier, Tunis
- nitidiventris** Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 447. Chile
- nitidus** Baudi, Stud. ent. I, 1848, p. 147. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 878 nota. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 155. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 289. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 654. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 59. Südl. Mittel-Eur., Kaukasus, Mittel-meergeb.
- obesus** Kiesw. Stett. Ent. Zeit. V, 1844, p. 375. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 873. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 276. Mittel-Europa, Mittel-meergeb., Nord-Amerika, Neu-Kaledonien, Cap Verde
- fossulatus** Motsch. Bull. Mosc. XXIX, 1857, IV, p. 505.
- mancus** Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 345.
- memnonius** Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 151. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 651. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 56.
- spectatus** Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 345.
- tarsalis** Hochh. Bull. Mosc. XXII, 1849, I, p. 196.
- obliquus** Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 353. Kalifornien
- occidus** Cas. l. c. p. 339.
- opacus** Baudi, Stud. ent. I, 1848, p. 146. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 871 nota. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 149 nota. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 270 nota. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 652. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 55. Piemont, Krain, Schweiz, Istrien, Kroatien
- pacificus** Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 337. Kalifornien
- pallidulus** Cas. l. c. p. 373. Oberer See
- paludicola** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1887, p. 49. Süd-Australien
- papuensis** Fauv. Ann. Mus. Genova XIII, 1878, p. 81.
- parvulus** Muls. et Rey, Opusc. Ent. XII, 1861, p. 175 (*Oxytelus*). — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 159. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 306. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 656. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 64. Neu-Guinea, Frankreich, Griechenland, Korsika, Nord-Afrika
- pauperculus** Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 370. Kalifornien
- pertenuis** Cas. l. c. p. 360. Texas
- phloeoporinus** J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 246. — Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 351. Illinois, Iowa
- planellus** Sharp, Biol. Centr.-Am. I. 2, 1882—87 (1887), p. 698. Guatemala, Panama
- planicollis** Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 45. Ceylon
- politus** Kiesw. Stett. Ent. Zeit. XI, 1850, p. 221, 431. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 875 nota. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 152. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 280. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 652. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 58. Mittelmeer-gebiet
- Poppiusi** nom. nov.
- latipennis** Popp. Öfv. Finska Vet. Soc. LI, 1908—09, nr. 4, p. 7 (nec Fauv.). Ostsibirien

- probus** Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 358. Nord-Carolina
- prominens** Cas. l. c. p. 336. Kalifornien
- providus** Cas. l. c. p. 376. New Jersey
- pseudorivularis** Berob. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 355. Mexiko
- pudicus** Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 368. New Jersey
- pueblanus** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 356. Mexiko
- punctatellus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 810. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 879. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 155. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 287. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 655. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 59. Mittel-Europa, Italien
- myrmecophilus* Scriba, Stett. Ent. Zeit. XVI, 1855, p. 281.
- pygmaeus* Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 574.
- punctatus** Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 194; l. c. XIII, 1878, p. 490. Australien
- punctipennis** Kiesw. Stett. Ent. Zeit. XI, 1850, p. 221; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1861, p. 431. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 877 nota. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 156. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 293. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 655. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 62. Frankreich, Spanien, Korsika, Nord-Afrika,
- pustillus** Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 78. — Er. Käf. Mk. Brandb. 1837—39 (1839), p. 605; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 811. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 880. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 136. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 159. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 309. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 656. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 64. Europa, Kaukasus, Madeira, Nord-Amerika, Mittel-meergebiet
- affinis* Steph. III. Brit. V, 1832, p. 326.
- corticinus* Boisd. et Lac. Fn. Paris I, 1835, p. 468.
- exilis* Woll. Ann. Nat. Hist. (3) VI, 1860, p. 105.
- fuliginosus* Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 460.
- picipennis* Steph. III. Brit. V, 1832, p. 325.
- rufipennis* Steph. l. c. p. 326.
- tantillus* Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 383 (*veris*).
- quadripunctatus** Say (*Stenus*), Trans. Am. Philad. Soc. IV, 1834, p. 459. — Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 340. Pennsylvanien, New York
- laticollis* J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 55.
- Reitteri** Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 57. Korfu
- rivularis** Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 552. Paläarktische Region, Nord-Amerika
- Hochh. l. c. XXXV, 1862, III, p. 94. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 651. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 55.
- bilineatus** Er. Käf. Mark 1837—39 (1839), p. 600; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 806. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 872. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 135. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 271.

- corticinus* Gyll. Ins. Spec. II, 1810, p. 645.
Erichsoni Sharp, Ent. Month. Mag. VII, p. 182. —
 Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 150.
metuens Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879,
 p. 274.
obscurus Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 326.
apretus Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 343
 (veris).
subaequus Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. p. 279.
robustus Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 369.
rufipennis Eppelsb. Stett. Ent. Zeit. XXXIX, 1878,
 p. 422. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904,
 p. 62.
rufitarsis Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 14.
salicola Cas. Ann. N. York Ac. VIII, 1895, p. 450.
scabrosus Krantz, Arch. Natg. XXV, 1859, I, p. 179.
scrupulus Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 379.
sculptilis Cas. l. c. p. 354.
sedatus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 417.
senilis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 51; Fn.
 Hawaiens. III, V, 1908, p. 543.
Sharpi Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital. LX, 1908, p. 229;
 Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 355.
punctipennis Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—
 1887 (1887), p. 701.
siamensis Fauv. Rev. d'Ent. V, 1886, p. 144; Ann. Soc.
 Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 178.
stenus Muls. et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Brévip. Oxyp.
 Oxyt. 1879, p. 291. — Klima, Münch. Kol.
 Zeitschr. II, 1904, p. 60.
simplex Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 505. —
 Krantz, Archiv Natg. XXV, 1859, I, p. 180. —
 Fauv. Ann. Mus. Genova XIII, 1878, p. 26.
simplarius J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 244.
 — Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 373.
Smithi Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital. LX, 1908, p. 229.
stricticollis Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861,
 p. 449.
subdenticulatus Bernh. Arch. Natg. 1908, p. 289.
subtilis Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1837), p. 606;
 Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 812. — Krantz,
 Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 881. — Fauv.
 Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 160. — Muls. et Rey,
 Col. Fr. Brévip. 1879, p. 314. — Ganglb. Käf.
 Mitt.-Eur. II, 1895, p. 657. — Klima, Münch.
 Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 65.
indigens Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 362.
suffusus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887),
 p. 698.
temporalis Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 357.

New York
 Griechenland,
 Syrien,
 Nord-
 Afrika
 Brit.
 Ost-Afrika
 Utah
 Ost-Indien
 Texas
 Kalifornien
 Japan
 Hawaii
 Guatemala,
 Mexiko
 Ost-Indien,
 Madagas-
 kar, Sunda-
 Inseln
 Sizilien,
 Süd-Italien,
 Korfu
 Ost-Indien,
 Sunda Ins.,
 Australien
 Coney-Island
 Grenada,
 Bolivien,
 Argentinien
 Chile
 Paraguay
 Mittel-
 Europa,
 Rhode
 Island,
 Pennsylvanien
 Guatemala
 New York,
 Massachu-
 setts

- tener** Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 249. —
Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 58.
- transmarinus** Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 14.
- troglydites** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 810. —
Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 62. — Klima,
Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 61.
var. *ruficollis* Woll. Cat. Canar. 1864, p. 601. —
Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 62.
- uniformis** J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 244.
— Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 381.
- vagus** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 417.
- varicornis** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIV,
1904, p. 24.
- velutinus** Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887),
p. 700.
- vicinus** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 400.
- Zellichi** Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1903, p. 189. —
Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 61.
- Turkestan
- Brit. Ost-
Afrika
Mittelmeer-
gebiet,
Canar.
Inseln
- Georgien,
Pennsyl-
vanien
- Japan
Grenada
- Panama
- Amazon.
Dalmatien

Subgen. Teropalpus Sol.

- Solier in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 330. — Fauv. Rev. d'Ent. XIX,
1900, p. 182.
- Trogolinus* Sharp, Ent. Monthly Mag. (2) XI, 1900, p. 200.
- coloratus** Sharp, Ent. Monthly Mag. XXXVI, 1900, p. 231.
- luniger** Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) I, 1868, p. 40.
- senex** Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) I, 1868, p. 40.
- suturalis** Sol. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 331, t. 5,
f. 12. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859,
p. 7. — Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864,
p. 128.
var. *melanocephalus* Sol. l. c. p. 331.
- unicolor** Sharp, Ent. Monthly Mag. XXXVI, 1900, p. 232.
— Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 182. —
Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 43.
- Neu-Seeland
Chile
"
"
- Neu-Seeland,
England

Subgen. Troginus Muls. et Rey.

- Muls. et Rey**, Hist. Nat. Col. Fr. Brévip. 1879, p. 317. — Ganglb. Käf.
Mitt.-Eur. II, 1895, p. 648. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 46.
- abdominalis** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 52;
Fn. Hawaiens. III, V, 1908, p. 544.
- boops** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 303.
- exiguus** Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 604;
Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 809. — Kraatz,
Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 877. —
J. Sahlb. Enum. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 180.
— Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 157; Ann.
Mus. Genova XIII, 1878, p. 195. — Muls. et
Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 317. — Klima,
Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 65.
- aberrans** Rosh. Thiere Andalus. 1856, p. 85.
- atomus** Sauley, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864,
p. 658.
- Oahu,
Antillen
Madagaskar
Europa,
Mittel-
meergebiet,
Afrika,
Mada-
gaskar,
Turkestan,
Japan,
Ostindien,
Ceylon,
Sunda-Ins.

- bledioides* Woll. Cat. Canar. 1864, p. 601.
despectus Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 658.
discolor Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 400.
glabricollis Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 552.
luteicornis Muls et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 319.
minimus Kraatz, Archiv Naturg. XXV, 1859, p. 180.
minusculus Motsch. Bull. Mosc. XXIV, 1851, I, p. 144.
despectus Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 400. Nord- und Mittel-Europa, Kaukasus
 — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 157. —
 Mars. Ab. VIII, 1871, p. 376. — Muls. et Rey, Opusc. ent. XIV, 1870, p. 113; Ann. Soc. Linn. Lyon XVIII, 1870, p. 19; Col. Fr. Brévip. 1879, p. 320. — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 65.
exiguus Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 658.
Schneideri Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 659. Borkum
 — Klima, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 66.
taprobanae Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. 1859, p. 52. Ceylon
zealandicus Sharp, Ent. Monthly Mag. XXXVI, 1900, p. 233. Neu-Seeland
 223

Xerophygus Kraatz.

Kraatz, Archiv Natg. XXV, 1859, I, p. 178.

- flavipes* Motsch. Bull. Mosc. XXXIV, 1861, I, p. 143. Ceylon
ocularis Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 95. Sumatra
pallipes Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 505. Ost-Indien
 — Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1859, I, p. 178, t. 3, f. 1a u. b.

3

Blediotrogus Sharp.

Sharp, Ent. Monthly Mag. XXXVI, 1900, p. 234.

- cribricollis* Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 184. Auckland
guttiger Sharp, Ent. Monthly Mag. XXXVI, 1900, p. 234. Neu-Seeland

2

Trogactus Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 702.

- Championi* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1887), p. 702. Panama
elegans Sharp, l. c. p. 702. "
funebis Sharp, l. c. p. 703. "
Gadmani Sharp, l. c. p. 703. "
mirabilis Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 353. Mexiko

5

Parosus Sharp.

- Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 704.
hilaris Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), Panama
 p. 704.
Skalitzkyi Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 12. Antillen

2

Apocellus Er.

Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840 (1840), p. 812. — Kraatz, Naturg. Ina. Deutschl. II, 1850—1858, p. 807. — Lynch, Estaf. Buenos-Aires in Bol. Ac. Nac. Cordoba VII, 1884, p. 373. — Cas. Trans. Amer. Ent. Soc. 1884, p. 153. — Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 694: Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 400.

- albipes** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840 (1840), p. 814. Kolumbien
analis J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 247. Kalifornien,
 — Casey, Trans. Amer. Ent. Soc. 1884, p. 159. Arizona,
 — Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), Louisiana,
 p. 695. Mexiko
argentinus Bernh. Arch. Naturg. 1908, p. 287. Argentinien
barbatus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), Panama
 p. 696.
bicolor Cas. Trans. Amer. Ent. Soc. 1884, p. 154. Nebraska
brevipennis Cas. l. c. p. 158. Louisiana
cognatus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), Louisiana,
 p. 695. Mittel-
 amerika
crassicornis Cas. Trans. Amer. Ent. Soc. 1884, p. 156. Colorado
curtipennis Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, Mexiko
 p. 357.
gracilicornis Cas. Trans. Amer. Ent. Soc. 1884, p. 157. Kalifornien
gracilis Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), Mexiko
 p. 696.
laevis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 401. Amazon.
longipennis Bernh. Arch. Natg. 1908, p. 287. Paraguay
mendozanus Steinh. Atti Soc. Ital. Sci. Nat. XII, 1880, Mendoza
 p. 254.
moestus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), Mexiko
 p. 801.
muticus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887),
 p. 695.
niger Cas. Bull. Calif. Ac. Sc. II, 1886, p. 232. Texas
opacipennis Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, Mexiko
 p. 357.
opacus Bernh. Arch. Naturg. 1908, p. 287. Argentinien
parvipennis Bernh. l. c. p. 288. Paraguay
planus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 401. Amazon.
praestans Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), Guatemala,
 p. 696. Panama
sericeus Wasm. Krit. Verzeichn. Myrmec. 1894, p. 212. Brasilien
sordidus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), Guatemala
 p. 697.
sphaericollis Say, Trans. Am. Phil. Soc. IV, 1834, p. 455. Nord-
 — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 813, Amerika,
 t. 2, f. 5. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, Mexiko,
 1877, p. 248. — Cas. Trans. Amer. Ent. Soc. Guatemala
 1884, p. 155. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I,
 2, 1882—87 (1887), p. 694.

- amabilis* Sachse, Stett. Ent. Zeit. XIII, 1852.
p. 116 (*Falagria*).
globosus Melsh. Proc. Ac. Phil. II, 1846, p. 30.
longicornis Sachse, Stett. Ent. Zeit. XIII, 1852,
p. 116.
stilleoides J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 247. Florida
— Cas. Trans. Amer. Ent. Soc. 1884, p. 161. Antillen
ustulatus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840 (1840), p. 813.
27

Oxytelopsis Fauv.

Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 199.

- apicipennis* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 200. Birma]
cimicoides Fauv. l. c. p. 200. "
genalis Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 96. Perak
madecassa Fauv. l. c. p. 96. Madagaskar]
pseudopsina Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 201. Birma
5

Delopsis Fauv.

Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 198.

- cornuta* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 198. Birma]
microphthalmia Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 95. Java]
— Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 12.
seticornis Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 199. Birma
3

Oxytelodes Bernh.

Bernh. Arch. Naturg. 1908, p. 290.

- Holdhausi* Bernh. l. c. p. 290. Brasilien
1

Hoplitodes Fauv.

Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 109.

- echidne* Fauv. l. c. p. 110. Natal
1

Aploderus Steph.

- Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 321. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 133.
— Muls. et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Brévip. Oxyt. 1879, p. 219.
— Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 71.
Haploderus Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 863.
— Fauv. Fn. gallo-rhén. III. 1872, p. 161. — Ganglb. Käf. Mitt.-
Eur. II, 1895, p. 645.
Phloeonaeus Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 597;
Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 799. — Lacord. Gen. Col. II,
1854, p. 143. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 56.
annectens J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 242. Kalifornien
— Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 77.

- caelatus** Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 103. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39, p. 597; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 800. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 22, f. 106. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 865. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 133. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 161. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 221. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 646. Nord- und Mittel-Europa, Mittelmeerg.
- biarcuatus** Matth. Entom. Mag. V. 1838, p. 198.
- brachypterus** Marsh. Entom. Brit. 1802, p. 510.
- spinipes** Block, Verz. Ins. Flauensch. Gr. p. 116, f. 6.
- caesus** Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—1839 (1837), p. 598; Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 800. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. 1856—58, II, p. 866. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 162. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 224. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 647. Mittel-Europa
- cephalotes** Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 74. Nord-Amerika,
- cordicollis** Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. XIX, 1907, p. 57. Neu-Seeland
- flavipennis** Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 76. Nord-Amerika
- japonicus** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVII. 1907, p. 374. Japan
- linearis** J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 55. — Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 73. Oregon, Kalifornien, Br.-Kolumbien
- princeps** Cas. Ann. N. York Ac. IV, 1889, p. 75. Nord-Amerika
- speculiventris** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 97. Java

10

Anisopsis Fauv.

Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 108

- carinata** Fauv. l. c. p. 109. Zanzibar
- flexuosa** Fauv. l. c. p. 108. Zambesi

2

Oxytelus Grav.²

Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 101. — Mannh. Brachél. 1830, p. 47. — Steph. III. Brit. V, 1832, p. 314. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1837), p. 588; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 785. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 118. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 847. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 55. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 126. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 163. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 43. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 687. — Cas. Ann. N. York Ac. VII. 1893, p. 381. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 633.

- Subgen. *Anotylus* Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 130.
- Subgen. *Caccoporus* Thoms. l. c. p. 127.
- Subgen. *Epomotylus* Thoms. l. c. p. 128.

Subgen. *Emopotylus* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 359.

Subgen. *Oxytelus* s. str.

Subgen. *Tanycraerus* Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 129.

Biologie: Walzl, Isis 1837, p. 277. — Chapuis et Candèze. Mém. Soc. Sc. Liège VIII, 1853, p. 400, t. 2, f. 2. — Muls. et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Brévip. Oxyt. Oxyt. 1879, p. 64, 74, 88. — Rupertsberger, Biol. Lit. Käf. Eur. 1894, p. 124, 125. — Xamheu, Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 1.

- africanus** Luze, Hor. Ross. XXXVII, 1904, p. 83. Tripolis,
Tunis
flavipennis Eppelsch. Berl. Ent. Zeitschr. XXXIII,
1889, p. 313.
- akazawensis** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVII,
1907, p. 379 (*Caccoporus*). Japan
- alpicola** Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 394. Colorado
- alutaceifrons** Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871,
p. 410. St. Helena
- alutellus** Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 120. Gabun
- antennalis** Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 249. Neu-
Kaledonien
- antennarius** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVII,
1907, p. 377 (*Oxytelus* s. str.). Japan
- anticus** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 304. Madagaskar
- antipodum** Bernh. Fauna Südwest-Austral. II, 2, 1908,
p. 15 (*Anotylus*). Südwest-
Australien
- apicalis** Fauv. Ann. Mus. Genova XIII, 1878, p. 494. West-
Australien
- apicicornis** Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 127. Kolumbien
- armatifrons** Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—1887
(1887), p. 692. Panama
- armiger** Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 202. Birma
- asperiventris** Fauv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 260. Neu-
Kaledonien
- atriceps** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 98 (*Anotylus*). Celebes
- aurantiacus** Fairm. Naturaliste II, 1880, p. 236; Ann.
Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 325. Madagaskar
- barbatus** Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 113. Java
- Barbiellinii** Bernh. Arch. Naturg. 1908, p. 292 (*Anotylus*). Brasilien
- bellicosus** Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 202 (*Tany-
craerus*). Birma
- bengalensis** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840 (1840),
p. 789. — Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859,
I, p. 171. Bengal
- Bernhaueri** Ganglb. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLVIII,
1898, p. 400 (*Anotylus*). Österreich,
Ungarn
- bicolor** Walker, Ann. Mag. Nat. Hist. 1859, p. 52. Ceylon
- bidentulus** Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 125. Natal
- bigenimatus** Fauv. Mitt. Mus. Hamburg XXII, 1905,
p. 80. Java
- Boehmi** Bernh. Entom. Blätter VI, 1910, p. 256 (*Ano-
tylus*). Ägypten
- Bohemani** nom. nov. Kapland
picipennis Boh. Ins. Caffr. I, 1848, p. 295 (nec
Steph. *rugosus* var.).
- borealis** Motsch. Schrenck's Reise 1860, p. 119, t. 8, f. 11. Ost-Sibirien
- brasiliensis** Sahlb. Acta Soc. Fenn. II, 2, 1847, p. 803
(*Anotylus*). Brasilien
- breviceps** Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 385. N. York

- brevipennis** Fauv. Mém. Soc. Linn. Norm. XV, 1869, p. 42; Fn. gallo-rhén. III, Cat. Staph. 1875, p. XI nota; Bull. Soc. Norm. (3) II, 1877—78, p. 93. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 370 (*Anotylus*).
- brunneipennis** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 150. — Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 199 nota.
- bubalus** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 97 (*Anotylus*).
- caller** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 790 (*Anotylus*).
- celebensis** Fauv. Rev. d'Ent. V, 1886, p. 145; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 178.
- cephalotes** Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 66.
- Championi** Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 131.
- clavicornis** Fauv. Ann. Mus. Genova XII, 1878, p. 219.
- claviger** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 104.
- clypeatus** Motsch. Schrenck's Reise 1860, p. 119, t. 8, f. 12.
- clypeonitens** Pandellé, Mat. Cat. Grenier 1867, p. 171. — Fauv. Faun. gallo-rhén. III, 1872, p. 174. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 92. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 643 (*Anotylus*).
- cognatus** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 94 (*Anotylus*).
- collaris** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 789.
- colonus** Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 135 (*Tanyraerus*).
- complanatus** Er. Käf. Mk. Brandenh. 1837—39 (1839), p. 595; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 795. — Kratz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 858. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 132. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 172. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 85 — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 642 (*Anotylus*).
- depressus** Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 457.
- pallipes** Steph. III. Brit. V, 1832, p. 319.
- congoensis** Fauv. Arkiv Zool. I, 1903, p. 237.
- convergens** J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 236. — Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 386.
- cordovensis** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 358 (*Caccoporus*).
- coriaceus** Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 250.
- crassicornis** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 92 (*Oxytelus* s. st.).
- crassus** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 106.
- crebratus** Schuh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 377 (*Anotylus*).
- crenaticollis** Fauv. Rev. d'Ent. XXVII, 1908, p. 96.
- crenulifer** Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 117.
- cribriceps** Fauv. Ann. Mus. Genova XIII, 1878, p. 496 (*Anotylus*).
- cribrum** Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 114.
- cuernavacanus** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 359 (*Emopotylus*).
- curticollis** Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 124.
- Algier,
Marokko,
Oran
- Australien
- Java
- Kapland
- Manila,
Celebes
- Himalaya
Guatemala
Neu-Guinea
Abessinien
Behring-Ins.
Mittel-
Europa,
Italien
- Japan
- Tasmanien
West-Afrika
- Europa,
Mittelmeer-
gebiet
- West-Afrika
Florida
- Mexiko
- Neu-
Kaledonien
Japan
- Bolivien
Deutsch-Ost-
Afrika
Abessinien
Gabun
Melbourne
- Sikkim,
Bengalen
Mexiko
- Gabun

- curtus* Bernh. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 219 (*Anotylus*).
densus Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 393.
dentifer Fauv. Ann. Mus. Genova XII, 1878, p. 218.
dentifrons Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 107.
depauperatus Woll. Col. Hesperid. 1867, p. 254.
derasus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 689.
dilutipennis Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 101 (*Anotylus*).
discipennis Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 187 (*Anotylus*).
dispar Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI, 1906, p. 209.
emeritus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 691 (*Anotylus*).
exaratus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 693.
exasperatus Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1859, I, p. 175.
exiguus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 798. — Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 397 (*Anotylus*).
parvulus Melsh. Proc. Ac. Philad. II, 1846, p. 41.
pygmaeus Melsh. l. c. p. 41.
extensicornis Fauv. Mitt. Mus. Hamburg XXII, 1905, p. 79.
externus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 694.
Fairmairei Pand. Mat. Cat. Gren. 1867, p. 172. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 175. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 97. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 644 (*Anotylus*).
transversalis Czwal. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 419.
lallax Fauv. Ann. Mus. Genova XII, 1878, p. 215.
Fauveli nom. nov.
bicolor Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 104 (nec Walker).
ferrugineus Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1859, I, p. 173. — Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 71. — Sharp, Fn. Hawaiens. III, V, 1908, p. 543 (*Caccoporus*).
bledioides Blackb. Trans. R. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 125.
laevior Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 92.
laxipennis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. 1893, p. 527.
- Neu-Holland
Texas,
Maryland
Neu-Guinea
Amaz.,
Antillen
Cap Verd.
Mittel-
Amerika
Gabun,
Kongo,
Kiliman-
djaro
Tasmanien,
N. S. Wales
Tasmanien
Guatemala
Ceylon
Nord-
Amerika
Java
Panama
Mittel-
Europa,
Pyrenäen
Molukken
Madagaskar,
Gabun
Hawai
Ceylon,
Ostindien,
Sunda-Ina.,
Japan,
Hawai,
Seychellen,
Mada-
gaskar,
Comoren,
Zanzibar,
Kolumbien,
Panama,
Antillen

- flavio** Blackb. Trans. Roy. Soc. S.-Austr. XXVI, 1902, p. 24.
- flavipennis** Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1859, I, p. 172.
- flavipes** Fauv. Ann. Mus. Genova XIII, 1878, p. 494.
- foraminosus** Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 118.
- fragilis** Sharp, Biol. Centr.-Am. 1. 2, 1882—87 (1887), p. 691 (*Anotylus*).
- fulgidus** Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 123.
- fulvipes** Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 590; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 187. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 852. — Thoms. Skand. Col. IX, 1861, p. 293. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 167. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 54. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 638 (*Oxytelus* s. st.).
- larandus** Motsch. Etud. Ent. I, 1852, p. 18; Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 554.
- luncheis** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVII, 1907, p. 376 (*Anotylus*).
- fusciceps** Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 179 (*Cacco-porus*).
- fuscicornis** Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 120.
- gabonensis** Fauv. Arkiv Zool. I, 1903, p. 238 (*Anotylus*).
- galla** Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 121.
- Ganglbaueri** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVII, 1907, p. 375 (*Anotylus*).
- gibbulus** Eppelsh. Verh. Ver. Brünn XVI, 1877, p. 122, t. 1, f. 9 (*Anotylus*).
- gigantulus** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 99.
- glareosus** Woll. Ins. Mader. 1854, p. 610. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 66 (*Anotylus*).
- grandis** Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 136 (*Tanyraerus*).
- gregarius** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 414.
- hamacenus** Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 122.
- hamatus** Fairm. et Laboulb. Fn. Fr. I, 1854, p. 612. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. 1856—58, p. 863. — Pand. Mat. Cat. Grenier 1867, p. 172. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 176. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 102. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 644 (*Anotylus*).
- affinis** Czwal. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 420. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 371. — Seidl. Fn. Balt. 1875, p. 248. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 176 nota. — J. Sahlb. Fn. Col. brach. Feun. 1876, p. 177.
- hamuliger** Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 127.
- heterocerus** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 104 (*Anotylus*).
- Australien
- Ost-Indien
- König-Georgs-Sund
- Senegal, Ost-Afrika
- Guatemala, Panama
- Ost-Afrika
- Nord- und Mittel-Europa
- Japan
- Madagaskar
- Zambesi
- Kamerun, Gabun, Usambara
- Abessinien
- Japan
- Kaukasus
- Siam
- Madeira, Canar. Ins., Antillen, Mauritius, Java
- West-Afrika, Usambara
- Japan
- Abessinien
- Mittel-Europa, Italien, Finnland
- Guyana
- Gabun

- heterophthalmus* Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 101. N. S. Wales
- hirtulus* Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 68. Ost-Indien
- hybridus* Eppelsh. Verh. Ver. Brünn XVI, 1877, p. 121 (Anotylus). Kankasus
- Jelskyi* Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 126. Peru
- jessoensis* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVII, 1907, p. 378 (*Tanyraerus*). Japan
- impennis* Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 198; l. c. XIII, 1878, p. 493. Victoria
- impressifrons* M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 150. — Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 200 nota (*Anotylus*). Australien
- inaequalis* Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 127. Argentinien
- incilis* Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 693. Guatemala, Panama
- incisicollis* Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 103. Deutsch-Ost-Afrika
- incisus* Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 504. Ost-Indien
- incolumis* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 791. Nord-
- J. Lec. Trans. Am. Ent. Soc. VI, 1877, p. 235. Amerika,
- Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 391 Süd-
- (*Anotylus*). staaten
- inconstans* Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI, 1906, p. 210. West-
- iners* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 94 Australien
- (*Carcoporus*). Japan
- insecatus* Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 189. — Er. Europa
- Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 589;
- Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 787. — Kraatz,
- Naturg. Ins. Deutschl. 1856—58, p. 852. —
- Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 127. — Fauv.
- Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 166. — Muls. et
- Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 51. — Ganglb.
- Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 637 (*Oxytelus* s. str.).
- carinatus* var. h Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 453.
- nitidus* Steph. III. Brit. V, 1832, p. 318.
- insignitus* Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 188. — Er. Amerika,
- Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 793. — J. Lec. Mauritius,
- Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 236. — Réunion,
- Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), Tahiti,
- p. 689. — Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, Madeira
- p. 384 (*Anotylus*).
- americanus* Mannh. Brach. 1830, p. 48.
- pumilio* Boh. Resa Eugen. 1858, p. 34. — Fauv.
- Rev. d'Ent. X, 1891, p. 91.
- intricatus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 794. Mittel-
- Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58. europa,
- p. 859. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 172. Mittel-
- Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 82. meergebiet
- Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 642
- (*Anotylus*).
- scaber* Rosenh. Thiere Andal. 1856, p. 82.
- inustus* Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 188. — Er.
- Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 593;
- Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 791. — Kraatz,
- Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 856. —
- Fauv. Fn. gallo-rhén. II, 1872, p. 170. — Muls.

- et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 69. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. 1895, II, p. 640 (*Anotylus*).
- mazillozus* Sperk, Bull. Mosc. VIII, 1835, p. 154.
- invenustus* Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 389.
- Kraatzii* nom. nov.
- pulcher* Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1859, I, p. 173 (nec Grav.).
- laevissimus* Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 128.
- laqueatus* Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 513. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 167. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 638 (*Tanyraerus*).
- fuscipennis* Mannh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 233. — Solsky, Bull. Mosc. XLII, 1869, p. 246. — Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 387.
- luteipennis* Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 593; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 792. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 854. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 129. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 65. — Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 688.
- nitens* Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 316.
- plagiatus* Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 554.
- plagifer* Gemm. et Har. Cat. Col. II, 1868, p. 649.
- lateralis* Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI, 1906, p. 207.
- laticornis* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 95 (*Anotylus*).
- latifrons* Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 692.
- latuseculus* Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1859, I, p. 176. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 67.
- sulcifrons* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1875, Cat. p. XI.
- Lewisius* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 95 (*Anotylus*).
- lividus* Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 503. — Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1859, I, p. 171 (*Caccoporus*).
- lobatus* Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 303.
- longicornis* Fauv. Mitt. Mus. Hamburg XXII, 1905, p. 80.
- lucens* Bernh. Stett. Ent. Zeit. LXIV, 1903, p. 34 (*Tanyraerus*).
- lucidus* Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 689.
- madagascariensis* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 793 (*Caccoporus*).
- Magdalenae* Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 132.
- mammillatus* Hochh. Bull. Mosc. XXIV, 1851, III, p. 53.
- marginatus* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 96.
- Maryland
Ost-Indien
- Amazon.
Paläarkt.
Gebiet,
Nord- und
Mittel-
Amerika,
Brasilien
- Australien
- Japan
- Panama
- Indomalay.
Gebiet,
Madagaskar,
Gabun,
Süd-Afrika,
Australien,
Syrien,
Ägypten
- Ost-Indien,
Ceylon,
Shanghai
- Madagaskar
- Java
- Sumatra,
Java
- Guatemala,
Panama
- Madagaskar
- Kolumbien,
Ecuador
- Daurien
- Japan

- megacephalus** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 99.
megaceros Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 201 (*Tany-
craerus*).
megalomerus Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 123.
melas Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 196; l. c.
 XIII, 1878, p. 492.
m-elevatus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI,
 1906, p. 206.
micans Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1859, I, p. 175 (*Tany-
craerus*).
puncticeps Kraatz (♀), l. c. p. 176.

micropterus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI,
 1906, p. 203, t. 18, f. 4.
migrator Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 100.
mimulus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 94
 (*Anotylus*).
minimus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 798.
niticeps Fauv. Rev. d'Ent. XXVII, 1908, p. 96.
monodon Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 130.
montanus Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 388.
munitus Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 385.

myops Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 199.
nanus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840 (1840), p. 797.
 — Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1903, p. 384.
nlger J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 235.
 — Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 392.

nlgriceps Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 171
 (*Caccoporus*).

nimius Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 388.
nitens Fauv. Bull. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, p. XXIV.
nitidifrons Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871,
 p. 411.
advena Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1880, p. 50;
 Trans. Roy. Soc. Dublin III, 1885, p. 223; Fn.
 Haw. III, V, 1908, p. 543. — Fauv. Rev. d'Ent.
 XXI, 1902, p. 65.
nitidipennis Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 102.
nitidulus Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 107. — Er.
 Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—1839 (1839), p. 594;
 Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 795. — Kraatz,
 Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 860. —
 Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 132. — Fauv.
 Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 171. — Muls. et
 Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 76. — Cas. Ann.
 N. York Ac. VII, 1893, p. 394. — Ganglb. Käf.
 Mitt.-Eur. II, 1895, p. 642 (*Anotylus*).
angustatus Steph. III. Brit. V, 1832, p. 320
asper Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 78.
- Ost-Indien
 Ost-Indien,
 Sumatra
 Gabun
 Tasmanien

 Australien
 Ceylon,
 Ost-Indien,
 Mada-
 gaskar,
 Abessinien,
 Kapland
 Tasmanien

 Siam,
 Sunda-Ins.
 Japan

 Kolumbien
 Amani
 Bolivien
 Kalifornien
 Pennsyl-
 vanien
 Australien
 Nord-
 Amerika
 Kalifornien,
 Brit.
 Kolumbien
 Ost-Indien,
 Sunda-I.,
 Ceylon,
 Süd-China
 Pennsyl-
 vanien
 La Plata,
 Montevideo
 Afrik. Inseln,
 Hawai,
 Gabun,
 Zanzibar,
 Birma,
 Philippinen
 Madagaskar
 Paläarkt.
 Gebiet,
 Nord-
 Amerika

- flavipes* Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 318.
pedicellus Grav. Col. Micr. Brunsv. 1832, p. 102.
piceus Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p. 236.
piceus var. Payk. Fn. Suec. III, 1800, p. 384.
punctatus J. Lec. Trans. Am. Ent. Soc. VI, 1877, p. 236.
ruficrus Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 320.
 var. *luridipennis* Luze, Hor. Ross. XXXVII, 1904, p. 84.
subnitidus Reitt. Fauna German. II, 1909, p. 171, nota.
obseurellus Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 131.
obscurifrons Fauv. Ann. Mus. Genova XIII, 1878, p. 494.
occidentalis Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 199.
ocelipitalis Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 116.
ocularis Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 198.
opacicollis Fauv. Ann. Mus. Genova XII, 1878, p. 217.
opacifrons Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 93.
opacinus Bernh. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 221 (*Anotylus*).
opacus Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 851. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 637 (*Oxytelus* s. st.).
paradoxus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 177 (*Tanyraerus*).
parasitus Motsch. Etud. ent. VIII, 1859, p. 69.
parumpunctatus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXVI, 1902, p. 25.
parcepunctatus Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 121.
pennsylvanicus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840 (1840), p. 792. — J. Lec. Trans. Am. Ent. Soc. VI, 1877, p. 235. — Cas. Ann. N. York Ac. VII, p. 390 (*Anotylus*).
Perrisi Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. VI, 1861, p. 42; Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, Bull. p. 34; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 169. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 79. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 640 (*Anotylus*).
maritimus Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 131.
 var. *oceanus* Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 292.
fulvipes Hardy et Bold, Murray Cat.
piceicollis Fauv. Ann. Mus. Genova XIII, 1878, p. 495 (*Anotylus*).
piceus L. Syst. Nat. ed. XII, I, 2, 1767, p. 686. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—1839 (1839), p. 590; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 788. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 853. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 128. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 168. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 60. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 639 (*Caccoporus*).
humilis Heer, Fn. Helv. I, 1838—1842, p. 204.
japonicus Motsch. Etud. Ent. IX, 1860, p. 10.
rugosus Schrank, Fn. Boica I, 1798, p. 648.

Turkestan,
Kaukasus

Franz.
Guyana
Australien
"Java
Australien
Neu-Guinea
Japan
Brasilien

N.-Öster-
reich,
Ungarn,
Süd-
Russland
Bolivien

Ceylon
Australien

Kongo
Östliches
Nord-
Amerika

West-Europa,
Nördl.
Mittel-
Europa,
Tunis,
England,
Schweden

N. S. Wales

Palä-
arktisches
Gebiet,
Japan

- sulcatus* Müll. Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 97. —
Gehl. Bull. Mosc. XXI, 1848, III, p. 79.
- pietficornis* Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 249. Neu-Kale-
donien,
Washington
- placensinus* J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877,
p. 237. — Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893,
p. 392.
- plagiatus* Rosh. Thiere Andal. 1856, p. 81. Spanien
- planus* Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 102. Abessinien,
Sa. Leone,
Natal
- plumbeus* Fauv. Ann. Mus. Genova XII, 1878, p. 218. Neu-Guinea
- politus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840 (1840), p. 794. Österreich,
— Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, Sieben-
p. 859. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, bürgen,
p. 641 (*Anotylus*). Süd-
bisulcatus Petri, Verh. Mitt. Siebenb. Ver. Nat. Ungarn
XLI, 1891, p. 16.
- principalis* Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887),
p. 688. Guatemala
- pubiventris* Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 119. Gabun
- pumilus* Er. Käf. Mk. Brandb. I, 1837—1839 (1839),
p. 596; Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 797. Mittel- u.
— Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856— Süd-
1858, p. 861. — Pand. Mat. Cat. Grenier 1867, Europa,
p. 172. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 173. Russland,
— Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 94. Persien,
— Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 644 (*Ano- Westl.*
tylus). Nord-
spiniventris Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVI, 1897, Afrika
p. 307.
- punctipennis* Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 113. Sikkim
- pusillus* Boh. Ins. Caffr. I, 1848, p. 296. Kapland
- pygmaeus* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 176. Ceylon,
— Sharp, Fn. Hawniens. III, V, 1908, p. 543 Hawaii,
(*Anotylus*). Ost-Indien,
pusillimus Kraatz, l. c. p. 177. Aden
- tenuis* Motsch. Etud. ent. VIII, 1859, p. 70.
- quinquesulcatus* Bernh. Arch. Natg. 1908, p. 291 (*Ano- Brasilien*
tylus).
- Raffrayi* Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 117. Java,
Ost-Indien
- reductus* Fauv. l. c. p. 124. Deutsch-
Ost-Afrika
- rhopalocerus* Fauv. l. c. p. 132. Bolivien
- robusticornis* Luze, Hor. Ross. XXXVII, 1904, p. 82. Turkestan
- robustus* Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 383 Kaschmir
(*Tanycraerus*).
- rubeculus* Fauv. Ann. Mus. Genova XIII, 1878, p. 497. Victoria
- rufinodis* Fauv. l. c. p. 493. Australien
- rufus* Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1859, I, p. 174 (*Ano- Ceylon*
tylus).
- rugicollis* Bernh. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 220 Neu-Holland
(*Anotylus*).
- rugifrons* Hochh. Bull. Mosc. XXII, 1849, I, p. 189. — Nord- und
— Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 637 (*Oxytelus Mittel-*
s. st.). Europa,
elegans Meinert, Ent. Medd. 1890, p. 257 (veris). Kaukasus

- Eppelsheimi* Bethe, Stett. Ent. Zeit. XXVIII, 1867, p. 307. — Kellner, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 358. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 165. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 50.
- rugosus** F. Syst. Ent. 1775, p. 267. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1837), p. 588; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 786. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 850. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 21, f. 102. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 126. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 165. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 47. — Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 391. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 636 (*Oxytelus*).
- basalis* Melsh. Proc. Ac. Phil. II, 1846, p. 41.
- carinatus* Panz. Fn. Germ. LVII, 1798, nr. 24.
- crenatulus* Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 119 (*Omalium*).
- piceus* Ol. Entom. III, 1789—1808, nr. 42, p. 20, t. 3, f. 30.
- picipennis* Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 316.
- pulcher* Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 107.
- striatus* Ström, Act. Nidros. IV, p. 35.
- sulcatus* Fourcr. Entom. Paris I, 1785, p. 168.
- terrestris* Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 462.
- rugulosus** Say, Trans. Am. Phil. Soc. IV, p. 460.
- carbonellus* Solsky, Bull. Mosc. XIII, 1867, p. 266.
- ruptus** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 100 (*Cacco-porus*).
- Sauleyi** Pandellé, Mat. Cat. Grenier 1867, p. 172. — Scriba, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 423. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 175. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 99. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 644 (*Anotylus*).
- Sauteri** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVII, 1907, p. 375 (*Anotylus*).
- scabrellus* Fauv. Ann. Mus. Genova XIII, 1878, p. 496.
- scabripennis* Fauv. Ann. Mus. Genova XII, 1878, p. 216.
- scorpio* Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 107.
- sculptiventris* Fauv. l. c. p. 105.
- sculpturatus* Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 187. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 592; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 790. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 857. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 171. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 72. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 641 (*Anotylus*).
- flavipes* Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 464.
- montivagus* Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 574.
- terrestris* Heer, l. c. p. 205. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. V, 1861, p. 409.
- sculptus** Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 191. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 591;
- Paläark-tisches Gebiet, Nord-Amerika
- Nord-Amerika, Mexiko
- Java
- Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich, Ungarn
- Japan
- Australien
- Molukken
- S. Domingo
- Madagaskar
- Paläarkt. Gebiet, Süd-Afrika, Kapland
- Kosmopolit

- Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 788. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 855. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 21, f. 103. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 128. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 169; Ann. Mus. Genova 1877, p. 32. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 57. — Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 384. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 639 (*Epomotylus*).
antennatus Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 317.
longicornis Mannh. Brach. 1830, p. 48.
moerens Melsh. Proc. Ac. Phil. II, 1846, p. 42.
testaceipennis Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 446.
semirufus Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 202; l. c. XIII, 1878, p. 493 (*Anotylus*).
sericeiventris Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 119.
sexualis Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 342.
Sharpi Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 14 (*Anotylus*).
sikkimi Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 115.
simplex Motsch. Etud. Ent. VIII, 1859, p. 70.
simulator Eppelsh. Ann. Mus. Genova XXXV, 1895, p. 212 (*Epomotylus*).
sobrinus J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 237. — Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 396.
sparsus Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 203; l. c. XIII, 1878, p. 493.
speculiceps Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 133.
speculifrons Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 862 nota. — Pandellé, Mat. Cat. Gren. 1867, p. 171. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 173. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 89. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 643 (*Anotylus*).
speculum Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 106.
spinifer Fauv. Ann. Mus. Genova XII, 1878, p. 216.
spinifrons Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 691 (*Anotylus*).
spinosus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 13 (*Anotylus*).
stipes Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 692.
strilatellus Fauv. Ann. Mus. Genova XIII, 1878, p. 497.
strigiceps Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI, 1906, p. 204.
strigicollis Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 178.
strigifrons Hochh. Bull. Mosc. XXII, 1849, I, p. 187 (*Oxytelus* s. st.).
strigosulus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 690 (*Anotylus*).
striolicollis Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 129.
subaeneus Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 199.
subnitidus Bernh. Arch. Natg. 1908, p. 291 (*Anotylus*).
- West-Australien
Transvaal
Turkestan
Brasilien
Sikkim
Ceylon
Gallas
Kalifornien
Java,
Victoria
Bolivien,
Venezuela,
Kolumbien
Mittelmeergebiet
Peru, Amaz.
Neu-Guinea
Nicaragua
Brasilien
Panama
West-Australien
Australien
Madagaskar
Kaukasus
Mexiko,
Guatemala
Brasilien
West-Australien
Brasilien

- subtilis* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 343.
sulcicollis Gemm. et Har. Cat. Col. II, 1868, p. 650.
sulcatus Solier in Gay, Hist. Chile IV, 1849,
p. 329, t. 6, f. 11 (nec Müll., Gebl.). — Fauv.
Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 128.
uncifer Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 90 (*Anotylus*).
suspectus Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 395.
nitidulus J. Lec. Trans. Am. Ent. Soc. VI, 1877,
p. 237 (nec Grav.).
syriacus Eppelsh. Stett. Ent. Zeit. XLII, 1881, p. 377
(*Anotylus*).
excellens Luze, Hor. Ross. XXXVII, 1904,
p. 81. — Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV,
1905, p. 595.
tenuicornis Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 116.
tetracaratus Block, Verz. Ins. Plauensch. Gr. 1799,
p. 116, f. 5. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872,
p. 176. — Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893,
p. 398. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. 1895, II,
p. 644 (*Anotylus*).
depressus Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 103.
— Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839),
p. 595; Gen. Spec. Staph. 1840, p. 796. — Kraatz,
Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 862.
— Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 132. —
Pand. Mat. Cat. Grenier 1867, p. 171. — Fauv.
Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 176. — Muls. et
Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 104.
opacus Steph. III. Brit. V, 1832, p. 321.
pustulus Mannh. Brach. 1830, p. 48.
tetratoma Czwal. Berl. Ent. Zeit. XIV, 1870, p. 421.
— Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 177. — Muls.
et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 107. — Ganglb.
Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 645 (*Anotylus*).
simplex Pand. Mat. Cat. Gren. 1867, p. 171
(nec Motsch.).
thoracicus Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 504
(*Anotylus*).
tibialis Schub. Deutsche Ent. Zeit. 1908, p. 624 (*Ano-*
tylus).
trisulcicollis Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI,
1906, p. 204.
tuberculatus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI,
1906, p. 204.
uncifer Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 115.
varipennis Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1859, I, p. 172.
varius Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 201 (*Anotylus*).
vegrandis Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 396.
v-elevatus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI,
1906, p. 205.
vermicularis Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 185
(*Oxytelus* s. st.).
viator Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 125.
vicinus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 94.
villis Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 690
(*Anotylus*).

Turkestan
Chile

Venezuela
Nord-
Amerika

Syrien,
Turkestan

Java
Palaarkt.
Gebiet,
Nord-
Amerika

Deutschland,
Frank-
reich,
Kroatien,
Bosnien,
Sieben-
bürgen
Ost-Indien,
Sunda-Ins.
Ost-Indien

Australien

Java
Ceylon,
Ost-Indien

Victoria
Kalifornien
Tasmanien

Gabun

Abessinien,
Zambesi

Japan
Mexiko,
Guatemala
3*

- vulcanus* Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 129. Bolivien
vulneratus Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 197: Victoria
 l. c. XIII, 1878, p. 492.
wattsensis Blackb. Trans. Roy. Soc. Austr. XXVI, 1902, Australien
 p. 23.
 256

Platystethus Mannh.

Mannh. Brachél. 1830, p. 46. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 585; Gen. Spec. Staph. 1839—1840 (1840), p. 781. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 116. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 55. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 838. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 178. — Muls. et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Brévip. Oxypt. Oxytel. 1870, p. 13. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 686. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 627.

Subgen. *Pyctocraerus* Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 125.

Subgen. *Platystethus* Thoms. s. st. l. c. p. 122.

Biologie: Rupertsberger, Biol. Lit. Käf. Eur. 1894, p. 126. — Xambau, Ann. Soc. Linn. Lyon XXXVIII, 1891, p. 181; Mœura VI, p. 123. — Schiodte, Nat. Tidskr. III, 1864, p. 210, t. 11, f. 15—22; t. 12, f. 3. — Bouché, Naturg. Ins. Deutschl. 1834, p. 182, t. 8, f. 14—21.

alutaceus Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 123. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 26. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 631. Europa, Mittelmeergebiet

cornutus Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 450. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 596; Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 782 (ex parte). — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 841 (ex parte). — Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. X, 1802, p. 340. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 180 (ex parte).

tristis Muls. et Rey, Opusc. Ent. XII, 1861, p. 172.

americanus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840 (1840), p. 784. — Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 687. Pennsylvanien, Virginien, Mexiko

arenarius Fourcr. Ent. Paris I, 1785, p. 172. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 179. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 630 (*Pyctocraerus*). Paläarktisches Gebiet

brunnipennis Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 313.

caliginosus Steph. l. c. p. 314.

foveatus Steph. l. c. p. 313.

immunis Steph. l. c. p. 313.

mordax Sahlb. Ins. Fenn. I, 1834, p. 411.

morsitans Payk. Mon. Curcul. App. 1792, p. 145.

— Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 585; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 182. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 842. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 126.

— Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 16.
pallidipennis Panz. Fn. Germ. XXVII, 1796, nr. 16.

striolatus Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 460.

sulcatus Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 507.

trilobus Ol. Ent. III, 1794, nr. 42, p. 20, t. 5, f. 48.

- armatus** Sachse, Stett. Ent. Zeit. XIII, 1852, p. 146.
brevipennis Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 112.
- Burlei** Brisout, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 597. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1873, p. 184. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 40. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 633.
constrictus Scriba, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 157.
 var. *Luzei* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIX, 1899, p. 27.
- capito** Heer, Fn. Helv. I, 1838—1842, p. 208. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 843. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 182. — J. Sahlb. Enum. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 174. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 30. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 631.
cribricollis Baudi, Studi Entom. I, 1848, p. 145.
pilosellus Wankow. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 419. — J. Sahlb. Sv. Ak. Handl. XVII, 1880, nr. 4, p. 98.
- cornutus** Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 109. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 586; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 782. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 841. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 21, f. 101. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 122. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 180. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 23. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 631.
degener Muls. et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Brévip. Oxyp. Oxyt. 1879, p. 26.
maxillosus Peyron, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VI, 1856, p. 432.
scybalarius Runde, Brach. Hal. 1835, p. 19.
 var. *pallidipennis* Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. VII, 1908, p. 124.
- crassicornis** Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 506.
debilis Hochh. Bull. Mosc. XLIV, 1871, p. 161.
- depravatus** Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 341.
exiguus Jacq. du Val, Hist. Cuba IV, 1857, p. 506.
fallax Lynch, Estaf. Buen. Air. in Bol. Ac. Nat. Cordoba VII, 1884, p. 360.
laevis Kiesw. Stett. Ent. Zeit. IX, 1848, p. 325. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 846. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 180. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 19. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 630.
cephalotes Eppelsh. Verh. Ver. Brünn XVI, 1877, p. 120, t. 1, f. 8 (*Pyctocraerus*).
- nifens** Sahlb. Ins. Fenn. I, 1834, p. 413. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 845. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 124. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 184. — Muls. et Rey, Col.
- Kapland
 Sardinien,
 Kleinasien,
 Attika,
 Cypern
 West-Alpen,
 Spanien,
 Italien
- Neusiedler
 See
 Europa,
 Mittel-
 meergeb.
- Paläark-
 tisches
 Gebiet,
 Ost-Indien
- Transkaspien
- Ost-Indien
 Südrussland,
 Preussen,
 Trans-
 kaspien
 Turkestan
 Kuba
 Argentinien,
 Uruguay
 Alpen,
 Kaukasus,
 Appen-
 ninen,
 Korsika
- Europa,
 Mittelmeer-
 gebiet, Cana-
 rische Inseln

- Fr. Brévip. 1879, p. 38. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 632.
- aegyptiacus* Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 506.
- angustipennis* Scribn. Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 158.
- longicornis* Luc. Expl. Alg. Ent. 1849, p. 126, t. 13, f. 7.
- nodifrons* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 783 (ex parte).
- splendens* Heer, Fn. Helv. 1838—42, p. 208.
- striatulus* Heer, l. c. p. 218. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 35.
- nodifrons** Sahlb. Ins. Fenn. I, 1834, p. 412. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 783 (ex parte). — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 844. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 124. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 183. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 27. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 632.
- asphaltinus* Walzl, Isis IV, 1838, p. 267.
- obscurus** Sharp, Biol. Centr.-Am. 1, 2, 1882—87 (1887), p. 687. Mexiko
- operosus** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 91. Japan
- oxytelinus** Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. syst. 1875, p. XI nota (*Ptyctocraerus*). Südspanien, Nord-Afrika
- excavatus* Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 503 (veris).
- longipennis* Eppelsb. Stett. Ent. Zeit. XXXVI, 1875, p. 367.
- macropterus* Weise, Deutsche Ent. Zeit. XIX, 1875, p. 368.
- pallidipes** Lynch, Estaf. Buen. Air. in Bol. Ac. Nac. Cordoba VII, 1884, p. 362. Argentinien
- praetermissus** Eppelsb. Deutsche Ent. Zeit. 1893, p. 58. Baikalg., Mongolei
- Quedenfeldti** Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 147. Japan
- rufospinus** Hochh. Bull. Mosc. XXIV, 1851, III, p. 51. Armenien, Griechenland, Sardinien, Kleinasien
- rugifrons** Bernh. Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 55. Kleinasien
- spectabilis** Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1859, I, p. 170. Ost-Indien
- spiculus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 784. — Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), t. 18, f. 9. Kolumbien, Mittel-Amerika
- spiniornis** Luze, Hor. Ross. XXXVII, 1904, p. 85. Turkestan
- spinosus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 784. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 841 nota. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 182. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 33. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 632. Frankreich, Ungarn, Mittelmeergebiet, Turkestan,
- fossor* Woll. Ins. Mader. 1854, p. 603. Madeira,
- flavipennis* Luze, Hor. Ross. XXXVII, 1904, p. 86. Persien
- strigosulus** Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. syst. 1875, p. XII nota. Syrien

- testaceus Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 506. Ost-Indien
 volgensis Csiki, Zichy's Reise II, 1901, p. 105. Südrussland
 Wankowicz Hochh. Bull. Mosc. XLIV, 1871, p. 162. „
 32

Bledius Mannh.

Mannh. Brach. 1830, p. 44. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 578; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 760. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 134. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 816. — Jacq. du Val. Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 54. — J. Lec. Col. North Am. in Smiths. Misc. Coll. III, 1862, p. 69. — Fauv. Not. ent. V, 1, 1867, p. 21; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 185. — Muls. et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Brévipennes, Oxypt. Oxyt. 1879, p. 109. — Lynch, Bol. Ac. Nac. Cordoba VII, 1884, p. 351. — Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 685. — Casey, Ann. N. York Ac. V, 1889—91 (1889), p. 41. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 610. — Blackb. Trans. Roy. S. Austr. XXVI, 1902, p. 23.

Bledius + *Hesperophilus* Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 307, 309.

Bledius + *Hesperophilus* + *Astycops* Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 118, 120, 121.

Bledius + *Tadunus* + *Bargus* + *Astycops* + *Hesperophilus* Schiedte, Naturh. Tidskr. (3) IV, 1866—67, p. 144—145, 164—165.

Subgen. *Astycops* Muls. et Rey, l. c. p. 195.

Subgen. *Belidus* Muls. et Rey, l. c. p. 215.

Subgen. *Blediodes* Muls. et Rey, l. c. p. 134.

Subgen. *Bledius* n. st. Muls. et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Brévip. Oxypt. Oxyt. 1879, p. 113.

Subgen. *Elbidus* Muls. et Rey, l. c. p. 130.

Subgen. *Hesperophilus* Muls. et Rey, l. c. p. 189.

Subgen. *Pucerus* Muls. et Rey, l. c. p. 212.

Biologie: Schiedte, Nat. Tidskr. (3) III, 1864—65, p. 211—214, t. 12, f. 4—32. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, Suppl. p. 18. —

Rupertsb. Biol. Käf. Eur. 1880, p. 125.

aculeatus Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 69.

addendus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 394.

adelaidae Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1888, p. 49.

adustus Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 62.

affinis Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 556. — Hochh. l. c. XXXV, 1862, III, p. 87.

agonus Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 48.

Akinini Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1887, p. 65 (*Blediodes*).

albidus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 393.

albonotatus Makl. Bull. Mosc. XXVI, 1863, III, p. 193.

amplicolis Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 185.

analisis J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 52.

angustus Muls. et Rey, Opusc. ent. XII, 1861, p. 168 (*Belidus*).

annularis J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 53.

arcticus J. Sahlb. Medd. Fn. Fl. Fenn. 1890, p. 12. — Popp. Medd. Fn. Fl. Fenn. 1902, p. 112 (*Blediodes*).

Kongo

Amazon.

Süd-Australien

Colorado

Kirgisien

Utah

Turkestan

Amazon.

Russ.

Amerika

Neu-Seeland

Illinois

Westl.

Mittelmeer-gebiet

Nord-

Amerika

Skandi-

navien,

Nord-

Russland

- arenarius** Payk. Fn. Suec. III, 1800, p. 382. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 585; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 778. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 826. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 121. — Schiödte, Nat. Tidskr. 1866, p. 150. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 197. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 189. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 624 (*Hesperophilus*).
minor Muls. et Rey, l. c. p. 192.
var. aubniger Schneider, Thiere Bork. 1898, p. 62.
- arenicola** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 112.
- armatus** Say, Journ. Ac. Phil. III, 1823, p. 155. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 779. — J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 51. — Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 43 (*Blediodes*).
- assimilis** Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 55.
- aterrimus** Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 204; l. c. XIII, 1878, p. 499.
- atratus** Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. syst. 1875, p. XIII nota (*Blediodes*).
- atricapillus** Germ. Fn. Ins. Eur. XI, 1835, nr. 4. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 773. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. 1856—58, p. 832. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 203 (ex parte). — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 160. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 619 (*Blediodes*).
var. nanus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 773. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 883. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 163. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 204, Obs. 1. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 620.
- basalis** J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 54.
- Baudii** Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) VI, 1870, p. 47; Fn. gallo-rhén. II, 1872, p. 205. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 164. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 623 (*Blediodes*).
- agricultor** Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 837 (nec Heer).
- neuter* Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 166.
- Bedeli** Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 99 (*Hesperophilus*).
- bellicosus** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 111.
- bicolor** Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 64.
- bicornis** Germ. Fn. Ins. Eur. VI, 1822, nr. 15. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 762. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 819. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 191. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 131. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 617 (*Elbidus*).
- dama** Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 507.
- bifasciatus** Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 686.
- bipustulatus** Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 14 (*Blediodes*).
- Nord-Deutschland, Französische Meeresküsten, Marokko, Tunis
- Borkum
Malabar
Nordamerika
- Illinois,
Jowa
N. S. Wales
- Sardinien
- Mittel-Europa, Mittelmeerg., Transkaspien
- Mittel-Europa
- New York
Mittel-europa
- Algier,
Oran
Sumatra
Kalifornien
Mittel-Europa, Mittelmeergeb., Transkaspien, Turkestan, Buchara
Guatemala
- West-Afrika

- bispluus** Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1859, I, p. 169.
bos Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) V, 1869, p. 20; Mém. Soc. Linn. Norm. XV, 1869, p. 41; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 190. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 360 (*Bledius* s. st.).
atramentarius Rottbg. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 35. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 361.
bosnicus Bernh. Verh. zool-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 700 (*Blediodes*).
brevicens J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 219.
brunnipennis F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 596. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 779. — Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1859, I, p. 168 nota. — Fauv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 151 (*Bledius* s. st.).
productus Walker, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 205 (*Oxytelus*).
rudis Walker l. c. p. 205 (*Oxytelus*).
Campi Bondroit, Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 24.
capra Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. syst. 1875, p. XII nota; Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 97; Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 69 (*Bledius* s. st.).
giraffa Costa, Atti Accad. Sc. Phys. Mat. Napoli VII, 1875, p. 21. — Fauv. Rev. d'Ent. V, 1886, p. 24.
carinicolis Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. syst. 1875, p. XII nota; Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—1878, p. 97.
Caroli Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1888, p. 13.
cavus Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 143.
circularis Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 251.
clarus Fall, Pap. Calif. Ac. VIII, 1902, p. 228.
clavatus Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 60.
claviventris Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 445.
cognatus J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 231.
confusus J. Lec. l. c. p. 228.
conicicollis Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 111.
convexifrons Fauv. Ann. Mus. Genova XIII, 1878, p. 498.
cordatus Say, Trans. Am. Phil. IV, 1834, p. 461. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 780.
cordicollis Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 555. — Hochh. l. c. XXXV, 1862, III, p. 90.
corniger Rosh. Thiere And. 1856, p. 77. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 70 (*Bledius* s. st.).
cornutissimus Woll. Cat. Canar. 1864, p. 594.
Cowleyi Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXVI, 1902, p. 22.

Ost-Indien
 Italien,
 Sardinien,
 Sizilien,
 Algier,
 Oran,
 Tunis
 Süd-Oesterreich,
 Korsika
 New York
 Ost-Indien,
 Ceylon

Belgien,
 Holland
 Aegypten

Algier,
 Tunis

Süd-Australien
 Goldküste

Neu-Kaledonien
 Süd-Kalifornien
 Baikal
 Chile

Texas,
 Carolina
 Oberer See
 Tonkin
 West-Australien
 Virginia

Daurien

Andalusien,
 Corfu,
 Algier,
 Sizilien,
 Canar. Ins.
 Australien

- crassicolis* Boisd. et Lac. Fn. Paris I, 1835, p. 456. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—38 (1839), p. 580; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 770. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 835. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 120. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 208. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 178. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 621 (*Blediodes*).
filum Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 211.
- cribratus* Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 413. Japan
- cribricollis* Heer, Fn. Helv. I, 1838—42 (1838), p. 210. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 209. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 172. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 621 (*Blediodes*). Mittel-Europa, Mittelmeergeb.
- rufipennis* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 770. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 834.
- curticornis* Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 68. Kongo
- curvicornis* Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 412. Japan
- cuspidatus* J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 394. Dakota
- debilis* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 778. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 197 nota. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 625 (*Hesperophilus*). Deutschland, Süd-Russland, Westliches Mittelmeergebiet
- Mulsanti* Rosh. Thiere And. 1856, p. 80. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 827 nota.
- deceptivus* Fall, Pap. Calif. Ac. VIII, 1902, p. 227. Süd-Kalifornien
- defensus* Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) VI, 1870, p. 54; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 212. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 368. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 141. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 618 (*Blediodes*). Frankreich, Belgien, Hessen, Kroatien
- denticollis* Fauv. Bull. Norm. (2) VI, 1870, p. 44; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 202. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 365. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 138. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 618 (*Blediodes*). Mittel-Europa, Finnland, Kaukasus, Sibirien
- obscurus* Muls. et Rey, Op. ent. XIV, 1870, p. 111; Ann. Soc. Linn. Lyon XVIII, 1870, p. 87.
- subsiniatus* Muls. et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Brévip. Oxyt. 1879, p. 109.
- derasus* Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 800. Mexiko
- diagonalis* J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 52. Kalifornien
- diffinis* Baudi, Berl. Ent. Zeit. XIII, 1869, p. 398. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 362. Cypern
- dilutipennis* Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 507. — Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1859, I, p. 170. Ost-Indien
- dimidiatus* J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 232. Florida
- dissimilis* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 769. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 835. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 210. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 175. Mittel-Europa, Kaukasus, Spanien

- Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 622 (*Blediodes*).
 var. *nigricans* Er. l. c. p. 769.
- distans** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 304 (*Pucerus*).
divisus J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 53.
emarginatus Say, Trans. Am. Phil. IV, 1834, p. 461. —
 Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 780 (*Blediodes*).
troglydytes Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840),
 p. 774 (*veris*).
- ensifer** Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 96.
erraticus Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—38 (1839), p. 582;
 Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 772. — Kraatz,
 Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 836. —
 Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 203. — Muls.
 et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 181. — Ganglb.
 Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 622 (*Blediodes*).
- eximius** Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 47.
externus Lynch, Estaf. Buenos Aires in Bol. Ac. Nac.
 Cordoba VII, 1884, p. 353 (*Blediodes*).
fasciatus Say, Journ. Ac. Phil. III, 1823, p. 156. — Er.
 Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 780.
- Fauveli** nom. nov.
phytosinus Fauv. Ann. Mus. Genova XIII,
 1878, p. 499 (nec Lec.).
- femoralis** Gyll. Ins. Suec. IV, 1827, p. 497. — Er. Gen.
 Spec. Staph. 1839—40, p. 768. — Kraatz,
 Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 830. —
 Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 119. — Fauv.
 Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 211. — Muls. et Rey,
 Col. Fr. Brévip. 1879, p. 151. — Ganglb. Käf.
 Mitt.-Eur. II, 1895, p. 620 (*Blediodes*).
- sus* Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. 320.
- Fenyési** nom. nov.
Lecontei Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905,
 p. 14 (nec Sharp).
cribricollis J. Lec. Trans. Am. Ent. Soc. VI, 1877,
 p. 221 (nec Heer).
- ferratus** J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 220.
flavipennis J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 52.
flexicornis Apfelb. Wiss. Mitt. Bosn. X, 1906, p. 638
 (*Hesperophilus*).
- foraminosus** Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 53.
foreipatus J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 54.
fortis J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 219.
fossiventris Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 252.
- fossor** Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 211. — Kraatz,
 Natg. Ins. Deutschl. 1856—58, p. 826 nota. —
 Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 197. — Muls.
 et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 208. — Ganglb.
 Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 626 (*Hesperophilus*).
 ? *grandicollis* Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857,
 IV, p. 507.
- opacus** var. b Fairm. et Laboulb. Fn. Fr. I, 1854,
 p. 603.
- triangulum** Bandi, Studi Entom. I, 1848, p. 143.
 var. *funestus* Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. II, 1883,
 p. 271.
- Madagaskar
 Kanada
 Indiana
- Algier, Oran
 Mittel-
 Europa
- Kalifornien
 Argentinien,
 Uruguay
 Missouri
- Australien
- Nord- und
 Mittel-
 Europa
- Kalifornien
- "
 "
- Bosnien
- Kalifornien
- "
 Texas
 Neu-Kale-
 donien
 Mittelmeer-
 gebiet,
 Schweiz,
 Ungarn
- Balkan-
 Halbinsel

- fracticornis** Payk. Mon. Carab. App. 1790, p. 135. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 579; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 767. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 829. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 118. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 210. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 148. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 620 (*Blediodes*).
- alpestris** Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 219.
- erythropterus** Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 831; Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 220 (Monstr.).
- laetior** Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. Oxyt. 1879, p. 151.
- pallipes** Boisd. et Lacord. Fn. Paris I, 1835, p. 458.
- pallipes gallicus** Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 198.
- var. **elongatus** Mannh. Brachél. 1830, p. 45. — Hochh. Bull. Mosc. XXXV, 1862, III, p. 88. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 72.
- fragilis** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 90.
- fratellus** Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX. 1885, p. 144 (*Belidus*).
- frater** Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 827. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 211. *Fiorii* Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902, p. 60.
- fumatus** J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 52.
- furcatus** Ol. Encycl. méth. VIII, 1811, p. 616. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 615. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 68 (*Bledius* s. st.).
- taurus** Germ. Fn. Ins. Eur. XII, 1825, nr. 2. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 760. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 818. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 20, f. 98. — Fauv. Fn. gallo-rhén. 1872, p. 190. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 114.
- var. **haedus** Baudi. Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 110.
- var. **Skrimshiri** Curt. Ent. Brit. III, t. 143.
- Ruddi** Steph. III. Brit. V, 1832, p. 308, t. 27, f. 3.
- Stephensi** Westw. Zool. Journ. III. 1828, p. 61. nota, t. 2, f. 4 A, B.
- furtivus** Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 45.
- gabonensis** Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 68.
- Ganglbaueri** Bernh. Denkschr. med.-naturw. Ges. Jena XIII, 1908, p. 103 (*Pucerus*).
- gemellus** Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 140 (*Bledius* s. st.).
- gentilis** Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 59.
- Glasunovi** Luze, Hor. Ross. XXXVII. 1904, p. 87 (*Blediodes*).
- gracilicornis** Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1859, I, p. 169 (*Pucerus*).
- gracilis** Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 60.

Europa,
Mittelmeer-
gebiet,
Trans-
kaspien,
Turkestan

Japan
Goldküste,
Togo
Süd-
Frankreich,
Italien
Nord-
Amerika
Mittel-
Europa,
Mittel-
meergebiet,
Kaukasus

Oregon
Kongo
Deutsch-
Ostafrika
Goldküste

Kalifornien
Turkestan,
Trans-
kaspien
Ceylon,
Ostindien
Kalifornien

- Graellsii** Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1865, p. 309; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 194. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 120. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 616 (*Bledius* s. st.).
♀ antilope Peyron, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VI, 1858, p. 431.
tricornis var. B Fairm. et Laboulb. Fn. Fr. I, 1854, p. 600.
gravidus Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 54.
gregarius Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 685.
gularis J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 218.
hamifer Fauv. Ann. Mus. Genova XIII, 1878, p. 499.
Hauseri Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 40.
Helferi Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 112.
heterocerus Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 180 (*Blediodes*).
hinnulus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 762 (*Elbidus*).
honestus Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 66.
hoplites Fauv. Rev. d'Ent. V, 1886, p. 146.
Husseini Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 377 (*Hesperophilus*).
jacobinus J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 220.
ignavus Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 67.
ignobilis Eppelsh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXX, 1880, p. 508.
immaturus Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 345.
ineptus Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 48.
infans Rottbg. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 36. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. syst. 1875, p. XIII, nota. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 366 (*Belidus*).
infantilis Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 686.
injuvundus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1888, p. 14.
inornatus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 685.
insignicornis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XIV, 1891, p. 75.
languidus Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 63.
lateralis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 766.
laticollis J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 227.
Lecontei Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 685.
lectus Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 49.
limbatus Hochb. Bull. Mosc. XLIV, 1871, p. 158 (*Hesperophilus*).
litoralis Heer, Fn. Helv. I, 1838—42 (1838), p. 209. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 204. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 136. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 617 (*Blediodes*).
Westl.
 Mittel-meergebiet,
 Italien,
 Istrien
 Neu-Mexiko
 Guatemala
 Nord-Amerika
 West-Australien
 Buchara
 Birma
 Kroatien
 Südrussland
 New York
 Ostindien,
 Philippinen
 Marokko,
 Algier,
 Senegal,
 Gabun
 Kalifornien
 Rhode Island
 Kaukasus
 Turkestan
 Neu-Mexiko,
 Texas
 Sizilien,
 Algier,
 Tunis
 Mexiko
 Süd-Australien
 Costa Rica,
 Panama
 Victoria
 Oregon
 Kolumbien
 Kalifornien
 Mexiko
 Kalifornien
 Süd-Russland
 Pyrenäen,
 Alpen,
 Ost-Sibirien

- aquarius* Fr. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 766. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 822.
- lividipes* Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 445. Chile
- longipennis* Mäkl. Bull. Mosc. XXV, 1852, II, p. 318. Russ.
Amerika
- longulus* Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 579; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 768. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 830. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 207. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 146. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 619 (*Bledius*). Mittel-Europa,
Dalmatien
- ruficornis* Muls. et Rey, l. c. p. 155.
- var. *nigripennis* Bernh. Entom. Bl. VI, 1910, p. 256.
- lucidus* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 90 (*Hesperophilus*). Japan,
China,
Ostindien,
Sunda-Ins.,
Madagaskar,
Australien
- capitalis* Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 204.
- Fischeri* Bernh. Stett. Ent. Zeit. LXIV, 1903, p. 35. Madagaskar
Kalifornien
Chile
- lugubris* Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 305.
- luteipennis* J. Lec. Trans. Am. Ent. Soc. VI, 1877, p. 227.
- maculipennis* Sol. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 332. — Kraatz, Berl. Ent. Zeit. III, 1859, p. 7 (*Tero-
palpus*).
- irroratus* Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 127.
- madagascariensis* Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 169 (*Hesperophilus*). Madagaskar
- magniceps* Reitt. Wien Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 186 Transkaspien
(*Belidus*).
- Maïndroni* Fauv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 151. Ostindien
- mandibularis* M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 150. — Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 204 nota. Australien
- melanocephalus* Say, Journ. Ac. Phil. III, 1823, p. 156. — Fr. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 780. Missouri
- microcephalus* Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 72. Kolumbien
- miles* Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital. LX, 1909, p. 232. Argentinien
- minax* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. X, 1888, p. 14. Süd-Australien
- minusculus* Motsch. Bull. Mosc. XXXIV, 1861, I, p. 144. Ceylon
- misellus* Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 68. Texas
- modestus* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 306. Amazon.
- monstratus* Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 46. Kalifornien
- monticola* Cas. l. c. p. 58.
- morio* Heer, Fn. Helv. 1838—42, p. 211. — Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 161; l. c. XXI, 1902, p. 72. Schweiz,
Frankreich,
Spanien,
Portugal,
Algier,
Tunis
- hispidulus* Fairm. et Laboulb. Fn. Fr. I, 1854, p. 601. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 825 nota. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 199. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 202. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 625 (*Hesperophilus*).

- muticus** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 395.
nebulosus Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 57.
neglectus Cas. l. c. p. 69.
- niloticus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 776. —
 Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 71.
nitidicollis Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr.
 XXIX, 1885, f. 142.
- nitidiceps** J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 224.
nitidicollis J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 52.
obscurus Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 556.
 — Hochh. Bull. Mosc. XXXV, 1862, III, p. 85
 (*Blediodes*).
- obsoletus** Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) VI, 1870,
 p. 49; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 207. — Mats.
 Ab. VIII, 1871, p. 367 (*Blediodes*).
- obtusus** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 413.
occidentalis Bondroit, Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p.
 245.
- opacicollis** Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 59.
opacifrons J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 224.
opaculus J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 54.
opacus Block, Verz. Ins. Plauensch. Gr. 1799, p. 117,
 f. 7. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839),
 I, p. 581; Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 771.
 — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—1858,
 p. 828. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 119. —
 Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 204. — Muls.
 et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 157. — Ganglb.
 Käf. Mitt.-Eur. 1895, II, p. 619 (*Blediodes*).
castaneipennis Mannh. Brach. 1830, p. 45.
divisus Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 510.
haemopterus Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 310.
 var. *extensus* Motsch. Bull. Mosc. 1860, II, p. 555,
 — Hochh. l. c. 1862, III, p. 87.
 var. *sinuatocollis* Gerhardt, Deutsche Ent.
 Zeitschr. 1899, p. 218.
- orientalis** nom. nov.
lividipes Fairm. Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 90
 (nec Fairm. et Germ.).
- ornatus** J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 53; Trans.
 Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 230.
- orphanus** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 91.
ovensis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XIV, 1891,
 p. 76.
- palliatu**s Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 203.
pallipennis Say, Journ. Ac. Phil. III, 1823, p. 155. —
 Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 779.
mandibularis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40
 (1840), p. 765.
- pallipes** Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 197. — Er. Gen.
 Spec. Staph. 1839—40, p. 772. — Kraatz,
 Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 824. —
 Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 201. — Muls.
 et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 143. —
 Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 618.
- Amazon.
 Iowa
 Rhode
 Island
 Aegypten,
 Algier,
 Syrien,
 West-
 afrika,
 Madagaskar
 Kalifornien
 New York
 Mongolei,
 Mand-
 schurei
 Pyrenäen
- Japan
 Holland,
 Belgien
 Baikal
 Kalifornien
 Maine
 Europa,
 Algier,
 Oran,
 Nord-
 Amerika
- Obock,
 Ostafrika
- Kalifornien
- Japan
 Victoria
- Birma
 Nord-
 Amerika
- Nord- und
 Mittel-
 europa,
 Ostsibirien

- juscipes* Rye, Ent. Monthly Mag. II, 1865, p. 154.
rastellus Thoms. Skand. Col. IX, 1867, p. 291.
terebrans Schiødte, Nat. Tidskrift 1866, p. 149.
vilis Mäklin, Öfv. Finska Vet. Soc. XIX, 1876—77,
 p. 22; Sv. Akad. Handl. XVIII. 1881, p. 38.
 — J. Sablb. 1. c. XVI, 1880, p. 98.
- parvicollis* Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 65. Kalifornien
parvulus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 775. Kolumbien
Perrieri Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 305. Madagaskar
Petzi Bernh. Denkschr. med.-naturw. Ges. Jena XIII,
 1908, p. 104 (*Pucerus*). Deutsch-
 Ostafrika
phytosinus J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, Kalifornien
 p. 231.
Lecontei Duvivier, Cat. 1883, p. 187.
- picipennis* Hochh. Bull. Mosc. XXII, 1849, I, p. 182. Kaukasus
pllicollis Bernh. Denkschr. med.-naturw. Ges. Jena XIII, Angola
 1908, p. 103 (*Bledius* s. st.).
pleuralis J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, Kalifornien
 p. 229.
- polltus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 766. Carolina
pontilis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXVI, 1902, Australien
 p. 22.
- Poppiusi* Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 248. — Nord-Russ-
 Popp. Medd. Soc. Fn. Fl. Fenn. 1902, p. 111 land
 (*Blediodes*).
- procerulus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840 (1840), Mitteleuropa
 p. 768. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II,
 1856—1858, p. 832. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III,
 1872, p. 208. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip.
 1879, p. 169. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895,
 p. 621 (*Blediodes*).
- pueches* Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) I, 1868, p. 23. Chile
pulchellus Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1859, I, p. 169. Ceylon
pumilio Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 775. Kolumbien
punctatissimus J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, Kalifornien
 p. 226.
- pusillus* Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), Deutschland,
 p. 583; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 773. Österreich,
 — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, Frank-
 p. 833. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, reich
 p. 623 (*Blediodes*).
- pygmaeus* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 205.
 — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 167.
- pygmaeus* Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), Österreich,
 p. 583; Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 774. — Deutsch-
 Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. 1856—58, land,
 — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 623 Frank-
 (*Blediodes*). reich,
agricultor Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 576. — Piemont
 Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58,
 p. 837.
- pusillus* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 206. —
 Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 186.
- rarus* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 394. Amazon.
rectangulus Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, Baikal
 p. 61 (*Hesperophilus*).
relictus Fall, Pap. Calif. Ac. VIII, 1902, p. 228. Süd-Kali-
 fornien

rossicus nom. nov.

gracilicornis Popp. Ann. Mus. Petersb. 1905, p. 313 (nec Kraatz).

rotundicollis J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 223.

rubiginosus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 765.

ruficornis J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 53.

rulipes Germain, An. Univ. Chile 1855, p. 390.

rugosicollis Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 43.

rugosulus Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 61.

rusticus Fall, Pap. Calif. Ac. VIII, 1902, p. 229.

sellatus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 413.

semiferrugineus J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 52.

similis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 396.

simplex Sharp, l. c. p. 395.

simpliciventris Apfelb. Wiss. Mitt. Bosn. X, 1907, p. 638 (*Blediodes*).

simulator Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 344 (*Bledius* s. st.).

sinuatus J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 228.

spectabilis Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 821 nota: Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 126; l. c. XII, 1868, p. 347. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 195. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 117. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 616 (*Bledius* s. st.).

tricornis Fairm. et Laboulb. Fn. Fr. I, 1854, p. 600. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1865, p. 319.

stabilis Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 61.

strenuus Cas. l. c. p. 44.

strictus Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) VI, 1870, p. 53; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 211 nota. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 368. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 619 (*Blediodes*).

subopacus Bernh. Denkschr. med.-naturw. Ges. Jena XIII, 1908, p. 104 (*Pucerus*).

subterraneus Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 584; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 177. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 823. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 200. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 199. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 624 (*Hesperophilus*).

pallipes Thoms. Skand. Col. III. 1861, p. 119; IX, p. 291.

raatellus Schiødte, Nat. Tidskr. (3) IV, 1866—67, p. 149.

ruturalis J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 54.

talpa Gyllb. Ins. Suec. II, 1810, p. 448. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 777. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. 1856—58, p. 823. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 122. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 200. — Muls. et Rey,

Nord-

Russland

Nehraska

Carolina

Kalifornien

Chile

Ceylon

Baikal

Süd-Kalifornien

Japan

Nord-

Amerika

Amazon.

„

Bosnien,

Kleinasien

Turkestan

Canada,

Illinois

Mitteuropa,

östl. Mittel-

meergebiet,

Tunis,

Oran,

Trans-

kaspien,

Buchara,

Turkestan

Pennsyl-

vanien

Kalifornien

Schweiz,

Piemont,

Syrien,

Tirol

Deutsch-Süd-

westafrika

Mitteuropa,

Skandi-

navien,

Finnland

Kalifornien

Nördl.

Mittel-

europa,

Skandi-

navien,

- Col. Fr. Brévip. 1879, p. 196. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 624 (*Hesperophilus*).
- tau** J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 230.
- tenuis** Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 50.
- testaceipennis** Lynch, Estaf. Buenos Aires in Bol. Ac. Nac. Cord. VII, 1884, p. 353.
- tibialis** Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 212. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 825. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 199. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 205. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 626 (*Hesperophilus*).
pubescens Kol. Melet. Ent. III, 1846, p. 25.
- tricornis** Herbst in Fuessly, Arch. Insekteng. V, 1784, p. 149, t. 30, f. 8. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 578. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 821; Berl. Ent. Zeitschr. 1868, p. 347. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 118. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 193. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 122. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 615 (*Bledius* s. st.).
armatus Panz. Fn. Germ. 66, 1799, p. 17.
diota Schiedte, Nat. Tidskr. (3) IV, 1866—67, p. 146.
nuchicornis Muls. et Rey, Opusc. Ent. XII, 1861, p. 165.
- tristis** Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 92. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 198. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 192. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 626 (*Hesperophilus*).
brevicollis Muls. et Rey, Opusc. Ent. XII, 1861, p. 170. — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 399 nota.
- tuberculatus** F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 181. — Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 168. — Fauv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 151 (*Pucerus*).
- turbulentus** Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 70.
- turgidus** Cas. l. c. p. 52.
- unicornis** Germ. Fn. Ins. Eur. XII, 1825, nr. 3. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 764. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 820. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 20, f. 99. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 192. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 128. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 616. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 70 (*Bledius* s. st.).
hispidus Parfitt, Zoologist 1857, p. 5409.
juvencus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 763.
monoceros Rosh. Thiere Andal. 1856, p. 78.
var. *galeatus* Woll. Cat. Canar. 1864, p. 594.
crenulatus Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. II, 1867, p. 222.
Winkleri Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 588.

Finnland,
Russland
New York
Nevada
Argentinien

Mittel-
Europa,
Italien,
Kaukasus,
Norwegen

Europa,
Kaukasus,
Trans-
kaspien,
Turkestan,
Klein-
asien,
China

Provence,
Italien,
Sizilien,
Algier,
Korsika,
Ägypten,
Tunis

Ost-Indien,
Ceylon,
Ägypten,
Betschna-
naland

Florida
Colorado

Mittel-
Europa,
Mittel-
meergebiet,
Kaukasus

- verres** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 776. — Kraatz, Natg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 819, nota. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 20, f. 100. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 196. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 212. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 627. (*Pucerus*).
cinctus Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 555. — Hochh. l. c. XXXIV, 1862, III, p. 84.
- victoriae** nom. nov. *infans* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XIV, 1891, p. 76 (nec Rottb.).
- villosus** Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 57.
- vitulus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 761 (*Bledius* s. st.).
januvianus Woll. Cat. Canar. 1864, p. 593.

Mittel-
meergebiet

Victoria

Kalifornien
Arabien,
Spanien,
Canar.
Inseln,
Nordafrika,
Senegal

229

Typhlobledius Lea.

Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXI, 1906, p. 200.

cylindricus Lea, l. c. p. 200.

Tasmanien

I

5. Subtribus: **Thinobii**.**Sciotrogus** Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 1882—87 (1887), p. 707.

opacus Sharp, l. c. p. 707.

Panama

I

Thinobius Kiesw.

Kiesw. Stett. Ent. Zeit. V, 1844, p. 355. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 147. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 57. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 881. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 134; Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 83—89. — Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 705. — Casey, Ann. N. York Ac. V, 1889—91 (1889), p. 78. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 659.

Thinophilus + *Thinobius* Muls. et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Brévip. Oxyp. Oxyt. 1879, p. 322, 342.

Subgen. **Thinophilus** Muls. et Rey.

Muls. et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Brévip. Oxyp. Oxyt. 1879, p. 322. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 660.

algericus Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 94.

Algier

allocerus Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 64.

Baikal

angusticeps Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 83, 84. —

Bayern,

Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 661.

England,

49

- major* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 135. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 327.
- antennarius* Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 261.
- Apfelbecki* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 580.
- brevicornis* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 581.
- brunneipennis* Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 884. — Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 83. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 662. — Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1908, p. 334.
- crassicornis* Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 87.
- delicatus* Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 884 nota. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 136; Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 84, 86. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 334. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 663.
- var. Bernhaueri* Ramb. Act. Soc. Ent. Boh. VII, 1910, p. 98.
- dissimilis* Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 707.
- diversicornis* Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 84, 86. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 661.
- Ernesti* Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1908, p. 322.
- heterocerus* Fauv. Not. Ent. IX, 1886, p. 10; Rev. d'Ent. V, 1889, p. 86; Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 58.
- heterogaster* Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 84, 87. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 662.
- Klimai* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 700.
- Nigeris* Pyot, Ann. Soc. Ent. Fr. 5, IV, 1874, p. 79, t. 2, f. 21. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, Suppl. p. 31. — Eppelsb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1878, p. 402. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 336. — Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 88. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 663.
- linearis* Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 883. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 135; Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 83, 85. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 330. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 662.
- longicornis* J. Sahlbg. Not. Sällsk. Fn. Flor. Fenn. XIII, 1871—74, p. 488; Enum. Brach. Fenn. 1876, p. 181.
- luteipennis* Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 329.
- major* Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 883. — Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 85. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 661.
- brevicollis* Muls. et Rey, Opusc. Entom. XIV, 1870, p. 114; Col. Fr. Brévip. 1879, p. 325.
- micrus* Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) V, 1869, p. 163; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 137; Rev. d'Ent. VII, 1889, p. 84, 87. — Mars. Ab. VIII, 1871,
- Savoyen
- Texas
- Bosnien
- Bosnien
- Thüringen,
Österreich
- Texas
- Mittel-
Europa,
Kaukasus,
Algier,
Kalifornien
Ost-Rumelien
- Panama
- Frankreich,
Böhmen
Österreich
Algier
- Spanien,
Böhmen,
Korfu,
Rumelien,
Bosnien
Österreich,
Mähren
- Frankreich,
Böhmen,
Mähren,
Kärnten
- Mittel-
Europa,
Italien,
Algier,
Tunis,
Kaukasus,
Bosnien
- Frankreich,
Tirol,
Bayern,
Kaukasus,
Norwegen
- Süd-
Frankreich,
Italien

- p. 380. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 332. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 663.
- minor** Muls. et Rey, Opusc. Ent. XIV, 1870, p. 116; l. c. XVIII, p. 92; Col. Fr. Brévip. 1879, p. 338. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 136 nota; Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 85. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 379. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 664. Süd-Frankreich
- nitens** Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) V, 1869, p. 163; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 137, t. 2, f. 3; Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 84, 88. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 380. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 340. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 664. Süd-Frankreich
- nodicornis** Eppelsh. in Radde, Fauna und Flora Caspi-Geb. (Verh. Nat. Ver. Brünn) 1886, p. 196; Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 206. Lenkoran
- obscurus** Eppelsh. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 208. Kaukasus, Süd-Frankreich
- Petzi** Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1908, p. 321. Österreich
- procerus** Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 63. Baikal
- quadricollis** Eppelsh. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 207. Kaukasus
- silvaticus** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIX, 1899, p. 436. Steiermark, Österreich
- validus** Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 88. Kalifornien

Subgen. *Thinobius* s. str.

- appendiculatus** Sahlb. Sv. Ak. Handl. XVII, 1880, nr. 4, p. 100, t. 1, f. 16. Ost-Sibirien
- atomus** Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) V, 1869, p. 165; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 139, t. 2, f. 4. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 381. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 349. — Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 84, 89. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 665. Mittel-Europa, Kaukasus, Oran, Mittel-Russland
- bacillus** Bernh. Arch. Natg. 1908, p. 288. Paraguay
- brevipennis** Kiesw. Steff. Ent. Zeit. XI, 1850, p. 221; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. 432. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 885. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 139 nota; Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 84, 89. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 348. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 665. Deutschland, England, Ungarn
- curtellus** Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2. 1882—87 (1887), p. 706. Guatemala
- limbriatus** J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 240. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 263. — Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 84. Michigan
- flavicornis** J. Lec. l. c. p. 240. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 263. — Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 81. New York
- gilvus** Fauv. Rev. d'Ent. XVIII, 1899, p. 71. Korfu, Nord-Afrika
- gracileornis** Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 87. Kalifornien

- grossulus* Cas. l. c. p. 81.
hesperius Cas. l. c. p. 84.
iridipennis Fauv. Bull. Soc. Ent. Norm. (2) I, 1868, p. 43.
longipennis Heer, Fn. Helv. I, 1838—1842, p. 595. —
 Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. 1856—58, II,
 p. 885. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858,
 t. 22, f. 107. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872,
 p. 138; Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 84, 88. —
 J. Sahlb. Enum. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 181.
 — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 345. —
 Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 664.
ciliatus Kiesw. Stett. Ent. Zeit. V, 1884, p. 355.
opacus Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879,
 p. 847.
Wenkeri Fauv. Mat. Cat. Grenier 1863, p. 41.
 var. *pusillimus* Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 347.
 — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr., V, 1861, p. 411.
 — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 138 nota.
 — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 347.
 — Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 88. —
 Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 665.
macropterus J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 241. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 262. — Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 82.
minutissimus Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, Suppl. p. 14; Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 84, 89. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 665.
nigricans Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 706.
nitidulus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 11.
ocularis Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 179.
oxytelinus J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 240. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 262. — Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 79.
pallidicornis Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 80.
pallidus Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 86.
perpusillus Rambous. Vestn. česk. spol. Nauk II, 1909, p. 20.
pygmaeus Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 85.
seminiger Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 451.
sonomae Cas. Ann. N. York Ac. V, 1889, p. 83.
speciosus Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 352.
tenuis Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 705.
thripsoides Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 705.
- New York
 Kalifornien
 Chile
 Europa,
 Mittel-
 meergebiet
- Kalifornien
- Frankreich,
 Österreich,
 Korsika
 Guatemala
- Antillen
 Algier
 Kalifornien
- Texas
 „
 Bulgarien
- Nevada
 Chile
- Kalifornien
 Mexiko
- Guatemala
- Mexiko

Subgen. 'Thinobiellus Bernh.

Bernh. Entom. Blätter V, 1909, p. 198.

rossicus Bernh. Ent. Bl. V, 1909, p. 198.

Süd-Russland

10. Tribus: **Osoriini.**

- Oxytelini* Subtribus *Osorini* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 753.
Oxytelides Sous-tribu *Osoriides* Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 111.
Osorii Fauv. Faun. gallo-rhén. III, 1872, p. 213 nota.
Oxytelini Group *Osorii* J. Lec. et Horn, Classif. Col. North Amer. 1883, p. 102.
Oxitelini I, *Osoraria* Lynch, Estaf. Buenos Aires in Bol. Ac. Nac. Cordoba 1884, p. 344.
Oxytelinae Group *Osoriina* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 677.

1. Subtribus: **Osorii.**

Cylindropsis Fauv.

Fauv. Rev. d'Ent. IV, 1885, p. 182.

Cylindrogaster Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) VI, 1870, p. 55; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 213.

- | | |
|---|----------|
| <i>africana</i> Peyerimh. Bull. Soc. Ent. Fr. 1905, p. 186. | Algier |
| <i>balearica</i> Breit, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVIII, 1908, p. 60. | Mallorka |
| <i>corsica</i> Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) VI, 1870, p. 55; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 213, t. 2, f. 17. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 361. — Sauley, Bull. Soc. Hist. nat. Metz XV, 1878, p. 122. | Korsika |
| <i>sardoa</i> Sauley, Bull. Soc. Hist. Metz XV, 1878, p. 123. | |

3

Paragonus Fauv.

Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 197.

- | | |
|--|------------|
| <i>acuticollis</i> Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 134. | Sumatra, |
| | Ost-Indien |
| <i>birmanus</i> Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 197. | Birma |
| <i>heterocerus</i> Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 134. | Sumatra, |
| | Java |

3

Mimogonus Fauv.

Fauv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 261.

- | | |
|--|--|
| <i>fumator</i> Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 246; Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 261. — Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 359. | Sunda-Inseln,
Neu-Kaledonien,
Madagaskar,
Guadeloupe,
Mexiko |
| <i>microps</i> Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 412. | Japan |
| <i>rufipennis</i> Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 508. | Ost-Indien |

3

Craspedus Bernh.

Bernh. Arch. Natg. 1908, p. 296.

Jheringi Bernh. l. c. p. 296.

Brasilien

1

Holotrochus Er.

Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 757. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 113. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 807. — Fauv. Not. Ent. V, 1867, p. 46. — Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 387; Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 682.

anophthalmus Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 188.
brachypterus Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 136.
minor J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877,
 p. 216 (nec Fauv.).

Neu-Seeland
 Florida,
 Carolina

brasiliensis nom. nov.

Brasilien

brevipennis Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905,
 p. 15.

brevipennis Broun, Man. N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1034.
caledoniae Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 245.

Neu-Seeland
 Neu-
 Kaledonien

centralis Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887),
 p. 684.

Guatemala,
 Nicaragua
 Madagaskar

coriaceus Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 306.**crassicollis** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 758.**curticollis** Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 115.**cylindrus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 758.**durus** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 388.**Fairmairei** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 309.**ferrugineus** Broun, Man. N. Zeal. Col. V, 1893, p. 1034.

Portorico
 Amazon.
 Madagaskar
 Neu-Seeland

— Fauv. Rev. d'Ent. XVIII, 1899, p. 186.

glaber Scriba, Stett. Ent. Zeit. XVI, 1855, p. 301.**Helmsi** Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 187.**laevicauda** J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1866, p. 376; Trans.

Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 216. — Fauv. Rev.
 d'Ent. XXIV, 1905, p. 136.

Venezuela
 Neu-Seeland
 Illinois,
 Neu-
 Mexiko,
 Louisiana

laticollis Bernh. Arch. Natg. 1908, p. 295.

marginatus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887),
 p. 684.

Brasilien
 Guatemala

marginicollis Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 308.**microphthalmus** Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 188.**minor** Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 437;

Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 135.

Madagaskar
 Neu-Seeland
 Venezuela

minuseulus Fauv. Ann. Mus. Genova XV, 1879—80, p. 79.

Mysol,
 Borneo
 Madagaskar

nigrita Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 307.**nitescens** Fauv. l. c. p. 307.

picescens Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887),
 p. 683.

Guatemala

politus Sharp, l. c. p. 683.**pubescens** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 390.**pubiventris** Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 73.**punctulatus** Scriba, Stett. Ent. Zeit. XVI, 1855, p. 301.

rufopygus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887),
 p. 683.

Guatemala

simplex Sharp, l. c. p. 683.

..

- specularis* Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 308. Madagaskar
subtilis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 391. Amazon.
syntheticus Sharp, l. c. p. 389. "
uniformis Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), Panama
p. 684.
vagepunctus Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 187. Neu-Seeland
volvulus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 758, t. 2, f. 4. Portorico
37

Oephronistus Blackb.

- Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXVI, 1902, p. 20.
australicus Blackb. l. c. p. 21. Victoria
1

Anoncosorius Bernh.

- Bernh. Arch. Natg. 1908, p. 292.
Kllmschi Bernh. l. c. p. 293. Brasilien
1

Osorius Latr.

- Latr. Règne anim. IV, 1829, p. 438. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 753. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 112. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 806. — Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 381; Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 677. — Lynch, Estaf. Buenos Aires in Bol. Ac. Nac. Cordoba VI, 1884, p. 345.
Molosoma Say, Trans. Am. Phil. Soc. (n. s.) IV, p. 462.
Biologie: Lacord. Nouv. Ann. Mus. Paris II, 1833, p. 65. — Coquerel, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 180, t. 7, nr. 4, f. 3a. — Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 167. — Candèze, Mém. Soc. Sc. Liège 1861, p. 331, t. 1, f. 3.
affinis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 385. Amazon.
alutaceus Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIV, 1904, p. 17. Madagaskar
angustulus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 89. Japan
assiniensis Fauv. Arkiv Zool. I, 1903, p. 238. West-Afrika
asymmetricus Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 72. Venezuela,
canaliculatus Sharp, Rev. d'Ent. X, 1891, p. 91 Kolumbien,
(nec Solsky). Panama
ater Perty, Del. anim. 1834, p. 30, t. 7, f. 1. — Er. Gen. Brasilien
Spec. Staph. 1839—40, p. 754.
cornutus Cast. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 395.
bicornis Heller, Abh. Mus. Dresd. VII, 1898, nr. 3, p. 4. Celebes
boops Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), Panama
p. 679.
brasilienis Guér. Ic. Ins. 1829—44, t. 9, f. 11a—d. — Brasilien
Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 755.
calvus Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 406. Himalaya
canaliculatus Solsky, Bull. Mose. XLII, 1869, p. 265. Mexiko
— Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887),
p. 678, t. 18, f. 3. — Fauv. Rev. d'Ent. XX,
1901, p. 73.

- cariniellus* Fauv. Ann. Mus. Genova XII, 1878, p. 211.
celebesus Heller, Abh. Mus. Dresd. VI, 1897, p. 2.
constrictus Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 196.
cordicollis Fauv. Notes Leyd. Mus. IV, 1882, p. 58 nota.
cordovens Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 360.
crassus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 681.
cylindricus Latr. Nouv. Ann. Mus. Paris I, 1832, p. 86.
 — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 756. — Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 680.
debilis Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 681.
dentatus Bernh. Arch. Natg. 1908, p. 294.
discicollis Fauv. Ann. Mus. Genova XV, 1879—80, p. 78.
dubius Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 679.
Eggersi Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIV, 1904, p. 19.
Eppelsheimi Bernh. l. c. p. 18.
frater Lynch, Estaf. Buenos Aires in Bol. Ac. Nac. Cordoba VII, 1884, p. 345.
frontalis Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 134.
germanus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 680.
hamatensis Fauv. Ann. Mus. Genova XII, 1878, p. 267.
hirtulus Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 92.
hirtus Fauv. Ann. Mus. Genova XII, 1878, p. 211.
impennis Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 306.
incisierurus Latr. Nouv. Ann. Mus. Paris I, 1832, p. 85.
 — Klug, Ins. Madag. 1832—34, p. 139, t. 1, f. 13.
 — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 755.
incisilrons Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 195.
integer Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 384.
intermedius Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 754.
Kraatzii nom. nov.
rugiceps Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1859, I, p. 166.
laevicollis Bernh. Arch. Natg. 1908, p. 294.
laevigatus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 679.
latimargo Bernh. Arch. Natg. 1908, p. 294.
latipes Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 198. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 757. — Say, Trans. Am. Phil. Soc. IV, 1834, p. 462.
mexicanus Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 360.
micros Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 682.
mundus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 432; Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 681.
neotropicus Bernh. Arch. Natg. 1908, p. 295.
nigiriensis Fauv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 152.
nitens Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 382.
oculatus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 386.
- Neu-Guinea
 Celebes
 Birma
 Sumatra
 Mexiko
 Mexiko,
 Guatemala
 Mexiko
 Panama
 Bolivien
 Neu-Guinea
 Panama
 St. Thomas
 Sunda-Ins.
 Argentinien
 Sumatra,
 Java
 Guatemala
 Neu-Guinea
 Venezuela
 Neu-Guinea
 Madagaskar
 "
- West-Afrika
 (Mts. de
 Cristal)
 Amazon.
 Kolumbien
 Ost-Indien
 Bolivien
 Guatemala
 Peru
 Nord-
 Amerika
 Mexiko
 Guatemala,
 Honduras,
 Panama
 Mexiko
 Brasilien
 Ost-Indien
 Amazon.
 "

- opacifrons* Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 680. Mexiko
- opaculus* Eppelsb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 134. West-Afrika
- pareus* Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 680. — Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 72. Mittel-amerika,
Kolumbien,
Venezuela,
Ecuador,
Paraguay
- parvulus* Scriba, Stett. Ent. Zeit. XVI, 1855, p. 300. Venezuela
- pectinifrons* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 196. Birma
- peruvianus* Bernh. Arch. Natg. 1908, p. 293. Peru
- piceus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 755. — Lynch, Estaf. Buenos Aires in Bol. Ac. Nac. Cordoba VII, 1884, p. 349. Brasilien,
Argentinien
- pilosus* Fauv. Ann. Mus. Genova 1878, XII, p. 212. Neu-Guinea
- planifrons* J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 215. Nord-Amerika
- politus* J. Lec. l. c. p. 215. Florida
- puncticeps* Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 678. Mexiko
- puncticollis* Kraatz, Archiv Naturg. XXV, 1859, I, p. 168. Ost-Indien
- punctipennis* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 195. Birma
- punctulatus* Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 508. Ost-Indien
- pygmaeus* Cast. Etud. ent. VI, 1835, p. 130. Cayenne
- regularis* Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 194. West-Afrika
- rufipes* Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 508. Ost-Indien,
Ceylon,
Sumatra,
Mauritius,
Reunion,
Ägypten
- compactus* Walker, Ann. Mag. Nat. Hist. 1859, p. 52.
- syriacus* Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) V, 1875, Bull. p. VIII; Fn. gallo-rhén. III, Cat. syst. 1875, p. XIII; Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 160.
- rugiceps* Boh. Ins. Caffr. I, 1848, p. 294. Kapland
- rugicollis* Kraatz, Archiv Naturg. XXV, 1859, I, p. 167. Ceylon
- rugifrons* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 756. — Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 166. Java
- rugipennis* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 361. Mexiko
- Salvini* Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 682. Guatemala
- sanguinipennis* Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 192. Australien
- scolytinus* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 195. Birma
- simplex* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 383. Amazon.
- Smithi* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 361. Mexiko
- solidus* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 384. Amazon.
- sparsior* Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 291. Deutsch-Ost-Afrika
- stipes* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 382. Amazon.
- strangulatus* Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 47. Ost-Indien
- streticollis* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 196. Birma
- strigifrons* Kolbe, Stett. Ent. Zeit. I, 1889, p. 122. West-Afrika
- striola* Fauv. Ann. Mus. Genova XII, 1878, p. 210. Neu-Guinea
- taurus* Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 411. Japan
- truncorum* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIV, 1904, p. 17. Zanzibar
- vicinus* Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 678. Panama

2. Subtribus: **Parosorii.****Parosorius** Bernh.

Bernh. Stett. Ent. Zeit. 1904, p. 222.

Foersteri Bernh. Stett. Ent. Zeit. LXIV, 1903, p. 36 Sumatra
(*Ancaeus*).

1

Mesotrochus Wasm.

Wasm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 317.

paradoxus Wasm. l. c. p. 317.

Brasilien

1

Teiros Eichelb.Eichelb. Katal. Staph. Gatt. in Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 126
(nom. mut.).**Teras** Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 15 (nec Treitschke).**mirabile** Bernh. l. c. p. 16.

Engano

1

II. Subfam. **Leptotyphlinae.**

Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 605.

Stenini Section I, *Leptotyphli* Fauvel, Fn. gallo-rhén. III, 1874,
2. Suppl. p. 35, 60.*Euesithéliens* 2e branche *Leptotyphlaires* Muls. et Rey, Ann.
Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 325.1. Tribus: **Leptotyphlini.**Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 606. — Bernh. Münch. Kol. Zeitschr.
III, 1908, p. 332.**Leptotyphlus** Fauv.Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1874, 2. Suppl. p. 36. — Muls. et Rey, Ann.
Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 328. — Sauley, Bull. Soc. Hist. Nat.
Metz XV, 1878, p. 122. — Muls. et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Brévip. Péd.
Euest. 1878, p. 328. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 606. — Bernh.
Münch. Kol. Zeitschr. III, 1908, p. 332. — Doderò, Ann. Mus. Genova
XLIII, 1908, p. 631.

Biologie: Moesarski, Münch. Kol. Zeitschr. III, 1908, p. 313.

Entomoculia Croissandeau, Le Coléoptériste X, 1891, p. 150.**caroliensis** Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1908, Krain
p. 331. — Doderò, Ann. Mus. Genova XLIII,
1908, p. 638, t. 1, f. 3.

- cribratus** Fauv. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 356. — Croiss. Nizza
Le Coléoptériste X, 1891, p. 151 (*cribrosus*).
— Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 607.
— Doderò, Ann. Mus. Genova XLIII, 1908,
p. 640.
- cribriceps** Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1908, p. 331. Korsika
laticeps Doderò, Ann. Mus. Genova XLIII, 1908,
p. 639, t. 1, f. 9.
- exilis** Muls. et Rey, Opusc. Entom. XVI, 1875, p. 131. Ost-Pyre-
— Sauley, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz XV, 1878, nâen,
p. 121. — Croiss. Le Coléoptériste X, 1891, Ariège
p. 150. — Doderò, Ann. Mus. Genova XLIII,
1908, p. 639, t. 1, f. 7.
- sublaevis* Muls. et Rey (nec. Fauv.), Hist. Nat.
Col. Fr. Brévipennes Péd. Euésth. 1878, p. 330.
- foveiceps** Doderò, Ann. Mus. Genova XLIII, 1908, p. 639. Ligurien
- Grouvellei** Fauv. Rev. d'Ent. IX, 1890, p. 356. — Croiss. Süd-
Le Coléoptériste X, 1891, p. 151. — Ganglb. Käf. Frankreich,
Mitt.-Eur. II, 1895, p. 607. — Doderò, Ann. Ligurien,
Mus. Genova XLIII, 1908, p. 637. Toskana,
Mayeti Normand, Bull. Soc. Ent. Fr. 1907, p. 122. Algier
var. *alutaceus* Doderò, Ann. Mus. Genova XLIII, Nizza
1908, p. 637.
- Omessae** Doderò, Ann. Mus. Genova XLIII, 1908, p. 639. Korsika
- perpusillus** Ann. Mus. Genova XL, 1900, p. 573. Italien
- Revelierei** Sauley, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz XV, 1878, Korsika
p. 120. — Croiss. Le Coléoptériste X, 1891, p. 150.
— Doderò, Ann. Mus. Genova XLIII, 1908,
p. 637.
- sublaevis** Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1874, 2. Suppl.,
p. 36, 61, t. 6, f. 2. — Sauley, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz XV, 1878, p. 119. — Doderò, Ann. Mus. Genova XLIII, 1908, p. 638.
- tyrrhenius** Doderò, Ann. Mus. Genova XLIII, 1908, p. 638. Toskana

11

Mayetia Muls. et Rey.

Muls. et Rey, Opusc. entom. XVI, 1875, p. 87. — Fauv. Fn. gallo-rhén.
III, 1874, 2. Suppl. p. 60. — Sauley, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz XV, 1878,
p. 117. — Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1908, p. 332.

atomus Sauley, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz XV, 1878, Sardinien
p. 118.

corsica Sauley, l. c. p. 118.

sphaerifer Muls. et Rey, Opusc. Entom. XVI, 1875, Korsika
p. 88; Ann. Soc. Linn. Lyon XXII, 1875, p. 10. Ost-Pyre-
— Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1874, 2. Suppl. nâen
p. 61, t. 6, f. 3. — Sauley, Bull. Soc. Hist. Nat.
Metz XV, 1878, p. 117.

3

Cyrtotyphlus Doderò.

Doderò, Ann. Mus. Genova XL, 1900, p. 401.

convexus Doderò, l. c. p. 402.

Ligurien

1

III. Subfam. Oxyporinae.

- Oxyporina* Thomson, Skand. Col. III, 1861, p. 143.
Oxytelini Group I, *Oxypori* J. Leconte, Classif. Col. North Amer. 1, 1, 1861—62, p. 68.
Oxytelini Section II, *Oxypori* Fauvel, Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 212.
Oxyporina Mulsant et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (5) VIII, 1875, p. 208; Hist. Nat. Col. Fr. Brévip. Oxyt. 1879, p. 1.
Oxytelini Group II, *Oxypori* J. Leconte et Horn, Classif. Col. North Amer. 1883, p. 102.
Oxyporinae Sharp, Biol. Centr. Amer. 1, 2, 1882—87 (1887), p. 676. — Ganglbauer, Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 601. — Reitter, Fn. Germ. II, 1909, p. 162.

1. Tribus: Oxyporini.

Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 602.

Oxyporus F.

- F. Syst. Ent. 1775, p. 267. — Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 150. — Latr. Gen. Crust. Ins. I, 1806, p. 283. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 497; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 555. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 87. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1858—59, p. 810. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 40. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 144. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 214. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 214. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 2. — Sharp, Biol. Centr. Amer. 1, 2, 1882—87 (1887), p. 676. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 602.

Biologie; Schiödte, Nat. Tidsskrift 1864, p. 208, t. II, f. 1—14. — Rupertusberger, Biol. Lit. Käf. Eur. 1894, p. 124.

- | | |
|---|---------------------|
| <i>austrinus</i> Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 135. | Georgien
(Amer.) |
| <i>bicolor</i> Fauv. Ab. I, 1864, p. 371. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 215. | Carolina |
| <i>biguttatus</i> Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 411. | Japan |
| <i>borneensis</i> Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 204. | Sarawak |
| <i>bucephalus</i> Fauv. l. c. p. 204. | Birma |
| <i>croceatus</i> Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 2. | Japan |
| <i>Dybowskii</i> Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. VIII, 1871, p. 242. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. syst. 1875, p. XIV, nota. | Ost-Sibirien |
| <i>elegans</i> J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 215. | Louisiana |
| <i>fasciatus</i> Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. 1885, p. 135. | Br.
Kolumbien |
| <i>femoralis</i> Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 196. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 558. | Nord-Amerika |
| var. <i>pulcher</i> Ziegl. Proc. Ac. Phil. II, 1844, p. 43. | |
| <i>Fenyesi</i> Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 362. | Mexiko |
| <i>flavicornis</i> Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 623. | Himalaya |
| <i>Flohr</i> Sharp, Biol. Centr. Am. 1, 2, 1882—87 (1887), p. 677. | Mexiko |

- germanus** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 409. Japan
- gnatho** Sharp, l. c. p. 411.
- guerreroanus** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 362. Mexiko
- hoplites** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 410. Japan
- humeralis** Sharp, l. c. p. 410. "
- japonicus** Sharp, l. c. p. 407. "
- lateralis** Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 195. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 559. Nord-Amerika
- var. *brevis* Melsh. Proc. Ac. Phil. II, 1846, p. 39.
- lepidus** J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 215. New York
- longipes** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 409. Japan
- maculiventris** Sharp, l. c. p. 408. "
- major** Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 234. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 557. Nord-Amerika
- Mannerheimi** Gyll. Ins. Suec. IV, 1827, p. 495. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 557. — Wankow. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. 254. Nord-Europa, Süd-Ungarn
- maxillosus** F. Ent. Syst. I, 2, 1792—98, p. 531. — Er. Käf. Mark Brandenb. 1837—39 (1839), p. 498; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 556. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 815. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 216. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brevip. 1879, p. 7. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 605. Nord- und Mittel-Europa, Sibirien
- var. *amurensis* Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 605.
- var. *angularis* Gebl. in Ledeb. Reise App. III, 1832, p. 69.
- var. *apicalis* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 181.
- var. *Schönherri* Mann. Brach. 1830, p. 19.
- mexicanus** Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. X, 1866, p. 21. Mexiko
- niger** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 407. Japan
- occlpitalis** Fauv. Ab. I, 1864, p. 371. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 215. Carolina
- parvus** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 408. Japan
- procerus** Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 122, t. 2, f. 3. Amur
- quinquemaculatus** J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 51. Pennsylvanien
- rufipennis** J. Lec. l. c. p. 51. Nord-Amerika
- rufus** L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 422. — Er. Käf. Mark Brandenb. 1837—39 (1839), p. 498; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 556. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 814. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 16, f. 78. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 145. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 215. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1879, p. 4. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 605.
- var. *nigrofulvus* Fourcr. Ent. Paris I, 1785, p. 173.
- var. *octavus* Schaeff. Icon. I, 1769, t. 85, f. 3.
- Smithi** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. LX, 1910, p. 361. Mexiko
- stigma** Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 203. Birma
- stygius** Say, Trans. Am. Phil. IV, 1834, p. 459. Nord-Amerika

- triangulum* Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 407. Japan
vittatus Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 195. — Er. Pennsylvanien
 Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 558.
 var. *cinctus* Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 196. "
 var. *dimidiatus* Melsh. Proc. Ac. Phil. II, 1846, "
 p. 39.
 39

IV. Subfam. Megalopinae.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 668.

Oxytelini Subtrib. *Megalopini* Erichson, Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 750.

Oxytelides Sous-tribu I *Mégaloïpides* Lacordaire, Gen. Col. II, 1855, p. 110.

Mégaloïpides Motschulsky, Bull. Mosc. XXX, 1857, II, p. 509.

Oxytelini Group I *Megalopes* J. Leconte et Horn, Classif. Col. North Amer. 1883, p. 102.

1. Tribus: Megalopini.

Megalops Er.

Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 751. — Lacord. Gen. Col. II, 1855, p. 111. — Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 378; Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 668.

- acutangulus* Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. 1883, p. 336. Java
adjectus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), Guatemala,
 p. 669. Panama
angulicollis Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 92. Venezuela
armatus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), Panama
 p. 670.
basalis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), "
 p. 674, t. 17, f. 23.
bifenestratus Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 309. Madagaskar
bolivianus Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital. LX, 1909, p. 235. Bolivien
brevipennis Bernh. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 222. Brasilien
caelatus Grav. Col. Micr. 1802, p. 197. — Er. Gen. Spec. Nord-
 Staph. 1839—40, p. 751. Amerika
cephalotes Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 752, t. 2, f. 3. Kolumbien
cognatus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), Panama
 p. 672.
cribriceps Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 310. Madagaskar
cruciger Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), Mittel-
 p. 668, t. 17, f. 18. Amerika
denticollis Fauv. Ann. Mus. Genova XII, 1878, p. 500. Australien
elegans Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), Panama
 p. 672, t. 17, f. 20.
guatemalensis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 Guatamala
 (1887), p. 673, t. 17, f. 22.
Gestroi Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital. LX, 1909, p. 235. Bolivien
hova Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 309. Madagaskar

<i>impressus</i> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 380; Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 676.	Amazonas, Panama
<i>incultus</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 675.	Mexiko, Panama
<i>ineptus</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 671.	Guatemala
<i>integer</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 671.	..
<i>laevipennis</i> Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital. LX, 1909, p. 234.	Bolivien
<i>mexicanus</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 669.	Mexiko
<i>modestus</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 671.	Panama
<i>morosus</i> Sharp, l. c. p. 670.	Guatemala, Panama
<i>nodipennis</i> M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 150. — Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 206.	Australien
<i>obscurus</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 674.	Guatemala
<i>ornatus</i> Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. 1883, p. 335.	Peru
<i>panamensis</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 673.	Panama
<i>peplodes</i> Sharp, l. c. p. 675, t. 17, f. 24.	Panama
<i>plicatus</i> Boh. Ins. Caffr. I, 1848, p. 293.	Natal
<i>politus</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 673.	Panama
<i>porcatus</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 675.	Guatemala
<i>praeditus</i> Sharp, l. c. p. 672, t. 17, f. 21.	Panama
<i>pulcherrimus</i> Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 363.	Mexiko
<i>punctatus</i> Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 752. — Lacord. Gen. Col. Atl. t. 15, f. 4.	Kolumbien
<i>puncticeps</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 676, t. 17, f. 25.	Guatemala
<i>quadrinaculatus</i> Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital. LX, 1909, p. 236.	Brasilien, Bolivien
<i>robustus</i> Motsch. Bull. Moscou XXX, 1857, IV, p. 509.	Kolumbien
<i>rufipes</i> J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 51.	Georgien (Amer.)
<i>spinosus</i> Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 379.	Amazonas
<i>vulneratus</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 674.	Panama

43

V. Subfam. Steninae.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 640. — Ganglb. Käf.
Mitt.-Eur. II, 1895, p. 546. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 153.

Stenini Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 526; Gen.
Spec. Staph. 1839—40, p. 687 (excl. *Euaesthetus*). — Kraatz,
Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 732 (excl. *Euaesthetus*).
— J. Lec. and Horn. Classif. Col. North Amer. 1883, p. 97. —
Lynch, Estaf. Buen. Aires in: Bol. Soc. Ac. Nac. Cordoba VII,

- 1884, p. 331. — Casey, Rev. Stenini Amer. North of Mexico 1884, p. 3.
Stenides Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 106 (excl. *Euaesthetus*).
Stenites Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 50 (excl. *Euaesthetus*).
Stenina Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 210.
Stenini sect. II *Steni* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 224.
Stenides Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (5) VIII, 1875, p. 205.
 — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 175.

1. Tribus: Stenini.

Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 548.

Stenus Latr.

- Latr. Préc. Caract. gén. Ins. 1796, p. 77. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 528; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 689. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 740. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 51. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 211. — Rye, Ent. Monthly Mag. I, 1864—65, p. 6. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 225. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 180. — Lynch, Estaf. Buen. Aires in: Bol. Ac. Nac. Cordoba VII, 1884, p. 332. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 640, 798. — Meinert, Vidensk. Medd. math. For. Kopenh. 1884—86, p. 180—207, t. 15, 16; Zool. Anz. X, p. 136—139. — Cas. Ann. N. York Ac. VI, 1892, p. 711. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 549.
- Biologie: Schiödt, Nat. Tidskr. 3, VIII, 1872—73, p. 548—552, t. 18, f. 1—9. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 547, 551.

Subgen. Stenus s. st.

- Stenus* s. st. Rey + *Nestus* Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 183. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 552.
- abscondens* Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1887), p. 798. Mexiko
- adelops* Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 80. Kalifornien
- adspector* Mäklin, Bull. Mosc. XXV, 1852, II, p. 316. Sitkha
 — Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 127.
- aerous* Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. VIII, 1871, p. 163; — Fedtsch. Reise Turk. II, V, 1874, p. 194. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. syst. 1875, p. XIV, nota. Samarkand
- affaber* Baudi, Stud. ent. 1848, p. 140. Syrien
- agilis* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 711. Kolumbien, Venezuela
- alienus* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 81. Japan
- alpicola* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 236. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 228. Alpen,
 — Cas. Revis. Sten. Amer. North of Mex. 1884, Sieben-
 p. 75. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 571. bürgen,
sibiricus J. Sahlb. Bidrag Nordv. Sib. Insf. Sibirien,
 1880 (K. Svensk. Ak. Handl. XVII, nr. 4), Nord-
 p. 79. Amerika

- altifrons* Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1886, p. 302.
alveolatus Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 78.
- ampliventris* J. Sahlb. Medd. Fn. Flor. Fenn. XVII, 1890, p. 7.
amurensis Eppelsh. Deutsche Ent. Zeit. XXX, 1886, p. 43.
angustus Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 40.
- animatus* Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 99.
annamita Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 207.
- anthracinus* Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 326.
- Argus* Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 231. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 552; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 714. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 770. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 224; IX, 1867, p. 195. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 262. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 312. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 580 (*Nestus*).
ageus Casey, Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 116.
decipiens Leprieur, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. 201.
opticus Gyll. Ins. Suec. IV, 1827, p. 504.
rigidus Casey, l. c. p. 119.
 var. *austriacus* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIX, 1899, p. 26.
- arizonae* Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 93.
- asphaltinus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 695. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 748. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 236. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 206. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 569.
socius Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 208.
- ater* Mannh. Brach. 1830, p. 42. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 534; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 696. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 749. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 213. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 247. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 211. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 561.
?adjectus Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 214.
maurus Mannh. Brach. 1830, p. 41.
punctipennis Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 214.
- aterrimus* Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 549; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 712. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58 (1858), p. 767. — Thoms. Skand. Col. IX, 1867, p. 196. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 235. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX,

Nord-Italien
 Nevada,
 Kalifornien
 Finnland

Amur

Massa-
 chusetts
 Oberer See
 Ost-Indien,
 Ceylon
 Japan

Palaarkt.
 Gebiet,
 Nord-
 Amerika

Österreich

Arizona,
 Texas
 Mittel-
 Europa,
 Italien,
 Sardinien

Palaarkt.
 Gebiet

Nord- und
 Mittel-
 Europa

- 1883, p. 226. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 570.
- atratus** Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 540; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 701. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 759. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 221. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 256. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 269. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 575 (*Nestus*).
- externus* Rey, l. c. p. 272.
- longipennis* Rey, l. c. p. 268.
- propinquus* Rey, l. c. p. 272.
- tenuis* Rey, l. c. p. 272.
- atrovirens** Fauv. Ann. Mus. Genova XIII, 1878, p. 503.
- augur** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 709. Paläarkt. Gebiet
- auliensis** Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 247; Verh. zool.-bot. Ges. Wien. XV, 1905, p. 596.
- parilis* Luze, Hor. Ross. XXXVII, 1904, p. 88.
- aureolus** Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. syst. 1875, p. XVII, nota. Baikal
- auropubescens** Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 296 (*Nestus*). Mexiko
- Austini** Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 28. Nord-Amerika
- azeganus** Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 137.
- Bernhaueri** Poppius, Medd. Soc. Fn. Flor. Fenn. XXXIII, 1907, p. 106. Abessinien
- biguttatus** L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 422. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 529; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 690. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 742. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 227. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 231. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 184. — Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 325. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 557. Lappland
- bipustulatus* Ljungh in Weh. und Mohr, Arch. I, 1804, p. 63. — Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 527.
- var. *bipustulatus* Thoms. Öfv. Vet. Ak. Förh. 1857, p. 220. Virginia
- bilentigatus** Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 19.
- blilineatus** J. Sahlb. Not. Fn. Flor. Fenn. XI, 1870, p. 412; En. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 61; Sv. Ak. Vet. Handl. XVII, 1880, nr. 4, p. 79. — Fauv. gallo-rhén. III, Cat. syst. 1875, p. XIV, nota. Lappland, Finnland, Ost-Sibirien
- bimaculatus** Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 466. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 532; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 692. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 746. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 212. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 241. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 201. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 560. Europa
- biguttatus* Marsh. Ent. Brit. 1802, p. 526.
- Juno** Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 154.
- maculipes* Grimmer, Steierm. Col. 1841, p. 33.

- bimaculosus** Steph. Man. Brit. Col. 1839, p. 409. — Waterh. et Jans. Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) III, 1855, p. 145. — *binotatus* Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 303.
- bipunctatus** Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 530; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 691. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 743. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 227. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 232. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 187. — Cas. Revis. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 14. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 558.
- biguttatus** Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 302.
- bipustulatus** Steph. l. c. p. 303.
- comma** J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 50.
- boreellus** Poppus, Act. En. Flor. Fenn. XXXI, 1908—09, p. 10.
- bosniens** Bernh. Ent. Blätter V, 1909, p. 198.
- brevipeunis** Thoms. Öfv. Vet. Ak. Förh. 1851, p. 133.
- buphthalmus** Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 156. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 536; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 699. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 752. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 220. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 253. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 253. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 572 (*Nestus*).
- angustatus** Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 299.
- boops** Ljungh in Web. und Mohr, Beitr. II, 1804, p. 158.
- canaliculatus** Boisd. et Lacord. Fn. Paris I, 1835, p. 449.
- clavicornis** Panz. Fn. Germ. XXVII, 1795, nr. 11.
- joveiventris** Fairm. et Laboulb. Fn. Fr. I, 1854, p. 578.
- notatus** Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 255.
- sulcatulus** Muls. et Rey, Op. Ent. XIV, 1870, p. 108; Ann. Soc. Linn. Lyon XVIII, 1870, p. 84; XXX, 1883, p. 255.
- calcaratus** Scriba, Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 380. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 245. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 220. nota. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 563.
- ♀ **inspector** Mäkl. Öfv. Finska Vet. Soc. XXII, p. 82.
- canaliculatus** Gyll. Ins. Suec. IV, 1827, p. 501. — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 542; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 704. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 754. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 222; IX, p. 194. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 255. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 273. — Cas. Revis. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 115. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 573 (*Nestus*).

Patria?

Europa,
Nord-
Amerika,
Oran (?)Nord-
Russland
Bosnien,
Türkei
Schweden
EuropaDeutschland,
Holland,
Russland,
SibirienEuropa,
Nord-
Amerika

- affinis* Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 298.
congener Mäkl. Bull. Mosc. XXVI, 1853. III, p. 192. — Cas. Revis. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 114.
- capitatus* Eppelsh. Stett. Ent. Zeit. XXXIX, 1878, p. 421. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 102; Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 76 (*Nestus*).
- carbonarius* Gyll. Ins. Suec. IV, 1827, p. 505. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 218. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 263. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 581 (*Nestus*).
- debilis* Rye, Entom. Monthly Mag. I, 1864, p. 42.
niger Mannh. Brach. 1830, p. 43. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 753.
- opacus* Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 543; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 705. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 294.
 var. *calidus* Baudi, Stud. Ent. I, 1848, p. 141.
- carinicolis* Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 101.
caroliniae Cns. l. c. p. 116.
- cautus* Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 553; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 715. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 770. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 579 (*Nestus*).
- macrocephalus* Aubé, Mat. Cat. Gren. 1863, p. 38. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 259. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 298.
sublobatus Muls. et Rey, Opusc. Entom. XII, 1861, p. 160.
- certatus* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 365.
Championi Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 642.
- circularis* Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 157. — Er. Käf. Mk. Brandenb. II, 1837—39 (1839), p. 556; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 717. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 774. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 219. — Fauv. Fn. gallo-rhén. II, 1872, p. 249. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 304. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 578 (*Nestus*).
- clavicornis* Scop. Ent. Carn. 1763, p. 190. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 242. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 564.
- atricornis* Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 294.
boops Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 469. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 215. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 234.
- brunnipes* Grimmer, Steierm. Col. 1841, p. 33.
bupthalmus Schrank, Beytr. Naturgesch. 1776, p. 72.
- canaliculatus* Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 294.
cicindeloides Ljungh in Web. und Mohr, Arch. I, 1804, p. 62.
- nigricornis* Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 293.
punctatissimus Steph. l. c. p. 293.
simplex Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 236 nota.

Sizilien.
 Algier

Nord- und
 Mittel-
 Europa,
 Griechen-
 land

Michigan
 Nordamerik.
 Südstaaten
 Mittel-
 Europa

Amazonas
 Mittel-
 Amerika
 Europa,
 Mittelmeer-
 gebiet

Europa

- speculator* Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 445. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—1839 (1839), p. 545; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 706. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 761.
- collum* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 207.
- colon* Say, Trans. Amer. Phil. Soc. IV, 1834, p. 458. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 693. — Casey, Revis. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 15.
- colonus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 699. — Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 96.
- comes* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 207.
- confusus* J. Sahlb. En. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 58.
- convictor* Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 62.
- cordaticollis* Leinberg, Medd. Fn. Flor. Fenn. XXVI, p. 187 (*Nestus*).
- cordicollis* Fauv. Mém. Soc. Linn. Norm. XV, 1869, p. 40; Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877/78, p. 102; Fn. gallo-rhén. III, Cat. syst. 1875, p. XV, nota. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 350.
- corrosus* Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 645.
- corvus* Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 72.
- costalis* Cas. l. c. p. 77.
- crenicollis* Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 65.
- croceipes* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 710.
- cupreipennis* M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 149. — Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 209 nota; XIII, 1878, p. 502.
- deductor* Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 204.
- confusus* Cas. l. c. p. 63.
- delawarensis* Cas. l. c. p. 30.
- denticulatus* Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 225.
- dissociatus* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 54.
- distans* Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 327.
- dives* Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 127.
- dolosus* Cas. l. c. p. 108.
- egenus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 698. — Cas. Revis. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 105.
- ellipticus* Cas. l. c. p. 79.
- erlensis* Cas. l. c. p. 67.
- erythrocnemus* Eppelsh. in Radde, Verh. Nat. Ver. Brünn XXII, p. 6; Fn. Fl. Casp. 1886, p. 195.
- erythropus* Melsh. Proc. Ac. Phil. II, 1846, p. 40. — Cas. Revis. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 46. — Blanch. Ent. Am. 1887, p. 85.
- excellens* Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. II, 1883, p. 303.
- Birma
Washington,
Virginia,
Michigan,
Südstaaten
Nord-
Amerika
Birma
Finnland,
Norwegen
Washington
Finnland
Algier, Oran
Panama
Brit.-
Kolumbien
Nevada,
Kalifornien
Ost-Indien
Kolumbien,
Venezuela
Australien
Michigan
Nordamerik.
Mittel-
Staaten
Kaukasus
Baikal
Japan
Kalifornien
Colorado
Pennsyl-
vanien,
Michigan,
Kansas
Kalifornien
Michigan
Kaukasus
Pennsyl-
vanien
Michigan,
Massachu-
setts
Dalmatien

- excubitor** Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 551; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 714. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 769. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 568.
- exiguus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 706. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 250. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 289. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 577 (*Nestus*).
- fasciculatus** J. Sahlb. Not. Fn. Flor. Fenn. XI, 1870, p. 341; Fn. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 47; Sv. Ak. Handl. XVII, 1880, nr. 4, p. 76. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. syst. 1875, p. XV nota.
- femoratus** Say, Trans. Am. Phil. Soc. IV, 1834, p. 459. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 713. — Cas. Revis. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 33.
- fenestralis** Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 94.
- flavitaris** Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 510.
- floridanus** Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 95.
- foraminosus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 703. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 755. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 257 nota. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 259. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 576 (*(Nestus)*).
- cribrellus* Rey, l. c. p. 261.
- fortis** Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 230.
- fossulatus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 711. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 767. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 238. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 223. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 570.
- fuscipes** Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 157. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 555; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 716. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 772. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 225; IX, 1867, p. 195. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 259. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 303. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 579 (*Nestus*).
- argyrostroma* Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 288.
- cariniger* Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 513.
- curvipes* Steph. l. c. p. 285.
- femorellus* Zett. Ins. Lapp. 1838, p. 71.
- fulvipes* Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 446.
- vilis* Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1839, I, p. 162.
- gallicus** Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 248. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 218. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 563.
- gayndahensis** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 149. — Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 209 nota.
- gemmeus** Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 18.
- Deutschland,
Österreich
- Rheinprovinz,
Gross-
britannien,
Frankreich
- Skandinavien,
Ost-Sibirien,
Nord-
Rußland
- Östl. Nord-
Amerika
- Venezuela
Ägypten
Florida
- Deutschland,
Österreich,
Frankreich
- Süd-
Frankreich
- Mittel-
Europa,
Italien
- Europa,
Ost-Indien
- Deutschland,
Österreich,
Süd-
Frankreich
Australien
- Georgien
(Amer.)

- gibbicollis* J. Sahlb. Sv. Ak. Handl. XVII, 1880, nr. 4, p. 80. Ost-Sibirien
- gracilipes* Kraatz. Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 750. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 238 nota. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 570. Sudeten, Alpen, Bosnien
- ab. *Wankai* Fleischer, Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 110.
- graciliventris* Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 643. Guatemala, Panama
- gravidus* Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 98. Massachusetts, Venezuela
- gutta* Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 93. Paläarkt. Gebiet
- guttula* Müll. Germ. Mag. IV, 1816, p. 225. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 531; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 691. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 744. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 228. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 234. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 195. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, p. 558.
- geminus* Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 215. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 19, f. 93.
- Kirbyi* Gyll. Ins. Suec. IV, 1827, p. 499.
- Guynemeri* Jacq. du Val, Ann. Soc. Ent. Fr. 1850, p. 51; Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 19, f. 94. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 237. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 221. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 569. Alpen, Mittelmeergebiet, Ungarn
- rugosus* Kiesw. Stett. Ent. Zeit. XI, 1850, p. 220.
- tylocephalus* Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58 (1858), p. 761 nota.
- hispanicus* Motsch. Bull. Mosc. XX, 1849, III, p. 85. Spanien
- hostilis* Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 643. Mittelamerika
- humilis* Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 554; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 716. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 773. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 218; IX, 1867, p. 194. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 263. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 310. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 580 (*Nestus*). Europa, Nordamerika
- Argus* Gyll. Ins. Suec. IV, 1827, p. 503.
- fuscipes* Ljungh in Web. und Mohr, Arch. I, 1804, p. 159.
- mammops* Casey, Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 97.
- picipes* Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 513.
- synonymus* Gemm. et Har. Cat. Col. II, 1868, p. 640.
- var. *Netolitzkyi* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVIII, 1908, p. 33. Steiermark
- hyperboreus* J. Sahlb. Fn. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 50. Finnland
- idoneus* Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 799. Mexiko
- incanus* Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 538; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 700. Mittel-Europa,

- Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 758. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 239. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 292. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 577 (*Nestus*).
pygmaeus Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 506.
incertus Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 120. Nordam.
 Seen,
 Rocky Mts.
 Europa
- incrassatus* Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 541; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 702.
 — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 752. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 220.
 — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 252. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 261.
 — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 573 (*Nestus*).
- incultus* Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 71. Arizona
indagator Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 428. Amurgeb.
- indigenus* Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 55. Massa-
 chusetts
 Australien
- indistinctus* Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1890, p. 543.
- inermis* Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2. 1882—87 (1886), p. 642. Guatemala
- ingratus* Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 58. Michigan
innuptus Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 55. Baikal
inornatus Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 64. Massa-
 chusetts,
 Nordam.
 Seen
 Kalifornien
 Massa-
 chusetts
- insignis* Cas. l. c. p. 102. Westl.
integer Cas. l. c. p. 94. Mittel-
 meergebiet,
 Ungarn,
 Herze-
 gowina,
 Kroatien,
 Margelan
- intricatus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 694. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 248. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 214. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 562. Östl. Nord-
 Amerika
Zoufali Fleischer, Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 313. Paläarkt.
 Gebiet,
 Nord-
 Amerika
- intrusus* Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 44.
- Juno* F. Syst. El. II, 1801, p. 602. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 533; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 694. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 747. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 212. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 246. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 208. — Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 24. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 560.
- boops* Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 226.
- buphtalmus* Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. IX, 1802—05, p. 353, t. 80, f. 2.

- calabrus* Fiori, Nat. Sic. VIII, 1894, p. 95.
clavicornis F. Gen. Ins. 1776, p. 242.
inspector Mäkl. Öfv. Finska Vet. Soc. XXII, 1879—80, p. 82; Sv. Ak. Handl. XVIII, 1881, nr. 4, p. 37.
lineatulus Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 296.
Mäklini Duviv. Kat. 1883, p. 182.
- jacuticus* Popp. Öfv. Finska Vet. Förh. LI, 1908—09, nr. 4, p. 16. Ost-Sibirien
- japonicus* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 84. Japan
- juvencus* Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 123. Michigan
- kamtschaticus* Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, IV, p. 355. — J. Sahlb. Svensk Ak. Handl. XVII, nr. 4, p. 76. Kamtschatka
- labilis* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 697 (*Nestus*).
aemulus Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 223. Finnland,
canaliculatus Sahlb. Ins. Fenn. I, p. 428. Schweden,
lapponicus J. Sahlb. En. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 56; Sv. Ak. Handl. XVII, 1880, nr. 4, p. 78. Norwegen,
Lappland
- laccophilus* Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 23. Nordam.
Seen
- laevigatus* Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon VIII, 1861, p. 136; Opusc. Ent. XII, 1861, p. 152. Piemont,
— Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 234 nota. Korsika,
— Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 197. Sardinien,
— Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 559. Italien
- lateralis* Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 510. Kolumbien
- latipennis* J. Sahlb. Sv. Ak. Handl. XVII, 1880, nr. 4, p. 78. Ost-Sibirien
- lentus* Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 326. Japan
- Lewisius* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 82. „
- longipennis* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 64. Turcmenien
- longipes* Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 214. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 743 nota. Mittel-
— Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 233. — Europa,
— Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 190. Italien,
— Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 558. Klein-
Asien
- aeneiceps* Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 192.
- longitarsis* Thoms. Öfv. Vet. Ac. Förh. 1857, p. 222; Skand. Col. II, 1860, p. 213. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 747 nota. — Nord- und
— Scriba, Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 128. Mittel-
— Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 247. — Europa,
— Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 217. Spanien,
— Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 562. Italien
- Barnevillei* Bedel, Abeille VII, 1870, p. 92.
- luctuosus* Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 81. Kalifornien
- luculentus* Cas. l. c. p. 122.
- lustrator* Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 548; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 712. — Nord- und
— Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 764. — Thoms. Skand. Col. IX, 1867, p. 191. Mittel-
— Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 244. — Europa,
— Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 244.
— Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 566.
- Lysholmi* Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902, p. 59. Norwegen
- macellus* Fauv. Ann. Mus. Genova XIII, 1878, p. 504. Australien

- macies* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 83.
maculiger Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 367. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 559. Japan
 Bulkanhalbinsel,
 Ungarn,
 Kroatien
 Alaska,
 Vancouver
- maritimus* Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, IV, p. 356.
 — Mäkl. Bull. Mosc. XXV, 1852, II, p. 316. — Cas. Revis. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 73.
- melanarius* Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 299. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 254. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 575 (*Nestus*). Europa,
 Japan
- cinerascens* Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 539; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 701. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 759. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 265.
- loveifrons* Rey, l. c. p. 272.
- gracilentus* Fairm. et Laboulb. Fn. Fr. I, 1854, p. 578. — Rey, l. c. p. 283.
- nigripalpis* Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 221; IX, 1867, p. 194.
- rugulosus* Rey, l. c. p. 268.
- melanopus* Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 528. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 256. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 576 (*Nestus*). Europa,
 Mittelmeer-
 gebiet
- cribrellus* Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 261.
- discretus* Rey, l. c. p. 261.
- nitidus* Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 450. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 703. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 756. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 225. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 256.
- mendax* Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 66.
- mendicus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 702. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 576. — Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 17 (*Nestus*).
- oreophilus* Fairm. et Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 43. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 238. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 290. Massachusetts
 Mittelmeer-
 gebiet,
 Kaukasus,
 Senegal,
 Süd-Afrika,
 Br. Ost-Afrika
- relucens* Rey, l. c. p. 292.
- lythus* Schauf. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 621.
- metallicus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 709. Kolumbien,
 Venezuela
 Mexiko
- mexicanus* Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 644.
- micros* Solsky, Fedtsch. Reise Turk. II, V, 1874, p. 196. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. syst. 1875, p. XV, nota. Samarkand
- militaris* Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 69. Nordamerik.
 Seen
 Michigan
 Daurien
- minor* Cas. l. c. p. 117.
- minutissimus* Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 557. — Hochh. l. c. XXXV, 1862, III, p. 81.
- mongolicus* Eppelsh. Hor. Ross. XXIII, 1889, p. 183.
- montanus* Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 74. Mongolei
 New-Hampshire

- morio** Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 230. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 537: Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 700. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 757. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 257. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 278. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 574 (*Nestus*).
aequalis Muls. et Rey, Op. Ent. XII, 1861, p. 154. — Rey, l. c. p. 281.
albipilis Rey, l. c. p. 275.
arcuatus Rey, l. c. p. 282.
enodis Casey, Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 126 (veris).
haplus Casey, l. c. p. 125.
inaequalis Muls. et Rey, Opusc. Ent. XII, 1861, p. 140.
indistinctus Casey, l. c. p. 130.
subgriseus Casey, l. c. p. 127.
transfuga Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 282 (veris).
trivialis Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 760.
- mucronatus** Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 644. Panama
- mundulus** Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 129. Kalifornien
- nanulus** Cas. l. c. p. 83. Brit.
Kolumbien
- nanus** Steph. III. Brit. V, 1832, p. 301. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 240. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 578 (*Nestus*). Paläarkt.
Gebiet,
Nord-
Amerika
- assequens* Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 309.
- circularis* Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 233.
- declaratus** Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39, p. 557; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 717. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 774. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 229; IX, 1867, p. 197. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 307.
- laticor* Rey, l. c. p. 309.
- pusio* Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 82.
- nigrovirens** Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 206. Birma
- nimborum** Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 644. Guatemala
- neglectus** Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 59. Östl. Nord-
Amerika
- neglectus** Gerhardt, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 220; Zeitschr. Ent. Breslau XXIV, p. 20*.) Schlesien
- nitens** Steph. III. Brit. V, 1832, p. 300. — J. Sahlb. Enum. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 58. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 255 nota. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 574 (*Nestus*). Mittel-
Europa,
Nord-
Europa
- aemulus* Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 541; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 704.

*) Ob eigene Art? Bernhauer.

- Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 756.
- noctivagus** Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 121.
- notipennis** Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 94.
- obstrusus** Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 92.
- occidentalis** Cas. l. c. p. 90.
- ocellatus** Fauv. Bull. Soc. Norm. IX, 1865, p. 305.
- olivaceus** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 148. — Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 209 nota; l. c. XIII, 1878, p. 503.
- pacificus** Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 91.
- palpalis** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 710.
- palposus** Zett. Ins. Lapp. 1838, p. 70. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 251. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 249. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 571 (*Nestus*).
- argenteus** Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 222; IX, 1867, p. 194.
- argenteus** Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1854, p. 149.
- buphthalmus** Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 475.
- carbonarius** Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 535; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 696. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 750 (nec Gyll.).
- parallelopipedus** Motsch. Bull. Mosc. XXV, 1852, II, p. 317. — Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 149.
- parallelus** Cas. l. c. p. 121.
- pauper** Cas. l. c. p. 53.
- pauperculus** Cas. l. c. p. 124.
- brumalis** Cas. l. c. p. 131.
- Pettiti** Cas. l. c. p. 42.
- pekinensis** Csiki, Zichy's Ergebn. II, 1901, p. 104.
- perpulcher** Solsky, Horae Ross. XI, 1875, p. 24.
- phyllobates** Penecke, Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 14.
- piscator** Sauley, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 655. — Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 75 (*Nestus*).
- arctulus** Hochh. Bull. Mosc. XXII, 1849, I, p. 171.
- ignotus** Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 226.
- morulus** Baudi, Berl. Ent. Zeit. XIII, 1869, p. 395. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 348.
- sulcifrons** Eppelsh. Stett. Ent. Zeit. XXIX, 1878, p. 116.
- placidus** Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 65.
- tunicollis** Cas. l. c. p. 100; Ann. N. York Ac. VI, p. 711.
- pluto** Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 70.
- posticalis** Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 340.
- New-Hampshire
Venezuela
New-York,
New-Jersey
Brit.
Kolumbien
Pyrenäen,
Spanien
Australien

Kalifornien
Kolumbien,
Venezuela
Nord- und
Mittel-Europa

Sikhia

Massachusetts
"
Michigan

Nordam. Seen
China
Peru
Ost-Alpen,
Siebenbürgen
Syrien,
Kaukasus,
Cypern

Michigan

Massachusetts
Taschkent

- prismalis** Fauv. Ann. Mus. Genova XII, 1878, p. 222, t. 1, f. 19. Neu-Guinea
- proditior** Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 550; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 713. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 768. — Thoms. Skand. Col. IX, 1867, p. 192. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 244 nota. — J. Sahlb. Enum. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 51. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 232. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 568. Nord- und Mittel-Europa
- grandiceps** Thoms. Öfv. Vet. Ak. Förlh. 1857, p. 222.
- ripaecola** J. Sahlb. Not. Fn. Fl. Fenn. XI, 1870, p. 414.
- protector** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 311. Madagaskar, Senegal
- providus** Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 546; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 707. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 763. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 216. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 243. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 237. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 565. Europa, Nord-Afrika, Madeira
- obscurus** Luc. Expl. Alg. Ent. 1849, p. 124, t. 13, f. 6.
- puberulus** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 83. Japan
- pubescens** Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 117. Nordam. Seen
- pumilio** Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 558; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 718. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 775. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 219. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, p. 578 (*Nestus*). Nord- und Mittel-Europa, Östl. Nord-Amerika, Sibirien
- atomarius** Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 84. Australien
- puncticollis** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 149. — Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 209 nota; l. c. XIII, 1878, p. 502.
- punctiger** Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 13. Colorado
- punctiventris** Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 645. Panama
- pusillus** Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 301. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 544; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 705. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 761. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 229. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 250. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 286. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 577 (*Nestus*). Europa, Mittel-meergebiet
- consciventris** Fairm. et Laboulb. Fn. Fr. I, 1854, p. 579.
- exiguus** Rey, Brévip. 1884, p. 137.
- ranops** Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 29. Nordam. Südstaaten
- renifer** J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 50. — Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 16. Kalifornien, Texas, Arizona

- repletus* Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 646. Guatemala
- Rogeri* Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 764. — Fuss, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 93. — Thoms. Opusc. Entom. IV, p. 369. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 242. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 565. Mittel-Europa, Süd-Schweden
- novator* Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. Catalogue 1868, p. 74.
- subrugosus* Rey, l. c. p. 243.
- rossicus* Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1903, p. 188. Süd-Russland
- rotundatus* Ljungh in Web. und Mohr, Arch. I, 1804, p. 67. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 745. Schweden
- rufomaculatus* Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902, p. 59. Turkestan
- rugicollis* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 162. Ost-Indien
- rugifer* Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 47. Colorado
- anastomozans* Cas. l. c. p. 48; Ann. N. York Ac. VI, p. 711.
- rugosulus* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. syst. 1875, p. XVI nota. Baikal-See
- ruralis* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 697. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 751. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 252. — J. Sahlb. Enum. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 55. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 252. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 572 (*Nestus*). Nord- und Mittel-Europa, Sibirien, Kaukasus
- alpestris* Heer, Fn. Helv. 1838—42, p. 577.
- Shepherdii* Crotch, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) V, 1865—67, p. 441.
- var. *frigidus* J. Sahlb. Sv. Ak. Handl. XVII, 1880, nr. 4, p. 78.
- Sallaei* Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 641. Mexiko
- Sauteri* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVII, 1907, p. 379. Japan
- scabiosus* Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 60. Nordam. Seen
- Schwarzii* Cas. l. c. p. 52. Massa-chusetts
- serupeus* Cas. l. c. p. 43. Nordam. Seen
- scrutator* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 708. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 765. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 216. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 242 nota. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 231. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 566. Nord- und Mittel-Europa
- femorialis* Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 547.
- cozalis* J. Sahlb. En. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 49.
- sculptilis* Cas. l. c. p. 22. Kalifornien, Nevada, Washing.
- sectator* Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 31. Washington

- sectilifer Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 110.
milleporus Cas. l. c. p. 111; Ann. N. York Ac.
 IV, 1892, p. 711.
- Semenowi Eppelsh. Horae Ross. XXIII, 1889, p. 181.
- semicolon J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 50. — Cas.
 Rev. Sten. Amer. North. of Mex. 1884, p. 17.
- sexualis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 84.
- shoshonis Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 49.
- similis M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871,
 p. 149. — Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877,
 p. 209 nota*).
- simplex Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884,
 p. 56.
- simpliciventris Poppius, Öfv. Finska Ver. Förh. LI, 1908—
 1909, nr. 4, p. 13.
- sphaerops Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 68.
- stigmula Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 693. —
 Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58,
 p. 745. — Thoms. Opusc. Ent. IV, 1871, p. 370.
 — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 240. —
 Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 199.
 — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. 1895, p. 559.
Kirbyi Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 442
 (nec Gyll.).
maculipes Heer, Fn. Helv. I, 1838—1842, p. 215.
- strangulatus Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884,
 p. 39. — Blanch. Ent. Am. 1887, p. 85.
- strigosus Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 239 nota.
- stygius Say, Trans. Am. Phil. Soc. IV, 1834, p. 458.
 — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 698.
 — Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884,
 p. 104.
- subarcticus Poppius, Medd. Fn. Fl. Fenn. XXXIII,
 1907, p. 106.
- subdepressus Muls. et Rey, Opusc. Entom. XII, 1861,
 p. 158. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX,
 1883, p. 276. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. 1895,
 p. 575.
- explorator* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 254.
- subfasciatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860,
 p. 162.
- subglaber Thoms. Opusc. ent. III, 1870, p. 329. —
 Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. syst. 1875,
 p. XVI nota. — J. Sahlb. En. Col. Brach. Fenn.
 1876, p. 52.
- glabellus* Thoms. Opusc. Ent. II, 1870, p. 127.
 — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Cat. syst. 1875,
 p. XVI nota.
- subnudus Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 53.
- subtilis Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 54.
- sylvester Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839),
 p. 547; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 708.
 — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58,
- Östl. Nord-
 Amerika
- China
 Östl. Nord-
 Amerika
- Japan
 Washington
 Australien
- Oregon
- Ost-Sibirien
- Massa-
 chusetts
 Nord- und
 Mittel-
 Europa,
 Kaukasus
- New York,
 Michigan
 Korsika
 Nord-
 Amerika
- Lappland
- Frankreich,
 Spanien,
 Deutsch-
 land,
 Österreich,
 Ungarn
- Nord-Afrika,
 Spanien,
 Canar. Ins.
- Skandi-
 navien,
 Finnland
- Baikal
 Michigan
 Nord- und
 Mittel-
 Europa

*) Ob eigene Art? Bernhauer.

- p. 766. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 217.
 — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 244,
 Suppl. 1874, p. 37. — Rey, Ann. Soc. Linn.
 Lyon XXX, 1883, p. 240. — Ganglb. Käf.
 Mitt.-Eur. II, 1895, p. 567.
- tacomae** Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 34. Washington
 Ost-Sibirien
- taigae** Poppus, Öfv. Finska Vet. Förh. LI, 1908—09,
 nr. 4, p. 11.
- tenuipes** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 80. Japan
- tenuis** Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 40. Nordam.
difficilis Cas. l. c. p. 41. Mittel-
 staaten
 Nevada
- terricola** Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884,
 p. 128.
- texanus** Cas. l. c. p. 88. Texas
- Thioni** Montrouz. Ann. Soc. Linn. Lyon 1864, p. 89. Neu-
 — Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1874, p. 433; Kaledonien
 Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 252.
- Traili** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 366. Amazonas
- tristis** Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 27. Kalifornien
 Florida
- tuberculatus** Cas. l. c. p. 129.
- umbrius** Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 395. Italien,
 — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 346. — Fauv. Fn. Schweiz,
 gallo-rhén. III, 1872, p. 252 nota. — Ganglb. Türkei
 Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 572 (*Nestus*).
- undulatus** Woll. Ins. Mader. 1854, p. 599.
- vafellus** Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839),
 p. 554; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 715. Madeira
 — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, Nord- und
 p. 771. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 224; Mittel-
 IX, 1867, p. 195. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Europa
 1872, p. 258. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX,
 1883, p. 300. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II,
 1895, p. 579 (*Nestus*).
- ? *submarginatus* Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 295.
- venator** Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 208. Birma
- venustus** Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 89. Nord-
 Amerika
- verecundus** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 81. Japan
- verticosus** Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884,
 p. 25. Vancouver,
 Washington
- vespertinus** Cas. l. c. p. 61. Washington
- vexatus** Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 51.
insularis Cas. l. c. p. 50; Ann. N. York Ac.
 IV, 1892, p. 711 (nec J. Sahlb.).
- vlecinus** Cas. l. c. p. 57. Östl. Nord-
 Amerika
- villosus** Cas. l. c. p. 109. Kalifornien,
jejunus Cas. l. c. p. 112; Ann. N. York Ac. IV, Brit.-
 1892, p. 711. Kolumbien
- vinnulus** Cas. l. c. p. 112. Massa-
 chusetts,
 Nordam.
 Seen
- virginiae** Cas. l. c. p. 87. Virginia
- viridans** Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 109. Lombardei
- viridiaeneus** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II,
 1871, p. 149. — Fauv. Ann. Mus. Genova X,
 1877, p. 209 nota. Australien

- zunicus** Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 32. Arizona
zunilensis Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), Guatemala
 p. 645.

Subgen. *Tesnus* Rey.

Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 183.

Mutinus Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 140.

- alacer** Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 135. Nord- und
 — Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 74. Mittel-
 Fauvelianus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882— Amerika,
 1887 (1886), p. 646, t. 17, f. 6. Kolumbien
amicus Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 142. Colorado
anthrax Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, Chile
 p. 444.
australicus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) V, Victoria
 p. 788.
brunnipes Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 285. — Fauv. Europa
 Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 265. — Ganglb.
 Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 583.
cribiventer Fairm. et Laboulb. Fn. Fr. I, 1854,
 p. 584.
gracilis Steph. l. c. p. 288.
laticollis Thoms. Öfv. Vet. Ac. Förh. 1851, p. 133.
Marshami Steph. l. c. p. 284.
unicolor Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 720.
 — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58,
 p. 777. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 230;
 IX, 1867, p. 197. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon
 XXX, 1883, p. 324.
buccalis Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), Nikaragua
 p. 648.
californicus Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, Kalifornien
 p. 145.
cariniceps Mäkl. Bull. Mosc. XXV, 1852, II, p. 317. Sitkha
 — Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884,
 p. 149.
caviceps Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 207; l. c. Neu-Guinea,
 XII, 1878, p. 223. Nord-
 Australien
chalcites Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 721. Kolumbien
cognatus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 361. Amazonas
erassus Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 287. — Fauv. Fn. Europa
 gallo-rhén. III, 1872, p. 260 (ex parte). —
 Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 582.
atratus var. b Heer, Fn. Helv. I, 1838—42,
 p. 220.
crassiventris Thoms. Öfv. Vet. Ac. Förh. 1857,
 p. 229; Skand. Col. II, 1860, p. 226. — Rey,
 Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 316.
minutus Hochh. Bull. Mosc. XXII, 1849, I, p. 176.
nigritulus Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39
 (1839), p. 559; Gen. Spec. Staph. 1839—40,
 p. 719. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II,
 1856—58, p. 775 (ex parte).
curator nom. nov. Amazonas
inspector Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876,
 p. 358.

- cursitor* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 362. Amazonas
curtus Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 135. Nordam. Seen
dauricus Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 557. Daurien
— Hochh. Bull. Mosc. XXXV, 1862, III, p. 82.
dispar Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 147. Nord-
Amerika
eumerus Kiesw. Stett. Ent. Zeit. XI, 1850, p. 220; Ann. Pyrenäen,
Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. 425. — Kraatz, Alpen,
Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 777. Karpathen,
— Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 261. — Finnland
Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 321.
— Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 581.
fallax Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 364. Amazonas
formicetorum Mannh. Bull. Mosc. XVI, 1843, p. 83. Nord- und
— Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 582. Mittel-
crassus Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 260 Europa,
(ex parte). Sibirien
borealis Mäkl. Öfv. Finska Vet. Soc. XXII, 1879—
1880, p. 83; Sv. Ak. Handl. XVIII, 1881, nr. 4,
p. 37.
intermedius Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX,
1883, p. 318.
litoralis Thoms. Öfv. Vet. Ac. Förh. 1857, p. 229;
Skand. Col. II, 1860, p. 226. — Rey, Ann. Soc.
Linn. Lyon XXX, 1883, p. 318.
nigritulus Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39
(1839), p. 559; Gen. Spec. Staph. 1839—40,
p. 719. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II,
1856—58, p. 775 (ex parte).
fraternus Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, Brit.-Kolum-
p. 155. bien,
umbratilis Cas. l. c. p. 156. Wyoming,
Oberer See
gilae Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 146 Arizona
(*Mutinus*).
gratiosus Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, Michigan
p. 133.
hirsutus Cas. l. c. p. 137; Ann. N. York Ac. IV,
1892, p. 711.
Heeri Woll. Ins. Mader. 1854, p. 600. — Fauv. Rev. Madeira
d'Ent. XX, 1901, p. 76.
var. *Wollastoni* Gemm. et Har. Cat. Col. II,
1868, p. 641.
fulvescens Woll. Cat. Col. Mader. 1857, p. 198
(nec Motsch.).
hirtiventris Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, Japan
p. 328.
immarginatus Mäklin, Bull. Mosc. XXVI, 1853, III, Russ.
p. 192. — Casey, Revis. Sten. Amer. North of Amerika
Mex. 1884, p. 150.
laborator Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, Japan
p. 327.
macilentus Sharp, Biol. Centr.-Am. 1, 2, 1882—87 (1886), Guatemala
p. 647.
monticola Cas. Rev. Sten. Am. North of Mex. 1884, p. 134. New-
Hampshire
nasutus Sharp, Biol. Centr.-Am. 1, 2, 1882—87 (1886), Panama
p. 648.

- nigritulus* Gyll. Ins. Suec. IV, 1827, p. 502. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 229. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 264. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 323. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 583.
- campestris* Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 559; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 719. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 776.
- unicolor* Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 286.
- var. *lepidus* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 367. — Eppelsh. Ent. Nachr. V, 1879, p. 194.
- nimbosus* Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 139.
- obductus* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 359.
- optiens* Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 231. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 560; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 720. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 778. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 222. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 261. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 319. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 582.
- pugetensis* Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 140.
- retrusus* Cas. l. c. p. 154.
- seabriculus* J. Sahlb. En. Col. Brach. Fenn. 1876, p. 53.
- simulator* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 364.
- sobrinus* Sharp. Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 647.
- solitarius* Sharp, l. c. p. 647.
- tahoensis* Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 139.
- tinetus* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 360.
- vacillator* Sharp, l. c. 1876, p. 362. — Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 74.
- vacuus* Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 141.
- vestalis* Cas. l. c. p. 138.
- Europa,
Nord-
Afrika
- Griechenland
- Colorado
- Amazonas
Nord- und
Mittel-
Europa
- Washington
- Brit.
Kolumbien
Finnland,
Norwegen
- Amazonas
Panama
- Guatemala
Nevada
- Amazonas
Amazonas,
Kolumbien,
Venezuela,
Brasilien
Kalifornien

Subgen. *Hypostenus* Rey.

Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 183.

- Areus* Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 150 (ex parte).
- Astenus* Lynch, Bol. Ac. Nac. Cordoba VII, 1884, p. 341.
- Hemistenus* Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 557 (ex parte).
- Stenoidotus* Lynch, l. c. p. 338.

- aculeatus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 661.
- acuminatus* Kr. Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 165.
- addendus* Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 654.
- Guatemala,
Mexiko
- Ceylon
- Guatemala,
Panama

- advena* Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 158.
aenescens Lynch, Bol. Ac. Nac. Cordoba 1884, p. 338.
agnatus Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 163. Oberer See
 Argentinien
 Brit.-
 Kolumbien
albipes Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886),
 p. 664. Mittel-
 Amerika
Alluaudi Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 314. Madagaskar
alticola Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886),
 p. 652. Guatemala
alumnus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886),
 p. 654. Mexiko,
 Guatemala
angulipennis Bernh. Arch. Natg. 1908, p. 297. Paraguay
amabilis Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 166. Delaware
ambulator Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886),
 p. 657. Guatemala
Andrewesi Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 49. Ost-Indien
angulnus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 740. Guyana
angusticollis Eppelsb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895,
 p. 405. Ost-Indien
annularis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 735. —
 Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 168. Ostl. u. südl.
 Nord-
 Amerika
arachnipes Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 42. Ceylon
arculus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 744. — Cas. Ostl. Nord-
 Amerika,
 Texas,
 Brit.
 Kolumbien
armatus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886),
 p. 661. Panama
artus Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 182. New York
ascendens Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 18. Deutsch-
 Ost-Afrika
asperatus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886),
 p. 659. Guatemala
assimilis Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 287. England
attenuatus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 738. Madagaskar
bajulus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886),
 p. 653. Guatemala
Bakeri Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910,
 p. 364. Kuba
barbatus Nietn. Ann. Mag. Nat. Hist. 1857, p. 381. —
 Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 163. Ceylon
Barbiellinii Bernh. Arch. Natg. 1908, p. 298. Brasilien
basicornis Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, p. 163. Ceylon
Batesi Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 375. Amazonas
bifrons Waterh. Ent. Monthly Mag. XIV, 1877, p. 25. Ost-Afrika,
 Kongo
birmanus Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 213. Birma
bispinus Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 514. Ost-Indien,
 Sunda-Ina.
bivulneratus Motsch. l. c. p. 514. Ost-Indien
brachypterus Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 164. Ceylon
callosus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 737. — Cas. Pennsylv-
 vanien,
 Florida
canadensis Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884,
 p. 175. Nordam. Seea

- capucinus* Boh. Resa Eugen. 1858, p. 34. — Fauv. Ann. Mus. Genova X. 1877, p. 42; Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 76.
eremitus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 655.
varipes Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 76.
- cephalotes* Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 331.
cerillus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 374.
ceylonicus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 41.
chalybeus Boh. Resa Eugen. 1858, p. 33. — Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 197.
chiriquensis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 663.
chloropterus Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 316.
chontalensis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 666.
cicindela Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 85.
cicindeloides Schall. Abh. Hall. Nat. Ges. I, 1783, p. 324.
— Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 570; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 734. — Kruatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 795. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 231. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 268. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 393. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 585. — Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 77.
biguttatus var. Ol. Ent. III, 1794, nr. 44. 5, t. 1, f. 3d.
bupthalmus Rossi, Fn. Etr. I, 1790, p. 252.
clavicornis Rossi, Mant. Ins. Etr. I, 1792—94, p. 98.
hydropathicus Woll. Cat. Col. Mader. 1857, p. 197.
scabrior Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 282.
similis var. β Ljungh in Web. und Mohr, Arch. I, 1804, p. 66.
- coelestis* Fauv. Ann. Mus. Genova XII, 1878, p. 224, t. 1, f. 20.
coeruleus Waterh. Ent. Monthly Mag. XIV, 1877, p. 24. — Fauv. Ann. Mus. Genova X. 1877, p. 209; XIII, 1878, p. 506.
collaris Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 376.
colubrinus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 737.
concinus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 332.
conductor Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 19.
- confertus* Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 331.
consimilis Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 651.
consors Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 49.
creberrimus Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 316.
cribellatus Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 515.
cribriceps Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 662.
cubensis Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. LX, 1910, p. 364.
cupreus Cast. Étud. ent. I, 1885, p. 124.
ariolus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 742.
jugalis Er. I. c. p. 736 (sec. Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 74).
- Tahiti,
Venezuela,
Brasilien,
Mexiko,
Östl. Nord-Amerika
- Japan
Amazonas
Ceylon
Kalifornien
- Panama
- Madagaskar
Nicaragua
- China, Japan
Europa,
Sibirien,
Madeira
- Neu-Guinea
- N. S. Wales
- Amazonas
Madagaskar
Japan
Deutsch-Ost-Afrika
- Japan
Mexiko
- Ost-Indien
Madagaskar
Ost-Indien
Nikaragua,
Panama
Kuba
Trop. Süd-Amerika,
Nikaragua,
Panama

- currax* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 88.
curtipennis Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital. LX. 1909, p. 233.
cylindricollis Boh. Rees Eugen. 1858, p. 34.
cylindricus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 663.
deceptor Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 666.
decoloripes Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 75, t. 1, f. 3.
delphinus Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 317.
denticollis Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 75, t. 1, f. 4.
detector Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 665.
dieganus Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 315.
dissentiens Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 190.
dissimilis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 87.
docilis Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 653.
elongatus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 741.
europae Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 160.
excisus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 372.
exilis Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 143.
extensus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 368.
exulans Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 660.
flavicornis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 733. — Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 167.
geniculatus Say. Trans. Am. Phil. Soc. IV, 1834, p. 458.
flavidulus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 334.
Flohri Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 666.
fornicatus Steph. III. Brit. V, 1832, p. 287. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 269. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 586.
contractus Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 573; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 744. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 797. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 19, f. 95. — Thoms. Skand. Col. IX, 1867, p. 198. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 406.
basalis Curtis, Ann. Mag. Nat. Hist. V, 1840, p. 277.
frontalis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 737.
fulvescens Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 515.
fulvicornis Steph. III. Brit. V, 1832, p. 284. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 584.
paganus Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 571; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 742. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 796. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 231; IX, 1867, p. 198. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 266. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 403.
- Japan
Brasilien
Malakka
Mittel-
Amerika
Guatemala
Venezuela,
Kolumbien
Madagaskar
Kolumbien,
Venezuela
Panama
Madagaskar
Oherer See
Japan
Guatemala
Brasilien
Maryland,
Virginia
Amazonas
Kalifornien
Amazonas
Guatemala
Östl. Nord-
Amerika
Japan
Mexiko
Europa,
Marokko
Kolumbien
Ost-Indien
Europa,
Nord-
Afrika

- gastralis* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 214.
genalis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 369.
gentilis Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 657.
Godmani Sharp, l. c. p. 662.
- Goudoti* Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 315.
gracilis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 739.
guatemalensis Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 665.
guttalis Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 212.
heres Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 374.
hirtellus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 86.
Hubbardi Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 191.
simiolus Cas. l. c. p. 194.
- imitator* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 56.
inanis Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—1887 (1886), p. 656.
incognitus Sharp, l. c. p. 652.
Indubius Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 330.
irroreus Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 311.
janthinipennis Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1899, p. 544.
juncus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 741.
Kiesenwetteri Rosh. Thiere Andalus. 1856, p. 76 nota.
— Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 793. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 269. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 392. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 586.
- kwaiensis* Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 376.
- laceratus* Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 658.
lacertoides Nietn. Ann. Mag. Nat. Hist. 1857, p. 382.
— Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 165.
laetipes Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 658.
laetulus Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 192.
laticeps Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 372.
latifrons Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 572; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 743. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 797. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 230. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 265. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 404. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 583.
- Leai* nom. nov.
longiventris Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1899, p. 542.
lencopus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 651.
leviceps Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 193.
lucidus Cas. l. c. p. 196.
politus Cas. l. c. p. 193.
- Birma
Amazonas
Guatemala
- Mexiko,
Guatemala
Madagaskar
"Guatemala
- Birma
Amazonas
Japan
Nordam. Seen
- Baikal
Panama
- Guatemala
Japan
Madagaskar
Australien
- Kolumbien
Bayern.
Frankreich,
England
- Deutsch-Ost-Afrika
Mexiko
- Ceylon
- Mexiko
- Kalifornien
Amazonas
Europa
- Australien
- Mexiko,
Guatemala
Kalifornien,
Vancouver,
Brit.
Kolumbien

- lubricus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 739. Brasilien
lugens Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 161. Massa-
 chusetta
madecassa Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1898, p. 179. Madagaskar
megalops Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, Florida
 p. 161.
megops Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), Panama
 p. 658.
mercator Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 333. Japan
meridionalis Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, Florida
 p. 185.
micans Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), Guatemala
 p. 656.
millepunctus Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 49. Ost-Indien
mirus Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 313. Madagaskar
monomerus Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 214. Birma
Moritzzi Bernh. Arch. Natg. 1908, p. 297. Venezuela
mysticus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 330. Japan
nairobiensis Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 19. Brit. Ost-
 Afrika
nlgricus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 371. Amazonas
niteseens Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, Florida
 p. 170.
obconicus Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 313. Madagaskar
oblitus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 87; Ann. Japan
 Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 332.
operosus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 736. Brasilien
oscillator Rye, Ent. Monthly Mag. VII, 1870, p. 7; England
 Ent. Ann. 1871, p. 35. — Fauv. Fn. gallo-rhén.
 III, 1872, p. 265 nota.
papagonis Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, Arizona
 p. 180.
parae Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 370. Amazonas
parviceps Sharp, l. c. p. 377. "
pauloensis Bernh. Arch. Natg. 1908, p. 299. Brasilien
peregrinus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), Panama
 p. 656.
perforatus Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, Arizona
 p. 169.
pertinax Cas. l. c. p. 195. Rocky Mts.
pertusus Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, Chile
 p. 444.
peruvianus Bernh. Arch. f. Natg. 1908, p. 299. Peru
pictus Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 515. Ost-Indien
piliferus Motsch. l. c. p. 514. "
pinguis Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 177. Westl. Nord-
 Amerika
placidus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), Panama
 p. 663.
planiceps Harold, Mitth. Münch. Ent. Ver. IV, 1880, p. 149. Bolivien
planifrons Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 253; Rev. Neu-
 d'Ent. XXII, 1903, p. 262. Kaledonien,
 Celebes,
 Northwest-
 Australien
plicipennis Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, Vancouver
 p. 162.
pluripunctus Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 316. Madagaskar

- podagricus** Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 667.
- pollens** Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 171.
- patens* Cas. l. c. p. 172.
- prolixus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 738.
- prospector** Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 18.
- proximus** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 378.
- puehlanus** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LX, 1910, p. 365.
- pulcher** Motsch. Étud. ent. 1859, p. 71.
- punctatus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 744. — Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 189.
- dilutus* Cas. l. c. p. 184.
- obsoletus* Cas. l. c. p. 181.
- Quedenfeldti** Harold, Mitth. Münch. Ent. Ver. V, 1881, p. 155.
- remotus** Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 659.
- repandus** Poppius, Öfv. Finska Vet. Förh. LI, 1908—09, nr. 4, p. 19.
- rorellus** Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 17.
- rufescens** Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 88.
- sagax** Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 665.
- Salvini** Sharp, l. c. p. 659.
- Sayi** Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 164.
- scutiger** Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 660.
- sedatus** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 333.
- segnis** Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 655.
- Sicardi** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 314.
- signifer** Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 213.
- similis** Herbst in Füessly's Archiv V, 1784, p. 151. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 267. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 585.
- cognatus* Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 283.
- modestus* Luc. Expl. Alg. Ent. 1849, p. 124 nota, t. 13, f. 5.
- oculatus* Grav. Col. Mier. Brunsv. 1802, p. 155. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 569; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 733. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 795. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 232. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 397.
- siculus* Stierl. Mitteil. Schweiz. Ent. Ges. II, 1867, p. 221.
- solutus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 734. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 268. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 395. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 585.
- Nicaragua
- Washington,
Kalifornien,
Colorado
- Madagaskar
Brit.
Ostafrika
- Amazonas
Mexiko
- Ceylon, Java,
Ost-Indien
- Östl. Nord-
Amerika
- Zanzibar
- Guatemala
- Ost-Sibirien,
Nord-
Rußland
- Brit.
Ost-Afrika,
Abessinien,
Süd-Afrika
- Japan
- Guatemala,
Panama
- Panama
- Kalifornien
- Panama
- Japan
- Panama
- Madagaskar
Birma
- Europa,
Mittelmeer-
gebiet
- Westl.
Mittel-
Europa

- speculifrons* Fauv. Ann. Soc. Ent. Belg. XX, Bull. p. XXV.
snaveolus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 667.
subopacus Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 20.
tabascensis Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 366.
tarsalis Ljungh in Web. und Mohr, Arch. I, 1804, p. 157.
 — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 569; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 732. —
 Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 794. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 232.
 — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 267. —
 Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 400.
 — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 584.
buphtalmus Ljungh, l. c. p. 67.
clavicornis Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 156.
flavitaris Steph. III. Brit. V, 1832, p. 286.
insidiosus Solsky, Bull. Mosc. XXXVII, 1864, II, p. 449.
nigriclavis Steph. III. Brit. V, 1832, p. 285.
propinquus Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 174.
reconditus Cas. l. c. p. 173.
riparius Runde, Brach. Hal. 1835, p. 16.
roscidus Voll. Bowst. Fn. Nederl. II, p. 71.
rufitaris Steph. III. Brit. V, 1832, p. 286.
teres Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 740.
tificacanus Bernh. Arch. Natg. 1908, p. 299.
trepidus Waterh. Ent. Monthly Mag. XIV, 1877, p. 25.
tricarinatus Kraatz, Arch. Natg. XXV, 1859, I, p. 164.
tricolor Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 373.
troile Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 317.
tumidulus Solsky, Fedtsch. Reise Turk. II. V, 1874, II, p. 199.
turkestanicus nom. nov.
indubius Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 583.
uniformis Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 312.
velocipes Fauv. Rev. d'Ent. V, 1886, p. 146; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 179.
velox Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 333.
ventralis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 368.
ventricosus Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 48.
vestigialis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 732.
villosiventris Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1899, p. 543.
violaceus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 194.
volvulus Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 312.
Wasmanni Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 214.
- Pampas,
Montevideo
Guatemala

Brit. Ost-
Afrika
Mexiko

Europa,
Nord-
Amerika

Brasilien
Peru
Zambesi
Ost-Indien,
Java
Amazonas
Madagaskar
Turkestan

Turkestan

Madagaskar
Philippinen

Japan
Amazonas
Ost-Indien
Mexiko
Australien

Brasilien
Madagaskar
Birma

Subgen. Hemistenus Motsch.

- Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 557 (ex parte).
Arens Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 150 (ex parte).
Mesastenus Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 183.
Parastenus Heyden, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 262.

- abdominalis** Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 210.
- aceris** Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 292. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. X, 1866, p. 25. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 595.
- aerosus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 727. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 282. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 337.
- annulatus** Crotch, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) V, 1865—67, p. 442.
- elegans** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 163.
- aeneotinctus** Woll. Cat. Canar. 1864, p. 592.
- audax** J. Sahlb. Acta Soc. Fn. Fl. Fenn. XIX, 1900, nr. 3, p. 16.
- auriger** Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 57.
- Belli** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 47.
- bicolon** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 328.
- bifoveolatus** Gyll. Ins. Suec. IV, 1827, p. 500. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 781. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 234. — Fauv. Fn. gallo-rhén. II, 1872, p. 275. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 384. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 590.
- nitidus** Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 300.
- phaeopus** Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 288.
- plancus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 723.
- binotatus** Ljungh in Web. und Mohr, Arch. I, 1, 1804, p. 66. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 561; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 721. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 779. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 232. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 272. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 370. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 588.
- carens** Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 371.
- pilosulus** Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 298.
- canescens** Rosh. Thiere Andal. 1856, p. 74. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 270. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 365. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 587.
- arabicus** Sauley, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 657.
- major** Muls. et Rey, Opusc. Entom. XII, 1861, p. 163.
- circumflexus** Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 211.
- clavulus** Hochh. Bull. Mosc. XXII, 1849, I, p. 174.
- Lederi** Eppelsh. Verh. Nat. Ver. Brünn XVI, 1877, p. 117, t. 1, f. 6.
- conformis** Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 44.
- coarcticollis** Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 170.
- cordatus** Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 198. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 726. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 278. — Rey, Ann.

Birma

Westl.

Mittel-
Europa,
Mittelmeer-
gebiet,
EnglandCanar. Inseln
FinnlandBaikal
Ost-Indien
JapanNord- und
Mittel-
Europa

Europa

Mittelmeer-
gebiet,
EnglandBirma
Kaukasus

Amur

Kaukasus,
Mittel-
Europa
Westl. Mittel-
meergebiet,
Kroatien,

- Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 328. — Ganglb.
Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 592.
- aeneus* Luc. Expl. Alg. Ent. 1849, p. 123, t. 13, f. 4.
Monticellii Costa, Atti Nap. IV, p. 59.
- princeps* Hampe, Stett. Ent. Zeit. XI, 1850, p. 349.
- cribratus* Kiesw. Stett. Ent. Zeit. XI, 1850, p. 220.
— Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 593.
- gracilicornis* Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII,
1869, p. 396.
- hespericus* Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX,
1883, p. 334.
- politus* Aubé, Mat. Cat. Grenier 1863, p. 38.
— Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 279. —
Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 332.
- serpentinus* Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2)
V, 1869, p. 21.
- croceatus* Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884,
p. 158.
- cyaneus* Baudi, Stud. ent. I, 1848, p. 142. — Kraatz,
Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 123. — Baudi,
Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 396. —
Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 593.
- rutilans* Sauley, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864,
p. 656.
- splendens* Sauley, l. c. p. 656.
- densipennis* Sharp, Biol. Centr.-Am. I. 2, 1882—87
(1886), p. 650.
- elegans* Rosh. Thiere Andal. 1856, p. 75. — Fauv. Fn.
gallo-rhén. III, 1872, p. 280. — Rey, Ann. Soc.
Linn. Lyon XXX, 1883, p. 338. — Ganglb.
Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 595.
- Fauveli* Bris. Mat. Cat. Gren. 1863, p. 128.
- ochropus* Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. II. 1858,
p. 125.
- Erichsoni* Rye, Entom. Monthly Mag. I, 1864, p. 108.
— Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 289. —
Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 598.
- flavipes* Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39
(1839), p. 566; Gen. Spec. Staph. VI, 1839—40,
p. 729. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II,
1856—58, p. 789. — Thoms. Skand. Col. II,
1860, p. 237. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon
XXX, 1883, p. 356.
- var. *longelytratus* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges.
Wien L, 1900, p. 48.
- var. *Ludyi* Fauv. Rev. d'Ent. IV, 1885, p. 280.
— Ganglb. Ann. Hofm. Wien XI, 2, 1896, p. 173.
- Feae* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 211.
- flavipes* Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 289. — Fauv. Fn.
gallo-rhén. III, 1872, p. 278 (nec Er., Kr.). —
Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 591.
- Dobberti* Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVI,
1882, p. 183.
- filum* Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—38 (1839),
p. 568; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 731.
— Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58,
p. 792. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 235.

Turkestan,
Süd-
Europa

Provence,
Korsika,
Italien,
Dalmatien,
Griechen-
land,
Türkei,
Österreich

Östl. Nord-
Amerika
Syrien

Panama

Süd-Europa,
Westl.
Mittel-
meergebiet

Europa

Österreich,
Tirol
Frankreich,
Kroatien,
Schlesien

Birma

Europa,
Algier,
Marokko,
Tunis

- Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 388.
- var. *Payeri* Krauss, Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 204. Steiermark
- flavipalpis** Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 237; IX, 1867, p. 200. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 597. Nördl.
Europa,
Tirol
- flavipennis* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Suppl. 1874, p. 64.
- loveicollis** Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 782. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 275. Nord- und
Mittel-
Europa
- Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 383. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 590.
- bijoveolatus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 723 (nec Gyll.).
- brevicollis* Thoms. Öfv. Vet. Ac. Förh. 1857, p. 231; Skand. Col. II, 1860, p. 234; IX, 1867, p. 199.
- fuscicornis** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 730. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 791. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 287. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 342. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 596. Mittel-
Europa,
Algier,
Tunis
- Ganglbaueri** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 583. Dalmatien,
Türkei,
Klein-
Asien
Chile
- Gayi** Sol. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 306, t. 5, f. 10. — Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 443.
- geniculatus** Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 228 (*oculatus* var.). — Er. Käf. Mk. Brandenb. 1837—39 (1839), p. 564; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 728. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 788. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 236; IX, 1867, p. 200. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 285. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 349. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 596. Nord- und
Mittel-
Europa,
Sardinien,
Kaukasus
- proboscideus* Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 476.
- Gestroi** Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 212. Birma
- glacialis** Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 224. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 787. Mittel-
Europa
- Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 281. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 344. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 593.
- muscorum* Fairm. et Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 42.
- ab. *densatus* Kolhe, Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 416.
- grossepunctatus** Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1887, p. 264. Kaukasus
- guttulifer** Waterh. Ent. Monthly Mag. XIV, 1877, p. 24. — Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 209. N. S. Wales
- Holmbergi** Lynch, Bol. Ac. Nac. Cordoba VII, 1884, p. 335. Argentinien

- Hopfgarteni** Eppelsh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIX, 1879, p. 40. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 601. Kroatien, Bosnien, Krain, Piemont
- hospes** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 726. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 279. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 331. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 592. Piemont, östl. Mittelmeergebiet
- longicornis** Sauley, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 657.
- pulchripes** Solsky, Hor. Ross. V, 1867, p. 31.
- hypsidermus** Ganglb. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 104. Krain
- impressus** Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 36. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 564; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 728. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 788. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 236; IX, 1867, p. 200. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 283. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 353. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 597. Europa, Algier, Kaukasus
- aceris** Boisd. et Lacord. Fn. Paris I, 1835, p. 445 (nec Steph.).
- angustulus** Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 226.
- annulipes** Heer, l. c. p. 225.
- carinifrons** Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 512.
- gilvipes** Motsch. l. c. p. 512.
- proboscideus** Germ. Fn. Ins. Eur. XV, 1831, p. 1.
- subrugosus** Steph. III. Brit. V, 1832, p. 290.
- tenuicornis** Steph. l. c. p. 291.
- insularis** J. Sahlb. Vega-Exp. Vet. IV, 1885, p. 53.
- Kolbel** Gerh. Zeitschr. Entom. Breslau (n. F.) XVIII, 1893, p. 6; Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 359. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 600. Japan, Schlesien, Steiermark, Ungarn
- latitarsis** Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 329. Japan
- languidus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 725. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 276 nota. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 377. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 591. Süd-Europa, westl. Mittelmeergebiet
- Leprieuri** Cussac, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. XXIX. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 783. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 274. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 386. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 589. Frankreich, Rheinprovinz, Spanien
- sculptus** Rey, l. c. p. 388.
- Llechtensteini** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien L, 1900, p. 47. Tirol
- lineola** Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 20.
- longiventris** Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 650. Kaukasus, Panama
- maculatus** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 148. — Fauv. Ann. Mus. Genova X, 1877, p. 208 nota; l. c. XIII, 1878, p. 504. Australien
- micropterus** Eppelsh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIX, 1879, p. 465. Kaukasus
- monachus** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 582. Griechenland

- montivagus** Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 578. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 791 nota. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 284. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 358. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 599.
var. *carpathicus* Ganglb. Ann. Hofmus. Wien 1896, p. 173.
- nitidiusculus** Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 292. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 277. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 591.
juncorum Steph. l. c. p. 292.
obliquus Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 224.
tempestivus Fr. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 563; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 724. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 784. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 234. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 375.
- niveus** Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. IX, 1865, p. 307; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 273. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 374. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 589.
cavifrons Muls. et Rey, Opusc. Ent. XIV, 1870, p. 110; Ann. Soc. Linn. Lyon XVIII, 1870, p. 86. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 353.
- obesulus** Fauv. Ann. Mus. Genova XIII, 1878, p. 506.
- obscuripes** (Ganglb. Ann. Hofmus. Wien, XI, 2, 1896, p. 174. — Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIX, 1899, p. 26.
- ornativentris** Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 650.
- ossium** Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 290. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 284. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 594.
carinifrons Fairm. et Laboulb. Fn. Fr. I, 1854, p. 589.
elevatus Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 511.
impressipennis Jacq. du Val, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, p. 701. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 339.
sardous Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 786 nota.
var. *insularis* Joy, Ent. Monthly Mag. XLII, 1906, p. 5.
- pallipes** Grav. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 157. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 567; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 731. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 790. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 238. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 286. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 361. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 599.
immunis Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 290.
- pallitarsis** Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 298. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 273. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 639.
binotatus var. b Gyll. Ins. Suec. IV, 1827, p. 500.

Jura,
Westalpen,
Sudeten,
Karpathen

Nord- und
Mittel-
Europa

Harz,
Thüringen
Frankreich,
Schottland

Queensland
Siebenbürgen

Panama

Mittelmeer-
gebiet,
westl.
Mittel-
Europa

Gross-
britannien
Europa,
Algier

Europa,
westl.
Mittelmeer-
gebiet

- plantaris* Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 562; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 722. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 781. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 233; IX, 1867, p. 199. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 372.
- paludicola* Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 124.
- palustris* Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 565; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 729. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 790. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 238; IX, 1867, p. 200. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 287. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 351. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 597.
- proboscideus* Heer, Fn. Helv. 1838—42, p. 225 (nec Gyll.).
- predator* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 367.
- peraffinis* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 209.
- picipennis* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 725. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 785. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 276. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 378. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 590.
- picipes* Steph. III. Brit. V, 1832, p. 288. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 274. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 589.
- rufimanus* Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 577.
- rusticus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 724. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 783. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 233; IX, 1867, p. 199. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 380.
- spretus* Fairm. et Laboulb. Fn. Fr. I, 1854, p. 590.
- testaceicornis* Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon IV, 1857, p. 121.
- villicornis* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 208.
- posticus* Fauv. l. c. p. 209.
- pteroabrachys* Gemm. et Har. Cat. Col. II, 1868, p. 639. — Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 72. — Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 102.
- brevipennis* Mäkl. Bull. Mosc. XXV, 1852, II, p. 318 (nec Thoms.).
- pubescens* Steph. III. Brit. V, 1832, p. 297. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 271. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 587.
- laevior* Steph. l. c. p. 297.
- laevis* Steph. l. c. p. 297.
- subimpressus* Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—1839 (1839), p. 561; Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 722. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 780. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 232; IX, 1867, p. 199. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 368.
- pustulifer* Fauv. Ann. Mus. Genova XIII, 1878, p. 505.
- Reitteri* Weise, Berl. Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 356. — Eppelsh. Ent. Nachr. V, 1879, p. 194. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 600.

Griechenland
Nord- und
Mittel-
Europa

Amazonas
Birma
Deutschland,
Frankreich,
England,
Korsika,
Nord-
Afrika
Europa,
östl.
Mittelmeer-
gebiet

Birma
" "
Alaska

Nord- und
Mittel-
Europa

N. S. Wales
Ungarn

- rugipennis* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 85.
sallinus Brisout, Mat. Cat. Gren. 1863, p. 39. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 271. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 369. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 588.
subconvexus Rey, l. c. p. 370.
scaber Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (2) V, 1869, p. 21; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 285. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 357. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 346. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 596.
italicus Baudi. Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 367.
bituberculatus Motsch. Bull. Mosc. XXX, 1857, IV, p. 511 (veris).
scabripennis Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 649.
scabrosus Sharp, l. c. p. 648.
Sharpi nom. nov.
palpalis Sharp. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 329 (nec Er.).
sparsus Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Suppl. 1874, p. 39 nota.
speculifer Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 288.
stigmaticus Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 210.
subaeneus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 727. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 786. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 281. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 334. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 594.
geniculatus Mannh. Brach. 1830, p. 43.
gonymelas Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 291 (veris).
subcylindricus Scriba in Heyd. Reise südl. Span. 1870, p. 83. — Mars. Ab. VIII, 1871, p. 359. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 288 nota.
subnotatus Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 95.
sulcicollis Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 295. — Waterb. et Jans. Trans. Ent. Soc. Lond. 1854, p. 148.
suramensis Eppelsh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX, 1879, p. 466.
var. *confrater* Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 227.
trajectus Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 179.
transsilvanicus Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien L, 1900, p. 48.
trochanterinus Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 649.
utenis Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 178.
virgula Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 210.
- Japan
Westl. Mittel-Europa, westl. Mittelmeergebiet
Provence, Italien, Korsika, Algier, Dalmatien
Mittel-Amerika
Mexiko, Guatemala
Japan
Korsika, Spanien
Pyrenäen
Birma
Westl. Mittel-Europa, westl. Mittelmeergebiet, Süd-Europa
Spanien
Venezuela
England
Kaukasus, Algier, Tunis
Colorado
Siebenbürgen
Panama
Colorado
Birma

Dianous Sam.

Samouelle, Ent. Compend. 1819, p. 173. — Curtis, Brit. Entom. III, 1826, p. 107. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 527; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 688. — Lacord. Gen. Col. II, 1855, p. 102. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 738. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 51. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 211. — Fauv.

Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 224. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 175. — Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 8. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 548.

- coerulescens* Gyll. Ins. Suec. II, 1810, p. 463. — Er. Nord- und
Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 528. Mittel-
— Gen. Spec. Staph. 1840, p. 689. — Kraatz, Europa,
Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 739. — Nord-
Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 20. Amerika
f. 96. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 211.
— Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 225. —
Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 177.
— Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 549.
biguttatus Ljungh in Web. und Mohr, Arch. I,
1804, p. 62.
bisetosus Dufour, Bull. Soc. Pau 1843, p. 36.
chalybaeus J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 49.
nitidulus J. Lec. Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. XVI, 1874, Nord-
p. 272. — Cas. Rev. Sten. Amer. North of Mex. Amerika]
1884, p. 9.
zephyrus Cas. l. c. p. 11.
verticosus Eppelsb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 404. Pegu
3

VI. Subfam. Euaesthetinae.

- Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 639. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 542. — Reitt. Fann. Germ. II, 1909, p. 153.
Euaesthetina Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 114.
Euaestheti J. Lec. (*Stenini* Group II) Classif. Col. North Amer. 1, I, 1861—62, p. 67. — Fauv. (*Stenini* Section I) Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 218, Suppl. 1875, p. 36 (excl. *Leptotyphlae*). — J. Lec. et Horn (*Paederini* Group I), Classif. Col. North Amer. 1883, p. 98.
Evesthétiens Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 299 (excl. *Leptotyphlae*).
Euaesthetini Casey, Trans. Amer. Ent. Soc. 1884, p. 18.

1. Tribus: Nordenskiöldiini.

Nordenskiöldia J. Sahlb.

J. Sahlb. Sv. Vet. Ak. Handl. XVII, 1880, nr. 4, p. 96.

- glacialis* J. Sahlb. l. c. t. 1, f. 15. Ost-Sibirien
1

2. Tribus: Stenaesthetini.

Stenaesthetus Sharp.

Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 79.

- illatus* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 357. Amazonas
Kraatzi Bernh. Arch. Natg. 1908, p. 300. Paraguay
sunoides Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 80. China, Japan
3

Stictocranius J. Lec.

J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1866, p. 374.

puncticeps J. Lec. l. c. p. 374.

Washington

1

3. Tribus: Euaesthetini.

Turellus Sharp.

Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 423. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 766.

Batesi Sharp, l. c. p. 424.

Amazonas

1

Octavius Fauv.

Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 220.

crenicollis Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Suppl. 1874, p. 59.

Pyrenäen

grandiceps Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 39; Opusc. Ent. II, p. 52. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 220 nota.

See-Alpen,
Italien

insularis Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 220 nota. — Saulcy, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz 1878, p. 123.

Korsika

italus Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1908, p. 105.

Italien

pyrenaeus Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 220, t. 3, f. 2.

Pyrenäen

Raimondi Saulcy, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz 1878, p. 124.

Sardinien

Vitalei Bernh. Soc. Ent. XXIII, 1908, p. 25.

Sizilien

7

Edaphus J. Lec.

J. Lec. Classif. Col. North Amer. I. 1861, p. 67. — Smithson. Miscell. Coll. VI, 1867, p. 50. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 218. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 301. — Cas. Trans. Amer. Ent. Soc. 1884, p. 30. — J. Lec. et Horn, Classif. Col. North Amer. 1883, p. 98. — Horn, Bull. Brooklyn Soc. VII, 1885, p. 121. — Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), p. 640. — Schauf. Hor. Ross. XXI, 1887, p. 110—113. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 543.

Tetratarsus Schauf. Nunq. Otios. II, 1872, p. 460; Ann. Mus.

Genova XVIII, 1882—83, p. 166—172 (*Tetrameres* emend).

— Fauv. Rev. d'Ent. I. 1882, p. 138; l. c. XIV, 1895, p. 205;

l. c. XXI, 1902, p. 38.

africanus Eppelsb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1885, p. 139.

West-Afrika,
Abessinien

carinicollis Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVII, 1907, p. 380.

Japan

cribricollis Schauf. Hor. Ross. XXI, 1887, p. 109.

Sumatra

densatus Fauv. Mitt. Nat. Hist. Mus. Hamburg XXII, 1905, p. 81.

Java

- dentiventris* Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 137. Ost-Indien,
Java
- dilutus* Schauf. Hor. Ross. XXI, 1887, p. 109. Sumatra
- dissimilis* Aubé, Mat. Cat. Grenier 1863, p. 37. — Fauv. Süd-
Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 218. — Muls. et Frankreich,
Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 301. Korsika,
— Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 543. Italien,
Dalmatien
- euplectoides* Sharp, Biol. Centr.-Am. I, 2, 1882—87 (1886), Guatemala
p. 640.
- japonicus* Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, Japan
p. 325.
- Kaufmanni* Reitt. Wien, Ent. Zeit. XXVIII, 1909, Kroatien
p. 303.
- Lederi* Eppelsh. Verh. Ver. Brünn XVI, 1878, p. 118, Kaukasus
t. 1, f. 7.
- major* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 205. Birma
- nitidus* J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 50. Östl. Nord-
carinatus Cas. Trans. Amer. Ent. Soc. 1884, p. 30. Amerika
— Horn, Bull. Brooklyn Soc. VII, 1885, p. 121.
- luculentus* Cas. l. c. p. 31.
- punctatus* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 206. Birma
- sumatrensis* Schauf. Hor. Ross. XXI, 1887, p. 110. Sumatra

15

Edaphellus Fauv.

Fauv. Ann. Mus. Genova XII, 1878, p. 220.

- novae-guinene* Fauv. l. c. p. 220, t. 1, f. 18. Neu-Guinea
1

Tamotus Schauf.

Schauf. Peelaph. Siam 1877, p. 24; Nunq. Otios. II, 1872, p. 460; Ann.
Mus. Genova XVIII, 1882, p. 170. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 38.

- lemoratus* Schauf. Nunq. Otios. II, 1872, p. 289; Ann. Kuba
Mus. Genova XVIII, 1882, p. 170, f. a, b, c, d.
— Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 38.

1

Euaesthetus Grav.

Grav. Mon. Micr. 1806, p. 201. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39
(1839), p. 574; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 746. — Lacord. Gen. Col.
II, 1855, p. 109. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 734.
— Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 53. — Thoms. Skand. Col.
III, 1860, p. 115. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 221. — Muls. et
Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 303. — Cas. Trans. Amer.
Ent. Soc. 1884, p. 19. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 544.

Eristhetus Mannerb. Brach. 1830, p. 41. — Boisd. et Lacord.
Faun. Ent. Paris I, 1835, p. 438.

- americanus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 747. — Östl. Nord-
Cas. Trans. Amer. Ent. Soc. 1884, p. 27. Amerika

- atomus* Cas. Trans. Amer. Ent. Soc. 1884, p. 28.
hipunctatus Ljungh in Web. und Mohr, Arch. I, 1, 1804, p. 68. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 222. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 308. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 545.
brevipennis Muls. et Rey, l. c. p. 308.
Mariae Bethé, Stett. Ent. Zeit. XXVIII, 1867, p. 308.
ruficollis Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 558.
scaber Grav. Mon. Col. Micr. 1806, p. 202. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 574; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 746. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 736. — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 115. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 306.
brevipennis Cas. Trans. Amer. Ent. Soc. 1884, p. 20.
elongatus Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 557.
floridae Cas. Trans. Amer. Ent. Soc. 1884, p. 24.
irigidus Poppus, Öfv. Finska Vet. Förh. LI, 1908—09, nr. 4, p. 21.
fulvus Motsch. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, II, p. 558. — Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. II, 1883, p. 265.
granulipennis Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 429.
immarginatus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 748.
iripennis Cas. Trans. Amer. Ent. Soc. 1884, p. 25.
japonicus Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVII, 1907, p. 380.
laeviusculus Mannh. Bull. Mosc. XVII, 1844, p. 195. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 736. — Thoms. Skand. Col. IX, 1867, p. 286. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 224. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 303. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 546.
ruficollis Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 116.
mundulus Cas. Trans. Amer. Ent. Soc. 1884, p. 23.
neomexicanus Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIII, 1907, p. 219.
nitidulus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 78.
punctatus Cas. Trans. Amer. Ent. Soc. 1884, p. 24.
robustus Cas. l. c. p. 23.
ruficapillus Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 439. — Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39 (1839), p. 575; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 747. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. 1856—58, p. 737. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 20, f. 97. — Thoms. Skand. Col. IX, 1867, p. 287. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 223. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 311. — Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. III, 1895, p. 545.
Lespesi Jacq. du Val, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VIII, 1850, p. 48.
- Florida
 Nord-,
 Mittel-
 Europa,
 Sibirien
- Michigan
 Daurien
 Florida
 Ost-Sibirien
- Kirgisen-
 Steppe,
 Kaukasus
 Amurgebiet
- Kolumbien
 Ohio
 Japan
- Nord- und
 Mittel-
 Europa
- Massachusetts
 Neu-Mexiko
- Japan
 Florida
 Massachusetts
- Nord- und
 Mittel-
 Europa,
 Italien,
 Kaukasus

- pullus* Thoms. Öfv. Vet. Ac. Förh. 1857, p. 235;
 Skand. Col. III, 1861, p. 116.
similis Cas. Trans. Amer. Ent. Soc. 1884, p. 22. Florida
texanus Cas. l. c. p. 26. Texas
 21

Ctenomastax Kraatz.

- Kraatz in Heyd. Reise südl. Span. 1870, p. 84, t. 2, f. 4. — Sharp, Biol.
 Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 640.
Ctenomax Duvivier, Kat. Staph. 1883, p. 177.
Kiesenwetteri Kraatz, l. c. t. 2, f. 4. — Mars. Ab. VIII, Spanien
 1871, p. 341. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872,
 p. 291, t. 3, f. 13.
pharaonum J. Sahlb. Öfv. Finska Vet. Förh. 1907—08, Ägypten
 nr. 7, p. 32.
varicolor Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 57. Andalusien,
 Tunis

W. JUNK, Berlin W. 15.

Verlag und Antiquariat für Entomologie.

- Pars 19: M. Bernhauer et K. Schubert, Staphylinidae I.
1910. 86 p. (Mark 8.10) Mk. 5.40
20: A. Schmidt, Aphodiinae. 1910. 111 p.
(Mark 10.50) Mk. 7.—
21: K. Ahlwarth, Gyrinidae. 1910. 42 p.
(Mark 4) Mk. 2.70
22: H. Gebien, Tenebrionidae II. 1910. 188 p.
(Mark 17.70) Mk. 11.80
23: S. Schenkling, Cleridae. 1910. 174 p.
(Mark 16.35) Mk. 10.90
24: H. Bickhardt, Histeridae. 1910. 137 p.
(Mark 12.85) Mk. 8.60
25: K. W. von Dalla Torre, Cebriionidae. 1911. 18 p.
(Mark 1.70) Mk. 1.15
26: M. Pic, Scraphiidae, Pedilidae. 1911. 27 p.
(Mark 2.60) Mk. 1.75
27: A. Raffray, Pselaphidae. 1911. 222 p.
(Mark 20.80) Mk. 13.90
28: H. Gebien, Tenebrionidae III. 1911. 231 p.
(Mark 21.75) Mk. 14.50
-

- Jacobs, Diptères du voyage Antarctique du S. Y. „Belgica“.
1906. 4. 12 p. av. 3 pl. (1 color.) Mk. 2.50
W. Junk, Entomologen-Adreßbuch. 1905. 302 p. Origbd.
Mk. 5.—
K. Mitterberger, Verzeichnis der im Kronlande Salzburg bis-
her beobachteten Mikro-Lepidopteren (Kleinschmetter-
linge). 1910. 358 p. Mk. 10.—
O. Prochnow, Über die Färbung der Lepidoptera. 1907. 262 p.
mit 4 Tfln. (2 color.) Mk. 12.—
O. Prochnow, Die Laut-Apparate der Insekten. 1908. 178 p.
mit 49 Fig. Mk. 5.—
O. Prochnow, Reactionen auf Temperatur-Reize. 1908. 63 p.
mit Fig. Mk. 2.50
C. Ribbe, Anleitung zum Sammeln von Schmetterlingen in
tropischen Ländern. 1907. 8. 44 p. Mk. 1.50
Zeitschrift für systemat. Hymenopterologie und Dipterologie.
Herausg. von F. W. Konow. 8 Jahrgänge (soviel er-
schienenen). 1901—1908 mit 7 Tfln. (Preis statt 80 Mark)
Mk. 45.—