





Zijaanzicht ♀




Buikzijde ♀

WETENSCHAPPELIJKE NAAM

Etmopterus spinax (Linnaeus, 1758).

VERSPREIDING

IJsland tot Noorwegen en Gabon en de westelijke Middellandse Zee. Ook in de Azoren, Kaapverdische Eilanden en de Zuid-Afrikaanse Kaapprovincieⁱ.



LOKALE NAMEN

DONKERBUIKLANTAARNHAAI, Zwarte Doornhaai, Velvet Belly Lanternshark (UK), Sagre Commun (Fr), Negrito (Es).

KENMERKEN

- 1 Tweede rugvin twee keer zo groot als de eerste.
- 2 Grote stekels bij de rugvinnen.
- 3 Buikzijde met lichtgevende fotofoeren.
- 4 Geen anaalvinⁱⁱ.

KLEUR

- ⦿ Rugzijde bruin.
- ⦿ Buikzijde zwart.
- ⦿ Duidelijke zwarte tekening op zijkanten van de staart en rondom de buikvinnenⁱⁱⁱ.


BIOLOGIE EN GROOTTE

- ⦿ Bij geboorte: 12–14 cm. Bij geslachtsrijpheid: 33–36 cm. Max TL: 60 cmⁱⁱ.
- ⦿ 6–20 jongen per worp zijn gemeldⁱⁱ.
- ⦿ Eet vis, inktvissen, kreeftachtigen en zoöplanktonⁱⁱⁱ.


TANDEN

- Mesvormige tanden in de onderkaak met enkele punt.
- Tand in de bovenkaak puntig, 3 of minder bijspitsenⁱ.


GELIJKAARDIGE SOORTEN




- *Etmopterus spinax*, **Donkerbuiklantaarnhaai**



- *Etmopterus pusillus*, **Gladde Lantaarnhaai**



- *Etmopterus princeps*, **Grote Lantaarnhaai**



- *Centroscyllium fabricii*, **Zwarte Lantaarnhaai**



- *Centroscymnus coelolepis*, **Portugese IJshaai**

HABITAT

- 70–2490 m^{iv}, voornamelijk 200–500 mⁱ.
- Gewoonlijk op of nabij de bodem, ook aangetroffen in de pelagische sleepnetvisserijⁱ.
- Leven gescheiden naar geslacht en grootte: grote, geslachtsrijpe vrouwtjes op grote diepteⁱⁱ.

BESCHERMINGSSTATUS

- Populaties lijken stabiel in de Middellandse Zee en in het zuidelijke- en oostelijke deel van de Centraal-Atlantische Oceaan. Afname van ~20% zijn gemeld in de Noordoost-Atlantische Oceaan sinds 1970ⁱⁱ.
- **Status op de Rode Lijst:** LC - Momenteel niet in gevaar (2009)ⁱ. NT - Bijna in gevaar in Europese wateren (2015)^v.

COMMERCIEEL BELANG

- Beperkte commerciële waarde maar er is een tekort aan gedetailleerde gegevens.
- Bijvangst in bodem- en pelagische sleepnetvisserij.
- Kan gebruikt worden voor vismeel en consumptie, gedroogd en gezoutenⁱ.

HANTEREN

- Voorzichtig hanteren.
- Sterk ontwikkelde stekels bij de rugvinnen.
- Scherpe tanden.
- Schurende huid.

REFERENTIES

- Coelho, R. *et al*; 2009. IUCN Red List.
- Compagno, L. J. V; 1984. FAO.
- Cortés, E; 1999. *ICES JMS*.
- Jones, E.G. *et al*; 2003. *Mar. Ecol. Prog. Ser.*, Vol 251: 75 - 80.
- Nieto, A. *et al*; 2015. European Red List of Marine Fishes.