

EEN BIJZONDERE SCHELPEMTOCHT OP TEXEL VAN PAAL 6-16 OP 21 JUNI 1993

door

Harry Raad

In een poging het schelpenstrand van Texel te leren kennen heb ik in juni '93 wat strandwandelingen op het eiland gemaakt. Het natuurlijke beeld van het aanspoelsel is op Texel nogal verstoord door strandsuppleties, zodat het 'aanspoelen' van bijzondere soorten moeilijk op waarde is te schatten. Over mijn ervaringen tussen paal 6 en paal 16 gaat het volgende verslag.

Bereikbaarheid

Het meest zuidelijke strand van Texel is de Hors, een uitgestrekte zandvlakte met jonge duinvorming, wadachtige omstandigheden en Noordzeestrand. Vanaf de veerhaven moet een flinke wandeling om de Mokbaai gemaakt worden om op de Hors te kunnen komen. Een omweg die landschappelijk gezien overigens zeer de moeite waard is. Het militaire oefenkamp zorgt er voor dat we niet op de oostelijke punt van de zandvlakte kunnen starten, maar via de Horspolders bij paal 6 moeten beginnen.

De Schelpentocht

De vlakte van de Hors heeft op schelpengebied niet veel te bieden en het wordt pas interessanter op het hoge strand langs de Noordzee. Hier kunnen we naast de gangbare recente soorten Eem-fossielen aantreffen, zoals *Venerupis aurea senescens* en *Acanthocardia tuberculata*.

Na paal 9 versmalt de strandvlakte zich snel en komen we op het badstrand van de Hoornderslag. Bij paal 10 heb ik fijn gruis verzameld van bijzondere kwaliteit. Met name de vondst van drie gave horens en een fragment van *Hyala vitrea* en twee fragmenten van een kleine *Philine* spec. verdienen aandacht. De horens zijn niet vers, maar hebben een min of meer recent voorkomen.

De wandeling wordt voortgezet en opeens kom ik rond paal 11 dubletten van *Ensis arcuatus* en *Spisula solida* tegen, zeer vers en sommige met vleesresten. De eerste soort steeds defect. Bij paal 12 begint een opgehoogd strand, waar een overvloed aan verweerde kleppen van *Spisula elliptica* ligt: de trouwe indicator van menige zandsuppletie. De tocht gaat verder langs opgehoogd strand, dat regelmatig nieuwe ontdekkingen oplevert, zoals dubletten van *Chamelea striatula*, een verweerd klepje van *Striarca lactea* en een niet verse, grote klep van *Laevicardium crassum* met de originele rose kleur nog zichtbaar bij de top. De hoop om tot De Koog door te kunnen lopen werd verstoord door suppletiewerkzaamheden voorbij paal 16. Er zat niets anders op dan terug te lopen naar paal 15 en de Westerslag te nemen voor een wandeling naar Den Hoorn.

De soortenlijst

In de bijgevoegde soortenlijst wordt een opsomming gegeven van de schelpen die ik tussen paal 6 en 10 heb aangetroffen, dus buiten de directe invloed van de suppleties. Het is echter niet uit te sluiten dat die invloed door verspoeling toch aanwezig is. Het gruismonster van paal 10 had een inhoud van 0.9 l. Er is bij het verzamelen geen volledigheid nagestreefd.

<i>Valvata piscinalis</i>	1 juv. & 2 fr. foss.?
<i>Littorina saxatilis</i>	4 juv., foss.?
<i>Lacuna vincta</i>	1 juv., verweerd
<i>Hydrobia ulvae</i>	veel, verweerd, foss.?
<i>Hyala vitrea</i>	3 ad. & 1 fr., niet vers-verweerd
<i>Onoba aculeus</i>	1 ad., foss.
<i>Rissoa membranacea</i>	8 ad. & 6 fr., verweerd-foss.
<i>Fusillina inconspicua</i>	13 niet vers & 2 foss.?
<i>Bittium reticulatum</i>	fr. algem., foss.
<i>Epitonium clathratulum</i>	2 fr., juv
<i>Epitonium clathrus</i>	3 fragm, juv-ad.
<i>Lunatia spec.</i>	juv., algem., verweerd
<i>Lunatia catena</i>	1 fr., verweerd
<i>Buccinum undatum</i>	regelmatig fr., foss.?
<i>Oenopota turricula</i>	1 fr., foss.?
<i>Chrysallida sarsi</i>	4 juv-ad., niet vers
<i>Philina spec.</i>	2 fr., niet vers
<i>Vallonia excentrica</i>	2 ad., verweerd
<i>Mytilus edulis</i>	veel broed & algem. verse doubl-verweerde kleppen
<i>Ostrea edulis</i>	algem., verweerd-foss.
<i>Mysella bidentata</i>	doubl. algem. & kleppen talrijk
<i>Tellinomya ferruginosa</i>	vrij algem., niet vers-verweerd
<i>Cerastoderma edule</i>	veel verweerd-foss. & broed vrij algem.
<i>Parvicardium exiguum</i>	1 halfwas, foss.
<i>Acanthocardia tuberculata</i>	1 fr. & 1 ad., foss.
<i>Venerupis senegalensis</i>	3 fr., foss.?
<i>Venerupis aurea senescens</i>	fr., vrij algem., foss.
<i>Petricola pholadiformis</i>	regelmatig ad. kleppen & juv. doubl.; 1 ad. doubl.
<i>Macoma balthica</i>	algem., verweerd
<i>Angulus fabulus</i>	1 fr., foss.
<i>Angulus tenuis</i>	1 ad. doubl. & 3 fr., niet vers & 1 juv. doubl.
<i>Angulus pygmaeus</i>	1 juv., verweerd
<i>Scrobicularia plana</i>	regelmatig, verweerde kleppen
<i>Donax vittatus</i>	algem., verweerd-foss.?
<i>Ensis directus</i>	fragm. (doubl.) vrij alg. & 1 juv. doubl. algem.
<i>Mactra corallina</i>	vrij algem., verweerd & 1 juv., niet vers
<i>Spisula elliptica</i>	1 ad., verweerd & regelmatig juv.
<i>Spisula solida</i>	vrij algem., verweerd
<i>Spisula subtruncata</i>	algem., verweerd & 2 ad doubl & algemeen juv doubl
<i>Mya arenaria</i>	algem., verweerd
<i>Mya truncata</i>	3 fragm., verweerd
<i>Barnea candida</i>	1 ad., niet vers & 3 juv. fr.
<i>Zirfaea crispata</i>	regelmatig verweerd
<i>Sepia officinalis</i>	regelmatig, niet verse rugschilden