

VERSLAG VAN DE EKSKURSIË NAAR HET STRAND VAN OOSTDUINKERKE OP

19 FEBRUARI 1983.

R. BILLIAU

We noteren de nacht van 18 op 19 februari als de koudste nacht van het jaar. Het aantal deelnemers was dan ook beperkt tot negen mensen. We bekeken vooral de secundaire aanspoelslijn daar de eigenlijke vloedlijn volledig was ondergestoven met daarboven nog een ijslaag. De laagwaterlijn gaf geen materiaal. Hier merkten we wel een groot aantal foeragerende scholeksters en strandlopers. Boven ons vloog een vlucht van 22 ganzen in N.O.-richting.


De typische oostenwind en de koude zorgden voor heel wat fijn materiaal in de secundaire aanspoelslijn. Daartussen vonden we veel tweekleppige Tapijtschelpen (Venerupis pullastra). Het waren jonge, verse doubletten, sommige nog met vleesresten. We hadden te doen met exemplaren van de afgelopen zomer, want er was nog geen groei-ring. Ze waren opvallend mooi getekend en hun grootte was ongeveer 23 mm. Ook van de Grote Strandschelp (Macra cinerea cinerea) vonden we enkele éénjarige doubletten (ongeveer 3 cm). Waarschijnlijk waren dat resten van de zware stormen van zondag 16 januari tot donderdag 20 januari 1983.

Typische tweekleppigen voor oostenwind die algemeen voorkwamen waren het Nonnetje (Macoma balthica), Rechtsgestreepte Platschelp (Fabulina fabula), Tere Platschelp (Angulus tenuis), Witte Dunschaal (Abra alba) en Zaagje (Donax vittatus). Deze laatste soort was echter minder algemeen. Andere tweekleppigen: Halfgeknotte Strandschelp (Spisula subtruncata), Stevige Strandschelp (Spisula solida) en 1 Krombekmossel (Mytilus galloprovincialis), Tafelmesheft (Ensis siliqua), Grote zwaardschede (Solen marginatus).

Van de gastropoda vonden we meestal fossielen. Namelijk: de Fuikhoren (Hinia reticulata), Gewone Tepelhoorn (Lunatia catena), Geschubde stekelhoorn (Tritonalia erinaceus), Gewone Tolhoorn (Calliostoma zizyphinum), Wenteltrapje (Epitonium clathrus) en Purperslak (Nucella lapillus). Opvallend vonden we een groot aantal schepjes (Philine aperta). Er lagen ook veel landslakken (Cepaea's). Eén daarvan was volledig begroeid

met het mosdiertje Conopeum reticulatum. Waarschijnlijk zouden we nog heel wat andere organismen gevonden hebben, maar de koude deed ons verlangen naar een warme thuis.

Westhoeklaan 13
8470 De Panne



Dit kaartje hoort bij de activiteiten
kalender op p. 39 !