

VERSLAG EXCURSIE NAAR WENDUINE OP 19 FEBRUARI 1984.


P. RAPPÉ

Op de afspraakplaats, de rotonde aan het westelijke uiteinde van de Wenduine zeedijk, verschenen toch nog 12 mensen, ondanks het ijzige winterweer. Twee laatkomers, die de groep niet meer op het strand vonden, zijn niet in dit totaal opgenomen.

In de vloedlijn vielen vooral de vele verse doubletten van diverse soorten op: Grote Strandschelp *Macra corallina*, jonge exemplaren tot  $\pm 2.5$  cm, Halfgeknotte Strandschelp *Spisula subtruncata*, jonge ex. tot  $\pm 8$  mm en zeer veel Witte Dunschaal *Alra alba*, samengespoeld tot hoopjes. Van het Zaagje *Donax vittatus* noteerden we enkele losse kleppen, één klep van de Brakwaterkokkel *Cerastoderma glaucum* (wellicht van subfossiele oorsprong) en enkele kleppen van de fossiele *Megacardita planicosta*. Verder werden in de vloedlijn nog gevonden enkele levende ex. en lege kokertjes van het Goudkammetje *Pectinaria koreni*, twee lege kokers van de Perkamentkokerworm *Chaetopterus variopedatus*, Zeecypres *Sertularia cupressina*, Zeedenetje *Abietinaria abietina* en Doorschijnende Zeevinger *Alcyonidium* cf. *gelatinosum*, één kolonie.

Daar het zeer laag water was spitsten we onze aandacht ook toe op de golfbrekers en lager op het strand. In blootgekomen turfbanken aan de laagwaterlijn zaten massaal Amerikaanse Boormossels *Petricola pholadiphormis* en enkele Witte *Barnea candida*. Alle doubletten waren echter leeg, of gevuld met turfbrokjes. De golfbrekers leverden niet veel bijzonders op. Naast de gewone zaken sprongen vooral de overal verspreide slijktapijtjes van de worm *Polydora ciliata* in het oog. Ook de Schelpkokerworm *Lanice conchilega* bleek massaal aanwezig.

Omstreeks elf uur gingen we onze verkleumde ledematen wat opwarmen bij een hete koffie of cacao.



Duinbergenlaan 69  
8390 Knokke-Heist