


# DE ZONERING VAN HET MACROBENTHOS

IN DE BELGISCHE KUSTZONE




INFORMATIEVE BROCHURE





# ZONERING VAN HET MACROBENTHOS




TYPISCHE VERTEGENWOORDIGERS	DIVERSITEIT	DENSITEIT
1 <i>Scolelepis squamata</i>	hoog strand 10-tal soorten	hoog strand >1000 ind./m <sup>2</sup>
2 <i>Eurydice pulchra</i>	laag strand 20-tal soorten	laag strand 100-500 ind./m <sup>2</sup>
3 <i>Nephtys cirrosa</i>	vooroever 30-tal soorten	vooroever 100-1000 ind./m <sup>2</sup>
4 <i>Arenicola marina</i>	geul 50-tal soorten	geul >1000 ind./m <sup>2</sup>
5 <i>Nephtys cirrosa</i>	zandbank 20-tal soorten	zandbank 100-500 ind./m <sup>2</sup>
6 <i>Echinocardium cordatum</i>		
7 <i>Lanice conchilega</i>		
8 <i>Spisula subtruncata</i>		
9 <i>Nephtys cirrosa</i>		
10 <i>Bathyporeia sp.</i>		


STAALNAME METHODIEK
intertidaal uitgraven frame
subtidaal Van Veen grijper

POLYCHAETA  
(BORSTELWORMEN)




*Lanice conchilega*

POLYCHAETA  
(BORSTELWORMEN)




*Nephtys cirrosa*

POLYCHAETA  
(BORSTELWORMEN)




*Scolelepis squamata*




habitus: Spionidae

POLYCHAETA  
(BORSTELWORMEN)



*Arenicola marina*


CRUSTACEA  
(KREEFTACHTIGEN)



*Eurydice pulchra*




CRUSTACEA  
(KREEFTACHTIGEN)



*Bathyporeia* sp.




ECHINODERMATA  
(STEKELHUIDIGEN)



*Echinocardium cordatum*

BIVALVIA  
(TWECKLEPPIGEN)



*Spisula subtruncata*