

**LISTE DES MOLLUSQUES
RAPPORTÉS DE LA NOUVELLE-ZEMBLE
PAR M. SERGE IVANOFF**

Par Ph. DAUTZENBERG

La récolte dont M. Ivanoff a bien voulu me confier l'examen, renferme quelques espèces qui n'ont pas été signalées dans l'important travail publié en 1878 par M. Wilhelm Leche sur les Mollusques recueillis à la Nouvelle-Zemble par l'Expédition suédoise. D'autre part, M. Ivanoff a visité l'extrémité septentrionale de la Nouvelle-Zemble, qui est rarement accessible, à cause des glaces. Les matériaux que j'ai sous les yeux constituent donc un nouvel appoint pour la faune de ces parages peu fréquentés par les naturalistes.

PTEROPODA

CLIONE LIMACINA Phipps

1774. *Clio limacina* Phipps, Voyage to the North Pole, Appendix, p. 195.
1910. *Clione* — Phipps, DAUTZENBERG et H. FISCHER, Campagne Arctique Duc d'Orléans, p. 3.

Stn. 97, surface. 1 exemplaire.

LIMACINA HELICINA Phipps

- 1774 *Turbo helycinus* Phipps, Voyage to the North Pole, Appendix, p. 198.
1910. *Limacina helicina* Phipps, DAUTZENBERG et H. FISCHER, Campagne Arctique duc d'Orléans, p. 4.

Stn. sans n°. 75°8' N.-35°E., 2 exemplaires.

GASTEROPODA

CYLICHNA ALBA BROWN

Var. **corticata** (Beck) Möller

1842. *Bulla corticata* BECK, in MÖLLER, Index Moll. Groenl.,
p. 6.
1910. *Cylichna alba* var. *corticata* (Beck) Möller, DAUTZENBERG et H. FIS-
CHER, Camp. Arct. Duc d'Orléans, p. 6.
1912. — — — — DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Nord
P^{ce} de Monaco, p. 39.

Stn. 39, 74° N.-60° E., côte E. de la Nouvelle-Zemble,
1 exemplaire mort.

Stn. 75, 4 exemplaires vivants.

CYLICHNA SCALPTA Reeve

1855. *Bulla scalpta* REEVE, in BELCHER, Last of the Artic
Voyages, II. p. 392, pl. 32, fig. 3.
1912. *Cylichna* — Reeve Camp. Nord P^{ce} de Monaco, p. 39.

Stn. 39, 74° N.-60° E., côte Est de la Nouvelle-Zemble,
1 exemplaire mort.

Stn. 75, 2 exemplaires vivants.

Stn. 93, 74°21' N.-60° E., côte Est de la Nouvelle-
Zemble, 2 exemplaires vivants.

Cette espèce est plus connue sous le nom de *C. propinqua* M. Sars, mais ce dernier nom est plus récent.

PHILINE FRAGILIS G. O. Sars

1878. *Philine fragilis* G. O. SARS, Moll. Reg. arct. Norv.,
p. 296, pl. 18, fig. 11^a-11^c; pl. XII, fig. 2.
1901. — — G. O. Sars, FRIELE et GRIEG, Norw. North Atl. Exp.,
p. 114.

Stn. 93, 74°21' N.-60° E, côte Est de la Nouvelle-
Zemble.

BELA sp. ?

Stn. 39, 74° N.-60° E., côte Est de la Nouvelle-Zemble, 1 exemplaire vivant, jeune, qu'il ne nous a pas été possible d'identifier.

NEPTUNEA ANTIQUA Linné subsp. TORNATA Gould

1841. *Fusus tornatus* GOULD, Invertebrata of Massachusetts, p. 286, fig. 201.
1912. *Neptunea antiqua* Lin. subsp. *tornata* Gould, DAUTZENBERG et H. FISCHER, Campagne Nord P^{co} de Monaco, p. 78, pl. II, fig. 5, 6, 7.

Stn. 53, 74° N.-60° E., côte Est de la Nouvelle-Zemble
1 exemplaire mort.

NEPTUNEA ANTIQUA Linné subsp. DESPECTA Linné

1758. *Murex despectus* LINNÉ, Syst. Nat. edit. X, p. 754.
1910. *Neptunea antiqua* Lin. subsp. *despecta* Lin., DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Arct. Duc d'Orléans, p. 8.
1912. *Neptunea antiqua* Lin. subsp. *despecta* (Lin.) Schröter, DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Nord P^{co} de Monaco, p. 79, pl. III, fig. 1, 2.

Stn. sans n^o, 1 fragment.

BUCCINUM GLACIALE Linné

1761. *Buccinum glaciale* LINNÉ, Fauna Suecica, p. 523.
1912. — — Lin., DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Nord P^{co} de Monaco, p. 117, pl. VII, fig. 1-4.

Stn. sans n^o, 4 exemplaires roulés.

BUCCINUM GROENLANDICUM Schröter in Chemnitz

Var. **Kobelti** Dautz. et H. Fischer

1788. *Buccinum groenlandicum* SCHRÖTER in CHEMNITZ, Conch. Cab, Namen Register, p. 16.

1910. *Buccinum groenlandicum* (Chemn.) Schröter, DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Arct. Duc d'Orléans, p. 8.
1912. — — — DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Nord P^{co} de Monaco, p. 132, pl. VIII, fig. 9-13.

Stn. 53, 74° N.-60° E., côte Est de la Nouvelle-Zemble, un exemplaire avec Pagure.

Stn. 89, 94° N.-60° E., côte Est de la Nouvelle-Zemble, un exemplaire vivant.

BUCCINUM HYDROPHANUM Hancock.

1846. *Buccinum hydrophanum* HANCOCK, Shells dredg. on the W. Coast of Davis's Strait, in Ann. and Mag. Nat. Hist., 1st Ser., XVIII, p. 325, pl. V, fig. 7.
1912. — — — Hanc., DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Nord P^{co} de Monaco, p. 133, pl. VIII, fig. 16, 17.

Stn. 53, 74° N.-60° E., côte Est de la Nouvelle-Zemble, 2 exemplaires vivants.

Stn. 89, 74° N.-60° E., côte Est de la Nouvelle-Zemble, 2 exemplaires jeunes, vivants.

BUCCINUM PULCHELLUM G. O. Sars

1878. *Buccinum pulchellum* G. O. SARS, Moll. reg. arct. Norv., p. 261, pl. 24, fig. 9.

Stn. 10, 75°25' N.-58° E., côte W. de la Nouvelle-Zemble, un exemplaire jeune, vivant.

TROPHON CLATHRATUS Linné

Var. **scalariformis** Gould

1841. *Fusus scalariformis* GOULD, Invert. of Massachusetts, p. 288, fig. 203.
1912. *Trophon (Boreotrophon) clathratus* Lin. var. *scalariformis* Gould, DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Nord P^{co} de Monaco, p. 150.

Stn. 58, 75°23' N.-57° E., côte W. de la Nouvelle-Zemble, 1 exemplaire vivant.

NATICA CLAUSA Broderip et Sowerby

1829. *Natica clausa* BRODERIP et SOWERBY, On some Mollusca in the Collection of the Zool. Soc., in Zool. Journal, IV, p. 372.
1910. — — Br. et Sow., DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Arct. Duc d'Orléans, p. 9.
1912. — — — DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Nord P^{co} de Monaco, p. 225.

Stn. 10, 75°25' N.-58° E., côte W. de la Nouvelle-Zemble, 4 exemplaires vivants.

Stn. 39, 74° N.-60° E., côtes de la Nouvelle-Zemble, 3 exemplaires vivants.

Stn. 58, 75°23' N. 57° E., côte W. de la Nouvelle-Zemble, un exemplaire vivant.

Stn. 75, 6 exemplaires jeunes.

NATICA (NATICINA) PALLIDA Broderip et Sowerby

1829. *Natica pallida* BRODERIP et SOWERBY, On some Mollusca in the Collection of the Zool. Soc., in Zool. Journal, IV, p. 372.
1912. — (*Naticina*) *pallida* Br. et S., DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Nord P^{co} de Monaco, p. 234.

Stn. 10, 75°25' N.-58° E., côte W. de la Nouvelle-Zemble, un exemplaire mort.

Stn. 93, 74°21' N.-60° E., côte Est de la Nouvelle-Zemble, 1 exemplaire mort.

NATICA (LUNATIA) NANA Möller

1842. *Natica nana* MÖLLER, Index Moll. Groenlandiæ, p. 7.
1878. *Lunatia* — Möller, G. O. SARS, Moll. Reg. arct. Norv., p. 159, pl. 21, fig. 16^a, 16^b.

Stn. 39, 74° N.-60° E., côte Est de la Nouvelle-Zemble 3 exemplaires vivants.

SCALA GROENLANDICA Chemnitz

Var. **crebricostata** G. O. Sars

1878. *Scalaria groenlandica* var. *crebricostata*, G. O. Sars, Moll. Reg. arct. Norv., p. 194, pl. 23, fig. 1.

Stn. 53, 74° N.-60° E., côte Est de la Nouvelle-Zemble, un exemplaire mort.

EUMARGARITA HELICINA Phipps

1774. *Turbo helicina* PHIPPS, Voyage towards the North Pole, Appendix, p. 198.

1912. *Eumargarita helicina* Phipps, DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Nord P^{ce} de Monaco, p. 270.

Stn. 89, 74° N.-60° E., côte Est de la Nouvelle-Zemble, 6 exemplaires vivants.

Stn. 100, 2 exemplaires vivants.

EUMARGARITA CINEREA Couthouy

1829. *Margarita striata* BRODERIP et SOWERBY (*non* Leach), New or interesting Mollusca, *in* Zool. Journal, IV, p. 371.

1838. *Turbo cinereus* COUTHOUY, New Moll. of Massachusetts, *in* Boston Journ. of Nat. Hist., II, p. 99, pl. III, fig. 9.

1912. *Eumargarita cinerea* Couth., DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Nord P^{ce} de Monaco, p. 273.

Var. **grandis** Mörch

1869. *Margarita cinerea* Couth. var. *grandis* MÖRCH, Catal. Moll. Spitzberg, *in* Mém. Soc. Malac. Belg., IV, p. 23.

Stn. 58. 75°23' N.-57° E., côte W. de la Nouvelle Zélande, un exemplaire mort.

La var. *grandis* diffère de l'*E. cinerea* typique par ses cordons plus serrés.

EUMARGARITA (VALVATELLA) GROENLANDICA (Chemnitz)
Schröter

1788. *Trochus groenlandicus* SCHRÖTER, in CHEMNITZ, Conch. Cab.,
Namen Register, p. 107.
1910. *Eumargarita groenlandica* (Chtz.) Schr., DAUTZENBERG et H. FISCHER,
Camp. Arct. Duc d'Orléans, p. 9.
1912. *Eumargarita (Valvatella) groenlandica* (Chtz.) Schr., DAUTZENBERG et
H. FISCHER, Camp. Nord P^{co} de Monaco,
p. 277.

Stn. 39, 74° N.-60° E., côte Est de la Nouvelle-
Zemble, 2 exemplaires vivants.

Stn. 75. 10 exemplaires jeunes, vivants.

Var. **lævior** Möller

1842. *Trochus groenlandicus* Chtz. var. *lævior* MÖLLER, Ind. Moll. Groenl.,
p. 8.

Stn. 56, 74° N.-60 E., côte Est de la Nouvelle-Zemble,
11 exemplaires vivants.

ACMÆA TESTUDINALIS Müller

1776. *Patella testudinalis* MÜLLER, Zool. Dan. Prodr., p. 237.
1912. *Acmaea* — Müll., DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Nord
P^{co} de Monaco, p. 295.

Stn. 89, 74° N.-60° E., côte Est de la Nouvelle-
Zemble, un exemplaire vivant et un mort.

LEPETA CÆCA Müller (emend.)

1776. *Patella cæca* MÜLLER, Zool. Dan. Prodr., p. 237.
1910. *Lepeta cæca* Müll., DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Arct.
Duc d'Orléans, p. 11.
1912. — — — DAUTZENBERG et H. FISCHER. Camp. Nord
P^{co} de Monaco, p. 300.

Stn. 30, 76°7' N.-70° E., côte N.-E. de la Nouvelle-
Zemble, un exemplaire vivant.

POLYPLACOPHORA

TRACHYDERMON ALBUS Linné

1767. *Chiton albus* LINNÉ, Syst. Nat., edit. XII, p. 1107.
1912. *Trachydermon albus* Lin., DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Nord P^{co} de Monaco, p. 26.

Stn. 30, 76°7' N.-70° E., côte N.-E. de la Nouvelle-Zemble, un exemplaire vivant.

Stn. 56, 74° N.-60° E., côte Est de la Nouvelle-Zemble, 2 exemplaires vivants.

TONICIELLA MARMOREA Fabricius

1780. *Chiton marmoreus* FABRICIUS, Fauna Groenl., p. 420.
1912. *Toniciella marmorea* Fabr., DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Nord P^{co} de Monaco, p. 28.

Stn. 19, 30, 76°7' N.-70° E., côte N.-E. de la Nouvelle-Zemble, 2 exemplaires vivants.

Stn. 56, 74° N.-60° E., côte Est de la Nouvelle-Zemble, 1 exemplaire vivant.

Stn. 89, 74° N.-60° E., côte Est de la Nouvelle-Zemble, 1 exemplaire vivant.

Stn. 101, 1 exemplaire vivant.

SCAPHOPODA

SIPHONODONTALIUM LOBATUM Sowerby

1851. *Dentalium vitreum* M. SARS (*non* Gmelin), Beretn. Zool. Reise in Nyt Mag. f. Naturvid., VI, p. 178.
1860. — *lobatum* SOWERBY, Thesaurus Conch., III, p. 100, pl. III (225), fig. 44.
1912. *Siphonodentalium lobatum* Sow., DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Nord P^{co} de Monaco, p. 309.

Stn. 93, 74°21' N.-60° E., côte Est de la Nouvelle-Zemble, 1 exemplaire mort, avec Siponcle.

PELECYPODA

LIMATULA ELLIPTICA Jeffreys

1863. *Lima elliptica* JEFFREYS, Brit. Conch., II, p. 81; V (1869), p. 169, pl. XXV, fig. 2.
1910. *Limatula* — Jeffr., DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Arct. Duc d'Orléans, p. 11.

Stn. 93, 74°21' N.-60° E., côte Est de la Nouvelle-Zemble, 1 exemplaire mort.

CHLAMYS ISLANDICA Müller

1776. *Ostrea islandica* MÜLLER, Zool. Dan. Prodr., p. 248.
1910. *Chlamys* — Müll., DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Arct. Duc d'Orléans, p. 11.
1912. — — — DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Nord P^{co} de Monaco, p. 319.

Stn. 53, 74° N.-60° E., côte Est de la Nouvelle-Zemble, 1 exemplaire mort.

Var. **Fabricii** Philippi

1845. *Pecten Fabricii* PHILIPPI, Abbildungen, p. 101, pl. I, fig. 5.

Stn. sans n^o, 2 valves.

CHLAMYS (PALLIOLUM) GROENLANDICA Sowerby (emend.)

1845. *Pecten Greenlandicus* SOWERBY, Thesaurus Conch., I, p. 57, pl. XIII, fig. 40.
1910. *Chlamys (Palliolum) groenlandica* Sow., DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Arct. Duc. d'Orléans, p. 12.
1912. — — — — DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Nord P^{co} de Monaco, p. 332.

Stn. 12, 76°7' N.-70° E., côte N.-E. Nouvelle-Zemble, nombreux exemplaires vivants.

Stn. 53, 74° N.-60° E. côte Est de la Nouvelle-Zemble, 2 exemplaires vivants.

Stn. 56, 74° N.-60° E., côte Est de la Nouvelle Zemble, 3 exemplaires vivants.

CHLAMYS (CYCLOPECTEN) HOSKYNSI Forbes

Var. **major** Leche

1843. *Pecten Hoskynsi* FORBES, Report Aegean Invert. in Rep. Brit. Assoc. for 1843, p. 146, 192,
1883. — — var. *major* LECHE, Övers. « Vega » Exp., p. 452.
1910. *Chlamys (Palliolum) Hoskynsi* Forb., DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Arct. Duc d'Orleans, p. 12.
1912. — (*Cyclopecten*) — — DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Nord P^{co} de Monaco, p. 349.

Stn. 89, 74° N.-60° E., côte Est de la Nouvelle-Zemble, 1 exemplaire vivant.

CRENELLA DECUSSATA Montagu

1808. *Mytilus decussatus* MONTAGU, Test. Brit., suppl., p. 69.
1912. *Crenella decussata* Mtg., DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Nord P^{co} de Monaco, p. 371.

Stn. 39, 74° N.-60° E., côte Est de la Nouvelle Zemble, 1 exemplaire vivant.

MODIOLARIA LAEVIGATA Gray

1824. *Modiola laevigata* GRAY, Suppl. Append. Voy. Parry, p. 245.
1910. *Modiolaria* — Gray, DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Arct. Duc d'Orléans, p. 14.
1912. — — — DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Nord P^{co} de Monaco, p. 379.

Stn. 56, 74° N.-60° E., côte Est de la Nouvelle-Zemble, 3 exemplaires vivants.

Stn. 58, 75°23' N.-57° E., côte W. de la Nouvelle-Zemble, 1 exemplaire vivant.

ARCA (BATHYARCA) GLACIALIS Gray

1824. *Arca glacialis* GRAY, Suppl. Appendix Voy. Parry, p. 244.
1910. — (*Bathyarca*) — Gray, DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Arct. Duc d'Orléans, p. 15.
1912. — — — — DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Nord P^o de Monaco, p. 388.

Stn. 56, 74° N.-60° E., côte Est de la Nouvelle-Zemble, 1 exemplaire vivant.

NUCULANA PERNULA Müller

1779. *Arca Pernula* MÜLLER, Besch. Berl. Ges., IV, p. 55.
1910. *Nuculana pernula* Müll., DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Arct. Duc d'Orléans, p. 16.
1912. — — — — DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Nord P^o de Monaco, p. 396.

Stn. sans n^o, 3 exemplaires vivants.

YOLDIA HYPERBOREA (Lovén) Gould

1841. *Yoldia hyperborea* (Lovén) GOULD, Invert. of Massach., p. 99.
1912. — — — — Torell, DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Nord P^o de Monaco, p. 402.

Stn. 68, 75°35' N.-57°30' E., côte W. de la Nouvelle-Zemble, nombreux exemplaires vivants.

PORTLANDIA GLACIALIS Gray

1871. *Yoldia glacialis* GRAY, in REEVE, Conch. Icon., pl. III, fig. 12^a, 12^b.

Stn. 53, 74° N.-60° E., côte Est de la Nouvelle-Zemble, 3 exemplaires vivants.

Stn. 58, 75°23' N.-57° E., côte W. de la Nouvelle-Zemble, 2 exemplaires vivants.

YOLDIELLA INTERMEDIA M. Sars

1858. *Yoldia intermedia* M. Sars, Arctiske Molluskf. Norges, in Forh. Vidensk. Selsk., p. 57.
1910. *Yoldiella* — M. Sars, DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Arct. Duc d'Orléans, p. 17.
1912. — — — DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Nord P^{ce} de Monaco, p. 408.

Stn. 93, 74°21' N.-60° E., côte Est de la Nouvelle-Zemble, 1 exemplaire vivant.

ASTARTE ELLIPTICA BROWN

1827. *Crassina elliptica* BROWN, Illustr. Conch. of Great Britain and Ireland, pl. XVIII, fig. 3.
1910. *Astarte* — BROWN, DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Arct. Duc d'Orléans, p. 18.
1912. — — — DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Nord P^{ce} de Monaco, p. 418, pl. XI, fig. 12, 13, 14.

Stn. 19, 76°7' N.-70° E., côte. N-E. de la Nouvelle-Zemble, 1 exemplaire vivant.

Stn. 56, 74° N.-60° E., côte Est de la Nouvelle-Zemble, 3 exemplaires vivants.

ASTARTE CRENATA Gray

1824. *Nicania crenata* GRAY, Suppl. Appendix Voy. Parry, p. 242.
1910. *Astarte crebricostata* Mac Andrew et Forbes, DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Arct. Duc d'Orléans, p. 18.
1912. — *crenata* Gray, DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Nord P^{ce} de Monaco, p. 416, pl. XI, fig. 9, 10, 11.

Stn. 39, 74° N.-60° E., côte Est de la Nouvelle-Zemble, 1 exemplaire vivant.

Stn. 89, 74° N.-60° E., côte Est de la Nouvelle Zemble, 1 exemplaire vivant.

Stn. 93, 74°21' N.-60° E., côte Est de la Nouvelle-Zemble, 1 exemplaire vivant.

ASTARTE (TRIDONTA) SEMISULCATA Leach

1819. *Crassina semisulcata* LEACH, Voyage Ross, Append. IV, p. 175.
1910. *Astarte* — Leach, DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Arct. Duc d'Orléans, p. 17.
1912. — (*Tridonta*) — — DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Nord P^{ce} de Monaco, p. 421, pl. XI, fig. 23-25.

Stn. 53, 74° N.-60° E., côte Est de la Nouvelle-Zemble, 17 exemplaires vivants.

Stn. 56, 74° N.-60° E., côte Est de la Nouvelle-Zemble, 1 exemplaire vivant.

ASTARTE (NICANIA) BANKSI Leach

1819. *Nicania Banksi* LEACH, Ross's first Voyage, Appendix, II, p. LXII.

Var. **Warhami** Hancock

1846. *Astarte Warhami* HANCOCK, Shells of Davis's Strait, in Ann. and. Mag. of Nat. Hist., 1st Ser. XVIII, p. 336, pl. 5, fig. 15, 16.
1910. *Banksi* Leach var. *Warhami* HANC., DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Arct. Duc d'Orléans, p. 19.
1912. — — — — — DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Nord P^{ce} de Monaco, p. 426, pl. XI, fig. 18-22.

Stn. 53, 74° N.-60° E., côte Est de la Nouvelle-Zemble, 2 exemplaires vivants.

CARDIUM (CERASTODERMA) ISLANDICUM Chemnitz

1782. *Cardium islandicum* CHEMNITZ, Conchylien Cabinet XI, p. 200, pl. 19, fig. 195, 196.
1910. — — — Ch, DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Arct. Duc d'Orléans, p. 19.
1912. — — — — — DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Nord P^{ce} de Monaco, p. 448.

Stn. sans n^o, 1 exemplaire,

CARDIUM (SERRIPES) GROENLANDICUM (Chemnitz) Gmelin

1782. *Cardium Groenlandicum* etc. CHEMNITZ, Conch. Cab. VI, p. 202,
pl. 19, fig. 198.
1790. — — — Ch., GMELIN, Syst. Nat. edit. XIII, p. 3252.
1910. — (*Serripes*) *groenlandicum* Ch., DAUTZENBERG et H. FISCHER,
Camp. Arct. Duc d'Orléans, p. 20.
1912. — — — (Ch.) Gmel., DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Nord
P^o de Monaco, p. 455.

Stn. sans n^e, un exemplaire.

MYA TRUNCATA Linné

Var. **udevallensis** G. O. Sars

1878. *Mya truncata* Lin. var. *udevallensis* G. O. Sars, Moll. Reg. Arct.
Norv, p. 92.
1910. — — — — — G. O. S., DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Arct.
Duc d'Orléans, p. 22.

Stn. sans n^o, valves.

BRACHIOPODA

RHYNCHONELLA PSITTACEA Gmelin

1790. *Anomia psittacea* GMELIN, Syst. Nat. edit. XIII, p. 3348.
1910. *Rhynchonella* — Gmel., DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Arct.
Duc d'Orléans, p. 24.

Stn. 53, 74° N.-60° E., côte Est de la Nouvelle-Zemble,
4 exemplaires morts.

PH. D.
