



LAURENTII THEODORI GRONOVII
ANIMALIUM IN BELGIO HABITANTIUM
CENTURIA PRIMA (*)

Singulam Tellurem sibi peculiaribus gaudere incolis non manifestius apparet, quam ut attenta mente accurate omnia ista naturae miracula congesta in unam massam perponderantur; tumque elucescunt naturae decora singulari loco tributa; tumque deteguntur quae alias in latibulis essent derelicta. Exempla nobis praesto sunt. Quid enim CATESBAEUS non depinxit in America Septentrionali, quanta non detexit BROWNE in Jamaica, quot non observavit LINNAEUS in Suecia? nonne mirum est, quod in nostro Belgio, quod diligentissimis sane gloriari potest praeditum esse Observatoribus, nemo ferme in se susceperit laborem conquirendorum omnium objectorum apud nos obviorum? Quae hic ratio? an penuria subjectorum? minime B. L. affirmare audeo Belgium nostrum nulli Terrarum Orbis tractui cedendum habere circa copiam atque pulcritudinem Animantium, quae si diligenter examinantur magnum jam implebunt catalogum; quem, cum

Tab. XIII.

H h 2

a

(*) Monitum te vellem B. L. Cel. Auctorem, naturalium rerum indagatorem indefessum, Amicum meum aestumatissimum, qui praeter descriptiones elegantissimas curiosissimasque, *Cancris Norvegici, Gymnoti tremantis Americani, Insectorum quorundam ad Littora Maris Belgici observatorum*, huicce Actor. nostror. Volumini p. 23. seqq. insertas, & hancce *Animalium in Belgio degentium Enumerationem*, eidem inferendam, benigne mecum communicavit, datis ad me litteris, & reliquas Centurias, ceu continuationem illius, insequenti tempore se daturum spondere, ita ut exinde facile *Fauna Belgica* confici possit. Vale. JO. JAC. D'ANNONE.

Tab. XIII. a nemine hactenus sit compilatus, constitui conscribere, secundum methodum *Linnaeanam* in *Speciebus Animalium* propositam.

MAMMALIA.

PRIMATES.

1. VESPERTILIO caudatus, naso simplici, auribus maximis intus appendiculatis.
Vespertilio caudatus naso oreque simplici, auribus duplicatis, capite majoribus. LINN. *Spec. anim. gen. 4. n. 6.*
Belgis *Vleermuys.*
2. VESPERTILIO caudatus, naso oreque simplicibus inappendiculatis.
Vespertilio caudatus, naso oreque simplici, auriculis capite minoribus. LINN. *Spec. anim. gen. 4. n. 7.*
Belgis *Vleermuys.*
Habitat cum praecedente sub tectis, in arborum cavis, in aedificiis derelictis.

MAMMALIA.

FERA.

3. PHOCA pedibus anticis digitatis unguiculatis, posterioribus latis, unguibus teretibus.
Phoca dentibus laniariis tectis. LINN. *Spec. anim. gen. 10. n. 4.*
Belgis *Zeehond, Zeekalf.* Inhabitat Mare septentrionale, ad Zelandiam frequens.
4. CANIS cauda (sinistrorsum) recurvata. LINN. *Spec. anim. gen. 11. n. 1.*
Facile apud nos omnes Varietates adinveniendae forent.
Belgis *Hond.*
Cicuratur in domibus.
5. CANIS cauda incurvata. LINN. *Spec. anim. gen. 11. n. 2.*
Belgis *Wolf.*
Rarissime apud nos, in Gelriae desertis quandoque.
6. CANIS

6. CANIS cauda recta, apice albo. LINN. *Spec. anim. gen.* Tab. XIII.
 II. n. 4. Belgis Vos.
 In fylvis quandoque.
7. FELIS cauda elongata, corpore fasciis nigricantibus dorsali-
 bus longitudinalibus tribus, lateralibus spiralibus. LINN.
Spec. anim. gen. 12. n. 6. Belgis Kat.
 Cicuratur in domibus.
8. MUSTELA plantis palmatis nudis, cauda corpore dimi-
 dio brevior. LINN. *Spec. anim. gen.* 14. n. 2.
 Lutra digitis aequalibus. KRAMER *Elench.* p. 312. n. I.
 Belgis Otter.
 Habitat ad aquas piscibus divites, nidulans in arundinetis.
9. MUSTELA pedibus fissis, corpore flavo nigricante, ore
 auriculisque albis. LINN. *Spec. anim. gen.* 14. n. 6.
 Belgis Bonsing.
 Habitat in arvis ad aquas.
10. MUSTELA plantis fissis, caudae apice atro. LINN. *Spec.*
anim. gen. 14. n. 9.
 Mustela caudae apice atro. LINN. *Fn. Suec.* §. 9.
 Belgis Hermelyn, Wezel.
 In agris frequens.
11. URSUS cauda concolore, corpore supra cinereo, subtus
 nigro, fascia longitudinali per oculos auresque nigra.
 LINN. *Spec. anim. gen.* 15. n. 3.
 Meles unguibus anticis longissimis. LINN. *Fn. Suec.* §. 15.
 Belgis Das.
 In Hollandiae & Ultrajectinae provinciis aliquot capti
 sunt 1759.

MAMMALIA.

BESTIAE.

12. SUS caudatus, auriculis brevibus subrotundis, cauda pi-
 losa. BRISSON. *regn. anim.* p. 108. *spec.* 3.
 Belgis Wildswyn.

Tab. XIII. In fylvis Gelriae quandoque.

13. SUS caudatus, auriculis oblongis acutis, cauda pilosa.
 BRISSON. *regn. anim.* p. 106. *Spec. I.*
 Sus dorso antice fetoso, cauda pilosa. LINN. *Fn. Suec.*
 §. 36. Belgis *Varken.*
 A rusticis faginatur pro Oeconomia.
14. ERINACEUS. LINN. *Spec. anim. gen.* 18. n. 1.
 Erinaceus spinosus auriculatus. LINN. *Fn. Suec.* §. 16.
 Belgis *Egelvarken.*
 Habitat in fylvis & desertis ubique.
15. TALPA caudata, pedibus pentadactylis. LINN. *Spec. anim.*
gen. 19. n. 1.
 Talpa caudata. LINN. *Fn. Suec.* §. 17. KRAMER *Elench.* p. 314.
 Belgis *Mol.*
 Habitat sub terra in Hollandia nimis frequens, in Ze-
 landia haud observavi.

MAMMALIA.

GLIRES.

16. LEPUS caudatus, obscure cinereus. BRISSON. *regn. anim.*
 p. 140. *sp.* 4.
 Lepus cauda abbreviata, auriculis nudatis. LINN. *Spec.*
anim. gen. 24. n. 2. Belgis *Konyn.*
 Inhabitat Dunos submarinos in quibus fodinas agit.
17. LEPUS cauda abbreviata auribus apice nigris. LINN.
Spec. anim. gen. 24. n. 1.
 Lepus caudatus ex cinereo rufus BRISSON. *regn. anim.*
 p. 138. *Spec. I.* Belgis *Haas.*
 Habitat ubique in agris arvisque.
18. LEPUS cauda nulla, manibus tetradactylis, plantis tridac-
 tylis.
 Mus cauda abrupta, palmis tetradactylis, plantis tridac-
 tylis. LINN. *Spec. anim. gen.* 26. n. 1.

Cuni-

Cuniculus ecaudatus, auritus albus, aut rufus, aut ex Tab. XIII. utroque variegatus. BRISSON. *regn. anim. pag. 147. n. 7.*
Cicuratur in domibus.

19. CASTOR cauda ovata plana. LINN. *Fn. Suec. §. 23. Spec. anim. gen. 25. n. 1.* Belgis Bever.

Anno 1759. duo in Belgio capti sunt, unus ad Moerdyk, & alter prope pagum Niewland ad Leccam.

20. MUS cauda elongata subnuda, palmis tetradactylis cum unguiculo pollicari, plantis pentadactylis. LINN. *Spec. anim. gen. 10. n. 9.* Belgis Huysrot.

Habitat sub domibus ad cloacas.

21. MUS cauda elongata subnuda, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis. LINN. *Spec. anim. gen. 26. n. 10.* Belgis Muys.

Habitat in domibus agrisque sub terra.

22. SCIURUS auriculis apice barbatis, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis. LINN. *Spec. anim. gen. 27. n. 1.*

Sciurus palmis folis faliens. LINN. *Fn. Suec. §. 21. KRAMER Elench p. 314.* Belgis Jukhorn.

Habitat in Gelriae sylvis. In Hollandia Zelandiaque nunquam.

MAMMALIA.

PECORA.

23. CAPRA cornibus carinatis arcuatis. LINN. *Spec. anim. gen. 31. n. 1.*

Hircus cornibus interius cultratis, exterius rotundatis infra carinatis arcuatis. BRISSON. *regn. anim. p. 62. gen. 9. Spec. 2.* Belgis mas Bok, foemina Geit.

24. OVIS cornibus compressis lunatis. LINN. *Spec. anim. gen. 32. n. 1.*

Aries laniger, cauda rotunda brevi. BRISSON. *regn. anim. p. 74. gen. 10. Sp. 1.*

Belgis mas Ram, foemina Schaap, foetus Lam.

Labora

Tab. XIII.

Laboratur ex morbo, qui *ongans* dicitur, causatus a *Fasciola ovata* in hepate ac ductu cystico nidulante.
Alitur in pascuis ad usum oeconomicum.

25. BOS cornibus teretibus extrorsum curvatis, palearibus la-
xis. LINN. *Spec. anim. gen.* 33. n. 1.
Bos cornibus laevibus, teretibus sursum reflexis. BRISSON.
regn. anim. p. 78. *gen.* 11. n. 1. Belgis mas *Stier*, foemina
Koey, foetus *Kalf*.
Alitur in pascuis ad usum oeconomicum.

MAMMALIA.

BELLVA.

26. EQUUS cauda undique fetosa. LINN. *Spec. anim. gen.* 34. n. 1.
Equus auriculis brevibus erectis, juba longissima. BRISSON.
regn. anim. p. 100. *gen.* 10. *Spec.* 1. Belgis *Paard*.
Mansuefactus alitur in stabulis pro usu oeconomico.
27. EQUUS cauda extremitate fetosa, cruce nigra supra hu-
meros. LINN. *Spec. anim. gen.* 34. n. 2.
Equus auriculis longis flaccidis, juba brevi. BRISSON. *regn.*
anim. p. 102. *gen.* 14. *Spec.* 3. Belgis *Esel*.
Alitur in stabulis pro usu oeconomico.

MAMMALIA.

PETE.

28. DELPHINUS corpore subconiformi, dorso lato, rostro
subobtusum. LINN. *Spec. anim. gen.* 39. n. 1.
Belgis *Noordkaper*, *Botskop*.
In Oceano & praesertim ad Zelandiam frequens.
29. DELPHINUS corpore oblongo subtereti, rostro attenua-
to, acuto. LINN. *Spec. anim. gen.* 39. n. 2.
Belgis *Bruynvis*, *Tuymelaar*.
Habitat cum praecedente

AVES.

ACCIPITRES.

31. FALCO cera flava, cauda forficata, corpore ferrugineo,
capite albidiore. LINN. *Spec. anim. gen.* 41. n. 10. *Fn.*
Suec. §. 59. Belgis *Wouvv*.

Habitat

Habitat ubique in excelsis arboribus.

Tab. XII.

31. FALCO cera pedibusque flavis, dorso rufo, punctis nigris, pectore maculis longitudinalibus fuscis, cauda rotundata. LINN. *Spec. anim. gen. 41. n. 15. Fn. Suec. §. 67.*
Belgis Sparwer.

Habitat in turribus murisque excelsis.

32. FALCO cera pedibusque flavis, corpore cinereo, maculis fuscis, cauda fasciis quatuor nigricantibus. LINN. *Spec. anim. gen. 41. n. 12.* Belgis Duynvalk.
Nidulatur in dunis.

33. FALCO cera viridi, pedibus flavis, pectore albo fuscoque undulato, cauda fasciis nigricantibus. LINN. *Spec. anim. gen. 41. n. 26.* Belgis Sparwer.

34. STRIX capite auriculato, corpore rufo. LINN. *Spec. anim. gen. 42. n. 1. Fn. Suec. §. 45.* Belgis Schuyfuyt.
Habitat in arboribus excelsis, at raro.

35. STRIX capite laevi, corpore ferrugineo, iridibus atris, remigibus primoribus ferratis. LINN. *Spec. anim. gen. 42. n. 6. Fn. Suec. n. 48.* Belgis Nagtuyl.
Vivit cum praecedente sed vulgarior.

36. LANIUS cauda cuneiformi lateribus alba, dorso cano, alis nigris macula alba. LINN. *Spec. anim. gen. 43. n. 2.*
Autumnali quandoque tempore in Hollandia observatur:

37. LANIUS remigibus secundariis apice membranaceo colorato, cauda integra. LINN. *Spec. anim. gen. 43. n. 10.* Belgis Vlaamse Viesel.
Anno 1759. autumnali tempore aliquot hujus speciei observati apud nos.

AVES.

PICAE.

38. CORVUS ater, dorso caerulefcente, cauda subrotunda. LINN. *Spec. anim. gen. 48. n. 1.* Belgis Kraay.
Vol IV. Ii Nidi-

Tab. XIII.

Nidificat in sylvis densis & excelsis.

39. CORVUS ater, fronte cinerascens. LINN. *Spec. anim. gen.*
48. n. 3. Belgis *Raav.*
Nidificat in arboribus turribusque praealtis.
40. CORVUS tetricibus alarum caeruleis, lineis transversis albis nigrisque, corpore ferrugineo variegato. LINN.
Spec. anim. gen. 48. n. 7. Belgis *Vlaamse Gaay.*
Circa autumnum per totum Belgium frequens circa arboretra fructifera, quibus invisus est avis.
41. CORVUS albo nigroque varius, cauda cuneiformi. LINN.
Spec. anim. gen. 48. n. 10. Belgis *Bontekraay.*
Nidificat in excelsis arboribus.
42. CORACIAS flava, alis caudaque nigris. LINN. *Spec. anim. gen.* 49. n. 3. Belgis *Widewaal.*
In Flandria, Zelandiaque frequens.
43. CUCULUS cauda aequali nigricante albo punctata. LINN.
Spec. anim. gen. 52. n. 1. Belgis *Koekoek.*
Frequens per Belgium.
44. PICUS niger pileo coccineo. LINN. *Spec. anim. gen.* 54. n. 1.
Belgis *Groote swarte Spegt.*
45. PICUS viridis, vertice coccineo. LINN. *Spec. anim. gen.*
54. n. 7. Belgis *Groene Spegt.*
Autumnali tempore quandoque in sylvis.
46. MEROPS dorso ferrugineo abdomine caudaque viridi caeruleo, rectricibus duabus longioribus. LINN. *Spec. anim. gen.* 57. n. 1. Belgis *Tsvogel.*
Hiemali tempore passim ad fossas.
47. UPUPA cristata, variegata. LINN. *Spec. anim. gen.* 58. n. 1.
Belgis *Hoppe.*
In Zelandia autumnali tempore frequens, in agris.

48. CER-

48. CERTHIA supra grisea, subtus alba, remigibus fuscis: Tab. XIII.
maculis decem albis. LINN. *Spec. anim. gen. 59. n. 1.*
Habitat in arborum truncis, at raro apud nos.

A V E S.

A N S E R E S.

49. ANAS rostro semicylindrico atro, cera flava, corpore albo.
LINN. *Spec. anim. gen. 61. n. 1.* Belgis *Zvvaan.*
Cicuratur in vivariis Magnatum.
50. ANAS rostro semicylindrico basi gibbo. LINN. *Spec. anim.*
gen. 61. n. 2. Belgis *Turkse gans.*
Vivit cum praecedente.
51. ANAS nigricans, macula pone oculos lineaque alarum
albis. LINN. *Spec. anim. gen. 61. n. 5.*
Habitat in Vivariis.
52. ANAS fusca, capite, collo, pectoreque nigris, collari albo.
LINN. *Spec. anim. gen. 61. n. 11.* Belgis *Rotgans.*
Habitat in insulis a mari cinctis, & quovis aestu partim
inundatis.
53. ANAS cauda acuminata elongata, subtus nigra, occipite
utrinque linea alba. LINN. *Spec. anim. gen. 61. n. 25.*
54. ANAS rectricibus intermediis (Maris) recurvatis, rostro
recto. LINN. *Spec. anim. gen. 61. n. 34.*
55. MERGUS crista dependente, capite nigro-coerulescente,
collari albo. LINN. *Spec. anim. gen. 62. n. 2.*
Habitat ad ripas lacuum fluviorumque sed raro.
56. ALCA rostro compresso ancipiti sulcato sulcis quatuor,
oculorum orbita temporibusque albis. LINN. *Spec.*
anim. gen. 63. n. 3.
Hiemali tempore quandoque ad littora marina.
57. COLYMBUS pedibus lobato-fissis, capite rufo, collari ni-
gro remigibus secundariis albis. LINN. *Spec. anim. gen.*
68. n. 2. Belgis *Arsevoet, Duyker.*
In paludibus ac lacubus quandoque.

58. PLATALEA corpore albo. LINN. *Spec. anim. gen. 73. n. 1.*
Belgis *Lepelaar.*
Rarius apud nos, quandoque attamen prope Goringum.
59. ARDEA vertice nudo papilloso, fronte, remigibus, occipiteque nigris, corpore cinereo. LINN. *Spec. anim. gen. 76. n. 4.*
Belgis *Ryger.*
Nidificat in excelsis arboribus, frequens ad aquas pisciferas dulces.
60. ARDEA nigra, remigibus nigris, cutem sanguinea. LINN. *Spec. anim. gen. 76. n. 7.*
Belgis *Oyevaar.*
Per aestatem frequens apud nos, appropinquante hyeme nos derelinquens.
61. ARDEA occipite crista pendula, dorso caerulescente, subtus albida, pectore maculis oblongis nigris. LINN. *Spec. anim. gen. 76. n. 10.*
Belgis *Roerdomp.*
Habitat aquas pisciferas dulces.
62. SCOLOPAX rostro arcuato, pedibus caerulescentibus, alis nigris maculis niveis. LINN. *Spec. anim. gen. 77. n. 5.*
Belgis *Wulp.*
Habitat ad ripas fluviorum.
63. SCOLOPAX rostro recto laevi, pedibus cinereis femoribus tectis, fascia frontis nigra. LINN. *Spec. anim. gen. 77. n. 7.*
Belgis *Snip.*
64. SCOLOPAX rostro recto apice tuberculato, pedibus fuscis, lineis frontis fuscis quaternis. LINN. *Spec. anim. gen. 77. n. 11.*
Belgis *Halve Snip.*
Habitat cum praecedentibus.
65. TRINGA pedibus rubris, rectricibus tribus lateralibus immaculatis, facie papillis granulatis carneis. LINN. *Spec. anim. gen. 78. n. 1.*
Belgis *Kemphaan.*
Habitat ad paludes.
66. TRIN-

66. TRINGA pedibus rubris, crista dependente, pectore nigro. Tab. XIII.
 LINN. *Spec. anim. gen. 78. n. 2.* Belgis *Kieviet.*
 Habitat in pratis, gramini imponens ova.
67. TRINGA rostro laevi, pedibus lividis, corpore cinereo
 lituris nigris, subtus albo. LINN. *Spec. anim. gen. 78.*
n. 9.
68. CHARADRIUS pedibus cinereis, corpore nigro viridi
 maculato, subtus albido. LINN. *Spec. anim. gen. 79.*
n. 8. Belgis *Plevier.*
 Habitat in campis.
69. RECURVIROSTRA albo nigroque varia. LINN. *Spec.*
anim. gen. 80. n. 1.
 Habitat quandoque ad littora marina.
70. HAEMATOPUS. LINN. *Spec. anim. gen. 81. n. 1.*
 Belgis *Strandjager.*
 Frequens ad littora marina.
71. FULICA fronte calva, corpore nigro, digitis lobatis.
 LINN. *Spec. anim. gen. 82. n. 1.* Belgis *Meerkoet.*
 Habitat ad aquas dulces.

A V E S.

G A L L I N A E.

72. PAVO crista erecta. LINN. *Spec. anim. gen. 87. n. 1.*
 Belgis *Paauv.*
 Habitat in vivariis magnatum.
73. MELEAGRIS capite caruncula frontali, cristaque gulari,
 maris pectore barbato. LINN. *Spec. anim. gen. 88. n. 1.*
 Belgis *Kalkoen.*
74. PHASIANVS cauda compressa adscendente. LINN. *Spec.*
anim. gen. 90. n. 1.
 Belgis *mas Haan, foemina Hen.*
 Habitat ubique.
75. PHASIANUS vertice calloso, temporibus carunculatis.
 LINN.

Tab. XIII.

LINN. *Spec. anim. gen. 90. n. 2.* Belgis *Poule pintade.*
Habitat in vivariis.

76. PHASIANUS rufus, capite caeruleo. LINN. *Spec. anim. gen. 90. n. 3.* Belgis *Faisant.*
Habitat quandoque in arvis, & in sylvestribus.

77. TETRAO pedibus hirsutis, rectricibus exterioribus sub-
brevioribus, axillis albis. LINN. *Spec. anim. gen. 91. n. 1.* Belgis *Korhoen.*
In Groningensi provincia frequens.

78. TETRAO pedibus nudis, corpore griseo-maculato, super-
ciliis albis. LINN. *Spec. anim. gen. 91. n. 13.* Belgis *Quartel.*
Habitat in campis.

A V E S.

P A S S E R E S.

79. COLUMBA coerulefcens, collo supra viridi nitente, fascia
alarum apiceque caudae nigricante. LINN. *Spec. anim. gen. 92. n. 1.* Belgis *mas Doffer, foemina Duyv.*
Habitat ubique culta.

80. COLUMBA pectore inflato. LINN. *Spec. anim. gen. 92. n. 2.*
Belgis *Paggadette.*

81. COLUMBA pennis occipitis reflexo-erectis. LINN. *Spec. anim. gen. 92. n. 3.* Belgis *Kapper.*

82. COLUMBA pennis in pectore recurvatis. LINN. *Spec. anim. gen. 92. n. 4.*

83. COLUMBA cauda erecta multipenni patula. LINN. *Spec. anim. gen. 92. n. 5.* Belgis *Paauwstaart.*

84. COLUMBA cera lata verrucosa, palpebris nudis. LINN. *Spec. anim. gen. 92. n. 6.*
Habitat culta cum praecedentibus ubique.

85. COLUMBA rectricibus posticis atris, remigibus primori-
bus

bus margine exteriori albidis, collo utrinque albo. Tab. XIII.

LINN. *Spec. anim. gen. 92. n. 11.* Belgis *Wilde duyf.*

Habitat in arboribus excelsis, nec non in turribus, gregatim volitans.

86. ALAUDA rectricibus extimis duabus extrorsum longitudinaliter albis, intermediis interiori latere ferrugineis. LINN. *Spec. anim. gen. 93. n. 1.* Belgis *Leeuwrik, Lewerk.* Habitat in agris.
87. STURNUS rostro flavescente, corpore nigro punctis albis. LINN. *Spec. anim. gen. 94. n. 1.* Belgis *Spreetw.* Habitat in foraminibus murorum turriumque.
88. TURDUS rectricibus nigris, extimis margine interiore apice albicantibus, capite uropygioque cano. LINN. *Spec. anim. gen. 95. n. 2.* Belgis *Kramsvogel.* Appropinquante hieme in sylvestribus.
89. TURDUS ater, rostro palpebrisque fulvis. LINN. *Spec. anim. gen. 95. n. 12.* Belgis *Swarte Lyste, Maarler.*
90. LOXIA artubus nigris, tectricibus caudae remigumque posticarum albis. LINN. *Spec. anim. gen. 96. n. 4.* Belgis *Goudvinck, Bloedvinck.* Hiemali tempore frequens in arboretis.
91. LOXIA flavescenti-virescens, remigibus primoribus antice luteis, rectricibus lateralibus quatuor basi luteis. LINN. *Spec. anim. gen. 96. n. 20.* Belgis *Groening.* Appropinquante hyeme apud nos.
92. FRINGILLA artubus nigris, remigibus utrinque albis, tribus primis immaculatis, rectricibus duabus oblique albis. LINN. *Spec. anim. gen. 98. n. 2.* Belgis *Vink.* Approximante hyeme frequens apud nos.
93. FRINGILLA remigibus antrorsum luteis, extima immaculata, rectricibus duabus extimis medio reliquisque apice albis. LINN. *Spec. anim. gen. 98. n. 9.* Belgis *Putter.*
94. FRIN-

- Tab. XIII. 94. FRINGILLA rostro corporeque albicante, rectricibus remigibusque virescentibus. LINN. *Spec. anim. gen.* 98. n. 18. Belgis *Canarie*.
Culta ubique habitat.
95. FRINGILLA remigibus medio luteis primis quatuor immaculatis, rectricibus quatuor flavis apice nigris. LINN. *Spec. anim. gen.* 98. n. 19. Belgis *Seysje*.
96. MOTACILLA rufo cinerea, genuum annulis cinereis. LINN. *Spec. anim. gen.* 99. n. 1. Belgis *Nagtegaal*.
97. MOTACILLA supra fusca, subtus albida, rectricibus fuscis, extima margine tenuiore alba. LINN. *Spec. anim. gen.* 99. n. 6. Belgis *Grasmis*.
98. MOTACILLA grisea, alis nigro cinereoque undulatis. LINN. *Spec. anim. gen.* 99. n. 29. Belgis *Boomkruypertie*.
Hiemali tempore in arboretis & hortis frequens.
99. PARUS capite nigro, temporibus albis, nucha lutea. LINN. *Spec. anim. gen.* 100. n. 2. Belgis *Mees*.
Appropinquante hyeme frequens apud nos.
100. HIRUNDO rectricibus, exceptis duabus intermediis, macula alba notatis. LINN. *Spec. anim. gen.* 101. n. 1. Belgis *Huys-Svaluw*.
Habitat ad trabes intra tectum.

CENTURIA ANIMALIUM SECUNDA IN BELGIO
A ME OBSERVATORUM.

AMPHIBIA.

REPTILIA.

101. SALAMANDRA alepidota verrucosa, cauda ancipiti pedibus inermibus fissis, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis. *Hist. amph.* n. 51.
Belgis *Water Hagedis*.
Habitat in stagnis.

102. SA-

102. SALAMANDRA alepidota, cauda teretiuscula pedibus Tab. XIII.
inermibus fissis, palmis tetradactylis, plantis pentadac-
tylis. *Hist. amph. n. 52.*
Vivit cum praecedente.
103. LACERTA cauda corpore parum longiore, squamis lae-
vissimis, abdominalibus oblongo-quadratis. *Hist. amph.*
p. 80. n. 57. Belgis *Duyn-Hagedis.*
Habitat in locis arenosis.
104. RANA manibus tetradactylis fissis, plantis hexadactylis
palmatis, corpore laevi.
Rana manibus tetradactylis fissis, plantis hexadactylis pal-
matis, pollice longioribus. *Hist. amph. n. 66.*
Belgis *Kikvorsch.*
Frequens in aquis stagnantibus dulcibus.
105. RANA manibus tetradactylis fissis, plantis hexadactylis
palmatis, corpore tuberculoso laevi.
Rana manibus tetradactylis fissis, plantis hexadactylis pal-
matis, pollice brevioribus. *Hist. amph. n. 65.*
Belgis *Padde.*
Habitat in locis humidis umbrosisque, natare aut salta-
re nesciens.

AMPHIBIA.

SERPENTIA.

106. COLUBER scutis abdominalibus CLXIV, & squama-
rum caudalium paribus LVIII. *Hist. amph. n. 27.*
In Gelria frequens.

AMPHIBIA.

NANTIA.

107. PETROMYZON unico ordine denticulorum minimo-
rum in limbo oris, praeter inferiores majores. *Mus.*
Jchth. I. n. 144. Belgis *Prik, Negenoo.*
Habitat in Mari Septentrionali.
108. RAJA aculeata, dentibus tuberculosis, cartilagine trans-
Vol. IV. K k *versa*

Tab. XIII.

- versa in ventre. *Mus. Ichth. I. n. 140.*
Belgis Rog.
109. RAJA dorso ventreque glabris, aculeis ad oculos, ter-
noque eorum ordine in cauda. *Mus. Ichth. I. n. 142.*
Belgis Vleet.
110. RAJA varia, dorso medio glabro, unico aculeorum ordi-
ne in cauda. *Mus. Ichth. I. n. 143.*
Belgis Gladde Rog.
111. RAJA corpore glabro, aculeo longo anterieus ferrato in
cauda apterygia. *Mus. Ichth. I. n. 141.*
Belgis Pylstaart.
Habitat cum congeneribus in Mari Septentrionali.
112. SQUALUS pinnis dorfalibus aculeatis, pinna anali carens.
Squalus pinna ani nulla, corporis ambitu subrotundo.
Mus. Ichth. I. n. 134. Belgis Speerhaay.
113. SQUALUS pinnis dorfalibus muticis, anali praesente, den-
tibus granulosis.
Squalus dentibus obtusis feu granulosis. *Mus. Ichth. I.*
n. 135.
114. SQUALUS dorso vario inermi, pinnis ventralibus concretis,
dorfalibus caudae proximis. *Mus. Ichth. II. n. 199.*
Belgis Sternhaay.
115. SQUALUS dorso vario inermi, pinnis ventralibus discretis,
dorfalibus caudae proximis. *Mus. Ichth. II. n. 200.*
116. SQUALUS pinna ani nulla, ore in apice capitis. *Mus.*
Ichth. I. n. 137.
Belgis Schoerhaay, Pakhaay.
Habitat cum congeneribus in Mari Septentrionali.
117. LOPHIUS corpore alepidoto plagioplateo, dorso dipte-
rygio, ore corporeque cirrofo.
Lophius ore cirroso. *Mus. Ichth. I. n. 128.*
Bel-

Belgis Zee-Duyvel.
Ante aliquot annos Catvicenses hunc piscem in Mari Septentrionali cepere.

Tab. XIII.

118. ACIPENSER corpore tuberculis spinosis a. vero. *Mus.*
Ichth. I. n. 131. II. p. 42. n. 131.
Belgis *Steur.*
Habitat in Mari Septentrionali rarior.

PISCES

APODES.

119. MURAENA maxilla inferiore longiore, corpore unicolore. LINN. *Spec. anim. gen. 119. n. 4.*
Belgis *Aal, Paling.*
Habitat ubique; etiam in mari.
120. MURAENA pinna ambiente alba, margine nigro. LINN.
Spec. anim. gen. 119. n. 5.
Belgis *Kongeraal.*
Rarissima apud nos, reperitur attamen in Lacu Harlemiensi.
121. PHOLIS maculis annulatis ad pinnam dorsalem.
Blennius maculis circiter decem nigris limbo albo utrinque ad pinnam dorsalem. *Mus. Ichth. I. n. 77.*
Habitat in Mari Septentrionali.
122. ENCHELYOPUS.
Blennius capite dorsoque fusco-flavescente, lituris nigris, pinna ani flava. *Mus. Ichth. I. n. 145.*
Belgis *Magaal.*
Quandoque frequens in Sinu Maris vulgo de Zuyder-Zee.
123. ANARRHICHAS. *Mus. Ichth. I. n. 44.*
Belgis *Zee-Wolf.*
Inhabitat Mare Septentrionale.
124. AMMODYTES. *Mus. Ichth. I. n. 35.*

K k 2

Bel-

Tab. XIII.

Belgis *Smelt*.

Frequens in littoribus septentrionalibus prope Domburgum in Zelandiae Walachria.

PISCES

JUGULARES.

125. URANOSCOPIUS officulo primo pinnae dorsalis primae unciali. *Mus. Ichth. I. n. 63.*
Belgis *Schelvisduyvel*.
126. URANOSCOPIUS officulo primo pinnae dorsalis primae longitudine corporis. *Mus. Ichth. I. n. 64.*
Belgis *Schelvisduyvel*.
127. URANOSCOPIUS officulo primo pinnae dorsalis primae triunciali. *Mus. Ichth. I. n. 65.*
Belgis *Schelvisduyvel*.
Habitat cum congeneribus in Mari Septentrionali.
128. URANOSCOPIUS officulis pinnae dorsalis primae brevissimis, capite utrinque monacantho. *Mus. Ichth. I. n. 166.*
Vivit cum praecedentibus at minus frequens.
129. TRACHINUS maxilla inferiore longiore. *Mus. Ichth. I. n. 97.*
Belgis *Pieterman*.
Frequens in Mari Septentrionali.
130. GADUS dorso tripterygio, ore cirrato, colore vario, maxilla superiore longiore, cauda aequali. *Mus. Ichth. I. n. 58.*
Belgis *Kabbeljauvv*.
Frequens in Mari Septentrionali.
A. 1758. Observantissimus D. BASTER Ziricaeae detexit Hermaphroditum hujus speciei lactes atque ovaria gerentem.
131. GADUS dorso tripterygio, ore cirrato, longitudine ad latitudinem tripla, pinna anni prima officulorum triginta. *Mus. Ichth. I. n. 60.*

Bel-

Belgis *Steenbolk*.
Aestivo tempore ad littora nostra marina.

Tab. XIII.

132. GADUS dorso tripterygio, maxilla inferiore brevior, cir-
ro solitario, cauda lunulata, linea laterali atra.
Gadus dorso tripterygio, ore cirrato, corpore albicante,
maxilla superiore longior, cauda parum bifurca. *Mus.*
Ichth. I. n. 59. Belgis *Schelvis*.
Hiemali tempore frequens in Mari Septentrionali.
133. GADUS dorso tripterygio, ore imberbi, maxilla inferiore
paulo brevior, corpore albicante, cauda subquadrata.
Gadus dorso tripterygio, ore imberbi, corpore albo, ma-
xilla superiore paulo longior. *Mus. Ichth. I. n. 55.*
Belgis junior *Molenaar*, natu majores *Wyting*.
Frequens aestivo tempore ad nostra littora.
134. GADUS dorso tripterygio, ore imberbi, maxilla inferio-
re longior, corpore subfusco, cauda aequali.
Gadus dorso tripterygio, ore imberbi, corpore virescente.
Mus. Ichth. I. n. 56. Belgis *Groene Schelvis*.
Rarior in Mari nostro.
135. GADUS dorso tripterygio, ore imberbi, maxillis aequa-
libus, corpore albidior, cauda parum lunulata.
Gadus dorso tripterygio, ore imberbi, maxilla inferiore
longior, linea laterali curva. *Mus. Ichth. I. n. 57.*
Habitat cum praecedente.
136. GADUS dorso dipterygio, ore cirrato, maxillis aequali-
bus. *Mus. Ichth. I. n. 61.* Belgis *Puitaal*.
Habitat in fluminibus.
137. GADUS dorso dipterygio fulco magno ad pinnam dorfi
primam, ore cirrato. *Mus. Ichth. I. n. 62.*
Belgis *Zee-puitaal*.
Habitat in Mari Septentrionali.

138. GOBIUS albescens, pinnis utrisque dorsalibus altitudine aequalibus. *Mus. Ichth. III. Mss.*
 Gobio RONDEL. *pisc. mar. lib. 6. cap. 16. p. 195.*
 Belgis *Meune.*
 Frequens ad littora marina.
139. COTTUS alepidotus, capite polyacantho, maxilla superiore paulo longiore. *Mus. Ichth. I. n. 104.*
 Belgis *Donderpadde.*
140. COTTUS cirris plurimis, corpore octagono. *Mus. Ichth. I. n. 105.*
 Belgis *Harnasmannetie.*
 Vivit cum praecedente in Mari Septentrionali.
141. ZEUS ventre aculeato, cauda in extremo circinata. *Mus. Ichth. I. n. 107.*
 Belgis *Zonnevis.*
 Habitat in Mari Septentrionali.
142. PLEURONECTES laevis, tuberculis post oculos, cauda rotundata, dentibus contiguis obtusis.
 Pleuronectes oculis & tuberculis sex a dextra capitis, lateribus glabris, spina ad anum. *Mus. Ichth. I. n. 36.*
 Belgis *Schol.*
 In Mari Septentrionali frequens, & ad nostra littora.
143. PLEURONECTES laevis, tuberculis capitis nullis, cauda lunulato-truncata, dentibus acutis remotis.
 Pleuronectes oculis a dextra, totus glaber, dentibus acutis, cauda fere aequali. *Mus. Ichth. II. n. 158.*
 Belgis *Heilbot.*
 Habitat cum praecedente sed rarior.
144. PLEURONECTES, linea laterali radicibusque pinnarum dorsi anique spinulis asperis, cauda subaequali.
 Pleuronectes oculis a dextris, linea laterali aspera, spinulis superne ad radices pinnarum dentibus acutis. *Mus. Ichth. I. n. 40.*
 Belgis

Belgis *Amsterdamsse Bot*, *Tey-Bot*.
 Frequens in Sinu Maris vulgo *het Tey*.

Tab. XIII.

145. PLEURONECTES corpore ovato, glabro, dentibus obtusis, cauda rotundata.

Pleuronectes oblongo-ovatus, glaber, oculis a dextris, dentibus obtusis, cauda subrotunda. *Mus. Ichth. II. p. 11. sub num. 39.*

Belgis *Scharretong*.

Habitat in Mari Septentrionali, at raro.

146. PLEURONECTES oblongus, squamis exasperatis, maxilla superiore longiore, ore ad latus album cirroso, cauda subrotunda.

Pleuronectes oblongus maxilla superiore longiore, squamis utrinque asperis. *Mus. Ichth. I. n. 37.*

Belgis *Tonge*.

Frequens ad littora nostra.

147. PLEURONECTES subrotundus, glaber.

Pleuronectes oculis a sinistra, corpore glabro. *Mus. Ichth. I. n. 43.*

Belgis *Griet*.

Habitat in Mari Septentrionali.

148. PLEURONECTES subrotundus, tuberculis osseis sparsis scaber.

Pleuronectes oculis a sinistra, corpore aspero. *Mus. Ichth. II. n. 159.*

Belgis *Tarbot*.

Habitat cum praecedente.

OBS. Haud constans sed manca est distinctio Pleuronectum, in tales, qui oculos in dextro, vel in sinistro capitis latere gerunt, reperi N^o. 142, 144, 146, & 148. oculos tum in dextro, tum in sinistro latere promiscue habere.

149. SPARUS dorso acutissimo, linea arcuata aurea inter oculos. *Mus. Ichth. I. n. 90.*

Habitat in Mari Septentrionali quandoque.

150. PERCA

- Tab. XIII. 150. PERCA dorso monopterygio, capite cavernoso. *Mus.*
Ichth. I. n. 94. Belgis *Pos.*
 Frequens in fluminibus.
151. PERCA lineis utrinque sex transversis nigris, pinnis ventralibus rubris. *Mus. Ichth. I. n. 96.* Belgis *Baars.*
 Vivit cum antecedente.
152. PERCA radiis pinnae dorsalis secundae tredecim, ani quatuordecim. *Mus. Ichth. I. n. 95.*
 Belgis *Zee-Baars.*
 Habitat in Mari Septentrionali quandoque.
153. GASTEROSTEUS aculeis in dorso tribus. *Mus. Ichth. I. n. 111.* Belgis *Stekelbaars.*
 Frequens in fluminibus lacubusque.
154. GASTEROSTEUS aculeis in dorso decem. *Mus. Ichth. I. n. 112.* Belgis *Stekelbaars.*
 Habitat cum praecedente.
155. GASTEROSTEUS aculeis in dorso quindecim. *Mus. Ichth. I. n. 113.*
 Habitat in Mari Septentrionali.
156. SCOMBER dorso dipterygio, pinnulis spuriiis nullis, linea laterali curva loricata, aculeata.
 Scomber linea laterali aculeata, pinna ani officulorum triginta. *Mus. Ichth. I. n. 80.* Belgis *Marsbanker.*
 Frequens en Mari Septentrionali.
157. SCOMBER pinnulis quinque in extremo dorso polypterygio, spina brevi ad anum. *Mus. Ichth. I. n. 81.*
 Belgis *Makreel.*
 Vivit cum antecedente.
158. MULLUS cirris geminis, corpore rubro. *LINN. Spec. anim. gen. 147. n. 1.*
 Trigla capite glabro, cirris geminis in maxilla inferiore. *Mus. Ichth. I. n. 99.* Belgis *Koning van de Haring.*
 Habitat

Habitat in Mari Septentrionali.

Tab. XIII.

159. TRIGLA capite aculeato, linea laterali exasperata.
Trigla varia, rostro diacantho aculeis geminis ad utrum-
que oculum. *Mus. Ichth. I. n. 101.*
Belgis *Knorhaan*.

160. TRIGLA capite aculeato, linea laterali laevi.
Trigla rostro parum bifido, linea laterali ad caudam bi-
furca. *Mus. I. n. 100.* Belgis *Knorhaan, Zeekaan.*
Habitat cum praecedente frequenter in Mari Septentrio-
nali.

PISCES

ABDOMINALES.

161. COBITIS aculeo bifurco infra utrumque oculum. *Mus.*
Ichth. I. n. 5.
Cobitis cirris oris sex, spina suboculari. *LINN. Spec. anim.*
gen. 149. n. 5. Belgis *Grundel.*
Habitat in fluviis.

162. COBITIS caerulefcens, lineis utrinque quinque nigris lon-
gitudinalibus. *Mus. Ichth. I. n. 7.*
Quandoque apud nos in fossis.

163. COBITIS tota glabra maculosa, corpore subtereti. *Mus.*
Ichth. I. n. 6.
Habitat in stagnis fossisque.

164. SILURUS cirris duobus ad maxillam superiorem, qua-
tuor in mento. *Mus. Ichth. I. n. 25. & II. Tab. 6. fig. I.*
Belgis *Meerval.*
Habitat in Lacu Harlemiensi.

165. CYCLOGASTER. *Mus. Ichth. II. n. 157.*
Belgis *Kringbuyk.*
Habitat ad littora nostra marina.

166. SALMO maxilla superiore longiore conica. *LINN. Spec.*
anim. gen. 152. n. 17.
Vol. IV. L1 Corego-

- Tab. XIII. Coregonus maxilla superiore longiore conica. *Mus.*
Ichth. I. n. 48. Belgis *Hauting.*
 Reperitur in fluminum ostiis.
167. SALMO unicolor, maxilla inferiore longiore.
 Osmerus radiis pinnae ani septemdecim. *Mus. Ichth. I.*
n. 49. Belgis *Spiering.*
 Habitat in lacubus, fluminum ostiis, & in mari.
168. SALMO cauda vix lunata, lateribus superioribus tantum
 maculis nigris obsperfis.
 Salmo rostro ultra inferiorem maxillam saepe prominente.
Mus. Ichth. II. n. 163. Belgis *Salm.*
 Frequens certis anni temporibus in fluminum ostiis.
169. ESOX rostro plagioplateo. *Mus. Ichth. I. n. 28.*
 Belgis *Snoek.*
 Habitat in omni aqua dulci piscosa.
170. ESOX rostro cuspidato, gracili, subtereti, spithamali.
Mus. Ichth. I. n. 30. Belgis *Geep.*
 Habitat in Mari Septentrionali.
171. ATHERINA. *Mus. Ichth. I. n. 66.* LINN. *Spec. anim.*
gen. 156. n. 1.
 Habitat in mari.
172. ARGENTINA maxilla inferiore longiore, ore dentato,
 pinna dorsali ventralibus opposita.
 Argentina pinna dorsali ventralibus opposita. *Mus. Ichth.*
I. n. 24. Belgis *Anfiovis.*
 Habitat in mari.
173. MUGIL. *Mus. Ichth. I. n. 85.* LINN. *Spec. anim. gen.*
157. n. 1. Belgis *Harder.*
 Habitat in mari.
174. CLUPEA maxilla inferiore longiore maculis nigris carens
Mus. Ichth. I. n. 21.
 Recens aut sale condita Belgis *Haring*; fumo indurata
Bokken

Bokken vel & Bokking.
Frequens in Mari Septentrionali.

Tab. XIII.

175. CLUPEA apice maxillae superioris bifido, maculis nigris utrinque. *Mus. Ichth. I. n. 23.* Belgis *Elft.*
Habitat cum praecedente.
176. CLUPEA quadriuncialis, maxilla inferiore longiore, ventre acutissimo. *Mus. Ichth. I. n. 22.* Belgis *Sprot.*
Autumnali tempore frequens ad littora nostra.
177. CYPRINUS cirris quatuor, officulo tertio pinnarum dorsae anique uncinulis armato. *Mus. Ichth. I. n. 19.*
Belgis *Karper.*
Habitat in fluminibus ubique.
178. CYPRINUS oblongus, maxilla superiore longiore, cirris quatuor, pinna ani officulorum septem. *Mus. Ichth. I. n. 20. II. n. 20.* Belgis *Barm, vel & Barbel.*
Habitat in Transisulaniae flumine Isala frequens.
179. CYPRINUS mucosus, totus nigricans, extremitate caudae aequali. *Mus. Ichth. I. n. 18.* Belgis *Zeelt.*
Habitat in fluminibus, lacubus atque stagnis.
180. CYPRINUS quincuncialis maculosus, maxilla superiore longiore, cirris duobus ad os. *Mus. Ichth. II. n. 149.*
In Flandriae fluviis frequens.
181. CYPRINUS oblongus, cauda lunata, dorso convexiusculo, pinna dorsali ventralibus remotiore, maxillis aequalibus.
Cyprinus iride, pinnis ventris anique plerumque rubentibus. *Mus. Ichth. I. n. 8.* Belgis *Blancke Voorn.*
Habitat ubique in aqua dulci.
182. CYPRINUS oblongus, cauda lunata, dorso convexiusculo, pinna dorsali ventralibus remotiore, maxilla inferiore longiore.
Cyprinus iride, pinnis omnibus caudaque rubris. *Mus. Ichth.*

Tab. XIII.

*Ichth. I. n. 9.*Belgis *Ruysvoorn.*

Habitat ad arundineta.

183. CYPRINUS oblongus, cauda lunata, dorso convexiusculo, pinna dorsali ventralibus opposita, maxilla superiore paulo longiore.
Varietas 8. Cyprini. *Mus. Ichth. I. n. 8.*
184. CYPRINUS oblongus, rostro nasiformi prominente, pinna dorsali ventralibus opposita, cauda bifurcata.
Cyprinus rostro nasiformi prominente, pinna ani officulorum quatuordecim. *Mus. Ichth. II. n. 147.*
Habitat in fluminibus.
185. CYPRINUS oblongus, teres, maxillis aequalibus, pinna dorsali ventralibus paulo remotiore, pinnis ventris anique albicantibus.
Cyprinus oblongus, macrolepidotus, pinna ani officulorum undecim. *Mus. Ichth. I. n. 12.*
Habitat in Lacu Harlemiensi.
186. CYPRINUS oblongus, teres, maxillis subaequalibus, pinna dorsali ventralibus paulo remotiore, cauda lunata, pinna dorsi anique parallelogramma.
Cyprinus oblongus subquadrangulus, pinna dorsi anique parallelogramma. *Mus. Ichth. I. n. 17.*
Habitat quandoque in fluviis.
187. CYPRINUS oblongus, teres, maxilla inferiore longiore, pinna dorsali ano opposita, cauda lunulata.
Cyprinus quincuncialis, pinna ani officulorum viginti.
Mus. Ichth. I. n. 10. Belgis *Nasteling.*
Habitat in lacubus.
188. CYPRINUS oblongus, teres, maxilla inferiore longiore, pinna dorsali ventralibus remotiore, cauda bifurcata.
Belgis *Winden.*
Frequens in fluminibus.

189. CY-

189. CYPRINUS oblongus, maxillis subaequalibus, dorso Tab. XIII.
recto, cauda truncata, pinna dorsi ventralibus opposita.
Habitat in Rheno.
190. CYPRINUS latus, cauda subaequali, pinnae dorsi anique
officulo secundo postice duplici serie denticulato.
Cyprinus pinnae dorsi officulorum viginti, linea laterali
recta. *Mus. Ichth. I. n. 11.* Belgis *Hamburger, Steen-*
karper.
Habitat in Rheno & in Lacu Harlemienfi.
191. CYPRINUS latissimus, cauda amplissima lunulata, pinnis
omnibus ad margines fuscis.
Ballerus Rondeletii. *GESNER. Aquat. lib. 4. p. 24.*
Belgis *Bley, Bliek.*
192. CYPRINUS latissimus, cauda lunulata, pinnis omnibus
fuscis, linea laterali in mediis lateribus.
Belgis *Kolfoog.*
Habitat cum praecedente frequens in fluminibus & fossis.
193. CYPRINUS latus pinna dorsali ano ferme opposita, cau-
da amplissima, lunulata, pinnis omnibus nigricantibus.
Cyprinus pinnis omnibus nigrescentibus, pinna ani officu-
lorum viginti septem. *Mus. Ichth. I. n. 14.*
Belgis *Braassem.*
Frequens in fluminibus.
194. CYPRINUS latus, ovatus, maxillis subaequalibus, pin-
na dorsali ventralibus paulo remotiore, cauda lunulata.
Cyprinus iride sublutea, pinnis ventralibus anique rubris.
Mus. Ichth. I. n. 13.
Habitat quandoque in Rheno.

PISCES

BRANCHIOSTEGI.

195. TETRAODON laevis, compressus, caudae pinna trun-
cata brevissima dorsali analique adnexa. *LINN. Spec.*
anim. gen. 165. n. 6.

L 1 3

Ostra-

Tab. XIII.

- Ostracion cathetoplateus subrotundus, inermis, asper, pinnis pectoralibus horizontalibus, foraminibus quatuor in capite. *Az. Upsal. 1741. p. 68. n. 9.*
Habitat in Mari Septentrionali.
196. CYCLOPTERUS. *Mus. Ichth. I. n. 127. Belgis Engelse Lump. Zelandis Klieft.*
Habitat in Mari Septentrionali.
197. SYNGNATHUS teres, pinnis pectoralibus caudaeque carens. *Mus. Ichth. I. n. 2.*
Frequens in littoribus marinis.
198. SYNGNATHUS corpore heptagono, cauda pinnata. *Mus. Ichth. I. n. 3.*
Habitat cum antecedente.

INSECTA.

COLEOPTERA.

199. SCARABAEUS thorace tricorni, intermedio minore, capite mutico. *LINN. Spec. anim. gen. 170. n. 6.*
200. SCARABAEUS thorace tuberculo triplici, capitis cornu recurvato. *LINN. Spec. anim. gen. 170. n. 7.*
Belgis Rhinoceros-Tor.
Foemina cornu caret. Habitat in cortice quercino putrefacto.



CAROLI