

Flitsen uit een kort verblijf aan de Côte d'Emeraude (Côtes du Nord, Bretagne)

M.-Th. Vanhaelen

17 mei 1998 - Sables d'Or-les Pins

Mijn eerste kennismaking met dit uitgestrekte zandstrand. Langs de waterlijn spoelen grote kluwens bruinwier aan : riem-, vezel-, hauw-, knots- en blaaswier. Ook vele holle 'patatjes', het bruinwier *Leathesia difformis*. Ertussen liggen regelmatig kleine lilaroze trosjes, het lijken wel bloempjes, meer bepaald deeltjes van de bolle rode klaverbloem of de basterdklaver. Bij nader toekijken zie ik dat het eikapseltjes zijn. Qua grootte stemmen ze overeen met de 'bekertjes' van de purperslak, maar die sierlijke urnvorm hebben ze niet. De zijkanten zijn eerder plat. Eigenlijk lijken ze nog het best op Nassarius-kapseltjes, maar dan zeer langgerekt en gekleurd. Wat ik vermoed ... wordt later thuis bevestigd : het zijn de eikapsels van de stekelhoren, *Ocenebra erinacea* (Graham, 1988) die hier in de buurt onder andere de lage delen van de havenmuren van Erquy inpalmt. Deze eikapsels worden in klompjes afgezet op schelpen of stenen, maar nu zijn ze los van hun substraat in partjes aangespoeld.

17 mei 1998 ('s avonds) - St.-Jacut, Plage du Rougeret

Naar het eind toe van een twee-uren zoektocht raap ik op dit vertrouwde strand nog gauw een rood plastic dobbertje op. Het is mooi bezet met vulkaantjes *Balamus perforatus*. Ja, ... wat doe ik ermee ? Bijna machinaal werp ik het terug weg, maar in een laatste reactie raap ik het toch weer op en plof het bij enkele bewaarde doubletten, een *Modiolus barbatus*, een *Arcopagia crassa* en een *Cardium norvegicum* in mijn zak. Wat blijkt later bij grondiger inspectie van dit dobbertje ? Er zitten een 20-tal zeer kleine kapsels op : een mini-uitgave van de ons zo bekende 'hartjes'-kapsels van de gevlochten fuikhoren, doch de nu ontdekte exemplaartjes zijn piepklein, slechts 1 à 1,5 mm. Of ze van *Nassarius incrassatus* zijn ofwel van *Nassarius pygmaeus* kan ik niet uitmaken. Graham (1988) vermeldt ze op pagina 412 en 414.

Na jaren strandspeurwerk word je erg selectief bij het meenemen, gelukkig had ik ditmaal twee keer nagedacht !

18 mei 1998 ('s morgens) - Erquy

In de haven gaan Marc en ik op zoek naar roze pokken *Solidobalanus fallax* (Kerckhof, 1997). Er staan zeer veel grote kreeftenkorven, doch op geen enkele zitten de bewuste pokken. Tot we daar een bolletje soepel gaas met grote mazen op de kaderand bemerken. En ditmaal is het letterlijk 'in de roos'; het is bezaaid met roze pokjes, waarvan velen nog met dier. (Francis zal in zijn nopjes zijn).


18 mei 1998 ('s avonds) - St.-Jacut

Fig. 1. *Calliactis parasitica*.

Naar Hayward P.J. & Ryland J.S., 1995

Weerom St.-Jacut, Plage du Rougeret. Wanneer het strand stilaan begint vrij te komen, zie ik in de krachtige stroming van een mui plots 'iets' rollen. Vlug er op af. Het is een grote wulkhoren bezet door twee grote anemonen, *Calliactis parasitica* (Fig. 1) of de heremiet-zee-anemoon. Ze hebben donkerpaarse vlekken en hun bijna volledig ingetrokken tentakels zijn oranje. De Buccinum is bewoond door een heremietkreeft *Pagurus bernhardus*, die naar mijn gevoel minder schuw is dan zijn Belgische soortgenoten die geen gezelschap van meereizende en - etende anemonen hebben.

Misschien is dat doordat hij beschermd wordt door die twee heremiet-zee-anemonen. Of het gebruikelijk of eerder zeldzaam is, dat er twee anemonen tegelijk één Buccinum bezetten, heb ik niet kunnen achterhalen in de literatuur.

Literatuur

Graham, A., 1988. Molluscs : Prosobranch and Pyramidellid Gastropods. Leiden : Brill & Backhuis. 662 pp.

Kerckhof, F., 1997. Waarnemingen van de Afrikaanse zeepok *Solidobalanus fallax* langs de Franse Atlantische kust en op drijvende voorwerpen aangespoeld op het Belgisch strand. De Strandvlo 17(3) : 34-44.

Ter Yde, 1 - 8670 Koksijde