

## KORTE MEDEDELINGEN

### De struikspons, *Raspailla hispida* tweemaal aangespoeld aan de Westkust

35987

Op 16 november 1996 vond ik te Koksijde een sponsje dat door F. Kerckhof op naam gebracht werd, namelijk *Raspailla hispida*. Het lijkt op een fijn struikje of boompje dat regelmatig en breed vertakt is en puntige uiteinden heeft. Het is dof en beige-achtig gekleurd. Het exemplaar is  $\pm 9$  cm hoog en  $\pm 13$  cm breed. Ik herinnerde me dat ik al eerder een soortgelijk sponsje vond : die eerste vondst dateert van 28 december 1995 te Oostduinkerke en meet  $\pm 8,5$  cm x 10 cm.

Een ander soort boomvormig sponsje spoelde vroeger (2 december 1990 en 25 februari 1994) reeds aan te Koksijde-Schipgat. Deze soort was helder tot licht okergeel gekleurd, met bredere takjes en voelde erg fluweelachtig aan. Deze 2 sponsjes zijn ook regelmatig vertakt, doch eindigen breed gevorkt (Y). Ze waren vers en  $\pm 5$  cm en  $\pm 10$  cm hoog. *Axinella agnata*, een soort gele geweispons, beschreven door S. Weinberg (1994) beantwoordt het meest aan het uitzicht van deze sponssoort.

De 4 sponzen zijn telkens gevonden in een periode dat bundels bruinwieren en kluwens hydroidpoliepen zeer talrijk aanspoelden, een paar weken na een zuidwestenstorm. Vermoedelijk zijn de sponzen dan ook met dat drijvend materiaal naar onze stranden gevoerd.

### Literatuur

Weinberg, S., 1994. Découvrir l'Atlantique, la Manche et la mer du Nord. Nathan, Paris. p. 148-150.

M.-Th. Vanhaelen

### Vondsten van *Aglaophenia pluma*, zeepluim op 16 november 1996 te Koksijde

35988

Die dag lagen er in de vloedlijn tussen de 10 golfbrekers van Koksijde honderden kluwens, waarin riem-, knots- en blaaswieren verstrengeld zaten. Iets lager telde ik een