

## Summary

Two important strandings of the bivalve *Solen marginatus* in February and May 2005 on the western part of the Belgian coast are reported.

## Literatuur

- VANHAELEN, M.-TH., 1997. Grote stranding *Solen marginatus* aan de Belgische Westkust na extreme winter en februari-stormen 1997. De Strandvlo 17(4): 27-128.
- VANHAELEN, M.-TH., 2005. Verse strandingen van enkele bivalvesoorten in opmars tijdens de winter 2004-2005 aan de Belgische Westkust. De Strandvlo, 25(3): 99-100.

**Ter Yde, I,  
8670 Oostduinkerke**

## Korte mededeling

### **Voor u gezien en bewonderd in het uitstalraam van 'Mare nostrum' te Sint-Idesbald in 2005**

21 juli 2005: 1 blonde rog *Raja brachyura* van ongeveer 60 cm. Lichtbruine rugzijde met donkere stippen, dicht open en enkele grote vage, witte vlekken; geen stekels.

17 augustus 2005: 1 gewone sidderrog *Torpedo nobiliana* (elektrische rog), opgevisst in de Ierse Zee en aangevoerd te Oostende. Gewicht 35 kg. Lengte  $\pm$  1,5 m. Kleur: rugzijde zeer donkergrijs tot zwart.

103077

**Marie-Thérèse Vanhaelen**

### **Opvallende toename van de tere platschelp *Tellina tenuis* te Koksijde en De Panne in 2006**

Reeds einde december 2005 had ik gemerkt dat de tere platschelp iets frequenter en talrijker in aantal voorkwam op onze Westkust, dit wil zeggen dat je er elke strandwandeling toch enkele en al eens meer dan 5 doubletjes zag per zoektocht. Tot eind februari telde ik reeds 107 exemplaren. Daartussen zaten enkele tientallen levende en dode dieren. Op één dag, 23 januari 2006, lagen er zelfs 30 doubletjes.

Een tweede aanspoelperiode liep van begin april tot einde mei 2006. In totaal werden er dan 159 verzameld.

Vooraf na een zeer late storm uit noordwest zijn er op 31 mei 2006 veel *Tellina tenuis* gevonden: 93 verse, lege exemplaren raapte ik die dag op te Koksijde, tussen begin dijk (Elisabethplein) en Sint-André, het zogenaamde Schipgat. Mogelijk lagen er dubbel zoveel.

Die dag was vooral *Tellina fabula*, de rechtsgestreepte platschelp goed vertegenwoordigd met minstens een 1000-tal van deze soort.

De tere platschelpen leken me dit jaar redelijk groot; de meeste hadden een lengte van minimum 2 cm en meerdere tientallen waren 2,5 cm à 3 cm. Persoonlijke vondsten van bijvoorbeeld Bretagne, Middellandse Zee en Algarve zijn altijd kleiner en vaak feller gekleurd dan onze Noordzee-exemplaren.

Wat me bij de huidige stranding opviel: naast *Tellina tenuis* schelpen met een matte binnenzijde, waren er ditmaal veel met sterk glanzende en opvallend gekleurde binnenkant.

Net zoals bij *Solen marginatus* lijkt de oorzaak voor een opvallende *Tellina tenuis* stranding nu niet meer een uiterst strenge winter te zijn. Vroeger gold dit wel: onder andere tijdens de extreme winter in 1997; toen deed zich op 11 februari, bij Ster der Zee, de grootste stranding van *Tellina tenuis* voor die ik ooit zag: in één dag werden er 242 verse tere platschelpen gevonden, waaronder vele tientallen met vleesresten (Vanhaelen, 1997).

## Literatuur

VANHAELLEN, M.-TH., 1997. Grote stranding *Solen marginatus* aan de Belgische Westkust na extreme winter en februari-stormen 1997. De Strandvlo 17(4): 27-128.

Marie-Thérèse Vanhaelen