

In het aanspoelsel te Oostduinkerke werden op 17.I. massaal levende gewone slangsterren (*Ophiura texturata*) aangetroffen. Nadien werden slechts af en toe enkele ex. gevonden. Op 28.III. waren er 2 ex. van de brokkelster (*Ophiotrix fragilis*) gevonden in een warrelnet samen met 3 slangsterren.

Andere waarnemingen van de brokkelster :

Oostduinkerke	24.I.	1 ex.	aanspoelsel
De Panne	28.V.	1 ex.	id.

Lucas De Heerestraat 64
B-9000 Gent

Verslag van de SWG-excursie naar Nieuwpoort en Lombardsijde op 23 augustus 1981.

A. Huysseune

Negenentwintig personen waren komen opdagen voor deze excursie; enkelen hadden er zelfs een verre verplaatsing voor over.

Het eerste gedeelte van de uitstap bestond uit een wandeling op het strand ten oosten van de IJzermonding (Lombardsijde). De harde NW-wind van de afgelopen week had voor behoorlijk wat aanspoelsel gezorgd dat op het strand in verschillende banken gesorteerd lag. Het laagst op het strand lag vooral grof schelpengruis waarin, behalve kokkels, weinig intacte schelpen te vinden waren. Iets hoger in de getijdenzone lag een bank van aanspoelsel dat vnl. bestond uit lege kokers van sedentair levende wormen : het goudkammetje, de schelpkokerworm, de slijkkokerworm en de perkamentkokerworm. Tussen de kokers lagen veel anemonen, waarvan een aantal zeker zeeanellijeren waren. Verder lagen hiertussen veel rugschilden van de strandkrab, de gewone zwemkrab, de breedpootkrab en een klein ex. van de noordzeekrab; ook een levend porceleinkrabbetje. Tussen de talrijke kluwens mosdiertjes en poliepen-


kolonies kropen zeepissebedden en vlokreeften rond.

Het aanspoelsel in de vloedlijn bestond vooral uit ineengestrengelde kluwens wier w.o. zeer talrijk het riemwier, Japans bessenwier en darmwier. Verder zat hiertussen ook knotswier, blaaswier, kleine zeeëik, kamwier en een enkele sliert vezelwier. Rondom deze vloedlijn waren in het droge zand de gaatjes te zien waarin de strandvlo leeft.

Het tweede gedeelte van de excursie ging naar de IJzermonding. Eerst werd halt gehouden aan de "Oesterput". Daar werd een bodemstaal uitgezeefd om de overvloedige aanwezigheid van het wadkreeftje aan te tonen. Deze kleine kreeftjes zitten met zo'n 5000 à 6000 ex. per m² en vormen een belangrijke voedselbron voor veel steltlopers. In de hoge schorre vonden we de voor dit milieu typische kwelder-springer en het muizenootje, een slikbewonend slakje.

Een staal slib van een slijkplaat langs de IJzer leverde o.m. talrijke zeeduizendpoten op en een enkele levende platte slijkgaper. In het verzand, noordelijk gedeelte van het reservaat werden tenslotte nog de bestippelde en de gewone strandvlo gevonden.

Muinkkaai 100
B-9000 Gent



Bestippelde strand-
vlo (mannetje)
(*Talorchestia*
deshayesii)
(naar Dekker)