
Vraagtekens rond een fluwelen zeemuis. R. Vanwalleghem

Onlangs vestigde onze vriend E. Eneman mijn aandacht op een 'bijzonder geval' van de fluwelen zeemuis, *Aphrodite aculeata* Linné.

Het dier werd midden januari door een garnaalvisser langs de Belgische kust gevangen, doch de juiste vindplaats was niet meer te achterhalen. Het dier werd dood ontvangen, doch zonder twijfel levend gevangen.

Bij een oppervlakkig onderzoek zag Eddy achteraan de dorsale zijde een stuk mossel uit het lichaam steken. Hij sneed de huid verder open en bemerkte nog andere kleine schelpjes. De operatie werd beëindigd en het ganse geval op formol gezet. Nadien heb ik het ex. wat nader bekeken. In de viltlaag vond ik de borstelworm *Harmothoe impar* Johnston, en een parasitaire copepode. De mossel die gedeeltelijk uit de rug huid stak was 21 mm lang en met byssusdraden stevig in het inwendige van de zeemuis verankerd. Daar dichtbij maar volledig inwendig vond ik nog een juveniel ex. (4 mm) en ook 4 juveniele ex. van de afgeknotte gaper (*Mya truncata* Linné), waarvan de grootste 4 mm mat.

Gedurende mijn jarenlang contact met de vissers ben ik er gewoon aan geraakt op de meest mogelijke en onmogelijke plaatsen schelpen te zoeken, maar 'levende mollusken' in een zeemuis vond ik maar al te kras.

Mijn kennis over wormen is zeer gering maar ik meen echter over dit verschijnsel in de door mij doorgenomen literatuur nog nooit iets gelezen te hebben. Ook navraag in mijn kennissenkring bracht geen opheldering.

Hierbij wou ik graag reacties horen inzake dit ongewone feit. Met dank aan G. Rappé en F. Kerckhof voor de determinatie.

Frère Orbanstraat 59
8400 Oostende