

Een vergeten stuk strand

W. Segers

Naar aanleiding van het aan de gang zijnde onderzoek naar de 'Recente Belgische Mollusken' door de heer Van Goethem, ben ik eindelijk in mijn verzameling gedoken om het materiaal dat ik gedurende mijn strooptochten in augustus 1983 en 1984 te Zeebrugge verzamelde te inventariseren en na lang aandringen door derden ook te publiceren.

Het betreft hier materiaal opgespoten op het vergeten stuk strand tussen de oude en de nieuwe westelijke havendam. Dit materiaal is afkomstig uit de havenmond van een diepte tussen 12 en 18 m. De opgestelde lijst bevat dus recente, pleistocene, pliocene en zelfs oocene soorten. Welke waartoe behoren is een vette kluit voor fossielenverzamelaars, maar hier minder terzake. De (vermoedelijke) recente soorten werden in de lijst met een sterretje aangeduid en eventueel voorzien van commentaar.

Zonder de heer Van Nieulande, die reeds prachtig veldwerk verrichte op gelijkaardig materiaal te Cadzand en die in 'zweet, bloed en tranen' ook mijn materiaal grotendeels determineerde, zou dit artikel nooit het licht hebben gezien. Mijn oprechte dank hiervoor.

KLASSE BIVALVIA

- | | |
|--|---|
| * <i>Nucula nucleus</i> (L., 1767) | 4 doubletten, twijfelachtig, geen periostracum |
| * <i>Striarca lactea lactea</i> (L., 1758) | één vers dood doublet met periostracum |
| <i>Chlamys varia</i> (L., 1758) | |
| <i>Flexopecten flexuosus</i> (Poli, 1759) | |
| <i>Unio</i> sp. | |
| <i>Lucinoma borealis</i> (L., 1767) | |
| <i>Lucina squamula</i> (Deshayes, 1825) | |
| * <i>Mysella bidentata</i> (Montagu, 1803) | zeer veel doubletten, dood |
| <i>Tellimya ferruginosa</i> (Montagu, 1803) | |
| <i>Venericardia sulcata serrulata</i> (Deshayes, 1858) | |
| <i>Venericardia</i> cf. <i>laekenensis</i> Glibert, 1936 | |
| <i>Cardita</i> cf. <i>rugifera</i> (Cossmann, 1887) | |
| <i>Astarte incerta</i> Wood, 1835 | |
| <i>Tridonta montagui</i> (Dillwyn, 1817) | |
| <i>Musculus tumidus</i> (Hanley, 1843) | |
| <i>Musculus costatus</i> | |
| * <i>Cerastoderma edule</i> (L., 1758) | levende exx. langs gans de kust |
| <i>Parvicardium exiguum</i> (Gmelin, 1791) | |
| <i>Plagiocardium papillosum</i> (Poli, 1795) | |
| <i>Spaerocarium paucicostatum</i> (Sowerby, 1839) | |
| <i>Mactra corallina cinerea</i> Montagu, 1803 | |
| * <i>Spisula elliptica</i> (Brown, 1827) | verse dode doubletten, één met vleesresten |
| * <i>Spisula solida</i> (L., 1758) | levende en dode doubletten langs de ganse kust. |
| * <i>Spisula subtruncata</i> (da Costa, 1778) | |

* <i>Spisula subtruncata triangulata</i> (Wood, 1857)	veel levende en dode doubletten langs de ganse kust
* <i>Angulus fabulus</i> (Gmeling, 1791)	veel dode doubletten langs gans de kust
<i>Angulus pygmaeus</i> (Loven, 1846)	
<i>Gastrana fragilis</i> (L., 1758)	
* <i>Macoma balthica</i> (L., 1758)	veel levende doubletten langs gans de kust
* <i>Alba alba</i> (Wood, 1802)	veel vers dode doubletten langs de ganse kust
<i>Petalocardia pectinifera</i> (Sowerby, 1823)	
<i>Corbicula fluminalis</i> (Müller, 1774)	
<i>Venerupis decussata</i> (L., 1758)	
<i>Venerupis aurea senescens</i> (Cocconi, 1873)	
?* <i>Chamelea gallina striatula</i> (da Costa, 1778)	3 doubletten
<i>Corbula gibba</i> (Olivi, 1792)	
<i>Corbula brabantica</i> Vincent, 1922	
<i>Hiatella arctica</i> (L., 1758)	
<i>Turneria jeffreysi</i> (Winckworth, 1930)	
<i>Pholas dactylus</i> (L., 1758)	
KLASSE SCAPHOPODA	
<i>Dentalium entalis</i> L., 1758	
<i>Dentalium vulgare</i> (da Costa, 1778)	
KLASSE GASTROPODA	
<i>Emarginula elongata</i> (da Costa, 1828)	
<i>Puncturella noachina</i> L.; 1771	
<i>Diadora apertura</i> (Montagu, 1803)	
<i>Acmaea virginea</i> (Müller, 1776)	
<i>Jujubinus exasperatus</i> (Pennant, 1777)	
<i>Gibbula tumida</i> (Montagu, 1803)	
<i>Gibbula cineraria</i> (L., 1758)	
<i>Calliostoma zizyphium</i> (L., 1758)	
<i>Calliostoma zizyphium simile</i> (Sowerby, 1818)	
<i>Circulus striatus</i> (Philippi, 1836)	
<i>Lacuna vineta</i> (Montagu, 1803)	
<i>Hydrobia stagnorum</i> (Gmelin, 1790)	
* <i>Peringia ulvae</i> (Pennant, 1777)	zeer veel voorkomend in gruis langs de ganse kust
<i>Alvania cancellata</i> (da Costa, 1778)	
* <i>Alvania lactea</i> (Michaud, 1830)	zeer veel voorkomend in gruis langs de ganse kust
<i>Alvania carinata</i> (da Costa, 1778)	
<i>Cingula semicostata semicostata</i> (Montagu, 1803)	
<i>Rissoa membranacea</i> (Adams, 1800)	
<i>Turboella parva parva</i> (da Costa, 1778)	
* <i>Tornus subcarinatus</i> (Montagu, 1803)	vrij regelmatig voorkomend in gruis langs de ganse kust

<i>Omalaxis serratus</i> (Deshayes, 1832)	
<i>Capulus ungaricus</i> (L., 1758)	
* <i>Crepidula fornicata</i> (L., 1758)	reeds levend gevonden te Blankenberge na storm
<i>Velutina velutina</i> (Müller, 1776)	
<i>Trivia monacha</i> (da Costa, 1778)	
<i>Euspira poliana</i> (Della Chiaje, 1830)	8 levende exx. reeds vermeld in Strandvlo 5(1)
<i>Trophonopsis truncatus</i> (Ström, 1768)	
* <i>Nucella lapillus lapillus</i> (L., 1758)	voorkomend langs ganse kust, dood
<i>Nucella lapillus incrassatus</i> (Sowerby, 1825)	
<i>Buccinum undatum</i> L., 1758	
<i>Chauvetia minima</i> (Montagu, 1803)	
<i>Pisania exigua</i> (Dujardin, 1837)	
<i>Colus curtus</i> (Jeffreys, 1867)	
* <i>Hinia reticulata</i> (L., 1758)	reeds levend gevonden te Oostduinkerke, vermeld in Strandvlo 5(1)
<i>Hinia incrassata</i> (Ström, 1768)	
<i>Hinia pygmaea</i> (Lamarck, 1822)	
<i>Hinia consociata</i> (Wood, 1848)	
<i>Amyclina labiosa</i> (Sowerby, 1824)	
<i>Turritella incrassata</i> (Sowerby, 1824)	
<i>Turritella tricarinata tricarinata</i> (Brocchi, 1814)	
<i>Turritella solanderi</i> (Mayer, 1877)	
* <i>Caecum glabrum</i> (Montagu, 1803)	zeer veel voorkomend langs de ganse kust in gruis; 1 ex. dood maar met operculum
<i>Eulima glabra</i> (da Costa, 1778)	
<i>Potamidus tricinctus</i> (Brocchi, 1814)	
* <i>Bittium reticulatum</i> (da Costa, 1778)	
<i>Potamidus tricinctus</i> (Brocchi, 1814)	
* <i>Bittium reticulatum</i> (da Costa, 1778)	
<i>Cerithiopsis tubercularis</i> (Montagu, 1803)	
<i>Epitonium clathrus</i> (L., 1758)	
<i>Epitonium clathratulum clathratulum</i> (Kanmacher, 1798)	
<i>Melanella alba</i> (da Costa, 1788)	
<i>Melanella</i> cf. <i>semiosa</i> (Sacchi)	
<i>Mangelia costulata smithi</i> (Forbes, 1840)	
<i>Mangelia substriolata</i> (Harmer, 1918)	
? <i>Mangelia keefingi</i> (Etheridge & Bell, 1898)	
<i>Oenopota trevellingi</i> (Turton, 1834)	
* <i>Oenopota turricula</i> (Montagu, 1803)	zeer vers dood ex. in netten van vissers te Oostduinkerke : zie Strandvlo 5(1)
<i>Chrysallida</i> cf. <i>indistincta</i> (Montagu, 1808)	
<i>Chrysallida spiralis</i> (Montagu, 1808)	
* <i>Chrysallida sarsi</i> (Nordsieck)	nog vers uitzicht

Odostomia plicata (Montagu, 1803)
Acteon tornatilis (L., 1758)
Roxania semistriata (Deshayes,
1824)
Philine aperta (L., 1767)
Retusa umbilicalis (Montagu, 1803)
Retusa obtusa (Montagu, 1803)
Retusa truncatula Bruguière, 1792
**Ovatella myosotis* (Draparnaud, vers uitzicht
1801)
Turbonilla rufa (Philippi, 1836)
Turbonilla elegantissima (Montagu,
1803)

Documentnaam : 8504-135-138.doc