
NOTE SUR L'ABONDANCE D'*AEOLIDIA PAPILLOSA* (LINNAEUS, 1758) A HEIST EN FÉVRIER 1988.

C. D'UDEKEM D'ACQZ

BACKELJAU (1986) considère la présence du Nudibranche *Aeolidia papillosa* comme incertaine en Belgique. DUMOULIN (1987) et RAPPÉ (1987) ont ensuite montrés que l'espèce avait plusieurs fois été signalée de la côte belge (l'un des signalements antérieurs (ENEMAN, 1985) est basé sur un exemplaire récolté par moi-même).

Les observations relatées ici montrent que l'espèce peut même y être localement et temporairement abondante. Le 20-II-1988, jour de marée exceptionnellement basse, je suis allé prospecter les rochers qui bordent le côté oriental de la jetée est du port de Zeebrugge à Heist (on notera en passant que cette zone abrite une faune très diversifiée pour les normes de la côte belge). Là, j'ai eu la surprise de découvrir pas moins de 17 exemplaires d'*A. papillosa*, mesurant tous environ 50 mm. D'après SWENNEN & DEKKER (1987) *A. papillosa* se nourrit d'anémones de mer, surtout de *Metridium senile* (LINNAEUS) et plus accessoirement d'*Urticina felina* (LINNAEUS) et d'*Actinia equina* (LINNAEUS). De fait, dans la zone où les *A. papillosa* ont été récoltées, les deux premières actines citées abondaient.

Quelques exemplaires d'*A. papillosa* ont été déposés dans les collections de l'IRSNB (Bruxelles).

Bibliographie.

- BACKELJAU, T., 1986. Lijst van de recente mariene mollusken van België.- Studiedocumenten K. Belg. Inst. Natuurwet., 29: 1-106.
DUMOULIN, E., 1987. Boekbespreking.- De Strandvlo, 7(1): 34-39.
ENEMAN, E., 1985. Uit het Natuurhistorisch Archief.- De Strandvlo, 5(1): 3-7.
RAPPÉ, G., 1987. Boekbespreking.- De Strandvlo, 7(1): 40-44.
SWENNEN, C. & R. DEKKER, 1987. De Nederlandse Zeenaaktslakken.- Wet. Meded. K.N.N.V., 183: 1-52.

Avenue du bois des collines, 34
1420 Braine l'Alleud