


Een vondst van *Candelabrum cocksi* (Cocks) in Bretagne.

Marco Faasse

Het raadsel uit de vorige De Strandvlo (Faasse, 1994) is opgelost door C. d'Udekem d'Acoz (waarvoor dank). Het wormachtige dier is een hydropoliep met een sterk afwijkende lichaamsvorm. De tentakels, 200 of meer, zijn verspreid over het gehele bovenste deel van het lichaam. De langere uitsteeksels op het onderste deel van het lichaam dragen de gonophoren. Daaruit komen larven, die lopen op hun 15-20 lange tentakels.

Over de gewoonten van het dier is weinig bekend. Het is vooral in het Zuidwesten van Engeland waargenomen onder stenen en wieren vanaf het niveau van zeer lage springtijden tot 3000 m. diep.



Candelabrum phrygium

Naar Hayward & Ryland (1990)

Candelabrum phrygium (fig. 1.) is gekend van dieper water en wordt veelal als een aparte soort beschouwd. Alle bovenstaande informatie is ontleend aan Hayward & Ryland (1990).

De soort werd op twee plaatsen in Zuid-Bretagne waargenomen. Eén ervan werd niet genoteerd. De andere is Beg en Aod op het schiereiland Quiberon. Datum : 26 maart 1994. Ook dient nog vermeld te worden dat het bovenste deel van het lichaam roodachtig kan zijn, maar ook gespikkeld. Hayward & Ryland (1990) beelden het basale deel af met enkele korte uitsteeksels voor de verankering; de exemplaren van Bretagne hadden één enkele langgerekte stam voor de bevestiging aan het substraat.

Literatuur

Faasse, M., 1994. Raadsel. De strandvlo 14(4) : 138.

Hayward, P.J. & J. S. Ryland, 1990. The Marine Fauna of the British Isles and Northwest Europe, vol. 1. Oxford University Press, XVI + 626 p.

Schorerstraat 14
4341 GN Arnemuiden - Nederland