

---

## WAARNEMINGEN AANGAANDE DE TARBOT SCOPHTHALMUS MAXIMUS (LINNAEUS, 1758).

---

H. VAN DEN HEUVEL

Op 28 juli 1988 ving ik te Wenduine met de garnaalkor een uitzonderlijk wit exemplaar van de Tarbot *Scophthalmus maximus*. De vis mat 110 mm en was slechts gepigmenteerd op volgende gedeelten van het lichaam: rond de ogen en in een boog naar het uiteinde van de bovenkaak. Lichte pigmentering op de linker borstvin. Gepigmenteerd op de rugvin, anaalvin en staart. Verder een vlek van  $\pm 4$  mm diameter op de zijlijn en een oranje vlek met zwarte stip bij de anaalvin. Vóór het staarteinde een licht gepigmenteerde ring.

Ik plaatste het dier in mijn zeeaquarium en kon het gedurende een periode van twee jaar in leven houden en observeren. Onderstaande waarnemingen, vnl. met betrekking tot de geleidelijk toenemende pigmentering van de vis kon ik noteren:

- pas 4 weken nadat het dier werd gevangen zag ik het voor het eerst een levende grondel *Pomatoschistus* sp. opeten. Vanaf 4-IX-1988 voederde ik de Tarbot met diepgevroren voedsel.
- 23-X-1988: de pigmentering vóór het staarteinde is toegenomen en verspreid over het dorsale gedeelte van het lichaam verschijnen er meerdere vlekjes (fig. 1).
- 18-I-1989: de pigmentering neemt toe op de kop en de achterste helft van de rug (fig. 2).
- 4-VI-1989: de pigmentering neemt nog toe. Van de normaal volledig gepigmenteerde bovenzijde blijft nu nog wit: een strook langs de rugvin lopende van de kop tot halfweg de rug, en langs de anaalvin lopende van de mond tot halfweg de buik (fig. 3).
- 23-VII-1990: de vis is gestorven.

### NASCHRIFT.

Op 25-IX-1989 ving ik te Wenduine nog een kleine Tarbot (28 mm) die zowel aan de boven- als onderzijde vrijwel geheel wit was.




Fig. 1.



Fig. 2.

Enkel rond de ogen, op de linker borstvin, rugvin, anaalvin en staart was enige pigmentering aanwezig.

Lode de Boninghestraat, 9  
2170 Merksem




Fig. 3.