

Verslag van de strandexcursie van 5 mei 1993 tussen Klemskerke (Vosseslag) en De Haan.

F. Kerckhof

Met zijn zessen troffen we elkaar op het strand van Klemskerke Vosseslag. Er stond een harde tot stormachtige zuidwesten wind. Gelukkig was het anders mooi, zonnig weer zodat het toch vrij aangenaam was om te zoeken. Om te verhinderen dat we zouden "gezandstraald" worden zoals iemand treffend opmerkte, liepen we met de wind mee. We zochten dus het strand af van Vosseslag tot De Haan. We deden er zo'n drie uur over, een bewijs dat het toch wel de moeite was.

Op het strand liggen daar die typische ronde "worsten", loodrecht op de kust. Die fungeren als golfbrekers en dienen om het zand vast te houden. Het strand tussen Vosseslag en De Haan is inderdaad sterk onderhevig aan erosie. Of het allemaal veel zal helpen is nog de vraag. Ook wordt er zand opgevoerd van uit zee. Verder bestaat het strand er uit systemen van progressief bloot komende zandbanken evenwijdig aan de kust met zwinnen daartussen.

De vloedlijn was, u raadt het al, ondergestoven. We zochten dan ook voornamelijk in het aanspoelsel van de zogenaamde achterzwinlijnen. Daar zat heel wat schelpmateriaal tussen. Om te beginnen zeer veel Nonnetjes, mooi gekleurde juvenielen en volwassen individuen, velen nog met dier. Het Nonnetje kende een goed jaar en was al een tijdje langs de Middenkust overal dominant aanwezig in 't aanspoelsel. Natuurlijk ook veel Amerikaanse Zwaardscheden, lege doubletten maar wel vers. De Halfgeknotte Strandschelp was minder talrijk. Toch vonden we regelmatig verse doubletten en ook enkele levende dieren. Verder nog

enkele verse doubletten van het Zaagje, de Rechtsge-streeppte Platschelp en de Witte Dunschaal; ook 1 enkel leeg doublet van de Kokkel. Kleppen van al die soorten waren natuurlijk heel algemeen. Dit gold ook voor de Witte- en Amerikaanse Boormossel. Van de laatste soort vonden we regelmatig lege doubletten. Van de Witte Boormossel zagen we opvallend veel jonge kleppen en ook het derde schelpstuk lag zo nu en dan in de schelpenbanken. Beide boormossel-soorten leven in de turfbanken iets verder uit de kust.

In het schelpenslag van de gruisbanken verder nog een keur van allerlei horentjes al dan niet recent; o.a. veel Wenteltrapjes, enkele mooie Witte Wenteltrapjes, veel Tepelhorentjes, Fuikhorens en zelfs enkele Trapgevels en Koffieboontjes. Waarschijnlijk zijn die grotendeels afkomstig uit het zand van de zandsuppleties. Ook van de zandopspuitingen afkomstig waren de kleppen van de Melkwitte Arkschelp en de talrijke Zeeboontjes.

Naast het zoeken in het aanspoelsel visten we ook in de zwinnen tussen de zandbanken. Dit leverde enkele kwalletjes op. Het Zeedruifje (niet zo algemeen) en het hydroidpoliep-kwalletje *Eutorina indicans*. Deze laatste was zoals elk jaar in de lente te vinden, maar dit jaar is ze nu al een hele tijd erg algemeen. De kwalletjes waren ook aangespoeld te vinden. Dan drogen ze heel snel uit en blijft alleen een dun vliesje over, dat vrijwel niet opvalt. Aangespoeld ook enkele Oorkwallen en 1 kleine Blauwe Haarkwal. Marie-Thérèse had daags voordien ook al een exemplaar van deze laatste kwal aan de Westkust gevonden. Het schepnet van Cédric leverde verder enkele juveniele visjes op, o.a. een Zandspiering en jonge levende Breedpootkrabbetjes naast natuurlijk de onvermijdelijke Garnalen en levende Grijze Heremietkreeftjes *Diogenes pugilator*. Talrijke exemplaren scharrelden bovendien rond in de zwinnen en in de branding van de laagwaterlijn. In het aanspoelsel vielen bovendien de vervellingen op. Het ziet er naar uit dat de Grijze Heremietkreeft een blijvertje is geworden langs onze kust!

In het aanspoelsel verder talrijke vervellingen van het Breedpootkrabbetje. Bij nader toezien waren het bijna allemaal mannetjes. Het is inderdaad dikwijls zo dat eerst de mannetjes vervellen en later pas de vrouwtjes. We vonden toch enkele dode vrouwtjes en ook een klein nog levend exemplaar met eitjes. Van krabben vonden we een schild van de Helmkrab. Deze niet alledaagse soort werd de afgelopen periode opvallend meer gemeld dan anders.

Tenslotte vonden we nog enkele losse eierslierten van pijlinkvissen *Loligo* sp., naast een grote tros. Eieren van pijlinktvissen waren dit jaar talrijker dan anders. En om bij de legsels te blijven, we zagen ook eikapseltjes van de Gevlochten Fuikhoren. En dan zou ik nog vergeten dat er in het aanspoelsel nog enkele levende Goudkammetjes lagen. Misschien een teken dat de soort terug algemener gaat worden? Inderdaad, waar is de tijd dat je soms miljoenen Goudkammetjes kon vinden.

Inspectie van de "worsten" leverde niet veel speciaals op: Darmwier, Zeepokken, enkele Gewone Alikruiken en soms dikke lagen van een kokerbewonende borstelworm, *Polydora ciliata*. Die verstikte dan de andere organismen onder zijn slibbige kokers.

Samenvattend; een vruchtbare excursie die ons een goed beeld gaf van de typische fauna van een zandstrand, naast enkele voor de tijd van het jaar te verwachten vondsten.

Muscarstraat, 14
8400 Oostende