

Literatuur.

ENTROP, B., 1972. Schelpen vinden en herkennen.- Zutphen: Thieme, 320 p.

VANHAELLEN, M.-Th., 1992. De Gevlochten Fuikhoren *Nassarius reticulatus* (L., 1758) weer vers op het strand van De Panne en Koksijde.- De Strandvlo, 12(4): 113-114.

M.-Th. Vanhaelen

**Nouvelles observations de *Hydrobia ulvae* (PENNANT, 1777) à Heist.**

36158

Au début des années 80, le gastéropode prosobranch *Hydrobia ulvae* formait une petite population le long de la jetée orientale du port de Zeebrugge (DUMOULIN, 1990). Ces individus étaient associés à l'algue *Enteromorpha torta* et pouvaient atteindre une densité de quelques dizaines d'exemplaires par m<sup>2</sup>. En été 1989 et au printemps de 1990, l'espèce n'a plus été observée vivante (DUMOULIN, 1990; observations personnelles).

Des prospections récentes ont permis la capture de nouveaux individus vivants (8-II-1993, quelques ex., vase des hauts niveaux; 5-VIII-1993, quelques ex. à la base des touffes de *Suaeda maritima*). Il est possible que l'espèce n'aie pas complètement disparu en 1989-90 mais se soit temporairement fortement raréfiée.

## Bibliographie.

DUMOULIN, E., 1990. De brakwatermollusken van België: autecologie en verspreiding.- De Strandvlo, 10(2): 26-69.

C. d'Udekem d'Acoz

### Aanspoelen van schelpen van de Sierlijke Zeekat *Sepia elegans* (d'ORBIGNY, 1826).

36160

Deze korte bijdrage is een aanvulling op het eerder in dit nummer geschreven artikel van N. Severijns & S. Gilles over *Sepia elegans*.

Op 28 augustus 1993, na een nacht stormachtige noordenwind, vond ik 's namiddags bij afnemend tij in de vloedlijn bij Duinpark (Oostduinkerke, richting Nieuwpoort) 4 niet al te verse schelpen van *S. elegans*. De schelpen maten respectievelijk 5; 5,5; 5,5 en 6 cm. Twee exemplaren waren nog intact met aan de achterrand van de dorsale zijde het karakteristieke lengte-kammetje en de scherp afgetekende grote roze rugvlek. Buik- en rugzijde vertoonden een groene aanslag, veroorzaakt door begroeiing met *Enteromorpha* sp. De poreuze buikzijde van de ex. waren bezet met puntige, driehoekige en lijnvormige snavelinslag. De 4 schelpen werden verzameld over een afstand van nauwelijks 200 m. Op dit strandgedeelte lagen een 50-tal grote Riemwieren, sommige tot 2 cm breed; 10-tallen dikke bossen Blaaswier; enkele verse Knotswieren en opmerkelijk veel Darmwier.

Op 20 september 1993 vond ik eveneens schilden van de Sierlijke Zeekat te Hardelot (halverwege Bou-