

Die kluwens leverden wel wat aardigheidjes op. Van poliepjes bleken er in te zitten: zeespriet, -don, -cypres, gekromde -borstel, -pluim (Aglaophenia pluma) op een hauwtje van hauw-
wier, Laomedea longissima, Eudendrium spec. Er bleken ook wat roodwiertjes in verstrengeld: Gracilaria verrucosa, Co-
rallina officinalis, Plocamium coccineum, iers mos (Chondrus
crispus) waarop het mosdiertje Electra pilosa, Griffithsia
flosculosa, Phyllophora epiphylla, deze laatste twee gedeter-
mineerd door Martine Meert. Ik heb ook nog wat spulletjes
vergeten uit de vloedlijn: geweisspons (Haliciona oculata),
ruwe zeerasp op wulk en tepelhoren o.a., zeevinger (Alcyoni-
dium cf. gelatinosum), bladachtig hooiwier (Flustra folia-
cea), Membranipora membranacea en, net als vorig jaar, een
stuk parasteen, groot 39,75 mm.

Guido

67410

Het weekendje in 't Zwin, 19 en 20 maart.

Het z'n zessen (van de afdelinger Gent, Oostende en Heist, waar bleef Blankenberge????) moesten we dit weekend maken. Het laagtij was erg vroeg, zodat we eigenlijk wel te laat wa-
ren begonnen met kruien. Daar de lichaamslengte van de deel-
nemers toen ter plaatse enigszins een beperkende factor was,
word Erwina geslachtofferd het drie meter brede net te helpen
sleuren. De lezer dient nu niet zijn fantasie de vrije loop
te laten gaan wat betreft Erwina's maten. Om alle dubbelzin-
nigheden weg te nemen, wil ik benadrukken dat ik het heb over
lengte en pk. Met twee 'waterdichte' pakken stevenden we
door de schuimende golven. Dat schuim was overigens niet wit,
maar bruin, door de enorme hoeveelheid slib. De zeebodem
was ook zalig zacht, zodat we monigmaal het net mochten uit-
graven. In de eerste sleep zat een tong (Solea solea) of zes,
pladijs (Pleuronectes platessa), meun (Ciliata mustelus), gar-
naal (Crangon crangon) uiteraard, maar niet voldoende voor een
maaltijd, een fluwelen zwomkrab (Macroipus puber) zonder schild,
enkele kamkwalletjes (Pleurobranchia pileus) en strandkrabben
(Carcinus maenas), 11 m., 11 vr. zonder en 4 vr. met eieren.
1 ex. was geparasiteerd door een krabbezakje (Sacculina carcini).
Bij de 2e sleep haalden we het net, dat overigens zijn beste
tijd gekend had, zo lelijk open aan een roeste prikkeldraad,
anno 40-45, dat we wel een kruis konden maken over ons kruien.
Enkele mensen hadden wat op de gb 31 geneusd en noemden de
geschubde zeerups (Lepidonotus squamatus) talrijk. Verder mel-
den ze nog Nereis diversicolor, 2 noordzeekrabben (Cancer pa-
gurus), van resp. 119,9 en 61,4 mm. Erg laag was het water nog
niet, 't was pas springtij de maandag. 's Namiddags, bij hoog
water, gingen we wandelen in het vogelreservaat. Het water
was zo diep, de stroming zo sterk en de grachten zo breed dat
er voor sommigen nattigheid en voor een enkeling zelfs een fles
wijn mee te verdienen viel. Er lagen ook nogal wat doden, o.a.
een ooievaar, die fel gegeerd werd door een deelneemster voor
een vriend van haar die in schedels doet. Zorg maar dat je er
zelf het hoofd niet bij verliest. Andere lijken waren dat van
een koperviek, ekster, adult en juv. silvermeeuw en een schou-
dergordel, van een juv. drieteenmeeuw. Deens lepelblad stond
in bloei. We keerden langs het strand terug en noteerden pen-
horen (Turritella communis) en lange muschelkoker (Mytilus).

deri), wadslakje (*Hydrobia ulvae*), wenteltrap (*Epitonium clathrus*), enkele schilden van de gewone zwemkrab (*Macropipus holsatus*) en een horsmakreel (*Trachurus trachurus*) van 34 cm. Het laatste eind liepen we weer door 't Zwin. Vanop de dijk konden we in de kokmeeuwenkolonie mooi het koppeltje zwartkopmeeuwen bewonderen. In totaal schatten we het aantal bergeenden op 250. Dit voor de conservator die ons vroeg die beesten eens te tellen. 's Avonds gingen we op audiëntie bij ouwe sok en swger Luc van Rillaer. Hij heeft nl. een ferme kollektie schelpen en ook nog ander zeespul. D'er zaten enkele dingetjes tussen die men niet alle dagen te zien krijgt, o.a. twee kleine soorten zwemkrabben, *Macropipus pusillus* en *M. marmoreus*, en *Astacilla spec.*, een bizarre isopood, om van de schelpen nog te zwijgen. De zondagvoormiddag probeerden we nog wat te vissen met een kleiner steeknetje en we haalden er waarachtig een smalle zee-pissebed (*Idotea linearis*) mee boven. Ook tarbot (*Scophthalmus maximus*) is 't vermelden waard. Op gb 31 zeeanjer (*Metridium senile*), gorgelpijpje (*Tubularia larynx*), noordzeekrab en zeedraad spec. (*Laomedea spec.*). Op 30 vonden we, na lang zoeken, aan de oostkant nog 1 schaalhoren (*Patella vulgata*). Ook opnieuw noordzeekrab en een soort buiswier (*Polysiphonia spec.*). Dat was het. Volgende keer hopelijk meer volk.

Guido

67412

KWALLENPROEF.

In de vorige Tuimelaar verscheen een oproep i.v.m. kwal-
lenwaarnemingen. Daar wilde ik nog even op terugkomen.

We zullen nl. proberen dit jaar, aan de hand van zoveel
mogelijk waarnemingen, min of meer een overzicht te krijgen
van de massale aanspoelingen, die de strandwandelaars onder
ons allicht bekend zijn, maar ook van de doolie enkeling die
je vindt.

Rond welke tijd spoelen ze aan ? Wat voor soort ? enz...

Om 't jullie gemakkelijk te maken laat ik de stoet nog
eens passeren.

Erg algemeen is de oorkwal (*Aurelia aurita*), die vrij-
wel altijd makkelijk herkend kan worden aan de 4, veelal
witte, oorvormige gonaden (voortplantingsorganen). Aan de
onderzijde bevinden zich 4 mondlappen, waartussen de mond-
opening zit.

Een kwal die eveneens makkelijk herkenbaar is, is de
kompaskwal (*Chrysaora hyoscilla*). Op het scherm heeft ie
nl. 24 bruine driehoekige tekeningen (in de vorm van een
kompasroos) en de gelobde rand draagt ook nog eens vlek-
ken van dezelfde kleur.