

1. De winter blijft zeer zacht, heel wat noordelijke broedvogels blijven nog wat ter plaatse pleisteren. Toch is het Zwin nu reeds een belangrijke pleisterplaats voor heel wat vogels, vooral als slaappleats : zo bvb. heel wat wilde ganzen (verscheidene soorten), wulpen, eenden, meeuwen enz. De aankomst van heel wat van deze vogels naar de slaappleats kan men mooi observeren als men plaats neemt op de dijk, enkele tientallen meters ten Noorden van het Chalet, dit tussen 16.30 en 17.30 u. Benevens de mooie melancholische roep van heel wat vogels kan men er eveneens genieten van een enigmooi en wild, ongerept landschap. Op dit uur gaan ook de ransuil en de velduil op jacht.
2. Precies op de hoogwaterlijn van hoge springvloed en storm kan men nu, zowat overal in het reservaat honderden zangvogeltjes observeren : vinken (*Fringilla coelebs*), kepen (*Fringilla montifringilla*), veldleeuweriken (*Alauda arvensis*), grauwe gorzen (*Emberiza calandra*), sneeuwgorzen (*Plectrophenax nivalis*), strandleeuweriken (*Eremophila alpestris*) en nu en dan zelfs een ijsgors (*Calcarius lapponicus*). Tussen het lamsoor ziet men overal groepjes fraters (*Carduelis flavirostris*), kneutjes (*Carduelis cannabina*) en ringmussen (*Passer montanus*). Langs de kreekjes en grachtjes zijn er momenteel heel wat oeverpiepers te zien (*Anthus spinoletta littoralis*). Tussen het biestarwegras ziet men geregeld enkele velduilen (*Asio flammeus*), die hier overwinteren.
3. Op de vijvers in het reservaat verblijven enkele kleine zwanen (*Cygnus bewickii*), een aalscholver (*Phalacrocorax carbo*), bergeenden (*Tadorna tadorna*), verscheidene eenden en talingen. Regelmatig ziet men er ook dodaarsjes (*Podiceps cristatus*), een duiker, een brilduiker (*Bucephala clangula*), een zeeëend of een zaagbek.
4. Elk jaar worden door het Biologisch Station "Het Zwin" enkele duizenden vogels geringd. Onlangs ontvingen we een fantastische terugmelding : een bontbekplevier (*Charadrius hiaticula*), in het Zwin geringd op 3 mei 1971 werd op 26 juni uit GOTHAVN teruggemeld ; dit is gelegen op de westkust van GROENLAND, net voor Canada, 70° NB en 54° OL. Dit betreft waarschijnlijk de eerste terugmelding van een Europese bontbekpluvier op Groenland. Op 23 XI 1971 ringden we een PALLAS' BOSZANGER (*Phylloscopus proregulus*). Dit betreft de eerste vangst in België van deze Siberische broedvogel.
5. Door het zachte weer kunnen we hier nog heel wat overwinterende steltloper-tjes waarnemen : wulpen (*Numenius arquata*), kieviten (*Vanellus vanellus*), goudpluvieren (*Pluvialis apricarius*), zilverpluvieren (*Pluvialis squatarola*), kemphanen (*Philomachus pugnax*), tureluurs (*Tringa totanus*), zwarte ruiters (*Tringa erythropus*), bonte strandlopers (*Calidris alpina*), paarse - (*Calidris maritima*) en drie-teenstrandlopers (*Calidris alba*), steenlopers (*Arenaria interpres*) en scholeksters (*Haematopus ostralegus*).
6. Van de hand van Graaf Léon Lippens, in samenwerking met de heer Henri Wille zal binnenkort een "ATLAS VAN DE VOGELS VAN BELGIE EN WEST-EUROPA" verschijnen. Het boek is ter perse en verschijnt rond 1 maart 1972 : 850 bladzijden, geïllustreerd met onder andere 760 verspreidingskaartjes, met aanduiding van aantallen broedparen en broedplaatsen voor ons land. Feitelijk zal het een samenvatting betreffen van de ornithologische kennis, wat België betreft en dit alles gesitueerd in zijn Europees verband. Geïnteresseerde personen kunnen hun naam en adres opgeven, ofwel bij de conservator, ofwel bij de ingang van het reservaat. Binnenkort wordt hen dan een luxueuse prospectus toegestuurd, waarin ze alle gewenste documentatie