INVENTARIO DE LOS MOLUSCOS MARINOS EN LAS COSTAS DEL ESTADO FALCON, VENEZUELA

INVENTORY OF THE MARINE MOLLUSCS ON FALCONSTATE COAST, VENEZUELA

Bitter, Ricardo S¹. y Rafael Martinez E²

- 1. Universidad Francisco de Miranda, Centro de Investigaciones Marinas (CIMAR). Complejo Docente El Hatillo, carretera Morón Coro, La Velade Coro 4131. Falcón Venezuela. Correo -e: rbitter@funflc.org.ve.
- 2. Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias, Instituto de Zoología Tropical, Apartado Postal 47058, Caracas 1041-A, Venezuela.

RESUMEN

La información disponible sobre los moluscos marinos en Venezuela se limita a pocas áreas costeras; la referida al Estado Falcón es deficiente. Este inventario permite tener un conocimiento más amplio de la fauna de moluscos de la región falconiana, y también una colección de referencia para efectos del muestreo. Se efectuó una revisión de los ejemplares recolectados en años anteriores (1979-1984), así como una recolección adicional para efectos de actualización (1988-1998), además se añadió información de especies de moluscos habitantes de Golfo Triste. En total se consideran 60 Localidades de la costa. Basándose en la identificación del material existente, se efectuó una revisión de la identificación taxonómica de las especies así como un registro fotográfico de las mismas. Con la información obtenida se procedió a claborar una base de datos y se catalogaron las especies con base a familias. Los moluscos recolectados se agrupan en cinco clases: Gastropoda, Bivalvia, Cephalopoda, Scaphopoda y Polyplacophora. Se señalan 314 especies, distribuidas en 189 géneros y 93 familias. Las clases Gastropoda y Bivalvia, abarcan más del 95% de los taxa representados. La fauna malacológica del Estado Falcón muestra una distribución relacionada directamente con la accidentada morfología costera e influencia fluvial.

ABSTRACT

Available information on Venezuela marine molluses is limited to few sites. In particular, the information related to Falcon State Coast is deficient. An inventory allows a better knowledge on marine invertebrates and to have a reference collection as well. A revision of the specimens gathered in previous years (1979-1984) was made and an additional collection to update the inventory (1988-1998); besides, it was added information of species of molluses inhabiting Golfo Triste. In total, 60 localities of the coast are considered. Based on the identification of the existent material, a revision of the taxonomy of the species and the photographic record was made. With the obtained information, it was proceeded to elaborate a data bae. The species were classified taking into consideration the families. Colected specimens comprised in five classes: Gastropoda, Bivalvia, Cephalopoda, Scaphopoda and Polyplacophora containing 314 species distributed in 189 genus and 93 families. Gastropods and Bivalvia classes comprise more than 95% of the reported taxa. The malacological fauna of Falcon State shows a related distribution directly with the morphology of the coast and the fluvial influence.

Palabras clave: Fauna malacológica marina, Colección de referencia, Gastropoda, Bivalvia, Estado Falcón. **Keywords**: Marine malacological fauna, Reference collection, Gastropoda, Bivalvia, Falcón State

INTRODUCCION

En Venezuela se han realizado estudios taxonómicos y ecológicos sobre algunos grupos de invertebrados marinos, entre ellos los moluscos (Beaperthuy, 1967; Flores, 1966, 1968; Tello, 1975; Martínez y Almeida, 1976; Bitter, 1978; Princz, 1973, 1978; Penchaszadeh y Col., 1979, 1983; Flores y Col., 1980; Ewald y Col., 1981; Guerra, 1983; Penchaszadeh y Salaya, 1985; Vera y Martínez, 1990; Cipriani y Col., 1994; Martínez y Ruíz, 1994; Ramos y Robaina, 1994). Knorr, (1678) refiere por vez primera los gastrópodos marinos de Venezuela, citando a la especie Cypraea mus en su obra: Les delices des yeux et l'espirit, parte de la Collection Generale de Coquillages. Esta especie es citada más tarde por otros autores: Martinez et al., en 1679, Born en 1780 y Schuvetter en 1783 (Citados por Princz, 1980).

Hasta el presente no se disponía de estudios taxonómicos exhaustivos referidos a moluscos en las costas del Estado Falcón, segundo estado con mayor extensión costera en Venezuela, lo cual constituye una evidencia de lo poca información publicada sobre el particular biogeográfico en los mares de Venezuela e islas relacionadas (Princz, 1980).

AREA DE ESTUDIO

Las costas del Estado Falcón fueron muestreadas en 60 Localidades, identificadas en la Tabla l y señaladas en la Figura 1. Están formadas en su mayor parte por litorales arenosos ó areno-fangosos (Carmona y Conde, 1989), cuyas aguas presentan un alto grado de turbidez. De las costas arenosas, las zonas Este y Sureste del Golfete de Coro, presentan el perfil más llano. Dentro de este tipo de costa se encuentran zonas con litoral rocoso, localizadas entre Mangle Lioroso y Mangle LLoroso, pasando por el Cabo San Román en la Pensínsula de Paraguaná. En la zona comprendida entre Punta Macolla y Punta Jacuque, existe un sublitoral de fondo arenoso, safpicado con parchos de substrato duro. Esto último también se encuentra en Punta Prudencio (Golfete de Coro), y a ambos lados del Istmo de Los Médanos.

Según sus características ecofisiográficas (Carmona y Conde, 1989) las mayores extensiones de manglar se encuentran en el Parque Nacional Morrocoy. Existen otras concentraciones de cierta magnitud en el Golfete de Cuare, Chichiriviche, Prudencio y Tacuato (Norte) y Punta Caimán (Sur) en el Golfete de Coro y el manglar que rodea a la Laguna de Tiraya al este de la Península de Paraguaná. Existen otras concentraciones de menor cuantía, ubicadas en Aguide, Boca de Mangle, Boca de Hueque y Boca de Ricoa.

Los campos de *Thalassia testudinum* forman parte importante de las comunidades costeras. Se les encuentra bien desarrolladas en la zona sublitoral del Parque Nacional Morrocoy, formando grandes extensiones; a ellas se encuentran asociadas varias especies de moluscos integrantes de la comunidad bentónica (Bitter, 1988). *Thalassia* crece también en Adícora, El Supí, Buchuaco, Amuay y Mangle Lloroso en la Península de Paraguaná (Carmona y Conde, 1989), así como en la Localidad de Barranquita.

MATERIALES Y METODOS

La costa del Estado Falcón fue muestreada en años anteriores (1979-1984) abarcando los tipos de costa señalados en el punto anterior. Las muestras se obtuvieron mediante colecta manual y por la pesca de arrastre efectuada por barcos en el Golfo de venezuela. La obtención y preservación de los ejemplares se realizó según lo indicado por Lincoln y Sheals (1979) para cada tipo de organismo. Con estos ejemplares se formó una colección de referencia. En 1988 se comenzó la actualización de esta colección existente, y así se ha continuado anualmente. En los ultimos cinco años se ha hecho énfasis en la revisión de la identificación taxonómica de las especies, en el registro fotográfico y la automatización de la base de datos.

En la clasificación taxonómica hasta nivel de especie se siguió a varios autores: Keen (1971), Abbott (1974), Humfrey (1975), Rios (1975, 1985), Abbott y Dance (1982), Vokes y Vokes (1983), Rehder (1990), Díaz y Puyana (1994).




Fig. 1. Distribución de las localidades de muestreo en la costa del Estado Falcón

Tabla 1. Localidades muestreadas en las costas del Estado Falcón

1. Parque Nac. Morrocoy	23. Punta Salina	45. Huesa de Barrancas		
2. Chichiriviche	24. Los Taques	46. Peña Santa Clara		
3. Punta Manatí	25. Villa Marina	47. Baja Baloa		
4. Punta La Piragua	26. Amuay	48. Punta Espada		
5. Punta Uvero	27. Las Piedras	49. Boca de Caño		
6. San José de La Costa	28. Carirubana	50. Golfo de Venezuela		
7. Sauca	29. Punta Cardón	51. Punta Varadero		
8. Boca de Ricoa	30. Punta Gorda	52. Punta Zamuro		
9. Punta Manzanillo	31. El Cayude	53. Punta Sabana		
10. Santa Rosa	32. Cuara	54. Punta Taima-taima		
11. Tucupido	33. Prudencio	55. Puerto Gutiérrez		
12. Ensenada de La Vela	34. Punta Cocuy	56. Punta Capana		
13. Animas de Guasare	35. Punta Caimán	57. Golfete de Coro		
14. Adícora	36. Punta Maragüey	58. Golfo Triste		
15. Tiraya	37. Punta Codore	59.Golfete de Cuare		
16. Punta de Barco	38. Zazárida	60. Parque Nacional Morrocoy		
17. Puerto Escondido	39. El Codo			
18. Cabo San Román	40. Adaro			
19. Punta Macoila	41. El Supí			
20. Punta Jacuque	42. Piedras Negras			
21. El Playón	43. Muaco			
22. Cujisito	44. Guaranao			

RESULTADOS Y DISCUSION

Grupos representados. Con base al análisis de las muestras de moluscos, en las costas del Estado Falcón se encontraron representadas cinco Clases de moluscos, las cuales están ordenadas según su abundancia relativa; las más abundantes resultaron ser las Clases Gastropoda y Bivalvia (Tabla 2), las cuales abarcan el 98 % del total de especies recolectadas. El mayor número de amabas clases fue localizado en los muestreos realizados en la costa occidental de la Península de Paraguaná v en el Golfo de Venezuela. Este hecho correlaciona con la concentración de clorofila detectada a través de fotografías de satélite (Müller-Karger y Col., 1989) y el patrón de circulación de las masas de agua. Del total de especies colectadas, el 78 % de los Gastrópodos y el 87 % de los Bivalvos representan registros nuevos en el listado de especies para el Estado Falcón, en base al catálogo presentado por Tello (1975). Para Venezuela el 26 % de las especies de Gastrópodos representan un registro nuevo, según la lista presentada por Princz (1978). Estos registros nuevos representan una información muy importante en el conocimiento de la biodiversidad, tomando en cuenta que en Venezuela hoy día hay vacios de información en cuanto al conocimiento de nuestra fauna. En la medida que se avance en el grado de conocimiento de las especies de los distintos grupos zoológicos, se podrán implementar planes con fines de conservación y aprovechamiento racional de las especies.

Entre los gastrópodos las familias con mayor número de especies fueron las siguientes: Fissurellidae (I), Neritidae (II) y Muricidae (III) con 8,9 y 10 especies respectívamente. Entre ellas se destacan Fissurella nimbosa (I), Nerita spp. (II) y Murex chrysostomus (III). Entre las familias de bivalvos con mayor número de especies destacan: Pectinidae (I), Tellinidae, Arcidae (II) y Veneridae (III), con 10,10, 13 y 16 especies respectívamente. Entre ellas resaltan Amusium papyraceum y A. laurenti (I), Arca zebra (II) y Chione cancellata, Tivela mactroides y Anomalocardia brasiliana (III). Esta última es utilizada en la alimentación de crustáceos cultivados.

En total, las especies revisadas taxonómicamente constituyen 314 especies, contenidas en 189 géneros y representantes de 93 familias.

Una especie que merece mención especial es *Mactra fragilis*, la cual presenta una variación en sus características morfológicas: a lo largo de la costa oriental del estado, externamente es una concha que hace honor a su nombre, es frágil; en el Golfete de Coro la misma especie presenta una concha gruesa. Este hecho se atribuye a las condiciones ecológicas particulares del lugar, como son: aguas más frias, turbias y someras.

Distribución geográfica de las especies. La realización de la recolecta y revisión taxonómica de los ejemplares de moluscos ha permitido conocer especies nuevas para el Edo. Falcón y el país, am-

Tabla 2. Clases de moluscos representadas en las costas del Estado Falcón

CLASE	Nº FAMILIAS	N° GENEROS	N° ESPECIES
GASTROPODA	54 (58.1)	102 (54.3)	172 (54.8)
BIVALVIA	32 (34.4)	78 (41.8)	133 (42.3)
CEPHALOPODA	4 (4.3)	5 (1.6)	5 (1.6)
POLYPLACOPHORA	1 (1.1)	2 (1.1)	2 (0.6)
SCAPHOPODA	2 (2.2)	2 (1.1)	2 (0.6)
ΤΟΤΑL	93	189	314

pliar el ámbito de distribución de algunas de ellas y ubicar posibles zonas relicto como el Golfete de Coro. En comparación con las especies de moluscos del Caribe Colombiano, se encontró que hay especies compartidas (Provincia Faunística Colombo-Venezolana)(Díaz y Puyana, 1994); entre ellas cabe mencionar al gastrópodo Ancilla glabrata, señalado sólo en la costa occidental de Falcón, particularmente en la Península de Paraguaná.

En el Anexo I se presenta el listado completo de las especies cuya identificación taxonómica fue objeto de revisión, su ubicación taxonómica y su localización geográfica en la costa falconiana, asi como su distribución en Venezuela. Varias de las especies identificadas representan el primer registro para Venezuela y en otros casos, una extensión en el ámbito de distribución en el mundo, como por ejemplo Strygilla pseudocarnaria, la cual aparece señalada como exclusiva de Bahamas y Cuba (Abbott, 1974); también Melongena corona, señalada como exclusiva de la Provincia Faunítica Floridana según Díaz y Puyana (1994).

Entre las especies encontradas cabe mencionar a Donax denticulatus, Tivela mactroides, Arca zebra, Amusium papyraceum y Strombus gigas, como especies con interés comercial. Las especies de moluscos se encuentran también formando parte de las comunidades asociadas a las raíces del mangle rojo (Rhizophora mangle). Las especies señaladas en la Tabla 3 se encuentran principalmente en el Parque Nacional Morrocoy. Isognomon alatus se encuentra ocupando gran parte del espacio primario disponible en las raíces del mangle rojo (Inclan, 1989), formando masas densas, las cuales debido a su peso ocasionan el desprendimiento parcial de la raíz. Esta especie es capaz de invadirraíces en las cuales dominan previamente otras especies, llegando a monopolizar el espacio disponible y generar un sustrato secundario (Alvarez, 1989).

Entre las especies identificadas se encuentran dos que merecen una mención especial: se trata de dos gastrópodos: Babylonia areolata y Haliotis pourtalesii. El género Babylonia se encuentra habitando la costa occidental de Africa (Kilburn y Rippey, 1982) y la segunda especie se destaca por su tamaño pequeño. Su presencia en el Caribe ya habia sido señalada por Martínez y Ruíz (1994). En este caso, se registra presente en el Istmo de los Médanos.

Dos especies de gastrópodos se encontraron en asociación, se trata de *Tectarius muricatus* y *Nodilittorina tuberculata*. Su presencia en la costa fue observada en una zona rocosa (Cabo San Román y Boca de Ricoa) por encima del nivel del mar, concretamente en la parte de salpicadura de la roca.

Tipos de sustrato. Las Familias de moluscos gastrópodos y bivalvos más abundantes, fueron encontradas principalmente sobre: sustrato arenoso (Familias Fissurellidae, Tellinidae y Veneridae), sustrato areno-fangoso (Familia Pectinidae), sustrato areno-fangoso, Thalassia testudinum y algas (Familia Muricidae), sustrato rocoso y dósel de T. testudinum (Familia Neritidae), sustrato arenoso y raíces de Rhizophora mangle.

CONCLUSIONES

La fauna malacológica de las costas del Estado Falcón es diversa, particularmente en algunas zonas específicas como El Parque Nacional Morrocoy, El Golfete de Coro y el Golfete de Cuare, los cuales presentan una diversidad alta debido a la disponibilidad amplia en cuanto a hábitats se refiere, por sus características geomorfológicas y topográficas. Estos sitios pudieran representar zonas relicto en la costa falconiana. La revisión taxonómica de las especies y la implementación de la colección de referencia, apoyan la afirmación inicial de la

Tabla 3. Moluscos asociados a las raíces del mangle rojo (Rhizophora mangle) en el Parque Nacional Morrocoy

Lopho frons	Isognomon alatus	Spondylus americanus	Littorina angulifera
Chama macerophilla	Crassostrea rhizophorae	Lima scabra	Fissurella sp.
Brachidonte exustus	Aequipecten acanthodes	Arca sp.	Pinctada imbricata
Thais haemastoma floridana	Arca zebra	Laevicardium laevigatu	m

información escasa relativa a los moluscos del Edo. Falcón, con base en el porcentaje alto de registros nuevos, tanto para Falcón como para Venezuela.

AGRADECIMIENTOS

A Omegar Céspedes por su apoyo en el trabajo de campo y en el procesamiento de las muestras en el laboratorio. Al Centro de Investigaciones Marinas (CIMAR) de la UNEFM por el financiamiento recibido. Al personal del Departamento de Fotografía del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), por el apoyo en el trabajo de registro fotográfico de las especies de moluscos.

LITERATURA CITADA

ABBOTT, R.T. Y S.P. DANCE

1982. Compendium of Seashells. E.P. Dutton, Inc. New York, p. 411.

ABBOTT, R.T.

1974. American seashells. Van Nostrand Reinhold Company, 2a ed., pp 663.

ALVAREZI., A.

1989. Establecimiento, Desarrollo y Mantenimiento de una Comunidad Epibentónica Tropical. Tesis Doctoral, Facultad de Ciencias, Universidad Central de Venezuela, p 150.

BEAPERTHUY, I.

1967. Los Mytilidos de Venezuela (Moflusca:Bivafvia). Bol. Inst. Oceanogr. Univ. Oriente, 6(1): 1-115.

BITTER S., R.

1988. Análisis Multivariado de la Comunidad Asociada a Thalassia testudinum en el Parque Nacional Morrocoy. Tesis Doctoral, Facultad de Ciencias, Universidad Central de Venezuela, p. 153.

1978. Nicho Trófico de dos Estrellas de Mar (Astropecten riensis y Astropecten ef Articulatus) Integrantes de la Broza en la Pesca de Arrastre de Golfo Triste, Región Centro-Occidental de Venezuela. Trabajo Especial de Grado, Lic. en Biología. Univ. Central de Venezuela, p 84.

CARMONA S., C. Y J.E. CONDE

1989. Caracterización de las Costas del Edo. Falcón. Bol. Inst. Oceanogr. Univ. Oriente, 28(1-2): 127-134.

CIPRIANI, R., S.M. PAULS Y F. LOSADA

1994. Observation s on the egg-capsules of Cerithiopsis flavum (C.B. Adams, 1806). J. Moll Stud., 60: 200-203.

DÍAZ, J. M. Y M. PUYANA

1994. Moluscos del Caribe Colombiano. Un Catálogo ilustrado. Colciencias, Fudación Natura e Invernar (Eds.), Santa Fe de Bogotá, Colombia. p. 291÷ 74 lám.

EWALD, J.J., H. SEVEREYN, R. TURNER Y G. GODOY

 Los Moluscos Bivalvos perforadores (Orden Pholadacea). Su Distribución en Aguas venezolanas. Libro de resúmenes XXXI Convención Anual AsoVAC, p 160.

FLORES, C. Y R. CÁCERES DE TALARICO

1980. El Género Astraea Röding, 1798 (Archeogastropoda:Turbinidae) en las Aguas Costeras de Venezuela. Bol. Inst. Oceanogr. Univ. Oriente, 19(1-2): 59-72.

FLORES, C.

1968. Algunos gastrópodos de las Islas Las Aves, Venezuela y su Distribución. Bol. Inst. Oceanogr. Univ. Oriente, 7(1): 73-106.

1966. La familia Cassididae (Mollusca:Mesograstropoda) en las Costas Nororientales de Venezuela. *Bol. Inst.* Oceanogr. Univ. Oriente, 5(1-2): 7-37.

GUERRA, M.A.

1983. Diversidad y Fauna de Moluscos y Crustáceos Asociados a las Raíces Sumergidas del Mangle Rojo, Rhizophora mangle en la Laguna de La Restinga. Acta Científica Venezolana 34 (Suplemento No. 1): 479.

HUMFREY, M.

1975. Sea Shells of The West Indies. William Collins Sons & Co. LTD Glasgow, p 351.

INCLAN, R.R.

1989. Ecotogía de la Epibiósis en las Raíces inmersas de Rhizophora mangle en Bahía de La Ascensión, Quintana Roo, México. Ciencias Marinas, 15(1): 1-20.

KEEN, M.

 Seashells of Tropical West America. Stanford University Press, p 1064.

KILBURN, R. YE. RIPPEY

1982, Sea Shells of Southern Africa. Macmillan South Africa (Pty) Ltd. (Ed.) Eleason-Mary Cardell. p. 249.

LINCOLN, R.J. Y J. GORDON SHEALS

1979. Invertebrate Animals. Collection and Preservation. Cambridge University Press, p 150.

MARTINEZ E. R. Y P. ALMEIDA

1976. Aspectos biológicos y ecológicos de Mytilopsis sallei

Recluz (Bivalvia_Eulamellibranchia) en áreas adyacentes a la Laguna de Unare (Estado Anzoategui, Venezuela). *Acta Biol. Venez.*, 9(12): 165-193.

MARTINEZ E. R. Y L. RUIZ

1994. Nota acerca de la presencia del gastrópodo *Haliotis* (*Padollus*) *pourtalesii* Dall, 1881 (Archaegastropoda, Pleurotomariacea) en aguas del caribe venezolano. Acta Biol. Venez., 15(1): 63-64.

MÜLER-KARGER, F.E., C.R. MCCALIN, T.R. FISHER, W.E. ESAIAS Y.R. VANELA

1989. Pigement distribution in the caribbean sea: Obervations fron space. *Prog. Oceanogr.*, 23: 23-64.

PENCHASZADEH, P.E. YJ. J. SALAYA

1985. Estructura y Ecología Trófica de las Comunidades Demersales en Golfo Triste, Venezuela. 12: 571-598. En: Recursos Pesqueros Potenciales de México: La Pesca Acompañante del Camarón. A. Yañez-Arancibia (Ed), UNAM, México.

PENCHASZADEH, P.E., R. COLMENARES Y M. LAYRISE

1979. Comunidades Bentónicas del Area de Punta Morón (entre 0 y 10 m de Profundidad). En: P.E. Penchaszadeh (Ed) Ecología del Ambiente Marino Costero de Punta Morón (1era fase): 119-232. Universidad Simón Bolivar, INTECMAR, Caracas.

PENCHASZADEH, P.E., R. COLMENARES Y M. LAYRISE

1983. Comunidades Bentónicas del Area de Punta Morón (entre 0 y 10 m de Prof.) En: P.E. Penchaszadeh (Ed), Ecología del Ambiente Marino Costero de Punta Morón (2a fase): 119-232 Universidad Simón Bolivar, INTECMAR, Caracas.

PRINCZ, D.

1980. Lista y Bibliografia de los Gastrópodos Marinos vivos de los Mares de Venezuela, Trinidad e Islas de Sotavento. Contribucion No. 97 Estacion de Investigaciones Marinas de Margarita.

- 1978. Los Moluscos Marinos del Golfo de Venezuela.

 Mem. Soc. Cien. Nat. La Salle, 38 (109): 151-155.
- 1973. Moluscos Gastrópodos y Pelecipodos del Estado Nueva Esparta. Mem. Soc. Cien. Nat. La Salle, 33(96):169-222.

REHDER, H.A.

1990. The Audubon Society Field Guide to North American Seashells. Alfred Knopp Inc. (Publ.), New York. p. 894.

RAMOS G.I. Y G. ROBAINA

1994. Contribución al conocimiento de los moluscos gastrópodos y pelecípodos de la Bahía de Mochima Edo. Sucre, Venezuela. Mem. Soc. Cien. Nat. La Salle, 54(141): 95-106.

RIOS, E.C.

- 1985. Seashells of Brasil. Fundação Universidade Do Rio Grande, p 328.
- 1975. Brazilian Marine Mollusks Iconography. Fundação Universidade Do Rio Grande, p 331.

TELLO, J.

1975. Catálogo de La Fauna Venezolana. VII Mollusca. Pub. Comisión Organizadora III Conferencia O.N.U. sobre Derecho del Mar, p 599.

VOKES, H.E. Y E.H. VOKES

1983. Distribution of Shallow-water Marine Molluscs, yucatan Peninsula Mexico. Tulane University, p 183.

VERA, B. YR. MARTINEZ

1990. Estudio Comparativo en dos especies del Género Nerita L.1758. del Litoral Central. Acta Científica Venezolana, 41 (Suplemento No. 1): 385.

ANEXO I

Especies de moluscos colectados, su ubicación taxonómica y geográfica

Abreviaturas utilizadas: AN: Anzoategui, NE: Nueva Esparta, AR: Aragua, SU: Sucre, CA: Carabobo, ZU: Zulia, DF:Distrito Federal, df: Dependencias Federales, MI: Miranda,

CLASE GASTROPODA

FAMILIA ACTEOCINIDAE

Acteocina canaliculata (Say, 1822). Localidad: Parque Nacional Morrocoy. Distribución en Venezuela: 1er registro para Venezuela y Falcón.

FAMILIA ACMEIDAE Carpenter, 1857

Acmaea of pustulata (Helbling, 1779). Localidad: Puerto Escondido. Distribución en Venezuela: CA, DF, MI, df (Los Roques).

Acmuea antillarum (Sowerby, 1831). Localidad: Animas de Guasarc. Distribución en Venezuela: DF, df (Los Roques). 1er registro en Falcón.

Acmaea leucopleura (Gmelin, 1791). Localidad: Animas de Guasare. Distribución en Venezuela: df (Los Roques).

FAMILIA APLUSTRIDAE Gray, 1847

Hydatina of vesicaria (Lighfoot, 1786). Localidad: Punta Macolla. Distribución en Venezuela: DF, df (Los Roques). Ter registro en Falcón.

FAMILIA APLYSIIDAE Rafinesque, 1815

Aplysia dactylomela Rang, 1828. Localidad: Cabo San Román, Villa Marina. Distribución en Venezuela: df (Los Roques). 1er registro en Falcón

FAMILIA ARCHITECTONICIDAE Gray, 1850

Architectonica nobilis Röding, 1798. Localidad: Ensenada de La Vela, Punta de Barco, Punta Macolla, Punta Salina, Los Taques, El Codo, Muaco. Distribución en Venezuela: DF, ZU.

Heliacus cylindricus (Gmelin, 1791). Localidad: Parque Nacional Morrocoy. Distribución en Venezuela: MI, CA, DF, SU, df (Isla de Aves). Ter registro en Falcón.

FAMILIA BULLIDAE Rafinesque, 1815

Bulla striata Bruguière, 1792. Localidad: Chichiriviche, El Playón, Cujisito, Los Taques, Amuay, Punta Cardón, El Cayude, Parque Nacional Morrocoy. Distribución en Venezuela: CA, DF, SU.

Bulla solida (Gmelin, 1791). Localidad: El Playón, Cujisito, Punta Cardón. Distribución en Venezuela: ter registro para Venezuela y Falcón.

FAMILIA BURSIDAE Thiele, 1925

Bursa bufo (Bruguiere, 1792). Localidad: Punta Uvero, San José de la Costa, Sauca, Pta. Manzanillo, Tucupido, Ensenada de La Vela, El Codo. Distribución en Venezuela: SU. 1er registro en Falcón.

Bursa granularis cubaniana (Orbigny, 1842). Localidad: Sauca. Distribución en Venezuela: df (Los Roques). 1er registro en Falcón.

FAMILIA BUCCINIDAE Rafinesque, 1815

Pisania pusio (Linneo, 1758). Localidad: Puerto Escondido, El Supi. Distribución en Venezuela: CA, DF, NE, df (Isla Larga, Los Roques, Isla de Aves, La Orchila, La Tortuga).

Pisania auritula (Link, 1807). Localidad: Puerto Escondido, Golfete de Cuarc. Distribución en Venezuela: CA, DF, MI, SU, df (Isla de Aves).

Pisania tineta (Conrad, 1846). Localidad: Punta Cocuy, El Supi, Golfete de Cuare. Distribución en Venezuela: DF, df (La Orchila). Les registro en Falcón.

Engina turbinella (Kiener, 1835). Localidad: El Supí. Distribución en Venezuela: CA, DF, NE, df (La Orchila, Los Roques, La Tortuga). 1er registro en Falcón.

Pallacera guadalupensis (Petit, 1852). Localidad: Cujisito. Distribución en Venezuela: SU. 1cr registro en Falcón.

Babylonia areolata (Link, 1807). Localidad: Adicora. Distribución en Venezuela: fer registro en el país y Falcón. El género Babylonia está presente en la costa occidental de Africa.

FAMILIA CAECIDAE Gray, 1850

Caecum pulchellum Stimpson, 1851. Localidad: Parque Nacional Morrocoy. Distribución en Venezuela: ler registro para Venezuela y Falcón.

Caecum ryssotitum Folin, 1867. Localidad: Parque Nacional Morrocoy. Distribución en Venezuela: Ler registro para Venezuela y Falcón.

Especies de moluscos colectados, su ubicación taxonómica y geográfica

FAMILIA CASSIDAE Swainson, 1832

Phalium granulatum (Born, 1778). Localidad: Punta Uvero, San José de la Costa, Sauca, Boca de Ricoa, Tucupido, Ensenada de La Vela. Punta de Barco, Cabo San Román, Punta Macolla, Cujisito, Punta Salína, Los Taques, Amuay, Adaro, Muaco. Distribución en Venezuela: 1er registro en Falcón.

Cypraecassis testiculus (Linneo, 1758). Localidad: Ensenada de La Vela, Cabo San Román, El Supí, Golfete de Cuare. Distribución en Venezuela: CA, DF, MI, NE, SU, df (Los Roques, Las Aves, Isla Larga, Isla de Aves, La Tortuga, La Orchila, Isla Píritu).

Sconcia striata (Lamarck, 1816). Localidad: Punta de Barco. Distribución en Venezuela: 1er registro para Venezuela y Falcón.

Cassis tuberosa (Linneo, 1758). Localidad: Cabo San Román. Distribución en Venezuela: SU, df (La Tortuga, Las Aves, La Orchila. Los Roques). 1er registro en Falcón.

Cassis madagascariensis Lamarck, 1822. Localidad: Punta Macolla, Amuay, Guaranao. Distribución en Venezuela: NE, DF, SU. 1er registro en Falcón.

FAMILIA COLUMBELLIDAE Swainson, 1840

Columbella mercatoria Linneo, 1758. Localidad: Chichíriviche, Punta Uvero, San José de La Costa, Animas de Guasare, Puerto Escendido, Cujisito, El Codo, El Supí, Muaco, Golfete de Cuare, Golfo Triste. Distribución en Venezuela: CA, DF, NE, MJ, SU, df (Isla Larga, Isla Ave de Sotavento, Isla de Aves, La Orchila, La Tortuga).

Anachis (Parvanachis) obesa C.B. Adams, 1845. Localidad: Punta Cocuy. Distribución en Venezuela: DF. 1er registro en Falcón.

Anachis (Costanachis) lyrata (Sowerby, 1832). Localidad: Santa Rosa, Ensenada de La Vela. Distribución en Venezuela: ler registro para Venezuela y Falcón.

Nitidella laevigata (Linneo, 1758). Localidad: Chichiriviche, Punta Uvero, San José de La Costa, Sauca, Boca de Ricoa, Boca de Ricoa, Animas de Guasare, Puerto Escondido. Distribución en Venezuela: DF, NE, SU. 1er registro en Falcón.

Mazatlania aciculata (Lamarck, 1822). Localidad: Adícora. Distribución en Venezuela: DF, NE.

Rhombinella laevigata (Linneo, 1758). Localidad: Golfo Tristo. Distribución en Venezuela; CA. 1er registro en Falcón.

Mitrella argus Orbigny, 1842. Localidad: Parque Nacional Morrocoy. Distribución en Venezuela: ler registro para Venezuela.

FAMILIA CERITHIIDAE Bruguiere, 1789

Cerithium litterattum (Born, 1778). Localidad: El Supí, Golfete de Cuare. Distribución en Venezuela: CA, Ml, SU, df (Isla de Aves, La Orchila, Isla Las Aves, Los Roques, La Tortuga, 1er registro en Falcón.

Cerithium of guinaicum Philippi, 1849. Localidad: Parque Nacional Morrocoy. Distribución en Venezuela: ler registro para Venezuela y Falcón.

Cerithium eburneum Bruguiere, 1792. Localidad: Parque Nacional Morrocoy, Golfete de Cuarc. Distribución en Venezuela: SU, CA, MI, NE. 1er registro en Falcón

Cerithium lutosum Menke, 1828. Localidad: Animas de Guasarc, Tiraya, El Supí. Distribución en Venezuela: 1er registro en Falcón

Cerithium algicola C.B. Adams, 1848. Localidad: Parque Nacional Morrocoy, Golfete de Cuare. Distribución en Venezuela: SU, df (Isla de Aves, Los Roques, La Orchila. 1er registro en Falcón.

Cerithium atratum (Born, 1778). Localidad: Parque Nacional Morrocoy, Golfo Triste. Distribución en Venezuela: SU. Ler registro en Falcón.

Bittium varium (Pfeiffer, 1840). Localidad: Parque Nacional Morrocoy. Distribución en Venezuela: ler registro en Falcón.

FAMILIA CYPRAEIDAE Rafinesque, 1815

Cypraea zebra Linneo, 1758. Localidad: Boca de Ricoa, Ensenada de La Vela, Muaco, El Supí. Distribución en Venezuela: CA, DF, MI, SU, NE, df (Isla de Aves, Isla Larga, Islas Chimanas, Los Roques.

Cypraea spurca acicularis Gmelin, 1791. Localidad: Santa Rosa. Distribución en Venezuela: CA, DF, MI, df (Isla de Aves, Los Roques). ler registro en Falcón.

Siphocypraea mus Linneo, 1758. Localidad: Parque Nacional Morrocoy, Amuay. Distribución en Venezuela: 1er registro en Falcón.

FAMILIA CREPIDULIDAE Fleming, 1822

Caliptrea centralis (Conrad, 1841). Localidad: Boca de Ricoa, Punta Macolla, Adaro, Distribución en Venezuela: SU, ZU.

Crucibulum marense Weisbord, Localidad: Ensenada de La Vela, Cabo San Román, Punta Macolla, Punta Jacuque, Punta Salina, Amuay. Distribución en Venezuela: DF.

Crucibulum auricula (Gmelin, 1791). Localidad: Punta Salina, Amuay, El Codo, Golfete de Cuare. Distribución en Venezuela: DF, NE, SU, df (Los Roques). 1er registro en Falcón.

Especies de moluscos colectados, su ubicación taxonómica y geográfica

FAMILIA CREPIDULIDAE Fleming, 1822 (CONT.)

Crepidula ef convexa Say, 1822. Localidad: El Codo, Adaro. Distribución en Venezuela: SU, NE, df (Los roques). 1er registro en Falcón.

Crepidula of plana Say, 1822. Localidad: Adaro. Distribución en Venezuela: DF. ler registro en Falcón.

Crepidula cf. maculosa Conrad, 1846. Localidad: Parque Nacional Morrocoy. Distribución en Venezuela: SU.

FAMILIA CANCELLARIDAE Forbes y Hanley, 1853

Cancellaria reticulata (Linneo, 1767). Localidad: Muaco. Distribución en Venezuela: NE, SU, df (Isla Tortuga). Ier registro en Falcón.

FAMILIA CONIDAE Rafinesque, 1815

Conus puncticulatus Hwass, 1792. Localidad: Puerto Escondido, Golfo Triste. Distribución en Venezuela: 1er registro para Venezuela y Falcón.

Conus mus Hwass, 1792. Localidad: Parque Nacional Morrocoy, Punta Uvero, San José de la Costa, Boca de Ricoa, Punta Macolla, El Supí, Muaco, Golfete de Cuare. Distribución en Venezuela: CA, DF, MI, NE, SU, df (Isla de Aves, Los Roques). 1er registro en Falcón.

Conus ef austini Rehder y Abbott, 1951. Localidad: Punta de Barco, Punta Macolla, Distribución en Venezuela: Ier registro en Falcón.

Conus spurius Gmelin, 1791. Localidad: Punta de Barco, Cabo San Román, Punta Macolla, El Playón, Los Taques, Las Piedras, Punta Cardón, Adaro, Guaranao. Distribución en Venezuela:

Conus centurio Born, 1778. Localidad: Ensenada de La Vela, Punta de Barco, Cabo San Román. Distribución en Venezuela: 1er registro para Venezuela y Falcón.

FAMILIA CYMATIIDAE Iredale, 1913

Cymatium pileare martiniamum Orbigny, 1842. Localidad: San José de la Costa. Distribución en Venezuela: CA, DF,SU. 1er registro en Falcón.

Cymatium cingulatum (Lamarck, 1822). Localidad; Punta Cardón. Distribución en Venezuela: 1er registro para Venezuela.

Cymatium muricinum (Röding, 1798). Localidad: Animas de Guasare. Distribución en Venezuela: CA, DF, MI, df (Los Roques, La Orchila). 1er registro en Falcón.

Cymatium parthenopeum (Von Salis, 1793). Localidad: Cujisito Distribución en Venezuela: DF, MI, SU, df (Isla Larga).

Cymatium moritinetum caribbeum Clench y Turner, 1957. Localidad: El Codo. Distribución en Venezuela: Ier registro para Venezuela y Falcón.

Charonia variegata (Lamarck, 1816). Localidad: San José de la Costa, Punta Macolfa, Villa Marina. Distribución en Venezuela: CA, DF, MI, SU, df (Isla Las Aves, Isla Tesoro, Isla de Aves, Los Roques). Ler registro en Falcón.

Distorsio cluthrata (Lamarck, 1816). Localidad: Boca de Ricoa, Ensenada de La Vela, Las Piedras, Adaro. Distribución en Venezuela: DF, AN, NE, SU.

FAMILIA DORIDIDAE Rafinesque, 1815

Glossodoris bayeri. Marcus y Marcus, 1967. Localidad: Parque Nacional Morrocoy. Distribución en Venezuela: ler registro para Venezuela y Falcón.

FAMILIA ERATOIDAE Gill, 1871

Trivia pediculus (Linneo, 1758). Localidad: Chichiriviche, San José de la Costa, Boca de Ricoa, Boca de Ricoa, Santa Rosa, Tucupido, Ensenada de La Vela, El Supi. Distribución en Venezuela: CA, DF, MI, SU, NE, df (Las Aves, Los Roques, Isla de Aves, La Orchila, La Tortuga.

FAMILIA EPITONIIDAE S.S. Berry, 1910

Epitonium lamellosum (Lumarck, 1822). Localidad: Puerto Escondido, Muaco, La Huesa de Barrancas. Distribución en Venezuela: CA, MI, df (Los Roques, Isla de Aves).

FAMILIA FASCIOLARIIDAE Gray, 1853

Fasciolaria hollisteri (Weisbord, 1962). Localidad: Punta Uvero, El Playón, Cujisito, Los Taques, Villa Marina, Amuay, Las Piedras, Punta Cardón, Punta Cocuy, Punta Caimán, Adaro. Distribución en Venezuela: SU. Ier registro en Fascón.

** Leucozonia nassa (Cimelin, 1791). Localidad: Parque Nacional Morrocoy, Punta Uvero, Puerto Escondido. Distribución en Venezuela: DF, MI, NE, SU, CA, df (Isla larga, Isla Maceta, Isla de Aves, Los Roques, Cayo de La Colonia). Ter registro en Falcón.

Especies de moluscos colectados, su ubicación taxonómica y geográfica

FAMILIA FASCIOLARIIDAE Gray, 1853 (CONT.)

Latirus infundibulum (Gmelin, 1791). Localidad: Peña Santa Clara. Distribución en Venezuela: DF. 1er registro en Falcón.

Fusinus helenae Bartsch, 1939. Localidad: Punta Macolla, Amuay, Zazárida, Adaro. Distribución en Venezuela: Ler registro para Venezuela y Falcón.

Fusinus closter (Philippi, 1850). Localidad: Amuay, Punta Maragüey, Zazárida, Adaro. Distribución en Venezuela: DF. 1er registro en Falcón.

Fusinus bitteri Gibson-Smith. Localidad: Golfo de Venezuela. Distribución en Venezuela: Especie nueva para la ciencia.

FAMILIA FICIDAE Conrad, 1867

Ficus communis Röding, 1798. Localidad:Punta Macolla, Cujisito, Punta Salina, Los Taques, Amuay, Zazárida, Adaro, Distribución en Venezuela: ler registro para Venezuela y Falcón.

FAMILIA FISSURELLIDAE Fleming, 1822

Fissurella ef nodosa (Born, 1778). Localidad: Cabo San Román. Distribución en Venezuela: SU, df (Isla Las Aves).). 1er registro en Falcón.

Fissurella nimbosa Linneo, 1758. Localidad: San José de La Costa, Boca de Ricoa, Santa Rosa, Tucupído, Ensenada de La Vela, Animas de Guasare, Puerto Escondido, Cabo San Román, El Codo, Muaco, Golfete de Cuare. Distribución en Venezuela: DF, SU. df (Isla Las Aves). 1er registro en Falcón.

Diodora jaumei Aguayo y Rehder, 1936. Localidad: El Cayude. Distribución en Venezuela: Ier registro para Venezuela y Falcón.

Diodora cayenensis (Lamarck, 1822). Localidad: San José de La Costa, Boca de Ricoa. Distribución en Venezuela: CA, DF, NE, SU, df (Isla La Tortuga). Ler registro para Falcón.

Diodora listeri (Orbigny, 1842). Localidad: Cabo San Román, El Supí, Golfete de Cuare. Distribución en Venezuela: DF, SU, df (Islas Las Aves). Ler registro para Falcón.

Hemitoma octoradiata (Gmelin, 1791). Localidad: Punta Varadero, Golfete de Cuare. Distribución en Venezuela: DF, SU. 1er registro para Falcón.

Lucapina ef philippiana (Finlay, 1930). Localidad: Parque Nacional Morrocoy. Distribución en Venezuela: SU. 1er registro para

Lucapina sowerby (Sowerby, 1835). Localidad: Tiraya, El Cayude.. Distribución en Venezuela: SU. 1er registro para Falcón.

FAMILIA HAMINOEIDAE Pilsbry, 1895

Haminoea antillarum (Orbigny, 1841). Localidad: La Huesa de Barrancas. Distribución en Venezuela: 1er registro para Venezuela y Falcón.

Haminoea succinea (Conrad, 1846). Localidad: Golfete de Cuare. Distribución en Venezuela: ler registro en Falcón.

FAMILIA HIPPONICIDAE Troschel, 1861

Hipponix anticuatus (Linneo, 1767). Localidad: El Supí. Distribución en Venezuela: CA, DF, MI, df (Isla de Aves, Los Roques, La Orchila, La Tortuga).

FAMILIA JANTINIDAE Leach, 1823

Jantina globosa Swainson, 1822. Localidad: Animas de Guasare. Distribución en Venezuela: DF. 1er registro en Falcón.

FAMILIA LITTORINIDAE Gray, 1840

Littorina ef nebulosa (Lamarek, 1822). Localidad: Boca de Ricoa, Santa Rosa. Distribución en Venezuela: Ml, ZU, df (Isla Larga). 1er registro en Falcón.

Littorina angulifera (Lamarck, 1822). Localidad: Parque Nacional Morrocoy. Distribución en Venezuela: NE, df (Las Aves, La Orchila, Isla Tesoro, Los Roques, Isla de Aves). Le registro en Falcón.

Littorina lineolata Orbigny, 1840. Localidad: San José de la Costa, Sauca, Boca de Ricoa, Santa Rosa, Animas de Guasare, Cabo San Román, Amuay. Distribución en Venezuela: Ter registro en Falcón.

Littorina angustior Morch, 1876. Localidad: Boca de Ricea, Amuay. Distribución en Venezuela: ler registro para Venezuela y Falcón.

Nodilittorina tuberculata (Menke, 1828). Localidad: Boca de Ricoa, Ensenada de La Vela, Cabo San Román. Distribucióπ en Venezuela: CA, DF, df (La Orchila, Isla de Aves, Isla Larga, Isla Tesoro, Los Roques, La Orchila, La Tortuga). Ter registro en Falcón.

Tectarius muricatus (Linneo, 1758). Localidad: San José de la Costa, Sauca, Boca de Ricoa, Cabo San Román, Amuay, Golfete de Cuare. Distribución en Venezuela: SU, df (Las Aves, Los Frailes, Los Roques, Cayo de La Colonia, Isla Maceta, Isla Tesoro, Isla de Aves). Ter registro en Falcón.

Especies de moluscos colectados, su ubicación taxonómica y geográfica

FAMILIA MARGINELLIDAE Fleming, 1828

Murginella prunum (Gmelin, 1791). Localidad: Punta Uvero, San José de la Costa, Sauca, Boca de Ricoa, Santa Rosa, Tucupido, Ensenada de La Vela, Animas de Guasare, Adícora, Puerto Escondido, Punta Macolla, Cujisito, Punta Salina, Los Taques, Punta Cardón, Punta Caimán, El Codo, El Supi, Muaco, Golfete de Cuare, Parque Nacional Morrocoy, Golfo Triste. Distribución en Venezuela: Mi, SU. 1er registro en Falcón.

Marginella ef circumvitata Weisbord, 1962. Localidad: Amuay. Distribución en Venezuela: Ler registro para Venezuela y Falcón.

Persicula interruptolineata (Muhlfeld, 1816). Localidad: San José de la Costa, Sauca, Boca de Ricoa, Santa Rosa, Tucupido, Animas de Guasare, Tiraya, Puerto Escondido, Cujísito, Punta Caimán, El Codo, Muaco. Distribución en Venezuela: DF, NE, SU. 1er registro en Falcón.

Hyalina albolineata (Orbigny,1842). Localidad: Parque Nacional Morrocoy. Distribución en Venezuela: Ler registro para Venezuela y Falcón.

FAMILIA MELAMPIDAE Stimpson, 1851

Melampus coffeus (Linneo, 1758). Localidad: Tiraya, La Huesa de Barrancas. Distribución en Venezuela: CA, NE, ZU, df (Los Roques). Les registro en Falcón.

FAMILIA MELANELLIDAE Bartsch, 1917

Melanella intermedia (Cantraine, 1835). Localidad: Parque Nacional Morrocoy. Distribución en Venezuela: 1er registro para Venezuela y Falcón.

FAMILIA MITRIDAE Swainson, 1831

Mitra nodulosa (Gmelin, 1791). Localidad: Ensenada de La Vela, Muaco. Distribución en Venezuela: df (Isla de Aves). Ter registro en Falcón.

FAMILIA MODULIDAE Fischer, 1884

Modulus modulus (Linneo, 1758). Localidad: Parque Nacional Morroccoy. Distribución en Venezuela: CA, MI, NE, SU.

FAMILIA MURICIDAE da Costa, 1776

Murex donmoorei Bullis, 1964. Localidad: Punta Macolla, Punta Salina, Los Taques. Distribución en Venezuela: 1er registro para Venezuela y Falcón.

Murex ef cabritti Bernardi, 1859. Localidad: Los Taques. Distribución en Venezuela: ler registro para Venezuela y Falcón.

Murex chrysostomus Sowerby, 1834. Localidad: Cujisito, Los Taques, Villa Marina, Amuay, Las Piedras, Punta Cardón, Prudencio, Punta Cocuy, Punta Caimán, Punta Codore, El Codo, Adaro. Distribución en Venezuela: DF, NE, SU, df (Los Roques). 1er registro en Falcón.

Murex brevifrons Lamarck, 1822. Localidad: Punta Uvero, 22, Punta Salina, Los Taques, Amuay, Las Piedras, Punta Cocuy, Punta Caimán, El Codo, Adaro, Guaranao, Golfete de Cuare. Distribución en Venezuela: CA, DF, SU, df (Los Roques, Isla de Aves). 1er registro en Falcón.

Murex margaritensis Abbott, 1958. Localidad: Punta Jacuque, Punta Salina, Los Taques, Amuay, Punta Cardón, Punta Caimán, Punta Maragüey, Punta Codore, Adaro. Distribución en Venezuela: NE. 1er registro en Falcón.

Murex ef formosus Sowerby, 1841. Localidad: Golfete de Cuare. Distribución en Venezuela: 1er registro para Venezuela y Falcón.

Purpura patula Linneo, 1758. Localidad: Sauca, Boca de Ricoa, Santa Rosa, Ensenada de La Vela, Animas de Guasare, Cabo San Román. Distribución en Venezuela: CA, DF, NE, SU, df (Los Roques, Las Aves, Isla de Aves). 1er registro en Falcón.

Thais rustica (Lamarck, 1822). Localidad: Punta Uvero, Sauca, Animas de Guasare, Cujisito, El Supí. Distribución en Venezuela: CA, DF, df (Isla de Aves, Los Roques). 1er registro en Falcón.

Thais deltoidea (Lamarck, 1822). Localidad: El Supí. Distribución en Venezuela: CA, DF, df (Isla de Aves, Los Roques). Ier registro en Falcón.

Thais of haemastoma floridana Conrad, 1837. Localidad: Parque Nacional Morrocoy, Cujisito, El Codo, Golfete de Cuare, GolfoTriste. Distribución en Venezuela: ZU, df (Isla La Tortuga). 1er registro en Falcón.

Morula nodulosa (C.B. Adams, 1845). Localidad: Muaco. Distribución en Venezuela: CA, DF, df (Isla de Aves, La Orchila, Los Roques). Ler registro en Falcón.

FAMILIA MELONGENIDAE Gill, 1867

Melongena melongena (Linneo, 1758). Localidad: San José de La Costa, Sauca, Tucupido, Gusare, Los Taques, Amuay, Las Piedras, Punta Cardón, Prudencio, Punta Cocuy, Punta Caimán, Adaro, Guaranao. Distribución en Venezuela: AN, MI, NE, SU, df (Los Roques, Isla La Tortuga).

Melongena corona (Gmelin, 1791). Localidad: Golfete de Cuare. Distribución en Venezuela: Ler registro para Venezuela y Falcón.

Especies de moluscos colectados, su ubicación taxonómica y geográfica

FAMILIA NATICIDAE Gray, 1840

- Natica canrena (Linneo, 1758). Localidad: Parque Nacional Morrocoy, Ensenada de La Vela, Punta Cocuy. Distribución en Venezuela: CA, DF, MI, NE, SU, df (Isla Las Aves, Isla de Aves, Los Roques, La Tortuga, Islas Chimanas).
- Natica marochiensis (Gmelin, 1791). Localidad: Ensenada de La Vela, Animas de Guasare, El Supí. Distribución en Venezuela: 1er registro para Venezuela y Falcón.
- Polinices hepaticus (Röding, 1798). Localidad: Enscnada de La Vela, Golfete de Cuare. Distribución en Venezuela: DF, MI, SU. 1er registro para Falcón.
- Polinices lacteus (Guilding, 1834). Localidad: Puerto Escondido, Golfete de Cuare. Distribución en Venezuela: CA, DF, MI, df (Isla de Aves, La Orchila, Los Roques). 1er registro para Falcón.
- Sinum of maculatum (Say, 1831). Localidad: Ensenada de La Vela. Distribución en Venezuela: Ter registro para Venezuela y Falcón. FAMILIA NERITIDAE Rafinesque, 1815
 - Nerita peloronta Linnco, 1758. Localidad: San José de La Costa, Sauca, Boca de Ricoa, Boca de Ricoa, Animas de Guasare, Cabo San Román, El Supí, Muaco. **Distribución** en Venezuela: CA, DF, NE, SU, df (Las Aves, La Orchila, Los Roques, Isla de Aves, Islas Chimanas, Isla Tesoro).
 - Nerita versicolor Gmelin, 1791. Localidad: San José de La Costa, Boca de Ricoa, Boca de Ricoa, Santa Rosa, Tucupido, Animas de Guasare, El Supí, Muaco, Golfete de Cuare. **Distribución** en Venezuela: AR, CA, DF, NE, SU, df (Isla de Aves, La Orchila, La Tortuga, Los Roques, Isla Larga, Isla Tesoro, Isla Las Aves).
 - Nerita tesselata Gmelin, 1791. Localidad: San José de La Costa, Sauca, Boca de Ricoa, Santa Rosa, Tucupido, Ensenada de La Vela, Animas de Guasare, Puerto Escondido, El Supí, Golfete de Cuare. Distribución en Venezuela: AR, CA, DF, NE, SU, df (Islas Las Aves, Isla de Aves, Los Roques, Isla Tesoro, La Orchila).
 - Nerita fulgurans Gmelin, 1791. Localidad: San José de La Costa, Boca de Ricoa, Tucupido, Ensenada de La Vela, Puerto Escondido, Cabo San Román, Cujisito, Amuay, El Supi. Distribución en Venezuela: AR, CA, DF, NE, SU.
 - Neritina meleagris Lamarck, 1822. Localidad: Ensenada de La Vela. Distribución en Venezuela: DF. Ier registro para Falcón.
 - Neritina piratica Russel, 1940. Localidad: Parque Nacional Morrocoy. Distribución en Venezuela: 1er registro para Venezuela y
 - Neritina virginea (Linneo, 1758). Localidad: Prudencio. Distribución en Venezuela: AN, DF, NE, SU, 1er registro para Falcón.
 - Neritina reclivata (Say, 1822). Localidad: La Hucsa de Barrancas. Distribución en Venezuela: SU, ZU. 1er registro para Falcón.
 - Smaragdia viridis (Linnco, 1758). Localidad: Parque Nacional Morrocoy, Tiraya, Prudencio, El Supí, Golfo Triste. Distribución en Venezuela: DF, SU. 1er registro para Falcón.

FAMILIA NASSARIDAE Iredale, 1916

Nassarius vibex (Say, 1822). Localidad: Prudencio, Punta Cocuy, Parque Nacional Morrocoy. Distribución en Venezuela: CA, NE, SU, df (Isla La Tortuga). Ler registro para Falcón.

FAMILIA OVULIDAE Fleming, 1822

- Cyphoma intermedium Cate, 1973. Localidad: Ensenada de La Vela, Peña Santa Clara. Distribución en Venezuela: SU. 1er registro para Falcón.
- Cyphoma gibbosum (Linneo, 1758). Localidad: Parque Nacional Morrocoy. Distribución en Venezuela: SU, df (Los Roques). Ter registro para Falcón.

FAMILIA OLIVIDAE Latreille, 1825

- Oliva schepmani Weisbord, 1962. Localidad: Parque Nacional Morrocoy, Santa Rosa, Animas de Guasare, Adícora, Tiraya, Puerto Escondido, Cujisito, Punta Salina, Los Taques, Amuay, El Codo, El Supi, Muaco. Distribución en Venezuela: NE.
- Oliva scripta Lamarck, 1810. Localidad: Punta de Barco, Punta Macolla, Cujisito, Punta Salina, Los Taques, Villa Marina, Amuay, Las Piedras, Carirubana, Punta Cardón, Punta Caimán, Punta Maragüey, Zazárida, Adaro, Guaranao. Distribución en Venezuela: 1er registro para Venezuela y Falcón.
- Olivella minuta (Link, 1807). Localidad: Golfo Triste. Distribución en Venezuela: DF. 1er registro para Falcón.
- Ancilla glabrata (Linneo, 1758). Localidad: Punta Macolla, El Playón, Punta Salina, Villa Marina, Amuay, Carirubana, Punta Cardón, Punta Cocuy, Punta Caimán, Punta Maragüey, Zazárida, Adaro, Guaranao. Distribución en Venezuela: ler registro para Venezuela.

Especies de moluscos colectados, su ubicación taxonómica y geográfica

FAMILIA PLANAXIDAE Gray, 1850

Planaxis nucleus (Bruguiere, 1789). Localidad: Parque Nacional Morrocoy. Distribución en Venezuela: DF, MI, NE, SU, df (La Orchila, Isla Las Aves, Isla Tesoro, Los Roques, La Tortuga). 1cr registro para Falcón.

FAMILIA POTAMIDIDAE H, y A, Adams, 1854

Cerithidea ef costata (da Costa, 1778). Localidad: La Huesa de Barrancas. Distribución en Venezuela: NE, df (Los Roques). 1er registro para Falcón.

Batillaria minima (Gmelin, 1791). Localidad: San José de La Costa, El Cayude, La Huesa de Barraneas. Distribución en Venezuela: CA, NE, SU, df (Isla de Aves, Los Roques). Ler registro para Falcón.

FAMILIA PHASIANELLIDAE Swainson, 1840

Tricolia ef. affinis (C.B. Adams, 1850). Localidad: Parque Nacional Morrocoy. Distribución en Venezuela: NE, DF, ler registro para Falcón.

Tricolia ef. thalassicola Robertson, 1958. Localidad: Parque Nacional Morrocoy. Distribución en Venezuela: ler registro para Venezuela y Falcón.

Tricolia tessellata (Potiez y Hichaud, 1838). Localidad: Golfo Triste, Distribución en Venezuela: DF. 1er registro para Falcón.

FAMILIA RISSOINIDAE Stimpson, 1865

Rissoina fischeri Desjardin, 1949. Localidad: Parque Nacional Morrocoy. Distribución en Venezuela: Ter registro para Venezuela y Falcón.

Rissoina bryerea (Montagu, 1803). Localidad: Parque Nacional Morrocoy. Distribución en Venezuela: df (La Orchita, Isla de Aves).

Rissoina decussata (Montagu, 1803). Localidad: Parque Nacional Morrocoy. Distribución en Venezuela: df (Isla de Aves). 1er registro en Falcón.

Zebina browniana (Orbigny, 1842). Localidad: Parque Nacional Morrocoy. Distribución en Venezuela: df (La Orchila,Isla de Aves). Jer registro en Falcón.

Alvania auberiana (Orbigny, 1842). Localidad: Parque Nacional Morrocoy. Distribución en Venezuela: CA, df (Los Roques, La Orchila, Tortuga). Ier registro en Falcón.

FAMILIA SIPHONARIIDAE Gray, 1840

Siphonaria pectinata (Linneo, 1758). Localidad: Boca de Ricoa, Tucupido, Ensenada de La Vela, Animas de Guasare, Puerto Escondido, Punta Cardón, El Cayude, El Supí. **Distribución** en Venezuela: NE, ZU. Ter registro para Falcón.

FAMILIA STROMBIDAE Rafinesque, 1815

Strombus pugilis Linneo, 1758. Localidad: Animas de Guasare, Cujisito, Punta Salina, Los Taques, Amuay, Las Piedras, Carirubana, Punta Cardón, Prudencio, Adaro, Golfo Triste. Distribución en Venezuela: DF, df (Los Roques). Ler registro para Falcón.

Strombus raninus Gmelin, 1791. Localidad: Adicora, Punta Caimán. Distribución en Venezuela: MI, NE, df (Los Roques).

Strombus gigas Linneo, 1758. Localidad: Parque Nacional Morrocoy, Buchuaco. Distribución en Venezuela: NV, CA, NE, SU, df (Isla de Aves, Isla Las Aves, La Tortuga, Los Roques, Isla Tesoro).

FAMILIA TEREBRIDAE H. y A. Adams, 1854

Terebra protexta Conrad 1845. Localidad: Punta Caimán. Distribución en Venezuela: Ier registro para Venezuela y Falcón.

Terebra cinerea (Born, 1778). Localidad: San José de La Costa, Sauca, Boca de Ricoa, Santa Rosa, Ensenada de La Vela, Animas de Guasare, Puerto Escondido, Cujisito. Distribución en Venezuela: DF, NE.

Terebra ef taurina Lighfoot, 1786. Localidad: Punta Macolla. Distribución en Venezuela: Ler registro para Venezuela y Falcón.

FAMILIA TROCHIDAE Rafinesque, 1815

Cittarium pica (Línneo, 1758). Localidad: San José de La Costa, Cabo San Román, Punta Macolla. Distribución en Venezuela: CA, MI, NE, SU, df (Isla de Aves, Los Roques, Las Aves). Ier registro para Falcón.

Calliostoma pulchrum (C.B. Adams, 1850). Localidad: Parque Nacional Morrocoy. Distribución en Venezuela: 1er registro para Venezuela y Falcón.

Calliostoma sarcodum Dall, 1927. Localidad: Punta Cocuy. Distribución en Venezuela: Ler registro para Venezuela y Falcón:

Tegula fasciata (Born, 1778). Localidad: Parque Nacional Morrocoy. Distribución en Venezuela: SU, df (Los Roques, Isla de Aves). 1er registro para Falcón.

Tegula viridula (Gmelin, 1791). Localidad: Punta Uvero, San José de La Costa, Sauca, Boca de Ricoa, Tucupido, Ensenada de La Vela, Animas de Guasare, Puerto Escondido, Cujisito, Punta Salina, Punta Cardón, El Codo, Golfete de Cuare, Golfo Triste. Distribución en Venezuela: DF, SU, df (Los Roques). Ier registro para Falcón.

Especies de moluscos colectados, su ubicación taxonómica y geográfica

FAMILIA TONNIDAE Peile, 1926

Tonna maculosa (Dillwyn, 1817). Localidad: Parque Nacional Morroccoy. Distribución en Venezuela: DF, df (Isla de Aves, Las Aves, Los Roques).

Tonna galea (Línneo, 1758). Localidad: Boca de Ricoa, Boca de Ricoa, Punta Jacuque, Cujisito, Punta Salina, Los Taques, Villa Marina, Amuay, Las Piedras, Carirubana, Punta Cardón, Fenta Maragüey, Zazárida, Adaro, Guaranao. Distribución en Venezuela: DF, EN. 1er registro para Falcón.

FAMILIA TURRITELLIDAE Clarke, 1851

Turritella variegata (Linneo, 1758). Localidad: Animas de Guasare, El Playón, Punta Salina, Amuay, Punta Cocuy, Punta Caimán, El Codo, El Supi, Muaco. Distribución en Venezuela: DF, MI, SU. 1er registro para Falcón.

Turritella paraguanensis F. Hudson, Localidad: Punta Salina, Distribución en Venezuela: 1er registro para Venezuela.

FAMILIA TURBINELLIDAE Swainson, 1840

Turbinella ef angulata (Lighfoot, 1786). Localidad: Amuay. Distribución en Venezuela:

Vasum muricatum (Born, 1778). Localidad: Amuay, Punta Varadero. Distribución en Venezuela: ler registro para Venezuela y Falcón.

FAMILIA TURBINIDAE Rafinesque, 1815

Turbo castanea Gmelin, 1791. Localidad: Muaco, Parque Nacional Morrocoy. Distribución en Venezuela: SU.

Astraea brevispina (Lamarck, 1822). Localidad: Ensenada de La Vela, El Playón, Cujisito, Punta Cardón, Prudencio, Punta Caimán, El Codo. Muaco. Distribución en Venezuela: MI, EN. 1er registro para Falcón.

Astraea tuber (Linneo, 1767). Localidad: Puerto Escondido, Cabo San Román, Cujisito, Punta Cardón El Supí, Golfo Triste. Distribución en Venezuela: DF, SU, df (Los Roques). Ier registro para Falcón.

Astraea caelata (Gmelin, 1791). Localidad: Parque Nacional Morrocoy, El Supi. Distribución en Venezuela: CA, df (Isla de Aves, Los Roques).

FAMILIA TURRIDAE Swainson, 1840

Fusiturricula pauletae Princz, 1978. Localidad: Punta Macolla. Distribución en Venezuela: 1er registro para Falcón.

Polystira albida (Perry, 1811). Localidad: Punta de Barco, Punta Macolla, Punta Salina, Los Taques, Amuay, Adaro. Distribución en Venezuela: ZU.

Drillia gibbosa (Born, 1778). Localidad: Cujisito. Distribución en Venezuela:DF, SU. ler registro para Falcón.

Hindsiclava ef consors (Sowerby,). Localidad: Punta Jacuque. Distribución en Venezuela: SU.

Pyrgocythara candidissima (C.B. Adams, 1845). Localidad: Parque Nacional Morrocoy. Distribución en Venezuela: ler registro para Venezuela y Falcón.

FAMILIA VERMETIDAE Rafinesque, 1815

Serpulorbis decussatus (Gmelin, 1791). Localidad: Animas de Guasare, Amuay. Distribución en Venezuela: df (Isla de Aves). 1er registro para Falcón.

FAMILIA VITRINELLIDAE Bush, 1897

Teinostoma megastoma (C.B. Adams, 1850). Localidad: Parque Nacional Morrocoy. Distribución en Venezuela: ler registro para Venezuela y Falcón.

FAMILIA VOLUTIDAE Rafinesque, 1815

Voluta musica Linneo, 1758. Localidad: Puerto Escondido, Cabo San Román, Punta Macolla, Los Taques, Caimán, El Codo, Piedras Negras. Distribución en Venezuela: DF, NE, df (Isla Las Aves, La Tortuga, Los Roques).

CLASE BIVALVIA

FAMILIA ARCIDAE Lamarck, 1809

Area zebra (Swainson, 1833). Localidad: Punta Uvero, San José de la Costa, Sauca, Boca de Ricoa, El Playón, Punta Salina, Los Taques, Villa Marina, Punta Cardón, El Codo, Adaro. Distribución en Venezuela: CA, SU, DF, DA.

Arca imbricata Bruguiere, 1789. Locatidad: Parque Nacional Morrocoy, Punta Uvero, San José de la Costa, Sauca, Boca de Ricoa, Punta Manzanillo, Tucupido, Animas de Guasare, Tiraya, Punta Macolla, Cujisito, Punta Salina, El Cayude, Punta Caimán, El Codo. Distribución en Venezuela: CA, DF, NE, MI, SU, ZU, df (Isla de Aves, La Orchila, La Tortuga).

Barbatia candida (Helbling, 1779). Localidad: Parque Nacional Morrocoy, Los Taques. Distribución en Venezuela: CA, DF, MI, NE, df (Los Roques, La Orchila, Isla de Aves).

Especies de moluscos colectados, su ubicación taxonómica y geográfica

FAMILIA ARCIDAE Lamarck, 1809 (CONT.)

- Barbatia tenera (C.B. Adams, 1845). Localidad: Punta Cardón, El Cayude. Distribución en Venezuela: CA, DF, MI, df (Isla de Aves, La Tortuga). Ler registro en Falcón.
- Barbatia cancellaria (Lamarck, 1819). Localidad: Los Taques, Parque Nacional Morrocoy. Distribución en Venezuela: CA, DF. MI, df (La Orchila, Los Roques, Isla de Aves, La Tortuga). 1er registro en Falcón.
- Barbatia dominguensis (Lamarck, 1819). Localidad: Golfo Triste. Distribución en Venezuela: CA, DF, Ml, SU, FA, df (Isla de Aves, Los Roques, La Orchila, La Tortuga, Islas Chimanas).
- Anadara of floridana (Conrad, 1869). Localidad: El Codo. Distribución en Venezuela: Ler registro para Venezuela y Falcón.
- Anadara brasiliana (Lamarek, 1819). Localidad:Punta Manzanillo,Tucupido, Animas de Guasare,Punta Salina,Villa Marina, Punta Cardón, El Codo, Golfo Triste. Distribución en Venezuela: DF, MI, NE, SU, ZU. Ler registro en Falcón.
- Anadara notabilis (Röding, 1798). Localidad: San José de la Costa, Sauca, Tucupido, Ensenada de La Vela, Animas de Guasare, Cabo San Román, Punta Macolla, El Playón, Cujisito, Punta Salina, Los Taques, Villa Marina, Amuay, Punta Caimán, El Codo. Distribución en Venezuela: DF, NE, SU. 1er registro en Falcón.
- Anadara chemnitzii (Philippi, 1851). Localidad: Punta Uvero, San José de la Costa, Sauca, Punta Manzanillo, Ensenada de La Vela, Cujisito, Punta Salina, Villa Marina, Punta Cardón, Punta Cocuy, El Codo. Distribución en Venezuela: DF, NE, SU. 1er registro en Falcón.
- Anadara ovalis (Bruguiere, 1789). Localidad: Sauca, Punta Manzanillo, Golfo Triste. Distribución en Venezuela: 1er registro para Venezuela y Falcón.
- Anadara ef baughmani Hertlein, 1951. Localidad: Punta Macolla. Distribución en Venezuela: 1er registro para Venezuela y Falcón.
- Noetia bisulcata (Lamarck, 1819). Localidad: San José de la Costa, Sauca, Boca de Ricoa, Punta Manzanillo, Santa Rosa, Tucupido, Ensenada de La Vela, Animas de Guasare, Cujisito, Punta Cardón, Punta Cocuy, El Codo. **Distribución** en Venezuela: ler registro para Venezuela y Falcón.
- Arcopsis adamsi (Dall, 1886). Localidad: Parque Nacional Morrocoy. Distribución en Venezuela: CA, DF, SU, MI, df (Isla de Aves, Los Roques, La Orchila, La Tortuga).
- Lunarca ovalis (Bruguiere, 1789). Localidad: Golfo Triste. Distribución en Venezuela: DF, NE, SU.

FAMILIA CHAMIDAE Lamarck, 1809

- Chama of lactuca Dall, 1886. Localidad: Punta Uvero, Amuay. Distribución en Venezuela: ler registro para Venezuela y Falcón.
- Chama macerophylla (Gmelin, 1791). Localidad: Parque Nacional Morrocoy. Distribución en Venezuela: MI, SU, DF.
- Chama florida Lamarck, 1819. Localidad: Parque Nacional Morrocoy. Distribución en Venezuela: CA, DF, NE, df (La Blanquilla, Isla de Aves, Los Roques, La Orchila, La Tortuga).
- Pseudochama radians (Lamarck, 1819). Localidad: El Playón. Distribución en Venezuela: DF. 1er registro para Falcón.
- Arcinella arcinella (Linneo, 1767). Localidad: Punta de Barco, Punta Macolla, Los Taques, Amuay. Distribución en Venezuela: SU. 1er registro para Falcón.
- Arcinella cornuta Conrad, 1866. Localidad: Ensenada de La Vela. Distribución en Venezuela: 1er registro para Venezuela y Falcón.

FAMILIA CORBULIDAE Lamarck, 1818

- Corbula aequivalvis Philippi, 1836. Localidad: Sauca. Distribución en Venezuela: ler registro para Venezuela y Falcón.
- Corbula contracta Say, 1822. Locatidad: Parque Nacional Morrocoy, Golfo Triste. Distribución en Venezuela: ler registro para Falcón.
- Corbula caribaea Orbigny, 1842. Localidad: Golfo Triste. Distribución en Venezuela: SU. 1cr registro para Falcón.

FAMILIA CARDITIDAE Fleming, 1820

Carditamera gracilis (Shuttleworth, 1856). Localidad: Parque Nacional Morrocoy, Ensenada de La Vela, Anímas de Guasare, Cujisito, Punta Salina, Villa Marina, Amuay, Punta Cardón, El Codo, Golfo Triste. **Distribución** en Venezuela: SU, DF. 1er registro para Falcón.

FAMILIA CARDIIDAE Oken, 1818

- Trachycardium isocardiu (Linneo, 1758). Localidad: Amuay, Punta Cardón, Prudencio, El Codo. Distribución en Venezuela: SU, DF, 1er registro para Falcón.
- Trachycardium muricatum (Linneo, 1758). Localidad: San José de la Costa, Punta Manzanillo, Santa Rosa, Tucupido, Animas de Guasare, Tiraya, Punta Salina, Los Taques, Punta Cardón, Punta Caimán, El Codo, Golfo Triste. Distribución en Venezuela: CA, DF, Ml, SU, df (La Tortuga). Ier registro para Falcón.

Especies de moluscos colectados, su ubicación taxonómica y geográfica

FAMILIA CARDIIDAE Oken, 1818 (CONT.)

Papyridea soleniformis (Bruguiere, 1789). Localidad: Golfo De Venezuela. Distribución en Venezuela: SU, DF. 1er registro para Falcón.

Trigonocardia antillarum (Orbigny, 1842). Localidad: El Cayude. Distribución en Venezuela: ler registro para Venezuela y Falcón.

Laevicardium laevigatum (Linnco, 1758). Localidad: Ensenada de La Vela, Punta Macolla, Punta Jacuque, Punta Salina, Los Taques, Villa Marina, Amuay, Las Piedras, Carirubana, Punta Cardón, Punta Caimán, Punta Maragüey, Punta Codore, Zazárida, Adaro. Distribución en Venezuela: SU, ZU.

Crassinella martinicensis (Orbigny, 1842). Localidad: Parque Nacional Morrocoy. Distribución en Venezuela: 1er registro para Falcón.

FAMILIA CRASSATELLIDAE Férussac, 1822

Eucrassarella antillarum (Reeve, 1842). Localidad: Punta Cardón. Distribución en Venezuela: NE, SU, DF. 1er registro para Palcón.

FAMILIA DREISSENIDAE Grav. 1840

Mytilopsis sallei Récluz, 1849. Localidad: Boca de Ricoa, Distribución en Venezuela: Ler registro para Falcón.

FAMILIA DONACIDAE

Donax demicularus Linneo. 1758. Localidad: Boca de Ricoa, Punta Manzanillo, Santa Rosa, Tucupido, Animas de Guasare, Tiraya, Cujisito. Punta Salina.Los Taques, Villa Marina, Amuay, Punta Cardón, El Cayude, Punta Cocuy, Punta Caimán, El Codo. Distribución en Venezuela: MI, NE, SU.

Donax striatus Linnee, 1767. Localidad: Golfo Triste, Distribución en Venezuela: MI, NE, ZU.

Donax higuerotensis. Localidad: Golfo Triste. Distribución en Venezuela: Mi. 1er registro para Falcón.

FAMILIA GLYCYMERIDAE Newton, 1922

Glycymeris castaneus | Lamarck | Localidad: Punta Uvero, Distribución en Venezuela: let registro para Venezuela y Falcón.

Glycymeris et pectinata (Gmelin, 1791). Localidad: Punta Macolla. Distribución en Venezuela: Ler registro para Venezuela y Falcón.

FAMILIA LIMIDAE Rafinesque, 1815

Lima scabra (Born, 1778). Localidad: Parque Nacional Morrocoy. Distribución en Venezuela: CA, DF, MI, SU, df (Los Roques, Isla de Aves. La Tortuga). Jer registro para Falcón.

Lima pellucida C.B. Adams, 1846. Localidad: Parque Nacional Morrocoy. Distribución en Venezuela: CA, DF, MI, df (Isla de Aves, La Tortuga, Islas Chimanas). 1er registro para Falcón.

FAMILIA ISOGNOMONIDAE Woodring, 1925

Isognomon alatus (Gmelin, 1791). Localidad: Parque Nacional Morrocoy. Distribución en Venezuela: MI, SU. 1er registro para Falcón.

PAMILIA LUCINIDAE Fleming, 1828

Lucina pectinata (Gmelin, 1791). Localidad: San José de la Costa, Los Taques, Amuay. Distribución en Venezuela: SU, df (Isla de Aves, Los Roques, La Tortuga). Ler registro para Falcón.

Lucina muricata (Spengler, 1798). Localidad: Parque Nacional Morrocoy. Distribución en Venezuela: CA, SU. Ier registro para Falcón.

Lucina radians (Conrad, 1841). Localidad: Parque Nacional Morrocoy. Distribución en Venezuela: 1er registro para Venezuela y Falcón.

Codakia orbicularis (Linneo, 1758). Localidad: Parque Nacional Morrocoy, Cabo San Román, Piedras Negras, Punta Varadero. Distribución en Venezuela: CA, DF, MI, SU, df (Isla La Tortuga, Los Roques, Isla de Aves, La Orchila, Islas Chimanas).

Codakia orbiculata (Montagu, 1808). Localidad: Parque Nacional Morrocoy, Cabo San Román. Distribución en Venezuela: CA, DF. NE. Ml. df (Isla La Tortuga, Isla de Aves, Los Roques).

Codakia ef. costata (Orbigny, 1842). Localidad: Parque Nacional Morrocoy. Distribución en Venezuela: CA, df (Isla de Aves,

Divaricella quadrisulcata (Orbigny, 1842). Localidad: Sauca. Distribución en Venezuela: CA, NE, SU, df (Isla de Aves, Los Roques, Isla Chimanas).

Anodontia alba Link, 1807. Localidad: Punta Caimán. Distribución en Venezuela: 1er registro para Venezuela y Falcón.

CH Land Fr

Especies de moluscos colectados, su ubicación taxonómica y geográfica

FAMILIA MYTILIDAE Rafinesque, 1815

Brachidontes modiolus (Linneo, 1767). Localidad: Punta Macolla, El Playón, Punta Cardón, Punta Caimán. Distribución en Venezuela: DF. 1er registro para Falcón.

Brachidontes exustus (Linneo, 1758). Localidad: Animas de Guasarc, Parque Nacional Morrocoy. Distribución en Venezuela: SU. Ter registro para Falcón.

Brachidontes dominguensis (Lamarck, 1819). Localidad: Punta Salina. Distribución en Venezuela: SU. Jer registro para Falcón.

Modiolus americanus (Leach, 1815). Localidad: Animas de Guasare, Los Taques, Amuay, Punta Caimán. Distribución en Venezuela: DF, SU. 1er registro para Falcón.

Musculus lateralis (Say, 1822). Localidad: Parque Nacional Morrocoy. Distribución en Venezuela: 1er registro para Venezuela y Falcón.

Amydalum cf. papyrium (Conrad, 1846). Localidad: Distribución en Venezuela: 1er registro para Venezuela y Falcón.

FAMILIA MACTRIDAE Lamarck, 1809

Mactra fragilis Gmelin, 1791. Localidad: San José de la Costa, Boca de Ricoa, Punta Manzanillo, Cujisito, Los Taques, Amuay, Punta Cardón, El Cayude, El Codo, Golfo Triste. Distribución en Venezuela: MI. ler registro para Falcón.

Mactrellona alata (Spengler, 1802). Localidad: Sauca, Tucupido, Animas de Guasare, El Playón, Cujisito, Golfo Triste. Distribución en Venezuela: Ier registro para Venezuela.

Mactrellona ilieringi (Dali, 1897). Localidad: Ensenada de La Vela. Distribución en Venezuela: MI. Ier registro para Falcón.

Mulinia cleryana (Orbigny, 1846). Localidad: San José de la Costa, Sauca, Boca de Ricoa, Punta Manzanillo, Santa Rosa, Tucupido, Ensenada de La Vela, Punta Macolla, Cujisito, Punta Salina, Punta Cardón, El Codo. Distribución en Venezuela: MI. 1er registro para Falcón.

Raeta plicatella (Lamarck, 1818). Localidad: Ensenada de La Vela. Distribución en Venezuela: DF. 1er registro para Falcón.

Anatina anatina (Spengler, 1802). Localidad: Ensenada de La Vela, Cujisito, Punta Caimán. Distribución en Venezuela: 1er registro para Venezuela y Falcón.

FAMILIA NUCULANIDAE Mcek, 1864

Nuculana acuta (Conrad, 1831). Localidad: La Huesa de Barrancas. Distribución en Venezuela: 1er registro para Venezuela y Falçón.

Adrana tellinoides (Sowerby, 1823). Localidad: La Huesa de Barrancas. Distribución en Venezuela: DF. 1er registro para Falcón.

Adrena gloriosa A. Adams. Localidad: Punta Espada. Distribución en Venezuela:

FAMILIA NUCULIDAE Gray, 1824

Nucula mareana Weisbord, 1964. Localidad: Punta Cocuy. Distribución en Venezuela: DF. 1er registro para Falcón.

FAMILIA OSTREIDAE Rafinesque, 1815

Crassostrea rhizophorae (Guilding, 1828). Localidad: Parque Nacional Morrocoy, Punta Salina, Punta Cocuy, Punta Caimán, Golfete de Cuare. Distribución en Venezuela; CA, MI, SU, NE.

Lopho frons (Linneo, 1758). Localidad: Parque Nacional Morrocoy. Distribución en Venezuela: 1er registro para Venezuela y Falcón.

FAMILIA PTERIIDAE Rafinesque, 1815

Pinctada imbricata Röding, 1798. Localidad: Los Taques, Amuay, Punta Cardón, Parque Nacional Morrocoy. Distribución en Venezuela: NE, df (Los Roques). 1er registro para Falcón.

Pteria colymbus (Röding, 1798). Localidad: El Codo. Distribución en Venezuela: SU. 1er registro para Falcón

FAMILIA PECTINIDAE Grav. 1847

Pecter (Euvola) ziczac (Linneo, 1758). Localidad: Punta Cardón. Distribución en Venezuela: SU, df (Isla La Tortuga). 1er registro para Falcón.

Artusium papyraceum (Gabb, 1873). Localidad: Punta Macolla, Punta Jacuque, Punta Salina, Amuay, Las Piedras, Carirubana, Punta Cardón, Punta Maragüey, Punta Codore, Zazárida, Adaro. Distribución en Venezuela: DF, SU. Ier registro para Falcón.

Amusium laurenti (Gmelin, 1791). Localidad: Punta Salina, Punta Cardón. Distribución en Venezuela: 1er registro para Venezuela y Falcón.

Aequipecten lineolaris (Lamarck, 1819). Localidad: Punta Macolla, Punta Jacuque, Punta Salina, Los Taques, Villa Marina, Amuay, Punta Cardón, Punta Codore, Zazárida. Distribución en Venezuela: Su.

Chlamys muscosa (Wood, 1828) (Ref: Abbott 1974, como Aequipecten muscosus). Localidad: Sauca, Punta Manzanillo, Muaco. Distribución en Venezuela: DF, SU.

Especies de moluscos colectados, su ubicación taxonómica y geográfica

FAMILIA PECTINIDAE Gray, 1847 (CONT.)

Aequipacten acanthodes (Dall, 1925). Localidad: Parque Nacional Morrocoy, Distribución en Venezuela: 1er registro para Venezuela y Falcón.

Argopecten gibbus (Linneo, 1758). Localidad: Tucupido, Punta Salina, Punta Caimán, Adaro. Distribución en Venezuela: 1er registro para Venezuela y Falcón.

Argopecten nucleus (Born, 1778). Localidad: Punta Macolla. Distribución en Venezuela: Su. 1er registro para Falcón.

Argopecten ef irradians amplicostatus Dall, 1898. Localidad: Ensenada de La Vela, Distribución en Venezuela: Ter registro para Venezuela y Falcón.

Liropecten nodosus (Linneo, 1758). Localidad: Cabo San Román, Golfete de Cuare. Distribución en Venezuela: DF, NE, SU, df (Isla La Tortuga).

PAMILIA PINNIDAE Leach, 1819

Atrina rigida (Lighfoot, 1786). Localidad: Los Taques, Punta Cocuy. Distribución en Venezuela: SU. 1er registro para Falcón.

Atrina venezuelana. Localidad: Golfo de Venezuela. Distribución en Venezuela: 1er registro para Falcón.

Atrina bitteri. Gibson-Smith, Localidad: Punta Macolla. Distribución en Venezuela: Especie nueva para la ciencia. En revision,

Atrina seminuda (Lamark, 1819). Localidad: Golfo Triste. Distribución en Venezuela: DF, MI, SU,

Pinno carnea Ginelin, 1791. Localidad: Cujisito, El Codo. Distribución en Venezuela: DF, SU, 1er registro para Falcón

FAMILIA PSAMMOBIIDAE Fleming, 1828

Sanguinolaria cruenta (Lighfoot, 1786). Localidad: Ensenada de La Vela, Punta Salina, Amuay. Distribución en Venezuela: 1er registro para Venezuela y Falcón.

Heterodonax bimaculatus (Linneo, 1758). Localidad: La Huesa de Barrancas. Distribución en Venezuela: Ler registro para Venezuela y Falcón.

FAMILIA PHOLADIDAE Lamarck, 1809

Pholas campechiensis Gmelin, 1791. Localidad: Parque Nacional Morrocoy, Santa Rosa, Punta Cocuy, Muaco. Distribución en Venezuela: Ml, df (Isla de Aves).

Martesia fragilis Verril y Bush, 1890. Localidad: Golfete de Cuare. Distribución en Venezuela: DF.

Martesia cuneiformis (Say, 1822). Localidad: Golfo Triste. Distribución en Venezuela: Ler registro para Falcón.

FAMILIA PLICATULIDAE Watson, 1930

Plicatula gibbosa Lamarck, 1801. Localidad: Punta Macolla. Distribución en Venezuela: DF, SU. 1er registro para Falcón.

FAMILIA SPONDYLIDAE Gray, 1826

Spondylus ictericus Reeve, 1856. Localidad: Parque Nacional Morrocoy. Distribución en Venezuela: CA, DF, df (Los Roques, Isla de Aves). Ter registro para Falcón

Spondylus americanus Hermann, 1781. Locatidad: Golfo de Venezuela. Distribución en Venezuela: DF, SU. 1er registro para Falcón.

FAMILIA SOLENIDAE Lamarck, 1809

Solen obliquus Spengler, 1794. Localidad: Boca de Ricoa, Punta Cocay, Punta Caimán. Distribución en Venezuela: Ml. ler registro para Falcón.

FAMILIA SEMELIDAE Stoliczka, 1870

Semele proficua (Pulteney, 1799). Localidad: San José de la Costa. Distribución en Venezuela: DF, SU. 1er registro para Falcón.

FAMILIA SOLECURTIDAE Orbigny, 1846

Tagelus divisus (Spengler, 1794). Localidad: Los Taques. Distribución en Venezuela: ler registro para Venezuela y Falcón.

Tagelus plebeius (Lighfoot, 1786). Localidad: Sauca, Ensenada de La Vela, El Playón, Los Taques, Punta Caimán. Distribución en Venezuela: AN, MI, NE, SU. 1er registro para Falcón.

FAMILIA TELLINIDAE Blainville, 1814

Tellina fausta Pulteney, 1799. Localidad: Cujisito, Punta Caimán. Distribución en Venezuela: 1er registro para Venezuela y Falcón.
Tellina lineata Turton, 1819. Localidad: El Playón, Punta Cardón. Distribución en Venezuela: 1er registro para Venezuela y Falcón.

Tellina listeri Röding, 1798. Localidad: Piedras Negras. Distribución en Venezuela: Ler registro para Venezuela y Falcón.

Tellina punicea Born, 1778. Localidad: Tucupido, Golfete de Cuare. Distribución en Venezuela: Ler registro para Venezuela y Falcón.

Especies de moluscos colectados, su ubicación taxonómica y geográfica

FAMILIA TELLINIDAE Blainville, 1814 (CONT.)

Teilina lirata Turton, 1819. Localidad: Amuay. Distribución en Venezuela: Let registro para Venezuela y Falcón.

Tellina sandix Boss, 1968. Localidad: Golfo Triste. Distribución en Venezuela: ler registro para Falcón,

Tellina exerythra Boss, 1964. Localidad: Golfo Triste. Distribución en Venezuela; 1er registro para Venezuela y Falcón.

Macoma constricta (Bruguiere, 1792). Localidad: Boca de Caño. Distribución en Venezuela: EN. 1er registro para Falcón.

Macoma tageliformis Dall, 1900. Localidad: Punta Caimán. Distribución en Venezuela: SU. 1er registro para Falcón.

Macoma brasiliana Dall. Localidad: El Supí. Distribución en Venezuela: ler registro para Venezuela y Falcón.

Macoma brevifrons (Say, 1834). Localidad: Punta Cardón. Distribución en Venezuela: 1er registro para Venezuela y Falcón.

Cymatoica sp. Localidad: Golfo triste. Distribución en Venezuela: ter registro para Falcón.

Strigilla pseudocarnaria Boss, 1969. Localidad: Punta Manzanillo. Distribución en Venezuela: Ter registro para Venezuela y Falcón.

Strigilla producta Tryon, 1870. Localidad: Golfo Triste. Distribución en Venezuela: 1er registro para Falcón.

Psammotreta brevifrons (Say, 1834). Localidad: Punta Cardón. Distribución en Venezuela: Ier registro para Venezuela y Falcón.

FAMILIA THRACIIDAE E.A. Smith, 1885

Cyathodonta magnifica Jonas, 1850. Localidad: Punta Macolla. Distribución en Venezuela: ler registro para Venezuela y Falcón. FAMILIA UNGULINIDAE H. y A. Adams, 1857

Diplodonta candeana (Orbigny, 1842). Localidad: La Huesa de Barrancas. Distribución en Venezuela: 1er registro para Venezuela y Falcón.

Diplodonta semiaspera (Philippi, 1836). Localidad: Golfo Triste. Distribución en Venezuela: DF, SU.

FAMILIA VENERIDAE, Rafinesque, 1815

Circomphalus ef strigillinus (Dall, 1902). Localidad: Punta Macolia. Distribución en Venezuela: 1er registro para Venezuela y Falcón.

Periglypta listeri (Gray, 1838). Localidad: Punta Cardón. Distribución en Venezuela: DF, df (Isla La Tortuga). 1er registro para Falcón

Ventricolaria rigida (Dillwyn, 1817). Localidad: Punta de Barco, Golfete de Cuare. Distribución en Venezuela: DF, SU.

Chione cancellata (Linneo, 1767). Localidad: Punta Uvero, San José de la Costa, Sauca, Boca de Ricoa, Ensenada de La Vela, Animas de Guasare, Cujisito, Punta Salina, Los Taques, Villa Marina, Amuay, Punta Cardón, Punta Cocuy, Punta Caimán, El Codo, Parque Nacional Morrocoy. Distribución en Venezuela: DF, CA, SU, ZU, NE, MI, df (Isla Tortuga).

Chione paphia (Linneo, 1767). Localidad: Parque Nacional Morrocoy, Ensenada de La Vela, Villa Marina, Punta Cardón, El Codo. Distribución en Venezuela: SU. 1er registro para Falcón.

Chione pubera (Bory-Saint-Vicent, 1827). Localidad: Punta Macolla. Distribución en Venezuela: SU. 1er registro para Falcón.

Anomalocardia brasiliana (Gmelin, 1791). Localidad: Sauca, Punta Manzanillo, Ensenada de La Vela, Tiraya, Punta Salina, Los Taques, Villa Marina, Punta Cardón, El Cayude. Distribución en Venezuela: CA, SU.

Protothaca granulata (Gmelin, 1791). Localidad: Punta Cardón. Distribución en Venezuela: ler registro para Venezuela y Falcón.

Tivela mactroides (Born, 1778). Localidad: Parque Nacional Morrocoy, Sauca, Boca de Ricoa, Punta Manzanillo, Animas de Guasare, Tiraya, El Playón, Cujisito, Punta Salina, Punta Caimán, El Codo, Golfo Triste. Distribución en Venezuela: DF, MI, NE, SU, ZU, df (Isla La Tortuga).

Pitar arestus (Dall y Simpson, 1901). Localidad: Golfo de Venezuela. Distribución en Venezuela: Ler registro para Venezuela y Falcón.

Pitar dione (Linneo, 1758). Localidad: Ensenada de La Vela, Animas de Guasare, Golfo Triste. Distribución en Venezuela: DF. MI, SU, ZU. 1er registro para Falcón.

Pitar circinatus (Born, 1778). Localidad: Punta Caimán. Distribución en Venezuela: DF, SU.

Pitar fulminatus (Menke, 1828). Localidad: Punta Cardón. Distribución en Venezuela: ZU, SU.

Pitar albidus (Gmelin, 1791). Localidad: Punta Macolla, Las Piedras, Golfo Triste. Distribución en Venezuela: SU. 1er registro para Falcón.

Macrocallista maculata (Linneo, 1758). Localidad: Punta Macolía. Distribución en Venezuela: CA, DF, NE, SU, ZU, df (Los Roques).

Cyclinella tenuis (Récluz, 1852). Localidad: Amuay, Las Piedras, Punta Cardón, Adaro. Distribución en Venezuela: df (Los Roques). Jer registro para Falcón.

Especies de moluscos colectados, su ubicación taxonómica y geográfica

FAMILIA VENERIDAE Rafinesque, 1815 (CONT.)

Dosinia concentrica (Born, 1778). Localidad: Punta Macolla, Las Piedras, Carirubana, Punta Caimán, Golfete de Cuare. Distribución en Venezuela: SU. 1er registro para Falcón.

Petricola Iapicida (Gmelin, 1791). Localidad: Golfo Triste. Distribución en Venezuela: DF. 1er registro para Falcón.

FAMILIA PERIPLOMATIDAE Dall, 1895

Periploma margaritacea (Lamarck, 1801). Localidad: Golfo Triste. Distribución en Venezuela: DF, FA.

CLASE CEPHALOPODA

FAMILIA SPIRULIDAE Rafinesque, 1815

Spirula spirula (Linnco, 1758). Localidad: Adícora. Distribución en Venezuela: df (Isla de Aves). 1er registro para Falcón.

FAMILIA LOLIGINIDAE Lesueur, 1821

Loligo pealei Lesueur, 1821. Localidad: Golfo de Venezuela. Distribución en Venezuela: 1er registro para Falcón.

Lolliguncula brevis (Blainville, 1823). Localidad: Golfo Triste. Distribución en Venezuela: Ier registro para Falcón.

FAMILIA OCTOPODIDAE Rafinesque, 1815

Octopus vulgaris Cuvier, 1797. Localidad: El Supí. Distribución en Venezuela: df (Los Roques). 1er registro para Falcón.

FAMILIA THYSANOTEUTHIDAE

Thysanoteuthys rhombus Troschel, 1857. Localidad: Villa Marina. Distribución en Venezuela: 1er registro para Venezuela y Falcón.

CLASE SCAPHOPODA

FAMILIA DENTALIDAE Grav, 1834

Dentalium of laqueatum Verril, 1885. Localidad: Punta Caimán. Distribución en Venezuela: DF. 1er registro para Falcón.

FAMILIA SIPHODENTALIIDAE Simroth, 1894

Cadulus quadridentatus (Dall, 1881). Localidad: Parque Nacional Morrocoy. Distribución en Venezuela: DF. ler registro para Falcón.

CLASE POLYPLACOPHORA

FAMILIA CHITONIDAE Rafinesque, 1815

Chiton marmoratus Gmelin, 1791. Localidad: El Supi, Punta de Barco, Santa Rosa. Distribución en Venezuela: DF, NE, df (Los Roques). 1er registro para Falcón.

Acanthopleura granulata (Gmelin, 1791). Localidad: Animas de Guasare. Distribución en Venezuela: SU, df (La Orchila). 1er registro para Falcón.