


## WETENSCHAPPELIJKE NAAM

*Raja brachyura* (Lafont, 1873).

## VERSPREIDING

Noordoost-Atlantische Oceaan: Noorwegen tot Marokko, en het westen van de Middellandse Zee<sup>iii</sup>.



## LOKALE NAMEN

**BLONDE ROG**, Kielrog, Straalrog, Blonde Ray (UK), Raie Lisse (Fr), Raie a Queue Courte (Fr), Razza a Coda Corta (It), Raia Pontauada (Pr), Raya Boca de Rosa (Es).

## KENMERKEN

- 1 Grote rog met korte snuit<sup>vii</sup>.
- 2 Rij van 40-45 stekels op de middenlijn bij juvenielen en volwassen vrouwtjes<sup>iv</sup>.
- 3 Bij volwassen mannetjes is rij aanwezig, maar onderbroken<sup>x</sup>.

## KLEUR

- Rugzijde bruin en bedekt met kleine donkere vlekken.
- Vlekken lopen door tot aan de uiterste rand van de vinnen.
- Grotere, bleke vlekken verspreid over de lichaamsschijf.
- Buikzijde wit<sup>viii</sup>.

## BIOLOGIE EN GROOTTE

- Bij geboorte: 16–18 cm. Bij geslachtsrijpheid: 80–90 cm. Max. TL: 120 cm<sup>v</sup>.
- Juvenielen eten kleine kreeftachtigen (vlokkreeftjes, garnalen, krabben), volwassenen eten meer kleine vissen (zandspiering) en inktvissen<sup>iv</sup>.
- Juvenielen vaak dicht bij de kust gevonden waar de kraamkamers zich bevinden<sup>iv</sup>.

**GELIJKAARDIGE SOORTEN**

- *Raja clavata*, **Stekelrog**
- *Raja microocellata*, **Kleinoogrog**
- *Raja montagui*, **Gevlekte Rog**

**HABITAT**

- Levend op of nabij de bodem tot 900 m.
- Voornamelijk < 100 m.
- Voorkeur voor zachte substraten zoals zand en slib<sup>iv</sup>.

**BESCHERMINGSSTATUS**

- Wordt laat geslachtsrijp, met een lange broedperiode en langzame voortplanting. De populatie concentreert zich in bepaalde gebieden. Hierdoor is deze soort kwetsbaar tegenover lokale overexploitatie<sup>viii</sup>.
- **Status op de Rode Lijst:** NT - Bijna in gevaar (2009)<sup>xi</sup>.  
NT - Bijna in gevaar in Europese wateren (2015)<sup>xii</sup>.

**COMMERCIEEL BELANG**

- Een belangrijke soort, bevest in gebieden waar hij in grote getalen voorkomt. Technieken: gemengde sleepnetvisserij, beug- en kieuwnetvisserij<sup>vi</sup>.
- Populaire soort onder sportvissers.
- Vanaf 2009 – voor deze soort geldt een vangstquotum in EU-wateren.

**HANTEREN EN STEKELPOSITIE**

- Voorzichtig hanteren.
- Centrale rij met stevige stekels.
- Staart met aan weerszijde een rij stekels<sup>vii</sup>.

**REFERENTIES**

- Catchpole, T. L.; 2007. CEFAS.
- Clark, R; S; 1926. Fishery Board for Scotland.
- Ellis, J. *et al*; 2005. *J. Northw. Atl. Fish. Sci.* 35: 195-213.
- Farias, I. *et al*; 2005. ICES.
- Gallagher, M. J.; 2005. *J. Northw. Atl. Fish. Sci.* 35: 47-66.
- Gibson, C; 2006. IUCN SSC Shark Specialist Group.
- Luna, S. M; 2009. Fishbase.
- Marine Conservation Society; Unknown.
- Shark Trust; 2008.
- Whitehead, P. J. P. *et al*; 1986. UNESCO.
- Ellis, J. *et al*; 2009. IUCN Red List.
- Nieto, A. *et al*; 2015. European Red List of Marine Fishes.

**TANDEN**

- 60–90 rijen tanden in bovenkaak. In beide geslachten met scherpe spitsen<sup>ii</sup>.

**EIKAPSEL**

- 1 ~90 mm lang (exclusief hoorns).
  - 2 Duidelijke zomen.
  - 3 Hoorns aan bovenzijde groter dan aan onderzijde<sup>x</sup>.
- Eikapsel lijkt op dat van de stekelrog, *Raja clavata*, maar dan aanzienlijk kleiner.  
(Eikapsel op ware grootte.)