





WETENSCHAPPELIJKE NAAM

Scyliorhinus canicula (Linnaeus, 1758).

VERSPREIDING

Noorwegen tot Senegal en de Middellandse Zee, mogelijk de Ivoorkustⁱ.



LOKALE NAMEN

HONDSHAAI, Hondje, Zeepaling, Hondje met kleine spikkels, Smallspotted Catshark (UK), Roussette (Fr), Pintarroja (Es).

KENMERKEN

- 1 Neusflappen lopen door tot in de bek.
- 2 Geen stekels op de rugzijde.
- 3 Met anaalvinⁱ.


KLEUR

- ⊙ Rugzijde lichtbruin.
- ⊙ Patroon van talrijke donkere stippen.
- ⊙ Buikzijde witⁱ.

BIOLOGIE EN GROOTTE

- ⊙ Bij geboorte: 9–10 cmⁱ. Bij geslachtsrijpheid: 57 cm ♀, 54 cm ♂^v. Max TL: 80cmⁱ.
- ⊙ Eierlegend, meldingen van een broedtijd van 5–11 maanden, afhankelijk van watertemperatuurⁱ.
- ⊙ Opportunistisch, eet elke geschikte prooi. Met name kreeftachtigen en schelpdieren zijn van belang^{vi}.


TANDEN




- Negen verschillende typen tanden.
- Mannetjes hebben een wijdere mond en langere tanden dan vrouwtjes^{iv}.

- Scheef tot opgericht. Met een punt en 5 bijspitsen^{iv}.


GELIJKAARDIGE SOORTEN




- *Scyliorhinus canicula*, **Hondshaai**



- *Scyliorhinus stellaris*, **Kathaaai**



- *Galeus melastomus*, **Spaanse Hondshaai**



- *Galeus murinus*, **Muiskathaaai**



- *Galeus atlanticus*, **Atlantische Zaagstaartkathaaai**

HABITAT

- Van het getijdengebied tot 780 m^{viii}, meestal 80–100 m^{ix}.
- Nachtelijke jager, gedurende de dag rustend op de bodem^{vii}.
- Leven gescheiden volgens geslacht. Tijdens warmere maanden worden er meer vrouwtjes langs de kust aangetroffen om eieren te leggen^v.

BESCHERMINGSSTATUS

- Veel voorkomende soort met hoge vruchtbaarheid. Populaties lijken stabiel of nemen toe in heel het verspreidingsgebiedⁱⁱⁱ.
- **Status op de Rode Lijst:** LC - Momenteel niet in gevaar (2009)ⁱⁱⁱ. LC - Momenteel niet in gevaar in Europese wateren (2015)^x.

COMMERCEEL BELANG

- Bijvangst bij bodemsleepnet- en beugvisserij.
- Gewoonlijk overboord gegooid. Overlevingskans tot 98 %.
- In het geval van aanlanding, gebruikt voor consumptie, vismeel of aas voor korven en pottenⁱⁱⁱ.

HANTEREN

- Voorzichtig hanteren.
- Scherpe tanden.
- Schurende huid.

EIKAPSEL

- 1 Dooslengte 40 mm (exclusief hoorns).
- 2 20 mm breed.
- 3 Lange hechttdraden op elke hoekⁱ.
- 4 Eikapsel lijkt op die van de Kathaaai, *Scyliorhinus stellaris*.

REFERENTIES

- i. Compagno, L. J. V.; 1984. FAO.
- ii. Ellis, J. R. et al; 1995. *J. Fish. Biol.*
- iii. Ellis, J. et al; 2009. IUCN Red List.
- iv. Gajić, A; Unknown. Shark Laboratory.
- v. Ivory, P. et al; 2004. *Acta Adriatica*.
- vi. Lyle, J. M.; 1983. *J. Fish. Biol.*
- vii. Metcalfe, J. D. et al; 1983. *J. Exp. Biol.*
- viii. Mytilineou, C. et al; 2005. *Belg. J. Zool.*, Vol 135: 229 - 233.
- ix. Capapé, C. et al; 2008. *Vie Milieu*, Vol 58: 47 - 55.
- x. Nieto, A. et al; 2015. European Red List of Marine Fishes.

