

**LISTE DES MOLLUSQUES
RAPPORTÉS DE LA NOUVELLE-ZEMBLE
PAR M. SERGE IVANOFF**

Par Ph. DAUTZENBERG

La récolte dont M. Ivanoff a bien voulu me confier l'examen, renferme quelques espèces qui n'ont pas été signalées dans l'important travail publié en 1878 par M. Wilhelm Leche sur les Mollusques recueillis à la Nouvelle-Zemble par l'Expédition suédoise. D'autre part, M. Ivanoff a visité l'extrémité septentrionale de la Nouvelle-Zemble, qui est rarement accessible, à cause des glaces. Les matériaux que j'ai sous les yeux constituent donc un nouvel appoint pour la faune de ces parages peu fréquentés par les naturalistes.

PTEROPODA

CLIONE LIMACINA Phipps

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1774. <i>Clio limacina</i> | PHIPPS, Voyage to the North Pole, Appendix, p. 195. |
| 1910. <i>Clione</i> — Phipps, | DAUTZENBERG et H. FISCHER, Campagne Arctique Duc d'Orléans, p. 3. |

Stn. 97, surface. 1 exemplaire.

LIMACINA HELICINA Phipps

- | | |
|--|---|
| 1774 <i>Turbo helycinus</i> | PHIPPS, Voyage to the North Pole, Appendix, p. 198. |
| 1910. <i>Limacina helicina</i> Phipps, | DAUTZENBERG et H. FISCHER, Campagne Arctique duc d'Orléans, p. 4. |

Stn. sans n°. 75°8' N.-35°E., 2 exemplaires.

GASTEROPODA

CYLICHNA ALBA BROWN

Var. **corticata** (Beck) Möller

1842. *Bulla corticata* BECK, in MÖLLER, Index Moll. Groenl., p. 6.
1910. *Cylichna alba* var. *corticata* (Beck) Möller, DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Arct. Duc d'Orléans, p. 6.
1912. — — — — DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Nord P^{ce} de Monaco, p. 39.

Stn. 39, 74° N.-60° E., côte E. de la Nouvelle-Zemble,
1 exemplaire mort.

Stn. 75, 4 exemplaires vivants.

CYLICHNA SCALPTA Reeve

1855. *Bulla scalpta* REEVE, in BELCHER, Last of the Artic Voyages, II. p. 392, pl. 32, fig. 3.
1912. *Cylichna* — Reeve Camp. Nord P^{ce} de Monaco, p. 39.

Stn. 39, 74° N.-60° E., côte Est de la Nouvelle-Zemble,
1 exemplaire mort.

Stn. 75, 2 exemplaires vivants.

Stn. 93, 74°21' N.-60° E., côte Est de la Nouvelle-Zemble, 2 exemplaires vivants.

Cette espèce est plus connue sous le nom de *C. propinqua* M. Sars, mais ce dernier nom est plus récent.

PHILINE FRAGILIS G. O. Sars

1878. *Philine fragilis* G. O. Sars, Moll. Reg. arct. Norv., p. 296, pl. 18, fig. 11^a-11^c; pl. XII, fig. 2.
1901. — — G. O. Sars, FRIELE et GRIEG, Norw. North Atl. Exp., p. 114.

Stn. 93, 74°21' N.-60° E, côte Est de la Nouvelle-Zemble.

BELA sp. ?

Stn. 39, 74° N.-60° E., côte Est de la Nouvelle-Zemble, 1 exemplaire vivant, jeune, qu'il ne nous a pas été possible d'identifier.

NEPTUNEA ANTIQUA Linné subsp. TORNATA Gould

1841. *Fusus tornatus* GOULD, Invertebrata of Massachusetts, p. 286, fig. 201.
1912. *Neptunea antiqua* Lin. subsp. *tornata* Gould, DAUTZENBERG et H. FISCHER, Campagne Nord P^{co} de Monaco, p. 78, pl. II, fig. 5, 6, 7.

Stn. 53, 74° N.-60° E., côte Est de la Nouvelle-Zemble
1 exemplaire mort.

NEPTUNEA ANTIQUA Linné subsp. DESPECTA Linné

1758. *Murex despectus* LINNÉ, Syst. Nat. edit. X, p. 754.
1910. *Neptunea antiqua* Lin. subsp. *despecta* Lin., DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Arct. Duc d'Orléans, p. 8.
1912. *Neptunea antiqua* Lin. subsp. *despecta* (Lin.) Schröter, DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Nord P^{co} de Monaco, p. 79, pl. III, fig. 1, 2.

Stn. sans n^o, 1 fragment.

BUCCINUM GLACIALE Linné

1761. *Buccinum glaciale* LINNÉ, Fauna Suecica, p. 523.
1912. — — Lin., DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Nord P^{co} de Monaco, p. 117, pl. VII, fig. 1-4.

Stn. sans n^o, 4 exemplaires roulés.

BUCCINUM GROENLANDICUM Schröter in Chemnitz

Var. **Kobelti** Dautz. et H. Fischer

1788. *Buccinum groenlandicum* SCHRÖTER in CHEMNITZ, Conch. Cab, Namen Register, p. 16.

1910. *Buccinum groenlandicum* (Chemn.) Schröter, DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Arct. Duc d'Orléans, p. 8.
 1912. — — — DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Nord P^{co} de Monaco, p. 132, pl. VIII, fig. 9-13.

Stn. 53, 74° N.-60° E., côte Est de la Nouvelle-Zemble, un exemplaire avec Pagure.

Stn. 89, 94° N.-60° E., côte Est de la Nouvelle-Zemble, un exemplaire vivant.

BUCCINUM HYDROPHANUM Hancock.

1846. *Buccinum hydrophanum* HANCOCK, Shells dredg. on the W. Coast of Davis's Strait, in Ann. and Mag. Nat. Hist., 1st Ser., XVIII, p. 325, pl. V, fig. 7.
 1912. — — — Hanc., DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Nord P^{co} de Monaco, p. 133, pl. VIII, fig. 16, 17.

Stn. 53, 74° N.-60° E., côte Est de la Nouvelle-Zemble, 2 exemplaires vivants.

Stn. 89, 74° N.-60° E., côte Est de la Nouvelle-Zemble, 2 exemplaires jeunes, vivants.

BUCCINUM PULCHELLUM G. O. Sars

1878. *Buccinum pulchellum* G. O. Sars, Moll. reg. arct. Norv., p. 261, pl. 24, fig. 9.

Stn. 10, 75°25' N.-58° E., côte W. de la Nouvelle-Zemble, un exemplaire jeune, vivant.

TROPHON CLATHRATUS Linné

Var. **scalariformis** Gould

1841. *Fusus scalariformis* GOULD, Invert. of Massachusetts, p. 288, fig. 203.
 1912. *Trophon (Boreotrophon) clathratus* Lin. var. *scalariformis* Gould, DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Nord P^{co} de Monaco, p. 150.

Stn. 58, 75°23' N.-57° E., côte W. de la Nouvelle-Zemble, 1 exemplaire vivant.

NATICA CLAUSA Broderip et Sowerby

1829. *Natica clausa* BRODERIP et SOWERBY, On some Mollusca in the Collection of the Zool. Soc., in Zool. Journal, IV, p. 372.
1910. — — Br. et Sow., DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Arct. Duc d'Orléans, p. 9.
1912. — — — DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Nord P^{ce} de Monaco, p. 225.

Stn. 10, 75°25' N.-58° E., côte W. de la Nouvelle-Zemble, 4 exemplaires vivants.

Stn. 39, 74° N.-60° E., côtes de la Nouvelle-Zemble, 3 exemplaires vivants.

Stn. 58, 75°23' N. 57° E., côte W. de la Nouvelle-Zemble, un exemplaire vivant.

Stn. 75, 6 exemplaires jeunes.

NATICA (NATICINA) PALLIDA Broderip et Sowerby

1829. *Natica pallida* BRODERIP et SOWERBY, On some Mollusca in the Collection of the Zool. Soc., in Zool. Journal, IV, p. 372.
1912. — (*Naticina*) *pallida* Br. et S., DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Nord P^{ce} de Monaco, p. 234.

Stn. 10, 75°25' N.-58° E., côte W. de la Nouvelle-Zemble, un exemplaire mort.

Stn. 93, 74°21' N.-60° E., côte Est de la Nouvelle-Zemble, 1 exemplaire mort.

NATICA (LUNATIA) NANA Möller

1842. *Natica nana* MÖLLER, Index Moll. Groenlandiæ, p. 7.
1878. *Lunatia* — Möller, G. O. SARS, Moll. Reg. arct. Norv., p. 159, pl. 21, fig. 16^a, 16^b.

Stn. 39, 74° N.-60° E., côte Est de la Nouvelle-Zemble
3 exemplaires vivants.

SCALA GROENLANDICA Chemnitz

Var. **crebricostata** G. O. Sars

1878. *Scalaria groenlandica* var. *crebricostata*, G. O. Sars, Moll. Reg. arct. Norv., p. 194, pl. 23, fig. 1.

Stn. 53, 74° N.-60° E., côte Est de la Nouvelle-Zemble, un exemplaire mort.

EUMARGARITA HELICINA Phipps

1774. *Turbo helicina* PHIPPS, Voyage towards the North Pole, Appendix, p. 198.

1912. *Eumargarita helicina* Phipps, DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Nord P^{ce} de Monaco, p. 270.

Stn. 89, 74° N.-60° E., côte Est de la Nouvelle-Zemble, 6 exemplaires vivants.

Stn. 100, 2 exemplaires vivants.

EUMARGARITA CINEREA Couthouy

1829. *Margarita striata* BRODERIP et SOWERBY (*non* Leach), New or interesting Mollusca, in Zool. Journal, IV, p. 371.

1838. *Turbo cinereus* COUTHOUY, New Moll. of Massachusetts, in Boston Journ. of Nat. Hist., II, p. 99, pl. III, fig. 9.

1912. *Eumargarita cinerea* Couth., DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Nord P^{ce} de Monaco, p. 273.

Var. **grandis** Mörch

1869. *Margarita cinerea* Couth. var. *grandis* MÖRCH, Catal. Moll. Spitzberg, in Mém. Soc. Malac. Belg., IV, p. 23.

Stn. 58, 75°23' N.-57° E., côte W. de la Nouvelle Zélande, un exemplaire mort.

La var. *grandis* diffère de l'*E. cinerea* typique par ses cordons plus serrés.

EUMARGARITA (VALVATELLA) GROENLANDICA (Chemnitz)
Schröter

1788. *Trochus groenlandicus* SCHRÖTER, in CHEMNITZ, Conch. Cab.,
Namen Register, p. 107.
1910. *Eumargarita groenlandica* (Chtz.) Schr., DAUTZENBERG et H. FISCHER,
Camp. Arct. Duc d'Orléans, p. 9.
1912. *Eumargarita (Valvatella) groenlandica* (Chtz.) Schr., DAUTZENBERG et
H. FISCHER, Camp. Nord P^{co} de Monaco,
p. 277.

Stn. 39, 74° N.-60° E., côte Est de la Nouvelle-
Zemble, 2 exemplaires vivants.

Stn. 75. 10 exemplaires jeunes, vivants.

Var. **lævior** Möller

1842. *Trochus groenlandicus* Chtz. var. *lævior* MÖLLER, Ind. Moll. Groenl.,
p. 8.

Stn. 56, 74° N.-60 E., côte Est de la Nouvelle-Zemble,
11 exemplaires vivants.

ACMÆA TESTUDINALIS Müller

1776. *Patella testudinalis* MÜLLER, Zool. Dan. Prodr., p. 237.
1912. *Acmæa* — Müll., DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Nord
P^{co} de Monaco, p. 295.

Stn. 89, 74° N.-60° E., côte Est de la Nouvelle-
Zemble, un exemplaire vivant et un mort.

LEPETA CÆCA Müller (emend.)

1776. *Patella cæca* MÜLLER, Zool. Dan. Prodr., p. 237.
1910. *Lepeta cæca* Müll., DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Arct.
Duc d'Orléans, p. 11.
1912. — — — DAUTZENBERG et H. FISCHER. Camp. Nord
P^{co} de Monaco, p. 300.

Stn. 30, 76°7' N.-70° E., côte N.-E. de la Nouvelle-
Zemble, un exemplaire vivant.

POLYPLACOPHORA

TRACHYDERMON ALBUS Linné

1767. *Chiton albus*

LINNÉ, Syst. Nat., edit. XII, p. 1107.

1912. *Trachydermon albus* Lin.,

DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Nord
P^{co} de Monaco, p. 26.

Stn. 30, 76°7' N.-70° E., côte N.-E. de la Nouvelle-Zemble, un exemplaire vivant.

Stn. 56, 74° N.-60° E., côte Est de la Nouvelle-Zemble, 2 exemplaires vivants.

TONICIELLA MARMOREA Fabricius

1780. *Chiton marmoreus*

FABRICIUS, Fauna Groenl., p. 420.

1912. *Toniciella marmorea* Fabr.,

DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Nord
P^{co} de Monaco, p. 28.

Stn. 19, 30, 76°7' N.-70° E., côte N.-E. de la Nouvelle-Zemble, 2 exemplaires vivants.

Stn. 56, 74° N.-60° E., côte Est de la Nouvelle-Zemble, 1 exemplaire vivant.

Stn. 89, 74° N.-60° E., côte Est de la Nouvelle-Zemble, 1 exemplaire vivant.

Stn. 101, 1 exemplaire vivant.

SCAPHOPODA

SIPHONODONTALIUM LOBATUM Sowerby

1851. *Dentalium vitreum*

M. SARS (non Gmelin), Beretn. Zool.
Reise in Nyt Mag. f. Naturvid., VI,
p. 178.

1860. — *lobatum*

SOWERBY, Thesaurus Conch., III, p. 100,
pl. III (225), fig. 44.

1912 *Siphonodentalium lobatum*

SOW., DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp.
Nord P^{co} de Monaco, p. 309.

Stn. 93, 74°21' N.-60° E., côte Est de la Nouvelle-Zemble, 1 exemplaire mort, avec Siponcle.

PELECYPODA

LIMATULA ELLIPTICA Jeffreys

1863. *Lima elliptica* JEFFREYS, Brit. Conch., II, p. 81 ; V
(1869), p. 169, pl. XXV, fig. 2.
1910. *Limatula* — Jeffr., DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Arct.
Duc d'Orléans, p. 11.

Stn. 93, 74°21' N.-60° E., côte Est de la Nouvelle-Zemble, 1 exemplaire mort.

CHLAMYS ISLANDICA Müller

1776. *Ostrea islandica* MÜLLER, Zool. Dan. Prodr., p. 248.
1910. *Chlamys* — Müll., DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Arct.
Duc d'Orléans, p. 11.
1912. — — — DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Nord
P^{ce} de Monaco, p. 319.

Stn. 53, 74° N.-60° E., côte Est de la Nouvelle-Zemble,
1 exemplaire mort.

Var. **Fabricii** Philippi

1845. *Pecten Fabricii* PHILIPPI, Abbildungen, p. 101, pl. I,
fig. 5.

Stn. sans n^o, 2 valves.

CHLAMYS (PALLIOLUM) GROENLANDICA Sowerby (emend.)

1845. *Pecten Greenlandicus* SOWERBY, Thesaurus Conch., I, p. 57,
pl. XIII, fig. 40.
1910. *Chlamys (Palliolum) groenlandica* Sow., DAUTZENBERG et H. FISCHER,
Camp. Arct. Duc. d'Orléans, p. 12.
1912. — — — — DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Nord
P^{ce} de Monaco, p. 332.

Stn. 12, 76°7' N.-70° E., côte N.-E. Nouvelle-Zemble, nombreux exemplaires vivants.

Stn. 53, 74° N.-60° E. côte Est de la Nouvelle-Zemble, 2 exemplaires vivants.

Stn. 56, 74° N.-60° E., côte Est de la Nouvelle Zemble, 3 exemplaires vivants.

CHLAMYS (CYCLOPECTEN) HOSKYNSI Forbes

Var. **major** Leche

1843. *Pecten Hoskynsi* FORBES, Report Aegean Invert. in Rep. Brit. Assoc. for 1843, p. 146, 192,
1883. — — var. *major* LECHE, Övers. « Vega » Exp., p. 452.
1910. *Chlamys (Palliolum) Hoskynsi* Forb., DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Arct. Duc d'Orleans, p. 12.
1912. — (*Cyclopecten*) — — DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Nord P^{ce} de Monaco, p. 349.

Stn. 89, 74° N.-60° E., côte Est de la Nouvelle-Zemble, 1 exemplaire vivant.

CRENELLA DECUSSATA Montagu

1808. *Mytilus decussatus* MONTAGU, Test. Brit., suppl., p. 69.
1912. *Crenella decussata* Mtg., DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Nord P^{ce} de Monaco, p. 371.

Stn. 39, 74° N.-60° E., côte Est de la Nouvelle Zemble, 1 exemplaire vivant.

MODIOLARIA LAEVIGATA Gray

1824. *Modiola laevigata* GRAY, Suppl. Append. Voy. Parry, p. 245.
1910. *Modiolaria* — Gray, DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Arct. Duc d'Orléans, p. 14.
1912. — — — DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Nord P^{ce} de Monaco, p. 379.

Stn. 56, 74° N.-60° E., côte Est de la Nouvelle-Zemble, 3 exemplaires vivants.

Stn. 58, 75°23' N.-57° E., côte W. de la Nouvelle-Zemble, 1 exemplaire vivant.

ARCA (BATHYARCA) GLACIALIS Gray

1824. *Arca glacialis* GRAY, Suppl. Appendix Voy. Parry, p. 244.
1910. — (*Bathyarca*) — Gray, DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Arct. Duc d'Orléans, p. 15.
1912. — — — — DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Nord P^{co} de Monaco, p. 388.

Stn. 56, 74° N.-60° E., côte Est de la Nouvelle-Zemble, 1 exemplaire vivant.

NUCULANA PERNULA Müller

1779. *Arca Pernula* MÜLLER, Besch. Berl. Ges., IV, p. 55.
1910. *Nuculana pernula* Müll., DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Arct. Duc d'Orléans, p. 16.
1912. — — — — DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Nord P^{co} de Monaco, p. 396.

Stn. sans n^o, 3 exemplaires vivants.

YOLDIA HYPERBOREA (Lovén) Gould

1841. *Yoldia hyperborea* (Lovén) GOULD, Invert. of Massach., p. 99.
1912. — — — — Torell, DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Nord P^{co} de Monaco, p. 402.

Stn. 68, 75°35' N.-57°30' E., côte W. de la Nouvelle-Zemble, nombreux exemplaires vivants.

PORTLANDIA GLACIALIS Gray

1871. *Yoldia glacialis* GRAY, in REEVE, Conch. Icon., pl. III, fig. 12^a, 12^b.

Stn. 53, 74° N.-60° E., côte Est de la Nouvelle-Zemble, 3 exemplaires vivants.

Stn. 58, 75°23' N.-57° E., côte W. de la Nouvelle-Zemble, 2 exemplaires vivants.

YOLDIELLA INTERMEDIA M. Sars

1858. *Yoldia intermedia* M. Sars, Arctiske Molluskf. Norges, in
Forh. Vidensk. Selsk., p. 57.
1910. *Yoldiella* — M. Sars, DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Arct.
Duc d'Orléans, p. 17.
1912. — — — DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Nord
P^{ce} de Monaco, p. 408.

Stn. 93, 74°21' N.-60° E., côte Est de la Nouvelle-Zemble, 1 exemplaire vivant.

ASTARTE ELLIPTICA BROWN

1827. *Crassina elliptica* BROWN, Illustr. Conch. of Great Britain
and Ireland, pl. XVIII, fig. 3.
1910. *Astarte* — BROWN, DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Arct.
Duc d'Orléans, p. 18.
1912. — — — DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Nord
P^{ce} de Monaco, p. 418, pl. XI, fig. 12,
13, 14.

Stn. 19, 76°7' N.-70° E., côte. N-E. de la Nouvelle-Zemble, 1 exemplaire vivant.

Stn. 56, 74° N.-60° E., côte Est de la Nouvelle-Zemble, 3 exemplaires vivants.

ASTARTE CRENATA Gray

1824. *Nicania crenata* GRAY, Suppl. Appendix Voy. Parry,
p. 242.
1910. *Astarte crebricostata* Mac Andrew et Forbes, DAUTZENBERG et H.
FISCHER, Camp. Arct. Duc d'Orléans, p. 18.
1912. — *crenata* Gray, DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Nord
P^{ce} de Monaco, p. 416, pl. XI, fig. 9,
10, 11.

Stn. 39, 74° N.-60° E., côte Est de la Nouvelle-Zemble, 1 exemplaire vivant.

Stn. 89, 74° N.-60° E., côte Est de la Nouvelle Zemble, 1 exemplaire vivant.

Stn. 93, 74°21' N.-60° E., côte Est de la Nouvelle-Zemble, 1 exemplaire vivant.

ASTARTE (TRIDONTA) SEMISULCATA Leach

1819. *Crassina semisulcata* LEACH, Voyage Ross, Append. IV, p. 175.
 1910. *Astarte* — Leach, DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Arct. Duc d'Orléans, p. 17.
 1912. — (*Tridonta*) — — DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Nord P^{ce} de Monaco, p. 421, pl. XI, fig. 23-25.

Stn. 53, 74° N.-60° E., côte Est de la Nouvelle-Zemble, 17 exemplaires vivants.

Stn. 56, 74° N.-60° E., côte Est de la Nouvelle-Zemble, 1 exemplaire vivant.

ASTARTE (NICANIA) BANKSI Leach

1819. *Nicania Banksi* LEACH, Ross's first Voyage, Appendix, II, p. LXII.

Var. **Warhami** Hancock

1846. *Astarte Warhami* HANCOCK, Shells of Davis's Strait, in Ann. and. Mag. of Nat. Hist., 1^{re} Ser. XVIII, p. 336, pl. 5, fig. 15, 16.
 1910. *Banksi* Leach var. *Warhami* Hanc., DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Arct. Duc d'Orléans, p. 19.
 1912. — — — — — DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Nord P^{ce} de Monaco, p. 426, pl. XI, fig. 18-22.

Stn. 53, 74° N.-60° E., côte Est de la Nouvelle-Zemble, 2 exemplaires vivants.

CARDIUM (CERASTODERMA) ISLANDICUM Chemnitz

1782. *Cardium islandicum* CHEMNITZ, Conchylien Cabinet XI, p. 200, pl. 19, fig. 195, 196.
 1910. — — — Ch, DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Arct. Duc d'Orléans, p. 19.
 1912. — — — — — DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Nord P^{ce} de Monaco, p. 448.

Stn. sans n^o, 1 exemplaire,

CARDIUM (SERRIPES) GROENLANDICUM (Chemnitz) Gmelin

1782. *Cardium Groenlandicum* etc. CHEMNITZ, Conch. Cab. VI, p. 202,
pl. 19, fig. 198.
1790. — — — Ch., GMELIN, Syst. Nat. edit. XIII, p. 3252.
1910. — (*Serripes*) *groenlandicum* Ch., DAUTZENBERG et H. FISCHER,
Camp. Arct. Duc d'Orléans, p. 20.
1912. — — — (Ch.) Gmel., DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Nord
P^{ce} de Monaco, p. 455.

Stn. sans n^e, un exemplaire.

MYA TRUNCATA Linné

Var. **udevallensis** G. O. Sars

1878. *Mya truncata* Lin. var. *udevallensis* G. O. Sars, Moll. Reg. Arct.
Norv, p. 92.
1910. — — — — — G. O. S., DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Arct.
Duc d'Orléans, p. 22.

Stn. sans n^o, valves.

BRACHIOPODA

RHYNCHONELLA PSITTACEA Gmelin

1790. *Anomia psittacea* GMELIN, Syst. Nat. edit. XIII, p. 3348.
1910. *Rhynchonella* — Gmel., DAUTZENBERG et H. FISCHER, Camp. Arct.
Duc d'Orléans, p. 24.

Stn. 53, 74° N.-60° E., côte Est de la Nouvelle-Zemble,
4 exemplaires morts.

PH. D.
