

Maart 2016

Zoute ecotopenkaart Westerschelde 1996

Toelichting op de samenstelling van de zoute ecotopenkaart



Maart 2016
Status: definitief

Maart 2016

Toelichting op de zoute ecotopenkaart Westerschelde 1996

Biologische monitoring zoute rijkswateren

Colofon

Uitgave	Rijkswaterstaat - Centrale Informatievoorziening Derde Werelddreef 1 2622 HA Delft Postbus 5023 2600 GA Delft
Informatie	Servicedesk-data@rws.nl Tel: 015-2757700 www.rijkswaterstaat.nl
Foto omslag	Westerschelde 1-8-2007 https://beeldbank.rws.nl Rijkswaterstaat / Joop van Houdt
Uitgevoerd door	L. Walburg, D. de Jong
Opmaak	L. Walburg
Datum	Maart 2016
Status	definitief
Disclaimer	Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen en/of het gebruik daarvan, aanvaarden auteurs en uitgever geen enkele aansprakelijkheid.
© 2016 Rijkswaterstaat	Gehele of gedeeltelijke overneming of reproductie van de inhoud van deze uitgave op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende is verboden, behoudens de beperkingen bij de wet gesteld. Het verbod betreft ook gehele of gedeeltelijke bewerking

Inhoud

1 INLEIDING.....	4
2 GEBRUIK ECOTOPENKAARTEN	5
3 WERKWIJZE.....	7
3.1 BESCHRIJVING VAN DE BRONBESTANDEN	8
3.1.1 <i>GEBIEDSGRENS</i>	8
3.1.2 <i>BODEMHOOGTE</i>	8
3.1.3 <i>DROOGVALDUUR</i>	10
3.1.4 <i>GEOMORFOLOGISCHE KAART - KARTERING</i>	11
3.1.5 <i>GEOMORFOLOGISCHE KAART - EXTRAPOLATIE</i>	12
3.1.6 <i>MAXIMUM STROOMSNELHEID</i>	12
3.1.7 <i>ZOUTKAART</i>	13
4 DE ZOUTE ECOTOPENKAART – HET EINDPRODUCT ..	16

Literatuur

BIJLAGEN

BIJLAGE I	LEGENDA ZOUTE ECOTOPENKAART
BIJLAGE II	ZOUTE ECOTOPENKAART WESTERSCHELDE 1996
BIJLAGE III	STANDAARDLEGENDA GEOMORFOLOGISCHE KAART

1 Inleiding

Voorliggend rapport geeft een toelichting op het samenstellen van de zoute ecotopenkaart Westerschelde 1996.

Ecotopenkaarten zijn onderdeel van het biologische monitoringsprogramma 'MWTL' van Rijkswaterstaat- Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS-WVL). De producten worden geleverd door Rijkswaterstaat-Centrale Informatievoorziening (RWS-CIV). Een ecotopenkaart van het watersysteem is tot nu toe om de 4 jaar gerealiseerd om o.a. te voldoen aan de monitoringsverplichting voortvloeiend uit de Europese Kaderrichtlijn Water.

Toepassingen van de zoute ecotopenkaart zijn:

- Het gebruik bij het evalueren van beheersmaatregelen
- Het gebruik als ruimtelijk kader voor de macrozoobenthos monitoring
- Het gebruik voor internationale beoordelingen voor KRW en N2000

Voor het beschrijven van de zoute ecotopen is primair uitgegaan van het rapport **Zoute Ecotopen Stelsel (ZES-1)** (Bouma et al., 2005). Het Zoute EcotopenStelsel ZES.1 is een instrument om het potentiële voorkomen van habitats in brakke en zoute Rijkswateren in kaart te brengen.

De ecotopenkaart Westerschelde 1996 is samengesteld uit een vijftal basiskaarten, die gerealiseerd zijn volgens de "Dienstbeschrijving Zoute Ecotopenkaarten" (Kers et al, 2013). De ecotopenkaart Westerschelde 1996 is op deze (uniforme) wijze geproduceerd.

2 Gebruik ecotopenkaarten

Een ecotopenkaart is een kaart, die de situatie in een waterlichaam beschrijft voor belangrijke ecologische aspecten, uitgedrukt in ecotopen. Hoewel de kaart een exact beeld lijkt te geven, is dat niet helemaal het geval. Het patroon van de ecotopen klopt en de arealen per ecotoop kloppen ook ongeveer, maar het hoeft niet zo te zijn dat als je een grens tussen twee ecotopen in het veld opzoekt, dat daar ook precies de grens tussen die ecotopen ligt. Het kan zelfs zijn dat het ene ecotoop inmiddels is vervangen door een ander. Maar ergens anders kan het ander ecotoop zijn vervangen door het ene waardoor er gebiedsbreed weinig is veranderd.

Dit komt met name door de werkwijze voor de diverse deelkarteringen en de (soms snelle) veranderingen in de Westerschelde zelf.

Bijvoorbeeld de geomorfologische kartering is gebaseerd op luchtfoto's, gevlogen op een dag in het karterjaar; een momentopname dus. Door de soms snelle veranderingen in de Westerschelde kan een gebied dat op de luchtfoto gekarakteriseerd wordt als laagdynamisch, een jaar later veranderd zijn in hoogdynamisch en omgekeerd.

Diepte- en hoogtekarten worden gemaakt met een globale nauwkeurigheid van ca +/- 10cm. Bij droogvallende gebieden vertaald dat zich in een marge van ca +/- 3% droogvalduur.

Stroomsnelheden worden berekend met behulp van een model; met name in de ondiepe delen vertoont dit model onnauwkeurigheden, zoals is gebleken uit stroomsnelheidsmetingen op diverse plaatsen in de Westerschelde.

Door dit alles verandert het grote patroon van ecotopen niet veel en zullen ook oppervlakken niet sterk veranderen, maar de exacte ligging kan wel anders zijn.

Maar naast deze parameters spelen nog andere parameters een rol. Bijvoorbeeld als er een strenge winter is geweest of als er ergens recent gevestigd is met bodem beroerende netten dan zal de bodemdiergemeenschap in de Westerschelde als geheel respectievelijk ter plaatse van de beviste locatie sterk verarmd zijn wat weer zijn weerslag kan hebben op de vogelbevolking. Ook kan er ergens een laag schelpen vlak onder het oppervlak aanwezig zijn, die niet op de luchtfoto's zichtbaar is, maar waardoor er in een laagdynamische situatie toch relatief weinig bodemdieren (en vogels) aanwezig zijn. Dergelijke zaken zijn niet (goed) te karteren tenzij intensief veldwerk voor het gehele gebied uitgevoerd wordt; een onmogelijk klus.

Een ecotopenkaart geeft dus wel aan waar, op het moment van karteren, de kans op het voorkomen van bepaalde belangrijke leefgebieden erg groot is. Maar het geeft geen spijkerharde garantie dat een bepaald leefgebied ook daadwerkelijk te vinden is op de plaats waar het op een kaart staat aangegeven; zeker niet als enige tijd na de kartering wordt gekeken.

Dit alles betekent dat in een bepaald jaar een ecotopenkaart een goed beeld geeft van de ecologische opbouw van een gebied als de Westerschelde. Met twee ecotopenkaarten is een indicatie te geven van mogelijke grote veranderingen, maar kleinere veranderingen kunnen ook samenhangen met de natuurlijke variaties van jaar tot jaar. Maar met een serie ecotopenkaarten kan een beeld gevormd worden van de trends in de ontwikkelingen. Neemt in de loop van de jaren een bepaald type ecotoop toe of juist af? Veranderen door de jaren heen de patronen waarin de ecotopen in de Westerschelde voorkomen?

Wat op valt is, dat er geen biota, zoals bodemdieren en vogels, voorkomen bij de benaming van de ecotopen. Deze biota zijn niet op de ruimtelijke schaal van een waterlichaam te karteren. De aanname is dat door het in kaart brengen van goede combinaties van de abiotische parameters, de leefgebieden van de biota worden aangegeven.


In het Zoute EcotopenStelsel is een groot aantal ecotopen onderscheiden, die alle ook op de kaart zijn weer te geven. Afhankelijk van het doel waarvoor de ecotopenkaart wordt gebruikt kunnen deze ecotopen op eenvoudige wijze worden gecombineerd tot meer globale ecotopen. Op deze wijze kunnen de ecotopenkaarten overzichtelijk gehouden worden en aangepast aan het doel waarvoor ze op dat moment bedoeld zijn.

3 Werkwijze

De ecotopenkaart omvat alle ecotopen van de buitendijkse gebieden van de Westerschelde, zoals beschreven in het Zoute EcotopenStelsel (ZES.1), voor zover aanwezig. De kaart is opgebouwd uit de volgende basisbestanden:

- kaart met gebiedsbegrenzing;
- bodemhoogtekaart, op basis van laseraltimetrie en lodingen;
- droogvalduurkaart, op basis van de bodemhoogtekaart + waterstanden;;
- geomorfologische kaart, op basis van luchtfoto's en veldwerk;
- stroomsnelheidskaart, op basis van een model en de bodemhoogtekaart;
- zoutkaart, op basis van een model + continue zoutmetingen.

Onderstaande figuur 1 geeft schematisch de samenhang aan van de kaarten die de basis vormen voor de ecotopenkaart.



Figuur 1 De processtappen om te komen tot een ecotopenkaart. De hoogtekaart, dieptekaart en de geomorfologiekaart zijn bestaande diensten van de CIV. Uit het schema blijkt dat voor het samenstellen van de ecotopenkaart de bodemhoogtekaart kritisch is voor het vervolgproces.

Enkele basiskaarten worden in de vorm van rasters geproduceerd; andere in de vorm van polygonen. Om een kwalitatief goede ecotopenkaart te produceren wordt erop gelet dat de rasters niet verschoven liggen ten opzichte van elkaar. Om te voorkomen dat ecotopen foutief worden benoemd, is bij elke basiskaart getoetst of de data gebiedsdekkend gevuld is. Op deze manier wordt voorkomen dat er schijnbare veranderingen in de ecotopenkaarten plaatsvinden, die er in feite niet zijn. Alleen wanneer door de jaren heen hiervoor wordt gewaakt, kunnen de ecotopenkaarten onderling goed met elkaar vergeleken worden.


Voor het genereren van een ecotopenkaart is binnen ArcGIS for Desktop een zoveel mogelijk geautomatiseerd proces in de Modelbuilder opgesteld om productiefouten te minimaliseren en waardoor de ecotopenkaart te allen tijde reproduceerbaar is.

3.1 Beschrijving van de bronbestanden

3.1.1 Gebiedsgrens

Het gebied omvat het hele gebied van de Westerschelde voor zover onder invloed van het getij. Voor de vergelijkbaarheid van de producten in jaren is een kaart met de te gebruiken gebiedsbegrenzing gemaakt:

- Als buitengrens wordt de (zichtbare) teen van de dijk gehanteerd. Alleen (delen van) havens, zoals het westelijk deel van de Sloehaven, waar ecotopen in het litoraal aanwezig zijn, vallen binnen de gebiedsgrenzen. De overige havens worden buiten beschouwing gelaten.
- Vaste grens benedenstrooms / monding: de lijn tussen Vlissingen (Koopmanshaven) en Breskens (Handelshaven).
- Vaste grens bovenstrooms: de landgrens.



Figuur 2 De gebiedsgrens voor de ecotopenkaart Westerschelde 1996.

3.1.2 Bodemhoogte

Voor het produceren van de bodemhoogtekaart zijn de data van singlebeam vaklodingen aangevuld met hoogtemetingen. Teneinde de gehele kaart gebiedsdekkend te kunnen vullen, is de data aangevuld met detaillodingen (havens).

Laseraltimetrie data werd in 1996 nog niet ingewonnen. Topografische data is gebruikt om de singlebeam vaklodingen aan te vullen. De opnames hebben plaatsgevonden in de periode 30-07-1996 t/m 14-01-1997.

Overige topografische data (dijken, platen, oevers etc.) is echter niet meer beschikbaar. Het grid is daarom aangevuld met de topografische data uit het bestaande bodemhoogte grid van 1996 waarvan de herkomst onduidelijk is.

Het samenstellen van de data is hierdoor afwijkend t.o.v. ecotopenkaarten in latere jaren. Het lodingsdatagrid (vaklodingen en de aanvullende lodingen) is hier 'over' het bestaande bodemhoogte grid van 1996 gelegd zodat het aangevuld is met de topografische data.

De singlebeam vaklodingen zijn in vakken opgenomen (figuur 3):

Vak 1 bestand: 0100p9602 periode: 02-01-1996 tot 23-03-1996
Vak 2 bestand: 0200p9601 periode: 10-01-1996 tot 05-06-1996
Vak 3 bestand: 0300p9601 periode: 16-02-1996 tot 03-06-1996
Vak 4 bestand: 0400p9601 periode: 19-02-1996 tot 17-04-1996
Vak 5 bestand: 0500p9601 periode: 22-02-1996 tot 30-07-1996
Vak 6 bestand: 0600p9601 periode: 05-02-1996 tot 02-08-1996
Vak 18 bestand: 1800p9601 periode: 17-01-1996 tot 31-01-1996


De originele data van vak 1 is niet meer beschikbaar. Derhalve is voor vak 1 het bestaande ESRI grid gebruikt (g1_1996).

Aanvullende surveys (singlebeam):

Koopmanshaven	bestand: 0617p9601	datum: 06/09/1996
Aanloop Sloehaven	bestand: 7003p9601	datum: 02/04/1996
Sloehaven (buitenzijde strekdammen)	bestand: 7004p9601	datum: 08/10/1996
Sloehaven Vlissingen		datum: april 2001
Buitenhaven Vlissingen	bestand: 6101p9601	datum: 01/10/1996 02/10/1996
Total steiger (multibeam)	bestand: 0542p9601	datum: 13/02/1996
Hansweert buiten	bestand: 0361p9601	datum: 02/04/1996
Buitenhaven Hansweert	bestand: 6201p9601	datum: 28/05/1996
Haven Kruiningen	bestand: 0201p9601	datum: 11/07/1996
Haven Perkpolder	bestand: 0232p9601	datum: 15/01/1996
Westbuitenhaven Terneuzen	bestand: 6001p9601	datum: 01/08/1996
Oostbuitenhaven Terneuzen	bestand: 6002p9601	datum: 01/07/1996
Handelshaven Breskens	bestand: 0627p9601	datum: 09/01/1996

Dieptegegevens van de Sloehaven zijn niet beschikbaar voor 1996. Dit gebied is opgevuld met data uit het 2001 grid.

De raaiafstand in de vakken 1 t/m 3 is 100m; in de vakken 4 t/m 6 en 18 is de raaiafstand 200m. De raaiafstand van beide oevers in vak 6 is 100m. De singlebeam data is geïnterpoleerd m.b.v. de applicatie Digipol. Daarbij zijn de instellingen gebruikt die vastgelegd zijn in de "Dienstbeschrijving Zoute Ecotopenkartering".



Figuur 3 Ligging vakbladen van de singlebeam vaklodingen

De stappen die gevolgd moeten worden om alle data tot een volledig raster te combineren, staan uitvoerig beschreven in de "Dienstbeschrijving Zoute Ecotopenkaarten". Het eindresultaat is een bodemhoogtekaart, een raster met celgrootte 20x20m.

De bodemhoogtekaart is niet alleen nodig voor het samenstellen van de ecotopenkaart maar ook voor de berekening van de droogvalduurkaart en de stroomsnelheidskaart. De productie van de bodemhoogtekaart is daardoor een kritische factor binnen het proces.

Voor het samenstellen van de ecotopenkaart van de Westerschelde wordt de grens tussen sublitoraal en litoraal bepaald op basis van de droogvalduurkaart; zie verder H3.1.3. Binnen het sublitoraal worden de volgende klassengrenzen gehanteerd op basis van de bodemkaart (Walburg & de Jong, 2014):

Klassengrens (m)	Omschrijving
\leq NAP-7m	Diep water (diep sublitoraal)
$>$ NAP-7m	Ondiep water (ondiep sublitoraal)

3.1.3 Droogvalduur

Voor de droogvalduurkaart is de M2-component van het getij de basis van de berekeningsmethodiek. Om de methodiek te kunnen toepassen moet er voor de Westerschelde een M2-amplituderaster en een M2-middenstandsraster berekend/beschikbaar zijn.

Voor het jaar 1996 is de droogvalduurkaart gebaseerd op de bodemhoogtekaart van 1996, en de opgetreden waterstanden in de periode 1993 t/m 1996 van de meetnetlocaties CADZ, VLIS, BORS, TERN, HANS, BAAL, BATH, LIEF, KALO en ANTW.

De toegepaste methodiek staat uitvoering beschreven in de "Dienstbeschrijving Zoute Ecotopenkaarten".

De droogvalduurkaart is nodig om de geomorfologische kaart te kunnen afsnijden op dan wel te extrapoleren naar gemiddeld laagwater (GLW), de grens tussen het litoraal en sublitoraal. Hiervoor wordt de 4% droogvalduur aangehouden.

De klassengrenzen van de droogvalduurkaart die voor het samenstellen van de ecotopenkaart worden gebruikt (Walburg & de Jong, 2014), zijn in het litoraal:

Klassengrens (%)	Omschrijving
4 – 25	Laag litoraal
25 – 75	Midden litoraal
75 – 85	Hoog litoraal
85 – 100	supralitoraal

3.1.4 Geomorfologische kaart - kartering

De kartering van de geomorfologische kaart wordt vanuit luchtfoto's uitgevoerd. Voorafgaand aan de interpretatie wordt een fotovlucht uitgevoerd. In 1996 zijn de luchtfoto's genomen op 6 en 17 juni 1996 (Loomans, P.M., 1997).

Het karteren van de geomorfologie is een bestaande dienst van de CIV, waarbij de specificaties voor de geomorfologische kaart vastliggen. Door voortschrijdend inzicht zijn de specificaties echter aangepast. Daarom hebben alle geomorfologische kaarten van de periode 1996 t/m 2012 een optimalisatieslag ondergaan (Walburg & de Jong, 2014)

Het strand bij Rammekens – Kaloot is volgens de specificaties in de geomorfologische kaart gekarteerd als P2c (hoogdynamisch vlak) op de hogere delen en P1a1 (laagdynamisch zandig) in de lagere delen. Er is echter nauwelijks bodemleven aanwezig (veldkennis in de regio). Afwijkend van de specificaties is dit gebied daarom geheel aangemerkt als P2a (hoogdynamisch laag gegolfd reliëf, met enig bodemleven in de lagere delen).

Voor toekomstige geomorfologische karteringen zijn de specificaties inmiddels aangepast in de "ProductSpecificaties Geomorfologische kartering v2.16". In bijlage III is een compleet overzicht van alle onderscheiden geomorfologische karteereenheden opgenomen.

3.1.5 Geomorfologische kaart - extrapolatie

De geomorfologiekaart wordt gekarteerd tot de waterlijn zoals die tijdens de fotovlucht aanwezig is. Om vergelijking van arealen in het litoraal door de tijd heen mogelijk te maken, wordt de geomorfologische kaart geëxtrapoleerd tot (en soms afgesneden op) de GLW-lijn, waarvoor de 4% droogvalduur wordt aangehouden.

De waterlijn tijdens de ene fotovlucht varieert ten opzichte van de andere. Hierdoor kan de situatie optreden dat door een hogere waterstand een laagdynamisch gebied aan de waterlijn ligt en in alle andere jaren een hoogdynamisch gebied. Dat ene jaar zou dan verkeerdt geëxtrapoleerd worden. Om dat te voorkomen is ter controle de voorgaande geëxtrapoleerde kaart erbij gehouden.

De extrapolatie tot de GLW-lijn is een handmatige actie en is uitgevoerd volgens de specificaties zoals benoemd in de "Dienstbeschrijving Zoute Ecotopenkaarten".

3.1.6 Maximum stroomsnelheid

De stroomsnelheden zijn berekend met het model ScalWest2000 op een kromlijinig grid. Voor de ijking van het ScalWest model is data uit juli 2000 gebruikt (Dam & Jansen, 2002).

Voor de berekening van de stroomsnelheden wordt in het model de bodemhoogte aangepast op basis van de bodemhoogtekaart van 1996, aangevuld met de data van 1996 voor de havens. Is de data niet volledig genoeg, dan is aanvullende data van het dichtstbijzijnde voorgaande jaar gebruikt.

Uit de modelresultaten zijn op het kromlijinig grid de maximale stroomsnelheden voor eb en vloed bepaald. De maximum stroomsnelheidspunten van het kromlijnige grid zijn met Digipol geïnterpoleerd naar het regelmatig raster van 20x20m, volgens de procedure en instellingen zoals is vastgelegd in de "Dienstbeschrijving Zoute Ecotopenkaarten".

In het sublitoraal voldoen de stroomsnelheden niet in de ondiepe delen. Om dat te verbeteren is de ruwheid van de bodem voor het litoraal aangepast in het ScalWest2000 model (zie dienstbeschrijving). Daarmee kloppen de berekende stroomsnelheden in de ondiepe delen al beter, maar nog steeds niet voldoende om de in het ZES-1 rapport genoemde grens van 80 cm/s aan te kunnen houden. Daarom zijn, afwijkend van het ZES-1 rapport, voor de maximale stroomsnelheden de volgende klassengrenzen aangehouden in de ecotopenkaart (Walburg & de Jong, 2014):


Klassengrens (cm/s)	Omschrijving
≤ 70 cm/s	Laagdynamisch (sublitoraal)
> 70 cm/s	Hoogdynamisch (sublitoraal)

3.1.7 Zoutkaart

Zoutgrens ecotopenkaart

Een belangrijke gebruiker van de ecotopenkaarten is de projectgroep Evaluatie en Rapportage (onderdeel van de Vlaams Nederlandse Schelde Commissie- VNSC) ten behoeve van de 6-jaarlijkse toestandrapportages. Deze maakt gebruik van deelgebieden met vaste grenzen, o.a. gebaseerd op de gemiddelde zoutgehaltegradiënt, de zgn. OMES-vakken.

Voor de ecotopenkaarten is daarom de OMES-grens tussen polyhalien en mesohalien gekozen als de grens tussen zout en (sterk) variabel brak (figuur 4).




Figuur 4 De vaste grens van de zoutkaart op basis van de OMES-vakgrens polyhalien - mesohalien.

Bij de zoutkaart worden de volgende klassengrenzen gehanteerd voor de ecotopenkaart:

Klassengrens	Omschrijving
z	Zout (litoraal en sublitoraal)
v	(sterk) Variabel brak (litoraal en sublitoraal)

Berekende zoutgrens

Het jaargemiddeld zoutgehalte is direct van invloed op het voorkomen van belangrijke bodemdiersoorten en daarmee op het voedsel in de bodem zijn voor vogels en vissen. Daarom wordt per jaar de actuele ligging berekend van de grens zout – (sterk) variabel brak. Dit wordt gedaan door de gemeten chloridegehalten van de zoutmeetlocaties Hoofdplaat (HFPL), Overloop Hansweert (OVHA) en Baalhoek (BAAL) te combineren met de modelresultaten van Scaldis400 (Lievense, 2013). Voor ieder jaar wordt de afstand van deze grens ten opzichte van Vlissingen berekend en, samen met de vaste OMES-grens, in een grafiek gezet (figuur 5).




Figuur 5 De ligging van de berekende zoutgrens versus de vaste OMES-grens als afstand t.o.v. Vlissingen

Daarnaast wordt voor de zoutmeetpaal Baalhoek het gemiddelde zoutgehalte en de standaarddeviatie per jaar weergegeven; zie figuur 6. (De zoutwaarden van 1966 t/m 1996 zijn gemeten met een meetschip; (daarna zijn de zoutwaarden bepaald met de bovenste sensor op de meetpaal Baalhoek).

In deze figuur is tevens de zoutvariatie weergegeven, die op basis van gemiddeld zoutgehalte en standaarddeviatie wordt berekend volgens de formule: $\text{zoutvariatie} = (4 \times \text{standaard deviatie} / \text{jaargemiddeld zoutgehalte}) \times 100\%$. Dit is de maat in het ZES-1 rapport om te kunnen bepalen of er sprake is van een "weinig variabel zout" resp. "weinig variabel brak" dan wel van een "(sterk) variabel brak" gebied.

In de figuur is te zien dat bij Baalhoek de zoutvariatie gemiddeld groter is dan 100%, en daarmee is het zoutgehalte daar (sterk) variabel. Meer naar het oosten zal de variatie nog groter worden (door het lagere gemiddelde zoutgehalte) zodat het hele brakke gebied (sterk) variabel is.



Figuur 6 Van 1966 t/m 1996 is het zoutgehalte gemeten met een meetschip. Gemiddeld zoutgehalte en standaarddeviatie bij Baalhoek in de Westerschelde op de linker-as. De zoutvariatie is weergegeven op de rechter-as. Bij een variatie >100% is er sprake van (sterk) variabel brak i.p.v. weinig variabel brak.

4 De Zoute ecotopenkaart – het eindproduct

De ecotopenkaart is samengesteld volgens de procedure die is vastgelegd in het document "Vervaardiging zoute Ecotopenkaart" (de Lange & Davelaar, 2013). De totale legenda die van toepassing is voor de ecotopenkaart is in bijlage I gegeven. Hierin staan de codes van de zoute ecotopen met de (verkorte) omschrijving.

Ten opzichte van het ZES-1-rapport (Bouma et al., 2005) zijn enkele ecotopen anders gedefinieerd:

- hardsubstraat veen/klei is verder uitgesplitst naar hard/zacht;
- hardsubstraat steen komt alleen nog in het litoraal voor en niet meer in het supralitoraal;
- het ecotoop laagdynamisch supralitoraal is toegevoegd;
- de ecotopen "schor" en "pionierzone (potentieel schor)" zijn gedefinieerd op basis van vegetatiebedekking in plaats van op overspoelingsfrequentie; "schor" heeft een bedekking van > 50% en "pionierzone (potentieel schor)" heeft een bedekking van 2-50%.

De ecotopenkaart voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Het samenstellen van de kaart gebeurt op een uniforme wijze en is reproduceerbaar. De ecotopenkaarten zijn dan ook onderling goed met elkaar te vergelijken.

De ecotopenkaart en de basiskaarten zijn opgeslagen in de RWS-Geodatabase als digitale GIS-bestanden. De ecotopenkaart is ook in de Mapviewer toegankelijk voor gebruik.


Benaming ecotopenkaart:

- Ecotopenkaart_zout_WS1996 (vlakken)

Benaming basiskaarten:

- eKarteergrens_WS1996 (vlakken)
- eZout_WS1996 (vlakken)
- eGMK_WS1996 (vlakken)
- EBODEM_WS1996 (raster)
- EDVD_WS1996 (raster)
- EVMAX_WS1996 (raster)

Bijlage II geeft de ecotopenkaart Westerschelde 1996. Voor de belangrijkste ecotopen zijn de arealen gegeven; zie figuur 7.



Figuur 7 Arealen van de Westerschelde (Nederlands grondgebied) van 1996.

Literatuur


- Bouma, H., D.J. de Jong, F. Twisk & K. Wolfstein, 2005.** Zoute Wateren Ecotopenstelsel (ZES-1). Voor het in kaart brengen van het potentiële voorkomen van levensgemeenschappen in zoute en brakke rijkswateren. Rapport RIKZ/2005.024. Rijkswaterstaat, Middelburg.
<http://publicaties.minienm.nl/documenten/zoute-wateren-ecotopenstelsel-zes-1-a-dutch-ecotope-system-for-c>
- Dam, G. & M. Jansen, 2002.** Verbeteren van het SCALWEST model: eindrapport deel 1. Royal Haskoning
<http://publicaties.minienm.nl/documenten/verbeteren-van-het-scalwest-model-eindrapport-deel-1>
- Kers, A.S., L. Walburg, J. Bakker, A.H. Daane, D.J. de Jong, M. Schrijver, P. Lievense, L. Dekker & J. de Klerk, 2013.** Dienstbeschrijving Zoute ecotopenkarteringen. Rijkswaterstaat CIV/ZD, Delft / Middelburg.
- Kers A.S., D.J. de Jong & L. Walburg, 2014.** ProductSpecificaties Geomorfologische kartering v2.16. Rijkswaterstaat, Centrale Informatie Voorziening
- Lange, M. de, H. Davelaar, 2013.** Vervaardiging zoute Ecotopenkaart; documentatie werkwijze op basis van ArcGIS Modelbuilder. Grontmij
- Lievense, P., 2013.** Deelproduct Saliniteit tbv Ecotopenkaart 1996, Rijkswaterstaat ZD, Meet en Adviesdienst Zeeland
- Loomans, P.M., 1997.** Toelichting bij de Geomorfologische Kartering van de Westerschelde 1996. Rijkswaterstaat Meetkundige Dienst.
<http://publicaties.minienm.nl/documenten/korte-beschrijving-van-de-bevindingen-bij-het-gebruik-van-de-geo>
- Walburg, L., D.J. de Jong, 2014.** Aanpassingen ecotopenkaarten, Rijkswaterstaat.

Bijlage I Legenda zoute ecotopenkaart

ZES_CODE	VERKORT	OMSCHRIJVING
Z1.2x1	Hard substraat steen	Hard substraat steen in het litoraal
Z1.2x2h	Hard substraat veen/klei	Hard substraat harde veen/klei in het litoraal
Z1.2x2z	Hard substraat veen/klei	Hard substraat zachte veen/klei in het litoraal
Z1.3x2h	Hard substraat veen/klei	Hard substraat harde veen/klei in het supralitoraal
Z1.3x2z	Hard substraat veen/klei	Hard substraat zachte veen/klei in het supralitoraal
Z2.11x	Hoogdynamisch sublitoraal	Hoogdynamisch zacht substraat in het sublitoraal
Z2.122x	Laagdynamisch sublitoraal	Laagdynamisch zacht substraat in het diepe sublitoraal
Z2.123x	Laagdynamisch sublitoraal	Laagdynamisch zacht substraat in het ondiepe sublitoraal
Z2.21f	Hoogdynamisch litoraal	Hoogdynamisch fijnzandig litoraal
z2.21s	Hoogdynamisch litoraal	Hoogdynamisch slibrijk litoraal
Z2.221f	Laagdynamisch laaglitoraal	Laagdynamisch fijnzandig laag litoraal
Z2.221s	Laagdynamisch laaglitoraal	Laagdynamisch slibrijk laag litoraal
Z2.222f	Laagdynamisch middenlitoraal	Laagdynamisch fijnzandig middelhoog litoraal
Z2.222s	Laagdynamisch middenlitoraal	Laagdynamisch slibrijk middelhoog litoraal
Z2.223f	Laagdynamisch hooglitoraal	Laagdynamisch fijnzandig hoog litoraal
Z2.223s	Laagdynamisch hooglitoraal	Laagdynamisch slibrijk hoog litoraal
Z2.31x	Hoogdynamisch supralitoraal	Hoogdynamisch zacht substraat supralitoraal
Z2.320	Laagdynamisch supralitoraal	Laagdynamisch zacht substraat in het supralitoraal
Z2.x21	Pionierzone (potentieel schor)	Pionierzone en pre-pionierzone
Z2.x22	Schor	Schor / kwelder
V1.2x1	Hard substraat steen	Hard substraat steen in het litoraal
V1.2x2h	Hard substraat veen/klei	Hard substraat harde veen/klei in het litoraal
V1.2x2z	Hard substraat veen/klei	Hard substraat zachte veen/klei in het litoraal
V1.3x2h	Hard substraat veen/klei	Hard substraat harde veen/klei in het supralitoraal
V1.3x2z	Hard substraat veen/klei	Hard substraat zachte veen/klei in het supralitoraal
V2.11x	Hoogdynamisch sublitoraal	Hoogdynamisch zacht substraat in het sublitoraal
V2.122x	Laagdynamisch sublitoraal	Laagdynamisch zacht substraat in het diepe sublitoraal
V2.123x	Laagdynamisch sublitoraal	Laagdynamisch zacht substraat in het ondiepe sublitoraal
V2.21f	Hoogdynamisch litoraal	Hoogdynamisch fijnzandig litoraal
V2.21s	Hoogdynamisch litoraal	Hoogdynamisch slibrijk litoraal
V2.221f	Laagdynamisch laaglitoraal	Laagdynamisch fijnzandig laag litoraal
V2.221s	Laagdynamisch laaglitoraal	Laagdynamisch slibrijk laag litoraal
V2.222f	Laagdynamisch middenlitoraal	Laagdynamisch fijnzandig middelhoog litoraal
V2.222s	Laagdynamisch middenlitoraal	Laagdynamisch slibrijk middelhoog litoraal
V2.223f	Laagdynamisch hooglitoraal	Laagdynamisch fijnzandig hoog litoraal
V2.223s	Laagdynamisch hooglitoraal	Laagdynamisch slibrijk hoog litoraal
V2.31x	Hoogdynamisch supralitoraal	Hoogdynamisch zacht substraat supralitoraal
V2.320	Laagdynamisch supralitoraal	Laagdynamisch zacht substraat in het supralitoraal
V2.x21	Pionierzone (potentieel schor)	Pionierzone en pre-pionierzone
V2.x22	Schor	Schor / kwelder
B1.2x1	Hard substraat steen	Hard substraat steen in het litoraal
B1.2x2h	Hard substraat veen/klei	Hard substraat harde veen/klei in het litoraal
B1.2x2z	Hard substraat veen/klei	Hard substraat zachte veen/klei in het litoraal
B1.3x2h	Hard substraat veen/klei	Hard substraat harde veen/klei in het supralitoraal
B1.3x2z	Hard substraat veen/klei	Hard substraat zachte veen/klei in het supralitoraal
B2.11x	Hoogdynamisch sublitoraal	Hoogdynamisch zacht substraat in het sublitoraal
B2.122x	Laagdynamisch sublitoraal	Laagdynamisch zacht substraat in het diepe sublitoraal
B2.123x	Laagdynamisch sublitoraal	Laagdynamisch zacht substraat in het ondiepe sublitoraal
B2.21f	Hoogdynamisch litoraal	Hoogdynamisch fijnzandig litoraal
B2.21s	Hoogdynamisch litoraal	Hoogdynamisch slibrijk litoraal
B2.221f	Laagdynamisch laaglitoraal	Laagdynamisch fijnzandig laag litoraal
B2.221s	Laagdynamisch laaglitoraal	Laagdynamisch slibrijk laag litoraal
B2.222f	Laagdynamisch middenlitoraal	Laagdynamisch fijnzandig middelhoog litoraal
B2.222s	Laagdynamisch middenlitoraal	Laagdynamisch slibrijk middelhoog litoraal
B2.223f	Laagdynamisch hooglitoraal	Laagdynamisch fijnzandig hoog litoraal
B2.223s	Laagdynamisch hooglitoraal	Laagdynamisch slibrijk hoog litoraal
B2.31x	Hoogdynamisch supralitoraal	Hoogdynamisch zacht substraat supralitoraal
B2.320	Laagdynamisch supralitoraal	Laagdynamisch zacht substraat in het supralitoraal
B2.x21	Pionierzone (potentieel schor)	Pionierzone en pre-pionierzone
B2.x22	Schor	Schor / kwelder
overig	Overig	Overig
NoData	NoData	NoData

Bijlage II Ecotopenkaart Westerschelde 1996

Ecotopenkaart Westerschelde 1996




Legenda

- 2672 ha Schor
- 141 ha Pionierschor
- 325 ha Supralitoraal
- 693 ha Laagdynamisch hooggelegen litoraal
- 2671 ha Laagdynamisch middelhooggelegen litoraal
- 261 ha Laagdynamisch laaggelegen litoraal
- 3882 ha Hoogdynamisch litoraal
- 340 ha Hard substraat
- 418 ha Laagdynamisch sublitoraal
- 19283 ha Hoogdynamisch sublitoraal
- 72 ha Overig

Zie voor de inhoud van de beschreven legenda eenheden het Zoute wateren ecotopenStelsel (ZES.1):

H. Baumann, D.J. de Jong, F. Twiss, K. Wolfrum, 2005, Zoute wateren ecotopenStelsel (ZES.1), Rapport RINZ/2005/024, ISBN 90-569-3494-4 Rijswaterstaat, Rijksinstituut voor Water en Zee/RIWZ, Nidderlând

<http://www.vla.be/mbidat/publications/126667.pdf>



BIJLAGE III. Standaardlegenda geomorfologische kaart

1		2		3		4			
S	Schor/ kwelder	1	Gesloten vegetatie (≥50% bedekking)	a	Natuurlijke schorren				
				b	Kwelderwerken				
				c	Open plekken (Bedekking <25% binnen S1a/b)				
		2	Open vegetatie (<50% bedekking)	a	Primair schor (bedekking 10-50%)				
				b	Pollen (Bedekking 2-10%, >10 pollen/ha)				
				c	kwelderwerk				
3	Indifferente kreek (breedte 5-250m)	a	Meanderende kreek						
		b	Rechte onnatuurlijke kreek						
P	Plaat/slik	1	Laag energetisch	a	Vlak	1	Zand	Extra: w: water geen indicatie: droog	
				b	Laag golvend reliëf (H<0,25m, L10-25m)		2		Slibrijk zand
				c	Schelpdierbank	1	Mosselbank natuurlijk		
						2	Mossels cultuurperceel		
						3	(Japanse) oesterbank	d	Dichte bank >75%
				m	Matig dicht 25-75%				
		o	Open bank 5-25%						
		d	Kwelderwerk, kaal	1	2-dimensionaal, regelmatig				
				2	3-dimensionaal, onregelmatig				
				1	Zandrug				
		2	Hoog energetisch	a	Gegolfd reliëf (H<0,25m, L>25m)	2	Schelpenrug		
				b	Megaribbels (H>0,25m)	3	Schelpenrand langs dijk		
c	Vlak								
d	Ruggen	1	Zandrug						
		2	Schelpenrug						
		3	Schelpenrand langs dijk						
3	Water bodem onzichtbaar)								
K	Grote krekens in schor (bv Saeftinge) (B >250m)	1	Laag energetisch	a	Vlak	1	Zand	Extra: w: water geen indicatie: droog	
				b	Laag golvend reliëf (H<0,25m, L>10-25m)		2		Slibrijk zand
				2	Hoog energetisch	a	Gegolfd (H<0,25m, L>25m)	1	2-dimensionaal, regelmatig
						b	Megaribbels (H>0,25m)	2	3-dimensionaal, onregelmatig
		c	Vlak						
		d	Ruggen	1	Zandrug				
				2	Schelpenrug				
		3	Water (bodem onzichtbaar)						

H	Hard substraat	1	Natuurlijk (veen/kleibank)	a	<25% zandbedekking	Extra: z: Antropogene sporen geen indicatie: geen sporen
				b	>25% zandbedekking	
		2	Anthropogeen (glooiing/krib)	a	Dijkglooiing	
				b	Krib/havendam	
				c	Geulwandverdediging	
				d	Vooroeververdediging Schorrandverdediging	
D	Duinen	1	Natuurlijk			
		2	Anthropogeen			
O	Overig	1	Zanddam			
		2	Plateau			
		3	Wegen/paden			
		4	Getijdenhaven			
		5	Waterberging			
		6	Vloedmerk			