







A detailed engraving of a young woman's portrait, framed by a decorative border. The border features the text "VERIFIED LESKE" at the top and "A.D. 1782" on the right side. The portrait itself is enclosed in a circular frame with a textured background. The woman has dark hair styled up, a high forehead, and a gentle expression. She is wearing a dark coat over a white cravat and a patterned waistcoat.

*Tecum vivere amem, tecum obeam libens.*

*Eleonora Sophia Leske.*

# M V S E V M L E S K E A N V M

---

## REGNVM ANIMALE

QVOD

L.C.Cds. Ord.  
8-23-63

ORDINE SYSTEMATICO

DISPOSVIT ATQVE DESCRIPTSIT

D. L. GVSTAVVS KARSTEN,

SOCIET. NAT. CVRIOS. HALENS. SODALIS.

---

V O L. I.


Cum IX. iconibus piatis.

---

L I P S I A E,  
SYMPTIBVS HAEREDVM I.G. MÜLLERI.

1 7 8 9.


199722



QL  
71  
G3  
M32  
1789  
v.1  
c.1  
SCN4RB

V I T A

NATHANAELIS GODOFREDI  
LESKII.



**N**atus est NATHANIEL GODOFREDUS LESKE, qui naturalem scientiam ac oeconomiam docendo scribendoque summopere auxit, Muscaviae, Lusatiae superioris pago, die xxii. mens. Octobris anni MDCCCLII, patre **GODOFREDO LESKE**, verbi divini primum apud Muscavienses, deinde in pago Königswarte, postea in vico Nowodwor, non longe a Warsavia sito, ministro longe meritissimo, qui vivens adhuc filium, senectutis suae praefidium solatiumque praematura morte sibi erectum luget.

Contigit LESKIO quod paucis, et ad ingenium puerile formandum apprime utile est, ut tam in iis, quae ad puerile ingenium excolendum necessaria sunt, quam in severioribus litterarum studiis, quibus iuvenes ad academiarum studia solent praeparari, patrem praceptorum haberet, qui, quod in publicis scholis fieri vix potuisset, in quibus institutio secundum consuetudinem quandam procedit, cui ingenia accommodentur paene necesse est, cupiditatem rerum naturalium cognoscendarum atque indagandarum filii fovit, suo confilio rexit eumque his potissimum literarum atque scientiarum generibus, quae ad vitam cum laude gerendam et ad aliorum studia necessaria sunt, copiose ac liberaliter instituit. Adiit quidem decimo aetatis anno orphanotrophii Halensis scholam publicam; sed ob adversam valitudinem, ex distortis dorsalibus superioribus et collis inferioribus vertebris natam, quam tenellus puer, nutricis incuria, contraxerat, viroque optimo per universam vitam molestam admodum, ob pulmones compressos spiritumque coarctatum, atque ad aliorum morborum, quos postea perpeccus est, origines plurimum facientem, anno in schola hac publica exacto ad patrem rediit, qui illum, ad severiora studia

—

copiose praeparatum, decimo septimo aetatis anno ad studia in academiis ulterius prosequenda dimisit.

Lipsiam adiit, celeberrimam scientiarum bonarumque artium omnium mercaturam, ibique, ne animus ab eo, quod prosequebatur, studio, rerum nempe naturalium, deflesteret, nomen suum studiis medicinae dedit. Maxime autem has medicinae partes coluit, quae naturali philosophiae atque historiae arctiore conjugio junctae sunt, has enim scientias tantopere amabat, ut medicinam illarum gratia profiteri videtur. Hinc tanto iis animum studio applicuit, ut non solum praceptoribus summopere placeret, verum etiam aetate, qua alii scientiarum rudimenta discere cupientes audientium subsellia frequentant, munere docendi publico, in celeberrima literarum universitate, in qua ipse doctrinam suam hauserat, ornaretur. Placuit in primis ingenium Nostri morumque cultus LUDWIGIO, illustri quondam viro et de literarum universitate Lipsiensi longe meritissimo, qui non naturalem solum scientiam et universam medicinam liberaliter coluit, ac de utrisque praedclare meritus est, verum etiam quos ad scientiam peculiarem intensius agi animadvertebat, consilio reque iuvit. LESKIO vero contigit, ut necessitudine quadam cum praceptorre suo iungeretur ab eoque constitueretur ut rerum suarum academicarum inter studiosos aliosque curam gereret: unde suppetuit illi consiliorum de literariis rebus a praceptore petendorum opportunitas, ususque est illius instructissima bibliotheca, apparatu physico splendidissimo et collectione corporum naturalium copiosissima hoc in primis commodo, ut quae alii fugiente quasi oculo conspi ciunt, consuetudine quadam usuque familiari ipsi innotescerent. Stipendium autem, quod his laboribus meruit, effecit, ut pecunia ad prosequenda studia necessaria suppeteret. Anatomicae praesertim scientiae operam

  
operam dedit plurimam, nec solum demonstrationes cadaverum anatomicas vidit, verum ipse quoque cadavera incidit, quae ipsi exercitationes, animalium anatomen postea exponenti, plurimo usui fuere. Omnemque medicinam hoc studio coluit, ut in exercenda illa sibi aliisque sufficeret: sed quam studiose dicerat et callebat, medicinam, non exercuit, medica tamen sua scientia in instruendis dirigendisque commentariis de rebus in scientia naturali et medicina gestis, nec non veterinaria medicina novis experimentis augenda et in praelectionibus de naturalibus corporibus in humanae vitae commoda vertendis et noxis eorum avertendis commode usus est. Nec inter severiora studia elegantiores literas neglexit, scripsitque (quod opusculum e lucubrationibus literariis, quas postea copias edidit, primum est) gratulatoriam epistolam de difficultate Homeri carminum in vernacula linguam ita transferendorum, ut ingenio poetae nihil detrahatur.

Academiarum studia qui tanto studio, **LUDWIGIO** in primis duce, prosequutus erat, aliis ut professe docendo posset et academicis doctoris munus consequeretur, anno **MDCCLXXIII.** supremam in philosophica facultate dignitatem assequutus est, disputatione edita de vegetabilium propagatione: facultas autem ad publicas praelectiones instituendas ipsi data est, edito specimine, quo indicem piscium, qui in Lipsiensibus aquis vivunt, exhibuit. Quae ingenii atque doctrinae praeclera specimen effecere, ut cum applausu dissentium plurimo naturalem historiam profiteretur et eodem anno, quo pisces Lipsienses recensuerat, **MDCCLXXV** nempe, munus naturalem historiam extra ordinem publice docendi cum CC. imperialium stipendio a Potentissimo Saxoniae Principe Electore ipsi demandaretur.

Quae insitae virtutis atque doctrinae praemia, praematura, si aetatem, vigefimum enim tertium vitae



fluae annum nondum superaverat, cum professoris historiae naturalis extraordinarii munere ornaretur, matura vero atque meritissima, si ingenii cultum et doctrinae copiam respicias, effecere, ut omni, quo poterat, studio, et maiori fane, quam naturalis corporis sui infirmitas ferre posset, animum ad excolendam ulterius disciplinam, quam profitebatur maxime, applicaret. Corpora naturalia colligendo, ordinando, pisces praeparando, exsiccando et secundum generum atque specierum essentiales notas ordinando, plantas exquirendo, siccando, ordinando, infecta venando, lapides colligendo parcus, quod ipfi supererat, otium consumebat, et ut tempus ad praelectiones et ad alia literarum studia sufficeret, sera nocte rus sylvasque petebat, sub dio ad orientem usque solem dormiturus et primo mane omnia, quae natura offerebat, conquisitus. Quae diligenter collecta congestaque in ordinem in discentium utilitatem, deinde aucta magnopere, conquisitis ex quocunque terrarum angulo corporibus naturalibus, thesaurum confituant rerum rararum, preciosarum et magnis sumtibus vix parabilem copia instruunt, praeclaro, quo omnia digesta atque disposita sunt, ordine, commendabilem omnibus, qui naturae studio delectantur.

Non autem in historia naturali exponenda id solum respexit, ut ordinibus corporum naturalium, classibus, generibus atque speciebus constitutis, notas tantum corporum distinctivas enarraret modumque quo natura ab alio ordine ad aliud procedit, quae quidem non omisit, probantia quippe, omnia in natura nexu quodam esse consociata, cum quo ipsa semper ad alia procedat, id vero potissimum egit, ut constitutis classibus atque ordinibus, singulorum corporum naturalium naturam, utilitatem, noxas exponeret, modosque, quibus utilia in suos usus vertere, nocua vero aut

ayer-

avertere, aut in commoda sua vertere homines possent. Eoque modo scientiam per se iam satis utilem generi humano utilissimam effecit, utilitates in primis demonstrando, quae ex naturalium corporum ususque, quem habent, exacta cognitione in oeconomiam, agrorum praesertim culturam artificiaque resultant omnia. Incitatbat nempe eum humanae felicitatis promovendae cupiditas, ut, quae scrutando atque explorando didicerat, ad vitae humanae usus accommodaret, hinc in primis agrorum culturae omnibusque, quae ad oeconomiam spectant, operam dabat. In quibus studiis iuvabatur admodum, cum anno MDCCCLXXVIII. in societatem oeconomicam Lipsiensem, membra honorarii dignitate reciperetur ipsique postea rerum societatis gerendarum cura demandaretur. Servabat, pro munera ratione, antiquum societatis splendorem eumque augebat, sodalibus compluribus, tam Germanis, quam exteris, qui doctrinae, experientiae atque industriae famam adquisiverant, adscitis, quorum viribus effectum est, ut societas plurimum ad agrorum culturam perfectiorem reddendam artificiaque humana excolenda praestare posset. Ipse quoque propositis multis, praesertim ad agrorum culturam pertinentibus, quae in Saxonie quibusdam partibus perverse tractata non tantum emolumenti dabant, quantum dare potuisset secundum iustas naturae leges tractata, effecit quidem, ut cognosceretur posse et debere agrorum cultum corrigi, per hunc pecudum copiam augeri, quae ruralis oeconomiae partem principem constitutat, verum id non efficere potuit, ut, quibus antiqua consuetudo sanctitatem quandam dederat, opinionibus eversis, legibus sublatis, saeculo quidem, quibus datae erant, non vero nostrorum temporum ingenio idoneis, praeiudiciisque ex hominum animis depulsis et veritate restituta, quae meliora atque utiliora videbantur, in communes usus verterentur eaque ruricolae experientur, quae commoda utiliaque fore ipse

❧

praeviderat. Obstat non raro is quoque animus, quo  
privata utilitas plurimorum saluti praferri solet. Ea-  
que Noſter tolerare quum nollet, Secretarii munere fe-  
abdicavit, principibus tamen viris placuisse, quae pro-  
posuerat, vidit, eodem anno professoris oeconomiae  
ordinarii munere, cum novo CC imperialium stipendio,  
ornatus, cui, quod omnibus notum est, et docendo  
et scribendo cum plurima laude praefuit, in primis au-  
tem scribendo, praeiudiciis quibusdam oeconomiae ru-  
rali pestiferis acriter confutatis et prospere expugnatis.

Qui agros colebant in Saxonia et aliis quibusdam  
Germaniae regionibus solo longe maiorem fertilitatem  
conciliari putabant, si, ubi cultum per aliquot annos  
fuisset variasque fruges exhibuisset, per anni spatium  
quiesceret hacque mora novam quasi ad novas fruges  
progenerandas vim acquireret. Gramina herbasque  
alias in novali tali solo crescentes pecoribus pascendis  
adhibent, praediorum autem equestrium domini privi-  
legio ut plurimum gaudent, anni quodam tempore ex-  
acto pecora sua graminibus in his noualibus agris sponte  
crescentibus pascendi. Idque agros colentibus plurimo  
est incommodo atque detimento: grama enim uti-  
lesque herbae absque cultura parcius prognoscuntur,  
exesa etiam a pecoribus prius quam ad maturitatem iu-  
flam perveniunt, hinc ruricolis pabulum deest alendis  
pecudibus idoneum, desunt frumenta et ad stercoandum stramina. Lege insuper cavetur ut plurimum, ne  
agricolae plus ruris, quam ferre volunt dynastae, co-  
lant utque agrorum partem satis magnam incultam  
sterilemque ad ovium pecudumque pascua finant. Inde  
ruricolis graminum herbarumque aliarum, quibus pe-  
cudes in stabulis commode vescuntur, serendarum li-  
bertas aut nulla est, aut tali modo circumscripta, ut  
earum copia vix unquam tanta sit, quae pecudibus  
pro praediorum agrorumque magnitudine et sterco-  
rationis

—

rationis necessitate alendis sufficiat. Ipsi etiam dynastae, priuilegio gaudentes, agros post messem, priusquam fruges iterum ferantur, pratorumque gramina usque ad statum tempus depascendi, vix permittunt, ut rustici herbas graminaque pecoribus alendis idonea artificiose colant, prata stercorent eoque modo graminum proventum accelerent augeantque, neque ferunt prima messe exacta, ut vegetabilia ad hominum et pecorum alimoniam idonea in eodem, qui frumenta jam dederat, agro, colantur, eo consilio, ut sua pecora in his agris alimoniae majorem copiam, sed aridae saepe atque succi expertis, habeant. Quod sane frugum proventum minuit admodum et cum agricultae pecorum tantam copiam, ob pabuli idonei defectum, alere non possint, quae agris pratisque debite stercorandis sufficiat, efficit, ut ex incultis agris ruricolis redditus nullus, ex cultis parcus, agrosque colentium hominum conditio talis sit, quae a felicitate, quam natura illi adjunctam esse voluit, absit quam longissime.

Isque perveritus usus, qui a longissimis inde temporibus, ob defectum incolarum, agricultarum ignorantiam, stultam in consuetudine veteri hominum pertinaciam, principum et procerum in rebus oeconomicis incuriam, pecudum cultum neglectum, in Germaniae universae et Saxoniae multis regionibus invaluerat, movit nostrum, ut opera, quam ad vitae suae finem usque studio plurimo prosequutus est, magna aequa ac laudabilissima cum audacia quadam (callebat enim ex dynastis et praediorum dominis adversarios plurimos natum, multumque operae et sudorum fore necessarium, ut antiquus privilegorum valor minueretur et rusticis agrorum suorum, modo, quo vellent, colendorum libertas redderetur) priscae in agrorum cultura incuriae sece opponeret agrorumque cum majore emolumento colendorum, et pecudum in stabulis alendarum probam commodam.

~~~~~

modamque rationem traderet. Quod in prolusione aca-  
demica, ad audiendam orationem scripta, qua munus  
professoris oeconomiae publici ordinarii auspiciabatur:  
de agri noualis cultura et ratione pecudes in stabulis pa-  
scendi, effecit, quam Schubartus von Kleefeld, ger-  
manice versam scriptis suis oeconomicis deinde inseruit.  
Qui libellus etsi in Germania non primus erat, in quo  
simplicissima et naturae reique publicae emolumento ac-  
commodata maxime haec agrorum colendorum ratio  
traderetur, inter primos tamen, ob argumentorum gra-  
vitatem, quibus proposita defenduntur, habendus est,  
quem etiam omnes, qui agrorum colendorum peritiam  
habebant, laudabant admodum probabantque.

Demonstrabat in primis hoc libello, in satis magna  
Germaniae parte tertiam, quartam, saltim sextam agro-  
rum partem incultam jacere civesque hac frugum parte,  
quae in his agris provenire possent, destitui, hanc vero  
intermissam per annum agri culturam agro fertiliori red-  
dendo parum vel nihil conferre, qui laetiores quidem se-  
getes, sed ideo exhibit, quod stercora per medium fere  
aestuatem solo mixta magis computruerint, imo adimi-  
vim solo nocuus et inutilibus herbis ac radicibus, pre-  
fertim tritici repentis, copiose ingeneratis, quae et ope-  
ram facestant in extirpando, et segetum proventum in-  
crementaque praefocent. Debere hinc agros quotannis  
coli et frequenter stercorari, pro soli tamen natura va-  
rie: ad stercorandum autem pecudibus et straminibus,  
ad pecudes vero pabuli et recentis et sicci copia opus es-  
se: stercoranda quotannis esse prata pecoraque omnia ab  
iis arcenda, et quum pratorum copia utplurimum vix  
tanta sit, ut justam cum agris proportionem habeat, di-  
visis inter ruricolas communibus pascuis, sublatisque  
juribus pascuorum et fundorum servientium, prata esse  
augenda et herbas ad pastum utiles ferenda: nec permit-  
tendum esse ut pecudes in pascuis pascantur, quae pedi-  
bus



bus suis plus pabuli corrumpant, quam ad earum alimoniam necesse sit, efficiant quoque saepius ut utilium graminum radices computrescant: et quum mala utplurimum duraque gramina pascuis minus cultis innascantur, carnes pecudi decidere, lac deficere, ob alimentum et idoneum minus et durum bonique succi expers et corporis sub immitti saepe coelo nocuas affectiones. Praeflare hinc rem pecuariam ita instruere, ut aut in stabulis amplis, mundis, aeri libero perviis, aut sub dio, in area sepibus praclusa, substratis straminibus, ne stercora perdantur, et facultas ad corpus in libero aere movendum pecudibus suppetat, pabulum praebeatur, eumque in finem ubi naturalia prata gramina non largiuntur, quae sufficient, artificialia prata, serendo herbas graminaque, quae et laete proveniant et perdurent, efficiantur: ovi- bus adeo alendis hunc modum esse maxime idoneum, quarum adeo lanae exinde nobiliores evaserint.

Quae libro hoc in vulgarem usum scripto proposuerat, auditoribus, quos copiosos in oeconomicis praelectionibus habuit, exponebat, demonstrabat experimentis et institutis et ad demonstrationem allegatis. Eoque modo, quum plures auditores haberet, qui aut prae diorum domini jam essent, aut acquirendorum spem haberent, docendo effecit, ut quae exposuerat demonstraveratque justae agrorum culturae fundamenta, a multis in eum, quem requirunt, usum traherentur. Quae vero ipse experimentis profusionibus, quod quidem vehementer optabat, probare non poterat, ea vir magni inter Germanos nominis, candidus et ad veritatem cum pertinacia quadam tuendam atque defendendam natus, **Germanorum oeconomorum princeps, SCHUBARTUS von KLEEFELD**, qui quantum virum morte sua praematura perdiderit Germania, quantaque incrementa rationalis oeconomia exspectare potuisset, si inter vivos diutius mansisset, scriptis suis abunde comprabavit, hoc modo

—

modo exsequutus est, ut non solum plures Germanorum principes suam in oeconomia methodum admirarentur atque imitarentur, verum etiam ex regionibus longe disfisis homines ad explorandam, descendam, imitandamque suam, quam in oeconomia observabat, methodum, confluenter. Eadem in rebus oeconomicis, praesertim in agrorum cultu, principia, idem animus veritati studens atque desiderio humanae prosperitatis augendae flagrans, eadem in tuendis, quae vera esse usus comprobaverat, pertinacia, utrosque hos clarissimos viros ita conjunxit, ut consociatis animis atque studiis non solum arctissimo amicitiae vinculo conjungerentur, verum etiam auctis in utrisque per societatem in veritate defendenda severitate et in exercendis his oeconomiae verae fundamentis constantia plurimum conferrent ad meliorrem atque utiliorem oeconomiam efficiendam, saltim ad demonstrandum quanta quamque perniciofa labe recepta haecenus in oeconomicis rebus consuetudo laboraret.

Praeter oeconomiam naturalem historiam indefesso studio docebat tractabatque, cujus elementa in peculiari libro bis edito et in alias quoque linguis translato ad praelectionum academicarum usum conscripsit. Isque liber ob pulchrum lucidumque ordinem, quo exposita sunt omnia, doctis viris placuit admodum, eamque in primis ob causam naturalis historiae studiis commode inservit, quod characteres distinctivos tam in vernacula lingua, quam latina exprimat, usum, quem singula corpora naturalia ad vitam humanam habent, enarret, librorum praestantissimorum titulos nec non varietatem nominum in exterorum linguis notatam contineat. In academicis vero praelectionibus omnia clare exponebat, dissectionibus animalium institutis eorum interiorem naturam demonstrabat, allatis exemplaribus ex splendidissima naturalium corporum collectione sua dicta illustrabat, nec putabat cum utilitate discentium multa natura-



Iem historiam doceri posse, nisi ipsi et generici et specifici characteres per ipsa naturalia corpora demonstrantur: incitari etiam discentes hac delectatione ad severiora historiae naturalis studia efficique ipsis corporibus demonstratis notisque cognitis, ut eadem a dissentibus et cognosci facilius et colligi in privatos usus possent.

Praeter naturalis historiae elementa, de quibus diximus, alia et praeflantiora opera ad eam pertinentia editi. BOHADSCHII librum de marinis animalibus minus cognitis, nec non IACOBI THEODORI KLEINII historiam echinodermatum additamentis auxit, lucubratiuncula etiam de aculeis echinorum marinorum adjecta, quae omnia latine edita peculiarem librum constituant. Colligit etiam ex scientiarum societatis regiae Anglicae philosophicis transactionibus tractationes ad naturalem historiam, physicam practicam et oeconomiam pertinentes easque in vernaculam versas et aliquot voluminibus comprehensas edidit. Vermium autem naturalem historiam amplificavit admodum novisque inventis locupletavit, edito exiguae quidem molis, at magni ponderis, plurimi experimenti ac studiosae observationis opusculo: de vertiginoso ovium peculiari morbo et taenia hydatigena cerebri, causa ejusdem, quod Lipsiae, anno MDCCCLXXX. typis expressum est. Animadversum quidem jam ab aliis erat, oves hoc sporadico vertiginoso morbo frequenter tentari eumque semper esse mortiferum, quibusdam adeo veram illius causam, hydatidem nempe in cerebro natam, non ignorantibus, sed nec sedes mali, nec natura hydatidum probe notae erant. Primus Noster per experimenta et cadaverum incisiones demonstravit, hydatides in vertiginosis hoc modo factis ovibus in cerebro ipso sedem semper habere, grandiores in medullari cerebri substantia, minus grandes in cerebri ventriculis residere, hydatides ipsas cum cerebro immediato nexo non esse junctas, hydatigenas vero taenias

—

taenias cerebro exacte adhaerere, ipsi impactas, cerebrum his in locis quasi erosum ac putredine consumptum ex naturali suo situ ab hydatidum mole eversum esse, in reliquo vero corpore, ob adversam ex cerebro turbato valetudinem, mutationes plurimas observari, intestinorum angustiam, intestina sanguine turgida, inflammatas, secundiarum nomine insigniendas, nec non connexos primario morbos, a taeniis hydatigenis aliis, fasciola hepatica, rel. repetendos.

Antiqua autem etsi erat opinio **TYSONI**, qua hydatidum verminosae origines statuebantur, quam praelari in naturali historia viri, **LINNAEUS**, **PALLAS**, **GÖTZIUS**, **WERNERUS**, experimentis copiose factis veram et indubitatem demonstraverunt, nec temporibus, quibus Noster libellum hunc scribebat, haec incognita erant; origines tamen ovilli hujus morbi vertiginosi, quas quidam in hydatidibus esse fitas, dubitanter tamen, affirmaverant, a taeniis hydatigenis ignotae penitus erant, prius quam **LESKIUS** illas experimentis et cadaverum incisionibus, vere anni **MDCCLXXIX** in praedio Illustrissimi Comitis **VITZTUM** von **ECKSTÄDT** institutis detegeret.

Copiosam jam per se taeniarum hydatigenarum familiam **LESKIUS** auxit, detecta hac in ovium cerebro vesicula. Inventi vero honor **GÖTZIO**, viro doctissimo, quum tribueretur a quibusdam, **GÖTZIO** non succensebat, sufficere causam aegritudinis utilissimi pecoris nosse reputans, nec interesse agros colentibus et rem pecuariam exercentibus utrum sua, an aliorum diligentia: nec commodi quicquam ex hujus generis contentionibus redundare. Amicitiam potius cum **GÖTZIO** quam communia studia effecerant, sancte coluit, inventi vero sui historiam descripsit eaque demonstravit se jam anno **MDCCLXXIX**, in annotatione quadam ad **TYSONI** de-



de taeniis hydatigenis tractationem inventi sui mentionem fecisse dubiis tamen verbis, quoniam oculis suis convenientia ad examinandum curiosius arma hoc tempore deerant. Ipsum deinde GÖTZIUM de hoc invento suo certiorem fecit, qui tamen taeniarum in his hydatidibus praesentiam in dubium vocabat primum, hydatidem enim in vini spiritu servatam examinaverat tantum, a LESKIO ipfi traditam, tempore vero vix multo interjecto HOFMANNO, optico Lipsiensi celeberrimo, scribebat, se, recentibus hydatidibus examinatis, perspexisse innumeras atomos in iis obvias, quibus organicam structuram antea vix tribuerat, et organicam habere structuram, et taeniarum hydatigenarum familiae accensendas esse. Gloria hinc taeniarum hydatigenarum in ovillo cerebro detectarum LESKIO merito vindicatur.

Multa etiam alia ad dilatanda historiae naturalis studia et ruralis scientiae emolumenta molitus est. Quae ad naturalem historiam, chemiam, caet. pertinent, ex commentariis instituti scientiarum Bononiensis excerpit et duobus voluminibus comprehensa edidit. Promptuarii etiam curam editionemque naturalis scientiae, mathezos et oeconomiae cum HINDENBURGIO, V. Cl. suscepit, separatis tamen postea, quae ad mathematicas disciplinas pertinent et curantibus Clarissimis Viris, HINDENBURG et BERNOULLI promptuarii peculiaris forma editis. Effecit autem hoc promptuario, ut, quae oeconomi observando atque experimentando didicerant, neque tamen typis mandata tale spatum comprehendunt, ut in libri formam redigi possint, cum omnibus oeconomicarum rerum cupidis communicarentur ac literarum quoddam commercium institueretur inter celebiores et prudentiores Germaniae oeconomos, quo cogitata sua atque experimenta facilius sibi aliisque communicare possent. Praeclara in primis hoc promptuario plurima continentur de agrorum ac pratorum cultura ad Nostri et SCHUBARTT mentem tractata deque emolu-

—

mentis quae vegetabilium ad pecudum alimoniam saturum cultura attulerit, ut merito putandum sit, hoc opere, in quo per singulos fere menses nova cum hac oeconomica administratione capta emolumenta enarrabantur, oeconomiae ruralis hunc modum, qui SCHUBARTI inventoris nomen ferebat, a multis, intellectis ejus commodis, in usum esse vocatum. Ejusmodi quoque fugitiva quasi opuscula, non multum operae in lectione facessentia lectorumque varietate quadam delectantia, ab his legi copiose solent, qui severiora lectiōnum studia alias non amant, indeque vix dubium est, quin multi in re, quae tam copiosa emolumenta promittat, aemulatione quadam incitati, aliquid saltim ad oeconomicam suam administrationem a fordibus purgandam effecerint. Noster sane, ubicunque poterat, oeconomiae rationalis, quae dederat, fundamenta strenue adseruit, SCHUBARTUM, agricolarum antiqua praejudicia acriter oppugnantem, defendit, severe et cum impetu quodam ab amico suo prolata grata quadam verborum blanditie mitigavit effecitque ut amici sui suaque proposita displicerent paucis, placerent plurimis et a permultis in oeconomiae reformandae usum traherentur. Addidit Noster ex physicis et ad naturalem historiam pertinentibus quae prodeesse et lectionis vicissitudine quadam delectare possent.

Commentarios de rebus in scientia naturali et medicina gestis, quorum editionem LUDWIGIUS cooperat, ut lingua, quam omnes docti viri scirent, novarum et annotatione dignarum rerum, quas scire interest medicis et naturae indagatoribus, scientia ad omnes doctos viros per Europam pervenire posset, quibusque solis haecenus exteris perspicere licuit quaenam Germani in medicina et naturali scientia moliti fuerint efficiantque, post REICHELII obitum, qui curam eorum post LUDWIGI deceplum non absque doctorum virorum probatione

pluri-



plurima susceperebat, a Volumine xxv. usque ad xxviii edidit, adscitis in laborum consortium celeberrimis in Germania medicis et naturae indagatoribus. Copiosas censuras librorum ad naturalem scientiam pertinentium ipse elaboravit et diligenter studuit, ut hi commentarii et mature et ornate satis ad viros Germaniae aliarumque terrarum doctos pervenirent.

Amplissimum autem opus ad naturalem scientiam, oeconomiam universam et technologiam suscepit, sed, proh dolor! non ad finem perduxit, iter suum per Saxoniam describendo, cuius prima pars impressa nitidissime et ornata omnibus, quibus argumenti gravitati per formae splendorem cultus quidam addi possit, in primis vero tabulis aeneis copiosissimis et artificiose a Richtero delineatis et Schönbergio sculptis, ex parte quoque coloribus distinctis, ad modum, quo ABERLI Helvetiae alpès expresserat, Lipsiae, anno MDCCCLXXXV prodiit. Diu scilicet vir optimus propositum habuerat terras omnes Potentissimi Saxoniae Principis Electoris imperio subditas peragrandi, et quidem non citato pede, sed retardato cohibitoque, ut omnia, quae ad naturae historiam, physicam, agrorum culturam, oeconomicas scientias alias hominumque vivendi modum, cultum, artificiaque pertinerent, cognosceret intelligeretque quomodo agri colerentur, oeconomiae res transarentur, quae produxerat natura dederatque ad hominem utilitatem felicitatemque impenderentur, utque, ubi delinqui in his intelligeret, meliorem atque probatiorum modum proponeret. In primis mineralogiam respiciebat, quod studii genus amabat maxime et cum abundat Saxonia mineralium lectissimorum copia, praevidebat, fore ut plurima offenderet, quibus descriptis eorum scientiam posset dilatare, aut usu demonstrato, civium ex iis commoda quaestumque augere. Iter, libertate a Potentissimo Electore Principe ipsi data, anno



MDCCLXXXII. ingressus est, eaque aestate patiām ter-  
ram, superiorem Lusatiam, instrūctus copiose his, quae  
naturae indagationi inserviunt, peragravit, nec ex no-  
bilissimis atque clarissimis viris in his terris deerant, qui  
labores suos consiliis aliisque modis multifariis juvarent,  
ita ut provinciam hanc, qua patet, peragraret, ab iti-  
neris via, vbi notabilia conspicienda et examinanda  
erant, deflecteret, neque urbibus visendis inhaereret,  
sed pagis, villis, sylvis, montibus examinandis, col-  
lectis et in adversariis notatis omnibus, quae ad itineris  
finem aliquo modo facere viderentur. Nec pictor ipſi  
deerat, qui naturam, ubi aut laetior apparebat, aut  
singularia atque notabilia prodebat, plantas, insecta,  
mineralia, montium strata, et delinearet, et coloribus  
distingueret. Amplissima observationum utilium copia  
instrūctus domum rediit, aeri incidendas pīcturas cura-  
vit, iter ipſe elaboravit, regionum et locorum descri-  
ptione et observationum ubertate conspicuum, volebat  
enim, ut hoc opus posteris Saxoniam talem exhiberet,  
qualis suis temporibus fuisset indeque nihil eorum praef-  
termittebat, quae ad amplissimae regionis et hominum  
in ea viventium statum pertinere ipſi ullo modo vide-  
bantur.

Primus autem ex copiosis historiae naturalis in Sa-  
xonia scriptoribus extitit, qui Saxoniae universae histo-  
riam naturalem describendi animum haberet. Hinc  
omnia, quae ex animali regno. colligere poterat, dili-  
genter examinavit novasque species, insectorum praef-  
sertim, complures detexit, quarum etiam, sed paucif-  
simarum, icones in primo itineris tomo exhibuit (reli-  
quas musei Leskiani index dedit). Agrorum et pecudum  
cultum commendavit ubique ratione et exemplis, plures-  
que, vix putantes, fore, ut trifolium aliaque pecudi-  
bus utilia pabula in agris suis crescerent, horum cultu-  
ram docuit effecitque, ut ubi macra erant pecudibus per  
aesta-

aestatem parcaque per hyemem pabula, ea, et melioris quidem notae, utrique anni temporis sufficerent. Diligenter etiam notavit in quibusnam artificiis diversarum urbium incolae emineant et in quibus ipsa haec artifacia et faciliora et utiliora reddi possint. Maximam autem montium descriptioni, in primo saltim itineris tomo, operam dedit, notabilium ob faxorum naturam, strata situmque effigiem aeri incisam exhibuit docuitque atque demonstravit basalem terreno igni origines suas debere. Multas quoque observationes calcareos montes concorrentes exposuit. Plantarum et animalium descriptions alteri tomo reservavit, quem vero non edidit, aliis occupatus. Nec emptorum copia impensis ad splendidum hoc opus sumptibus respondebat.

Mineralogiae studia sublevavit, scriptis adnotacionibus atque additamentis ad WALLERII systema mineralogiae, quo ad praelectiones academicas usus est. Proprias etiam mineralogiae institutiones meditabatur, quarum editionem aliorum negotiorum gravitas, tandem mors intercepit.

Multa sane ad universitatis literariae Lipsiensis famam gloriamque, qua perpetuo floruit, conservandam atque amplificandam fecit, nec pauca tulit oeconomum in primis SCHUBARTI systema cum contentione plurima defendendo. Qui vero amicis omnibusque viris doctis laboribus suis satisfecerat, non tamen sibi satisfecisse putans, dies noctesque studiis operam dando transigebat ut adeo corporis valetudo, per se parum durabilis, inde laederetur. Physices professionem, post obitum FUNCKII, viri quondam clarissimi, petebat, ipseque cum HINDENBURGIO, V. Clarissimo amico suo et laborum socio inter eos nominabatur a senatu academico, ex quibus physices professor constitueretur. Quod munus etsi petebat, non tamen amico suo aduersabatur,

reputans plurimum interesse ut digno atque bene merenti viro professio demandaretur: indeque demandato **HINDENBURGIO** physicen docendi munere gratulabundus amicum adiit, laetus ob munus, quod ipse non obtinuerat, amico suo, viro dignissimo, oblatum. Ipse autem quum munus academicum vix aliud adspiraret, nisi cui sufficeret et digne praeesse posset, nec praeuideret, fore, vt alio munere ornari posset, disciplinis, quas colebat, accommodato, ipso scilicet oeconomiam atque naturalem historiam, **HINDENBURGIO** vero physicam docente, aliquoties quidem ad alias academias vocatus renuerat, officia patriae praeflenda aliis praefferens: splendide vero atque liberaliter Marburgensem literarum universitatem nuper cum ornasset Serenissimus Hassiae Landgravius, **WILHELMUS IX**, summa amplissima ad amplificanda academica studia collocata, doctisque hominibus pluribus cum amplissimis stipendiis ad universitatis gloriam augendam convocatis, viris praecipue, qui utilissimas medicinae et naturalium rerum scientias exponerent, **BALDINGERO**, V. Ill. quem amicum noster habebat, suadente, ipsi munus in hac literarum universitate camerales scientias atque oeconomiam docendi demandatum est. Non abnuebat, quod aliis occasionibus fecerat, amicis etiam suadentibus, quos consuluit.

Discessit Lipsia die 7 mensis Novembris anni **MDCCLXXXVI** cum conjuge liberisque, tempestate et gelida admodum, et ventola existente, Marburgum, ut novum munus auspicaretur, petiturus. Patriam sanus reliquit, flagrans desiderio perficiendorum eorum omnium in naturali scientia et oeconomia, quae et muneris ratio, et alia plurima Lipsiae interceperant. Sed iter ipsi si non exitio fuit, ad adversam tamen valetudinem, mox lethiferam, qua in ipso itinere affici coepit, constituit. Vix enim itinere duorum miliarium emenso curru cum conjuge liberisque euersus est, corpore tamen nec  
fuo,

  
suo, nec reliquorum euidenter laeso. Sed ventosum frigus, cui per aliquot horas sub dio exponebatur, usque dum leuato curru omnia in ordinem essent restituta idque atrox admodum, non sine valetudinis noxa sustinuit. Laetus quidem et sanus appareret sequenti die conjugis dilectissimae lectionis natalia festa celebrabat, amico aduersa, quae illi acciderant jocose prescribebat, prosequuto itinere cum plurimo ciborum desiderio prandebat, omniaque in corpore suo ita geri videbantur, ut et si infirmum nec antea constanti valetudine gauisum esset, tamen non essent, quae magni futuri morbi metum incuterent.

Verum aegrum jam antea corpus morboque diuturno ac rebelli affectum tantam valetudinis a frigore injuriam non sine noxa tulit. Herpetum acrimonia per plures annos corpori optimi viri insederat, cui praefocandae operam dederat, quam potuerat, maximam. Medicinis praesertim mercurialibus, et antimonalibus copiose sub qualicunque forma datis, hoc inimicum inquinamentum medici oppugnaverant, sed absque plurimo effectu: nec balnea, suadentibus et medicis, cui corporis curam mandauerat, REICHELIO atque DAEHNE, V. celeb. et amicis, neglexerat. Nimius tamen in mercurialium et aliarum potenter solventium medicinarum usu fuisse videtur, nec deflexit ab iis, herpetum exanthemate licet pertinaciter persistente et abdominalem regionem in primis occupante. Nec cum mihi prescriberet noxas suae valetudinis et quid ad eam instaurandam medici praeciperint meaque consilia intelligere cuperet, putavi fore, ut mercurialibus et potenter alterantibus medicinis multum proficeret, et diluentia et solventia ex saponaceorum vegetabilium genere, absque adstringione roborantibus interpositis, suasi, quae fane medicinae mihi, corporis simul non neglecto motu et studiorum intensitate circumcisae, utiliores visae sunt, cum laboriosa pulmo-

—

num atque viscerum abdominalium actio leuari quidem, verum ob vitium in vertebrarum dorsalium situ, quod ad herpetum inquinamenti primas origines contulisse saltim aliquo modo videbatur, corrigi penitus non posset.

Morbi lethiferi initia nausea fecit, altero die intineris, post cibos copiosos ingestos, Nostrum occupans. Colicos simul dolores percessus est, transeuntes quidem atque fugitivos, attamen et reddituros, tantamque spiritus difficultatem, quantam vix unquam in vita sua expertus fuerat. Quae tamen partim a cibis ingestis, partim ab aeris injuriis deriuabat, nec tanta erant, ut itineris persequendi propositum interciperent. Agebat e contra, ut Cassellos perveniret ibique mora itineris facta, medicos consuleret. Morbus vero in ipso itinere invaluit, quem tamen aegrotans ingratum itineris comitem et cum eo natum eodem absoluto decessurum rebat. Consulebat tamen Cassellis **FISCHERUM**, Serrissimi Hassiae Landgravii medicum cubicularium, qui medicamenta visceralia praecepit, in quorum usu semelius habere coepit. Abdominis affecti symptomatis profligatis persistabat atrox spiritus difficultas, quam ex pectoris praeter naturam angustata structura ipse explicabat. Adibat adeo eos, qui studiis Marburgensibus praeerant, amicosque, ipsum adeo principem, gratias ei pro splendidissima vocatione dicturus, exceptusque ab eo benevolē ac perhumaniter est, dimissusque confilio dato, ut valetudinem suam curaret. Quibus perennis urbem reliquit, itineris finem acceleraturus. Sed in ipso hoc itinere morbus tantum auctus est, ut inter seueniores spiritus angustias delirio etiam corriperetur. Morbo fere confectus, per itineris molestias aucto, Marburgum pervenit. Laetabundus eum excipiebat **BALDINGERUS**, ob amici, quem jamdudum dilexerat, adventum, tristis yero ob aduersum quem timebat,

morbi

[decorative flourish]

morbi exitum. Omnia molitus est ad morbum profiliandum felix hic atque doctissimus medicus, in curationis consortium etiam adscito Clarissimo viro, MICHAELIS, quorum vero coniuncta opera atroci morbo superando non suffecit. Vires quidem aegri paulisper augebantur, quiete ipsis redditia, morboque auspicator forma videbatur, ut adeo die xxv. Novembris lectum deferere, literas scribae mandare et ipse scribere posset, nec valde a morbi vi affici videretur: de praelectionibus adeo auspicandis cogitabat coenabatque cum plurimo ciborum desiderio. Etsi vero omnia laetiorem spem promittere videbantur, tanta tamen spirandi difficultas erat ut vix, nisi stans, res suas agere posset. Ejusdem diei vespertino tempore periculosiora omnia facta sunt, abdomine cum plurimo dolore intumescente. Vocati medici morbum, e periculo periculosorem factum, lethiferum fore praevidebant. Medicamenta dabant alvum leniter scientia, et respondit aliquoties alvus. Ipse Noster praevidit mortem, nec horruit humanarum calamitatum finem, quas crebras expertus fuerat. Abdomen interea magis et cum majori duritie intumuit, dolore etiam aucto. Noctu sopore correptus vix plurimo spiritum placide, quiete, sanorum instar duxit, mox vero convulsus leniter interiit.

Mortuum desideratissimi viri corpus MICHAELIS, V. Clariss. praesente BALDINGERO, V. Ill. incidit. Sinistrum abdomen maculas herpetum exanthematis complures exhibuit, eaedemque in brachio sinistri lateris observabantur. Sinister pulmo uno loco pleurae praeter naturam connexus erat: tertia costa ejusdem lateris quartae fere tota, media quintae costae pars sextae incubuit. Omnes sinistri lateris costae in media parte longe magis extenuatae, quam in extremis erant, quintae cartilaginea appendix cum sextae cartilagine connata erat. Dextri lateris

stae plus, quam per sanitatem licet, a se invicem distan-  
tes intercostales musculos extenuauerant admodum.

Sinister pulmo sanissimus erat, volumine tamen  
longe minor, quam secundum naturam esse debuisset,  
renem adeo sani hominis magnitudine non aequabat  
graciliorque erat, quam unquam in adultis esse solet.  
Quod a pectoris ossi in prima pueritia optimi viri lae-  
fione explicandum est, quae ob vertebrarum dorsalium  
et inferiorum colli versus dextrum latus distortionem  
tanta erat, ut liberum huic pulmoni locum non daret,  
ejus etiam cum reliqui corporis incremento intercepto.  
Dexter pulmo parvus praeter naturam, mole tamen  
sinistro major, caetera sanissimus erat. Pericardium in-  
cisum aquas vix ulla, cor vero praegrande exhibuit.  
In abdominis cavo aqua ad libram circiter effusa, fel-  
lis vesicula a bile vacua deprehendebatur: in hepate et  
ventriculo nil adversi visum est. Jejuni intestini pars  
totumque ileon admodum rubra et anatomico quasi ar-  
tificio cera rubra injecta deprehendebantur, augebatur  
autem in ileo rubedo eo magis, quo magis ad crassa  
intestina vergeret. Incisa praeter naturam constituta  
haec intestina et nervosam et musculosam tunicam in-  
flammatas exhibuerunt: sana caeterum crassa intestina  
erant. Vertebrae dorsales superiores et colli inferiores  
versus dextram et externam partem praeter modum fle-  
xae erant.

Eoque modo corpore ab itineris injuriis nimis af-  
fecto et intestinis occulte inflammatis desideratissimus  
vir interiit, cum sperare et sibi, et rebus suis prospera  
quaevis posset amplissimamque occasionem esset naclus  
naturae studium experimentis, observationibus, praee-  
lectionibus excolendi excultumque jam prosequendi ul-  
terius. Eam enim in primis ob causam Serenissimus  
Hassiae Landgravius Marburgensem suam literarum uni-  
versi-

  
versitatem amplissima pecuniae summa ditaverat, ut ad naturalium scientiarum studia tam docentibus, quam discentibus qualiscunque opportunitas conciliaretur. Callebat enim magnus is studiorum fautor patriorumque promotor eximius, non sufficere ad studia naturae, ut versatissimi in iis viri in universitatis consortium convergentur, sed alias quoque opportunitates requiri, eamque ob causam hortum botanicum restaurandum, theatrum dissektionibus anatomicis aptum extruendum jubebat, omniaque ita fieri, ut commodiorem studiis suis fedem Nofer vix optasset. Nec sane absque laboribus literariis otium Marburgense transegisset. Libris, quos scribere jam cooperat, elementorum historiae naturalis parte altera, botanica, tertiaque mineralogica (naturalem enim historiam universam in systematis formam, in praelectionum usum redigere volebat) historiae naturalis encyclopaedia, Fauna Saxonica, ad finem perductis editisque, catalogum naturalium corporum, quae ipse in museo suo asservabat, dare volebat, quo simul minus cognitorum generum atque specierum characteres essentiales continerentur.

Libri vero, quibus memoriam sui inter nos servavit servabitque ulterius, terso comptoque dicendi genere, quod veterum studio debebatur, lucidoque ac concinno expositorum ordine se commendant. In eo in primis praecellebat ingenium, ut distinctivas corporum notas, ordinemque adeo corporum naturalium maxime naturalem mox intelligeret. Hinc quo confusa magis genera et species corporum naturalium erant, quo magis dubii characteres, eo felicior fuit in illis constituendis, his vero eruendis, cuius ingenii in dispositione echinodermatum praeclarum specimen edidit. Oeconomiam universam libris editis non pertractavit, illius vero in popularem usum institutiones scribere instituerat: hanc vero descripsit, ex qua, quidquid utilitatis oeconomiae

mia habet, ceu ex primis fontibus deducitur. Eamque non a SCHUBARTO didicerat, sed librorum lectione, cogitatione ac observatione eorum, quae in communia agrorum cultura fieri videbat; primusque inter Saxones cum aucta re pecuaria, agriculturam scriptis publice libris commendabat.

Praelectiones, pro munera ratione, in historiam naturalem, camerales scientias et oeconomiam instituit. Naturalem historiam ab anno MDCCCLXXIX ad libri proprii ductum explicuit, qui tamen regnum animale tantum complectebatur. Ad minerale regnum exponendum in WALLERIUM additamenta ediderat. Res in praelectionibus dilucide et cum plurimo ordine explicabat plurimaque naturalia corpora auditoribus ex museo demonstrabat. Caeterum oratoriae arti in praelectionibus operam non dabat, sed naturali puraque dictione dicenda ita proponebat, ut nec fusus nimis videatur, nec contractis rebus explicatione dignis difficulter intelligeretur. Hinc omnes qui scientiis, quas proponebat, studebant eum lubenter audiverunt.

Multum etiam temporis, nec minus sumptuum, literario commercio impendit, quod cum amicis doctissime viris tam Germanis, quam exteris, habebat. Coluere, ex pluribus aliis, amicitiam suam literasque ad eum dedere inter Suecos Clarissimi viri BERGMANNUS, THUNBERGIUS, CEDERBAUM, MURRAY, inter Danos, MVELLERUS, EGGRERS, inter Gallos BROUSSONNET, inter Italos, VOLTA, SCOPOLI, ALLIONI, inter Russos, PALLAS, FERBER, CAROSI inter Polonos, inter Germanos, BLOCHIUS, MURRAY, NICOLAI, BALDINGER, GRUNER, ROMANUS, WERNER, WESTRUMB, CRELL, SCHROEDER, VOIGT, GMELIN. Multos ex amicis recta sua mente sibi conciliaverat, ac doctrinae, qua florebat fama, nec parciores, ob communia



munia cum aliis studia habuit. Prosequuti etiam eum sunt favore singulari, Serenissimus Princeps haereditarius Rudolfstadiensis, nec non Serenissimus Princeps de Fuerstenberg.

Virum ob doctrinae copiam summopere aestimatum doctorum hominum societates plurimae in consortium literarium adsciverunt, Societas imperialis libera Petropolitana; Societas Regia patriotica Stockholmien-sis, moralium atque oeconomicarum scientiarum Bavaria Burghausensis, physiographica Lundensis, medicinae regia et musei Parisiensis, naturae curiosorum Berolinensis, Tigurina, societas in artium et scientiarum emolumentum Francofurtensis, oeconomica Lipsiensis, scientiarum et aparia in Lusatia superiore, nec non Regia scientiarum Bohemica. Societas Regia scientiarum Gottingensis socii correspondentis nomen illi dedit.

Vitam duxit, qualis a viro expectari potest, qui ad humani generis felicitatem, quidquid poterat, libenter ac studiose, imo cum propriae valetudinis detri-  
mento quodam contulit, probam reclamque. Deum sancte coluit ejusque cultum magni fecit. Superstitio-  
nem in omnibus rebus odio prosequebatur, verus natu-  
rae cultor, qui usu didicerat, quantum superstitione prae-  
judicataeque opiniones naturalium scientiarum progres-  
sui obsuerint. Bonus vir erat in quo nihil ficti, nihil  
simulati, plurimus candor, mens justi tenax erat: eam-  
que mentem suam non oratiunculis ingeniose excogita-  
tis demonstrabat, sed agendo atque faciendo, quae  
animo sentiret, prodebat.

Conjugem duxit ineunte anno MDCCCLXXX. SO-  
PHIAM ELEONORAM MUELLERIAM, JOANNIS GODO-  
FREDI MUELLERI, bibliopolae Lipsiensis non ignobi-  
lis, filiam unicam, virginem ornatissimam, quae vidua  
super-

—

superstes, quae adhuc ex clementia Serenissimi Hassiae Landgravii Wilhelmi annuae pensionis CCC. imperialis fructum capit, cum liberis, quos ex felicissimo conjugio suscepit duobus, mariti, quem plurimo amore prosequuta est, obitum acerbe luget. MUELLERO eodem anno MDCCCLXXX. demortuo, bibliopolium in filiam, LESKII conjugem, haereditatis jure cum transiret, LESKIUS illius curam gerebat, et quidem tanta cum peritia, ac si universam vitam suam in negotiis hujusmodi gerendis transegisset. Utilia ab inutilibus discernere et doctorum hominum labores ad inprimendum fibi oblatos in primis in naturali historia et oeconomia aestimare quum posset, vix accidere poterat, ut libris aut malae notae, aut inutilibus sumptus suppeditaret, amans autem scientiarum naturalium, ad libros, qui ad has spectant, in primis sumptus, eosque non raro permagnos, dedit. In his opera sunt argumenti et gravitate conspicua, et figurarum aeri incisarum copia, elegantiaque in primis commendanda, in quibus HEDWIGII plantas cryptogamicas, THUNBERGII Floram Japonicam, MERREMI systema ornithologiae, ejusdemque avium historiam generalem, BERGMANNI opuscula physica et chemica, MUELLERI entomofraca, STORRII Alpinum iter, CRELLII diaria chemica, inter plurimos alios, qui suis sumptibus impressi sunt, nominasse sufficiet.

---

## SCRIPTORUM A LESKIO EDITORUM TITULI.

**E**pistola gratulatoria Homeri Versionem Germanicam non esse probandam. Lipsiae, 1772. 4.  
Dissertatio de vegetabilium generatione. Lipsiae 1773. 4.  
Ichthyologiae Lipsiensis Specimen. Lips. 1774. 8.

Aus.



Auserlesene Abhandlungen praktischen und chirurgischen Inhalts aus den philosophischen Transaktionen und Sammlungen der Jahre 1699 bis 1720 gesammlet und übersetzt. Mit Kupfern. Erster bis fünfter Theil Lübeck 1774 — 1778. 8.

Anfangsgründe der Mineralogie nach den Grundsätzen der Probierkunst. Aus dem Franzöfischen des Hrn. Sage, mit einigen Anmerkungen vermehrt. Leipzig 1775. 8. 262 pag.

Io. Bapt. Bohadsch *Beschreibung einiger minderbekannten Seethiere. Dresden 1778. 4. mit Kupf.*

De agri noualis cultura et ratione pecudes in stabulis pascendi differit atque ad audiendam orationem aditalem, qua munus professoris oeconomiae publici ordinarii clementissime sibi demandatum d. 25. Jul. An. 1778. aufspicabitur. Lipsiae, 4. 18 p.

Additamenta ad Jacobi Theodori Kleinii naturalem synopsin echinodermatum et lucubratiunculam de aculeis echinorum marinorum. Cum xviii tabulis aeneis. Lipsiae, 1778. 4. 214 pag.

Abhandlungen zur Naturgeschichte, Physik und Oekonomie, aus den philosophischen Transaktionen und Sammlungen, von dem ersten Bande angefangen, gesammlet und mit einigen Anmerkungen übersetzt, Ersten Bandes erster und zweiter Th. Leipzig 1779. 4.

Anfangsgründe der Naturgeschichte. Leipzig, 1779. 8. Editio altera prodiit an. 1784, cum xii tabulis aeti incisis et complectitur 42 plag.

Italica hujus operis versio prodiit Ticini Regii, an. 1786. duobus voluminibus comprehensa, auctore ERME-NEGILDO PINI.

Von dem Drehen der Schaafe und dem Blasenbandwurme im Gehirne derselben, als der Ursache dieser Krankheit. Mit einer Kupfert. Leipzig, 1780. 8. 52 p.

Abhandlungen zur Naturgeschichte, Chemie, Anatomie, Medicin und Phyzik, aus den Schriften des Instituts



stituts der Künste und Wissenschaften zu Bologna.  
Mit Kupf. 1. Band. Brandenburg, 1781 2. Band 1782 8.  
**Leipziger Magazin zur Naturkunde, Mathematik und  
Oekonomie.** Herausgegeben von B. C. Funke, N.  
G. Leske und C. F. Hindenburg. 1781 — 1785. 8.  
Quatuor particulae hujus promptuarii volumen con-  
flituunt.

**Ann.** 1786 liber hic hoc titulo, physicis et mathemati-  
cis scientiis separatis, prodit, quo adhuc continuatur.  
**Leipziger Magazin zur Naturgeschichte und Oekono-  
mie.** Herausgegeben von N. G. Leske.

**Reise durch Sachsen in Rückficht der Naturgeschichte  
und Oekonomie unternommen und beschrieben.**  
Leipzig 1785. 4. cum XLIX tabulis aeri incisis, qua-  
rum complures vivis coloribus artificio plurimo di-  
stinctae sunt.

**Insertae etiam quaedam ejus tractationes leguntur in li-  
bris ad physicen et historiam naturalem pertinentibus:  
Sammlungen zur Physic und Naturgeschichte, nec  
non in libro, qui Halae, apud Gebauerum exuti-  
tur: der Naturforscher.**

**Plures librorum ad naturalem historiam et oeconomiam  
pertinentium censuras continet celebratissimus liber:  
allgemeine deutsche Bibliothek a volumine inde  
XXXIX.**

**Labores quoque literarii ab eo profecti leguntur in  
Ephemeridibus literariis Lipsiensibus, exceptis ta-  
men annis 1777, 1778, 1779 et 1785. Wittebergensi-  
busque, nec non in ephemeridibus litteraturae uni-  
versalis Jenensis. Sua quoque contulit ad indi-  
cem generalem librorum novorum, qui Lipsiae  
apud Crusium prodiit, nec non ad relationes litera-  
rias bibliopolii eruditorum.**

## P R A E F A T I O.

---

Iam iam b. L. partis hucusque imperfectae, collectionis zoologicae, Musei, cuius *Pars Entomologica*, praeterlapso paschali mercatu, *alio quidem autore*, in lucem iam prodiit (nunc vero absolutionis causa huic catalogo est inserta), plenum accipias indicem.

Quod me attinet, huius musei dominae, viudae nimirum iam mortui LESKII Doctoris publici, precibus commotus, quin hunc susciperem laborem, eumque quam primum perficerem, sane haud potui. Finis enim dominae, quem sibi proposuit, nec nullus rei peritus probet, necesse est, *quod omne Museum, quo haec Zoologica, deinde botanica et demum mineralis collectio continetur, et copiae et pretii causa, integrum ac indivisum vendatur*, sicque eo magis historiae naturalis studio consulatur, spectat. Quem igitur finem sibi propositum, ut obtineret praetereaque lector oculis quam facillime ac celerrime perlustraret, harum rerum omnium profecto pretiosarum, quas ne LESKIUS quidem morbo oppressus morteque extinxetus, Marburgi perlustrare ac disponere potuerat, index scientifice ordinatus haud contempnendus videbatur.

Quae cum ita sint, nec ullus praeter Equitem a LINNE' in toto animalium regno, illustrior subtilior aequa perscrutando ac tractando versatus

\*\*\*

mihi

## PRAEFATIO.

mihi videatur, hoc viro, nec qui unquam memoria excidat nostra dignissimo; huius ipsius Viri sistema — ne id quidem SCHREBERI, BLOCHII, MARTINI, CHEMNITZII, NOBILIS BORNII, GOEZII cet. virtutibus ac meritis, fane summe venerandorum naturae indagatorum detractus, omnium horum in tractandis *singulis* classibus, notitia scientifica usus — eligendum putaverim. Quem autem Virum haud exiguum, omnique imitatione in naturae historia tradenda dignissimum, me *nullo modo tolutim ac servitii more* esse secutum, huc vel illuc potius viam ab ipso ingressam, caute magis quam temere, reliquisse, Viris, quorum merita in sua ipsorum vel arte vel disciplina fane sunt cognita, experta atque probata, ducibus eorumque rationibus commotum, ex indice ipso luculenter patebit.

Quibus dictis naturae historiam non edere, sed potius varietates *singulasque res, scientifice dispositas iustis rectisque nominibus* notatas, in medium proferre fuisse meum, ne quis omittat, voluerim. Characteres igitur *genericos ac specificos* describere atque afferre, qui iam noti suppositi, simulac de individuis, vel ad hoc vel illud genus referendis est sermo, extra omnem dubitationem ponuntur, *valde inutile* mihi videbatur. Sin huc illucve occurrerint descriptiones, hae modo *istas praecipue notas*, quibus unius eiusdemque speciei varietates *inter se abhorrent, spectant; qua re, ut mihi videatur, dum characteres specificos tamquam membra summatis ex istis seriebus, quarum singuli termini varie-*

## PRAEFATIO.

varietatum sunt notae ducta, habenda esse puto, efficitur, ut thesaurus iste et magis ob oculos ponatur et rectius ac copiosius sistema constituatur. Quas quidem varietates in primis rerum formam externam, ipsarumque saepissime colores attingere, iam per se patet; ita ut characteres *specificos* ubi vel minus notae et rariores res occurrebant, vel *specifici characteres a Linnaeo* aliisque hunc fecutis *in medium prolati, nostro individuo insitis ac propriis*, abhorrebat, vel demum in indicandis istis speciebus, quae *novae* a me diiudicantur, inferendos esse putaverim. In utraque re modo commemorata, si aliter egisset, haud dubie peccassem dignusque essem, qui reprehenderer; dum rei periti hac via *et apti iudicando redduntur, quid quantumque sit tribuendum iudicio meo, et historiae naturalis ambitus eiusmodi indiciis ac characteribus est augendus atque amplificandus.*

Quilibet autem ut emitor futurus sive dominus sciat, quid emendum, ac Eruditus, quid diiudicandum sit de rebus a me designatis constitutisque; in cuius ordinis rebus descriptis, opera classica, ubi latius fusiusque synonymis ac imaginibus aere excusis instructae atque adornatae traduntur, sunt adlata. Quam saepissime, ista opera, quae *post Linnaei Systema composita, in publicum prodiere allegavi, quibus inter se comparandis, ut mihi videtur, non modo legenti haud exiguum emolumentum, sed etiam multa voluptas adfertur; quod si autem omiserim, atque libros iam ante Linnaei systema editos, posuerim,*

## PRAEFATIO.

fuerim, necessitate cogente factum esse, quivis sibi persuadeat velim.

Leve quidem citata loca per totas paginas extracta, ac diffusa ex LINNAEO describere, fane autem valde inutile negotium fuisse, nemo non videt; dum huius systemate gaudens, simul quoque his citatis est instructus, hoc autem non habenti, hic catalogus minime curae cordique erit. — Tamen ad rem ipsam:

1) *Mammalium* numerus est exiguus; ita ut SCHREBERI opus, quo omnia hac de re dicenda continentur, *solum* allegandum satis putaverim.

2) In indicandis *avibus* maxime BUFFONIUM, ac quidem editionem germanicam 1772 parte prima in lucem editam, adtuli. MERREMI libro nimis manco adhuc ac imperfecto, de quo praeterea an praestiterit, quae sperat, est quod dubitemus, plane prorsusque non usus; destitutus atque relictus BUFFONII igitur tomis duodecim, ex BRISSONII opere praestantissimo citata supplere conatus sum, ac utriusque libris aere excusis imaginibus deficientibus, FRISCHIUM et EDWARDS, allegavi.

3) Quoad *Amphibia*; nil simile SCHREBERI mammalibus existit, quod quidem est dolendum; hic pertinentes autem icones ex Sebae opere, sane digno, quod priorum duorum ordinum LINNAEI classicum dicatur, adtuli. Quam dubiam ac incertam *Linnaei Serpentum* descriptionem *ex scutorum squamarumque numero*, et quantopere aptio-

## PRAEFATIO.

aptiorem esse optandam; huc illucve haud parvo computationis discriminē me ostendisse, puto.

4) Cum BLOCHIUS in *piscibus* non minoris faciendus esse mihi videatur, quam SCHREBERUS in Mammalibus, atque *Nantia Linnaei Amphibia* ad piscium genus adnumeraverit; aequē ad hunc *ordinem* atque ad *classem* modo citatam, loca huc pertinentia e BLOCHII opere laude dignissimo afferenda, ac GRONOVII Ichthyologiam quam rarissime extra ordinem tantum adducendam, arbitrabar.

5) In *vermium* diversis ordinibus, quin multa variaque allegarem, quod quidem inutile in *Intestinalibus* a Celeberr. GOEZIO quam plenissime ac accuratissime traditis, nec autem in *Molluscis* et praesertim in *Asteriis Echinisque*, in *Sebae* libro classico praeclare tractatis mihi videbatur, facere haud potui. Quod autem attinet *Testacea*, duo ista praeclara ac plena opera, nempe: *Testacea mus. Caes. Vind. a Perillistri Bornio descripta*, et *conchyliorum collectionem a Martinio* (sub nomine vulgari: Martini Konchilienkabinet) institutam, CHEMNITZIO autem nuper absolutam, hic in medium protuli. In cognoscendis ac notandis conchyliis, quibus nam infectisque, longe maxima pars animalium regni *Musei Leskeani* continebatur, praecipue nec ulli diligentiae operaeque pepercī, ita ut non modo MARTINIUM atque CHEMNITZIUM, in *specie* allegaverim, sed etiam characteres, quo specimina Musei ab ipsis hoc in opere descriptis ac delineatis, discrepant, nota-

## PRAEFATIO.

verim; unde fit, ut opus horum virorum semper *sub varietate* descripta, quod quidem rei peritis aequo gratum acceptumque esse debet, ac mihi fuit molestem, adducatur. Perill. a Bornii opus, quod illo *collectaneo conchyliorum*, magnitudine cedit, obiter *in speciebus* (ut LINNAEI ipsum) praeципue eorum causa, qui hoc ampliori non gaudent, a me citatum est; ita tamen ut, MARTINIO, CHEMNITZIO nobilique BORNIO, vel inter se, vel a LINNAEO abhorrentibus, ipse diuidare conatus fuerim. Illi enim duo Viri, si non haud raro, solas *varietates immerito* iam alienas ad *diversas species* putasse, mihi videbantur, LINNAEUM ac BORNIUM; si non iure autem, *ipso* sum fecutus; sicuti hanc illamve novam speciem BORNII, persaepe hoc in indice adtuli. An forsitan interdum, BORNIO Conchyliogistarum Peritissimo, CHEMNITZIOQUE Solertissimo alienis, recte comparandis nostris speciminibus ipsorumque characteribus, in notis adspersis huc illucve emendatio ac correctio mihi contigerit, non meum sed aliorum est diiudicare. In determinanda Conchyliorum patria, *quam brevissime* adiecta, praecipue Celeb. CHEMNITZIUM fecutus sum. Cum praeterea conchyliorum magnitudo, vim haud mediocrem habere mihi videatur in ipsorum pretium, quin cuiusque speciminis ambitum spatiumque adferrem haud dubitavi; qua quidem re, et enitor ad diiudicandum aptior, et individuorum designatio plenior redditur.

Typis ipsis *notas proprias* ac peculiares, quibus specimina inter se distinguuntur, ne una eademque

## PRAEFATIO.

demque res sub diversis numeris occurrere videantur, exprimere conatus sum. *Concharum*, ubi *solitariae* modo adfuere valvulae, notavi: quae autem nota ubi deest, *omnibus* huc pertinentibus valvulis, specimina sunt instructa.

In *Coralliis*, quorum numerus haud est exiguis, praeter *Sebam*, *Eperi* Phytozoa iam plene in lucem edita optasse, quorum autem *primo* duntaxat *fasciculo* in publicum progresso uti potui. Ad LINNAEI Systema supplendum, v. c. in *Antipathum* genere, et nonnullis speciebus ab ipso omisis, PALLASII Zoophytorum Elenchum, in usum adhibitum laudavi; cuius libri versio nuperrime in germanicam linguam haud vitiose, ut fertur, absoluta atque edita est.

Praeterea generatim nonnulla mihi addenda videntur.

a) *Omnium vel saepius vel rarius laudatorum autorum syllabus plenus est hic:*

*Caroli a Linné* Systema naturae. Edit. 12. Holmiae 1766. 1767 in 8.

— — — Museum Reg. Ulricae. Holmiae 1764. in 4.

— — — Mantissa altera. Holmiae 1768. in 8.  
*Schreber's Säugthiere.* I — 12 Abtheilung mit illum. Kupf. neue Aufl. 1782 — 1787. in 4.

*Des Gr. v. Buffons Naturgeschichte der Vögel übers.*  
von Martini I — 6 Band. Berl. 1772 — 1776,  
fortgesetzt von Otto bis zum 12 Band. 1776 —  
1786. in 8. mit Kupf.

*Leske* Naturgeschichte, neue Aufl. Leipzig 1785. in  
8. mit Kupf.

## PRAEFATIO.

- Ornithologie ou méthode contenant la division des oiseaux en ordres, sections, genres, espèces et leur variétés par Mr. *Briffon*. Paris 1766. Tom. I — VI. in 4. avec Fig.
- Joh. Leonh. *Frisch* Vorstellung der Vögel in Deutschland. Verl. 1733. in Fol.
- Gleanings of natural history, exhibiting figures of quadrupeds, Birds, insects, plants by *G. Edwards*. Lond. 1758 — 1764. P. I — III.
- Hessische Beiträge zur Gelehrsamkeit und Kunst. 5tes Stük. Frankf. am Main 1785. in 8.
- Enchiridion historiae naturali inserviens .... editore *I. R. Forster*. Halae 1788. in 8.
- Locupletissimi rerum naturalium thesauri accurata descriptio, et iconibus accuratissimis expressio, per universam physices historiam .... ex toto terrarum orbe collegit, digesta, descripta et depingendum curavit *Albertus Seba*. T. I — IV. Amstel. 1738 — 1765. in Fol.
- Gößte Naturgeschichte der Eingeriedewürmer, neue Aufl. Leipzig 1787 mit Kupf. in 4.
- Leske Abhandlung vom Drehen der Schafe. Leipzig. 1780. in 8. mit Kupf.
- Vermium terrestrium ac fluviat. succincta historia autore *O. Fr. Müller*. Havniae 1774. in 4.
- Blochs ökonom. Naturgeschichte der Fische Deutschlands. 3 Theile. Verl. 1781 — 1784. in 4. mit 108 ill. Kupf.
- — Naturgeschichte der ausländischen Fische; ebenfalls 3 Theile. Verl. 1788 mit illum. Kupf.
- Gronovii Museum Ichthyologicum sistens Piscium... descriptiones ordine systematico. Lugd. Batav. 1754. in Fol.
- Leskii Ichthyologiae Lipsiensis specimen. Lips. 1774. in 8.
- Berlinische Beschäftigungen naturforschender Freunde. 2 Theil. Verl. 1777. in 8.

*Pallas*

## PRAEFATIO.

*Pallas* spicilegia Zoologica. Fasc. I — 13. Berl. 1772. in 4.

— — Elenchus Zoophytorum. Hag. Comit. 1766. in 8.

Testacea musei Caesarei Vindobonensis, quae disponuit et descripsit Ign. Nob. a Born. Vind. 1780. in Fol. cum iconib. pictis.

Martini Renthilienkabinet. I — 3 Band. Nürnberg 1769 — 1777. in 4., fortgesetzt von Chemniz, 4 — 10 Band, ebendaselbst 1780 — 1788. mit illum. Kupfern.

Prodromus Zoologiae Danicae, seu animalium characteres et nomina .... autore O. Fr. Müller. Havniae 1776. in 8.

b) Avibus, vermbusque icones pictas adieci.

Tres species ac quidem, ut mihi videntur novae, quae *Certhia longicauda* (Nr. 71), *Trochilus maximus* (Nr. 76), et *Pipra tricolor* (Nr. 159), a me laudantur copioseque describuntur atque signantur, ut quilibet rei peritus cognoscere et experiri possit, an recte habeantur novae, aut non, nec in LINNAEI nec BRISSONII, BUFFONII, MERREMI operibus occurrunt, (ut quoque *Merops Caser Linnaei*, huc usque nondum ni fallor in systemate quodam depictus) ornithologicis imaginibus, novissime delineatis a Viro Illustri a Wildungen, Sereniss. Hassiae Principi a consiliis regundae civitatis, et artis et scientiae ornithologicae peritissimo, continentur. *Omnibus coram huic Viro*, aequo ego ac posteri b. *Leskii*, gratias quam maximas agere, pro studiis officiisque in nos humanissime collatis, sumus omnino coacti. Quod dolerent, esset, si chalcographi vitio, hae sane

## PRAEFATIO.

venustae et accuratae delineationes, corrumperentur.

Tabulae helminthologicae conchylia modo continent in MARTINII AC CHEMNITZII opere non dum delineata; *Coni aulici* nempe duas varietates notatu dignas (Nr. 510 et 511) (quae fortasse non immerito species diversae habentur), *Cypreae stercorariae* unam varietatem (Nr. 53<sup>b</sup>) verisimile *mancae* atque *distortae*, *Muricem torulosum Linnaei* et has quae mihi novae videntur species, ut: *Voluta Subpraeputium* (Nr. 727); *Murex cancellatus* (Nr. 1020) *Nerita Chrysostomus* (Nr. 1190) ac *Nerita reticulata* (Nr. 1236); quas cognitas et expertas rei periti, facillime vel probabunt vel reiicient.

Varietates tres priores in *minus* spatiū ambitumque aequa ratione redactae, vel ex *scala geometrica*, posterior autem LINNAEI, aliaeque quatuor novae species *iusta magnitudine* ac *naturali*, ut dicunt, signantur.

c) Ne quis emtorum externorum tam pretio, quam re ipsa defraudetur decipiaturque, omnes res mancas atque vitiosas, ipfas, vel minimum laefas, notis adspersis magna fide indicavi.

d) Omnes res istae, quae in spiritu vini adservantur sub finem hunc in modum sunt notatae: (J.S.) praeter Amphibia, quae fere omnia ita servata sunt. Quod reliquum, Mammalia ut fieri solet sunt conferta, etiamque aves; pisces autem ex recentiorum more convexi sunt arefacti atque afferculo glutinati. Hi tamen quoad colorem fere omnes sunt aliquantum corrupti.

e) Cum

## PRAEFATIO.

e) Cum vicissim unius eiusdemque varietatis plura specimina, haud bene separanda ab ipsa collectione universa, occurrant; varias descriptiones excipiens numerus, speciminis quantitatem denotat; ita ut numerus 2 v. c. significet, specimen in *duplo*; 3 in *triplo* cet. adesse.

f) Numeris cuiusque classis cum i. incipientibus, omni commutationi in ordinandis disponendisque rebus alio forsan loco, occursurus spectavi, ut semper littera prima Classis, *numeros speciminibus ipsis adfixos*, numerisque indicis nostri convenientes, antecedat. V. causa.

|          |         |             |             |
|----------|---------|-------------|-------------|
| M. 4.    | denotat | Mammalium   | Nr. 4.      |
| A. 4.    | -       | Avium       | Nr. 4.      |
| Amph. 4. | -       | Amphibiorum | Nr. 4.      |
| P. 4.    | -       | Piscium     | Nr. 4.      |
| V. 4.    | -       | Vermium     | Nr. 4. cet. |

g) Nonnulla vitia haud magni momenti in numerorum progressu commissa, v. gr. quod 1237 excipiat 1241, 1242 cet., loco 1238 cet.; 519 subsequatur 519<sup>b</sup>, 519<sup>c</sup> cet., loco 520; qui errorum in numeris scribendis facilitatem haud ignorat, magisque rei quam numeri cupidus ac rerum est negligens, quae rem ipsam non tangunt, quam facillime ignoscit.

h) *Typhetae vitia* potiora in syllabo peculiari emenda erunt.

Quod reliquum est, commendare Museum, quod se ipsum commendat dignumque, quod a peritissimis doctissimisque laudetur Viris; minime: fautoribus autem mihiique amicis, quibus adiu-

## PRAEFATIO.

adiuvantibus vel ipsorum libris pretiosis, vel con-  
fuetudine scientifica hoc in opere perficiendo ver-  
satus sum, gratias quam maximas possum, palam  
agere, in primis *Illustri Baldingero Sereniss. Hass.*  
*Princ. a consiliis intimis ac Medicorum Peritissimo*  
*doctissimoque, Perillustri Baroni a Selchov,* *Uni-*  
*versitatis Marburg.* *Cancellario Celeberrimo atque Clas-*  
*sissimo Buschio professori Medicinae optime*  
*merito, meum fuisse arbitrabar.* Quoque ceteris,  
quorum studiis, officiisque commoratio quam  
maxime iucunda ac suavis mihi redditur *Marburgi*,  
illas ut iustas referrem, si hic esset locus.

Quam primum tamen Deo volente, Erudi-  
torum Reipublicae, catalogum mineralium col-  
lectionis pretiosissimae, perquam accurate ac  
scientificè institutum, me offerre posse, spero.

Dabam Marburgi  
5. a. Cal. Octobr.  
MDCCCLXXXVIII.

D. L. G. Karsten.




MUSEUM LESKEANUM

REGNUM ANIMALE

CLASSIS I.

MAMMALIA.





# REGNI ANIMALIS

## CLASSIS PRIMA.

### MAMMALIA.

---

- I. Ad characteristicam Mammalium et quidem
  - A. Ad characteristicam internam seu *Physiologiam*:
    - a. *Hominis.*

- 1 *Partus maturus; Thorace aperto, ut respirationis organa cum corde conspicantur. Europ. (J. S.)*
- 2 *Part. mat. Aethiopis masculini generis. (J. S.)*
- 3 *Foetus partui proximus ex Aethiope matre et Europaeo procreatus. (J. S.)*
- 4 *Foetus quiunque circiter mensum cum membrana floculenta Hunteri, Europ. (J. S.)*  
*Obs. Oculus alter hoc in subiecto est excisus, ut concretarum palpebratum ratio pateret.*
- 5 *Membranae cæducae Hunteri pars soluta. (J. S.)*
- 6 *Organa respirationis et deglutionis Infantis cum lingua et corde (J. S.)*
- 7 *Brachium cera injectum infantis sentieris. (J. S.)*
- 8 *Brachium infantis 4 circiter annorum, vasis injectis conspicuis.*
- 9 *Maxilla inferior partus maturi.*
- 10 *Ossicula capitis infantis neonati separata.*  
*Obs. Os sphenoideum distinctissimum.*
- 11 *Sceloton infantis 3 circiter mensum cum vasis sanguiferis injectis.*
- 12 *Cor humanum cera injectum cum truncis potioribus vasorum.*
- 13 *Cor humanum cera impletum, cum aorta et vena cava descendente nec minus ramificationibus validioribus.*
- 14 *Sceloton maris adulti.*  
*Obs. magnitudine 5 ped. et 10 poll. superat.*
- 15 *Ossicula capitis humani, maxilla inferiore deficiente.*

- 16 Os frontis.
- 17 Bregmata duo.
- 18 Offa temporum 2.
- 19 *Os temporum diffusum*, ut meatus conspiciatur auditorius.
- 20 Ossis temporum pars petrosa dissecta. 4.
- 21 *Offa maxillaria superiora*. 2.
- 22 Os sphenoideum.
- 23 Os jugale.
- 24 Ossiculum Palati.
- 25 Ossicula Nasi.
- 26 Ossiculum spongiosum inferius.

b. *Aliorum animalium.*

- 27 Foetus canis familiaris, duarum circiter hebdomadum, in duplo. (J. S.)
- 28 Foetus eiusdem, paulo major. (J. S.)
- 29 Foetus canis fam. 6 circiter hebdomadum (J. S.) 2.
- 30 Foetus vitulinus semeltris. (J. S.)
- 31 Foetus vitul. minor cum placenta, decem circiter hebdomadum. (J. S.)
- 32 Foetus ejusdem duorum circiter mensium. (J. S.)
- 33 Foetus porcinus, 8 circiter hebdomadum. (J. S.)
- 34 Cor cum lingua et sterno, felis domesticae. (J. S.)
- 35 Sceleton *Talpae Europaeae*. In duplo.
- 36 Sceleton *Leporis?*
- 37 Sceleton *Sciuri vulgaris*.
- 38 Pars petrosa ossis temporum *Elephantis maximis*.
- 39 Fornix cranii *Ovis arietis*.
 

*Obs.* Hoc specimen nobis propterea quam maxime vindetur insigne, quod animal cui pertinebat, vertigine (vulgo Drehkrankheit) laborabat, unde foramina haud angusta conspiciuntur a Taeniis perforata.
- 40 Os temporum ovinum, quo officula auditus cum tympano optime distinguuntur.
- 41 Pars petrosa ossis temporum ovini, in qua cochlea cum labyrintho auditorio imprimis conspiciuntur.

B. Ad characteristicam externam.

- 42 Caput *Canis Lupi*
- 43 Caput *Felis Tigridis*.
- 44 Caput *Felis Cati*.

- 45 *Leporis timidi caput*, maxilla inferiore deficiente.  
 46 *Caput Cervi capreoli*.  
 47 *Caput Bovis Tauri*.

*Obs.* Cornu alterum destructum, ossa nasi desciunt, et ossa spongiosa inferiora cum vomere conspicua sunt.

- 48 *Ovis Arietis maris caput*.

*Obs.* E rubia tinctorum, nutrimento animalis cum vivet, coloratum.

- 49 *Caput Suis Scrofae*.

- 50 *Caput Suis Babyrussae*.

- 51 *Eiusdem Caput*, laniaribus brevioribus ac magis curvatis.

- 52 *Elephantis max.* dens laniarius.

- 53 *Equi caballi* dens molaris.

Not. Capita (43 — 52) ea de causa hue locavi, quia forma ac accumulatio dentium in ipsis perdistincta et praesertim notatu digna est in determinandis generibus mammalium.

- 54 *Rhinocerotis cornu albidum*, subconiforme attenuatum.

- 55 *Cornu Cervi Elaphi*, duodecim, ut dicunt, terminorum.

- 56 *Cornu eiusdem spec.* minus et octo terminorum.

- 57 *Cervi Damæ cornu*.

- 58a *Cornu Cervi Tarandi*.

- 58b *Cornu Cervi capreoli*.

- 59 *Caprae rupi caprae cornua* 3.

- 60 *Ungula cervi Alcis*.

- 61 *Ungula cervi capreoli*.

## II. Ad Systema.

### Ordo primus. PRIMATES.

#### SIMIA.

- 62 *Simia Capucina*. Linn. S. N. Gen. 2 Sp. 30.

Schreber Tab. XXIX.

Pectus spec. nostrae f. cit. multo obscurius.

#### VESPERTILIO.

- 63 *Vespertilio Spectrum*. Linn. S. N. Gen. 4. Sp. 2.

Schr. T. XLVI. (J. S.)

64 *Vespertilio murinus*. Linn. S. N. Gen. 4. Sp. 6.

Schr. T. LI.

Membrana, dorsoque, subferrugineis, pectore abdome  
mineque albescentibus.

65 *Vesp. ferrum equinum* Buff.

Schr. T. LXII. Fig. infima.

Membrana ex atro-fusca, dorso pallido. (J. S.)

## Ordo II. BRUTA.

### MANIS.

66 *Manis pentadactyla*. Linn. S. N. Gen. 9. Sp. 1.

Schreb. Tab. LXIX,

### DASYPUS.

67 *Dasypus novemcinctus*. Linn. S. N. Gen. 10. Sp. 6.

Schreb. Tab. LXXIV. (J. S.)

## Ordo III. FERAE.

### PHOCA.

68 *Phoca vitulina*. Linn. S. N. Gen. 11. Sp. 3.

Schreb. Tab. LXXXIV.

Colore flavo, immaculato, capite aliquantum destructo.

### FELIS.

69 *Felis Lynx*. Linn. S. N. Gen. 13. Sp. 7.

Schr. Tab. CIX.

Dorso fulvo, pectore, abdomine, pedibusque albidis,  
maculis nigris, variis. Canadensis.

### MUSTELA.

70 *Mustela Putorius*. Linn. S. N. Gen. 15. Sp. 7.

Schr. Tab. CXXXI.

71 *Must. Erminea*. Linn. S. N. Gen. 15. Sp. 10.

Schr. Tab. CXXXVII. A.

Corpo superne ferrugineo, subtus luteo, cauda sita  
pra dimidium atra.

72 *Must. nivalis*. L.S.N. Gen. 15. Sp. 11.

Schr. Tab. CXXXVIII.

### URSUS.

73 *Ursus Meles*. Linn. S. N. Gen. 16. Sp. 2.

Schr. Tab. CXLII,

DIDEL-

## DIDELPHIS.

- 74 *Didelphis Marsupialis.* Linn. S. N. Gen. 17. Sp. 1.  
Schr. Tab. CXLV. (J. S.)
- 75 *Didelph. dorsigera.* Linn. S. N. Gen. 17. Sp. 5.  
Schr. Tab. CL. (J. S.)
- 76 *Did. dorsigera, pullus.* (J. S.)

## TALPA.

- 77 *Talpa Europaea.* Linn. S. N. Gen. 18. Sp. 1.  
Schreb. Tab. CLVI.

## SOREX.

- 78 *Sor. araneus.* Linn. S. N. Gen. 19. Sp. 5.  
Schr. Tab. LX.  
DORSO ex ferrugineo-fusco, gula, pectori, abdomi-  
neque pallidis.

## ERINACEUS.

- 79 *Erinaceus Europaeus.* Linn. S. N. Gen. 20. Sp. 1.  
Schr. Tab. CLXII.

## Ordo IV. GLIRES.

## CAVIA.

- 80a *Cavia Aguti* Pall.  
Schr. Tab. CLXXII.

## CASTOR.

- 80b *Castor Fiber.* Linn. S. N. Gen. 23. Sp. 1.  
Schr. Tab. CLXXV.  
Corpo flavescente-ferrugineo, immaculato.

## MUS.

- 81 *Mus cricetus.* Linn. S. N. Gen. 24. Sp. 9.  
Schr. Tab. CLXXXVIII. A.
- 82 *Mus musculus.* Linn. S. N. Gen. 24. Sp. 13.  
Schr. Tab. CLXXXI.  
Varietas undique nivea, auribus caudaque solis lute-  
scentibus.
- 83 *Mus amphibius.* Linn. S. N. Gen. 24. Sp. II.  
Schr. Tab. CLXXXVI.  
Cauda muris arvalis Pall. sed magnitudo Muris am-  
phibii.

VIII MUS. LESK. REG. ANIM. CL. I. MAMM.

84 *Mus silvaticus*. Linn. S. N. Gen. 24. Sp. 17.  
Schr. Tab. CLXXX.

SCIURUS.

85 *Sciurus vulgaris, rufus*. Linn. S. N. Gen. 25. sp. 20.  
Schr. Tab. CCXII.

Ordo V. PECORA.

BOS.

86 *Bos Taurus vitulus*. Linn. S. N. Gen. 32. Sp. 2.  
Huius speciei pellis nondum arte in effigiem compa-  
ta est.

---

CLAS.

CLASSIS II.

A V E S.



# REGNI ANIMALIS

## CLASSIS SECUNDA,

### A V E S.

#### I. Ad characteristicam ornithologicam, et quidem

##### A. Ad chara&teristicam *internam*.

- 1 **S**keleton Corvi.
- 2 Pullus Gallinaceus in ovo. (J. S.)
- 3 Pulli duo Loxiae cuiusdam, in ovulis. (J. S.)

##### B. Ad characteristicam *externam*; ratione

###### a. *Rostri.*

- 4 Caput Falconis; (*rostro adunco.*)
- 5 Caput Corvi, mandibula inferiore deficiente; (*rostro cul-trato.*)
- 6 Caput Certhiae; (*rostro incurvato.*)
- 7 Buceri bicornis, *rostrum serratum, fronteque ossa.*
- 8 Rostrum Ramphastii, *serratum, naribus ad rostri basin.*
- 9 Turdi caput; (*rostro emarginato, subulato, basi comppresso.*)
- 10 Eiusdem caput; (*rostro parum arcuato et magis comppresso.*)
- 11 Caput Fulicae atrae; (*rostro convexo, mandibula superiore fornicata, inferiore pone apicem gibba.*)
- 12 Caput Anatis Anseris; (*rostro unguiculato, denticulis membranaceis.*)
- 13 Cap. Ardeae Stellaris; (*rostro recto subacuto.*)

###### b. *Pedum.*

- 14 Pedes Corvi, (*fissi atque cursorii.*)
- 15 Pes Meleagridis Gallopavonis.
- 16 Pedes Phasiani Galli, (*pentadactyli.*)  
(vid. Buff. Cours d'Histoire natur. III. 42, Poule à cinq doigts.)

17 Pedes

- 17 Pedes Ardeae cinereae, (*pinnati.*)  
 18 Pedes Fulicae atrae, (*sublobati.*)  
 19 Pes Anatis Anseris, (*palmatus.*)  
 20 Pedes 2 conuati, *monstrofi*, Anatis domesticae.

## II. Ad Systema.

### Ordo I. ACCIPITRES.

#### FALCO.

- \* Cera lutea.  
 21 Falco fulvus. Linn. S. N. Gen. 42. Sp. 6.  
     Buffon. 1. p. 102. Tab. 2.  
     Obs. Longitudo ipsius ab apice rostri ad caudam usque,  
         pedes 3 aequat, crassities, sequi. circiter pedem.  
     Not. Qui F. ad Lipsiam a MDCCCLXXXIII. glandibus  
         emissis intersectus est. (vid. Leske Naturgeschichte  
         p. 277. ed. nov.)  
 22 Falco anatinus. Briss. Aquila anatina.  
     Buffon. 1. p. 109. Tab. 4.  
     Forma fere F. Buteonis sed pedibus gaudet hirsutis.  
 23 F. pygargus. Linn. S. N. Gen. 42. Sp. 11.  
     Buff. 2. p. 17. Tab. 29.  
 24 F. gentilis. Linn. S. N. G. 42. Sp. 13.  
     Buff. 2. p. 12. Tab. 28.  
     F. Dilute cinereus, abdomine, femoribusque niveis.  
 25 F. Subbuteo, mas. Linn. S. N. Gen. 42. Sp. 14.  
     Buff. 2. p. 143. T. 42.  
 26 F. Subbuteo, femina, ibid.  
 27 F. Buteo, femina. Linn. S. N. Gen. 42. Sp. 15.  
     Buff. 2. p. 3. Tab. 22.  
     Femoribus ferrugineis.  
 28 F. Buteo mas. Linn. ibid.  
     Femoribus niveis, ac minor.  
 29 F. Tinunculus. Linn. S. N. Gen. 42. Sp. 16.  
     Buff. 2. p. 148. Tab. 43.  
     Mas; caput collumque cinerefrens, gula albida, re-  
         migum tectrices rufae, fusco fasciatae, femora ru-  
         bescentia.  
 \*\* Cera obscura.  
 30 Falco palumbarius. Linn. S. N. Gen. 42. Sp. 30.  
     Buff. 2. p. 46. Tab. 32.  
     Femina, quod praecipue e magnitudine patet.

31 *Falco Nifus*. Linn. S. N. Gen. 42. Sp. 31.

Buff. 2. p. 35. Tab. 31.

*Femina*, pectore albo fusco variegato, femoribus albis immaculatis.

### STR IX.

\**Auriculatae*, pennis auricularum instar existantium.

32 *Strix Otus*. Linn. S. N. Gen. 43. Sp. 4.

Buff. 2. p. 42. Tab. 63.

\*\**Inauriculatae*.

33 *Strix Ulula*. Linn. S. N. Gen. 43. Sp. 10.

Buff. 3. p. 81. Tab. 70.

34 *Strix Funerea*. Linn. S. N. Gen. 43. Sp. 11.

Briss. av. 1. tab. 37. fig. 2.

### LANIUS.

35 *Lanius Erytrocephalus* Frischii.

Frisch tab. 61.

*Not. Ornithologiae peritissimus Grandidier in libello, cui est titulus :*

*Hess. Beitr. zur Gelehrsamkeit 5 St. 1785. pag. 108. jure jam mirabatur, Linneum immortalem hanc avem Germaniae frequentissimam plane omisisse. L. lucionensis. Linn. ab illa, ut icon Briss. etiam probat, non multum differt.*

36 *Lanius Excubitor*. Linn. S. N. Gen. 44. Sp. 11.

Buff. 2. p. 173. Tab. 45.

*Mas*, pectore rufescente, fronte, fascia oculorum haud angusta, perater.

37 *Lanius Excubitor. femina*. Linn. ib.

Pectore albido, griseo undulato, capite ciperecente, fronteque ipsi concolore, fascia oculorum angustiore nigra.

38 *Lanius Collurio*, mas. Linn. S. N. Gen. 44. Sp. 12.

Buff. 2. p. 186. Tab. 48.

### Ordó II. PICAE.

Rostrum subcompressum, convexum.

### PSITTACUS.

*Brachyuri cauda aequali.*

39 *Psittacus Erithacus*. Linn. S. N. Gen. 45. Sp. 24.

Frisch. av. 4. t. 51.

Spec. male conservatum.

- 40 Psittacus brasiliensis. (J. S.) Linn. S. N. Gen. 45. Sp. 36.  
Edwards av. T. 161.
- 41 Psitt. chrysopterus. (J. S.) Linn. S. N. Gen. 45. Sp. 44.  
Edwards av. t. 293. fig. 2.
- 42 Psitt. passerinus. Linn. S. N. Gen. 45. Sp. 47.  
Edwards av. tab. 235.  
Spec. satis bene conservatum.

## RAMPHASTOS.

- 43 Ramphastos dicolorus. Linn. S. N. Gen. 46. Sp. 7.  
Buff. av. t. 31. fig. 1.  
Quod spec. fragmentum modo refert huius speciei, caput cum collo et pectoris parte suprema, continens.

## CORVUS.

- 44 Corvus Corax. Linn. S. N. Gen. 50. Sp. 2.  
Buff. 7. Fig. ad pag. 27.
- 45 Corv. Cornix. Linn. S. N. Gen. 50. Sp. 5.  
Buff. 7; fig. ad pag. 114.
- 46 Corv. Glandarius. Linn. S. N. Gen. 50. Sp. 7.  
Buff. 7; fig. ad pag. 219.
- 47 Corv. Pica. Linn. S. N. Gen. 50. Sp. 13.  
Buff. 7; fig. ad pag. 173.

## CORACIAS.

- 48 Coracias Garrula. Linn. S. N. Gen. 51. Sp. 1.  
Buff. 7; fig. ad p. 274.  
DORSO rufescente, remigium te<sup>c</sup>trices primores ferrugineae, secundariae, antrosum coeruleae, poslice autem cyaneae, cauda integra, rectricibus 2 supremis fuscis, inferioribus autem dicoloribus ad crissum scilicet coeruleis, et ad apicem cyaneis, lateralibus 2 exceptis, quae apice ultimo gaudent fusco. Avis pulcherrima.

## ORIOLUS.

- 49 Oriolus Galbula, mas. Linn. S. N. Gen. 52. Sp. 1.  
Buff. 8; fig. ad p. 270. (bene)

## GRACULA.

- 50 Gracula religiosa. Linn. S. N. Gen. 53. Sp. 1.  
Buff. 9; fig. 1. ad pag. 192.  
Nigro-coerulea, subtus undique fasciis lutescentibus frequentissimis ac tenuibus undata. (J. S.)

## PARADISEA.

51 *Paradisea apoda*. Linn. S. N. Gen. 54. Sp. 1.

Büff. 7; fig. ad pag. 192.

*Ferruginea*, gutture virescente nitido, pennis elongatis, dorfi lutescentibus hypochondriorum niveis.

## CUCULUS.

52 *Cuculus canorus*. Linn. S. N. Gen. 57. Sp. 1.

Frisch. t. 40. (non satis bene)

*Subtus albida*, fasciis fuscis undique undata.

53 *Cuculus canorus*. Linn. ib.

*Gula*, pectoreque cinereis, rectrice prima caudae, nitide nigra, punctis albis quaternis ad scapum locatis, notata.

## YUNX.

54 *Yunx Torquilla*. Linn. S. N. Gen. 58. Sp. 1.

Briss. av. 4. t. 1. fig. 1. (icon accuratissima.)

*Fasciis ocularibus fuscis, perdiscretis*, nec ab Ill. Linn. nec a celeberr. Br. commemoratis.

## PICUS.

55 *Picus martius*. Linn. S. N. Gen. 59. Sp. 1.

Frisch. t. 34. fig. 1.

56 *Picus viridis*. Linn. S. N. Gen. 59. Sp. 12.

Frisch. t. 35. fig. 1.

*Mas*, temporibus coccineis.

57 *Picus viridis*. Linn. ib.

*Femina*, temporibus atris.

58 *Picus major mas*. Linn. S. N. Gen. 59. Sp. 17.

Frisch. tab. 36.

59 *Picus major femina*. Linn. ib.

*Criffo solo coccineo*, vertice nigro.

60 *Picus varius mas*. Linn. S. N. Gen. 59. Sp. 20.

*Rostro potius cultrato et arcuato quam polyedro*.

61 *Picus tridactylus*. Linn. S. N. Gen. 59. Sp. 21.

Edwards av. tab. 114.

*Dorso virescente nigro, subtus ex albo nigroque varius*.

*Suecicus*. (J. S.)

## SITTA.

62 *Sitta Europaea*. Linn. S. N. Gen. 60. S. 1.

Briss. av. 3. 29. fig. 3. (icon satis bona.)

*Mas*; corpus cinereum subtus rufescens, fascia oculari utrinque angusta et atra.

ALCE.

## ALCEDO.

- 63 Alcedo Ispida. Linn. S. N. Gen. 62. Sp. 3.  
Edwards av. t. 11.

## MEROPS.

- 64 Merops Cafer. Linn. S. N. Gen. 63. Sp. 7.

Corpus superne omnino cinereoscens, macula nigra in medio dorso, subtus albidum; uropygio, crissaque flavescens; cauda longissima, magnitudine corporis duplici; pennis colli et capitinis setaceis. Rostri tam compressi quam abbreviati causa, hoc Linnaci genus, mihi potius ad *Passerines* referendum videtur.

## UPUPA.

- 65 Upupa Erops. Linn. S. N. Gen. 64. Sp. 1.  
Briss. av. 2. tab. 43. fig. 1.

## CERTHIA.

- 66 Certhia Capensis. Linn. S. N. Gen. 65. Sp. 4.  
Briss. av. 3. tab. 31. fig. 1.

- 67 Certhia currucaria. Linn. S. N. Gen. 65. Sp. 6.  
Briss. av. 3. 30. fig. 1. (icon non satis accurata.)

Olivacea punicea coeruleis nitidis subtus ex virescente flavescens, Cap. b. Sp.

- 68 Certhia caerulea. Linn. S. N. Gen. 65. Sp. 8.  
Briss. 3. tab. 31. fig. 4.

- 69 Certhia chalybea. Linn. S. N. Gen. 64. Sp. 10.  
Briss. 3. tab. 32. fig. 1.

- 70 Certhia famosa. Linn. S. N. Gen. 65. Sp. 20.  
Briss. 3. tab. 34. fig. 1.

- 71 Certhia longicauda.

Rostrum subulatum, subarcuatum, nigrum, capite longius. Corpus superne ex virescente-fuscum, subtus albidum, crissu uropygioque luteis, certhia familiaris major. Cauda longissima, magnitudinem corporis duplo ac dimidio exsuperans, rectribus 10. ut in Certh. familiaris, ex nigro fuscis, composita, binis se invicem tangentibus, sen simque ita ab infinitis crescentibus, ut supremae sint longissimae. Ind. Occ.

Certhiam Philippinam Linn., colore fere aemulatur, sed cauda quam maxime ab ista differt.

## TROCHILUS.

- 72 Trochilus dominicus. Linn. S. N. Gen. 66. Sp. 9.  
Briss. av. 3. tab. 35. fig. 4.

- 73 *Trochilus mellisugus*. Linn. S. N. Gen. 66. Sp. 15.  
Briss. av. 3. tab. 36. fig. 3.
- 74 *Troch. pegasus*. Linn. S. N. Gen. 66. Sp. 16.  
Briss. av. 3. 36. fig. 4.  
Subtus albescens, maculis fuscis, cauda parum intus coeruleescens.
- 75 *Troch. pegasus*, Linn. ib.  
Pulchrior, pectore subfuscō, pennis virescēte-aureis intermixtis, nitente, cauda subtus splendidissime coerulea. Magnitudine haec varietas antecedentem etiam aliquid superat.
- 76 *Trochilus maximus*.  
Tr. rectirostris; rostrum cultratum, capite, sesquifere longius; corpus splendens, pileo, remigibus, rectricibusque coerulecentibus; occipite, dorso, pectore, uropygio atque alarum teatricibus virescēte-atreis; gutture niveo, crissoque ferrugineo; cauda integra, subtus nigrescens. Avis longitudo, ab apice rostri ad caudam extremam usque, 8 pollices superat, eiusque crallities duo poll. fere aequat.

## Ordo III. ANSERES.

Rostrum obtusiusculum, epidermide tectum, sub basi gibbum, apice auctum, Faux denticulata.  
Lingua carnosa.  
Pedes palmati.

## ANAS.

- 77 *Anas tadorna*. Linn. S. N. Gen. 67. Sp. 4.  
Brit. av. 6. tab. 33. fig. 2.
- 78 *Anas acuta*, mas. Linn. S. N. Gen. 67. Sp. 28.  
Briss. av. 6. tab. 34. fig. 1.

## MERGUS.

- 79 *Mergus merganser*. Linn. S. N. Gen. 68. Sp. 3.  
Fragmentum caput cum collo continens.
- 80 *Mergus Serrator*. Linn. S. N. Gen. 68. Sp. 3.  
Briss. av. 6. tab. 23. (icon accuratissima.)

## COLYMBUS.

- 81 *Colymbus arcticus*. Linn. S. N. Gen. 75. Sp. 4.  
Briss. av. 6. p. 115. nr. 4.  
(Specimen distinctissimum.)

82 *Colymbus cristatus*. Linn. S. N. Gen. 75. Sp. 7.

Briss. av. 6. tab. 5. fig. 1.

Remiges sine fasciis albidis in spec. nostro, hinc forsitan femella.

83 *Colymbus auritus*. Linn. S. N. Gen. 75. Sp. 8.

Edwards Beards tab. 145.

84 *Colymbus cristatus minor* Briss.

Br. av. 6. p. 46. Ord. 19. Gen. 41. Sp. 3.

Spec. nostr. a citato, crista non valde elevata, et collo ferrugineo immaculato differt.

#### Ordo IV. GRALLAE.

*Rostrum subcylindricum, obtusiusculum.*

*Lingua integra, carnosa.*

*Femora supra genua denudata.*

#### SCOLOPAX.

85 *Scolopax rusticola*. Linn. S. N. Gen. 85. Sp. 6.

Frisch. Tab. 229.

86 *Scolopax Gallinago*. Linn. S. N. Gen. 86. Sp. 7.

Frisch. Tab. 226.

#### TRINGA.

87a *Tringa Vanellus mas*. Linn. S. N. Gen. 87. Sp. 2.

Briss. av. 5. Tab. 8. fig. 1.

*Corpus superne virescente-aureum, pectore, coeruleo-atro, abdome niveo criscoque ferrugineo.*

87b *Tringa Vanellus femina*. Linn. ib.

*Crista breviore, pectoreque fusco.*

88 *Tringa Vanellus pullus*. Linn. ib.

89 *Tringa Vanellus*, pullus, sed major.

90 *Tringa hyperborea*. Linn. S. N. Gen. 87. Sp. 9.

91 *Tringa Ocrophus*. Linn. S. N. Gen. 87. Sp. 13.

Briss. 5. Tab. 16. F. 1.

#### RALLUS.

92 *Rallus Crex*. Linn. S. N. Gen. 98. Sp. 1.

Briss. 5. Tab. 13. fig. 2.

93 *Rallus aquaticus*. Linn. S. N. Gen. 93. Sp. 2.

Briss. 5. Tab. 12. fig. 2.

*Rostrum in fig. cit. nimis tenue.*

## OTIS.

94 *Otis tarda*. Linn. S. N. Gen. 95. Sp. 1.

Buff. 4. pag. 5. fig. 78. (mala.)

*Corpus cinereescens, remigibus primariis atris, secundariis albidis, collo albo nigroque dimidiato, iridibus croccis. Sine crista. Femina.*

## Ordo V. GALLINAE.

*Rostrum convexum: mandibula superiore fornicata, margine extra inferiorem dilatato.*

*Nares membrana cartilaginea convexa semitectae.*

*Rectrices plures quam duodecim.*

*Pedes fissi, sed intimo articulo connexi.*

## PHASIANUS.

95 *Phasianus colchicus mas*. Linn. Gen. 101. Sp. 3.

Buff. 5; fig. 1. ad pag. 200.

96 *Phasianus colchicus femina*. Linn. ib.

Buff. 5; fig. 2. ad pag. 200.

## TETRAO.

97 *Tetrao Tetrix mas*. Linn. S. N. Gen. 103. Sp. 2.

Buff. 5; fig. 1. ad pag. 32.

98 *Tetrao Tetrix femina*. Linn. ibid.

Buff. 5; fig. 2. ad pag. 32.

99 *Tetrao Perdix mas*. Linn. S. N. Gen. 103. Sp. 13.

Buff. 6; fig. ad pag. 12.

*Guttura rufescente, abdomine ferrugineo, pectoreque griseo.*

100 *Tetrao Perdix femina*. Linn. ibid.

*Guttura pallidiore, abdomine ferrugineo, albido, interrupto.*

101 *Tetrao Coturnix*. Linn. S. N. Gen. 103. Sp. 20.

Buff. 6; fig. ad pag. 78.

## Ordo VI. PASSERES.

*Rostrum conicum, acuminatum.*

*Nares ovatae, patulae, nudaee.*

## COLUMBA.

102 *Columba domestica*. Linn. Gen. 104. Sp. 1. var.  $\beta$ .

Buff. 6. fig. ad p. 162.

*Monstrofa; pedibus enim gaudet tribus. (J. S.)*

- 103 *Columba palumbus mas.* Linn. Gen. 104. Sp. 19.  
Buff. 6; fig. ad pag. 238.
- 104 *Columba palumbus femina.* Linn. ib.  
Magnitudine duntaxat minore a mare differt.
- 105 *Columba risoria.* Linn. S. N. Gen. 104. Sp. 33.  
Buff. 6; fig. 2. ad pag. 271.  
*Corpus rufescens, annulo collari nigro.*

## ALAUDA.

- 106 *Alauda arvensis.* Linn. S. N. Gen. 105. Sp. 1.  
Frisch. Tab. 15. fig. 1.
- 107 *Alauda pratensis.* Linn. S. N. Gen. 105. Sp. 2.  
Frisch. Tab. 16.

## STURNUS.

- 108 *Sturnus vulgaris.* Linn. S. N. Gen. 106. Sp. 1.  
Buff. 8; fig. ad pag. 5.

## TURDUS.

- 109 *Turdus viscivorus.* Linn. S. N. Gen. 107. Sp. 1.  
Buff. 8; fig. ad pag. 260.
- 110 *Turdus pilaris.* Linn. S. N. Gen. 107. Sp. 2.  
Buff. 8; fig. ad pag. 276.
- 111 *Turdus iliacus.* Linn. S. N. Gen. 107. Sp. 3.  
Buff. 8; fig. ad pag. 296.
- 112 *Turdus Merula.* Linn. S. N. Gen. 107. Sp. 22.  
Buff. 9; fig. 1. ad pag. 5.  
*Varietas muris perrara, quae undique atra, nitens,  
in medio dorsi autem, capitis atque pectoris, macula alba  
est notata.*
- 113 *Turdus torquatus.* Linn. S. N. Gen. 107. Sp. 23.  
Buff. 9; fig. 2. ad pag. 36.

## AMPELIS.

- 114 *Ampelis Garrulus.* Linn. S. N. Gen. 108. Sp. 1.  
Buff. 9; fig. 1. ad pag. 214. et 221.

## LOXIA.

- 115 *Loxia coccothraustes.* Linn. S. N. Gen. 109. Sp. 2.  
Buff. 10; fig. 1. ad pag. 5.  
*Ferruginea, nigroque varia, pectore rufescente gula-  
que atra.*

116 *Loxia Chloris*. Linn. S. N. Gen. 109. Sp. 27.

Buff. 10; fig. 1. ad pag. 225.

*Mas*; femoribus luteis.

117 *Loxia Chloris*. Linn. S. N. ibid.

*Femina*; femoribus griseis.

118 *Loxia Capensis*. Linn. S. N. Gen. 109. Sp. 39.

Briss. av. 3. tab. 16. fig. 1.

Capite, collo, gula, pectore, abdomine et cauda nitente-atris, uropygio atque tectricibus alarum penultimis, luteis, remigibus fuscis, luteo marginatis.

### EMBERIZA.

119 *Emberiza citrinella*. Linn. S. N. Gen. 110. Sp. 5.

Buff. 12; fig. ad pag. 206.

*Mas*, subtus splendide lutea maculis rufis ad pectus notata.

120 *Emberiza citrinella*. Linn. ibid.

*Femina*; subtus pallide lutea, pennis virecentibus variegata.

121 *Emberiza paradisea*. Linn. S. N. Gen. 110. Sp. 19.

Buff. 11; fig. 1. ad pag. 198.

Spec. non satis bene conservatum.

### TANAGRA.

122 *Tanagra bresilia*. Linn. S. N. Gen. III. Sp. 2.

Buff. 12; fig. ad pag. 83.

Superne tota coccinea, fronte, temporibus et fauce aequae ac pectore cum abdomine nitente-atris, remigibus caudaque fuscis, tectricibus superioribus remigum rufescens, femoribus griseis. Cap. b. Sp.

Specimen hoc Africanum magnitudine, Fringillam domesticam superat.

123 *Tanagra violacea*. Linn. S. N. Gen. III. Sp. 5.

Buff. 12. fig. ad pag. 97.

124 *Tanagra cyanea*. Linn. S. N. Gen. 110. Sp. 6.

Buff. 11, fig. ad pag. 54.

Artibus ex-atro fuscis, pileo, temporibus gula atque uropygio coeruleis, remigum tectricibus primis splendissime cyaneis, coeruleo marginatis. Corpus subtus dilute flavescentia. Rostrum brevissimum ut in specie praecedente.

## FRINGILLA.

- 125 Fringilla *coelebs*. Linn. S. N. Gen. 112. Sp. 3.  
Buff. 11; fig. ad pag. 83.
- 125a Fringilla *amandava*. Linn. S. N. Gen. 112. Sp. 10.  
Briss. av. 3. p. 206. t. 10. fig. 4.
- 125b Fringilla *canaria*. Linn. S. N. G. 112. Sp. 23.  
Buff. 10; fig. 1. ad pag. 105.
- 126 Fringilla *cannabina*. Linn. S. N. Gen. 112. Sp. 28.  
Buff. 11; fig. ad pag. 5.
- 127 Fringilla *linaria*. Linn. S. N. Gen. 112. Sp. 29.  
Buff. 11; fig. 1. ad pag. 509.

## MUSCICAPA.

- 128 Muscicapa *atricapilla*. Linn. S. N. Gen. 113. Sp. 9.  
Frisch. Tab. 24.  
*Mas*; fascia utrinque a rostro ad collum albida, pe.  
ctore rufescente.
- 129 Muscicapa *atricapilla*. Linn. ibid.  
*Femina*; absque fasciis ocularibus; subtusque grisea.

## MOTACILLA.

- 130 Motacilla *alba*. Linn. S. N. Gen. 114. Sp. 11.  
Frisch. Tab. 23. fig. 3.
- 131 Motacilla *flava*. Linn. S. N. Gen. 114. Sp. 12.  
Frisch. Tab. 23. fig. 4.
- 132 Motacilla *Oenanthe*. Linn. S. N. Gen. 114. Sp. 15.  
Frisch. Tab. 22.
- 133 Motacilla *Rubetra*. Linn. S. N. Gen. 114. Sp. 16.  
Briss. av. 3. Tab. 24. fig. 1.  
Remigibus fascia alba non interruptis ut in fig. eit.
- 135 Motacilla *Phoenicurus*. Linn. S. N. Gen. 114. Sp. 34.  
Frisch. Tab. 19. fig. 1.  
Avis pulcherrime varia.
- 136 Motacilla *Rubecola*. Linn. S. N. Gen. 114. Sp. 45.  
Frisch. Tab. 19. fig. 2.
- 137 Motacilla *Trochilus*. Linn. S. N. Gen. 114. Sp. 49.  
Frisch. Tab. 24. fig. 2.

## PIPRA.

- 138 Pipra *aureola*. Linn. S. N. Gen. 115. Sp. 7.  
Br. av. 4. tab. 34. fig. 3.  
Abdomen spec. nostr. anticum quoque coccineum.

139 *Pipra tricolor.*

*P. nigra*, fronte, gula, temporibus, humerisque *cyanis*, remigibus rectricibusque nigris margine exteriore virescentibus, occipite, dorso, pediore abdomineque *viridibus*; uropygio, crissloque concoloribus. Cap. b. Sp. Magnitudo fere Fring. Canar. — Haec avis Fring. tricolori quam maxime adsimilis, sed rostro *integerrimo*, abdomineque *viridi*, ab ea differt.

## PARUS.

- 140 141 *Parus major*, mas et femina. Linn. S. N. Gen. 146. Sp. 3.

Frisch. Tab. 13. fig. 1. 2.

- 142 *Parus palustris*. Linn. S. N. Gen. 146. Sp. 8.

Frisch. Tab. 13. fig. 4.

## III. Ad oeconomiam ornithologicam.

A. *Nidi.*

- 143 *Nidus pendulus*, e ramulis arborum constructus, apertura laterali supra; magnitudine sesqui pedis.

vid. J. R. Forsteri Enchiridion histor. Nat. inferv. pag. 25.

- 144 *Nidus pendulus* subglobiformis e pappis plantarum confectus, apertura laterali quoque supra; magnitudine 8 poll. etiam Africanus. 2.

- 145 *Nidus* e muscis confectus, *forma globi excavati atque dimidiati*.

- 146 *Nidus*, *forma vulgari*, luto argilloso aggestus, et extus ramulis intertextis arborum munitus. Patria Nr. 143 - 146. comm. Cap. b. Sp.

- 147 *Nidi vulgares*, av. Europaearum, plures.

B. *Ova.*

- 148 *Ovum Corvi Picae*, pallidum, punctis virescentibus. 3.

- 149 *Ov. Struthionis Camelis*, maximum 2.

- 150 *Ov. Anatis domesticae*, virescens.

- 151 *Ov. 2 monstrosa Phas. Galli*.

- 152 *Ov. Lari marini*, pallidum, punctis fuscis variegatum.

- 153 *Ov. Charadrii Hiaticulae*. Praeced. persimile sed triplo minus.

XXIV MUS. LESK. REG ANIM. CL. II. AVES.

- 154 Ov. Sternae Hirund. virescens maculis nigris haud angustis varium 2.  
155 Ov. Stern. nigr., flavescens, atro maculatum 2.  
156 Ov. Stern. minutae, pallidum punctis atris adspersum tenuibus.  
157 Ov. Tetraonis Perdicis, glaucum et fere immaculatum 2.  
158 Ov. Motacillae modularis, decolor. 2.  
159 Ov. Fringillae coelibis, albidum, varicibus rubris.  
160 Ov. Fring. montifringillae, pallide rufescens.  
161 Ov. Fring. Carduelis.
- 

CLAS.

**C L A S S I S   I I I .**

**A M P H I B I A.**



# REGNI ANIMALIS

## CLASSIS III.

### A M P H I B I A.

#### Ordo I. REPTILES.

*Os respirans pulmonibus,  
Pedes quatuor.*

#### TESTUDO.

- 1 *Testudo Caretta.* Linn. S. N. Gen. 119. Sp. 4.  
Seb. thes. 1. tab. 80. fig. 9.  
Varietas nostra nondum est adulta superne atra, sub-  
tusque flavescentis, 4. (J. S.)
- 2 *Testudo orbicularis.* Linn. S. N. Gen. 119. Sp. 5.  
Testa cum animali inhabitante. 2.
- 3 *Testudinis orbicularis testae, tegmen dorsale solitarium.*
- 4 *Testudo denticulata.* Linn. S. N. Gen. 119. Sp. 9.  
Albida, pedibus rufescens, capite squamis ferru-  
gineo-fuscis, obtecto. (J. S.)
- 5 *Testudo Graeca.* Linn. S. N. Gen. 119. Sp. 10.  
Testa ipsius duntaxat sine animali. 3.
- 6 *Testudo geometrica.* Linn. S. N. Gen. 119. Sp. 13.  
Seb. thes. 1. tab. 80. fig. 8.  
Testa quoque tantum, animali defic. 2.

#### RANA.

- 7 *Rana Pipa.* Linn. S. N. Gen. 120. Sp. 1.  
Seb. thes. 1. Tab. 77. fig. 1 - 4.
- 8 *Rana Bufo.* Linn. S. N. Gen. 120. Sp. 3.
- 9 *Rana typhonia.* Linn. S. N. Gen. 120. Sp. 9.
- 10 *Rana ocellata.* Linn. S. N. Gen. 120. Sp. 10.  
Seb. thes. 1. tab. 76. fig. 1.
- 11 *Rana marginata.* Linn. S. N. Gen. 120. Sp. 12.
- 12 *Rana paradoxa.* Linn. S. N. Gen. 120. Sp. 13.  
Seb. thes. 1. tab. 78.

## DRACO.

- 13 *Draco volans*. Linn. S. N. Gen. 121. Sp. 1.

Seb. thes. 1. tab. 102. fig. 2.

*Corpus squamosum, squamulis parvis munitum; ala albida, coerulecente fuscoque varia. Cauda corpore sesquimajor, sqamulis armatum submuricatis. Java.* — *Genus distinctissimum, inter Ranas et Lacertas.*

## LACERTA.

\* *Cauda compressa; Corpore vestito subsquamoso.*

- 14 *Lacerta Crocodilus*. Linn. S. N. Gen. 122. Sp. 1.

Seb. thes. 1. tab. 103.

*Flavescens, fusco maculata.*

- 15 *Lacerta Crocodilus*. Linn. ib.

*Virescens, fusco confertim fasciata.*

- 16 *Lacerta Crocodilus*. Linn. ib.

*Fusca, luteo transversim fasciata.*

*Not. Omnia huius speciei specim. nostra nondum adulta sesquipedem vix aequant.*

- 17 *Lacerta Dracaena*. Linn. S. N. Gen. 122. Sp. 3.

Seb. thes. 1. tab. 101. fig. 1.

- 18 *Lacerta Monitor*. Linn. S. N. Gen. 122. Sp. 6.

Seb. thes. 1. tab. 94. fig. 1 - 3.

\*\* *Cauda verticillata.*

- 19 *Lacerta Cordylus*. Linn. S. N. Gen. 122. Sp. 9.

Seb. thes. 1. tab. 84. fig. 3. 4.

- 20 *Lacerta Stellio*. Linn. S. N. Gen. 122. Sp. 10.

Seb. thes. 2. tab. 8. fig. 7. In duplo.

- 21 *Lacerta mauritanica*. Linn. S. N. Gen. 122. Sp. 11.

Seb. thes. 1. tab. 108. fig. 2. 6. 7.

*Not. Specimen nostrum varietatem refert singularem, cum cauda laevis nec muricata ut secundum Linn. sit. Attamen vero minime ad L. Gecko vel ad aliam speciem pertinet, cum corpus reliquum spinis frequentibus, omnibusque aliis gaudet characteribus mauritanicae.*

- 22 *Lacerta agilis*. Linn. S. N. Gen. 122. Sp. 15. var. β.

Seb. thes. 2. tab. 4. fig. 4. 5.

*Virescens, punctis ferrugineis longitudinaliter notata. Europ.*

- 23 *Lacerta agilis*. Linn. ibid.  
*Nebulosa virescens, fasciis brunneis longitudinalibus, interieatis punctis albidis, ordinatim locatis. Adulta, cum pulla. Exot.*
- 24 *Lacerta algira*. Linn. S. N. Gen. 22. Sp. 16.  
*Dorso dilute fusca, linea longitudinali perangusta, variegata flavescente.*
- 25 *Lacerta Seps*, Linn. S. N. Gen. 122. Sp. 17.
- 26 *Lacerta angulata*. Linn. S. N. Gen. 122. Sp. 19.  
 \*\*\* Cauda tereti imbricata, corpore breviore.
- 27 *Lacerta Chamaeleon*. Linn. S. N. Gen. 122. Sp. 20.  
 Seb. thes. 1. tab. 82. fig. 1-5.
- 28 *Lacerta Gecko*. Linn. S. N. Gen. 122. Sp. 21.  
 Seb. thes. 1. tab. 108. fig. 1. 3. 5.  
 \*\*\*\* Cauda tereti imbricata, corpore longiore.
- 29 *Lacerta Iguana*. Linn. S. N. Gen. 122. Sp. 26.  
 Seb. thes. 1. tab. 97. fig. 3.  
 Adulta; dorso virescente.
- 30 *Lacerta Iguana*. Linn. ibid.  
 Duplo minor, dorso *fusco*, postice pallida maculata.
- 31 *Lacerta Iguana*. Linn. ibid.  
 Dorso *coeruleofcente*.
- 32 *Lacerta Agama*. Linn. S. N. Gen. 122. Sp. 28.  
 Seb. thes. 1. tab. 107. fig. 1-3.  
 Dorso *coeruleo, fusco albidoque maculata*.
- 33 *Lacerta Agama*. Linn. ibid.  
 Dorso *coeruleo immaculato*.
- 34 *Lacerta marmorata*. Linn. S. N. Gen. 122. Sp. 31.  
 Seb. thes. 2. tab. 76. fig. 4.  
 Dorso *brunneo, maculis paucis coerulecentibus, varia*.
- 35 *Lacerta marmorata*. Linn. ibid.  
 Praecedenti concolor, *fascia autem longitudinali in medio dorsi pallida*.
- 36 *Lacerta marmorata*. Linn. ibid.  
 Dorso *flavescente-ferrugineo*.
- 37 *Lacerta marmorata*. Linn. ibid.  
 Dorso *pallido, ferrugineo atque coeruleofcente maculato*.

- 33 *Lacerta marmorata*. Linn. ibid.  
*Duplo minor, abdomine pallido virescente maculato.*
- 39 *Lacerta Teguixin*. Linn. S. N. Gen. 122. Sp. 34.  
 Seb. thes. 1. tab. 96. fig. 1.  
*Dorso coerulescente, ocellis, latere utroque albidis varia.*
- 40 *Lacerta Teguixin*. Linn. ibid.  
*Dorso nigro cyaneoque longitudinaliter fasciata, latere utroque ocellis frequentioribus variegata albidis; pulcherrima.*
- 41 *Lacerta Teguixin*. Linn. ibid.  
*Dorso atro, annulis punctisque pallidis atque angustis transversim fasciata.* 2.
- 42 *Lacerta aurata*. Linn. S. N. Gen. 122. Sp. 35.  
 Seb. thes. 1. tab. 89. fig. 3.  
*Fasciis 2. flavescentibus ad latera dorsi longitudinalibus.*
- 43 *Lacerta aurata*. Linn. ibid.  
*Fasciis 3 angustissimis dorsi flavescentibus.*
- 44 *Lacerta punctata*. Linn. S. N. Gen. 122. Sp. 38.  
 Seb. thes. 2. tab. 2. fig. 9. In duplo.  
 \*\*\*\* Palnis tetradactylis; Corpore alepidoto nudo.
- 45 *Lacerta palustris*. Linn. Gen. 122. Sp. 44.  
 Seb. thes. 1. tab. 89. fig. 4. 5.  
*Subfusca, dorso, fascia albida longitudinali et angusta.*
- 46 *Lacerta palustris*. Linn. ibid.  
*Varietas monstrosa.*
- 47 *Lacerta palustris*. Linn. ibid. *nullus.*  
 \*\*\*\*\* *Pedibus exiguis* †).
- 48 *Lacerta serpens*. Linn. Gen. 126. Sp. 1. *Anguis quadrupes.*  
 Berl. Beschäftig. der Naturforsch. Freunde T. 2. Tab. 2. pag. 28.

Ordo

†) Huius familiae inscriptio *nosta*, Lacertam quoque comprehendit *anguinam* Linn. atque *apodam* Pall. nam pedes alterius ratione numeri, alterius autem ratfone magnitudinis omnium minimae, a *pedibus* Lacertarum, ad familias ceteras pertinentium, *discrepant*.

## Ordo II. SERPENTES.

*Os respirans tantum pulmonibus.**Pedes nulli, Pinnaeve natatoriae nullae.**Aures nullae.*

## CROTALUS.

49 *Crotalus horridus.* Linn. S. N. Gen. 123. Sp. 2.

Seb. thes. 2. tab. 95. fig. 1.

Pullus; dorso, maculis ex atro-fuscis concatenatis, notatus, longitudine vix sesqui pedali, et crassitie pollicis. Americanus.

50 *Crot. Dryinas.* Linn. S. N. Gen. 123. Sp. 3.

Seb. thes. 2. tab. 95. fig. 3.

Magnitudine circiter antecedentis.

51 *Crot. Durissus.* Linn. S. N. Gen. 123. Sp. 4.

Seb. thes. 2. tab. 95. fig. 2.

*Pictura perdistinctus*, sed nondum adultus; magnitudine enim 2 pedes vix superat, et crassitie sesquidigitum circiter sequat.52 *Crot. Dutissus.* Linn. ibid.

Minor et colore pallidiore, uterque Americ.

53 *Crot. mutus.* Linn. S. N. Gen. 123. Sp. 5.

Cuius longitudo duos pedes et dimidium superat.

## BOA.

54 *Boa Constrictor.* Linn. S. N. Gen. 124. Sp. 4.

Seb. 2. tab. 19. fig. 1.

Atro, ferrugineo alboque maculata.

Long. 2. ped. crass. fere sesquidigitali. Amer.

## COLUBER.

55 *Coluber striatulus.* Linn. S. N. G 126. Sp. 7.

Corpus laevigatum subtus albidum, dorso maculis ferrugineis subhexagonis variegatum.

56 *Col. plicatilis.* Linn. S. N. Gen. 125. Sp. 9.

Seb. thes. 1. tab. 57. fig. 5.

57 *Col. Domicella.* Linn. S. N. Gen. 129. Sp. 10.

Seb. thes. 2. tab. 54. fig. 1.

Sec. observationes nostras, huic varietati Domicellae 168 sunt scuta abdominalia, atque 67 squamae subcaudales. Differentia permagna a computatione Linnaei.

58 Colu-

- 58 *Coluber Berus*. Linn. S. N. Gen. 125. Sp. 14.  
*Vitta dorsali fusca, abdomine albido.*
- 59 *Col. Berus*. Linn. ibid.  
*Varietas longior ac tenuior, abdomine glauco.*
- 60a *Col. coeruleus*. Linn. S. N. Gen. 125. Sp. 18  
*Seb. thes. 2. tab. 13. fig. 3.*
- 60b *Col. melanocephalus*. Linn. S. N. Gen. 125. Sp. 24.  
*Perlaevis, brunascens, caput utrinque atro, haud an-*  
*guste fasciatum oculis coeruleoscentibus.*  
*Scut. abdom. 165. sq. subcaud. 47.*
- 61 *Col. ordinatus*. Linn. S. N. Gen. 125. Sp. 28.  
*Seb. thes. 2. tab. 20. fig. 2.*
- 62 *Col. mexicanus?* Linn. S. N. Gen. 125. Sp. 29.  
*Scut. summa integra 206, nempe abdominalia 146, squa-*  
*miae autem subcaudales 60. Differentia a Linnaeo haud*  
*magna.*  
*Albidus, squamulis dorsalibus rufescente marginatis;*  
*abdomine fasciis transversis rufescentibus variegato. 2.*
- 63 *Col. Aurora*. Linn. S. N. Gen. 125. Sp. 26.  
*Seb. thes. 2. tab. 78. fig. 3.*
- 64 *Col. flotatus*. Linn. S. N. Gen. 125. Sp. 29.  
*Seb. thes. 2. tab. 9. fig. 1.*
- 65 *Col. rhombatus*. Linn. S. N. Gen. 125. Sp. 30.
- 66 *Col. Natrix*. Linn. S. N. Gen. 125. Sp. 32.  
*Supra, colore virescente, subtus albido.*
- 67 *Col. agilis*. Linn. S. N. Gen. 125. Sp. 33.  
*Fasciis fuscis albisque subaequalibus, variegatus. 2.*
- 68 *Col. agilis*. Linn. ibid.  
*Fuscus, fasciis albidis angustis annulatus.*
- 69 *Col. pallidus*. Linn. S. N. Gen. 125. Sp. 39.
- 70 *Col. lineatus*. Linn. S. N. Gen. 125. Sp. 40.  
*Seb. thes. 2. tab. 12. fig. 3..*  
*Sublividus, vittis linearibus 4 fuscis, quarum duas me-*  
*diae in unam confluent.*
- 71 *Col. lineatus*. Linn. ibid.  
*Rufescens, vittis quatuor obscurioribus longitudinali-*  
*ter variegatis, subtus flavescens immaculatus.*

- 72 Coluber Padera. Linn. S. N. Gen. 125. Sp. 42.  
Albus, maculis *ex atro-fuscis*, varius.
- 73 Col. Padera. Linn. ibid.  
Albus, maculis *ferrugineis*.
- 74 Col. Sibilaus. Linn. S. N. Gen. 125. Sp. 45.  
Seb. thes. 2. tab. 107. fig. 4.
- 75 Col. Sibon. Linn. S. N. Gen. 125. Sp. 49.  
Seb. thes. 1. tab. 14. fig. 4.
- 76 Col. nebulatus. Linn. S. N. Gen. 125. Sp. 50.  
Ferrugineo cinereoque nebulatus, subtus albidus, punctis fuscis adspersis 5.
- 77 Col. saturninus. Linn. S. N. Gen. 125. Sp. 52.  
Dilute coeruleus, oculis magnis flavescentibus.
- 78 Col. Lemniscatus. Linn. S. N. Gen. 125. Sp. 68.  
Seb. thes. 2. tab. 76. fig. 3.
- 79 Col. annulatus. Linn. S. N. Gen. 125. Sp. 66.  
Seb. thes. 2. tab. 38. fig. 2.
- 80 Col. petiola. Linn. S. N. Gen. 125. Sp. 71.  
Seb. thes. 1. tab. 54. fig. 4.
- 81 Col. petalarius. Linn. S. N. Gen. 125. Sp. 75.
- 82 Col. pullatus. Linn. S. N. Gen. 125. Sp. 78.  
Albidus, capite juguloque superne atris,
- 83 Col. cinereus. Linn. S. N. Gen. 125. Sp. 81.
- 84 Col. myterizans. Linn. S. N. Gen. 125. Sp. 86.  
Seb. thes. 2. tab. 23. fig. 2.
- 85 Col. Argus. Linn. S. N. Gen. 125. Sp. 88.  
Seb. thes. 2. tab. 103. fig. 1.
- 86 Pulli colubrini, membranula ovi adhuc circumdati, sed *exclusione proximi*.
- 87 Ova colubrina flavescentia, magnitudine ovorum Columbae domesticae, duodecim forma regulari ovarii vaginac in haerentia.

## ANGUIS.

- 88 Anguis Meleagris. Linn. S. N. Gen. 126. Sp. 3,  
Seb. thes. 2. tab. 21. fig. 4.
- 89 Ang. maculata. Linn. S. N. Gen. 126. Sp. 5.  
Seb. thes. 2. tab. 100. fig. 2.

90 *Anguis reticulata*. Linn. S. N. Gen. 126. Sp. 6.  
Squam. abdom. numer. 170; caud. 12. — 2.

91 *Ang. Scytale*. Linn. S. N. Gen. 126. Sp. 13.  
Seb. thes. 2. tab. 7. fig. 4.

92 *Ang. fragilis*. Linn. S. N. Gen. 126. Sp. 15.  
Squam. abdom. 134. caud. 77.  
Spec. nostr. medium igitur, inter specimen Linnaei ac  
Gronovii, cum secundum huius computationem num-  
merus sq. caud. 43. tantum, secundum illius autem,  
135 aequet.

#### AMPHISBAENA.

93 *Amphisbaena fuliginosa*. Linn. S. N. Gen. 127. Sp. 1.  
Seb. thes. 1. tab. 88. fig. 3.  
Albo, fuscoque varia.

94 *Amph. fuliginosa*. Linn. ibid.  
Ex albo ferrugineoque maculata. 2.

95 *Amph. alba*. Linn. S. N. Gen. 127. Sp. 2.  
Seb. thes. 2. tab. 24. fig. 1.

#### Ordo III. NANTES.

#### PETROMYZON.

96 *Petromyzon fluvialis*, mas atque femina. Linn. S. N.  
Gen. 129. Sp. 2.

Blochs Fische Deutschl. 3. pag. 41. Tab. 78. fig. 1.

97 *Petr. Planeri*.

Blochs F. Deutschl. 3. pag. 47. Tab. 78. fig. 3.

98 *Petr. branchialis*. Linn. S. N. Gen. 129. Sp. 3.

Blochs F. Deutschl. 3. pag. 47. Tab. 78. fig. 2.

#### R A J A.

99 *Raja Aquila*. Linn. S. N. Gen. 130. Sp. 6.

Blochs F. Deutschl. 3. pag. 59. Tab. 81.

100 *Raja clavata*. Linn. S. N. Gen. 130. Sp. 8.

Bloch. I. c. pag. 65. Tab. 83.

101 *Ovum Rajae*.

#### S Q U A L U S.

102 *Embryo Squali Acanthiae*. Linn. S. N. G. 131. Sp. 1.

103 *Squalus Squatina*. Linn. S. N. Gen. 131. Sp. 4.

Blochs ausländ. Fische 1. pag. 25. Tab. 116.

104 Ro-

- 104 Rostrum ensiforme Squali *Priftis*. Linn. S. N. Gen. 131. Sp. 15.

Rostrum squali *adulti*, longitudine duorum pedum et dimidi, latitudine poll. sesquitertii; colore sub-glaucō.

- 105 Rostr. squali eiusdem *pulli*, longitudine poll. 9, latitudine poll. 2.; colore spadiceo.

### LOPHIUS.

- 106 Lophius *Hiftrio*. Linn. S. N. Gen. 133. Sp. 3.

Blochs ausl. F. 1. pag. 13. Tab. II.

- 107 Lophius *Hiftrio Pullus*. Linn. ibid.

Magnitudine quadrante antecedentis. 4.

### ACIPENSER.

- 108 Acipenser *Sturio*. Linn. S. N. Gen. 134. Sp. 1.

Blochs F. Deutschl. 3. pag. 89. Tab. 88.

- 109 Intestinum ex Acipensere Sturione.

### BALISTES.

- 110 Balistes *Monoceros*. Linn. S. N. Gen. 135. Sp. 1.

Blochs ausl. Fische 2. pag. 12. Tab. 147.

- 111 Bal. *verrucosus*. Linn. S. N. Gen. 135. Sp. 5. in duplo;

### OSTRACION.

- 112 Ostracion cornutus. Linn. S. N. Gen. 136. Sp. 6.

Bloch. l. c. 1. pag. 105. Tab. 133.

### TETRODON.

- 113 Tetrodon rostratus Blochii.

Bloch. l. c. 2. pag. 8. Tab. 146. fig. 2.

### DIODON.

- 114 Diodon *Atinga*. Linn. S. N. Gen. 138. Sp. 2. D. *Hystriz*:

Bloch l. c. 1. pag. 66. Tab. 125.

*Linnaeum*, species huius Generis 2, Atingam et Hystricem nempe, quas *Markgravius* primus distinxit, vitiose permutasse, Cel. *Bloch* l. ad. probavit; quare hic non *Linnaeum* sed *Blochium* vel potius *Markgravium* secuti sumus.

- 115 Diod. *orbicularis* Bloch.

Bloch l. a. 1. pag. 75. Tab. 127.

CYCLOPTERUS.

- 116 Cyclopterus Lumpus. Linn. S. N. Gen. 139. Sp. 1,  
Bloch F. Deutsch. 3. pag. 103. Tab. 90

SYNGNATHUS.

- 117 Syngnathus Typhle. Linn. S. N. Gen. 141. Sp. 1.  
Bloch I. c. 3. pag. 112. Tab. 91. fig. 1.

- 118 Syngn. *Acus*. Linn. S. N. Gen. 141. Sp. 2.  
Bloch I. c. 3. pag. 113. Tab. 91. fig. 2.

- 119 Syngn. *Ophidion*. Linn. S. N. Gen. 141. Sp. 5.  
Bloch I. c. 3. pag. 115. Tab. 91. fig. 3.

- 120 Syngn. *Hippocampus*. Linn. S. N. Gen. 141. Sp. 7.  
Bloch ausl. F. 1. pag. 6. Tab. 109. fig. 3.
-

CLASSIS IV.

P I S C E S.



# REGNI ANIMALIS

## CLASSIS IV.

### P I S C E S.

#### Ordo I. APODES.

*Pinnae ventrales nullae.*

#### MURAENA.

- 1 Muraena Helena. Linn. S. N. Gen. 143. Sp. 1. (J. S.)  
Bloch ausl. Fische 2. pag. 31. Tab. 153.

#### AMMODYTES.

- 2 Ammodytes Tobianus. Linn. S. N. Gen. 147. Sp. 1. (J. S.)  
Blochs Fische Deutschl. 3. pag. 24. Tab. 71, fig. 2.

#### Ordo II. JUGULARES.

*Pinnae ventrales pectoralibus anteriores.*

#### GADUS.

- \* Pinnis dorsalibus tribus, ore cirroso.
- 3 Gadus Callarias. Linn. S. N. Gen. 154. Sp. 2  
Bloch l. c. 2. pag. 142. Tab. 63.  
Immaculatus, linea laterali distinctissima.
- \*\* Pinnis dorsalibus tribus, ore imberbi.
- 4 Gadus Merlangus. Linn. S. N. Gen. 154. Sp. 8.  
Bloch l. c. 2. pag. 161. Tab. 65.
- \*\*\* Pinnis dorsalibus duabus.
- 5 Gadus Lota. Linn. S. N. Gen. 154. Sp. 14.  
Bloch l. c. pag. 177. Tab. 70.  
Abdomine pallido, immaculato. (In duplo quorum 1.  
J. S.)

## BLENNUIS.

- 6 Blennuis Gunnellus. Linn. S. N. Gen. 155. Sp. 9.  
Bloch. l. c. 2. pag. 186. Tab. 71. fig. 2.

## Ordo III. THORACICI.

*Pinnae ventrales sub ipso Thorace sitae.*

## ECHENEIS.

- 7 Echeneis Remora. Linn. S. N. Gen. 157. Sp. 1.  
Blochs austl. F. 2. pag. 134. Tab. 172. (J. S.)  
8 Echeneis neucrates. Linn. S. N. Gen. 157. Sp. 2.  
Bloch. l. c. 2. pag. 131. Tab. 171. (J. S.)

## COTTUS.

- 9 Cottus cataphractus. Linn. S. N. Gen. 160. Sp. 1.  
Blochs F. Deutschl. 2. p. 15. Tab. 39. fig. 3. 4. (J. S.)  
10 Cottus Scorpious. Linn. S. N. Gen. 160. Sp. 5.  
Bloch. l. c. 2. p. 18. Tab. 40. (J. S.) 2.  
11 Cottus Gobio. Linn. S. N. Gen. 160. Sp. 6.  
Bloch. l. c. 2. pag. 12. Tab. 39. fig. 1.

## ZEUS.

- 12 Zeus Faber. Linn. S. N. Gen. 162. Sp. 3.  
Bloch. l. c. 2. pag. 24. Tab. 41.  
13 Zeus Aper. Linn. S. N. Gen. 162. Sp. 3. (J. S.)

## PLEURONECTES.

\* Oculis a latere dextro.

- 14 Pleur. Hippoglossus. Linn. S. N. Gen. 163. Sp. 4.  
Bloch. l. c. 2. pag. 36. Tab. 43.  
15 Pleur. Platessa. Linn. S. N. Gen. 163. Sp. 6.  
Bloch. l. c. 2. pag. 31. Tab. 42.  
In duplo; alter ocellis adhuc distinctis, alter autem se-  
re deletis.  
16 Pleur. Fleesus. Linn. S. N. Gen. 163. Sp. 7.  
Bloch. l. c. 2. pag. 39. Tab. 44.  
17 Pleur. Solea. Linn. S. N. Gen. 163. Sp. 9.  
Bloch l. c. 2. pag. 42. Tab. 45.  
\*\* Oculis a latere sinistro.  
18 Pleur. Rhombus. Linn. S. N. Gen. 163. Sp. 12.  
Bloch l. c. pag. 36. Tab. 43. in duplo.

- 19 Pleur.

- 19 *Pleur. maximus.* Linn. S. N. Gen. 163. Sp. 14.  
Bloch l. c. 2. pag. 53. Tab. 49. in duplo.  
20 *Pleur. Passer.* Linn. S. N. Gen. 163. Sp. 15.  
Bloch l. c. pag. 57. Tab. 50.

## CHAETODON.

- 21 *Chaetodon alepidatus.* Linn. S. N. Gen. 164. Sp. 2. (J. S.)  
22 *Chaet. arcuatus.* Linn. S. N. Gen. 164. Sp. 8. (J. S.)  
Blochs ausl. Fische 3. pag. 62. Tab. 198. fig. 2.  
23 *Chaet. rostratus.* Linn. S. N. Gen. 164. Sp. 9. (J. S.)  
Bloch l. c. 3. pag. 78. Tab. 202. fig. 1.  
24 *Chaet. lineatus.* Linn. S. N. Gen. 164. Sp. 12. (J. S.)  
Seb. thes. 3. tab. 25. fig. 1.  
*Ferrugineis, lineis obscurioribus quatuor radiatus.* —  
Quam speciem in Bloch Cel. operibus desiderari, valde miror.  
25 *Chaet. striatus.* Linn. S. N. Gen. 164. Sp. 16. (J. S.)  
Bloch ausl. F. 3. pag. 90. Tab. 206. fig. 1.  
26 *Chaet. capistratus.* Linn. S. N. Gen. 164. Sp. 18. (J. S.)  
Bloch l. c. 3. pag. 72. Tab. 205. fig. 2.  
27 *Chaet. vagabundus.* Linn. S. N. Gen. 164. Sp. 19. (J. S.)  
Bloch l. c. 3. pag. 88. Tab. 204. fig. 2.  
27a *Chaet. ciliaris.* Linn. S. N. Gen. 164. Sp. 20. (J. S.)  
Bloch l. c. 3. pag. 111. Tab. 214.  
28 *Chaet. mesoleucus.* Bloch. (J. S.)  
Bloch l. c. 3. pag. 117. Tab. 216. fig. 2.

## LABRUS.

- 29 *Labrus marginalis.* Linn. S. N. Gen. 166. Sp. 13. (J. S.)

## PERCA.

- \* *Pinnis dorsalibus 2 distinctis.*  
30 *Perca fluviatilis.* Linn. S. N. Gen. 168. Sp. 1.  
Blochs F. Deutschl. 2. pag. 66. Tab. 52.  
\*\* *Dorso monopterygio, cauda bifida.*  
31 *Perca Cernua.* Linn. S. N. Gen. 168. Sp. 36.  
Bloch l. c. 2. pag. 74. Tab. 53. fig. 2.

## GASTEROSTEUS.

- 32 *Gasterosteus aculeatus.* Linn. S. N. Gen. 169. Sp. 1.  
Bloch l. c. 2. pag. 79. Tab. 53. fig. 3.

## SCOMBER.

\*Pinnulis spuriis distinctis.

- 33 Scomber *Scomber*. Linn. S. N. Gen. 170. Sp. 1.  
Bloch l. c. 2. pag. 88. Tab. 54.

\*\* Pinnulis spuriis connatis.

- 34 Scomber *Trachurus*. Linn. S. N. Gen. 170. Sp. 6,  
Bloch l. c. 2. pag. 104. Tab. 56.

## MULLUS.

- 35 Mullus imberbis. Linn. S. N. Gen. 171. Sp. 3.  
Ex rufescente virens, fasciis 2 ferrugineis ad truncum  
partem anticam.

## TRIGLA.

- 36 Trigla *Hirundo*. Linn. S. N. Gen. 172. Sp. 6. in duplo.  
Bloch l. c. 2. pag. 126. Tab. 60.
- 37 Trigla *evolans*. Linn. S. N. Gen. 172. Sp. 8.  
Ferrugineo fasciata. (J. S.)

## Ordo IV. ABDOMINALES.

*Pinnae ventrales, pone Thoracem, in abdome fitas.*

## COBITIS.

- 38 Cobitis *Barbatula*. Linn. S. N. Gen. 173. Sp. 2.  
Bloch l. c. 1. pag. 224. Tab. 31. fig. 3.
- 39 Cob. *Taenia*. Linn. S. N. Gen. 173. Sp. 3. in duplo.  
Bloch l. c. 1. pag. 221. Tab. 31. fig. 2.

## SILURUS.

- 40 Silurus *Astrodon*. Linn. S. N. Gen. 175. Sp. 3. (J. S.)  
Gronov. mus. Ichtyol. pag. 8. nr. 26.  
Seb. thes. 3. tab. 29. fig. 10. pag. 102.
- 41 Sil. *Myctus*. Linn. S. N. Gen. 175. Sp. 4. (J. S.)  
Colore subferrugineo, corpore tenui, cirris octo brevioribus.
- 42 Sil. *galeatus*. Linn. S. N. Gen. 175. Sp. 11. (J. S.)  
Seb. thes. 3. pag. 85. tab. 19. fig. 7.
- 43 Sil. *Clarias*. Linn. S. N. Gen. 175. Sp. 15. (J. S.)  
Blochs F. Deutschl. 1. pag. 247. Tab. 35. fig. 1.
- 44 Sil. *cataphractus*. Linn. S. N. 175. Sp. 21. (J. S.)  
Gron. mus. Ichtyol. Tab. 3. fig. 3. 4. pag. 28. nr. 71.  
Seb. Callichthys, cirris 6, lateribus uno squamarum ordine.

LORI-

## LORICARIA.

- 45 Loricaria *Plecostomus*. Linn. S. N. Gen. 177. Sp. 2. (J. S.)  
Gron. mus. Icht. Tab. 3. fig. 1. 2. pag. 24, nr. 67.

## SALMO.

- \* *Truttae*, corpore variegato.
- 46 Salmo *Salar*. Linn. S. N. Gen. 178. Sp. 1. (J. S.)  
Bloch F. Deutschl. 3. pag. 146. Tab. 98.  
mas; fascia quoque laterali brunascente.
- 47 S. *Trutta*. Linn. S. N. Gen. 178. Sp. 3. In duplo.  
Bloch l. c. 1. pag. 143. Tab. 21,
- 48 S. *Fario*. Linn. S. N. Gen. 178. Sp. 4. In duplo.  
Bloch l. c. 1. pag. 148. Tab. 22.
- \*\* *Osmeri*, pinna dorsali anique oppositis.
- 49 S. *Eperlanus-marinus* Blochii.  
Bloch. l. c. 1. pag. 182. Tab. 28. fig. 1.
- \*\*\* *Coregoni*, dentibus vix conspicuis.
- 50 S. *Albula*. Linn. S. N. Gen. 178. Sp. 16.
- 51 S. *Thymallus*. Linn. S. N. Gen. 178. Sp. 17.  
Bloch l. c. 1. pag. 170. Tab. 26.  
Corpo lato, striis longitudinalibus paullulum deletis.
- 52 S. *Maraenula* Bloch.  
Bloch l. c. 1. pag. 176. T. 28. fig. 3.

## FISTULARIA.

- 53 Fistularia *paradoxa*. Pall. Spic. Zool. VIII. tab. 4. fig. 6.

## ESOX.

- 54 Esox *Lucius*. Linn. S. N. Gen. 180. Sp. 5.  
Bloch l. c. 1. pag. 229. Tab. 32.  
Ocellis albidis solum.
- 55 Esox *Lucius*. Linn. ibid.  
*Striis albidis transversis quoque variis.*
- 56 Esqx *Belone*. Linn. S. N. Gen. 180. Sp. 6.  
Bloch pag. 236. Tab. 33.

## EXOCOETUS.

- 57 Exocoetus *volitans*, Linn. S. N. Gen. 185. Sp. 1. (J. S.)  
Gron. mus. Ichtyol. pag. 9, nr. 27.

## CLUPEA.

- 58 Clupea *Harengus*. Linn. S. N. Gen. 188. Sp. 1.  
Bloch l. c. 1. pag. 236. Tab. 33.

- 59 *Clupea Sprattus*. Linn. S. N. Gen. 188. Sp. 2. in duplo.  
 59<sup>a</sup> *Clupea Alofa*. Linn. S. N. Gen. 188. Sp. 3. in duplo.  
     Bloch l. c. 1. pag. 209. Tab. 30. fig. 1.  
 60 *Clupea mystus*. Linn. S. N. Gen. 188. Sp. 9.  
     Virescens, fusco maculata.

## CYPRINUS.

- \* *Barbati* seu ad os cirroſi.  
 61 *Cyprinus Gobio*. Linn. S. N. Gen. 189. Sp. 3.  
     Bloch l. c. 1. pag. 57. Tab. 8. fig. 2.  
     \*\* *Pinna caudae* indivisa,  
 62 *Cyprin. Carassius*. Linn. S. N. Gen. 189. Sp. 5.  
     Bloch l. c. 1. pag. 69. Tab. 11.  
     \*\*\* *Pinna caudae* trifida.  
 63 *Cypr. auratus*. Linn. S. N. Gen. 189. Sp. 7. (J. S.) 2.  
     Bloch l. c. 3. pag. 132. Tab. 93.  
     \*\*\*\* *Pinna caudae* bifida.  
 64 *Cypr. Phoxinus*. Linn. S. N. Gen. 189. Sp. 10.  
     Bloch l. c. 1. pag. 60. Tab. 8. fig. 5.  
 65 *Cypr. Dobula*. Linn. S. N. Gen. 189. Sp. 13-4.  
     Bloch l. c. 1. pag. 42. Tab. 5.  
 66 *Cypr. Rutilus*. Linn. S. N. Gen. 189. Sp. 16.  
     Bloch l. c. 1. pag. 32. Tab. 2.  
 67 *Cypr. Jefes*. Linn. S. N. Gen. 189. Sp. 20-2.  
     Bloch l. c. p. 45. Tab. 6.  
 68 *Cypr. Nasus*. Linn. S. N. Gen. 189. Sp. 21.  
     Bloch l. c. 1. pag. 35. Tab. 3.  
 69 *Cypr. Aspius*. Linn. S. N. Gen. 189. Sp. 22. — 3.  
     Bloch l. c. 1. pag. 48. Tab. 7.  
 70 *Cypr. bipunctatus* Bloch.  
     Bloch l. c. 1. pag. 50. Tab. 8. fig. 1.  
 71 *Cypr. Brama*. Linn. S. N. Gen. 189. Sp. 27.  
     Bloch l. c. 1. pag. 75. Tab. 13.  
 72 *Cypr. pleistyia* Leskii. Spec. Icht. pag. 69. n. 15. — 2.  
     Bloch l. c. 1. pag. 65. Tab. 10.
-

## CLASSIS V.


## I N S E C T A.

C U R A J. J. Z S C H A C H I I.

---

Haec classis a Clariss. J. J. Zschachio Med. Bacc. elaborata, jam  
ante annum et quod excurrit sub titulo: Museum N. G.  
Leskeanum. Pars entomologica, ad systema entomologiae  
Cl. Fabricii ordinata 8 maj. in bibliopolio Mulleriano typis  
expressa est. Quae entomologica collectio, cum singula-  
rem collectoris curam exposcat, fortassis a reliquo museo  
sejuncta, naturae scrutatori, cuius imprimis interstit,  
istam possidere, separatim divendetur.

Orius fidei 1786



CLASSIS I.  
E L E U T E R A T A.

I. LUCANUS.

- L**uc. Cervus. F. S. *L. 2. Eur.*  
2. L. Cervus minor. — — *Eur.*  
3. L. Interruptus. F. S. *L. 7. Americ.*  
4. L. Parallelepipedus. F. S. *L. 6. Eur.*  
5. L. Caraboides. F. S. *L. 8. Eur.*

2. SCARABAEUS.

\* *Scutellati thorace cornuto.*

6. Sc. Actaeon. F. S. *S. 14. Amer. Bras.*  
7. Sc. Boas. F. S. *S. 17. ad Sierr. Leon.*  
8. Sc. Typhoeus. F. S. *S. 26. Germ. Hispan.*  
9. Sc. Nasicornis. F. S. *S. 29. Eur.*  
10. Sc. Cylindricus. F. S. *S. 33. Eur.*  
11. Sc. Mobilicornis. F. S. *S. 32. Herfort Anglorum.*

\*\* *Scutellati thorace inermi, capite cornuto.*

12. Sc. \* *scutellatus thorace inermi, quadripunctato, fronte ruga, vertice tuberculo armato, elytris laevissime striatis, tarsis anticis nullis.*  
13. Sc. Fosfor. F. S. *S. 47. Eur. †*  
14. Sc. Piceus. F. S. *S. 44. Indus. ††*  
15. Sc. Subterraneus. F. S. *S. 46. Eur.*  
16. Sc. Bimaculatus. F. Mantiss. Tom. 1. *S. 67. Eur.*  
17. Sc. Fimetarius. F. S. *S. 51. Eur.*  
18. Sc. Sordidus. F. S. *S. 55. Eur.*  
19. Sc. Inquinatus. F. M. Tom. 1. *Sc. 74. Eur.*  
20. Sc. Terrestris. F. S. *S. 48. Eur.*

21. Sc.

† *Variat elytris rufo-nigris.*

†† *Thorax glaber, laevis, vesiculis adspersus: elytra punctato-striata, vesiculosa,*

21. Sc. \* scutellatus, niger, thorace inermi, capite tuberculato, intermedio prominulo: elytris sordide testaceis, sutura marginibusque fusco-brunneis. *Eur.*

22. Sc. \* scutellatus fuscus, thorace inermi, laevi, marginibus externis lividis, capite obsolete tuberculato, elytris striatis, fusco-nebulosis, pedibus testaceis. *Eur.*

\*\*\* *Scutellati mutici, capite thoraceque inermi.*

24. Sc. Scaber. F. S. *S. 58. Indus.*

25. Sc. Stercorarius. F. S. *S. 60. Eur.*

26. Sc. Vernalis. F. S. *S. 61. Eur.*

27. Sc. Rufipes. F. S. *S. 68. Eur.*

28. Sc. Luridus. F. S. *S. 69. Eur.*

29. Sc. 4-maculatus. F. S. *S. 70. Eur.*

30. Sc. Granarius. F. S. *S. 56. Eur.*

31. Sc. Merdarius. F. S. *S. 73. Eur.*

32. Sc. Quisquilius. F. S. *S. 74. Eur. †*

33. Sc. Porcatus. F. S. *S. 75. Eur.*

34. Sc. \* scutellatus, muticus, ater, thorace laevi, elytris striatis. *Eur.*

35. Sc. \* scutellatus, muticus, ater, glaber, thoracis margine extero, elytris pedibusque sordide testaceis. *Eur.*

\*\*\*\* *Exscutellati thorace cornuto.*

36. Sc. Molosces. F. M. Tom. I. *S. 134. Exotic.*

37. Sc. Fricato. F. M. Tom. I. *S. 140. Indus.*

38. Sc. Lunaris. F. S. *S. 86. Eur.*

39. Sc. Lemur. F. M. Tom. I. *S. 127. ††*

\*\*\*\*\* *Exscutellati thorace inermi, capite cornuto.*

40. Sc. Schaefferi. F. S. *S. 117. Eur.*

41. Sc. Taurus. F. S. *S. 100. Eur.*

42. Sc. Taurus minor, cornubus brevioribus. *Eur.*

43. Sc. Vacca. F. S. *S. 101. Eur.*

44. Sc. Capra. F. M. Tom. I. *S. 144. Eur.*

45. Sc. Vitulus. F. M. Tom. I. *S. 145. Eur.*

46. Sc. Nuchicornis. F. S. *S. 104. Eur. †††.*

47. Sc.

† Varietatem Scar. Merdarii esse iudicat Cl. Fabricius, at triplo maior, glaber, aterrimusque.

†† F. Sp. Inf. App. Habitat Lipsiae. Dom. Prof. Leske.

††† Variat I. capite thoraceque aeneo.

2. Elytris punctis sparsis.

3. Cornu erecto brevissimo.

DSI

47. Sc. \* nuchicornis minor, occipite spina erecta, brevi, elytris lividis, maculis confluentibus nigris. *Eur.*  
 48. Sc. \* exscutellatus, testaceo-fuscus, clypeo rugis duabus, antennis lividis, thorace antice tuberculis, margine externo livido, in medio tuberculo obtuso, elytris fuscis, singulo maculis 9. rufo-testaceis, basi 4, in medio 2. et ad apicem 3., pedibus lividis. *Exoticus.*

\*\*\*\*\* *Exscutellati mutici.*

49. Sc. Sacer. F. M. Tom. 1. S. 159. in *Eur. Australi.*  
 50. Sc. Pallipes. F. M. Tom. 1. S. 174. *Eur.*  
 51. Sc. Schreberi. F. S. S. 120. *Eur.* †.  
 52. Sc. \* exscutellatus, muticus, niger, elytris striatis, punctatis. *Eur.*  
 53. Sc. \* exscutellatus, muticus, niger, thorace rotundato, guttis eminentibus glabris, capitum clypeo impresso, apice bifido, elytris profunde striatis, crenatis, maculis oblongis, e pilis luteis. *Exotic.*

3. T R O X.

54. Tr. \* niger, capite retracto, punctis elevatis sex, thorace dorso sulcato, punctis elevatis scabro, elytris abdomen superantibns, punctis elevatis striatis, novem ordinibus, striisque transverse undulatis. *Exotic.*  
 55. Tr. \* niger, capite retracto, fronte tuberculis duobus, thorace tuberculato, elytris abdomen superantibus, ordinibus novem punctorum elevatorum diversae magnitudinis. *Exotic.*  
 56. Tr. Sabulosus. F. S. T. 1. *Eur.*  
 57. Tr. Arenarius. F. M. Tom. 1. T. 2. *Eur.*

4. MELOLONTA.

58. Me. Fullo. F. S. M. 1. *Eur.*  
 59. Me. Vulgaris. F. S. M. 2. *Eur.*  
 60. Me. Solstitialis. F. S. M. 5. *Eur.*  
 61. Me. Frischii. F. S. M. 25. *Eur.*  
 62. Me. \* capite, thorace, pectore obsolete violacea, thorace margine externo testaceo, macula in medio violacea, elytris, abdomine pedibusque testaceis, ano fusco-violaceo, femoribus antice violaceis. Magnitudo et statura Mel. Frischii. *Eur.*  
 63. Me. Ruficornis. F. S. M. 6. *Eur.*

A 2

64.

† Mas capitum ruga postica bidentata.

64. Me. Fruticola. F. M. Tom. i. *M. 56. Eur.*  
 65. Me. Horticola. F. S. *M. 28. Eur.*  
 66. Me. Agricola. F. S. *M. 29. Eur.*  
 67. Me. Dentipes. F. M. Tom. i. *M. 64. Exotic.*  
 68. Me. Crassipes. F. M. Tom. i. *M. 68. Exotic.*  
 69. Me. Farinosa. F. S. *M. 31. Eur.*  
 70. Me. Pulverulenta. F. S. *M. 33. Argentor.*  
 71. Me. Brunnea F. S. *M. 20. Eur.* †  
 72. Me. \* fusco-violacea, thorace fusco, luteo, piloso, capitit  
     clypeo apice reflexo, elytris testaceis. *Eur.*

## 5. TRICHIUS.

73. Tr. Fasciatus. F. S. *T. 1. Eur.*  
 74. Tr. Hemipterus. F. S. *T. 4. Eur.*  
 75. Tr. \* hirsutus, totus niger, clypeo angusto, spicē bifido.  
*Exoticus. In 2plo.*  
 76. Tr. \* griseus, tomentosus, thorace fusco, clypeo spicē an-  
     gusto, sulcato, bifido, elytris rufis, margine nigris, pilo-  
     sis, pedibus posticis elongatis unguiculatis. *Exotic. In*  
*2plo. ††*

## 6. CETONIA.

77. Ce. Aurata. Lin. S. *Scar. 78. Eur.*  
 78. Ce. Aurata. Seop. Ent. carn. n. 17. *Eur.*  
 79. Ce. Eremita. F. S. C. 12. *Eur.*  
 80. Ce. Variabilis. Lin. S. *Scar. 79. Eur.* †††  
 81. Ce. Nobilis. F. S. C. 5. *Eur.* ††††  
 82. Ce. Fasicularis F. S. C. 13. *Africana. In duplo.* †††††  
 83. Ce. Africana F. S. C. 25. *Africana.* ††††††  
 84. Ce. Capensis. F. S. C. 14. *Africana. In duplo.*  
 85. Ce. Hirta. F. S. C. 36. *Eur.*  
 86. Ce. Stictica. F. S. C. 37. *Eur. Gall.*

## 7. HI-

† Variat colore brunneo-fuliginoso, cinereo-nitento, in quibus  
 puncta thoracis vix conspicua.

†† Variat elytris fuscis, disco rufescente.

††† Elytris punctis 4 marginalibus abdominis, regione ani duobus  
 albidis. Variat femina colore atro.

†††† In Cl. Fabricii Mantissa Cet. 9. eodem nomine venit: at alia.

††††† In hoc exemplari thoracis lineae impressae absque albedine.

†††††† In hoc exemplari margines thoracis externi antice elytro-  
 rumque testacei, pedes testaceo-aenei, segmentum primum ab-  
 dominis utrinque dente armatum, uti in Cet. Aurata.

## 7. HISTER.

87. Hi. Unicolor. F. S. *H. 2. Eur.*  
 88. Hi. 4-maculatus. F. S. *H. 8. Eur.* †  
 89. Hi. \* unicolor, elytris striis 5-punctatis, dimidiatis, obliquis, regione versus marginem posticum punctata, *H. Unicolo*re triplo minor. *Eur.*  
 90. Hi. \* unicolor, glaber, elytris striis tribus integris duabusque parvulis, interne ad marginem posticum. *H. Unicolo*re 4plo minor. *Eur.*  
 91. Hi. 2-maculatus. F. S. *H. 7. Eur.*  
 92. Hi. Depressus. F. M. Tom. I. *H. 8. Eur.*  
 93. Hi. Detritus. F. S. *H. 10. Eur.*

## 8. APATE.

94. Ap. Hamatus. F. M. Tom. I. *A. 2. Eur.* ††  
 95. Ap. Capucinus. F. S. *Bostrichus. 1. Eur.* †††

## 9. DERMESTES.

96. Der. Lardarius. F. S. *D. 1. Eur.*  
 97. Der. Murinus F. S. *D. 7. Eur.*  
 98. Der. Tesselatus. F. S. *D. 8. Eur.*  
 99. Der. Navalis. F. S. *D. 9. Eur.*  
 100. Der. Pellio. F. S. *D. 4. Eur.*  
 101. Der. \* statura D. Pellionis, absque puncto 2ploque & minor. *Eur.*  
 102. Der. 20-guttatus. F. S. *D. 6. Eur.*  
 103. Der. Violaceus. F. S. *D. 1. Eur.*  
 104. Der. Undatus. F. S. *D. 5. Eur.*  
 105. Der. Fumatus. F. S. *D. 12. Eur.* ††††  
 105. b. Der. Pedicularius. Lin. S. *D. 23. Eur.*  
 106. Der. Paniceus. F. S. *D. 14. Eur.*  
 107. Der. Fenestralis. F. S. *D. 19. Eur.*  
 108. Der. Testaceus. F. S. *D. 15. Eur.*  
 108. b. Der. \* fuscus, capite retracto, antennis pedibusque rufis, minimus. *Eur.*

A 3

10. BO-

† Maculae in aliis distinctae, in aliis cohærentes.

†† Habitat in Saxoniae lignis. Dom. Prof. Leske.

††† Lin. S. Dermestes 5. Faun. Svec. 416. Secundum descriptionem Cl. Linnaei in Faun. Svec. Bostrichus esse nequit; nam huic ita, ut in nostro exemplari, antennae non clava solida, sed tribus articulis distinctis persolitatae.

††† Scop. Ent. Carn. n. 29. Dermestes Rosae.

## 10. BOSTRICHUS.

109. Bo. Typographus. F. S. *B. 2. Eur.*  
 110. Bo Scolytus. F. S. *B. 4. Eur.*  
 111. Bo. Crenatus. F. M. Tom. I. *B. 10. Eur.*  
 112. Bo. \* fuscus, elytris striatis, striis apice cohaerentibus, tibiis extus dentatis, plantis rufis. *Eur.*  
 113. Bo. \* testaceus, pilosus, elytris punctato-striatis, apice retusis, dentatis. *Eur.*

## 11. BYRRHUS.

114. Byr Pilula. F. S. *B. 1. Eur.*  
 115. Byr. Varius. F. S. *B. 2. Eur.*  
 116. Byr. \* virescens, scutello luteo. *Eur.*  
 117. Byr. acneus. F. S. *B. 3. Eur.*

## 12. ANTHRENUS.

118. An Scrophulariae F. S. *A. 2. Eur.*  
 119. An Pimpinellae. F. S. *A. 1. Gall.*  
 119. b. An. \* fuscus, pilis luteis laevissime tomentosus, apice pallido. *Eur.*  
 120. An. Verbasci. F. S. *A. 4. Eur.*

## 13. ANOBIA.

121. Ano. \* fuscum, polline griseo variegatum, antennis ferrugineis, scutello griseo, abdomine pedibusque fuscis. *Eur.*  
 122. Ano. \* rufum luteo-nitens, thorace utrinque postice macula lutea, elytris striatis, striis punctatis. *Eur.*  
 123. Ano. \* ferrugineum, thorace inaequali, elytris striatis, striis punctatis, antennis rufescientibus, 3. ultimis articulis compressis, obconicis, maioribus. *Eur.*  
 124. Ano Pertinax. F. S. *A. 1. Eur.*  
 125. Ano. Pectinicorne. F. S. *Hisp. 3. Eur.* †  
 126. Ano Molle. F. S. *A. 2. Eur.*  
 127. Ano. testaceum, antennarum 3. ultimis articulis maioribus, elytris laevissime striatis. *Eur.*  
 127. b. Ano \* brunneum, elytris laevissime striatis, pubescensibus. *Eur.*

## 14. PTINUS.

128. Pt. Fur. F. S. *P. 2. Eur.*  
 129. Pt. Latro. F. S. *P. 4. Eur.*

† Femina antennis serratis.

130. Pt. \* apterus, capite fuscō, fronte canaliculata, thorace fuscō, mutico, elytris connatis rufis, antennis rufis, filiformibus, pedibus rufis, femoribus clavatis, tibiis ciliatis.

### 15. BRUCHUS.

131. Br. \* niger immaculatus, elytris obsolete striatis, punctatis, femoribus muticis, antennis basi rufis.
131. b. Br. Bactris. F. M. Tom. 1. B. 2. *Americanus*.
132. Br. \* fuscus, elytris rubris, obsolete striatis, punctatis, femoribus muticis, antennarum basi tibiisque rufis.
133. Br. \* fuscus, elytris crenato-striatis, femoribus muticis.
134. Br. Theobromae. F. S. B. 5. *Exotic*.
135. Br. \* ferrugineus, pectore nigro, albo-maculato, femoribus posticis acute dentatis, abdomine tribus segmentis, utrinque macula alba, apice linea longitudinali alba, utrinque punctis binis nigris notata.
136. Br. Granarius. F. S. B. 6. *Eur.*

### 16. ELOPHORUS.

137. El. Aquaticus. F. S. *E. 1. Eur.*
137. b. El. \* niger, capite, thorace elytrisque fumatis, statua Coccinellae. *Eur.*
137. c. El. \* fuscus, capite fuscō, thorace fuso-testaceo, elytris testaceo-fuscis, punctato-striatis, antennis pedibusque testaceis. *Eur.*
138. El Minutus. F. S. *El. 2. Eur.*
138. b. El. \* testaceo-griseus, capite fuscō, tuberculis 4. inter oculos, thorace aspero, elytris lineis elevatis sex, intersticiis punctatis. An El. Nubilus?

### 17. SPHAERIDIUM.

139. Sph. Scarabaeoides. F. S. *S. 1. Eur.*
140. Sph. 2-pustulatum. F. M. Tom. 1. *S. 2. Eur.*
141. Sph. Glabrum. F. M. Tom 1. *S. 4. Eur.*
142. Sph. \* atrum, glabrum, antennis, abdomine pedibusque ferrugineis. *Eur.*
143. Sph. Haemorrhoidale. F. S. *S. 5. Eur.*
144. Sph. Pulicarium. F. S. *S. 9. Eur.*
144. b. Sph. Atomarium. F. S. *S. 3. Eur.*
144. c. Sph. \* atrum, glabrum, minimum, capite thoraceque incurvo. *Eur.*

144. d. Sph. \* ferrugineo-fuscum, glabrum, capite thorace-que incurvo. *Eur.*

### 18. TRITOMA.

145. Tr. 2-pustulata. F. S. *T. 1. Eur.*

146. Tr. 4-pustulata. F. S. *T. 3. Eur.*

147. Tr. Rufifrons. F. S. *T. 5. Eur.*

### 19. IPS.

148. Ips Rufipes F. M. Tom. I. *Ips 6. Eur.*

### 20. HISPA.

149. His. Atra. F. S. *H. 7. Eur.*

150. His. Mutica. F. S. *H. 6. Eur.*

### 21. NICROPHORUS.

151. Ni. Germanicus. F. S. *N. 1. Eur.*

152. Ni. Vulgaris. F. S. *N. 2. Eur.*

### 22. SILPHA.

153. Sil. Littoralis. F. S. *S. 2. Eur.*

154. Sil. Lunata. F. M. Tom. I. *S. 12. Eur.*

154. b. Sil. \* elytris punctatis, lineis elevatis tribus, intermedia longissima. *Eur.*

155. Sil. Thoracica. F. S. *S. 6. Eur.*

156. Sil. Laevigata F. S. *S. 10. Eur.*

157. Sil. Atrata. F. S. *S. 9. Eur.*

158. Sil. Quadripunctata. F. S. *S. 14. Eur.*

159. Sil. Paedemontana. F. S. *S. 15. Eur.* †

160. Sil. Sinuata. F. S. *S. 13. Eur.*

161. Sil. Rugosa. F. S. *S. 8. Eur.*

162. Sil. Opaca. F. S. *S. 12. Eur.*

163. Sil. Ferruginea. F. S. *S. 16. Eur.*

164. Sil. Dentata. F. M. Tom. I. *S. 24. ††*

165. Sil. Oblonga. F. S. *S. 17. Eur.*

166. Sil. Colon. Lin. S. Nat. *S. 27. Eur.*

167. Sil. Undata. F. M. Tom. I. *S. 26. Eur.*

168. Sil. 4-pustulata. Lin. S. Nat. *S. 5. Eur.*

169.

† Variat tota nigra.

†† Mus. Dom. Prof. Leske. Habitat in Eur.

169. Sil. \* testacea, oculis nigris, elytris guttis 5. nigris, una communi ad scutellum. *Eur.*
170. Sil. Aestiva. Lin. S. Nat. S. 32. *Eur.*
171. Sil. \* nigra, antennis rufis, apice fuscis, thorace testaceo, dorso fusco, duplice puncto impresso. Elytris testaceis, singulo basi punctis duobus nigris, taenia nigra in medio, fascia inaequali versus apicem, apiceque nigro, pedibus rufis. *Eur.*
172. Sil. \* fusca, pedibus rufis. *Eur.*
173. Sil. \* testacea, capite, thorace, elytrisque fusco-nebulosiss. *Eur.*
174. Sil. \* fusca, antennis pedibusque rufis. *Eur.*
174. b. Sil. \* thorace angusto, dorso sulcato, corpore fusco, elytris rugosis, capite, thorace, elytris, abdomine pedibusque ferrugineis.
174. c. Sil. Succincta. Lin. S. Nat. S. 26. *Eur.*
174. d. Sil. \* nigra, capite, thorace, elytris, pedibusque pallidis, oculis nigris. *Eur.*
174. e. Sil. \* fusco-testacea, capite thoraceque fuscis, elytris sordide testaceis, pedibus lividis, antennis testaceis, ultimis articulis fuscis.
174. f. Sil. \* ferruginea, elytris laevissime striatis. *Eur.*
174. g. Sil. \* nigra, antennis pedibusque rufis, elytris fusco-brunneis. *Eur.*

## 23. OPATRUM.

175. Op. Sabulosum. F. S. O. 1. *Eur.*
176. Op. 4-pustulatum. Lin. Faun. Suec. 549. *Eur.* †
177. Op. Tibiale. F. Species. p. 9. *Op.* 7.
178. Op. \* testaceum, capite rufo, oculis fuscis, antennis moniliformibus sensim crassioribus, 4. primis articulis rufis, reliquis fuscis, ultimo rufo, thorace fusco, punctis 2. impressis, elytris fuscis, striato-punctatis, basi macula magna lunata, versus apicem subquadrata testacea. *Eur.* ††

A 5

179.

† Lin. S. Nat. Chrysomela 4-pustulata. n. 80. Ejusd. Faun. Suec. 811. Carabus. Fabr. S. Cryptocephalus 23. Tam habitu, quam antennis, quae moniliformes et extirorium sensim crassiores, huic generi adiungendum esse puto. Descriptio in Lin. Faun. Suec. 549. in omnibus respondit.

†† Statuta Opatri 4-pustulati. Variat puncto in medio ad marginem anticum, alioque ad angulum apicis testa eo.

179. Op. \* brunneum, luteo - sericeum, elytris laevissime punctis striatis, singulo maculis sex luteis, antennis pedibusque lutescentibus.

### 24. NITIDULA.

180. Ni. Ferruginea. F. S. N. 3. Eur.

181. Ni. Hirta. F. M. Tom. I. N. 20.

### 25. COCCINELLA.

182. Coc. Ocellata. F. S. C. 27. Eur. †

183. Coc. 7 - punctata. F. S. C. 13. Eur.

183. b. Coc. \* Variatio Coc. 7 - punctatae. Puncta 3. in elytro dextro, in sinistro 4., quorum 3. ad marginem externum. Eur.

184. Coc. \* coleoptris rubris, punctis nigris 18., margine pallido, quibusdam albido. Eur. ††

185. Coc. 2 - punctata. F. S. C. 6. Eur.

186. Coc. 5-punctata. F. M. Tom. I. C. 31. Eur.

187. Coc. 13 - punctata. F. M. Tom. I. C. 54. Eur. †††

188. Coc. \* thorace albo, punctis 7., aliis 5., nigris, coleoptris pallide rubris, punctis 11., aliis 6., nonnullis 4., nigris. Eur.

189. Coc. 7-punctata. F. M. Tom. I. C. 37.

190. Coc. Impunctata. F. S. C. 4. Eur. ††††

192. Coc. \* 12 - punctata, coleoptris flavo-rubris, punctis 1. 3. 2., thorace albo, guttis 4. intermedio puncto nigris. Eur. †††††

193. Coc. \* 9-punctata, coleoptris rufescentibus, punctis 1. 2. 1. cum puncto communis ad scutellum, thorace albido, macula scutiformi nigra, in qua puncta duo alba, capite postice fascia nigra. Eur. †††††

194.

† Variat ocellis minoribus paucioribusque.

†† Variat coleoptris flavo - rubris, margine albido, punctis duobus distinctis nigris; reliquis vel obsoletis vel nullis. Caput albidum punctis duobus nigris, thorax albidus punctis 13. nigris, et hac ratione Coc. Margine punctata. F. Mantiss. Tom. I. C. 8.

††† Variat coleoptris flavis rubrisque.

†††† Thorax punctis 5. brunneis.

††††† Variat punto communi ad scutellum et hac ratione Coc. 13-punctata mentitur.

††††† Variat coleoptris rubris, singulo punctis 3 nigris, 2. 1. una cum communi ad scutellum et hac ratione Coc. 7 - punctata mentitur.

194. Coc. \* 11-punctata, coleoptris rubris, punctis nigris undecim, 1. 3. 1., una cum communia ad scutellum, thorace flavescente, guttis 5. nigris et utrinque punctulo nigro. *Eur.*
195. Coc. \* 10-punctata, coleoptris flavo-rufescentibus, punctis 1. 3. 1., thorace maculis 4. punctisque interpositis 3. nigris. *Eur.*
196. Coc. 24-punctata. F. S. C. 33. *Eur.* †
197. Coc. Annulata. Lin. S. C. 5. *Eur.*
198. Coc. Conglobata. Lin. S. C. 30. *Eur.*
199. Coc. Conglomerata. Lin. S. C. 31. *Eur.* ††
200. Coc. 14-maculata. F. M. Tom. I. C. 57. *Eur.*
201. Coc. 6-maculata. F. M. Tom I. C. 35. *Eur.* †††
202. Coc. Hieroglyphica. F. S. C. 7. *Eur.*
203. Coc. 20-punctata. F. S. C. 30. *Eur.*
204. Coc. 12-punctata. F. S. C. 20. *Eur.*
205. Coc. Oblongo-guttata. F. S. C. 42. *Eur.*
206. Coc. 16-guttata. Scop. Ent. carn. n. 249. *Eur.*
207. Coc. 14-guttata. F. S. C. 38. *Eur.*
208. Coc. 10-guttata. F. S. C. 37. *Eur.*
209. Coc. 18-guttata. F. S. C. 40. *Eur.*
210. Coc. \* 12-guttata, coleoptris flavo-rufescentibus, singulo elytro guttis sex albis 1. 2. 2. 1. *Eur.*
211. Coc. \* impunctata, coleoptris flavescentibus, puncto nullo, thorace macula nigra, in qua puncta duo alba. †††
212. Coc. Tigrina. F. S. C. 55. *Eur.*
213. Coc. Cacti. F. S. C. 44. *Eur.*
214. Coc. 6-pustulata. F. S. C. 47. *Eur.* ††††

215.

† Variat 1. singulo elytro punctis 8. nigris.

2. Elytris puncto nullo. Sexus differentia. Capta in coitu, Lin. S. Coce. 4. Impunctata.

3. Col-optimis punctis obsoletis.

4. Col-optimis punctis distinctis omnibus, thoracis disco unico.

†† Differt a Coc. Conglobata, thorace macula magna nigra, antice quadriloba: thorax Coc. conglobatae exhibit puncta 7. nigra.

††† Differt a Coc. Schalleriana puncto basos uno, in reliquis simili.

†††† Thorace punctis nigris septem. Missa ex Suecia.

††††† Variat 1. pustula basi in fasciam extensa, in qua punctum minimum nigrum ad scutellum,

2. pustula posteriore ad medium marginis externi extensa.

215. Cœ. \* coleoptris nigris, singulo basi macula magna luna-  
nata, in medio pustulis duabus et ad apicem unica rubra. *Eur.* †
216. Cœ. 4-pustulata. F. S. C. 46. *Eur.* ††
217. Cœ. \* coleoptris nigris, in medio ad basin lunula pun-  
ctoque in medio rubro, margine elytrorum reflexo.
218. Cœ. 2-pustulata. F. S. C. 45. *Eur.*
219. Cœ. \* thorace nigro, margine albo, coleoptris nigris,  
iuxta basin ad marginem exteriorem lunula rubra. *Eur.*
220. Cœ. \* capite rubro, elytris nigris, singulo in medio pun-  
ctis tribus transversis rubris, abdomine rubro. *Eur.*
221. Cœ. Impustulata F. S. C. 43. *Eur.*
222. Cœ. 14-pustulata F. S. C. 50. *Eur.*
223. Cœ. \* capite albo, macula triangulari nigra, thorace ni-  
gro, anticè albo, elytris nigris, punctis tribus ad margi-  
nem internum, in medio unico, tribusque ad marginem  
externum album margine connexis albis.
224. Cœ. \* thorace nigro, pustula ad marginem externum  
nigra, elytris nigris, singulo postice gutta rubra.
225. Cœ. \* capite thoraceque rubro, elytris nigris apice ru-  
bris. *Eur.*
226. Cœ. \* capite nigro, thorace nigro, margine externo flavo,  
elytris flavis, fascia in medio longitudinali communique  
in sutura nigra. *Americana.*

## 26. CASSIDA.

227. Cas. viridis. F. S. C. 1. *Eur.*
228. Cas. Annulata. F. M. Tora. 1. C. 47. *Exoticæ.*
229. Cas. Reticulata. F. S. C. 25. *Americana.*
230. Cas. Marginata. F. S. C. 16. *India.*
231. Cas. Murraea. F. S. C. 10. *Eur.*
232. Cas. Nebulosa F. S. C. 5. *Eur.*
233. Cas. Affinis F. S. C. 3. *Eur.* †††
234. Cas. Vibex. F. S. C. 4. *Eur.*
235. Cas. Nobilis. F. S. C. 11. *Eur.*
236. Cas. \* ferruginea thorace elytrisque fuscis, punctatis, mar-  
ginibus externis ciliatis. *Eur.*

237.

† Variat basi pustulis duabus loco lunulae Cœ. 10-pustulata.

†† Variat pustula maiore iuxta basin, et minore in medio elytri.  
Cum Cœ. 6-pustulata saepius in coitu.

††† Cassida Nebulosa recens declarata exhibet elytra grisea, nitida,  
thoracem flavescutem, hibernata autem tota sordide grisea.

237. Caf. \* nigra, thorace elytrisque griseis aureo-nitentibus, pedibus lividis.
238. Caf. \* capite pectoreque nigro, clypeo viridi-aureo, antennis viridibus, elytris punctatis, viridi-aureis, abdome pedibusque viridibus. Eur. †

## 27. CHRYSOMELA.

239. Chr. Tenebricosa. F. S. Ch. 1. Eur.
240. Chr. Goettingensis. F. S. Ch. 2. Eur.
241. Chr. Surinamensis. F. M. Tom. I. Ch. 19. Exotica.
242. Chr. Vittata. F. M. Tom. I. Ch. 4. Exotica.
243. Chr. \* ovata, violacea, capite, thorace, elytrisque fusco-violaceis, elytris margine inflexo violaceis, antennis, tibiis plantisque fusco-ferrugineis. Eur.
244. Chr. Haemoptera. F. S. Ch. II. Eur.
245. Chr. Populi. F. S. Ch. 13. Eur.
246. Chr. Staphylaea. F. S. Ch. 14. Eur.
247. Chr. Polita. F. S. Ch. 16. Eur.
248. Chr. Striata. F. M. Tom. I. Ch. 45. Eur.
249. Chr. Boleti. F. S. Ch. 18. Eur.
250. Chr. Collaris. F. S. Ch. 21. Eur.
251. Chr. 10-punctata. F. S. Ch. 25. Eur.
252. Chr. Pallida. F. S. Ch. 26. Eur.
253. Chr. Gloriosa. F. M. Tom I. Ch. 61. Eur.
254. Chr. Faftuosa. F. S. Ch. 36. Eur.
255. Chr. Cuprea. F. S. Ch. 10. Eur. ††
256. Chr. Cerealis. F. S. Ch. 33. Eur.
257. Chr. \* ovata, aenea, capite thoraceque fusco-aeneo, elytris rubris, basi gibbis, pedibus aeneis.
258. Chr. Graminis. F. S. Ch. 9. Eur. †††
259. Chr. Speciosa. F. S. Ch. 37. Eur.
260. Chr. \* oblonga, testacea, elytris punctis profundis striata, singulo maculis 5. nigris, basi 2., in medio 2. et versus apicem 1. notatis, aliis obsoletis, abdomine fusco-testaceo. Eur.
261. Chr. \* oblonga, violacea, nitida, elytris laevissime punctatis.

202.

† Color aurens cum vita perit.

†† Variat capite, thorace, elytris fusco-cupreis, pectore abdomeque nigris, antennarum 4. primis articulis, abdominisque margine sanguineis.

††† Variat tota violacea, abdominis margine sanguineo.

262. Chr. Alni. F. S. *Ch. 53. Eur.*
263. Chr. \* oblonga, nigra, capite rubro, postice puncto ore-que nigro, thorace rubro, utrinque puncto dorsoque late nigro, scutello nigro, elytris rubris futura nigra ad apicem et basin non extensa.
264. Chr. 20-punctata. F. S. *Ch. 65. Eur.*
265. Chr. \* ovata, violacea, capite thoraceque nigro, elytris nigris, profunde punctatis, antennarum basi rubra. *Eur.*
266. Chr. \* ovata, nigra, elytris ordinibus punctorum 5. parium. *Eur.*
267. Chr. \* ovata, violacea. elytris laevissime punctatis. *Eur.*
268. Chr. Sanguinolenta. F. S. *Ch. 40. Eur.*
269. Chr. Limbata. F. S. *Ch. 39. Eur.*
270. Chr. \* ovata, atra, elytris laevibus, punctatis, margine sanguineis. *Eur.*
271. Chr. Aucta. F. M. Tom. 1. *Ch. 69. Eur.*
272. Chr. Rustica F. M. Tom. 1. *Ch. 95. Eur.*
273. Chr. Tanaceti. F. S. *Ch. 51. Eur.*
274. Chr. Sophiae. F. M. Tom. 1. *Ch. 86. Eur.*
275. Chr. \* ovata, nigra, antennis luteo-rufescentibus, elytris laevissime punctatis, novem ordinibus, marginibus inflexis testaceis. *Eur.*
276. Chr. \* ovata, nigra, aeneo-nitens, elytris laevissime punctatis. *Eur.*
277. Chr. \* ovata, testacea, oculis nigris, elytris vix punctatis, femoribus crassis. *Eur.*
278. Chr. Halensis. Lin. S. *Ch. 20. Eur.* †
279. Chr. Armoraciae. F. S. *Ch. 50. Eur.*
280. Chr. \* oblonga, violacea, thorace, elytris tibiisque viridi-aeneis. *Eur.*
281. Chr. \* oblonga, violaceo-aenea, capite, thorace, elytris pedibusque viridi-aeneis, profunde punctatis. *Eur.*
282. Chr. Ruficollis. F. M. Tom. 1. *Ch. 89. Eur.* ††
283. Chr. Vulgatissima. F. S. *Ch. 56. Eur.*
284. Chr. Marginella. F. S. *Ch. 42. Eur.*
285. Chr. \* ovata, nigra, elytris laevissime punctatis, novem ordinibus. *Eur.*
286. Chr. \* oblonga, fusco-aenea, elytris violaceis, punctatis, novem ordinibus, tibiis compressis rufis. *Eur.*

287.

† F. M. Tom. 1. Crioceris 13. Nigricornis.

†† Variat elytris violaceis, antennis basi articulis 5. rufis, reliquis crassis fuscis, unguis nigris.

287. Chr. \* oblonga, capite, thorace pedibusque rufis, elytris testaceis, punctis striatis, maculis duabus oblongis, obsolete fuscis. *Eur.*

## 28. CRYPTOCEPHALUS.

\* *Antennis serratis.*

288. Cr. Longipes. F. S. *C. 1. Eur.*  
 289. Cr. 4-punctatus. F. S. *C. 2. Eur.*  
 290. Cr. Auritus. F. S. *C. 8. Eur.*  
 291. Cr. Tridentatus. F. S. *C. 5. Eur.*  
 292. Cr. Longimanus. F. S. *C. 11. Eur.*  
 293. Cr. 2-maculatus. F. M. Tom. I. *C. 24. Eur.*  
 294. Cr. Cyaneus. F. S. *C. 20. Eur.*  
 295. Cr. 4-maculatus. F. S. *C. 10. Eur.*  
 296. Cr. Bucephalus. F. M. Tom. I. *C. 41. Eur.*  
 297. Cr. Scopolinus. F. S. *C. 30. Eur.*

\*\* *Antennis filiformibus.*

298. Cr. Coeruleus. F. M. Tom. I. *C. 35. Eur.*  
 298. b. Cr. \* capite violaceo, vertice coccineo, thorace coccineo, margine antico posticoque violaceo, elytris violaceis, scapulis elevatis, pedibus violaceis, femoribus coccineis, inermibus, basi apiceque violaceis. *Exoticus.*  
 299. Cr. Sericeus. F. S. *C. 21. Eur.*  
 300. Cr. Coryli. F. S. *C. 16. Eur.*  
 301. Cr. Vitis. F. S. *C. 15. Eur.*  
 302. Cr. Bipunctatus. F. S. *C. 12. Eur.*  
 303. Cr. Cordiger. F. S. *C. 13. Eur.*  
 304. Cr. 6-punctatus. F. S. *C. 18. Eur.*  
 305. Cr. 2-pustulatus. F. M. Tom. I. *C. 53. Eur.*  
 306. Cr. \* ater, nitidus, fronte, ore, pedibus, antennarum basi, elytrorumque margine lutescentibus. *Eur.*  
 307. Cr. Labiatus. F. S. *C. 33. Eur.*  
 308. Cr. Moraei. F. S. *C. 25. Eur.*  
 308. b. Cr. Nitens. F. S. *C. 22. Eur.*  
 309. Cr. Flavilabris. F. M. Tom. I. *C. 67. Eur.*  
 310. Cr. \* fuscus, capite, thorace elytrisque violaceis, elytris profunde punctatis. *Eur.*  
 311. Cr. Flavipes. F. M. Tom. I. *C. 68. Eur.*  
 312. Cr. \* niger, capite flavo, postice nigro, thorace flavo, utrinque maculis duabus connatis, elytris flavis, punctis striatis, basi guttis duabus, totidem in medio, punctoque apicis nigro. Aliis gutta apicis pedesque flavi. *Eur.*

313. Cr. 10-punctatus. F. S. C. 27. Eur.  
 314. Cr. \* ater, glaber, elytris flavis, sutura vittaque atra,  
     apice connata. Eur.  
 315. Cr. \* ater, glaber, elytris punctis striatis, capite, elytro-  
     rum apibus pedibusque flavis. Eur.

## 29. ALTICA.

316. Al. Rufipes. F. S. A. 14. Eur.  
 317. Al. Oleracea. F. S. A. 3. Eur.  
 318. Al. Atra. F. S. A. 21. Eur.  
 319. Al. Hemisphaerica. F. S. A. 22. Eur.  
 320. Al. Testacea. F. S. A. 16. Eur.  
 321. Al. Exoleta. F. S. A. 17. Eur.  
 322. Al. Hyoscyami. F. S. A. 5. Eur.  
 323. Al. Nitidula. F. S. A. 7. Eur.  
 324. Al. \* capite thoraceque viridi-aeneo, punctato, pedibus  
     piceis, elytris rubro-brunneis, versus, suturam nigris,  
     punctato-striatis. Eur.  
 325. Al. \* fusco-aenea, elytris striatis, antennis pedibusque  
     rufis, femoribus posticis fusco-aeneis. Eur.  
 326. Al. Anglicana. F. S. A. 12. Eur.  
 327. Al. Atricilla. F. S. A. 11. Eur.  
 328. Al. Tabida. F. S. A. 19. Eur.  
 329. Al. Nemorum. F. S. A. 20. Eur.  
 330. Al. Helixinis. F. S. A. 8. Eur.  
 331. Al. \* nigra, elytris aeneis, striis crenatis, basi antennarum  
     tibiisque piceis. Eur.  
 332. Al. \* capite thoraceque nigro, elytris testaceo-fusco-  
     glabris, pedibus 4. anticus tibiisque posticis subtestaceis.  
     Eur.  
 333. Al. \* fusco-aenea, elytris striis crenatis, antennarum  
     basi, tibiis 4. anticus rufis, annulo fusco-aeneo notatis. Eur.

## 30. CISTELA.

334. Ci. Ceramboides. F. S. C. 3. Eur.  
 335. Ci. \* ferruginea, capite thoraceque fusco, elytris fusco-  
     crenato-striatis, antennis pedibusque ferrugineis. Eur.  
 336. Ci. Sulphurea. F. S. C. 5. Eur.  
 337. Ci. \* supra polline luteo, subtus argenteo vestita; an-  
     tennis fusco-crenatis, pedibus fusco-ferrugineis. Facie curculio-  
     nis, caput in rostrum breve elongatum, at antennae non  
     fractae palpique securiformes.

338. Ci. \* fusca, ore, elytris pedibusque sulphureis, plantis fuscis. Statura Citt. Sulphureae. *Eur.*
339. Ci. \* fusca, antennis, elytris pedibusque flavo-rufescens-tibus, thorace postice truncato, elytris laevibus. *Eur.*
340. Ci. \* brunnea, abdomine fuscō, elytris laevibus. *Eur.*
341. Ci. Murina. F. S. *C. 7. Eur.*
342. Ci. Cervina. F. S. *C. 1. Eur.*

## 31. CRIOCERIS.

343. Cr. Nymphaeæ. F. S. *C. 1. Eur.*
344. Cr. Capreæ. F. S. *C. 2. Eur.*
345. Cr. Lineola. F. M. Tom. i. *C. 2. Eur.*
346. Cr. Calmariensis. F. S. *C. 4. Eur.*
347. Cr. Tenella. F. S. *C. 6. Eur.*
348. Cr. Sangwinea. F. S. *C. 5. Eur.*
349. Cr. Merdigera. F. S. *C. 10. Eur.*
350. Cr. 12-punctata. F. S. *C. 11. Eur.*
351. Cr. Asparagi. F. S. *C. 19. Eur.*
352. Cr. Phellandrii. F. S. *C. 20. Eur.*
353. Cr. Melanopa. F. S. *C. 17. Eur.*
354. Cr. \* nigra, thorace cylindrico, lateribus gibbosō, capite, thorace, elytrorum sutura marginibusque ferrugineis, elytris testaceis, pedibus, antennis palpisque flavo-rufescens-tibus.
355. Cr. \* thorace cylindrico, lateribus gibbosō, capite rufo, postice nigro, oculis nigris, thorace luteo-rufescente, elytris polline rufo, abdomine argenteo vestitis.
356. Cr. \* thorace cylindrico, lateribus gibbosō, capite, thorace pedibusque flavo-rufescens-tibus, elytris nigris, profunde punctatis.
357. Cr. \* nigra, thorace pedibusque rufis, elytris laevissime punctatis. *Eur.*
358. Cr. \* nigra, thorace flavo, elytris fuscis, antennarum basi, pedibusque flavis, femoribus bâsi fuscis. *Eur.*
359. Cr. Cyanella. F. S. *C. 16. Eur.*
360. Cr. Rufipes. F. M. Tom. i. *C. 43. Eur.*

## 32. EROTYLUS.

361. Er. Morio. F. S. *E. 4. Eur.*
362. Er. Caraboides. Lin. S. *Chrysomela 116. Eur.*

## 33. LAGRIA.

363. La. Hirta. F. S. *L. 8. Eur.*
364. La. Elongata. F. S. *L. 6. Eur.*

365. La. \* elongata, violacea, thorace lateribus gibboſo. *Eur.*  
 366. La. \* fusca, pubescens. *Eur.*

## 34. CURCULIO.

\* *Longirostres, femoribus simplicibus.*

367. Cur. Palmarum. F. S. C. 2. *Indus.*  
 368. Cur. \* longirostris, griseus, thorace basi impresso, dorso  
     ruga abbreviata, elytris griseis albo punctatis decem or-  
     dinibus, interstitiis profunde nigro punctatis, basi ad fu-  
     turam impressis, postice gibbis. *Exoticus.*  
 369. Cur. Paraplecticus. F. S. C. 44. *Eur.*  
 370. Cur. Bardanae. F. M. Tom. I. C. 84. *Eur.*  
 371. Cur. Colon. F. S. C. 12. *Eur.*  
 371. b. Cur. 2-maculatus. F. M. Tom. I. C. 21. *Eur.*  
 372. Cur. Pini. F. S. C. 10. *Eur.*  
 373. Cur. Crassipes. F. S. C. 50. *Eur.*  
 374. Cur. \* longirostris, ater, thorace plano, punctato, linea  
     media parum elevata, elytris abbreviatis, substriatis, in-  
     terstitiis punctatis. *Eur.*  
 375. Cur. Equifeti. F. S. C. 14. *Eur.*  
 376. Cur. Cuprirostris. F. M. Tom. I. C. 43. *Eur.*  
 377. Cur. Betulae. F. S. C. 16. *Eur.*  
 378. Cur. Populi. F. S. C. 17. *Eur.* †  
 379. Cur. \* longirostris, niger, elytris ordine punctatis, fasciis  
     undulatis, interruptis, albis. *Eur.*  
 380. Cur. \* longirostris, fuscus, elytris striatis, interstitiis lae-  
     vislime punctatis, atomis griseis, pilosis adspersis, tibiis  
     rufis. *Eur.*  
 381. Cur. \* longirostris, coccineus, elytris punctatis decem  
     ordinibus. *Eur.*  
 382. Cur. Polygoni. Lin. S. C. 26. *Eur.*  
 383. Cur. Vittatus. Lin. S. C. 33. *Eur.*  
 384. Cur. \* longirostris, griseus, elytris striatis, sutura albida,  
     nigro-punctata, macula oblonga communi versus apicem,  
     marginibus externis postice nigro punctatis; aliisque di-  
     spersis nigris. *Eur.*  
 385. Cur. \* longirostris, griseus, elytris striatis, rostro pedi-  
     busque nigris, tibiis apice incurvis, rubris, platiisque. *Eur.*  
 386. Cur. Aequatus. Lin. S. C. 9. *Eur.*  
 387. Cur. Purpureus. Lin. S. C. 14. *Eur.*  
 388. Cur. \* longirostris, glaber, nigro-coerulescens, rostro  
     arcuato, thorace punctato, elytris striatis. *Eur.*

† Variat totus coeruleus.

389. Cur. Curvirostris. F. M. Tom. i. C. 37. Eur.  
 390. Cur. \* longirostris, niger, glaber, elytris striatis, striis profunde crenatis, rostro longitudine corporis.  
 391. Cur. \* longirostris, capite, thorace, elytris viridé - aureis, rostro pedibusque nigris, abdomine violaceo, elytris profunde punctatis, inter antennas oculosque fovea oblonga impressa. Eur.  
 392. Cur. \* longirostris, oblongus, cylindricus, viridis, nitens, rostro pedibusque cupreo - nitentibus.  
 393. Cur. \* longirostris, niger, rostro compresso, antennis non fractis, apice crassioribus, thorace elytrisque laevissime punctatis. Eur.  
 394. Cur. T album. Litt. S. C. 23. Eur.  
 395. Cur. Pratinii. Litt. S. C. 12. Eur.  
 396. Cur. Alliariae. F. S. C. 27. Eur.  
 397. Cur. Aterrimus. Litt. S. C. 10. Eur.  
 398. Cur. \* longirostris; niger, glaber, elytris striatis, nigro-aeneis. Statura Cur. Alliariae. Eur.  
 399. Cur. \* longirostris, fuscus, elytris striatis, atomis griseis pilosis. Eur.  
 400. Cur. \* longirostris, niger, elytris profunde striatis. Statura Cur. Aterrimi. Eur.  
 401. Cur. Viscariae. Litt. S. C. 27. Eur.  
 402. Cur. Badensis. Litt. S. C. 8. Eur.  
 403. Cur. Flavipes. F. S. C. 33. Eur.  
 404. Cur. Campanulae. Litt. S. C. 7. Eur.  
 405. Cur. \* longirostris, fuscus, elytris rugosis, tibiis ferrugineis. Eur.  
 406. Cur. Cupreus. F. S. C. 20. Eur.  
 407. Cur. \* longirostris, niger, globosus, pilis griseis adspersus, rostro glabro, incurvo, elytris striatis. Eur.  
 408. Cur. Pericarpium. F. S. C. 26. Eur.  
 409. Cur. Acridulus F. S. C. 32. Eur.  
 410. Cur. 4-maculatus. F. S. C. 31. Eur.  
 411. Cur. 4-tuberulatus. F. M. Tomi. i. C. 39. Eur.  
 412. Cur. Erysimi. F. M. Tomi. i. C. 54. Eur.  
 413. Cur. Craccae. Litt. S. C. 6. Eur.  
 414. Cur. Cerasi. Litt. S. C. 11. Eur.  
 415. Cur. Salicariae. F. M. Tom. i. C. 48. Eur.  
 416. Cur. Graianarius. Litt. S. C. 16. Eur.  
 417. Cur. \* longirostris, niger, thorace punctato, elytris striis crenatis, antennis tibiisque sanguineis. Eur.

\*\* *Longirostres, femoribus dentatis.*

418. Cur. Germanus. F. S. C. 67. Eur.  
 419. Cur. Abietis. F. S. C. 59. Eur.  
 420. Cur. Lapathi. F. S. C. 61. Eur.  
 421. Cur. Scrophulariae. F. S. C. 68. Eur.  
 422. Cur. Violaceus. F. S. C. 76. Eur.  
 423. Cur. \* longirostris, oblongus, niger, elytris profunde punctatis reticulatisque, rugis transverse laevissime striatis. Eur.  
 424. Cur. Druparum. F. S. C. 82. Eur.  
 425. Cur. Nucum. F. S. C. 77. Eur.  
 426. Cur. \* longirostris, ferrugineus, elytris fulvo obsolete fasciatis, pedibus posticis dentatis. Eur.  
 427. Cur. \* longirostris, testaceus, capite thoraceque rufo, elytris testaceis, fasciis duabus dentatis, ferrugineis, pedibus rufis, acute dentatis. Eur.  
 428. Cur. 5-punctatus. F. S. C. 70. Eur.  
 429. Cur. Aterrimus. F. S. C. 74. Eur.  
 430. Cur. Pomorum. F. S. C. 84. Eur.  
 431. Cur. \* longirostris, rufus, femoribus dente valido armatus. Eur.  
 432. Cur. \* longirostris, rufus, elytris striatis, femoribus acutte dentatis. Eur.  
 433. Cur. Tortrix. F. S. C. 5. Eur.  
 434. Cur. \* longirostris, niger, subtus cinerascens, elytris striatis, rostro longitudine corporis. Eur.  
 435. Cur. \* longirostris subglobosus, niger, elytris sulcatis, pilosis, cinereis, postice muricatis, tibiis tarfisque rufis. Eur.  
 436. Cur. \* longirostris, subglobosus, cinereus, antennis pedibusque rufescentibus. Eur.  
 437. Cur. Amoenus. F. S. C. 81. Eur.  
 438. Cur. Cerasorum. F. S. C. 80. Eur.  
 439. Cur. \* longirostris, subglobosus, cinereus, thorace griseo, antice tuberculis 4, elytris striatis, singulo disco punctis 2 griseis. Eur.

\*\*\* *Longirostres, femoribus posticis saltatoriis.*

440. Cur. Pilosus. F. M. Tom. 1. C. 152. Eur.  
 441. Cur. \* longirostris, rufus, oculis nigris, pedibus posticis saltatoriis, multidentatis. Eur.  
 442. Cur. Fagi. F. S. C. 93. Eur.  
 443. Cur. Salicis. F. S. C. 91. Eur.

\*\*\*\* *Brevirostres, femoribus muticis.*

444. Cur. Imperialis. F. M. Tom. 1. C. 160. *Exoticus.*  
 445. Cur. \* brevirostris, griseus, oblongus, rostro carinato, catarina utrinque furcata, thorace profunde confuse punctato, elytris profunde punctatis, 10 ordinibus, pollineque griseo adspersis, pedibus anticus longioribus, femoribus tibiisque fusco-annulatis. *Exoticus.*  
 446. Cur. Sulcirostris. F. M. Tom. 1. C. 185. *Eur.*  
 447. Cur. Nebulosus. F. S. C. 104. *Eur.*  
 448. Cur. Capistratus. F. M. Tom. 1. C. 248. *Exoticus.*  
 449. Cur. \* brevirostris, griseus, rostro crasso dorso, ruga impressio, thorace nigro punctato, elytris obsolete rugosis, pilis erectis hispidis, abdomine fusco. *Eur.*  
 450. Cur. \* brevirostris, oblongus, niger, variolosus, polline albo variegatus, elytris fasciis duabus obliquis, macula baseos, apicis et in medio ad marginem externum alba, abdemine nigro punctato. *Eur.*  
 451. Cur. Latiostris. F. S. C. 128. *Eur.*  
 452. Cur. Albinus. F. S. C. 127. *Eur.*  
 453. Cur. \* brevirostris, oblongus, niger, thorace utrinque albo, punctis confluentibus ruguloso, elytris profunde striato-punctatis, fasciis duabus albis, sutura alba connexis. *Eur.* †  
 454. Cur. Viridis. F. S. C. 102. *Eur.*  
 455. Cur. Incanus. F. S. C. 105. *Eur.*  
 456. Cur. \* brevirostris, niger, thorace lineis 4 cinereis, supra elytra ad medium usque extensis, elytris striato-punctatis, basi vittis 4, annexa plaga inaequali cinerea et utrinque punctis dispersis cinereis, ad apicem usque extensis. *Eur.*  
 457. Cur. Niger. F. S. C. 121. *Eur.*  
 458. Cur. Punctatus. F. S. C. 119. *Eur.*  
 459. Cur. \* brevirostris, subglobosus, griseus, rostro explanato, elytris striatis, pilis erectis sebris. *Eur.*  
 460. Cur. 3-guttatus. F. S. C. 109. *Eur.*  
 461. Cur. \* brevirostris, elytris griseo fulvoque variegatis, striato-punctatis, punctisque holosericeis fuscis notatis. *Eur.*  
 462. Cur. Trifinis. F. S. C. 117. *Eur.*  
 463. Cur. \* brevirostris, griseus, rostro crasso, dorso plano, fusco, elytris rugosis, sutura elevata, postice carinata; femoribus fuscis, tibiis rufis, griseo-squamosis. *Eur.*

† Cur. Candidus. Herbst. Füesslin. Archiv. S. 83. Taf. 24. Fig. 31.

464. Cur. Splendidus. Herbst im Archiv, n. 72. Tab. 24. f. 30. +  
 465. Cur. \* brevirostris, niger, ovatus, glaber, thorace punctato, elytris connatis, punctatis, apice acuminatis. Eur.  
 466. Cur. \* brevirostris, elytris striato-punctatis, pilis cinereis adspersis, rostro brevi, lato, stria dorsali exarato. Eur.  
 467. Cur. \* brevirostris, fusca, thorace lineis 4 griseis, elytris striato-punctatis, griseis, pilis brevibus hispidis, marginibus externis albidis. Eur.  
 468. Cur. Hispidulus, F. M. Tom. 1. C. 211. Eur.  
 469. Cur. Undatus. F. M. Tom. 1. C. 210. Eur.  
 470. Cur. \* brevirostris, griseus, thorace, dorso, fusco-ferrugineo et utrinque puncto, elytris rugosis, sutura ferrugineo fusca. Eur.  
 471. Cur. \* brevirostris, rostro fusco, thorace fusco, lineis 3 griseis, elytris rufescentibus, griseo-rugosis, tibiis rufescentibus Eur.  
 472. Cur. \* brevirostris, fusco-griseus, antennis tibiisque rufis. Eur.  
 473. Cur. \* brevirostris, fulvo-griseus, antennis tibiisque rufescens. Eur.  
 474. Cur Lineatus. F. S. C. 111. Eur.  
 475. Cur. \* brevirostris, oblongus, fuscus, cinereo adspersus, antennis rufis, femoribus fuscis, clavatis, tibiis rufis. Eur.  
 476. Cur. Seabriculus. F. S. C. 113. Eur.  
 477. Cur. Coryli. F. S. C. 110. Eur.  
 478. Cur. \* brevirostris, fuscus, elytris striatis, antennis pedibusque rufis. Eur.  
 479. Cur. \* brevirostris, fuscus, griseo-nebulosus, rostro lato, plano, elytris striatis, apice obtusis. Magnitudine pediculi. Statura C. Albini. Eur.  
 480. Cur. Ruficornis. F. S. C. 115. Eur.  
 481. Cur. \* brevirostris, niger, subaeneus, ovatus, hirtus, pilis minimis adspersus, striis punctatis striatus, antennis pedibusque rufis, femoribus nigris. Eur.  
 482. Cur. \* brevirostris, lutosus, ovatus, antennis rufis. Eur.  
 483. Cur. Chloropus. F. S. C. 116. Eur.  
 484. Cur. Marginellus. F. M. Tom. 1. C. 240. Eur.

\*\*\*\*\* *Brevirostres, femoribus dentalis.*

485. Cur. Ligustici. F. S. C. 145. Eur.  
 486. Cur. Nubilus. F. M. Tom. 1. C. 274. Eur.  
 487. Cur. Sulcatus. F. S. C. 146. Eur.

† Laichart. Cur. viride-apris.

488. Cur. *Vagus*. Schaeffer, Tab. 25. Fig. 8. *Eur.*  
 489. Cur. *Nigrita*. F. M. Tom. 1. C. 275. *Eur.*  
 490. Cur. \* *brevirostris*, niger, thorace variolofo, elytris punctis elevatis rugosis, intersticiis punctis minoribus repletis. *Eur.*  
 491. Cur. \* *brevirostris*, ferrugineus, maculis albidis adspersus, villisque brevibus hirtus, thorace punctis confluentibus inaequali, elytris punctis copiosissimis striatis. *Eur.*  
 492. Cur. \* *brevirostris*, fuscus, thorace profunde punctato, rugis longitudinalibus exarato, elytris punctatis rugis complanatis, antennis pedibusque ferrugineis. *Eur.*  
 493. Cur. \* *brevirostris*, fuscus, glaber, thorace punctato, elytris profunde striatis, striis crenatis, basi maculis tribus in medio et versus apicem, polline aureo compositis, lineaque a margine interno versus apicem reflexa notatis, antennis ferrugineis. *Eur.*  
 494. Cur. *Pyri*. F. S. C. 147. *Eur.*  
 495. Cur. *Argentatus*. F. S. C. 148. *Eur.*  
 496. Cur. *Ovatus*. F. S. C. 151. *Eur.*  
 497. Cur. *Oblongus*. F. S. C. 150. *Eur.*  
 498. Cur. *Cervinus*. Lin. S. C. 70. *Eur.*  
 499. Cur. *Mali*. F. M. Tom. 1. C. 282. *Eur.*  
 500. Cur. \* *brevirostris*, corpore viridi-argenteo, antennis tibiisque rufis, femoribus fuscis, clavatis, dentatis. *Eur.*  
 501. Cr. \* *brevirostris*, fuscus, antennis, pedibus abdominalisque apice rufis, elytris fulvo-virescentibus. *Eur.*

### 35. ATTELABUS.

502. Att. *Coryli*. F. S. A. 1. *Eur.*  
 503. Att. *Curculionoides*. F. S. A. 2. *Eur.*  
 504. Att. \* *niger*, thorace elytrisque rufescens, scutello nigro, femoribus tibiisque basi apiceque nigris. *Eur.*  
 505. Att. \* *niger*, thorace elytrisque rubris, thorace dorso macula nigra, femoribus basi apiceque nigris, tibiisque. *Eur.*  
 506. Att. \* *niger*, elytris rubris, laevissime striato-punctatis. *Eur.*  
 507. Att. *Betulae*. F. S. A. 3. *Eur.*

### 36. CLERUS.

508. Cl. *Apiarius*. F. S. C. 4. *Eur.*  
 509. Cl. *Mutillarius*. F. S. C. 1. *Eur.*  
 510. Cl. *Formicarius*. F. S. C. 2. *Eur.*  
 511. Cl. 4-maculatus. F. M. Tom. 1. C. 2. *Eur.*

## 37. NOTOXUS.

512. No. Mollis. F. S. *N. 1. Eur.*  
 512. b. No. Monoceros. F. S. *N. 2. Eur.*

## 38. SPONDYLIS.

513. Sp. Buprestoides. F. S. *S. 1. Eur.*  
 514. Sp. Ceramboides. F. S. *S. 2. Eur.*

## 39. PRIONUS.

515. Pr. Longimanus. F. S. *P. 1. Americanus.*  
 515. b. Pr. Cinnamomeus. F. S. *P. 16. Americanus.*  
 516. Pr. Spinibarbis. F. S. *P. 14. Americanus.*  
 517. Pr. Coriarius. F. S. *P. 7. Eur.*  
 518. Pr. Depsarius. F. M. Tom. 1. *P. 7. Eur.*  
 519. Pr. Planatus. Lin. S. *Cerambyx 17. Eur.*

## 40. CERAMBYX.

520. Cer. Heros. F. S. *C. 14. B. Eur.*  
 521. Cer. Alpinus. F. S. *C. 15. Eur.*  
 521. b. Cer. Succinctus. F. S. *C. 16. Americanus.*  
 522. Cer. Moschatus. F. S. *C. 7. Eur.*  
 523. Cer. Cердо. F. S. *C. 14. Eur.*  
 524. Cer. Aedilis. F. S. *C. 1. Eur.*  
 525. Cer. Varius. F. M. Tom. 1. *C. 2. Eur.*  
 526. Cer. Nebulosus. F. S. *C. 20. Eur.*  
 527. Cer. Hispidus. F. S. *C. 21. Eur.*  
 528. Cer. Fasciculatus. F. M. Tom. 1. *C. 37. Eur.*

## 41. LAMIA.

529. La. Capensis. F. S. *L. 14. Capensis.*  
 530. La. Oculator. F. M. Tom. 1. *L. 23. Exotica.*  
 531. La. Textor. F. S. *L. 5. Eur.*  
 532. La. Sartor. F. M. Tom. 1. *L. 18. Eur.*  
 533. La. Sutor. F. S. *L. 10. Eur.*  
 534. La. <sup>2</sup> thorace spinoso, elytris convexis, nigris, fasciis tribus coccineis, interruptis, apicis fascia angustiore, antennis corpore longioribus. *Exotica.*  
 535. La. <sup>2</sup> thorace 4-spinofo, oblonga, capite luteo, linea dorsali fusca, antennis nigris basi luteis, thorace luteo, dorso lineis tribus fuscis, antice connatis, elytris flavescensibus, rugis duabus margineque fuscis, apice bispinosis, pedibus luteis. *Exotic.*

535. La. Kaehleri. F. S. *L. 13. Eur.*  
 537. La. Circulionoides. F. S. *L. 20. Eur.*  
 538. La. Fuliginator. F. S. *L. 23. Eur.*  
 539. La. Morio. F. M. Tom. 1. *L. 54. Eur.*

## 42. STENOCORUS.

540. Ste. \* thorace spinoso, pubescente, elytris subfastigiatis,  
 testaceis, sutura vittaque fusca. *Eur.*  
 541. Ste. Meridianus. F. S. *St. 1. Eur.* †  
 542. Ste. Glabratus. F. S. *St. 10. Exotic.*

## 43. RHAGIUM.

543. Rh. Inquisitor. F. S. *Rh. 1. Eur.*  
 544. Rh. Bifasciatum. F. S. *Rh. 3. Eur.*  
 545. Rh. Indagator. F. M. Tom. 1. *Rh. 3. Eur.*

## 44. SAPERDA.

546. Sa. Carcharias. F. S. *S. 1. Eur.*  
 547. Sa. Scalaris. F. S. *S. 2. Eur.*  
 548. Sa. Oculata. F. S. *S. 3. Eur.*  
 549. Sa. Punctata. Lin. S. *Cerambyx 7. Eur.*  
 550. Sa. Linearis. F. S. *S. 5. Eur.*  
 551. Sa. Longipes. F. M. Tom. 1. *S. 16. Exotica.*  
 552. Sa. Cardui. F. S. *S. 10. Eur.*  
 553. Sa. Populnea. F. S. *S. 12. Eur.*  
 554. Sa. Latipes. F. M. Tom. 1. *S. 17. Exotica.* ††  
 555. Sa. Nigricornis. F. M. Tom. 1. *S. 24. Eur.* †††  
 556. Sa. Erythrocephala. F. M. Tom. 1. *S. 13. Eur.* ††††

B 5

557.

† Dantur paria utriusque sexus

1. elytris totis fuscis,
2. elytris totis testaceis,
3. elytris fuscis, antice testaceis.

Par tertium e priorum mixtione provenisse ratio suadet; in coitu inveni marem feminamque unicolores, et saepissime marem fuscum, feminam testaceam, rarius marem feminamque elytris fuscis antice testaceis.

†† Habitat ad Cap. Bon. Spei. Prof. Leske.

††† Prof. Leske.

†††† Variat 1. thorace nigro, dorso macula rufa,  
 2. thorace nigro, maculis 3 rufis,  
 3. thorace nigro, maculis 3 rufis, transverse contiguis,  
 4. thorace nigro, maculis 5 rufis.

557. Sa. \* nigra, thorace cylindrico, elytris punctis confluentibus punctatis, antennis mediocribus. *Eur.*
558. Sa. \* testacea, thorace longo, utrinque tuberculato, femoribus clavatis, ferrugineis, antennis fuscis. *Eur.*
559. Sa. Testacea. F. M. Tom. i. S. 34. *Eur.*
560. Sa. Lineola. F. M. Tom. i. S. 38. *Eur.*
561. Sa. Unicolor. F. M. Tom. i. S. 8. *Exotica.*
562. Sa. Praeusta. F. S. S. 16. *Eur.*

#### 45. CALLIDIUM.

563. Cal. Rusticum. F. S. C. 6. *Eur.*
564. Cal. Baiulus. F. S. C. 1. *Eur.*, †
565. Cal. Salicis. F. M. Tom. i. C. 38. *Eur.* ††
566. Cal. Clavipes. F. S. C. 3. *Eur.*
567. Cal. Violaceum. F. S. C. 4. *Eur.* †††
568. Cal. Fennicum. F. S. C. 2. *Eur.*
569. Cal. Striatum. F. S. C. 17. *Eur.*
570. Cal. \* thorace rotundato, nigrum, elytris striatis, brunneis, tibiis plantisque brunneis. *Eur.*
571. Cal. Praeustum. F. M. Tom. i. C. 27. *Eur.*
572. Cal. Femoratum. F. M. Tom. i. C. 9. *Eur.* ††††
573. Cal. \* thorace laevi, nitido, corpore nigro, opaco, elytris laevibus, femoribus rubris, compressis, tibiis ferrugineis, antennis mediocribus. *Eur.*
574. Cal. \* thorace rotundato, viridi, fovea utrinque impressa, elytris testacea viridibus, rugoso-reticulatis, antennis pedibusque fusco-testaceis. *Eur.*
575. Cal. Fuscum. F. M. Tom. i. C. 30. *Eur.*
576. Cal. Sanguineum. F. S. C. 12. *Eur.*
577. Cal. Luridum. F. S. C. 14. *Eur.*
578. Cal. \* thorace violaceo, subpiloso, capite subviolaceo, antennis luteis, apice fuscis, elytris violaceis, pubescentibus, femoribus piceis, basi tibiisque luteis. *Eur.*
579. Cal. Lunatum. F. M. Tom. i. C. 47. *Exoticum.*
580. Cal. \* thorace rotundato, antice maculis 4, postice totidem punctis fulvis, pilosis, capite nigro, fulvo, piloso, fronte

† Variat elytris pallide testaceis, singulo in medio maculis 2 cinereis.

†† Elytra nigra, viridi-nitentia, margine inflexo rufescente: plerumque femina. Scutello fuscum, aliis testacea, elytris testaceis s. rufescens: plerumque mas.

††† Specimina nostra tota violacea, solo abdomine fuscum.

†††† Variat femoribus basi apiceque nigris.

te furca glabra ad antennas producta, elytris fuscis, utrinque ad scutellum puncto, dein fascia undata, in medio puncta duo, dein fascia tenuis, sinuata, alba, abdomen p. desque fusco-ferruginei. *Eur.*

- 581. Cal. Detritum. F. S. C. 31. *Eur.*
- 582. Cal. Arctuatum. F. S. C. 26. *Eur.*
- 583. Cal. Mysticum. F. S. C. 34. *Eur.* †
- 584. Cal. Verbasci. F. S. C. 32. *Eur.*
- 585. Cal. Arietis. F. S. C. 27. *Eur.*
- 586. Cal. Rusticum. F. S. C. 28. *Eur.*
- 587. Cal. Annulare. F. M. Tom. I. C. 59. *Exatic.*
- 588. Cal. \* nigrum, pectorē, abdomine 3 primis segmentis marginē externo canis, elytris puncto versus basi in marginē inflexo, fasciisque 2 deorsum arquatis, linearibus, sutura unitis, albis apiceque albo-cinereis. *Eur.*

#### 46. DONACIA. F. S. Genus 51.

- 589. Do. \* (Bicolora) capite, thorace, abdomine subtus pedibusque aureis, thorace supra viridi, elytris viridibus, striato-punctatis, hinc inde impressis, femoribus clavatis, posticis dentatis. *Eur.*
- 590. Do. \* (Craspis) viridi-aenea, subtus cinereo-aenea, elytris striato-punctatis, transverse lineolis substriatis, ore, antennis pedibusque rufis, femoribus crassis, posticis multicisis. *Eur.*
- 591. Do. \* (Fusca) capite, thorace, elytris fuscis, elytris punctato-striatis, ore, antennis pedibusque rufis, femoribus posticis dente valido armatis. *Eur.*
- 592. Do. \* (Aenea) capite, thorace, elytris rufo-aeneis, subtus cinereo-aeneis, elytris punctato-striatis, rugis crenatis, femoribus posticis dentatis. *Eur.*
- 593. Do. \* (Sericea) viridi-aurēa, nitida, elytris punctato-striatis, rugis crenatis, vitta lata, purpureo-aenea, antennis, pedibus abdomineque auratis, femoribus posticis dentatis. *Eur.*
- 594. Do. \* (Vulgaris) viridi-argentea, elytris punctato-striatis, rugis crenatis, vitta lata, communī, viridi-purpurea, capite, abdomine pedibusque cinereo-argenteis, femoribus posticis multicisis. *Eur.*
- 595. Do. \* (Caerulea) caerulea, elytris punctato-striatis, rugis crenatis, antennis aeneis, femoribus posticis dentatis. *Eur.*

47. L. E-

† Elytra maribus plerumque tota nigra, fasciae autem feminis compares.

## 47. LEPTURA.

596. Lep. Virens. F. S. *L. 6. Eur.*  
 597. Lep. Rubra. F. S. *L. 4. Eur.*  
 598. Lep. Testacea. F. S. *L. 5. Eur.*  
 599. Lep. 4-fasciata. F. S. *L. 13. Eur.*  
 600. Lep. \* nigra, elytris testaceis, versus basi maculis 5 nigris, duabus utrinque unaque communi, fasciisque tribus nigris, antennis testaceis, nigro annulatis, pedibus testaceis, femoribus posticis versus apicem nigris. *Eur.*  
 601. Lep. Attenuata. F. S. *L. 12. Eur.*  
 602. Lep. 4-maculata. F. S. *L. 10. Eur.*  
 603. Lep. Collaris. F. S. *L. 16. Eur.*  
 604. Lep. 6-maculata. F. S. *L. 11. Eur.*  
 605. Lep. Atra. F. S. *L. 7. Eur.*  
 606. Lep. \* nigra, pedibus rubris, femoribus basi, tibiis apice plantisque nigris. *Eur.*  
 607. Lep. Virginea. F. S. *L. 17. Eur.*  
 608. Lep. Sanguinolenta. F. S. *L. 2. Eur.*  
 609. Lep. Melanura. F. S. *L. 1. Eur.*  
 610. Lep. Nigra. F. S. *L. 8. Eur.*  
 611. Lep. Hastata. F. M. Tom. 1. *L. 2. Eur.*  
 612. Lep. \* nigra, elytris testaceis, apice fuscis. *Eur.*  
 613. Lep. Suturalis. F. M. Tom. 1. *L. 15. Eur.*  
 614. Lep. \* nigra, elytris testaceis, tibiis anticis rufis. *Eur.*  
 615. Lep. 6-guttata. F. M. Tom. 1. *L. 31. Eur.*  
 616. Lep. Praeusta. F. M. Tom. 1. *L. 21. Eur.*  
 617. Lep. \* fusca, aureo-pubescentia, antennis fuscis, basi testaceis, pedibus fuscis, femoribus anticis testaceis, supra fuscis, 4 posticis basi testaceis, tibiis anticis testaceis. *Eur.*  
 618. Lep. Abbreviata. F. S. *L. 18. Eur.*  
 619. Lep. Dimidiata. F. S. *L. 19. Eur.*  
 620. Lep. Umbellatarum. F. S. *L. 21. Eur.*

## 48. LAMPYRIS.

621. Lam. Larva Lam. Noctilueae. Lin. Faun. Suec. 699.  
*Eur.*  
 622. Lam. Splendidula. F. S. *L. 2. Eur.*

## 49. PYROCHROA.

623. Py. Peetinicornis. F. M. Tom. 1. *P. 3. Eur.*  
 624. Py. Coccinea. F. S. *P. 1. Eur.*  
 625. Py. Sanguinea. F. S. *P. 2. Eur.*

626. Py. \*atra, thorace orbiculato, rubro, dorso macula impressa nigra, elytris rubris. *Eur.*

50. LYCUS. F. M. Gen. 58.

627. Ly. Palliata. F. M. Tom. I. *L. 2. Capensis.*

51. HORIA. F. M. Gen. 59.

628. Ho. Dermestoides. F. M. Tom. I. *H. 2. Eur.*

52. CUCUIUS.

629. Cu. Coeruleus. F. M. Tom. I. *C. 3. Eur.*

629. b. Cu. \*thorace quadrato, nigro, postice dentato, in medio tuberculato, ad marginem externum rugoso, antice elevato, capite nigro, in medio sulcato, antennis filiformibus fuscis, elytris crenato-striatis s. reticulatis, testaceis, ad futuram fuseescentibus, dorso depresso, abdome nigro, pedibus simplicibus testaceis.

629. c. Cu. Flavipes. F. M. Tom. I. *C. 6. Eur.* †

53. CANTHARIS.

630. Can. Fusca. F. S. C. I. *Eur.*

631. Can. \*testacea, capite postice, oculis, pectore, abdome flavis marginibus nigris. *Eur.*

632. Can. \*thorace marginato, rufa, capite rufa, vertice fuso, antennis basi rufis, elytris fuscis, corpore fuso, abdome fuso, marginibus apiceque rufis, pedibus rufis, femoribus posticis apice tibiisque 4 posticis fuscis. *Eur.*

633. Can. \*nigra, ore abdomineque rufa. *Eur.*

634. Can. Livida. F. S. C. 2. *Eur.*

635. Can. Obscura. F. S. C. 3. *Eur.*

636. Can. Melanura. F. S. C. 9. *Eur.*

637. Can. Pallipes. F. M. Tom. I. C. II. *Eur.*

638. Can. \*livida, thorace marginato, oculis corporeque fuscis, abdominalis segmentis utrinque puncto fuso. *Eur.*

639. Can. \*nigra, thorace marginato, rufa, antice macula nigra, capite nigro, infra oculos rufa, antennis basi, abdome pedibusque rufis. *Eur.*

640. Can. \*thorace marginato, luteo, capite nigro, infra oculos luteo, elytris fuscis, abdome pedibusque lividis. *Eur.*

641. Can. Testacea. F. S. C. II. *Eur.*

642.

† Lin. S. Cerambyx planatus. n. 17.

642. Can. \* thorace marginato, livido, macula nigra, postice triloba, usque punctis duobus impressis fusca, capite antice livido punctis duobus nigris, postice nigro, dentibus inter antennas extensis, antennis lividis, apice fusco-scentibus, clytris fusca, corpore fusco, abdomine pedibusque lividis. *Exotica.*
643. Can. \* thorace marginato, nigra, maxillis, thoracis marginibus externis abdominalisque lividis. *Eur.*
644. Can. \* thorace marginato, capiteque nigro, corpore abdominalisque fusco, clytris testaceis apice exultis, antennis pedibusque luteis. *Eur.*
645. Can. \* thorace marginato, luteo, macula fusca, capite nigro, antennis basi luteis, clytris flavo-fusca, apice flavis, corpore nigro, abdomine nigro, segmentis margine postico pedibusque luteis. *Eur.* †
646. Can. \* picea, thorace postice utrinque puncto rubro, antennis basi luteis, pedibus luteis, femoribus basi atris. *Eur.*
647. Can. Nigra. F. M. Tom. 1. C. 20. *Eur.*
648. Can. \* nigro-violacea, pubescens. *Eur.*
649. Can. \* nigra, thorace marginato, clytris dimidio nigris, versus apicem albis, summo apice geniculisque luteis. *Eur.*
650. Can. Pulicaria. F. M. Tom. 1. C. 21. *Eur.*

#### 54. MALACHIUS.

651. Ma. Aeneus. F. S. M. 1. *Eur.*
652. Ma. Bipustulatus. F. M. Tom. 1. M. 2. *Eur.*
653. Ma. Sanguinolentus. F. M. Tom. 1. M. 4. *Eur.*
654. Ma. Cyaneus. F. M. Tom. 1. M. 5. *Eur.*
655. Ma. Pedicularius. F. S. M. 3. *Eur.*
656. Ma. Pulicarius. F. M. Tom. 1. M. 7. *Eur.*
657. Ma. Fasciatus. F. M. Tom. 1. M. 8. *Eur.*
658. Ma. Equestris. F. M. Tom. 1. M. 9. *Eur.*
659. Ma. Flavipes. F. M. Tom. 1. M. 10. *Eur.*
660. Ma. \* niger, thorace, elytrorumque apicibus rubris. *Eur.*

#### 55. NECYDALIS.

661. Ne. Viridissima. F. S. N. 1. *Eur.*
662. Ne. Coerulescens. F. S. N. 2. *Eur.*
663. Ne. Humeralis. F. S. N. 4. *Eur.*

664.

† Variat 1. thorace immaculato,  
2. thorace punctis duobus ferrugineis,  
3. thorace nigro, margine luteo, pedibus fuscescentibus.

664. Ne. \* elytris subulatis, testaceis, marginibus exustis, corpore fusco, pedibus simplicibus. *Eur.*
665. Ne. \* elytris subulatis, testaceis, marginibus externis fuscis, corpore nigro, femoribus posticis clavatis, arcuatatis. *Eur.*
666. Ne. Podagrariae. F. S. N. 7. *Eur.*
667. Ne. Simplex. F. S. N. 8. *Eur.*
668. Ne. Glaucescens. F. M. Tom. 1. N. 13. *Eur.*

### 56. ELATER.

669. El. Fusipes. F. S. E. 5. *Indus.*
670. El. Ferrugineus. F. S. E. 7. *Eur.*
671. El. \* elongatus, fuscus, thorace punctato, elytris striato-crenatis, ore pedibusque ferrugineis. *Eur.*
672. El. Peetinicornis. F. S. E. 14. *Eur.* †
673. El. \* niger, thorace linea longitudinali, elytris basi fulcatis, versus apieem sensim complanatis, tibiis ferrugineis. *Eur.*
674. El. \* piceus, pubescens, elytris striatis, plantis ferrugineis. *Eur.*
675. El. Murinus. F. S. E. 10. *Eur.*
676. El. Testelatus. F. S. E. 11. *Eur.* ††
677. El. Obscurus. F. S. E. 21. *Eur.*
678. El. Cupreus. F. S. E. 15. *Eur.*
679. El. Sanguineus. F. S. E. 29. *Eur.* †††
680. El. Aeneus. F. S. E. 13. *Eur.*
681. El. \* fuscus, capite, thorace, elytris pedibusque fusco-aeneis. *Eur.* Statura El. aenei, at latior.
682. El. \* fuscus, villis protratis, cinereis, adspersus, elytris laevissime striatis, antennis pedibusque ruficentibus. *Eur.*
683. El. \* niger, elytris crenato-striatis punctatisque, pedibus testaceis. *Eur.*
683. b. El. Flabellicornis. F. M. Tom. 1. E. 1. †††††
684. El. \* niger, elytris crenato-striatis, antennis pedibusque fuscis. *Eur.*
685. El. Crueciatus. F. S. E. 16. *Eur.*
686. El. Linearis. F. S. E. 26. *Eur.* †††††

687.

† Variat colore viridi-violaceo rufescente.

†† Variat colore int̄egro, absque maculis nitentibus.

††† Variat magnitudine, elytris absque omni nigredine.

†††† Palpi anteriores flabellicornes.

††††† Variat ore thoraceque tectis tufis, elytris testaceis, fusco-nebulosis, marginibus exterius testaceis, femoribus fusco-nebulosis.

687. El. Aterrimus. F. S. E. 9. Eur.
688. El. \* niger, elytris rufo-testaceis, striatis, plantis testaceis.
689. El. \* niger, thorace linea longitudinali, elytris crenato-striatis. Eur.
690. El. \* niger, elytris obsolete striatis, antennis longis. Eur.
691. El. \* fuscus, thorace punctato, elytris laevissime striatis, antennis pedibusque rufo-fuscis. Eur.
692. El. Castaneus. F. S. E. 18. Eur.
693. El. \* fuscus, villo flavo adspersus, elytris laevissime striatis, pilosis, sed ita, ut ad variam directionem maculae variae fuscae apparent et iterum evanescant. Pedes rufi. Eur.
694. El. \* ferrugineus, thorace fusco punctato, elytris crenato-striatis. Eur.
695. El. \* fusco-ferrugineus, villis prostratis griseis adspersus, thorace pectoreque fuscis, elytris laevissime striatis. Eur.
696. El. \* ferrugineus, capite fusco, thorace fusco, marginibus externis testaceis, elytris testaceis, punctis laevissime striatis, antennis pedibusque testaceis. Eur.
697. El. \* niger, elytris sanguineis, sutura macula oblonga, communi, picea. Eur.
698. El. \* fuscus, villis prostratis griseis adspersus, thorace gibbo, elytris gibbis, laevissime striatis, antennis pedibusque fusco-ferrugineis. Eur.
699. El. \* niger, elytris laevissime striatis, femoribus crassis. Eur.
700. El. Pilosus. Prof. Leske, Itjn. 1. pag. II. 1. Tab. A. Fig. 1.
701. El. \* testaceus, thorace dorso fuscescente, elytris striatis, striis punctis distinctis impressis. Eur.
702. El. \* ater, glaber, pubescens, elytris striatis. Eur.
703. El. \* ater, villo brevissimo pubescens, elytris laevissime punctis striatis. Eur.
704. El. \* testaceus, villo prostrato cinereo adspersus, thorace fuscescente, pedibus rufis. Eur.
705. El. \* fusco-ferrugineus, capite thoraceque fuscis, elytris striatis. Eur.
706. El. \* niger, elytris obsolete striatis, basi sulcis 4 impressis, antennis longis, tibiis plantisque anticis fusco-ferrugineis. Eur.
707. El. \* testaceo-fuscus, elytris striatis, fuscescentibus, versus apicem testaceis, antennis pedibusque testaceis. Eur.
708. El. \* testaceo-fuscus, elytris striatis, pedibus testaceis. Eur.
709. El. Marginatus. F. S. E. 24. Eur.

710. El. Marginellus. F. M. Tom. I. E. 51. Eur.  
 711. El. \* fuscus, capite fuscō, thorace fuscō, margine ferrugineo, elytris testaceis, futura fuscis. Eur.  
 712. El. Striatus. F. M. Tom. I. E. 47. Eur.  
 713. El. \* thorace atro, macula utrinque dentibusque rubris, elytris testaceis, marginibus externis nigris. Eur.  
 714. El. \* niger, elytris testaceis, apice fuscescentibus, pedibus testaceis. Eur.  
 715. El. Balteatus. F. S. E. 30. Eur.  
 716. El. 2-pustulatus. F. S. E. 36. Eur.  
 717. El. Ruficollis. F. S. E. 27. Eur.  
 718. El. \* niger, elytris, pedibus anticis tibiisque testaceis. Eur.  
 719. El. Limbatus. F. M. Tom. I. E. 49. Eur.  
 720. El. \* testaceus, thorace gibboſo, obſcuro, elytris striatis. Eur.  
 721. El. \* murinus, thorace gibboſo, elytris testaceis, antennis pedibusque ferrugineis. Eur.  
 722. El. \* niger, elytris rufescentibus, striatis, tibiis rufescentibus. Eur.  
 723. El. \* niger, elytris striatis, tibiis rufis. Eur.  
 724. El. \* testaceus, elytris striatis, capite fuscō. Eur.  
 725. El. \* nigro-aeneus, nitidus, femorum antecorū basi tibiisque rufis. Eur.  
 726. El. \* ferrugineus, capite thoraceque fuscis, thorace postice, elytris pedibusque testaceis. Eur.  
 727. El. Dermestoides. F. M. Tom. I. E. 56. Eur.  
 728. El. \* piceus, glaber, pubescens, elytris testaceis, marginibus fuscis, antennis pedibusque testaceis. Eur.  
 729. El. Pulchellus. F. M. Tom. I. E. 53. Eur.  
 730. El. \* brunneus, antennarum articulis tribus ultimis lamellatis, elytris laevissime striatis, pubescentibus. Eur.  
 Statura El. Dermestoidis, magnitudine Pediculi.

## 57. BUPRESTIS.

731. Bu. Gigantea. F. S. B. 2. Americana.  
 732. Bu. Chrysis. F. S. B. 13. India.  
 733. Bu. Sternicornis. F. S. B. 12. India.  
 734. Bu. Vittata. F. S. B. 3. India.  
 735. Bu. Onopordi. F. M. Tom. I. B. 51. Eur.  
 736. Bu. Fascicularis. F. S. B. 24. Capensis.  
 737. Bu. Mariana. F. S. B. 15. Eur.

738. Bu. Rauca. F. M. Tom. I. *B. 14. Exotic.*  
 739. Bu.\* elytris apice truncatis, striatis, fuscis, rugis impressis, interruptis, aeneo-variegatis, thorace scabro, sulco obliquo utrinque impresso, abdomine pedibusque nitide aeneis, punctatis.  
 740. Bu. Rubi. F. S. *B. 30. Eur.*  
 741. Bu. Porcata. F. S. *B. 17. Orientalis.*  
 742. Bu. Flavo-maculata. F. M. Tom. I. *B. 22. Eur.*  
 743. Bu. Rutilans. F. M. Tom. I. *B. 16. Eur.*  
 744. Bu.\* elytris integris, coccineis, rugis 4 nigris, internis ad futuram ramosif, spatio interiecto, punctis concatenatis dupli serie striatis, thorace aeneo, sulcato, sulcis striis villosis griseis repletis, corpus fusco-aeneum, punctatum. *Exotica.*  
 745. Bu. Hirta. F. M. Tom. I. *B. 52.*  
 746. Bu. Biguttata. F. M. Tom. I. *B. 82. Eur.*  
 747. Bu. Chrysostigma. F. S. *B. 18. Eur.*  
 748. Bu. Bistriata. F. S. *B. 37. Eur.*  
 749. Bu. Cyanea. F. S. *B. 43. Eur.*  
 750. Bu. Umbellatarum. F. M. Tom. I. *B. 74. Exotic.*  
 751. Bu. Nitidula. F. M. Tom. I. *B. 84. Eur.*  
 752. Bu. Viridis. F. S. *B. 39. Eur.* †  
 753. Bu. 4-punctata. F. S. *B. 35. Eur.*  
 754. Bu. Minuta. F. S. *B. 38. Eur.*

### 58. CICINDELA.

755. Ci. Sylvatica. F. S. *C. 3. Eur.*  
 756. Ci. Hybrida. F. S. *C. 2. Eur.* ††  
 757. Ci. Campestris. F. S. *C. 1. Eur.*  
 758. Ci. Flexuosa. F. M. Tom. I. *C. 13. Eur.*  
 759. Ci. Carolina. F. S. *C. 13. Exotic.*  
 760. Ci. Capensis. F. S. *C. 5. Capensis.*  
 761. Ci. Germanica. F. S. *C. 6. Eur.* †††  
 762. Ci.\* ferruginea, capite testaceo, postice viridi, bilobo, labio albo, maxillis nigris, thorace testaceo, antice exciso, posti-

† Variat 1. tota viridis, subtus fusco-aenea,  
 2. capite thoraceque viridibus, elytris coeruleis,  
 3. capite viridi, thorace, elytris coeruleis,  
 4. capite, thorace, elytris coeruleis,

†† Variat elytris maculisque obscurioribus s. oblitteratis.

††† Variat 1. capite, thoraceque viridibus, elytris violaceis,  
 2. capite, thorace, elytrisque nigris, maculis similibus,

postice macula magna viridi, scutello nullo, elytris testaceis, singulo striis 15 punctatis, basi maculis tribus margine antico contiguis, in medio et versus apicem, fascia undata viridi, sutura viridi, pedibus testaceis. Statura Coccinellae. *Eur.* Habitat in aqua.

## 59. ELAPHRUS.

763. El. Riparius. F. S. *E. 1. Eur.*  
 764. El. Aquaticus. F. S. *E. 4. Eur.*  
 765. El. Flavipes. F. S. *E. 2. Eur.*

## 60. HYDROPHILUS.

766. Hy. Piceus. F. S. *H. 1. Eur.*  
 767. Hy. Olivaceus. F. M. Tom. 1. *H. 2. Exotic.*  
 768. Hy. Caraboides. F. S. *H. 2. Eur.*  
 769. Hy.\* niger, nitidus, elytris punctis distantibus laevissime striatis, antennis plantisque ferrugineis. Statura Hy. Caraboidis, at 4plo minor. *Eur.*  
 770. Hy. Scarabaeoides. F. S. *H. 4. Eur.*  
 771. Hy. Orbicularis. F. S. *H. 5. Eur.*  
 772. Hy. Luridus. F. S. *H. 7. Eur.*  
 773. Hy. Minutus. F. S. *H. 8. Eur.*  
 774. Hy.\* ater, glaber, antennis tibiisque rufescens. *Eur.*

## 61. DYTISCUS.

775. Dy. Latifimus. F. S. *D. 1. Eur.*  
 776. Dy. Marginalis. F. S. *D. 3. Eur.* †  
 777. Dy. Semistratus. F. S. *D. 5. Eur.*  
 778. Dy.\* testaceus, supra virescens, thoracis marginibus externis elytrorumque flavis, elytris longitudinaliter laevisime striatis, pedibus posticis crassioribus. *Eur.*  
 779. Dy. Punctulatus. F. M. Tom. 1. *D. 4. Eur.*  
 780. Dy. Striatus. F. S. *D. 7. Eur.*  
 781. Dy. Cinereus. F. S. *D. 9. Eur.*  
 782. Dy. Sulcatus. F. S. *D. 6. Eur.*  
 783. Dy.\* testaceus, thorace livido, marginibus antico posticoque fuscis, elytris linea ad futuram, marginibusque atomis lividis. *Eur.*

† Variat sexu et armis

1. mas, Dy. Marginalis legitimus pedibus anticis palmatis,
2. neuter, Dy. Marginalis simillimus, at deficiunt palmae, armis maris, et rariss. cum priori in cōtu,
3. Dy. Semistratus, legitimia femina Dy. Marginalis.

784. Dy. \* niger, thorace margine antico, externis latiore, elytris marginibus lividis, margo elytrorum versus medium ramo adiacente instructus, ferrugineo longitudinaliter punctatus. *Eur.*
785. Dy. Transversalis. F. M. Tom. I. D. 23. *Eur.*
786. Dy. Gibbus. F. M. Tom. I. D. 26. *Eur.*
787. Dy. 2-pustulatus. F. M. Tom. I. D. 17. *Eur.*
788. Dy. \* oblongo-ovatus, niger, antennis ferrugineis. *Eur.*
789. Dy. \* oblongo-ovatus, niger, ore verticis macula biloba flavis, thorace flavo, disco macula transverse posita, nigra, elytris ad futuram linea, basi marginibusque flavis. *Eur.*
790. Dy. \* ferrugineus, capite nigro, antice flavo, maculis 2 flavis inter oculos, thorace flavo, postice margine nigro, elytris futura linea marginibusque flavis, pedibus ferrugineis. *Eur.*
791. Dy. \* flavus, ore punctis duobus inter oculos, thoracis elytrorumque marginibus externis ferrugineis pedibusque flavis. *Eur.*
792. Dy. \* ferrugineus, ore, thoracis elytrorumque marginibus pallidis, maculis duabus inter oculos, antennis pedibusque ferrugineis, capite, thorace, elytris testaceo-fuscis. *Eur.*
793. Dy. \* pectore nigro, abdomine luteo, segmentis utrinque macula nigra, capite nigro, ore punctis duobus inter oculos luteis, thorace disco puncto transverse posito et utrinque simplici nigro, elytris fuscis, atomis lividis marginibusque exterhis lividis. *Eur.*
794. Dy. Uliginosus. F. S. D. 15. *Eur.*
795. Dy. \* ater, antennis ferrugineis, elytris pone medium utrinque puncto testaceo. *Eur.*
796. Dy. \* niger, pedibus, abdominis apice testaceis, capite nigro, antennis, ore, punctisque duobus inter oculos testaceis, thorace testaceo, in medio guttis duabus nigris, elytris testaceis, fusco-maculatis, ita ut pone medium utrinque macula testacea emineat. *Eur.*
797. Dy. Maculatus. F. S. D. 17. *Eur.*
798. Dy. Hermanni. F. S. D. 14. *Eur.*
799. Dy. Erythrocephalus. F. S. D. 18. *Eur.*
800. Dy. Ovatus. F. S. D. 22. *Eur.*
801. Dy. Lineatus. F. S. D. 25. *Eur.*
802. Dy. \* lividus, thorace viridi-livido, elytris fusco-lividis, marginibus externis lividis, singulo maculis 4 connatis, lividis, utrinque basi una, striaeque breves pone medium lividae. *Eur.*

803. Dy. *Crafficornis*. F. M. Tom. I. *D. 52. Eur.*  
 804. Dy. *Impressus*. F. M. Tom. I. *D. 48. Eur.*  
 805. Dy. \* *lividus*, capite angusto, thorace antice angustiore, elytris fusco-punctato-striatis, pedibus lividis. Statura Dy. Impressi. *Eur.*  
 806. Dy. *Dorsalis*. F. M. Tom. I. *D. 36. Eur.*  
 807. Dy. *Confluens*. F. M. Tom. I. *D. 46. Eur.*  
 808. Dy. *Obliquus*. F. M. Tom. I. *D. 47. Eur.*  
 809. Dy. \* *niger*, elytris profunde punctatis, fuscescenscentibus, lineis 4 marginibusque externis flavescenscentibus, ramosis, pedibus ferrugineis. *Eur.*  
 810. Dy. \* *piceus*, capite piceo, ore, antennis ferrugineis, thorace piceo, antice pallido, elytris glabris, piceis, basi fascia bidentata, margine externo pallido connexa, cui adhaerent maculae tres pallidae, pedes pallidi. *Eur.*  
 811. Dy. *Pictus*. F. M. Tom. I. *D. 53. Eur.*

## 62. GYRINUS.

812. Gy. *Natator*. F. S. *G. 1. Eur.*  
 813. Gy. *Bicolor*. F. M. Tom. I. *G. 2. Eur.* †

## 63. CARABUS.

## \* Maiores.

814. Ca. *Coriaceus*. F. S. *C. 1. Eur.*  
 815. Ca. *Cyanus*. F. M. Tom. I. *C. 7. Eur.* ††  
 816. Ca. *Violaceus*. F. S. *C. 2. Eur.*  
 817. Ca. *Quadri-guttatus*. F. S. *C. 5. Capensis.*  
 818. Ca. \* *apterus*, ater, glaber, elytris sublaevibus, punctis minutissimis, confluentibus, confusis, obfessis, marginibus subviolaceis. *Eur.*  
 819. Ca. \* *apterus*, ater, elytris punctis elevatis, confusis, adspersis, marginibus externis, violaceo-aeneis. *Eur.*  
 820. Ca. \* *apterus*, ater, elytris rugosis, rugis alternantibus, confuse fractis. *Eur.*  
 821. Ca. *Hortensis*. F. S. *C. 7. Eur.*  
 822. Ca. *Gemmatus*. F. M. Tom. I. *C. 15. Eur.*  
 823. Ca. \* *apterus*, ater, elytris confertion striatis, punctis impressis viridibus triplici serie. *Eur.*

† Habitat in Sueciae aquis. Prof. Leske.

†† Scop. Ent. carn. n. 265. Ca. *Coriaceus*.

824. Ca. \* apterus, niger, capite, thorace, elytris cupreis, elytris rugis 4 intercurrentibus serie punctorum elevorum, oblongorum, huicque utrinque serie punctorum elevorum minorum, similique ad marginem externum. *Eur.*
825. Ca. Granulatus. F. S. C. 14. *Eur.*
826. Ca. Clatratus. F. S. C. 15. *Eur.*
827. Ca. Retusus. F. S. C. 9. *Exotic.*
828. Ca. Auratus. F. S. C. 12. *Eur.*
829. Ca. Nitens. F. S. C. 17. *Eur.*
830. Ca. Leucophthalimus. F. S. C. 23. *Eur.*
831. Ca. Convexus. F. S. C. 11. *Eur.*
832. Ca. Sycophanta. F. S. C. 20. *Eur.*
833. Ca. Inquisitor. F. S. C. 18. *Eur.*
834. Ca. Cephalotes. F. S. C. 22. *Eur.*
835. Ca. Laevigatus. F. S. C. 40. *Eur.*

\*\* *Minores.*

836. Ca. \* ater, thorace lateribus rotundato, postice truncato, linea dorsali et utrinque lineola dupli baseos impressa, elytris rugosis, internis 5 apicibus, in 6tam incidentibus. *Eur.*
837. Ca. \* nigro-ferrugineus, capite nigro, antennis cinereis, basi nigris, glabris, thorace nigro, marginibus externis ferrugineis, linea dorsali, et utrinque postice lineolis duabus impressis, elytris ferrugineis, depresso-striatis, apice truncatis, pedibus nigro-ferrugineis. *Eur.*
838. Ca. Lividus. Lin. S. C. 15. *Eur.*
839. Ca. Bimaculatus. F. S. C. 36. *Indus.*
840. Ca. Spinipes. Lin. S. C. 20. *Eur.*
841. Ca. Madidus. F. S. C. 31. *Eur.*
842. Ca. Flavicornis. F. M. Tom. I. C. 50. *Eur.* †
843. Ca. \* ater, thorace lateribus rotundato, elytris striatis, rugis 1 et 8, 2 et 7 apice unitis. *Eur.*
844. Ca. \* ater, capite thoraceque nigris, elytris fuscis, holosericeis, striatis, antennis pedibusque ferrugineis. *Eur.*
845. Ca. \* niger, latus, antennis pedibusque ferrugineis, capite aeneo, thorace aeneo, linea dorsali et postice utrinque lineolis duabus impressis, elytris aeneis, laevissime striatis. *Eur.*
846. Ca. \* nigro-ferrugineus, elytris striatis, antennis rufis. *Eur.*

† Femina basi macula communis ferruginea ad medium usque.

847. Ca. Lepidus. F. M. Tom. I. C. 67. *Eur.* †  
 848. Ca. \* niger, thorace subquadrato, linea dorsali, et postice utrinque lineola impressa, elytris striatis. *Eur.*  
 849. Ca. \* ater, thorace suborbiculato, postice utrinque plicato, elytris rugosis. *Eur.*  
 850. Ca. \* piceus, capite thoraceque piceis, elytris atris, striatis, thorace linea dorsali, et postice utrinque lineolis duabus impressis, interna altiore. *Eur.*  
 851. Ca. \* ater, thorace subquadrato, postice truncato, elytris striatis, apice emarginatis. *Eur.*  
 852. Ca. \* niger, capite thoraceque aeneis, elytris aeneo-nigris, striatis, marginibus externis virescentibus, pedibus nigris. *Eur.*  
 853. Ca. \* niger, thorace subquadrato, lateribus rotundato, elytris striatis, antennis rufis, pedibus ferrugineis. *Eur.*  
 854. Ca. \* niger, thorace subquadrato, elytris atris, laevissime striatis, antennis pedibusque nigris. *Eur.*  
 855. Ca. Multipunctatus. F. M. Tom. I. C. 79. *Eur.*  
 856. Ca. Vulgaris. F. S. C. 42. *Eur.*  
 857. Ca. Ferrugineus. F. S. C. 46. *Eur.*  
 858. Ca. Pallens. F. S. C. 47. *Eur.*  
 859. Ca. \* niger, thorace postice truncato, elytris striatis, antennis pedibusque rufis. *Eur.*  
 860. Ca. \* niger, thorace subquadrato, elytris striatis. *Eur.*  
 861. Ca. \* niger, thorace linea dorsali, lineolisque duabus postice impressis, elytris striatis, antennis basi rubris. *Eur.*  
 862. Ca. \* niger, elytris striatis, punctis crenatis. *Eur.*  
 863. Ca. Coerulescens. F. S. C. 39. *Eur.*  
 864. Ca. Ruficornis. F. S. C. 27. *Eur.*  
 865. Ca. \* thorace postice truncato, supra niger, subtus ferrugineus. *Eur.*  
 866. Ca. \* niger, elytris laevissime striatis. *Eur.*  
 867. Ca. \* niger, elytris striatis, antennis basi rubris. *Eur.*  
 868. Ca. \* niger, thorace linea dorsali, postice truncato, antennis rubris. *Eur.*  
 869. Ca. \* niger, elytris vix striatis, punctulis ordine laevissime notatis. *Eur.*  
 870. Ca. \* niger, thorace, postice truncato, tibiis anticis crassis, bispinosis. *Eur.*  
 871. Ca. \* niger, antennis tibiisque ferrugineis. *Eur.*

† C. Lepidus Prof. Leske, Itin. I. 17. 8. Tab. A. Fig. 6. Habitat in Lusatiae arenosis.

872. Ca. \* niger, glaber, thorace postice utrinque impresso, truncato, elytris striatis. *Eur.*
873. Ca. \* niger, thorace postice truncato, antennis pedibusque ferrugineis, elytris striatis. *Eur.*
874. Ca. \* nigro-virescens, elytris striatis, rugis laevissime punctatis, planis, antennis pedibusque rufis. *Eur.*
875. Ca. \* niger, elytris striatis, striis punctis sparsim impressis, antennis pedibusque rufis. *Eur.*
876. Ca. \* niger, capite thoraceque viridibus, elytris viridi-coerulecentibus, villis lutescentibus tectis, ore, antennarum basi pedibusque rufis.
877. Ca. \* fuscus, thorace postice truncato, elytris striatis, antennis pedibusque ferrugineis. *Eur.*
879. Ca. \* niger, elytris striatis, tibiis ferrugineis. *Eur.*
880. Ca. \* ater, glaber, thorace subquadrato, elytris striatis, antennis pedibusque ferrugineis. *Eur.*
881. Ca. \* niger, elytris striatis, punctis 6 impressis. *Eur.*
882. Ca. \* niger, thorace postice truncato, linea dorsali punctaque utrinque impressis, elytris striatis, margine virecente, antennis ferrugineis basi rufis. *Eur.*
883. Ca. \* niger, thorace postice truncato, elytris striatis, antennis basi rufis. *Eur.*
884. Ca. \* ferrugineus, glaber, thorace antice truncato, postice exciso, elytris striatis. *Eur.*
885. Ca. \* niger, thorace marginato, postice plicato, elytris striatis, pedibus nigro-ferrugineis. *Eur.*
886. Ca. \* niger, thorace postice truncato, elytris striatis, pedibus fusco-ferrugineis. *Eur.*
887. Ca. \* niger, supra viridis, antennis pedibusque ferrugineis. *Eur.*
888. Ca. \* niger, thorace linea lineolaque utrinque impressa, elytris striatis. *Eur.*
889. Ca. \* niger, elytris striatis, apice sinuatis, antennis basi rufis. *Eur.*
890. Ca. Junceus Scopol Ent. Carn. n. 272. *Eur.*
891. Ca. Marginatus. F. S. C. 5. *Eur.*
892. Ca. \* niger, thorace postice truncato, marginibus exterioribus, antennis pedibusque pallidis, elytris striatis. *Eur.*
893. Ca. Azureus. F. M. Tom. i. C. 71. *Eur.*
894. Ca. \* nigro-aeneus, antennis pedibusque rufis. *Eur.*
895. Ca. 6-punctatus. F. S. C. 50. *Eur.*
896. Ca. Vaporiorum. F. S. C. 61. *Eur.*
897. Ca. \* niger; supra aeneus, thorace rotundato, elytris striatis, tibiis ferrugineis. *Eur.*

898. Ca. Cruxmaior. F. S. C. 55. Eur.  
 899. Ca. \* piceus, capite testaceo, thorace violaceo, elytris testaceis, striatis, ad apicem macula magna communi vio-  
     lacea, pedes testacei. Eur.  
 900. Ca. Crepitans. F. S. C. 35. Eur.  
 901. Ca. \* niger, thorace postice truncato, antennis rufis, ely-  
     tris striatis, femoribus fuscis, tibiis basi plantisque ferru-  
     gineis. Eur.  
 902. Ca. Cupreus. F. S. C. 40. Eur.  
 903. Ca. \* piceus, thorace postice truncato, elytris striatis, ti-  
     biis plantisque ferrugineis. Eur.  
 904. Ca. \* ferrugineus, thorace rotundato, elytris striatis, an-  
     tennis pedibusque lividis. Eur.  
 905. Ca. \* niger, thorace rotundato, elytris striatis, antennis  
     pedibusque ferrugineis, femoribus compressis, supra ni-  
     gris. Eur.  
 906. Ca. Cyanoccephalus. F. S. C. 53. Eur.  
 907. Ca. Viridanus. F. M. Tom. 1. C. 105. Eur.  
 908. Ca. Cruxminor. F. S. C. 56. Eur.  
 909. Ca. \* testaceus, cylindricus, capite nigro, thorace orbi-  
     culato, rufo. Eur.  
 910. Ca. \* niger, thorace truncato, elytris striatis, pedibus  
     ferrugineis. Eur.  
 911. Ca. \* niger, capite nigro, thorace suborbiculato, nigro, ely-  
     tris obscure testaceis, pedibus testaceis, geniculis fuscis. Eur.  
 912. Ca. Melanocephalus. F. S. C. 52. Eur.  
 913. Ca. Lunatus. F. S. C. 60. Eur.  
 914. Ca. Velox. F. S. C. 57. Eur.  
 915. Ca. Picipes. F. M. Tom. 1. C. 98. Eur.  
 916. Ca. \* niger, thorace orbiculato, elytris fusco-coeruleis,  
     guttis 4 testaceis, 2 ad basin et 2 versus apicem, pedibus  
     testaceis. Eur.  
 917. Ca. \* nigro-aeneus, thorace rotundato, elytris striatis,  
     punctis ad suturam impressis aeneis trium parium. Eur.  
 918. Ca. \* nigro-ferrugineus, capite nigro, thorace rotundato,  
     elytris striatis, antennis pedibusque ferrugineis. Eur.  
 919. Ca. Andreae. F. M. Tom. 1. C. 101. Eur.  
 920. Ca. \* piceus, thorace truncato, elytris striatis, antennis  
     tibiisque rufis. Eur.  
 921. Ca. \* niger, supra aeneus, thorace rotundato, punctato,  
     elytris crenato-striatis, antennis fuscis, pedibus rufis.  
 922. Ca. Flexuosus. F. S. C. 54. Eur.  
 923. Ca. Testaceus. F. S. C. 68. Eur.

924. Ca.\* niger, thorace orbiculato, elytris pallidis, nigro-variegatis, antennis pedibusque fusco-ferrugineis. *Eur.*
925. Ca.\* niger, capite thoraceque aeneis, thorace orbiculato, elytris ferrugineo-aeneis, striato-punctatis, pedibus rufis, femoribus crassis, tibiis spinis tribus armatis. *Eur.*
926. Ca.\* ferrugineus, thorace rotundato, elytris striatis, capite fusco, antennis pedibusque testaceis. *Eur.*
927. Ca. 2-punctatus. F. M. Tom. I. C. 121. *Eur.*
928. Ca. 2-pustulatus. F. S. C. 59. *Eur.*
929. Ca. 4-pustulatus. F. M. Tom. I. C. 107. *Eur.*

#### 64. SCARITES.

930. Sc. Arenarius. F. S. S. 3. *Eur.*

#### 65. PIMELIA.

931. Pi. Porcata. F. M. Tom. I. P. 14. *Exotic.*
931. b. Pi. Dentipes. F. M. Tom. I. P. 12. *Exotic.*
932. Pi.\* gibba, atra, elytris connatis, glabris, sutura et utrinque striis tribus coccineis, versus marginem internum subsistentibus, pedibus inermibus, nigris. *Exotica.*
932. b. Pi. Longipes. F. S. P. 3. *Exotica.*

#### 66. PLAPS.

933. Pl. Mortisaga. F. S. P. 3. *Eur.*
934. Pl. Excavata. F. S. P. 4. *Exotica.*

#### 67. TENEBRIÖ.

935. Te. Molitor. F. S. T. 2. *Eur.*
936. Te. Sanguinipes. F. S. T. 7. *Eur.*
937. Te.\* ovatus, piceus, elytris striis punctatis, femoribus arcuatis, posticis subtus ciliatis. *Eur.*
938. Te.\* ovatus, supra niger, subtus ferrugineus, elytris striatis, antennis pedibusque ferrugineis. *Eur.*
939. Te.\* ater, antennis ferrugineis. *Eur.*
940. Te. Culinaris. F. M. Tom. I. T. 15. *Eur.*
941. Te.\* niger, depresso-lunato, elytris striatis, pedibus ferrugineis. *Eur.*
942. Te.\* niger, hispidus, elytris striatis, basi macula utrinque rufa, antennis tibiisque rufis. *Eur.*
943. Te.\* ferrugineus, capite atro, glabro, ore ferrugineo, thorace atro, glabro, elytris atris, glabris, striatis, villosis, pedibus lividis. *Eur.*

## 68. HELOPS.

944. He. Lanipes. F. S. *H. 2. Eur.*945. He. Ater. F. S. *H. 7. Eur.*

## 69. MELOE.

946. Me. Proscarabaeus. F. S. *M. 1. Eur.*

## 70. LITTA.

947. Lit. Marginata. F. S. *L. 2. Capensis.*948. Lit. Vesicatoria. F. S. *L. 1. Eur.*

949. Lit. \* nigra, capite thoraceque pubescentibus, elytris flavis, macula postice utrinque ferruginea.

949.b. Lit. \*ferruginea, capite thoraceque rufis, elytris fuscis, basi testaceis. *Eur.*

## 71. MYLABRIS.

950. Myl. Cichorii. F. S. *M. 2. Exotic.*951. Myl. Algirica. F. M. Tom. 1. *M. 3. Exotic.*952. Myl. \* nigra, elytris croceis, basi nigris, utrinque gutta crocea ante et pone medium, fascia interrupta apiceque nigris. *Exotic.*953. Myl. \* nigra, elytris flavis, basi utrinque punctulo, in medio fascia, ad margines externos latiore, apiceque nigris. *Exotica.*954. Myl. Capensis. F. S. *M. 3. Exotica.*

## 72. CEROCOMA.

955. Ce. Schaefferi. F. S. *C. 1. Eur.*

## 73. MORDELLA.

956. Mor. Paradoxa. F. S. *M. 2. Eur.*957. Mor. Fasciata. F. S. *M. 6. Eur.*958. Mor. Aculeata. F. S. *M. 5. Eur.*959. Mor. Abdominalis. F. S. *M. 8. Eur.*960. Mor. Humeralis. F. S. *M. 9. Eur.*961. Mor. Frontalis. F. S. *M. 10. Eur.*962. Mor. Thoracica. F. S. *M. 11. Eur.*963. Mor. Flava. F. S. *M. 12. Eur.*

## 74. STAPHYLINUS.

964. Sta. Olens. F. M. Tom. 1. *St. 4. Eur.*965. Sta. Maxillosus. F. S. *St. 3. Eur.*

966. Sta. Erythropterus. F. S. St. 5. *Eur.*  
 967. Sta.\* cylindricus, totus ater, glaber. *Eur.*  
 968. Sta. \* ater, capitis vertice, thorace, elytris tibiisque ferrugineis, antennis fuscis. *Eur.* Facie St. Erythropteri.  
 969. Sta. Murinus. F. S. St. 2. *Eur.*  
 970. Sta.\* ater, capite thoraceque atris, glabris, elytris fusco-ferrugineis, antennis basi, articulis 5 ultimis plantisque ferrugineis. *Eur.*  
 971. Sta. Politus. F. S. St. 7. *Eur.*  
 972. Sta.\* ater, capite thoraceque piceis, glabris. *Eur.*  
 973. Sta. \* ater, glaber. *Eur.*  
 974. Sta \* ater, elytris rufis, basi nigris, antennis pedibusque rufis. *Eur.*  
 975. Sta.\* ater, singulo elytro disco gutta sanguinea. *Eur.*  
 976. Sta.\* niger, antennis, elytris pedibusque fuscis. *Eur.*  
 978. Sta. \* ater, glaber, elytris pedibusque fusco-testaceis, antennis biclavatis, basi longa, clavata, atra. *Eur.*  
 979. Sta. \* capite thoraceque atris, punctatis, abdomine nigro, elytris, antennis pedibusque fusco-rufescensibus. *Eur.*  
 980. Sta. \* ater, capite magno, elytris fuscis, antennis ferrugineis, pedibusque testaceis. *Eur.*  
 981. Sta.\* ater, elytris pedibusque testaceis, tibiis brevibus. *Eur.*  
 982. Sta \* ater, elytris, antennis pedibusque fusco-testaceis. *Eur.*  
 983. Sta. Fuscipes. F. S. St. 12. *Eur.*  
 984. Sta.\* niger, thoracis abdominalisque marginibus, antennarum basi, elytris pedibusque testaceis. *Eur.*  
 985. Sta.\* ater, thorace utrinque impresso, elytris, pedibus, ore anoque testaceis. *Eur.*  
 986. Sta.\* ater, thorace longo, subquadrato, glabro, elytris fuscis, antennis pedibusque rufescensibus, femoribus anticis crassis. *Eur.*  
 987. Sta. Tricolor. F.M. Tom. I. St. 30. *Eur.*  
 988. Sta. Piceus. F. S. St. 20. *Eur.*  
 989. Sta. 2-pustulatus. F. S. St. 11. *Eur.*  
 990. Sta.\* ater, punctis elevatis minimis undique obsessus, antennis flavis, apice fuscis. *Eur.*  
 991. Sta.\* ater, elytris testaceis, basi macula communis, et in medio ad marginem externum utrinque macula fusca, antennis pedibusque testaceis. *Eur.*  
 992. St. \* fulcus, elytris longis, pedibus rufo-fuscescentibus. *Eur.*

## 75. OXYPORUS.

993. Ox. Rufus. F. S. *O. 1. Eur.*

## 76. PAEDERUS.

994. Pæ. Riparius. F. S. *P. 1. Eur.*995. Pæ. Elongatus. F. S. *P. 2. Eur.*

\* \* \*

*Thorace scutiformi, abdomine utrinque pilis hispido, apice setoso.* †

996. St. Dilatatus. F. M. Tom. 1. *St. 7. Eur.*997. St. \* ater, antennis, elytris pedibusque ferrugineis. *Eur.*998. Sta. Lunulatus. F. S. *Oxyporus 2. Eur.*

999. Sta. \* ater, antennis, elytris pedibusque rufo-testaceis.

1000. St. \* fuscus, elytris pedibusque testaceis. *Eur.*1001. Sta. \* ater, glaber, elytris testaceis marginibus externis fuscis, antennis clavatis, pedibus fusco-testaceis. *Eur.*1002. Sta. Obtusus. F. S. *St. 10. Eur.*1003. Sta. Chrysomelinus. F. S. *St. 16. Eur.*1004. Sta. \* niger thorace marginibus externis late, antico posticoque summo flavis, elytris flavis, vitta media marginaque externo fuscis, antennis pedibusque flavis. *Eur.*1005. Sta. \* capite rufo, oculis nuchaque nigris, thorace rufo, elytris pedibusque testaceis, abdomine nigro. *Eur.*

† *Staphylinos a no. 996 ad 1005 proprium genus esse, facies structureaque suadent.*

## CLASSIS II.

## ULONATA.

## 77. FORFICULA.

1. For. Auricularia. F. S. *F. 1. Eur.*
2. For. Minor. F. S. *F. 2. Eur.*
3. For.\* livida, minima forcipe ad lentem dentata. *Eur.*

## 78. BLATTA.

4. Bl. Gigantea. F. S. *B. 1. Americana.*
5. Bl.\* aptera, fusca, punctata, abdominis segmentis margine postico tibiisque lividis, aliis ferrugineis, tibiis spinosis. *Exotic.*
6. Bl. Orientalis. F. S. *B. 12. Eur.*
7. Bl.\* fusca, thorace punctis elevatis impressisque variegato, alis albis. Statura facieque Blatt. Orientalis. *Exotica.*
8. Bl.\* hemiptera, brunnea, capite fronte macula rubra, thorace disco macula rubra, in qua maculae duae fuscae ocellares, abdomine segmentis marginibus anticis supra infraque rubris. *Exotica.*
9. Bl. 7-guttata. F. S. *Cassida 26. Exotica.*
10. Bl. Sylvestris. Scop. Ent. Carn. n. 314. *Eur.*
11. Bl. Variegata. F. S. *B. 13. Eur.*

## 79. MANTIS.

12. Man.\* thorace cylindrico, pedibus anticis thoraci antice annexis, clytris griseis, basi subtusque rufis, alis fuscis, guttis albis, vagis, fenestratis, maculatis, spina prostrata, abdomen respiciens utrinque ad basin elytrorum. *Exotica.*
13. Man. Oratoria *B.* F. S. *M. 14. Exotica.*
14. Man. Pulchra. F. M. Tom. i. *M. 34. Exotica.*

## 80. ACRYDIUM.

15. Acer Variolosum. Lin. S. *Gryll. Bull. 4. Indum.*
15. b. Acer. 2-punctatum. F. S. *A. 5. Eur.*
16. Acer. Subulatum (a). F. S. *A. 2. Eur.* Aliud fuscum, aliud griseum
16. b. Acer \* subulatum, fuscum, thoracis scutellique dorso elevato, pallido, scutello utrinque basi macula alba *Eur.*

16. c.

- 16.c. Acer. \* griseum, scutello basi et pone laminam alarum utrinque puncto nigro. *Eur.*  
 16.d. Acer. \* griseum, scutello versus apicem laminae alarum macula utrinque ferruginea. *Eur.*

## 81. TRUXALIS.

17. Tr. Nasutus. F. S. *T. 1. African.*

## 82. ACHETA.

18. Ach. Gryllotalpa. F. S. *A. 1. Eur.*  
 19. Ach. Campestris. F. S. *A. 7. Eur.*  
 20. Ach. Domestica. F. S. *A. 2. Eur.*

## 83. LOCUSTA.

21. Lo. Citrifolia. F. S. *L. 1. India.*  
 22. Lo. \* Desunt caput et alæ. Thorace oblongo, quadrato, marginato, femoribus tibiisque dupli serie spinosis, ense laevi adscendente, longitudine fere abdominis. *Exotica.*  
 23. Lo. Coronata. F. S. *L. 17. India.*  
 23.b. Lo. Coronata. Ibidem eodem in spiritu vini asservata.  
 23.c. Lo. \* thorace rotundato, elytris pallidis, immaculatis, alis albidis, elytris paullo longioribus, seriebus transversis circiter 11 e lineolis fuscis concatenatis, abdomine filis 4 terminato, femoribus 4 anticis muticis, posticis dupli serie subtus dentatis, tibiis 4 anticis dupli serie spinarum elongatarum, posticis minoribus armatis, antennis corpore longioribus. *Exotica.* In spiritu vini asservata.  
 24. Lo. \* thorace rotundato, laevi, nigro, picto, pallido, capite pallido, nigro, maculato, antennis corpore triplo longioribus, s. longissimis, elytris pallidis, alis coeruleo-virescentibus, latis, ordinibus septem transversis macularum nigrarum, undulatarum, pedibus pallidis, tibiis anticis spinis longis armatis, mediis minoribus, et posticis postice minoribus. *Exotica.*  
 25. Lo. Viridissima. F. S. *L. 22. Eur.*  
 26. Lo. Verrucivora. F. S. *L. 23. Eur.*  
 27. Lo. Ephippiger. F. M. Tom. 1. *L. 35. Exotica.*  
 28. Lo. \* testacea, thorace marginibus externis flavis, elytris abdomine brevioribus, abdomine testaceo, subtus flavo, ense adscendente 4-valvi. *Eur.*  
 29. Lo. Pupa. F. S. *L. 25. Aethiopa.*  
 30. Lo. Myrtifolia. F. S. *L. 3. Americana.*  
 31. Lo. Maxillosa. F. S. *L. 3. Americana.*

32. Lo. Perspicillata. F. S. L. 6. *Americana*.  
 33. Lo. \* fuscocinereoque marmorata, antennis flavescensibus, longitudine corporis, thorace plano, postice subcarinato, elytris fusco-griseis, ordine punctorum pallidorum obsoleto, ense adscendente. *Eur.*  
 34. Lo. \* viridi-testacea, thorace rotundato, dorso testaceo, capite viridi, fronte acuminato, testaceo, antennis longissimis, elytris testaceis, abdomine dimidio brevioribus, ense adscendente testaceo, basi viridi. *Eur.*  
 35. Lo. Varia. F. S. L. 24. *Eur.*

## 84. GR YLLUS.

36. Gr. Flavicornis. F. M. Tom. 1. G. 19. *Exotic*.  
 37. Gr. Morbillosus. F. S. G. 8. *Capensis*. In 2plo.  
 38. Gr. Migratorius. F. S. G. 12. *Eur.*  
 39. Gr. \* viridis, cinereo-variegatus, capite vesiculoso, fronte rugis duabus dentatis, et utrinque ruga minore tuberculata, vertice impresso, margine elevato, dentato, thorace morbilloso, spinoso, crista elevata, dentata, compressa, rugoso-dentata, corpore aptero, abdomine singulo segmento utrinque macula fusca, a lineola grisea divisa, singulo crista dentata horrido, et lateribus utrinque dentibus duobus armatis, femoribus posticis supra infraque dentatis tibiisque posticis. *Exotica*. In duplo. †  
 40. Gr. Succinctus. F. S. G. 2. *Indus*.  
 41. Gr. Danicus. Lin. S. G. 57. *Eur.*  
 42. Gr. Cyanipes. F. S. G. 25. *Americanus*.  
 43. Gr. Grossus. F. S. G. 28. *Eur.*  
 43. b. Gr. \*griseus, elytris in medio fusco-maculatis. *Exotic*.  
 44. Gr. Obscurus. Lin. S. Gr. 50. *Capensis*.  
 45. Gr. Flavus. F. S. G. 24. *Eur.*  
 46. Gr. Stridulus. F. S. G. 17. *Eur.*  
 47. Gr. Italicus. Scop. Ent. carn. n. 327. *Eur.* ††  
 48. Gr. Caerulescens. F. S. G. 23. *Eur.*  
 49. Gr. \* thorace carinato, alis basi rufis, in medio lunula fusca, margine antico maculisque tribus fuscis versus apicem ad marginem posticum, tibiis posticis albis, nigro-spinosis, griseo-villoso.

50.

† Variat colore cinereo, fusco-variegato. Antennae fictitiae lanceiformes e dimidia cauda Gryl. cuiusdam, artificiose agglutinatae.

†† Cl. Fabricio Gr. Germanicus. F. S. G. 20.

50. Gr. \* thorace dorso brunneo, elytris brunneis, margine antico viridi-flavis, femoribus posticis subtus sanguineis, tibiisque flavis. *Eur.*
51. Gr. \* thorace cruciato, dorso fuscō, elytris griseo-fusco-nebulosis, pedibus 4 anticis griseo-fusco-maculatis. *Eur.*
52. Gr. \* thorace cruciato, viridi, cruce alba, elytris dorso viridibus, marginibus inflexis, fuscis, extremis albis. *Eur.*
53. Gr. \* thorace carinato, viridi, utrinque linea fracta alba, elytris dorso viridibus, in reliquis fusco-nebulosis. *Eur.*
54. Gr. Biguttulus. Lin. S. *G. 55. Eur.*
55. Gr. Rufus. F. S. *G. 30. Eur.*
56. Gr. \* thorace cruciato, viridi, elytris viridibus, femoribus posticis supra viridibus, antennis corpore longioribus. *Eur.*
57. Gr. Viridulus. Lin. S. *G. 54. Eur.*
58. Gr. \* thorace cruciato, rufo, elytris aquosis, rufo-venosis. *Eur.*
59. Gr. \* thorace cruciato, rufo, utrinque lineola fracta, alba, elytris aquosis, rufo-venosis, in medio serie longitudinali 6 macularum fuscarnm interiacentibus, glauco-albidis. *Eur.*
60. Gr. Pedestris. F. S. *G. 31. Eur.*
- 60.b. Gr. \* griseus, corpore aptero, femoribus posticis subtus rufis. *Eur.*
- 60.c. Gr. \* viridis, corpore aptero, femoribus posticis mari bus viridescentibus, feminis dorso. *Eur.*

## CLASSIS III.

## SYNISTATA.

## 85. MONOCULUS.

1. Mo. Polyphemus. F. S. M. 1. *Indus.*
2. Mo. Apus. F. S. M. 3. *Eur.*

## 86. ONISCUS.

3. On. Psora. F. S. O. 11. *Eur.*
4. On. Entomon. F. S. O. 5. *Eur.*
5. On. Ceti. F. S. O. 16. *Eur.*
6. On. Aquaticus. F. S. O. 6. *Eur.*
7. On. Afellus. F. S. O. 18. *Eur.*
8. On. Armadillo. (*Hortensis*) F. S. O. 19. *Eur.*
9. On. Armadillo. (*Sylvestris*). Scop. Ent. Carn. n. 1144. *Eur.*
10. On. Ovalis, abdominis squamis sex, totidemque caudalibus minoribus, sensim decrescentibus, ultima obtusa setis 4 terminata. *Eur.*

## 87. LEPISMA.

11. Le. Saccharina. F. S. L. 1. *Eur.*

## 88. PODURA.

12. Po. Nivalis. F. S. P. 6. *Eur.*

## 89. EPHEMERA.

\* *Cauda trifeta.*

13. Eph. Vulgata. F. S. E. 1. *Eur.*
14. Eph. Lutea. F. S. E. 2. *Eur.*
15. Eph. \* inanis, cauda trifeta, alis hyalinis, corpore nigro, abdominis segmentis 4, 5, 6, 7 pellucidis. *Eur.*

\*\* *Cauda bifida.*

16. Eph. \* lutea, cauda bifida, alis albis, abdominis segmentis utrinque macula fusca, subtus utrinque puncto. *Eur.*
17. Eph. \* cauda bifida, alis fusciflaccibus, corpore fusco-testaceo, plantis fuscis. *Eur.*
18. Eh. \* cauda bifida, alis lutescentibus, corpore ferrugineo. *Eur.*

19. Eph. Diptera. F. S. *E. 11. Eur.*  
 20. Eph. \* cauda biseta, alis fulcescentibus, corpore luteo, femoribus in medio puncto nigro. *Eur.*

## 90. SEMBLIS.

21. Sem. Bicaudata. F. S. *S. 2. Eur.*  
 22. Sem. Nebulosa. F. S. *S. 3. Eur.*  
 23. Sem. Lutaria. F. S. *S. 4. Eur.*  
 23. b. Sem. \* ecaudata, alis albis, reticulatis, costa ad maculam marginalem ferruginea, capite fuscō, macula lutea utrinque ante oculos, thorace fuscō, postice ferrugineo, scutello luteo. *Exotica.*  
 24. Sem. Viridis. F. M. Tom. I. *S. 9. Eur.*

## 91. PHRYGANEA.

25. Phr. Grandis. F. S. *P. 6. Eur.*  
 26. Phr. Striata. F. S. *P. 2. Eur.*  
 27. Phr. \* alis albis, ad futuram et ad marginem inflexum maculis ferrugineis, abdomine virescente, pedibus flavescentibus. *Eur.*  
 28. Phr. \* alis fuscō argenteoque variis, puncto pone medium ad marginem anticū fuscō, ad posticum tribus, alis posticis apice fuscis. *Eur.*  
 29. Phr. \* alis luteis, faciis tribus albis et maculis oblongis, in medio et maculis 4, hanc sequitur macula simplex, post hanc fascia 4 macularum, huic adiacet fascia 5 macularum, cuius macula intermedia interrupta, *Eur.*  
 30. Phr. \* testacea, alis inferioribus versus apicem stria longa, fusca. *Eur.*  
 31. Phr. Reticulata. F. S. *P. 1. Eur.*  
 32. Phr. \* alis fuscō-pilosis, maculis congestis variis albis, duabus solitariis versus apicem, ad marginem externum. *Eur.*  
 33. Phr. Fusca. F. S. *P. 4. Eur.*  
 34. Phr. \* testacea, alis fasciis tribus albis, basi unitis, apice laciniatis, in medio macula obliqua interruptis. *Eur.*  
 35. Phr. Grisea. Lin. S. *P. 6. Eur.*  
 36. Phr. \* testacea, alis griseis, punetis numerosis, solitariis confluentibusque, albidis, maculatis. *Eur.*  
 37. Phr. \* fuscō-testacea, antennis, alis superioribus pedibusque testaceis, alis inferioribus albidis. *Eur.*  
 38. Phr. \* fusca, antennis corpore longioribus, palpis anticis longis, alis griseis, apice glabris, pedibus lutescentibus *Eur.*

39. Phr. \* nigra, alis subtestaceis, ciliatis, venis ad marginem anticum posticumque ramosissimis, pedibus 4 anticis testaceis. *Eur.*
40. Phr. Filosa. F. S. *P. 17. Eur.*
41. Phr. Longicornis. F. S. *P. 15. Eur.*
42. Phr. Nigra. F. S. *P. 9. Eur.*
43. Phr. \* fusca, antennis longissimis, albo-annulatis, alis ad marginem posticum internumque ciliatis. *Eur.*
44. Phr. Interrupta. F. S. *P. 13. Eur.*

### 92. HEMEROBIUS.

45. He. Perla. F. S. *H. 2. Eur.*
46. He. Chrysops. F. S. *H. 4. Eur.*
47. He. \* flavus, alis hyalinis, ore utrinque cruento. *Eur.*
48. He. Phalaenoides. F. S. *H. 5. Eur.*
49. He. \* flavescens, alis hyalinis, coeruleo-aureo-variis, nervis albidis, nigro-punctatis, pilosulis, marginibus punctis minutissimis, nigris, variegatis. *Eur.*
50. He. \* flavus, alis hyalinis, coeruleo aureoque variis, abdominis basi subtus anoque nigris, antennis flavis. *Eur.*
51. He. Maculatus. F. M. Tom. I. *H. 6. Eur.*

### 93. MYRMELEON.

52. Myr. Libelloides. F. S. *M. 1. Capense.*
53. Myr. Formicarium. F. S. *M. 2. Eur.*

### 94. ASCALAPHUS.

54. As. Barbarus. F. S. *A. 1. Eur.*

### 95. PANORPA.

55. Pa. Communis. F. S. *P. 1. Eur.* †

### 96. RAPHIDIA.

56. Ra. Ophiopsis. F. S. *R. 1. Eur.*

### 97. CYNIPS.

57. Cy. Ascendens. F. M. Tom. I. *C. 1. Eur.*
58. Cy. Quercus gemmae. Lin. S. *C. II. Eur.*

58.b.

- \* Variat 1. alis maculatis fasciatib apiceque nigris,  
2. alis macula ad marginem anticum, punctis apiceque fuscis,  
3. alis foliis punctis dispersis, fuscis.

58. b. Cy. Quercus petioli. F. S. C. 6. Eur.  
 58. c. Cy. \* testacea, capite pedibusque flavescentibus, oculis nigris. Eur.  
 58. d. Cy. \* nigra, abdominis basi pedibusque pallidis. Eur.  
 59. Cy. Quercus inferus. F. S. C. 5. Eur.  
 60. Cy. Capreae. F. S. C. 11. Eur.

## 98. TENTHREDO.

\* *Antennis clavatis.*

61. Ten. Femorata. F. S. T. 1. Eur.  
 62. Ten. Lutea. F. S. T. 3. Eur.  
 63. Ten. Marginata. F. S. T. 5. Eur.  
 64. Ten. Vitellinae. F. S. T. 6. Eur.  
 65. Ten. Amerinae. F. S. T. 4. Eur.  
 66. Ten. Sericea. F. S. T. 8. α, β. Eur.

\*\* *Antennis exarticulatis, extrorsum crassioribus, maribus subtus ciliatis.*

67. Ten. Ustulata. F. M. Tom. I. T. 11. Eur. †  
 68. Ten. Enodis. F. M. Tom. I. T. 12. Eur.  
 69. Ten. \* capite, thorace femoribusque nigris, abdomine luteo, ano utrinque lineola nigra, tibiis plantisque flavis, alis macula nigra. Eur.  
 70. Ten. \* capite thoraceque nigris, alis pedibusque fuscis, abdomine flavo. Eur.  
 71. Ten. \* capite nigro, thorace, pectore in medio, tibiis posticis apice nigris, abdomine pedibusque flavis. Eur.  
 72. Ten. \* capite thoraceque nigris, pedibus fuscis, abdomine flavo. Mas femoribus 4 anticis, posticis apice nigris, in reliquis flavis. Eur.

\*\*\* *Antennis pectinatis.*

73. Ten. Pini. F. S. T. 11. Eur.

\*\*\*\* *Antennis subclavatis, articulatis.*

74. Ten. Rustica. Lin. S. T. 16. Eur.  
 75. Ten. Scrophulariae. F. S. T. 12. Eur.  
 76. Ten. \* antennis subclavatis, nigris, corpore nigro, plantis posticis articulis tribus intermediis albis, pedibus 4 anticis sulphureis. Eur.

† Ten. Ciliaris Linnaei mas Ten. Ustulatae est: in hoc subgeneri maribus antennae ciliatae.

77. Ten. \* antennis subclavatis, nigris, basi flavis, ore, abdominis lateribus, segmentis 1, 2, 3, 4, 5, subtus marginibus posticis pedibusque flavis. *Eur.*
78. Ten. \* antennis subclavatis, nigris, flava, tibiis apice plantisque nigro-annulatis. *Eur.*
79. Ten. \* antennis subclavatis, nigris, basi flavis, corpore nigro, abdomine nigro, segmentis 2 dorso nigro, 3, 4, 5 ferrugineis, pedibus flavis. *Eur.*
79. b. Ten. \* antennis subclavatis, apice subulatis, nigra, abdomine segmentis 2, 3, 4, 5, margine postico, tibiis plantisque flavis, plantis nigro-annulatis. *Eur.*

\*\*\*\*\* *Antennis filiformibus, articulis septem.*

80. Ten. 2-cincta. F. S. T. 24. *Eur.*
81. Ten. \* antennis septemnodiis, luteis, corpore nigro, abdomine luteo, segmentis ultimis 2, 3, 4 nigris, apicibus alarum fuscis. *Eur.*
82. Ten. Albicornis. F. M. Tom. I. T. 33. *Eur.*
83. Ten. \* antennis septemnodiis, nigris, ore, scutello, maculisque scutellaribus albis, thorace, abdominis 4 primis segmentis nigris, reliquis pedibusque ferrugineis. *Eur.*
84. Ten. Atra. F. S. T. 23. *Eur.*
85. Ten. Viridis. F. S. T. 14. *Eur.*
86. Ten. Nassata. F. S. T. 16. *Eur.*
87. Ten. \* antennis septemnodiis, atra, pedibus posticis sanguineis. *Eur.*
88. Ten. Germanica. F. S. T. 21. *Eur.*
89. Ten. Abietis. F. S. T. 20. *Eur.*
90. Ten. Salicis. F. S. T. 13. *Eur.*
91. Ten. Septentrionalis. F. S. T. 28. *Eur.*
92. Ten. \* antennis septemnodiis, nigris, tribus ultimis articulis maxillisque albis, corpore, abdomine femoribusque nigris, tibiis plantisque luteis. *Eur.*
93. Ten. Livida. F. S. T. 22. *Eur.*
94. Ten. \* fusca, cano-pubescentia, alis griseis. *Eur.*
95. Ten. \* fusca, cano-pubescentia, alis griseis, thorace utrinque ante alas rufo. *Eur.*
96. Ten. \* fusca, ore albo, thorace atro, scutello maculisque 4 ad scutellum albis, abdomine fasciis duabus interrumpitis, flavis, alarum margine pedibusque luteis. *Eur.*
97. Ten. \* nigra, femoribus rufis, tibiis 4 posticis basi, antennarum articulis tribus penultimis albis. *Eur.*
98. Ten. \* nigra, abdominalis basi utrinque macula, maxillisque albis, pedibus 4 anticus rufis. *Eur.*

99. Ten. \* nigra, ore, thorace ante alas utrinque lineola, macula ad femoralia postica, tibiis, abdomine segmentis 5, 6, 7, utrinque apiceque albis. *Eur.*
100. Ten. \* nigra, ore, pedibus 4 anticis, flexura basilaris femorum posticorum flavis. *Eur.*
101. Ten. \* nigra, flexura basilaris femorum alba, tibiis 4 anticis extus, posticis in medio albis. *Eur.*
102. Ten. Gonagra. F. M. Tom. 1. T. 34. *Eur.*
103. Ten. \* nigra, pedibus rufis, antennarum articulis 4, 5, tibiisque posticis basi albis. *Eur.*
104. Ten. \* fusca, alarum costa ad maculam usque pedibusque testaceis. *Eur.*
105. Ten. \* nigra, abdominalis segmentorum marginibus posticis undique albis, pedibus rufescentibus. *Eur.*
106. Ten. \* nigra, palpis tibiisque anticis obsolete albis. *Eur.*
106. b. Ten. \* antennis septemnodiis, ferrugineis; basi nigris, nigra, basi alarum, margineque antico albo, abdomine segmento primo albo, margine postico nigro, quarto lineola ad marginem posticum alba, quinto albo margine antico nigro, 8, 9 macula alba, femoribus nigris, basi albis, tibiis plantisque albis, tibiis posticis apice nigris. *Eur.*
107. Ten. \* nigra, corpore angusto, cano-pubescente. *Eur.*
108. Ten. \* capite, thorace, abdomine, dorso basi, apiceque nigris, abdomine pedibusque luteo-rufis. *Eur.*
109. Ten. \* nigra, tibiis plantisque albis. *Eur.*
110. Ten. \* nigra, ore albo, abdomine flavo, dorso apiceque nigro, pedibus testaceis. *Eur.*
111. Ten. \* picea, tibiis anticis antice, macula femorali, femoribusque posticis, basi albis, pedibus posticis rufis, geniculis plantisque nigris. *Eur.*
111. b. Ten. \* nigra, pedibus rufis, plantis posticis fuscis. *Eur.*
112. Ten. Alni. F. M. Tom. 1. T. 27. *Eur.*
112. b. Ten. Punctum. F. M. Tom. 1. T. 46. *Eur.*
113. Ten. Ovata. F. S. T. 17. *Eur.*
114. Ten. Rosae. F. S. T. 41. *Eur.*
115. Ten. \* lata, nigra, abdominalis segmentis posticis albis, 2, 3, 4, 5 interruptis. *Eur.*
116. Ten. \* pallida, oculis, abdomine supra basi, pectore maculisque duabus nigris. *Eur.*
117. Ten. \* pallida, antennarum basi nigro-antrata, vertice figura rainosa, oculis, thoracis abdominis dorso, punctis paribus nigris. *Eur.*

118. Ten. \* picea, ore, thorace antice in medio litura V. et utrinque macula scutelloque flavis, punctis duobus scutellaribus albis, pedibus, ventrisque segmentorum marginibus posticis flavis. *Eur.*
119. Ten. Rapae. Lin. S. T. 35. *Eur.*
120. Ten. \* nigra, abdomine segmentis 2, 2, 4, 5 dorso, utrinque macula ovata, marginibusque albis, pedibus anticis tibiisque 4 posticis antice albis. *Eur.*
121. Ten. \* nigra, abdomine flavo, dorso maculis transversis anoque nigris. *Eur.*
121. b. Ten. \* nigra, antennis filiformibus, singula gemina, geniculis tibiisque pallidis. *Eur.*
122. Ten. Morio. F. M. Tom. i. T. 53. *Eur.*
123. Ten. \* capite, thorace, abdomine, dorso, basi anoque piceo, abdomine pedibusque flavis. *Eur.*
124. Ten. \* capite thoraceque rufis, ad marginem thoracis postice oculisque nigris, abdomine pedibusque flavis. *Eur.*
125. Ten. Vaga. F. M. Tom. i. T. 49. *Eur.*
126. Ten. Capreæ. F. S. T. 27. *Eur.*
127. Ten. \* atra, thorace antice rufo, geniculis albidis, antennis subclavatis. *Eur.*
128. Ten. \* nigra, ore pedibusque pallidis. *Eur.*

\*\*\*\*\* *Antennis setaceis, articulis plurimis.*

129. Ten. Erythrocephala. F. S. T. 33. *Eur.*
130. Ten. Betulae. F. S. T. 38. *Eur.*
131. Ten. Nemoralis. Lin. S. T. 42. *Eur.*
132. Ten. Sylvatica. F. S. T. 34. *Eur.*

\*\*\*\*\* *Antennis filiformibus, versus apicem seusim crassioribus, 18 articulis.*

132. b. Ten. \* antennis 18-nodiis, subclavatis, nigra, abdominis segmentis 2, 5, margine postico flavo-virescentibus, femoribus nigris, 4 anticis apice tibiisque flavis, posticis apice nigris, plantis flavis, abdomine lineariter compresso. Maribus segmentum 6tum apexque margine flavum. *Eur.*

99. SIREX.

133. Si. Gigas. F. S. S. 1. *Eur.*
134. Si. Cyaneus. F. M. Tom. i. S. 10. *Eur.*
135. Si. Nigrita. F. M. Tom. i. S. 12. *Eur.*
136. Si. Mariscus. F. S. S. 6. *Eur.*

137. Si. Spectrum. F. S. S. 3. Eur.  
138. Si. Dromedarius. F. M. Tom. I. S. 14. Eur.

## 100. ICHNEVMON.

\* *Scutello albido, antennis albo-annulatis.*

139. Ich. Pisorius. Lin. S. I. 12. Eur. †  
140. Ich. \* scutello albido, thorace maculato, abdomine pedibusque ferrugineis, antennae albo-annulatae, thorax utrinque versus alas et sub ala antica lineola alba. Eur.  
141. Ich. Sugillatorius. F. S. I. 1. Eur.  
142. Ich. Culpatorius. F. S. I. 6. Eur.  
143. Ich. \* scutello flavicante, abdomine atro, segmento primo antice utrinque lineola ferruginea tibiisque ferrugineis. Eur.  
144. Ich. \* niger, capite thoraceque maculato, scutello albido, antennis basi ferrugineis, dein albo-annulatis, reliquis fuscis, pedibus rufis. Eur.  
145. Ich. \* niger, scutello albo, abdomine petiolo segmentis 1, 5, 6, 7, dorso puncto albo, oculis verticis margine albis, tibiis albis, posticis apice nigris. Variat tibiis omnibus basi apiceque nigris. Eur.  
146. Ich. \* niger, scutello flavicante, oculis marginibus intertisis, abdominis apice albis, tibiis griseo-ferrugineis. Eur.  
147. Ich. Infractorius. F. S. I. 9. Eur.  
148. Ich. \* niger, vertice lineola ad oculum, scutello lineolis duabus albis, pedibus rufis, plantis posticis fuscis. Eur.  
149. Ich. Extensorius. F. S. I. 4. Eur.  
150. Ich. \* niger, capite thoraceque maculato scutello albo, et pone lineola, abdomine apice albo, aculeo brevissimo, tibiis fuscis, basi albidis. Eur.  
151. Ich. \* niger, scutello flavicante, fronte flava, antennis ad annulum subtus fusco-flavis, basi flavis, pedibus rufis. Eur.  
152. Ich. \* thorace maculato, scutello flavo, oculorum orbita alba, abdomine rubro, apice nigro, aculeo brevi, nigro, pedibus rubris posticis geniculis nigris, plantis albis. Variat ab domine toto rufo. Eur.  
153. Ich. \* scutello albo, thorace ad basin et sub ala puncto albo, orbita oculorum alba, abdomine fusco-ferrugineo, aculeo mediocri, pedibus rufis. Eur.

† Variat lineola a capite versus alas ducta, nigra: forte femina.

154. Ich. \* niger, scutello duplice flavo, thorace puncto ante et sub ala antica albo, abdomine duobus ultimis segmentis albis, pedibus rubris, femoribus tibiisque brevibus, crassis, oculis margine flavis. *Eur.*

155. Ich. Raptorius. F. S. I. 2. *Eur.*

\*\* *Scutello albo, antennis nigris totis.*

156. Ich. Persuasorius. F. S. I. 22. *Eur.*

156.b. Ich. \* scutello flavicante, pone lineola flava, thorace dorso lineolis duabus parallelis, ante alas utrinque punctis duobus, basi alarum sub alis anticis macula magna, et utrinque ad apicem thoracis macula maiore flava, orbita oculorum, vertice linea in fronte latiore, et pone oculos dilatata flava, abdomine petiolo postice flavo, segmento 1 dorso lineolis duabus parallelis, 2 duabus flexuosis, 3, 4, 5 utrinque macula ovata, 7mo puncto, anno utrinque linea flava unita, pedibus flavis, femoralibus posticis longis, basi nigris. Statura Ich. Persuasorii, ut facile pro eodem haberi possit.

157. Ich. Fusorius. F. S. I. 26. *Eur.*

158. Ich. \* scutello flavicante, niger, pedibus rufis, tibiis posticis apice plantisque fuscis. *Eur.*

159. Ich. \* niger, scutello albo, lineola ante alas alba, pedibus rufis, plantis posticis nigris. *Eur.*

160. Ich. \* scutello flavicante, fronte lineola orbitali flava, thorace puncto ante et sub ala antica flavo, abdomine segmentis 1, 2 ferrugineis, margine postico dorso nigro, 4, 5, 6 dorso macula alba, femoribus nigris, 4 anticis apice, tibiis plantisque luteis, posticis apice nigris. *Eur.*

161. Ich. \* scutello flavo, fronte flava, in medio nigra, antennis fuscis, subtus ferrugineis, thorace ante et sub ala antica macula alba, abdomine segmentis 1, 2, 3, margine postico flavo, in medio exciso, 5, 6, 7 albido, pedibus rufis. *Eur.*

162. Ich. Bidentorius. F. S. I. 21. *Eur.*

163. Ich. Luctatorius. F. S. I. 15. *Eur.*

163.b. Ich. \* niger, antennis basi antice, fronte, ore tibiisque flavis, abdomine segmentis 1, 2 flavescentibus. *Eur.*

164. Ich. \* scutello flavicante, ater, thorace maculato, orbita flava, in fronte dilatata, femora fusa, tibiae plantaeque flavescentes, tibiae posticae apice oblique fuscatae. *Eur.*

165. Ich. \* niger, scutello flavo, pone lineola, antennis, palpis pedibusque rufis, tibiis posticis, tarassisque ad basin albis, abdomine oblongo aculeo brevi. *Eur.*
166. Ich. \* niger, fronte, antennarum basi antice scutelloque flavis, antennis fuscis, subtus ferrugineis, abdomine oblongo compreso, angusto, pedibus rufis, posticis geniculis, tibiis apice postice plantisque nigris. *Eur.*
167. Ich. *Falcatorius*. F. S. I. 29. *Eur.*
168. Ich. \* niger, scutello albo, thorace lineola utrinque ante alas, punctoque sub ala antica albo, pedibus fuscis, tibiis 4 posticis annulo albo. *Eur.*
169. Ich. \* niger, scutello lineolis duabus transversis flavis, basi alarum anticarum macula alba, a dominis petiolo apice flavo, segmentis 1 flavo puncto nigro, 2 navo, reliquis nigris, femoribus anticis basi apiceque flavis, posticis nigris, tibiis flavis, posticis apice nigris, plantis flavis. *Eur.*
170. Ich. \* niger, scutello flavo, thorace utrinque punctis tribus flavis, fronte ferruginea, lineola nigra in medio et utrinque puncto labioque nigro, antennis rufo-flavis, dorso fuscis, basi antice flavis, abdominis petiolo, segmentis 1, 2, 3, 5, 6, 7 postice flavis, pedibus rufis, femoribus tibiisque posticis apice nigris, plantis nigro-annulatis. *Eur.*
171. Ich. \* niger, scutello flavo, thorace postice bidentato, orbita ad frontem flava, abdomine segmentis 1, 2 ferrugineis, pedibus 4 anticis rufo-fuscis, posticis nigris, plantis albis. *Eur.*
172. Ich. *Volutatorius*. F. S. I. 18. *Eur.*
173. Ich. *Fosforius*. F. S. I. 28. *Eur.*
174. Ich. \* niger, scutello gemino pulvinato, ferrugineo, postice flavo, thorace maculato, orbita frontali oreque flavo, pedibus rufis, tibiis flavis, posticis apice plantisque nigris. *Eur.*
- \* Scutello, thorace concolore, antennis fascia annulatis.
175. Ich. \* luteus, capite, verticis macula oculisque nigris, antennis fuscis, albo-annulatis, thorace fusco-maculato, abdomine segmento tertio postice reliquisque piceis, pedibus luteis. *Eur.*
176. Ich. *Comitator*. F. S. I. 34. *Eur.*
177. Ich. \* niger, antennis obsolete fasciatiss, abdomine segmentis duobus punto albo, pedibus rufis, tibiis posticis apice plantisque nigris. *Eur.*

178. Ich.\* niger, ore pedibusque rufis, abdomine penultimo segmento subtus macula ferruginea. *Eur.*
178. b. Ich.\* niger, pedibus luteis, tibiis posticis plantisque nigris, tibiis basi manibusque luteis. *Eur.*
178. c. Ich.\* capite nigro, orbita, vertice postice alba, antennis nigris annulo atro, thorace rufo, alarum basi scutellique margine nigro, abdomine conico, nigro, petiolo postice utrinque puncto albo, segmento primo utrinque macula alba, 3, 4, 5 ad marginem posticum linea alba, pedibus rufis. *Eur.*
179. Ich.\* niger, aculeo abdomine duplo longiore, pedibus rufis, tibias posticis fuscis, tarsis fuscis, metatarsis albis, alis anticis fascia fusca. *Eur.*
180. Ich.\* niger, abdomine depresso, pedibus rufis. *Eur.*
181. Ich. Profligator. F. S. I. 39. *Eur.*
182. Ich.\* niger, femoribus 4 anticis supra tibiisque ferrugineis. *Eur.*
183. Ich.\* niger, pedibus rufis, tibiis plantisque posticis fuscis, aculeo longitudine abdominalis. *Eur.*
184. Ich.\* niger, pedibus primi paris albidos, secundi albido-fuscis, tertii fuscis. *Eur.*
185. Ich.\* niger, pedibus rufis, tibiis clavatis, extus in medio albis. *Eur.*
186. Ich. Incubitor. F. S. I. 40. *Eur.*
187. Ich. Migrator. F. S. I. 38. *Eur.*
188. Ich.\* niger, pedibus rufis, digitis fuscis, aculeo abdominali breviore. *Eur.*
189. Ich.\* niger, abdomine ferrugineo, segmentis 4 posticis nigris, pedibus rufis, antennis ferrugineis, annulo fusco, apice nigris. *Eur.*
- \* Scutello, thorace concolore, antennis nigris totis.
190. Ich. Manifestator. F. S. I. 51. *Eur.*
191. Ich.\* ater, immaculatus, abdomine sessili, pedibus rufis, plantis posticis nigris, aculeo longitudine abdominalis. *Eur.*
192. Ich.\* ater, abdomine sessili, margine albo, aculeo abdominali longiore, fronte macula magna flava, versus verticem biloba, pedibus rufis. *Eur.*
193. Ich.\* niger, abdomine ferrugineo, apice fusco, aculeo abdominali longiore, vertice capitis rotundo, elevato, supra planu margine subdentato, pedibus ferrugineis, posticis longissimis, femoribus fuscis, singulo subtus dentibus tribus armato. *Eur.*

194. Ich. \* niger, aculeo abdomine breviore, pedibus rufis, thorace lineis duabus antice impressis. *Eur.*
195. Ich. \* niger, vertice impresso, aculeo breviore, pedibus rufis. *Eur.*
196. Ich. \* niger, fronte lineis duabus flavis, abdomine depresso, pedibus rubris, plantis posticis fuscis. *Eur.*
197. Ich. \* niger, abdomine segmentis 1, 2 ferrugineis, pedibus nigris, tibiis quatuor anticis nigro-ferrugineis, alis nigris. *Eur.*
198. Ich. \* niger, fronte cana, abdomine cylindrico, tenui, longo, pedibus rufis. *Eur.*
199. Ich. \* niger, pedibus luteo-rufis, tibiis posticis apice plantisque fuscis. *Eur.*
200. Ich. \* niger, thorace antice utrinque lineola, sub ala antica macula fronteque alba, pedibus rufis. *Eur.*
201. Ich. \* niger, abdomine cylindrico, aculeo brevissimo, segmentis transverse impressis, pedibus rufis, antennis luteis fusco anguste annulatis. *Eur.*
202. Ich. Pugillator. F. S. I. 70. *Eur.*
203. Ich. \* niger, abdomine falcato, ferrugineo, segmento primo dorso nigro, apice nigro s. fusco, pedibus rufescensibus, tibiis posticis apice nigris, capite nigro, fronte flava. *Eur.*
204. Ich. \* niger, orbita in vertice lineola, et postice oreque flava, scutello elevato, abdomine ferrugineo, cultrato, petiolo apice, segmentis 2, 3 dorso flavis, pedibus flavis. *Eur.*
205. Ich. \* niger, pedibus rufis, cauda longitudine corporis, alis albis, venis maculaque marginali luteis. *Eur.*
206. Ich. \* niger, abdomine ferrugineo, petiolo caudaque nigro, cauda brevi. *Eur.*
207. Ich. Delusor. F. S. I. 54. *Eur.*
208. Ich. \* niger, capite thoraceque ferrugineo-vario, pedibus rufis, tibiis plantisque posticis ferrugineis, alis ferrugineis, apicibus albo-hyalinis. *Eur.*
209. Ich. Compunctor. F. S. I. 52. *Eur.*
210. Ich. \* niger, fronte flava, antennis nigris, subtus flavis, thorace ante alas maculis duabus flavis, scutello postice elevato, utrinque margine elevato, abdomine segmentis 1, 3, 4, 5, 6 margine postico flavis, pedibus flavis. Habitat in Larva Phalaenae Fimbriae.
211. Ich. \* niger, abdomine petiolo apice, segmentis 1, 2 dorso pedibusque rufis, plantis posticis fuscis, aculeo abdomine longiore. *Eur.*

212. Ich. Irrorator. F. S. I. 71. Eur.
213. Ich. \* niger, fronte flava, antennis subtus rufo-flavis, pedibus rufis, plantis posticis fuscis. Eur.
214. Ich. \* niger, pedibus rufis, palpis albis. Eur.
215. Ich. \* niger, pedibus rufis, plantis posticis nigris. Eur.
216. Ich. \* niger, pedibus rufis, plantis posticis albis. Eur.
217. Ich. \* niger, fronte antennarum basi antice maxillisque albis, pedibus 4 anticis rufo-flavis, posticis nigris, geniculis rufis. Eur.
218. Ich. \* niger, pedibus 4 anticis, abdomine segmentis 3, 4 marginibus apiceque ferrugineis, pedibus posticis nigris. Eur.
219. Ich. \* niger, fronte utrinque oreque flavo, antennis subtus luteis, pedibus rufis, tibiis posticis basi apiceque plantisque fuscis, abdomine segmento primo margine postico luteo. Eur.
220. Ich. \* niger, pedibus rufis, plantis posticis nigris, aculeo abdomine duplo longiore. Eur.
221. Ich. \* niger, pedibus rufis, aculeo abdomine longiore, alis hyalinis Eur.
222. Ich. \* niger, pedibus rufis, abdomine cylindrico, segmentis 2, 3, 4 aliis omnibus, marginibus externis ferrugineis, aculeo abdomine longiore. Eur.
223. Ich. \* niger, pedibus rufis, tibiis posticis albis, annulo ad basin apiceque ferrugineo, plantis albidis, articulis apice ferrugineis, aculeo vix longitudine abdominalis. Eur.
224. Ich. \* niger, fronte oreque flavo, thorace utrinque ante alas lineola flava, pedibus rufis, tibiis plantisque albis, apicibus nigris. Eur.
225. Ich. Denigrator. F. S. I. 48. Eur.
226. Ich. \* niger, abdomine cylindrico, palpis albis, pedibus rufis. Eur.
227. Ich. \* niger, fronte orbitaque oculorum oreque flavis, antennis subtus flavescensibus, pedibus anticis rufo-flavis, posticis rufis, tibiis in medio albis, plantis albis, fusco annulatis Eur.
228. Ich. \* niger, pedibus 4 anticis pallide rufis, posticis femoribus rufis, tibiis flavescensibus basi annulo apiceque ut et articulis plantarum fuscis. Eur.
229. Ich. \* niger, fronte utrinque lineola oreque flavo, thorace maculato, pedibus rufis, aculeo abdominalis fere longitudine Eur.
230. Ich. \* niger, pedibus rufis, tibiis posticis ad basin annulo flavo, aculeo brevissimo. Eur.

231. Ich. \* niger, ahdomine subfalcato, ferrugineo, basi apiceque nigro, pedibus rufis, femoribus tibiisque posticis apice plantisque fuscis. *Eur.*
232. Ich. \* niger, fronte utrinque linea lata, flava, tibiis 4 anticis, posticis basi flavis. *Eur.*
233. Ich. \* niger, antennis tibiisque posticis fusco-ferrugineis, abdome ferrugineo, petiolo nigro, aculeo brevi, pedibus rufis. *Eur.*
234. Ich. \* niger, fronte, antennis subtus pedibusque flavis, femoribus nigris, basi flavis, tibiis apice nigris, abdome ferrugineo, basi apiceque dorso nigro. *Eur.*
235. Ich. \* niger, fronte utrinque lineola flava, antennarum basi, palpis pedibusque rufis, femoribus posticis, tibiarum apicibus plantisque nigris, abdome ferrugineo, basi apiceque nigro. *Eur.*
236. Ich. *Affectator.* F. S. II. 74. *Eur.*
237. Ich. \* niger, pedibus 4 anticis flavis, posticis ferrugineis. *Eur.*
238. Ich. \* niger, fronte, antennarum basi pedibusque flavis, tibiis posticis apice nigris. *Eur.*
239. Ich. \* niger, palpis albis, pedibus flavo-rufis, tibiis annulo albo. *Eur.*
240. Ich. \* niger, fronte oreque albo, antennis subtus luteis, pedibus rufis, plantis posticis nigris. *Eur.*
241. Ich. *Turionellae.* F. S. I. 60. *Eur.*
242. Ich. \* niger, fronte, la'io, antennarum basi flavis, antennis subtus luteis, pedibus flavo-rufescensibus, tibiis posticis albis, apice nigris, ad basin annulo ferrugineo, plantis albis nigro annulatis. *Eur.*
243. Ich. \* niger, pedibus rufis, tibiis posticis albis, apice plantisque nigris. *Eur.*
244. Ich. \* niger, fronte oreque flavis, antennis subtus luteis, pedibus rufis, plantis fuscis. *Eur.*
245. Ich. \* niger, pedibus rufis, tibiis posticis plantisque albo annulatis, aculeo mediocri. *Eur.*
246. Ich. \* niger, antennis fusco-ferrugineis, pedibus rufis, tibiis posticis in medio subflavis, aculeo brevi. *Eur.*
247. Ich. \* niger, antennis fuscis, pedibus abdomeque testaceis. *Eur.*
248. Ich. \* niger, antennarum basi, fronte maculis 4 oreque albis, abdome ferrugineo, petiolo nigro, pedibus 4 anticis pallide flavis, femoribus posticis, tibiis, tarsis fuscescentibus, plantis albis. *Eur.*

249. Ich. \* niger, pedibus rufis, abdomine segmentis 1, 2, 3 ferrugineis. *Eur.*
250. Ich. \* niger, antennarum basi facieque flava, punctis duobus nigris, abdomine ferrugineo, basi apiceque nigro, femoribus fuscis, basi apiceque flavis, tibiis plantisque 4 anticis flavescensibus, posticis ferrugineis. *Eur.*
251. Ich. \* niger, pedibus 4 anticis rufis, femoribus basi nigris, posticis nigris, tibiis fusco-rufis, metatarsis albis. *Eur.*
252. Ich. \* niger, fronte villosa cana, abdomine ferrugineo, petiolo apiceque nigro, segmento secundo dorso macula nigra, femoribus rufis, basi lucide flavis, tibiis 4 anticis flavescensibus, posticis rufescensibus, plantis articulis basi aquoso-flavis, apice rufescensibus. *Eur.*
253. Ich. \* piceus, abdomine petiolato, subfessili, petiolo nigro, segmentis 1, 2, 3 ferrugineis, reliquis nigris, apice punctis duobus flavescensibus, pedibus rufescensibus, plantis posticis fuscis. *Eur.*
254. Ich. \* niger, abdomine flavo, basi apiceque nigro, segmento primo in medio fascia nigra, pedibus 4 anticis flavis, femoribus postice nigris, posticis nigris, tibiis ferrugineis apice fuscis. *Eur.*
255. Ich. \* niger, antennis fuscis, pedibus rufis, tibiis posticis versus apicem fuscescentibus, aculeo abdomine dimidio longiore. *Eur.*
256. Ich. \* niger, facie, antennis, abdomine fusco-ferrugineis, palpis longissimis, pedibus flavis, tibiis posticis apice fuscis, aculeo abdomine compresso dimidio longiore. *Eur.*
257. Ich. \* niger, palpis albis, pedibus 4 anticis alto-rufescensibus, posticis femoribus nigris, tibiis ad basin annulo albido. *Eur.*
258. Ich. \* niger, antennarum basi fronteque alba, lineis duabus nigris, abdomine subfessili, ferrugineo, basi apiceque nigro, pedibus rufis, femoribus tibiisque posticis apice plantisque nigris. *Eur.*
259. Ich. \* niger, antennarum basi oreque albo, pedibus flavo-rufescensibus, abdomine rufo, basi apiceque nigro. *Eur.*
260. Ich. \* niger, abdomine ferrugineo, apice, petioli basi nigro, pedibus 4 anticis flavescensibus, basi ferrugineis, femoribus posticis nigris, tibiis ferrugineis, apice fuscescentibus, plantis 4 posticis albis. *Eur.*
261. Ich. \* niger, pedibus rufescensibus, femoribus tibiisque posticis apice fuscis. *Eur.*

262. Ich. \* niger, ore, antennarum basi ferrugineis, pedibus rufis, abdomine ferrugineo, basi apiceque nigro, aculeo abdomine longiore. *Eur.*
263. Ich. \* niger, ore, antennarum femorumque basi flavis, abdominis petiolo nigro, apice ferrugineo, primo segmento antice nigro, postice ferrugineo, incisura nigra, 3, 4que ferrugineo, reliquis nigris, pedibus rufis. *Eur.*
264. Ich. \* niger, antennarum basi antice, pedibusque 4 anticis flavescentibus, femoribus posticis nigris, basi tibiisque flavescentibus, apice fuscis, abdomine rufo-flavescente, basi apiceque nigro. *Eur.*
265. Ich. \* niger, fronte utrinque linea alba, abdomine rufescente, basi apiceque nigro, segmentis 1., ., 3 in medio linea transversa impressa, pedibus rufis, tibialis posticis apice rufis, versus basin albis, utrinque annulo ferrugineo inclusis, plantis nigris. *Eur.*
266. Ich. \* niger, fronte canescente, abdomine rufo-flavo basi, summo apice nigro, pedibus 4 anticis flavis, posticis fuscis. *Eur.*
267. Ich. \* niger, abdomine rufo, petiolo nigro, pedibus rufis. *Eur.*
268. Ich. \* niger, abdomine rufo, basi summoque apice nigro, aculeo brevi, pedibus rufis. *Eur.*
269. Ich. \* niger, ore, antennis subtus pedibusque rufescensibus, abdomine rufescente, basi nigro, alis nigris. *Eur.*
270. Ich. \* niger, antennis, petibus aliquo fuscescensibus, abdomine flavo, subfessili, aculeo abdomine longiore. *Eur.*
271. Ich. \* niger, fronte fascia transversa, ore, antennis subtus flavis, abdomine ferrugineo, basi nigro, primo segmento in medio macula nigra, pedibus 4 anticis flavescentibus, femoribus postice nigris, femora postica nigra, tibiae basi flavae, posticae fuscae. *Eur.*
272. Ich. \* niger, antennis fuscis, abdomine pedibusque flavis, aculeo omnium brevissimo. *Eur.*
273. Ich. \* niger, ore, antennarum femorumque basi flavis, abdomine ferrugineo, basi nigro, pedibus 4 anticis luteis, femoribus posticis, tibiisque apice plantisque nigris. *Eur.*
274. Ich. \* niger, capite ferrugineo, oculis nigris, abdominis petiolo nigro, apice ferrugineo, segmentis 1, 2 ferrugineis, tertio antice ferrugineo, postice nigro, 4 nigro apice ferrugineo, pedibus rufis. *Eur.*

275. Ich. \* niger, femoribus flavis, tibiis albis, posticis plan-tisque flavo-annulatis. *Eur.*
276. Ich. Desertor. F. S. I. 41. *Eur.*
277. Ich. \* niger, pedibus rufis, ventre flavescente. *Eur.*
278. Ich. \* piceus, glaber, maxillis rufis, apice latis, triden-tatis, abdomine lato, brevi, glabro, pedibus sanguineis, plantis fuscis. *Eur.*
279. Ich. \* niger, pedibus rufis, tibiis posticis basi apiceque nigris, plantis 4 posticis fuscis, articulis basi albis, aculeo abdomine breviore. *Eur.*
280. Ich. \* niger, pedibus rufescentibus, tibiis albidis, posticis apice fuscis, plantis albidis. *Eur.*
281. Ich. \* niger, fronte oreque flavo, abdomine nigro, seg-mento primo postice secundoque flavo, pedes rufescen-tes, tibiae posticae albae, apice fuscae, plantae fuscae. *Eur.*
282. Ich. \* niger, antennarum basi, facie, femorumque basi flavis, abdomine petiolo nigro, segmentis primo ferrugi-neo, 2, 3 ferrugineis, dorso nigris, 4 nigro, margine postico ferrugineo, apice nigris, pedibus rufis. *Eur.*
283. Ich. \* niger, fronte utrinque lineola labioque albo, pedibus rufis, geniculis albis. *Eur.*
284. Ich. \* niger, antennis fuscis, pedibus rufis, aculeo ab-domine longiore. *Eur.*
285. Ich. \* niger, abdomine compresso, clavato, segmentis 2, 3 utrinque masula ferruginea, aculeo mediocri, rufo, pedi-bus rufis, tibiis posticis albidis, apice fuscis, plantis al-bidis. *Eur.*
286. Ich. \* niger, antennarum basi oreque rufescentibus, ab-domine fusco-lutescente, petiolo nigro, pedibus flavescen-tibus, femoribus posticis rufo-fuscis. *Eur.*
287. Ich. \* niger, antennarum basi antice ferruginea, ab-domine depresso, basi nigro, segmentis 1, 2, 3 flavis, reli-quis nigris, pedibus obsolete rufis. *Eur.*

\*\*\*\*\* *Antennis luteis.*

288. Ich. \* capite flavo, postice nigro, fronte punctis duobus impressis, antennis ferrugineis, thorace nigro, ferrugi-neo-lineato, postice ferrugineo, nigro-niaculato, abdomi-ne falcato, femoribus rufis, tibiis flavis, posticis apice fu-scis, plantis posticis albis. *Eur.*
289. Ich. Glaucopterus. F. S. I. 79. *Eur.*
290. Ich. Luteus. F. S. I. 75. *Eur.*

291. Ich. \* ferrugineus, vertice frontisque margine antico nigris, abdomine petiolo subtus, primo segmento puncto ad basin, secundo postice reliquisque nigris. *Eur.*
292. Ich. Circumflexus. F. S. I. 80. *Eur.*
293. Ich. \* luteus, thorace fusco-maculato, abdomine primo segmento transverse impresso, tribusque ultimis nigris. *Eur.*
294. Ich. \* niger, fronte flava, in medio nigra, antennis flavis, nigro-annulatis, pedibus rufis. *Eur.*
295. Ich. \* niger, fronte tribus tuberculis elevata, antennis flavis, apice dimidio nigris, abdomen ferrugineum, basi apiceque nigrum, femora nigra, brevia, tibiae flavae, plantae ferrugineae. *Eur.*
296. Ich. \* ferrugineus, thorace nigro, variegato, scutello maculaque sub ala antica alba, aculeo abdomine dimidio breviore. *Eur.*
297. Ich. \* niger, antennis luteis, abdomine ferrugineo, basi nigro, pedibus anticis flavis, 4 posticis ferrugineis, nigro-nebulosis. *Eur.*
298. Ich. \* niger, antennis luteis, basi nigris, fronte utrinque lineola scutelloque albo, abdomine segmentis 3, 4, 5 utrinque margine postico, 6to toto albo, pedibus rufis. *Eur.*
299. Ich. \* niger, antennis ferrugineis, basi antice pone oculos flavis, fronte flava, linea longitudinali nigra, interrupta, labioque flavo, thorace flavo-maculato, abdomine cultrato, flavo, basi segmentis antice nigris, pedibus flavis, femoribus in medio ferrugineo-nigris. *Eur.*
300. Ich. \* niger, antennis luteis, basi antice, fronte tibiisque 4 anticis flavescentibus, abdomine luteo, basi segmentis tribus posticis dorso nigris, pedibus rufis. *Eur.*
301. Ich. \* luteus, thorace fusco-variegato, abdomine incisuris ferrugineis. *Eur.*
302. Ich. \* niger, antennis luteis, tenui nigro annulatis, pedibus rufis, aculeo brevi. *Eur.*
303. Ich. \* totus luteus, inter stemmata niger, alis albis, luteo-venosis. *Eur.*
304. Ich. \* niger, antennis luteis, tenui ferrugineo annulatis, fronte, ore pedibusque luteis, scutello maculaque sub ala antica alba. *Eur.*
305. Ich. \* niger, abdomine ferrugineo, apice nigro, aculeo abdomine longiore, thorace ferrugineo, maculato, scutelli margine ferrugineo, antennis, ore pedibusque ferrugineis. *Eur.*

306. Ich. \* niger, antennis ferrugineis, apice nigris, abdomine ferrugineo, apice nigro, pedibus ferrugineis, posticis geniculis nigris. *Eur.*
307. Ich. \* niger, antennis ferrugineis, apice nigris, thorace puncto sub ala antica abdominalisque apice albo, pedibus rufis, tibiis posticis apice nigris. *Eur.*
308. Ich. \* niger, antennis pedibusque luteis, ventre flavo. *Eur.*
309. Ich. \* niger, antennis, fronte, ore, pedibus, ventris antica parte luteis, scutello ferrugineo. *Eur.*
310. Ich. \* niger, antennis ferrugineis, dein extus albis, apice nigris, abdomine ferrugineo, segmentis 3, 4 nigris, apice albis, pedibus crassis, rufis, tibiis posticis apice nigris. *Eur.*

\*\*\*\*\* *Minuti, antennis filiformibus.*

311. Ich. \* niger, antennis, ore, abdominis segmentis 1, 2, 3 pedibusque rufescensibus, aculeo  $\frac{1}{4}$  lin. longo. *Eur.*
312. Ich. \* niger, antennis, fronte, ore, abdominis segmentis 1, 2, 3 pedibusque rufescensibus. *Eur.*
313. Ich. \* niger, antennis, fronte, ore, abdomine segmentis 1, 2, 3, 4, pedibusque rufescensibus, aculeo  $\frac{1}{4}$  lin. longo. *Eur.*
314. Ich. \* niger, antennis, abdominis segmentis 1, 2, 3, 4 rufescensibus, aculeo  $\frac{1}{4}$  lin. longo, femoribus nigris 4 anticis tibiis plantisque flavis. *Eur.*
315. Ich. \* niger, antennis, ore, abdominis segmentis 1, 2, 3 rufescensibus, pedibus rufo-flavis, femoribus posticis fuscis, tibiis albidis, apice fuscis. *Eur.*
316. Ich. \* niger, antennis, abdominis segmentis 1, 2, pedibusque rufescensibus, aculeo abdomine breviore, geniculis posticis fuscis. *Eur.*
317. Ich. \* niger, abdominis segmento primo dimidio postice, secundo anticē pedibusque rufis. *Eur.*
318. Ich. \* niger, antennis fuscis, pedibus rufescensibus, abdomine pubescente, segmento primo luteo, utrinque macula nigra, secundo tertioque anticē luteo. *Eur.*
319. Ich. \* niger, antennis, fronte, maxillis, pectoris lateribus pedibusque rufescensibus, abdomine primo segmento luteo, punctis duobus nigris, reliquis margine postico, aculeo medioctri. *Eur.*
320. Ich. \* niger, antennarum femorūque 4 anticarū basi, fronte, oreque albidis, antennis luteis, dorso nigris, abdomini

- domine ferrugineo, fusco-nebuloso, basi nigro, pedibus rufescens. *Eur.*
321. Ich. \* niger, antennis excepta basi, abdominis tribus primis segmentis pedibusque rufescens. *Eur.*
322. Ich. \* niger, antennis luteis, dorso fuscis, abdomine petiolo longo nigro, segmentis 1, 2 luteis, aculeo brevi, pedibus anticus luteis, femoribus 4 posticis, tibiis posticis plantisque fuscis. *Eur.*
323. Ich. \* niger, fronte alba, infra' antennas macula nigra, abdominis petiolo apice, segmentis duobus primis pedibusque rufescens. *Eur.*
324. Ich. \* niger, fronte oreque albo, abdomine basi, primo secundoque segmento pedibusque rufescens. *Eur.*
325. Ich. \* niger, antennarum basi, fronte oreque pallide flavo, abdomine petiolo apice, segmentis 1, 2, 3 pedibusque rufescens, segmento primo dorso macula nigra. *Eur.*
326. Ich. \* niger, abdomine rufescente, petiolo apice segmento primo antice nigro, pedibus rufescens. *Eur.*
327. Ich. \* niger, antennis fuscis, abdomine luteo, apice fusco, pedibus luteo-fuscescentibus. *Eur.*
328. Ich. \* niger, antennis subtus oreque luteis, pedibus rufo-flavescens, basi plantisque albis, abdomine ferrugineo, basi nigro. *Eur.*
329. Ich. \* niger, antennis excepta basi, abdomine excepta basi pedibusque rufescens, femoribus posticis brunneis, aculeo mediocri. *Eur.*
330. Ich. \* niger, antennis fusco-lateis, ore albido, abdomine rufescente, basi nigro, pedibus pallide rufis. *Eur.*
331. Ich. \* niger, abdomine pedibusque rufescens, aculeo mediocri. *Eur.*
332. Ich. \* niger, antennis pedibusque fusco-rufescens, abdomine ferrugineo, basi nigro, aculeo mediocri. *Eur.*
333. Ich. \* niger, abdomine luteo, basi macula trigona nigra, aculeo mediocri, pedibus lividis, alis fumatis. *Eur.*
334. Ich. \* niger, antennis ferrugineis, annulo albo, apice fuscis, abdomine luteo, basi nigro, aculeo medioeri, pedibus flavescens, femoribus posticis aliquae fuscatis. *Eur.*
335. Ich. \* niger, antennis nigris annulo albo, abdomine luteo, basi nigro, aculeo mediocri, femoribus nigris, tibiis ferrugineis. *Eur.*
336. Ich. \* totus lividus, aculeo abdomine longiore. *Eur.*
337. Ich. \* niger, fronte flavescente, antennis, abdomine pedibusque rufescens. *Eur.*

- 338 Ich. \* niger, fronte flavescente, antennis abdominis segmentis 2, 3 pedibusque rufescens. *Eur.*
- 339 Ich. \* niger, pedibus 4 anticis lividis, posticis rufis, femoribus in medio dente armatis. *Eur.*
340. Ich. \* niger, antennis, pedibus 4 anticis tibiisque posticis lividis, femoribus posticis nigris, abdomine luteo, basi nigro. *Eur.*
341. Ich. \* niger, ore, pedibus 4 anticis, tibiis posticis, abdominis segmento primo apice flavescentibus, segmento secundo reliquisque luteis, femoribus posticis fusco-luteis, aculeo brevi. *Eur.*
342. Ich. \* niger, maxillis, pedibus 4 anticis flavescentibus, femoribus posticis rufo-nigris, abdomine primo segmento postice 2, 3, 4 luteis, secundo antice macula nigra. *Eur.*
343. Ich. \* niger, fronte, pedibus 4 anticis, abdominis segmento tertio postice flavescentibus, abdomine basi nigro, segmentis antice fuscis, postice rufescens, excepto tertio, pedibus posticis rufo-fuscis, geniculis nigris. *Eur.*
344. Ich. \* niger, abdominis incisuris pedibusque rufescens, aculeo brevi. *Eur.*
345. Ich. \* niger, fronte, ore, femorum 4 anticorum basi paleide flavis, pedibus 4 anticis flavo-rufis, posticis rufis. *Eur.*
346. Ich. \* niger, abdominis incisuris lateribusque pallidis, pedibus obsolete flavis, femoribus in medio nigris. *Eur.*
347. Ich. \* niger, antennarum basi flava, pedibus rufo-flavis. *Eur.*
348. Ich. \* niger, abdomine compresso, pedibus rufis. *Eur.*
349. Ich. \* niger, abdomine utrinque obsolete testaceo, maculato, pedibus rufescens. *Eur.*
350. Ich. \* niger, abdomine ferrugineo-fusco, aculeo abdominis longitudine. *Eur.*
351. Ich. \* niger, ore, abdominis incisura 1, 2 pedibusque rufescens. *Eur.*
352. Ich. \* niger, antennis pedibusque rufescens, aculeo mediocri. *Eur.*
353. Ich. \* niger, antennis, thorace antice, lateribus pedibusque rufo-fuscis, abdomine fusco, aculeo mediocri. *Eur.*
354. Ich. \* niger, antennis pedibusque testaceis. *Eur.*
355. Ich. \* niger, abdomine depresso, lateribus pallidis (ferrugineis), aculeo longitudine abdominis, alis nigris. *Eur.*
356. Ich. \* niger, pedibus 4 anticis testaceis, posticis fuscis, geniculis albidis. *Eur.*

357. Ich. \* piceus, glaber, abdomine subovato, utrinque acuminato, pedibus testaceis. *Eur.*
358. Ich. \* niger, fronte utrinque linea, ore, thorace antice utrinque linea, scutelloque dupli puncto albo, pedibus rufescens, tibiis posticis albis, basi, apice plantisque nigris. *Eur.*
359. Ich. \* niger, pedibus testaceis, aculeo abdome longiore. *Eur.*
360. Ich. \* niger, antennis lividis, tenui fusco-annulatis, pedibus lividis. *Eur.*
361. Ich. \* niger, antennis fuscis, ore, scutello pedibusque rufescens, thorace ante alas utrinque lineola alba. *Eur.*
362. Ich. \* niger, antennis, abdominis segmentis 2, 3, 4 pedibusque rufescens, aculeo mediocri. *Eur.*
363. Ich. \* niger, pedibus 4 anticis rufescens, posticis fuscis. *Eur.*
364. Ich. \* niger, abdome compresso, fusco, segmentis 1, 2 utrinque macula lutea, antennarum basi antice, femorum 4 anticorum basi oreque flavo, pedibus rufis. *Eur.*
365. Ich. \* niger, glaber, abdome plano, segmentis 1, 2 luteis, postice fuscis, aculeo mediocri luteo, pedibusque testaceis. *Eur.*
366. Ich. \* niger, antennarum basi pedibusque rufescens, aculeo abdome longiore. *Eur.*
367. Ich. \* niger, capite, abdominis segmento secundo, apice pedibusque luteis, aculeo mediocri. *Eur.*
368. Ich. \* niger, antennis luteis, abdome incisuris ferrugineis, aculeo mediocri, pedibus rufis, tibiis posticis plantisque 4 posticis albo-annulatis. *Eur.*
369. Ich. \* niger, pedibus 4 anticis luteis, posticis rufescens, abdome subtus flavescente. *Eur.*
370. Ich. \* niger, antennis, pedibus 4 anticis luteis, posticis rufescens, tibiis albidis, apice plantisque fuscis. *Eur.*
371. Ich. \* niger, antennis pedibusque luteis. *Eur.*

\*\*\*\*\* *Minuti, antennis filiformibus, abdome ovato, sessili.*

372. Ich. Bedeguaris. F. S. I. 85. *Eur.*
373. Ich. Gallarum. F. S. I. 86. *Eur.*
374. Ich. Aphidum. F. S. I. 96. *Eur.*
375. Ich. Sphegum. F. M. Tom. I. I. 138. *Eur.*
376. Ich. Ovulorum. F. M. Tom. I. I. 145. *Eur.*

377. Ich. \* niger, femoribus anticis apice tibiisque pallidis, posticis apice nigris, aculeo porrecto longitudine abdominis. *Eur.*
378. Ich. \* niger, antennis longis, pedibus rufis, macula alarum magna, semilunari, fusca. *Eur.*
379. Ich. Cursitans. F. S. L. 98. *Eur.*

## ICL. EVANIA.

380. Ev. Maeulata. F. S. E. 2. *Eur.*
381. Ev. \* nigra, alis anticis fascia fusca. *Eur.*

## 102. CHALCIS.

381. Chal. Minuta. F. M. Tom. 1. Ch. 3. *Eur.*

## 103. SPHEX.

\* *Abdomine petiolato.*

382. Sph. Pensylvanica. F. S. S. 3. *Exotic.*
383. Sph. Aegyptia. Lin. S. S. 10. *Exotic.* <sup>†</sup>
384. Sph. Sabulosa. F. S. S. 1. *Eur.*
385. Sph. Arenaria. F. M. Tom. 1. S. 2. *Eur.*
386. Sph. Violacea. F. S. S. 4. *Capensis.*
387. Sph. Cyanea. F. S. S. 5. *Americana.*
388. Sph. Lutaria. F. M. Tom. 1. S. 3.
389. Sph. Figulus. F. S. S. 6. *Eur.*
389. b Sph. \* tomentosa, nigra, antennis basi crassis, abdome fessili, thorace breviore, segmentis tribus primis subferrugineis, basi apiceque nigris. *Eur.*

\*\* *Abdomine fessili.*

390. Sph. \* atra, antennis, maxillis (exceptis apicibus, quae atrae), abdominis apice, tibiis plantisque coccineis, thorace postice utrinque dente armato, alis flavis, margine postico fuseis *Exotica.*
391. Sph. Ruficornis. F. M. Tom. 1. S. 61. *Exotic.*
391. b Sph. \* hirta, atra, antennis luteis, oculis postice utrinque lineola flava, thorace ante alas linea transversa scutelloque flavo, alis flavis, marginibus posticis fuscis, primis basi macula nigra, abdomine segmentis 2, 3, 4 marginibus anticis utrinque flavis, femoribus nigris, apice luteis, tibiis plantisque luteis, spinosis.

392.

† Fab. S. Sphe. II. β. S. Spirifex.

392. Sph. Coerulea. F. S. *S. 38. Americana.*  
 393. Sph. Fusca. F. S. *S. 19. Eur.*  
 394. Sph. Viatica. F. S. *S. 20. Eur.*  
 394. b. Sph. \* nigra, capite, vertice utrinque lineola alba, thorace utrinque gutta, ante alas utrinque lineola transverse obliqua, alba, thorace pone scutellum croceo-ruso, abdomine segmentis 1, 2 utrinque gutta ovata, transversa, tertio dorsali alba, pedibus rufis, tibiis 4 posticis extus dentatis, alis luteis.  
 395. Sph. Rufipes. F. S. *S. 29. Eur.*  
 395. b. Sph. \* nigra, abdome primo segmento utrinque macula ovata, transversa tertioque dorsali alia, femoribus 4 posticis rufis, tibiis posticis rufis, dentatis, alis nigris, versus marginem posticum albis.  
 396. Sph. Nigra. F. S. *S. 22. Eur.*  
 397. Sph. \* nigra, abdomine sessili, basi ferrugineo, segmentis tertio postice 4, 5, 6, 7 nigris. *Eur.*  
 397. b. Sph. Exaltata. F. S. *S. 31. Eur.*  
 398. Sph. \* nigra, abdomine sessili, testaceo, apice fuscō, pedibus testaceis. *Eur.*

## 104. TIPHIA.

398. b. Ti. Femorata. F. S. *T. I. Eur.*  
 398. c. Ti. \* nigra, immaculata. *Eur.*

## 105. SCOLIA.

399. Sc. 4-maculata. F. S. *S. 2. Americ.*

## 106. CHRYSIS.

400. Chr. Ignita. F. S. *Ch. 6. Eur.*  
 401. Chr. \* capite coeruleo-virescente, thorace coeruleo, antice virescente, postice bidentato, abdomine viridi, rufo-coeruleo, pedibus coeruleis, plantis testaceis. *Eur.*  
 402. Chr. \* capite coeruleo-viridi, thorace aureo, in medio macula quadrata posticeque viridi, abdomine aureo, ultimo segmento viridi-coeruleo, obsolete 4-dentato. *Eur.*  
 403. Chr. Lucidula. F. S. *Ch. 9. Eur.*  
 404. Chr. Aurata. F. S. *Ch. 10. Eur.*  
 405. Chr. \* capite coeruleo, thorace coeruleo, antice viridi, abdomine aureo inermi. *Eur.*  
 406. Chr. \* viridis, abdominis ultimo segmento aureo, inermi. *Eur.*  
 407. Chr. Cyanea. F. S. *Ch. 21. Eur.*

408. Chr. \* capite thoraceque viridibus, macula ante scutellum abdomineque viridi-aureo, inerimi. *Eur.*

### 107. LEVCOPSIS.

408. b. Lev. Dorsigera. F. S. *L. 1. Eur.*

### 108. BEMBYX.

409. Bem. Rostrata. F. S. *B. 3. Eur.*

409. b. Bem. Signata. F. S. *B. 1. Americana.*

### 109. VESPA.

410. Ves. Cincta. F. S. *V. 1. Malabar.*

411. Ves. Crabro. F. S. *V. 8. Eur.*

412. Ves. \* nigra, ferrugineo variegata, abdominis petiolo ferrugineo, dorso nigro, pedibus ferrugineis, caput nigrum, frons flava, apice truncata, antennae nigrae, basi flavae, maxillae ferrugineae, thorax niger, basi usque ad alas ferrugineus, interne excisus, dorso utrinque adiacente ferrugineo, punctum callosum ante alas, macula sub ala antica, aliaque ad basin femorum mediorum ferruginea, scutellum ferrugineum, linea sub scutello et utrinque inferius macula ferruginea, abdominis petiolus elongatus, dorso niger, apice libero, abdominis primum segmentum campaniforme, maximum, basi ferrugineum, in medio nigrum, apice flavum, reliqua segmenta decrescentia, flava, alae luteo-ferrugineae, pedes ferruginei. *Exotica.*

413. Ves. Vulgaris. F. S. *V. 9. Eur.*

414. Ves. Gallica. F. M. *Tom. I. V. 11. Eur.*

415. Ves. Coarctata. F. S. *V. 39. Eur.*

416. Ves. Parietum. F. S. *V. 26. Eur.*

417. Ves. Spinipes. F. S. *V. 28. Eur.*

418. Ves. \* nigra, thorace maculato, scutello bilineato, priorre interrupta, postice utrinque macula renali, flava, abdome fasciis 5 flavis, prima remotissima, reliquae antice sinuatae, pedes flavi, femora 4 antica basi flava. *Eur.*  
Variat scutello punctis duobus, absque maculis renalibus.

419. Ves. \* nigra, labio flavo, thorace antice puncto calloso alarum anticarum, lineaque transversa, scutellari, flava, abdome fasciis 6 flavis, prima remotissima, secunda utrin-

utrinque sinuata, femoribus nigris, apice, tibiis plantisque flavis. *Eur.* †

420. Ves. \* capite nigro, puncto inter antennas, thorace antice fascia interrupta, abdomine fasciis 4, prima remotissima, apiceque lineola pallide flava, femoribus nigris, apicibus, tibiis plantisque luteis. *Eur.*
421. Ves. \* nigra, capite ferrugineo, ore et sub oculis flavo, thorace nigro, lateribus, basi et utrinque sub ala antica macula longa, flava, loco scutelli lineolae duae flavae, abdomine ferrugineo, petiolo nigro, apice flavo, segmentis, primo antice nigro, postice flavo, 3; 4 margine flavis, femora nigra, tibiae flavae, posticae apice nigrae, plantae flavae, alis luteis. *Exotica.*
422. Ves. Trifasciata. F. M. Tom. I. V. 46. *Eur.*
423. Ves. Muraria. F. S. V. 27. *Eur.*
424. Ves. 2-punctata. F. S. V. 33. *Eur.*

## II. CRABRO.

425. Cr. \* thorace maculato, abdomine fasciis sex flavis, dorso angustioribus, prima interdum interrupta, pedibus flavis. *Eur.*
426. Cr. \* thorace maculato, abdomine fasciis sex flavis, prima e punctis tribus, tertia interrupta, pedibus flavis, basi nigris, labio argenteo. *Eur.*
427. Cr. \* thorace maculato, scutello concolore, abdomine fasciis sex flavis, labio argenteo, femoribus nigris, tibiis plantisque flavis. *Eur.*
428. Cr. \* niger, punctatus, thorace maculato, abdomine incisuris profundis, fasciis quatuor, petiolo utrinque macula flava, ano marginato, apice truncato, bidentato, pedibus luteis, basi nigris, femoribus apice truncatis. *Eur.* ††

429.

- † Variat 1. scutello linea antice punctis duobus flavis,  
 2. abdominis fasciis latioribus,  
 3. punctis 4 flavis, loco scutelli,  
 4. scutello lineolis duabus, priore interrupta, postice  
 utrinque macula renali nigra,  
 5. scutello thorace concolore, labio flavo.
- †† Variat 1. fascia prima, petioli maculis fasciisque interruptis,  
 2. petiolo fasciisque duabus interruptis,  
 3. petiolo concolore, fascia prima interrupta, femoribus  
 4 anticis basi, posticis apice nigris,  
 4. fascia tercia integra,  
 5. fasciis omnibus interruptis, strigaque transversa ad  
 quintum segmentum flava, in aliis etiam et haec in-  
 terrupta,

5.

429. Cr. \* punctatus, fronte oreque flavo, thorace nigro, puncto alarum calloso, flavo, abdomine primo segmento basi, secundo toto, in medio triangulo nigro, quarto utrinque macula triangulari, flava, anoque marginato, femora ferruginea, 4 antica postice nigra; tibiae plantaeque flavae. *Eur.* †
430. Cr. Critrarius. F. S. C. 6. *Eur.*
431. Cr. \* antennis basi maxillisque flavis, labio argenteo, thorace maculato, abdomine fasciis sex flavis, tertia interrupta, aliis petiolo punctis tribus fasciisque 2, 3 interruptis, femoribus nigris, 4 anticis suetus flavis, tibiis plantisque flavis, aliis femoribus nigris, tibiis luteis, anticis postice macula nigra. *Eur.*
432. Cr. \* thorace maculato, labio argenteo, abdomine fasciis tribus, duabus anticis interruptis, femoribus nigris, apice, tibiis plantisque flavis. *Eur.*
433. Cr. Uniglumis. F. S. C. 12. *Eur.*
434. Cr. \* thorace maculato, labio argenteo, abdomine segmentis 4 anticis utrinque macula flava, 5to fascia pedibusque ferrugineis *Eur.*
435. Cr. Mystaceus. F. S. C. 9. *Eur.*
436. Cr. \* thorace maculato, labio nigro, tridentato, abdomen petiolato, segmentis 1, 2 utrinque macula, quarto fascia flava, antennis, maxillis pedibusque rufo-luteis. *Eur.*
437. Cr. Subterraneus. F. S. C. 4. *Eur.*
438. Cr. \* thorace cylindrico, maculato, punctis duobus inter antennas, labio nigro, utrinque linea flava, abdomine cylindrico, supra segmentis 1, 2, 3 fascia flava, subtus utrinque macula flava, antennis apice ferrugineis, pedibus nigris, tibiis posticis basi flavis. *Eur.*
438. b. Cr. \* thorace immaculato, pubescente, fronte oreque flavo, antennis nigris, apice ferrugineis, abdomine petiolato, segmentorum marginibus luteis, femora 4 antica
- ca
6. petiolo macula utrinque, abdominis fasciis quinque, prima interrupta,  
7. petiolo concolore, fasciis quinque, ultima integra,  
8. fasciis quinque integris, femoribus postice in medio nigris.
- † Variat 1. fasciis tribus flavis, intermedia interrupta,  
2. fasciis tribus integris,  
3. primo segmento basi, secundo fascia interrupta, 3, 4 margine postico, quinto utrinque macula flava.

ca nigra, postica basi flava, dente apice excurrentia, tibiae flavae, posticae apice nigrae, extus dentatae, plantae flavae. *Eur.*

439. Cr. Leucostoma. F. S. C. 13. *Eur.*
440. Cr. Clypeatus. F. S. C. 7. *Eur.*
441. Cr. \* totus niger.
442. Cr. \* niger, canescens, abdomine petiolato, segmentis 1, 2 postice gibbosis. *Eur.*
443. Cr. \* thorace antice utrinque puncto, labio argenteo, abdomine petiolato utrinque puncto, segmentis quatuor anticis utrinque macula oblonga, flava, pedibus flavis, basi nigris. *Eur.*
444. Cr. \* thorace immaculato, fronte labioque argenteo, abdomine nigro, petioli apice, segmento primo, antennis, tibiis plantisque ferrugineis, tibiis 4 posticis apice nigris. *Eur.*
445. Cr. \* thorace immaculato, labio argenteo, abdomine nigro, cano-nitente, geniculis flavis. *Eur.*
446. Cr. \* niger, thorace immaculato, fronte labioque subargenteo, abdomine petiolato, plantis subferrugineis. *Eur.*
447. Cr. \* niger, fronte ad oculum utrinque macula flava, thorace margine antico maculaque sub ala flava, geniculisque flavis. *Eur.*
448. Cr. \* thorace maculato, labio argenteo, femoribus nigris, tibiis flavis, posticis intus fuscis. *Eur.*
449. Cr. \* thorace antice lateribus utrinque puncto flavo, labio argenteo, abdomine petiolato, clavato, segmento primo apice apiceque luteo, femoribus nigris, basi apiceque flavis, tibiis anticis flavis, mediis flavis, intus macula nigra, posticis clavatis, basi flavis, in medio nigris, apice luteis, plantis flavis. *Eur.* †
450. Cr. \* niger, thorace immaculato, abdomine petiolato, apice, maxillis, antennis, macula alarum, tibiis plantisque luteis. *Eur.*
451. Cr. \* niger, thorace immaculato, labio argenteo, antennis basi antice pedibusque anticis flavis, femoribus supra nigris. *Eur.*
452. Cr. \* niger, thorace utrinque puncto, maxillis, antennarum basi antice, tibiis anticis, 4 posticis basi flavis. *Eur.*

† Variat tibiis posticis basi flavis, apice nigris.

## III. ANDRENA.

453. An. Coerulescens. F. S. *A. 1. Eur.*
454. An. Succineta. F. S. *A. 14. Eur.*
455. An. \* fusca, subvillosa, abdomine segmentis 1, 2, 3 ferrugineis, dorso macula magna, fusca, labio antice, tibiis plantisque flavis, tibiis in medio fuscis. *Eur.*
456. An. \* fusca, subvillosa, abdomine, incisurarum marginibus albicantibus, labio, femoribus antice, antennis, tibiis plantisque flavis. *Eur.*
457. An. \* fusca, subvillosa, abdomine, incisurarum marginibus ferrugineis, labio, tibiis plantisque flavis, tibiis in medio antennisque fuscis. *Eur.*
458. An. \* fusca, subvillosa, abdomine fusco, segmentis 1, 2 antennis antice ferrugineis, tibiis basi, apice plantisque albis. *Eur.*
459. An. \* fusca, subvillosa, antennis subtus ferrugineis, plantis albis. *Eur.*
460. An. Aenea. F. S. *A. 2. Eur.*
461. b. An. \* nigra, punctata, abdominis incisuris luteis. *Exotica.*

## II2. APIS.

461. Ap. Nigrita. F. S. *A. 3. Africana.*
462. Ap. Violacea. F. S. *A. 2. Eur.*
463. Ap. Brasiliatorum. F. S. *A. 23. Americana.*
464. Ap. Terrestris. F. S. *A. 5. Eur.*
465. Ap. Hortorum. F. S. *A. 13. Eur.*
466. Ap. Lapidaria. F. S. *A. 14. Eur.*
467. Ap. Sylvarum. F. S. *A. 15. Eur.*
468. Ap. Muscorum. F. S. *A. 17. Eur.*
469. Ap. Hypnorum. F. S. *A. 18. Eur.*
470. Ap. Nemorum. F. S. *A. 19. Eur.*
472. Ap. \* hirsuta, thorace luteo, abdomine nigro, postice albo. *Eur.*
473. Ap. \* hirsuta, flavo-lutea, antennis basi antice flavis, alis cupreo-nitentibus. *Exotica.*
474. Ap. \* hirsuta, nigra, alis violaceis, margine postico et tenuiore late fuscis, plantis subtus ferrugineis.
475. Ap. \* nigra, capite nigro, hirsuto, thorace nigro, antice griseo, hirsuto, abdomine nigro, pedibus glabris, plantis ferrugineis. *Eur.*
476. Ap. Subterranea. F. S. *A. 22. Eur.*
477. Ap. Dentata. F. S. *A. 47. Americana.*

478. Ap. Senilis. F. S. *A. 26. Eur.*
479. Ap. Lagopoda. F. S. *A. 27. Eur.*
480. Ap. Pilipes. F. S. *A. 28. Eur.*
481. Ap. Cunicularia. F. S. *A. 29. Eur.*
482. Ap. Mellifica. F. S. *A. 30. Eur.*
483. Ap. Cineraria. F. S. *A. 33. Eur.*
484. Ap. Manicata. F. S. *A. 35. Eur.*
485. Ap. Haemorrhoa. F. M. Tom. I. *A. 49. Eur.*
486. Ap. Bicornis. F. S. *A. 38. Eur.*
487. Ap. Centuncularis. F. S. *A. 42. Eur.*
488. Ap. Punctata. F. S. *A. 43. Eur.*
489. Ap. \* fronte thoraceque albido, scutello bidentato, abdome atro, segmentorum marginibus albis, pedibus albis. *Exotica.*
490. Ap. \* capite thoraceque griseis, abdomine atro, segmento secundo utrinque macula 3, 4, apiceque marginibus albis. *Exotica.*
491. Ap. Longicornis. F. S. *A. 58. Eur.*
492. Ap. Linguaria. F. S. *A. 60. Eur.*
493. Ap. Cineta. F. M. Tom I. *A. 72. Exotica.*
494. Ap. Florisomnis. F. S. *A. 55. Eur.*
495. Ap. \* capite thoraceque luteo-griseis, abdomine fusco, basi utrinque segmentis, tertio utrinque macula grisea, quarto margine albido, quinto fulvo, pedibus lanatis fulvis. *Eur.*
496. Ap. \* capite thoraceque griseis, abdomine nigro, apice acuminato, segmentis 1, 2 parum griseis, omnibus utrinque macula griseo-albida. *Eur.*
497. Ap. \* capite nigro, thorace luteo griseo-que vario, abdomine fusco, pubescente, femoribus posticis antice posticeque albo-villosis. *Eur.*
498. Ap. \* grisea, abdomine postice nigro. *Eur.*
499. Ap. \* hirsuta, grisea, fronte alba, segmentorum marginibus griseis. *Eur.*
500. Ap. \* grisea, fronte alba, abdomine fusco, griseo-pubescente. *Eur.*
501. Ap. \* fronte maxillisque flavis, thorace luteo, abdomine fusco-pubescente, segmentis ultimis griseo-marginatis. *Eur.*
502. Ap. Mystacea. F. S. *A. 41. Eur.*
503. Ap. Quadridentata. F. S. *A. 49. Eur.*
504. Ap. Conica. F. S. *A. 53. Eur.*
505. Ap. \* luteo-grisea, fronte utrinque macula albo-rufescente, labio albo-rufescente, punctulis duabus nigri abdomine fusco, marginibus griseo-luteis. *Eur.*

506. Ap. \* grisea, abdomine fuscō, apice, tibiis plantisque ferrugineis. *Eur.*
507. Ap. \* grisea, abdomine nigro, segmentorum 3, 4, 5 marginibus albīs, pedibus fulvis, lanatis. *Eur.*
508. Ap. \* grisea, pilosa, thorace abdominalisque medio fascia nebulosa, nigra. *Eur.*
509. Ap. Variegata. F. M. Tom. I. A. 56. *Eur.*
510. Ap. Rufa. F. S. A. 39. *Eur.*
511. Ap. \* luteo-grisea, abdomine fuscō, segmentorum marginibus griseis. *Eur.*
512. Ap. \* nigra, cylindrica, fronte villo griseo, pubescente, mystace lutea, thorace pedibusque luteis, abdomine glabro, segmentorum marginibus luteis. *Eur.*
513. Ap. Maxillosa. F. M. Tom. I. A. 86. *Eur.*
514. Ap. \* fusca, capite thoraceque griseis, maxillis basi dentate armatis, plantis luteis. *Eur.*
515. Ap. \* nigra, antennis versus apicem luteis, femoribus posticis subtus dente armatis. *Eur.*
516. Ap. \* capite thoraceque nigris, abdomine, tibiis plantisque rufis. *Eur.*
517. Ap. \* fusca, griseo-pubescentis. *Eur.*
518. Ap. \* nigra, fronte alba, labio margine flavo. *Eur.*
519. Ap. \* capite thoraceque luteis, abdomine nigro, glabro, segmentorum 2, 3, 4 marginibus albidis. *Eur.*
520. Ap. \* nigra, pedibus posticis fulvis, hirsutissimis. *Eur.*
521. Ap. \* nigra, thorace griseo, abdomine segmentorum marginibus luteo-griseis. *Eur.*
522. Ap. \* cana, abdominalis segmentorum marginibus canis. *Eur.*
523. Ap. \* nigra, fronte utrinque macula trigona, alba, thorace maculato, abdomine ferrugineo, apice nigro, pedibus nigris, tibiis basi albīs. *Eur.*
524. Ap. Annulata. F. S. A. 56. *Eur.*

## 113. NOMADA.

525. No. Hattorfiana. F. S. N. 6. *Eur.*
526. No. Ruficornis. F. S. N. 3. *Eur.*
527. No. Fabriciana. F. S. N. 4. *Eur.*
528. No. Gibba. F. S. N. 5. *Eur.*
529. No. Cingulata. F. S. N. 7. *Eur.*

## 114. TERMESS.

529. b. Ter Fatale. F. S. T. 1. *Exotic.*

## 115. FOR-

## 115. FORMICA.

530. For. Herculeana. F. S. *F. 1. Eur.*
531. For. Rufa. F. S. *F. 4. Eur.*
532. For. Fusca. F. M. Tom. I. *F. 10. Eur.*
533. For. \* capite thoraceque nigris, squama integra, crassa, abdomine cylindrico, fusco, capite thoraceque longiore, pedibus testaceis, alis albis, venis testaceis, macula marginali fusca.
534. For. \* rufa; oculis nigris, abdomine dorso fusco, squama integra. *Eur.*
535. For. Pubescens. F. S. *F. 5. Eur.*
536. For. \* nigra, glabra, squama bidentata, abdomine incisuris albidis, pedibus rufis. *Eur.*
537. For. \* testaceo-fusca, subpubescens, antennis pedibusque testaceis, alis albis, basi ferrugineo-dilatatis. *Eur.*
538. For. Flava. F. M.; Tom. I. *F. 25. Eur.*
539. For. Cespitem. F. S. *F. 14. Eur.*
540. For. \* nigra, capite abdominalis latitudine, squama brevissima, ore, antennis pedibusque rufo-fuscouscentibus. *Eur.*
541. For. \* capite thoraceque nigro, abdomine fusco, maxillis, antennis pedibusque testaceis, alis hyalinis. *Eur.*

## 116. MUTILLA.

542. Mu. Europaea. F. S. *M. 7. Eur.*

## \* APPENDIX.

- 543... Rufum, luteo-villosum; caput parvum, coccineum, antennae breves, 12 articulis, excepta basi, filiformes, coccineae, basi longa, maxillae validae, coccineae, uti in Bembyce, labium superius aut deest, aut omnino nullum; thorax rufus, oblongus, pubescens, postice angustatus, alae ferrugineo-venosae, costa marginali fusca; abdomen sessile, subcylindricum, apice parum incurvum, rufum, luteo-pubescens; pedes breves, coccinei, femora compressa, glabra. *Exoticum.*
- 544... Facie Evaniae; caput nigrum, villis albis adspersum, antennae filiformes, nigrae, 10 articulis, maxillae pallidae, apice nigrae; thorax niger, gibbus, villo albo adspersus, margine antico, et a puncto alarum calloso ad alterum stria sub ala antica, macula utrinque flava, alae

albae; abdomen flavescens, femora nigra, tibiae flavae,  
in medio fuscae. *Exoticum.*

545... Facie Sphegis; caput nigrum, antennae filiformes, fu-  
scæ; thorax niger, longus, angustus, immaculatus; alae  
albae macula marginali ferruginea, abdomine breviores;  
abdomen ferrugineum, sessile, primum segmentum maxi-  
mum totum abdomen fere constituens, dein duo angu-  
stiora, anus exit in caudam incurvam integrum, abdomi-  
nis longitudine; pedes ferruginei. *Eur.*

546... Facie Ichneumonis semiaurati; caput auratum, anten-  
nae crassæ, basi longa, lutea, a basi inflexæ arcuatae,  
tribus articulis luteis, reliquis nigris; thorax auratus, li-  
neis 4 longitudinalibus impressis, unaque transversa ante  
alas; alae albae, fascia fusca; abdomen ferrugineum, api-  
ce nigrum, anus productus in caudam luteam, integrum,  
sinistrorum inflexam, abdominis fere longitudine; pedes  
lutei. *Eur.*

547... Facie Tenthredinis minoris, at ano obtuso; nigrum,  
palpi albi, antennæ filiformes, basi flavae, thorax im-  
maculatus, postice quinque-dentatus; abdomen saccat-  
um, apice rotundum, integrum, ventre excavato; femo-  
ra fusca, tibiae plantaeque rufo-fuscae.

548... Facie Sphegis, magnitudine formicæ; piceum, caput  
fronte acuminata, antennæ moniliformes, fuscae; tho-  
rax glaber, postice angustatus; alae albae; abdomen ova-  
tum, petiolo lato; pedes rufi, femora clavata.

549... Facie prioris; at antennarum basis duplo longior; ca-  
put nigrum, globoso-conicum, fronte acuminata, ad cuius  
apicem antennæ moniliformes, testaceæ, basi longa cy-  
lindrica; thorax niger, postice angustus; alae albae; ab-  
domen fusco-ferrugineum, ovatum, planum, petiolatum,  
petiolo subovato, piano; pedes lividi.

CLASSIS IV.  
A G O N A T A.

---

## 117. SCORPIO.

1. Scor. Americus. F. S. *S. 4. Americanus.*
2. Scor. \* pectinibus 20-dentatis. *Exoticus.*
3. Scor. \* pectinitibus 11-dentatis. *Exoticus.*
4. Scor. Europaeus. F. S. *S. 5. Eur.*
5. Scor. <sup>!\*</sup> pectinibus 29-34-dentatis. *Exoticus.*
6. Scor. Maurus. F. S. *S. 2. Africaanus.*
7. Scor. Carniolicus. Scop. Ent. carn. n. 1122. *Eur.*

## 118. CANCER.

\*\* *Thorace laevi, lateribus inciso.*

8. Can. Pelagicus. F. S. *C. 21. Exotic.*
9. Can. Pagurus. F. S. *C. 28. Eur.*
10. Can. Maenas. F. S. *C. 24. Eur.*
11. Can. Floridus. F. S. *C. 17. Indus.*
12. Can. \* thorace laevi sculo, antice quadridentato, utrinque quinquedentato, carpis subdentatis, cauda inflexa angusta.
13. Can Grapsus. F. S. *C. 33. Exoticus.*
13. b. Can. \* thorace orbiculato, laevi, antice truncato, utrinque quinquedentato, cauda inflexa, articulo tertio longiore, digito postremo acuminato; magnitudine Cimicis Festivi.

\*\*\* *Thorace supra hirto, aut spinoso.*

14. Can. Horridus. F. S. *C. 46. Asiaticus.*
15. Can. Phalangium. F. S. *C. 43. Exoticus.*

## 119. PAGURUS.

16. Pag. Bernhardus. F. S. *P. 2. Eur.*
17. Pag. Crabus. Lin. *S. Macrourus 68. Exoticus.*
19. Pag. Strigosus. F. S. *P. 10. Exoticus.*

## 120. ASTACUS.

20. Ast. Fluviatilis. F. S. *A. 2. Eur.*
21. Ast. Mantis. F. S. *A. 16. Asiaticus.*

## 121. GAMARUS.

22. Ga. Pulex. F. S. *G. 2. Eur.*

## CLASSIS V.

## U N O G A T A.

## 122. LIBELLULA.

1. Lib. 4-maculata. F. S. *L. 1. Eur.*
1. b. Lib. Carolina. F. S. *L. 23. Americana.*
1. c. Lib. <sup>\*</sup> rubicunda, alis basi lineolisque marginalibus ferrugineis. *Exotica.*
2. Lib. Depressa. F. S. *L. 2. Eur.*
3. Lib. Cancellata. F. S. *L. 12. Eur.*
4. Lib. Aenea. F. S. *L. 21. Eur.*
5. Lib. Vulgatissima. F. S. *L. 9. Eur.*
6. Lib. Vulgata. F. S. *L. 11. Eur.*
7. Lib. Flaveola. F. S. *L. 4. Eur.*
8. Lib. Umbrata. F. S. *L. 14. Americana.*

## 123. AESHNA.

9. Ae. Grandis. F. S. *A. 2. Eur.*
10. Ae. Forcipata. F. S. *A. 1. Eur.*

## 124. AGRION.

11. Ag. Virgo.  $\alpha$ . F. S. *A. 1.  $\alpha$ . Eur.*
12. Ag. V. <sup>\*</sup> corpore sericeo, nitido, alis virescentibus, margine immaculatis. *Eur.*
13. Ag. V.  $\gamma$ . F. S. *A. 1.  $\gamma$ . Eur.*
14. Ag. Puella  $\alpha$ . F. S. *A. P. 2.  $\alpha$ . Eur.*
15. Ag. P.  $\gamma$ . F. S. *A. P. 2.  $\gamma$ . Eur.*
16. Ag. P. <sup>\*</sup> corpore albo, sericeo alterno, alis puncto marginali nigro. *Eur.*
17. Ag. P. <sup>\*</sup> corpore albo, sericeo alterno, alis puncto marginali albo. *Eur.*

## 125. IULUS.

18. Iu. Terrestris. F. S. *I. 3. Eur.*
19. Iu. <sup>\*</sup> brunneus, pedibus utrinque 57. *Eur.*
20. Iu. Complanatus. F. S. *I. 4. Eur.*

## 126. SCOLOPENDRA.

21. Sc. Morsitans. F. S. *S. 5. India.*
22. Sc. Electrica. F. S. *S. 8. Eur.*
23. Sc. Forficata. F. S. *S. 3. Eur.*

## 127. TROM-

## 127. TROMBIDIUM.

24. Tr. Holofericeum. F. S. *T. 2. Eur.*  
 25. Tr. Aquaticum. F. S. *T. 3. Eur.*

## 128. ARANEA.

\* a. \* *Oculis ::::*

26. Ar. \* pedibus pilosis, femoribus tibiisque triplici annulo virescente variegatis, reliqua ob exsiccationem et abdominis corrugationem, uti in sequentibus, vix determinanda. *Eur.*  
 27. Ar. \* pedibus pilosis, pallidis. *Eur.*  
 28. Ar. \* tota pallida, levissime pilosa.

\* b. \* *Oculis ::::*

29. Ar. \* tota fusca. *Eur.*

\* c. \* *Oculis ::::*

30. Ar. \* testacea, abdomine dorso sanguineo. *Eur.*

\* d. \* *Oculis ::::*

31. Ar. \* fusca, thorace postice pedibusque luteis, abdomine fascia dorsali alba. *Eur.*

\* e. \* *Oculis ::::*

32. Ar. \* pedibus spinosis, geniculis ferrugineis. *Eur.*  
 33. Ar. \* thorace dorso marginibusque fuscis. *Eur.*  
 34. Ar. \* pallida, pedibus spinosis. *Eur.*  
 35. Ar. \* nigra, pedibus rufis. *Eur.*

\* f. \* *Oculis ::::*

36. Ar. \* abdomine longo, pedibus anticis longissimis. *Eur.*

\* g. \* *Oculis ::::*

37. Ar. \* pedibus spinosis, tibiis in medio albis. *Eur.*  
 38. Ar. \* thorace pedibusque aquosus, geniculis aurulentis. *Eur.*

\* h. \* *Oculis ::::*

39. Ar. \* femoribus in medio annulo geniculisque fuscis. *Eur.*

\* i. \* *Oculis* :: :

40. Ar. Truncorum. Lin. S. A. 37. Eur.

\* k. \* *Oculis* :: :

41. Ar. \* fusca, pedibus fuscō-maculatis, pilosis. Eur.

\* l. \* *Oculis* :: :

42. Ar. \* thorace luteo, in medio impresso, postice fuscō, abdomine ovato, flavo, utrinque tuberculis 4, fasciisque 4 arcuatis, fuscis, ab uno tuberculo ad alterum ductis, pedibus luteis, tibiis primi paris annulo fuscō, plantis fuscis. *Exotica*.

\* m. \* *Oculis* :: :

43. Ar. Avicularia. F. S. A. 35. *Americana*.

### 129. PHALANGIUM.

44. Ph. Caudatum. F. S. P. 5. *Indum*.

45. Ph. Opilio. F. S. P. 2. *Eur.*

## CLASSIS VI.

## G L O S S A T A.

## ISO. PAPILIO:

\* 1. \* *Equites Troes.*

1. P. E. T. Deiphobus. F. S. E. T. 8. in Asia.
2. P. E. T. Hector. F. S. E. T. 4. in Indiis.
3. P. E. T. Pammon. F. S. E. T. 13. in Asia.
4. P. E. T. Polydamas. F. S. E. T. 22. in America.
5. P. E. T. Aeneas. F. S. E. T. 23. in India.

\* 2. \* *Equites Achivi.*

6. P. E. A.\* alis dentatis, supra nigris, anticis fasciis duabus argenteis, postica nebulosa, subtus coeruleo-argenteis fasciis duabus, apice margineque postico unitis, fuscis, striae transversae, coeruleo-argenteae versus basin, utrinque ad marginem crassiorem, alis posticis dentatis, dente intermedio, reliquis longiore; supra fascia latiori argentea, maculisque 7 coeruleo-argenteis, lineola transversa interruptis ad marginem posticum; subtus coeruleo-argenteae, in medio maculis tribus transversis aeneis, unaque remota ad marginem internum, fasciisque duabus nigris, prima undata, altera dentata, margineque postico nigro, albo maculato, inter fasciam posticam et marginem maculae coeruleo-argenteae, anticis lineolis nigris interruptae, maculae tres dentatae, nigrae, ad marginem internum versus angulum ani; abdomen subtus luteum.  
*Exoticus.*
7. P. E. A. Leilus. F. S. E. A. 31. in America.
8. P. E. A. Podalirius. F. S. E. A. 38. Eur.
9. P. E. A. Machaon. F. S. E. A. 42. Eur.
10. P. E. A. Demoleus. F. S. E. A. 53. in India.
11. P. E. A. Idomeneus. F. S. E. A. 68. in America.
12. P. E. A. Achilles. F. S. E. A. 54. in America.
13. P. E. A. Menelaus. F. S. E. A. 65. in America.
14. P. E. A. Amphimachus. F. S. E. A. 59. in Indiis.

\* 3. \* *Heliconii.*

15. P. H. Lybia. F. S. P. H. 73. in India.
16. P. H. Melpomene. F. S. P. H. 85. in America.

17. P. H. Mneme. F. Spec. *P. H. 110. in India.*
18. P. H. Antiochus. F. S. *P. H. 92. in India.*
19. P. H. Euterpe. F. S. *P. H. 97. in America.*
20. P. H. Psidii. F. S. *P. H. 83. in India.*
21. P. H. Ricini. Mas et Fem. F. S. *P. H. 81. in America.*
22. P. H. Thalia. F. S. *P. H. 88. in Indiis.*
23. P. H. Clio. F. S. *P. H. 87. in America.*
23. b. P. H. Melite. F. S. *P. H. 71. in Indiis.*
23. c. P. H. Hippodamia. F. S. *P. H. 78. Exotic.*

\* 4. \* *Parnassii.*

24. P. Par. Apollo. F. S. *P. P. 99. Eur.*
25. P. Par. Mnemosine. F. S. *P. P. 100. Eur.*
26. P. Par. \* alis rotundatis, posticis caudatis, fusco-hyalinis, anticis fascia linearis, obsoleta, subtus alba; posticis supra basi coerulescente, stria undata, nigra, terminata ocellis duobus nigris, pupilla alba, adiacente utrinque macula alba, aliisque dispersis circiter 15 albis, coeruleo-insidentibus; subtus fascia dimidia, annexa circulo macularum sex albarum, punctulisque duobus; ocelli duo vividiores, antico maiore. *Exoticus.*
27. P. Par. Rhea. F. S. *P. P. 106. in India.*
28. P. Par. Horta. F. Spec. *P. P. 151. in Africa.*
29. P. Par. Crataegi. F. S. *P. P. 101. Eur.*

\* 5. \* *Danai candidi.*

30. P. D. c. Trite. F. S. *P. D. c. 146. in Africa.*
31. P. D. c. \* alis rotundatis, anticis albis, margine antico apiceque nigro, subtus flavis, margine antico posticoque nigris, in cuius apice arcus 5 macularum flavarum, sensim decrementium; alae posticae supra albae, margine postico nigro, in quo puncta 2-2 alba, subtus dimidio-flavae, postice nigræ, lunulis fulvis 6 ad marginem posticum: *Exoticus.*
32. P. D. c. \* alis rotundatis, anticis albis, margine antico apiceque nigro, apice maculis 4 albis; subtus nigris, basi flavis, apice maculis 4 flavis; alae posticae albae, margine postico nigro, subtus coccineae, nigro venosae, basi flavae, margine postico nigro. Altero sexu: supra fuscae, basi cinereac, anticis apice, maculis 4 albis, subtus omnibus uti in priore. *Exoticus.*
33. P. D. c. Hyparete. F. S. *P. D. c. 156. in India.*
34. P. D. c. \* alis rotundatis, anticis albo-fuliginosis, subtus nigris, apice maculis 4 flavis, posticis albis, margine postico

stico late fuliginoso, subtus flavis, margine postico nigro, maculis tribus flavis. *Exoticus.*

- 35. P. D. c. \* alis rotundatis, utrinque flavis, anticis margine antico, postico latius nigris, intus sinuato; posticis margine postico nigris, subtus omnibus totis flavis. *Exotic.*
- 36. P. D. c. Brassicæ. F. S. *P. D. c. 110. Eur.*
- 37. P. D. c. Rhamni. F. S. *P. D. c. 155. Eur.*
- 38. P. D. c. Daplidice F. S. *P. D. c. 122. Eur.*
- 39. P. D. c. Rapae. F. S. *P. D. c. 111. Eur.*
- 40. P. D. c. Napi. F. S. *P. D. c. 112. Eur.*
- 41. P. D. c. Palaeno. F. S. *P. D. c. 147. Eur.*
- 42. P. D. c. Hyale. F. S. *P. D. c. 148. Eur.*
- 43. P. D. c. Cardamines. F. S. *P. D. c. 126. Eur.*

\* 6. \* *Danai festivi.*

- 45. P. D. f. Midamas. F. S. *P. D. f. 161. in India.*

- 46. P. D. f. \* alis integerrimis, nigris, anticis in medio punctis 8 coeruleis ad marginem posticum, strigaque dupli punctorum alborum, subtus in medio punctis tribus coeruleis, infra macula oblonga, grisea, strigaque gemina punctorum alborum, externa incompleta; alis posticis striga gemina punctorum alborum, ad marginem posticum, punctis interne longioribus, subtus basi punctis minutis 7-8 albis, disco serie arcuata 7 punctorum centro- que unico coeruleo, strigaque simili gemina punctorum alborum ad marginem posticum. *Exoticus.* Sexus alter: alis anticis impunctatis, subtus versus marginem tenuiorem, linea e maculis tribus transversis 4 minoribus, dispersis minoribus albis; alae inferiores similes, maculis disci subtus clarioribus.

- 46. b. P. D. f. \* alis subintegris, fuscis, maculis punctisque viridi-albis, hyalinis, basi radiatis, apice bifidis, posticis angulatis, subtus versus marginem internum squama instructis. *Exoticus.*

- 46. c. P. D. f. \* alis subintegris, fuscis, maculis punctisque albis, hyalinis, basi anticis longis, posticis radiatis, clavatis, marginibus posticis dupli serie punctorum alborum, subtus concolores. *Exoticus.*

- 47. P. D. f. \* alis integerrimis, murinis, anticis subtus fuscis, posticis supra albis, postice late murinis, oculo magno, iride luteo, orbita murina, pupilla alba, basi fascieulo piloso, fulvo, subtus fuscis, disco albo, oculis utrinque duobus maioribus, uno ad marginem anticum, et altero

ad angulum ani versus marginem posticum addito, iride coerulea. *Exoticus.*

48. P. D. f. \* alis integerrimis, fuscis, anticis macula magna coerulecente versus marginem tenuiorem, versus apicem serie 5 macularum albarum, subtus in medio serie arcuata 6 macularum albarum, quinta maxima, duplique serie punctorum ad marginem posticum; alae posticae serie obsoleta pun torum alborum, tribus anticis clarioribus, subtus vasi punctulis, versus discum punctis duobus serieque dupli punctorum alborum, postica incompleta. *Exoticus.*
49. P. D. f. \* alis subcaudatis, integerrimis, basi fulvis, anticis margine antico, praeter basin, posticoque late nigro, maculis duabus fulvis, arcuque 5 punctorum altorum, subtus cinereo griseoque variae, striga transversa, fusca, antice dentata, serieque punctorum, quorum sex ocelli oculati, alis posticis margine postico late nigris, ad angulum ani cauda brevi instructis, subtus striga fusca, et utrinque ocellis duabus nictitantibus. *Exoticus.*
50. P. D. f. Chorinaeus. F. S. *D. f. 182. Surinami.*
51. P. D. f. Xanthus. F. S. *D. f. 177. in Asia.*
52. P. D. f. Antiochus. F. S. *D. f. 164. in China.*
53. P. D. f. Plexippus. F. S. *D. f. 170. in America.*
54. P. D. f. Chrysippus. F. S. *D. f. 172. in India.*
55. P. D. f. \* alis integerrimis, subcaudatis, fulvis, striga communi ferruginea, ab apice priorum ad caudam posteriorum ducta, anticis apice maculaque in medio ad marginem anticum ferruginea, margine interiore parum emarginato, posticis striga undata ad marginem posticum, subtus pallidioribus, striga communi latiore, posticis striga ab utroque margine ad caudam cum communi connecta. *Exoticus.*
56. P. D. f. Hyperanthus. F. S. *D. f. 192. Eur.*
57. P. D. f. Eribotes. F. S. *D. f. 183. in India.*

\* 7. \* *Nymphales Gemmati.*

- . 58. N. G. Iris. F. S. *N. G. 248. Eur.*
- 58 b N. G. \* alis crenatis, anticis supra nigris, maculis 5 subfasciatis, obliquis, albis, in medio alae, duabusque minoribus ad marginem anticum, serie 3 macularum versus marginem posticum, maculae 5 albae lunatae ad marginem, postice 5 contrariae lineares; subtus fuliginosae, basi punctis duobus lineolisque transversis; cetera uti in pagina superiori; alae posticae basi nigrae, postice luteae, serie

serie 7 macularum magnarum, pupillis coeruleis, septima minore, margine postice nigro, lineolis lunatis interstincto, subitus basi fuliginosae, postice pallidae, ordo macularum itidem, at pupillae maiores, septima bipupillata, lunulae 7 pallidae inter marginem nigrum. *Exoticus.* †

59. N. G. \* alis angulatis, fuscis, subitus cinereis, strigis duabus communibus, fuscis, fasciaque lata, cinerea, communi, postice dentata, in qua series ocellorum fundo fuso, priorum 5 intermediis maioribus, posteriorum sex, pupilla alba, iride lutea. *Exoticus.*
60. N. G. Oenone. F. S. *N. G.* 206. in *Asia.*
61. N. G. Laomedia. F. S. *N. G.* 219. in *India.*
62. N. G. Lemonias. F. S. *N. G.* 207. in *India.*
63. N. G. Minerva. F. S. *N. G.* 216. in *America.*
64. N. G. Almana. F. S. *N. G.* 204. in *Asia.*
65. N. G. Proserpina. Esp. Tab. 39. suppl. 15. *Eur.*
66. N. G. Cardui. F. S. *N. G.* 239. *Eur.*
67. N. G. Io. F. S. *N. G.* 203. *Eur.*
68. N. G. Hermione. F. S. *N. G.* 225. *Eur.*
69. N. G. Briseis. F. Spec. *N. G.* 339. *Eur.*
70. N. G. Semele. F. S. *N. G.* 224. *Eur.*
71. N. G. Ianthe maior. Esp. Tab. 26. Suppl. 2. *Eur.*
72. N. G. Ianthe minor. Esp. Tab. 26. Suppl. 2. *Eur.*
73. N. G. Iatrophe. F. S. *N. G.* 218. in *America.*
74. N. G. Galathea. F. S. *N. G.* 230. *Eur.*
75. N. G. Deianira. F. S. *N. G.* 222. *Eur.*
76. N. G. Mæra. F. S. *N. G.* 211. *Eur.*
77. N. G. Megæra. F. S. *N. G.* 213. *Eur.*
78. N. G. Aegeria. F. S. *N. G.* 214. *Eur.*
79. N. G. Ianira. F. S. *N. G.* 235. *Eur.*
80. N. G. Iurtina. F. S. *N. G.* 236. *Eur.*
80. b. N. G. Eudora. F. M. Tom. 2. *N. G.* 435. *Eur.*
81. N. G. Ianiræ aberratio. Esp. Tab. 82. Contin. 32. *Eur.*
82. N. G. Fauna. F. M. Tom. 2. *N. G.* 371. *Eur.*
83. N. G. Ligea. F. S. *N. G.* 229. *Eur.*
84. N. G. Eudora. F. M. Tom. 2. *N. G.* 435. *Eur.*
85. N. G. Phædra. Esp. Tab. 9. F. 1.

\* 8. ♀. Nymp-

† Variat alis antieis supra immaculatis, subitus maculis lunulisque marginalibus, posticis disco late coeruleo, macula septima gemina, absque pupilla, margo posticus totus niger, subitus priori similis; at macula gemina postica absque pupilla.

\* 3. \* *Nymphales Phalerati.*

85. N. P. Dido. F. S. *N. P.* 285. *in America.*  
 87. N. P. Alimena. F. S. *N. P.* 279. *in India.*  
 88. N. P.\* alis dentatis, concoloribus, atris, subtus fuscis, anticis disco, punctulis duobus albis, uno pone alterum, pone discum duo paria macularum albidarum, punctaque 7 ad marginem posticum, subtus basi linea alba, bis interrupta, ad marginem posticum series gemina lunularum albarum; alæ posticæ fascia e maculis 7 albis punctatisque tribus, postice versus marginem anticum, subtus eadem fascia serieque triplici lunularum albarum ad marginem posticum. *Exoticus.*  
 89. N. P.\* alis dentatis, nigris, anticis macula magna, ovata, oblique posita, ad apicem minore alba, pellucida, subtus basi luteae, punctis tribus albis, ad marginem anticum, margo posticus bis lunulatus; alis posticis disco albo, pellucido, lunula rufa, tribusque coeruleis ad angulum ani, subtus basi luteo-fuscis, puncto nigro, in medio fascia lata, alba, lunula nigra, ad marginem anticum dein fascia lutea, punctis ferrugineis, margo posticus coeruleus, striis duabus nigris, undulatis, extrema albo-sinuata. *Exoticus.*  
 90. N. P. Phœnusa. F. S. *N. P.* 280. *in India.*  
 91. N. P. Leucothea. F. S. *N. P.* 272. *in Asia.*  
 92. N. P. Medea. F. S. *N. P.* 273. *in India.*  
 93. N. P. Populi. F. S. *N. P.* 251. *Eur.*  
 94. N. P. Antiopa. F. S. *N. P.* 256. *Eur.*  
 95. N. P. Atalanta. F. S. *N. P.* 258. *Eur.*  
 96. N. P. Polychloros. F. S. *N. P.* 262. *Eur.*  
 97. N. P. C album. F. S. *N. P.* 265. *Eur.*  
 98. N. P. Sibilla. F. S. *N. P.* 294. *Eur.*  
 99. N. P. Lucilla. Esp. Tab. 38. suppl. 14. *Eur.*  
 100. N. P. Urticæ. F. S. *N. P.* 263. *Eur.*  
 101. N. P. Neæra. F. S. *N. P.* 286. *in India.*  
 102. N. P. Prorsa. F. S. *N. P.* 307. *Eur.*  
 103. N. P. Levana. F. S. *N. P.* 306. *Eur.*  
 104. N. P. Ruminæ. F. S. *N. P.* 299. *Eur.*  
 105. N. P. Cynthia. F. M. Tom. 2. *N. P.* 574. *Eur.*  
 106. N. P. Cinxia maior. F. S. *N. P.* 304. *Eur.*  
 107. N. P. Maturna. Esp. Tab. 16. *Eur.*  
 108. N. P. Athalia. Esp. Tab. 47. Suppl. 23. *Eur.*  
 109. N. P. Lucina. F. S. *N. P.* 303. *Eur.*  
 110. N. P. Vanille. F. S. *N. P.* 319. *in America.*

- 111. N.P. Paphia. F.S. *N.P. 303. Eur.*
- 112. N.P. Aglaia. F.S. *N.P. 310. Eur.*
- 113. N.P. Adippe. F.S. *N.P. 313. Eur.*
- 114. N.P. Niobe. F.S. *N.P. 316. Eur.*
- 115. N.P. Chloris. Esp. Tab. 44. Suppl. 20. *Eur.*
- 116. N.P. Lathonia. F.S. *N.P. 314. Eur.*
- 117. N.P. Euphrosyne. F.S. *N.P. 315. Eur.*
- 118. N.P. Dia. F.S. *N.P. 305. Eur.*

\* 9. \* *Plebeii Rurales.*

- 119. P.R. Cupido. F.S. *P.R. 320. in America.*
- 120. P.R. Aeolus. F.S. *P.R. 337. in India.*
- 121. P.R. Marsyas. F.S. *P.R. 327. in America.*
- 122. P.R. \* alis bicaudatis, albis, subtus cum margine fasciis 6 communibus, nigris, posticis utrinque et anticis fascia dimidia fulva, angulo ani ocello triplici, iride flava. ?  
P.R. Celerio. *Exoticus.*
- 123. P.R. \* alis caudatis, coerulescentibus, anticis macula fusa, annulo coeruleo, margineque postico fusco, posticis margine antico, subtus cinerascentibus, lineis tribus transversis, undatis, albis ad marginem posticum, punctoque ani gemino, fulvo, disco nigro. *Exoticus.*
- 124. P.R. Betulae. F.S. *P.R. 330. Eur.*
- 125. P.R. Quercus. F.S. *P.R. 332. Eur.*
- 126. P.R. Pruni. F.S. *P.R. 331. Eur.*
- 127. P.R. Rubi. F.S. *P.R. 339. Eur.*
- 128. P.R. Arion. F.S. *P.R. 345. Eur.*
- 129. P.R. Coridon. Scop. Ent. Carn. p. 179. *Eur.*
- 130. P.R.\* alis dentatis, supra fuscis, disco coeruleo, marginibus albis, anticis disco puncto nigro, posticis lunulis nigris, sinu macula lutea; subtus cinereis anticis, disco lunula albo-marginata, arcuque punctorum ocellatorum lunulisque obsoletis, fuscis ad marginem posticum, posticis basi punctis 4, disco unico arcuque 8 punctorum ocellatorum, septimo bipupillato serieque duplii lunularum fuscarum, obsoletarum, ad angulum ani dentatæ. F.M. Tom. 2. *P.R. 679. Eur.*
- 131. P.R.\* alis ecaudatis, supra fuscis, disco coeruleis, maculis obsoletis, atris, subtus fuso-canis, punctis ocellaribus, disco lunula, area primoribus 5-6, posticis 8, ad basin unice, marginalibus 6 plerumque obsoletis. *Eur.*
- 132. P.R.\* alis ecaudatis, fuscis, disco coerulescentibus, obsolete maculatis, subtus fuso-cinereis, disco lunula arcuque punctorum ocellarium, priorum 5, posticarum 7. *Eur.*

133. P.R. Argus. F. S. *P. R.* 346. *Eur.*  
 134. P.R. Argiolus. F. S. *P. R.* 347. *Eur.*  
 135. P.R. Idas. Scop. Ent. carn. p. 178. *Eur.*  
 136. P.R. Idas. Esp. Tab. 20. Fig. 3.  $\alpha$ . 4.  $\beta$ . *Eur.*  
 137. P.R. Argiolus. Esp. Tab. 21. Fig. 1.  $\alpha$ . *Eur.*  
 138. P.R. Cyllarus. F. M. Tom. 2. *P. R.* 685. *Eur.*  
 139. P.R. Belliargus. F. M. Tom. 2. *P. R.* 694. *Adonis.* *Eur.*  
 140. P.R. Tirefias. Esp. Tab. 34. suppl. 10. *Eur.*  
 141. P.R. Tirefias. F. M. Tom. 2. *P. R.* 666. *Amyntas.* *Eur.*  
 142. P.R. Amphidamas. F. M. Tom. 2. *P. R.* 730. *Hille.* *Eur.*  
 143. P.R. Eurydice. F. M. Tom. 2. *P. R.* 725. *Chryseis.* *Eur.*  
 144. P.R. Virgaureae. F. S. *P. R.* 354. *Eur.*  
 145. P.R. Hippothoe. Lin. S. *P. R.* 254. *Eur.*  
 146. P.R. Thyra. F. S. *P. R.* 356. *in Guinea.*  
 147. P.R. Phleas. F. S. *P. R.* 355. *Eur.*  
 148. P.R. Phocas. F. M. Tom. 2. *P. R.* 731. *Xanthe.* *Eur.*  
 149. P.R. Arcanius. F. S. *P. R.* 369. *Eur.*  
 150. P.R. Tiphon. Esp. Tab. 35. Suppl. 11. *Eur.*  
 151. P.R. Sabaeus. F. S. *P. R.* 371. *Eur.*  
 152. P.R. Pamphilus. Lin. S. *P. R.* 239. *Eur.*

\* 10. \* *Plebeii Urbicolae.*

153. P.U. Actorion. F. S. *P. U.* 386. *in Indiis.*  
 154. P.U.  $\circ$  alis integris atris, prioribus supra fasciis tribus  
     fenestratis albis, maculisque coeruleis, ad angulum posti-  
     cum, posticis basi striis duabus longitudinalibus, pallidis,  
     strigaque transversa 5 punctorum coeruleorum, sinus ex-  
     ternus internusque apicis albi, subtus basi fasciae duas  
     transverse, pallide, antica communi, dein duæ coeruleæ,  
     sinus albido; collare punctis 4 albis, thorax fasciis 4  
     longitudinalibus, internis coeruleis, externis pallidis;  
     abdomen nigro luteoque annulatum, linea dorsali nigra.  
*Exoticus.*  
 155. P.U. Bixæ. F. S. *P. U.* 390. *in America.*  
 156. P.U. Phidias. F. S. *P. U.* 393. *in Asia.*  
 157. P.U. Thrax. F. S. *P. U.* 388. *in India.*  
 158. P.U. Proteus. F. S. *P. U.* 379. *in America.*  
 159. P.U. Steropes. F. M. Tom. 2. *P. U.* 809. *Aracanthus.*  
*Eur.*  
 160. P.U.  $\circ$  alis integris, fuscis, anticis utrinque fascia obli-  
     qua, argentea, punctisque duobus minimis ad marginem  
     anticum, posticis subtus basi fascia striaque lutescente.  
*Exoticus.*

161. P. U. \* alis integris, fuscō-luteis, disco punctis fenestratīs tribus, versus apicem ad marginem anticūm tribus minoribus. *Exoticus.*
162. P. U. Metis. F. Spec. *P. U. 603. Exotic.*
163. P. U. Comma. F. S. *P. U. 374. Eur.*
164. P. U. Thaumas. F. M. Tom. 2. *P. U. 792. Linea. Eur.*
165. P. U. Paniscus. F. S. *P. U. 377. Eur.*
166. P. U. Maluæ. F. S. *P. U. 396. Eur. a. b.*
167. P. U. Tages. F. S. *P. U. 398. Eur.*

## 131. SPHINX.

168. Sph. Ocellata. F. S. *Sph. 1. Eur.*
169. Sph. Lugubris. F. S. *Sph. 2. in America.*
170. Sph. Populi. F. S. *Sph. 3. Eur.*
171. Sph. Tiliae. F. S. *Sph. 4. Eur.*
172. Sph. Oenotheræ. F. Spec. *Sph. 10. Eur.*
173. Sph. Strigilis. F. S. *Sph. 10. in America.*
174. Sph. Atropos. F. S. *Sph. 11. Eur.*
175. Sph. Clotho. F. S. *Sph. 12. Exoticus.*
176. Sph. Convolvuli. F. S. *Sph. 27. Eur.*
177. Sph. Ligustri. F. S. *Sph. 28. Eur.*
178. Sph. Pinastri. F. S. *Sph. 16. Eur.*
179. Sph. Euphorbiae. F. S. *Sph. 17. Eur.*
180. Sph. Lineata. F. S. *Sph. 18. in America.*
181. Sph. Galii. F. Spec. *Sph. 33. Eur.*
182. Sph. Vitis. F. S. *Sph. 19. in America.*
183. Sph.\* alis integris, anticis viridi-griseis, striga transversa, posticis rufis, immaculatis. *Exoticus.*
184. Sph.\* alis integris, anticis virecentibus, basi late griseis, fasciis duabus obsoletis lituraque apicis alba, posticis basi nigris, dein fascia f. lva, apice fuscis, subtus flavescentibus, ferrugineo-pulveratis, striga ferruginea, postice rufo-fulvis. *Exoticus.?* Sph. Pluto. F. Spec. *Sph. 40.*
185. Sph. Tersa. F. S. *Sph. 36. in America.*
186. Sph.\* alis integris, anticis griseis, fascia obliqua, fusca, abrupta ad apicem lineolisque tenuissimis, posticis rufis, margine nigris, subtus anticis disco rufis, puncto nigro, in medio versus marginem posticum fascia fulva, punctis sex nigris, posticis flavescentibus, punctis oculo fuscis, margine postico fuscescente. *Exoticus.*
187. Sph. Elpenor. F. S. *Sph. 25. Eur.*
188. Sph. Porcellus. F. S. *Sph. 26. Eur.*

## 132. SESIA.

189. Se. Stellatarum. F. S. *Se. 3. Eur.*
190. Se. Fuciformis. F. S. *Se. 5. Eur.*
191. Se. Apiformis. F. S. *Se. 6. Eur.*
192. Se. \* alis anticis luteis, macula marginaque postico nigra, posticis hyalinis, venis marginaque interno late posticoque luteis, fimbria nigra, thorace ad basin alarum utrinque macula, plantisque luteis. *Exoticus.*
193. Se. \* alis fenestratis, anticis macula nigra, fascia versus apicem, marginaque interno luteis, fimbria nigra; posticis venis marginibusque luteis, fimbria nigra, abdomine nigro, cingulis tribus flavis, duobusque intermediis linearibus, barba utrinque lutea. *Exoticus.*
194. Se. Spheciformis. Esp. Tom. 2. Tab. 30. Cont. 5. *Eur.*
195. Se. Culiciformis. F. S. *Se. 8. Eur.*
196. Se. Tipuliformis. F. S. *Se. 9. Eur.*

## 133. ZYGAENA.

197. Zy. Filipendulae. F. S. *Z. 1. Eur.*
198. Zy. Phegea. F. S. *Z. 2. Eur.*
199. Zy. Ephialtes. F. S. *Z. 3. Eur.*
200. Zy. Pythia. F. Spec. *Z. 2. Eur.*
201. Zy. Trifolii. Esp. Tom. 2. Tab. 34, Cont. 9. *Eur.*
202. Zy. Cerbera. F. S. *Z. 7. in Aethiopia.*
203. Zy. Caffra. F. S. *Z. 5. Eur.*
204. Zy. \* alis fuscis, basi marginaque antico, antennis pectinatis, dorso abdominalisque dorso cyaneis.
205. Zy. Statices. F. S. *Z. 26. Eur.*

## 134. BOMBYX.

\* *Alis patulis.*

206. Bom. Atlas. F. S. *B. 1. in America.*
207. Bom. Hesperus. F. S. *B. 2. in America.*
208. Bom. Pavonia maior. F. S. *B. 14. b. Eur.*
209. Bom. Cytherea. F. S. *B. 5. Capensis.*
210. Bom. \* alis patulis, griseis, anticis supra in medio fascia lata ferruginea, disco albido, linea fusca pallidaque, alias fusca, undulata versus marginem posticum, apice lunulata, fusca; subtus cervinis ocello nigro, pupilla alba, striga transversa, pone minori fusca, marginaque postico eroso; alis posticis supra griseis, marginae postico cervinis, disco ocello eroco, pupilla alba, iride nigra, pone

pone fasciis duabus fuscis, subtus erosis, disco puncto albo, pone striga undata, fusca. *Exotica.*

210. Bom. Pavonia minor. F. S. B. 14. a. Eur.  
211. Bom. Tau. F. S. B. 15. Eur.

\*\* *Alis reversis.*

212. Bom. Quercifolia. F. S. B. 19. Eur.  
213. Bom. Fagi. F. S. B. 23. Eur.  
214. Bom. Quercus. F. S. B. 24. Eur.  
215. Bom. Pruni. F. S. B. 26. Eur.  
216. Bom. Potatoria. F. S. B. 28. Eur.  
217. Bom. Pini. F. S. B. 32. Eur.  
218. Bom. Rubi. F. S. B. 35. Eur.  
219. Bom. Vericolora. F. S. B. 34. Eur.  
220. Bom. Vinula. F. S. B. 36. Eur.  
220. b. Bom. Trifolii. F. M. Tom. 2. B. 46. Eur.  
221. Bom. Dumeti. F. S. B. 33. Eur.  
222. Bom. Lanestris. F. S. B. 37. Eur.  
223. Bom. Populi. F. S. B. 38. Eur.  
224. Bom. Catax. F. S. B. 39. Eur.  
225. Bom. Processionea. F. S. B. 40. Eur.  
226. Bom. Mori. F. S. B. 41. Eur.  
227. Bom. Neustria. F. S. B. 42. Eur.  
228. Bom. Castrensis. F. S. B. 43. Eur.  
229. Bom. Hieracii. F. S. B. 44. Eur.

\*\*\* *Alis deflexis.*

230. Bom. Cossus. F. S. B. 48. Eur.  
230. b. Bom. Cyane. F. Spec. App. p. 506. in *Amboina.*  
231. Bom. Dispar. F. S. B. 49. Eur.  
232. Bom. Pudibunda. F. S. B. 50. Eur.  
233. Bom. Fascelina. F. S. B. 51. Eur.  
234. Bom. Bucephala. F. S. B. 52. Eur.  
235. Bom. Coeruleocephala. F. S. B. 53. Eur.  
236. Bom. Ziczac. F. S. B. 55. Eur.  
237. Bom. Dromedarius. F. Spec. B. 78. Eur.  
238. Bom. Monacha. F. S. B. 58. Eur.  
239. Bom. Curtula. F. S. B. 61. Eur.  
240. Bom. Anastomosis. F. S. B. 62. Eur.  
240. b. Bomb. \* alis anticis e murino aureis. striga in medio cinerea, versus marginem anticum bifida, triplicique serie punctorum fuscorum versus marginem posticum, alte postice unicolores, subtus linea pallida nigraque marginata. *Exotica.*

241. Bom. Oo. F. S. *B. 63. Eur.*  
 242. Bom. Palpina. F. S. *B. 64. Eur.*  
 243. Bom. Camelina. F. S. *B. 66. Eur.*  
 244. Bom. Trepida. Esp. Tom. 2. Tab. 57. f. 2. 3. *Eur.*  
 245. Bom. Lubricipedea. F. S. *B. 93. Eur.*  
 246. Bom. Sphinx. Esp. Tom. 3. Tab. 49. *Eur.*  
 247. Bom. V nigrum. F. S. *B. 73. Eur.*  
 248. Bom. Chrysorrhea. F. S. *B. 74. Eur.*  
 248. b. Bom. Compressa. F. Spec. *B. 97. Eur.*  
 249. Bom. Salicis. F. S. *B. 75. Eur.*  
 250. Bom. Russula. F. S. *B. 80. Eur.*  
 251. Bom. Leporina. F. Spec. *B. 94. Eur.*  
 252. Bom. Bicolora. Esp. Tom. 3. Tab. 41. *Eur.*  
 253. Bom. Grammica. F. S. *B. 81. Eur.*  
 254. Bom. Purpurea. F. S. *B. 82. Eur.*  
 255. Bom. Plantaginis. F. S. *B. 83. Eur.*  
 256. Bom. Aulica. F. S. *B. 67. Eur.*  
 257. Bom. Villica. F. S. *B. 85. Eur.*  
 258. Bom. Hebe. F. S. *B. 86. Eur.*  
 259. Bom. Caia. F. S. *B. 87. Eur.*  
 260. Bom. Cratægi. F. Spec. *B. 104. Eur.*  
 261. Bom. \* alis anticis griseis, fusco-nebulosis, ad marginem  
     anticum maculis 4 oblongis, nigris, ad posticum 4 subro-  
     tundis, albis, subtus ad marginem anticum macula nigra,  
     utrinque alba, alis posticis cinereis, subtus areu in me-  
     dio fusco. *Eur.*  
 262. Bom. \* alis anticis griseis, basi strigis duabus, disco ver-  
     sus marginem anticum puncto, dein striga flexuosa, apici-  
     busque brevi transversa, fusca, posticis albis. *Eur.*  
 263. Bom. \* alis anticis cinereo-fuscis, basi albis, in medio  
     utrinque striga alba, prima undulata, postica dentata, fa-  
     scia alba pone strigam posticam, cui pone lunula nigra,  
     posticæ albidæ. *Eur.*

\*\*\* *Alis incumbentibus.*

264. Bom. Matronula. F. S. *B. 97. Eur.*  
 265. Bom. Credula. F. S. *B. 94. in America.*  
 266. Bom. Hera. F. S. *B. 92. Eur.*  
 267. Bom. Dominula. F. S. *B. 93. Eur.*  
 268. Bom. Crotalariae. F. S. *B. 90. in India.*  
 268. b. Bom. \* alis superioribus nigris, basi macula lutea, in  
     medio duæ, superiore postice macula albida, hanc sequi-  
     tur furca lutea, maculis duabus albidis repleta, supra  
     crus

crus posticum macula albida, margo posticus maculis 7 pallidis; subtus ferrugineæ, maculis tribus pallidis, versus apicem marginis antici; alæ posticæ ferrugineæ, immaculatæ. *Exotica.*

268. c. Bom. Parthenias. Lin. S. *Noct. 94. Eur.*  
 268. d. Bom. Ancilla. Lin. S. *Noct. 93. Eur.*  
 269. Bom. Furcula. F. S. *B. 96. Eur.*  
 270. Bom. Antiqua, femina. F. S. *B. 98. Eur.*  
 271. Bom. Gonostigma, femina. F. S. *B. 99. Eur.*  
 271 b. Bom. Rosea. F. S. *B. 109. Eur.*  
 271 c. Bom. Cribrum. F. S. *B. 112. Eur.*  
 272. Bom. Rubricollis. F. S. *B. 110. Eur.*  
 273. Bom. Iacobææ. F. S. *B. 113. Eur.*  
 274. Bom. Luctifera. Esp. Tom. 3. Tab. 43. *Eur.*  
 275. Bom. Fuliginosa. F. S. *B. 111. Eur.*  
 275. b. Bom. Limacodes. Esp. Tom. 3. Tab. 26. *Eur.*

### 135. HEPIALUS.

276. He. Humuli. F. S. *H. 1. Eur.*  
 277. He. Sylvina. Esp. Tom. 4. Phal. Tab. 82. *Noct. 3. Eur.*  
 278. He. \* spirilinguis, antennis brevibus, serratis, alis cineo-rufescens, antice fasciis striisque albidis. *Eur.*  
 279. He. Hectus. F. S. *H. 3. Eur.*  
 280. He. Flina. Esp. Tom. 4. Phal. Tab. 8. *Noct. 3. Fig. 6. Eur.*

### 136. NOCTUA.

\*\* *Thorace laevi, alis planis incumbentibus.*

281. Noc. Quadra. F. S. *N. 19. Eur.*  
 282. Noc. Deplana. F. S. *N. 20. Eur.*  
 283. Noc. \* spirilinguis, laevis, alis depresso-superioribus canescentibus marginibus, antico posticoque flavis, inferioribus subcinereis. *Eur.*  
 284. Noc. Complana. F. S. *N. 8. Eur.*

\*\*\* *Thorace laevi, alis deflexis.*

285. Noc. Batis. F. S. *N. 28. Eur.*  
 285. b. Noc. \* capitæ fronte antennisque rufis, alis anticis supra viridibus, striis duabus obliquis, pallidis, subtus viridi-albis, alis posticis abdomineque albis. *Eur.*  
 285. c. Noc. \* viridis, alis anticis striis tribus ferrugineis, ab domine subtus albido. *Exotica.*

285. d. Noc. <sup>\*</sup>viridis, alis anticis striis tribus obliquis, albis, subtus alisque inferioribus albis. *Eur.*  
 286. Noc. *Glyphica*. F. S. N. 31. *Eur.*  
 287. Noc. *Dipsacea*. F. S. N. 32. *Eur.*  
 288. Noc. *Mi.* F. S. N. 33. *Eur.*  
 289. Noc. *Geometrica*. F. S. N. 37. *in India.*

\*\*\*\* *Thorace cristato, alis incumbentibus.*

290. Noc. *Fraxini*. F. S. N. 54. *Eur.*  
 290. b. Noc. *Materna*. Lin. S. N. 117. *in Indiis.*  
 291. Noc. *Nupta*. F. S. N. 52. *Eur.*  
 291. b. Noc. <sup>\*</sup>magna, fusca, stigmatibus ordinariis, nigro-marginalatis, strigis omnibus lunulatis 4-5 nigris, subtus griseis, anticis basi macula rotunda, oblique in disco lunata, striis tribus obsoletis, fusca, undatis, margine postico, striis lunatis; alis posticis disco macula nigra, fascia fusca, margineque postico late fusco, antice interrupto griseo. *Exotica.*  
 292. Noc. *Sponsa*. F. S. N. 51. *Eur.*  
 293. Noc. *Maura*. F. S. N. 61. *Eur.*  
 294. Noc. *Paranympha*. F. S. N. 56. *Eur.*  
 295. Noc. *Fimbria*. F. S. N. 57. *Eur.*  
 296. Noc. *Pronuba*. F. S. N. 55. *Eur.* <sup>†</sup>  
 297. Noc. <sup>\*</sup>alis incumbentibus, griseis, luteo-brunneis, inferioribus pallide flavis, disco macula transversa fasciaque submarginali nigra. *Eur.*  
 298. Noc. *Libatrix*. F. S. N. 62. *Eur.*  
 299. Noc. *Plecta*. F. S. N. 63. *Eur.*  
 300. Noc. *Augur*. F. S. N. 58. *Eur.*  
 301. Noc. *Exclamationis*. F. S. N. 65. *Eur.*  
 302. Noc. *L album*. F. S. N. 66. *Eur.*  
 302. b. Noc. *Brassicæ*. F. Spec. N. 85. *Eur.*  
 303. c. Noc. *Derasa*. F. S. N. 80. *Eur.*

\*\*\*\*\* *Thorace cristato, alis deflexis.*

303. Noc. *Chrysitis*. F. S. N. 69. *Eur.*  
 304. Noc. *Gamma*. F. S. N. 72. *Eur.*  
 305. Noc. *Interrogationis*. F. S. N. 73. *Eur.*  
 306. Noc. *Meticulosa*. F. S. N. 78. *Eur.*  
 307. Noc. *Absinthii*. F. S. N. 86. *Eur.*  
 308. Noc. *Pisi*. F. S. N. 88. *Eur.*

309.

<sup>†</sup> Alae inferiores luteae.

309. Noc. Oxyacanthæ. F. S. N. 90. Eur.  
 310. Noc. Atriplicis. F. S. N. 91. Eur.  
 311. Noc. Pyramidea. F. S. N. 95. Eur.  
 312. Noc. Oleracea. F. S. N. 97. Eur.  
 313. Noc. Leucomelas. F. S. N. 98. Eur.  
 314. Noc. Aprilina. F. S. N. 100. Eur.  
 314. b. Noc. Virens. Lin. S. N. 139. Eur.  
 315. Noc. Lichenis. F. S. N. 102. Eur.  
 316. Noc. Algae. F. S. N. 103. Eur.  
 317. Noc. Psi. F. S. N. 104. Eur.  
 318. Noc. Persicariæ. F. S. N. 106. Eur.  
 319. Noc. Flavicornis. F. S. N. 113. Eur.  
 320. Noc. Triplacia. F. S. N. 114. Eur.  
 321. Noc. Exoleta. F. S. N. 116. Eur.  
 322. Noc. Verbasci. F. S. N. 117. Eur.  
 323. Noc. Umbratica. F. S. N. 118. Eur.  
 324. Noc. Putris. F. S. N. 119. Eur.  
 325. Noc. Delphinii. F. S. N. 87. Eur.  
 326. Noc. Ruminis. F. Sp. N. 143. Eur.  
 327. Noc. Aceris. Lin. S. N. 137. Eur.  
 328. Noc. Ornithopos. Esper.  
 329. Noc. Argentea. F. Spec. Append. Eur.  
 330. Noc. \* thorace cristato, albo-variegato, alis anticis fuscis, in medio fascia transversa alba, extus dentata, stigmata renali, adiacente albo-marginato, strigaque undulata, alba ad marginem posticum, postice fuscæ, subtus arcu fuscæ. Eur.  
 331. Noc. \* alis albis, anticis supra flavis, puncto maculisque tribus ferrugineis, punctisque 5 minoribus versus marginem posticum, abdomine albo. Eur.  
 332. Noc. \* lutea, immaculata, alis posticis albis. Eur.  
 333. Noc. \* albida, alis anticis, fasciis duabus obsoletis, ferrugineis, posticis ferrugineo-variis. Eur.  
 334. Noc. \* pallida, alis anticis strigis 4 obliquis, luteis, subtus alisque posticis albidis. Eur.  
 335. Noc. \* alis anticis fuscis, disco macula alba, fasciaque ad marginem posticum cinerea, in medio utrinque dentata. Eur.  
 336. Noc. \* alis anticis e viridi fuscoque variis, stigmatibus obliquis, contrariis, infra unitis, lutescentibus, strigaque dentata, albida ad marginem posticum. Eur.  
 337. Noc. \* alis superioribus croceo, luteo persicoque pulchre variegatis maculatisque, stigmate ovato lacteo, re-

- nali luteo, albo-marginato, subtus stria communi, dentata, marginibus posticis late miniatis. *Eur.*
338. Noc. \* fusca, alis anticis stigmatibus, margine interno albo-marginatis, strigaque versus marginem posticum in medio bidentata. *Eur.*
339. Noc. Turca. F.S. N. 108. *Eur.*
340. Noc. \* alis deflexis, canescensibus, fusco-variegatis, stigmatibus tribus, duobus canis ordinariis, tertio fusco, lineola ad angulum posticum, strigaque dentata, fusca, versus marginem posticum. *Eur.*
341. Noc. \* alis anticis griseo, viridi, albo fuscoque variegatis striisque undulatis, stigmate postico magno, albido, punctisque tribus albis, utrinque associato nigro, apiceque lineola nigra, extus alba. *Eur.*
342. Noc. \* alis griseis, fusco-nebulosis, stigmate reniformi, utrinque macula fusca, striisque duabus griseis, contrariis. *Eur.*
343. Noc. \* alis anticis fusco-cinereis, basi lineola nigra, adiacente tenuiori alba, stigmate renali subferrugineo, subtus lineola nigra, marginata. *Eur.*
344. Noc. \* alis anticis ferrugineo-griseis, basi apiceque macula, stigmate ovato, utrinque macula nigra inclusa. *Eur.*
345. Noc. \* alis deflexis, cinereis, fusco-variegatis, lineis duabus undulatis, cinereis, annuloque pupilla fusca, inferioribus albis. *Eur.*
346. Noc. \* alis anticis fuscis, stigmatibus obsoletis, renali postice albo, marginato, strigaque ad marginem posticum undata, pallida. *Eur.*
347. Noc. \* alis anticis luteo-fuscis, loco stigmati renalis lineola flexuosa, grisea. *Eur.*
348. Noc. \* alis anticis griseis, fusco-variegatis, stigmatibus ordinariis, albo-lineatis, fasciaque grisea, postice dentata. *Eur.*
349. Noc. Tripterygia. Esp. Tom. 4. Tab. 107. N. 28. *Eur.*
350. Noc. \* alis deflexis, griseo viridique variis, basi in medio lineola nigra, strigaque postice dentata. *Eur.*
351. Noc. \* alis deflexis, superioribus in medio fascia lata, nigra, infra oblique truncata, adiacente fascia lutea, ad marginem anticum latiore. *Eur.*
352. Noc. \* alis anticis fusco-pallidis, striis obsoletis, disco versus marginem anticum, puncto lineolaque apicis nigra. *Eur.*
353. Noc. \* grisea, alis anticis disco stigmate albo, punctis duabus nigris, utrinque strigis nigris, lineola apicis nigra. *Eur.*

354. Noc. \* fuscō griseoque varia, alis anticis griseis, striga marginis postici dentata, lineolaque ad marginem tenuiorem grisea, interne nigra. *Eur.*
355. Noc. \* alis anticis fuscō-cinereis, stigmate in medio obliquo, extus bidentato, fasciaque cinerea dentata ad marginem posticum. *Eur.*
356. Noc. \* alis anticis griseo-fuscis, stigmate reniformi, postice albo. *Eur.*
357. Noc. \* alis anticis cinereis, fuscō-nebulosis, stigmatibus obsoletis, utrinque stria lunulata, fusca, contraria, margineque antieo punctato. *Eur.*
358. Noc. \* alis omnibus fuscis, anticis stigmatibus tribus nigris, utrinque striga dupli, aliaque dupli marginis postici fusca. *Eur.*
359. Noc. \* alis anticis griseis, fuscō-variegatis, stigmatibus ordinariis, obsoletis, fasciaque marginis postici grisea, inferioribus albis. *Eur.*
360. Noc. Circumflexa. Lin. S. N. 128. *Eur.*
361. Noc. \* alis anticis fuscis, maculis duabus oblongis, nigris, utrinque ad stigma renale obsoletum, lineolisque duabus parallelis, nigris, versus marginem posticum directis. *Eur.*
362. Noc. \* alis anticis griseis, fuscō-nebulosis, stigmatibus ordinariis, maculaque fusca, inferioribus albis. *Eur.*
363. Noc. \* alis anticis griseis, stigmate renali fuscō, posticis albis. *Eur.*
364. Noc. \* alis anticis griseo-fuscō variis, posticis albis. *Eur.*
365. Noc. \* alis anticis griseis, stigmatibus fasciaque marginis postici obsoletis. *Eur.*
366. Noc. \* alis anticis luteo-fuscis, immaculatis, posticis aliis albidis, aliis lutescentibus. *Eur.*
367. Noc. \* alis anticis griseis, fuscō-variegatis, macula magna albida, ad angulum ani. *Eur.*
368. Noc. \* alis anticis griseis, ferrugineo-nebulosis, in medio fascia ferruginea, utrinque striga fusca, postice striga grisea, appositis maculis tribus ferrugineis. *Eur.*
369. Noc. \* alis anticis murinis, basi et in medio ad marginem anticum cinereis, striisque undulatis. *Eur.*
370. Noc. \* alis anticis griseis, fuscō-nebulosis, disco lunula punctisque 4 fuscis ad marginem ant. cum. *Eur.*
371. Noc. \* alis anticis lutescentibus, disco puncto obsoleto, fuscō, striisque duabus ferrugineis, obsoletis. *Eur.*
372. Noc. \* alis anticis cinereis, pone discum fasem fusca, striisque tribus undulatis versus marginem p. st. cum. *Eur.*

373. Noc. \* alis anticis cervinis, in medio versus marginem posticum puncto gemino, et in utroque angulo minori nigro. *Eur.*
374. Noc. \* alis anticis cinereis, fusco undulatis, versus marginem posticum serie 8 macularum lutearum. *Eur.*
375. Noc. \* alis anticis luteo-rufescensibus, disco puncto albo, utrinque striga ferruginea. *Eur.*
376. Noc. \* alis anticis griseis, fusco-nebulosis, disco arcu nigro, punctoque fusco inter stigmata. *Eur.*
377. Noc. \* alis anticis griseis, atomis fuscis repletis, versus marginem posticum striga, et ad marginem serie punctorum minutissimorum. *Eur.*
378. Noc. Trapetzina. F. S. N. 99. *Eur.*
379. Noc. Pallens. F. S. N. 107. *Eur.*
379. b. Noc. \* alis anticis virescentibus, posticis albidis. *Eur.*
379. c. Noc. \* alis fuscis, anticis fascia alba, antice bifida. *Eur.*
379. d. Noc. \* alis fuscis, luteo translucentibus, maculis strigaque, subtus albis, maculis duabus piceis, posticis albis, disco fasciaque marginali fusca, subtus disco macula, striga annulisque duobus marginalibus. *Eur.*
380. Noc. \* alis anticis luteo-ferrugineis, strigis obsoletis, margine antico lineolis tribus arcuatis, albis. *Eur.*
381. Noc. \* alis anticis fuscis, basi maculaque pone medium ad marginem anticum albis, posticis fuscis, in medio fascia alba. Variat posticis albis, ad limbum fascia fusca. *Eur.*
382. Noc. \* alis anticis griseis, disco puncto albo, in medio ad marginem internum, macula nigra, utrinque lutea, linea alba, tecta, maculaque albida ad angulum ani. *Eur.*
383. Noc. Retusa. Lin. S. N. 193. *Eur.*
384. Noc. \* alis griseo luteoque variegatis, punctis dispersis, ad marginem posticum serie punctorum minimorum nigrorum. *Eur.*
385. Noc. \* alis anticis fuscis, fascia flexuosa, alba ad marginem posticum. *Eur.*
385. b. Noc. Arbuti. F. S. N. 122. *Eur.*

## 137. PHALAE NA.

386. Ph. Laetaria. F. S. *Ph. 1. Eur.*
386. b. Ph. Punctaria. F. S. *Ph. 6. Eur.*
387. Ph. Amataria. F. S. *Ph. 7. Eur.*
388. Ph. Falcataria. F. S. *Ph. 8. Eur.*

389. Ph. Lacertinaria. F. S. *Ph. 11. Eur.*
390. Ph. Alniaria. F. S. *Ph. 12. Eur.*
391. Ph. Syringaria. F. S. *Ph. 13. Eur.*
392. Ph. Lunaria. F. S. *Ph. 14. Eur.*
393. Ph. Dolabraria. F. S. *Ph. 17. Eur.*
394. Ph. \* alis angulatis, flavis, ferrugineo transverse lineolatis, basi striga, disco puncto marginaque postico late fusco-cinereis. *Eur.*
395. Ph. Strigaria. F. Spec. *Ph. 12. in India.*
396. Ph. Sambucaria. F. S. *Ph. 10. Eur.*
397. Ph. Atomaria. F. S. *Ph. 26. Eur.*
398. Ph. Pennaria. Lin. S. *Geom. 209. Eur.*
399. Ph. Papilionaria. F. S. *Ph. 20. Eur.*
400. Ph. Prunaria. F. S. *Ph. 21. Eur.*
401. Ph. \* alis fuscis, anticis fascia lutea, lunula fusca, posticis subdentatis, disco luteo. *Eur.*
402. Ph. \* alis anticis albis, atomis nigris, in medio ad marginem anticum puncto nigro, fasciis duabus brunneis, interno nigro-marginatis, antennis albo-annulatis. *Eur.*
403. Ph. \* alis cinereis, anticis strigis 4 fuscis, fascia inter 3 et 4 fusca. *Eur.*
404. Ph. \* alis albidis, basi striga undulata, disco lunula pone lunulam, strigis duabus griseo-repletis. *Eur.*
405. Ph. \* alis albidis, disco puncto nigro, basi luteo, fasciaque versus marginem posticum lutea. *Eur.*
406. Ph. \* alis anticis griseis, luteo-variegatis, posticis albidis, strigis duabus obsoletis. *Eur.*
407. Ph. \* alis anticis griseis, fusco-variegatis, disco lineola, basi striga arcuata et pone lineolam, striga sinuata, fusca, posticis in medio ad marginem tenuiore striga dimidia aliaque obsoleta, ad angulum ani, lunulisquè marginalibus fuscis. *Eur.*
408. Ph. \* alis cinereis, fasciis tribus griseis, obsoletis, secunda interne nigro-marginata. *Eur.*
409. Ph. \* alis griseis, fascia lata grisea, luteo marginata, puncto nigro. *Eur.*
410. Ph. Praefinaria. F. S. *Ph. 33. Eur.*
411. Ph. \* alis cinereis, strigis duabus linearibus, undatis, ferrugineis. *Eur.*
412. Ph. Turcaria. F. S. *Ph. 22. Eur.*
413. Ph. Piniaria. F. S. *Ph. 23. Eur.*
414. Ph. Pusaria. F. S. *Ph. 27. Eur.*

415. Ph. \* alis griseis, fuliginoso-nebulosis, pone medium striga dentata, fusca, pone strigam pallidioribus. *Eur.*
416. Ph. \* alis luteis, ferrugineo-pulverulentis, strigis duabus ferrugineis. *Eur.*
417. Ph. \* alis luteis, immaculatis. *Eur.*
418. Ph. \* alis fuscis, striga tenui, lunulaque alba ad marginem posticum. *Eur.*
419. Ph. Annularia. F. S. *Ph. 29.* *Eur.*
420. Ph. Wavaria. F. S. *Ph. 32.* *Eur.*
421. Ph. \* alis griseis, disco annulo fusco, basi et pone annulum striga punctata, fusca. *Eur.*
422. Ph. Purpuraria. F. S. *Ph. 45.* *Eur.*
423. Ph. \* alis anticis albis, margine antico flavescentibus, fasciis macularibus, nigris, tertia dimidiata, posticis flavis, nigro-maculatis. *Eur.*
424. Ph. \* alis semitectis, anticis strigis tribus fuscis. Femina aptera. *Eur.*
425. Ph. \* alis anticis pallescentibus, striga terminali versus marginem posticum, posticis albidis. *Eur.*
426. Ph. \* alis albidis, strigis duabus lutescentibus, subtus disco, omnibus puncto. *Eur.*
427. Ph. \* alis pallidis, immaculatis. *Eur.*
428. Ph. \* alis albis, immaculatis. *Eur.*
429. Ph. \* alis griseis, luteo-variegatis, anticis fascia lata, nigra, externe albo-marginata, dente armata. *Eur.*
430. Ph. Dubitata. Lin. S. *Geom. 235.* *Eur.*

*et Antennis setaceis.*

431. Ph. \* alis anticis pallide-luteis, fusco-pulveratis, dentatis, strigis duabus punctoque fusco, posticis albidis, puncto strigaque fusca. *Eur.*
432. Ph. \* alis rufo-pallidis, anticis versus marginem posticum, striga albida. *Eur.*
433. Ph. Grossulariata. F. S. *Ph. 58.* *Eur.*
434. Ph. \* alis cinereis, anticis fasciis 5 strigosis, singula striis tribus, 2 et 3 ad marginem anticum solidis, 4 linea ferruginea apicis tecta. *Eur.*
435. Ph. \* pallida, subtus anticis versus apicem virescentibus. *Eur.*
- 435.b. Ph. \* alis luteis, fusco transverse striatis, striis plerumque paribus, anticis fascia lata, obliqua, in apicem desinens fusca, aliae posticæ dentatae. *Eur.*
436. Ph. \* alis albis, anticis fasciis 4 nigris, prima stria alba, interrupta, secunda interrupta, albo-punctata, tertia in-

terru-

terrupta, lineolis albis variegata, alis posticis versus basin stria, quam sequitur fascia mediocris, fasciaque lata marginis postici, litura alba, lineolaque ad angulum ani interrupta. *Eur.*

437. Ph. Dealbata. F. S. *Ph. 63. Eur.*  
 438. Ph.\* alis anticis cinereis, fasciis duabus nebulosis, posticis albis. *Eur.*  
 439. Ph. Falcata. F. Spec. *Ph. 68. Eur.*  
 440. Ph.\* alis griseis, anticis fascia latissima, postice dentata, fusca, apiceque lineola. *Eur.*  
 441. Ph.\* alis albidis, anticis fuscis, fascia striata, alba, versus basin, margine postico fusco-albidis, interne dentato-sinuatis, linea alba terminantibus lunulisque albis, posticis postice lineolis duabus albis, undatis, fundo fuscescente. *Eur.*  
 442. Ph.\* alis anticis pallidis, fascia lata, fulva, postice lobata, postice linea nigra, marginata, disco lineola tenui, apiceque linea arcuata, lutescente, posticæ albidæ. *Eur.*  
 443. Ph. Cratagata. F. S. *Ph. 63. Eur.*  
 444. Ph. Undulata. F. S. *Ph. 59. Eur.*  
 445. Ph.\* alis griseis, fusco-pulverulentis, anticis strigis 4 disco lunula, posticis tribus obscuris, fuscis. *Eur.*  
 446. Ph.\* alis albis, anticis basi fuscis, margine postico fascia fusca, in medio fere deleta, posticarum margo fuscescens. *Eur.*  
 447. Ph.\* alis anticis cinereis, fasciis tribus obsoletis, albidis, posticis albis. *Eur.*  
 448. Ph.\* alis rufo-griseis, anticis fascia, posticis striga rufescente, subtus albidis. *Eur.*  
 449. Ph.\* alis anticis lutescentibus, basi fasciaque fusca, posticis margine postico late lutescentibus. *Eur.*  
 450. Ph. Fasciata. F. S. *Ph. 47. in Indiis.*  
 451. Ph.\* alis anticis lutescentibus, apice triangulo albido, margine postico, macula ferruginea apposita. *Eur.*  
 452. Ph.\* alis anticis griseis, strigis tribus luteis, posticis albis, striga obsoleta. *Eur.*  
 453. Ph.\* alis cinereis, anticis strigis 4 fuscis, posticis obsoletis. *Eur.*  
 454. Ph.\* alis griseis, anticis disco puncto, antice striga, postice duabus, extrema obsoleta, lineolam apicis describente. *Eur.*  
 455. Ph.\* alis griseo-fuscescentibus, anticis strigis duabus ferrugineis. *Eur.*

456. Ph. \* alis anticis cinereis, versus basin striga ferruginea, versus marginem posticum albida. *Eur.*
457. Ph. \* alis rufo-pallidis, anticis fascia lata, postice sinuata, fulva, posticis ad marginem tenuiorem, striga dimiata, fulva. *Eur.*
458. Ph. \* alis pallidis, immaculatis, subtus primoribus strigis duabus obsoletis. *Eur.*
459. Ph. \* alis anticis griseo-viridi variis, versus basin fascia arcuata, alba, versus marginem posticum, flexuosa, obsoleta, antice posticeque macula alba terminata, aliis fasciæ obsoletæ. *Eur.*
460. Ph. \* alis albidis, anticis luteo-pulverulentis, apice macula magna, subquadrata, albida. *Eur.*
461. Ph. Notata. F. S. *Ph. 55.* *Eur.*
462. Ph. Emarginata. F. S. *Ph. 57.* *Eur.*
463. Ph. \* alis cinereis, anticis fascia lata, fusca, postice dentata. *Eur.*
464. Ph. \* alis albidis, anticis virescente adspersis, strigis duabus fuscis. *Eur.*
465. Ph. \* alis albis, immaculatis. *Eur.*
466. Ph. \* alis griseis, anticis versus basin striga gemina, disco lunula alba, fuscocmarginata, margine postico late fuscocstrigoso. *Eur.*
467. Ph. \* alis griseis, basi fuscis, nigro-marginatis, versus marginem posticum fascia sinuata, fuscoc luteoque varia. *Eur.*
468. Ph. \* alis fulvo-pulverulentis, disco lineola strigaque communi rufescente. *Eur.*
469. Ph. \* alis griseis, atomis fuscis, anticis fascia fusca. *Eur.*
470. Ph. \* fuscescens, alis obsolete luteo-strigosis, margine postico pallidiore. *Eur.*
471. Ph. \* alis anticis griseis, fascia lata, cinerea, disco puncto, posticis albidis. *Eur.*
472. Ph. \* alis anticis albidis, fascia lata, obsoleta, fulvescente, postice lobata. *Eur.*
473. Ph. \* alis albidis, anticis maculis tribus ad marginem anticum striga connexa, 2 et 3 ad marginem tenuiorem macula terminata, lineolaque apicis fusca. *Eur.*
474. Ph. \* alis albis, basi nigris, postice fascia subarcuata, fusca, postice nebulosa, punctata. *Eur.*
475. Ph. \* alis anticis griseis, strigis 4 ferrugineis *Eur.*
476. Ph. \* alis anticis albidis, basi nigris, fascia lata dimidiata nigra, albo-marginata, maculaque apicis nigra, posticis

- ecis fuscescensibus, strigis duabus albidis, undatis, ad marginem posticum. *Eur.*
477. Ph. Triflata. F. S. *Ph. 71. Eur.*
478. Ph. Clathrata. F. S. *Ph. 72. Eur.*
479. Ph. Chærophyllata. F. S. *Ph. 73. Eur.*
480. Ph. Maculata. F. S. *Ph. 88. Eur.*
481. Ph. \* alis cinereo-variegatis, margine antico lineolis & fuscis. *Eur.*
482. Ph. \* alis griseis, strigis tribus obsoletis, pallidis. *Eur.*
483. Ph. \* alis albis, anticis basi fusco-luteis, in medio fascia, versus marginem tenuiorem coarctata, striga fusca albaque undulata versus marginem posticum, interne luteo diffusa. *Eur.*
484. Ph. \* grisea, strigis duabus albidis. *Eur.*
485. Ph. \* grisea, strigis tribus obsolete fuscis, intermedia latiore. *Eur.*
486. Ph. \* grisea, strigis tribus æqualibus, fuscescensibus. *Eur.*
487. Ph. \* alis pallescentibus, striga albescente. *Eur.*
488. Ph. \* alis griseis, atomis nigris, disco annulo nigro, pone et ad marginem posticum arcu punctorum nigrorum. *Eur.*
489. Ph. \* alis flavis, immaculatis. *Eur.*
490. Ph. \* alis fusco-griseis, fascia alba. *Eur.*
491. Ph. \* alis albis, versus marginem posticum lutescentibus. *Eur.*
492. Ph. \* alis griseis, fascia lata, cinerea. *Eur.*
493. Ph. \* alis fuscis, strigis tribus latis, albescentibus. *Eur.*
494. Ph. \* alis cinereis, immaculatis. *Eur.*
495. Ph. \* alis nigris, albo-substriatis. *Eur.*
496. Ph. \* alis pallescentibus, strigis duabus fuscis. *Eur.*
- 496.b. Ph. Prunata. F. S. *Ph. 64. Eur.*
497. Ph. Bilineata. F. S. *Ph. 75. Eur.*
498. Ph. Bimaculata. F. S. *Ph. 76. Eur.*
499. Ph. Ocellata. F. S. *Ph. 78. Eur.*
500. Ph. Marginata. F. S. *Ph. 66. Eur.*
501. Ph. \* alis nigris, versus basin strigis tribus fasciaque alba, margine postico albo-punctato. *Eur.*
502. Ph. \* alis albis, fascia obsoleta, interrupta, lutescente, versus marginem posticum, anticis versus apicem puncto marginali, posticis disco nigro. *Eur.*
503. Ph. \* alis albidis, anticis basi fasciaque nigra, postice angusta, strigisque apicis tribus dimidiatis, coerulecentibus. *Eur.*

504. Ph. \* alis albidis, anticis strigis lutescentibus, undulatis, punctoque gemino, fusco ad marginem posticum. *Eur.*
505. Ph. \* alis griseis, basi fasciaque fuscescente, posticis striga. *Eur.*
506. Ph. \* alis albidis, basi lutescente, fascia tenui, fusca, strigisque tribus flexuosis, margine postico lutescente. *Eur.*
507. Ph. \* alis fuscis, anticis albo-variis, fascia dimidiata, alba, ad angulum ani, stigmata fusco, subocellato. *Eur.*
508. Ph. \* alis anticis fuscis, fascia strigaque albida, posticis albis. *Eur.*
509. Ph. \* alis griseis, luteo alboque striatis. *Eur.*
510. Ph. \* alis albis, anticis strigis 4 nigris, postica gemina ad marginem posticum ramosa. *Eur.*
511. Ph. \* alis pallescentibus, strigis tribus obsoletis. *Eur.*
512. Ph. \* alis albidis, basi, in medio et pone, macula subrenali. *Eur.*
513. Ph. \* alis angulatis, pallidis. *Eur.*
514. Ph. \* alis nigris, basi versusque marginem posticum fascia alba. *Eur.*
515. Ph. \* alis pallescentibus, strigis duabus, margineque postico fuscescente. *Eur.*
516. Ph. \* alis albis, anticis striga, fasciisque duabus fulvis, obsoletis versus marginem posticum. *Eur.*
517. Ph. \* alis albidis, fasciis 5 fusco-fulvis, passim confluentibus. *Eur.*
518. Ph. \* alis fuscis, fascia nebulosa, alba. *Eur.*
519. Ph. \* alis albidis, strigis atomisque nigris. *Eur.*
520. Ph. \* alis luteo-griseis, venis nigro alboque variis. *Eur.*
521. Ph. \* alis albis, basi maculaque in medio ad costam nigra. *Eur.*
522. Ph. \* alis flavis, strigis obsoletis. *Eur.*
523. Ph. \* alis albis, punctis nigris, sparsis. *Eur.*
524. Ph. \* alis albidis, margine antico ferruginescente. *Eur.*
525. Ph. \* alis albis, puncto atomisque versus margines fuscis. *Eur.*
526. Ph. \* alis fusco griseoque variis. *Eur.*
527. Ph. \* alis flavis, rufo-pulverulentis, fasciaque terminali. *Eur.*
528. Ph. \* alis albis, anticis maculis duabus fuscis. *Eur.*
529. Ph. \* alis griseis, strigis duabus fuscis. *Eur.*
530. Ph. \* alis hyalinis, disco antico macula, marginibus antico posticisque lutescentibus. *Eur.*
531. Ph. \* alis anticis lutescentibus, disco macula strigaque postica lutea. *Eur.*

532. Ph. Urticata. F. S. *Ph. 101. Eur.*  
 533. Ph. \* alis anticis pallescentibus, disco macula marginē  
anticō, striga obliqua versus apicem lutea. *Eur.*  
 534. Ph. \* alis anticis pallescentibus, disco macula, marginē  
anticō strigaque arcuata, pallida. *Eur.*  
 535. Ph. Nymphæata. F. S. *Ph. 105. Eur.*  
 536. Ph. Hyalinata. F. S. *Ph. 103. in America.*  
 537. Ph. Potamogata. F. S. *Ph. 104. Eur.*  
 538. Ph. Limbata. F. S. *Ph. 102. Eur.*  
 539. Ph. Lemnata. F. S. *Ph. 106. Eur.*  
 540. Ph. \* alis hyalinis, marginē antico lineolaque luteis.  
*Eur.*  
 541. Ph. \* alis pallescentibus, anticis versus apicem striga obli-  
qua, ferruginea. *Eur.*

\*\*\* *Alis forficatis.*

542. Ph. Proboscidalis. F. S. *Ph. 116. Eur.*  
 543. Ph. \* alis cinereis, anticis strigis duabus ferrugineis,  
punctoque nigro. *Eur.*  
 544. Ph. \* alis cinereis, anticis strigis tribus ferrugineis. *Eur.*  
 545. Ph. Verticalis. F. S. *Ph. 121. Eur.*  
 546. Ph. Pinguinalis. F. S. *Ph. 124. Eur.*  
 547. Ph. \* alis griseis, atomis fuscis. *Eur.*  
 548. Ph. Sulphuralis. Lin. S. *Pyral. 333. Eur.*  
 549. Ph. \* alis pallidis. *Eur.*  
 550. Ph. \* alis griseis, disco lineola, punctisque 4 nigris, apice  
lineola marginaque postico nigro, punctato. *Eur.*  
 551. Ph. \* alis anticis ferrugineo-cinereis, striga obliqua, po-  
sticis cinereis. *Eur.*  
 552. Ph. \* alis anticis griseo-fuscis, maculis duabus fuscis. *Eur.*  
 553. Ph. Tentacularis. F. S. *Ph. 115. Eur.*  
 554. Ph. Barbalis. F. S. *Ph. 114. Eur.*  
 555. Ph. \* alis griseis, disco macula, marginaque antico pun-  
ctis duobus, postico fuscescente, fusco punctato. *Eur.*  
 556. Ph. \* alis fuscis, anticis apice macula, posticis fascia sub-  
marginali, pallida. *Eur.*  
 557. Ph. \* alis fusco-rufescentibus, substriatis, subtus griseis,  
striis duabus. *Eur.*  
 558. Ph. \* alis fusco-pallidis, margine postico pallido, subtus  
pallidis, maculis duabus, strigaque gemina, fusca. *Eur.*  
 559. Ph. \* alis fusco-fulvescentibus, posticis fasciis duabus  
pallidis. *Eur.*  
 560. Ph. Purpuralis. F. S. *Ph. 131. Eur.*

561. Ph. Atralis. F. S. *Ph.* 133. *Eur.*  
 562. Ph. Reticularis. Lin. S. *Pyral.* 341. *Eur.*  
 563. Ph. \* alis flavis, anticis strigis tribus, posticis duabus  
       fuscis. *Eur.*

## 138. PYRALIS.

564. Py. Mundana F. S. *Py.* 2. *Eur.*  
 565. Py. Uncana. F. S. *Py.* 7. *Eur.*  
 566. Py. Decussana. F. S. *Py.* 10. *Eur.*  
 567. Py. Ameriana. F. S. *Py.* 11. *Eur.*  
 568. Py. Rosana. F. S. *Py.* 9. *Eur.*  
 569. Py. Ministrana. F. S. *Py.* 15. *Eur.*  
 570. Py. Cruciana. F. S. *Py.* 19. *Eur.*  
 571. Py. Arcuana. F. S. *Py.* 22. *Eur.*  
 572. Py. Lecheana. F. S. *Py.* 23. *Eur.*  
 573. Py. Brunnichana. F. S. *Py.* 21. *Eur.*  
 574. Py. Operana. F. S. *Py.* 33. *Eur.*  
 575. Py. Modeeriana. F. S. *Py.* 29. *Eur.*  
 576. Py. Bergmanniana. F. S. *Py.* 43. *Eur.*  
 577. Py. Conwagana. F. S. *Py.* 46. *Eur.*  
 578. Py. Seabrana. F. Spec. *Py.* 54. *Eur.*  
 579. Py. Cynosbana. F. S. *Py.* 54. *Eur.*  
 580. Py. Resinella. F. S. *Py.* 55. *Eur.*  
 581. Py. \* alis luteo-fuscis, fasciis duabus obliquis, argenteis,  
       intus dentatis, strigaque versus marginem posticum, fascia  
       ad basin, dentibus duobus, altera unico. *Eur.*  
 582. Py.\* alis anticis fuscis, a basi ad discum, et ab hac ad  
       apicem versus marginem anticum albis, fusco-maculatis,  
       fascia longitudinali ad marginem tenuiorem, fascia ad  
       marginem posticum, maculis 4 fuscis interrupta. *Eur.*  
 583. Py. \* alis pallidis, anticis disco macula fusca, margine  
       antico apice posticoque ferruginescitibus. *Eur.*  
 584. Py. \* alis anticis testaceis, fasciis duabus obliquis, fuscis,  
       basi ad marginem tenuorem, macula arcuata, apicisque  
       fusca. *Eur.*  
 585. Py. \* alis anticis luteo-cinereis, basi puncto, versus api-  
       cem fascia lata, fusca, irregulari, uncum versus angulum  
       ani dirigente. *Eur.*  
 586. Py. \* alis anticis luteis s. testaceis, fascia obliqua, a disco  
       versus marginem anticum, postice ramum porrigente,  
       apice ad marginem posticum, maculaque triangulari,  
       ferruginea, stria lutea, interrupta. *Eur.*

587. Py. \* alis anticis argenteis, basi macula renali fasciisque duabus obliquis, maculaque apicis ferrugineis, inter fascias macula nigra. *Eur.*
588. Py. \* alis anticis cinereis, fascia obliqua, strigaque marginali, fuscescente. *Eur.*
589. Py. Gnomana. F. S. *Py. 32. Eur.*
590. Py. \* alis anticis luteo-griseis, fascia transversa, strigaque ad marginem posticum fusca. *Eur.*
591. Py. \* alis testaceis, fascia lata, fusca, subinterrupta. *Eur.*
592. Py. \* alis anticis cinereis, fascia transversa, strigaque obliqua, fusca. *Eur.*
593. Py. \* alis anticis fuscis, postice oblique albis, apice fuscis, punctisque duobus nigris ad marginem posticum. *Eur.*
594. Py. \* alis anticis fuscō-fulvo-variegatis, strigis duabus tribusque transversis, cinereis. *Eur.*

## 139. TINEA.

595. Ti. Evonymella. F. S. *T. 4. Eur.*
596. Ti. Padella. F. S. *T. 5. Eur.*
597. Ti. Pusiella. F. S. *T. 6. Eur.*
598. Ti. Lutarella. F. S. *T. 10. Eur.*
599. Ti. Oxyacanthella. F. S. *T. 12. Eur.*
600. Ti. Pratella. F. S. *T. 14. Eur.*
601. Ti. Mesomella. F. S. *T. 11. Eur.*
602. Ti. Pascuella. F. S. *T. 15. Eur.*
603. Ti. Culmella. F. S. *T. 16. Eur.*
604. Ti. Carnella. F. S. *T. 18. Eur.*
605. Ti. Cucullatella. F. S. *T. 29. Eur.*
606. Ti. Leucatella. F. S. *T. 37. Eur.*
607. Ti. Bractella. F. S. *T. 41. Eur.*
608. Ti. Calthella. F. S. *T. 47. Eur.*
609. Ti. Frischella. F. S. *T. 48. Eur.*
610. Ti. Raiella. F. S. *T. 62. Eur.*
611. Ti. \* alis anticis albis, argenteis, apice lutescentibus *Eur.*
612. Ti. Clerkella. F. S. *T. 66. Eur.*
613. Ti. \* alis anticis argenteis, basi fasciaque obliqua lutea. *Eur.*
614. Ti. \* alis argenteis, fasciis tribus aureis. *Eur.*
615. Ti. \* alis albis, basi fascia obliqua, apiceque fulvo-aureis. *Eur.*

616. Ti. \* alis anticis luteis, albo-nebulosis, margine interno vitta alba, interrupta. *Eur.*
617. Ti. \* alis anticis argenteis, deauratis. *Eur.*
618. Ti. \* alis fusco-auratis, fascia transversa, communi, argentea, a disco ad discum extensa. *Eur.*
619. Ti. \* alis anticis cinereis, fascia communi, dorsali, alba, utrinque tridentata. *Eur.*
620. Ti. \* alis nigris, anticis in utroque margine maculis quatuor, interne totidem minoribus, margineque postico minimis, lacteis, alx posticæ nigræ. *Eur.*
621. Ti. \* alis cinereis, anticis macula marginali, fusca. *Eur.*
622. Ti. \* alis griseis, disco maculis tribus clavatis, pone punctis tribus oblique positis. *Eur.*
623. Ti. \* alis anticis albo-pallescensibus, apice macula ferruginea, areu albo tecta, posticis albis, fasciis duabus fuscenscentibus ad angulum ani. *Eur.*
624. Ti. \* alis albis, argenteis. *Eur.*
625. Ti. \* alis griseis, margine utroque argenteis. *Eur.*
626. Ti. \* alis griseis, punctis elevatis, fuscis, atomisque lucescentibus. *Eur.*
627. Ti. \* alis anticis pallescentibus, vitta intermedia, argentea, macula apicis fimbriaque. *Eur.*
628. Ti. \* alis anticis fusco-rufo-cinereoque confluentibus, fascia obliqua, albida. *Eur.*
629. Ti. \* alis anticis auratis, postice sensim ascendentibus, dorso, basi maculaque marginali flavis. *Eur.*
630. Ti. \* alis anticis albis, sulcatis, sulcis pallidis, margine postico punctis quatuor nigris. *Eur.*
631. Ti. \* alis anticis albis, marginie antico pallescente, postico nigro-punctato, fimbria argentea. *Eur.*
632. Ti. \* alis versus marginem anticum posticumque auro-coeruleo-alboque variis, nigro-punctatis, versus marginem internam albis, basi discoque puncto nigro, thorace albo, punctis quatuor nigris. *Eur.*

## 140. ALUCIDA.

633. Al. Swammerdaminella. F. S. A. 13. *Eur.*
634. Al. Robertella. F. S. A. 14. *Eur.*
635. Al. De Geerella. F. S. A. 15. *Eur.*
636. Al. \* antennis longissimis, fusco auratis. *Eur.*
637. Al. \* antennis mediocribus, alis anticis flavis, atomis ferrugineis, versus basin striga, pone punctum, disco duobus ferrugineis, macula marginali, in medio flava. *Eur.*

638. Al. \* antennis mediocribus, alis anticis aureis, fascia transversa, purpurea. *Eur.*

### 141. PTEROPHORUS.

639. Pt. Didaëtulus. F. S. *Pt. 2. Eur.*  
 640. Pt. Tridaëtulus. F. S. *Pt. 3. Eur.*  
 641. Pt. Tessaradaëtulus. F. S. *Pt. 4. Eur.*  
 642. Pt. Pentadaëtulus. F. S. *Pt. 6. Eur.*  
 643. Pt. Hexadaëtulus. F. S. *Pt. 7. Eur.*
- 

## CLASSIS VII.

### R Y N G O T A.

---

### 142. FULGORA.

1. Ful. Laternaria. F. S. *Ful. 1. in America.*
2. Ful. Candelaria. F. S. *Ful. 3. in China.*
3. Ful. Europæa. F. S. *Ful. 11. Eur.*

### 143. MEMBRACIS.

4. Mem. Foliata. F. S. *M. 2. in India.*
5. Mem. Aurita. F. S. *M. 6. Eur.*
6. Mem. Cornuta. F. S. *M. 8. Eur.*
7. Mem. 2-punctata. F. S. *M. 11. in nova Hollandia.*

### 144. TETTIGONIA.

8. Tet. Atrata. F. S. *T. 14. in China.*
9. Tet. Tibicen. F. S. *T. 5. in America.*
10. Tet. Hæmatodes. F. S. *T. 11. Eur.*
11. Tet. Stridula. F. S. *T. 8. in Capite B. Sp.*
12. Tet. Septendecim. F. S. *T. 6. in America.*

### 145. CICADA.

13. Ci. Perspicillata. F. Spec. Tom. 2. *C. 1. in India.*
14. Ci. Lanata. F. S. *C. 9. in India.*
15. Ci. Rubra. Lin. S. *C. 45. in America.*
16. Ci. Viridis. F. S. *C. 21. Eur.*

17. Ci. Nervosa. F. S. C. 28. Eur.
18. Ci. Cynosbatis. F. S. C. 26. Eur.
19. Ci. Leucocephala. F. S. C. 18. Eur.
20. Ci.\* nigra, thorace utrinque gutta sanguinea. Eur.
21. Ci. Variegata. F. S. C. 29. Eur.
22. Ci. Rosea. F. S. C. 33. Eur.
23. Ci. Cuspidata. F. S. C. 35. Eur.
24. Ci. Punctata. F. S. C. 32. Eur.
25. Ci.\* testacea, elytris ferrugineo-variis, rivulis transversis, albis. Eur.
26. Ci.\* thorace rufescente, strigis numerosissimis, transversis, scutello rufescente, elytris fusco, rufo cinereoque variis, ano setoso, pedibus posticis longis, tibiis spinis ciliatis. Eur.
27. Ci.\* elytris griseis, nervis elevatis, punctis elevatis, rugosis, thorace depresso, striis 4 longitudinalibus, elevatis, antennae latæ, pediformes, apice articulo minore, non setoso; pedes antici lati, fuscæ, tibie apice griseæ. Eur.
28. Ci.\* fusco-pallida, immaculata. Eur.
29. Ci.\* lutea, elytris ad scutelli margines albis. Eur.
30. Ci.\* flava, fronte punctis duobus fuscis, elytris albis, luteo-venosis. Eur.
31. Ci.\* lutea, fronte flava, punctis duobus minimis, nigris. Eur.
32. Ci.\* flava, elytris albis, luteo-venosis. Eur.
33. Ci.\* fusca, elytris albidis, fusco-venosis, lineolis albis, interruptis. Eur.
34. Ci.\* flava, virescens. Eur.
35. Ci.\* flava, elytris albis, flavo-venosis. Eur.
36. Ci.\* elytris albis, margine interno posticoque nigro, dorso interrupto. Eur.
37. Ci.\* elytris aquosis, albo-venosis. Eur.
38. Ci.\* pallida, alis lacteis. Eur.
39. Ci.\* flava, alis albis, abdominis dorso nigro. Eur.
40. Ci.\* fusca, elytris albidis, fusco-maculatis. Eur.
41. Ci. Vittata. F. S. C. 13. Eur.
42. Ci.\* aptera, pallida. Eur.
- 42.b. Ci. Lateralis. F. S. C. 14. Eur.
- 42.c. Ci. Flava. Lin. S. C. 34. Eur.

#### 146. CERCOPIS.

43. Cer. Sanguinolenta. F. S. C. 2. Eur.
44. Cer. Spumaria. F. S. C. 5. Eur.

45. Cer. Rustica. F. S. C. 6. *Eur.*  
 46. Cer. \* elytris griseis, lineolis fuscis, disco litura transversa. *Eur.*  
 47. Cer. \* fusca, elytris maculis lacteis. *Eur.*  
 48. Cer. \* pallida, immaculata. *Eur.*  
 49. Cer. \* grisea, thorace dorso sanguineo. *Eur.*  
 50. Cer. \* fusca, thorace antice punctis impressis, elytris maculis duabus albis, lateralibus. *Eur.*  
 51. Cer. \* elytris albis, fusco-striatis, striis interruptis. *Eur.*  
 52. Cer. \* alis aquofis, albo-venosis, postice fasciis duabus fuscis, irregularibus. *Eur.*  
 53. Cer. \* alis albis, luteo-nebulosis. *Eur.*  
 54. Cer. Bifasciata. F. S. C. 8. *Eur.*

## 147. NOTONECTA.

55. No. Glauca. F. S. N. 1. *Eur.*  
 56. No. Minutissima. F. S. N. 4. *Eur.*

## 148. SIGARA.

57. Si. \* elytris fuscis, lineolis transversis undatis, flavis. *Gigas* in hoc genere. *Eur.*  
 58. Si. Striata. F. S. S. 1. *Eur.*

## 149. NEPA.

59. Ne. Cinerea. F. S. N. 4. *Eur.*  
 60. Ne. Linearis. F. S. N. 6. *Eur.*

## 150. NAUCORIS.

61. Nau. Cimicoides. F. S. N. 1. *Eur.*  
 62. Nau. \* elytris futura integra, eiusdem magnitudinis. *Eur.*

## 151. ACANTHIA.

63. Ac. Leptularia. F. S. A. 1. *Eur.*  
 64. Ac. Littoralis. F. S. A. 4. *Eur.*  
 65. Ac. Corticalis. F. S. A. 7. *Eur.*  
 66. Ac. Erosa. F. Spec. Tom. 2. A. 14. *in America.*  
 66. b. Ac. \* membranacea, nigra, thorace conico, apice truncato, ferrugineo, marginato, elytris abdomine dimidio brevioribus, margine externo ferrugineis, abdomine plano, nigro, utrinque lobis sex ferrugineis, supra albo maculato, subtus utrinque sex paribus guttarum alba-

rum, elevatarum, lobis ferrugineis, pedibus nigris. *Exotica.*

66.c. Ac. Rugosa. F. S. A. 5. Eur.

### 152. CIMEX.

\* *Scutellati*, scutello longitudine abdominis.

- 67. Ci. Nobilis. F. S. C. 2. in *Asia*. In duplo.
- 68. Ci. Lineatus. F. S. C. 9. Eur.
- 69. Ci. Maurus. F. S. C. 13. Eur. †
- 70. Ci. \* Mauro quadruplo minor. Eur.
- 71. Ci. Scarabæoides. F. S. C. 16. Eur.

\*\* *Spinosi*, thorace spina utrinque armato.

- 72. Ci. Bidens. F. S. C. 23. Eur.
- 73. Ci. Rufipes. F. S. C. 24. Eur.
- 74. Ci. Nigricornis. F. S. C. 26. Eur.
- 75. Ci. Hæmorrhoidalis. F. S. C. 36. Eur.
- 76. Ci. Marginatus. F. S. C. 50. Eur.
- 77. Ci. Quadratus. F. S. C. 51. Eur.
- 78. Ci. Phyllopus. F. S. C. 56. in *America*.
- 78. b Ci. \* ovatus, griseus, thorace obtuse spinoso, elytris fuscopunctatis, membrana maculis lentiginosis adspersa, antennis fuscis, articulis 2, 3, 4 basi lividis. Eur.
- 78. c Ci. \* ovatus, fuscus, thorace, elytris rufo-griseis, antennis albo-annulatis, femoribus nigris, basi albis, tibiis albis, apice plantisque nigris. Eur.
- 78. d Ci. \* nigro-xneus, immaculatus. Eur.
- 79. Ci. \* thorace obtuse spinoso, utrinque dentato, clypeo bifido, coeruleo-virescente, spinarum apices coeruleo-virescentes, articulus antennarum 4 postice dimidio albus. Eur.
- 80. Ci. \* thorace acute spinoso, capite spinis apice, scutello in medio, elytris utrinque ad basin scutelli, membranarum marginibus externis nigris. Eur.
- 81. Ci. \* thorace obtuse spinoso, elytris margine interno postice sanguineis, abdome pallido, ano sanguineo, bidentato. Eur.
- 82. Ci. \* thorace obtuse dentato, elytris griseis, punctatis, interdum rufescens, ano bilobato. Eur.

83.

† Variat supra rufus.

83. Ci. \* oblonga, thorace obtuse spinoso, supra ferrugineo, subtus luteo, antennis ferrugineis. *Eur.*
84. Ci. \* thorace hispido, obtuse spinoso, antennis hispidis, coccineis, ultimo articulo nigro. *Eur.*
85. Ci. \* griseus, thorace spinoso, spinis antice nigris, antennarum articulis 2, 3 nigris. *Eur.*
86. Ci. \* thorace obtuse spinoso, antice punctis duobus impressis, abdome subtus utrinque nigro-punctato, ad anum gutta nigra. *Eur.*

\*\*\* *Ovati, thorace mutico.*

87. Ci. Nigripes. F. S. C. 64. *in India.*
88. Ci. \* ovatus, rufo-flavus, alis basi rufo-flavis, postice fusco-violaceis, abdomine subtus pallido, apice quadridentato. *Exoticus.*
89. Ci. \* rotundatus, ater, scutelli abdominisque marginibus rubris, thorace rubro, antice linea atra, elytris rubris, membranis fuscis, alis luteis, apice fuscis; caput pedesque nigri. *Exoticus.*
90. Ci. Praefinus. F. S. C. 67. *Eur.*
91. Ci. \* subrotundus, virescens, margine undique flavo, antennis rufis. *Eur.*
92. Ci. Juniperinus. F. S. C. 68. *Eur.*
93. Ci. \* subrotundus, albidus, antennis nigris, geniculis albis, elytris livido-rufo-variis, scutello apice albo. *Eur.*
94. Ci. Festivus. F. S. C. 87. *Eur.*
95. Ci. Morio. F. S. C. 96. *Eur.*
96. Ci. Acuminatus. F. S. C. 100. *Eur.*
97. Ci. \* ovalis, capite acuminato, lineis 4 longitudinalibus, nigris, antennis nigris, thorace pallido, nigro-punctato, scutello nigro-punctato, elytris pallidis, versus futuram rufis, rugis transversis, undatis, nigris, membrana venis fuscis. *Exoticus.*
98. Ci. \* ovatus, pallidus, nigro-punctatus, thoracis, scutelli apice elytrorumque marginibus externis albidis. *Eur.*
99. Ci. Coeruleus. F. S. C. 95. *Eur.*
100. Ci. Bicolor. F. S. C. 91. *Eur.*
101. Ci. Oleraceus. F. S. C. 92. *Eur.*
102. Ci. Biguttatus. F. S. C. 94. *Eur.*
103. Ci. \* niger, immaculatus. *Eur.*
104. Ci. \* ovatus, niger, thorace elytrorumque margine exteriori albo. *Eur.* †

105. Ci. \* óvatus, niger, capite, thorace, elytris pedibusque ferrugineis, capite, thorace elytrisque ciliatis. *Eur.*  
 106. Ci. \* ovatus, griseus, membrana elytrorum extus excisa, abdomine nigro. *Eur.*

\*\*\*\* *Oblongi.*

107. Ci. Equestris. F. S. C. 104. *Eur.*  
 108. Ci. Hyoscyami. F. S. C. 105. *Eur.*  
 109. Ci. Apterus. F. S. C. 121. *Eur.*  
 110. Ci. Carnifex. F. S. C. 120. *Eur.*  
 111. Ci. Pini. F. S. C. 124. *Eur.*  
 112. Ci. Rolandri. F. S. C. 126. *Eur.*  
 113. Ci. \* oblongus, ater, immaculatus. *Eur.*  
 114. Ci. \* oblongus, niger, thorace postice, elytris antice griseis, pedibus fuscō-annulatis. *Eur.*  
 115. Ci. \* oblongus, niger, elytris griseis, ad membranam nigro-maculatis, femoribus anticis crassissimis, tibiis rufescientibus. *Eur.*  
 116. Ci. \* oblongus, niger, elytris fuscis, margine externo striis, postico punctis griseis, femoribus anticis crassissimis, dente armatis. *Eur.*  
 117. Ci. \* oblongus, niger, femoribus anticis crassis, dente armatis, elytris basi griseis, membrana basi gutta lactea. *Eur.*  
 118. Ci. \* pallidus, coleoptris fenestratis, nervis pallide rufis. *Eur.*  
 119. Ci. \* oblongus, pallide rufus, elytris fenestratis, apice rufis, scutello rufo, apice pallido, antennis clavatis, clava rufa. *Eur.*  
 120. Ci. Urtice. F. S. C. 129. *Eur.*  
 120. b. Ci. \* ovatus, niger, elytris griseis, punctatis, apice maculis tribus fuscis, membrana alba, truneata, pedibus pallide rufis, antennis pallidis, clavatis, clava nigra. *Eur.*  
 121. Ci. \* oblongus, fuscus, elytris griseis, apice fuscis, femoribus nigris, basi griseis. *Eur.*  
 122. Ci. \* oblongus, niger, elytris griseo-fuscis, membrana basi maculaque apicis alba. *Eur.*  
 123. Ci. \* oblongus, fuscus, elytris maculis albis, disco fuscis, membrana alba, venis fuscis, maculis duabus fuscis, pedibus pallidis. *Eur.*  
 124. Ci. \* oblongus, niger, elytris brunneis, membrana venis albis. *Eur.*

125. Ci. \* oblongus, niger, elytris fusco-luteis, puncto albo, membrana utrinque gutta alba, pedibus luteis. *Eur.*
126. Ci. \* oblongus, fuscus, elytris rufescentibus, apice fratre, femoribus rufescentibus, tibiis albis, setoso-spinosis. *Eur.*
127. Ci. \* oblongus, rufescens, elytris pallidis, apice rufescentibus, pedibus pallidis. *Eur.*
128. Ci. \* oblongus, fuscus, ano luteo, elytris luteo-pellucidis, disco puncto gemino, apiceque solitario, fuso. *Eur.*
129. Ci. \* oblongus, rufescens, antennis compressis, latis, rufis. *Eur.*
130. Ci. \* oblongus, flavus, capite thoraceque rufescentibus, antennis clavatis. *Eur.*
131. Ci. \* oblongus, griseus, thorace lineis 4 longitudinalibus, elevatis. *Eur.*
132. Ci. \* oblongus, capite thoraceque fuscis, elytris griseis, apice fuscis. *Eur.*

\*\*\*\*\* *Oblongi, antennis apice capillaribus.*

133. Ci. Trifasciatus. F. S. C. 144. *Eur.* †
134. Ci. Striatus. Scop. Ent. carn. n. 387. *Eur.*
135. Ci. Seticornis. F. S. C. 145. *Eur.*
136. Ci. Capillaris. F. S. C. 146. *Eur.*
137. Ci. \* flavescens, femoribus fusco-punctatis. *Eur.*
138. Ci. \* flavescens, thorace maculis 4 fuscis. *Eur.*
139. Ci. \* oblongus, niger, capite, thorace, elytris rufescentibus, thorace postice fuso, scutello flavescente, elytrorum apice inflexo, coccineo. *Eur.*
140. Ci. \* oblongus, rufescens, thorace scutelloque flavo. *Eur.*
141. Ci. \* oblongus, niger, capite flavo, linea longitudinali nigra, elytris fusco-rufis, apiceque inflexo coccineis. *Eur.*
142. Ci. \* oblongus, niger, elytris pallidis, apice inflexo, coccineo. *Eur.*
143. Ci. \* oblongus, fuscus, capite thoraceque rufo, antennis scutelloque flavis, pedibus pallidis, femoribus posticis longis, fusco variis, annulo pallido. *Eur.*

† Variat 1. elytris totis rufis,

2. elytris totis nigris, tibiis omnibus annulatis.

144. Ci. \* oblongus, capite thoraceque fusco, tomento fulvo, abdomine rufo, elytris fusco-pallidis, apice inflexo, flavo, apice nigro. *Eur.*
145. Ci. \* oblongus, niger, scutello postice, elytris apice inflexo, flavis. *Eur.*
146. Ci. \* oblongus, niger, elytris flavo-fuscis, apice inflexo, flavo, venis duabus rubris. *Eur.*
147. Ci. \* oblongus, angustus, niger, antennis basi rubris, thorace postice scutelloque flavo, elytris rufis, fascia obliqua a basi, apiceque inflexo, albo. *Eur.*
148. Ci. \* oblongus, niger, elytris flavis, fascia transversa, fusa, apiceque fusco. *Eur.*
149. Ci. \* oblongus, niger, antennis basi, clytris basi, apice inflexo, pedibus flavis. *Eur.*
150. Ci. \* oblongus, niger, thorace postice, elytris tibiisque pallidis, elytris apice inflexo, rufo, marginato. *Eur.*
151. Ci. \* oblongus, fuscus, capite, thorace elytrisque rufescens, antennis pedibusque pallidis. *Eur.*
152. Ci. \* oblongus, flavus, oculis fuscis. *Eur.*
153. Ci. \* oblongus, supra rufescens, capite linea dorsali, thorace tribus, elytris in medio et margine externo albis, apice inflexo, flavo, abdomine subtus utrinque linea alba. *Eur.*
154. Ci. \* fuscus, ventre pallido, capite pallido, thorace subconico, lineolis tribus fuscis, elytris pallidis, fusco-subnubilosis. *Eur.*
155. Ci. \* ovatus, pallide flavus. *Eur.*
156. Ci. \* ovatus, flavescens, capite utrinque, scutello basi, elytris apice inflexo fuscis. *Eur.*
157. Ci. \* oblongus, fuscus, elytris apice inflexo flavis. *Eur.*
158. Ci. \* ovatus, pallidus, rufo-adspersus. *Eur.*
159. Ci. \* ovatus, pallidus, rufescens, scutello flavo. *Eur.*
160. Ci. \* ovatus, niger, elytris griseis, apice, membranarum apicibus albis. *Eur.*
161. Ci. \* niger, elytris margine externo, basi apiceque inflexo flavis. *Eur.*
162. Ci. \* ovatus, pallidus, membrana elytrorum alba. *Eur.*
163. Ci. \* oblongus, antennis thoracis margine, scutelli apice pedibusque flavis, abdomine flavo, apice nigro. *Eur.*
164. Ci. \* oblongus, niger, antennis basi rufis, thorace antice posticeque scutelloque flavo; elytris rufis, vitta alba apiceque inflexo, albo. *Eur.*
165. Ci. Pratensis. F. S. C. 137. *Eur.*

166. Ci. \* ovatus, rufescens, abdomine subtus in medio atro. *Eur.*
167. Ci. \* ovatus, niger, thorace rufo, pedibus rufis, fuscovariis. *Eur.*
168. Ci. \* ovatus, flavus, elytris versus apicem rufescens. *Eur.*
169. Ci. \* ovatus, niger, capite, elytrorum apice rufis, elytris rufo-fuscis. *Eur.*
170. Ci. \* ovatus, flavo-rufus, thorace antice maculis duabus nigris, elytris pallidis, apice inflexo fuscis. *Eur.*
171. Ci. \* ovatus, totus niger. *Eur.*
172. Ci. \* ovatus, pallidus, elytrorum apice inflexo, singulo angulo puncto fusco. *Eur.*
173. Ci. \* ovatus, supra pallidus, subtus flavus. *Eur.*
174. Ci. \* ovatus, niger, capite pallido, elytris pallidis, margine externo, versus apicem, cum apice inflexo fuscens. *Eur.*
175. Ci. \* ovatus, fuscus, capite, thorace antice flavis, elytris nigris, basi, in medio ad marginem anticum, apiceque inflexo flavis. *Eur.*
176. Ci. \* oblongus, fuscus, antennis, elytris pedibusque albidis. *Eur.*
177. Ci. \* oblongus, ater, thorace, elytris pedibusque flavescentibus. *Eur.*
178. Ci. \* ovatus, niger, capite, thoracis dorso, elytris fascia in medio, apiceque inflexo albis. *Eur.*
179. Ci. \* ovatus, capite pallido, thorace pallido, antice nigro, elytris pallidis, atomis apice apiceque inflexo fuscis, abdomine rufescente. *Eur.*
180. Ci. \* ovatus, niger, thorace elytrisque pallidis, femoribus nigro-punctatis. *Eur.*
181. Ci. \* ovatus, niger, elytris albis, fuscoc-nebulosis, pedibus rufescens. *Eur.*
182. Ci. \* oblongus, fuscus, antennis, thorace, elytris pedibusque albidis. *Eur.*
183. Ci. \* ovatus, rufescens, elytris albis, rufo-adspersis. *Eur.*
184. Ci. \* oblongus, pallidus, thorace, elytris abdomineque virescentibus. *Eur.*
185. Ci. \* ovatus, pallidus, alis albis. *Eur.*
186. Ci. \* ovatus, rufescens, antennis, elytris pedibusque albidis. *Eur.*
187. Ci. \* ovatus, brunneus, alis albis. *Eur.*
188. Ci. \* ovatus, niger, capite, elytris, margine externo pedibusque flavis. *Eur.*

\*\*\*\*\* *Antennis setaceis.*

189. Ci. \* pallidus, corpore linearis, elytris abdomine  $\frac{1}{3}$  brevioribus. *Eur.*
190. Ci. Populi. F. S. C. 154. *Eur.*
191. Ci. \* oblongus, flavescens, abdomine lutescente. *Eur.*
192. Ci. \* oblongus, pallidus, thorace utrinque linea fuscata, elytris virescentibus, abdomine lutescente. *Eur.*
193. Ci. Lævigatus. F. S. C. 148. *Eur.*
194. Ci. \* oblongus, virescens, capite antennisque rufescentibus. *Eur.*
195. Ci. \* oblongus, pallidus, thorace lineis tribus fuscis, abdomine nigro, margine dilatato, rubro, aliis flavo, subtus fusco, in medio pallido. *Eur.*
196. Ci. \* oblongus, rufescens. *Eur.*
197. Ci. \* oblongus, niger, thoracis lateribus, elytris pedibusque albidis. *Eur.*
198. Ci. \* oblongus, niger, pedibus pallidis, squamis albis loco elytrorum. *Eur.*

\*\*\*\*\* *Lineares, corpore angusto.*

199. Ci. Lacustris. F. S. C. 159. *Eur.*
200. Ci. Stagnorum. F. S. C. 160. *Eur.*
201. Ci. \* linearis, fuscus, elytris griseo fuscoque variegatis, antennis pedibusque griseo fuscoque alternatim annulatis, pedibus linearibus. *Eur.*

## 153. REDUVIUS.

202. Re. \* niger, abdominis apice, membranis duabus ovatis, rufis. *Exoticus.*
203. Re. \* niger, abdomine rufo, basi nigro, elytris nigris, in medio ad marginem anticum puncto coccineo, femoribus apice tibiisque rufis. *Exoticus.*
204. Re. Personatus. F. S. R. 2. *Eur.*
205. Re. Annulatus. F. Sp. Tom. 2. R. 5. *Eur.*
206. Re. Iracundus. F. S. R. 8. *Eur.*
207. Re. \* griseus, abdomine dorso nigro, margine elevato, rufo fuscoque variegato, elytris griseis, abdomine diuidio brevioribus. *Eur.*
208. Re. \* niger, elytris abbreviatis, abdominis margine elevato, maculis 5 albis, inverse conicis, pedibus griseis, fusco-annulatis. *Eur.*

209. Re.\* apterus, niger, elytris minoribus, coleoptratis, rubris, uti in Staphylinis, pedibus rubris, femoribus 4 anticis compressis. *Eur.*

#### 154. PULEX.

210. Pu. Irritans. F. S. *P. 1. Eur.*

#### 155. APHIS.

211. Aph. Lychnidis. F. S. *A. 1. Eur.*  
 212. Aph. Tiliæ. F. S. *A. 27. Eur.*  
 213. Aph. Aparines. F. S. *A. 8. Eur.*

#### 156. CHERMES.

214. Ch. Graminis. F. S. *Ch. 1. Eur.*  
 215. Ch. Ulmi. F. S. *Ch. 2. Eur.*

#### 157. COCCUS.

216. Coc. Hesperidum. F. S. *C. 1. Eur.*  
 217. Coc. Polonicus. F. S. *C. 15. Eur.*

#### 158. THRIIPS.

218. Th. Physapus. F. S. *Th. 1. Eur.*

## CLASSIS VIII.

## A N T L I A T A.

## 159. OESTRUS.

1. Oe. Bovis. F. S. *Oe. 1. Eur.*

2. Oe. Ovis. F. S. *Oe. 5. Eur.*

## 160. TIPULA.

\* *Alis patentibus.*

3. Ti. Sinuata. F. S. *T. 3. Eur.*
4. Ti. Peftinicornis. F. S. *T. 1. Eur.*
5. Ti. Crocata. F. S. *T. 5. Eur.*
6. Ti. Rivosa. F. S. *T. 2. Eur.*
7. Ti. \* thorace cinereo, abdomine luteo, depresso, alis luteo-fuscis, maculis marginalibus 4 fuscis, saturioribus. *Eur.*
8. Ti. Oleracea. F. S. *T. 7. Eur.*
9. Ti. Lunata. F. S. *T. 12. Eur.*
10. Ti. Pratensis. F. S. *T. 13. Eur.*
11. Ti. Cornicina. F. S. *T. 14. Eur.*
12. Ti. \* cinerea, abdomine utrinque lutescente, alis macula fusca albaque. *Eur.*
13. Ti. \* atra, antennis semipectinatis, alis glaucis, puncto marginali magno, apiceque, femoribus tibiisque rufis, apicibus nigris. *Eur.*
14. Ti. \* flava, thorace flavo, nigro maculato, abdomine dorso, subtus et lateribus cinereis, alis venis maculaque fusca. *Eur.*
15. Ti. \* nigra, rostro, pedibus abdominalisque apice luteis, alis maculis dispersis, fuscis. *Eur.*
16. Ti. \* lutea, alis lutescentibus. *Eur.*
17. Ti. \* atra, abdomine fasciis duabus luteis, alis albis, nigro maculatis, pedibus luteis, geniculis plantisque fuscis. *Eur.*
18. Ti. \* cinereo-lutea, alis griseis, fasciis 4 lutescentibus, costaque marginali punctata, pedibus luteis, geniculis nigris. *Eur.*

\*\* *Alis*

\*\* *Alis incumbentibus.*

19. Ti. Plumosa. F. S. T. 24. *Eur.*
20. Ti. Arundineti. F. S. T. 31. *Eur.*
21. Ti. \* lutescens, corpore dorso maculis tribus fusca, antennis plumosis. *Eur.*
22. Ti. \* ferruginea, alis fasciis tribus. *Eur.*
23. Ti. \* corpore lutescente, abdomine virescente, alis albis, fascia fusca. *Eur.*
24. Ti. \* corpore griseo, abdomine albo, apice fuscum, alis albis. *Eur.*
25. Ti. Littoralis. F. S. T. 32. *Eur.*
26. Ti. \* nigra, pedibus ferrugineis, alis hyalinis. *Eur.*
27. Ti. \* fusca, antennis fuscescentibus, plumosa, pedibus luteis. *Eur.*
28. Ti. Hortulana. F. S. T. 38. *Eur.*
29. Ti. Marci. Lin. S. T. 38. *Eur.*
30. Ti. Brevicornis. F. S. T. 37. *Eur.*
31. Ti. Iohannis. F. S. T. 39. *Eur.*
32. Ti. \* atra, pedibus ferrugineis. *Eur.*
33. Ti. Thomæ. F. S. T. 41. *Eur.*
34. Ti. Minutissima. Lin. S. T. 59. *Eur.*
35. Ti. \* fusca, abdominis apice pedibusque luteis, alis albis. *Eur.*
36. Ti. Hirta. F. S. T. 48. *Eur.*

## 161. BIBIO.

37. Bi. Hottentotta. F. S. B. 11. *Eur.*
38. Bi. Maura. F. S. B. 9. *Eur.*
39. Bi. Morio. F. S. B. 8. *Eur.*
40. Bi. Anilis. F. S. B. 6. *Eur.*
41. Bi. \* nigra, scutello ferrugineo, alis nigris, versus marginem tenuiorem ramosis, interstitiis albis, disco macula, basi et versus apicem puncto minore albo, abdomine ferrugineo, dorso nigro, segmentorum angulis ferrugineis. *Exotica.*
41. b. Bi. \* hirta, flavesiens, alis fusca, abdomine fuscum, segmentis 2, 3 utrinque macula ferruginea, subtus segmentis 1, 2, 3, 4 utrinque macula ferruginea. Magnitudine et statura B. Hottentottæ. *Exotica.*

## 162. STRATIOOMYS.

42. St. \* testacea, scutello bidentato, oculis nigris, abdomine segmentis 2 et 3, postice utrinque macula flava. *Eur.*

43. St. \* antennis filatis, clavatis, scutello bidentato, nigro, dentibus flavis, abdомine nigro, segmentorum marginibus posticis subtus albidis. *Eur.*
44. St. Chamæleon. F. S. *St. 1. Eur.*
45. St. Ephippium. F. S. *St. 2. Eur.*
46. St. Tigrina. F. S. *St. 4. Eur.*
47. St. Hydroleon. F. S. *St. 5. Eur.*

## 163. RHAGIO.

48. Rh. Scolopaceus. F. S. *R. 1. Eur.*
49. Rh. Tringarius. F. S. *R. 2. Eur.*
50. Rh. \* antennis filatis, niger, abdomine tenui, longo, apice subulato, aliis maculatis, femoribus rufo-flavescentibus, tibiis plantisque fuscescentibus. *Eur.*
- 50.b. Rh. Clavipes. F. S. *R. 9. Eur.*

## 164. SYRPHUS.

\* *Antennis seta plumata.*

51. Syr. Bombylans. F. S. *S. 1. Eur.*
52. Syr. \* antennis plumatis, tomentosa, nigra, abdomine postice rufo, thorace hirsuto, nigro. *Eur.*

\*\* *Antennis seta nuda.*

53. Syr. Pendulus. F. S. *S. 7. Eur.*
54. Syr. Floreus. F. S. *S. 8. Eur.*
55. Syr. Subcoleoptratus. F. S. *S. 9. Eur.*
56. Syr. Neinorum. F. S. *S. 10. Eur.*
57. Syr. Arbustorum. F. S. *S. 12. Eur.*
58. Syr. Tenax. F. S. *S. 15. Eur.*
59. Syr. Intricarius. F. S. *S. 17. Eur.*
60. Syr. \* antennis setariis, tomentosus, fronte alba, vertice luteo, thorace luteo, tomentoso, abdomine albo-luteo-tomentoso, pedibus nigris, femoribus posticis crassis, alis albis, fascia fusca. *Eur.*
61. Syr. \* antennis setariis, tomentosus, thorace fulvo, abdомine nigro, parum fulvo-tomentoso, subtus utrinque ferrugineo, femoribus nigris, tibiis luteis, posticis versus apicem nigris, alis albis, fascia nigra. *Eur.*
62. Syr. \* antennis setariis, thorace nigro, fulvo-tomentoso, scutello luteo, alis albis, venis ferrugineis, abdomine nigro, segmentis 1, 2, basi fascia ferruginea, femoribus ferrugineis.

- rugineis, basi puncto nigro, posticis crassis, versus apicem nigris, tibiis fuscis, posticis arcuatis. *Exoticus.*
63. Syr. \* antennis setariis, capite albo, oculis cupreis, fusco-punctatis, thorace cinereo, parum tomentoso, cinereo, fasciis 4 nigris, abdomine coeruleo-nigro. *Eur.*
64. Syr. Sylvarum. F. S. S. 20. *Eur.*
65. Syr. \* antennis setariis, oblonga, atra, pedibus rufis, femoribus posticis longis, crassis, tibiis posticis nigris, arcuatis. *Eur.*
66. Syr. \* antennis setariis, thorace nigro, abdomine segmentis 2, 3 fulvis, basi apiceque nigris. *Eur.*
67. Syr. Vespiiformis. F. S. S. 33. *Eur.*
68. Syr. Festivus. F. S. S. 34. *Eur.*
69. Syr. Ribesii. F. S. S. 41. *Eur.*
70. Syr. Pyrastris. F. S. S. 42. *Eur.*
- 70.b. Syr. Ruficornis. F. S. S. 35. *Eur.*
71. Syr. Conopseus. F. S. S. 26. *Eur.*
- 71.b. Syr. Ichneumoneus. F. S. S. 27. *Eur.*
72. Syr. \* antennis setariis, thorace subæneo, abdomine nigro, fasciis duabus cinereis, pedibus flavis, femoribus basi nigris. *Eur.*
73. Syr. \* antennis setariis, thorace subæneo, abdomine nigro, segmentis 1, 2, fascia flava, prima interrupta, pedibus flavis, plantis posticis fuscis. *Eur.*
74. Syr. \* antennis setariis, atra, thorace maculato, abdomine fasciis 4 interruptis, alis margine maculaque marginali fusca. *Eur.*
75. Syr. \* antennis setariis, thorace subæneo, fasciis duabus obsoletis, flavis, ad basin alarum scutelloque flavo, abdomine nigro, fasciis 4 flavis, prima in medio et bis transverse interrupta, secunda et tertia utrinque lineola transversa, interrupta, 4 macula nigra; apex flavus. *Eur.*
76. Syr. Noctilucus. F. S. S. 38. *Eur.*
77. Syr. \* antennis setariis, niger, abdominis segmento secundo utrinque luteo. *Eur.*
78. Syr. \* antennis setariis, nigro-æneus, vertice utrinque lineolis transversis impressis, abdomine depresso. *Eur.*
79. Syr. \* antennis setariis, thorace nigro, abdomine nigro-virescente, subtomentoso, depresso. *Eur.*
80. Syr. \* antennis setariis, niger, minutus, fronte alba, abdomine depresso, alis albis, pedibus fusco-ferrugineis. *Eur.*
81. Syr. Scriptus. F. S. S. 45. *Eur.*
82. Syr. Mellinus. F. S. S. 44. *Eur.*

83. Syr. Pipiens. F. S. *S. 46. Eur.*  
 84. Syr. Menthastris. F. S. *S. 43. Eur.*  
 85. Syr. Gibbosus. F. S. *S. 39. Eur.*  
 86. Syr. Podagricus. F. S. *S. 30. Eur.*

## 165. MUSCA.

\* *Antennis seta plumata.*

87. M. Inanis. F. S. *M. 1. Eur.*  
 88. M. Pellucens. F. S. *M. 2. Eur.*  
 89. M. Meridiana. F. S. *M. 3. Eur.*  
 90. M. \* antennis plumatis, subtomentosa, thorace subæneo,  
     abdomine nigro, cingulis tribus parum interruptis, apice-  
     que flavo. *Eur.*  
 91. M. Carnaria. F. S. *M. 4. Eur.*  
 92. M. Cæsar. F. S. *M. 8. Eur.*  
 93. M. Vomitoria. F. S. *M. 13. Eur.*  
 94. M. Vulpina. F. S. *M. 15. Eur.*  
 95. M. \* antennis plumatis, fusca, abdomine clavato, tibiis lu-  
     teis. *Eur.*  
 96. M. \* antennis plumatis, thorace fusco, pectore utrinque  
     macula oblonga, lutea, scutello luteo, abdomine luteo-ci-  
     nereo, pedibus luteis. *Eur.*  
 97. M. \* antennis plumatis, thorace fusco, abdomine luteo-ci-  
     nereo, pedibus luteis, plantis fusca. *Eur.*  
 98. M. \* antennis plumatis, nigra, abdomine cinereo-mutabili.  
     *Eur.*  
 99. M. \* antennis plumatis, nigra, abdomine luteo, cinereo  
     -nigroque vario. *Eur.*  
 100. M. \* antennis plumatis, cinerea, abdomine apice nigro,  
     femoribus 4 posticis, apice tibiisque ferrugineis. *Eur.*  
 101. M. \* antennis plumatis, luteo-cinerea, pedibus testaceis,  
     oculis nigris. *Eur.*  
 102. M. Domestica. F. S. *M. 5. Eur.*  
 103. M. Cæfarina. Scop. Ent. carn. n. 873. *Eur.*  
 104. M. \* antennis plumatis, cinerea, thorace lineis 4 nigris,  
     abdomine cinereo-mutabili, fronte utrinque argentea.  
     *Eur.*  
 105. M. \* antennis plumatis, testacea, vertice utrinque pun-  
     cto ferrugineo, alis strigis transversis, numerosis, testa-  
     ceis. *Eur.*

\*\* *Antennis seta nuda.*

106. M. Grossa. F. S. *M. 20. Eur.*
107. M. Fera. F. S. *M. 18. Eur.*
108. M.\* antennis setariis, thorace cinereo, abdomine rufo, basi macula nigra, alis basi lutescentibus, maculis duabus fuscis, una in disco, altera ad marginem anticum, margine postice fuscescente. *Eur.*
109. M. Larvarum. F. S. *M. 23. Eur.*
110. M. Cupraria. F. S. *M. 39. Eur.*
111. M. Polita. F. S. *M. 40. Eur.*
112. M.\* antennis setariis, nigra, abdomine setoso, basi utrinque macula pallida. *Eur.*
113. M.\* antennis setariis, nigra, abdomine segmentis 1, 2, 3, utrinque rufo-cinereo, mutabili. *Eur.*
114. M.\* antennis setariis, nigra, abdomine glabro, nigrovirescente. *Eur.*
115. M. Cucularia. F. S. *M. 55. Eur.*
116. M. Scybalaria. F. S. *M. 56. Eur.*
117. M. Stercoraria. F. S. *M. 57. Eur.*
118. M.\* antennis setariis, tota brunnea. *Eur.*
119. M.\* antennis setariis, cinerea, setis nigris, pedibus testaceis, plantis nigris. *Eur.*
120. M.\* antennis setariis, cinerea, alis basi luteis, pedibus nigris. *Eur.*
121. M. Fimetaria. F. S. *M. 58. Eur.*
122. M. Rotundata. F. S. *M. 22. Eur.*
123. M.\* antennis setariis, cinerea, fronte, femoribus, apice tibiisque testaceis. *Eur.*
124. M.\* antennis setariis, nigra, cinereo-mutabili. *Eur.*
125. M.\* antennis setariis, picea, glabra, pedibus atris. *Eur.*
126. M.\* antennis setariis, nigra, setosa, femoribus crassis. *Eur.*
127. M. Parietina. F. S. *M. 60. Eur.*
128. M.\* antennis setariis, nigra, alis nigris, punctis numerosis, albis. *Exotica.*
129. M. Seminationis. F. S. *M. 70. Eur.*
130. M.\* antennis setariis, cinerea, vertice rufo, tibiisque testaceis. *Eur.*
131. M.\* antennis setariis, nigra, abdomine segmentis, basi cinereo-mutabili. *Eur.*
132. M.\* antennis setariis, nigra, fronte alba, alis lutescentibus, tibiisque ferrugineis. *Eur.*
133. M. Fenestralis. F. S. *M. 33. Eur.*

134. M. \* antennis setariis, picea, abdomine subulato, alis macula ferruginea, tibiis pallidis. *Eur.*
135. M. \* antennis setariis, cinerea, abdomine conico, pedibus fusco-testaceis. *Eur.*
136. M. \* antennis filatis, cinerea, alis fasciis tribus abruptis, testac. is. *Eur.*
137. M. \* antennis setariis, capite flavo, vertice ferrugineo, thorace flavo, dorso nigro, alis albis, fasciis duabus fuscis apiceque fuso, macula alba, abdomine nigro, linearis, pedibus flavis. *Eur.*
138. M. Arnicæ. Lin. S. *M. 119. Eur.*
139. M. Stilata. F. S. *M. 66. Eur.*
140. M. \* antennis setariis, flavo-cinerea, capite flavo, vertice ferrugineo, alis alvis, fasciis 4 flavis, 1, 2 et 3 et 4 ad marginem anticum unitis, pedibus flavis. *Eur.*
141. M. \* antennis setariis, nigricans, facie alba, scutelli apice subtestaceo, abdomine cinereo-mutabili. *Eur.*
142. M. \* antennis setariis, nigricans, abdomine cylindrico, cinereo-mutabili. *Eur.*
143. M. \* antennis setariis, picea, glabra, cylindrica, pedibus flavis. *Eur.*
144. M. Ungulata. F. S. *M. 48. Eur.*
145. M. Radicum. F. S. *M. 24. Eur.*
146. M. \* antennis setariis, brunnea, oculis aliquo fuscis. *Eur.*
147. M. \* antennis setariis, nigra, alis fuscous, margine tenuiore hyalinis. *Eur.*
148. M. \* antennis setariis cinerea, vertice ferrugineo, pedibus nigris. *Eur.*
149. M. Vibrans. F. S. *M. 62. Eur.*
150. M. Cynipsea. F. S. *M. 63. Eur.*
151. M. \* antennis setariis, fusca, pedibus ferrugineis, abdome depresso. *Eur.*
152. M. \* antennis setariis, nitida, thorace coeruleo, abdome viridi, femoribus nigris, apice tibiisque flavis. *Eur.*
153. M. \* antennis setariis, nigricans, abdomine cinereo, cylindrico, linea dorsali, nigra. *Eur.*
154. M. \* antennis setariis, lutea, abdomine clavato, femoribus posticis latis, tibiis annulo albo. *Eur.*
155. M. \* antennis setariis, testacea, thorace dorso cinereo, abdome segmentis basi fuscis. *Eur.*
156. M. \* antennis setariis, cinerea, alis macula ferruginea, pedibus pallidis. *Eur.*

157. M. Canicularis. F. S. *M. 27. Eur.*  
 158. M. Roralis. F. S. *M. 32. Eur.*  
 159. M. Corrigiolata. F. S. *M. 46. Eur.*  
 160. M. Petronellæ. F. S. *M. 44. Eur.*  
 161. M. \* antennis setariis, nigricans, vertice utrinque punctis tribus nigris, thorace subcinerascente. *Eur.*  
 162. M. \* antennis setariis, picea, glabra, alis glaucis. *Eur.*  
 163. M. \* antennis setariis, picea, glabra, pedibus ferrugineis, alis albis *Eur.*  
 164. M. \* antennis setariis, thorace nigro, abdomine subcinerreo, punctis 9 nigris. *Eur.*  
 165. M. Pluvialis. F. S. *M. 29. Eur.*  
 166. M. \* antennis setariis, thorace nigro, abdomine piceo, glabro, plantis posticis crassis. *Eur.*  
 167. M. Germinationis. F. S. *M. 75. Eur.*  
 168. M. \* antennis setariis, lutea, alis maculis sex fuscis, tribus apicis. *Eur.*  
 169. M. Flava. F. S. *M. 71. Eur.*  
 170. M. \* antennis setariis, nigra, pedibus ferrugineis. *Eur.*  
 171. M. \* antennis setariis, flava, vertice punto, thorace fasciis tribus longitudinalibus, nigris. *Eur.*

## 166. TABANUS.

172. Ta. Bovinus. F. S. *T. 1. Eur.*  
 173. Ta. Autumnalis. F. S. *T. 2. Eur.*  
 174. Ta. Tropicus. F. S. *T. 14. Eur.*  
 175. Ta. \* niger, thorace griseo, abdominis secundo segmento postice fascia communis, cinerea, 4, 5, 6 utrinque nigro, alis ferrugineis. *Exoticus.*  
 176. Ta. Rusticus. F. S. *T. 11. Eur.*  
 177. Ta. Bromius. F. S. *T. 10. Eur.*  
 178. Ta. Pluvialis. F. S. *T. 16. Eur.*  
 179. Ta. Cæcutiens. F. S. *T. 18. Eur.*  
 180. Ta. Lugubris. F. S. *T. 19. Eur.*

## 167. RHINGIA.

181. Rh. Rostrata. F. S. *R. 1. Eur.*

## 168. ASILUS.

182. Af. Crabroniformis. F. S. *A. 5. Eur.*  
 183. Af. Flavus. F. S. *A. 10. Eur.*

184. Af. Gilvus. F. S. *A. 11. Eur.*  
 185. Af. Maculatus. F. S. *A. 17. in India.*  
 186. Af. \* niger, villo flavo, hirtus, alis ferrugineis, femoribus nigris, tibiis plantisque flavis, hirsutis, digitis nigris. *Eur.*  
 187. Af. Teutonus. F. S. *A. 21. Eur.*  
 188. Af. Diadema. F. Spec. Tom. 2. *A. 11. in Italia.*  
 189. Af. Ater. F. S. *A. 9. Eur.*  
 190. Af. Rufipes. Scop. Ent. carn. n. 980. *Erax rufipes.*  
 191. Af. Forcipatus. F. S. *A. 14. Eur.*  
 192. Af. \* fuscus, pubescens, fronte cana, abdominis segmentorum marginibus utrinque lutescentibus, halteribus flavis. *Eur.*  
 193. Af. \* niger, thorace lateribus utrinque linea cinerea, halteribus flavis. *Eur.*  
 194. Af. \* niger, glaber, thorace linea longitudinali, gemina, nigra, abdomine incisuris luteis, fronte alba, pedibus lividis.

### 169. CONOPS.

195. Co. Vesicularis. F. S. *C. 1. Eur.*  
 195. b. Co. Aculeata. F. S. *C. 2. Eur.*  
 196. Co. Macrocephala. F. S. *C. 3. Eur.*

### 170. STOMOXIS.

197. St. \* orbita oculorum alba, thorace griseo, abdomine griseo-fusco, pedibus ferrugineis, plantis elongatis, nigris. Variat ab domine toto griseo. *Eur.*  
 198. St. Siberita. F. S. *St. 2. Eur.*  
 199. St. Calcitrans. F. S. *St. 3. Eur.*

### 171. MYOPA.

200. My. Ferruginea. F. S. *M. 1. Eur.*  
 201. My. \* thorace nigro, alis basi ferrugineis, abdomine cylindrico, apice incurvo, segmento 1, 2 flavo-ferrugineo, dorso nigro, 3 nigro, margine postico flavo, reliquis flavis; at 4, 5, 6 utrinque macula nigra, pedibus ferrugineis, fusco-anulatis. *Eur.*  
 202. My. \* abdomine ovato, flavo, basi dorso nigro, utrinque lacinia nigra, segmento 2, 3 utrinque macula obliqua, et in medio

medio macula nigra, thorace nigro, scutello flavo, pedibus flavis, plantis nigris. *Eur.*

203. My. Buccata. F. S. M. 4. *Eur.*

204. My. Atra. F. S. M. 2. *Eur.*

### 172. CULEX.

205. Cu. Pipiens. F. S. C. 1. *Eur.*

206. Cu. Bifurcatus. F. S. C. 2. *Eur.*

207. Cu. \* fuscus, alis griseis, maculis quatuor fuscis, abdome nigro, annulis sex albis, plantis albo-annulatis. *Eur.*

### 173. EMPIS.

208. Em. \* cinerea, femoribus nigris, tibiis alisque ferrugineis. *Eur.*

209. Em. \* atra, femoribus quatuor posticis pennatis, alis fuscis, costa marginali atra. *Eur.*

210. Em. \* cinerea, thorace lineis impressis tribus nigris, alis albis, abdomine luteo; aliis fusco, pedibus luteis. *Eur.*

211. Em. \* nigra, subcinerascens, thorace lineis quatuor, abdomine cylindrico, apice inflexo. *Eur.*

212. Em. \* nigra, subcinerea, pedibus ferrugineis. *Eur.*

213. Em. Borealis. F. S. E. 1. *Eur.*

214. Em. Stercorea. F. S. E. 6. *Eur.*

215. Em. Pennipes. F. S. E. 2. *Eur.*

216. Em. \* fusca, thorace gibboso, abdomine tenui, alis maculatis, tibiis plantisque albis. *Eur.*

217. Em. \* fusco-cinerea, alis albis, pedibus lividis, plantis fuscis. *Eur.*

218. Em. \* thorace cinereo, abdomine nigro, alis albis, pedibus lividis. *Eur.*

### 174. BOMBYLIUS.

219. Bom. Medius. F. S. B. 2. *Eur.*

220. Bom. Maior. F. S. B. 1. *Eur.*

221. Bom. \* ater, fronte alba, thorace villoso, alis albis, costa ferruginea, abdomine atro, segmento secundo margine postico utrinque cinereo, 4, 5, 6 postice utrinque cinereis. *Exoticus.*

222. Bom. Minor. F. S. B. 4. *Eur.*

223. Bom. Ater. F. S. B. 5. *Eur.*

## 175. HIPPOBOSCA.

224. Hi. Equina. F. S. *H. 1. Eur.*  
 225. Hi. Hirundinis. F. S. *H. 3. Eur.*  
 226. Hi. Avicularia. F. S. *H. 2. Eur.*

## 176. PEDICULUS.

227. Pe. Humanus. F. S. *P. 1. Eur.*  
 228. Pe. Pubis. F. S. *P. 2. Eur.*  
 228.b. Pe. Balænarum. F. S. *P. 35. Eur.*  
 229. Pe. \* capite trigono, utrinque linea sanguinea, obliqua,  
      abdomine ovato, incisuris utrinque lineis 9-10 nigris.

## 177. ACARUS.

230. Ac. Lipsiensis. F. S. *A. 5. Eur.*  
 231. Ac. \* ovatus, albus, antice coleoptratus, ferrugineus,  
      pedibus ferrugineis. *Eur.*



CLASSIS VI.

V E R M E S.



---

# REGNI ANIMALIS

## CLASSIS VI.

### VERMES.

---

#### Ordo I. INTESTINA.

*Animalia simplicia, absque artibus, nuda.*

#### ASCARIS.

1 **A**scaris lumbricoides. Linn. S. N. Gen. 276. Sp. 2. (J. S.)  
Göz. Naturgesch. d. Eingeweidewürm. pag. 65.

ECHINORYNCHVS MVILL. †)

2 Echinorynchus Gigas.  
Göz. Nat. d. Eingew. p. 149. Tab. 10. fig. 1.  
Specimina permulta, sed omnia e suum intestinis. (J. S.)

#### HIRUDO.

3 Hirudo medicinalis. Linn. S. N. Gen. 280. Sp. 2. (J. S.)

4 Hir. sanguisuga. Linn. S. N. Gen. 280. Sp. 3. (J. S.)

5 Hir. muricata. Linn. S. N. Gen. 280. Sp. 9. (J. S.)

Corpus teres, virescens, verrucis muricatis, transversim  
atque confertim armata.

#### TAENIA. ††)

6 Taenia solium. Linn. S. N. Gen. 351. Sp. 1.

Göz Nat. d. E. pag. 269. 280. cet. Tab. 21. fig. 3.

Plura specimina ex intestinis hominum. (J. S.)

K 2

7. Tae-

†) Zool. Dan. Prodromus. pag. 214. --- Species nostra ibi deficit,  
sed in Zool. Dan. ipsa, Cel. Gözzio teste, sub nomine Echinor.  
Lumbricoidis reperitur.

††) Decennio nostro, Taeniam non amplius cum Linnaeo inter  
Zoophytae numerare possumus, quam igitur, O. F. Mülleri, Les-  
kii, Gözzii et aliorum exemplio hoc locamus.

- 7 *Taeniae Sol. Articuli solitarii.* (J. S.)  
Medicorum vermes cucurbitini.
- 8 *T. vulgaris.* Linn. S. N. Gen. 351. Sp. 2. (J. S.)  
Göz Nat. d. E. pag. 296.
- 9 *T. vesicularis.* Hydra Hydatula. Linn. S. N. Gen. 349. Sp. 5.  
Göz Nat. d. E. pag. 207. Tab. 17. A. fig. 2. 3.  
Specimina nonnulla ex hepate suum. (J. S.)
- 10 *T. vesicularis.* Linn. ib.  
Göz Nat. d. E. pag. 205.  
Specimina ex hepate ovium. (J. S.)
- Not.* Hos vermes, (9 -- 10.) nomen *Taeniae re vera* mereri, Cl. Gözzius l. c. pag. 197. optime probavit.
- 11 *Taenia multiceps.* Lesk.  
Leske vom Dreh. der Schäfe pag. 28. §. 15. fig. 1. B. B.  
Göz Nat. d. E. pag. 252. Tab. 20. A. fig. 1. 2.  
Spec. 2. ex cerebro ovis. (J. S.)
- Not. 1.* De lite inter *Leskium* et *Cel.* Göze quis ipsorum *primus* hanc T. pro vera causa vertiginis ovium habueri, agitata et non multo post dirempta, v. notam pag. 448. Operis Göz jam saepius cit. nec non pag. 619. Tom. 4ti, libri, cui est titulus: *Neuste Mannigfaltigkeiten*.
- Not. 2.* Quibuscum Taeniis nostris, Oestri ovini, quos b. Leske, in sinu ossis frontis capitatis ovini dissecto, observavit (v. libell. ejus jami adleg. §. 8. pag. 14. 15.), in uno vitro conservati reperiuntur.

## Ordo II. MOLLUSCA.

*Animalia simplicia, nuda (absque Testa inhabitata, si Echinum excipias), artibus instruta.*

### APHRODITA.

- 12 *Aphrodita aculeata.* Linn. S. N. Gen. 285. Sp. 1.  
Seb. Thes. 3. tab. 4. fig. 7. 8.  
Pilis rufescente — ac virescente - aureis, latere utroque, hirsuta. Vermis splendidissimus. (J. S.)
- 13a *Aphr. scabra.* Linn. S. N. Gen. 285. Sp. 2.  
Dilute grisea. (J. S.)
- 13b *Aphrodita imbricata.* Linn. S. N. Gen. 285. Sp. 4.  
Colore ex lutescente - albido. (J. S.)

NEREIS

## NEREIS.

- 14 *Nereidis tubicolae* Müll. *vagina*,  
Zool. Dan. Prodr. pag. 277. N. 2625.

## SEPIA.

- 15 *Os Sepiae officinalis*. Linn. S. N. Gen. 296. Sp. 2.

## ASTERIAS.

## \* Stellatae.

*Asterias papposa*. Linn. S. N. Gen. 298. Sp. 2.

Seb. thes. 3. tab. 8. fig. 5.

- 16 *Aster. papp. pallide flavescens*, undique atque densissime muricata fasciculis.
- 17 *A. p. fusca*, radiis paululum curvatis, non tam regulariter distantibus ac in seq.
- 18 *A. p.*, *flavescens*, *crocea orbiculata*, radiis apice pectinatis, aequalibus, rectis. Radiorum numerus 12 non superat, sed spec. hoc, eo magis hue referre coacti sumus, quoniam in fig. Seb. a Linneo cit. quoque radii duntaxat sunt duodecim.
- 19 *A. p.*, *pallida*, radiis 12. curvatis, *fasciculis rarioribus* muricata.
- 20 *A. p.*, ex atro fusca, radiis 12. aequaliter distantibus, *spiraliter autem flexuoso-elevatis*.
- 21 *A. p.*, radiis *decem* non valide attenuatis, *disco brevioribus*.
- 22 *A. p.* radiis *novem* perattenuatis, *disco subaequalibus*.
- 23 *A. p.* radiis *totidem* angustis, *disco longioribus*.

*Asterias rubens*. Linn. S. N. Gen. 298. Sp. 3.

Seb. thes. 3. tab. 5. fig. 3.

- 24 *Aster. rub.*, *flavescens*, *radiis subtus canaliculatis*, subaurantiis. 2.
- 25 *Ast. rub.* *flavescens*, *reticulato muricata*, *radiorum apice magis elevata*.
- 26 *Ast. r. subfusca*, *radiorum apice partim oblique-partim elevato - flexuoso*. 2.
- 27 *Ast. r.* *radiis quinque superne subcanaliculatis*, *spiris frequentissimis aculeata*. 3.
- 28 *Ast. r.* *forma praecedentium*, *sed radiis magis flexuosis*.
- 29 *Ast. r.* *radiis disco subaequalibus*, *apice spiraliter elevato-flexuosis*.

- 30 Asterias rub. radiis spiraliter *ita* erecto-flexuosis, ut se invicem superne tangant, hincque *foramen superius* forment, ori inferiori non dissimile.
- 31 Asterias rub. radiis *tantum* 4. spiraliter elevata, spatium inter eorum duos permagnum, quintum casu *averso* perdidit.
- 32 Ast. rub. radiis *quinque* paullulum flexuosis, sutura media longitudinali convexa.
- 33 Ast. rub. flavescens, reticulato spinosa, radiis 5. elevatisculis, *inaequalibus* et convexis.
- 34 Ast. rub. radiis *ita locatis*, ut unus solitarius, duo oppositi, *duoque paralleli* cingant discum.
- 35 Ast. rub. spiris rarioribus reticulata, radiis 5., quorum *quatuor viciniores*.
- 36 Ast. rub. spinis frequentibus reticulata, radiis 5 *apice valde attenuatis*, paullulum flexuosis.
- 37 Ast. rub. radiis 5. *aequaliter convergentibus*, conchis marinis quibusdam obtecta.
- 38 Ast. rub. ferrugineo *fusca*, radiis 5., quorum unus supra dimidium, truncatus.
- 39 Ast. rub. ferruginea, *passim lutea*, radiis 5 *senzim attenuatis*.
- 40 Ast. rub. superne ferruginea, *radiis sex lanceolatis*.
- 41 Ast. rub. radiis totidem, subtus *latius canaliculatis*.

*Asterias glacialis.* Linn. S. N. Gen. 298. Sp. 5.

Seb. thes. 3. tab. 7. fig. 4.

- 42 Asterias glacialis ex *lutescente-fusca*, radiis curvatis sub-aequalibus.
- 43 Ast. glac. radiis *quinque*, quorum unus *minimus*, sine d. bio novissime reproductus.

*Asterias reticulata.* Linn. S. N. Gen. 298. Sp. 6.

Seb. thes. 3. tab. 7. fig. 1.

- 44 Asterias reticulata, flavescens, subtus *verrucis coacervatis plurimis*, armata.

*Asterias aranciaca.* Linn. S. N. Gen. 298. Sp. 8.

Seb. thes. 3. tab. 8. fig. 2.

- 45 Asterias aranciaca pallide flavescens.

- 46 Ast. ar. radiis *longioribus*, ratione disci.

Seb. thes. 3. tab. 6. fig. 7. 8.

- 47 Ast. ar. *varietas Gigas*, diametro semipedem aequipollente.

*Asterias*

*Asterias equestris.* Linn. S. N. Gen. 298. Sp. 9.

Seb. thes. 3. tab. 8. fig. 8.

48 *Asterias equestris*, pallida *poris tenuissimis* pertusa.

49 *Ast. eq. brunascens*, *punctis distinctissimis* perforata.

50a *Ast. eq. cuius radii superiores, radiis mediis elevatisculis* sunt *bifidi*.

50b *Ast. eq. disco convexiusculo.*

Seb. thes. 3. tab. 8. fig. 6.

51 *Ast. eq. punctis ut praec. pertusa, sed spinulis tenuissimis* ac confertissimis *armata* — An species singularis?

52 *Ast. eq. varietas praecedentis*, *radiis tantum gibbosioribus* atque *apice curvatis*.

*Asterias laevigata.* Linn. Gen. 298. Sp. 10.

53 *Asterias laevigata ferrugineo-fusca*, *radiis quinque extremitate flexuosis*.

54 *Ast. laev. quinque radiata, radiis rectiusculis.* 2.

55 *Ast. laev. radiis quatuor*, decussatim positis.

\*\* Radiatae,

*Asterias ophiura.* Linn. S. N. Gen. 298. Sp. 11.

Seb. thes. 3. tab. 9. fig. 7.

56 *Asterias ophiura pallida*, *radiis 5 flexuosis*.

*Radii 2 in extremitatibus paullulum sunt destructi*

*Asterias ciliaris.* Linn. S. N. Gen. 298. Sp. 13.

57 *Asterias ciliaris pallida*, *radiorum spinulis jam plurimis destructa*.

58 *Ast. cil. fusca*, *radiis 5*, *quorum unus paullulum destruetus; spinis solidioribus*, *aculeata*.

59 *Ast. cil. spinis acutiusculis*.

60 *Ast. cil. rufescens*, *radiis flexuosis, spinis obtusiusculis armata*.

61 *Ast. cil. radiorum spinis in seriebus locatis*.

62 *Ast. cil. radiis purpurascientibus, stella pallida.* 2.

*Asterias Caput Medusae.* Linn. S. N. Gen. 298. Sp. 16.

Seb. thes. 3. tab. 9. fig. 2.

63 *Asterias caput Medusae* *stella pentaloba, ferruginea, ramis pallide flavescientibus*, Emari Norweg.

64 *Ast. cap. Medusae* *ramuli solitarii*.

## ECHINUS.

\* Regulares anno verticali.

*Echinus esculentus.* Linn. S. N. Gen. 299. Sp. 1.

- 65 *Echinus esculentus subferrugineus*, spinis prorsus destruetis.
- 66 *Echinus esculentus gibbosior*, spinis quoque destruetis.
- 67 Ech. esc. ex *violaceo-roseus*, undique *spinis tenuibus albi*, disque conservatis.
- 68 Ech. esc. *purpurascens*, *spinis validioribus*, purpureis, apice albidis.
- 69 *Spinularum Ech. esc. copia*, partim *violacearum*, partim *virescentium*, magnitudine semi pollicis.
- 70 *Aliarum copia*, colore albido.

*Echinus sphaeroides.* Linn. S. N. Gen. 299. Sp. 3.

Seb. thes. 3. tab. II. fig. 5.

- 71 *Echinus sphaeroides violaces*, spinis ex parte superne destruetis.
- 72 Ech. sph. minor, *spinulis omnibus fere destruetis*, varietas.  
Seb. thes. 3. tab. 16. fig. 4. 5. 6.

*Echinus Lixula.* Linn. S. N. Gen. 299. Sp. 5.

- 73 *Echinus Lixula virescens*, subconicus, transversim mureatus.
- 74 *Echinus Lixula depressiusculus*, *rufescens*, atque muricatus, Fasciis longitudinalibus cinereis levibusque interjectis.

*Echinus saxatilis.* Linn. S. N. Gen. 299. Sp. 6.

Seb. thes. 3. tab. IZ. fig. 1.

- 75 *Echinus saxatilis aculeis pluribus*, *apice violaceis*, ac laevibus armatus.
- 76 Ech. sax. ex *virescente-brunneus*, aculeis privatus.
- 77 Ech. sax. *viridis*, valide depresso, ore subemarginato.
- 78 Ech. sax. *albidus*, ore decies exciso.
- 79 Ech. sax. ex *virescente-flavescens*. 2.
- 80 Ech. sax. *decolor*.
- 81 Ech. sax. dilute viridis, *verrucis albidis*.
- 82 Ech. sax. ex *violaceo viridiisque longitudinaliter et alterne fasciatus*.

Echinus

83 Ech. fax, aculeorum subfuscorum acervus.

*Echinus Diadema*. Linn. S. N. Gen. 299. Sp. 7.

84 Echinus Diadema *aculeis*, transversim rugoso striatis, plurimi adhuc ornatus.

85 Ech. Diad. *major*, pallidus, verrucis elevatisculis intermibus.

86 Ech. Diad. ex virescente *cinerescens*.

87 Ech. Diad. ex rufescente - *flavus*.

88 Ech. Diad. superne subfuscus, ad basin albidus, poris verrucisque croceis.

89 Ech. Diad. ex rufescente *griseus*, poris *solis* croceis.

90 Ech. Diad. aculei perlungi, *atro colore*.

91 Ech. Diad. aculei solidiores, *flavescentes* et *longitudinaliter striati*.

92 Ech. Diad. aculeus *scaberrimus* solitarius.

*Echinus Cidaris*. Linn. S. N. Gen. 299. Sp. 8.

Seb. thes. 3. tab. 13. fig. 12.

93 Echinus Cidaris specimen optime conservatum, fig. cit. plane respondens.

94 Ech. Cid. fragmentum crustae osseae.

95 Ech. Cid. *theca interna* cum dentibus quinis eorumque radiis.

Seb. thes. 3. tab. 13. fig. 12. A. 12. B.

96 Ech. Cit. *thecae* quatuor solitariae, partim cum, partim sine dentibus.

Seb. thes. 3. tab. 13. fig. 12. C.

97 Ech. Cid. *denticuli* duo e theca protracti et soluti.

Seb. thes. 3. tab. 13. fig. 12. Litt. D.

98 Ech. Cid. *officula* tria *transversalia*, cuiusmodi quinque in theca reperiuntur.

Seb. thes. 3. tab. 13. fig. 12. Litt. E.

*Echinus mammillatus*. Linn. S. N. Gen. 299. Sp. 9.

99 Echinus mammillatus *pallidus*, spinis denudatus, subovatus.

100 Ech. mamm. *spinae solidae* ac *triangulares*, subviolaceae, atque fasciatae.

Seb. thes. 3. tab. 13. fig. 1.

*Echinus Lucunter.* Linn. S. N. Gen. 299. Sp. 16.

Seb. thes. 3. tab. II. fig. II. a. II. b.

- 101 *Echinus Lucunter albidus immaculatus, interne opalescens.*  
 102 *Ech. Luc. varicibus frequentioribus et elevationibus.*  
 103 *Ech. Luc. albidus, et externe et interne Jside nob. ornatus.*  
 104 *Echinus Lucunter pallidus, verrucis virescitibus.*  
 105 *Ech. Luc. colore tristi, convexiusculus.*  
 106 *Ech. Luc. depressoesculus.*  
 107 *Ech. Luc. varicibus submargaritaceis.*  
 108 *Ech. Luc. ore amplissimo, exciso.*  
 109 *Ech. Luc. antecedenti persimilis, ore autem magis attenuato.*  
 110a *Ech. Luc. gibbosior, verrucis pluribus elevatis.*  
 110b *Ech. Luc. purpurascens, valideque depressoesculus.*

*Echinus atratus.* Linn. S. N. Gen. 299. Sp. 11.

- 111 *Echinus atrati, aculei nonnulli.*

\*\* Irregulares: apertura ani subitus uti os,

*Echinus spatagus.* Linn. S. N. Gen. 299. Sp. 12.

- 112 *Echinus spatagus scaber spinulis ciliaribus.*  
 113 *Ech. spat. spinulis undique privatus.*

*Echinus lacunosus.* Linn. S. N. Gen. 299. Sp. 13.

- 114 *Ech. lacunosi fragmenta albida.*

*Echinus rosaceus.* Linn. S. N. Gen. 299. Sp. 14.

Seb. thes. 3. tab. II. fig. 2. 3.

- 115 *Echinus rosaceus ex rufescente griseus.*  
 116 *Ech. ros. thecae internae officula.*  
 117 *Ech. ros. minimus, subglobosus atque albidus, ano subremoto.*

*Echinus orbicularis.* Linn. S. N. Gen. 299. Sp. 17.

Seb. thes. 3. tab. 15. fig. 1, 2.

- 118 *Echinus orbicularis violaceus atque scaber var.  $\alpha$ .* Linn.  
 119 *Ech. orb. foraminibus nullis perviis, dilute cinereus.* var.  $\delta$ . Linn.  
 120 *Ech. orb. planiusculus suborbicularis, albidusque.*  
 121 *Ech. orb. suboliaceus.*

## Ordo III. TESTACEA.

*Animalia Mollusca, simplicia, domo, saepius calcrea, propria obtecta.*

## CHITON.

*Chiton squamosus.*

Linn. S. N. Gen. 300. Sp. 5.

a Born. Test. Mus. Vind. pag. 5. Tab. I. fig. 1, 2.

122 Chiton squamosus testa parum detrita, animalculo siccо inhabitante. Jnd. Occ.

Chemnitz, Konch. Kab. T. 8. tab. 94. fig. 788.

Long. 1. poll. 9. lin. lat. 1. poll.

123 Chiton squamosus, testa ex virescente fusca, animalculo usque antec. munita.

Chemn. Konch. Kab. T. 8. tab. 94. fig. 789.

124 Chiton squamosus, testa multo magis gibba.

Chemn. Konch. Kab. T. 8. tab. 94. fig. 791.

125 Chiton squamosus, testa extus pulcherrime variegata, intus subcyanea.

Chemn. loc. cit. fig. 799.

Long. 1. poll. 1. lin. lat. 8. lin.

126 Chiton squamosus, testa angustior, hincque paulo gibbosior.

127 Chiton squamosus, testa quam maxime convexa, herbacea, fascia longitudinali fusca, limbo et animalculo optime conservato.

Chemn. loc. cit. fig. 798.

Long. 10. lin. lat. 11. lin.

128 Chiton squamosus, testa obscure virescens, fascia longitudinali subpurpurea, lineisque albidis marmorata.

Chemn. T. 8. tab. 95. fig. 805.

Long. 1. poll. 10. lin. lat. 11. lin.

*Chiton minimus.*

129 Chiton minimus, testa octovalvi, pallida, atro annulata.

Chemn. Konch. Kab. T. 8. tab. 96. fig. 814.

Long. 2. lin. lat. 1½. lin.

*Chiton*

*Chiton ruber.*

- Linn. S. N. Gen. 300. Sp. 7.  
 130 Chiton ruber, testa rufescente, alboque alterne fasciata. Oc.  
 Norw.  
 Cheinn. Konch. Kab. T. 8. tab. 96. fig. 813.  
 Long. 10. lin. lat.  $6\frac{1}{2}$ . lin.

*Chiton cinereus.*

- Linn. S. N. Gen. 300. Sp. 9.  
 a Born. test. mus. Vind. pag. 5. tab. 1. fig. 3.  
 131 Chiton cinereus, testa ex cinerescente fusca, animalculo  
 flavescente. Oc. Sept.  
 Cheinn. Konch. Kab. T. 8. tab. 96. fig. 818.  
 Long. 5. lin. lat. 2. lin.

## LEPAS.

*Lepas Balanoides.*

- Linn. S. N. Gen. 301. Sp. 2.  
 a Born. test. mus. Vind. pag. 8.  
 132 Lepas Balanoides, testa albida, Haliotidi inhaerens. Oc.  
 Sept.  
 Chemn. Konch. Kab. 8. T. 97. fig. 822.  
 Alt. 7. lin. long. bas. 9. lin.  
 133 Lepas Balanoides, testa *distantē striata* subfuscata. Hujus-  
 modi spec. permulta etiam Haliotiden onerant.  
 Chemn. loc. cit. tab. 97. fig. 822.  
 134 Lepas Balanoides, testa *operculo obtusiore*, Haliotidi ut  
 antec. adnata.  
 Chemn. loc. cit. tab. 97. fig. 823.  
 Alt.  $5\frac{1}{2}$ . lin. long. bas. 8. lin.  
 135 Lepas Balanoides, testa *valvulis mucronatis*.  
 Chemn. loc. cit. fig. 824.  
 Alt. 1. poll. lat. 8. lin.

*Lepas Tintinnabulum.*

- Linn. S. N. Gen. 301. Sp. 12.  
 a Born. test. mus. Vind. pag. 9.  
 136 Lepas Tintinnabulum, testa *purpurascentis* distincte stria-  
 ta, *subcylindrica*, Lepadibus Balanoid. obsessa,  
 Chemn. Konch. Kab. T. 8. tab. 97. fig. 828.  
 Alt. 2. poll. 1. lin. lat. 1. poll. 8. lin.

137 *Lepas Tintinnabulum*, testae arearum interjectarum *striae validiores*, ad operculum, et testa oblique gibba.

Chemn. Konch. Kab. I. c. sig. 829.

Alt. 1. poll. 6. lin. lat. bas. 1. poll. 7. lin.

138 Varietas eadem *colore subroseo*, minor.

139 *Lepas Tintinnabulum*, testa flavescens rugosa, *areis rufescens* interjectis.

Chemn. I. c. fig. 830.

140 *Lepas Tintinnabulum*, *tulipa alba*. Earum 12 lateribus invicem adfixae et serpulis obseßæ.

Chemn. I. c. tab. 98. fig. 832.

Alt. 1. poll. 9. lin. Diam. unius ejusque 8. lin.

*Lepas patula.*

141 *Lepas patula*, colore rufescente.

Chemn. Konch. Kab. T. 8. tab. 99. fig. 833.

Alt. 6½. lin. lat. 5. lin.

*Lepas verrucosa Spengleri.*

142 *Lepas verrucosa*, testarum copia numerosa *Haliotidi* adnata, sed omnes paullulum destructæ. Mar. Island.

Chemn. Konch. Kab. T. 8. tab. 99. fig. 834.

143 Hujusmodi specimina, *Patellæ rusticæ* adnata.

*Lepas coarctata Chemnitzi.*

144 *Lepas coarctata*, testa per ventricosa, limo marino sub ferrugineo obtecta. Spec. nostrum plures ejusmodi varietates *Ostreae* eduli adnatas continet.

Chemn. Konch. Kab. T. 8. tab. 99. fig. 835.

Alt. 1. poll. 8. lin. lat. bas. 1. poll. 6. lin.

*Varietas* forsitan *Lep. Balanoid*, nec species singularis?

*Lepas spinosa*. Chemn.

145 *Lepas spinosa*, testa violacea, spinulis aculeata, areis interjectis albidis laevibus. Ind. Or.

Chemn. Konch. Kab. T. 8. tab. 98. fig. 840.

Alt. 8. lin. lat. bas. 8. lin.

Septem ejusmodi specimina tabulati navis fragmento inhaerent.

*Lepas Testudinaria.*

Linn. S. N. Gen. 301. Sp. 14.

a Bornii test. mus. Vindob, pag. 10.

- 146 *Lepas Testudinaria*, testa albida sex radiata, obsolete striata, radiis excavato-striatis. Oc. Septentr.  
 Chemn. Konch. Kab. T. 8. tab. 99. fig. 845.  
 Long. bas. 1. poll. 4. lin. lat. 8. lin. diam. apert. 5. lin.

*Lepas Mitella,*

- Linn. S. N. Gen. 301. Sp. 15.  
 147 *Lepas Mitella*, testa flavescens.  
 Chemn. Konch. Kab. T. 8. tab. 100. fig. 849. 850.  
 Alt. 10. lin. lat. uniuscujusque 5. lin.

*Lepas anatifera.*

- Linn. S. N. Gen. 301. Sp. 18.  
 a Bornii test. mus. Vindob. pag. 11.  
 148 *Lepas anatifera*, testa lactea, rufescente marginata, in duplo.  
 Chemn. Konch. Kab. T. 8. tab. 101. fig. 853. 854.  
 Long. 1. poll. 6. lin. lat. 1. poll. long. intestin. 1. poll.  
 4. lin.  
 149 Ex intestino hujus speciminis solitario pedunculi 2 exserti  
 quibus L. a. cuiilibet adfixa est.  
 150 *Lep. anatifer.* multae, in forma arbusculae ramosae in-  
 ter se et ad fragmentulum navis tabulati, adhaerentes,  
 plane ut in.  
 Seb. thes. 3. tab. 16. fig. 1.  
 Long. intestin. max. 9. poll. minim. 4. poll.

PHOLAS.

*Pholas Dactylus,*

- Linn. S. N. Gen. 302. Sp. 20.  
 a Bornii test. mus. Vindob. pag. 14. Tab. I. fig. 7.  
 151 *Pholas Dactylus rufescens*, antice reticulato, postice sim-  
 pliciter rugosa valv. solit. Qc. Septentr.  
 Chemn. Konch. Kab. T. 8. tab. 101. fig. 859.  
 Long. 3. poll. 11. lin. lat. 2. poll.  
 152 *Pholas Dactylus* testa ex albido cinerescens valv. solit.  
 Ind. Or.  
 Chemn. Konch. Kab. T. 8. tab. 101. fig. 860.  
 Long. 3. poll. 10. lin. lat. 1. poll. 1. lin.

*Pholas costatus,*

- Linn. S. N. Gen. 302. Sp. 21.  
 a Bornii test. mus. Vind. pag. 15.

- 153 *Pholas costatus* testa cinerea, rugis 30 pluribus transversis, cardinis dente longissimo et satis bene conservato.  
valv. solitar. Ind. Occ.

Chemn. Konch. Kab. T. 8. tab. 101. fig. 863.  
Long. 3. poll. 4. lin. lat. 1. poll. 7. lin.

*Pholas candidus.*

Linn. S. N. Gen. 302. Sp. 23.

- 154 *Pholas candidus*, testa albida, striis decussatis transversim muricata. valv. 2. majores. Ind. Occ.

Chemn. Konch. Kab. T. 8. tab. 101. fig. 861. 862.  
Long. 1. poll. 3. lin. lat. 5. lin.

*Pholas pusillus.*

Linn. S. N. Gen. 302. Sp. 24.

- 155 *Pholas pusillus*, testa rufescens. Ind. Occ.

Chemn. Konch. Kab. T. 8. tab. 102. fig. 867.  
Long. 1. poll. 6. lin. diam. 6. lin.

- 156 *Pholas pusillus*, testa albida, solitaria et quidem media unco armata.

Long. 2. poll. 4. lin. diam. 4. lin.

- 157 *Mytili margaritiferi* fragmentum *Pholadibus pusillis* undique perforatum.

MYA.

*Mya pictorum.*

Linn. S. N. Gen. 303. Sp. 28.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 20.

- 158 *Mya pictorum* testa lutescens, transversim fusco striata.  
Fluv.

Chemn. Konch. Kab. T. 6. tab. 1. fig. 6.

Long. 1. poll. 6. lin. lat. 3. poll. 1. lin.

*Mya margaritifera.*

Linn. S. N. Gen. 303. Sp. 29.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 21.

- 159 *Mya margaritifera* testa, epidermide fusca munita, in medio valide sinuata.

Chemn. Konch. Kab. T. 6. tab. 1. fig. 5.

Long. 2. poll. 5. lin. lat. 5. poll. 2. lin.

*Mya*

*Mya oblonga.*

- 160 *Mya oblonga*, testa *virescente rugosa*, dente accessorio nullo, sed perlongo in valvula altera. Color internus *virescente-aureus*, superindumento albo tenuissimoque latet.

Chemn. Konch. Kab. T. 6. tab. 2. fig. 12.

Long. 1. poll. 6. lin. lat. 3. poll.

*Mya corrugata Müll.*

Müll. Hist. verm. pag. 214. Nr. 398.

- 161 *Mya corrugata* testa epidermide *virescente-fusca* adhuc obtecta, natibus vero denudatis.

Chemn. Konch. Kab. T. 6. tab. 3. fig. 22.

Long. 1. poll. lat. 1. poll. 6. lin.

*Mya Vulsella minor Chemnitz.*

- 162 *Mya Vulsella minor*, testa pallida, tenuis, rugosa, rugis transversis flexuosis, in medio sinuata ad littora Amboinæ. 2.

Chemn. Konch. Kab. T. 6. tab. 2. fig. 8.

Long. 7. lin. lat. 10. lin.

## SOLEN.

*Solen Vagina.*

Linn. S. N. Gen. 304. Sp. 33.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 24.

- 162 *Solen Vagina* testa, ex rufo, flavescenti, albidoque jucundissime picta. Mar. Lusitan.

Chemn. Konch. Kab. T. 6. tab. 4. fig. 27.

Long. 1. poll. lat. 5. poll. 6. lin.

*Solen siliqua.*

Linn. S. N. Gen. 304. Sp. 34.

- 164 *Solen siliqua*, testa area *altera transversaliter striata* colore roseo, altera laevi, albo flavescenteque varia. Oc. Septentr. 2.

Chemn. Konch. Kab. T. 6. tab. 9. fig. 29.

spec. alter. Long.  $8\frac{1}{2}$ . lin. lat. 5. poll. 4. lin.

— — Long. 5. lin. lat. 3. poll. 7 lin.

*Solen*

*Solen radiatus.*

- Linn. S. N. Gen. 304. Sp. 38.  
a Bornii test. mus. Vind. pag. 26.
- 165 S. rad. testa violacea, *radiis albidis perdistinctis* pieta.  
Litt. Tranquebar.  
Chemn. Konch. Kab. T. 6. tab. 5. fig. 38.  
Long. 1 poll. lat. 2 poll. 8 lin.
- 166 S. rad. testa violacea, *radiis sublutescentibus*; valv. solitaria.  
Chemn. loc. cit. fig. 39.  
Long. 1 poll. lat. 2 poll. 11 lin.

*Solen strigilatus.*

- Linn. S. N. Gen. 304. Sp. 39.  
a Bornii test. mus. Vind. pag. 26.
- 167 S. str. testa rosea, *radiis 2 mediis longitudinalibus*. Mar. Lusitan.  
Chemn. Konch. Kab. T. 6. tab. 6. fig. 41.  
Long. 1 poll. 4 lin. lat. 2 poll. 11 lin.

*Solen dyphos.*

- Linn. Mantissa altera pag. 544.
- 168 S. D. testa extus epidermide viridi adhuc vestita, intus violacea. Ind. Or.  
Chemn. Konch. Kab. T. 6. tab. 7. fig. 53. 54.  
Long. 2 poll. 4 lin. lat. 5 poll. 4 lin.
- 169 S. D. testa *júnior*, caeterum antecedenti persimilis.  
Long. 1 poll. 1 lin. lat. 2 poll. 7 lin.

*Solen constrictus Chemn.*

- 170 S. constr. testa albida ac tenuissima, valv. solitar. Inf. Nicol.  
Chemn. Konch. Kab. T. 6. tab. 6. fig. 45.  
Long. 11 lin. lat. 1 poll. 10 lin.

## TELLINA.

\*Ovatae, crassiusculae.

*Tellina Lingua felis.*

- Linn. S. N. Gen. 305. Sp. 45.  
a Bornii test. mus. Vindob. pag. 29.
- 171 T. Ling. fel. testa albida, *radiis 8 roseis*, nitida; *nau-*  
*tibus subpurpureis*. Inf. Frideric.  
Chemn. Konch. Kab. T. 6. tab. 8. fig. 65.  
Long. 1 poll. 6 lin. lat. 1 poll. 10 lin.

- 172 T. L. fel. testa radiis vix conspicuis roseis, atque testa postice paulo magis prominula.

Long. 1 poll. 8 lin. lat. 2 poll. 3 lin.

*Tellina virgata.*

Linn. S. N. Gen. 305. Sp. 46.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 30.

- 173 T. v. testa ovali gibba; extus roseo radiata, intus albida immaculata. Tranquebar.

Chenn. Konch. Kab. T. 6. tab. 8. fig. 68.

Long. 1 poll. 11 lin. lat. 2 poll. 9 lin.

- 174 T. virg. testa planiuscula, radiis angustioribus, etiam intus perlutecentibus, praeced. minor.

*Tellina angulata.*

Linn. S. N. Gen. 305. Sp. 47.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 30. Tab. II. fig. 5.

- 175 T. a. testa nivea, ano cordato, rugoso. Tranquebar.

Chenn. Konch. Kab. T. 6. tab. 9. fig. 74. 75.

Long. 1 poll. 3 lin. lat. 1 poll. 3 lin.

\*\*\* Ovatae, compressae.

*Tellina laevigata.*

Linn. S. N. Gen. 305. Sp. 52.

- 176 T. l. testa tenuissima, lutescens radiis plurimis depletis. Ind. Occident.

Chenn. Konch. Kab. T. 6. tab. 12. fig. III.

Long 1 poll. 6 lin. lat. 2 poll. 2 lin.

*Tellina radiata.*

Linn. S. N. Gen. 305. Sp. 53.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 34.

- 177 T. rad. testa rosea quadrifariam radiata, nymphis. contra Linn. descriptionem prominentibus, nec inflexis; id quod etiam observationibus solertissimi Chemnitzii optimè respondet. Ind. Occ.

Chenn. Konch. Kab. T. 6. tab. II. fig. 102.

Long. 1 poll. lat. 2 poll. 2 lin.

- 178 T. rad. testa radiis albidis et rosaceis alternis varia, cingulisque 6 transversis aequaliter distantibus, pulcherrime ornata, valv. solitaria.

Long. 10 lin. lat. 1. poll. 10 lin.

- 179 T. rad; testa candida *obsolete radiata cingulo transversali niveo interrupta*. 2.  
Long. 6 lin. lat. 1 poll. 1 lin.

*Tellina rostrata.*

Linn. S. N. Gen. 305. Sp. 55.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 34. Tab. II. fig. 10.

- 180 T. rostr. testa pertenui fragilique, *extus lutea obsoletè striata valide angulata*, intus laevis, albida luteaque *angulata*. Ind. Occ.

Chemn. Konch. Kab. T. 6. tab. 11. fig. 104.

Long. 1 poll. 1 lin. lat. 2 poll. 2 lin.

- 181 T. r. testa *extus albida*, vix lutescens, natibus roseis, solidior.

Long. 1 poll. 4 lin. lat. 2 poll. 9 lin.

- 182 T. r. testa, magnitudine et *annulo circa nates luteo ab antecedente tantum differt.*

Long. 6 lin. lat. 1 poll. 2 liti.

\*\*\*Suborbiculatae.

*Tellina Remies.*

Linn. S. N. Gen. 305. Sp. 62.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 36. Tab. II. fig. 12.

- 183 T. R. testa extus lutescens, rugosa, rugis validioribus aequaliter distantibus, conversis obsoletis; intus lutea radiatim, sed obsolete striata. Ind. Occ.

Chemn. Konch. Kab. T. 6. tab. 12. fig. 112.

Long. 1 poll. 6 lin. lat. 1 poll. 8 lin.

*Tellina reticulata.*

Linn. S. N. Gen. 305. Sp. 63.

- 184 T. ret. testa extus albida, intus lutescens, rima et anno purpureis. Ind. Occ.

Chemn. Konch. Kab. T. 6. tab. 12. fig. 118.

Long. 1 poll. 2 lin. lat. 1 poll. 4 lin.

- 185 T. ret. colore *flavescente*, nec rima nec anno purpureis. Magnitudo paulo minor anteced.

*Tellina Scobinata.*

Linn. S. N. Gen. 305. Sp. 64.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 37.

- 186 T. Scob. testa pallida, maculis nonnullis ferrugineis squamosa, squamulis omnibus bene conservatis. Ind. Occ. in dupl.

Chemn. Konch. Kab. T. 6. tab. 13 fig. 122 - 124.

Long. 2 poll. 1 lin. lat. 2 poll. 3 lin.

*Tellina divaricata.*

- Linn. S. N. Gen. 305. Sp. 70.  
**187** T. div. testa albida, striata, striis angulatis, margine crenulato. Ind. Occ.  
 Chemn. Konch. Kab. T. 6. Tab. 13. fig. 129.  
 Long. 10 lin. lat. 10 lin.

*Tellina cornea.*

- Linn. S. N. Gen. 305. Sp. 72.  
**188** T. corn. testa epidermide fusca, munita, transverse rugosa. Ind. Or.  
 Chemn. Konch. Kab. T. 6. tab. 13. fig. 133.  
 Long. 11½ lin. lat. 12 lin.

*Tellina Spengleri.*

- 189** T. Sp. testa albida, epidermide nulla, natibus roseis, vulva et ano subpubescentibus; intus laevis, albida roseo maculata. Ind. Occ.  
 Chemn. Konch. Kab. T. 6. tab. 10. fig. 88.  
 Long. 1 poll. lat. 2 poll. 9 lin.

*Tellina inflata.*

- 190** T. infl. testa albescens, tenuis perfragilis, margine integerrimo.  
 Chemn. Konch. Kab. T. 6. tab. 9. fig. 76.  
 Long. 1 poll. 2 lin. lat. 1 poll. 6 lin.

*Tellina polygona.*

- 191** T. pol. testa subovata, plicata, natibus roseo lineatis. Tranquebar.  
 Chemn. Konch. Kab. T. 6. tab. 9. fig. 77.  
 Long. 1 poll. lat. 1 poll. 8 lin.

## CARDIUM.

*Cardium costatum.*

- Linn. S. N. Gen. 306. Sp. 73.  
 a Bornii test. mus. Vind. pag. 40.  
**192** Card. cost. testa albida, fulcis rufescentibus, valv. solitaria.  
 Chemn. Konch. Kab. T. 6. tab. 15. fig. 151. 152.  
 Long. 2 poll. 1 lin. lat. 3 poll. 10 lin.

*Cardium Cardissa.*

Linn. S. N. Gen. 306. Sp. 74.

a Bornii Test. mus. Vind. pag. 40. Tab. II. fig. 15-18.

- 193 C. Card. testa *lutescens*, margine muricato, lateribus *utrinque convexis*. Ind. Or.

Chenn. Konch. Kab. T. 6. tab. 14. fig. 143.

Long. 2 poll. 3. lin. lat. 2 poll.

- 194 C. Card. testa *albida*, carina crenulata, margine *minus* muricato, paulluluin detrita.

Chenn. loc. cit. fig. 144.

Long. 2 poll. 2 lin. lat. 2 poll.

*Cardium aculeatum.*

Linn. S. N. Gen. 306. Sp. 78.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 43.

- 195 C. ac. testa pallide rufescente, valide sulcata, spinosa, costis 21, spinis solidis subconicis. M. Mediterr.

Chenn. Konch. Kab. T. 6. tab. 15. fig. 155. 156.

Long. 2 poll. 8 lin. lat. 2 poll. 10 lin.

*Cardium echinatum.*

Linn. S. N. Gen. 306. Sp. 79.

- 196 C. ech. testa pallida *vulva fasciata*, longitudinaliter costata, costis 19 spinosis, sulcis transversim striatis. M. Mediterr.

Chenn. Konch. Kab. T. 6. tab. 15. fig. 158.

Long. 2 poll. lat. 1 poll. 11 lin.

- 197 C. ech. testa pallida *absque fasciis*, costata atque sulcata, sed sulcis transversum perobsolete modo striatis.

Long. 2 poll. lat. 2 poll. 2 lin.

*Cardium tuberculatum.*

Linn. S. N. Gen. 306. Sp. 81.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 44.

- 198 C. tub. testa *flavescente*, longitudinaliter sulcata ac costata, costis 22 aequae atque sulcis, transverse striatis. M. Mediterr.

Chenn. Konch. Kab. T. 6. tab. 17. fig. 173.

Long. 1 poll. 10 lin. lat. 1 poll. 10 lin.

- 199 C. tub. testa extus et intus *albida*, subinmaculata, margine inferiori, retusa.

Long. 1 poll. 10 lin. lat. 1 poll. 8 lin.

- 200 C. tab. testa *minus convexa*, subfulva, costata, costis *depressiusculis*, cavitate rosea, valv. solitar.  
Long. 2 poll. 3 lin. lat. 2 poll. 3 lin.

- 201 C. tuberculati varietates *minores*; valvulae *solitariae*.  
Long. maxim. 1 poll. 1 lin. lat. 1 poll. 2 lin.

*Cardium Isocardia.*

- Linn. S. N. Gen. 306. Sp. 82.  
a Bornii test. mus. Vind. pag. 45.  
202 C. Is. testa albida, subroseo ac virescente varia, costata, costis 37, squamosa, squamulis imbricatis confertim obtecta, valv. solit. Jamaica.  
Chemn. Konch. Kab. T. 6. tab. 17. fig. 175.  
Long. 2 poll. 6 lin. lat. 2 poll. 2 lin.

*Cardium Fragum.*

- Linn. S. N. Gen. 306. Sp. 83.  
a Bornii test. mus. Vind. pag. 42. Tab. III. fig. 3. 4.  
Cardium imbricatum.  
203 C. Fr. testa nivæ longitudinaliter costata, costis squamu-  
lis notatis citrinellis. Ind. Or.  
Chemn. Konch. Kab. T. 6. tab. 16. fig. 166.  
Long. 1 poll. 9 lin. lat. 1 poll. 3 lin.

*Cardium Unedo.*

- Linn. S. N. Gen. 306. Sp. 84.  
a Bornii test. mus. Vind. pag. 45.  
203b C. Un. testa *solida* sulcata, sulcis 30, marginæ valide  
dentato. Ind. Or.  
Chemn. Konch. Kab. T. 6. tab. 16. fig. 168. 169.  
Long. 1 poll. 11 lin. lat. 1 poll. 8 lin.  
204 C. Un. testa *tenuior* sulcata et costata, costis 32.  
Long. 1 poll. 7 lin. lat. 1 poll. 5 lin.

*Cardium Leucostomum Bornii.*

- a Born. test. mus. Vind. pag. 46. Tab. III. fig. 6.  
205 C. Leuc. testa pallida, rufo maculata, costis exarata lon-  
gitudinalibus 39, intus albida, limbo purpurascente.  
Ind. Occ.

Chemn. Konch. Kab. T. 6. tab. 12. fig. 179.  
Long. 1 poll. 10 lin. lat. 1 poll. 6 lin.

*Not.* Nomen specificum *Leucostomi*, plane adaequa-  
tum, propter varietatem in limbi colore, non esse,  
Cel.

Cel. Chemniz loc. cit pag. 187, jam monuit, quod specimen nostri descriptio adfirmat: sed hanc speciem Ill. a Bornii ad C. magnum Linn. pertinere, ut Chemn. loc. cit. putare videtur, ob numerum costarum supra computatum, arbitrari nequeo,

## MACTRA,

*Macra corallina.*

Linn. S. N. Gen. 307. Sp. 98.

- 206 M. cor. testa albida, fasciis coerulecentibus, transversim ac obsolete striata, valv. solit. Ind. Or.

Chemn. Konch. Kab. T. 6. tab. 22. fig. 220.

Long. 1 poll. 8 lin. lat. 2 poll.

*Macra stultorum.*

Linn. S. N. G. 307. Sp. 99.

- 207 M. st. testa extus flavescens, albo radiata, natibus vilaceis, intus undique violacea. M. Mediterr. 2.

Chemn. Konch. Kab. T. 6. tab. 23. fig. 224.

Long. 1 poll. 11 lin. lat. 2 poll. 6 lin.

*Macra glauca Bornii.*

a Bornii test. mus. Vind. p. 51. Tab. III. fig. II.

- 208 M. gl. testa pallida absque radiis, ano vulvaque subferrugineis, valva solit. Mare Lusitan.

Chemn. Konch. Kab. T. 6. tab. 23. fig. 232. 233.

Macra helva s. helvacea.

Long. 2 poll. 11 lin. lat. 3 poll. 10 lin.

## DONAX.

*Donax Scortum.*

Linn. S. N. Gen. 308. Sp. 102.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 53. Tab. IV. fig. I.

- 209 D. Sc. testa pallide flavescente, fasciis quibusdam lacteis transversis. Ind. Or.

Chemn. Konch. Kab. T. 6. tab. 25. fig. 245.

Long. 1 poll. 2 lin. lat. 1 poll. 8 lin.

- 210 D. Sc. testa paulo tenuiori, colore vario subradiato.

Long. 1 poll. lat. 1 poll. 7 lin.

- 211 D. Sc. testa ex ferrugineo alboque radiata, natibus subrufescentibus.

Long. 1 poll. 2 lin. lat. 1 poll. 8. lin.

- 212 D. Sc. testa fere ut anteced. radiata sed fasciis obscurioribus duabus transversis distincta.  
Long. 9 lin. lat. 1, poll. 2 lin.

*Donax rugosa.*

- Linn. S. N. Gen. 308. Sp. 104.  
213 D. rug. testa albida, violacea transversim fasciata, stria-  
ta, striis radiatis paullulum obsoletis. Mar. Mediterr.  
Chenn. Konch. Kab. T. 6. tab. 25. fig. 250,  
Long. 9 lin. lat. 1 poll. 3 lin,

*Donax Trunculus.*

- Linn. S. N. Gen. 308. Sp. 105.  
a Bornii test. mus. Vind. pag. 51. Tab. IV, fig. 3, 4.  
214 D. tr. testa *virescens*, albido radiata, natibus violaceo,  
M. Mediterr.  
Chenn. Konch. Kab. T. 6. tab. 26, fig. 253.  
Long. 10 lin. lat. 1 poll. 5 lin.  
215 D. Tr. testa *albida*, longitudinaliter radiata atque stria-  
ta. 2.  
Long. 7 lin. lat. 1 poll.

*Donax striata.*

- Linn. S. N. Gen. 308. Sp. 106.  
216 D. str. testa pallida, nebulose violacea, striata, striis na-  
tum tenuissimis, antice perobtusa. Oc. Europ. Austr.  
Chenn. Konch. Kab. T. 6. tab. 26, fig. 255.  
Long. 10 lin. lat. 1 poll. 8 lin.  
217 D. str. testa albida *inmaculata*.  
Long. 10 lin. lat. 1 poll. 4 lin.

*Donax denticulata.*

- Linn. S. N. Gen. 308. Sp. 107.  
a Bornii test. mus. Vind. pag. 55.  
218 D. dent. testa *læteæ*, *purpurascente punctato radiata*;  
intus violacea, alboque varia; margo anticu ex viola-  
ceo ater. Afric.  
Chenn. Konch. Kab. T. 6. tab. 26, fig. 256.  
Long. 8 lin. lat. 11 lin.  
219 D. dent. testa pallide *virescente*, intus splendidissime vi-  
lacea. 2.  
Long. 9 lin. lat. 1 poll. 1½ lin.

*Donax*

*Donax scripta.*

- Linn. S. N. Gen. 308. Sp. 109.
- 220 D. sc. testa albida *subviolaceo exangulata*, intus violacea limbo albido. Ind. Occ.  
Chemn. Konch. Kab. T. 6. tab. 26. fig. 261.  
Long. 9 lin. lat. 1 poll. 1 lin.
- 221 D. sc. testa pallida, characteribus *ferrugineis exangulata*.  
Chemn. loc. cit. fig. 261.  
Long. 6 lin. lat. 8½ lin.
- 222 D. sc. testa solidiori, albida *transversim striata*, angulis acutioribus *subviolaceis notata*.  
Long. 1 poll. 3 lin. lat. 1 poll. 10 lin.

## VENUS.

\*Pubentes.

*Venus Dione.*

- Linn. S. N. Gen. 309. Sp. 112.  
a Bornii test. mus. Vind. pag. 58.
- 223 V. D. testa albida sulcis valide purpureis exarata, spinulis quibusdam fractis. Ind. Occ.  
Chemn. Konch. Kab. T. 6. tab. 27. fig. 271.  
Long. 1 poll. 4 lin. lat. 1 poll. 5 lin.

*Venus Paphia.*

- Linn. S. N. Gen. 309. Sp. 113.  
a Bornii test. mus. Vind. pag. 58.
- 224 V. P. testa albida, ferrugineo subexangulata, rugis in-  
crassatis transversis, quarum tertia a margine superiore,  
angustissima. valva solit. Ind. Occ.  
Chemn. Konch. Kab. T. 6. tab. 27. fig. 274.  
Long. 1 poll. 4 lin. lat. 1 poll. 6 lin.

*Venus Mariae.*

- Linn. S. N. Gen. 309. Sp. 114.  
a Bornii test. mus. Vind. pag. 59. Tab. IV. fig. 5, 6.
- 225 V. M. testa albida, pallide purpurascente, margine crenulato.  
Chemn. Konch. Kab. T. 6. tab. 27. fig. 282.  
Long. 1 poll. lat. 1 poll. 3 lin.

♀ Impuberes subcordatae.

*Venus verrucosa.*

Linn. S. N. Gen. 309. Sp. 116.

a Born. test. mus. Vind. pag. 60. Tab. IV. fig. 7.

- 226 V. vere. testa extus pallide flavescente, intus albida macula antica purpurascente, cavitate subincarnata. Mar. Mediterr.

Chemn. Konch. Kab. T. 6. tab. 29. fig. 300.

Long. 1 poll. 7 lin. lat. 1 poll. 9 lin.

*Venus Cufina.*

Linn. S. N. Gen. 309. Sp. 117.

- 227 V. C. testa rugosa, pallida, fasciis lanceolatis extus varia, intus albida, in margine antico integro, superiore et postico autem crenulato. Ind. Or.

Chemn. Konch. Kab. T. 6. tab. 29. fig. 303.

Long. 2 poll. lat. 2 poll. 1 lin.

*Venus cancellata.*

Linn. S. N. Gen. 309. Sp. 118.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 61. Tab. IV. fig. 9.

- 228 V. canc. testa albida, maculis subincarnatis adspersa, Inf. Nicobar.

Chemn. Konch. Kab. T. 6. tab. 29. fig. 304. 305.

Long. 1 poll. 2 lin. lat. 1 poll. 5 lin.

- 229 V. canc. testa subincarnata, natibus violaceis.

Long. 8 lin. lat. 9 lin.

*Venus Gallina.*

Linn. S. N. Gen. 309. Sp. 118.

- 230 V. Gall. testa pallida, glauco variegata, vulva anaque subcorneis; intus tenuissime radiatim striata, cavitate carnea. Ind. Occ.

Chemn. Konch. Kab. T. 6. tab. 30. fig. 309.

Long. 1 poll. 2 lin. lat. 1 poll. 8 lin.

- 231 V. G. testa pallida, ferrugineo varia, radiis 2 albidis notata; intus albida, antice subpurpurascente maculata.

Long. 1 poll. lat. 1 poll. 2 lin.

*Venus circinnata Bornii.*

a Born. test. mus. Vind. pag. 61. Tab. IV. fig. 8.

- 232 V. circ. testa nebulose rufescens, convexa, solida, intus undique alba, margine interiore crenulato.

Chemn. Konch. Kab. T. 6. tab. 30. fig. 311.

Long. 1 poll. 1 lin. lat. 1 poll. 2 lin.

*Venus*

*Venus flexuosa.*

- Linn. S. N. Gen. 309. Sp. 121.  
 a Bornii test. mus. Vind. pag. 62. Tab. IV, fig. 10.  
 233 V. fl. testa tota albescente, valide minuta, valv. solit.  
 Chemn. Konch. Kab. T. 6. tab. 31. fig. 333.  
 Long. 8 lin. lat. 9 lin.

*Venus Erycina.*

- Linn. S. N. Gen. 309. Sp. 122.  
 234 V. Er. testa glauca albo fasciata, fusoque radiata, radiis  
 interruptis, margine, ano atque vulva incarnatis; intus,  
 limbo carneo excepto, undique albida, Ceylon.  
 Chemn. Konch. Kab. T. 6. tab. 32. fig. 337.  
 Long. 1 poll. 9 lin. lat. 2 poll. 2 lin.

*Venus Luforia Chemnitizii.*

- 235 V. L. testa candida, violaceo antice undulata, natibus fer-  
 rugineis. Ind. Or.  
 Chemn. Konch. Kab. T. 6. tab. 32. fig. 340. pag. 237.  
 Long. 2 poll. 4 lin. lat. 2 poll. 9 lin.

*Venus Islandica.*

- Linn. S. N. Gen. 309. Sp. 124.  
 236 V. Isl. testa epidermide virescente obsolete rugosa vesti-  
 ta, et ubi haec detrita, roseo alboque adparet fasciata;  
 ani loco area minus distincta.  
 Chemn. Konch. Kab. T. 6. tab. 32. fig. 341. 342.  
 Long. 3 poll. 4 lin. lat. 3 poll. 9 lin.  
 237 V. isl. testa absque epidermide; ani impressione distinctius  
 subcordata.  
 Long. 1 poll. 9 lin. lat. 2 poll.

*Venus Chione.*

- Linn. S. N. Gen. 309. Sp. 125.  
 a Bornii test. mus. Vind. pag. 63.  
 238 V. Ch. testa flavescens, badio radiata, intus albida. M.  
 Mediterr.  
 Chemn. Konch. Kab. T. 6. tab. 32. fig. 343.  
 Long. 2 poll. 5 lin. lat. 3 poll.

*Venus Meretrix.*

- Linn. S. N. Gen. 309. Sp. 127.  
a Bornii test. mus. Vind. pag. 65.
- 239 V. M. testa obsoleta, annulo circa nates albido, vulva glauca, badeo marginata. Ind. Or.  
Chenn. Konch. Kab. T. 6. tab. 33. fig. 349.  
Long. 1 poll. 7 lin. lat. 2 poll.
- 240 V. M. testa albida, pone nates coerulescente; valv. solit.  
Chenn. loc. cit. fig. 347.  
Long. 1 poll. 6 lin. lat. 1 poll. 11 lin.

*Venus laeta.*

- Linn. S. N. Gen. 309. Sp. 128.
- 241 V. l. testa pallide flavescens, alboque radiata, vulva ferruginea. Inf. Mauritiana.  
Chenn. Konch. Kab. T. 6. tab. 34. fig. 353.  
Long. 1 poll. 6 lin. lat. 1 poll. 11 lin.
- 242 V. l. testa pallida, ano ac vulva ferrugineo marginatis.  
Long. 9 lin. lat. 11 lin.
- 243 V. l. testa ex ferrugineo - flavescens, radiis albis angustissimis, labio utroque subviolaceo. valv. solit.  
Long. 2 poll. 2 lin. lat. 2 poll. 6½ lin.

*Venus nebulosa.*

- 244 V. neb. testa pallide rufescens, obsolete transversim stria-  
ta, radiata, radiis angustis 4, vulva e cinereo-coeru-  
lea. Ind. Or.  
Chenn. Konch. Kab. T. 6. tab. 34. fig. 359.  
Long. 1 poll. 1 lin. lat. 1 poll. 3 lin.
- 245 V. n. testa subincarnata, characteribus subviolaceis notata,  
Long. 1 poll. 1 lin. lat. 1 poll. 1 lin.
- 246 V. n. testa rufescens, albo radiata, radiis tribus haud  
angustis. valva solit.  
Long. 1 poll. 1 lin. lat. 1 poll. 4 lin.

*Venus cordato-literata.*

- 247 V. c. l. testa pallida, ferrugineo purpureo que notata, intus  
albida, margine interiore crenulato. Ind. Or.  
Chenn. Konch. Kab. T. 6. tab. 34. fig. 364.  
Long. 1 poll. 5 lin. lat. 1 poll. 6 lin.
- Not.* Inter Conchiliogistas solertissimus Chennitzius, huic  
speciei nomen dedit *Veneris literatae* sine ullo epi-  
theto. Cum autem species quaedam, familie huius  
generis quartae ab Immortali Linn. jam ita nominata  
fit, nomen speciei nostrae, a Chenn. optatum ad erro-  
rem evitandum, paullulum mutavimus.

*Venus*

*Venus striata Chemnitzii.*

- 248 V. str. testa pallide flavescentia, transversim rugosa, carmine violaceo. Inf. Frider.

Chemn. Konch. Kab. T. 6. tab. 34. fig. 365.

Long. 1 poll. 1 lin. lat. 1 poll. 4 lin.

*Venus castrensis.*

Linn. S. N. Gen. 309. Sp. 129.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 66.

- 249 V. castr. testa pallide lutea, characteribus badiis, transversim concatenatis, exangulata, intus albida immaculata. Ind. Or.

Chemn. Konch. Kab. T. 6. tab. 34. fig. 367.

Long. 1 poll. 9 lin. lat. 1 poll. 11 lin.

- 250 V. castr. testa nivea, characteribus subpurpureis notata, cavitate subincarnata.

Chemn. loc. cit. fig. 368.

Long. 1 poll. lat. 1 poll. 3 lin.

- 251 V. c. testa albida, characteribus ferrugineis angustioribus et confertissimis, exangulata, valva solit.

Long. 10 lin. lat. 1 poll.

- 252 V. c. testa albida, triangulis ferrugineis notata. Valva solit.

Chemn. loc. cit. fig. 369.

Long. 10 lin. lat. 12 lin.

*Venus deflorata.*

Linn. S. N. Gen. 309. Sp. 132.

a Born. test. mus. Vind. pag. 31. Tellina anomala.

- 253 V. defl. testa extus rugosa, nebulosa violacea, intus violacea, nymphis ex violaceo atris. Ind. Occ.

Chemn. Konch. Kab. T. 6. tab. 9. fig. 79.

Long. 10 lin. lat. 1 poll. 4 lin.

*Not.* Errorem Ill. Bornii, qui hanc Venerem ad Tellinas, nomine specifico recenti, reculit, cui Chemn.

Soleit. loc. cit. pag. 64 adientiebat, idem primus quoque T. 7. pag. 59. rursum emendavit.

- 254 V. defl. testa alba, undique rugosa, antice submureata, parum violacea, nymphis peratris. — Hanc concham, colore violaceo etiam ornatam fuisse, hunc in posterum autem sensim in albidum mutatum esse, arbitrari fere coacti sumus.

Long. 1 poll. 4 lin. lat. 2 poll.

255 V. defl. testa pallide lutea, tam extus, quam intus, antice subatro maculata.

Chemni. Konch. Kab. T. 6. tab. 9. fig. 82.

Long. 10 lin. lat. 1 poll. 4 lin.

*Venus fimbriata.*

Linn. S. N. Gen. 309. Sp. 133.

256 Venus fimbriata, testa albida, ad regionem vulvae et anum tantum subroseo maculata, intus nivea, cavitate lucescente. Jnd. Or.

Chemni. Konch. Kab. T. 7. tab. 43. fig. 448. 449.

Long. 1 poll. 11 lin. lat. 2 poll. 7 lin.

*Venus Puerpera.*

Linn. Mantissa alt. pag. 544.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 69. Venus reticulata.

257 Venus Puerpera, testa pallida, antice subfuscō maculata; intus albida, supra vulvam, macula violacea falciformis. Jnd. Or.

Chemni. Konch. Kab. T. 6. tab. 36. fig. 388.

Long. 2 poll. 8 lin. lat. 2 poll. 10 lin.

*Not.* Quam Venērem, Perill. a Born. pro V. reticulata Linn. habuisse, Chemnitzius studiosissimus; loc. cit. pag. 375. probavit.

*Venus cincta Chemnitzii.*

258 Venus cincta, testa albida, antice ferrugineo variegata obsolete crenulata.

Chemni. Konch. Kab. T. 6. tab. 36. fig. 387.

Long. 1 poll. lat. 1 poll.

*Venus squamosa.*

Linn. S. N. Gen. 309. Sp. 135.

259 Venus squamosa, testa suborbicularis, depressa, pallida, squamosa; squamulis sublunatis atque imbricatis, ad marginem superiorem in laminam confluentibus, tecta. Margo integerrimus; nates se invicem tangentes obsoletae. Rima oblonga, labiis antice prominetibus, nymphis subretractis, longis atque crassiuseculis; Anus longitudinalis subovatus. Cardinis dentes 3, intermediis bifidis, lateralibus in altera valva solidissimis. Color internus albus immaculatus. Oc. Jnd.

Long. 2 poll. 8 lin. lat. 2 poll. 8 lin.

*Not.*

*Not.* Hanc speciem in Chemnitzii opere praestantissimo,  
frustra quaesiv.

\*\*\* Impuberes orbiculatae.

*Venus tigerina.*

Linn. S. N. Gen. 309. Sp. 136.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 70.

260 *Venus tigerina*, testa albida, intus lutea, ano, vulva atque limbo haud anguste rufis. Ind. Or.

Chemn. Konch. Kab. T. 7. tab. 37. fig. 390. 391.

Long. 2 poll. 11 lat. 3 poll. 2 lin.

*Venus concentrica.* Born.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 71. Tab. V. fig. 5.

261 *Venus concentrica*, testa extus lutescens, sulcata, fulcis concentricis, intus cretacea. Oc. Amerie.

Chemn. Konch. Kab. T. 7. tab. 37. fig. 392.

Long. 2 poll. 4 lin. lat. 2 poll. 5 lin.

*Venus pensylvanica.*

Linn. S. N. Gen. 309. Sp. 138.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 72. Tab. V. fig. 8.

262 *Venus pensylvanica*, testa nivea unicolor fragilissima et extus et intus obsolete striata. Ind. Occ.

Chemn. Konch. Kab. T. 7. tab. 37. fig. 393.

Long. 1 poll. lat. 1 poll. 4 lin.

*Venus pectinata.*

Linn. S. N. Gen. 309. Sp. 149.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 79.

263 *Venus pectinata*, testa albida, ferrugineo maculata, nodose striata, striis 21 et in area antica 12. Tranquebar.

Chemn. Konch. Kab. T. 7. tab. 39. fig. 417.

Long. 1 poll. lat. 1 poll. 1 lin.

264 *Venus pectinata*, testa pallida, ferrugineo exangulata, cavitate interna, incarnata. 3.

Long. 9 lin. lat. 1 poll.

\*\*\* Impuberes ovales, supra rimatu subangulatae.

*Venus literata.*

Linn. S. N. Gen. 309. Sp. 147.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 74.

265 *Venus literata*, testa pallide rufescens, angulis fuscis tenuissimis *perdense* notata; intus subincarnata, limbo albidio, valva solit. Jnd. Or.

Chenn. Konch. Kab. T. 7. tab. 41. fig. 432.

Long. 2 poll. 5 lin. lat. 3 poll. 10 lin.

266 *Venus literata*, testa rufescens, characteribus angulata remotioribus, cavitate incarnata. Jnf. Nicob.

Chenn. loc. cit. fig. 433.

Long. 1 poll. 7 lin. lat. 2 poll. 5 lin.

267 *Venus literata*, testa pallida, *fusco et purpurascente exangulata* atque maculata.

Chenn. loc. cit. fig. 434.

Long. 2 poll. 3 lin. lat. 3 poll. 7 lin.

268 *Venus literata*, testa pallida antice *subferrugineo maculata* postice exangulata, cavitate lutea. 2.

Long. 2 poll. 1 lin. lat. 3 poll. 1 lin.

269 *Venus literata* testa *gibbosior*, pallida, maculis fuscis adpersa, cavitate subincarnata.

Chenn. loc. cit. fig. 435. V. Nocturna.

Long. 2 poll. 3 lin. lat. 3 poll. 3 lin.

### *Venus punctata* Chenn.

270 *Venus punctata*, testa pallida, transverse striata tenuis et perfragilis, punctis subferrugineis extus adpersa; intus albida, cavitate lutea. Nicob.

Chenn. Konch. Kab. T. 7. tab. 42. fig. 436.

Long. 1 poll. 2 lin. lat. 1 poll. 10 lin.

### *Venus Textrix* Chenn.

271 *Venus Textrix*, testa *subincarnata*, characteribus nebuloso purpurascens exangulata, ano atque vulva albidis, notis splendidissime purpureis, oblitteratis. Malabar.

Chenn. Konch. Kab. T. 7. tab. 42. fig. 442.

Long. 1 poll. 3 lin. lat. 2 poll. 6 lin.

272 *Venus Textrix* testa *lutescens*, characteribus rufescensibus notata. 2.

Long. 1 poll. 3 lin. lat. 2 poll. 4 lin.

*Venus*

*Venus rotundata.*

Linn. S. N. Gen. 309. Sp. 148.

- 273 *Venus rotundata*, testa subincarnata, radiata, *radiis 4 haud angustis* fuceſcentibus luteo interruptis, transverſe fulcata, fulcis depreſſis 60 pluribus concentricis. Ceylon. 2.

Chemn. Konch. Kab. T. 7. tab. 42. fig. 441.

Ala Papilionis.

Long. 2 poll. lat. 3 poll. 8 lin.

- 274 *Venus rotundata* varietas, *radiis deletis*, *fulcis quinquaginta* et anno cordato; intus albida antice posticeque pallide violacea.

Long. 1 poll. 6 lin. lat. 2 poll. 3 lin.

*Venus decussata.*

Linn. S. N. Gen. 309. Sp. 149.

a Born. test. mus. Vind. pag. 63. Tab. V. fig. 2. 3. V. deflora-

- 275 *Venus decussata* testa albida, *extus immaculata*, intus ante violacea maculata. M. Mediterr.

Chemn. Konch. Kab. T. 7. tab. 43. fig. 455.

Long. 1 poll. 4 lin. lat. 1 poll. 11 lin.

- 276 *Venus decussata* testa albida *ferrugineo variegata*, intus vix antice parum violacea, striis decussatis magis confer- tis. 2.

Long. 1 poll. 1 lin. lat. 1 poll. 6 lin.

## SPONDYLUS.

*Spondylus Gaederopus.*

Linn. S. N. Gen. 310. Sp. 151.

a Born. test. mus. Vind. pag. 77.

- 277 *Spondylus Gaederopus*, testa *aculeis operculi splendidissi- me purpureis*.

Chemn. Konch. Kab. T. 7. tab. 44. fig. 459.

Long. 3 poll. 11 lin. lat. 3 poll. 2 lin.

- 278 *Spondylus Gaederopus*, testa pallida antice rufescens, *na- tibus quam maxime inaequalibus*, intus albida limbo purpureo. Mar. Chinens.

Chemn. loc. cit. fig. 461.

Long. 5 poll. 5 lin. lat. 3 poll. 6 lin.

279 *Spondylus Gaederopus operculo magis gibbo quam in praeced., nate valvae convexioris permagna atque curvata.* M. Rubr.

Chemn. loc. cit. fig. 460.

Long. 3 poll. 4 lin. lat. 2 poll. 9 lin.

*Spondylus variegatus Chemn.*

280 *Spondylus variegatus*, testa ex *albido ferrugineo* que pulcherrime *undulata*, limbo crenulato ac purpurascente. Jnd. Or.

Chemn. Konch. Kab. T. 7. tab. 45. fig. 464.

Long. 2 poll. 3. lin. lat. 2 poll. 1 lin.

281 *Spondylus variegatus* testa characterum vñdatorum loco, striis longitudinalibus ex purpureo-fuscis varia, limbo obscuriore.

Long. 3 poll. lat. 2 poll. 6 lin.

282 *Spondylus variegatus*, testa striis longitudinalibus in radios mutatis variegata.

Long. 3 poll. lat. 2 poll. 10 lin.

*Not.* Valva superior apice paullulum destrueta videtur.

283 *Spondylus variegatus*, testa aculeorum loco, squamis patulis elevatis armata.

Long. 1 poll. 10 lin. lat. 1 poll. 8 lin.

*Spondylus plicatus.*

Linn. S. N. Gen. 310. Sp. 153.

a Born. test. mus. Vind. pag. 78.

284 *Spondylus plicatus*, testa subdiaphana, albida, striis aurantiis notata, plicis 7 formata. Jnd. Occ.

Chemn. Konch. Kab. T. 7. tab. 47. fig. 481.

Long.  $10\frac{1}{2}$  lin. lat. 9 lin.

CHAMA.

*Chama Gigas.*

Linn. S. N. Gen. 311. Sp. 2.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 60.

285 *Chama Gigas*, testa *albida*, squamosa in seribus, squamis cujuscunque seriei 13, ano perhiante cordato, Madreporis et serpulis multis obtecta. Jnd. Or.

Chemn. Konch. Kab. T. 7. tab. 49. fig. 494.

Long. 5 poll. 6 lin. lat. 10 poll.

286 Chame

- 286 Chama Gigas, testa *lutescens*, sulcis crenulatis. 2.  
 Long. 3 poll. 3 lin. lat. 5 poll. 8 lin.  
*Not.* Altera squamis destructis, altera autem bene conservatis.
- 287 Chama Gigas, testa valide plicata, *squamis perlongis obfessa*.  
 Long. 2 poll. 10 lin. lat. 3 poll. 9 lin.
- 288 Chama Gigas, testae areola postica squamarum angustiorum seriebus quinque utrinque testa.  
 Long. 2 poll. 6 lin. lat. 4 poll. 2 lin.
- 289 Chama Gigas, testa pallida, *ad marginem superiorem rufescens*.  
 Long. 1 poll. 3 lin. lat. 2 poll. 6 lin.
- 290 Chama Gigas, testa squamis quaque serie quinquaginta planiusculis munita, rugis minus plicatis.  
 Chemn. loc. cit. fig. 496.  
 Long. 3 poll. lat. 4 poll. 3 lin.

### CHAMA HIPPOPUS.

- Linn. S. N. Gen. 311. Sp. 156.  
 a Bornii test. mus. Vind. pag. 81.
- 291 Chama Hippopus, testa albida sanguineo maculata. Jnd. Or.  
 Chemn. Konch. Kab. T. 7. tab. 50. fig. 498.  
 Long. 1 poll. 1 lin. lat. 1 poll. 11 lin.
- 292 Chama Hippopus, testa *spinis undique*, in primis autem margine posteriori, majoribus.  
 Long. 1 poll. 4 lin. lat. 2 poll. 1 lin.

### Chama gryphoides.

- Linn. S. N. Gen. 311. Sp. 165.  
 a Bornii test. mus. Vind. pag. 84.
- 293 Chama gryphoides, testa extus undique purpurascentia, insula albida, ad limbum superiorem purpurea, posticeque obsoleta striata. Jnd. Occ.  
 Chemn. Konch. Kab. T. 7. tab. 52. fig. 514.  
 Macerophylla.  
 Long. 2 poll. 2 lin. lat. 2 poll. 1 lin.

*Chama bicornis.*

Linn. S. N. Gen. 311. Sp. 166.

- 294 *Chama bicornis*, valvula tantum inferior, pallida, lamellis permultis rugosa. Jnd. Or.

Chemn. Konch. Kab. T. 7. tab. 52. fig. 515.

Long. 2 poll. 3 lin. lat. 2 poll.

*Chama lamellosa Chemn.*

- 295 *Chama lamellosa*, testa *albida* intus rufescente maculata. valv. solitar. Jnd. Or?

Chemn. Konch. Kab. T. 7. tab. 52. fig. 521.

Long. 1 poll. 3 lin. lat. 11 lin.

- 296 *Chama lamellosa*, testa *cinerascens*, lamellis 15 transversim rugosa.

Long. 1 poll. lat. 10 lin.

## ARCA.

\* Margine integro; Natibus inflexis.

*Arca Noae.*

Linn. S. N. Gen. 312. Sp. 169.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 88.

- 297 *Arca Noae*, testa *flavescens*, intus albida, obsolete striata, limbo flavo. Litt. Guin.

Chemn. Konch. Kab. T. 7. tab. 53. fig. 529.

Long. 1 poll. 3 lin. lat. 2 poll. 10 lin.

- 298 *Arca Noae*, testa *exastro-fusca*, striis latioribus rugosa, epidermide aequa atque anteced. denudata.

Long. 1 poll. 3 lin. lat. 2 poll. 3 lin.

- 299 *Arca Noae*, testa *validius rugosa*; milleporis nec non serpulis obtecta, valv. sol.

Long. 11 lin. lat. 2 poll. 5 lin.

- 300 *Arca Noae*, testa *pallida*, *crenulata*, arca interjecta colore fusco.

Long. 7 lin. lat. 1 poll. 2 lin.

*Arca barbata.*

Linn. S. N. Gen. 312. Sp. 170.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 89.

- 301 *Arca barbata*, testa, margine superiore, attenuata, epidermide pone aperturam paullulum destituta. Jnd. Or.

Chemn. Konch. Kab. T. 7. tab. 54. fig. 535.

Long. 11 lin. lat. 1 poll. 8 lin.

302 *Arca*

- 302 *Arca barbata*, testa, epidermide ad marginem anticum potius lamelloso, quam villoso, vestita, intus violacea.  
Long. 9 lin. lat. 1 poll. 5 lin.

\*\* Margine crenato; natibus recurvatis.

*Arca rostrata Chemn.*

- 303 *Arca rostrata*, testa epidermide virescente adhuc vestita.  
M. Norweg.

Chenn. Konch. Kab. T. 7. tab. 55. fig. 550.  
Long. 6½ lin. lat. 1 poll. 2 lin. in 2 plo.

- 304 *Concretio marina* cum Arcis talibus, quarum cardinis dentes lynceo tantum conspicuntur oculo.

*Not.* Quod specimen magis adhuc sententiam Cel. Chemnitizii confirmat, qui hanc Arcam pro concha marina nec fluviatili ut antea habet. vid. l. c. pag. 290.

*Arca nivea Chemn.*

- 305 *Arca nivea*, testa epidermide destituta, extus aequa ac intus nivea, crenulato striata, intus striis perobsoletis radiata.  
M. rubr.

Chenn. Konch. Kab. T. 7. tab. 54. fig. 538.  
Long. 1 poll. 1 lin. lat. 2 poll.

*Arca Modiolus.*

Linn. S. N. Gen. 312. Sp. 171.

- 306 *Arca Modiolus*, testa fusca, extus crenulata, intus obsolete striata, natibus albis. Jnd. Or.

Chenn. Konch. Kab. T. 7. tab. 54. fig. 534.  
Long. 10 lin. lat. 1 poll. 4 lin.

- 307 *Arca Modiolus*, testa ferruginea, radiis 2 albidis varia; valvula solitar.

Long. 9 lin. lat. 1 poll. 1 lin.

*Arca Rhomboidalis* ♂. Orient. Chenn.

- 308 *Arca Rh.* testa nivea, natibus lutescentibus. Tranquebar,  
Chenn. Konch. Kab. T. 7. tab. 55. fig. 552.  
Long. 1 poll. 5 lin. lat. 1 poll. 9 lin.

- 309 *Arca Rh.* testa *nivea immaculata*, cardine fusco.

Long. 1 poll. 1 lin. lat. 1 poll. 4 lin.

*Arca granosa.*

Linn. S. N. Gen. 312. Sp. 176.

- 310 *Arca granosa*, testa albida sulcata, fulcis anterioribus glabris, reliquis autem permuricatis viginti et quinque. Tranquebar.

Chemn. Konch. Kab. T. 7. tab. 56. fig. 557.

Long. 2 poll. lat. 2 poll. 5 lin.

## OSTREA.

\* *Pectines auriculati, aequilateres.**Ostrea maxima.*

Linn. S. N. Gen. 313. Sp. 185.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 98.

- 311 *Ostrea maxima*, testa ex albo rubescens, sulcata, radiata atque striata, radiis 16 divergentibus, nec non transverse sulcata, fulcis 4 margini superiori parallelis. Oc. Norweg.

Chemn. Konch. Kab. T. 7. tab. 60. fig. 585.

Long. 6 poll. 8 lin. lat. 5 poll. 1 lin.

- 312 *Ostrea maxima*, testa superior apicem versus striis exangulatis albidis varia.

Long. 3 poll. 5 lin. lat. 4 poll.

- 313 *Ostrea max.* operculum, cuius basis valde depressa; conglomerato arenario tegitur.

Long. 4 poll. 3 lin. lat. 4 poll. 10 lin.

*Ostrea Jacobaea.*

Linn. S. N. Gen. 313. Sp. 186.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 98.

- 314 *Ostrea jacobaea*, testa radiis 14 majoribus munita, fulcis 2-5 longitudinalibus striatis. M. Mediterr.

Chemn. Konch. Kab. T. 7. tab. 60. fig. 588.

Long. 4 poll. 7 lin. lat. 5 poll. 8 lin.

- 315 Ostr. Jac. testa radiis 14 elevata, in medio fere ambarum valvarum, fulco margini superiori parallelo, rugosa.

Long. 2 poll. 6 lin. lat. 3 poll.

- 316 Ostr. Jac. testa radiis 12 majoribus, transversim quadrifariam in medio sulcata.

Long. 2 poll. 8 lin. lat. 2 poll. 6 lin.

317 Ostr.

317 Ostr. Jac. testa radiis potius rotundatis quam angulatis, quadrifariam sulcatis et ponē marginem superiorem cremulatis.

Long. 3 poll. 7 lin. lat. 3 poll. 3 lin.

*Ostrea Ziczac.*

Linn. S. N. Gen. 313. Sp. 187.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 99.

318 Ostrea Ziczao, fornix ex brunneo flavescens, apicem versus albidus, operculum extus purpureum, albido pulcherrime exangulatum; intus albescens, annulo obscure purpureo, circa cavitatem,

Chenn. Konch. Kab. T. 7. tab. 61. fig. 590.

Long. 2 poll. 4 lin. lat. 2 poll. 5 lin.

*Ostrea Pleuronectes.*

Linn. S. N. Gen. 313. Sp. 190.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 99.

319 Ostrea Pleuronectes, Operculum extus rufum, striis obsole-tissimis albidis radiatum, fornix extus lacteus, valv. utra-que autem interne nivea, radiata, radiis 36 elevatis, limbo luteo. Ind. Or.

Chenn. Konch. Kab. T. 7. tab. 62. fig. 596.

Amus. Japonicum maximum.

Long. 5 poll. lat. 5 poll. 1 lin.

320 Ostr. Pl. testa limbo antice duntaxat et postice luteo.

Long. 4 poll. 6 lin. lat. 4 poll. 6 lin.

321 Ostr. Pl. testa major auribus roseis, radiis 22 linearibus atque obscuris.

Chenn. loc. cit. fig. 595.

Long. 3 poll. 3 lin. lat. 3 poll. 3 lin.

322 Ostr. Pl. operculum extus radiis 22 linearibus usque ad marginem superiorem distinctis, auribus et limbo roseis; fornix undique albida.

Long. 1 poll. 10 lin. lat. 1 poll. 9 lin.

*Ostrea Plica.*

Linn. S. N. Gen. 313. Sp. 192.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 101.

- 323 *Ostrea Plica*, testa fornice albo punctis ex brunno flavescientibus vario, operculo albido, sanguineo, striato. Ind. Or.

Chenn. Konch. Kab. T. 7. tab. 62. fig. 598. a. b.  
Long. 1 poll. 7 lin. lat. 1 poll. 6 lin.

\*\* *Pectines*, auricula altera intus ciliata - spinosa.

*Ostrea Pallium.*

Linn. S. N. Gen. 313. Sp. 193.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 101.

- 324 *Ostrea Pallium*, testa radiata, radiis 14 majoribus albidis ferrugineo undatis, intus albida, limbo plicato, aurantio violaceo que, alterne maculato. Ind. Or.

Chenn. Konch. Kab. T. 7. tab. 64. fig. 607.  
Long. 2 poll. 4 lin. lat. 2 poll. 2 lin.

- 325 Ostr. Pall. testa intus *radiis violaceis*. 2.

Long. 1 poll. 11 lin. lat. 1 poll. 10 lin.

- 326 Ostr. Pall. testa nivea, fusco maculata, auribus *intus roseo adspersis*.

Long. 10 lin. lat. 9 lin.

*Ostrea sulcata Bornii.*

a Bornii test. mus. Vind. pag. 103. Tab. VI. fig. 3.

- 327 *Ostrea sulcata*, testa fornice albido immaculato, operculo albido spadiceo variegato, costis 12 convexis radiata.

Chenn. Konch. Kab. T. 7. tab. 65. fig. 614.

Pallium Seminionis.

Long. 1 poll. 3 lin. lat. 1 poll. 4 lin.

*Ostrea cinnabarina Bornii.*

a Bornii test. mus. Vind. pag. 103.

- 328 *Ostrea cinnabarina*, testa splendidissime miniata, radiatim sulcata, sulcis 100 et pluribus. Oc. Island.

Chenn. Konch. Kab. T. 7. tab. 65. fig. 614, 615.  
Pecten Islandicus.

Long. 3 poll. 2 lin. lat. 3 poll.

*Ostrea citrina.*

- 329 *Ostrea citrina*, testa sulcata sed tamen laevis nec rugosa nec squamosa, operculo rubro transversim quoque striato, fornice undique fere citrino, valvula utraque intus albida violaceo maculata. Ind. Or.

Chenn. Konch. Kab. T. 7. tab. 65. fig. 618.

Long. 1 poll. 6 lin. lat. 1 poll. 7 lin.

*Ostrea*

*Ostrea varia.*

- Linn. S. N. Gen. 313. Sp. 199.  
 a Bornii test. mus. Vind. pag. 104.
- 330 *Ostrea varia*, testae *purpurascens* fornix atque operculum intus cum oculo violaceo. M. Mediterr.  
 Chemn. Konch. Kab. T. 7. tab. 66. fig. 633.  
 Long. 2 poll. 2 lin. lat. 2 poll. 1 lin.
- 331 Ostr. var. *testa albida* striis transversalibus ex aurantio-ferrugineis, intus decolor.  
 Long. 1 poll. 7 lin. lat. 1 poll. 8 lin.
- 332 Ostr. var. testa pallida *fusco undulata*, radiis viginti et quinque munita.  
 Chemn. loc. cit. fig. 634.  
 Long. 1 poll. 9 lin. lat. 1 poll. 7 lin.
- 333 Ostr. var. testa extus albida, *violaceo nebulosa*, intus violacea limbo pallido.
- 334 Ostr. var. testa squamis radiorum *magis elevatis*; valvula altera serpula inhaerente,  
 Long. 1 poll. 6 lin. lat. 1 poll. 2 lin.
- 335 Ostr. var. testa *radiis albis squamulis fuscis*, obtectis.  
 Long. 1 poll. 5 lin. lat. 1 poll. 2 lin.
- 336 Ostr. var. valva utraque *ex amethystina purpurascens*, natibus albis, squamulis minimis obfusca.

*Ostrea solaris Barnii.*

- a Bornii test. mus. Vind. pag. 106. Tab. VI. fig. 4.
- 337 *Ostrea solaris*, testa colore aurantio splendidissimo, radiata, radiis 20 in binis valvulis; intus pallida; regio carinis violaceo notata. M. Adriat.  
 Chemn. Konch. Kab. T. 7. tab. 67. fig. 638.  
 Long. 1 poll. 5. lin. lat. 1 poll. 6 lin.

*Ostrea glabra.*

- Linn. S. N. Gen. 313. Sp. 201.
- 338 *Ostrea glabra*, testa subcostata, costis 10 obsoletissimis, valvula utraque in medio quasi transversaliter duplicata, auribus rugosis. Color operculi brunnascens, maculis albis exangulatis; fornicis pallide flavescens striis albidis. Mar. Mediterr.  
 Chemn. Konch. Kab. T. 7. tab. 67. fig. 642.  
 Long. 1 poll. 6 lin. lat. 1 poll. 7 lin.

*Ostrea opercularis.*

Linn. S. N. Gen. 313. Sp. 202

a Born. test. mus. Vind. pag. 106.

339 *Ostrea opercularis, testa fornicalis, transversaliter fasciata,*  
Litt. Angl.

Chemn. Konch. Kab. T. 7. tab. 67. fig. 646.

Long. 2 poll. 5 lin. lat. 2 poll. 6 lin.

340 *Ostr. op. testa tam fornicalis quam opercularis albescens  
rubroque undulata. Fornix multis inhabitatur serpulis.*  
Long. 2 poll. 5 lin. lat. 2 poll. 9 lin.341 *Ostr. op. testa opercularis intus albescens violacea; for-  
nicalis undique albida.*  
Long. 1 poll. 5 lin. lat. 1 poll. 6 lin.342 *Ostr. op. fornice et extus et intus candida, operculum  
niveum, extus maculis subroseis.*  
Long. 1 poll. 6 lin. lat. 1 poll. 6 lin.*Ostrea undata Bornii.*

a Born. test. mus. Vind. pag. 108. tab. VII. fig. 2.

343 *Ostrea undata, testa extus alba fuscoque varia, intus pone  
cardinem subroseo maculata. Valv. solit.*  
Chemn. Konch. Kab. T. 7. tab. 67. fig. 647.  
Long. 1 poll. 6 lin. lat. 1 poll. 5 lin.

\*\*\* Pectines valvulis altero latere magis gibbis.

*Ostrea Lima.*

Linn. S. N. Gen. 313. Sp. 206.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 109.

344 *Ostrea Lima, testa undique nivea, radiatim costata, costis  
squamulis imbricatis ac patulis, obsefisis, auribus inaequa-  
libus. Ind. Or.*

Chemn. Konch. Kab. T. 7. tab. 68. fig. 651.

Long. 1 poll. 10 lin. lat. 1 poll. 6 lin.

*Obs. 1. Specimen per bene conservatum.**Obs. 2. Cel. Chemnitz. loc. cit. pag. 351. hujus Ostr. auricu-  
lae aequales esse docuit, sed spec. nostrum obser-  
vationi Perill. Bornii respondet, qui inaequalitatem  
earum jam (l. c.) animadvertisit. Spec. nostri auricula  
altera enim, alteram duplo feret superat.*

\*\*\*\* Rudes, vulgo Ostreae dictae,

*Ostrea Malleus.*

Linn. S. N. Gen. 313. Sp. 207.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 111.

- 345 *Ostrea Malleus*, testa ex fusco-nigra, extus rudissima, Ind. Or. Chemn. Konch. Kab. T. 7. tab. 70. fig. 655.  
Long. 5 poll. 5 lin. lat. 5 poll. 10 lin.

*Ostrea Edulis.*

Linn. S. N. Gen. 313. Sp. 211.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 114.

- 346 *Ostrea edulis*, testa intus albida, extus obscurior, Lepas  
dibus obsessa. valv. solit. M. Norweg.  
Chemn. Konch. Kab. T. 7. tab. 74. fig. 682.  
Long. 3 poll. lat. 3 poll. 1 lin.

- 347 *Ostr. ed. valva solitaria serpulis nonnullis, et lapide are-*  
*nario obtusiusculo obtecta.*  
Long. 3 poll. 10. lin. lat. 3 poll.

*Ostrea semiaurita.*

Linn. S. N. Gen. 313. Sp. 212.

Gualt. test. tab. 84, fig. H.

- 348 *Ostrea semiaurita*, testa glabra ex purpurascente-fusca, ocello  
permagno margaritaceo.  
Long. 1 poll. 9 lin. lat. 1 poll. 1 lin.

ANOMIA.

*Anomia Ephippium.*

Linn. S. N. Gen. 314. Sp. 218.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 117.

- 349 *Anomia Ephippium*, testa subuplicata, rugosa, intus ex albe-  
cente lutea, perlucida. M. Mediterr.  
Chemn. Konch. Kab. T. 8. tab. 76. fig. 692. 293.  
Long. 1 poll. 4 lin. lat. 1 poll. 9 lin.

*Anomia Cepa.*

Linn. S. N. Gen. 314. Sp. 219.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 117.

- 350 *Anomia Cepa*, testa rugosa plicata, colore amethystino, ser-  
pulis obtecta. M. Mediterr. valv. solit. plures.  
Chemn. Konch. Kab. T. 8. tab. 76. fig. 694. 695.  
Long. 1 poll. 9 lin. lat. 1 poll. 11 lin.

*Anomia*

*Anomia electrica.*

- Linn. S. N. Gen. 314. Sp. 220.  
 a Bornii test. mus. Vind. pag. 118.
- 351 *Anomia electrica*, valva inferior extus paullulum concava  
 seu in medio depresso.  
 Long. 1 poll. 6 lin. lat. 1 poll. 6 lin.
- 352 *Anomia electrica*, testa luteo-cens, valv. solit. 2.  
 Long. 1 poll. 1 lin. lat. 1 poll. 4 lin.

*Anomia truncata.*

- Linn. S. N. Gen. 314. Sp. 229.  
 a Bornii test. mus. Vind. pag. 118. T. VI. fig. 13.
- 353 *Anomia truncata*; testa pallida, altera striata subcrenulata,  
 altera autem laevis fragilissima ac perlucida. Litt. Norweg.  
 Chemn. Konch. Kab. T. 8. tab. 77, fig. 701.  
 Long. 1 poll. lat. 11 lin.
- 354 *Anomia trunc.* testa fragmento Lepidis Tintinnabuli ad-  
 fixa, cui adhuc Lepas balanoides inhaeret.  
 Long. 1 poll. 3 lin. lat. 1 poll. 2 lin.

*Anomia Caput Serpentis.*

- Linn. S. N. Gen. 314. Sp. 236.  
 a Bornii test. mus. Vind. pag. 119. Tab. VI. fig. 19.
- 355 An. Cap. Serp. testa undique libera, rostro cardinis distin-  
 ctissimo. M. Norweg. 2.  
 Chemn. Konch. Kab. T. 8. tab. 28, fig. 712.  
 Long. 6 lin. lat. 5 lin.
- 356 An. C. S. testa superior ligamento ipsius, madreporae ad-  
 nata.  
 Long. 9 lin. lat. 7 lin.

*Anomia Terebratula.*

- Linn. S. N. Gen. 314. Sp. 237.
- 357 A. T. testae 2 fuscae, Madreporae proliferae quoque in-  
 haerentes.  
 Long. 11 lin. lat. 8 lin.
- 358 A. T. testa flavescens, transversim obsolete striata, callo  
 marino adfixa.  
 Long. 11 lin. lat. 10 lin.

*Anomia Placenta.*

- Linn. S. N. Gen. 314. Sp. 241.  
 a Bornii test. mus. Vindob. pag. 120.

359 *Anomia*

359 Anomia Placenta testa albida obsolete radiata, radiis linearibus *vix conspicuis*, perfragilis ac pellucida. Tranquebar.

Chemn. Konch. Kab. T. 8. tab. 79. fig. 716.

Long. 3 poll. 7 lin. lat. 4 poll.

360 A. P. testa striis transversilibus *vicinioribus* et *intus conspicuis*.

Long. 2 poll. 2 lin. lat. 2 poll. 2 lin.

### MYTILUS.

\*Parasitici, unguibus adfixi.

#### *Mytilus Criſta Galli.*

Linn. S. N. Gen. 315. Sp. 243.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 122.

361 M. C. G. testa extus *ferruginea*, intus albicans plicis 7 majoribus. Ind. Or.

Chemn. Konch. Kab. T. 8. tab. 75. fig. 683.

Long. 2 poll. 2 lin. lat. 1 poll. 9 lin.

362 M. C. G. testa *nebulose brunaſcens*, plicis minus elevatis.

Long. 1 poll. 6 lin. lat. 2 poll.

*Obs.* Linea subulata atque excavata Mytilorum longitudinalis, de qua loquitur Linn. Immort. in characteribus Mytili genericis, paullulum *diffinſior*.

#### *Mytilus Hyotis.*

Linn. S. N. Gen. 315. Sp. 244.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 122.

363 M. H. testa obscurior squamis omnibus fere truncatis. Ind. Or.

Chemn. Konch. Kab. T. 8. tab. 75. fig. 685.

Long. 2 poll. 1 lin. lat. 1 poll. 10 lin.

\*\*Plani seu compressi, ut plani adpareant et subauriti.

#### *Mytilus margaritiferus.*

Linn. S. N. Gen. 315. Sp. 246.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 123.

364 M. marg. testa natibus *graminei coloris*, limbo **ex** virecente fusco. M. rubr.

Chemn. Konch. Kab. T. 8. tab. 80. fig. 718.

Long. 3 poll. 3 lin. lat. 3 poll. 4 lin.

365 M.

365 M. marg. valv. persolida, *solitaria et foecunda*, sic cum iis loquor, qui ab Oeconomia devisiones conchiologicas atque nomina mutuari cupiunt.

Optimam hac de re sententiam Chemnitzii v. l. c. pag. 130.

Long. 5 poll. 6 lin. lat. 5 poll. 6 lin.

366 M. marg. testa ponderosa *extus scaberrima* intus laevissima, limbo viridi. valv. solitar.

Long. 6 poll. 4 lin. lat. 5 poll. 6 lin.

367 M. marg. valv. solitar. *polita* et figuri more Chinens. variis ornata.

Long. 5 poll. 5 lin. lat. 4 poll. 9 lin.

368 M. marg. *segmentum* varietatis ex Ind. Orientali cum serulis ad marginem.

Long. 3 poll. lat. 7 poll. crass. poll. 2 lin.

369 M. marg. testa *tenuis*, laevis, lutea, fuscō radiata,

Chemn. loc. cit. fig. 720.

Long. 1 poll. 11 lin. lat. 1 poll. 7 lin.

370 M. marg. valv. altera albescens, *radiis obscure rubris*; altera subsquamosa.

Long. 2 poll. 4 lin. lat. 2 poll. 4 lin.

371 M. marg. et quidem varietatis praecedentis, valva solitaria, *polita*, colore extus fuscō, radiis albidis vario, intus margaritaceo nitente, limbo fuscō.

Long. 2 poll. 7 lin. lat. 2 poll. 10 lin.

\*\*\*Ventricosiusculi.

### *Mytilus lithophagus.*

Linn. S. N. Gen. 315. Sp. 248.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 124. Tab. VII. fig. 4.

372 M. l. testa extus *spadiceo*, epidermide jam derasa, intus margaritacea. Ind. Occ. 2.

Chemn. Konch. Kab. T. 8. tab. 81. fig. 729.

Long. 2 poll. 9 lin. lat. 10 lin.

373 M. l. testa superne fusca, intus albida, striata. valv. solit.

Long. 1 poll. 11 lin. lat. 6 lin.

### *Mytilus exustus.*

Linn. S. N. Gen. 315. Sp. 251

a Bornii test. mus. Vind. pag. 125. Tab. VII. fig. 5.

- 374 M. e. testa epidermide jam demidata, splendidissima, striato-plicata, antice rosaceo-purpurea, postice argentea. Fret. Magellan.

Chemin. Konch. Kab. T. 8. tab. 83. fig. 742.

Long. 1 poll. 6 lin. lat. 10 lin.

*Not. Obs.* Chemnitzii loc. cit. pag. 165 prolata tertia, mihi hanc concham pro *M. bidente* Linn. habentem, propterea non sufficit, quod Linn. marginem in Myt. exusto minime crenatum, ut Celeberr. Spenglerus loc. cit. docet, sed in Mus. Lud. Ulr. pag. 540 Nr. 134. suberenatum modo postulat, qui etiam hoc in specimine non deficit. Differentiam specificam e contra *M. bidentis* a *M. exusto in dente* quaerimus, qui *M. bidenti* inest nec integer nec obsoletus.

- 375 M. e. testa epidermide sordide-ferruginea, vestita.

Long. 1 poll. 6 lin. lat. 8 lin.

#### *Mytilus variegatus Chemn.*

- 376 M. var. testa extus ex roseo, fusco alboque pulcherrime maculata, intus subviolacea. Litt. Afric.?

Chemin. Konch. Kab. T. 8. tab. 84. fig. 748.

Long. 3 poll. 4 lin. lat. 1 poll. 8 lin.

#### *Mytilus barbatus.*

Linn. S. N. Gen. 315. Sp. 252.

- 377 M. barb. testa ex flavescente fusca, hirsuta. M. Mediterr.

Chemin. Konch. Kab. T. 8. tab. 84. fig. 749.

Long. 7 lin. lat. 4 lin.

#### *Mytilus edulis.*

Linn. S. N. Gen. 315. Sp. 253.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 126.

- 378 M. e. testa ex virescente-fusca, epidermide obtecta; intus albida limbo coeruleo haud angusto.

Chemin. Konch. Kab. T. 8. tab. 84. fig. 750.

Long. 2 poll. 6 lin. lat. 1 poll. 6 lin.

- 380 M. ed. praeced. persimilis, valv. altera lepadibus obtecta.

- 381 M. ed. specimina permulta invicem setis adnexa, cum animali Tethyde. (J. S.)

- 382 Conglomeratum praecedenti simile, absque animalibus.

*Mytilus ungulatus.*

- Linn. S. N. Gen. 315. Sp. 254.  
a Bornii test. mus. Vind. pag. 127.  
**383** M. ung. testa epidermide fusca adhuc vestita. M. Mediterr.  
Chemn. Konch. Kab. T. 8. tab. 85. fig. 756.  
Long. 2 poll. lat. 1 poll.

*Mytilus bidens.*

- Linn. S. N. Gen. 315. Sp. 255.  
a Bornii test. mus. Vind. pag. 128.  
**384** M. b. testa epidermide decisa, longitudinaliter striata, extus intusque purpurea, margine posteriori valide inflexo, dente terminali bifido; subdiaphana.  
Long. 1 poll. 3 lin. lat. 6 lin.

*Mytilus Modiolus.*

- Linn. S. N. Gen. 315. Sp. 256.  
a Bornii test. mus. Vind. pag. 128.  
**385** M. Mod. testa extus *roseo-violacea*, intus submargariacea. Oc. Europ.  
Chemn. Konch. Kab. T. 8. tab. 85. fig. 757.  
Long. 4 poll. 1 lin. lat. 2 poll.  
**386** M. Mod. testa *epidermide rudi vestita*, intus margaritacea. Valvam alteram lepades, alteram serpulae inhabitant.  
Long. 4 poll. 7 lin. lat. 2 poll. 4 lin.  
**387** M. Mod. testa *cortice subserrugineo testa*, serpulis, lepadibus et milleporis obsessa.  
Long. 4 poll. 6 lin. lat. 2 poll. 6 lin.  
**388** M. Mod. valv. ambæ tam lepadibus, quam milleporis testæ.  
Long. 3 poll. 2 lin. lat. 1 poll. 5 lin.  
**389** M. Mod. testa *ex violaceo nigra*; nates exalbidae striis linearibus violaceis ornatae. Tranquebar.  
Leng. 3 poll. lat. 1 poll. 5 lin.  
**390** M. Mod. varictas eadem, testa laevis, obscurissima natibus pallidis.  
Long. 2 poll. 2 lin. lat. 1 poll.  
**391** M. Mod. testa *ex albido nitens*, radiis violaceo-azureis, natibus albis, polita.  
Chemn. loc. cit. fig. 758. M. Mod. Tulipa.  
Long. 1 poll. 10 lin. lat. 1 poll. 1 lin.

392 M. Mod. testa extus *ex virescente ferruginea* natibus subroseis, intus dimidiato violacea.

Chemn. loc. cit. fig. 759.

Long. 2 poll. 10 lin. lat. 1 poll. 6 lin.

393 M. Mod. var. eadem, valvula utraque autem intus et extus polita, indeque *coloribus Iridis splendidissima*.

Long. 2 poll. 2 lin. lat. 1 poll. 2 lin.

394 M. Mod. testa *subviolacea* cortice *testa flavescente*, albo radiata ad marginem superiorem, barba muscosa vestita.

Coromandel. valv. solit. 2. ~

Chemn. loc. cit. fig. 860.

Long. 1 poll. 5 lin. lat. 8 lin.

395 M. Mod. varietas fere eadem sed *undique nuda*, et *radii dorsalis loco*, valvula utraque extus dimidiato alba atque violacea.

Long. 1 poll. 10 lin. lat. 4 lin.

### *Mytilus cygneus.*

Linn. S. N. Gen. 316. Sp. 257.

396 M. c. testa *tristis*, natibus minus prominulis, radiisque lynceo tantum conspicuis oculo. Europ.

Chemn. Konch. Kab. T. 8. tab. 86. fig. 762.

Long. 3 poll. 2 lin. lat. 5 poll. 5 lin.

397 M. c. testa, ubi epidermide destituta, partim *olivacea* partim *ferruginosa*.

Long. 1 poll. 8 lin. lat. 4 poll. 10 lin.

398 M. c. testa extus *radiis virescentibus distinctis*, cardinena versus autem vix conspicuis, varia; intus opalescens.

Long. 2 poll. 1 lin. lat. 3 poll. 6 lin.

399 M. c. valva utraque intus margaritis quibusdam onerata.

Long. 1 poll. 11 lin. lat. 5 poll. 5 lin.

### *Mytilus anatinus.*

Linn. S. N. Gen. 315. Sp. 258.

400 M. an. testa margine anteriori praecipue viridis.

Chemn. Konch. Kab. T. 8. tab. 86. fig. 763.

Long. 1 poll. 1 lin. lat. 1 poll. 8 lin.

### *Mytilus hirundo.*

Linn. S. N. Gen. 315. Sp. 262.

401 M. hir. testa inaequivalvis *flavescens fusco perdistincte radiata*. Mar. Mediterr.

Chemn. Konch. Kab. T. 8. tab. 81. fig. 722.

Long. 2 poll. 4 lin. lat. 1 poll. 4 lin.

- 402 M. hir. testa crassior, atque pholadibus extus destruita.  
Long. 2 poll. 4 lin. lat. 2 poll. 1 lin.

### PINNA.

*Pinna haud ignobilis Chemn.*

- 403 P. h. ign. testa versus basin purpurascens. Ind. Occ.  
Chemn. Konch. Kab. T. 8. tab. 87. fig. 769.  
Long. 5 poll. lat. 2 poll. 8 lin.  
404 P. h. ign. testa cinerea, area purpurascente minori.  
Long. 4 poll. 10 lin. lat. 3 poll.

*Pinna vitrea Chemn.*

- 405 P. v. testa longitudinaliter flexuoso-plicata, perlucida.  
Ind. Or.  
Chemn. Konch. Kab. T. 8. tab. 87. fig. 772.  
Long. 2 poll. 10 lin. lat. 1 poll. 14 lin.

*Pinna rufa.*

Linn. S. N. Gen. 316. Sp. 263.

- 406 P. rud. valv. utriusque tantum fragmenta. Litt. Guin.  
Chemn. Konch. Kab. T. 8. tab. 88. fig. 773.  
Long. 6 poll. 7 lin. lat. 2 poll. 7 lin.  
407 P. rud. et quidem huius varietatis fragmentum, quam  
Knorr Vergnügen der Augen T. 2. tab. 20. fig. 2. conti-  
memoravit.  
Long. 3 poll. 8 lin. lat. 4 poll. 11 lin.

*Pinna pectinata.*

Linn. S. N. Gen. 316. Sp. 264.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 132.

- 408 P. pect. testa ex flavesciente-fulva subpellucida. Ind. Or.  
Chemn. Konch. Kab. T. 8. tab. 87. fig. 770.  
Long. 4 poll. 6 lin. lat. 1 poll. 10 lin.

### ARGONAUTA.

*Argonauta Argo.*

Linn. S. N. Gen. 317. Sp. 271.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 140.

- 409 A. A. testa candida, carinata, carina dentata, dentibus-  
anticis fuscis; In duplo.

Martini Konch. Kab. T. I. tab. 17. fig. 157.  
Alter. long. 7 poll. 5 lin. lat. 5 poll.

— — 6 — 6 — — 4 —

*Not.* Specimina bene conservata, pretiosissima.

### NAUTILUS.

#### *Nautilus Pompilius.*

Linn. S. N. Gen. 318. Sp. 273.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 143.

- 410 N. P. testa extus, cortice destituta, margaritacea, distesa, diaphragmatibus siphoneque inde conspicuus.  
Martini Konch. Kab. T. I. tab. 19. fig. 165.  
Long. test. 5 poll. 7 lin. long. orif. 3 poll. 7 lin. lat. orif. 3 poll.

- 411 N. P. testa albida undique fasciis ferrugineis; varia.  
Martini loc. cit. tab. 18. fig. 164.  
Long. test. 4 poll. 6 lin. long. orif. 3 poll. 3 lin. lat. orif. 2 poll. 7 lin.

- 412 N. P. testa antica epidermide cinerascente tecta.  
Long. test. 5 poll. 6 lin. long. orif. 3 poll. 3 lin. lat. orif. 3 poll.

- 413 N. P. testa junior, umbilico inde conspicuo.  
Martini loc. cit. fig. 166.

Long. test. 1 poll. 6 lin. long. orif. 11 lin. lat. orif. 10 lin.

- 414 N. P. varietas eadem sed decorticata et hinc margaritacea atque pellucida.  
Martini loc. cit. fig. 167.  
Long. test. 1 poll. 6 lin. long. orif. 11 lin. lat. orif. 11 lin.

#### *Nautilus Beccarii.*

Linn. S. N. Gen. 318. Sp. 276.

- 415 N. B. testa albida, spiris se invicem tangentibus.  
Martini Konch. Kab. T. I. tab. 20. fig. 175b.  
Diameter testae totius 2 lin.

#### *Nautilus spirula.*

Linn. S. N. G. 318. Sp. 279.

a Born. test. mus. Vind. pag. 143.

- 416 N. sp. testa pallide cornea. Ind. Occ.  
Martini Konch. Kab. T. I. tab. 20. fig. 185.  
Cornua Ammonis.  
Diameter anfr. max. testae 3, 5 lin.

## CONUS.

\*Truncati s. Spira fere truncata.

*Conus marmoreus.*

Linn. S. N. Gen. 319. Sp. 290.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 146.

- 417 C. marm. testa *ferruginea*, maculis albis subcordatis varia. Ind. Or. 2.

Martini Konch. Kab. T. 2. tab. 62. fig. 686.

Long. 2 poll. 6 lin. diam. 1 poll. 3 lin.

- 418 C. marm. testa *atra* maculis albis subcordatis variegata. 2.

Martini loc. cit. fig. 685.

Long. 2 poll. 10 lin. diam. bas. 1 poll. 7 lin.

- 419 C. m. testa *atra*, maculis albis *minutis*.

Long. 2 poll. diam. 1 poll. 3 lin.

- 420 C. m. testa *atra*, maculis niveis, *in fascias tres transversas accumulatis*, adspersa.

Long. 1 poll. 6 lin. diam. 10 lin.

- 421 C. m. testa, *alterne albo ferrugineoque fasciata*, *spira albida*, *vestigiis flavescentibus*.

Martini loc. cit. fig. 687.

Long. 2 poll. 6 lin. diam. 1. poll. 2 lin.

*Conus imperialis.*

Linn. S. N. Gen. 319. Sp. 291.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 147.

- 422 C. imp. testa albida fasciis 3 *flavescentibus transversalibus*, ex quibus longitudinales effluunt. Guin. Litt. 3.

Martini Konch. Kab. T. 2. tab. 62. fig. 690.

Long. 2 poll. 9 lin. diam. 1 poll. 6 lin.

- 423 C. imp. testa albida fasciis longitudinalibus undulatis *ex fusco lividis*.

Martini. loc. cit. fig. 692.

Long. 1 poll. 9 lin. diam. 1 poll.

- 424 C. imp. testa ferruginea, *albidoque longitudinaliter undulata*.

Long. 1 poll. 7 lin. diam. 1 poll.

*Conus litteratus.*

Linn. S. N. Gen. 319. Sp. 292.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 148.

425 C.

- 425 C. litt. testa alba punctis oblongis fasciatis ordinatis, variegata. Ind. Orient. 2.  
 Martini Konch. Kab. T. 2. tab. 60, fig. 666.  
 Long. 3 poll. 7 lin. diam. 2 poll.
- 426 C. litt. testa alba roseo transverse fasciata ferrugineoque litterata.  
 Martini loc. cit. fig. 667.  
 Long. 4 poll. 1 lin. diam. 2 poll. 4 lin.
- 427 C. litt. testa albida maculis ferrugineis rotundis varia.  
 Long. 3 poll. 2 lin. diam. 1 poll. 10 lin.
- 428 C. litt. testa albida lineis flavescentibus cincta, ferrugineoque notata. 2. Inf. Frideric.  
 Martini loc. cit. fig. 668.  
 Long. 2 poll. 6 lin. lat. 1 poll. 6 lin.
- 429 C. litt. testa albida flavo fasciata, maculis ferrugineis tam majoribus quam minutis ordinatim atque alterne notata. Afric. ?  
 Martini Konch. Kab. T. 2. tab. 60, fig. 669.  
 Long. 2 poll. 5 lin. diam. 1 poll. 6 lin.
- 430 C. litt. testa punctis nebuloso purpurascentibus maculata.  
 Long. 2 poll. 1 lin. diam. 1 poll. 3 lin.
- 431 C. litt. testa ut in praeced. variegata antice sulcata, sulcis 7 longitudinalibus.  
 Long. 2 poll. 2 lin. diam. 1 poll. 5 lin.
- 432 C. litt. testa alba fasciis exangulatis transversalibus et ferrugineis.  
 Long. 1 poll. 5 lin. diam. 10 lin.
- 433 C. litt. testa alba, maculis angulatis ferrugineis, fascias 2 transversas formantibus, cincta, punctis interiectis subquadratis ordinate et confertim notata.  
 Long. 1 poll. 10 lin. lat. 1 poll. 3 lin.
- 433b C. litt. testa alba, maculis ferrugineis angulatis quidem sed in fascia non confluentibus notata, punctis minoribus interiectis 2.  
 Long. 1 poll. 10 lin. diam. 1 poll. 1 lin.
- 433c C. litt. varietas anteced. sed testa maculis flavis cincta 2.  
 Long. 11 lin. diam. 7 lin.

*Conus Generalis.*

- Linn. S. N. Gen. 319. Sp. 293.  
 a Bornii test. mus. Vind. pag. 149.
- 434 C. Gen. testa ferruginea, fasciis tribus albis, spadiceo longitudinaliter undulatis, variegata. Ind. Or.  
 Martini Konch. Kab. T. 2. tab. 58, fig. 649.  
 Long. 2 poll. 3 lin. lat. 1 poll.

- 435 C. Gen. testa ut praecedens fere picta, fascia media autem nivea, ferrugineo etiam transverse *interrupta* et ita subbifida.

Mart. loc. cit. fig. 648.

Long. 2 poll. 5 lin. lat. 1 poll. 2 lin.

*Conus Virgo.*

Linn. S. N. Gen. 319. Sp. 294.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 151.

- 436 C. Virg. testa epidermidē denudata, *subcarnea*, basi *violacea*. Oc. Afric. 2.

Mart. Konch. Kab. T. 2. tab. 53. fig. 585.

Long. 2 poll. 10 lin. lat. 1 poll. 6 lin.

- 437 C. Virg. testa laevis, *aurantia*, fascia perangusta in medio, albida ac transversali.

Long. 1 poll. 6 lin. lat. 1 poll.

- 438 C. V. testa aurantia, *punctis obscurioribus* minutissimis ordinata et confertim cincta.

Long. 11 lin. lat. 6 lin.

- 439 C. V. testa *laetea* maculis aurantiis subtefellatis confertis in fascias fere confluētibus, circumscripta.

Mart. loc. cit. fig. 654.

Long. 1 poll. 2 lin. lat. 8 poll. 8 lin.

*Not.* Per ill. a Born. quidem cum b. Martini hunc Cq. num ad singularem refert speciem, sub nomine *C. tef-sulati* (test. mus. Vind. p. 151.): sed ipsi hac in re propter ea adsentire nequeo, quod hic Conus etiam gaudet basi *violacea*, quam praeter formam pro differentia habeo specifica C. Virginis. Accedit quod Linn. ipse descriptioni C. Virg. haec verba addiderit: similis litteratis, colore laeteo „aut rubro maculata“ etc.

- 440 C. V. testa nivea maculis tessellatis sanguineis ac distin-  
ctioribus circumdata.

Long. 1 poll. 6 lin. lat. 11 lin.

- 441 C. V. testa nivea maculis flavis cincta.  
Long. 2 poll. lat. 1 poll. 3 lin.

- 442 C. V. testa ferruginea, in medio, albo fasciata et apertu-  
ram versus, linea longitudinali albida *interrupta*.

Mart. loc. cit. fig. 588.

Long. 1 poll. 7 lin. lat. 11 lin.

- 443 C. V. testa pallidior absque linea albida ad aperturam.  
Long. 1 poll. 10 lin. lat. 1 poll.

*Conus*

*Conus Capitaneus.*

- Linn. S. N. Gen. 319. Sp. 295.  
a Bornii test. mus. Vindob. pag. 152,
- 444 C. Cap. testa *flavescens* fascia media transversali nivea,  
in areas geminas, punctorum ferrugineorum seriebus  
multis varias, divisa. Afric.  
Mart. Konch. Kab. T. 2. tab. 59. fig. 660.  
Long. 1 poll. 10 lin. lat. 1 poll. 2 lin.
- 445 C. Cap. testae area antica, striis quibusdam *dorsalibus*  
e spira descendantibus ornata.  
Long. 2 poll. 4 lin. lat. 1 poll. 6 lin.
- 446 C. Cap. testa *ex olivaceo-flavescens*, fascia media trans-  
versali *lactea* in areas geminas immaculatas *bifida*.  
Mart. loc. cit. fig. 661.
- 447 C. Cap. testa *flavescens*, areis ferrugineo sed *minus fre-*  
*quenter punctatis* ac in specimine 444.  
Martini loc. cit. fig. 662.  
Long. 1 poll. 8 lin. lat. 1 poll. 1 lin.
- \* Pyriformes, basi rotundata, subcylindrica quam spira  
sesquilongiore.

*Conus Vexillum Martinii.*

- 448 C. Vex. testa *ferruginea* longitudinaliter striata attamen  
laevis, in medio albo fasciata, spira albo fuscoque varia.  
Ind. Or.  
Martini Konch. Kab. T. 2. tab. 57. fig. 629.  
Long. 3 poll. 7 lin. lat. 2 poll. 3 lin.

*Conus Cauda Erminea Mart.*

- a Born. Test. mus. Vind. pag. 159. C. Ermineus.  
449 C. C. Erm. testa *flava*, fascia albida exangulata in medio  
ad spiram autem maculis lacteis in fasciam non conflua-  
tibus, cincta. 2.  
Martini Konch. Kab. T. 2. tab. 57. fig. 630.  
Long. 1 poll. 11 lin. lat. 1 poll. 1 lin.
- 450 C. C. Erm. testa *rufa* alboque ut anteced. fasciata punctis  
minimis cincta.  
Long. 1 poll. 6 lin. lat. 10 lin.

*Conus Miles.*

Linn. S. N. Gen. 319. Sp. 296.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 152.

450b C. M. testa ferruginea, postice fusca, antice fuscō transversim vittata, fascia in medio albida.

Martini Konch. Kab. T. 2. tab. 59. fig. 66.

Long. 2 poll. 8 lin. lat. 1 poll. 5 lin.

451 C. M. testa ut praeced. pīcta lineolis autem quaque undulatis longitudinalib⁹.

Martini loc. cit. fig. 663.

Long. 1 poll. 9 lin. lat. 1 poll.

*Conus achatinus Mart.*

452 C. ach. testa ex virescente glauca striis fuscis subgranulatis transverse cincta, solida atque pergravis.

Martini Konch. Kab. T. 2. tab. 55. fig. 611.

Long. 2 poll. lat. 1 poll. 4 lin.

453 C. ach. testa e luteo ferruginea filis cinctus granulatis, Inf. Cruc.

Martini loc. cit. fig. 603.

Long. 1 poll. 8 lin. lat. 1 poll.

454 C. ach. testa lactea rufo subreticulata,

Martini loc. cit. fig. 604.

Long. 1 poll. lat. 7 lin.

*Conus genuanus.*

Linn. S. N. Gen. 319. Sp. 302.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 155.

455 C. gen. testa lactea fascijs connexis ferrugineis, ocellis pupillatis, tenuis et semipellucida. Litt. Guin.

Martini Konch. Kab. T. 2. tab. 56. fig. 627.

Long. 2 poll. 7 lin. lat. 1 poll. 4 lin.

*Conus glaucus.*

Linn. S. N. Gen. 319. Sp. 303.

456 C. gl. testa lutescens, ferrugineoque punctata, area antica atque postica, fascia albida distincta.

Martini Konch. Kab. T. 2. tab. 61. fig. 670.

Long. 2 poll. 2 lin. lat. 1 poll.

457 C. gl. testa lutea, lacteo transversim fasciata fasciis haud latis, numerosis, maculis ferrugineis ordinatim variegatis. Afric.

Martini loc. cit. fig. 672.

Long. 1 poll. 7 lin. lat. 1 poll.

- 458 C. gl. testa pallida *punctis ferrugineis* perminutis varia.  
Martini loc. cit. fig. 673.  
Long. 1 poll. 4 lin. lat. 10 lin.
- 459 C. gl. testa lactea maculis ferrugineis *subrotundis* varia,  
fasciis duabus luteis transversis circumdata.  
Martini loc. cit. fig. 674.  
Long. 1 poll. 6 lin. lat. 11 lin.
- 460 C. gl. testa albida *punctis obscurioribus subtegellatis*  
cincta.  
Long. 1 poll. 7 lin. lat. 1 poll. 2 lin.

*Conus Monachus.*

- Linn. S. N. Gen. 319. Sp. 304.  
a Bornii test. mus. Vind. pag. 156.
- 461 C. Mon. testa glauca *fusco longitudinaliter undulata*.  
Martini Konch. Kab. T. 2. tab. 55. fig. 613.  
Long. 2 poll. 2 lin. lat. 1 poll. 4 lin.
- 462 C. Mon. testa glauca *filis granulatis varia ferrugineis*.  
Long. 1 poll. lat. 7 lin.

*Conus Rusticus.*

- Linn. S. N. Gen. 319. Sp. 306.
- 463 C. R. testa ex livido flavescenti albida, in medio fasciata,  
area postica punctis albidis elevatis in seriebus cincta. Ind.  
Occ.  
Martini Konch. Kab. T. 2. tab. 63. fig. 694.  
Long. 1 poll. 8 lin. lat. 1 poll.
- 464 C. R. testa *sublivida*, apertura intus gibbosa.  
Long. 1 poll. 7 lin. lat. 11 lin.
- 465 C. R. testa livida albo fasciata, area postica *undique filis*  
*granulosis*, antica duobus tantum cincta.  
Long. 1 poll. 2 lin. lat. 9 lin.
- 466 C. R. testa flavescentia fascia albida in medio nulla.  
Long. 1 poll. 5 lin. lat. 11 lin.

*Conus Mercator.*

- Linn. S. N. Gen. 319. Sp. 307.  
a Bornii test. mus. Vind. pag. 157.
- 467 C. M. testa lactea, flavescente reticulata.  
Martini Konch. Kab. T. 2. Tab. 56. fig. 621.  
Long. 1 poll. 1 lin. lat. 8 lin.

*Conus betulinus.*

- Linn. S. N. Gen. 319. Sp. 308.  
a Bornii test. mus. Vind. pag. 158.
- 468 C. bet. testa lutea basi subemarginata rugosa, intus pallide violacea. Ind. Orient.  
Martini Konch. Kab. T. 2. tab. 60. fig. 665.  
Long. 4 poll. 6 lin. lat. 3 poll.
- 469 C. bet. testa lactea, punctis linearibus fasciisque connexis ferrugineis, transverse variegata.  
Chemn. Konch. Kab. T. 10. tab. suppl. 139. fig. 1282 83.  
Conus Pseudo Thomae.  
Long. 4 poll. 4 lin. lat. 2 poll. 3 lin.
- 470 C. bet. testa striis obscurioribus et spirae anfractibus magis depresso.  
Long. 3 poll. 3 lin. lat. 2 poll.
- 471 Con. bet. testa violacea, basi rugosa, fasciis subfuscis partim connexis partim albido interrupitis varia, filis granulatis undique transversis cincta. Amboina.  
Chemn. loc. cit. tab. 142. fig. 1317.  
Long. 1 poll. 7 lin. lat. 10 lin.  
*Not.* Qui C. vix ad betulinum pertinere videtur,
- 472 C. bet. testa ex fusco alboque varia filis transversis planibus adhuc cincta.  
Long. 1 poll. 9 lin. lat. 10 lin.

*Conus figulinus.*

- Linn. S. N. Gen. 319. Sp. 309.  
a Bornii test. mus. Vind. pag. 158.
- 473 C. fig. testa ex flavescente-fusca striis rufescentibus undique cincta. Ind. Orient.  
Martini Konch. Kab. T. 2. tab. 59. fig. 656.  
Long. 2 poll. 10 lin. lat. 1 poll. 10 lin.
- 474 C. fig. testa fulva basi emarginata rugosa fascia perdistinta albida ad spiram in medio dorsi autem nebulosa.  
Martini loc. cit. tab. 59. fig. 658.  
Long. 2 poll. 5 lin. lat. 1 poll. 5 lin.  
*Not.* b. Martini hunc Conum quidem l. c. ad C. minimum Linn. retulit, sed vitiose sine dubio, cum characteribus huius a Linn. prolati, nec cum descriptione Martini nec cum icone spec. nostr. convergant.

*Conus*

*Conus Terebellum Mart.*

- Linn. 1758  
(fig. 562)
- 475 C. T. testa ex *albido flavescentique fasciata*, undique punctata, punctis minimis, spira violacea.  
Martini Konch. Kab. T. 2. tab. 52, fig. 572.  
Long. 1 poll. 2 lin. lat. 7 lin.
- 476 C. T. testa pyriformis *ferruginea alboque fasciata*, spira albida basi violacea.  
Martini loc. cit. fig. 574.  
Long. 1 poll. 4 lin. lat. 6 lin.
- 477 C. T. testa ex *albido roseo que nebulosa*, transversim striata. 2.  
Long. 1 poll. 3 lin. lat. 7 lin.
- 478 C. T. testa ferruginea albido varia, striata, striis *validioribus* transversis.  
Long. 1 poll. 1 lin. lat. 5 lin.
- 479 C. T. testa *undique albida striata*, striis remotioribus.  
Martini loc. cit. fig. 576.  
Long. 1 poll. 2 lin. lat. 7 lin.
- 480 C. T. testa albida fasciis *duabus flavescentibus*, spirae mucrone ac basi violaceis.  
Martini loc. cit. fig. 577.  
Long. 2 poll. lat. 10 lin.
- 481 C. T. testa albida *luteo fasciata*, mucrone spirae roseo.  
Long. 2 poll. 2 lin. lat. 1 poll.  
*Not.* Quod spec. detritum videtur.

*Conus ebraeus.*

- Linn. S. N. Gen. 319. Sp. 310.  
a Bornii test. mus. Vind. pag. 159.
- 482 C. ebr. testa albida fasciis abbreviatis *nigris longitudinalibus distantibus transversum cincta*. Amboina. 2.  
Martini Konch. Kab. T. 2. tab. 56. fig. 617.  
Long. 1 poll. 3 lin. lat. 15 lin.
- 483 C. ebr. testa albida fasciis talibus *ferrugineis varia*.  
Long. 1 poll. lat. 9 lin.
- 484 C. ebr. testa pallida fasciis nigris longitudinalibus *concentratis*.  
Long. 11 lin. lat. 7 lin.

*Conus Stercus muscarum.*

- Linn. S. N. Gen. 319. Sp. 311.  
a Bornii test. mus. Vind. pag. 160. Tab. VII. fig. 12.

- 485 C. St. musc. testa albescens, *frequentissime punctata*, punctis plurimis fuscis cum quibusdam niveis in serie positis spirae mucrone roseo. Amboina. 2.  
 Martini Konch. Kab. T. 2. tab. 64. fig. 711.  
 Long. 2 poll. 2 lin. lat. 1 poll. 1 lin.
- 486 C. St. musc. testa lactea punctis *rarioribus* partim fuscis partim ferrugineis varia. Ind. Or.  
 Martini loc. cit. tab. 63. fig. 696.  
 Long. 1 poll. 7 lin. lat. 11 lin.
- 487 C. St. musc. testa lactea splendens, punctis ferrugineis *minutissimis*, ordinate et confertim cincta.  
 Long. 1 poll. 3 lin. lat. 8 lin.
- 488 C. St. musc. testa albida punctis *obscurioribus* minutissimis, in *fascias longitudinales confluentibus*, variegata.  
 Martini loc. cit. fig. 697.  
 Long. 10 lin. lat. 6 lin.

*Conus achates fasciatus Mart.*

- 489 C. a. fasc. testa *fulva* albido fasciata, filis multispulcherrime granulata, spira muricata. Ind. Orient.  
 Martini Konch. Kab. T. 2. tab. 63. fig. 703.  
 Long. 1 poll. 1 lin. lat. 9 lin.
- 490 C. a. fasc. testa *subviolacea* ferrugineo niveoque granulata.  
 Martini loc. cit. fig. 704.  
 Long. 1 poll. 2 lin. lat. 9 lin.
- 491 C. a. fasc. testa *ferruginea* alboque varia filis muricato granulosis cincta.  
 Martini loc. cit. fig. 705.  
 Long. 1 poll. 4 lin. lat. 10 lin.
- 492 C. a. fasc. testa *subviolacea*, olivaceo nebulosa, filis vix granulosis cincta. 2.  
 Long. 1 poll. 5 lin. lat. 1 poll.
- 493 C. a. fasc. testa *livida*, albido fasciata transversim striata nec granulata.  
 Long. 1 poll. 1 lin. lat. 9 lin.

*Conus varius.*

Linn. S. N. Gen. 319. Sp. 312.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 161.

- 494 C. var. testa albida *fasciis longitudinalibus* olivaceis, spirae mucrone roseo.  
 Martini Konch. Kab. T. 2. tab. 52. fig. 679.  
 Long. 1 poll. 10 lin. lat. 1 poll.

495 C.

495 C. var. testa albida, fasciis longitudinalibus, punctorumque seriebus transversis ferrugineis varia.

Long. 1 poll. 7 lin. lat. 9 lin.

496 C. var. testa alba, fasciis 2 transversalibus flavis variegata.

Long. 1 poll. 10 lin. lat. 9 lin.

\*\*\*Elongati basi rotundata cylindro duplo longiore, quam spira.

### *Conus Nussatella.*

Linn. S. N. Gen. 319. Sp. 314.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 162.

497 C. N. testa exalbida ferrugineoque varia, striis transversis tuberculatis fulvis scabra. 2.

Martini Konch. Kab. T. 2. tab. 51. fig. 567.

Long. 1 poll. 9 lin. lat. 8 lin.

### *Conus striatus.*

Linn. S. N. Gen. 319. Sp. 318.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 165.

498 C. str. testa ovato-oblonga undique obsolete striata albida flavoque maculata atque reticulata. Inf. Frideric.

Mart. Konch. Kab. T. 2. tab. 64. fig. 714.

Long. 2 poll. 1 lin. lat. 9 lin.

### *Conus Textile.*

Linn. S. N. Gen. 319. Sp. 319.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 165.

499 C. T. testa albida venis ferrugineis undique reticulata, flavoque maculata, maculis in fascias tres transversales ac aequales effluentibus. Ind. Frider.

Martini Konch. Kab. T. 2. tab. 54. fig. 598.

Long. 3 poll. 7 lin. lat. 1 poll. 7 lin.

500 C. T. testa ut anteced. picta, fascia spirae proxima sola angustior ceteris. 2.

Long. 3 poll. lat. 1 poll. 4 lin.

501 C. T. testa maculis flavis minus connexis. 2.

Martini loc. cit. fig. 601.

Long. 1 poll. 5 lin. lat. 9 lin.

502 C. T. testa angustius reticulata, et venis obscurioribus.

Cheinn. Konch. Kab. T. 10. tab. Suppl. 143. fig. 1326 b.

Long. 1 poll. 11 lin. lat. 1 poll.

- 503 C. T. testa non solum venis ac fasciis transversis, sed et fastiis longitudinalibus ferrugineis. 2.  
Long. 2 poll. 1 lin. lat. 1 poll.
- 504 C. T. testa venis ferrugineis undulatis vix reticulatim accumulatis varia.  
Long. 1 poll. 6 lin. lat. 11 lin.
- 505 C. T. testa tristis characteribus fuscis exangulata.  
Long. 1 poll. 7 lin. lat. 1 poll.

*Conus aulicus.*

- Linn. S. N. Gen. 319. Sp. 320.  
a Bornii test. mus. Vind. pag. 166.
- 506 C. aul. testa ferruginea maculis cordatis albidis variegata.  
Martini Konch. Kab. T. 2. tab. 53. fig. 592.  
Long. 3 poll. 5 lin. lat. 1 poll. 2 lin.
- 507 C. aul. testa ferruginea maculis albis cordatis partim maioribus partim minimis interrupta. 2.  
Long. 2 poll. 1 lin. lat. 11 lin.
- 508 C. aul. testa alba ferrugineo undata transversim valide striata. 2.  
Long. 3 poll. 6 lin. lat. 1 poll. 6 lin.
- 509 C. aul. testa solida pergravis lactea fasciis fuscis longitudinalibus exangulatis.  
Chenn. Konch. Kab. T. 10. tab. Suppl. 143. fig. 1528.  
Long. 3 poll. lat. 2 poll.
- 510 C. aul. varietas singularis. Testa haec enim magnitudine, soliditate, gravitate, forma atque spira utique gaudet C. aulici, sed colore quam maxime ab eo differt; nam ro-facea adparet striis pallidis longitudinalibus interrupta, a medio dorsi usque ad aperturam candidissime opalescentibus †).  
Long 3 poll. 5 lin. lat. 1 poll. 6 lin.
- 511 C. aul. varietas altera singularis rationis spirae imprimis, specimen hoc a praecedentibus, anfractibus omnibus coronatis, testa tenuiore, longitudinaliter striata, ac multo leviore differt; a nr. 506. autem colore, forma ac magnitudine testae fere convenit.  
Long. 4 poll. lat. 1 poll. 8 lin.  
Not. An species Coni singularis ††)?

\*\*\*\* Saxi

†) vid. Tab. Helmintholog. fig. 1.

††) v. Tab. Helminthol. fig. 2.

\*\*\*\* Laxi ventricosi, in dorsum disiecti super mensam tintantantes.

*Conus bullatus.*

Linn. S. N. Gen. 319. Sp. 322.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 168.

- 512 C. bull. testa sublivida ferrugineo longitudinaliter fasciata, apertura violacea. Ind. Or.

Martini Konch. Kab. T. 2. tab. 65. fig. 725.

Long. 1 poll. 6 lin. lat. 9 lin.

*Conus Tulipa.*

Linn. S. N. Gen. 319. Sp. 323.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 168.

- 513 C. T. testa subviolacea *ferruginea undata*, punctorum ex albido ferrugineoque variorum seriebus transversalibus cincta, apertura violacea; pulcherrima. Amboina 2.

Martini Konch. Kab. T. 2. tab. 64. fig. 718. 19.

Long. 2 poll. 3 lin. lat. 1 poll.

- 514 C. T. testa nebulose violacea, *fasciis longitudinalibus flavis ita abscessis varia*, ut fasciis pallidis transversalibus circumdata videatur.

Long. 1 poll. 8 lin. lat. 8 lin.

**CYPRAEA.**

\* *Mucronatae.*

*Cypraea Exanthema.*

Linn. S. N. Gen. 320. Sp. 325.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 172.

- 515 C. Ex. testa ferruginea, ocellis pallidis adspersa, linea longitudinali *vix ramosa*, labiorum dentibus fuscis.

Chemn. Konch. Kab. T. 3. tab. 28. fig. 289.

Long. 2 poll. 4 lin. lat. 1 poll. 3 lin.

- 516 C. Ex. testa linea longitudinali paullulum flexuosa, *ramo uno distincto*, fascisque duabus transversis, latere sinistro, basin petentibus.

Martini loc. cit. tab. 29. fig. 298.

Long. 3 poll. 6 lin. lat. 2 poll.

- 517 C. Ex. testae dorso dextro ocellis partim confluentibus.

- 518 C. Ex. latere utroque in primis autem sinistro, ocellis fuscis, quibus C. Ex. vera, cum sequenti coniungitur. Afric.

Long. 1 poll. 11 lin. lat. 11 lin.

*Cy-*

*Cypraea Scurro Chemn.*

519 C. Sc. testa ex virescente flavescente ocellis lividis, lateribus subincarnatis ocellis ex coeruleo-fuscis.

Chemn. Konch. Kab. T. 110. tab. Suppl. 144. fig. 1338.

Long. 1 poll. lat. 9 lin.

*Not.* Quin haec Cypraea species sit singularis dubito fere, quia spira quam Solertiss. Chemnitz. nullam vocat, (loc. cit. pag. 103.) revera adest, sed labio prominentem tecta, uti in plurimis varietatibus Cypr. Exanthematis.

*Cypraea Mappa.*

Linn. S. N. Gen. 320. Sp. 326.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 172.

519b C. M. testa virescente characteribus ferrugineis inscripta, linea longitudinali ramosissima, lateribus rufescens.

Martini Konch. Kab. T. 3. tab. 25. fig. 245.

Long. 1 poll. 8 lin. lat. 2 poll. 3 lin.

*Cypraea arabica.*

Linn. S. N. G. 320. Sp. 327.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 173.

519c C. ar. testa livida characteribus ferrugineis notata, lateribus pallidis fusco frequenter maculatis. Ind. Or.

Martini Konch. Kab. T. 3. tab. 31. fig. 328.

Long. 1 poll. 9 lin. lat. 1 poll. 1 lin.

519d C. ar. testa ad lineam longitudinalem cinerascente maculata.

Long. 1 poll. 11 lin. lat. 1 poll. 2 lin.

519e C. ar. testa dorso transversim subfasciata.

Long. 2 poll. 4 lin. lat. 1 poll. 6 lin.

519f C. ar. testa dorso quadripartita fusco fasciata.

Long. 1 poll. 10 lin. lat. 1 poll. 3 lin.

520 C. ar. testa fasciis dorso duabus pallidis.

Long. 2 poll. 1 lin. lat. 1 poll. 4 lin.

521 C. ar. testa characteribus rarioribus notata, linea longitudinali vix distincta.

Long. 2 poll. 3 lin. lat. 1 poll. 4 lin.

522 C. ar. testa characteribus subhexagonis ordinate inscripta, extremitatibus coeruleofuscis.

Long. 1 poll. 9 lin. lat. 1 poll.

523 C.

523 C. ar. testa ex livido ferrugineo que varia, linea longitudinali oblique arcuata.

Long. 1 poll. 7 lin. lat. 1 poll.

524 C. ar. testa characteribus ex flammeo-fuscis notata, linea longitudinali subramosa, ramulo in dorso antico ad latus sinistrum supra dymidium descendens.

Long. 2 poll. 1 lin. lat. 1 poll. 3 lin.

### *Cypraea Argus.*

Linn. S. N. Gen. 320. Sp. 328.

a Borni test. mus. Vind. pag. 174.

525 C. A. testa pallide ocellata atque subfasciata, labio interiori postice quam maxime retuso. Afric.

Martini Konch. Kab. T. I. tab. 28. fig. 285.

Long. 3 poll. 9 lin. lat. 2 poll.

### *Cypraea testudinaria.*

Linn. S. N. Gen. 320. Sp. 329.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 175.

526 C. test. testa ex albido violaceo fuscoque varia spira ante non manifesta. Amboina.

Martini Konch. Kab. T. I. tab. 27. fig. 271.

Long. 3 poll. 6 lin. lat. 1 poll. 9 lin.

### *Cypraea stercorearia.*

Linn. S. N. Gen. 320. Sp. 330.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 175. Tab. VIII. fig. 1.

527 C. sterc. testa livida ferrugineo temere adspersa; antice juxta spiram macula fusca perdistincta, subitus plana; labro interiori postice perretuso, apertura antica valde gibba.

Martini Konch. Kab. T. I. tab. 31. fig. 332.

### *Cypraea Cuniculus.*

Long. 2 poll. 7 lin. lat. 1 poll. 7 lin.

Not. Descriptionem, quamvis cum ipsa a Linn. data prorsus fere conveniat, dedimus pluribus verbis, quia b. Martini fig. citatam ad singularem refert Cypraeorum speciem, sub nomine *C. cuniculi*. Cum autem specimen nostrum, figurae cit. aequae atque characteribus *C. stercoreiae* Linn. respondeat, existimamus, Conchiologistam illum hanc Linn. speciem profecto non cognovisse.

- 528 C. sterc. testa lateribus glaucis, macula antica juxta spiram ex fusco ferruginea.  
Long. 2 poll. 6 lin. lat. 1 poll. 5 lin.
- 529 C. sterc. testa *disselta*, hinc spira conspicua; in usum characteristicae conchiologiae.  
Long. 2 poll. 10 lin. lat. 2 poll.
- 530 C. sterc. testa sublivida nebulosa fasciata.  
Long. 2 poll. 6 lin. lat. 1 poll. 6 lin.
- 531 C. sterc. varietas singularis, testa subferruginea, postice macula lactea notata.  
Long. 1 poll. 6 lin. lat. 11 lin.
- 531b C. sterc. varietas monstrosa, testa postica enim *cornuta*, corun, ex ocello magno fuscoque exeunte †).  
Long. 3 poll. 3 lin. lat. 1 poll. 11 lin.

*Not.* Num hoc cornu, aegritudinis animaleculi signum? — Intus nulla cavitas ad locum, qui cornu externo respondet, observatur.

### Cypraea Carneola.

- Linn. S. N. Gen. 320. Sp. 331.  
a Bornii test. mus. Vind. pag. 176. Tab. VIII. fig. 2.  
532 C. Carn. testa pallida, incarnato quadrifariam ac transverse fasciata, latere utroque pallido tenuissime striato. Oc. asiat.  
Martini Konch. Kab. T. 1. tab. 28. fig. 287. 288.  
Long. 2 poll. 8 lin. lat. 1 poll. 6 lin.
- 533 C. Carn. testa pallida fasciis obscurioribus 2.  
Long. 2 poll. lat. 1 poll. 2 lin.

### Cypraea Zebra.

- Linn. S. N. Gen. 320. Sp. 332.  
a Bornii test. mus. Vind. pag. 177. Tab. VIII. fig. 3.  
534 C. Z. testa ex livido-cinerea obscure fasciata *splendidissima*, apertura violacea ocellis opalescentibus, ore subincarnato, denticulis fuscis. Jamaica.  
Martini Konch. Kab. T. 1. tab. 26. fig. 256.  
Long. 4 poll. 1 lin. lat. 2 poll. 1 lin.

535 C.

†) v. Tab. Helmintholog. fig. 3.

- 535 C. Z. testa livida, fasciis subferrugineis ex undis longitudinalibus confluentibus, transversa.  
Long. 2 poll. 3 lin. lat. 1 poll. 4 lin.

*Not.* Quod specimen, Cypraeas cortice tenuissimo etiam vestitas esse, ostendit, sub quo nitor splendidissimus testae latet. Dorso enim quoque nitet, sed latere dextro multo magis, quia hic cortex paullulum jam est detritus. Finis corticis, et differentia splendoris utriusque ibi etiam perdistinete patent. Quo sequitur b. *Martiniūm* valde errasse, qui loc. cit. pag. 347. varietatem antecedentem nostram, et *C. Zebram* Linn. omnino, pro testa *C. Exanthematis* polita habuit. Nostra observatione vero, *C. Zebra* Linn. re vera singularis est species et varietas antecedens, specimen adultum, cortice plane destituto, eiusdem speciei.

- 536 C. Z. testa fasciis ferrugineis subalbidisque interruptis transversa.

Long. 2 poll. 1 lin. lat. 1 poll. 3 lin.

- 537 C. Z. testa ex albido atque subincarnato fasciata.

Long. 1 poll. 3 lin. lat. 9 lin.

*Not.* Medium inter *C. Carneolam* et *Zebram*.

### *Cypraea Talpa.*

- Linn. S. N. Gen. 320. Sp. 333.  
a Bornii test. mus. Vind. pag. 177.  
538 C. T. testa ferruginea fasciis lutescentibus varia, subtus, antice, posticeque fusca; splendidissima. Ins. Frider.

Mattini Konch. Kab. T. I. tab. 27. fig. 273. 274.

Long. 2 poll. lat. 3 poll. 6 lin.

- 539 C. T. testa flavescens, fasciis tribus latioribus,

Long. 2 poll. 4 lin. lat. 1 poll. 3 lin.

### *Cypraea amethystea.*

- Linn. S. N. Gen. 320. Sp. 334.  
540 C. am. testa subfuscata, antice ac postice violaceo undata; lateribus gibbis, fusco maculatis.  
Martini Konch. Kab. T. I. tab. 25. fig. 248. 249.  
Long. 2 poll. 5 lin. lat. 1 poll. 4 lin.

### *Cypraea lota.*

- Linn. S. N. Gen. 320. Sp. 337.  
a Bornii test. mus. Vind. p. 178. Tab. VIII, fig. 4. 5.  
541 C. lot. testa undique albida. Mar. Sicul.  
Martini Konch. Kab. T. I. tab. 30, fig. 322.  
Long. 1 poll. lat. 8 lin.

*Cypraea fragilis.*

- Linn. S. N. Gen. 320. Sp. 333.  
a Bornii test. mus. Vind. pag. 179. Tab. VIII. fig. 6.
- 542 C. fr. testa livida, dorso dextro ferrugineo haud anguste et longitudinaliter dorso sinistro autem, lineolis longitudinalibus flexuosis undata. M. Mediterr.  
Long. 1 poll. 4 lin. lat. 10 lin.
- \*\* Obtusae absque spira manifesta.

*Cypraea Caput serpentis.*

- Linn. S. N. Gen. 320. Sp. 339.  
a Born. test. mus. Vind. pag. 179.
- 543 C. C. serp. testa obtusa, dorso lacteo ferrugineoque reticulato, linea longitudinali subarcuata *albida*, lateribus pallide fuscis. Inf. Maurit.  
Martini Konch. Kab. T. I. tab. 30, fig. 316.  
Long. 1 poll. 6 lin. lat. 1 poll. 1 lin.
- 544 C. C. serp. testa linea longitudinali in medio *subramosa*.  
Long. 1 poll. 6 lin. lat. 1 poll. 1 lin.
- 545 C. C. serp. testa disco dorsali *angustiore*, lateribus nebulose coerulescentibus.  
Long. 1 poll. lat. 9 lin.

*Cypraea mauritiana.*

- Linn. S. N. Gen. 320. Sp. 340.  
a Born. test. mus. Vind. pag. 180.
- 546 C. maur. testa obtusa, disco dorsali ferrugineo ocellis subincarnatis, limbo ipsius flavescenti, basi lateribusque nigris, ad partem baseos sinistram, macula ferruginea notata. Java.  
Mart. Konch. Kab. T. I. tab. 30. fig. 317.  
Long. 3 poll. 5 lin. lat. 2 poll. 4 lin.
- 547 C. maur. testa *absque limbo dorfi* flavescente, lateribus, basique aterrimis.  
Long. 2 poll. 4 lin. lat. 1 poll. 6 lin.

*Cypraea Vitellus.*

- Linn. S. N. Gen. 320. Sp. 341.  
a Born. test. mus. Vind. pag. 181.
- 548 C. V. testa flavescens maculis albis notata, lateribus palidis immaculatis tenuissime striatis. Amboina,  
Martini Konch. Kab. T. I. tab. 23. fig. 228.  
Long. 1 poll. 6 lin. lat. 1 poll.

549 C. V. testa obscurior, *undique maculis albis notata.*

Long. 1 poll. 6 lin. lat. 11 lin.

550 C. V. testa ex ferrugineo-flavescens nitidissima, *spira magis prominente.*

Long. 1 poll. 9 lin. lat. 1 poll. 2 lin.

### *Cypraea Mus.*

Linn. S. N. Gen. 320. Sp. 342.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 181.

551 C. M. testa sordide flavescens dorso dextro ferrugineo fuscoque maculata.

Martini Konch. Kab. T. I. tab. 23. fig. 222.

Long. 2 poll. 1 lin. lat. 1 poll. 3 lin.

### *Cypraea Tigris.*

Linn. S. N. Gen. 320. Sp. 343.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 182. Tab. VIII. fig. 7.

552 C. T. testa exalbida maculis tam fuscis quam coerulecentibus adspersa. Madagasc.

Martini Konch. Kab. T. I. tab. 24. fig. 237.

Long. 3 poll. 6 lin. lat. 2 poll. 3 lin.

553 C. T. testa pallida, maculata, extremitatibus albidis, et apertura inter dentes crocea ut in C. Vanelli.

Long. 1 poll. 6 lin. lat. 1 poll.

554 C. T. testa sublutea, maculis fuscis densius adspersa.

Long. 2 poll. 10 lin. lat. 1 poll. 6 lin.

555 C. T. testa pallide rufescens fusco maculata, linea longitudinali sublutescente,

Long. 2 poll. 6 lin. lat. 1 poll. 4 lin.

556 C. T. testa lutescens maculis fuscis magnis ita confluentibus adspersa, ut linea longitudinalis vix conspicatur.

Long. 2 poll. 8 lin. lat. 1 poll. 12 lin.

557 C. T. testa pallida, maculis parviusculis ferrugineis temere adspersa.

Long. 2 poll. 6 lin. lat. 1 poll.

558 C. T. testa albida striis longitudinalibus, punctisque ferrugineis partim transverse confluentibus, subsensiata, apertura violacea, levis et subdiaphana; igitur T. femina ut vocant, et quidem varietas perrara, de qua scripsit Martini loc. cit. pag. 333.

Long. 3 poll. 6 lin. lat. 2 poll. 6 lin.

559 C. T. varietas eadem maculis pluribus ferrugineis.

Long. 3 poll. 2. lin. lat. 2 poll.

*Cypraea Lynx.*

- Linn. S. N. Gen. 320. Sp. 344.  
a Bornii test. mus. Vind. pag. 183. Tab. VIII, fig. 8. 9.  
 560 C. L. testa pallida *maculis fuscis confluentibus*, linea longitudinali subflavescente, extremitatibus albidis, ore rufo,  
     Martini Konch. Kab. T. I. tab. 23. fig. 230 231.  
     Long. 1 poll. 1 lin. lat. 8 lin.  
 561 C. L. testa albida *ferrugineo subfasciata gibbosior levie*  
ac diaphana, ore rufo.  
     Long. 1 poll. 5 lin. lat. 10 lin.  
*Not.* C. Lynx, quam vocant feminam,

*Cypraea Isabella.*

- Linn. S. N. Gen. 320. Sp. 345.  
a Bornii test. mus. Vind. pag. 183.  
 562 C. I., testa pallida immaculata, extremitatibus aurantiis,  
     Martini Konch. Kab. T. I. tab. 27, fig. 275.  
     Long. 1 poll. 6 lin. lat. 10 lin.

## \*\*\* Umbilicatae,

*Cypraea succincta.*

- Linn. S. N. Gen. 320. Sp. 348.  
 563 C. succ. testa dorso tristri fusco fasciata, lateribus ex rufo-  
punctatis.  
     Long. 1 poll. lat. 6 lin.  
 564 C. succ. testa magis pallida, lateribus immaculatis.  
     Magnitud. antec.

*Cypraea Ziczac.*

- Linn. S. N. Gen. 320. Sp. 349.  
 565 C. Z. testa lactea, luteo undata; basi lutea ferrugineo pun-  
ctata. 4.  
     Martini Konch. Kab. T. I. tab. 23. fig. 224.  
     Long. 10 lin. lat. 4 lin.  
 566 C. Z. testa pallida *fasciis tribus fuscis*, duabus pallidis  
exangulatis, interruptis.  
     Martini loc. cit. fig. 226.  
     Long. 11 lin. lat. 6 lin.

*Cypraea Hirundo.*

Linn. S. N. Gen. 320. Sp. 350.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 184. Tab. VIII. f. 11.

367 C.

567 C. H. testa coerulescens lateribus albis ferrugineo punctata.  
tis. spec. multa.

Martini Konch. Kab. T. I. tab. 28. fig. 282.

Long. 9 lin. lat. 5 lin.

568 C. H. testa coerulescens, in medio dorsi bimaculata. 3.  
Long. 8 lin. lat. 4½ lin.

### *Cypraea Asellus.*

Linn. S. N. Gen. 320. Sp. 351.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 185.

569 C. A. testa albida fasciis tribus ex violaceo-fuscis. Mal-  
div. spec. permulta.

Martini Konch. Kab. T. I. tab. 27. fig. 280.

570 C. A. testa subviolacea immaculata, basi lutea. 3.  
Cyprea coerulea Lesseri, vid.

Martini loc. cit. pag. 360.

Long. 7 lin. lat. 4 lin.

\*\*\*\* Marginatae.

### *Cypraea cribaria.*

Linn. S. N. Gen. 320. Sp. 353.

a Bornii test. mus. Vindob. pag. 186.

571 C. cr. testa virescente-lutea ocellis albidis, basi lactea  
immaculata. 3.

Martini Konch. Kab. T. I. tab. 31. fig. 336.

Argus minor femina dicta.

Long. 1 poll. lat. 7 lin.

### *Cypraea Moneta.*

Linn. S. N. Gen. 320. Sp. 354.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 187.

572 C. M. testa prorsus lutea, basique tantum albida; ex  
Maldivis. 4.

Martini Konch. Kab. T. I. tab. 31, fig. 337-338.

Long. 10 lin. lat. 8 lin.

572b C. M. testa, disco dorsali luteo, lateribus et basi la-  
teis. spec. permulta.

Martini loc. cit. fig. 338.

Long. 1 poll. lat. 9 lin.

### *Cypraea Annulus.*

Linn. S. N. Gen. 320. Sp. 355.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 187.

- 573 C. A. testa disco dorsali sublivido, annulo flavo circumdata. Amboina. 2.  
 Martini Konch. Kab. T. I. tab. 24. fig. 240.  
 Long. 1 poll. lat. 6 lin.  
 574 C. A. testa gibbosior. 2.  
 Long. 10 lin. lat. 6 lin.

*Cypraea caurica.*

- Linn. S. N. Gen. 320. Sp. 356.  
 a Bornii test. mus. Vind. pag. 188.  
 575 C. caur. testa dorso testaceo lateribus incrassatis atque fusco maculatis, basi subincarnata immaculata. 4.  
 Martini Konch. Kab. T. I. tab. 29. fig. 301.  
 Long. 1 poll. 5 lin. lat. 11 lin.  
 576 C. caur. testa lateribus ambobus immaculatis, apertura violaceo-opalescente.  
 Long. 1 poll. 2 lin. lat. 10 lin.

*Cypraea erosa.*

- Linn. S. N. Gen. 320. Sp. 357.  
 a Bornii test. mus. Vind. pag. 189.  
 577 C. er. testa dorso testaceo, margine incrassato, latere utroque, ferrugineo maculata. 4.  
 Martini Konch. Kab. T. I. tab. 30. fig. 320. 21.  
 Long. 1 poll. 9 lin. lat. 1 poll. 2 lin.  
 578 C. er. testa linea longitudinali distinctiore. 5.  
 Long. 1 poll. 1 lin. lat. 7 lin.

*Cypraea helvola.*

- Linn. S. N. Gen. 320. Sp. 361.  
 a Bornii test. mus. Vind. pag. 191.  
 579 C. helv. testa marginata triquetro-gibba, dorso albo punctato extremitatibus subviolaceis, basique flava immaculata. Spec. permulta.  
 Martini Konch. Kab. T. I. tab. 30. fig. 326. 27.  
 Long. 9 lin. lat. 6 lin.  
 Not. B. Martini quidem fig. cit. ad hanc Linn. speciem non refert, sed Perill. a Born, lectoreum, hanc speciem quod attinet, jure jam ad fig. cit. delegavit.

*Cypraea ocellata.*

- Linn. S. N. Gen. 320. Sp. 362.  
 a Bornii test. mus. Vind. pag. 192.

- 580 C. *oc.* testa *flavescens* ocellis *fusca* et *albidis* *notata*. 3.  
 Martini Konch. Kab. T. I. tab. 31, fig. 333. 34.  
 Long. 10 lin. lat. 6 lin.

*Cypraea poraria.*

- Linn. S. N. Gen. 320. Sp. 363.  
 a Bornii test. mus. Vind. pag. 192. T. VIII, fig. 16.  
 581 C. *por.* testa *nebulosa*, punctis *albidis* *permultis* et *qui-*  
*bustam ferrugineis majoribus adspersa*. Spec. permulta.  
 Martini Konch. Kab. T. I. tab. 30, fig. 324. 25.  
 Long. 7 lin. lat. 5 lin.  
 582 C. *por.* testa *coeruleescens*, punctis *subolivaceis* *sparsa*, *al-*  
*boque subfasciata*.  
 Long. 7 lin. lat. 5 lin.

*Cypraea Pediculus.*

- Linn. S. N. Gen. 320. Sp. 364.  
 a Bornii test. mus. Vind. pag. 193.  
 583 C. Ped. testa pallide *rosea* transversim *sulcata*. Specimina  
 haud pauca.  
 Martini Konch. Kab. T. I. tab. 29, fig. 309.  
 Long. 6 lin. lat. 4 lin.  
 584 C. Ped. testa *lutea* maculis *quinque* dorso *perpallidis*,  
 prorsus fere deletis.  
 Martini loc. cit. fig. 310.  
 Long. 5 lin. lat.  $3\frac{1}{2}$  lin.  
 585 C. Ped. varietas forte eadem, sed in medio dorsi *macu-*  
*lis 2 sanguineis elevatis*, ad utrumque parietem sulci lon-  
 gitudinalis, positis.  
 Long. 4 lin. lat. 3 lin.

*Cypraea Nucleus.*

- Linn. S. N. Gen. 320. Sp. 365.  
 a Bornii test. mus. Vind. pag. 194. Tab. VIII. f. 17.  
 586 C. N. testa undique pallida, superne tuberculose striata.  
*Oc. Jnd. Or. 2.*  
 Martini Konch. Kab. T. I. tab. 29, fig. 312.  
 Long. 1 poll. lat. 7 lin.

*Cypraea staphylaea.*

- Linn. S. N. Gen. 320. Sp. 366.  
 a Bornii test. mus. Vind. pag. 194. Tab. VIII. f. 18.

587 C. st. superne subviolacea, subtus pallida, extremitatibus ferrugineis. M. Mediterr. 3.

Martini Konch. Kab. T. I. tab. 29 fig. 313.  
Long. 7 lin. lat. 5 lin.

*Cypraea brevis salita Listeri.*

588 C. br. sal. ex fusco - ferruginea punctis elevatis albidis adspersa, extremitatibus fuscis. 2,

Martini Konch. Kab. T. I. tab. 24, fig. 237, 38.  
Long. 8 lin. lat. 4 lin.

*Cypraea Cicercula.*

Linn. S. N. Gen. 320. Sp. 367.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 195. Tab. VIII. f. 19.

589 C. Cic. testa albida flavescenti subfasciata. M. Mediterr. 2.

Martini Konch. Kab. T. I. tab. 24, fig. 243.  
Long. 7 lin. lat. 4 lin.

*Cypraea Globulus.*

Linn. S. Gen. 320, Sp. 368.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 195. Tab. VIII. f. 20.

590 C. Gl. testa albida ferrugineo punctata. Oc. Asiat. 2.

Martini Konch. Kab. T. I. tab. 24. fig. 242.  
Long. 8 lin. lat. 5 lin.

BULLA.

*Bulla Ovum.*

Linn. S. N. Gen. 321. Sp. 369.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 198.

581 B. O. testa extus lactea immaculata, intus badio varia, subdiaphana. Oc. Asiat. 2.

Martini Konch. Kab. T. I. tab. 22. fig. 205. 6.

Long. 3 poll. 4 lin. lat. 2 poll. 3 lin.

*Bulla gibbosa.*

Linn. S. N. Gen. 321. Sp. 374.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 200.

592 B. g. testa lactea, latere lutescens. Oc. Asiat. 2.

Martini Konch. Kab. T. I. tab. 22. fig. 211. 12.

Long. 1 poll. 2 lin. lat. 7 lin.

*Bulla aperta.*

Linn. S. N. Gen. 321. Sp. 376.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 201.

593 B. a. testa albida immaculata transversim striata, striis in medio magis distantibus, quam postice aut antice. Cap. b. Sp.

Martini Konch. Kab. T. I. tab. min. 13. fig. 3.

Long. 1 poll. 8 lin. lat. 1 poll. 1 lin.

*Bulla Ampulla,*

Linn. S. N. Gen. 321. Sp. 378.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 202,

594 B. Amp. testa ex albo fuscoque subreticulata oblique stria-  
ta, maculisque fuscis, latiusculis, undatis, oblique fasciata.  
3. Or.

Martini Konch. Kab. T. I. tab. 21. fig. 188. 89.

Long. 2 poll. 3 lin. lat. 1 poll. 5 lin.

595 B. A. testa pallida, subolivaceo, purpurascenque vario-  
gata.

Long. 1 poll. 8 lin. lat. 1 poll. 3 lin.

596 B. A. testa ex albo rufoque varia.

Long. 1 poll. 10 lin. lat. 1 poll. 2 lin.

597 B. A. testa ex rufo alboque variegata, violaceo transver-  
sim fasciata.

Long. 1 poll. 3 lin. lat. 9 lin.

598 B. A. testa ex albo fuscoque varia, sulcis duobus obliquis  
prope marginem aperturae.

Long. 1 poll. 4 lin. lat. 10 lin.

599 B. A. testa ovata tristis longitudinaliter fuscō subfasciata,  
labio ampliore. Jamaica. 2.

Martini Konch. Kab. T. I. tab. 22. fig. 202.

Long. 1 poll. 2 lin. lat. 8 lin.

600 B. A. testa subviolaceo ovata, longitudinaliter striata,  
punctis fuscis adspersa minutis.

Martini loc. cit. fig. 203. 204.

Long. 1 poll. 3 lin. lat. 7 lin.

601 B. A. testa lattea punctis maculisque fuscis raro varie-  
gata.

Long. 7 lin. lat. 3 lin.

*Bulla Physis,*

Linn. S. N. Gen. 321. Sp. 380.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 203,

- 602 B. Ph. testa laetea pertenuis fragilisque lineis purpurascen-  
tibus transversa, quarum quatuor subaequaliter distantes,  
distinctiores sunt ceteris. Jnd. Orient.

Martini Konch. Kab. T. 1. tab. 21, fig. 196, 197.  
Long. 1 poll. 2 lin. lat. 10 lin.

### Bulla Ficus.

Linn. S. N. Gen. 321. Sp. 382.

a Born. test. mus. Vind. pag. 204.

- 603 B. F. testa pallida striis albis angustis fasciata, punctis  
ferrugineis confertim ornata. Amboina.

Martini Konch. Kab. T. 3. tab. 66. fig. 733; 734.  
Long. 2 poll. lat. 1 poll. 2 lin.

- 604 B. F. testa pallida, maculis ferrugineis subundata.  
Long. 2 poll. 8 lin. lat. 1 poll. 6 lin.

- 605 B. F. testa pallida unicolor, distincte reticulata.  
Long. 2 poll. 9. lin. lat. 1 poll. 6 lin.

### Bulla Rapa.

Linn. S. N. Gen. 321. Sp. 383.

a Born. test. mus. Vind. pag. 205.

- 606 B. R. testa pallide rufescens, apertura ad labrum crenu-  
lata. Oc. Asiat.

Martini Konch. Kab. T. 3. tab. 68. fig. 748; 49.  
Long. 2 poll. 7 lin. lat. 2 poll.

- 607 B. R. testa flavescens solidior atque foliacea; aufractus  
2 majores squamis foliaceis incisi. Mar. Chinens.

Martini loc. cit. fig. 754.  
Long. 2 poll. 11 lin. lat. 2 poll.

### Bulla Terebellum.

Linn. S. N. Gen. 321. Sp. 388.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 206.

- 608 B. T. testa albida ad spiram lutescens. Oc. Asiat.

Martini Konch. Kab. T. 2. tab. 51. fig. 568, 69.  
Long. 1 poll. 4 lin. lat. 5 lin.

### Bulla Cypraea.

Linn. S. N. Gen. 321. Sp. 389.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 206. Tab. IX. fig. 2.

- 609 B. C. testa albida ferrugineo maculata et antice violaceo  
oblique subfasciata spira oblitterata apice prominente, co-  
lumella torta et apertura ampliore violacea.

Long. 2 poll. 6 lin. lat. 1 poll. 6 lin.

Bulla

*Bulla virginea.*

Linn. S. N. Gen. 321. Sp. 390.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 207.

- 610 B. v. testa subturrata coloribus permultis varia, sed, quod rarius, *anfractibus maximis ambobus*, cingulis *et olivaceis*. Fluviat.

Chemn. Konch. Kab. T. 9. tab. 117. fig. 1080.

Long. 1 poll. 6 lin. lat. 10 lin.

- 611 B. virg. testa *coerulescens* albo haud anguste fasciata, *anfractibus superioribus ferrugineis*; albido interruptis.

Chemn. loc. cit. fig. 1004.

Long. 2 poll. 5 lin. lat. 1 poll. 2 lin.

- 612 B. virg. testa minutissima *albida sanguineo undatum et oblique fasciata*, interdum maculis ferrugineis interrupta, pertenuis ac pellucida. Spec. haud pauca.

Long. 4 lin. lat.  $2\frac{1}{2}$  lin.*Bulla achatina.*

Linn. S. N. Gen. 321. Sp. 391.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 208. Tab. IX. f. 1; 2.

- 613 B. ach. testa epidermide adhuc tecta, ex *flavescente ferruginea*, fasciis fuscis oblique undata.

Chemn. Konch. Kab. T. 9. tab. 118. fig. 1012.

Long. 3 poll. 10 lin. lat. 2 poll. 1 lin.

- 614 B. ach. testa epidermide *semitecta*, colore *subviolaceo striis longitudinalibus albis*. Litt. Guin.

Long. 3 poll. 6 lin. lat. 1 poll. 10 lin.

- 615 B. ach. testa *lactea*, spadiceo *pulcherrime fasciata*; *anfractus insimus laevis*, reliqui oblique striati.

Long. 4 poll. 4 lin. lat. 2 poll. 6 lin.

- 616 B. ach. testa *albida*, ad *anfractus supremos coerulescens*, *ferrugineo undata*, *anfractibus omnibus striatis*.

Long. 1 poll. 6 lin. lat. 11 lin.

- 617 B. ach. testa ex *fusco alboque oblique fasciata*; *anfractus 2 majores striati*, reliqui vero *crenulati*. Cap. b. Spei.

Chemn. loc. cit. fig. 1014.

Long. 5 poll. lat. 2 poll. 6 lin.

- 618 B. ach. testa *pallida*, *anfractu insimo fusco oblique et nebuloso fasciata*, *superioribus ferrugineo ordinate et conflentim striata*.

Long. 1 poll. 1 lin. lat. 9 lin.

## VOLUTA.

\* Apertura integra.

*Voluta Auris Midae.*

Linn. S. N. Gen. 322. Sp. 392.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 211.

- 619 V. A. M. testa *ferruginea*, punctis elevatis undique cincta, intus albida immaculata, columella bidentata, dente postice validiore, quasi duplicata. Jnd. Or.

Martini Konch. Kab. T. 2. tab. 42. fig. 436; 37.

Long. 2 poll. 5 lin. lat. 1 poll.

*Voluta Auris Judae.*

Linn. S. N. Gen. 322. Sp. 393.

- 620 V. A. J. testa *ex rubescente albida*, punctis ferrugineis ordinate et transversim cincta, columella quinqueplicata.

*Not.* Linn. huic speciei columellam dedit *tridentatam*.

Long. 1 poll. 6 lin. lat. 9 lin.

*Voluta solidula.*

Linn. S. N. Gen. 322. Sp. 395.

- 621 V. sol. testa albida transversim sulcata, maculis numerosissimis griseis tessellata; columella uniplicata, plica subbifida. Jnd. Or.

Long. 1 poll. 1 lin. lat. 6 lin.

\*\* Cylindroideae s. subcylindrice emarginatae.

*Voluta porphyria.*

Linn. S. N. Gen. 322. Sp. 398.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 212.

- 622 V. p. testa *incarnata*, lineis badiis numerosissimis acute atque longitudinaliter exangulata, basi violacea. Brasil.

Martini Konch. Kab. T. 2. tab. 46. fig. 485.

Long. 3 poll. lat. 1 poll. 4 lin.

- 623 V. p. testa *lutescens* characteribus fuscis inscripta, apertura pallide lutea.

Long. 2 poll. 2 lin. lat. 1 poll.

- 624 V. p. testa *alba*, lineis ex luteo violaceis anguste undulata, fasciis tribus latis transverse cincta, quarum media, colore sublivaceo, antica et postica autem ferrugineo gaudent; apertura aurantia.

Martini loc. cit. tab. 45. fig. 476.

Long. 3 poll. lat. 1 poll. 4 lin.

*Not.* Perill. a Born Conchiologiae peritissimus, cur hanc Volutam ad olivam Linn. deleget, nescimus, cum haec numquam magnitudine V. porphyriae gaudeat.

625 V.

- 625 V. p. testa pallida *ex aurantio et olivaceo undata*, fasciis 2 olivaceis transversa; apertura enteced.  
Long. 2 poll. 1 lin. lat. 11 lin.
- 626 V. p. testa albida *punctis rufescentibus longitudinaliter undata*, fusco bifariam transverse fasciata, fasciis albido, in formam castrorum interruptis.  
Long. 2 poll. 6 lin. lat. 1 poll.
- 627 V. p. testa *flavescens*, *fusco variegata*; columella albida; aperturae faux pallide violacea.  
Long. 2 poll. 9 lin. lat. 1 poll. 4 lin.

*Voluta Oliva.*

- Linn. S. N. Gen. 322. Sp. 399.  
a Bornii test. mus. Vind. pag. 213.
- 628 V.O. testa *pallida*, ferrugineo scripta; columella violascens. Mar. Jnd. 2.  
Martini Konch. Kab. T. 2. tab. 51. fig. 561.  
Long. 1 poll. 5 lin. lat. 7 lin.
- 629 V.O. testa *luteescens*, lineis ferrugineis longitudinaliter undata. 2.  
Martini loc. cit. tab. 47. fig. 505.  
Long. 1 poll. 6 lin. lat. 8 lin.
- 630 V.O. testa pallida *subviolaceo tenuiter undata*, apertura cornea. 2.  
Martini loc. cit. tab. 51. fig. 561.  
Long. 1 poll. 3 lin. lat. 4½ lin.
- 631 V.O. testa albida, *olivaceo transversim fasciata*, luteoque longitudinaliter undata ad labri marginem externum fusco undata. Batavia. 4.  
Martini loc. cit. tab. 48. fig. 512. 13.  
Long. 1 poll. 10 lin. lat. 9 lin.
- 632 V.O. testa *polita*, *lutea*, lineis coeruleofuscis exangulis scripta. 2.  
Martini loc. cit. tab. 46. fig. 489.  
Long. 1 poll. 10 lin. lat. 11 lin.
- 633 V. O. testa albida lineis longitudinalibus ex luteo coeruleofuscis undata. 8.  
Long. 1 poll. 9 lin. lat. 10 lin.
- 634 V. O. testa literata, *ex luteo ferrugineo et coeruleofuscente varia*. 14.  
Long. 1 poll. 3 lin. lat. 7 lin.

- 635 V.O. testa flavescentia, antice fascia sanguinea cineta. 4.  
 Martini loc. cit. fig. 495.  
 Long. 10 lin. lat. 6 lin.
- 636 V.O. testa extus et superne dilute rufa apertura albida. 5.  
 Long. 8 lin. lat. 4 lin.
- 637 V. O. testa undique lattea, immaculata. Spec. haud pauca.  
 Martini loc. cit. fig. 596.  
 Long. 5 lin. lat. 3 lin.

*Voluta olivacea Mart.*

- 638 V. oliv. testa albida, punctis ex violaceo lutescentibus maculata, apertura atque columella omnino amethystinis.  
 Martini Konch. Kab. T. 2. tab. 46. fig. 493. 94.  
 Long. 10 lin. lat. 5 lin.

*Voluta Nigrita Mart.*

- 639 V. N. testa ferruginea, columella ex albescenti sanguinea. 2.  
 Martini Konch. Kab. T. 2. tab. 47. fig. 501.  
 Long. 2 poll. 1 lin. lat. 10 lin.
- 640 V.N. testa ex fusco nigrae immaculata, apertura cum columella albida. Amboina. 2.  
 Martini loc. cit. tab. 45. fig. 472. 73.  
 Long. 1 poll. 8 lin. lat. 10 lin.

- 641 V. N. testa ex fusco nigra, ad labri marginem externum luteo striata et characteribus oscurioribus scripta; apertura albida, columella rufescens. 2.  
 Long. 2 poll. 2 lin. lat. 9 lin.

*Not.* Specimina 639 - 641 ad singularem speciem cum b. Martinio retuli propterea, quod columella in ipsis, postice dunataxat in primis est striata, et magnitudine, hujus speciei omnes fere V. Olivae varietates Linn. supradicatas.

*Voluta gibbosa Bornii*

- a Born. test. mus. Vind. pag. 215.  
 642 V. gibb. testa ex cinereo pallidoque marmorea, fascia postice flavescente oblique cineta, ferrugineaque maculata. 2.  
 Martini Konch. Kab. T. 2. tab. 51. fig. 565.  
 Long. 2 poll. 3 lin. lat. 1 poll. 2 lin.

642 V.

- 643 V. gibb. testa *albida*, undis pallide rufescens varia.  
Long. 2 poll. 1 lin. lat. 1 poll. 1 lin.
- 644 V. gibb. testa ovata *cinerascens*, longitudinaliter tenuissime striata, spira laevi. Jamaica.  
Martini loc. cit. tab. 501. fig. 550.  
Long. 1 poll. 9 lin. lat. 4 lin.
- 645 V. gibb. testa pallida *subincarnata* cinereo longitudinaliter striata, antice posticeque varie fasciata.  
Martini loc. cit. fig. 551.  
Long. 2 poll. 8 lin. lat. 1 poll.
- 646 V. gibb. testa pallida lineis *coerulecentibus* longitudinaliter undata, postice flavo fasciata. 2.  
Martini loc. cit. fig. 553.  
Long. 2 poll. lat. 10 lin.
- 647 V. gibb. testa pallida, undulata, undis minus distinctis, labio gibbosior. 2.  
Long. 1 poll. 4 lin. lat. 9 lin.  
*Not.* Perill. a Born quidem varietates 644-647. ipsarumque icones a nobis allegatas, ad V. gibbosam non refert, sed columella magis minusve incrassata, quae his varietatibus inest et, ut arbitramur, speciem hanc Bornii praecipue determinat, amplificationem huius speciei nostram, probabit.

*Voluta Ispidula.*

- Linn. S. N. Gen. 322. Sp. 400.  
a Bornii test. inus. Vind. pag. 216.
- 648 V. Isp. testa *flava*, punctis nebulosis adspersa, Afric. 2;  
Martini Konch. Kab. T. 2. tab. 49. fig. 522. 23.  
Long. 1 poll. 2 lin. lat. 6 lin.
- 649 V. Isp. testa *pallida* lineis longitudinalibus ferrugineis, fasciisque subviolaceis transversis ornata. 7.  
Martini loc. cit. tab. 50. fig. 551.  
Long. 9 lin. lat. 4 lin.
- 650 V. Isp. testa *lutescens* lineis ferrugineis undatum scripta. 3;  
Martini loc. cit. tab. 46. fig. 488.  
Long. 1 poll. 10 lin. lat. 10 lin.
- 651 V. Isp. testa *lattea* lineis rufescens variegata; pulcherrima. 4.  
Long. 1 poll. 10 lin. lat. 8 lin.
- 652 V. Isp. testa *fusca* postice albida, spira concolore.  
Martini. loc. cit. tab. 49. fig. 537.  
Long. 1 poll. 5 lin. lat. 6 lin.

653 V. Isp. testa alba *antice* purpureo fasciata. 2.

Martini loc. cit. fig. 530.

Long. 1 poll. 4 lin. lat. 6 lin.

654 V. Isp. testa alba *purpureo punctata*.

Long. 1 poll. 5 lin. lat. 7 lin.

655 V. Isp. testa albida fere *immaculata*.

Long. 1 poll. 6 lin. lat. 7 lin.

656 V. Isp. testa *flavescens*, lineis brunneis exangulata; spira alba minuta. 3.

Martini loc. cit. fig. 543 544.

Long. 7 lin. lat. 3½ lin.

\*\*\* Ovatae s. obovatae, effusae, emarginatae.

#### *Voluta Daftylus.*

Linn. S. N. Gen. 322. Sp. 401.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 219.

657 V. D. testa pallida *transversim sulcata*, striis longitudinalibus olivaceis.

Long. 1 poll. 7 lin. lat. 11 lin.

#### *Voluta miliaria.*

Linn. S. N. Gen. 322. Sp. 402.

658 V. mil. testa pallida subemarginata obovata *pertenuis, fragilis*, ac pellucida, spec. multa. M. Mediterr.

Long. 9 lin. lat. 3 lin.

#### *Voluta Persicula.*

Linn. S. N. Gen. 322. Sp. 404.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 220.

659 V. Pers. testa albida, lineis rubris transverse cincta. Oc. Afric. 4.

Martini Konch. Kab. T. 2. tab. 42. fig. 419. 420.

Long. 7 lin. lat. 5 lin.

660 V. Pers. testa pallida striis tenuissimis ferrugineis conser-  
tim ornata. 6.

Martini loc. cit. fig. 417. 418.

Long. 7 lin. lat. 4 lin.

661 V. Pers. testa lactea, *immaculata*,

Long. 9 lin. lat. 5 lin.

*Voluta marginata Bornii.*

a Bornii test. mus. Vind. pag. 220. T. IX. fig. 5. 6.

- 662 V. marg. testa nivea immaculata, ovata, margine tumido latoque, cincta.

Long. 1 poll. 2 lin. lat. 7 lin.

*Voluta pallida.*

Linn. S. N. Gen. 322. Sp. 405.

- 663 V. pall. testa albida lineis flavescentibus longitudinaliter undulata; labrum paullulum marginatum. Afric. spec. permulta.

Long. 1 poll. 1 lin. lat. 6 lin.

*Voluta Faba.*

Linn. S. N. Gen. 322. Sp. 406.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 221.

- 664 V. F. testa glauca maculis fuscis parvulis ac tessellatis erubinate cincta, antice plicata. Inf. Gorea. 3.

Martini Konch. Kab. T. 2. tab. 42. fig. 432. 433.

Long. 1 poll. lat. 5 lin.

*Voluta glabella.*

Linn. S. N. Gen. 322. Sp. 407.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 221.

- 665 V. gl. testa subrufescens, punctis albidis adspersa. 5.

Martini Konch. Kab. T. 2. tab. 42. fig. 429.

Long. 1 poll. 10 lin. lat. 10 lin.

*Not.* Fascia media, quae testam secundum fig. cit. cingit, in speciminiibus nostris non observatur.

- 666 V. gl. testa pallide glauca immaculata, sulco ad labri marginem externum et fauce fulvis. 6.

Long. 1 poll. 4 lin. lat. 8 lin.

- 667 V. gl. testa pallida undulis griseis longitudinalibus varia 2.

Martini loc. cit. fig. 434.

Long. 1 poll. 3 lin. lat. 7 lin.

*Voluta mercatoria.*

Linn. S. N. Gen. 322. Sp. 409.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 222.

- 668 V. m. testa albida striis ferrugineis in undas confluentibus transversim cincta. M. Mediterr. Spec. haud pauca.

Martini Konch. Kab. T. 2. tab. 44. fig. 456. 457.

Long. 9 lin. lat. 6 lin.

669 V. m. testa *flava maculis albis interrupta*, cingulo ferrugineo subarticulato notata.

Martini loc. cit. fig. 458.

Long. 9 lin. lat. 7 lin.

670 V. m. testa *glauea* cingulo ex fusco alboque alterno notata, spira purpurea, labro luteo.

Long. 9 lin. lat. 8 lin.

*Voluta rusticæ.*

Linn. S. N. Gen. 322. Sp. 410.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 222.

671 V. rust. testa *subferruginea*, maculis albis interrupta. M. Mediterr. 2.

Martini Konch. Kab. T. 2. tab. 44. fig. 469.

Long. 8 lin. lat. 4 lin.

672 V. rust. testa *luteo alboque interrupta*, spira sublivida. M. Afric. 4.

Long. 9 lin. lat. 5 lin.

673 V. rust. testa *ex ferrugineo fusca*, maculis albis adspersa. Inf. Gorea spec. multa.

Martini loc. cit. fig. 471.

Long. 6 lin. lat. 4 lin.

674 V. rust. testa *albida ferrugineo undata*.

Long. 8 lin. lat. 4½ lin.

675 V. rust. testa *fusca punctis albidis perparvis rarius adspersa*. 5

Long. 10 lin. lat. 5 lin.

*Voluta paupercula.*

Linn. S. N. Gen. 322. Sp. 411.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 223.

676 V. paup. testa alba, characteribus fuscis longitudinalibus notata; columella non distincte plicata. M. Mediterr. 3.

Chern. Konch. Kab. T. 4. tab. 149. fig. 1306.

Long. 9 lin. lat. 4 lin.

*Voluta mendicaria.*

Linn. S. N. Gen. 322. Sp. 412.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 224.

677 V. m. testa ex albo fusco transversim fasciata. Oc. Asiat. spec. plura.

Martini Konch. Kab. T. 2. tab. 44. fig. 460. 461.

Long. 8 lin. lat. 5 lin.

\*\*\*\*Fusiformes.

*Voluta Scabricula.*

Linn. S. N. Gen. 322. Sp. 417.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 225.

- 678 V. Sc. testa pallida transversim rugosa, rugis ex albido ferrugineoque alternis. Tranquebar.

Chemn. Konch. Kab. T. 4. tab. 149. fig. 1381.

Long. 2 poll. 4 lin. lat. 8 poll.

*Voluta Vulpecula.*

Linn. S. N. Gen. 322. Sp. 422.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 227.

- 679 V. Vulp. testa fulva; anfractus superiores obscuriores; apertura antice posticeque fusco maculata. Ind. Or.

Chemn. Konch. Kab. T. 4. tab. 148. fig. 1366.

Long. 1 poll. 10 lin. lat. 7 lin.

*Voluta plicaria.*

Linn. S. N. G. 322. Sp. 423.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 227.

- 680 V. plic. testa ex luteo fuscoque fasciata plicata, plicis usque ad anfractum quartum perdistinctis. Inf. Nic. 2.

Chemn. Konch. Kab. T. 4. tab. 148. fig. 1362.

Long. 2 poll. lat. 9 lin.

- 681 V. pl. testa pallida fasciis duabus rufescens varia, columella quidem quadriplicata, plica postica obsoletissima.

Long. 1 poll. 5 lin. lat. 7 lin.

- 682 V. pl. testa ex albo flavoque fasciata, postice fusca.

Long. 1 poll. 6 lin. lat. 7 lin.

- 683 V. pl. testa ex luteo fuscoque fasciata anfractibus omnibus, excepto infimo, distincte plicatis.

Long. 2 poll. lat. 8 lin.

*Voluta pertusa.*

Linn. S. N. Gen. 322. Sp. 424.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 228. Tab. IX. fig. 11. 12.

- 684 V. pert. testa alba ferrugineo fasciata atque longitudinaleiter striata, punctis pertusis, postice non amplius conspicuis. Ind. Orient.

Chemn. Konch. Kab. T. 4. tab. 147. fig. 1358. 59.

Long. 1 poll. 10 lin. lat. 9 lin.

- 685 V. pert. testa ex flavescenti brunnascens, *immaculata* punctis pertusis, undique conspicuis. 2.  
Long. 2 poll. lat. 6 lin.

*Voluta mitra Episcopalis.*

- Linn. S. N. Gen. 322. Sp. 425. var.  $\alpha$ .  
a Bornii test. mus. Vind. pag. 228.
- 686 V. m. Ep. testa *lactea sanguineo varia*, ventre seriebus 8 macularum miniatarum cincto. Oc. Asiat.  
Chenn. Konch. Kab. T. 4. tab. 147. fig. 360. a.  
Long. 5 poll. lat. 1 poll. 5 lin.
- 687 V. m. Ep. labio *minus explanato ac tenuiore*.  
Long. 4 poll. 3 lin. lat. 1 poll. 3 lin.
- 688 V. m. Ep. testa *maculis aurantiis potius ac miniatis*.  
Long. 3 poll. lat. 1 poll.

*Voluta mitra Papalis.*

- Linn. S. N. Gen. 322. Sp. 425. var.  $\beta$ .  
a Bornii test. mus. Vindob. pag. 229.
- 689 V. m. P. testa *lactea maculis sanguineis seriatim cincta*, anfractibus coronatis; intus lutescens, columella *quintuplicata*. Inf. Cera.  
Chenn. Konch. Kab. T. 4. tab. 147. fig. 1354.  
Long. 4 poll. 3 lin. lat. 1 poll. 2 lin.
- 690 V. m. P. testa *lutescens*, maculis sanguineis vicinioribus ad sparsa; columella *quadriplicata*.  
Long. 3 poll. 9 lin. lat. 1 poll. 1 lin.
- Not.* Specimen sub nro. 689. signatum sententiam Cel. Chemnitzi ratione columellae V. mitr. Papalis loc. cit. pag. 198 Not. 4. prolatam confirmare videtur, sed sequens sub 690 signatum observationi Perill. Bornii quoad columellam *quadriplicatam* respondet: qua ex re ratione cinari licitum erit, utrumque Conchiologistam recte observasse, sententiam Chemnitzi autem non generaliter valere, sed specimina 689 et 690, ut varietates unius speciei esse consideranda.
- 691 V. m. Pap. testa *crocea*, varicibus niveis undata, in infimo anfractu fenestras quasi formantibus; punctis exiguis transversim et ordinate positis distinctius perforata. 2.  
Chenn. loc. cit. fig. 1356.  
Long. 2 poll. 2 lin. lat. 10 lin.
- Not.* Cuius varietatis columellam Chemnitzius ipse (loc. cit. pag. 202) *quadriplicatam* docet.

*Voluta Musica.*

Linn. S. N. Gen. 322. Sp. 427.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 230.

- 692 V. M. testa pallide incarnata, *punctis et maculis ferrugineis fuscisque notata*; columella decemplicata. Jamaica. 2.  
Martini Konch. Kab. T. 3. tab. 96. fig. 929.  
Alterius Long. 3 poll. 2 lin. lat. 1 poll. 6 lin.

— — I — 10 — I — —

- 693 V. M. testa extus colore praecedentis, *anfractibus spinis obtusioribus*; aperturæ incarnatae labrum fuso variegatum; columella duodecimplicata, plicis quatuor validioribus.

Long. 2 poll. lat. 1 poll. 1 lin.

- 694 V. M. testa punctis rarioribus adspersa, columella octoplicata.

Long. 2 poll. 2 lin. lat. 1 poll. 5 lin.

- 695 V. M. testa pallida rufo variegata; spirae macro *flavus* atque *diaphanus*.

Long. 2 poll. 2 lin. lat. 1 poll. 2 lin.

- 696 V. M. testa pallida, antice maculis flavis transverse et ordinate positis, varia, lineis ferrugineis angustis undique striata, columella novemplicata, plicis quinque validioribus.

Martini loc. cit. fig. 927. fere.

Long. 2 poll. 6 lin. lat. 1 poll. 4 lin.

- 697 V. M. testa albida, punctis ferrugineis rarissimis adspersa, plicata et transversim sulcata, columella novemuplicata.

Chemn. Konch. Kab. T. 10. tab. Suppl. 149. fig. 403.

Long. 1 poll. 6 lin. lat. 1 poll.

*Not.* Hisce ex speciminibus 692 - 697. omnino patet, columellam, quoad numerum plicarum *varietates huius speciei*, nec speciem ipsam determinare.

*Voluta Vespertilio.*

Linn. S. N. Gen. 322. Sp. 428.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 230.

- 698 V. Vesp. testa *flavescens* maculis exangulata fuscis, obsoletius spinosa. Amboina.

Martini Konch. Kab. T. 3. tab. 98. fig. 939.

Long. 6 poll. lat. 2 poll. 6 lin.

- 699 V. Vesp. testa *sublutescens*, characteribus ferrugineis notata; apertura albida, labro flavo subdiaphano,  
Long. 3 poll. 9 lin. lat. 1 poll. 6 lin.
- 700 V. Vesp. testa *paulo obscurior*, labio *incrassato*.  
Long. 2 poll. 6 lin. lat. 1 poll. 4 lin.
- 701 V. Vesp. testa *triflisis*, angulis acutis fuscis inscripta.  
Long. 2 poll. 10 lin. lat. 1 poll. 9 lin.
- 702 V. Vesp. testa *tenuior pallida ferrugineo longitudinaliter undata*,  
Long. 1 poll. 9 lin. lat. 11 lin.
- 703 V. Vesp. testa *pallida fusco litterata*, spinis rectis acutis; apertura albida, nitens, labro ac labio ex flavescente-rufis,  
Martini loc. cit. fig. 939.  
Long. 3 poll. 5 lin. lat. 2 poll.
- 704 V. Vesp. varietas fere eadem, testa autem characteribus *ex virescente fuscis notata*.  
Long. 2 poll. 9 lin. lat. 1 poll. 6 lin.
- 705 V. Vesp. testa pallida characteribus ferrugineis angustioribus notata, apertura ad labrum flava haud angusta.  
Long. 2 poll. 6 lin. lat. 1 poll. 6 lin.
- 706 V. Vesp. testa spinis breviusculis attamen peracutis, apertura *pallide rosea*.  
Long. 2 poll. 2 lin. lat. 1 poll.
- 707 V. Vesp. testa *incarnata absque characteribus*, pertinuis, levis ac diaphana.  
Chemn. Konch. Kab. T. 10. tab. Suppl. 149. fig. 1398.  
Long. 2 poll. 8 lin. lat. 1 poll. 2 lin.

*Voluta ebraea.*

- Linn. S. N. Gen. 322. Sp. 429.  
a Bornii test. mus. Vind. pag. 221.
- 708 V. ebr. testa *pallide incarnata characteribus lineisque ferrugineis notata* ac scripta, columella plicata, plicis quinque validioribus, *tribusque perobsoletis*. Ind. Orient.  
Martini Konch. Kab. T. 3. tab. 96. fig. 927.  
Long. 4 poll. 4 lin. lat. 3 poll.
- 709 V. ebr. testa *solidior*, columella plicata, plicis etiam quinque validioribus, *otto autem anterioribus obsoletis*.  
Long. 4 poll. 8 lin. lat. 2 poll. 6 lin.

*Volu-*

*Voluta Magellanica Chemn.*

710 V. M. testa pallida olivaceo und. lata longitudinaliter striata, striis tenuissimis; columella triplicata.

Chemn. Konch. Kab. T. 10. tab. Suppl. 148. fig. 1383 84.  
Long. 1 poll. 10 lin. lat. 1 poll.

*Voluta Turbinellus.*

Linn. S. N. Gen. 322. Sp. 430.

711 V. Turb. testa sublivida, fusco fasciata, spinis solidis armata, apertura levis. Litt. Coromand.

Martini Konch. Kab. T. 3. tab. 99. fig. 944.  
Long. 2 poll. 4 lin. lat. 1 poll. 10 lin.

712 V. Turb. testa alkida fusco fasciata, aperturae labrum atque labium utrumque ita varium.

Long. 1 poll. 6 lin. lat. 1 poll.

*Voluta Capitellum.*

Linn. S. N. Gen. 322. Sp. 431.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 232.

713 V. Cap. testa alba immaculata, transversim rugosa atque nodosa; columella quadriplicata, plicis duabus alternis validioribus. Oc. Ind.

Martini Konch. Kab. T. 3. tab. 99. fig. 949.  
Long. 3 poll. 3 lin. lat. 2 poll. 4 lin.

*Voluta Ceramica.*

Linn. S. N. Gen. 322. Sp. 432.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 233.

714 V. Cer. testa pallida fusco variegata, apertura distincte striata. Inf. Ceram.

Martini Konch. Kab. T. 3. tab. 99. fig. 943.  
Long. 4 poll. lat. 1 poll. 10 lin.

715 V. Cer. testa alba ferruginea longitudinaliter fasciata.

Long. 2 poll. 10 lin. lat. 1 poll. 3 lin.

*Not.* Quia et hoc in specimine aperturae faux transversim valide striata, V. Turbinelli autem semper levis est; praeter formam, ex hac qualitate aperturae praeципue characterem essentialem, ad discernendam V. Ceramicam a Turbinello, quaerendum esse, arbitramur.

*Voluta Pyrum.*

Linn. S. N. Gen. 322. Sp. 433.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 234.

716 V. P. testa epidermide fusca rugosa obtecta, tenuis et dia-phana sed pergravis, apertura albida, columella rosea. Tranquebar.

Mart. Konch. Kab. T. 3. tab. 95. fig. 918.

Long. 3 poll. 6 lin. lat. 1 poll. 11 lin.

*Not.* Quae species, epidermide adhuc integra, perraro in museis reperiatur.

*Voluta verruculata Mart.*

717 V. verr. testa lactea ferrugineo notata transversim nodo-sa; labrum subdentatum, labiumque incrassatum, pun-ctis elevatis undique adspersum. 2.

Martini Konch. Kab. T. 2. tab. 34. fig. 357.

Long. 7 lin. lat. 5 lin.

\*\*\*\*\* Ventricosae.

*Voluta Aethiopica.*

Linn. S. N. Gen. 322. Sp. 435.

a Born. Test. mus. Vind. pag. 234.

718 V. Aeth. testa ferruginea immaculata, apertura sublutea, spinis decumbentibus, columella triplicata.

Martini Konch. Kab. T. 3. tab. 75. fig. 785.

Long. 4 poll. 6 lin. lat. 2 poll. 9 lin.

719 V. Aeth. testa praecedenti unicolor, apertura pallidiore, spinis erectis. Mar. Persic.

Martini loc. cit. tab. 73. fig. 777.

Long. 3 poll. 2 lin. lat. 1 poll. 8 lin.

720 V. Aeth. testa sublutescens, maculis fuscis, prope in-te-riorem ventris partem modo conspicuis, spinis nullis, colu-mella quadriplicata. Ind. Orient.

Long. 4 poll. 3 lin. lat. 2 poll. 4 lin.

*Not.* Quod specimen, quamvis spinis plane careat, ta-men hic posuimus, quod nec labrum ipsius tam dilata-tum sit, ut in V. Olla reperitur, nec anfractus distin-ci-sint, id quod Perill. a Born pag. 235. etiam pro char-a-ctere habet V. Ollae essentiali; nec etiam alia species V. detur, ad quam spec. ipsum referre possemus.

*Voluta Cymbium.*

Linn. S. N. Gen. 322. Sp. 436.

s Bornii test. mus. Vind. pag. 235.

721 V. Cymb. testa pallida *badio undata*, apertura subincar-nata levissima ac splendidissima.

Martini Konch. Kab. T. 3. tab. 70. fig. 762.

Long. 4 poll. lat. 2 poll.

722 V. C. testa pallida *ferrugineo varia*, anfractibus valide canaliculatis.

Long. 4 poll. 4 lin. lat. 1 poll. 10 lin.

723 V. C. testa pallida, *anfractus infimi*, canalicula lactea nitente, apertura incarnata et immaculata. Inf. Philippin.

Martini loc. cit. fig. 764.

Long. 3 poll. 6 lin. lat. 1 poll. 11 lin.

### *Voluta Olla.*

Linn. S. N. Gen. 322. Sp. 437.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 236.

724 V. O. testa cortice rugoso vestita, intus subcarnea, labro quam maxime dilatato. Sin. Persie.

Martini Konch. Kab. T. 3. tab. 71. fig. 767.

Long. 7 poll. lat. 5 poll. 4 lin.

*Not.* Spiram huius speciminis *destrutam* esse valde est dolendum. — B. Martini quidem hanc Volutam pro Cymbio habuit, sed apertura *tam dilata* atque columella *quadriplicata* nos impellunt ipsam ad V. Ollam Linn. referre.

725 V. O. testa flavescentes unicolor; apertura rufescens. Inf. Philipp.

Martini loc. cit. fig. 766.

Long. 3 poll. 6 lin. lat. 2 poll.

### *Voluta Praeputium Chemn.*

726 V. Praep. testa *subferruginea*, alboque interrupta, aper-tura albida, columella *quadriplicata*. Tranquebar. 2.

Chemn. Konch. Kab. T. 10. tab. Suppl. 149. fig. 1391. 92.  
Long. 1 poll. 8 lin. lat. 11 lin.

### *Voluta Subpraeputium.*

727 V. Subpr. testa ovata, emarginata, minuta, subventricosa; spira elevata, anfractibus 4 contiguis ac nodosis; columella perforata, absque plicis. Color albidus ferrugi-neoque varius. Patria incognita †).

Long. 7 lin. lat. 5 lin.

BUC-

†) vid. Tab. Helmintholog. fig. 4.

## BUCCINUM.

\*Ampullacea, inflata, rotunda, tenui - subdiaphana,  
fragilis.

*Buccinum Galea.*

- Linn. S. N. G. 323. Sp. 439.  
a Born. test. mus. Vind. pag. 239.
- 728 B. G. testa obovata, sulcata, *extus albida, immaculata,*  
*intus lutescens.* Ind. Or.  
Martini Konch. Kab. T. 3. tab. 116. fig. 1070.  
Long. 3 poll. 10 lin. lat. 3 poll.
- 729 B. G. testa albida, costis validioribus antice, *posticeque*  
*ferrugineo tessellatis.*  
Long. 4 poll. lat. 3 poll.

*Buccinum Perdix.*

- Linn. S. N. Gen. 323. Sp. 400.  
a Bornii test. mus. Vind. pag. 239.
- 730 B. P. testa pallida ferrugineo transversim fasciata, fasciis  
interruptis, pertenuis fragilisque, semipellucida, labrum  
margine interiori fuscum. Litt. Guin.  
Martini Konch. Kab. T. 3. tab. 117. fig. 1079.  
Long. 3 poll. 8 lin. lat. 2 poll. 4 lin.
- 731 B. P. testa extus flavescens, fere unicolor, costis inter  
sulcos quam maxime explanatis; labium lacteum et tenui.  
Long. 4 poll. lat. 3 poll.  
Not. Spira paullulum destructa.
- 732 B. P. testa pallida brunascente, nebulose undata.  
Long. 2 poll. 9 lin. lat. 2 poll.
- 733 B. P. testa lactea costis pallide incarnatis quaternis sub-  
acqualiter distantibus.  
Long. 2 poll. 6 lin. lat. 1 poll. 5 lin.
- 734 B. P. testa lutescens longitudinaliter obsolete striata.  
Long. 1 poll. 6 lin. lat. 1 poll. 2 lin.

*Buccinum Pomum.*

- Linn. S. N. Gen. 323. Sp. 441.  
a Bornii test. mus. Vind. pag. 240.
- 735 B. P. testa pallida maculis subincarnatis albisque variega-  
ta; aperturae flavescentis labrum dentatum, dentibus 10  
compressis, labiumque plicatum plicis 5 obsoletiusculis.  
Java. 2.

Martini Konch. Kab. T. 2. tab. 36. fig. 370. 71.

Buc-

*Buccinum Delium.*

- Linn. S. N. Gen. 323. Sp. 442.  
a Bornii test. mus. Vind. pag. 241.
- 736 B. D. *testa lactea*, costis *tessellis ferrugineis* cincta; in-  
tus ex albido lutescens; labrum subintegrum. Tran-  
quebar.  
Martini Konch. Kab. T. 3. tab. 197. fig. 1073.  
Long. 3 poll. 6 lin. lat. 2 poll. 6 lin.
- 737 B. D. *testa albida*, costis, praecipue subtus, *lutescenti-  
bus*; labrum plicatum denticulatum, dentibus introrsum  
geminis. Mar. Sicul.  
Long. 4 poll. lat. 3 poll.
- 738 B. D. *testa rufescens*, costis ex albido spadiceoque varie-  
gatis cincta; apertura badia nitens, labio utroque lacteo.  
Long. 2 poll. 10 lin. lat. 2 poll. 1 lin.
- 739 B. D. *testa pallida unicolor*, margine exteriori labri per  
incrementum novum, gibbosum. 2.  
Long. 1 poll. 9 lin. lat. 1 poll. 2 lin.
- \*\* Cassidea Caudata: cauda exserta, brevi, reflexa; la-  
bro extrorsum inermi.

*Buccinum Echinophorum.*

- Linn. S. N. Gen. 321. Sp. 443.  
a Bornii test. mus. Vind. pag. 242.
- 740 B. Ech. *testa pallide rufescens*, costata ac tuberculosa, *tu-  
berculis quadrifariam cinctis*; spirae anfractus insimus  
cingulo nodoso unico. M. Mediterr.  
Mart. Konch. Kab. T. 2. tab. 41. fig. 407.  
Long. 2 poll. 4 lin. lat. 1 poll. 5 lin.
- 741 B. Ech. *testa pallida*, cingulis nodosis, duobus tantum di-  
stinctioribus.  
Long. 2 poll. 6 lin. lat. 1 poll. 5 lin.

*Buccinum cornutum.*

- Linn. S. N. Gen. 323. Sp. 445.  
a Bornii test. mus. Vind. pag. 243.
- 742 B. corn. *testa gigantea supra limo marino sordida*, basi  
ex albo ferrugineoque nitidissima; spirae anfractu insi-  
mo spinis 6 per validis armato.  
Martini Konch. Kab. T. 2. tab. 35. fig. 362.  
Long. 9 poll. lat. 7 poll. 6 lin.

- 743 B. corn. testa *limo marino expurgato*, decussatum striata, striis longitudinalibus distinctioribus quam transversalibus, subreticulata; labrum dentibus 10 subconicis, labrum potius plicatum ac dentatum; anfractus spirae infimus quoque spinis 6.

Long. 5 poll. lat. 4 poll.

- 744 B. corn. testa *scrobiculis validius punctata*, fasciata ac coronata; baseos pars lata, pulcherrime punctata; anfractus infimus spinis 11, cinctus. Amer.

Mart. loc. cit. fig. 348. 349.

Long. 3 poll. 10 lin. lat. 3 poll.

- 745 B. corn. testa *pulchre variegata*; labrum albidum maculis quinque ferrugineis; anfractus infimus spinis 9.

Long. 3 poll. 6 lin. lat. 2 poll. 10 lin.

### *Buccinum Testiculus.*

Linn. S. N. Gen. 323. Sp. 449.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 246.

- 746 B. T. testa pallida ferrugineo varia *sulcata*, sulcis 16 transversis, pluribus autem longitudinalibus; labrum albidum maculis geminis atris margine exteriore varium, interiore vero aurantio fasciatum; labrum amplissime replicatum, postice incrassatum. Ind. Occ. 2.

Martini Konch. Kab. T. 3. tab. 37. fig. 376. 77.

Long. 2 poll. 1 lin. lat. 1 poll. 4 lin.

- 747 B. T. testa *decussatim* antice subundulate striata, sulcis transversis nullis.

Long. 3 poll. lat. 1 poll. 6 lin.

### *Buccinum decussatum.*

Linn. S. N. Gen. 323. Sp. 450.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 246.

- 748 B. dec. testa pallida immaculata decussatim striata.

Martini Konch. Kab. T. 3. tab. 35. fig. 360. 61.

Long. 1 poll. 7 lin. lat. 1 poll. 1 lin.

### *Buccinum Areola.*

Linn. S. N. Gen. 323. Sp. 451.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 247.

- 749 B.A. testa *glaucă* tessulis ferrugineis, per series in aperituram usque digestas, varia; spira distincte striata. Java.

Long. 2 poll. 10 lin. lat. 1 poll. 6 lin.

- 750 B. A. testa *albida* flavo tessellata, ita disiecta, ut columella undique conspicua sit.  
Long. 2 poll. 9 lin. lat. 1 poll. 6 lin.
- 751 B. A. testa tenuior *pallide violacea* ferrugineaque tessellata, transversim striata, spira subreticulata.  
Long. 2 poll. 6 lin. lat. 1 poll. 7 lin.
- 752 B. A. testa *albida* *tessellis* fere *deletis*; labium incrassatum verrucosum.  
Long. 2 poll. 1 lin. lat. 1 poll. 5 lin.
- 754 B. A. testa *pertenuis* fragilisque; labrum vix dentatum, labium vero undique plicatum, plicis obsoletiusculis.  
Long. 1 poll. 4 lin. lat. 1 lin.
- 755 B. A. testa pallida, *flavo longitudinaliter vittata*; aperturae faux transversim striata.  
Long. 1 poll. 10 lin. lat. 1 poll.
- \*\*\* *Cassidea unguiculata*: labro postice extrorsum aculeato; caeterum Caudatis praec. similia:

### *Buccinum Erinaceus.*

- Linn. S. N. Gen. 323. Sp. 452.  
a Bornii test. mus. Vind. pag. 248.
- 756 B. Er. testa *subplicata*, laevis, pallida ferruginea notata; labrum spinis minimis exasperatum. Tranquebar.  
Martini Konch. Kab. T. 2. tab. 35. fig. 563.  
Long. 1 poll. 8 lin. lat. 11 lin.
- 757 B. Er. testa *solidior*; labrum albidum fusco maculatum, postice modo spinosum.  
Long. 2 poll. lat. 1 poll. 1 lin.
- 758 B. Er. testa pallida, *ferrugineo longitudinaliter undata*, plicis vix conspicuis; labrum spinis 4 postice muricatum.  
Long. 1 poll. 9 lin. lat. 1 poll.  
*Not.* Quod specimen medium videtur inter B. *Erinaceus* et *Vibicem*.
- 759 B. Er. testa pallide *rosea*; labrum spinis nullis. 2.  
Long. 1 poll. 6 lin. lat. 1 poll.
- 760 B. Er. testa *sublutescens*, nodosa potius ac plicata; labrum etiam absque spinis.  
Long. 1 poll. 10 lin. lat. 1 poll. 6 lin.  
*Not.* No. 759 - 768 varietates singulares hujus speciei; sed forma aliisque, quibus gaudent, characteres, relationem ipsarum ad B. *Erinaceum* postulant.

*Buccinum glaucum.*

Linn. S. N. Gen. 323. Sp. 453.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 249.

- 761 B. gl. testa grisea, unicolor, solida atque opaca; aperturæ faux nitide badia, labium utrumque incarnatum, interius plicatum et rugosum exterius dentatum, postice autem, valide muricatum. Amboina.

Martini Konch. Kab. T. 2. tab. 32. fig. 342; 43.

Long. 3 poll. lat. 1 poll. 10 lin.

*Buccinum Vibex.*

Linn. S. N. Gen. 323. Sp. 454.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 249.

- 762 B. V. testa pallida, ferrugineo oblique striata, tenuis semipellucida ac fragilis. Jamaica.

Martini Konch. Kab. T. 2. tab. 35. fig. 364; 65.

Long. 1 poll. 6 lin. lat. 10 lin.

- 763 B. V. testa ut antecedens variegata, striata, striis sursum subimbricatis.

Long. 1 poll. 7 lin. lat. 10 lin.

- 764 B. V. testa lactea, immaculata; labrum margine exteriori ferrugineo maculata; apertura undique lactea.

Long. 1 poll. 8 lin. lat. 11 lin.

*Buccinum papillosum.*

Linn. S. N. Gen. 323. Sp. 455.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 250.

- 765 B. papp. testa undique tuberculata, albida ferrugineo maculata; spirae apex suminus roseus; aperturæ faux striata. Amboina.

Chemn. Konch. Kab. T. 4. tab. 125. fig. 1204; 5.

Long. 1 poll. 8 lin. lat. 9 lin.

Not. Specimen egregie conservatum.

*Buccinum Glans.*

Linn. S. N. Gen. 323. Sp. 456.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 251.

- 766 B. Gl. testa albida rufo lineata; labrum postice obsolete muricatum, labium antice, dente unico.

Chemn. Konch. Kab. T. 4. tab. 125. fig. 1196; 97.

Long. 1 poll. 10 lin. lat. 1 poll.

\*\*\*\* Cal-

\*\*\*\*\* Callosa: columellae labio incrassato, dilatato.

*Buccinum Arcularia.*

Linn. S. N. Gen. 323. Sp. 457.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 251.

- 768 B. Arc. testa *albida*, inter plicas tantum anfractus maxi-  
mi, maculis notata coeruleoscentibus. 2.

Martini Konch. Kab. T. 2. tab. 41, fig. 409; 10.

Long. 1 poll. lat. 10 lin.

*Not.* B. arcularia Bornii minime verum esse, Cel. Chemnitz.  
Konch. Kab. T. 4. pag. 45 probavit.

- 769 B. Arc. testa *sublivida*; aperturae labium valde explanatum,  
faux nebulose brunascens, linea alba transversa interrupta,  
Long. 1 poll. 3 lin. lat. 10 lin.

*Buccinum Pullus.*

Linn. S. N. Gen. 323. Sp. 458.

- 770 B. P. testa pallida, apertura prope labrum transverse stria-  
ta. M. Mediterr.  
Long. 1 poll. lat. 6 lin.

\*\*\*\*\* Detrita: columellae labium quasi abrasum, planum,

*Buccinum Harpa.*

Linn. S. N. Gen. 323. Sp. 462.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 253.

- 771 B. H. testa ex rufo alboque varia, costis longitudinalibus,  
postice flexuosis, duodecim. Jnd. Orient.  
Martini Konch. Kab. T. 3. tab. 119. fig. 1090.

Long. 3 poll. 2 lin. lat. 2 poll.

- 772 B. H. testa praecedenti persimilis, sed costa tertia, a labri  
margine, omnium *latissima*.  
Long. 3 poll. lat. 1 poll. 11 lin.

- 773 B. H. testa ex rufescenti-ferruginea, pallidoque pulchra;  
rime variegata; costis 13, pluribus subaequalibus.  
Martini loc. cit. fig. 1091.

Harpa quae audit nobilis.

Long. 2 poll. lat. 1 poll. 4 lin.

- 774 B. H. varietas eadem, quae potissimum in eo ab anteced-  
differt, quod color testae *minus rufescat*.  
Long. 2 poll. 1 lin. lat. 1 poll. 4 lin.

- 775 B. H. testa ex flavescenti pallidoque varia, costis *carneis*  
*alboque interruptis*, subtus fusca,  
Martini loc. cit. fig. 1094.

Long. 2 poll. 5 lin. lat. 1 poll. 6 lin.

- 776 B. H. varietas eadem, testa *disselta*, ut *columnella* et *apertura* tota, quam Serpulae ac Celleporae inhabitant, *conspiciantur*.  
 Long. 2 poll. 6 lin. lat. 1 poll. 9 lin.
- 777 B. H. testa costis *latrioribus* ex rufo albidoque fasciatis.  
 Martini loc. cit. fig. 1096.  
 Long. 2 poll. lat. 1 poll. 4 lin.
- 778 B. H. testa costis *quindecim* ex *fusco alboque variis*; *spirae* apex sumimus violaceus.  
 Martini loc. cit. fig. 1097.  
 Long. 2 poll. 1 lin. lat. 1 poll.
- 779 B. H. testa costis *fusco densius undatis*; *spirae* apex sumimus regioque labii colore violaceo.  
 Long. 1 poll. 5 lin. lat. 10 lin.
- 780 B. H. testa varicibus *perangustis* costata.  
 Long. 1 poll. 3 lin. lat. 9 lin.

*Buccinum costatum.*

- Linn. S. N. Gen. 323. Sp. 463.
- 781 B. cost. testa tenuis, diaphana, pallida, varicata varicibus viginti angustissimis, transversim *fulcata*.  
 Chemn. Konch. Kab. T. 10. tab. suppl. 152. fig. 1453.  
 Long. 1 poll. 3 lin. lat. 10 lin.
- Not. Solertissimus Chemnitz cum Linnaco *differentiam specificam* hujus cum praecedenti in numero et vicinitate varicum ponit; sed maxima pars hujus honoris, *fulcis linearibus numerosissimis*, qui spatia inter varices transverse atque confertim cingunt, propterea deberi nobis videtur, quoniam in nullis varietatibus B. Harpae inveniuntur.

*Buccinum persicum.*

- Linn. S. N. Gen. 323. Sp. 464.
- a Bornii test. mus. Vind. pag. 254.
- 782 B. p. testa *hepatica*, cingulis distinctioribus ex fusco alboque lineatis, plerumque cum tribus obsoletiusculis alternis, circumdata. Sin. Persic.  
 Martini Konch. Kab. T. 3. tab. 69. fig. 760.  
 Long. 3 poll. 6 lin. lat. 2 poll. 1 lin.
- 783 B. p. testa *cingulis validioribus* cum binis tantum alternis, circumdata.  
 Long. 3 poll. lat. 2 poll.
- 784 B. p. testa *polita* pallide hepatica, annulis linearibus albis permultis, quorum 4 distinctiores, cincta.  
 Long. 3 poll. lat. 1 poll. 10 lin.

785 B.

- 785 B. p. testa *sublivida*, animali adhuc inhabitata.  
Long. 1 poll. 6 lin. lat. 1 poll. 1 lin.

*Buccinum patulum.*

Linn. S. N. Gen. 323. Sp. 465.

- 786 B. pat. testa *fusca*, cingulis 6 nodosis circumdata; labio flavescente. Oc. Asiat. 2.

Martini Konch. Kab. T. 3. tab. 69. fig. 758. 759.

Long. 1 poll. 7 lin. lat. 1 poll.

- 787 B. pat. testa, cortice tristri virescentique adhuc *tebla*, cingulis quatuor nodosis muricata.

Long. 3 poll. lat. 1 poll. 9 lin.

*Buccinum haemastoma.*

Linn. S. N. Gen. 323. Sp. 466.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 254.

- 788 B. haem. testa subferruginea, nodis albidis cincta undique transversim striata. Oc. Europ.

Martini Konch. Kab. T. 3. tab. 101. fig. 964.

Long. 1 poll. 8 lin. lat. 1 poll. 2 lin.

- 789 B. h. testa vix submuricata, obsoletius striata.

Long. 1 poll. lat. 8 lin.

*Buccinum Monoceros Chemn.*

- 790 B. M. testa pallida ferrugineo maculata, transversim rugosa, cortice tantum squamo poscite paululum detrita; apertura dente unico conoideo, validiori, postice ad labrum, armata. Jnf. Falkland.

Chemn. Konch. Kab. T. 10. tab. 154. fig. 1469. 70.

Long. 2 poll. 1 lin. lat. 1 poll. 3 lin.

*Buccinum Lapillus.*

Linn. S. N. Gen. 323. Sp. 467.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 255.

- 791 B. L. testa ovata striata, cortice viridi obtecta;

Martini Konch. Kab. T. 3. tab. 121. fig. 1111.

Long. 1 poll. 4 lin. lat. 10 lin.

\*\*\*\*\* Laevigata (nec praecedentia).

*Buccinum spiratum.*

Linn. S. N. Gen. 323. Sp. 469.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 256.

- 792 B. spir. testa alba maculis subaurantiis varia; anfractuum futurae quam maxime canaliculatae. Tranquebar. 2.  
 Chemn. Konch. Kab. T. 4. tab. 122. fig. 1118.  
 Long. 1 poll. 9 lin. lat. 1 poll. 2 lin.
- 793 B. spir. testa albida subaurantio undata; spirae futurae angustius canaliculatae.  
 Long. 1 poll. 9 lin. lat. 1 poll. 1 lin.
- 794 B. spir. testa, spira acutiore; columellae foramen violaceo notatum, dentibusque 4 munitum.  
 Chemn. loc. cit. fig. 1119.  
 Long. 2 poll. 2 lin. lat. 1 poll. 2 lin.

*Buccinum glabratum.*

- Linn. S. N. Gen. 323. Sp. 470.  
 a Bornii test. mus. Vind. pag. 257.
- 795 B. gl. testa extus ex albescenti flava; columella lactea; apertura lutescens. Tranquebar. 3.  
 Chemn. Konch. Kab. T. 4. tab. 122. fig. 1117.  
 Long. 2 poll. 4 lin. lat. 11 lin.

\*\*\*\*\* Angulata (nec antea dicta).

*Buccinum glaciale.*

- Linn. S. N. Gen. 323. Sp. 474.
- 796 B. gl. testa ovato-oblonga, lactea, cortice tenuissimo viridi obtecta; labrum integrum; labiumque entice incrassatum.  
 Long. 1 poll. 5 lin. lat. 7 lin.

*Buccinum reticulatum.*

- Linn. S. N. Gen. 323. Sp. 476.  
 a Bornii test. mus. Vind. pag. 260. Tab. IX. f. 16.
- 797 B. ret. testa lutescens, anfractuum futuris coerulecentibus; longitudinaliter striata transversim nodoso-reticulata. Afric. 6.  
 Chemn. Konch. Kab. T. 4. tab. 124. fig. 1162; 63.  
 Long. 1 poll. 1 lin. lat. 6 lin.
- 798 B. ret. testa albida, fusco fasciata, longitudinaliter rugosoplicata; apertura dentata, labro marginato.  
 Chemn. Konch. Kab. T. 4. tab. 124. fig. 1164; 65.  
 Long. 11 lin. lat. 6 lin.
- 799 B. ret. varietas singularis cui praeter characteres antedentium est spira magis exserta, et apertura edentula. 2.  
 Long. 1 poll. lat. 6, 5 lin.  
*Not.* An species forsitan singularis.

*Buccinum clathratum Bornii.*

a Bornii test. mus. Vind. pag. 261. Tab. IX. f. 17, 18.

800 B. clathr. testa ovata longitudinaliter plicata transversim subdecussatim striata, ex rufescente glauca; aperturæ ovatae labrum crenatum, labium expansum, sed ad marginem incrassatum nec tenuer.

Long. 10 lin. lat. 7 lin.

*Buccinum scalariforme.*

801 B. scal. testa subovata, striata, striis obliquis atque transversis reticulatim decussata; aperturæ marginatae labrum integrum submarginatum, labium expansum postice triplicatum. Inf. Maurit. 5.

Chemin. Konch. Kab. T. 4. tab. 124. fig. 1172; 73.

Nassa truncata scalariformis.

Long. 10 lin. lat. 6 lin.

*Not.* Errorem Perilli a Bornii, qui hanc Buccini speciem in Indice mus. Caes. pag. 244 pro B. Arcularia Linn. habuit, id quod etiam in operis majoris jam saepius citati paginam 251 transtulit, Cel. Chemnitz. jamjam loc. cit. pag. 45 indicavit ac emendavit.

\*\*\*\*\* Turrita: laevia, subulata.

*Buccinum maculatum.*

Linn. S. N. Gen. 323. Sp. 479.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 261.

802 B. mac. testa flavescens, anfractibus duodecim, turrita, basi fasciis niveis transversa; spira ferrugineo et purpurascenti seriatim maculata. Jnd. Or. 3.

Chemin. Konch. Kab. T. 4. tab. 154. fig. 1440.

Long. 3 poll. 9 lin. lat. 1 poll.

803 B. mac. testa turrita, anfractibus 18 ferrugineo et purpurascenti notatum.

Long. 2 poll. 7 lin. lat. 7 lin.

*Buccinum subulatum.*

Linn. S. N. Gen. 323. Sp. 480.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 262. T. X. f. 9.

804 B. sub. testa albida; anfractuum quisque — supremis 7 exceptis — maculis badiis bifariam annulatis. Jnd. Or.

Martini Konch. Kab. T. 4. tab. 154. fig. 1441.

Long. 3 poll. lat. 6 lin.

*Buccinum candidum Bornii.*

- a Bornii test. mus. Vind. pag. 263. Tab. X. f. 8.  
**805** B. cand. testa albida immaculata, anfractibus 16 omnibus,  
 lincis arcuatis tenuissimis striata.  
 Long. 1 poll. 9 lin. lat. 3 lin.

*Buccinum vittatum.*

- Linn. S. N. Gen. 323. Sp. 483.  
 a Born. test. mus. Vind. pag. 264.  
**806** B. vitt. testa *glaucia*; anfractuum futurae triplicato - crenulatae. Tranquebar. 2.  
 Chemn. Konch. Kab. T. 4. tab. 155. fig. 1461.  
 Long. 10 poll. 1 lin. lat. 9 lin.  
**807** B. vitt. testa anfractibus supremis *violacea*; anfractuum futuris laevibus nec crenulatis.  
 Chemn. loc. cit. fig. 1462.  
 Long. 1 poll. 11 lin. lat. 10 lin.

*Buccinum strigilatum.*

- Linn. S. N. Gen. 323. Sp. 484.  
 a Bornii test. mus. Vind. pag. 264. Tab. X. f. 10.  
**808** B. strig. testa *tristis immaculata*, anfractibus viginti et uno. Tranquebar.  
 Chemn. Konch. Kab. T. 4. tab. 155. fig. 1456.  
 Long. 2 poll. lat. 4 lin.  
**809** B. strig. testa *lutea*, fasciis ferrugineis longitudinalibus, striis validioribus transversa.  
 Long. 2 poll. 4 lin. lat. 5 lin.  
*Not.* Spirae apex supremus destructus est.

*Buccinum duplicatum.*

- Linn. S. N. Gen. 323. Sp. 485.  
 a Born. test. mus. Vind. pag. 265.  
**810** B. dupl. testa *glauca*, ferrugineo notata, anfractibus bicus partitis plicato - striatis.  
 Chemn. Konch. Kab. T. 4. tab. 155. fig. 1455.  
 Long. 2 poll. lat. 5 lin.

*Buccinum lanceatum.*

- Linn. S. N. Gen. 323. Sp. 486.  
 a Bornii test. mus. Vind. pag. 265.  
**811** B. lanc. testa *flavescens*; anfractus insimi laeves, reliqui longitudinaliter plicati. Ind. Or?  
 Chemn. Konch. Kab. T. 4. tab. 154. fig. 1450.  
 Long. 1 poll. 2 lin. lat. 3 lin.

812 B.

- 812 B. lanc. varietas singularis cuius anfractus omnes laeves, fuscæ basique duxtarat sunt albidi, 2.  
Long. 10 lin. lat. 3 lin.

*Buccinum dimidiatum.*

- Linn. S. N. Gen. 323. Sp. 487.  
a Born. test. mus. Vind. pag. 266.
- 813 B. dim. testa albida; macularum serie ferruginearum tripliæ, anfractuum 20 quisque annulatus. Jnd. Orient. 4.  
Chemin. Konch. Kab. T. 4. tab. 154. fig. 1443.  
Long. 4 poll. lat. 10 lin.
- 814 B. dim. testa carneæ, albo undulata; spira anfractibus 16 composita. 3.  
Long. 4 poll. 8 lin. lat. 10 lin.
- 815 B. dim. testa fulva albo undulata. 3.  
Long. 3 poll. 1 lin. lat. 7 lin.

S T R O M B U S.

\* Digitati; labio in laciniæ lineares excuntes.

*Strombus Fusus.*

- Linn. S. N. Gen. 324. Sp. 489.  
a Bornii test. mus. Vind. pag. 270.
- 816 Str. F. testa pallide flava; spiræ apex summus violaceus anfractuum supremorum sutura crenulata; labrum dentibus 6 conicis armatum. Mar. rubr.  
Chemin. Konch. Kab. T. 4. tab. 157. fig. 1495; 96.  
Long. 6 poll. lat. 1 poll. 8 lin.

*Strombus Pes pelecani.*

- Linn. S. N. Gen. 324. Sp. 490.  
a Bornii test. mus. Vind. pag. 270.
- 817 Str. P. pel. testa laticea immaculata, plicata; labrum tridactylum, tenue diaphanum. Mar. Mediterr.  
Martini Konch. Kab. T. 3. tab. 85. fig. 48. 19. ~~20.~~  
Long. 1 poll. 5 lin. lat. 11 lin.
- 818 Str. P. pel. testa ex livido-flavescens; labrum distinete tetradactylum, digitis magis incrassatis semipalliatiss.  
Long. 1 poll. 6 lin. lat. 1 poll. 2 lin.
- 819 Str. P. pel. testa sublivida; labrum quam maxime incrassatum. 2.  
Long. 1 poll. 6 lin. lat. 1 poll.

820 Str. P. pel. testa *subflavescens*, nodis pallidis armata; labrum lacteum fusco marginatum.

Long. 1 poll. 6 lin. lat. 1 poll.

821 Str. P. pel. testa *pallida*, digitis longioribus; serpulis numerosissimis adnatis.

Martini loc. cit. fig. 850.

Long. 1 poll. 8 lin. lat. 1 poll. 7 lin.

### *Strombus Chiragra.*

Linn. S. N. Gen. 324. Sp. 491.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 271.

822 Str. Chir. testa ex albo ferrugineo que varia; labri hexadactyli, digitus anticus vix curvatus. Oc. Asiat.

Martini Konch. Kab. T. 3. tab. 86. fig. 853; 54.

Long. 5 poll. 6. lin. lat. 4 poll.

### *Strombus Scorpius.*

Linn. S. N. Gen. 324. Sp. 492.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 272.

823 Str. Sc. testa albida, inter digitos incarnata; faux ferruginea albo striata; digitus posticus rectus. Jnd. Or.

Long. 3 poll. 6 lin. lat. 1 poll. 9 lin.

### *Strombus Lambis.*

Linn. S. N. Gen. 324. Sp. 493.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 273.

824 Str. L. testa ferruginea alboque varia, fauce incarnata, Oc. Asiat. 2.

Martini Konch. Kab. T. 3. tab. 86. fig. 855.

Long. 5 poll. 6 lin. lat. 3 poll.

825 Str. L. testa *pallida ferruginea* longitudinaliter undulatq; digitis longioribus minus patulis.

Long. 4 poll. 6 lin. lat. 2 poll. 8 lin.

826 Str. L. labro digitis omnibus clauso, postico longiore.

Long. 3 poll. 8 lin. lat. 2 poll.

827 Str. L. labrum solidius digitis subclausum, postico brevifimo.

Long. 3 poll. 2 lin. lat. 2 poll.

*Not.* In omnibus hujus familiae Strombis, exemplum Perilli, Bornii sequi, ac testam duntaxat, digitis neglectis, mensuram sumus.

\*\* Lobati.

### *Strombus Lentiginosus.*

Linn. S. N. Gen. 324. Sp. 495.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 274.

828 Str.

- 828 Str. L. testa lattea spadiceo varia; labrum antice posticeque lunato-plicatum, ad suturam usque anfractus 4ti dilatatum. Asiat.  
 Martini Konch. Kab. T. 3. tab. 81. fig. 827; 28.  
 Long. 5 poll. 3 lin. lat. 3 poll. 6 lin.
- 829 Str. L. labrum quadriplicatum, antice suturae anfractus 5ti adfixum.  
 Long. 5 poll. lat. 3 poll. 6 lin.
- 830 Str. L. varietas rario, labro polyplacato.  
 Long. 7 poll. 8 lin. lat. 4 poll. 6 lin.
- 831 Str. L. testa epidermide ferruginea vestita, labro minus ample, violaceo.  
 Long. 4 poll. 5 lin. lat. 2 poll. 6 lin.
- 832 Str. L. testa pallida ex olivacea nebulosa; labrum antice vix plicatum ad suturam anfractus secundi modo dilatatum.  
 Long. 3 poll. 2 lin. lat. 1 poll. 7 lin.
- 833 Str. L. testa albida ferrugineo virecentique variegata; labrum vix plicatum anfractus 4ti suturae adfixum.  
 Long. 2 poll. 6 lin. lat. 1 poll. 5 lin.
- 834 Str. L. testa muricata; labrum prorsus incrassatum, margine exteriori brunascente fasciatum; faux incarnata,  
 Long. 2 poll. 10 lin. lat. 1 poll. 8 lin.

*Strombus Gallus.*

- Linn. S. N. Gen. 324. Sp. 496.  
 a Bornii test. mus. Vind. pag. 275.
- 834b Str. G. testa pallida ferrugineo varia, spira subviolacea, apertura antice posticeque canaliculata. Asiat.  
 Martini Konch. Kab. T. 3. tab. 84. fig. 841.  
 Long. 3 poll. 10 lin. lat. 2 poll. 6 lin.

*Strombus Auris Dianaæ.*

- Linn. S. N. Gen. 324. Sp. 497.  
 a Bornii test. mus. Vind. pag. 276.
- 835 Str. A, D. testa pallida; apertura faux crocea laevis, antice posticeque alba oblique striata. Amboin.  
 Martini Konch. Kab. T. 3. tab. 84. fig. 839.  
 Long. 3 poll. lat. 1 poll. 5 lin.
- 836 Str. A, D. testa nebulose flavescens, albido punctata; aperturae faux undique laevis, margo anticus et posticus violacei.

- 837 Str. A. D. *testa tenuior, diaphana flava albo punctata; apertura albida.* 2,  
 Martini loc. cit. fig. 840,  
 Lqng. 2 poll. lat. 1 poll.
- 838 Str. A. D. *varietas singularis, testa marmorea; aperturae roseae ad labrum undique striatae, labium interius antice plicatum, exterius autem incrassatum, gibbum.* Jamaica.  
 Martini loc. cit. fig. 836. 837.  
 Long. 3 poll. lat. 2 poll. 2 lin.
- 839 Str. A. D. *testa praeced. similis, aperturae multo minus striatae, labium quoque tenuius.*  
 Long. 3 poll. lat. 1 poll. 11 lin.
- 840 Str. A. D. *testa ex albo ferrugineoque marmorea, aperturae valide striatae labrum labiumque cornuum.*  
 Long. 1 poll. 10 lin. lat. 1 poll. 5 lin.

### *Strombus Pugilis.*

- Linn. S. N. Gen. 324. Sp. 498,  
 a Bornii test. nus. Vind. pag. 277.
- 841 Str. Pug. *testa miniata, spira spinosa, aperturae faux albida, labium utrumque ex ferrugineo croceum posticeque violaceum.* Jamaica.  
 Martini Konch. Kab. T. 3. tab. 81. fig. 831.  
 Long. 3 poll. 6 lin. lat. 2 poll.
- 842 Str. P. *testa rubincarnata, aperturae labium aurantium, labrum incarnatum margine postico violaceum.*  
 Long. 3 poll. 8 lin. lat. 1 poll. 10 lin.
- 843 Str. P. *testa flava, in medio pallide fasciata; apertura praecedentis.*  
 Long. 3 poll. 8 lin. lat. 1 poll. 9 lin.
- 844 Str. P. *testa flavescentes longitudinaliter striata; dorso ventris seriebus 2 nodosis cincta.*  
 Long. 4 poll. 6 lin. lat. 3 poll.  
*Not.* Varietas haud frequens Str. Pugilis; sed ad hanc speciem referre debemus quia omnibus — seriebus nodosis neglectis — gaudet characteribus ipsi a Linnaeo tributis.
- 845 Str. P. *testa alba, roseo jucunde fasciata.*  
 Long. 4 poll. lat. 2 poll.  
*Not.* Labrum antice paullulum destructum.
- 846 Str. P. *testa et extus et intus lattea, immaculata.*  
 Long. 3 poll. 8 lin. lat. 2 poll. 2 lin.

*Strom-*

*Strombus Luhuanus.*

Linn. S. N. Gen. 324. Sp. 500.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 277.

- 847 Str. Luh. testa *pallida ferrugineo longitudinaliter undulata*, apertura prorsus sanguinea, ad columellam atro vittata. Oc. Asiae.

Martini Konch. Kab. T. 3. tab. 77. fig. 789. 90.

Long. 2 poll. 2 lin. lat. 1 poll. 1 lin.

- 848 Str. Luh. testa antecedenti similis, columella tantum *vitta atra latiori*. 2.

Long. 2 poll. 2 lin. lat. 1 poll.

- 849 Str. L. testa ferruginea *albo undata*; aperturae pallidae, columella nigro tantum lineata.

Long. 1 poll. 9 lin. lat. 10 lin.

*Strombus Gibberulus.*

Linn. S. N. Gen. 324. Sp. 501.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 278.

- 850 Str. Gibb. testa *flavescens*, suturis anfractuum 2 insimorum *purpurascens* notata; aperturae ad labrum striatae, ibique purpureo vittatae labium incrassatum ac gibbum. Oc. Asiat.

Martini Konch. Kab. T. 3. tab. 77. fig. 792.

Long. 2 poll. 2 lin. lat. 1 poll.

- 851 Str. Gibb. testa *lactea*, striis characteribusque paucis *lutescentibus varia*; apertura candida ad labrum purpureo vittata, ad labium autem violaceo nebulose maculata. Inf. Maurit.

Mart. loc. cit. fig. 795.

Long. 2 poll. 9 lin. lat. 1 poll. 2 lin.

- 852 Str. Gibb. testa lactea, fasciis *flavescens* interrupta, aperturae pallide *violaceae*, labium ex ferrugineo fuscum.

Martini loc. cit. fig. 794.

Long. 1 poll. 10 lin. lat. 10 lin.

- 853 Str. Gibb. varietas similis, ad suturam autem anfractus infimi, linea fusca, transversa; apertura laevis absque striis omnibus.

Long. 1 poll. 6 lin. lat. 9 lin.

- 854 Str. Gibb. testa *multa tenuior*; apertura undique fere pallida. 3.

Martini loc. cit. tab. 88. fig. 863. 864.

Long. 1 poll. 9 lin. lat. 10 lin.

*Not.* Femina ut cum Rumphio loquamus Str. Gibberuli.

\*\*\* Am-

## \*\*\* Ampliati.

*Strombus Lucifer.*

- Linn. S. N. Gen. 324. Sp. 503.  
a Bornii test. mus. Vind. pag. 279.
- 855 Str. L. *testa lattea*, laevis tenuis, pulla; Amerie. austr.  
Martini Konch. Kab. T. 3. tab. 90. fig. 880.  
Long. 2 poll. 6 lin. lat. 1 poll.
- 856 Str. L. testa quoque pulla, sed albida *ferruginea notata*,  
transversum sulcata. 4.  
Long. 2 poll. 7 lin. lat. 11 lin.
- 857 Str. L. testa *amethystina*, basi gibba, gravior.  
Long. 2 poll. 5 lin. lat. 1 poll.
- 858 Str. L. testa *pallida*, cortice tecta *subferrugineo*, intus  
pallide violacea; pulla.  
Long. 1 poll. 9 lin. lat. 9 lin.
- 859 Str. L. testa *flavescens* transversum *sulcata*; spira spinis  
longioribus coronata.  
Martini loc. cit. fig. 881.  
Long. 3 poll. lat. 1 poll. 1 lin.
- 860 Str. L. testa *rufescens* haud anguste *sulcata*, gravis atque  
plane adulta.  
Long. 3 poll. 1 lin. lat. 1 poll. 2 lin.
- 861 Str. L. testa pallida *fusco undulata*; spira tuberculis omni-  
bus detritis.  
Long. 3 poll. 8 lin. lat. 1 poll. 6 lin.

*Strombus Gigas.*

- Linn. S. N. Gen. 324. Sp. 504.  
a Bornii test. mus. Vind. pag. 280.
- 862 Str. G. *testa gravissima*, epidermide grisea extus *obtecta*,  
nihilo minus autem aperturae faux pulcherrime rosea; la-  
brum per dilatatum. Jamaic.  
Martini Konch. Kab. T. 3. tab. 81. fig. 824.  
Long. 10 poll. lat. 8 poll.
- 863 Str. G. *testa tristis transverse sulcata*, longitudinaliter  
striata, antecedente laevior.  
Long. 9 poll. lat. 6 poll.

*Strombus polyfasciatus Chemn.*

- 864 Str. pol. testa albida, pulla, fasciis coerulecentibus 3 atro  
marginatis, punctisque flavescentibus variegata; apertu-  
rae aurantiae labium striatum. Ind. Occid.  
Chemn. Konch. Kab. T. 10. tab. Suppl. 155. fig. 1483. 84.  
Long. 1 poll. 8 lin. lat. 10 lin.

*Strom-*

*Strombus Canarium.*

Linn. S. N. Gen. 324. Sp. 507.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 281.

864b Str. C. testa nivea fasciis flavis longitudinalibus; aperturae faux candidissima immaculata. Amboina.

Mart. Konch. Kab. T. 3. tab. 79. fig. 817. 818.

Long. 2 poll. 3 lin. lat. 1 poll. 5 lin.

864c Str. C. testa pallida, postice oblique valideque striata.

Long. 2 poll. 6 lin. lat. 1 poll. 6 lin.

*Strombus Epidromis.*

Linn. S. N. Gen. 324. Sp. 506.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 281.

864d Str. Ep. testa albida transversim striata, lutescenti maculata. Asia. 2.

Martini. Konch. Kab. T. 3. tab. 79. fig. 821. 3.

Long. 2 poll. 5 lin. lat. 1 poll.

*Strombus vittatus.*

Linn. S. N. Gen. 324. Sp. 508.

a Born. test. mus. Vind. pag. 282.

865 Str. vitt. testa laetea ferrugineo iucundissime variegata, fauce albida. Amboin. 2.

Martini Konch. Kab. T. 3. tab. 79. fig. 820.

Long. 1 poll. 10 lin. lat. 10 lin.

866 Str. vitt. testa flava albido quadrifariam anguste fasciata; aperturae labrum labiumque anticum striatum.

Long. 1 poll. 9 lin. lat. 11 lin.

867 Str. vitt. testa subuplicata, dilute flavescens; aperturae faux rufescens labium aequre atque labrum omnino striatum.

Long. 1 poll. 4 lin. lat. 8 lin.

*Strombus Urceus.*

Linn. S. N. Gen. 324. Sp. 512.

a Born. test. mus. Vind. pag. 283.

868 Str. Urc. testa albida, plicato-nodosa, maculis paucis notata; apertura ex atro fusca, valide striata. Inf. Maur.

Martini Konch. Kab. T. 3. tab. 78. fig. 803.

Long. 2 poll. lat. 11 lin.

869 Str. Urc. testa albida, flavoque varia, tenuior; aperturae labrum utrumque laetum. 3.

Martini loc. cit. fig. 804.

Long. 1 poll. 7 lin. lat. 8 lin.

- 870 Str. Urc. testa magis plicata, albida nebulosa reticulata. 2.  
 Mart. loc. cit. fig. 806.  
 Long. 1 poll. 6 lin. lat. 7 lin.
- 871 Str. Urc. testa albida valide plicata, labiis ambobus flavescentibus. 2.  
 Long. 1 poll. 5 lin. lat. 7 lin.
- 872 Str. Urc. testa pallida subviolaceo transversim fasciata, obsolete plicata. 6.  
 Long. 1 poll. 3 lin. lat. 8 lin.
- \*~~\*\*\*~~ Turriti, spira longissima.

*Strombus tuberculatus.*

- Linn. S. N. Gen. 324. Sp. 514.  
 a Bornii test. mus. Vind. pag. 284.
- 873 Str. tub. testa rudis, sordida, nodulis fuscis seriatim cincta; cauda brevissima. Mar. Mediterr. 3.  
 Chemin. Konch. Kab. T. 4. tab. 157. fig. 1490.  
 Long. 9 lin. lat. 4 lin.

*Strombus lividus.*

- Linn. S. N. Gen. 324. Sp. 517.
- 874 Str. liv. testa pallida, longitudinaliter plicata, labro saepe luto, intus striato. 2.  
 Chemin. Konch. Kab. T. 4. tab. 14. fig. 1378, 1379. ?  
 Long. 9, 5 lin. lat. 5 lin.

MUREX.

\**Spinosa*, cauda exserta.

*Murex Haustellum.*

- Linn. S. N. Gen. 325. Sp. 518.  
 a Bornii test. mus. Vind. pag. 287.
- 875 M. H. testa ex violaceo, ferrugineo alboque varia tuberculata, tuberculis tribus validioribus cum quatuor obsoletiusculis, etiam longitudinalibus sed nodosis interiectis; apertura utrinque rosea, fauce pallide violacea. Ind. Orient.  
 Martini Konch. Kab. T. 3. tab. 115. fig. 1066.  
 Long. 4 poll. 10 lin. lat. 1 poll. 10 lin.
- 876 M. H. testa imprimis albida, ferrugineo transversim striaata, tuberculis tribus validioribus, ex violaceo fasciatis.  
 Long. 2 poll. 9 lin. lat. 1 poll. 3 lin.

877 M.

877 M. H. testa tristis; non solum tuberculata, sed et decus-  
fatum firiata; apertura lactea.

Long. 3 poll. 3 lin. lat. 1 poll. 2 lin.

878 M. H. testa pallida, nebulosa fasciata; apertura dentata,  
labro duplicato. Coromandel?

Chemn. Konch. Kab. T. 10, tab. Suppl. 163. fig. 1563.

Murex Motacilla.

Long. 2 poll. lat. 11 lin.

*Murex Tribulus.*

Linn. S. N. Gen. 325. Sp. 519.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 287.

879 M. Tr. testa pallide lutescens, spinosa, spinis alternis  
maiорibus, supremis brevioribus. Ind. Orient.

Martini Konch. Kab. T. 3. tab. 113. fig. 1053. 54.

Long. 4 poll. lat. 1 poll. 2 lin.

Not. Testae latitud. spinis neglectis metimur.

880 M. Tr. testa ex latteo sublutea, spinis brevioribus.

Long. 2 poll. 3 lin. lat. 10 lin.

*Murex Brandaris.*

Linn. S. N. Gen. 325. Sp. 521.

a Born test. mus. Vind. pag. 289.

881 M. Br. testa albida ferrugineo fasciata, serie dupli spī-  
narum subulatarum, armata. M. Adriat.

Martini Konch. Kab. T. 3. tab. 114. fig. 1058.

Long. 4 poll. lat. 1 poll. 10 lin.

882 M. Br. testa alba, cingulo dupli spinarum conicarum  
armata; apertura subtetragona, labio labroque slavecen-  
tibus.

Martini loc. cit. fig. 1059.

Long. 2 poll. 4 lin. lat. 1 poll. 4 lin.

Not. Cauda truncata videtur.

883 M. Br. testa antecedentis; aperturae subpentagonae faux  
lutescens, labium labrumque latteum.

Long. 2 poll. lat. 1 poll.

884 M. Br. testa alba fusco fasciata, cauda longiore.

Long. 2 poll. 3 lin. lat. 1 poll. 3 lin.

885 M. Br. testa solidior, sulcata, sulcis transversalibus per-  
validis.

Long. 2 poll. 3 lin. lat. 1 poll. 5 lin.

886 M. Br. testa pallida, immaculata, spinis obtusioribus  
cincta.

Mart. loc. cit. fig. 1064.

Long. 2 poll. 9 lin. lat. 1 poll. 3 lin.

- 887 M. Br. testa pallida *ferrugineo notata*, perlacvis ac dia-phana.  
 Long. 2 poll. lat. 11 lin.
- 888 M. Br. testa pallida spinis subnodosis circumdata, seriei posticae spinis obsoletissimis; apertura flavescens.  
 Martini loc. cit. tab. 115. fig. 1062.  
 Long. 1 poll. 7 lin. lat. 1 poll. 4 lin.
- 889 M. Br. testa et extus et intus *albida*, solidissima, nodo-so-tuberculata.  
 Long. 2 poll. 6 lin. lat. 1 poll. 6 lin.
- 890 M. Br. testa *ex violaceo-flavescens*, nondum adūta; lon-gitudinaliter dissecta, in usum characteristicae conchio-logiae.  
 Long. 2 poll. 2 lin. lat. 1 poll. 3 lin.

#### *Murex Trunculus.*

- Linn. S. N. Gen. 325. Sp. 522.  
 a Born, test. mus. Vind. pag. 290.
- 891 M. Tr. testa *virescens rugosa nodosa*, spinis obsoletis anterius cincta. Mar. Mediterr.  
 Martini Konch. Kab. T. 3. tab. 109. fig. 1020.  
 Long. 3 poll. 2 lin. lat. 1 poll. 6 lin.
- 892 M. Tr. testa *ex albo fuscoque fasciata*; iunior.  
 Long. 2 poll. 6 lin. lat. 1 poll. 6 lin.
- 893 M. Tr. testa *lattea*, fuso et ad spiram spadiceo fasciata, spinis acutioribus. Januaica.  
 Martini loc. cit. fig. 1019.  
 Long. 2 poll. 11 lin. lat. 1 poll. 6 lin.
- 894 M. Tr. testa *pulla*, pertenuis ac semipellucida, albida ferrugineo fasciata.  
 Long. 1 poll. 3 lin. lat. 7 lin.
- \*\* Frondosi futuris crispato-frondescentibus, cauda ab-breviata, vulgo Purpurae dicti.

#### *Murex Triqueter Bornii.*

- a Bornii test. mus. Caef. Vind. pag. 291. Tab. XI. fig. 152.
- 895 M. Tr. testa albida, costis obscure purpurascentibus; spirae anfractibus septem. Tranqueb.  
 Martini Konch. Kab. T. 3. tab. 111. fig. 1038.  
 Long. 3 poll. 3 lin. lat. 1 poll. 6 lin.  
*Not.* Specimen perrarum.
- 896 M. Tr. testa albida, pulla, costis subferrugineis.  
 Long. 1 poll. 11 lin. lat. 11 lin.

*Murex*

*Murex ramosus.*

Linn. S. N. Gen. 325. Sp. 523.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 292.

- 897 M. ram. testa pallida fasciis *ex atro fuscis*, tuberculo simplici ac valido inter frondes locatis; aperturae ovatae labium roseum. Mar. rubr.

Martini Konch. Kab. T. 3. tab. 103. fig. 981.

Long. 2 poll. 6 lin. lat. 1 poll. 9 lin.

- 898 M. ram. testa albida, fasciis *subferrugineis*; aperturae lacteae labium pallide violaceum.

Martini loc. cit. fig. 983.

Long. 2 poll. 6 lin. lat. 1 poll. 4 lin.

- 899 M. ram. testa *flava*, lineis obscuris transversim rugosa; apertura albida, semipellucida.

Long. 3 poll. 1 lin. lat. 1 poll. 7 lin.

- 900 M. ram. testa *flava unicolor*; aperturae violaceae labium utrumque albidum.

Long. 2 poll. lat. 10 lin.

- 901 M. ram. testa *postice atra*; apertura albida, labio *ex videlicato rosea*. Ind. Orient.

Martini loc. cit. fig. 981.

Long. 1 poll. 6 lin. lat. 1 poll. 3 lin.

*Murex Scorpio.*

Linn. S. N. Gen. 325. Sp. 524.

a Bornii test. mus. Vind. p. 292.

- 902 M. Sc. testa sextuplex frondosa, ex ferrugineo fusca, apertura albida. Ind. Or.

Martini Konch. Kab. T. 3. tab. 106. fig. 1000. 1001.

Long. 1 poll. 8 lin. lat. 10 lin.

*Not.* Testae spira paullulum detrita videtur — Testam ipsam nec quadrifariam, ut Linn. docuit sed sextuplex plicatam esse, b. Martini et Cel. Spenglerus iam iam observarunt. vid. Mart. loc. cit. pag. 326.

*Murex Saxatilis.*

Linn. S. N. Gen. 325. Sp. 525.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 293.

- 903 M. Sax. testa *albida frondosa*, frondibus ex ferrugineo fuscis; apertura lactea. Ind. Or.

Chemn. Konch. Kab. T. 10. tab. Suppl. 107. fig. 1009.

Long. 1 poll. 10 lin. lat. 1 poll. 2 lin.

- 904 M. Sax. testa *sordida*, frondibus *obscurioribus*; apertura albida nebulosa striata.  
Long. 1 poll. 5 lin. lat. 9 lin.

*Murex Erinaceus.*

Linn. S. N. Gen. 325. Sp. 526.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 290. Tab. XI. fig. 3. 4.

- 905 M. Er. testa *fusca*, alboque transversim fasciata, subfrondoso spinosa nec non decussata, frondibus 8 circumdata. Mar. Mediterr.

Cheinn. Konch. Kab. T. 10. tab. Suppl. 161. fig. 1536. 37.

Long. 1 poll. 7 lin. lat. 1 poll.

- 906 M. Er. testa ex albido *luteofuscens*; pulla.

Long. 10 lin. lat. 7 lin.

\*\*\* Varicosi: suturis rotundatis torosis crassisque.

*Murex Rana.*

Linn. S. N. Gen. 325. Sp. 527.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 295.

- 907 M. R. testa *scabra*, muricata, albida, maculis ferrugineis et purpurascientibus varia; apertura verrucoso-denticulata. Amboin.

Cheinn. Konch. Kab. T. 4. tab. 133. fig. 1270.

Long. 2 poll. lat. 1 poll. 2 lin.

- 908 M. R. testa albida *subrufo maculata*, reticulatim decussata.

Long. 1 poll. 9 lin. lat. 1 poll. 3 lin.

- 909 M. R. testa *sordida*, spinarum loco, *varicibus nodisque solis munita*; aperturae labrum denticulatum, labium rugosum subplicatum, plica una antice validiori.

Long. 1 poll. 7 lin. lat. 10 lin.

- 910 M. R. testa pallida sere immaculata, *spinis solidioribus conicis muricata*; labio retuso.

Martini loc. cit. fig. 1271.

Long. 2 poll. 10 lin. lat. 1 poll. 8 lin.

- 911 M. R. testa *rufescens* alboque varia, spinis varicum per elongatis muricata, Tranquebar.

Martini loc. cit. fig. 1274.

Long. 3 poll. 4 lin. lat. 1 poll. 7 lin.

- 912 M. R. testa *glauca* spinis varicum perlongis subulatis armata.

Long. 2 poll. 2 lin. lat. 1 poll. 2 lin.

*Murex*

*Murex Gyrinus.*

Linn. S. N. Gen. 325. Sp. 528.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 296.

- 913 M. G. testa pallide coerulescens, varicibus oppositis continuatis, nodulis subferrugineis reticulata; labrum margine inferiori denticulatum. Tranqueb.

Chemn. Konch. Kab. T. 4. tab. 128. fig. 1229. 30.

Long. 11 lin. lat. 6 lin.

- 914 M. G. testa tenuior, lutescens, nodulis minoribus flavescentibus undique cincta. 4.

Long. 1 poll. lat. 6 lin.

- 915 M. G. testa subovata, nodoso seriata ac reticulata series geminis albidis spadiceisque alternis.

Chemn. loc. cit. fig. 1233. 34.

Long. 11 lin. lat. 7 lin.

- 916 M. G. varietas singularis, testa enim pallida ex brunascente fasciata, punctis elevatis undique cincta, apertura in primis ad labrum valide denticulata.

Chemn. loc. cit. <sup>tab. 127</sup> fig. 1226. 1227.

Long. 2 poll. 3 lin. lat. 1 poll. 3 lin.

*Not.* Apertura et magnitudo M. Ranae, sed cingulis muricatis, spinisque omnino caret, ergo ad Gyrinum referendus.

*Murex costatus Bornii.*

a Bornii test. mus. Vind. pag. 297.

- 917 M. cost. testa subferruginea, subfusciformis costis transversis angulata; aperturae faux opalescens.

Chemn. Konch. Kab. T. 4. tab. 131. fig. 1252.

Long. 2 poll. lat. 1 poll.

*Murex Lampas.*

Linn. S. N. Gen. 325. Sp. 529.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 296.

- 918 M. L. testa gibbosa et tuberculosa, lutescens; aperturas faux incarnata, labrum bimarginatum, altero dentibus subconicis, altero membranaceis in utroque vero geminis aut ternis viciniорibus, obsitum; spatium inter margines illos ex ferrugineo aurantios, lacteum immaculatum; labium rugoso plicatum, plicis albis in fundo subferrugineo. Amboin.

Chemn. Konch. Kab. T. 4. tab. 129. fig. 1238.

Long. 4 poll. 5 lin. lat. 2 poll.

*Murex Olearium.*

Linn. S. N. Gen. 325. Sp. 530.

a Born. test. mus. Vind. pag. 297.

- 919 M. Ol. testa pallida transversim striata, ocellis ferrugineis seriatim cincta, apertura denticulata.

Chenn. Konch. Kab. T. 4. tab. 127. fig. 1223.

Long. 6 poll. 6 lin. lat. 3 poll. 8 lin.

- 920 M. Ol. testa subferruginea albido maculata, varicibus alternis tuberculatis; apertura lactea ad labrum incarnata fusco maculata, labioque fusco.

Long. 6 poll. lat. 3 poll.

- 921 M. Ol. testa albida unicolor; labrum dentibus solitariis obsitum; paullulum destructum.

Long. 5 poll. 8 lin. lat. 2 poll. 6 lin.

*Not.* Hac in specie plane secuti sumus Perill. a Bornium; nulla enim habita ratione sententiae Chemnitizii secundum quam fig. supra citata M. Olear. + Linn. propterea non responderet, quod apertura esset denticulata; sed Archiater Linn. etiam in Lampade, Femorali et in pluribus testis, aperturam edentulam docet, ubi Conchiologistae recentiores veritatem et constantiam characteris huius non confirmatam viderunt.

*Murex Femorale.*

Linn. S. N. G. 325. Sp. 531.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 298.

- 922 M. F. testa flavescens, varicibus decussatis trigona; labrum margine exteriori fasciis lacteis badiisque alternum, apertura antice dentibus tribus, labri regionem versus, obsita. Guin. nov.

Martini Konch. Kab. T. 3. tab. 111. fig. 1039.

Long. 3 poll. 10 lin. lat. 1 poll. 10 lin.

- 923 M. F. testa antec.; apertura tam antice quam postice, dentibus duobus armata.

Long. 3 poll. lat. 1 poll. 6 lin.

*Murex cutaceus.*

Linn. S. N. Gen. 325. Sp. 532.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 299.

- 924 M. cut. testa varice solitaria, pallide lutescens; labrum undique dentatum, labium autem antice dente unico armatum. Guin.

Martini Konch. Kab. T. 3. tab. 118. fig. 1085. 86.

Long. 2 poll. 5 lin. lat. 1 poll. 9 lin.

925 M. cut. varietas singularis, nam testa tenuior ex *fusco-ferruginea*, varice solitaria, trigona, transversim subnodoso-rugosa; apertura subovata, transversim plicata.  
Long. 3 poll. 5 lin. lat. 1 poll. 6 lin.

926 M. cut. testa lutescens nodis angulata rugosa; *labrum intus canaliculatum lacteum nodosum*, inter nodos ferrugineo maculatum.

Long. 1 poll. 5 lin. lat. 9 lin.

### *Murex Lotorium,*

Linn. S. N. Gen. 325. Sp. 533.

927 M. Lot. testa *grisea*, albo ferrugineoque varia. Aertura crocea, dentibus albis utrinque ornata. Ind. Orient.  
Chemn. Konch. Kab. T. 4. tab. 130. fig. 1245.

Long. 2 poll. 3 lin. lat. 1 poll.

928 M. Lot. testa *minor*; aperiturae faux subferruginea, labrum labiumque autem lacteum.?  
Long. 1 poll. 5 lin. lat. 10 lin.

929a M. Lot. testa albida *tuberculosa ac sulcata*, sulcis ferrugineis; labrum extus bimarginatum, intus subdentatum; labium laeve; apertura undique alba,  
Long. 2 poll. 1 lin. lat. 1 poll. 3 lin.

929b M. Lot. testa albida *ferruginea varia*; apertura lutea dentibus lacteis utrinque munita. Mar. Afric.  
Chemn. loc. cit. 1246.

Long. 1 poll. 8 lin. lat. 1 poll.

### *Murex Pileare,*

Linn. S. N. Gen. 325. Sp. 534.

930 M. Pil. testa glauca, albido lutescente varia, subnodoso-rugosa, varicibus albidis ex ferrugineo fasciatis decussata, pertenuis ita ut color externus et intus perlucet, laevis et subdiaphana; apertura tam sulcata quam dorsum totius testae, *nec dentata*; cauda subadscendens. M. Mediterr.

Chemn. Konch. Kab. T. 4. tab. 130. fig. 1248. 49.

Long. 3 poll. 9 lin. lat. 1 poll. 6 lin.

*Not.* Chemnitz praestantissimus fig. cit. quidem ad M. *Lotorium* Linn. refert; sed potius ad hanc speciem illam pertinere arbitramur, quia nec tam tuberculosa, nec dentata, ut in M. *Lotorio*; sed rugosa tantum ipsius est apertura. Quo accedit testam hanc multo tenuorem, laeviorem atque magis diaphanam esse Murice *Lotorio*.

*Murex Pyrum.*

- Linn. S. N. Gen. 325. Sp. 535.  
a Bornii test. mus. Vind. pag. 299.
- 931 M. P. *testa fulva varicosa ovata*, varicibus lutescentibus nodosis; apertura fulva, fauce, et dentibus ad labrum, validioribus, ad labium obsoletis, albidis. Coromandel.  
Martini Konch. Kab. T. 3. tab. 112. fig. 1040. 41.  
Long. 4 poll. 9 lin. lat. 1 poll. 11 lin.
- 932 M. P. *labrum dentibus subbifidis armatum*.  
Long. 4 poll. 9 lin. lat. 1 poll. 6 lin.
- 933 M. P. *testa pallida, flavescens*; *labrum marginatum, maxulis tribus purpurascens* ad marginem, variegatum; *spira planiuscula*. Ind. Orient.  
Martini loc. cit. tab. 67. fig. 745. 46.  
Long. 1 poll. 4 lin. lat. 11 lin.

*Murex Rubecula.*

- Linn. S. N. Gen. 325. Sp. 536.  
a Bornii test. mus. Vind. pag. 300.
- 934 M. Rub. *testa decussata ac sulcata*, sulcis subviolaceis, striisque granulosis luteis elevatis costata. Ind. Or.  
Chemn. Konch. Kab. T. 4. tab. 132. fig. 1263. 64.  
Long. 2 poll. lat. 1 poll.
- 935 M. Rub. *testa costis granulosis tami aurantiis quam lutelis, albis rarioribus varia*, varicibus lacteis aurantio fasciatis.  
Long. 1 poll. 6 lin. lat. 9 lin.

*Murex reticularis.*

- Linn. S. N. Gen. 325. Sp. 538.  
a Bornii test. mus. Vind. pag. 300. Tab. XI. fig. 5.
- 936 M. ret. *testa pallida immaculata*, distinctissime reticulata, varice unico in regione labri; columella laevis.  
Chemn. Konch. Kab. T. 4. tab. 128. fig. 1228.  
Long. 2 poll. 6 lin. lat. 1 poll. 4 lin.
- Not.* Specimen nostrum varietas alia est, ac ea quae b. Martinii cura delineata est, quam autem Chemnitz loc. cit. descripsit; uti e varice solitaroi patet.
- 937 M. ret. *testa sublaetea*, reticulata; columella quidem subedentula, sed apertura subtriloba, ad labrum valide denticulatum.  
Long. 2 poll. 3 lin. lat. 1 poll. 2 lin.
- Not.* Ob aperturam subtrilobam, specimen nostrum medium sere videtur, inter M. reticulatum et M. Anum.

*Murex*

*Murex Anus.*

- Linn. S. N. Gen. 325. Sp. 539.  
a Bornii test. mus. Vind. pag. 300.
- 938 M. A. testa albida ferrugineo fasciata, varice labiisque dilatato - membranaceis ad anfractum tertium supremorum usque, basi tuberculato muricata, apertura triloba, Mar. Mediterr. 2.  
Martini Konch. Kab. T. 2. tab. 41. fig. 403. 404.  
Long. 2 poll. 6 lin. lat. 1 poll. 6 lin.
- 939 M. A. testa pallide lutescens, varice submembranacea, apertura valde spinosa.  
Long. 2 poll. 1 lin. lat. 1 poll. 2 lin.
- \*\*\*\* Ecaudati subechinati.

*Murex Ricinus.*

- Linn. S. N. Gen. 325. Sp. 540.  
a Bornii test. mus. Vind. pag. 302.
- 940 M. R. testa extus lutescens, spinosa, seriebus spinarum quinque transversim cincta; apertura ex roseo amethystina; labium antice plica solitaria, in medio nulla, postice tribus; labri margo lutescens. Coromandel.  
Martini Konch. Kab. T. 3. tab. 101. fig. 972. 73.  
Long. 1 poll. 3 lin. lat. 1 poll. 1 lin.

*Murex nodus.*

- Linn. S. N. Gen. 325. Sp. 541.  
a Bornii test. mus. Vind. pag. 303.
- 941 M. n. testa pallida fusco undata; labrum dentatum, labium subrufescens, faux aperturae nebulose fasciata. Iamaica.  
Martini Konch. Kab. T. 3. tab. 100. fig. 957.  
Long. 11 poll. 10 lin. lat. 1 poll. 1 lin.
- 942 M. nod. testa antecedentis; labrum autem crenulatum dentibusque tribus subconicis armatum.  
Long. 1 poll. 9 lin. lat. 1 poll.
- 943 M. nod. testa lutescens ad spiram supremam flava, fusco longitudinaliter fasciata.  
Long. 2 poll. lat. 1 poll. 2 lin.

*Murex neritoideus.*

- Linn. S. N. Gen. 325. Sp. 542.  
a Bornii test. mus. Vind. pag. 303.

- 944 M. ner. testa pallida detrita, ordinibus quatuor. Ind. Orient.

Long. 8 lin. lat. 7 lin.

*Murex Hippocastanum.*

Linn. S. N. Gen. 325. Sp. 545.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 305.

- 945 M. Hipp. testa quadrifariam subspinosa, albida, fuso transversim fasciata; apertura lutescens, striata, labrum ex atro fuscum marginatum, labium pallidum ferrugineo maculatum. Oc. Asiat. 2.

Martini Konch. Kab. T. 2. tab. 40. fig. 398.

Long. 1 poll. 7 lin. lat. 1 poll. 1 lin.

*Murex Melongena.*

Linn. S. N. Gen. 325. Sp. 547.

a Bornii test. mus. Vindob. pag. 306.

- 946 M. Mel. testa subcoerulea fasciata, oblique striata, spinosa, seriebus quatuor spinarum; labium lacteum subincassatum.

Martini Konch. Kab. T. 2. tab. 39. fig. 391.

Long. 3 poll. 6 lin. lat. 2 poll. 1 lin.

- 947 M. Mel. testa pallida rufa fasciata, spinosa, spinarum serie duntaxat solitaria, anfractibus spirae perdistantibus.

Long. 3 poll. lat. 1 poll. 9 lin.

- 948 M. Mel. testa ferruginea laevis, albo transversim fasciata, antice posticeque spina serie muricata.

Long. 2 poll. 3 lin. lat. 1 poll. 2 lin.

- 949 M. Mel. testa glauca subunicolor, seriebus binis spinam obsoletiusculam cincta.

Long. 2 poll. 8 lin. lat. 1 poll. 5 lin.

- 950 M. Mel. testa sublivida ferruginea notata, seriebus 2 nodosis cincta, transversim undique striata, longitudinaliter decussata; apertura subaurantia, labro obsoleto dentato.

Long. 2 poll. 3 lin. lat. 1 poll. 6 lin.

*Murex rapiformis.*

a Bornii test. mus. Vind. pag. 307.

- 951 M. rap. testa pallide flavescens undique striata, cingulo antice submuricato; aperturae lacteae faux aequae ac labrum,

brum, striata; columella umbilicata, umbilico squamoso imbricato. Tranqueb.

Martini Konch. Kab. T. 3. tab. 68. fig. 750.

Long. 2 poll. lat. 1 poll. 9 lin.

XXXXX Caudigeri; cauda subulata clausa recta elongata, testa inerme.

### *Murex Babylonius.*

Linn. S. N. Gen. 325. Sp. 549.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 808.

952 M. Babyl. testa lactea maculis fuscis ordinatim sparsa, anfractibus duodecim. Oc. Asiat. 3.

Chemn. Konch. Kab. T. 4. tab. 143. fig. 1331. 32.

Long. 3 poll. 6 lin. lat. 11 lin.

### *Murex Javanus.*

Linn. S. N. Gen. 325. Sp. 550.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 808.

953 M. Jav. testa lactea *immaculata*, anfractibus obsolete striatis, tuberculatis, cinctis, nodosis.

Chemn. Konch. Kab. T. 41. tab. 143. fig. 1334. 35.

Long. 2 poll. lat. 9 lin.

954 M. Jav. testa albida, anfractibus carinatis ac angulatis, ferrugineo tenuissime adspersis. 2.

Long. 3 poll. lat. 7 lin.

955 M. Jav. testa pallide tam transversim quam oblique striata.

Long. 2 poll. 2 lin. lat. 10 lin.

Not. Hoc specimen calcinatum videtur.

956 M. Jav. testa rufescens anfractibus valide nodosis.

Long. 1 poll. 8 lin. lat. 7 lin.

957 M. Jav. testa flavescentia; columella labiata, labio adnata, replicata, antice aequa atque postice paullulum infrasatum.

Long. 1 poll. 6 lin. lat. 5 lin.

### *Murex Colus.*

Linn. S. N. Gen. 325. Sp. 551.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 310.

- 958 M. C. testa *lactea immaculata*, turrita striata, nodoso carinata, ventre tereti; apertura undique striata; labium substrebrum. Amboin.  
 Chemn. Konch. Kab. T. 4. tab. 144. fig. 1339.  
 Long. 9 poll. 9 lin. lat. 2 poll. 6 lin.
- 959 M. C. testa pallida undulatim *rugosa*, *carinatis maculis purpurascensibus* inter carinas undulatas, labio pertenui.  
 Chemn. loc. cit. fig. 1344.  
 Long. 6 poll. lat. 2 poll.
- 960 M. C. testa *lutescens*, nodulis striisque transversis niveis, *spira* suprema atque *cauda ferrugineis*. Amboin.  
 Chemn. loc. cit. fig. 1342.  
 Long. 4 poll. lat. 9 lin.

### *Murex Morio.*

- Linn. S. N. Gen. 325. Sp. 552.  
 a Bornii test. mus. Vind. pag. 310.
- 961 M. Mor. testa *ex atro fusca* lineis pallidis subbifariam transverse cincta. Mar. Afric.  
 Chemn. Konch. Kab. T. 4. tab. 139. fig. 1300.  
 Long. 6 poll. lat. 2 poll. 6 lin.
- 962 M. Mor. testa *subatra*, lineis albidis ternis transversum cincta.  
 Long. 4 poll. lat. 1 poll. 8 lin.
- 963 M. Mor. testa *fusca*, lineis albidis solitariis cincta.  
 Chemn. loc. cit. fig. 1301.  
 Long. 3 poll. 6 lin. lat. 1 poll. 6 lin.
- 964 M. Mor. testa *subincarnata*, lineis albis cincta geminis.  
 Long. 4 poll. lat. 1 poll. 9 lin.
- Not.* Varietas haec raro invenitur.

### *Murex Cochlidium.*

- Linn. S. N. Gen. 325. Sp. 853.  
 a Bornii test. mus. Vind. pag. 312.
- 965 M. Cochli. testa *subfulva*, transversim striata, subnodosa; columella subelabiata. Ind. Or.  
 Chemn. Konch. Kab. T. 4. tab. 143. fig. 1333.  
 Long. 4 poll. 6 lin. lat. 1 poll. 7 lin.

### *Murex spirillus.*

- Linn. S. N. Gen. 325. Sp. 554.  
 a Bornii test. mus. Vind. pag. 312.

966 M. sp. testa subcoeruleo-scens, maculis subferrugineis, adspersa, ventre suborbiculari. Malabar.

Martini Konch. Kab. T. 3. tab. 115. fig. 1969.

Long. 2 poll. 9 lin. lat. 1 poll. 5 lin.

### *Murex canaliculatus.*

Linn. S. N. Gen. 325. Sp. 555.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 312.

967 M. canal. testa ex fulvo-ferruginea, transverse sulcata, canaliculata. Ocean. Amer.

Martini Konch. Kab. T. 3. tab. 67. fig. 742. 43.

Long. 2 poll. lat. 1 poll. 2 lin.

### *Murex antiquus.*

Linn. S. N. Gen. 325. Sp. 558.

a Bornii Test. mus. Vind. pag. 314. M. despectus.

968 M. ant. testa albida, ex flavescenti nebulosa, cum animale Limace. 2. (J. S.)

Cheinn. Konch. Kab. T. 4. tab. 138. fig. 1292.

Long. 2 poll. 9 lin. lat. 1 poll. 6 lin.

*Nat.* Absque balanis et serpulis.

969 M. ant. testa subferruginea, ventre squamo-so, squamis seorsum imbricatis.

Long. 3 poll. lat. 1 poll. 8 lin.

### *Murex Pugilinus Bornii.*

a Bornii test. mus. Vind. pag. 314.

970 M. Pug. testa extus flavescens longitudinaliter obsolete striata, gibbosa, et nodosa, intus alba, apertura prorsus laevis. Tranqueb.

Cheinn. Konch. Kab. T. 4. tab. 142. fig. 1323. 24.

Long. 4 poll. 6 lin. lat. 2 poll. 9 lin.

971 M. Pug. testa et extus et intus ex lutescente albida; spinis acutioribus coronata.

Long. 3 poll. 10 lin. lat. 2 poll.

### *Murex Tritonis.*

Linn. S. N. Gen. 325. Sp. 560.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 315.

972 M. Tr. testa ex albo flavo, et spadiceo nitidissime varia, apice spirae summo violaceo, varicibus alternis longitudinalibus; aperturae faux crocea, labrum albidum ferrugineo

gineo striatum, muricatum, labrum transverse rugosum. Ind. Orient. 2.

Chemn. Konch. Kab. T. 4. tab. 135. fig. 1282.  
Alterius Long. 9 poll. lat. 5 poll.

— — 6 — 2 —

973 M. Tr. testa *sordida subincarnata* nodosa solidissima ac gravissima; apertura pallida immaculata. M. Mediterr.

Chemn. loc. cit. fig. 1284. 85.

Long. 5 poll. lat. 2 poll. 5 lin.

### *Murex Pusio.*

Linu. S. N. Gen. 325. Sp. 561.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 316.

974 M. P. testa *albida* striis rufescentibus seriatim cincta; apertura striata, labium antice posticeque subdenticulatum. Oc. Afric.

Chemn. Konch. Kab. T. 4. tab. 147. fig. 1357.

Long. 1 poll. 6 lin. lat. 7 lin.

Nat. Linnaeus et Perill. a Born, aperturam huius speciei *omnino laevem* docent, id quod vero specimine hoc et sequenti non confirmari videtur.

975 M. P. testa *subviolacea*, punctis ferrugineis seriatim cincta; apertura ad labrum striata,

Long. 1 poll. 5 lin. lat. 7 lin.

### *Murex denticulatus.*

976 M. dent. testa subferruginea, oblonga ventricosa, undique transversim striata; spira anfractibus circiter sex convexis atque contiguis; apertura flavescens oblonga, antice posticeque canaliculata, ad labium utrumque dente armata solitario atque compresse, labro praeterea integrissimo, labioque explanato.

Long. 2 poll. 2 lin. lat. 1 poll. 1 lin.

### *Murex Tulipa.*

Linn. S. N. Gen. 325. Sp. 562.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 317.

977 M. T. testa *fulva* fere unicolor, transversim striata, anfractibus rotundatis, sutura subuplicata; apertura undique striata, labio antice gibbo, postice biplicato, plicis flexuosis croceis. Ind. Occ.

Chemn. Konch. Kab. T. 4. tab. 137. fig. 1288. 89.

Long. 7 poll. lat. 2 poll. 9 lin.

978 M. T. testa *subviolacea* fusco transversim striata, albidoque varia; apertura obsoletius striata, labro ex fusco pallidoque alterne maculato, labioque antice retuso, postice plicato, plicis duabus pallide carneis.

Long. 5 poll. 9 lin. lat. 2 poll.

979 M. T. testa fere antecedentis paullulum *alias variegata*, *differita*, unde columella prorsus conspicua.

Long. 5 poll. lat. 1 poll. 11 lin.

980 M. T. testa ex *pallide violaceo ferrugineo* que *marmorea*, spira insima rufescens; apertura subviolacea.

Long. 4 poll. 2 lin. lat. 1 poll. 6 lin.

981 M. T. testa *fulva*, *fusco striata*, pallidoque maculata, labium violaceum, plicis duabus posticis pallide incarnatis.

### *Murex clathratus.*

Linn. S. N. Gen. 325. Sp. 563.

982 M. cl. testa sublivida oblonga, plicata, plicis longitudinalibus submembranaceis, sulcis transversalibus exarata; apertura spadicea. Mar. Island.

Long. 1 poll. 10 lin. lat. 10 lin.

983 M. cl. testa tenuior, transversim multo obsoletius sulcata. 2.

Long. 1 poll. 2 lin. lat. 6 lin.

### *Murex dolarium.*

Linn. S. N. Gen. 325. Sp. 564.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 318.

984 M. dol. testa cornea, cingulis tantum tribus transversim costata. Ind. Or.

Mart. Konch. Kab. T. 3. tab. 18. fig. 1089.

Long. 1 poll. 3 lin. lat. 9 lin.

985 M. dol. testa pallida, transversim costata, costis 6 distinctis subnodosis cincta. 4.

Long. 1 poll. 9 lin. lat. 1 poll. 1 lin.

*Not.* Varietas haec nobis videtur perrara, quia nec in Mart. et Chemnitzi Konch. Kab. nec in Supplementis alterius reperitur.

986 M. dol. testa pallida ferrugineo striata, costis tribus nodoso-muricatis, cincta.

Long. 1 poll. 6 lin. lat. 1 poll. 1 lin.

987 M. dol. testa costis obsoletiusculis cincta, praeterea autem transversim sulcata; apertura quoque transversim striata.

Long. 1 poll. 11 lin. lat. 1 poll. 2 lin.

### *Murex*

*Murex Trapexium.*

- Linn. S. N. Gen. 325. Sp. 567.  
a Bornii test. mus. Vind. pag. 319.
- 988 M. Tr. testa *viridescens*; aperturae transversim striatae, labrum ad marginem subdenticulatum, labium subcarneum triplicatum, plica infima validiori. Amboin.  
Chenn. Konch. Kab. T. 4. tab. 139. fig. 1298.  
Long. 3 poll. 2 lin. lat. 1 poll. 5 lin.
- 989 M. Tr. testa *trifinis ferrugineo* longitudinaliter fasciata, transversim valide sulcata. Inf. Maurit. 2.  
Chenn. ~~Loc. cit.~~<sup>tab. 140</sup> fig. 1310.  
Long. 3 poll. 7 lin. lat. 1 poll. 6 lin.
- 990 M. Tr. testa *ex lutescenti albida*, nodose angulata; apertura (ut in antecedente) striata.  
Long. 4 poll. 4 lin. lat. 1 poll. 6 lin.
- 991 M. Tr. testa *lutea*, longitudinaliter carinata, striis transversis *subferrugineis*.  
Chenn. ~~Loc. cit.~~<sup>tab. 140</sup> fig. 1304.?  
Long. 1 poll. 6 lin. lat. 7 lin.
- 992 M. Tr. testa albida, nodose carinata, striis transversis *rufescentibus*; aperturae ovatae labrum ad marginem exteriorem muricatum, labium umbilicatum.  
Chenn. ~~Loc. cit.~~<sup>tab. 140</sup> fig. 1308 1309.  
Long. 3 poll. 3 lin. lat. 1 poll. 1 lin.  
Not. Num species singularis?

*Murex syracusanus.*

- Linn. S. N. Gen. 325. Sp. 568.
- 993 M. syr. testa pallida, fuso longitudinaliter undata, anfractibus muricato plicatis; apertura sublongitudinali. Mar. Sicil. 2.  
Chenn. Konch. Kab. T. 10. tab. Suppl. 162. fig. 1542; 43.  
Long. 1 poll. 10 lin. lat. 1 poll.

*Murex craticulatus.*

- Linn. S. N. Gen. 325. Sp. 569.  
a Bornii test. mus. Vind. pag. 319.
- 994 M. crat. testa albida, longitudinaliter subuplicata, angulis elevatis ferrugineis; labrum integrum, labium reflexum adnatum. Mar. Mediterr.  
Long. 2 poll. 9 lin. lat. 11 lin.

*Murex*

*Murex Argus Chemnitza.*

- 995 M. A. testa subturrata, albida, *fasciis linearibus badiis transversim cincta*; labrum luteum crenulatum. Mar. Mediterr.

Chemn. Konch. Kab. T. 10. tab. Suppl. 160. fig. 1522.

Long. 2 poll. lat. 11 lin.

*Not.* Nomen hujus specificum nobis non adaequatum videtur.

- 996 M. A. testa *multo tenuior*, nivea ferrugineo maculata ac fasciata; transversim sulcata, subdiaphana.

Long. 1 poll. 9 lin. lat. 1 poll.

\*\*\*\*\* *Turriti subulati, cauda brevissima.**Murex Vertagus.*

Linn. S. N. Gen. 325. Sp. 571.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 320.

- 997 M. Vert. testa *lutea unicolor*; spirae anfractibus 14 distinctis superne plicatis; columella subbiplicata. Ind. Or. 4.

Chemn. Konch. Kab. T. 4. tab. 157. fig. 1480.

Long. 1 poll. 3 lin. lat. 9 lin.

- 998 M. V. testa albida, longitudinaliter plicata, *fulcis longitudinalibus fuscis*; columella uniplicata.

Long. 2 poll. 1 lin. lat. 7 lin.

*Murex gibbosus Bornii.*

a Bornii test. mus. Vind. pag. 321. Tab. XI. f. 12. 13.

- 999 M. gibb. testa lutescens maculis pallide ferrugineis adspersa; labrum marginatum intus obsolete denticulatum; apertura elabiata.

Long. 1 poll. 7 lin. lat. 6 lin.

*Murex Aluco.*

Linn. S. N. Gen. 325. Sp. 572.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 321.

- 1000 M. Al. testa albida, *fusco transverse striata*, apertura subovata, albida, labro plicato, labio antice et postice plica solida munito. Ind. Orient. 3.

Chemn. Konch. Kab. T. 4. tab. 156. fig. 1473. 74.

Long. 3 poll. 8 lin. lat. 1 poll. 6 lin.

- 1001 M. Al. testa albida *immaculata*, transversim distincte sulcata.

Long. 1 poll. lat. 5 lin.

1002 M.

- 1002 M. Al. testa albida badio undata; labrum subintegrum. 2.  
Long. 2 poll. 3 lin. lat. 11 lin.
- 1003 M. Al. testa tenuior albida, *luteo maculata*, columella tantum antice uniplicata.  
Long. 1 poll. 1 lin. lat. 5 lin.
- 1004 M. Al. testa albida fusco varia; *columella laevi*, plicis nullis.  
Long. 2 poll. lat. 9 lin.
- 1005 M. Al. varietas singularis, nam testa ferrugineo fasciata, tuberculis spiniformibus cincta, apertura vero est integririma. 2.  
Long. 1 poll. 7 lin. lat. 7 lin.
- 1006 M. Al. varietas antecedenti similis, cuius testa ex atro fusca, fasciis autem fulvis cincta.  
Long. 1 poll. 5 lin. lat. 6 lin.
- 1007 M. Al. varietas alia, cuius testa virescens, subolivacea, tuberculis lacteis subnodosis cincta; apertura autem omnino est ovata.  
Long. 1 poll. 1 lin. lat. 4 lin.

#### *Murex coronatus Bornii.*

- a Bornii test. mus. Vind. pag. 322.
- 1008 M. cor. testa subcyanea, paliidoque varia, anfractibus novem coronatis. Mar. Ind. Or.  
Chemn. Konch. Kab. T. 4. tab. 156. fig. 1478.  
Long. 2 poll. 2 lat. lin. 8 lin.

#### *Murex litteratus Bornii.*

- a Bornii test. mus. Vind. pag. 323. Tab. XI. f. 14. 15.
- 1009 M. litt. testa nivea, punctis subferrugineis notata; anfractuum futurae vix distincte muricatae. 4.  
Long. 11 lin. lat. 4 lin.
- 1010 M. litt. testa pallida; anfractuum trium infimorum suturae, spinis muricatis perdistinctis, cinctae.  
Long. 9 lin. lat. 4 lin.
- 1011 M. litt. varietas nitidissima, ex albido ferrugineo fuscoque varie notata. 3.  
Long. 5 lin. lat. 2 lin.

#### *Murex fuscatus.*

- Linn. S. N. Gen. 325. Sp. 573.
- a Bornii test. mus. Vind. pag. 323.
- 1012 M. fusc. testa ex ferrugineo fusca, crenulata, apertura albida. M. Mediterr. 2.  
Long. 1 poll. 8 lin. lat. 8 lin.

*Murex*

*Murex torulosus.*

- Linn. S. N. Gen. 325. Sp. 574.  
 1013 M. tor. testa nivea flavescens varia, longitudinaliter sub-plicata; anfractus cincti zona gibba ac torulosa; apertura ovata. 2. †)  
 Long. 1 poll. 10 lin. lat. 7 lin.

*Murex Radula.*

- Linn. S. N. Gen. 325. Sp. 575.  
 a Bornii test. mus. Vind. pag. 324. Tab. XI, fig. 16.  
 1014 M. Rad. testa albescens, tuberculato muricata, punctis ferrugineis et purpurascientibus cincta. Mar. Mediterr. 3.  
 Long. 2 poll. 1 lin. lat. 10 lin.

*Murex atratus Bornii.*

- a Bornii test. mus. Vind. pag. 324. Tab. XI. f. 17, 18.  
 1015 M. atr. testa atra, transversim rugosa, punctisque elevatis cincta; apertura lactea. Spec. permulta.  
 Long. 1 poll. 6 lin. lat. 6 lin.

*Murex asper.*

- Linn. S. N. Gen. 325. Sp. 576.  
 1016 M. asp. testa pallida, anfractibus circiter decem coalitis, albidis, longitudinaliter sulcatis, transversim striatis nee non muricatis. Mar. Guienens. 3.  
 Long. 1 poll. 9 lin. lat. 7 lin.

*Murex granulatus.*

- Linn. S. N. Gen. 325. Sp. 577.  
 1017 M. gr. testa albida, subtuberculata; aperturae fauex flavescens. Oc. Asiat. 3.  
 Long. 2 poll. 1 lin. lat. 1 poll.  
*Not.* Apertura spec. nostr. a Bernhardo Eremita adhuc inhabitatur.

*Murex varicosus.*

- 1018 M. var. testa subrufescens, plicata, apertura laevi. Cap. b;  
 Sp.  
 Chemn. Konch. Kab. T. 10. tab. Suppl. 162. fig. 1546. 47.  
 Long. 1 poll. 6 lin. lat. 9 lin.

1019 M;

†) vid. Tab. Helmintholog. fig. 5;

1019 M. var. testa *laetea*, spira suprema inter plicas fusca, apertura striata.

Long. 1 poll. 8 lin. lat. 1 poll.

*Murex cancellatus.*

1020 M. canc. testa turrita, pallida, fasciis transversis fusca; anfractus novem longitudinaliter plicati, gibbi transversim sulcati, striis submembranaceis elevatis, unde facies cancellata; apertura ovata, ferrugineo maculata, striata, columella fere elabiata; cauda subadscendente. Patria ignota. 4. †)

Long. 1 poll. 6 lin. lat. 7 lin.

*Murex decollatus.*

Linn. S. N. Gen. 325. Sp. 572.

1021 M. dec. testa pallida, imbricato decussata. 4.

Long. 1 poll. 3 lin. lat. 6 lin.

*Murex perversus Chemn.*

1022 M. p. testa turrita sinistrosum versa, slavevens; anfractus circiter 8 longitudinaliter plicati et nodosi, transversim sulcati; apertura obovata cauda brevi striata. Litt. Afric. 3.

Chemn. Konch. Kab. T. 9. tab. 105. fig. 896.

Long. 10 lin. lat. 3 lin.

1023 M. perv. testa pallida *immaculata*.

Long. 11 lin. lat. 3 lin.

TROCHUS.

\*Umbilicati erecti, perforata columella.

*Trochus niloticus.*

Linn. S. N. Gen. 326. Sp. 579.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 327.

1024 T. nil. testa conica laevis, anfractibus distantibus, profrus ex margaritaceo argentea, quia tunica extima est detraeta. Ind. Occ.

Chemn. Konch. Kab. T. 5. tab. 167. fig. 1605.

Long. 2 poll. lat. 2 poll. 2 lin.

*Trochus*

†) v. Tab. Helmintholog. fig. 6.

*Trochus acutangulus Chemn.*

- 1025 Tr. ac. testa conica pallida, maculis chermesinis tessellatis varia, anfractibus decem subnodosis ac granulosis.  
Ind. Or.

Chemn. Konch. Kab. T. 5. tab. 167. fig. 1610.  
Long. 2 poll. 1 lin. lat. 1 poll. 7 lin.

*Trochus maculatus.*

- Linn. S. N. Gen. 325. Sp. 580.  
a Bornii test. mus. Vind: pag. 327.

- 1026 Tr. mae. testa conica, pallido virecentique maculata, tuberculato nodosa; basis albida seriatim et concentrica crenulata, sanguineo varia; labrum postice denticulatum, denticulis tribus ornatum; columella denticulata, aperturae faux striata. Ind. Or.

Chemn. Konch. Kab. T. 5. tab. 167. fig. 1608. 9.  
Long. 1 poll. 2 lin. lat. 1 poll. 3 lin.

*Not.* Chemn. solertissimis, fig. citat. pro Tr. nilotico quidem habet, sed Linnaeo judice, hic nunquam apertura gaudet striata. — An columella in speciminibus quae vidit Cel. Chemnitz, etiam, ut in nostro, denticulata fuerit, nescimus; nam in fig. adl. 1609 laevis adparet et Chemn. in descriptione loc. cit. pag. 81 data nihil hac de re adjecit.

- 1027 Tr. mae. testa subolivacea, spadiceo maculata; labrum integerrimum.

Long. 1 poll. lat. 1 poll. 2 lin.

- 1028 Tr. mae. testa aeruginosa pallido mactilata, spira sanguineo parum adspersa; labium obsolete dentatum.

Long. 1 poll. lat. 1 poll. 1 lin.

- 1029 Tr. mae. testa lutescens et paullulum detrita.

Long. 1 poll. lat. 1 poll. 3 lin.

- 1030 Tr. mae. tuberculato muricata, lutea, basi autem vestigiis adhuc punctorum sanguinorum.

Long. 1 poll. 9 lin. lat. 1 poll. 6 lin.

*Trochus apiarium Chineense Chemn.*

- 1031 Tr. apiar. testa longitudinaliter subuplicata nodosa, umbilicata, transversim decussato sulcata; basi et apertura antecedentis. Ind. Or.

Chemn. Konch. Kab. T. 5. tab. 168. fig. 1619.  
Long. 1 poll. 1 lin. lat. 1 poll. 2 lin.

*Trochus radiatus Chemnitz.*

- 1032 Tr. rad. testa virescens, fasciis longitudinalibus rubris.  
Chemn. Konch. Kab. T. 5. tab. 170. fig. 1640.  
Long. 11 lin. lat. 1 poll. 1 lin.

*Not.* Testa oblique dissecta est in usum characteristicæ conchiliologicae.

*Trochus perspettivus.*

Linn. S. N. Gen. 326. Sp. 581.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 328.

- 1033 Tr. persp. testa pallida cingulis badiis circumdata, quo-  
rum tantum infimum albo est interruptum. Franqueb.  
Chemn. Konch. Kab. T. 5. tab. 172. fig. 1691. 92.

Long. 1 poll. 4 lin. lat. 1 poll. 7 lin.

- 1034 Tr. persp. testa pallida subgranulosa, dentibus umbilici  
ferrugineis. 2.  
Chemn. loc. cit. fig. 1693.

Long. 10 lin. lat. 1 poll. 2 lin.

- 1035 Tr. persp. testae umbilicus dentibus armatus flavescen-  
tibus.

Chemn. loc. cit. fig. 1694.

Long. 10 lin. lat. 1 poll. 1 lin.

- 1036 Tr. persp. umbilicus testae, dentibus niveis flavo pun-  
ctatis.

Long. 7 lin. lat. 10 lin.

- 1037 Tr. persp. testa livida, ferrugineo pallidoque seriatim  
maculata; apertura violacea.

Long. 11 lin. lat. 1 poll. 2 lin.

*Trochus hybridus.*

Linn. S. N. Gen. 326. Sp. 582.

- 1038 Tr. hybr. testa obscure sanguinea unicolor, conuexa,  
granulosa. Mar. Mediterr. 2.

Long. 5 lin. lat. 4 lin.

*Trochus Pharaonius.*

Linn. S. N. Gen. 326. Sp. 584.

a Bernii test. mus. Vind. pag. 329.

- 1039 Tr. ph. testa pulcherrime varia; labrum dentatum, den-  
ticulo antice solidissimo; labium triplicatum, plica postica  
validiore. Mar. rubr.

Chemn. Konch. Kab. T. 5. tab. 171. fig. 1672. 73.

Long. 9 lin. lat. 10 lin.

Tro-

*Trochus Magus.*

- Linn. S. N. Gen. 326. Sp. 585.  
a Bornii test. mus. Vind. pag. 330.
- 1040 Tr. Mag. testa pallida, *fusco undulata*. Mar. Mediterr.  
Chemn. Konch. Kab. T. 5. tab. 171, fig. 1660.  
Long. 9 lin. lat. 10 lin.
- 1041 Tr. M. testa albida, *sanguineo undata*, subtusque testellata 4.  
Chemn. loc. cit. fig. 1656.57.  
Long. 6 lin. lat. 6 lin.

*Trochus striatus Chemn.*

- 1042 Tr. str. testa subumbilicata ex albido sanguineoque varia. Oc. Afric. 4.  
Chemni. Konch. Kab. T. 5. tab. 170, fig. 1650.51.  
Long. 4 lin. lat. 5 lin.

*Trochus modulus.*

- Linn. S. N. Gen. 326. Sp. 586.
- 1043 Tr. mod. testa umbilicata, striata, ex albo ferrugineoque varia, supra vero non plicata. 5.  
Mörtini Konch. Kab. T. 5. tab. 171, fig. 1665.  
Long. 7 lin. lat. 7 lin.

*Trochus cinerarius.*

- Linn. S. N. Gen. 326. Sp. 590.  
a Bornii test. mus. Vind. pag. 330. Tab. XI. f. 19.20.
- 1044 Tr. ciner. testa pallida, cinereo purpurascenque maculata. Litt. Norweg. Spec. non pauca.  
Chemn. Konch. Kab. T. 5. tab. 171, fig. 1636.  
Long. 7 lin. lat. 7 lin.
- 1045 Tr. ciner. testa pallida, *subferrugineo undata*. Specimina permulta.  
Long. 8 lin. lat. 8 lin.

*Trochus umbilicaris.*

- Linn. S. N. Gen. 326. Sp. 592.  
a Bornii test. mus. Vind. pag. 331. Tab. XII. f. 1.2.
- 1046 Tr. umb. testa *nebulosa*, ex livido, ferrugineo alboque varia, cingulis subelevatis ornata. Mar. Mediterr. 2.  
Chemn. Konch. Kab. T. 5. tab. 171. f. 1666.  
Long. 10 lin. lat. 10 lin.
- 1047 Tr. umb. testa *glaucā*, cingulis *nullis*.  
Long. 11 lin. lat. 11 lin.

*Trochus Cookianus Chemn.*

1048 Tr. Cooks. testa *rudis*, anfractus duo infimi supra longitudinaliter plicati; apertura argentea annulo *haud angusto* cincta ferrugineo. Fret. Cookian. Zeeland. nov.

Chemn. Konch. Kab. T. 5, tab. 164. fig. 1551.

Long. 2 poll. 2 lin. lat. 2 poll. 2 lin.

*Not.* Descriptionem nostram tam incompletam, ad supplementum duntaxat descriptionis accuratissimae a Cel. Spenglero atque Cheymitzio loc. cit. pag. 36-38 datae, hue adjectimus. — *Trochus* autem hic, *Turbini rugosa* maxime adfinis est.

1049 Tr. Cooks. testa minoria limo marino prorsus *depurata*, unde jucundior; apertura vero fascia tantum lugulari ferrugineo notata, margine extimo crenato.

Long. 1 poll. 8 lin. lat. 1 poll. 9 lin.

*Trochus declive Ind. Occ.*

1050 Tr. decl. etc. testa anfractu *infimo ferruginea*, spiracula lactea; apertura laevis.

Chemn. Konch. Kab. T. 5, tab. 165. fig. 1567. 68.

Long. 9 lin. lat. 1 poll.

1051 Tr. decl. etc. testa *undique albida*, apertura striata.

Long. 8 lin. lat. 7 lin.

\*\* Imperforati, erecti, umbilico clauso.

*Trochus vestiarius.*

Linn. S. N. Gen. 326. Sp. 594.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 334.

1052 Tr. vest. testa *subviolacea* albidoque *interrupta*; anfractus infimi sutura elevata. Chin.

Chemn. Konch. Kab. T. 5, tab. 166. fig. 1601, a, b.

Long. 4 lin. lat. 6 lin.

1053 Tr. vest. testa *virescens*, radiis obliquis albidis, Bengal. Spec. multa.

Chemn. loc. cit. fig. 1601. Litt. e, f.

Long. 4 lin. lat. 5 lin.

1054 Tr. vest. testa *cinerascens*, cingulis e *roseo* albidoque alternis. Chin. 3.

Chemn. loc. cit. fig. 1601. Litt. g.

Long. anteced.

1055 Tr.

1055 Tr. vest. testa cinerascens, cingulis roseis, radiisque obliquatis albis. Bengal.

Chemn. loc. cit. fig. 1601. Litt. h.  
Magnitudo praecepit.

1056 Tr. vest. testa subrosea albo undata. Franqueb.  
Long. 3 lin. lat. 4 lin.

1057 Tr. vest. testa undique alba.  
Long. 2 lin. lat. 3 lin.

### *Trochus Labio.*

Linn. S. N. Gen. 326. Sp. 595.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 335. T. XII. f. 7. 8.

1058 Tr. Lab. testa ex roseo, virecente fuscoque varia, granulosa; labium subplicatum. Oc. Asiat.

Chemn. Konch. Kab. T. 5. tab. 166. fig. 1579. 80.  
Long. 1 poll. 1 lin. lat. 10 lin.

### *Trochus conulus.*

Linn. S. N. Gen. 326. Sp. 598.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 336.

1059 Tr. con. testa violacea, ferrugineo varia, laevis; anfractuum suturae marginatiæ. Mar. Mediterr.

Chemn. Konch. Kab. T. 5. tab. 166. fig. 1589.  
Long. 1 poll. lat. 1 poll. 1 lin.

### *Trochus Zizyphinus.*

Linn. S. N. Gen. 326. Sp. 599.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 337.

1060 Tr. Zez. testa basi plana, tunica extima denudata, unde margaritacea. Europ. Spec. haud paucæ.

Chemn. Konch. Kab. T. 5. tab. 166. fig. 1594.  
Long. 10 lin. lat. 10 lin.

1061 Tr. Zez., testa pallida, violaceo variegata, transversim striata. 4.

Long. 6 lin. lat. 7 lin.

### *Trochus granulatus Chemn.*

1062 Tr. gran. testa flavescens, seriebus granulosis ex violaceo et ferrugineo alternis cincta.

Chemn. Konch. Kab. T. 5. tab. 166. fig. 1597. 98.  
Long. 10 lin. lat. 10 lin.

*Trochus leviter muricatus.*

- 1063 Tr. lev. mur. testa flava, suturis anfractuum subspinosis.  
Chemn. Konch. Kab. T. 5. tab. 164. fig. 1558. 59.  
Long. 9 lin. lat. 10 lin.

*Trochus tessellatus Bornii.*

- a Bornii test. mus. Vind. pag. 332. T. XII. fig. 5. 6.  
1064 Tr. tess. testa pallida nigro transversim tessellata, laevis  
ac solida. Ins. Crucian.  
Chemn. Konch. Kab. T. 5. tab. 166. fig. 1584.  
Long. 1 poll. 3 lin. lat. 1 poll. 2 lin.  
1065 Tr. tess. testa lutescens pueris purpurascens varie-  
gata, 4.  
Chenin. loc. cit. fig. 1585.  
Long. 9 lin. lat. 9 lin.  
1066 Tr. tess. varietas singularis, cuius testa laevis, chara-  
cteribus gaudet tessellatis obscuris, albo interruptis. 3.  
Long. 11 lin. lat. 10 lin.  
*Not.* Haec spec. Tr. agresti imperforato Chemn. loc. cit.  
fig. 1582 statura et colore simile.

*Trochus Iridis Chemn.*

- 1067 Tr. Ir. testa, cortice deslito, undique aureo-viride-  
scens, splendida. Nov. Zealand.  
Chemn. Konch. Kab. T. 5. tab. 161. fig. 1523.  
Long. 1 poll. 7 lin. lat. 1 poll. 1 lin.  
1068 Tr. Ir. testa cortice sordido extus adhuc tenuia; intus  
tamen virescens nitet.  
Chemn. loc. cit. fig. 1522.  
Long. 1 poll. 8 lin. lat. 1 poll.

*Trochus pyramis?*

- 1069 Tr. pyr. testa virescens ferrugineoque undulata, Specimi-  
na multa,  
Chemn. Konch. Kab. T. 5. tab. 160. fig. 1511. 12.  
Long. 1 poll. lat. 11 lin.  
*Not.* Quamvis anfractus non sunt granulosi, sed tantum  
marginati, has cochleas tamen hue locavimus, quia  
inter Trochos, Pyramidi Chemn. omnium sint praeterea  
simillimae.

*Trochus fenestratus imperforatus Chemn.*

1070 Tr. fen. imp. testa longitudinaliter rugosa, transversim striata, decussata, *albida* maculis obscure virescentibus, Ind. Or.

Chemn. Konch. Kab. T. 5. tab. 163. fig. 1549. 50.

Long. 1 poll. 1 lin. lat. 11 lin.

1071 Tr. fen. imp. testa olivacea, glutinosa splendens. Long. 11 lin. lat. 10 lin.

*Trochus tuberosus Chemn.*

1072 Tr. tub. testa limo marino tecta undique pallida atque tuberosa. Ins. Maurit.

Chemn. Konch. Kab. T. 5. tab. 163. fig. 1547. 48.

Long. 2 poll. 1 lin. lat. 1 poll. 8 lin.

\*\*\* Turreti umbilico exerto, qui positi cadunt in latus.

*Trochus Telescopium.*

Linn. S. N. Gen. 326. Sp. 600.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 338.

1073 Tr. Tel. testa ad spiram inferiorem fusca, ad superiorem ferruginea, striata. Ind. Or.

Chemn. Konch. Kab. T. 5. tab. 160. fig. 1507-9.

Long. 2 poll. 7 lin. lat. 1 poll. 4 lin.

*Trochus dolabratus.*

Linn. S. N. Gen. 326. Sp. 601.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 339.

1074 Tr. dol. testa pallida cingulis ferrugineis; anfractus novem; columella triplicata, plica antica validiore. Ind. Occ. 2.

Chemn. Konch. Kab. T. 5. tab. 167. fig. 1603. 4.

Long. 1 poll. 5 lin. lat. 6 lin.

## TURBO.

\* Neritoidei, aperturae margine columnari plano imperforato.

*Turbo obtusatus.*

Linn. S. N. Gen. 327. Sp. 605.

1075 T. obt. testa *triflisis*, solida tenuissime oblique striata. Oc. Septentr. 3.

Chemn. Konch. Kab. T. 5. tab. 185. fig. 1854. Litt. a. b.

Long. 7 lin. lat. 5 lin.

- 1076 T. obt. testa *aurantia*, virescente subfasciata, apertura laetea. 2.  
 Chemn. loc. cit. fig. 1854. litt. c. d.  
 Long. 7 lin. lat. 6 lin.

*Turbo Neritoides.*

- Linn. S. N. Gen. 327. Sp. 606.  
 1077 T. Nerit. testa lutea *fasciis subaurantiis*.  
 Chemn. Konch. Kab. T. 5. tab. 183. fig. 1854. 1.  
 Long. 6 lin. lat. 6 lin.  
 1078 T. Ner. testa *spadicea*, *fasciis 2 luteis transversa*. 2.  
 Chemn. loc. cit. fig. 1854. 3.  
 Magnitudo praeced.  
 1079 T. Ner. testa lutescens *absque fasciis*. Spec. peripulta.  
 Chemn. loc. cit. fig. 1854. 4.  
 Long. 6. lat. 7 lin.

*Turba littoreus.*

- Linn. S. N. Gen. 327. Sp. 607.  
 a Bornii test. mus. Vind. pag. 343. T. XII. fig. 13. 14.  
 1080 T. litt. testa *fusca subunicolor*; columella alba. Occ.  
 Europ. Spec. non paucia.  
 Chemn. Konch. Kab. T. 5. tab. 185. fig. 1852.  
 Long. 10 lin. lat. 9 lin.  
 1081 T. litt. testa *rubella*. 4.  
 Long. 7 lin. lat. 5 lin.  
 1082 T. litt. testa *tenuior virescens*, *subdiaphana*. Spec.  
 multa.  
 Long. 6 lin. lat. 5 lin.

*Turbo muricatus.*

- Linn. S. N. Gen. 327. Sp. 608.  
 a Bornii test. mus. Vind. pag. 341. Tab. XII. fig. 15. 16.  
 1083 T. mur. testa pallide cinerascens umbilicata, punctis se-  
 riatis eminentibus confertim cincta; fauce ferruginea. 4.  
 Long. 11 lin. lat. 9 lin.  
 \*\* Solidi imperforati.

*Turbo pullus.*

- Linn. S. N. Gen. 327. Sp. 610.  
 a Bornii test. mus. Vind. pag. 342. Tab. XII. fig. 17. 18.  
 1084 T. pull. testa nivea sanguineo undata. M. Mediterr. 5.  
 Long. 3 lin. lat. 3 lin.

*Tur-*

*Turbo Petiolatus.*

- Linn. S. N. Gen. 327. Sp. 612,  
a Bornii test. mus. Vind. pag. 342.  
 1085 T. Peth. testa pallide incarnata spadiceo maculata ac angustae fasciata, spirae apex summus sanguineus; labium luteum. Ind. Or. 2.  
 Chemn. Konch. Kab. T. 5. tab. 183. fig. 1828. 29;  
 Long. 2 poll. 3 lin. lat. 2 poll. 1 lin.  
 1086 T. Peth. testa *badia*, maculis pallidis fasciisque transversis fuscis, albido parum interruptis, ornata. 3,  
 Long. 1 poll. 5 lin. lat. 1 poll. 3 lin.

*Turbo Cidaris Pers. Chemn.*

- 1087 T. Cid. Pers. testa subfuscata punctis albidis transversim notata; spira superior potius flavescens ac viridis. Occ. Ind. Or.  
 Chemn. Konch. Kab. T. 5. tab. 184. fig. 1842.  
 Long. 1 poll. lat. 1 poll. 2 lin.

*Turbo Cidaris rufescens.*

- 1088 T. C. ruf. testa subferruginea, apertura margaritacea.  
 Chemn. Konch. Kab. T. 5. tab. 184. fig. 1847.  
 Long. 1 poll. 7 lin. lat. 1 poll. 8 lin.  
*Not.* Testa paullulum detrita, et varietas tantum speciei praecedentis nobis videtur.

*Turbo Chrysoftomus.*

- Linn. S. N. Gen. 327. Sp. 614.  
 a Bornii test. mus. Vind. pag. 344.  
 1089 T. Chr. testa rugosa, lutescens, maculis purpurascentiibus cincta; anfractus infimus spinulis trifariam circumdatur fornicatis; fauax aurea; umbilicus revera ad labium perforatus. Ind. Or. 2.  
 Chemn. Konch. Kab. T. 5. tab. 178. fig. 1766.  
 Long. 2 poll. lat. 1 poll. 6 lin.

*Turbo Teetum Persicum.*

- Linn. S. N. Gen. 327. Sp. 615,  
 a Bornii test. mus. Vind. pag. 344. Tab. XII. fig. 19. 20.  
 1090 T. Teet. P. testa cornea fasciis fuscis spinisque papilloso cincta. Ind. Or. 2.  
 Chemn. Konch. Kab. T. 5. tab. 162. fig. 1543. 44.  
 Long. 1 poll. 1 lin. lat. 10 lin.

Tur-

*Turbo Pagodus.*

- Linn. S. N. Gen. 327. Sp. 616.  
a Bornii test. mus. Vind. pag. 345.
- 1091 T. Pag. testa *pallida subunicolor*, spinosa, apertura lutescens valide striata, columella lactea.  
Chemn. Konch. Kab. T. 5. tab. 163. fig. 1541. 42.  
Long. 2 poll. 5 lin. lat. 1 poll. 11 lin.
- 1092 T. Pag. testa *lutescens*, *violaceo*, ferruginosoque nebulose variegata.  
Long. 2 poll. lat. 1 poll. 8 lin.
- 1093 T. Pag. testae apertura *magis exarata* quam striata, columella in medio subuplicata.  
Long. 1 poll. 7 lin. lat. 1 poll. 6 lin.

*Turbo Calcar.*

- Linn. S. N. Gen. 327. Sp. 617.  
a Born. test. mus. Vind. pag. 346.
- 1094 T. Calc. testa flavescens spinosa, annulo croceo ad basin ornata. Amboin.  
Chemn. Konch. Kab. T. 5. tab. 174. fig. 1718, 19.  
Long. 1 poll. 5 lin. lat. 1 poll. 7 lin.

*Turbo rugosus.*

- Linn. S. N. Gen. 327. Sp. 618.  
a Bornii test. mus. Vind. pag. 346.
- 1095 T. rug. testa *cortice defitita*, margaritacea. Mar. Mediterr.  
Chemn. Konch. Kab. T. 5. tab. 180. fig. 1782. 83.  
Long. 1 poll. 9 lin. lat. 1 poll. 9 lin.
- 1096 T. rug. testa *ansæctibus superne iam distincte plicata*, transversim rugosa.  
Chemn. loc. cit. fig. 1784. 85.  
Long. 1 poll. 3 lin. lat. 1 poll. 4 lin.

*Turbo Castanea Ind. Occ. Chemn.*

- 1097 T. Cast. etc. testa albida ferrugineo variegata, subumbilicata ac papillosa.  
Chemn. Konch. Kab. T. 5. tab. 182. fig. 1813. 14.  
Long. 11 lin. lat. 10 lin.

*Turbo marmoratus.*

- Linn. S. N. Gen. 327. Sp. 619.  
a Bornii test. mus. Vind. pag. 347.

1098 T.

- 1098 T. marm. testa ex albo, herbaceo, fuscōque varia, serie solitaria nodosa, antice cincta. Ceylon.  
 Chemn. Konch. Kab. T. 5. tab. 179. fig. 1775. 76.  
 Long. 2 poll. 9 lin. lat. 2 poll. 2 lin.
- 1099 T. marm. operculum, colore fuscō-ferrugineo.  
 Chemn. Konch. Kab. T. 4. tab. 151. fig. 1420. 21.  
 Diam. opere. 11 lin.
- 1100 T. marm. operculum, colore lacteo.  
 Diam. huius 1 poll. 3 lin.

*Turbo Imperialis Chemn.*

- 1101 T. Imp. testa glaberrima ex viridi alboque varia, intus margaritacea. Mar. Chinens.  
 Chemn. Konch. Kab. T. 5. tab. 178. fig. 1773.  
 Long. 2 poll. 6 lin. lat. 2 poll.  
 \*\*\* Solidi, umbilico perforato.

*Turbo Olearius.*

- 1102 T. Ol. testa colore *T. marmor.* seriebus tribus nodosis cincta; umbilicata. Ind. Or.  
 Chemn. Konch. Kab. T. 5. tab. 177. fig. 1771. 72.  
 Long. 4 poll. 6 lin. lat. 3 poll. 11 lin.  
*Not.* Quod spec. multum valet, propter corticem prorsus conservatum. — Iudice Cel. Chemnitz. differentia specifica *T. Ol.* a marmorato in umbilico reperitur perforato; id quod Linnaeus nescivit, cum specimina *T. Olearii* tantum reformata videret.
- 1103 T. Ol. testa reformata, pulcherrime nitet margaritaceo.  
 Long. 5 poll. 9 lin. lat. 6 poll. 2 lin.  
*Not.* Impressio umbilici adhuc conspicua.
- 1104 T. Ol. testa quidem reformata, magis acutangula, labium latius explanatum.  
 Long. 4 poll. 9 lin. lat. 5 poll.
- 1105 T. Ol. operculum, solidum, colore lacteo, spadiceo-vario.  
 Diam. 3 poll.

*Turbo Pica.*

Linn. S. N. Gen. 327. Sp. 622.

a Born. test. mus. Vind. pag. 349.

- 1106 T. P. testa pallida, atro undulata, polita. Oc. Ind. Oce.  
 Chemn. Konch. Kab. T. 5. tab. 176. fig. 1750. 51.  
 Long. 3 poll. lat. 2 poll. 11 lin.

1107 T.

1107 T. P. testa *nondum polita*, umbilico plane *cordato*.  
Long. 2 poll. 5 lin. lat. 2 poll. 2 lin.

1108 T. P. testa *limo marino testa*, perrugosa.  
Long. 1 poll. 10 lin. lat. 1 poll. 10 lin.

*Not.* Hanc varietatem T. Picae ad singularem speciem  
sub nomine T. *nodulosi* Perill. a Born. loc. cit. re-  
tulit — Specimini nostro operculum adhuc inest.

### Turbo *Argyrostomus*.

Linn. S. N. Gen. 327. Sp. 624.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 350.

1109 T. Arg. testa *jubolivacea ferrugineo undulata*. Ind. Or. 3.  
Chemn. Konch. Kab. T. 5: tab. 177. fig. 1764.  
Long. 1 poll. 6 lin. lat. 1 poll. 4 lin.

1110 T. Arg. testa *ex fusco alboque undata*, valide sulcata  
umbilico fere nullo.  
Chemn. loc. cit. fig. 1795. 96.  
Long. 1 poll. 3 lin. lat. 1 poll. 2 lin.

### Turbo *Argyrost. canaliculatus* Chemn.

1111 T. A. canal. testa *subvirescens fusco maculata*, transver-  
sim valide sulcata, umbilico nullo. Ind. Or.  
Chemn. Kotch. Kab. T. 5: tab. 181. fig. 1797  
Long. 2 poll. 5 lin. lat. 1 poll. 10 lin.

### Turbo *depressus* Chemn.

1112 T. dépr. testa *rufescens*, ferrugineo alboque tenuissime  
et quadrangulariter punctata. Zeel. nov.  
Chemn. Konch. Kab. T. 5: tab. 176. fig. 1740. 41.  
Long. 6 lin. lat. 7 lin.

*Not.* Colore specimen nostrum a citato, ut ex descriptio-  
ne patet, plane differt.

### Turbo *Delphinus*.

Linn. S. N. Gen. 327. Sp. 626.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 351.

1113 T. D. testa hispida, *rufescens*, spirulis fuscescentibus  
cincta; aperturae margo subincarnatus. Oc. Asiat. 3.

Chemn. Konch. Kab. T. 5. tab. 175. fig. 1730. 31.  
Long. 1 poll. lat. 1 poll. 3 lin.

1114 T. D. testa polita, et extus et intus *margaritacea*;   
umbilicus usque ad spiram supremam perforatus.  
Long. 1 poll. 4 lin. lat. 1 poll. 6 lin.

1115 T.

*Turbo Delphinus nodosus.*

- 1115 T. D. nod. testa *albida* sanguineo notata rugoso-nodosa; umbilicus quoque omnes perforat anfractus. Ind. Or. Chemn. Konch. Kab. T. 5. tab. 174. fig. 1723. 24.  
Long. 11 lin. lat. 11 lin.

*Turbo carinatus Bornii.*

a Bornii test. mus. Vind. pag.

- 1116 T. car. nod. testa iam paullulum detrita; umbilicus spiralis etiam rugosus, rugis ramosis munitus.  
Long. 1 poll. 1 lin. lat. 1 poll. 7 lin.

*Not.* Figuram. 1303 et 4 Tab. 126. Tom. 9. Chemn. Konch. Kab. hanc Turbinis speciem minime esse, ut Cel. Chemn. arbitratur, mihi manifestum videtur e relatione descriptionis Perill. a Bornii cum characteribus a Chemnitz. adlatis.

*Turbo Spengleri.*

- 1117 T. sp. testa turrita, anfractibus 5 convexis, futura canaliculata distantibus, basi planiuscula; umbilici loco cava parva, apertura obovata. Ind. Or. Chemn. Konch. Kab. T. 5. tab. 181. fig. 1801. 2.  
Long. 2 poll. 3 lin. lat. 2 poll.

*Not.* Spec. nostr. denudatum margaritaceum adparet.

\*\*\*\* Cancellati.

*Turbo crenellus.*

Linn. S. N. Gen. 327. Sp. 628.

- 1118 T. cren. testa pallida, anfractus longitudinaliter plicati, transversim sulcati et crenulati; labrum plicatum dilatiusculum.  
Long. 6 lin. lat. 6 lin.

*Turbo scalaris.*

Linn. S. N. Gen. 327. Sp. 630.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 353.

- 1119 T. sc. testa lactea unicolor, anfractus distantes, cingulis octo longitudinalibus cancellati. Tranqueb.  
Chemn. Konch. Kab. T. 4. tab. 152. fig. 1426. 27.  
Long. 1 poll. lat. 6 lin.

*Tur-*

*Turbo Clathrus.*

- Linn. S. N. Gen. 327. Sp. 631.  
 a Bornii test. mus. Vind. pag. 354.
- 1120 T. Cl. testa albida, purpurascenti transversim punctata, anfractibus 8 cingulis membranaceis, longitudinalibus 12 cancellata, Ind. Or. 6.  
 Chemn. Konch. Kab. T. 4. tab. 153. fig. 1437. 38.  
 Long. 1 poll. 3 lin. lat. 6 lin.

*Turbo ambiguus.*

- Linn. S. N. Gen. 327. Sp. 632.
- 1121 T. amb. testa turrata, umbilicata; anfractus 8 pallide cinerascentes subcancellati, quorum quisque membrans 24, inter quos 4 ad summum validiores, reliqui autem lynceo tantum conspicui, imbricatim teguntur; apertura ovata. Ind. Or.  
 Chemn. Konch. Kab. T. 4. tab. 153. fig. 1435. 36.  
 Long. 10 lin. lat. 4 lin.

*Not.* Fig. cit. T. ambiguum Linn. revera esse arbitror;  
 Cel. Chemn. forsan membranulas tenuissimas non obseruavit.

*Turbo Uva.*

- Linn. S. N. Gen. 327. Sp. 636.  
 a Bornii test. mus. Vind. pag. 354.
- 1122 T. U. testa oblique plicata, cinerascens; apertura subbidentata. Ind. Occ.  
 Chemn. Konch. Kab. T. 4. tab. 153. fig. 1439. a.  
 Long. 11 lin. lat. 3 lin.

*Turbo corneus.*

- Linn. S. N. Gen. 327. Sp. 637.
- 1123 T. corn. testa umbilicata ferrugineo alboque undata; anfractus 6 convexi decussatim striati; apertura subovata, reflexa, fauce subfusca, extus lacteo annulata. 2.  
 Long. 9 lin. lat. 6 lin.
- 1124 T. corn. testa albida ex rufso nebulosa. 2.  
 Long. 9 lin. lat. 6 lin.
- 1125 T. corn. testa albida, et extus et intus unicolor.  
 Long. 10 lin. lat. 6 lin.

## \*\*\*\* Turriti proprie dicti.

*Turbo imbricatus.*

Linn. S. N. Gen. 327. Sp. 640.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 356.

- 1126 T. imbr. testa albida, flavevolent maculata, anfractibus  
14 deorsum imbricatis. Ind. Occ.

Long. 1 poll. 11 lin. lat. 6 lin.

*Turbo replicatus.*

Linn. S. N. Gen. 327. Sp. 641.

- 1127 T. repl. testa albida, ferrugineo transversim fasciata,  
spira suprema paullulum destrueta. Tranqueb.  
Chemn. Konch. Kab. T. 4. tab. 151. fig. 1410.  
Long. 3 poll. 3 lin. lat. 1 poll.

*Turbo acutangulus.*

Linn. S. N. Gen. 327. Sp. 642.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 356.

- 1128 T. ac. testa albida unicolor, anfractibus decem acutis.  
Chemn. Konch. Kab. T. 4. tab. 151. fig. 1413.  
Long. 1 poll. lat. 4 lin.

*Turbo duplicatus.*

Linn. S. N. Gen. 327. Sp. 643.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 357.

- 1129 T. dupl. testa pallida, ferrugineo fasciata, anfractus 12  
carinati, columella glaberrima subviolacea. Litt. Co-  
romand.

Chemn. Konch. Kab. T. 4. tab. 151. fig. 1414.

Long. 1 poll. 11 lin. lat. 8 lin.

*Turbo exoletus.*

Linn. S. N. Gen. 327. Sp. 644.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 357. Tab. XIII. fig. 7.

- 1130 T. exol. testa albida ferrugineo varia, anfractibus duos  
decim. 3.

Chemn. Konch. Kab. T. 4. tab. 152. fig. 1424.

Long. 2 poll. 5 lin. lat. 8 lin.

*Turbo Terebra.*

Linn. S. N. Gen. 327. Sp. 645.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 358.

1131 T. Ter. testa brunascens, *anfractibus* 26 valide carinatis. Ind. Or.

Chemn. Konch. Kab. T. 4. tab. 157. fig. 1415.

Long. 4 poll. 4 lin. lat. 1 poll.

1132 T. Ter. testa *anfractibus circiter* 18 obsolete carinatis. 4.

Long. 4 poll. 2 lin. lat. 1 poll.

1133 T. Ter. testa pallida *anfractibus* 14 tenuioribus. 4.

Chemn. loc. cit. fig. 1419.

Long. 1 poll. 6 lin. lat. 5 lin.

### *Turbo variegatus.*

Linn. S. N. Gen. 327. Sp. 646.

1134 T. var. testa albida, violaceo ferrugineoque undulata; *anfractus* 26 planiusculi, striis transversis 7 obsoletis, semipellucida.

Long. 5 poll. lat. 10 lin.

*Not.* Quare figuram 1423. Tab. 152. T. 4ti Chemnitzii

Konch. Kab. *huc allegare non potuerim*, eo ipso patet.

### *Turbo ungulinus.*

Linn. S. N. Gen. 327. Sp. 647.

1135 T. ung. testa rufescens; turrita, *anfractibus* 12, striis decem transversis. 2.

Long. 1 poll. 5 lin. lat. 5 lin.

### *Turbo bidens.*

Linn. S. N. Gen. 327. Sp. 649.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 359.

1136 T. bid. testa fuscescens, pellucida, longitudinaliter stria-ta, *anfractibus* 12 contrariis. Europ. Spec. multa.

Chemn. Konch. Kab. T. 9. tab. 152. fig. 960.

Long. 9 lin. lat. 2 lin.

### *Turbo helicineus Chemn.*

1137 T. helic. testa subcrenulata, umbilicata, umbilico patentissimo infundibuliformi; apertura orbicularis; terrefris.

Chemn. Konch. Kab. T. 9. tab. 123. fig. 1067. 68.

Long. 7 lin. lat. 3 lin.

## HELIX.

\**Ancipites*, testa longitudinaliter utrinque angulata.

*Helix Scarabaeus.*

Linn. S. N. Gen. 328. Sp. 655.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 365.

- 1138 H. Sc. testa ex albo ferrugineo que variegata, apertura dentibus sex utrinque bipartitis, armata. Tranqueb.  
Chemn. Konch. Kab. T. 9. tab. 136. fig. 1249. 50.  
Long. 1 poll. 3 lin. lat. 10 lin.

\*\**Carinatae anfractibus margine acuto.*

*Helix Lapicida.*

Linn. S. N. Gen. 328. Sp. 656.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 365. Tab. XIV. fig. 1. 2.

- 1139 H. Lap. testa pallida *ferrugineo maculata*, anfractibus 5 convexis. 2.  
Chemn. Konch. Kab. T. 9. tab. 126. fig. 1107.  
Long. 7 lin. lat. 3 lin.

- 1140 H. Lap. testa tristis, umbilico *magis patente*. 2.  
Long. 8 lin. lat. 4 lin.

*Helix Planorbis.*

Linn. S. N. Gen. 328. Sp. 662.

a Bornii test. mus. Vind. p. 367. Tab. XIV. fig. 5. 6.

- 1141 H. Pl. testa albida, cortice fusco tecta, anfractibus 5 supra concava. Spec. mult.  
Long. 8 lin. diam. anfr. 3 lin.

*Helix complanata.*

Linn. S. N. Gen. 328. Sp. 663.

- 1142 H. compl. testa cornea, pellucida, anfractibus 5, quorum maximus acutissime carinatus.

Chemn. Konch. Kab. T. 9. tab. 127. fig. 1121. 22.  
Long. 6 lin. diam. anfr. 3 lin.

*Helix Vortex.*

Linn. S. N. Gen. 328. Sp. 667.

- 1143 H. Vort. testa, cortice nigrascente tecta. 3.

Chemn. Konch. Kab. T. 9. tab. 127. fig. 1127.  $\alpha$ .  $\beta$ .  
Long. 4 lin. diam. anfr. 1 lin.

## \*\*\* Rotundatae anfractibus et umbilicatae.

*Helix cornea.*

Linn. S. N. Gen. 328. Sp. 671.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 372.

1144 H. corn. testa glauca, oblique striata, anfractibus 5 tere-

tibus. Spec. haud pauca.

Chemn. Konch. Kab. T. 9. tab. 127. fig. 1113. 14.

Long. 1 poll. 4 lin. diam. anfr. 7 lin.

*Helix Cornu arietis.*

Linn. S. N. Gen. 328. Sp. 674.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 373.

1145 H. C. ar. testa lutescens, fasciis 2 ferrugineis latioribus,

atque tribus pallidis angustioribusque; basi subviolacea.

Ind. Or.

Chemn. Konch. Kab. T. 9. tab. 112. fig. 952. 53.

Long. 1 poll. 1 lin. diam. anfr. 7 lin.

1146 H. C. ar. testa albida, vestigiis tantum fasciarum an-

teced. solidior.

Long. 1 poll. 3 lin. diam. anfr. 8 lin.

*Helix Pomatia.*

Linn. S. N. Gen. 328. Sp. 677.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 375.

1147 H. P. testa flavescens, apertura lactea, operculo clausa.

Europ.

Chemn. Konch. Kab. T. 9. tab. 128. fig. 1138. a.

Long. 1 poll. 6 lin. lat. 1 poll. 5 lin.

*Helix citrina.*

Linn. S. N. Gen. 328. Sp. 679.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 377. Tab. XIII. fig. 14. 15.

1148 H. citr. testa lutescens cingulis ex albo ferrugineoque al-

ternis, ornata. Iamaic. 2.

Chemn. Konch. Kab. T. 9. tab. 131. fig. 1170.

Long. 1 poll. 2 lin. lat. 1 poll. 6 lin.

*Helix castanea Chemn.*

1149 H. cast. testa ex violaceo flavescens, anfractibus 5, quo-

rum insinus fascia albida transversim cinctus; pellucida.

Chemn. Konch. Kab. T. 9. tab. 131. fig. 1172.

Long. 1 poll. 2 lin. lat. 1 poll. 6 lin.

*Helix*

*Helix arbustorum.*

Linn. S. N. Gen. 328. Sp. 680.

1150 H. arb. testa flavescens luteo variegata, umbilico vix conspicuo. 3. Europ.

Chemn. Konch. Kab. T. 9. tab. 133. fig. 1202.

Long. 10 lin. lat. 1 poll.

*Helix zonaria.*

Linn. S. N. Gen. 328. Sp. 681.

a Born. test. mus. Vind. pag. 378.

1151 H. zon. testa pallida, ventre fasciis 2 ferrugineis varia, apertura edentula. 5.

Chemn. Konch. Kab. T. 9. tab. 132. fig. 1189.

Long. 1 poll. 1 lin. lat. 8 lin.

*Helix volvulus Born.*

a Born. test. mus. Vind. pag. 379. Tab. 14. fig. 23. 24.

1152 H. volv. testa oblique tenuissime striata, ex fusco alboque varia. Sp. 6.

Long. 4 lin. lat. 2 lin.

*Helix Lusitanica.*

Linn. S. N. Gen. 328. Sp. 684.

1153 H. Lus. testa flavescens, fasciis transversis fuscis, anfractu infimo ventricoso, tereti, maximo, umbilico patentissimo; fasciae externae in apertura translucent. Europ. 2.

Long. 1 poll. 2 lin. lat. 1 poll. 10 lin.

Nat. Linn. quidem hanc speciem absque fasciis descripsit, sed specimen forsitan cortice nondum destituta tantum vidit.

\*\*\*\* Rotundatae imperforatae.

*Helix nemoralis.*

Linn. S. N. Gen. 328. Sp. 691.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 384. Tab. XVI. fig. 3 - 8.

1154 H. nem. testa lutescens fasciis multis spadiceis cincta. Spec. multa,

Chemn. Konch. Kab. T. 9. tab. 133. fig. 1196.

Long. 10 lin. lat. 1 poll.

1155 H. nem. testa albida fasciis spadiceis cincta. 3.

Long. 11 lin. lat. 1 poll.

- 1156 H. nem. testa *lutea*; *futura* quaeque anfractuum, anulo *cincta* badio. 3.  
 Chemn. loc. cit. fig. 1197.  
 Long. 11 lin. lat. 1 poll. 1 lin.
- 1157 H. nem. testa *ex rufescente lutea*, cingulis spadicels. 4.  
 Chemn. loc. cit. fig. 1198.  
 Long. 11 lin. lat. 1 poll.
- 1158 H. nem. testa *glauea*, *absque fasciis*. Spec. multa.  
 Long. 10 lin. lat. 1 poll.

### *Helix hortensis Müller.*

- a Bornii test. mus. Vindob. pag. 385. Tab. XVI. fig. 18. 19.
- 1159 H. hort. testa *purpuroscens*, cingulis albidis.  
 Chemn. Konch. Kab. T. 9. tab. 133. fig. 1200.  
 Long. 8 lin. lat. 10 lin.
- 1160 H. hort. testa *lutea fasciis permultis badiis cincta*. 3.  
 Chemn. loc. cit. fig. 1201.  
 Long. 9 lin. lat. 9 lin.
- 1161 H. hort. testa *lutea extus unicolor*, *apertura ut et labio utroque lacteis*. Spec. multa.  
 Long. 9 lin. lat. 11 lin.

### \*\*\*\*\* *Turritae.*

#### *Helix decollata.*

- Linn. S. N. Gen. 328. Sp. 695.  
 a Bornii test. mus. Vind. pag. 388.
- 1162 H. dec. testa *glauea*, oblique substriata, anfractu quoato iam decollata. Afr.  
 Chemn. Konch. Kab. T. 9. tab. 136. fig. 1254. 55.  
 Long. 1 poll. lat. 5 lin.

#### *Helix detrita Müll.*

- 1163 H. detr. testa *glauea oblique substriata*, *anfractibus 7 convexiusculis*, *umbilico parvulo*. Spec. permulta.  
 Chemn. Konch. Kab. T. 9. tab. 134. fig. 1225. Litt. c. d.  
 Long. 1 poll. 1 lin. lat. 4 lin.
- Not.* Num H. decollata forsitan testa adulta sit huius?  
 Simillima enim est ipsa huic, nisi apicem decollatum  
 et umbilicum parvum respicias. Apex autem testae  
 tam fragilis, facillime variis ab eventibus destrui poterat;  
 et umbilicum in testis adultioribus, labio saepius  
 absconditum esse, quis est qui nesciat? Ita fortasse  
 aenigma H. decollatae explicatum foret.

*Helix*

*Helix ottona.*

Linn. S. N. Gen. 328. Sp. 698.

- 1164 H. oct. testa albida, infimo anfractu fusco annulata.  
Ind. Occ. 2.

Chemn. Konch. Kab. T. 9. tab. 136. fig. 1264.

Long. 8 lin. lat. 2 lin.

## \*\*\*\*\* Ovatae imperforatae.

*Helix stagnalis.*

Linn. S. N. Gen. 328. Sp. 703.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 391. Tab. XVI. fig. 16.

- 1165 H. st. testa glauca, pellucida, longitudinaliter tenuissime striata, labio subbiplicato. Europ. Spec. multa.

Chemn. Konch. Kab. T. 9. tab. 135. fig. 1237. 38.

Long. 1 poll. 10 lin. lat. 10 lin.

- 1166 H. st. testa minus ventricosa, anfractu infimo oblique fasciato. 3.

Chemn. loc. cit. fig. 1239. 40.

Long. 1 poll. 2 lin. lat. 7 lin.

*Helix tentaculata.*

Linn. S. N. Gen. 328. Sp. 707.

- 1167 H. tent. testa cortice scabro tecta, animali adhuc inhabitante. Sp. multa.

Chemn. Konch. Kab. T. 9. tab. 135. fig. 1245.

Long. 5 lin. lat. 3 lin.

*Helix Auricularia.*

Linn. S. N. Gen. 328. Sp. 708.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 392.

- 1168 H. Aur. testa flavescens, ventricosa, anfractibus quatuor, columella plicata. 3.

Chemn. Konch. Kab. T. 9. tab. 135. fig. 1341. 42.

Long. 1 poll. lat. 11 lin.

*Helix Haliotoidea.*

Linn. S. N. Gen. 328. Sp. 713.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 393.

- 1169 H. Hal. testa subauriformis, transversim tuberculata-muricata, et extus et intus margaritacea. Mar. rubr.

Chemn. Konch. Kab. T. 10. tab. Sppl. 166. fig. 1600.

Long. 10 lin. lat. 8 lin.

## NERITA.

## \*Umbilicatae,

*Nerites Caurens.*

- Linn. S. N. Gen. 329. Sp. 715.  
a Bornii test. mus. Vind. pag. 396.
- 1170 N. C. testa laevissima, flavescentia, pallide atque undatim ferrugineo fasciata, apertura violacea. Ind. Occ.  
Chemn. Konch. Kab. T. 5, tab. 186. fig. 1860. 61.  
Long. 1 poll. 6 lin. lat. 1 poll. 4 lin.
- 1171 N. C. testa lactea, subferrugineo undatum fasciata. 2.  
Long. 1 poll. 5 lin. lat. 1 poll.
- 1172 N. C. testa albida, maculis ex violaceo ferrugineis permultis adspersa,  
Long. 1 poll. 2 lin. lat. 1 poll. 1 lin.
- 1173 N. C. testa albida, lineis undulatis obliquis rufescensibus, intus translutescentibus.  
Chemn. loc. cit. fig. 1864. 65.  
Long. 1 poll. 1 lin. lat. 1 poll. 4 lin.
- 1174 N. C. testa albida ferrugineo quadrifariam tessellata.  
Chemn. loc. cit. fig. 1871. fere.  
Long. 9 lin. lat. 7 lin.
- 1175 N. C. testa lactea, seriebus quinque macularum badiarum, quarum media tenet minores.  
Chemn. loc. cit. fig. 1887. 88.  
Long. 1 poll. lat. 10 lin.
- 1176 N. C. testa subflavescentia unicolor; apertura lunaris,  
labio utroque lacteo, fauce ferruginea,  
Long. 1 poll. 2 lin. lat. 1 poll.

*Nerita punctata Chemnitzi.*

- 1177 N. p. testa albida ferrugineo seriatim punctata; apertura subovalis, fauce violacea.  
Chemn. Konch. Kab. T. 5, tab. 186. fig. 1862. 63.  
Long. 1 poll. 5 lin. lat. 1 poll. 2 lin.
- Not.* Hanc Ner. potius ob spiram multo magis prominentem, quam propter colorem differentem, qui varietates tantum ac Individua determinat, cum Cel. Chemnitzio ad singularem retulit speciem.

*Nerita glauca.*

Linn. S. N. Gen. 329. Sp. 716.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 397. Tab. XIII. fig. 20. 21.

1178 N.

1178 N. gl. testa superne glauca subtus albida, oblique striata.  
Tranqueb. 3.

Chemn. Konch. Kab. T. 5. tab. 186. fig. 1856. 57.  
Long. 2 poll. lat. 1 poll. 10 lin.

1179 N. gl. testa *rufescens*, innior, semipellucida, 2.

Chemn. loc. cit. fig. 1859.

Long. 1 poll. 3 lin. lat. 1 poll. 4 lin.

1180 N. gl. testa *nigra*, duobus tantum superne ocellis albidis; labium *cinerascens*. 2.

Long. 1 poll. 4 lin. lat. 1 poll. 5 lin.

1181 N. gl. testa *pulla*, pallida, maculis ferrugineis; umbilicus nondum perfecte semiclausus, nec labium iam distincte bifidum. Spec. multa.

Long. 7 lin. lat. 9 lin.

### *Nerita rufa.*

a Bornii test. mus. Vind. pag. 398.

1182 N. ruf. testa spadicea, fasciis 2 albidis anteice et postice cincta; umbilico labioque fuso. Inf. Maurit. 5.

Chemn. Konch. Kab. T. 5. tab. 187. fig. 1874. 75.

Long. 10 lin. lat. 1 poll.

### *Nerita Vitellus.*

Linn. S. N. Gen. 329. Sp. 717.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 398.

1183 N. Vit. testa aurantia, fasciis 2 albidis undatis, umbilico subcordato; labium ex albido subviolaceum. Ind. Occ.

Chemn. Konch. Kab. T. 5. tab. 186. fig. 1866. 67.

Long. 1 poll. 5 lin. lat. 1 poll. 7 lin.

### *Nerita Zikzak Chemn.*

1184 N. Z. testa albida lineis ex fusco-ferrugineis angulata, umbilico pervio albidoque. Oc. Afric. Spec. multa.

Chemn. Konch. Kab. T. 5. tab. 187. fig. 1881. 82.

Long. 1 poll. lat. 1 poll. 2 lin.

### *Nerita pellis tigrina.*

1185 N. p. tig. testa albida, purpurascenti transversim maculata, umbilico subpervio. Tranqueb. 2.

Chemn. Konch. Kab. T. 5. tab. 187. fig. 1892. 93.

Long. 1 poll. lat. 10 lin.

*Nerita globosa Chemn.*

1186 N. gl. testa *albida*, *fasciis 3 rufescensibus transverse circumcincta*, longitudinaliter tenuissime striata globifor-  
mis, solida, neq; laevis. Tranq. 2.

Chemn. Konch. Kab. T. 5. tab. 188. fig. 1896. 97.

Long. 1 poll. 9 lin. lat. 1 poll. 8 lin.

1187 N. gl. testa *iunior*, *diaphana*, postice umbilicum ver-  
sus, *macula rosea* notata.

Long. 1 poll. 2 lin. lat. 1 poll. 2 lin.

1188 N. gl. testa *glaucia*, *absque fasciis*, *anfractibus perdi-  
scitatis*. 2.

Long. 1 poll. 7 lin. lat. 1 poll. 4 lin.

*Nerita rufescente varia.*

1189 N. r. var. testa albida e ferrugineo rufescente reti-  
culata, umbilico patentissimo. Spec. multa.

Chemn. Konch. Kab. T. 5. tab. 188. fig. 1900. 1.

Long. 8 lin. lat. 8 lin.

*Nerita Chrysoftomus.*

1190 N. Chr. testa ovata laevis, solida, subumbilicata, in  
fundo albido striis tenuissimis exangulatis, punctisque san-  
guineis notata, anfractibus quinque disiunctis convexis,  
infimo maximo; apertura obovata, *aurantia*, labro in-  
tegro, labio gibbo adnato, umbilico prorsus fere ab hoc  
clauso. Ex Oc. Asiat. 3. †).

Long. 10 lin. lat. 9 lin.

*Not.* N. haec praecedenti paullulum similis, sed ab ea dif-  
fert; *apertura*, *umbilico* et *apice minus prominente*,  
ut manifestum est.

*Nerita adusta Chemn.*

1192 N. ad. testa pallida, decolor, labio fusco. Tranq.  
Chemn. Konch. Kab. T. 5. tab. 189. fig. 1926. 27.  
Long. 1 poll. 5 lin. lat. 1 poll. 2 lin.

*Nerita Mammilla.*

Linn. S. N. Gen. 329. Sp. 719.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 399.

1193 N. M. testa *lattea*, umbilico *subperforato*. Tranq. 3.  
Chemn. Konch. Kab. T. 5. tab. 189. fig. 1930. 31.  
Long. 1 poll. 7 lin. lat. 1 poll. 2 lin.

1194 N.

†) v. Tab. Helmintholog. fig. 7.

1194 N. M. testa brevior, umbilico vix conspicuo, prorsus fere obtecto. 2.

Chemn. loc. cit. fig. 1928. 29.

Long. 1 poll. 2 lin. lat. 10 lin.

\*\* Imperforatae labio edentulo,

*Nerita Radula.*

Linn. S. N. Gen. 329. Sp. 721.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 400. T. XVII. f. 7. 8.

1195 N. R. testa albida unicolor, sulcata; labium maxime evacuatum. Ind. Or.

Chemn. Konch. Kab. T. 5. tab. 190. fig. 19+6. 47.

Long. 1 poll. 8 lin. lat. 1 poll. 2 lin.

1196 N. R. testa albida, fauce ferruginea.

Long. 1 poll. 1 lin. lat. 1 poll. 3 lin.

*Nerita cornea.*

Linn. S. N. Gen. 329. Sp. 722.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 401.

1197 N. c. testa fragilis, diaphana fasciis alternis atris flavisque obliqua. Ind. Or. 2.

Chemn. Konch. Kab. T. 9. tab. 124. fig. 1080?

Long. 10 lin. lat. 11 lin.

1198 N. c. testa atra lineis angustis ferrugineis oblique exangulata; labium tenuissime dentatum.

Long. 9 lin. lat. 8 lin.

1199 N. c. testa atra, fasciis 2 flavescentibus transversis, punctisque multis, ejusdem coloris, varia. 2.

Long. 11 lin. lat. 1 poll.

1200 N. c. testa ex fusco - atra, fascia una flavescenti vittata, lineolis multis tenuissimis flavescentibus angulata.

Long. 11 lin. lat. 1 poll.

1201 N. c. testa ex atro - fusca, flavescenti punctata, absque fasciis.

Long. 7 lin. lat. 7 lin.

1202 N. c. testa flava, fasciis 2 undulatis per atris vittata. 2.

Long. 9 lin. lat. 9 lin.

*Nerita fluviatilis.*

Linn. S. N. Gen. 329. Sp. 723.

1203 N. fl. testa rugosa, viridis; apertura ovata, labio utroque albido, fauce cinerafcente, Europ. Spec. multa.

Long. 7 lin. lat. 7 lin.

*Nerita*

*Nerita littoralis.*

Linn. S. N. Gen. 329. Sp. 724.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 401.

1204 N. litt. testa laevis *subpurpurascens*, albo punctata, fasciis 2 latis albido cincta, vertice carioso. Ind. Occ.

Chemn. Konch. Kab. T. 9. tab. 124. fig. 1086;

Long. 7 lin. lat. 7 lin.

*Not.* Differentia patriae quam Linn. adlegavit ab hac specie nostr. nil mutat in determinanda specie, quia Linn. immortalis unumquamque patriam uniuseujusque Individui profecto scire non poterat: miror itaque Cel. Chemnitz. *patriae causa* hanc concham et sequentem nolle, ad littoralem Linn. referre.

1205 N. litt. testa purpurea maculis albis adspersa, absque fasciis; fragilis, subpellucida; apertura lunaris, labio explanato albido. 2.

Long. 6 lin. lat. 9 lin.

1206 N. litt. testa splendidissime purpurea, striis luteis seriatim ordinatis, varia.

Long. 6 lin. lat. 5 lin.

\*\*\* Imperforatae labio dentato,

*Nerita pulligera.*

Linn. S. N. Gen. 329. Sp. 726.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 402. Tab. XVII. f. 9. 10.

1207 N. pull. testa fusca, epidermide testa, apertura lunata; fauce pone labrum fascia falciformi incarnata, labio haud angusto corneo. Ind. Orient.

Chemn. Konch. Kab. T. 9. tab. 124. fig. 1078. 79.

Long. 1 poll. 1 lin. lat. 1 poll. 6 lin.

*Nerita virginea.*

Linn. S. N. Gen. 329. Sp. 730.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 404.

1208 N. virg. testa ex albo nigroque undulata, fasciis albis obliquis interrupta; labri interioris margo, ubi illud ad testam adnatum, flavus. Ind. Occ.

Chemn. Konch. Kab. T. 9. tab. 124. fig. 1088.

Nerita fluviat. Ind. Occident.

Long. 5, 5 lin. lat. 6, 5 lin.

*Not.* Hanc et sequentes hujus speciei varietates, labris gibbi et denticulati causa huc cum b. Linn. retuli, nec ipsas

Ipsas cum Cel. *Chemn.* ad singularem speciem referre queo, cum nulla, praeter patriam, adest ratio, determinaciones ac Systema Linnaei hac in re negligendi. — Errorem Perill. a Bornii hac in specie Cel. *Chemn.* jam-jam loc. cit. pag. 308. emendavit.

- 1209 N. virg. testa ex albo nigroque tenuissime undulata, *maculisque lutescentibus* variegata. 4.  
Long. 5 lin. lat. 6, 5 lin.

- 1210 N. virg. testa albida *fasciis purpureis* obliquis varia; animalculo inhabitante. 5.  
*Chemn.* loc. cit. fig. 1088. Litt. b.  
Long. 3 lin. lat. 4 lin.

- 1211 N. virg. testa albida fasciis obliquis purpureis, cingulo medio *albido transversim interruptis*. 6.  
Long. 4 lin. lat. 5 lin.

- 1212 N. virg. testa *purpurea*, maculis albis subcordatis absque fasciis. 6.  
Long. 3 lin. lat. 4 lin.

- 1213 N. v. testa *rufescens*, maculis pallidis cordatis minutissimis atque frequentissimis.

### *Nerita polita.*

Linn. S. N. Gen. 329. Sp. 731.  
a Bornii test. mus. Vind. pag. 405.

- 1214 N. pol. testa *laevis*, albido *cinereoque* undulata; labrum intus crenulatum, labium gibbum dentatum, dentibus 3 distinctioribus. Ind. Or. 2.  
*Chemn.* Konch. Kab. T. 5. tab. 193. fig. 2001.  
Long. 10 lin. lat. 1 poll. 1 lin.

- 1215 N. pol. testa *albida*, cinerascente undata, *sanguineo trifariam* fasciata; apertura lunata, fauce citrinella. Inf. Molukk. 3.  
*Chemn.* loc. cit. fig. 2002. 3.  
Long. 8 lin. lat. 1 poll.

- 1216 N. pol. testa *ex flavescente rufescens* alboque undata; labium utrumque, ut antecedentis, niveum; fauce citrinella. 2.  
Long. 9 lin. lat. 1 poll.

### *Nerita Peloronta.*

Linn. S. N. Gen. 329. Sp. 732.  
a Bornii test. mus. Vind. pag. 406.

1217 N.

- 1217 N. P. testa pallida striis transversis purpurascientibus, labio albido dentato, *croceo maculato*; apertura operculo clausa. Oc. Asiat. 2.  
 Chemn. Konch. Kab. T. 5. tab. 192. fig. 1977.  
 Long. 9 lin. lat. 11 lin.
- 1218 N. P. testa *profundius striata*, albido purpurasciente longitudinaliter undata; labio utroque denticulato, exteriori antice postice *denticulo solitario interiori* dentibus 2 in medio, armatis; apertura etiam operculo clausa,  
 Chemn. loc. cit. fig. 1978. 79.  
 Long. 10 lin. lat. 1 poll. 1 lin.

*Nerita Albicila.*

- Linn. S. N. Gen. 329. Sp. 733.  
 a Bornii test. mus. Vind. pag. 406.
- 1219 N. Alb. testa transversim striata, *ex olivaceo alboque undata*; labium utrinque denticulatum, interius denticulis 4 ad marginem armatum. Cap. b. Sp.  
 Chemn. Konch. Kab. T. 5. tab. 193. fig. 2001, litt. c.  
 Long. 7 lin. lat. 10, 5 lin.
- 1220 N. Alb. testa decolor; labium utrumque subdentatum. 5.  
 Long. 7 lin. lat. 10 lin.

*Nerita Hiftrio?*

- Linn. S. N. Gen. 329. Sp. 734.
- 1221 N. H. testa oblique subsulcata, *ex albo nigroque varia, nigro trifariam fasciata*; apertura lactea, fauce citrinella; labium dentibus 4 haud obsoletis armatum. Ind. Orient. 2.  
 Chemn. Konch. Kab. T. 5. tab. 190. fig. 1948. 49.  
 Long. 1 poll. lat. 1 poll. 4 lin.
- 1222 N. H. testa ex albido virescentique varia, antice fascia albida late et transversim vittata; labrum interne crenulatum, labium gibbum, dentibus 3 marginalibus munitum.  
 Long. 1 poll. lat. 1 poll. 5 lin.
- 1223 N. H. testa transversim sulcata, *ex albido viridique undulata*; labrum integerrimum, labium rugosum, apertura albida.  
 Long. 1 poll. 1 lin. lat. 1 poll. 6 lin.

*Nerita nigerrima* Chemn.

- 1224 N. nig. testa atra, leviter striata; apertura lactea, obovata; labium luteo maculatum, subrugosum. Ind. Occ. 2.  
 Chemn. Konch. Kab. T. 5. tab. 192. fig. 1985. 86.  
 Long. 10 lin. lat. 1 poll. 1 lin.

1224b N.

1224b N. nig. varietas cuius testa ex cinerascente nigra, labrum margine interno crenulatum, antice posticeque dente munitum.

Chemn. loc. cit. fig. 1987?

Long. 8 lin. lat. 10, 5 lin.

*Nerita Pica Chemn.*

1225 N. P. testa alba atro undata; apertura lunata, denticulata: labrum dentibus 12, extimis validioribus, labium 4 marginalibus, mediis solidissimis, armatum. Ind. Or. 3, Chemn. Konch. Kab. T. 5. tab. 190. f. 1964. 65.

Long. 7, 5 lin. lat. 11 lin.

*Nerita tessellata Chemn.*

1226 N. tess. testa transverse sulcata ex albo atroque tessellata; labrum interne crenulatum, antice et postice denticulis 2, labium planiusculum punctis elevatis et denticulis marginalibus minimis munitum. Ind. Occ. 7.

Chemn. Konch. Kab. T. 5. tab. 192. fig. 1998. 99.

Long. 6 lin. lat. 7, 5 lin.

*Nerita plicata.*

Linn. S. N. Gen. 329. Sp. 735.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 407. Tab. XVII. f. 17. 18.

1227 N. pl. testa alba, transversim sulcata; spira flavescens; labri margo interior dentibus quinque extimis solidioribus, armatum, labium rugosum dentibus 3, lateralibus compressis, munitum. Tranqueb.

Chemn. Konch. Kab. T. 5. tab. 190. f. 1952. 53.

Long. 9 lin. lat. 11 lin.

1228 N. pl. testa colore anteced. immaculata, labrum margine iteriori dentibus otto, extimis validioribus, labium ut in praecedenti, armatum.

Magnitudo praeced.

1229 N. pl. testa pallide rufescens; labrum margine interiori dentibus 6 ornatum.

Long. 8 lin. lat. 9 lin.

*Nerita Chamäleon.*

Linn. S. N. Gen. 329. Sp. 737.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 408.

1230 N. Ch. testa pallida virenscentique undulata, sulcata; apertura lactea dentata; labrum margine interiori dentibus

**bus 12** mediis compressis, extimis acutiusculis, labium dentibus 4 marginalibus armatum. Ind. Or. 5.

Chemn. Konch. Kab. T. 5. tab. 192. f. 1988. 89.

Long. 9 lin. lat. 11, 5 lin.

**1231** N. Ch. testa transversim sulcata, varia, rugis 2 mediis unaque antice et postice fulvis; labrum obsolete denticulatum, labium antecedentis.

Long. 6 lin. lat. 8 lin.

*Nerita variegata Chemn.*

**1232** N. var. testa sulcata albida, nigro rufoque varia, apertura N. Picae. Ind. Occ. 3.

Chemn. Konch. Kab. T. 5. tab. 194. fig. 1962. 63.

Long. 7 lin. lat. 9, 5 lin.

*Not.* Num forsan N. Picae varietas?

*Nerita undata.*

Linn. S. N. Gen. 329. Sp. 738.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 408.

**1233** N. und. testa albida ex fusco viridique undata; apertura lactea immaculata dentata; labrum margine interiori denticulatum, dentibus duobus anticis validioribus. Ind. Or. 3.

Chemn. Konch. Kab. T. 5. tab. 190. fig. 1950. 51.

Long. 10 lin. lat. 1 poll. 1 lin.

**1234** N. und. testa ex pallido nigroque undata, antecedente solidiori, unde labium utrumque distinctius denticulatum. 2.

Long. 9 lin. lat. 1 poll. 1 lin.

*Nerita Exuvia.*

Linn. S. N. Gen. 329. Sp. 739.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 409.

**1235** N. E. testa profunde sulcata, sulcis 15 fuscis immaculatis; labrum externe crenulatum, interne dentatum, dentibus 8 munitum; labium tuberculatum, dentibus marginalibus compressis munitum. Ind. Or.

Chemn. Konch. Kab. T. 5. tab. 191. fig. 1972. 73.

Long. 7 lin. lat. 8, 5 lin.

*Nerita reticulata.*

**1236** N. ret. testa ovata, transversimi profunde sulcata, longitudinaliter striata, striis exaratis tenuissimis et quam maxime adproximatis, unde facies retibus minutissimis

com-

composita, quin imo cancellata fere; apertura obovata denticulata; labrum margine exteriori, subplicatum, interiori denticulatum dentibus obsolete compressis 12 labium rugosum, dentibus 2 marginalibus vix conspicuis munitum. Color albido, fasciis longitudinalibus exangulatis rufescens. Patria ignota. †) 2.

Long. 6 lin. lat. 7 lin.

### HALIOTIS.

#### *Haliotis Midae.*

Linn. S. N. Gen. 330. Sp. 740.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 41t.

- 1241 H. M. testa externe rugis obliquis subincarnatis tecta, foraminibus septem perviis. Ind. Or.

Martini Konch. Kab. T. 1. tab. 14. fig. 136. tab. 15. f. 141.

Long. 3 poll. 7 lin. lat. 3 poll. 4 lin.

#### *Haliotis Iridis Chemn.*

- 1242 H. Ir. testa externe rugosa, sed cortice foliaceo jam destruta, margine maxime elevato; foraminibus 5 perviis. Zeel. nov.

Chemn. Konch. Kab. T. 10. tab. Suppl. 167. fig. 1612. 13.

Long. 5 poll. lat. 4 poll.

#### *Haliotis tuberculata.*

Linn. S. N. Gen. 330. Sp. 741.

- 1243 H. tub. testa virescens, maculis fusco, transversim tuberculato-nodosa. Europ. 2.

Martini Konch. Kab. T. 1. tab. 16. fig. 146.

Long. 2 poll. lat. 1 poll. 4 lin.

- 1244 H. tub. testa pallida fusco maculata, foraminibus modo quatuor perviis. 2.

Long. 1 poll. 8 lin. lat. 1 poll. 2 lin.

#### *Haliotis plicata Chemn.*

- 1245 H. pl. testa rufescens oblique plicata, transversim rugosa; interne plicae externae conspicuae. Zeel. nov.

Chemn. Konch. Kab. T. 10. tab. Suppl. 166. fig. 1603. 4.

Long. 3 poll. lat. 2 poll. 1 lin.

Not. Margo anterior paullulum destructus.

1246 H,

†) vid. Tab. Helmintholog. fig. 8.

- 1246 H. pl. testa *per profunde et oblique plicata*, rugosa, extus olivacea, intus margaritacea, foraminibus 5 perviis. 2.  
Long. 1 poll. 10 lin. lat. 1 poll. 3 lin.

*Haliotis striata.*

Linn. S. N. Gen. 330. Sp. 742.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 411.

- 1247 H. str. testa *ferruginea extus rugoso-striata*, foraminibus perviis septem, sed septimum incremento novissimo ortum esse distinctissime patet. Oc. Asiat.

Martini Konch. Kab. T. 1. tab. 14. fig. 138.

Long. 3 poll. 6 lin. lat. 2 poll. 5 lin.

- 1248 H. str. testa *purpuraeflens unicolor*, margine laterali perlati, foraminibus 5 perviis. 2.

Long. 2 poll. 10 lin. lat. 2 poll.

*Haliotis varia.*

Linn. S. N. Gen. 330. Sp. 743.

- 1249 H. v. testa longitudinaliter tuberculato-striata, viridis; margine antico paullulum destructa. Ind. Or.

Martini Konch. Kab. T. 1. tab. 15. fig. 144.

Long. 1 poll. 8 lin. lat. 1 poll. 5 lin.

*Haliotis marmorata.*

Linn. S. N. Gen. 330. Sp. 744.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 412.

- 1250 H. m. testa ferruginea *ex albo viridique maculata*, foraminibus quinque perviis. Afric. 2.

Martini Konch. Kab. T. 1. tab. 14. fig. 139.

Long. 2 poll. 3 lin. lat. 1 poll. 5 lin.

- 1251 H. m. testa ferruginea, *macula solitaria alba*; foraminibus sex perviis.

Long. 1 poll. 11 lin. lat. 1 poll. 5 lin.

- 1252 H. m. varietas singularis et forsitan monstrosa dicenda: nam testa *ex fusco, ferrugineo alboque varia*, foraminibus quinque perviis marginalibus, *et duobus vicinis pone apicem majoribus*.

Long. 1 poll. 9 lin. lat. 1 poll. 2 lin.

Not. An haec foramina ab incola aut hoste perforata sint?

*Haliotis Afinina.*

Linn. S. N. Gen. 330. Sp. 745.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 412.

1253 H. af. testa extus tenuissime *filiata*, pulcherrime picta, foraminibus perviis sex. Ind. Or. 2.

Martini Konch. Kab. T. I. tab. 16. fig. 150.

Long. 3 poll. lat. 1 poll. 5 lin.

1254 H. af. testa et extus et intus splendidissime margaritacea, foraminibus septem perviis.

Long. 3 poll. 6 lin. lat. 1 poll. 6 lin.

### *Haliotis parva.*

Linn. S. N. Gen. 330. Sp. 746.

1255 H. p. testa *crocea* transversim costata, foraminibus 6 vix perviis. Afr.

Martini Konch. Kab. T. I. tab. 14. fig. 140.

Long. 11 lin. lat. 8 lin.

1256 H. p. testa *purpurascens* transversim costata; limo marino partim testa. 2.

Long. 1 poll. 4 lin. lat. 11 lin.

1257 H. p. testa *minima lutea*, maculis rubris varia, foraminibus 5 perviis.

Martini loc. cit. fig. 137.

Long. 7 lin. lat. 5 lin.

### PATELLA.

\* Labiatae s. labio interno instructae.

#### *Patella equestris.*

Linn. S. N. Gen. 331. Sp. 747.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 415.

1258 P. eq. testa albida immaculata, longitudinaliter *filiata*, subuplicata. Ind. Occ. Amerie.

Martini Konch. Kab. T. I. tab. 13. f. 117. 118.

Long. 1 poll. lat. 1 poll.

1259 P. eq. testa lamellata, *subconica*. Inf. Batav.

Martini loc. cit. fig. 125. 126.

Long. 7 lin. lat. 6 lin.

#### *Patella Neritoidea.*

Linn. S. N. Gen. 331. Sp. 748.

1260 P. Ner. testa *pallida rugosa*, labio postico concavo, laetio immaculato. M. Meditarr.

Martini Konch. Kab. T. I. tab. 13, fig. 119. 120.

Long. 11 lin. lat. 10 lin.

*Patella porcellana.*

Linn. S. N. Gen. 331. Sp. 750.

- 1261 P. porc. testa *subferruginea*, labio postico *plano*, *lacteo* et *immaculato*.

Long. 9 lin. lat. 6 lin.

- 1262 P. porc. testa *convexior pallida*, fascia longitudinali *alba*, *ferrugineo marginata*, labio postico *plano*.

Long. 10 lin. lat. 6 lin.

- 1263 P. porc. testa *pallida ferrugineo longitudinaliter frequenter striata*, transverse sulcata; labio postico *convexo*. M. Mediterr.

Martini Konch. Kab. T. I. tab. 13. fig. 129. 30.

Long. 1 poll. 1 lin. lat. 8 lin.

- 1264 P. porc. testa *pallida*, *rufescens gibbosior*, labio *concavo*.

Long. 9 lin. lat. 6 lin.

\*\* Dentatae basi s. margine angulatae.

*Patella Crepidula.*

Linn. S. N. Gen. 331. Sp. 752.

- 1265 P. Cr. testa planiuscula, tristis *immaculata*, intus antice *fusca*, postice, labio convexiusculo, munita.

Martini Konch. Kab. T. I. tab. 13. fig. 127. 28.

Long. 9 lin. lat. 7 lin.

*Patella saccharina.*

Linn. S. N. Gen. 331. Sp. 754.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 416.

- 1266 P. sach. testa angulata, costis 8 virescentibus. Americ.

Martini Konch. Kab. T. I. tab. 9. fig. 76.

Long. 1 poll. lat. 8 lin.

*Patella barbara.*

Linn. S. N. Gen. 331. Sp. 755.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 417.

- 1267 P. barb. testa *angulata*, dentata albida, disco *fulvo circuca* verticem.

Martini Konch. Kab. T. I. tab. 10. fig. 85. A. B.

Long. 2 poll. lat. 1 poll. 9 lin.

- 1268 P. barb. testa *dentata*, costata, costis 19 majoribus fornicate muricatis, interpositis totidem *minus elevatis*, margine costarum subferrugineo. 2.  
Long. 2 poll. 1 lin. lat. 1 poll. 6 lin.

*Patella plicata Bornii.*

- a Bornii test. mus. Vind. pag. 417. Tab. XVIII. f. 1.  
1269 P. pl. testa angulata costata, ovata, albida; margine denticulato, dentibus obsoletis, vertice detrito, dia- phana.  
Long. 2 poll. 6 lin. lat. 1 poll. 10 lin.  
1270 P. pl. testa ex ferrugineo rufa, vertice albido.  
Long. 1 poll. 5 lin. lat. 1 poll.

*Patella granularis.*

- Linn. S. N. Gen. 331. Sp. 756.  
a Bornii test. mus. Vind. pag. 418.

- 1271 P. gran. testa pallide virescens fusco variegata, *vertice*, *fundoque* sub centro ferrugineis. Ind. Occ. 5.  
Martini Konch. Kab. T. 1. tab. 9. fig. 72.  
Long. 2 poll. 5 lin. lat. 2 poll. 3 lin.  
1272 P. gr. testa gibbosior, pictura antecedentis, *margo au-*  
*tem obsolete dentatus*.  
Long. 2 poll. 1 lin. lat. 1 poll. 3 lin.

*Patella granatina.*

- Linn. S. N. Gen. 331. Sp. 757.  
a Bornii test. mus. Vind. pag. 419.

- 1273 P. gr. testa convexa, extus nebulose ferruginea, striis 50 elevatis angulatis atque imbricatis; intus albida, *margine fuso*. Cap. b. Sp.  
Martini Konch. Kab. T. 1. tab. 8. fig. 61.  
Long. 1 poll. 5 lin. lat. 1 poll. 2 lin.  
1274 P. gr. testa *planiuscula*, angulato striata ac imbrica- ta. 4.  
Long. 1 poll. 3 lin. lat. 11 lin.

*Not.* In determinandis speciebus P. *granular*. ac *granat*. plane Perill. a Bornium secuti sumus; nam b. Mart. errantem ad P. *granularem*, *granatinam*, et vice versa, retulisse patet.

*Patella Cochlear Bornii.*

- a Bornii test. mus. Vind. pag. 420. Tab. XVIII. f. 3.
- 1275 P. C. testa ovata postice valde attenuata, striata, striae fuscis in fundo albido. 2.  
 Long. 1 poll. 3 lin. lat. 10 lin.  
*Not.* Cavitas in spec. nostro etiam est albida.
- 1276 P. C. testae dorsum conglomerato calcareo, serpulis inhabitato oneratum; fundus postice punctis quibusdam elevatis.  
 Long. 1 poll. 4 lin. lat. 1 poll.

*Patella vulgata.*

- Linn. S. N. Gen. 331. Sp. 758.
- 1277 P. v. testa ovata angulata, angulis validioribus et obsoletis alternis, ex ferrugineo fusca, vertice et cavitate pallidis. Oc. Europ. 3.  
 Long. 3 poll. 5 lin. lat. 3 lin.

*Patella Magellanica Mart.*

- 1278 P. Mag. testa ovalis, angulata, costata, costis rugosis radiatis, solida; subtus laetitia, cavitate cinerascente; vertex subcentralis; margo valide dentatus.  
 Martini Konch. Kab. T. I. tab. 8. fig. 66.  
 Long. 3 poll. lat. 2 poll. 7 lin.

\*\*\* Mucronatae, vertice acuminato recurvo,

*Patella antiquata.*

- Linn. S. N. Gen. 331. Sp. 762.
- 1279 P. ant. testa oblonga, subfulva, vertice postico valde recurvato. 2.  
 Long. 1 poll. lat. 9 lin.

*Patella Cartilaginensis Mart.*

- 1280 P. Carth. testa *ovata integra*, gibba, radiatim striata, punctis miniatis varia; vertex laevis albidusque.  
 Martini Konch. Kab. T. I. tab. 7. fig. 52.  
 Long. 1 poll. 6 lin. lat. 1 poll. 2 lin.
- 1281 P. Carth. testa *minus convexa tristis*, flavo varia. 2.  
 Long. 2 poll. 4 lin. lat. 1 poll. 9 lin.
- 1282 P. C. testa planiuscula, ovata, striata, *magis crenulata*, et punctis frequentioribus adspersa miniatis. 4.  
 Long. 1 poll. 11 lin. lat. 1 poll. 5 lin.

*Patella mammillaris.*

Linn. S. N. Gen. 331. Sp. 763.

a Born. test. mus. Vind. pag. 422.

1283 P. mamm. testa glauca, radiatim striata, intus flavescenti virescens, glaberrima. M. Mediterr. 2.

Martini Konch. Kab. T. I. tab. 7. fig. 58. 59.

Long. 1 poll. lat. 10 lin.

*Patella pedinata.*

Linn. S. N. Gen. 331. Sp. 765.

a Bornii test. mus. i Vind. pag. 423. Tab. XVIII. f. 7.

1284 P. p. testa *flavescentia*, imbricato-striata, striis atro notatis; vertex posticus. M. Mediterr.

Long. 1 poll. 3 lin. lat. 1 poll.

1285 P. p. testa *atra* fere unicolor, extus imbricato striata, intus laevissima atque flavescentia.

Long. 10 lin. lat. 7 lin.

\*\*\*\* Integerrimae absque vertice mucronato.

*Patella testudinaria.*

Linn. S. N. Gen. 331. Sp. 771.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 425.

1286 P. test. testa pallida *ex fusco undulatim reticulata*, vix striata, subtus margaritacea, cavitate *lactea*, margine integerrimo fusco. Ind. Or.

Martini Konch. Kab. T. I. tab. 6. fig. 45. 46.

Long. 2 poll. 9 lin. lat. 2 poll. 3 lin.

1287 P. test. testa *junior*, striata *extus decolor*, intus *lactea* nitens, cavitate virescente margine fusco. 4.

Long. 1 poll. 2 lin. lat. 1 poll.

*Patella compressa.*

Linn. S. N. Gen. 331. Sp. 772.

a Born. test. mus. Vind. pag. 426.

1288 P. c. testa *flavescentia* radiatim striata; vertex obtusus sub-lateralis. Ind. Or.

Long. 4 poll. 8 lin. lat. 2 poll.

1289 P. c. testa *subfulva*, striis radiatis *validioribus*; vertex omnino obtusus. 2.

Long. 2 poll. 8 lin. lat. 1 poll. 6 lin.

*Patella rustica.*

- Linn. S. N. Gen. 331, Sp. 773.  
 a Bornii test. mus. Vind. pag. 426. T. XVIII, fig. II.  
 1290 P. r. testa ferruginea in fundo albido radiata, subdia-  
 phana. Litt. Lusitan. 2.  
 Martini Konch. Kab. T. I. tab. 5. fig. 35. litt. a.  
 Long. 1 poll. lat. 9 lin.  
 1291 P. r. testa pone apicem valde detrita, pallidi fuscō ra-  
 diata. 2.  
 Martini loc. cit. fig. 35, c.  
 1292 Pr. r. testa conica, radiatim dense striata, extus limo  
 marino tecta. 2.  
 Martini loc. cit. fig. 36. litt. a.  
 Long. 10 lin. lat. 8 lin.  
 1293 P. r. testa convexa, albo fuscoque alternatim radiata;  
 cavitas fulvula.  
 Long. 1 poll. 7 lin. lat. 1 poll. 4 lin.  
 1294 P. r. testa extus ferruginea, fascia alba orbiculari circa  
 verticem, intus albida; cavitate ferruginea.  
 Long. 1 poll. 3 lin. lat. 11 lin.

*Patella anomala Müller.*

- Zool. Dan. Prodr. pag. 237. nr. 2870.  
 1295 P. an. testa parva ovata, subpellucida, glauca, rubella  
 radiata, animalculo inhabitante.  
 Long. 4 lin. lat. 3 lin.

*Patella virginea Müller.*

- Zool. Dan. Prodr. pag. 237. nr. 2867.  
 1296 P. virg. testa ex fuscō ferraginez, subquadrangularis,  
 Long. 6 lin. lat. 5, 5 lin.

## \*\*\*\*\* Perforatae vertice.

*Patella Pustula.*

- Linn. S. N. Gen. 331. Sp. 779.  
 1297 P. Pust. testa lutescens, ovalis striato-reticulata; mar-  
 go distincte crenulatus; vertex foramine ovali. M. Me-  
 diterr.  
 Long. 11 lin. lat. 7 lin.  
 1298 P. Pust. testa albida, convexa striato-reticulata, margi-  
 ne integro.  
 Long. 6 lin. lat. 4 lin.

*Patella*

*Patella graeca.*

- Linn. S. N. Gen. 331. Sp. 780.  
a Bornii test. mus. Vind. pag. 428.
- 1299 P. gr. *testa radiatim atque imbricato-fulcata*, palida; foramen verticis suborbicularare. M. Mediterr. Martini Konch. Kab. T. I. tab. 4, fig. 100.  
Long. 1 poll. 5 lin. lat. 11 lin.
- 1300 P. gr. *testa*, dorso, *limo marino undique fere tecto*.  
Long. 1 poll. 2 lin. lat. 10 lin.
- 1301 P. gr. *testa rufescens nodoso-fulcata et intus radiatim fulcata*.  
Long. 1 poll. 1 lin. lat. 9 lin.
- 1302 P. gr. *testa gibbosior*, validissime fulcata.  
Long. 1 poll. lat. 9 lin.

*Not.* Ad Pat. Nodosam Bornii forsitan referri potuisset.

*Patella nimboſa.*

- Linn. S. N. Gen. 331. Sp. 781.  
a Bornii test. mus. Vind. pag. 429.
- 1303 P. nimb. *testa ovata, rugosa, striata, purpurascens*; vertex ovato-perforatus. M. Mediterr. Martini Konch. Kab. T. I. tab. II. fig. 91. 92.  
Long. 1 poll. 1 lin. lat. 10 lin.
- 1304 P. nimb. *testa purpurascens, radiatim striata, striis duodecim distinctioribus*.  
Long. 1 poll. lat. 7 lin.
- 1305 P. nimb. *testa albida, rufescente striata, intus laevis lactea*, margine orbiculari haud angusto, viridi.  
Long. 1 poll. 2 lin. lat. 10 lin.
- 1306 P. nimb. *testa pallida, fusco radiata, obsolete striata*; vertex oblongo perforatus.  
Long. 1 poll. 4 lin. lat. 11 lin.
- 1307 P. nimb. *testa ovata, planiuscula, purpurascens, decussatim striata*, striis *tenuioribus frequentissimis*.  
Long. 1 poll. lat. 8 lin.
- Not.* Dorsum hujus Pat. serpulis multis vermicularibus oneratum.

## DENTALIUM.

*Dentalium Elephantinum.*

Linn. S. N. Gen. 332. Sp. 783.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 431.

1308 D. El. testa viridis, sulcata, sulcis 10 longitudinalibus, subdiaphana. M. Ind.

Martini Konch. Kab. T. 1. tab. 1. fig. 5. litt. A.  
Long. 4 poll. diam. 5 lin.

*Dentalium striatum Bornii.*

a Bornii test. mus. Vind. pag. 431.

1309 D. str. testa pallide virescens, apice valde acuminato.

Martini Konch. Kab. T. 1. tab. 1. fig. 5. B.  
Long. 2 poll. 3 lin. diam. 3 lin.

*Dentalium aprinum?*

Linn. S. N. Gen. 332. Sp. 784.

1310 D. apr. testa duodecim angulata, albida, absque striis; prossus opaca.

Long. 2 poll. 2 lin. diam. 4 lin.

*Dentalium Entalis.*

Linn. S. N. Gen. 332. Sp. 786.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 432.

1311 D. E. testa laevis, lactea immaculata. Mar. Ind. Or.

Martini Konch. Kab. T. 1. tab. 1. fig. 1.  
Long. 1 poll. diam. 2. 5 lin.

1312 D. E. testa alba, apice rufescens atque magis acuminata.

Martini loc. cit. fig. 2.

Long. 1 poll. 6 lin. diam. 2 lin.

*Dentalium politum.*

Linn. S. N. Gen. 332. Sp. 788.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 433.

1313 D. pol. testa lactea, annulis quibusdam flavescientibus confertim tenuissime striata.

Martini Konch. Kab. T. 1. tab. 1. fig. 3. A.

Long. 1 poll. 4 lin. diam. 2 lin.

## SERPULA.

*Serpula spirillum.*

Linn. S. N. Gen. 333. Sp. 793.

- 1314 S. sp. testa albida, minutissima, multis individuis fucum Pelagi inhabitat.

Martini Konch. Kab. T. I. tab. 3. fig. 20. inter C. et D.  
Diam. tubul. 0, 5 lin. vix.

*Serpula spirorbis.*

Linn. S. N. Gen. 333. Sp. 794.

- 1315 S. spir. testa spiralis cornea, anfractibus tribus canaliculatis, longitudinaliter striatis; solitaria,

Diam. 2, 5 lin.

- 1316 S. spir. quaedam testae se invicem aggregatae, unde minus regulariter orbiculatae adparent, ac praecedens.

Diam. 2 lin.

*Serpula contortuplicata.*

Linn. S. N. Gen. 333. Sp. 799.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 437.

- 1317 S. cont. tubuli permulti callo marino adunati.

Martini Konch. Kab. T. I. tab. 3. fig. 24. A.  
Diam. 1 lin.

*Serpula glomerata.*

Linn. S. N. Gen. 333. Sp. 800.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 437.

- 1318 S. gl. testa reticulatim striata, albida, cavitatem testae alius inhabitans.

Martini Konch. Kab. T. I. tab. 3. fig. 23.  
Diam. 1, 5 lin.

*Serpula arenaria.*

Linn. S. N. Gen. 333. Sp. 803.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 439.

- 1319 S. ar. testae nonnullae aggregatae, subtus tamen unicum formant planum. Ind. Or.

Martini Konch. Kab. T. I. tab. 3. fig. 19. C.  
Diam. 7 lin.

- 1320 S. ar. testa rufescens, solitaria, subtus paullulum destructa.  
Diam. 5 lin.

*Serpula anguina.*

Linn. S. N. Gen. 333. Sp. 804.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 440. Tab. XVIII. fig. 15.

1321 S.

1321 S. ang. testa albida, fissura longitudinali *subarticulata*.  
Martini Konch. Kab. T. I. tab. 2. fig. 13. B.  
Diam. 4, 5 lin.

1322 S. ang. testa albida, *fissata ac reticulata*.  
Diam. 6 lin.

*Not.* Quae varietas, Bornii S. *muricatae* valde adfinis  
nisi spinis prorsus careret.

*Serpula vermicularis.*

Linn. S. N. Gen. 333. Sp. 805.

1323 S. verm. testae permultae, vario modo flexuosa, ad se  
invicem adhaerentes.

Diam. 3 lin.

*Serpula intestinum bubulum Mart.*

1324 S. int. bub. testa parum flexuosa, rufa et opaca, valde  
decolor.

- Martini Konch. Kab. T. I. tab. 1. fig. II,  
Diam. intern. 4 lin.

*Serpula Penis.*

Linn. S. N. Gen. 333. Sp. 806.

a Bornii test. mus. Vind. pag. 441.

1325 S. P. testa albida, ad discum rectius, ad caudam extremam  
paullulum flexuosa.

Martini Konch. Kab. T. I. tab. 1. fig. 7.  
Long. 4 poll. 8 lin. diam. disci 1 poll.

TEREDO.

*Teredo navalis.*

Linn. S. N. Gen. 334. Sp. 807.

1326 Fragmentum navis tabulati *Teredine navalis perforatum*.

Ordo IV. LITHOPHYTA.

*Animalia Mollusca, composita. Corallium calcareum,*  
*fixum, quod inaedificarunt animalia adfixa.*

TUBIPORA.

*Tubipora musica.*

Linn. S. N. Gen. 336. Sp. 1.

1327 T. mus. articulis, longitudine semipollicari, revera pa-  
rallelis.

Seb. Thes. 3 tab. II o. fig. 8.

1328 T.

- 1328 T. mus, articulis *minoribus paullulum divergentibus*,  
Seb. Thes. 3 tab. 110 fig. 9.

*Tubipora fascicularis.*

Linn. S. N. Gen. 336. Sp. 4.

- 1329 T. fasc. albida serpulis multis inhaerentibus.

MADREPORA.

*Madrepora Fungites.*

Linn. S. N. Gen. 337. Sp. 8.

- 1329b M. F. stella orbiculata, superne subconvexa, centro longitudinali concavo haud angusto.

Seb. Thes. 3 tab. 111. fig. 1.

Esper. Phytoz. fasc. I. tab. 1 fig. 1.

- 1330 M. F. gibbosior, centro multo angustiere, subtus spinis aculeata.

- 1331 M. F. stella parte tertia valde compressa, inde minus orbiculata, centro, lamella solitaria transversa, bifido.

*Madrepora labyrinthiformis.*

Linn. S. N. Gen. 337. Sp. 10.

- 1332 M. lab. *subglobosa*, convexa, subtus lside nobili adspersa.

Seb. Thes. 3. tab. 112. fig. 7.

Esper. Phytoz. fasc. I. tab. 3.

- 1333 M. lab. *angulaio-convexa*, stellis regulariter suboppositis.

*Madrepora maeandrites.*

Linn. S. N. Gen. 337. Sp. 11.

- 1334 M. m. subconvexa, suturis parum detritis.

Seb. Thes. 3. tab. 112. fig. 2.

Esper. fasc. I. tab. 4. fig. 1.

*Madrepora areola.*

Linn. S. N. Gen. 337. Sp. 12.

- 1335 M. ar. nivea *ambulacris sex per profundis*.

Seb. Thes. 3. tab. 112. fig. 25.

Esper. fasc. I. tab. 5. fig. 2.

- 1336 M. ar. *corallium*, *ambulacris minus profundis*, extus muricatis.

Seb. Thes. 3. tab. 109. fig. 4.

1337 M.

1337 M. a. stellis haud valide plicatis.

*Not.* Quod Corallium multum iam ad fine M. lamellosum,  
insidet fraginento calli marini, serpulis multis adnatis,  
conecto.

*Madrepora Lacera Pall.*

Pallas Zoophyt. elenchus spec. 173.

1338 M. L. Corallii lamellae inaequales, maiores, minoribus,  
ternis quaternis et quinis interiectae. 2.  
Seb. Thes. 3. tab. 110. fig. 6. A.

1339 M. L. in medio subplicata.

*Not.* M. areolae adfinis, sed ab ea lamellis, denticulis  
magnis armatis, distincte differt.

1339b M. L. centro profundiore.

*Madrepora angulosa Pall.*

Pallas zoophyt. elench. spec. 174.

1340 M. ang. corallium ramis sex, extremitate stellatis, fa-  
stigatum.

Seb. Thes. 3 tab. 109. fig. 2.

Esper. fasc. I. tab. 7.

1341 M. ang. corallium, stellis pluribus cordatis, serpulis  
frequentissimis obtectum.

*Madrepora Agaricites.*

Linn. S. N. Gen. 337. Sp. 13.

1342 M. Agar. corallium e crustis albidis, latis, lamelliformi-  
bus, solidis, ex centro ita diffusis, ut una horizontalis, re-  
liquae autem omnes adiungentes adpareant, profundissi-  
me sulcatis, compositum, cum stellis numerosissimis con-  
catenatis ornatum.

Seb. Thes. 3. tab. 100. fig. 6. C.

1343 M. Ag. corallium flavescentia, convexum flexuose sulca-  
tum, stellis parvis permultis cum maioribus solitariis  
paucisque interiectis. 2.

*Madrepora favosa.*

Linn. S. N. Gen. 337. Sp. 14.

1344 M. fav. massa corallii magna, gibba deformis, stellis  
subhexangulis semipollice minoribus composita M. caver-  
nosa coadunata.

Seb. Thes. 4. tab. 112. fig. 8.

*Madre-*

*Madrepora Ananas.*

Linn. S. N. Gen. 337. Sp. 15.

- 1345 M. An. corallium stellis angulosis irregularibus subcylindricis compositum; stellarum suturis prominulis.  
Seb. Thes. 3. tab. 109. fig. 11.

*Madrepora arenosa.*

Linn. S. N. Gen. 337. Sp. 17.

- 1346 M. ar. corallium tuberosum e griseo flavescens, stellis lynceo tantum distinctis.

*Madrepora Astroites.*

Linn. S. N. Gen. 337. Sp. 19.

- 1347 M. Astr. corallium tuberoso-gibbum, M. favosae adnatum.

Seb. Thes. 3. tab. 112. fig. 13. 14. 17. 18.

- 1348 Corallium conglomeratum ex M. Astroite, cum M. oculata, Milleporis ac Ifide nobili; specimen squalidum.

*Madrepora cavernosa.*

Linn. S. N. Gen. 337. Sp. 21.

- 1349 M. c. gibba, stellis cavatis, semipollicaribus conglutinata.

Seb. Thes. 3. tab. 112. fig. 19.

- 1350 M. c. plana, stellis vicinioribus, composita.

*Madrepora caespitosa.*

Linn. S. N. Gen. 337. Sp. 23.

- 1351 M. caesp. corallium iunci crassitie, subcylindriforme ac solitarium, ramulis quibusdam exferentibus.

- 1352 M. caesp. ramorum 4 breviorum adgregatum, cylindris vicinioribus longioribusque compositum.

*Madrepora porites.*

Linn. S. N. Gen. 337. Sp. 31.

- 1353 M. por. corallium fuscum subdichotomum.

Seb. Thes. 3. tab. 109. fig. 11.

- 1354 M. por. corallium ochraceum, ramulis minus divergentibus, stellis maiusculis,

Madre-

*Madrepora damicornis.*

Linn. S. N. Gen. 337. Sp. 32.

- 1355 M. dam. corallium *subpumile*, in trunco crassiores, hac in specie paullulum detritos, excrescens.

Pall. Zooph. el. Sp. 197. var.  $\alpha$ .

- 1356 M. dam. corallium ex albido griseum, *centrum versus rufescens*, e trunculis brevibus, subdichotomis compositum, quorum extremitates ramulis verruciformibus sunt muricatae. 2.

Pall. Zooph. el. Sp. 197. var.  $\beta$ .

*Not.* Spec. nostrum var. sequenti iam adsine, optime conservatum ideoque per preciosum.

- 1357 M. dam. corallium albidum, *ramulis longissimis compositum*, stellis autem minus frequentibus adspersum.

Pall. Zooph. el. Sp. 197. var.  $\gamma$ .*Madrepora muricata.*

Linn. S. N. Gen. 337. Sp. 33.

- 1358 M. mur. albida, ramulis subteretibus, *contactu coalescentibus*.

Seb. Thes. 3. tab. 108. fig. 6.

- 1359 M. mur. specimen hoc ad

Seb. Thes. 3. tab. 114. fig. 1.

Partem infimam referri debet, quia stirpem cum *ramulis binis attenuatis elongatisque modo continet*. 2.

- 1360 M. mur. stirpis solidissimi fragmentum, pollicem crassitie superans.

*Madrepora fastigiata.*

Linn. S. N. Gen. 337. Sp. 34.

- 1361 M. fast. pallida, ramis distortibus, solidisque munita.

Seb. Thes. 3. tab. 109. fig. 1. E. 8. 1.

*Madrepora oculata.*

Linn. S. N. Gen. 337. Sp. 35.

- 1362 M. oc. corallium albidum, *caulescens*, *ramis alternis*, stellisque immersis bifariis.

Esper. fasc. I. tab. 12. fig. 1.

*Not.* Fig. citata cum specimine nostro eo tantum convenient, quod rami stirpe exserti, alterni distincte adpareant; quod reliquum vero in F. c. ramulo multo plures ac in specie nostr. repertuntur.

- 1363 M. oc. *corallium e binis stirpibus dichotomis flexuosum*.  
Seb. Thes. 3. tab. 116. fig. 1.  
1364 M. oc. *stirpe solidissima pollicari*.  
1365 M. oc. ex *stirpibus multis specimen concretum et serpulis frequentissime obiectum*.

*Madrepora prolifera.*

Linn. S. N. Gen. 337. Sp. 38.

- 1366 M. prol. *lamellis stellarum inacqualibus*, 8-10 ceteris, altioribus. 2.

Esp. fasc. I. tab. II.

- 1367 M. pr. *specimen ex stirpibus tribus*, opposite *concretis*, *conglomeratum*.

- 1368 M. prol. *cinerea*, paullulum detrita et supra destructa.  
Seb. Thes. 3. tab. 116. fig. 3.

- 1369 M. prol. *stirpibus multis, breviusculis*, paullulum *detritis*, *conglomerata*.

## MILLEPORA.

*Millepora alcicornis.*

Linn. S. N. Gen. 338. Sp. 40.

- 1370 M. alc. *lutescens*, *ramosissima*, *ramis conicis undique curvatis*; pede *Madrepora cavernosa* obfuso.

Pall. Zooph. el. Spec. 161. var. α. I.

*Millepora cellulosa.*

Linn. S. N. Gen. 338. Sp. 49.

- 1371 M. cell. *albida*, *membranacea atque reticulata*, *foraminibus ovatis pervia*.

Seb. Thes. 3. tab. 100. fig. 11.

- 1372 M. cell. *foraminibus multo maioribus perforata* et hinc *reticulo simillima*.

- 1373 M. cell. *flavescens*, *foraminibus minimis ac frequentissimis*, vix *perviis*; *serpulis ac Iside adnatis*.

*Millepora polymorpha.*

Linn. S. N. Gen. 338. Sp. 53.

- 1374 M. pol. *albida*, *ramulis teretibus numerosissimis imperforatis*; ad basin *Turbine quodam inhaerente*.

## CELLEPORA.

*Cellepora pumicosa.*

Linn. S. N. Gen. 339. Sp. 56.

1375 C. pum. albida, deformis, cellulis quadratis hiantibus.

## Ordo V. ZOOPHYTA.

*Animalia composita, efflorescentia. Stirps vegetans, metamorphosi transiens in florens Animal.*

## I S I S.

*Isis Hippuris.*

Linn. S. N. Gen. 340. Sp. 1.

1376 I. H. specimen nostrum paullulum monstrosum videtur, quia inter ramulos, fragmentum stirpis tuberosum, superne conglutinatum tenet.

Seb. Thes. 3. tab. 110. fig. 2.

Esp. fasc. I. tab. 1. f. 1.

1377 I. H. stirpe exserta, crassa atque inarticulata.

1378 I. H. truncus solidus ac inarticulatus.

Esp. fasc. I. tab. 3. f. 2.

1379 I. H. truncus elongatus, ramulis nonnullis exserentibus, attenuatus atque subarticulatus.

*Isis Ochracea.*

Linn. S. N. Gen. 340. Sp. 3.

1380 I. Ochr. truncus tenuis, ramulis paucis tenuioribus exsertis. — 2.

Esper fasc. I. tab. 4. f. 1.

*Isis nobilis.*

Linn. S. N. Gen. 340. Sp. 6.

1380b I. nob. distincte dichotoma, cortice molli ac celluloso adhuc vestita. 2.

Esper fasc. I. tab. 7. f. 1.

1381 I. nob. decorticata, pulcherrime sanguinea, pede, callo marino, ex coralliis serpulisque conglutinato, adunata.

Esper fasc. I. tab. 8. f. 1.

1382 I. nob. superindumentum, quod callum tegit marinum, stirpibus brevissimis exsertis.

1383 I. nob. trunculi 2. solitarii.

## GORGONIA.

*Gorgonia lepadifera.*

Linn. S. N. Gen. 341. Sp. 1.

1384 G. lep., *dichotoma*, ramis elongatis parum curvatis, cortice undique conservato. Trunci quinque, una eademque basi lapidea, serpulis, madreporis etc. conglutinata, exserti sunt.

1385 G. lep. cortice, *floribus frequentioribus* munito.

1386 G. lep. phytozois aliis. modo mirabilissimo aggregata.

*Gorgoniae* hujus nempe stirpis basi lapidea exsertae ramus alter, Isole nobili obductus, alter callo arenaceo, serpulis inhaerentibus, et tertius antecedenti utroque a basi remotior, Milleporae cellulosa fragmento permagno (eius longitudo 3, 5 poll. alt. 2 poll. 8 lin. et lat. 4 poll.) circumdatus.

*Gorgonia verticillaris.*

Linn. S. N. Gen. 341. Sp. 3.

1387 G. v. stirps, parte infima denudata, superiori autem ramosa, undique subferruginea. 2.

*Gorgonia keratophyta.*

Linn. S. N. Gen. 341. Sp. 6.

1388 G. ker. ramis virgatis, extremitate tenuissimis, superne cortice purpurascente adhuc ornata.

Seb. thes. 3. tab. 107. f. 3.

*Gorgonia verrucosa.*

Linn. S. N. Gen. 341. Sp. 8.

1389 G. verr. *cortice albido*, ramulis superioribus undique adhuc obtecta. 2.

Seb. thes. 3. tab. 106. fig. 3.

1390 G. verr. *ramosior*, ramis tenuibus flexuosis, passim cortice calcareo flavescenti, obducta.

1391 G. v. *ex atro fusca*, cortice, ramulis omnibus, *denudata*, subdichotoma. 2.

*Gorgonia Antipathes.*

Linn. S. N. Gen. 341. Sp. 9.

1392 G. A. maxima et solidissima, cortice prorsus destituto, inde aterrima.

Seba thes. 3. tab. 104. f. 2.

Long. 2 ped. 6 poll. lat. 1 ped. 3 poll.

1393 G. A. cortice etiam denudata, sed ramis tenuioribus  
subferrugineis.

1394 G. A. truncus, spinulis ramulorum instar, prominulis,  
ad utrumque latus.

*Gorgonia pinnata.*

Linn. S. N. Gen. 341. Sp. II.

1395 G. pinn. stirps cum ramulis paucis.

*Not.* Quod spec. paullulum videtur destructum.

*Gorgonia flabellum.*

Linn. S. N. Gen. 341. Sp. 16.

1396 G. flab. lamella una reticulata, stirpe crassiori exerto,  
cortice flavo omnino fere obtecta.

Long. 1 ped. 11 poll. lat. 1 ped. 3 poll.

1397 G. fl. ramis percompressis, cortice undique denudata.

1398 G. fl. cortice luteo, et ubi hic detritus, purpurascente  
vestita, lamellis pluribus se invicem tegentibus, subpa-  
rallelis reticulatisque, stirpe solitaria exsertis.

ANTIPATHES PALL.

*Antipathes foeniculacea.*

Pall. Zooph. Elench. Sp. 132.

1399 A. foen. cortice undique destituta, ramulis numerosissi-  
mis tenuissimis ac hispidis.

*Antipathes pennacea.*

Pall. Zooph. Elench. Sp. 134.

1400 A. p. truncis validioribus quinis, ramulis numerosis in  
unum latus curvatis, subconcentricis, undique hirsutis,  
cortice prorsus destituta, hincque aterrima.

*Antipathes cupressina.*

Pall. Zooph. Elench. S. 138.

Linn. S. N. Gen. 341. Sp. 4. *Gorgonia Abies* var.  $\alpha$

1401 A. cup. culmo infimo nudo, superiori ramosisissimo, ra-  
mis scabris, tenuibus ac flexuosis.

Seb. thes. 3. tab. 106. f. I.

ALCYONIUM.

*Alcyonium arboreum.*

Linn. S. N. Gen. 342. Sp. I.

1402 A. arb. cinerascens, poris permultis papularibus. (J. S.)

*Alcyo-*

*Alcyonium exos.*

Linn. S. N. Gen. 342. Sp. 2.

- 1403 A. e. stirpe crassa, purpurea, superne ramosa, ramis spiraliter curvatis. (J. S.)

*Alcyonium Schlofferi?*

Linn. S. N. Gen. 342. Sp. 6.

- 1404 A. Sehl. substantia carnosa abbreviata, colore flavescente. (J. S.)

## SPONGIA.

*Spongia Ventilabra.*

Linn. S. N. Gen. 343. Sp. 1.

- 1405 Sp. V. subflabelliformis, ex albido flavescenti.

*Spongia flabelliformis.*

Linn. S. N. Gen. 343. Sp. 2.

- 1406 Sp. fl. oblonga potius quam orbiculata, ex purpurascente atra.

Seb. thes. 3. tab. 115. fig. 4.

- 1407 Sp. fl. fragmentum ferrugineum.

*Spongia cancellata.*

Linn. S. N. Gen. 343. Sp. 7.

- 1408 Sp. canc. ex griseo ferruginea, ramosa tubis crassitie calami scriptorii, cancellis numerosissimis, minutis.

*Spongia muricata.*

Linn. S. N. Gen. 343. Sp. 10.

- 1409 Sp. imur. limo marino squalida, sed poris permultis subulatis muricata.

*Spongia fluviatilis.*

Linn. S. N. Gen. 343. Sp. 16.

- 1410 Sp. fl. tuberosa, virescens, ac deformis.

## FLUSTRA.

\* utrinque porosae.

*Flustra foliacea.*

Linn. S. N. Gen. 344. Sp. 1.

1411 Fl. fol. subdichotoma, laciniis cuneiformibus undique perviis, rufescens.

1412 Fl. f. frondium extremitatibus palmatis, quadrifariam divisus.

1413 Fl. f. fucum *incrustans Pelagicum nigrum.*

1413b Fl. f. fucum *incrustans marinum rubellum.*

1414 Fl. f. caulem *incrustans fuci marini,* cum Madrepore muricata.

*Flustra truncata.*

Linn. S. N. Gen. 344. Sp. 2.

1415 Fl. tr. albida, subfrondosa, frondibus angustis,

\*\* Pagina altera tantum porosae.

*Flustra papyracea.*

Linn. S. N. Gen. 344. Sp. 4.

1416 Fl. pap. albida, foliis permultis frondosis accumulatis,

## CORALLINA,

*Corallina officinalis.*

Linn. S. N. Gen. 346. Sp. 2.

1417 C. off. articulis parvulis seriatim adnatis,  
Seb. thes. 3. tab. 100. f. 14.

1418 C. off. articulis majoribus stirpe seriatim adfixis,  
Seb. thes. 3. tab. 100. f. 13.

1419 C. off. ramis superne distinete bipinnatis,  
Seb. thes. 3. tab. 100. fig. 15.

*Corallina fragilissima.*

Linn. S. N. Gen. 346. Sp. 5.

1420 C. frag. specimen paullulum destrutum,

*Corat-*

*Corallina barbata.*

Linn. S. N. Gen. 345. Sp. 6.

- 1420b C. barb. articulis tenuibus, cylindricis paullulum curvatis, valvae mytili edulis adnata.

**SERTULARIA.**

\* Ovariis distinctis et exsertis instruētæ,

*Sertularia operculata.*

Linn. S. N. Gen. 347. Sp. 3.

- 1421 S. op. flavescentia, ovariis adhuc adfixis.

Seb. thes. 3. tab. 101. f. 3.

- 1422 S. op. culmo elongatiōri, ovariis destitutis.

*Sertularia abietina.*

Linn. S. N. Gen. 347. Sp. 5.

- 1423 S. ab. pallida, ramis pinnato-fasciculatis et alternis,

*Sertularia cupressina.*

Linn. S. N. Gen. 347. Sp. 6.

- 1424 S. cupr. purpurascens, ramis paniculatis perlongis.

Seb. thes. 3. tab. 101. f. 2.

*Sertularia antennina.*

Linn. S. N. Gen. 347. Sp. 14.

- 1425 S. ant. stirps pallida, teres et setacea.

*Sertularia pennaria.*

Linn. S. N. Gen. 347. Sp. 26.

- 1426 S. penn. contorta, stirpe ferruginea, ramis flavescentibus,

\*\* Ovariis non distinctis, sed intra articulos latitantibus.  
(Cellulariae).*Sertularia ciliata.*

Linn. S. N. Gen. 347. Sp. 38.

- 1427 S. cil. colore virescente.

## HYDRA.

*Hydra fuscä.*

Linn. S. N. Gen. 349. Sp. 2.

1428 H. f. tentaculis decem longissimis. (J. S.)

## PENNATULA.

*Pennatula grisea.*

Linn. S. N. Gen. 350. Sp. 1.

1429 P. gr. stirpe carnosa, colore subcorneo, pennis utrinque spinosissimis. (J. S.)

Seb. thes. 3. tab. 16. f. 8.

*Pennatula filosa.*

Linn. S. N. Gen. 350. Sp. 3.

1430 P. f. stirpe subcarnosa, superne canaliculata. (J. S.)

---







L. Dr. Wildungen inv.


N<sub>1</sub> *Sterops Cafer.*

N<sub>2</sub> *Certhia longicauda.*




N.1. *Pipra tricolor*: N.2. *Trochilus maximus*.





Tab. I.





*Synistata.*



412.



390.



547.



543.



549.



546.



548.




545.



*Glossata.*

6.





N. 183.

*Glosfata.*

N. 184.

N. 186.

N. 210.

N. 192.

N. 193.

N. 27.

*Ryngota.*


N. 57.

N. 58.  
*Ryngota.*N. 89.  
*Ryngota.*N. 22. *Anthrata.*N. 202.  
*Ryng.*N. 203.  
*Ryng.*



*Tab: helminthologica.*

*Fig. IV.*




*Fig. I. a*



*Fig. I. b*




*Fig. V.*





*Tab: helminthologica.*

*Fig. II. a.*



*Fig. VI*



*Fig. II. b.*



*Fig. VII*








*Fig:*

*III*



*a*



*b*

*Fig. VIII.*

18917 ①

