

A ranger dans la section des *Tomoderus* à prothorax non profondément canaliculé au milieu ; rappelle bien certaines espèces américaines comme *T. interruptus*.

**ANTHICUS SUBUSTULATUS** Abeille in litt. — Peu allongé, d'un brun rougeâtre brillant passant ordinairement au testacé clair sur les pattes et antennes ; élytres à deux macules (la première plus large) postérieures noirâtres, quelquefois réunies sur la suture. Tête allongée, bien diminuée et arrondie en cercle en arrière, à ponctuation assez forte, écartée, avec les yeux gris. Antennes très courtes, un peu épaissies. Prothorax largement arrondi, dilaté en avant, à ponctuation forte, peu écartée, et fossettes assez marquées sur la base. Elytres assez larges, maculés de noir brunâtre, arrondis aux épaules et à l'extrémité, à ponctuation forte, écartée. Quelques poils courts, jaunâtres. Dessous du corps d'un brun rouge, quelquefois obscurci. Pattes grêles. Long. 2 1/2, 3 mill. Guinée-Addah (coll. Abeille, Pic.)

Rappelle bien *Anthicus (cyclodinus) Bremei* Laf., d'Europe.

DESCRIPTION D'UN HÉLICÉEN NOUVEAU  
PROVENANT DE LA COTE OCCIDENTALE DU MAROC,

par Ph. DAUTZENBERG,


Ancien Président de la Société.

HELIX (JACOSTA) RENATI.

*Testa solidiuscula, modice umbilicata. Spira scalariformis parum elata. Anfractus 5 superne concavo-planulati, medio carinati. Carina obtuse marginata. Anfr. ultimus antice descendens basi convexus. Anfr. primus laevigatus, ceteri longitudinaliter irregulariter costulati. Apertura subquadrata. Columella parum callosa, obliqua; labrum simplex, acutum, medio angulatum. Color sordide lutescens, maculis fulvois albidisque irregulariter conspersus; basis anfractus ultimi pallidior, concentrica obscure lineolata. Altit. 4; diam. maj. 8 mill.; apertura 2 mill. longa, 3 1/2 millim. lata.*

Coquille assez solide, médiocrement ombiliquée. Spire scalariforme, peu élevée, composée de 5 tours étagés, plano-concaves à leur partie supérieure, munis à la périphérie d'une carène bordée d'un bourrelet saillant, arrondi. Dernier tour descendant à l'extrémité, convexe à la base. Tour embryonnaire lisse ; les suivants ornés

de costules longitudinales inégales, disposées dans le sens de l'accroissement. Quelques-unes de ces costules se relèvent en forme de denticulations sur le bourrelet de la carène. Ouverture subquadragulaire. Columelle mince, très faiblement réfléchie sur la cavité ombilicale ; labre simple, tranchant, anguleux à sa partie moyenne et un peu sinueux au-dessous. Coloration d'un gris jaunâtre, élégamment tacheté de fauve et de blanc, surtout sur la partie supérieure des tours. La base du dernier tour est plus claire et présente en outre quelques linéoles concentriques peu apparentes.



*L'Helix Renati* se distingue à première vue de toutes celles du même groupe par ses tours étagés, plano-concaves au-dessus; par sa carène bordée d'un bourrelet saillant, ainsi que par sa coloration. Nous devons faire quelques réserves quant à la conformation de l'ouverture, car nous doutons que les trois exemplaires que nous avons sous les yeux soient parfaitement adultes.

M. le commandant René Schlumberger, chef de la Mission militaire française au Maroc, a recueilli cette jolie espèce à Oualidiya et nous nous faisons un plaisir de la lui dédier.

#### OUVRAGES REÇUS LE 9 JANVIER 1894.

E. ANDRÉ, *Species des Hyménoptères d'Europe et d'Algérie*, V, fasc. 43; VI, fasc. 42 et 44. Gray, 1892.

1. H. H. FIELD, *Ueber die Art der Abfassung naturwissenschaftlicher Literaturverzeichnisse*. Biologischen Centralblatt, XIII, n° 24, p. 753, 1893.

2. ID., *Ueber die Gefässversorgung und die allgemeine Morphologie des Glomus*. Anatomischer Anzeiger, VIII, n°s 21 et 22, p. 753, 1893.

A. HERRERA, *El hombre prehistórico de México*. Memorias de la Sociedad « Alzate » de Mexico, VII, 40 p. et 2 pl., 1893.

E. SIMON, *Histoire naturelle des Araignées*, 2<sup>e</sup> édit., I, fasc 2, p. 257-488, avec 275 fig. Paris, 1893.