

L'animal (Pl. I, fig. 2) est recouvert, sur presque toute la surface du pied et de la tête, de tubercles d'un brun chocolat. Les côtés de la tête et du pied sont plus foncés que la région médiane.

Les tentacules oculaires sont coniques ; ils présentent un étranglement en arrière de l'extrémité sphérique qui porte l'œil. Leur surface est légèrement granuleuse, à l'exception de l'extrémité sphérique, qui est lisse. La base de ces tentacules est couverte de taches brunes ; dans le reste de leur étendue, la coloration est d'un brun très clair.

Les tentacules inférieurs présentent également une surface rugueuse ; ils sont incolores ; cependant, leur extrémité est lisse et légèrement lavée de brun.

Dans la partie postérieure du pied, les tubercles s'effacent : on n'y trouve plus que des taches brunes, de moins en moins distinctes vers l'extrémité.

La face ventrale du pied est d'un gris sale tirant un peu sur le vert.

H. F.

---

Description d'un **Perideris** nouveau, provenant  
du **Dahomey**,

Par Ph. DAUTZENBERG.

**PERIDERIS LECHATELIERI**, Dautzenberg.  
(Pl. I, fig. 3).

*Perideris Lechatelieri*, Dautzenberg, *Journ. de Conchyl.*,  
vol. XL, p. 297. 1892.

Coquille imperforée, assez solide. Spire élevée, turriculée, atténuee au sommet, composée de 7 à 8 tours séparés par une suture simple, non marginée. Les tours embryonnaires manquent dans l'exemplaire unique que

nous avons sous les yeux ; les trois suivants sont légèrement convexes ; les autres renflés un peu au-dessus de leur milieu ; le dernier pourvu, à la périphérie, d'une carène bien accusée et saillante. Surface peu luisante, ne présentant que des lignes d'accroissement très faibles, un peu plus marquées au-dessous de la suture. Ouverture subquadrangulaire, plus haute que large. Columelle verticale, à peine tordue ; labre simple, tranchant.

Le fond de la coloration des premiers tours est d'un violacé livide, qui passe insensiblement à une teinte jaune ochracée sur les tours suivants. Sur ce fond se détachent des flammules irrégulières mi-partie noires et blanches, plus larges à la base des tours. La coquille est, de plus, irrégulièrement parsemée de ponctuations brunes. La base du dernier tour est ornée de flammules rayonnantes, rapprochées, d'un brun très foncé, presque noir. Columelle d'un gris violacé ; labre bordé d'une zone étroite de la même nuance ; fond de l'ouverture d'un blanc porcelané. Epiderme mince, jaunâtre, peu persistant.

C'est du *Perideris auripigmentum*, Reeve (*Conchologia Iconica, G. Bulimus*, pl. 29, fig. 178), que cette belle coquille se rapproche le plus ; mais elle s'en éloigne par ses tours gibbeux, par la carène bien accusée de son dernier tour, par son ouverture moins dilatée et plus quadrangulaire, par sa columelle plus droite, moins tordue ; enfin, par ses flammules plus nombreuses et par la présence de ponctuations.

Nous sommes heureux de dédier cette nouvelle espèce à M. le capitaine Le Chatelier, qui l'a recueillie au Dahomey, pendant une reconnaissance effectuée dans les environs d'Affamé, à proximité du fleuve Ouémé.

Nous devons l'exemplaire unique rapporté par M. Le Chatelier à M. le lieutenant-colonel de Lamothe, qui a bien voulu s'en dessaisir en notre faveur. P. D.



Arnoul del.

Imp. Becquet. Paris.

- |                                            |                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1. Bulimulus Chaperi, Crosse et Fischer.   | 3. Perideris Lechatelieri, Dautzenberg. |
| 2. Le même avec l'animal.                  | 4. Littorina Nervillei, Dautzenberg.    |
| 5. Littorina Nervillei, var., Dautzenberg. |                                         |