

DESCRIPTION DE
DEUX BULIMULIDÉS NOUVEAUX PROVENANT DU PÉROU
par Ph. DAUTZENBERG.
PERONÆUS IOCOSENSIS Dautzenberg.
Pl. VIII, fig. 1, 2.

Peronæus iocosensis, Dautzenberg, *Journal de Conchyl.* 1901,
vol. XLIX, p. 131.

Coquille peu solide, allongée, pourvue d'une fente ombilicale très courte et étroite. Spire atténuée vers le sommet, composée de 11 tours peu convexes, séparés par une suture bien marquée : les premiers lisses, les autres ornés de côtes longitudinales arquées, irrégulièrement onduleuses, assez espacées et granuleuses. Ouverture petite, à bords disjoints. Columelle droite, à peine réfléchie. Labre simple, tranchant au bord.

Coloration d'une fauve clair, parsemé de taches et de flammules longitudinales brunes, irrégulières. Sommet de la spire teinté de gris noirâtre.

Cette espèce est surtout remarquable par la sculpture de ses côtes longitudinales qui sont divisées en séries de granulations un peu comme celles du *Peronaeus pustulosus* Broderip ; mais chez l'*iocosensis*, les granulations ne sont visibles que sous la loupe et cette espèce a d'ailleurs une forme tout à fait différente.

PERONÆUS BAERI Dautzenberg.

Pl. VIII, fig. 3, 4.


Peronæus Baeri Dautzenberg, *Journal de Conchyl.* 1901,
Vol XLIX, p. 431.

Coquille assez solide, très allongée et turriculée, pourvue d'une fente ombilicale étroite. Spire composée de 11 tours peu convexes, séparés par une suture bien marquée. Tours embryonnaires lisses, subtransparents ; les suivants opaques, ornés de costules longitudinales très faibles, un peu obliques et devenant encore moins accusées et moins régulières sur les derniers tours. Ouverture petite, à bords disjoints : bord columellaire droit, à peine réfléchi. Labre simple, tranchant au bord.

Coloration d'un blanc de lait passant à une teinte légèrement bleuâtre vers les tours supérieurs. Sommet de la spire brun-corné. Columelle teintée de violet noirâtre. On observe en outre sur les tours des flammules longitudinales d'un brun roux, très irrégulièrement distribuées et variant beaucoup en intensité. Péristome blanc jaunâtre ; fond de l'ouverture fauve.

Cette espèce, que nous dédions à M. Baer qui l'a découverte à Iocos en compagnie de la précédente, se rapproche, par sa forme allongée, du groupe des *Geoceras* (*G. cuspidatus* Morelet, etc.) ; mais le nombre de ses tours n'est que de 11, tandis que les *Geoceras* en possèdent constamment de 15 à 20. D'autre part, sa coloration la sépare nettement de tous les *Peronaeus* que nous connaissons.

PH. D.



De G. Pilarski phot. et imp.

27, rue de Coulmiers Paris

- 1, 2, 3. *Rhytida Bernieri Dautzenberg.*
- 4. 5. *Placostylus houailouensis Dautzenberg.*
- 6. *Leucocharis porphyrochila Dautz. et Bern. var. rubicunda.*
- 7, 8. *Cerithium Bavayi Vignal.*
- 9, 10. " Vignal.
- 11, 12. " *Dautzenbergi Vignal.*