

	P. ag.		P. ag.
<b>Ichneumon</b>		<b>Ichneumon</b>	
altercator . . . . .	405	pluralbatus . . . . .	397
— angustatus . . . . .	400	— refractarius . . . . .	381
— bellipes . . . . .	569	— rubens . . . . .	365
— castaneus . . . . .	394	— sinister . . . . .	367
— clarigator . . . . .	592	— sordidus . . . . .	391
— cornicula . . . . .	568	— subreptorius . . . . .	574
— diversor . . . . .	571	— vacillatorius . . . . .	405
— dolosus . . . . .	404	— velatus . . . . .	383
— exornatus . . . . .	594	<b>Ischnus</b>	<b>nigricollis . . . . .</b>
— faunus . . . . .	387		<b>432</b>
— fucatus . . . . .	403	<b>Phaeogenes</b>	<b>amaenus . . . . .</b>
— gracilicornis . . . . .	586		<b>424</b>
— gratus . . . . .	571	— Bohemani . . . . .	429
— gravipes . . . . .	379	— callopus . . . . .	420
— ignobilis . . . . .	375	— cephalotes . . . . .	427
— indagator . . . . .	397	— flavidens . . . . .	424
— indiscretus . . . . .	573	— hybridus . . . . .	428
— intricator . . . . .	572	— jucundus . . . . .	425
— inutilis . . . . .	584	— lascivus . . . . .	426
— luteipes . . . . .	578	— mysticus . . . . .	421
— magus . . . . .	589	— protervus . . . . .	427
— medialis . . . . .	570	— scutellaris . . . . .	419
— melanocerus . . . . .	377	— solers . . . . .	425
— melanopygus . . . . .	588	— stipator . . . . .	422
— melanosomus . . . . .	580	— tetricus . . . . .	<i>ib.</i>
— oblitteratus . . . . .	576	<b>Platylabus</b>	<b>histrio . . . . .</b>
— piceatorius . . . . .	586		<b>412</b>
		— pactor . . . . .	<b>413</b>
		— rufus . . . . .	<i>ib.</i>

*Description succincte d'un nouveau mollusque marin des rives de l'Escaut; par M. H. Nyst, membre de l'Académie.*

Prévoyant de ne pouvoir me rendre demain à la séance de l'Académie, je m'empresse, Monsieur le Secrétaire, de vous faire parvenir, avec prière de vouloir les communiquer à mes confrères qui s'occupent de malacologie, les

exemplaires ci-joints, que je viens de découvrir, d'un mollusque probablement inédit, ou tout au moins nouveau pour la faune belge. Je crois devoir le rapporter au genre *Alderia* de M. Allman, et propose, en attendant que je puisse le décrire complètement, dans un travail que je prépare sur les mollusques marins de nos côtes, de lui donner le nom spécifique de *scaldiana*, qui indique son habitation sur les rives de l'Escaut, entre Anvers et le fort Philippe.

Ce singulier mollusque pourrait être facilement pris au premier aspect pour une limace, si ce n'était l'absence de tentacules : ce caractère, ainsi que l'habitation de l'animal sur la vase que les eaux de l'Escaut venaient d'abandonner, me fit penser d'abord qu'il était amphibia. N'ayant d'ailleurs encore rencontré dans les eaux de l'Escaut, qui, en deçà d'Anvers, sont saumâtres, aucun mollusque fluviatile à l'état vivant, je fus porté à en conclure que celui-ci devait être marin, et ne pouvait, par conséquent, être un gastéropode pulmoné. Les recherches auxquelles je me livrais me firent découvrir, en parcourant le beau travail de MM. Forbes et Hauley (1), que cet animal devait entrer dans la classe des gastéropodes nudibranches, et faire partie du singulier genre *Alderia* proposé par M. Allman (2), en 1844, pour une seule espèce qu'il nomma d'abord *Alderia amphibia*, nom spécifique qu'il remplaça ensuite, en 1846 (3), par celui de *modesta*.

Mon espèce semble en être voisine, et je propose de la

(1) *A history of British Mollusca, and their Shells*, in-8°, 4 volumes publiés en 1851.

(2) *British Association report for 1844*.

(3) *Annals of natural history*, vol. XVII.

nommer *Alderia scaldiana* Nob. Elle se distingue essentiellement de l'*A. modesta*, par divers caractères assez tranchés qui sont : 1<sup>o</sup> sa couleur verte à l'état vivant au lieu de jaunâtre; 2<sup>o</sup> les taches noirâtres qui occupent la partie supérieure du corps et se terminent postérieurement en une bande de même couleur, et 3<sup>o</sup> les branchies lamelleuses qui se recouvrent lorsque l'animal est hors de l'eau, et qui sont disposées sur deux rangées au lieu d'une seule. Du reste, son corps est ovale-oblong, subconvexe, non pourvu d'un manteau distinct. Tête prolongée en un lobe de chaque côté. Animal dépourvu de tentacules et de mâchoires. Organes de la génération situés à la base postérieure de l'œil droit. Yeux excessivement petits, noirs. Longueur 6 à 7 mill.

Le frai de ce mollusque est de forme ovale, composé de matière gélatineuse, hyaline, dans laquelle on aperçoit les foetus sous la forme de petits points jaunes très-nombreux.



Figure 1. *Alderia scaldiana*. — 1a grandeur naturelle.  
— 2. Le frai. — 2a grandeur naturelle.