

Adema (1991) kan de schildbreedte bij de wijfjes maximaal 5,6 cm bedragen en bij de mannetjes 6,7 cm.

Gedurende 2,5 jaren heb ik deze soort niet meer op het strand aangetroffen ten gevolge van de twee koude winters 95-96 en 96-97.

- In 1998 (september en december) verzamelde ik opnieuw vier schilden
- In 1999 raapte ik reeds elf van deze schilden (tussen 2,8 cm en 4 cm) op, waarschijnlijk lagen er nog meer, want ze worden heel gemakkelijk over het hoofd gezien door de oppervlakkige gelijkens en overeenkomst in grootte met *Liocarcinus holsatus*. Negen van deze elf schilden werden in amper 2 maanden gevonden, namelijk van 6 oktober 99 tot 6 december 1999. De komende wintermaanden zal deze opgaande trend voor de blauwpootzwemkrab misschien verder bevestigd worden. Uitkijken dus, telkens er veel krabbenschilden aanspoelen.

Ook de gewimperde zwemkrab *Liocarcinus arcuatus* is terug aan onze Westkust

M.-Th. Vanhaelen

Sinds de vondst van een juveniel schild van 1,7 cm met nog aanwezige wimpertjes tussen de ogen (Vanhaelen, 1998) op 30 augustus 1998 heb ik regelmatig de schilden van deze soort *Liocarcinus arcuatus* (fig. 3) op de stranden van De Panne, Koksijde en Oostduinkerke aangetroffen; enkelen in de winterperiode 1998, de meesten in de herfstperiode 1999. In totaal zijn dit reeds 25 schilden. De breedtes van de carapaxen variëren tussen 1,7 cm en 3,5 cm. De maximale afmeting volgens Adema (1991) is 4,6 cm

Het leuke bij deze schildjes is dat ze vaak een symmetrisch vlekkenpatroon vertonen onder de ogen dat na opdrogen bruin, roodachtig of oranje kan zijn. Ook deze soort, die bij mijn weten nooit erg talrijk werd aangetroffen - behalve in 1994 (d'Udekem d'Acoz, 1995) - blijven we aandachtig volgen.

Naschrift:

Op 19 december 1999 tijdens de SWG-eindejaarsexcursie in De Panne (Westhoekstrand) werden nog eens 11 schilden van de gewimperde zwemkrab verzameld: 4 door Hans De Blauwe, 2 door Francis Kerckhof, 1 door Ingrid Jonckheere en 4 door Marie-Thérèse Vanhaelen. Dit bevestigt weer eens dat deze soort toegenomen is vóór de Westkust. Een dag nadien, op 20 december, lagen op hetzelfde traject nog 2 schilden van deze soort.

Literatuur

- Adema, J.P.H.M., 1991. De krabben van Nederland en België. Nat. Hist. Mus. Leiden: 190-196.
- Udekem d'Acoz, d', C., 1995. Echouage en masse de *Liocarcinus arcuatus* (Leach, 1814) sur la côte Belge en janvier 1994, remarques biométriques et liste des épibiontes (Crustacea, Decapoda, Brachyura, Portunidae). De Strandvlo, 15(1): 10-13.
- Vanhaelen, M.-Th., 1998. *Liocarcinus arcuatus* terug te Koksijde, na de strenge winters 95-96 en 96-97. De Strandvlo, 18(3): 136




Fig. 1. *Liocarcinus vernalis* (Tekening I. van Noordwijk)




Fig. 2. *Liocarcinus depurator* (tekening J. Wessendorp)




Fig. 3. *Liocarcinus arcuatus* (tekening J. Wessendorp)

**Ter Yde 1
8670 Koksijde**