

Verslag van de excursie te Oostende op 22 februari 2003

Georges Versele

Dat het verslag ludiek moest zijn, zei René en, voegde Francis er aan toe, voor de juiste wetenschappelijke naam zorg ik wel. Hij wist duidelijk welk vlees hij in de kuip had...

Onder een stralend zonnetje toonde Francis ons beeldjes op zijn digitale camera, van 4 bij 4 cm, van wat hij gefotografeerd had op een boei die de vorig avond was binnengebracht. Bewondering t'allen kant. Ik knikte fel mee alhoewel ik eerder de bijzondere schoonheid van sommige beelden moest raden dan zag.

Toen kwam het verlossende idee : laten we naar de boei gaan zien en zo geschiedde.

De boei in kwestie was de NO Akkaert, een groot geel geval dat zowat 17 maanden gedobberd had ter hoogte van de Akkaert zandbank zo'n 13 km buiten Oostende. Eerste oogopslag: enorme mosselbank, heel veel Japanse oesters *Crassostrea gigas* en heel veel zeepokken het geschikte moment om ze te leren kennen. Bij nader toezien vonden we:

- gekartelde of gekerfde zeepok *Balanus crenatus* - 6 gladde wandplaten (ondanks Nederlandse naam) met onderaan de holle buisjes (doorboord). We zagen ook tientallen kalkplaatjes van reeds verdwenen exemplaren.
- brakwaterzeepok *Balanus improvisus* - mooie gladde vorm, rond met een goed gesloten dekseltje in tegenstelling met *B. crenatus* die eerder een deur op een kiertje heeft. Laat ook een kalkplaatje achter.
- gewone zeepok *Semibalanus balanoides* - geen verkalkte grondplaat. Was wel in de minderheid want houdt meer van de ondiepe wateren.
- Nieuw-Zeelandse zeepok *Eliminus modestus* - vrij goed herkenbaar aan zijn 4 plaatjes met bovenop een grijsachtig deurtje ipv wit.
- *Balanus coccopoma* was wel het orgelpunt : een rozige vrij grote zeepok die Francis liggend op de rug losgemaakt heeft. Uit mijn nota's van de algemene vergadering vind ik terug : zeldzaam in de Noordzee, komt oorspronkelijk vanuit Midden Amerika en heeft zich verspreid via de scheepvaart en El Nino, zeg nu zelf : met zo'n palmares kan niet iedere pok uitpakken.

Om ons geluk volledig te maken vonden we een enorme massa levende vlokreeftjes : voornamelijk de kokervormende soort *Jassa herdmani*.

Verder pakten we uit met een jonge fluwelen zwemkrab *Necora puber*, konden we een zeerups = borstelworm en een snoerworm (noot van de redactie: vermoedelijk

Emplectonema gracile, zie verder in dit nummer) onder de loupe nemen. Ook bij de vliescelpoliepen scoorden we goed :

Harige vliescelpoliep *Electra pilosa*, vormde struikvormige kolonies en op de mossels leefde *Conopeum reticulum*.

Beetje overdonderd trokken we nog naar de strandhoofd, de excursie stond toch aangeduid als een strandhoofdexcursie zeker, en zo geschiedde volgens het boekje.

Opnieuw bogen we ons over de zeepokken, maar keken vooral naar de "modder" die in de lente met gulle hand door de "slibkokerworm" *Polydora ciliata* wordt uitgescheiden over zeepokken, mossels en dies meer.

Hoe de H_2S als rottingsgeur langs het strandhoofd ontstaat, en zeer uitgesproken volgens mij in deze periode, is mij ondanks anaërobe gisting in de bovenlaag enz. nog altijd niet duidelijk.

Maar we hadden honger en bij mij is na 2,5 uur speuren de maat vol. Ah ja, wie een verslagje wou schrijven? Ik tuurde zeer aandachtig naar de einder alsof ik een verschijning verwachtte, maar het mocht niet baten.

En eens te meer : de afwezigen hadden dik ongelijk !

Naschrift, een aantal foto's van de zeepokken van deze boei zullen op de website van de Strandwerkgroep geplaatst worden, meteen een vervolg op de voordracht van de jaarvergadering.

**Zeedijk 76/602
8620 Nieuwpoort**