LES POISSONS DE MER A ABIDJAN

RIJKSSTATION VOOR ZEEVISSERIJ

REPUBLIQUE DE COTE D' IVOIRE
MINISTERE DE LA PRODUCTION ANIMALE
DIRECTION DES PECHES MARITIMES & LAGUNAIRES

LABORATOIRE

N° 53 Juin 1972

POISSONS DE MER A ABIDJAN

JF.ALDRIN O.NOYER D.BREGEAT

AVANT-PROPOS

-§-

Ce catalogue des poissons de mer de Côte d'Ivoire est présenté sous forme de fiches signalétiques simples, classées dans l'ordre habituel de la nomenclature scientifique, et dont les numéros correspondent, pour les mêmes espèces, à ceux du document n° 52 du Laboratoire des Pêches consacré aux appellations des poissons de mer à Abidjan.

Plus de 150 espèces sont décrites ou citées dans les fiches, ce qui ne représente qu'une faible fraction des poissons du Golfe de Guinée, mais englobe la quasi totalité des espèces effectivement débarquées au port de pêche d'Abidjan.

Les fiches signalétiques sont volontairement brèves. Pour chaque espèce décrite, elles comprennent le schéma, le nom scientifique, le nom de la famille, la taille maxima, quelques signes distinctifs, l'habitat (c'est-à-dire la surface de la mer ou le fond, la zone côtière ou le large,etc...) et divers renseignements valables pour la Côte d'Ivoire : la quantité débarquée annuellement à Abidjan quand elle est supérieure à 100 tonnes, ainsi que les prix minimum et maximum de vente à quai de la caisse de 35 à 40 kg**. Enfin, une rubrique "remarques" apporte souvent des renseignements complémentaires.

Au début de ce catalogue, quelques généralités succinctes concernant les poissons et trois schémas types permettent de mieux comprendre les fiches.

A la fin du fascicule, des index alphabétiques des appellations courantes et des noms scientifiques renvoient aux numéros des fiches correspondantes.

-§-

* L'abréviation "sp" utilisée dans les fiches à la place du nom spécifique signifie que plusieurs espèces très voisines peuvent correspondre à la description donnée ; ex : Sphyrna sp.

** Les prix cités sont ceux de la période 1970 - 71. Dès la fin de l'année 1971, et surtout en 1972, un fort courant de hausse s'est produit pour de nombreuses espèces.

GENERALITES

Les poissons forment le groupe de vertébrés le plus important par le nombre des espèces : plus de 20.000...

Les poissons sont des vertébrés aquatiques à température variable (poïkilothermes), dont la peau est généralement couverte de denticules ou d'écailles. Leurs membres sont conformés en nageoires soutenues par un squelette propre. Ils respirent au moyen de branchies. Ils possèdent un organe des sens particulier : le sens acoustico-latéral, généralement matérialisé par une ligne latérale. Du point de vue de la reproduction, ils sont ovipares ou vivipares.

Classification :

/ Super classe des POISSONS /

I - Classe des Chondrichthyens

* Sous classe des Sélaciens

** Sous classe des Bradyodontes

II- Classe des Ostéichthyens

* Sous classe des Actinoptérygiens
  - S/ordre des Chondrostéens
  - S/ordre des Holostéens
  - S/ordre des Téléostéens

** Sous classe des Brachioptérygiens

*** Sous classe des Dipneustes

**** Sous classe des Crossoptérygiens

L'importance de ces divers groupes est très variable, en fait, deux englobent la quasi totalité des espèces:

- Les Sélaciens qui possèdent (fiches 1 à 13)
  - un squelette cartilagineux
  - des fentes branchiales

- Les Téléostéens qui possèdent (fiches 14 à 110)
  - un squelette ossifié
  - des branchies sous opercule

- Ces derniers représentent 95% environ des espèces actuelles de poissons


nageoires dorsales
fentes branchiales
nageoire caudale
évent
rostre
REQUINS
narines
nageoire anale
nageoire ventrale
nageoire pectorale

SELACIENS


évent
narine
bouche
RAIES
nageoire pectorale
nageoire ventrale
fentes branchiales
nageoire dorsale
nageoire caudale


nageoires dorsales
épineuse
molle
ligne latérale
narines
TELEOSTEENS
opercule
nageoire caudale
nageoire pectorale
nageoire anale
nageoire ventrale



Appellations : - Nom commercial : REQUIN-MARTEAU
- Nom scientifique : Sphyrna sp.
- Autres appellations :

Famille : Sphyrnidae

Taille : jusqu'à 5 mètres

Signes distinctifs : La forme caractéristique de leur tête permet de reconnaître immédiatement les requins de ce type, dont on compte quatre espèces très voisines dans le golfe de Guinée.

Habitat : Zone littorale - peut pénétrer en lagune.

Pêche : Surtout au chalut.
Les captures sont moins fréquentes que pour les Carcharhinidae, (voir fiche 2), les spécimens de grande taille sont très rares dans les débarquements.
Prix : de 1000 à 2500 CFA la caisse.

Remarques : L'huile de foie de requin-marteau est l'une des plus riche en vitamine A de tous les sélaciens.



Carcharhinus sp.



Prionace glauca

Appellations : - Nom commercial : REQUIN
- Nom scientifique : nombreuses espèces
- Autres appellations :

Famille : Carcharhinidae

Taille : jusqu'à 4 mètres (Carcharhinus), 6 mètres (Prionace glauca).

Signes distinctifs : Les carcharhinus sont des requins sombres - Prionace glauca est un grand requin de couleur bleue.(il existe un autre requin bleu : le "Mako", Isurus oxyrhynchus)

Habitat : Pélagique côtier (Carcharhinus) - pélagique (Prionace).

Pêche : Chalut, palangre - les carcharhinidae sont les requins le plus fréquemment capturés à Abidjan, et surtout les Carcharhinus.
Apports à Abidjan : L'ensemble des requins représente environ 300 tonnes par an.
Prix : les petits requins se vendent de 1000 à 2500 CFA la caisse, les gros de 1000 à 2000 CFA la pièce.

Remarques : La chair des sélaciens (requins et raies) contient en général de 1 à 1,8% d'urée, et leur sang de 20 à 30 grammes par litre! Cette urée se décompose rapidement après la mort en donnant de l'ammoniac, ce qui explique l'odeur particulière de ces poissons.
En basse côte, on fume les requins en tranches après les avoir laissés "faisander" quelques jours à la température ambiante. Ils sont en particulier consommés à l'occasion des repas de funérailles.



Appellations : - Nom commercial : REQUIN-TIGRE
- Nom scientifique : Galeocerdo cuvieri
- Autres appellations :

Famille : Carcharhinidae

Taille : jusqu'à 6 mètres

Signes distinctifs : Requin d'aspect massif à l'état adulte.
Les jeunes portent sur le dos et sur les flancs des taches et des bandes plus foncées.

Habitat : Pélagique ou pélagique côtier.

Pêche : Très rare sur le quai.

Remarques : Ce requin est l'une des espèces susceptibles de devenir "mangeur d'homme". Un accident mortel sur une plage de Dakar lui a été imputé en 1947.
Au large de la Floride, on a retrouvé des restes humains dans l'estomac de deux requins-tigres. De toutes façons leur voracité est extrême, et on a retrouvé de tout dans leur estomac : d'autres requins-tigres, des oiseaux, des tortues, des dauphins, des crocodiles, des boîtes de conserve, des tam-tam, etc...



Appellations : - Nom commercial : ANGE DE MER
- Nom scientifique : Squatina aculeata
- Autres appellations :

Famille : Squatinidae

Taille : jusqu'à 1,7 mètre.

Signes distinctifs : Tête aplatie à bouche terminale - grandes nageoires pectorales séparées de la tête par une profonde échancrure - une rangée médiane de denticules sur le dos.

Habitat : Poisson de fond - plateau continental.

Pêche : Chalut

Généralement de grande taille, les anges de mer se vendent à la pièce.

Remarques : A côté de Squatina aculeata, existe une autre espèce très voisine quoique de taille plus petite : Squatina oculata qui ne possède pas de rangée médiane de denticules dorsaux.
Les squatinidae font la transition entre les requins et les raies, car leurs fentes branchiales sont en partie latérales et en partie ventrales.



Centrophorus granulosus



Oxynotus centrina

Appellations : - Nom commercial : REQUIN

- Nom scientifique :

- Autres appellations : Oxynotus centrina est parfois appelé "porc" ou "humantin", et Centrophorus granulosus "centrophore granuleux", Akamba (Alladian).

Famille : Squalidae

Taille : jusqu'à 1,5 mètres pour les deux espèces citées.

Signes distinctifs : Peau agréablement granuleuse pour Centrophorus, plus grossière chez Oxynotus dont l'aspect est massif et inélégant.

Habitat : Vivent sur le talus continental.

Pêche : Rares au quai.
Le centrophore est couramment pêché à la ligne par les piroguiers.

Remarques : Centrophorus granulosus a un foie volumineux (25 à 30% du poids du corps) très riche en huile, cette dernière pouvant contenir jusqu'à 90% de squalène! Le squalène est un hydrocarbure terpénique d'intérêt stratégique entrant dans la préparation des lubrifiants polaires.
La peau du Centrophorus est parfaitement utilisable en maroquinerie de luxe.



Appellations : - Nom commercial : POISSON-SCIE
- Nom scientifique : Pristis sp
- Autres appellations :

Famille : Pristidae

Taille : jusqu'à 7 mètres

Signes distinctifs : Tête prolongée par un rostre armé de "dents" latérales formant comme une scie, rostre qui atteint environ le tiers de la longueur du poisson. Il existe en fait plusieurs espèces voisines.

Habitat : Côtier - certaines espèces rentrent dans les estuaires.

Pêche : Chalut
Poisson non consommé en Côte d'Ivoire mais dont la scie est recherchée pour la décoration...on en connait de 2 mètres de long sur 30 cm de large.

Remarques : On pense que la scie permet au poisson de fouiller le sable et la vase pour en déloger ses proies. Elle permet aussi de frapper et de déchirer les poissons rassemblés en bancs comme les sardinelles ou les mulets.
Les pristidae peuvent fournir un cuir excellent et leurs ailerons sont comestibles.



Appellations : - Nom commercial : TORPILLE
- Nom scientifique : Torpedo sp.
- Autres appellations : Raie électrique - Trembleuse.

Famille : Torpedinidae

Taille : jusqu'à 1 mètre

Signes distinctifs : La tête, le tronc et les pectorales, forment un disque arrondi sans rostre. Il existe plusieurs espèces voisines.

Habitat : Poisson de fond, en général côtier.

Pêche : Chalut - Pêché accidentellement, ce poisson n'est ni consommé ni vendu à Abidjan.

Remarques : Les torpilles ont la propriété de posséder des organes électriques de part et d'autre de la tête. Il s'agit de muscles tranformés rappelant un peu par leur disposition une pile de Volta! La décharge maximum dépasse rarement 40 volts, on est loin des 600 volts signalés chez le gymnote d'Amérique, ou même des 300 à 450 volts du malaptérure des lagunes de Côte d'Ivoire. Bien entendu, la décharge n'est possible que du vivant de l'animal.



Rhinobatos sp.

Appellations : - Nom commercial : GUITARE
- Nom scientifique : Rhynchobatus lubberti / Rhinobatos sp.
- Autres appellations :

Famille : Rhinobatidae

Taille : jusqu'à 3 mètres

Signes distinctifs : Leur forme générale rappelle celle d'une guitare. Chez Rhynchobatus la première nageoire dorsale est placée en partie au dessus des ventrales, chez Rhinobatos elle est placée nettement en arrière.

Habitat : Poissons de fond - côtiers

Pêche : Chalut
Les grandes guitares se vendent de 1500 à 2000 CFA la pièce, les petites de 500 à 1000 CFA la caisse.

Remarques : A la suite des Squatinidae, les Rhinobatidae marquent une nouvelle forme de transition entre les requins et les raies proprement dites.



Appellations : - Nom commercial : RAIE ZERO
- Nom scientifique : Raia miraletus
- Autres appellations : Raie miroir - Raie fleurie - Raie papillon.

Famille : Rajidae

Taille : jusqu'à 50 cm

Signes distinctifs : Présence sur la face supérieure du corps de deux ocelles ressemblant à des zéros, d'où son nom.

Habitat : Poisson de fond - côtier.

Pêche : Chalut
Apports annuels à Abidjan : l'ensemble des raies et des guitares représente 400 à 500 tonnes environ.
Prix : de 700 à 1200 CFA la caisse.

Remarques : Cette raie est parfois et très incorrectement appelée "raie bouclée" à Abidjan. Cette appellation est mauvaise car la raie bouclée : Raia clavata (d'ailleurs absente des eaux tropicales) possède des "boucles", c'est-à-dire des sortes d'épines plus ou moins recourbées, sur les faces ventrale et dorsale.



Appellations : - Nom commercial : RAIE PERLEE

- Nom scientifique : Dasyatis margarita

- Autres appellations : Raie plate - Terre - Pastenague - Saakoui (Ebrié) - Koudouke (Appolonien) - Gbengbena (Alladian).

Famille : Dasyatidae

Taille : jusqu'à 50 cm

Signes distinctifs : Le centre du disque porte un tubercule ressemblant à une perle - la queue est très longue et fine, et porte à la base un ou deux aiguillons venimeux.

Habitat : Côtier - pénètre en lagune.

Pêche : Chalut

Prix : 1000 à 2000 CFA la caisse

Remarques : L'aiguillon caudal de la raie perlée est dangereux, car il est accompagné d'une glande à venin sous-cutanée... La piqure est très douloureuse et peut être dangereuse par les risques d'infection secondaire.

Il existe en fait deux espèces voisines : Dasyatis margarita dont la largeur ne dépasse pas 30 cm, et l'autre, nettement plus grande, dont la largeur peut dépasser 65 cm, espèce provisoirement dénommée Dasyatis sp.

Plus rarement, on rencontre aussi Dasyatis centroura (jusqu'à 3,3 mètres de longueur), qui porte de nombreux tubercules sur le dos et sur la queue.



Appellations : - Nom commercial : DIABLE DE MER
- Nom scientifique : Manta birostris, Mobula sp.
- Autres appellations : Mante - Raie manta - Raie cornue.

Famille : Mobulidae

Taille : jusqu'à 8 mètres d'envergure pour Manta birostris!

Signes distinctifs : Ce sont les "raies à cornes" très caractéristiques. Le genre Manta a la bouche terminale - une seule espèce : Manta birostris. Chez le genre Mobula, la bouche s'ouvre sur la face inférieure, et il existe 4 ou 5 espèces.

Habitat : Poissons pélagiques.

Pêche : Capture accidentelle - au Sénégal, les diables sont parfois chassés au harpon.
Les grosses raies sont vendues à la pièce de 2000 à 2800 CFA

Remarques : Les diables de mer sont capables de faire des sauts hors de l'eau et font un bruit terrible en retombant. Ce fait, joint à leur aspect effrayant, explique leur nom et les nombreuses légendes qui circulent à leur sujet. En réalité, ils semblent à peu près inoffensifs, sauf au moment de leur capture.
Les diables se nourrissent de proies très petites et se servent de leurs "cornes" pour amener la nourriture vers leur bouche.



Appellations : - Nom commercial : RAIE CHAUVE-SOURIS

- Nom scientifique : Rhinoptera marginata
- Autres appellations :

Famille : Myliobatidae

Taille : jusqu'à 1,5 mètre d'envergure.

Signes distinctifs : Tête proéminente avec deux lobes frontaux

Habitat : Côtier

Pêche : Chalut et filet tournant

Vendue généralement à la pièce.

Remarques :



Appellations : - Nom commercial : RAIE CASQUETTE
- Nom scientifique : Pteromylaeus bovina
- Autres appellations :

Famille : Myliobatidae

Taille : jusqu'à 1,5 mètre

Signes distinctifs : Tête proéminente avec un seul lobe frontal - Museau avançant comme la visière d'une casquette d'où son nom.

Habitat : Côtier

Pêche : Chalut et filet tournant.
Vendue généralement à la pièce.

Remarques :



Appellations : - Nom commercial : TARPON
- Nom scientifique : Megalops atlanticus
- Autres appellations :

Famille : Elopidae

Taille : jusqu'à 2 mètres

Signes distinctifs : Grand poisson blanc argenté dont la bouche s'ouvre vers le haut. Le dernier rayon de la nageoire dorsale est prolongé par un fouet. Les écailles sont très grandes (jusqu'à 8 à 10 cm).

Habitat : Pélagique côtier.

Pêche : Poisson de pêche sportive, rare au port.
Vendu à la pièce.

Remarques : Ce poisson est très recherché par les pêcheurs sportifs car sa capture est difficile, il peut sauter hors de l'eau jusqu'à plus de 2 mètres, et sa bouche est assez fragile. Sa chair est, par contre, peu estimée.



Appellations : - Nom commercial : FAUSSE GUINEE

- Nom scientifique : Elops lacerta

- Autres appellations : Guinée - Attiebete (Appolonien) Asranhoua (Ebrié) - Diglikari (Alladian).

Famille : Elopidae

Taille : jusqu'à 90 cm

Signes distinctifs : Long poisson argenté - grande bouche - paupière adipeuse développée.

Habitat : Pélagique côtier - peut pénétrer en lagune.

Pêche : Chalut

Apports et prix : voir 16

Remarques : A la différence de la guinée , la fausse guinée est fréquemment pêchée en lagune Abi.



Appellations : - Nom commercial : GUINEE
- Nom scientifique : Albula vulpes
- Autres appellations :

Famille : Albulidae

Taille : jusqu'à 50 cm

Signes distinctifs : Flancs argentés -dos légèrement verdâtre marqué de lignes plus foncées parallèles - paupière adipeuse développée.

Habitat : Pélagique côtier.

Pêche : Chalut, surtout en Juin, Juillet et Aout, au large de la Sierra Leone.
Apports annuels à Abidjan : de 300 à 500 tonnes environ.
Prix : de 2500 à 3500 CFA la caisse.

Remarques : Comme la fausse guinée, la guinée a une chair fine mais pourvue de trop nombreuses arêtes.



Appellations : - Nom commercial : RASOIR

- Nom scientifique : Ilisha africana

- Autres appellations : Plat-plat rasoir. Lala (Ebrié) - Nafran (Appolonien).

Famille : Clupeidae

Taille : jusqu'à 25 cm

Signes distinctifs : Poisson extrèmement aplati, en lame de couteau - le bord de l'abdomen présente des écailles en dents de scie - anale très longue.

Habitat : Côtier - peut pénétrer en lagune.

Pêche : Chalut surtout mais aussi filet tournant.

Apports annuels à Abidjan : environ 400 tonnes

Prix : de 500 à 1500 CFA la caisse.

Remarques : Le rasoir est peu recherché; chalutiers et sardiniers le rejettent le plus souvent, sauf quand il y a pénurie de poisson.



Appellations : - Nom commercial : AOUBE
- Nom scientifique : Ethmalosa dorsalis
- Autres appellations : Hareng de lagune - Ethmalose Ayouwo (Ebrié) - Ehoube (Appolonien).

Famille : Clupeidae

Taille : jusqu'à 45 cm

Signes distinctifs : Profils ventral et dorsal très convexes - écailles à bord postérieur irrégulier, donnant au poisson un aspect velouté - tache foncée arrondie fréquente derrière l'opercule.

Habitat : Côtier - les jeunes vivent en lagune.

Pêche : Filet tournant

Pêche surtout lagunaire. Cette espèce représente environ 70% des apports à Adiaké

Prix identique à celui du hareng à Abidjan.

Remarques : L'aoubé de la lagune Abi a été utilisé par la Société des Conserves de Côte d'Ivoire pour la confection de conserves du type "sardine à l'huile", il y a quelques années.

Cette tentative intéressante a été interrompue en raison d'un certain nombre de difficultés résultant, en particulier, du transport d'Adiaké à Abidjan, et aussi de l'irrégularité des apports.



Appellations : - Nom commercial : HARENG GROS YEUX — 19
- Nom scientifique : *Harengula rouxi*
- Autres appellations :

Famille : Clupeidae

Taille : jusqu'à 15 cm

Signes distinctifs : Ressemble à un petit hareng, mais possède des yeux proéminents et plus gros (occupant le tiers de la tête environ au lieu du quart chez *Sardinella eba*).

Habitat : Pélagique côtier

Pêche : Filet tournant
Sur le quai, il est toujours confondu avec le hareng de petite taille.

Remarques :



Appellations : - Nom commercial : HARENG (tropical)
- Nom scientifique : Sardinella eba
- Autres appellations : Sardinelle - Ayouwo (Ebrié) - Gran (Alladian) - Djandjerema (Appolonien).

Famille : Clupeidae

Taille : jusqu'à 30 cm

Signes distinctifs : Une tache noire en arrière de l'opercule - corps plus aplati que celui de Sardinella aurita (21), avec laquelle on peut le confondre. Aspect général rappelant effectivement le vrai hareng des mer nordiques.

Habitat : Poisson de surface, pélagique côtier. Pénètre en lagune.

Pêche : Filet tournant - c'est l'un des poissons les plus abondants de la côte ouest de l'Afrique où on le pêche toute l'année.

Apports à Abidjan : de 10.000 à 13.000 tonnes par an (et même 18.700 tonnes en 1971).

Prix : de 500 à 2500 CFA la caisse.

Remarques : C'est l'un des poissons les plus appréciés, surtout après fumage.

Sa composition chimique est sujette à des fluctuations importantes, le taux de matières grasses variant de 1% à plus de 10% du poids frais, le maximum se situant généralement vers octobre

L'appellation "hareng" est en France normalisée (AFNOR) pour l'espèce Clupea harengus, il est donc préférable d'ajouter à notre hareng le qualificatif "tropical" pour que la terminologie de langue française demeure, autant que possible, cohérente.



Appellations : - Nom commercial : SARDINELLE

- Nom scientifique : Sardinella aurita

- Autres appellations : Sardine (la véritable sardine, Sardinia pilchardus, est inconnue au sud du Rio de Oro) - Allache - Kankanman (Fanti).

Famille : Clupeidae

Taille : jusqu'à 30 cm

Signes distinctifs : Une tache noire sur le bord de l'opercule - une ligne jaune dorée longitudinale - corps plus arrondi que celui de Sardinella eba avec laquelle on peut la confondre.

Habitat : Poisson de surface, pélagique côtier.

Pêche : Filet tournant - se pêche au moment des remontées d'eau froide (23 à 25° en surface), surtout de Juillet à Septembre.
Apports à Abidjan : de 5000 à 12000 tonnes par an.

Prix : de 500 à 2500 CFA la caisse.

Remarques : Poisson apprécié dont le goût rappelle effectivement celui de la sardine. Plus gras en moyenne que le "hareng", ce poisson est sujet, lui aussi, à des fluctuations importantes de sa teneur en matières grasses, qui varie de 1% à plus de 15% du poids frais, le maximum se situant généralement vers Novembre.

En Côte d'Ivoire, Sardinella aurita et Sardinella eba sont surtout consommées après fumage.



Appellations : - Nom commercial : ANCHOIS
- Nom scientifique : Engraulis guineensis
- Autres appellations :

Famille : Engraulidae

Taille : jusqu'à 15 cm

Signes distinctifs : Poisson caractéristique à bouche très grande - une seule espèce signalée dans l'Atlantique tropical.

Habitat : Pélagique côtier - vit en bancs importants.

Pêche : Il n'y a pas de pêche à l'anchois en Côte d'Ivoire. Ce poisson excellent n'est donc pas consommé, et il est très rare sur le quai...mais il n'est pas rare dans le golfe de Guinée.

Remarques : L'anchois peut se consommer frais, en particulier en en friture.
En Europe, il sert surtout à faire des marinades maintenues à une température relativement élevée pour permettre une fermentation qui développe un arôme spécial très recherché.



Appellations : - Nom commercial : FAUSSE VIVE
- Nom scientifique : Trachinocephalus myops
- Autres appellations : Vive

Famille : Synodidae

Taille : jusqu'à 30 cm

Signes distinctifs : Tête comprimée - museau très court - grande bouche
Ressemble un peu à la vive, sans les épines

Habitat : Poisson de fond - plateau continental

Pêche : Pêché accidentellement, ce poisson n'est pas consommé en général

Remarques :



Appellations : - Nom commercial : TETRODON

- Nom scientifique : Ephippion guttifer

- Autres appellations : Lapin - Gboto (Ebrié) - Saouama (Appolonien) - Ekénien (Alladian).

Famille : Tetraodontidae

Taille : jusqu'à 70 cm

Signes distinctifs : Denture ressemblant grossièrement à celle du lapin
Ce poisson possède en outre la propriété de pouvoir se gonfler d'eau ou d'air lorsqu'il est attaqué.

Habitat : Côtier - pénètre en lagune

Pêche : Pêche et vente interdites par le décret présidentiel du 11 - 1 - 1967 sur les poissons vénéneux.

Remarques : Il existe d'autres espèces de tétrodons en Côte d'Ivoire : Lagocephalus laevigatus, Spheroïdes splengeri, etc..., tous possèdant la denture caractéristique et la propriété de pouvoir se gonfler.

Ephippion guttifer a été la cause d'un accident mortel à Abidjan en 1966, car si la chair de ce poisson est parfaitement consommable, ses viscères, par contre, sont extrêmement toxiques, en particulier les ovaires, dont quelques grammes peuvent suffire à tuer un homme... Le poison responsable, la "tétrodontoxine", résiste à la chaleur de la cuisson.



Appellations : - Nom commercial : POISSON-LAMPE - 25
- Nom scientifique : Chilomycterus antennatus
- Autres appellations : Porc-épic.

Famille : Diodontidae

Taille : jusqu'à 30 cm

Signes distinctifs : Corps couvert d'épines et pouvant se gonfler - dents soudées en un seul bloc sur chaque mâchoire

Habitat : Côtier

Pêche : Accidentelle

Poisson vénéneux interdit à la consommation par décret présidentiel du 11 - 1 - 1967.
Sa peau peut être vendue pour faire des abat-jour, d'où son nom de "poisson-lampe".

Remarques : Chilomycterus antennatus est l'espèce la plus commune, mais il existe d'autres diodontidae : Chilomycterus reticulatus qui peut atteindre 60 cm, et Diodon maculatus, ce dernier très rare.



Appellations : - Nom commercial : POISSON-LUNE
- Nom scientifique : Mola mola
- Autres appellations : Mole

Famille : Molidae

Taille : jusqu'à 3 mètres (2000 kg).

Signes distinctifs : Corps raccourci par atrophie du pédoncule caudal et très comprimé latéralement - tête peu distincte du tronc - nageoires ventrales absentes.

Habitat : Poisson pélagique

Pêche : Poisson non pêché, très rare sur le port.

Remarques : La chair du poisson-lune est très médiocre, gélatineuse, sans aucun intérêt alimentaire. De plus, ce poisson est toujours bourré de parasites.



Appellations : - Nom commercial : MACHOIRON
- Nom scientifique : Arius sp.
- Autres appellations : Gangangri (Ebrié et Alladian)
Ebo (Appolonien).

Famille : Ariidae

Taille : jusqu'à 80 cm

Signes distinctifs : Peau sans écailles - trois paires de barbillons - pectorales et première dorsale munies d'une très forte épine - deuxième dorsale adipeuse - il existe plusieurs espèces voisines.

Habitat : Poisson de fond côtier et lagunaire.

Pêche : Chalut

Apports à Abidjan de l'ordre de 400 à 500 tonnes par an.

Prix : de 500 à 3000 CFA la caisse.

Remarques : La famille des Ariidae comporte aussi quelques espèces strictement d'eau douce.

Les Arius pratiquent l'incubation buccale de leurs oeufs : ceux-ci sont avalés par le mâle après la fécondation et conservés soigneusement dans la bouche jusqu'à l'éclosion. Pendant toute la durée de l'incubation, le poisson porteur ne mange pas et vit sur ses réserves.

Ce mode d'incubation assure aux oeufs le maximum de protection.



Appellations : - Nom commercial : MURENE
- Nom scientifique : Nombreuses espèces
- Autres appellations : Serpent de mer

Famille : Muraenidae

Taille : jusqu'à 1,3 mètre

Signes distinctifs : Poisson serpentiforme sans écailles - nageoires pectorales absentes - mâchoires puissantes.

Habitat : Poisson de fond rocheux - côtier

Pêche : Capturées accidentellement, les murènes ne sont pas consommées à Abidjan.

Remarques : Les murènes ont une chair très fine et très renommée, surtout en Méditerranée.

Les principaux genres de la famille des Muraenidae sont :

-Muraena
-Lycodontis
-Gymnothorax



Appellations : - Nom commercial : POISSON-SERPENT — 29
- Nom scientifique : *Pisodonophis semicinctus*
- Autres appellations : Serpent de mer

Famille : Ophichtyidae

Taille : jusqu'à 80 cm

Signes distinctifs : Poisson serpentiforme, sans écailles - nageoires pectorales présentes - belle coloration jaune marquée de taches brunes.

Habitat : Côtier

Pêche : Capturé accidentellement, ce poisson n'est pas consommé.

Remarques :



Appellations : - Nom commercial : CONGRE
- Nom scientifique : Cynoponticus ferox
- Autres appellations :

Famille : Muraenesocidae

Taille : jusqu'à 2 mètres

Signes distinctifs : Poisson serpentiforme sans écailles - nageoires pectorales présentes - dents caniniformes.

Habitat : Poisson de fond

Pêche : Chalut
Apports annuels à Abidjan : de 100 à 130 tonnes
Prix : de 500 à 1000 CFA la caisse.
Le congre est surtout pêché de Juillet à Octobre.

Remarques : Le congre a une chair fade, parfois caoutchouteuse...
Il est surtout recherché pour les soupes de poisson.



Strongylura crocodila



Hemirhamphus sp.



Hyporhamphus sp.

AIGUILLE - 31
AIGUILLETTE - 32

Appellations : - Nom commercial : Strongylura crocodila (31)
- Nom scientifique : Hemirhamphus sp. (32)
- Autres appellations : Hyporhamphus sp

Famille : Belonidae

Taille : jusqu'à 1,5 mètre pour Strongylura crocodila

Signes distinctifs : Poissons caractéristiques. L'aiguille a les deux mâchoires très allongées, et l'aiguillette seulement la mâchoire inférieure.

Habitat : Pélagique côtier.

Pêche : Filet tournant

Les aiguillettes ne sont pas consommées.

Remarques :



Appellations : - Nom commercial : POISSON-VOLANT

- Nom scientifique : Nombreuses espèces
- Autres appellations :

Famille : Exocoetidae

Taille : jusqu'à 45 cm

Signes distinctifs : Nageoires pectorales très développées - mâchoires courtes

Habitat : Pélagique

Pêche : Capture accidentelle

Remarques : Les poissons-volants sont capables de s'élancer hors de l'eau après avoir acquis une vitesse suffisante par des battements précipités de leur queue, dont le lobe inférieur est plus développé que le lobe supérieur. Ils peuvent ensuite planer grâce à leurs nageoires pectorales déployées.
Chez certaines espèces, les nageoires ventrales très développées participent à la sustentation (type biplan).
Il faut noter qu'en aucun cas les poissons-volants ne battent des "ailes", c'est-à-dire des pectorales.



Appellations : - Nom commercial : POISSON-TROMPETTE - 34
- Nom scientifique : Fistularia tabaccaria
- Autres appellations :

Famille : Fistulariidae

Taille : jusqu'à 1 mètre

Signes distinctifs : Corps très allongé, peau sans écailles, museau en tube, queue prolongée par un long filament

Habitat : Côtier

Pêche : Pêché accidentellement, ce poisson n'est pas consommé.

Remarques :



Appellations : - Nom commercial : HIPPOCAMPE
- Nom scientifique : Hippocampus sp.
- Autres appellations :

Famille : Syngnathidae

Taille : jusqu'à 15 cm

Signes distinctifs : Forme absolument caractéristique
Deux espèces très voisines

Habitat : Côtier et lagunaire

Pêche :

Remarques : La reproduction de l'hippocampe est extraordinaire : la femelle dépose ses oeufs dans une poche que le mâle porte sur le ventre. Les oeufs sont fécondés au passage, puis se développent dans la poche ventrale du mâle qui "accouche" après une gestation de durée variable suivant les espèces...
A la naissance, les petits sont expulsés un à un de la poche paternelle. En somme, chez l'hippocampe, la femelle est ovipare et le mâle vivipare!



Appellations : - Nom commercial : BARRACUDA
- Nom scientifique : Sphyraena piscatorum
- Autres appellations : Brochet - Grande bécune. Akouatcha (Ebrié) - Ekoudi (Appolonien) - Okotcha (Alladian).

Famille : Sphyraenidae

Taille : jusqu'à 2 mètres

Signes distinctifs : Corps allongé, presque cylindrique - mâchoire inférieure proéminente - denture puissante.

Habitat : Côtier et lagunaire

Pêche : Chalut et surtout filet tournant.

Apports annuels à Abidjan : 450 tonnes environ.

Prix : les petits barracuda se vendent de 1500 à 4500 CFA la caisse, et les gros 2000 CFA la pièce environ.

Remarques : Il existe d'autres espèces voisines de Sphyraenidae : Sphyraena sphyraena, dont la taille ne dépasse jamais 60 cm, Sphyraena dubia et Sphyraena barracuda, qui peuvent atteindre 2 mètres.

L'habitude, sur le port d'Abidjan, est d'appeler barracuda les gros spécimens, et brochet les petits.
Il est préférable d'abandonner l'appellation brochet, qui est très incorrecte, puisque le véritable brochet est un poisson des eaux douces froides ou tempérées.

Fine et appréciée, la chair du barracuda est parfois responsable, aux Antilles, d'intoxications de type ciguatérique.



Appellations : - Nom commercial : MULET

- Nom scientifique : Mugil sp.

- Autres appellations : Muge - Afa (Ebrié) - Atibete (Appolonien) - Efa (Alladian).

Famille : Mugilidae

Taille : jusqu'à 50 cm

Signes distinctifs : Poisson fusiforme, épais - tête large et plate - museau court - grandes écailles.

Il existe de nombreuses espèces de mulet.

Habitat : Côtier et lagunaire.

Pêche : Capturé accidentellement en mer, il est plus fréquemment pêché dans certaines lagunes.

Très rare au port d'Abidjan.

Remarques : Dans certains pays, on fabrique avec les oeufs de mulet une sorte de caviar appelé "boutargue".



Appellations : - Nom commercial : GROS CAPITAINE

- Nom scientifique : Polydactylus quadrifilis

- Autres appellations : Assan (Ebrié) - Ehouadjo (Appolonien) - Ebokro (Alladian).

Famille : Polynemidae

Taille : jusqu'à 2 mètres

Signes distinctifs : Corps allongé, museau arrondi - nageoires pectorales très basses accompagnées chacune de quatre filaments libres - queue très longue.

Habitat : Côtier et lagunaire.

Pêche : Chalut surtout et filet tournant.
Vendu à la pièce de 1000 à 2000 CFA.

Remarques : Le gros capitaine est très commun dans les lagunes, mais les plus gros spécimens sont capturés en mer.



Appellations : - Nom commercial : PETIT CAPITAINE

- Nom scientifique : Galeoïdes decadactylus

- Autres appellations : Assan (Ebrié) - Obo (Alladian) Abogne (Appolonien).

Famille : Polynemidae

Taille : jusqu'à 45 cm

Signes distinctifs : Corps allongé, museau arrondi, proéminent - nageoires pectorales basses accompagnées chacune de neuf à dix filaments libres.

Habitat : Côtier et lagunaire

Pêche : Chalut surtout et filet tournant.

Apports annuels à Abidjan : de 1500 à 1800 tonnes (gros capitaine compris).

Prix : de 1000 à 3000 CFA la caisse

Remarques : La chair des capitaines est délicate et très appréciée en Côte d'Ivoire.



Appellations : - Nom commercial : FRITURE-MOUSTACHE
- Nom scientifique : Pentanemus quinquarius
- Autres appellations : Friture à barbe.

Famille : Polynemidae

Taille : jusqu'à 35 cm

Signes distinctifs : Museau court - nageoires pectorales présentant chacune cinq rayons libres très longs dont deux dépassent nettement la longueur du corps.

Habitat : Côtier

Pêche : Chalut

Prix : de 500 à 1600 CFA la caisse.

Remarques :



Appellations : - Nom commercial : MERLU
- Nom scientifique : Merluccius polli
- Autres appellations :

Famille : Merluccidae

Taille : jusqu'à 50 cm

Signes distinctifs : Corps allongé - museau arrondi - dents aigües. Coloration grise plus ou moins foncée - écailles petites.

Habitat : Poisson de fond du talus continental (150 à 500 mètres).

Pêche : Capture accidentelle
Extrèmement rare sur le quai.

Remarques : Merluccius polli est sporadiquement pêché par les gros chalutiers russes ou polonais au large du Sénégal et de la Mauritanie.
C'est un poisson à chair maigre très blanche.

Le merlu d'Europe, Merluccius merluccius (baptisé colin à Paris) peut atteindre 1 mètre.



Appellations : - Nom commercial : CORYPHENE
- Nom scientifique : Coryphaena hippurus
- Autres appellations : Poisson machette

Famille : Coryphaenidae

Taille : jusqu'à 1,5 mètre

Signes distinctifs : Corps très allongé, comprimé latéralement- nageoire dorsale unique très longue - tête très raccourcie à profil busqué - ecailles très petite Dos bleu-vert, ventre et caudale jaunes.

Habitat : Pélagique

Pêche : Ligne - pêche sportive surtout

Remarques : Il existe chez ce poisson une certaine différence entre les femelles et les mâles, ces derniers ayant un profil nettement plus busqué.

La coryphène fait une chasse active aux poissons-volants et aux sardinelles.
Sa chair est délicieuse.



Appellations : - Nom commercial : MEROU

- Nom scientifique : Epinephelus aeneus

- Autres appellations : Dadassou (Ebrié) - Ekoue (Appolonien) - Orousin (Alladian).

Famille : Serranidae

Taille : jusqu'à 90 cm

Signes distinctifs : Présence sur l'opercule de deux épines inégales séparées par une encoche - trois lignes obliques claires sur les joues - onze rayons épineux à la dorsale - coloration grisâtre plus ou moins bronzée.

Habitat : Poisson de fond côtier - peut pénètrer en lagune.

Pêche : Chalut surtout - ligne

Prix : de 3000 à 5000 CFA la caisse.

Les gros spécimens se vendent à la pièce.

Remarques : Il existe d'autres mérous du genre Epinephelus, possèdant aussi onze rayons épineux à la dorsale et deux épines sur l'opercule, mais différant par la coloration, en particulier : Epinephelus goreensis et Epinephelus gigas qui peuvent atteindre 1,5 mètre, et qui vivent davantage en profondeur que Epinephelus aeneus.

Les mérous ont une chair délicieuse particulièrement appréciée.



Appellations : - Nom commercial : MEROU
- Nom scientifique : Promicrops esonue
- Autres appellations :

Famille : Serranidae

Taille : jusqu'à 2 mètres et plus

Signes distinctifs : Mérou de grande taille - dorsale épineuse basse.

Habitat : Poisson de fond très côtier

Pêche : Surtout à la ligne.
Très rare au port de pêche.

Remarques : Promicrops esonue est le plus grand mérou de l'ouest africain



Appellations : - Nom commercial : MOTARD
- Nom scientifique : Priacanthus arenatus
- Autres appellations : Gros-yeux

Famille : Priacanthidae

Taille : jusqu'à 45 cm

Signes distinctifs : Poisson de coloration entièrement rouge à très gros yeux - bouche oblique et menton proéminent.

Habitat : Poisson de fond - plateau continental.

Pêche : Chalut

Prix : de 500 à 1400 CFA la caisse.

Remarques : Le motard a une peau épaisse et une chair peu appréciée. Il est souvent rejeté par les chalutiers.



Appellations : - Nom commercial : CARPE ROUGE

- Nom scientifique : Lutjanus goreensis

- Autres appellations : Kessan (Ebrié) - Aidjoin (Alladian) - Toumakpan (Appolonien).

Famille : Lutjanidae

Taille : jusqu'à 80 cm

Signes distinctifs : Corps comprimé latéralement - opercule sans épines Belle coloration rose ou rouge vif avec une ligne foncée bleue sur le vivant sous l'oeil - écailles relativement grandes.

Habitat : Poisson de fond côtier - peut pénétrer en lagune.

Pêche : Chalut surtout - filet tournant - ligne.

Prix : les petites carpes rouges sont vendues 2500 à 5000 CFA la caisse

les grosses sont vendues à la pièce.

Remarques : Il existe en fait plusieurs espèces voisines, Lutjanus goreensis n'étant que la plus commune.

La chair de ce poisson est très estimée.



Appellations : - Nom commercial : CARPE METIS - 46
- Nom scientifique : Pomadasys incisus
- Autres appellations :

Famille : Pomadasyidae

Taille : jusqu'à 30 cm

Signes distinctifs : Corps comprimé latéralement - coloration unie gris argenté - une tache foncée sur le bord d l'opercule - nageoires jaunâtres.

Habitat : Poisson de fond côtier et lagunaire.

Pêche : Chalut - ligne.

Remarques : Ce poisson, comme bien d'autres de la famille des Pomadasyidae (voir 47 et 48), "grogne" parfois quand on le sort de l'eau. Ces grognements proviennent de la vessie natatoire.

Parmi les autres "grondeurs" ou "ronfleurs" il faut citer les Latilidae (49), les Sciaenidae (51 à 59), les Triglidae (104), etc...



Appellations : - Nom commercial : CARPE BLANCHE

- Nom scientifique : *Pomadasys jubelini*

- Autres appellations : Fruite de mer (en poissonnerie) Assiman (Ebrié) - Saboué (Appolonien) - Kprékpré (Alladian).

Famille : Pomadasyidae

Taille : jusqu'à 60 cm

Signes distinctifs : Corps comprimé latéralement - dos parsemé de taches sombres non disposées en rangées régulières.

Habitat : Poisson de fond côtier et lagunaire.

Pêche : Chalut - ligne
Apports annuels à Abidjan : de l'ordre de 800 à 900 tonnes, (*Pomadasys incisus* inclus)

Remarques : Poisson à chair délicate très appréciée.

Il existe une espèce voisine : *Pomadasys rogeri*, qui semble plus abondante au large de la Sierra Leone, et caractérisée par un museau plus pointu et une ou deux taches jaune vif sur les côtés de la tête.



Appellations : - Nom commercial : CARPE BRUNE - 47 bis
- Nom scientifique : Diagramma mediterraneus
- Autres appellations : Vieille - Burro (halles de Paris)

Famille : Pomadasyidae

Taille : jusqu'à 60 cm

Signes distinctifs : Corps comprimé latéralement - front haut - coloration brun-violacé,plus claire sur le ventre.

Habitat : Poisson de fond côtier .

Pêche : Chalut
rare

Remarques : Ce poisson,commun au large du Sénégal,est rarement débarqué à Abidjan,où il est parfois baptisé du nom de "vieille" L'appellation "carpe brune" serait bien préférable..



Appellations : - Nom commercial : FRITURE
- Nom scientifique : Brachydeuterus auritus
- Autres appellations :

Famille : Pomadasyidae

Taille : jusqu'à 24 cm

Signes distinctifs:: Museau court et arrondi - oeil relativement gros. Coloration argentée - une grosse tache noire sur le bord postérieur de l'opercule.

Habitat : Semi-pélagique côtier.

Pêche : Filet tournant et chalut.
C'est l'espèce marine la plus importante de Côte d'Ivoire, après les sardinelles.
Apports annuels à Abidjan : environ 6000 tonnes.

Prix : de 500 à 1500 CFA la caisse.

Remarques : Bien que pouvant atteindre 24 cm, la taille moyenne de ce poisson à Abidjan est de l'ordre de 10 cm, d'où son nom de "friture".

Brachydeuterus auritus a un genre de vie intermédiaire entre celui des poissons de fond et celui des poissons de surface : il est semi-pélagique avec tendance à se tenir vers le fond durant le jour et à remonter en surface la nuit.
Sur le plan gustatif, ce petit poisson est assez apprécié, mais il est fragile et s'altère rapidement; aussi est-il souvent rejeté par les chalutiers, pour lesquels sa valeur marchande est insuffisante.



Appellations : - Nom commercial : FRITURE ARGENTEE
- Nom scientifique : Gerres melanopterus
- Autres appellations : Mle (Ebrié) - Noupoussiva (Alladian) - Ngoissan (Appolonien).

Famille : Gerridae

Taille : jusqu'à 23 cm

Signes distinctifs : Museau conique - bouche pouvant s'allonger en un tube dirigé vers le bas - coloration argentée - une tache noire au sommet de la première dorsale.

Habitat : Très côtier et lagunaire.

Pêche : Chalut - senne de rivage.
Pour la vente, cette friture est confondue avec Brachydeuterus auritus et vendue au même prix.

Remarques : Il existe une autre espèce très voisine et plus rare qui n'a pas de tache noire sur la première dorsale et qui présente des bandes verticales foncées sur les flancs : Gerres octactis.



Appellations : - Nom commercial : ZEBRE - 50
- Nom scientifique : Latilus semifasciatus
- Autres appellations :

Famille : Latilidae

Taille : jusqu'à 60 cm

Signes distinctifs : Poisson caractéristique - corps comprimé aux très belles couleurs sur le vivant : flancs jaunes dorés zébrés de bandes verticales gris-mauve - nageoires roses ou mauves.

Habitat : Poisson de fond - plateau continental.

Pêche : Chalut
Se pêche surtout en septembre.
Prix : de 500 à 1000 CFA la caisse.

Remarques : Latilus semifasciatus est la seule espèce de Latilidae signalée dans l'Atlantique tropical africain.



Appellations : - Nom commercial : VIEILLE
- Nom scientifique : Umbrina steindachneri
- Autres appellations :

Famille : Sciaenidae

Taille : jusqu'à 50 cm

Signes distinctifs : Poisson très caractéristique par sa coloration bigarrée : présence sur le corps et sur les côtés de la tête de bandes sinueuses gris-bleu bordées de noir - un barbillon au menton.

Habitat : Poisson de fond côtier.

Pêche : Chalut
Assez rare, ce poisson n'apparait sur le quai qu'à certaines époques de l'année.

Remarques : En principe, les "vieilles" sont des poissons aux vives couleurs appartenant à la famille des labridae. Cette famille étant à peu près absente au port de pêche d'Abidjan, l'habitude a été prise d'appeler "vieille" cette ombrine très colorée.

Chez ce poisson, comme chez tous les Sciaenidae (fiche 51 à 58), la ligne latérale se poursuit sur la nageoire caudale.



Appellations : - Nom commercial : OMBRINE NOIRE - 52
- Nom scientifique : Umbrina canariensis
- Autres appellations :

Famille : Sciaenidae

Taille : jusqu'à 50 cm

Signes distinctifs : Poisson de couleur sombre à reflets dorés avec des lignes foncées obliques irrégulières - un barbillon au menton.

Habitat : Poisson de fond côtier.

Pêche : Chalut

Remarques : L'appellation "ombrine noire" est imprécise et s'applique également à Pseudotolithus moori (voir 52 bis).



Appellations : - Nom commercial : OMBRINE NOIRE - 52 bi
- Nom scientifique : Pseudotolithus moori
- Autres appellations :

Famille : Sciaenidae

Taille : jusqu'à 40 cm

Signes distinctifs : Poisson de coloration sombre brun-mauve uniforme - museau court tronqué - pas de barbillon au menton.

Habitat : Poisson de fond côtier.

Pêche : Chalut

Remarques : L'appellation "ombrine noire" est imprécise puisqu'elle s'applique également à Umbrina canariensis (voir 52).



Appellations : - Nom commercial : CARPE NOIRE - 54
- Nom scientifique : Pseudotolithus epipercus
- Autres appellations :

Famille : Sciaenidae

Taille : jusqu'à 40 cm

Signes distinctifs : Museau court et arrondi - coloration gris-argenté dos brunâtre - lignes obliques foncées sur les flancs - petites taches noires à la base des nageoires dorsales.

Habitat : Côtier et lagunaire.

Pêche : Chalut

Prix : de 500 à 1500 CFA la caisse.

Remarques : Cette espèce ressemble au "bobo" (voir 55), mais elle est beaucoup plus rare.



Appellations : - Nom commercial : OMBRINE SOSSO
- Nom scientifique : Pseudotolithus typus
- Autres appellations :

Famille : Sciaenidae

Taille : jusqu'à 80 cm

Signes distinctifs : Corps très fusiforme - tête presque cylindrique moins haute que le corps - coloration argentée avec des lignes obliques peu marquées ou absentes.

Habitat : Poisson de fond côtier.

Pêche : Chalut surtout.
Apports : voir 56
Prix : de 2000 à 3800 CFA la caisse.

Remarques : Cette espèce ressemble à l'ombrine (56), mais elle est plus rare et sa chair est plus fine et plus appréciée.



Appellations : - Nom commercial : BOBO
- Nom scientifique : Pseudotolithus elongatus
- Autres appellations : Vovoba (Ebrié) - Vovo (Alladian) Eze (Appolonien).

Famille : Sciaenidae

Taille : jusqu'à 45 cm

Signes distinctifs : Museau très court et arrondi - coloration argentée - dos brunâtre - deuxième épine anale particulièrement développée sensiblement aussi longue que les rayons mous de la nageoire.

Habitat : Très côtier et lagunaire.

Pêche : Chalut surtout - près des embouchures des rivières ou des lagunes
Apports annuels à Abidjan : 100 tonnes environ.
Prix : de 1000 à 2500 CFA la caisse.

Remarques : Cette espèce ressemble à la carpe noire (53), mais sa coloration est plus claire, et elle ne possède pas de ligne longitudinale de taches noires à la base des nageoires dorsales ; elle présente, par contre, une épine anale plus grosse.



Appellations : - Nom commercial : OMBRINE
- Nom scientifique : Pseudotolithus senegalensis
- Autres appellations :

Famille : Sciaenidae

Taille : jusqu'à 1 mètre

Signes distinctifs : Corps fusiforme gris argenté - des points foncés disposés en lignes obliques nettes sur les flancs.

Habitat : Poisson de fond côtier.

Pêche : Chalut surtout.

Apports annuels à Abidjan : de l'ordre de 2000 à 2500 tonnes pour toutes les ombrines.

Prix : de 1000 à 2500 CFA la caisse.

Remarques : Cette espèce ressemble beaucoup au "sosso" mais sa coloration est plus sombre, elle porte sur les flancs des lignes plus nettes et sa tête est moins aplatie.

Il existe une autre espèce très voisine mais plus claire avec des lignes obliques encore plus nettes : Pseudotolithus brachygnathus.



Appellations : - Nom commercial : COURBINE
- Nom scientifique : Argyrosoma hololepidotum
- Autres appellations : Maigre - Aigle-bar.

Famille : Sciaenidae

Taille : jusqu'à 2 mètres

Signes distinctifs : Grand poisson fusiforme de coloration argentée chez les jeunes, gris-verdâtre chez les adultes - une tache plus ou moins visible sur l'opercule.

Habitat : Semi-pélagique côtier.

Pêche : Filet tournant
Rare au port d'Abidjan.

Remarques : La chair de la courbine , assez appréciée, ressemble, en moins fine, à celle du "loup" ou "bar" des eaux tempérées (Morone labrax).



Appellations : - Nom commercial : FRITURE BLANCHE
- Nom scientifique : Pteroscion peli
- Autres appellations :

Famille : Sciaenidae

Taille : jusqu'à 25 cm

Signes distinctifs : Corps très comprimé, relativement court - bouche fendue très obliquement - couleur argentée - nageoires incolores - généralement une tache au milieu de l'opercule.

Habitat : Poisson de fond côtier.

Pêche : Chalut

Prix : de 500 à 1500 CFA la caisse.

Remarques : Ce poisson est confondu dans les statistiques avec Brachydeuterus auritus (48) et Gerres melanopterus (49), mais c'est Brachydeuterus auritus qui est de loin la plus importante.



Appellations : - Nom commercial : POISSON-BANANE
- Nom scientifique : Elagatis bipinnulatus
- Autres appellations :

Famille : Carangidae

Taille : jusqu'à 1,1 mètre

Signes distinctifs : Poisson de grande taille ayant la nageoire anale nettement plus courte que la deuxième dorsale - une pinnule isolée en arrière de l'anale et de la dorsale - des bandes longitudinales orangées et bleutées sur le corps.

Habitat : Pélagique

Pêche : Il est surtout pêché par les thoniers à la ligne de traîne. Il est assez rare au quai.

Remarques : On l'appelle "poisson-banane" parce que les pêcheurs bretons l'échangeaient contre des bananes dans les îles Annobom et São Thomé.

La chair de ce poisson est fine, mais des essais de conserve "au naturel" effectués il y a quelques années à Abidjan se sont révèlés décevants...



Appellations : - Nom commercial : SERIOLE
- Nom scientifique : Seriola dumerili
- Autres appellations : Thon saumoné (en poissonnerie)

Famille : Carangidae

Taille : jusqu'à 1,2 mètre

Signes distinctifs : Anale plus courte que la deuxième dorsale - pas de pinnules isolées en arrière de la dorsale ni de l'anale - coloration brun-rose avec des bandes latérales jaune doré.

Habitat : Pélagique

Pêche : Pêché à la ligne, ce poisson est assez rare.

Remarques : Cet excellent poisson est vendu en poissonnerie sous le nom de "thon saumoné"...sa chair, en effet, présente une coloration analogue à celle du saumon.



Trachurus trecae



Decapterus punctatus

Appellations : - Nom commercial : CHINCHARD — 61
- Nom scientifique : Trachurus trecae
- Autres appellations : Decapterus sp.

Famille : Carangidae

Taille : jusqu'à 25 cm pour Decapterus, 35 cm pour Trachurus.

Signes distinctifs : Trachurus : ligne latérale armée de scutelles (sorte de piquants) sur toute sa longueur - pas de pinnules isolées.
Decapterus : ligne latérale armée de scutelles en partie postérieure seulement - une pinnule nettement détachée derrière la dorsale et l'anale.

Habitat : Pélagique côtier.

Pêche : Filet tournant (souvent mêlé aux sardinelles) - chalut.

Apports : voir 61 bis.

Prix : de 500 à 2500 CFA la caisse.

Remarques : Bien que pouvant atteindre 35 cm, Trachurus trecae est généralement plus petit à Abidjan.

Il existe d'autres chinchards du genre Trachurus : Trachurus trachurus et Trachurus picturatus, mais ils sont très rarement débarqués à Abidjan.



Caranx rhonchus



Selar crumenophtalmus

Appellations : - Nom commercial : CHINCHARD
- Nom scientifique : Caranx rhonchus
- Autres appellations : Selar crumenophtalmus

Famille : Carangidae

Taille : jusqu'à 60 cm

Signes distinctifs : Chinchards de grande taille au corps plus trapu - scutelles sur la partie postérieure de la ligne latérale seulement. Selar a un oeil très gros et un bouton charnu sous l'opercule, à la différence de Caranx rhonchus

Habitat : Pélagique côtier

Pêche : Filet tournant et chalut

Apports annuels à Abidjan (pour tous les chinchards) : de l'ordre de 400 tonnes environ. (1000 tonnes en 1971).

Prix : de 3000 à 4000 CFA la caisse.

Remarques : Les chalutiers pêchent surtout les chinchards au large du Ghana et de la Sierra Leone.



Appellations : - Nom commercial : JAPON NOIR
- Nom scientifique : Caranx crysos
- Autres appellations :

Famille : Carangidae

Taille : jusqu'à 60 cm

Signes distinctifs : Corps fusiforme moins comprimé que celui du japon (Caranx carangus)- coloration grisâtre plus foncée sur le dos.

Habitat : Pélagique

Pêche : Filet tournant - ligne

Remarques :



Appellations : - Nom commercial : JAPON

- Nom scientifique : Caranx carangus

- Autres appellations : Carangue - Gouégoué (Ebrié) - Égbre (Appolonien) - Inmouhoui (Alladian).

Famille : Carangidae

Taille : jusqu'à 1,2 mètre

Signes distinctifs : Corps élevé et comprimé latéralement - museau busqué - nageoires verticales jaune vif - corps argenté, dos vert-jaune.

Habitat : Pélagique côtier. Peut pénétrer en lagune.

Pêche : Filet tournant - ligne - senne de rivage.

Apports : voir 64

Prix : généralement vendu à la pièce.

Remarques : La pêche au japon la nuit en surface est très spectaculaire, car il semble émettre une lumière bleutée, un "feu" comme disent les marins. Ce phénomène est dû à l'agitation du plancton luminescent causée par le passage rapide du poisson.



Caranx senegalus

Appellations : - Nom commercial : PETIT JAPON - 64
- Nom scientifique : Caranx hippos
- Autres appellations : Caranx senegalus

Famille : Carangidae

Taille : jusqu'à 50 cm

Signes distinctifs : Caranx hippos ressemble au japon, en plus petit, avec des nageoires blanches. Caranx senegalus a un profil moins busqué - la rangée de scutelles latérales est beaucoup plus longue que chez Caranx hippos - sa taille est aussi plus petite.

Habitat : Pélagique côtier - peuvent pénétrer en lagune.

Pêche : Filet tournant - ligne - senne de rivage

Apports annuels à Abidjan (pour tous les japons) de l'ordre de 100 à 200 tonnes.

Prix : de 2000 à 3000 CFA la caisse.

Remarques :



Appellations : - Nom commercial : LICHE - 65
- Nom scientifique : Lichia amia
- Autres appellations :

Famille : Carangidae

Taille : jusqu'à 1 mètre

Signes distinctifs : Corps allongé et comprimé - museau pointu - ligne latérale sans scutelles décrivant une courbe vers le bas - première dorsale réduite à quelques épines isolées - corps argenté.

Habitat : Pélagique côtier - peut pénétrer en lagune.

Pêche : Filet tournant - ligne - chalut.

Apports : voir 66

Prix : voir 66

Remarques :



Appellations : - Nom commercial : HIRONDELLE

- Nom scientifique : Lichia glauca

- Autres appellations : Nébé (Ebrié) - Akparaman (Apolonien) - Naniaranzoba (Alladian).

Famille : Carangidae

Taille : jusqu'à 35 cm

Signes distinctifs : Corps allongé et comprimé - museau moins pointu et bouche plus petite que la liche - ligne latérale droite sans scutelles, mais pourvue de quelques taches - première dorsale à épines indépendantes - dorsale, anale et caudale à extrèmités noires.

Habitat : Pélagique côtier - pénètre en lagune.

Pêche : Filet tournant - ligne - chalut.

Apports annuels à Abidjan de l'ordre de 300 tonnes environ.

Prix : de 1700 à 2500 CFA la caisse.

Remarques : Ce poisson a été baptisé "hirondelle" parce qu'il saute dans le filet en rasant l'eau quand il est pris.

Les apports indiqués plus haut concernent non seulement Lichia glauca et Lichia amia (plus rare), mais aussi Stromateus fiatola (fiche 101), qui, pour la vente est confondu avec les liches.

Sont aussi appelées "hirondelle" deux espèces voisines : Trachinotus glaucus et T. goreensis qui ont le museau plus court et les premiers rayons des nageoires dorsales et anale plus longs que Lichia glauca.



Appellations : - Nom commercial : LIRIOT
- Nom scientifique : Lichia vadigo
- Autres appellations : Liche

Famille : Carangidae

Taille : jusqu'à 50 cm

Signes distinctifs : Corps allongé, moyennement comprimé - bouche grande - coloration gris-vert du dos prolongée sur les flancs par de courtes lignes verticales.

Habitat : Pélagique côtier

Pêche : Rare à Abidjan, ce poisson est plus fréquent au large de la Mauritanie.

Remarques : Cette liche n'a pas d'appellation commune à Abidjan. Liriot est le nom utilisé aux Halles de Paris.



Appellations : - Nom commercial : PLAT PLAT - 68
- Nom scientifique : Chloroscombrus chrysurus
- Autres appellations : Médaille

Famille : Carangidae

Taille : jusqu'à 60 cm

Signes distinctifs : Corps ovale très comprimé latéralement - corps blanc, jaune verdâtre sur le dos - une tache noire sur le bord de l'opercule et une autre à la naissance de la queue - écailles très petites.

Habitat : Très côtier - peut pénétrer en lagune.

Pêche : Filet tournant (souvent mêlé au hareng) - chalut.

Apports : voir 69
Prix : de 500 à 1500 CFA la caisse.

Remarques : Bien que pouvant atteindre 60 cm, ce poisson est en général beaucoup plus petit à Abidjan : de l'ordre de 15 cm. Quand il est très petit, il est appelé "médaille" et est en principe rejeté.



Appellations : - Nom commercial : MUSSO

- Nom scientifique : Vomer setapinnis

- Autres appellations : Plat plat Mussolini. Besobeugre (Alladian) - Slingania (Appolonien).

Famille : Carangidae

Taille : jusqu'à 40 cm

Signes distinctifs : Corps très comprimé latéralement - tête à profil abrupt - les épines de la première dorsale sont plus ou moins incluses sous la peau - corps blanc, jaune verdâtre sur le dos écailles rares, très petites.

Habitat : Très côtier - peut pénétrer en lagune.

Pêche : Filet tournant - chalut (souvent pêché avec le plat plat).

Apports annuels à Abidjan : de l'ordre de 2000 tonnes environ (plat plat compris).

Prix : de 500 à 2500 CFA la caisse.

Remarques : Il existe une espèce assez voisine et de plus grande taille que l'on rencontre parfois sur le quai : Scyris alexandrinus. Cette espèce a les premiers rayons des nageoires dorsale et anale très developpés et prolongés en forme de faux.



Appellations : - Nom commercial : TASSERGAL
- Nom scientifique : Pomatomus saltatrix
- Autres appellations :

Famille : Pomatomidae

Taille : jusqu'à 1,2 mètre

Signes distinctifs : Corps allongé - nageoires pectorales courtes - coloration verdâtre sur le dos, ventre blanc.

Habitat : Pélagique

Pêche : Filet tournant - chalut - ligne.
Rare

Remarques : Très commun au Sénégal, ce poisson est très rarement débarqué à Abidjan.

Sa chair est grisâtre et médiocre.



Appellations : - Nom commercial : MAFOU
- Nom scientifique : Rachycentron canadum
- Autres appellations : Faux thon - sanfou.

Famille : Rachycentridae

Taille : jusqu'à 2 mètres

Signes distinctifs : Poisson très allongé à tête large et plate - première dorsale formée d'épines isolées - coloration sombre, ventre blanc.

Habitat : Pélagique

Pêche : filet tournant - senne de rivage.
Rare.

Remarques : Poisson à chair très blanche et très savoureuse,avec très peu d'arètes..



Appellations : - Nom commercial : ROUGET
- Nom scientifique : Pseudupeneus prayensis
- Autres appellations : Rouget barbet.

Famille : Mullidae

Taille : jusqu'à 30 cm

Signes distinctifs : Poisson caractéristique - deux longs barbillons au menton - coloration rose-rouge.

Habitat : Poisson de fond côtier.

Pêche : Chalut

Apports annuels à Abidjan : de l'ordre de 100 tonnes.

Prix : de 1000 à 2000 CFA la caisse.

Remarques : Le rouget est un très bon poisson mais qui ne se conserve pas longtemps dans la glace - les gros chalutiers d'Abidjan ne l'embarquent qu'en fin de marée.

En France on distingue deux espèces voisines de rouget : le rouget de vase ou barbarin : Mullus barbatus, et le rouget de roche ou surmulet : Mullus surmuletus.



Appellations : - Nom commercial : CARPE GRISE
- Nom scientifique : Lethrinus atlanticus
- Autres appellations :

Famille : Sparidae

Taille : jusqu'à 30 cm

Signes distinctifs : Museau à lèvres charnues - joues sans écailles
coloration où se mèlent le rose, le vert et le brun

Habitat : Poisson de fond côtier

Pêche : Chalut
Poisson jamais pêché en grande quantité

Remarques :



Appellations : - Nom commercial : PAGEOT ROUGE - 74
- Nom scientifique : Dentex angolensis
- Autres appellations :

Famille : Sparidae

Taille : jusqu'à 20 cm

Signes distinctifs : Corps comprimé latéralement - museau arrondi - deux fortes canines sur chaque mâchoire - pas d'incisives ni de molaires - coloration rouge presque vermillon.

Habitat : Poisson de fond côtier.

Pêche : Chalut
Apports : voir 77

Remarques : Il existe une autre espèce extrêmement voisine : Dentex congoensis un peu moins commune.

L'appellation "pageot" est très incorrecte pour ces Dentex, car les vrais pageots n'ont pas de canines. Mais l'habitude est pris à Abidjan de les appeler ainsi...(les gros Dentex sont appelés Daurade).



Appellations : - Nom commercial : DAURADE ou DORADE - 75
- Nom scientifique : Dentex filosus
- Autres appellations : Denté

Famille : Sparidae

Taille : jusqu'à 90 cm

Signes distinctifs : Corps comprimé latéralement - museau faiblement arrondi - deux fortes canines sur chaque mâchoire - ni incisives ni molaires - la troisième épine de la dorsale est prolongée par un long filament - coloration rose-rouge.

Habitat : Poisson de fond côtier.

Pêche : Chalut - les très grosses daurades sont prises à la ligne par les piroguiers.

Apports : voir 76

Prix : voir 76 - les gros spécimens sont vendus à la piece sur la base de 200 CFA le kilo.

Remarques : Il existe d'autres Dentex de grande taille, en particulier Dentex barnardi dont la dorsale est plus régulière.

Chez les daurades, les vieux mâles portent souvent une grosse bosse frontale.

Les daurades sont parmi les poissons les plus appréciés et les plus chers du quai.



Appellations : - Nom commercial : DAURADE ou DORADE
- Nom scientifique : Pagrus ehrenbergi
- Autres appellations : Pagre

Famille : Sparidae

Taille : jusqu'à 60 cm

Signes distinctifs : Corps comprimé latéralement - museau faiblement arrondi - présence de deux fortes canines sur chaque mâchoire et de molaires - corps rosé présentant des points bleus sur le dos.

Habitat : Poisson de fond côtier.

Pêche : Ligne surtout

Apports : voir 76

Prix : voir 76. Les gros spécimens sont vendus à la pièce sur la base de 200 CFA le kilo.

Remarques : Il existe plusieurs espèces de Pagrus, en particulier Pagrus pagrus dont la dorsale est de hauteur plus régulière et dont la couleur est à peu près uniformément rose.



Appellations : - Nom commercial : DAURADE GRISE
- Nom scientifique : Cantharus cantharus
- Autres appellations : Griset (halles de Paris)

Famille : Sparidae

Taille : jusqu'à 32 cm

Signes distinctifs : Corps comprimé latéralement - coloration gris-brunâtre avec des lignes longitudinales peu marquées - nageoires grisâtres.

Habitat : Poisson de fond côtier.

Pêche : Chalut

Apports annuels à Abidjan (pour toutes les daurades) : de l'ordre de 500 tonnes environ.

Prix : de 2500 à 4000 CFA la caisse.

Remarques : Les daurades grises sont plus rares que les autres daurades.

En France, l'appellation "Dorade grise " est normalisée (AFNOR) pour cette espèce.



Appellations : - Nom commercial : PAGEOT
- Nom scientifique : Pagellus coupei
- Autres appellations :

Famille : Sparidae

Taille : jusqu'à 35 cm

Signes distinctifs : Corps comprimé latéralement - museau arrondi - dents petites - coloration rose.

Habitat : Poisson de fond côtier.

Pêche : Chalut
Apports annuels à Abidjan (y compris les pageots rouges) : environ 1000 tonnes.

Prix : de 800 à 2800 CFA la caisse.

Remarques : Cette espèce est surtout pêchée au large de la Côte d'Ivoire de juillet à octobre.

Il existe une espèce voisine extrêmement rare à Abidjan : Pagellus bogaraveo, qui possède une tache noire à l'aisselle de la nageoire pectorale.



Appellations : - Nom commercial : BOGUE - 77 bis
- Nom scientifique : Boops boops
- Autres appellations :

Famille : Sparidae

Taille : jusqu'à 30 cm

Signes distinctifs : Corps allongé, presque cylindrique - dos olivâtre, flancs ornés de 4 à 5 bandes longitudinales jaune doré.

Habitat : Poisson de fond - plateau continental profond.

Pêche : Chalut

Rare actuellement.

Remarques : Le développement du chalutage profond devrait accroître de manière sensible les apports de "Bogues" dans les années à venir.



Appellations : - Nom commercial : POISSON-PAPILLON - 78
- Nom scientifique : Chaetodon hoefleri
- Autres appellations :

Famille : Chaetodontidae

Taille : jusqu'à 15 cm

Signes distinctifs : Poisson très comprimé - couleurs vives : blanc, jaune, avec des bandes brunes.

Habitat : Poisson de fond côtier.

Pêche : Chalut

Remarques : Ce poisson non consommé est rejeté, il est donc très rare sur le quai.
Il existe plusieurs espèces voisines.



Appellations : - Nom commercial : SAINT PIERRE RAYE - 79

- Nom scientifique : Drepane africana

- Autres appellations : Saint Pierre. Oko (Alladian) - Adamlangoua (Appolonien).

Famille : Ephippidae

Taille : jusqu'à 40 cm

Signes distinctifs : Corps élevé et comprimé en forme de losange - bou che petite - pectorales très longues - coloration argentée - 7 à 8 bandes transversales foncées.

Habitat : Poisson de fond côtier. Peut pénétrer en lagune.

Pêche : Chalut

Apports annuels à Abidjan (y compris le Saint Pierre noir) : l'ordre de 300 tonnes environ.

Prix : de 500 à 3500 CFA la caisse.

Remarques : La forme du drepane le rend très vulnérable au chalut, même s'il est petit; aussi cette espèce a-t-elle tendance à se raréfier.

Ce poisson est appelé couramment Saint Pierre à Abidjan. En Europe le Saint Pierre est le Zeus faber dont une variété dite mauritanic est encore pêchée quelquefois dans le golfe de Guinée. C'est pou quoi il est préférable d'ajouter le qualificatif "rayé" pour désigner le drepane sans ambigüité.



Appellations : - Nom commercial : SAINT PIERRE NOIR - 80
- Nom scientifique : Chaetodipterus goreensis
- Autres appellations :

Famille : Ephippidae

Taille : jusqu'à 30 cm

Signes distinctifs : Corps comprimé moins élevé que celui de Drepane africana - coloration plus sombre marquée de cinq à six bandes verticales foncées.

Habitat : Poisson de fond.

Pêche : Chalut

Apports et prix : voir 79.

Remarques : Il existe une autre espèce très voisine : Chaetodipterus lippei.

Les Saint Pierre noirs sont nettement plus rares que les Saint Pierre rayés.



Appellations : - Nom commercial : PERROQUET
- Nom scientifique : Scarus hoefleri
- Autres appellations :

Famille : Scaridae

Taille : jusqu'à 60 cm

Signes distinctifs : Dents bleues ou vertes soudées en deux blocs à chaque mâchoire et rappelant un peu un bec de perroquet - corps vivement coloré orange, vert, bleu, jaune...Il existe d'autres genres , aux dents blanches et aux couleurs moins vives.

Habitat : Côtier

Pêche : Non consommé.

Remarques : Bien que la toxicité des "perroquets" ne soit pas prouvée en Afrique de l'ouest, les Scaridae ont été inclus dans le décret présidentiel du 11 - 1 - 1967 relatif aux poissons vénéneux, pour éviter toute confusion avec les Tétrodons (24), appelés eux-même parfois à tort "perroquets".



Appellations : - Nom commercial : VIVE - 82
- Nom scientifique : Trachinus armatus
- Autres appellations :

Famille : Trachinidae

Taille : jusqu'à 30 cm

Signes distinctifs : Poisson de forme caractéristique: bouche très oblique - corps allongé - la première nageoire dorsale épineuse,et surtout l'épine operculaire sont venimeuses et occasionnent des piqûres très douloureuses.

Habitat : Poisson de fond très côtier.

Pêche : Chalut

Les vives sont rejetées,donc rares sur le quai.

Remarques : Il existe plusieurs autres espèces de vives dans l'Atlantique tropical: Trachinus radiatus et Trachinus lineolatus en particulier ..
Les vives ne sont pas consommées en Côte d'Ivoire. En Europe, on apprécie leurs filets,car leur chair est très fine. Au moment de la préparation,il faut se méfier des épines venimeuses qui restent dangereuses plusieurs heures après la mort.



Appellations : - Nom commercial : LOCHE
- Nom scientifique : Brotula barbata
- Autres appellations :

Famille : Brotulidae

Taille : jusqu'à 75 cm

Signes distinctifs : Museau et mâchoire inférieure portant chacun trois paires de barbillons - les nageoires dorsale et anale sont continues jusqu'à la queue, terminée en pointe - les nageoires ventrales sont réduites à un seul rayon - coloration brun-rosé

Habitat : Poisson de fond - plateau et talus continental.

Pêche : Chalut

Apports annuels à Abidjan : de l'ordre de 100 à 150 tonnes environ.

Prix : de 1300 à 3000 CFA la caisse.

Remarques : Les loches sont pêchées presque uniquement pendant la saison fraîche, c'est à dire en août et septembre.



Appellations : - Nom commercial : CHAS CHAS
- Nom scientifique : Acanthurus monroviae
- Autres appellations : Chirurgien - Docteur.

Famille : Acanthuridae

Taille : jusqu'à 40 cm

Signes distinctifs : Le signe le plus caractéristique est la présence au centre d'une tache jaune orangée, d'une épine mobile de chaque côté du pédoncule caudal - corps brun foncé.

Habitat : Côtier

Pêche : Chalut - ligne

Prix : de 500 à 1500 CFA la caisse.

Remarques :



Appellations : - Nom commercial : BALISTE
- Nom scientifique : Balistes capriscus
- Autres appellations : Poisson-caoutchouc.

Famille : Balistidae

Taille : jusqu'à 60 cm

Signes distinctifs : Corps comprimé latéralement - petite bouche à dent visibles - corps entièrement recouvert d'écailles constituant une sorte de carapace élastique - la première épine de la dorsale est à "cran-d'arrêt".

Habitat : Côtier

Pêche : Chalut - filet tournant

Les balistes semblent devenir de plus en plus abondantes.

Poisson rejeté non consommé.

Remarques : Il existe plusieurs autres espèces de balistes, en particulier Balistes forcipatus, de coloration plus claire, portant de petites taches foncées et une plus importante à la naissance de la queue.

La première épine dorsale des balistes peut être déverrouillée par pression sur la troisième épine, même sur le poisson mort.

Lorsqu'elle est pêchée et qu'elle se défend, la baliste peut mordre cruellement.



Appellations : - Nom commercial : MAQUEREAU - 86
- Nom scientifique : Scomber japonicus
- Autres appellations :

Famille : Scombridae

Taille : jusqu'à 60 cm

Signes distinctifs : C'est la seule espèce tropicale de maquereau - ses couleurs sont plus claires et ses dessins moins marqués que ceux du maquereau d'Europe.

Habitat : Poisson pélagique.

Pêche : Surtout au filet tournant, très rarement au chalut.
Comme la sardinelle, il est pêché en surface quand les eaux sont plus froides.
Apports à Abidjan : de 1000 à 4000 tonnes par an.
Prix : de 500 à 2500 CFA la caisse.

Remarques : C'est le type même des poissons gras - la teneur en matières grasses de la chair dépasse parfois 17% du poids frais. Dans ce cas, son corps prend assez vite une consistance molle (même avant d'être avarié), et il "éclate" facilement au fumage.



Appellations : - Nom commercial : MAQUEREAU-BONITE

- Nom scientifique : Cybium tritor

- Autres appellations : Tazard - Sanfou - Thon blanc. Spanish mackerel (USA) - Alaha (Ebrié) - Saafro (Appolonien) Aissa (Alladian).

Famille : Cybiidae

Taille : jusqu'à 1 mètre

Signes distinctifs : Corps allongé nettement comprimé latéralement - nageoires dorsales et anale suivies de 8 à 9 pinnules - ventre blanc argenté, dos bleuté avec des taches arrondies - la première nageoire dorsale est noire en avant.

Habitat : Pélagique - peut pénètrer en lagune.

Pêche : Filet tournant - ligne.

Remarques : Ce poisson ne se prend qu'en petites quantités, assez souvent mélangé aux sardinelles.

Sa chair est blanche et assez fine.



Appellations : - Nom commercial : BONITE - 88

- Nom scientifique : Sarda sarda
- Autres appellations : Bonite à dos rayé - Pélamide
  Atlantic bonito(USA)

Famille : Cybiidae

Taille : jusqu'à 75 cm

Signes distinctifs : Poisson fusiforme plus effilé que les thons, présentant des rayures sur le dos qui forment comme une série de "V" emboîtés quand on le regarde de dessus.

Habitat : Pélagique

Pêche : Filet tournant

Apports et prix : voir (92).

Remarques : Pélamide est l'appellation française normalisée (AFNOR).



Appellations : - Nom commercial : THON-BROCHET
- Nom scientifique : Acanthocybium solandri
- Autres appellations : Wahoo (pêcheurs sportifs).

Famille : Cybiidae

Taille : jusqu'à 2 mètres

Signes distinctifs : Poisson très allongé ressemblant un peu au brochet mais dont la queue est celle d'un thon - dos et flancs marqués de raies verticales sombres.

Habitat : Pélagique

Pêche : Filet tournant - ligne.

Remarques : Ce poisson est quelquefois capturé dans les bancs de sardinelles.

Sa chair est savoureuse.



Appellations : - Nom commercial : CIGARE - 90
- Nom scientifique : Auxis thazard
- Autres appellations : Bonite - Auxide.
Frigate mackerel (USA)

Famille : Thunnidae

Taille : jusqu'à 60 cm

Signes distinctifs : Aspect d'un petit thon - le deux nageoires dorsales sont très largement séparées.

Habitat : Pélagique

Pêche : Filet tournant

Apports et prix : voir (92).

Remarques : Auxis thazard n'a pas droit à l'appellation "thon" s'il est mis en conserve.

Le meilleur nuoc mam fabriqué en Côte d'Ivoire jusqu'à ce jour provenait de ce poisson.



Appellations : - Nom commercial : LISTAO
- Nom scientifique : Katsuwonus pelamys
- Autres appellations : Bonite à ventre rayé - Skipjack (USA).

Famille : Thunnidae

Taille : jusqu'à 60 cm

Signes distinctifs : Poisson caractéristique au corps fusiforme, dont le ventre porte de longues bandes longitudinales sombres.

Habitat : Pélagique

Pêche : Filet tournant - ligne

Apports et prix : voir (92) et remarques ci-dessous.

Remarques : Le listao est l'un des thonidés ayant droit à l'appellation "thon", une fois mis en conserve. Pour cette raison, il est pêché par les thoniers français et ivoiriens au même titre que le thon, et vendu à un prix fixé par le comité interprofessionnel du thon (à 107,5 CFA le kilo en 1972). Environ 1800 tonnes ont été débarquées à Abidjan en 1971.

Sur le port de pêche fraîche, on ne trouve que de très petits listaos pêchés par les sardiniers, et vendus au prix des autres bonites.



Appellations : - Nom commercial : THONINE
- Nom scientifique : Euthynnus alleteratus
- Autres appellations : Grosse bonite - Ravil.
Little Tuna (USA)

Famille : Thunnidae

Taille : jusqu'à 70 cm

Signes distinctifs : Aspect d'un petit thon - ressemble au cigare, mais les deux nageoires dorsales se touchent - le ventre porte vers l'avant quelques taches sombres.

Habitat : Pélagique

Pêche : Filet tournant - ligne.
Apports annuels à Abidjan (pour toutes les "bonites") : de 600 à 1000 tonnes environ.

Prix : de 500 à 2500 CFA la caisse.

Remarques : La thonine n'a pas droit à l'appellation "thon" car sa chai est fragile et de coloration rougeâtre. Néanmoins, des essais effectués à Abidjan il y a quelques années ont montré que des conserves à l'huile faites avec ce poisson valent largement celles de listao.

En général les thoniers français rejettent à l'eau les thonines qu'ils appellent "ravil", déformation probable de l'espagnol "rabil" qui désigne le thon albacore.



Appellations : - Nom commercial : ALBACORE

- Nom scientifique : Thunnus albacares

- Autres appellations : Thon à nageoires jaunes - Yellowfin (USA) - Albacore est l'appellation française normalisée (AFNOR).

Famille : Thunnidae

Taille : jusqu'à 2,5 mètres (exceptionnel -couramment jusqu'à 1,7 mètr

Signes distinctifs : (Par rapport au patudo auquel il ressemble) -poisson généralement moins ventru - oeil plus petit - deuxième dorsale et anale très longues - foie lisse - présence constante d'un couple de vers plats dans chaque narine.

Habitat : Pélagique

Pêche : Filet tournant - ligne (appât vivant ou traîne) - palangre flottante (japonais).

Apports annuels à Abidjan de l'ordre de 2000 à 2500 tonnes pou la conserve.

Prix pour la conserve : 150 CFA le kilo (accord interprofessio nel

Remarques : Thunnus albacares est l'espèce principale de thonidé de l'Atlantique : il représente le tonnage le plus important des thons mis en conserve dans toute la zone franc. Depuis quelques années toutefois, on remarque un accroissement du pourcentage de listao.

Les experts pensent que le stock d'albacore est actuellement menacé par la pêche intensive et par la destruction excessive des jeune d'un poids nettement inférieur à 10 kg...

En Côte d'Ivoire, l'arrêté n°141 du 2 mars 1970 interdit la pêche et le débarquement d'albacores d'un poids inférieur à 3,2 kg.



Appellations : - Nom commercial : PATUDO
- Nom scientifique : Thunnus obesus
- Autres appellations : Thon obèse - Big eye (USA).

Famille : Thunnidae

Taille : jusqu'à 2 mètres

Signes distinctifs : (Par rapport à l'albacore auquel il ressemble) : poisson généralement plus ventru - oeil plus gros - deuxième dorsale et anale plus courtes - foie présentant de nombreuses stries vasculaires - pas de vers plats dans les narines.

Habitat : Pélagique

Pêche : Comme pour l'albacore (le patudo est moins vif).

Apports annuels à Abidjan : de l'ordre de 100 tonnes environ.

Prix pour la conserve : jusqu'à 35 kg : 150 CFA le kilo, au delà : 107,5 CFA le kilo.

Remarques : La majeure partie des captures de patudo se fait à la palangre flottante.

La chair du patudo, très appréciée par certains à l'état frais, est beaucoup moins adaptée à la mise en conserve que celle de l'albacore. A peu près acceptable pour les petits spécimens jusqu'à 35 kg, elle devient très médiocre pour les plus gros : cartonneuse et brunâtre après appertisation. Il est bon de remarquer que pour l'albacore également, les gros spécimens donnent en conserve une chair de qualité inférieure à celle des petits et des moyens.



Appellations : - Nom commercial : GERMON
- Nom scientifique : Thunnus alalunga
- Autres appellations : Thon blanc - Albacore (USA) -

Germon est l'appellation française normalisée (AFNOR).

Famille : Thunnidae

Taille : jusqu'à 1 mètre

Signes distinctifs : La principale caractéristique du germon est d'avoir des nageoires pectorales extrèmement longues, qui dépassent nettement le niveau d'insertion de la seconde dorsale.

Habitat : Pélagique

Pêche : Comme pour l'albacore, mais dans des eaux plus froides.

Très rare à Abidjan.

Remarques : Le germon est le plus petit des thons proprement dits (genre Thunnus), le plus gros étant le thon rouge (Thunnus thynnus), dont il n'est pas question dans ce catalogue car il est excessivement rare dans l'Atlantique tropical africain.

Le germon est le plus réputé des thons pour la mise en conserve. Lui seul a droit, sur les boîtes, à l'appellation "thon blanc" (aux USA : white meat); sa chair est en effet nettement plus blanche que celle de l'albacore qui est rosée et que celle du listao qui est plutôt beige dans les boîtes...c'est également la plus fine au goût quoiqu'un peu sèche.



Appellations : - Nom commercial : VOILIER
- Nom scientifique : Istiophorus americanus
- Autres appellations : Espadon voilier - Sail fish(USA)

Famille : Istiophoridae

Taille : jusqu'à 2,5 mètres

Signes distinctifs : Mâchoire supérieure prolongée par un rostre effilé
Immense nageoire dorsale unique formant une voile
Double carène caudale.

Habitat : Pélagique

Pêche : Voir 98

Les voiliers sont quelquefois pris au filet tournant avec les sardinelles.

Remarques : La nageoire dorsale de ce poisson dépasse souvent au dessus de l'eau comme une voile, d'où son nom de voilier.



Appellations : - Nom commercial : MARLIN

- Nom scientifique : Makaira sp.
- Autres appellations : Makaire

Famille : Makairidae

Taille : jusqu'à 4,5 mètres

Signes distinctifs : "Epée" plus courte et plus ronde que celle de l'espadon - dorsale plus longue que celle de l'espadon mais moins haute au milieu que celle du voilier - double carène caudale.

Habitat : Pélagique

Pêche : Voir 98

Remarques : Il existe plusieurs espèces de marlin dans l'Atlantique :

-Makaira indica, le marlin noir, le plus grand, qui peut atteindre 4,5 mètres.

Makaira nigricans, le marlin bleu.

Tetrapterus albidus, le marlin blanc....

Les marlins sont surtout utilisés pour la fabrication de saucisses de poisson au Japon.



Appellations : - Nom commercial : ESPADON
- Nom scientifique : Xiphias gladius
- Autres appellations : Poisson-épée - Sword fish (USA).

Famille : Xiphiidae

Taille : jusqu'à 5 mètres

Signes distinctifs : "Epée" très longue et aplatie -corps plus rond que celui du marlin - nageoire dorsale assez haute mais courte - carène caudale simple.

Habitat : Pélagique

Pêche : Ligne (pêche sportive).- harpon - palangre flottante.
Rare à Abidjan (le marlin est rare également, le voilier est le plus couramment rencontré).

Vendu à la pièce.

Remarques : L'espadon se sert de son rostre comme d'une épée au milieu des bancs de poissons ou sur des proies plus grosses.

La plus grande partie des espadons, marlins et voiliers pêchés dans le monde est capturée par les palangres flottantes à thons des thonniers japonais, chinois et coréens.

Le "steack" d'espadon était très apprécié aux USA jusqu'à ces dernières années, mais depuis 1970, sa consommation est déconseillée par le département de la santé, en raison de sa teneur trop élevée en mercure.



Appellations : - Nom commercial : CEINTURE
- Nom scientifique : Trichiurus lepturus
- Autres appellations : Sabre

Famille : Trichiuridae

Taille : jusqu'à 1,5 mètre

Signes distinctifs : Poisson très allongé, aplati latéralement, dont le corps argenté, terminé par une queue en pointe, ressemble à la lame d'un sabre - nageoire dorsale longue et continue - ventrales absentes.

Habitat : Poisson de fond côtier. Peut pénétrer en lagune.

Pêche : Chalut et filet tournant.
Surtout pêchée en octobre et novembre.

Apports annuels à Abidjan : de l'ordre de 1000 tonnes environ.

Prix : de 500 à 1000 CFA la caisse.

Remarques : La ceinture abîme souvent les filets tournants des sardiniers avec ses dents courbes et tranchantes.



Appellations : - Nom commercial : SARDINEAU
- Nom scientifique : Paracubiceps ledanoisi
- Autres appellations : Petit chinchard

Famille : Stromateidae

Taille : jusqu'à 20 cm

Signes distinctifs : Poisson fusiforme présentant une certaine ressemblance avec les petits chinchards, mais ne possèdant pas de scutelles sur la ligne latérale - l'oeil est proportionnellement plus gros.

Habitat : Poisson de fond - plateau continental profond.

Pêche : Chalut

Poisson non pêché actuellement - peu ou pas consommé.

Remarques : Ce petit poisson encore peu connu a une chair très bonne rappelant à la fois celle de la sardine et du maquereau, et comportant fort peu d'arêtes.

Des essais effectués il y a quelques années à Abidjan ont montré que le sardineau se prête parfaitement à la confection de conserves du type "sardine à l'huile".

Le nom de "petit chinchard" sous lequel il est confondu avec le Décapterus (61) prête à confusion, aussi l'appellation "sardineau" (contraction de sardine-maquereau) serait-elle préférable.



Appellations : - Nom commercial : MADEMOISELLE
- Nom scientifique : Stromateus fiatola
- Autres appellations : Liche - Stromatée.

Famille : Stromateidae

Taille : jusqu'à 50 cm

Signes distinctifs : Corps comprimé - bouche petite - museau arrondi sans aucun prolongement - très belles couleurs sur le poisson vivant : gris argenté avec des lignes de points jaunes et des reflets bleus et verts

Habitat : Pélagique

Pêche : Filet tournant - chalut

Ce poisson est vendu avec les "hirondelles" et les "liches" sur le port d'Abidjan (voir 66).

Remarques :



Echeneis naucrates



Appellations : - Nom commercial : REMORA

- Nom scientifique : Remora sp.
- Autres appellations : Echeneis naucrates

Grebi bagre (Ebrié) - Lavousrin (Alladian) - Ametachene (Appolonien).

Famille : Echeneidae

Taille : jusqu'à 1 mètre pour Echeneis naucrates

Signes distinctifs : Il porte sur la tête une grande ventouse - coloration générale sombre - corps assez trapu pour le genre Remora, plus allongé pour Echeneis naucrates.

Habitat : Pélagique - peut pénétrer en lagune (Echeneis naucrates).

Pêche : Non consommé.

Remarques : La ventouse des rémoras est considérée comme une première nageoire dorsale transformée, et son pouvoir d'adhérence est très grand. Le rémora se fixe en général sous le ventre des grands animaux marins : requins, espadons, tortues et cétacés. Cette fixation lui assure gratuitement transport, protection et restes de nourriture.

Cette faculté d'adhérence est mise à profit par les pêcheurs de certaines contrées : Zanzibar, Singapour et Amérique centrale. Une cordelette est fixée à la queue d'un rémora vivant que le pêcheur lance vers le poisson ou la tortue convoités, et qu'il ramène lorsqu'il s'y est fixé.



Scorpaena sp.

Appellations : - Nom commercial : RASCASSE
- Nom scientifique : nombreux genres : Pontinus, Scorpaena...
- Autres appellations :

Famille : Scorpaenidae

Taille : jusqu'à 40 cm

Signes distinctifs : Poisson caractéristique - tête cuirassée présentant de nombreuses crêtes garnies d'épines - coloration rouge ou brunâtre.

Habitat : Poisson de fond côtier

Pêche : Chalut

Ces poissons ne sont jamais pêchés en grandes quantités.

Remarques : Les rascasses sont très estimées, en particulier pour la préparation de soupes de poisson.



Appellations : - Nom commercial : GRONDIN
- Nom scientifique : Trigla sp. et Lepidotrigla sp.
- Autres appellations : Trigle

Famille : Triglidae

Taille : jusqu'à 60 cm pour Trigla et 30 cm pour Lepidotrigla.

Signes distinctifs : Partie supérieure de la tête et du dos cuirassée trois rayons libres robustes à la partie inférieure des nageoires pectorales - ventre plat - le genre Trigla a de petites écailles et le genre Lepidotrigla des grandes.

Habitat : Poisson de fond.

Pêche : Chalut

Le grondin n'est jamais pêché en grande quantité.

Prix : de 200 à 1000 CFA la caisse.

Remarques : Les rayons inférieurs des nageoires pectorales, libérés de toute membrane, ressemblent à de longs doigts et peuvent servir au poisson à progresser sur le fond.

Les grondins doivent leur nom au fait qu'ils peuvent "grogner"; en effet, à l'aide de muscles spéciaux, ils peuvent émettre des sons en faisant vibrer leur vessie natatoire.



Appellations : - Nom commercial : FAUX GRONDIN
- Nom scientifique : Cephalacanthus volitans
- Autres appellations : Poisson-volant.

Famille : Dactylopteridae

Taille : jusqu'à 50 cm

Signes distinctifs : Ressemble au grondin, mais tous les os de la tête sont soudés comme un casque prolongé de chaque côté par deux très fortes épines - les rayons inférieurs des nageoires pectorales atteignent la longueur du corps.

Habitat : Poisson de fond côtier.

Pêche : Chalut

Non consommé.

Remarques : C'est semble-t-il à tort que le faux grondin est appelé poisson-volant, car, malgré ses très longues nageoires pectorales, il vit plutôt vers le fond.

Il s'approche néanmoins de la surface en période de reproduction et peut alors effectuer des sauts hors de l'eau, sauts beaucoup moins importants que ceux des exocètes.



Appellations : - Nom commercial : TURBOT (tropical)
- Nom scientifique : Psettodes belcheri
- Autres appellations : Flétan de Mauritanie (halles de Paris)

Famille : Psettodidae

Taille : jusqu'à 50 cm

Signes distinctifs : Poisson plat - la face pigmentée portant les yeu est orientée indifféremment à droite ou à gauche origine de la dorsale toujours en arrière du niveau de l'oeil - des taches foncées sur la queue

Habitat : Poisson de fond côtier.

Pêche : Chalut

Poisson de choix, rarement pêché en grande quantité.

Remarques : Il existe une espèce très voisine : Psettodes bennetti, qui n'a pas de taches sur la queue.

Le "vrai" turbot ne vit pas dans les eaux africaines, on pourrait donc maintenir cette appellation pour Psettodes belcheri, sans risques de confusion. Il est néanmoins préférable de lui ajouter le qualificatif "tropical",car, en France, "turbot" est une appellation normalisée (AFNOR), réservée à une espèce bien définie de poisson plat : Rhombus maximus, très nettement différente de Psettodes belcheri.



Appellations : - Nom commercial : LIMANDE (fausse) - 107
- Nom scientifique : Nombreuses espèces.
- Autres appellations :

Famille : Bothidae

Taille : jusqu'à 30 cm

Signes distinctifs : Poisson plat - la face pigmentée est toujours orientée à gauche - origine de la dorsale au niveau ou en avant de l'oeil - coloration jaune-brunâtre.

Habitat : Poisson de fond côtier.

Pêche : Chalut

Les limandes sont relativement rares sur le quai.

Remarques : Il existe une dizaine d'espèces de Bothidae dont la différenciation offre peu d'intérêt sur le plan pratique.

Le nom de limande que l'on donne aux Bothidae est incorrect en effet, il s'agit plutôt de fausses limandes : l'appellation française "limande" (normalisée AFNOR), s'applique à l'espèce Limanda limanda, plus grande en général, et dont la face pigmentée est orientée à droite.

Limanda limanda est d'ailleurs absente des eaux tropicales.



Appellations : - Nom commercial : SOLE DE ROCHE - 108

- Nom scientifique : Solea hexophtalma
- Autres appellations :

Famille : Soleidae

Taille : jusqu'à 20 cm

Signes distinctifs : Poisson plat - la face pigmentée, portant les yeux, est toujours orientée à droite - origine de la dorsale au niveau de l'oeil - présence de six taches et de fines bandes transversales.

Habitat : Poisson de fond côtier.

Pêche : Voir 109

Remarques : A côté de Solea hexophtalma, on trouve dans le golfe de Guinée une dizaine d'espèces très voisines de soles dont la différenciation est parfois délicate.

Les Soleidae, qui se trouvent réunis dans les statistiques d'apport avec les Cynoglossidae, ne représentent en fait que 10% du total.

Les soles de roche sont plus fines et plus appréciées que les soles cynoglosses (109). mais malgré tout, elles ont une chair moins savoureuse que celle des soles des eaux froides ou tempérées.



Appellations : - Nom commercial : SOLE

- Nom scientifique : Cynoglossus canariensis
- Autres appellations : Sole cynoglosse - Langue de chie

Banban doubie (Ebrié) - Anbanban (Alladian) - Panbancou (Appolonien).

Famille : Cynoglossidae

Taille : jusqu'à 60 cm

Signes distinctifs : Poisson plat - la face pigmentée est toujours orientée à gauche et possède trois lignes latérales - origine de la dorsale en avant de l'oeil - anale et dorsale unies à la caudale terminée en pointe.

Habitat : Poisson de fond côtier. Peut pénétrer en lagune.

Pêche : Chalut

Apports à Abidjan (pour toutes les soles) : de l'ordre de 500 à 600 tonnes par an.

Prix : de 500 à 3500 CFA la caisse.

Remarques : Cynoglossus canariensis est la plus commune des cynoglosses mais on rencontre fréquemment C. browni et C. goreensis, qui n'ont que deux lignes latérales sur la face pigmentée.

En lagune, on trouve assez communément une autre espèce de Cynoglossidae : C. senegalensis, morphologiquement très voisine de C. goreensis.

A Abidjan, les Cynoglossidae servent à la préparation de filets de sole qui sont exportés vers l'Europe ou consommés sur place. Il faut compter trois kg de soles pour faire un kg de filets.



Appellations : - Nom commercial : CRAPAUD - 110

- Nom scientifique : Antennarius occidentalis
- Autres appellations :

Famille : Antennariidae

Taille : jusqu'à 18 cm

Signes distinctifs : Corps trapu et ramassé - peau rugueuse - le premier rayon de la nageoire dorsale, tout à fait à l'avant du museau, porte à son extrêmité une touffe de filaments ou un lambeau cutané.

Habitat : Très côtier et lagunaire.

Pêche : Chalut

Poisson non consommé, donc rejeté.

Remarques : Il existe d'autres espèces d'Antennariidae : en particulier Antennarius pardalis et Antennarius senegalensis, ce dernier de plus grande taille.

Chez les Antennariidae, le premier rayon de la nageoire dorsale, ou illicium, sert de leurre pour attirer les petites proies dont ils se nourrissent.

INDEX ALPHABETIQUE DES NOMS SCIENTIFIQUES

NOM SCIENTIFIQUE	FICHE N°
Acanthocybium solandri	89
Acanthuridae	84
Acanthurus monroviae	84
Albula vulpes	16
Albulidae	16
Antennariidae	110
Antennarius sp.	110
Argyrosoma hololepidotum	57
Ariidae	27
Arius sp.	27
Auxis thazard	90
Balistes capriscus	85
Balistes forcipatus	85
Balistidae	85
Belonidae	31-32
Boops boops	77 bis
Bothidae	107
Brachydeuterus auritus	48
Brotula barbata	83
Brotulidae	83
Cantharus cantharus	76
Carangidae	60 à 69
Caranx carangus	63
Caranx chrysos	62
Caranx hippos	64
Caranx rhonchus	61 bis
Caranx senegalus	64
Carcharhinidae	2-3
Carcharhinus sp.	2
Centrophorus granulosus	5
Cephalacanthus volitans	105
Chaetodipterus goreensis	80
Chaetodipterus lippei	80
Chaetodon hoefleri	78
Chaetodontidae	78
Chilomycterus antennatus	25
Chilomycterus reticulatus	25
Chloroscombrus chrysurus	68
Clupea harengus	20
Clupeidae	17 à 21
Coryphaena hippurus	42
Coryphaenidae	42
Cybiidae	87 à 89
Cybium tritor	87
Cynoglossidae	109
Cynoglossus canariensis	109
Cynoglossus goreensis	109
Cynoglossus senegalensis	109
Cynoponticus ferox	30
Dactylopteridae	105
Dasyatidae	10
Dasyatis margarita	10
Dasyatis sp.	10
Decapterus punctatus	61
Dentex angolensis	74
Dentex barnardi	75
Dentex congoensis	74
Dentex filosus	75
Diagramma mediterraneus	47 bis
Diodon maculatus	25
Diodontidae	25
Drepane africana	79

Echeneidae 102
Echeneis naucrates 102
Elagatis bipinnulatus 59
Elopidae 14-15
Elops lacerta 15
Engraulidae 22
Engraulis guineensis 22
Ephippidae 79-80
Ephippion guttifer 24
Epinephelus aeneus 43
Epinephelus gigas 43
Epinephelus goreensis 43
Ethmalosa dorsalis 18
Euthynnus alleteratus 92
Exocoetidae 33
Fistularia tabaccaria 34
Fistulariidae 34
Galeocerdo cuvieri 3
Galeoides decadactylus 39
Gerres melanopterus 49
Gerres octactis 49
Gerridae 49
Gymnothorax 28
Harengula rouxi 19
Hemirhamphus sp. 32
Hippocampus sp. 35
Hyporhamphus sp. 32
Ilisha africana 17
Istiophoridae 96
Istiophorus americanus 96
Isurus oxyrhynchus 2
Katsuwonus pelamys 91
Lagocephalus laevigatus 24
Latilidae 50
Latilus semifasciatus 50
Lepidotrigla sp. 104
Lethrinus atlanticus 73
Lichia amia 65
Lichia glauca 66
Lichia vadigo 67
Limanda limanda 107
Lutjanidae 45
Lutjanus goreensis 45
Lycodontis 28
Makaira indica 97
Makaira nigricans 97
Makairidae 97
Manta birostris 11
Megalops atlanticus 14
Merluccidae 41
Merluccius merluccius 41
Merluccius polli 41
Mobula sp. 11
Mobulidae 11
Mola mola 36
Molidae 36
Morone labrax 57
Mugil sp. 37
Mugilidae 37
Mullidae 72
Mullus barbatus 72
Mullus surmuletus 72
Muraena 28
Muraenesocidae 30
Muraenidae 28
Myliobatidae 12-13
Ophichthyidae 29
Oxynotus centrina 5
Pagellus bogaraveo 77
Pagellus coupei 77
Pagrus ehrenbergi 75 bis
Pagrus pagrus 75 bis
Paracubiceps ledanoisi 100
Pentanemus quinquarius 40
Pisodonophis semicinctus 29
Polydactylus quadrifilis 38
Polynemidae 38 à 40
Pomadasyidae 46 à 48
Pomadasys incisus 46
Pomadasys jubelini 47
Pomadasys rogeri 47

Pomatomidae 70
Pomatomus saltatrix 70
Pontinus sp. 103
Priacanthidae 44
Priacanthus arenatus 44
Prionace glauca 2
Pristidae 6
Pristis sp. 6
Promicrops esonue 43 bis
Psettodes belcheri 106
Psettodes bennetti 106
Psettodidae 106
Pseudotolithus brachygnathus 56
Pseudotolithus elongatus 55
Pseudotolithus epipercus 53
Pseudotolithus moori 52 bis
Pseudotolithus senegalensis 56
Pseudotolithus typus 54
Pseudupeneus prayensis 72
Pteromylaeus bovina 13
Pteroscion peli 58
Rachycentridae 71
Rachycentron canadum 71
Raja clavata 9
Raja miraletus 9
Rajidae 9
Remora sp. 102
Rhinobatidae 8
Rhinobatos sp. 8
Rhinoptera marginata 12
Rhombus maximus 106
Rhynchobatus lubberti 8
Sarda sarda 88
Sardinella aurita 21
Sardinella eba 20
Sardinia pilchardus 21
Scaridae 81
Scarus hoefleri 81
Sciaenidae 51 à 58
Scomber japonicus 86
Scombridae 86
Scorpaena sp. 103
Scorpaenidae 103
Scyris alexandrinus 69
Selar crumenophtalmus 61 bis
Seriola dumerili 60
Serranidae 43-43 bis
Solea hexophtalma 108
Soleidae 108
Sparidae 73 à 77 bis
Sphaeroïdes spengleri 24
Sphyraena barracuda 36
Sphyraena dubia 36
Sphyraena piscatorum 36
Sphyraena sphyraena 36
Sphyraenidae 36
Sphyrna sp. 1
Sphyrnidae 1
Squalidae 5
Squatina aculeata 4
Squatina oculta 4
Squatinidae 4
Strongylura crocodila 31
Stromateidae 100-101
Stromateus fiatola 101
Syngnathidae 35
Synodidae 23
Tetraodontidae 24
Tetrapterus albidus 97
Thunnidae 90 à 95
Thunnus alalunga 95
Thunnus albacares 93
Thunnus obesus 94
Thunnus thynnus 95
Torpedinidae 7
Torpedo sp. 7
Trachinidae 82
Trachinocephalus myops 23
Trachinotus glaucus 66
Trachinotus goreensis 66
Trachinus armatus 82
Trachinus lineolatus 82
Trachinus radiatus 82

Trachurus picturatus	61
Trachurus trachurus	61
Trachurus trecae	61
Trichiuridae	99
Trichiurus lepturus	99
Trigla sp.	104
Triglidae	104
Umbrina canariensis	52
Umbrina steindachneri	51
Vomer setapinnis	69
Xiphias gladius	98
Xiphiidae	98
Zeus faber maurita-nicus	79

INDEX ALPHABETIQUE DES APPELLATIONS COURANTES

APPELLATION	FICHE N°
Aigle-bar	57
Aiguille	31
Aiguillette	32
Albacore	93
Albacore (USA)	95
Anchois	22
Ange de mer	4
Aoubé	18
Atlantic bonito (USA)	88
Auxide	90
Baliste	85
Bar	57
Barbarin	72
Barracuda	36
Bécune (grande)	36
Big eye (USA)	94
Bobo	55
Bogue	77 bis
Bonite	88-90
Bonite à dos rayé	88
Bonite (grosse)	92
Bonite à ventre rayé	91
Burro	47 bis
Brochet	36
Capitaine (gros)	38
Capitaine (petit)	39
Carangue	63
Carpe blanche	47
Carpe brune	47 bis
Carpe grise	73
Carpe métis	46
Carpe noire	53
Carpe rouge	45
Ceinture	99
Centrophore granuleux	5
Chas chas	84
Chinchard	61-61 bis
Chinchard (petit)	100
Chirurgien	84
Cigare	90
Colin	41
Congre	30
Coryphène	42
Courbine	57
Daurade (dorade)	75-75 bis
Daurade grise	76
Denté	75
Diable de mer	11
Docteur	84
Espadon	98
Espadon-voilier	96
Ethmalose	18
Fausse guinée	15
Fausse limande	107
Fausse vive	23
Faux grondin	105
Faux thon	71
Flétan de Mauritanie	106
Frigate mackerel (USA)	90
Friture	48
Friture à barbe	40
Friture argentée	49
Friture blanche	58
Friture-moustache	40
Germon	95
Grande bécune	36
Grondin	104
Grosse bonite	92
Gros capitaine	38
Gros-yeux	44

Guinée	15-16
Guinée (fausse)	15
Guitare	8
Hareng	20
Hareng (tropical)	20
Hareng de lagune	18
Hareng gros yeux	19
Hippocampe	35
Hirondelle	66
Humantin	5
Japon	63
Japon noir	62
Japon (petit)	64
Langue de chien	109
Lapin	24
Liche	65-67-101
Limande	107
Limande (fausse)	107
Liriot	67
Listao	91
Little tuna (USA)	92
Loche	83
Loup	57
Machoiron	27
Mademoiselle	101
Maigre	57
Mafou	71
Makaire	97
Mako	2
Mante	11
Maquereau	86
Maquereau-bonite	87
Marlin	97
Médaille	68
Merlu	41
Mérou	43-43 bis
Mole	26
Motard	44
Muge	37
Mulet	37
Murène	28
Musso	69
Ombrine	56
Ombrine noire	52-52 bis
Ombrine sosso	54
Pageot	77
Pageot rouge	74
Pagre	75 bis
Pastenague	10
Patudo	94
Pélamide	88
Perroquet	81
Petit capitaine	39
Petit chinchard	100
Petit japon	64
Plat plat Mussolini	69
Plat plat rasoir	17
Poisson-banane	59
Poisson-caoutchouc	85
Poisson-épée	98
Poisson-lampe	25
Poisson-lune	26
Poisson-machette	42
Poisson-papillon	78
Poisson-scie	6
Poisson-serpent	29
Poisson-trompette	34
Poisson volant	33-105
Porc	5
Porc-épic	25
Raie bouclée	9
Raie casquette	13
Raie chauve-souris	12
Raie cornue	11
Raie électrique	7
Raie fleurie	9
Raie manta	11
Raie miroir	9
Raie papillon	9
Raie perlée	10
Raie plate	10
Raie zéro	9

Rascasse 103
Rasoir 17
Ravil 92
Rémora 102
Requin 2-5
Requin-marteau 11
Requin-tigre 3
Rouget 72
Rouget barbet 72
Rouget de roche 72
Rouget de vase 72
Sailfish (USA) 96
Saint Pierre 79
Saint Pierre noir 80
Saint Pierre rayé 79
Sanfou 71-87
Sardine 21
Sardineau 100
Sardinelle 20-21
Sériole 60
Serpent de mer 28-29
Skipjack (USA) 91
Sole 109
Sole cynoglosse 109
Sole de roche 108
Spanish mackerel (USA) 87
Stromatée 101
Surmulet 72
Swordfish (USA) 98
Tarpon 14
Tassergal 70
Tazard 87
Terre 10
Tétrodon 24
Thon blanc 87-95
Thon-brochet 89
Thon à nageoires jaunes 93
Thon obèse 94
Thon saumoné 60
Thonine 92
Torpille 7
Trembleuse 7
Trigle 104
Truite de mer 47
Turbot 106
Turbot (tropical) 106
Vieille 47 bis-51
Vive 23-82
Vive (fausse) 23
Voilier 96
Wahoo 89
Yellowfin (USA) 93
Zèbre 50