



CHECKLIST DELLE SPECIE DELLA FAUNA ITALIANA

Versione 1.0

Copyright © 2003 by Fabio Stoch - Tutti i diritti riservati

Questo software è distribuito come freeware

Sono vietati la vendita, l'uso commerciale e la redistribuzione senza la presente pagina iniziale

INTRODUZIONE

Cos'è la checklist

La *Checklist delle specie della fauna italiana* elenca tutte le specie, note sino al momento della sua pubblicazione in forma cartacea, univocamente individuate da codici.

L'opera cartacea è suddivisa in 110 fascicoli all'interno dei quali viene di norma seguito un criterio ordinatore di tipo sistematico fino ai generi; all'interno dei generi le specie sono generalmente elencate in ordine alfabetico oppure, a discrezione dell'autore, seguendo un ordine sistematico.

Il *Progetto di informatizzazione della check-list della fauna italiana* avviato nell'ambito della I convenzione tra il Ministero dell'Ambiente e il Museo Civico di Storia Naturale di Verona ha consentito per la prima volta in Europa di costruire un completo database gerarchico di tutte le specie animali della fauna di una nazione. Questo programma è alla base della banca dati per la schedatura e mappatura dei dati di distribuzione degli invertebrati italiani.

La *Checklist delle specie della fauna italiana* è stata trasformata in un database a struttura gerarchica di semplice utilizzo e immediatamente fruibile da parte dei non specialisti (fruizione che risulta oltremodo complessa con una struttura cartacea o con un word-processor). I dati delle specie sono stati organizzati in una struttura di facile utilizzo che ricalca la configurazione del programma di Gestione Risorse di Windows. In questo modo sono stati conseguiti due obiettivi:

1 - I dati sono stati organizzati secondo uno schema che riproduce fedelmente la classificazione dei taxa animali adottata dalla *checklist*

2 - La struttura ad albero è facilmente consultabile anche dal non esperto, per il quale è previsto altresì la possibilità di listare i taxa in ordine alfabetico.

Il presente file rappresenta una conversione del database in formato testuale, che consente la rapida visualizzazione della checklist, la ricerca dei taxa e il loro ordinamento in modo semplice ed intuitivo.

Distribuzione delle specie

Specie terrestri e d'acqua dolce:

N	Italia settentrionale, comprendente: Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Lombardia, Val Emilia-Romagna
S	Italia peninsulare, comprendente Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria
Si	Sicilia e piccole isole circumsiciliane
Sa	Sardegna e piccole isole circumsarde

Specie marine:

3	bacini occidentali
4	alto e medio Adriatico
5	restanti bacini

Altre sigle:

E	specie endemica italiana
M	specie minacciata

Parassiti e ospiti

Le convenzioni adottate dalla checklist per le sigle dei parassiti differiscono a seconda del gruppo tassonomico.

Platelminti:

A Anfibi

- An** Anuri
- Ur** Urodeli

C Condroitti

M Mammiferi

- Ar** Artiodattili
- Cv** Carnivori
- Ce** Cetacei
- Cp** Chiroteri
- Ho** *Homo sapiens*
- In** Insettivori
- Lg** Lagomorfi
- Ro** Roditori
- Ps** Perissodattili

O Osteitti

R Rettili

- Sq** Squamati
- Te** Testudinati

U Uccelli

- Ac** Accipitriformi
- As** Anseriformi
- Cc** Ciconiiformi
- Ca** Caradriiformi
- Co** Columbiformi
- Cr** Coraciiformi
- Fe** Fenicotteriformi
- Ga** Galliformi
- Gr** Gruiformi
- La** Lariformi
- Pa** Passeriformi
- Pc** Piciformi
- Pe** Pelecaniformi
- Po** Podicipediformi
- Pr** Procellariiformi

Ra Ralliformi

St Strigiformi

Nematodi, Acantocefali:

- I** Insetti
- P** 'Pesci'
- R** Rettili
- U** Uccelli
- M** Mammiferi

Copepodi:

- SP** Poriferi
- CN** Cnidari
- At** Attinari
- Cm** Corallimorfari
- Oc** Ottocoralli
- PL** Policheti
- MO** Molluschi
- Pb** Prosobranchi
- Op** Opistobranchi
- Bi** Bivalvi
- Cf** Cefalopodi
- CT** Crostacei
- Cu** Cumacei
- Is** Isopodi
- Am** Anfipodi
- Dp** Decapodi
- ED** Echinodermi
- Cd** Crinoidei
- Ol** Oloturoidei
- Ec** Echinoidei
- Ad** Asteroidei
- Of** Ofiuroidei
- EN** Enteropneusti
- TU** Tunicati
- (1)** Ascidie solitarie
- (n)** Ascidie composte
- C** Condroitti
- O** Osteitti

Autori

Versione cartacea:

Commission of the European Communities
Ministero dell'Ambiente, Servizio Conservazione della Natura
Comitato Scientifico per la Fauna d'Italia

Minelli A., Ruffo S., La Posta S. (eds.), Checklist delle specie della fauna italiana, Calderini, Bologna

Versione informatizzata:

Ministero dell'Ambiente, Servizio Conservazione della Natura
Museo civico di Storia Naturale di Verona

Editori del supporto cartaceo

Alessandro Minelli, Sandro Ruffo, Sandro La Posta

Editor della versione informatizzata

Fabio Stoch

Elenco dei 272 autori della Checklist, con indicazione dei gruppi zoologici trattati:

ABBAZZI	Pietro	Coleoptera Curculionoidea
ABBIATI	Marco	Polychaeta Nereididae
AIELLO	Giuseppe	Ostracoda
AMORI	Giovanni	Mammalia
ANGELICI	Francesco	Mammalia
ANGELINI	Fernando	Coleoptera Leiodidae, Clambidae, Byrrhoidea, Cryptophagidae, Languriidae, Mycetophagidae, Ciidae
ARENBERGER	Ernst	Lepidoptera Pterophoridae
ARGANO	Roberto	Mystacocarida, Branchiura, Isopoda
AUDISIO	Paolo	Coleoptera Microsporidae, Hydroscaphidae, Hydraenidae, Agyrtidae, Silphidae, Scaphidiidae, Thorictidae, Trogossitidae, Cleridae, Phalacridae, Erotylidae, Cerylonidae, Bothrideridae, Alexiidae, Endomychidae, Colydiidae
AVIAN	Massimo	Cnidaria
BÄCHLI	Gerhard	Diptera Drosophilidae
BADALAMENTI	Fabio	Polychaeta Orbiniidae, Phyllodocidae, Sabellariidae
BALDIZZONE	Giorgio	Lepidoptera Coleophoridae
BALDUZZI	Andrea	Kamptozoa, Bryozoa
BALLETTO	Emilio	Lepidoptera Zygaenidae, Hesperioidea, Papilionoidea
BALSAMO	Maria	Gastrotricha
BARANJAK	Edward	Lepidoptera Yponomeutoidea
BARBAGALLO	Sebastiano	Homoptera Aphidoidea
BARRA	Diana	Ostracoda
BASSI	Graziano	Lepidoptera Pyralidae
BEDULLI	Daniele	Caudofoveata, Solenogastres,

BELCARI	Antonio	Gastropoda Gymnosomata, Bivalvia
BELFIORE	Carlo	Diptera Pipunculidae, Tephritidae
BELLO	Giambattista	Ephemeroptera
BERGAMASCO	Piero	Orthonectida, Dicyemida, Cephalopoda
BERNINI	Fabio	Hymenoptera Braconidae
BIANCHI	Carlo Nike	'Acari'
		Polychaeta Serpulidae, Spirorbidae;
		Pogonophora, Echiura, Sipuncula
BIN	Ferdinando	Hymenoptera Scelionidae
BINAZZI	Andrea	Homoptera Aphidoidea
BINDA	Maria	Tardigrada
BIONDI	Maurizio	Coleoptera Chrysomelidae
BODON	Marco	Gastropoda Neritidae,
		Cochlostomatidae, Aciculidae,
		Viviparidae, Thiaridae, Melanopsidae,
		Pomatiasidae, Bithyniidae, Hydrobiidae,
		Pyrgulidae, Emmericiidae, Valvatidae;
		Pulmonata
BOERO	Ferdinando	Cnidaria Hydrozoa
BOLCHI	Graziella	Homoptera Aphidoidea
BOLOGNA	Marco	Coleoptera Tetratomidae,
		Melandryidae, Rhipiphoridae, Meloidae,
		Oedemeridae, Mycteridae, Pythidae,
		Pyrochroidae, Pedilidae, Salpingidae,
		Othniidae
BONA	Franco	Digenea, Cestoda
BONADUCE	Gioacchino	Ostracoda
BOORMAN	John	Diptera Ceratopogonidae
BORSATO	Walter	Hymenoptera Vespidae
BRAIONI	Maria	Rotifera
BRUNO	Maria	Crustacea Harpacticoida
BURIOLA	Enrico	Digenea, Cestoda
CALECA	Virgilio	Hymenoptera Scelionidae
CAMPORESI	Sante	Lepidoptera Sesiidae
CANEPARI	Claudio	Coleoptera Coccinellidae
CANTONE	Grazia	Polychaeta Poecilochaetidae,
		Opheliidae, Scalibregmatidae,
		Onuphidae, Eunicidae, Euniphysidae,
		Lumbrineridae, Lphitimidae,
		Ichthyotomidae, Arabellidae,
		Oenonidae, Dorvilleidae
CANZONERI	Silvano	Diptera Ephydriidae, Canaceidae
CARPANETO	Giuseppe	Coleoptera Lucanoidea, Scarabaeoidea
CASALE	Achille	Hymenoptera Driapriidae
CASSULO	Luigi	Lepidoptera Zygaenidae, Hesperioidea,
		Papilionoidea
CASTAGNOLI	Marisa	'Acari'
CASTAGNOLO	Lucio	Bivalvia
CASTELLI	Alberto	Polychaeta, Pogonophora, Echiura,
		Sipuncula
CASTELLINI	Giorgio	Coleoptera Scydmaenidae
CATTANEO-VIETTI	Riccardo	Gastropoda Opisthobranchia
CECCHERELLI	Victor	Copepoda
CERIONI	Stefano	Digenea, Cestoda, Nematoda
CHEMELLO	Renato	Gastropoda Cephalaspidacea
CHEMINI	Claudio	Arachnida Scorpiones, Palpigradi,
		Solifugae, Opiliones

CIANFICCONI	Fernanda	Trichoptera
CICERONI	Alessandro	Coleoptera Staphylinidae
COLONNELLI	Enzo	Coleoptera Curculionoidea
COLUZZI	Mario	Diptera Culicidae
CONCI	Cesare	Homoptera Psylloidea
CONTINI	Carlo	Diptera Dixidae, Scenopinidae
COTTARELLI	Vezio	Branchiopoda
D'URSO	Vera	Homoptera Auchenorrhyncha
DACCORDI	Mauro	Coleoptera Chrysomelidae, Diptera Syrphidae
DAHL	Christine	Diptera Trichoceridae
DALLAI	Romano	Collembola
DE BIASE	Alessio	Coleoptera Microsporidae, Hydroscaphidae, Hydraenidae, Phalacridae, Erotylidae, Cerylonidae, Bothrideridae, Alexiidae, Endomychidae, Colydiidae
DE ZIO GRIMALDI	Susanna	Kinorhyncha, Tardigrada
DELL'ANGELO	Bruno	Monoplacophora, Polyplacophora
DEZFULI	Bahran Sayyaf	Acanthocephala
DI CAVE	David	Monogenea
DI GIROLAMO	Irene	Diptera Rhagionidae, Athericidae
DINI	Ferdinando	'Protozoa'
EMIG	Christian	Phoronida, Brachiopoda
FABBRI	Roberto	Coleoptera Byrrhoidea
FAILLA	Carmela	Blattaria
FALLENI	Alessandra	Gnathostomulida
FARACI	Franco	Heteroptera
FAVILLI	Leonardo	Gastropoda Neritidae, Cochlostomatidae, Aciculidae, Viviparidae, Thiaridae, Melanopsidae, Pomatiasidae, Bithyniidae, Hydrobiidae, Pyrgulidae, Emmericiidae, Valvatidae; Pulmonata
FERRARA	Franco	Isopoda
FERRARESE	Uberto	Diptera Chironomidae
FERRO	Giorgio	Coleoptera Sphaeridiidae
FIUMI	Gabriele	Lepidoptera Sesiidae
FOCHETTI	Romolo	Plecoptera
FODDAI	Donatella	Chilopoda
FRANCISCOLO	Mario	Coleoptera Mordellidae, Scaptiidae
FREDJ	Gaston	Nemertea, Priapulida, Hemichordata
FROGLIA	Carlo	Phyllocarida, Hoplocarida, Decapoda
FRUGIS	Sergio	Aves
GAEDIKE	Reinhard	Lepidoptera Tineidae, Douglassiidae, Acrolepiidae, Epermeniidae
GAMBI	Maria	Polychaeta Aphroditidae, Polynoidae, Polyodontidae, Sigalionidae, Eulepethidae, Chrysopetalidae, Pisionidae, Amphinomidae, Euprosynidae, Spintheridae
GANDOLFI	Gilberto	Agnatha, Chondrichthyes, Osteichthyes
GARDINI	Giulio	Pseudoscorpionida, Coleoptera Tenebrionidae
GHIRARDELLI	Elvezio	Chaetognatha
GHISOTTI	Fernando	Gastropoda Divasibranchia,

GIANGRANDE	Adriana	Gymnomorpha; Scaphopoda
GIANNUZZI-SAVELLI	Riccardo	Polychaeta Sabellidae
		Gastropoda Patellidae, Acmaeidae,
		Lepetidae, Cocculinidae, Lepetellidae,
		Addisoniidae, Choristellidae,
		Pseudocculinidae, Fissurellidae,
		Scissurellidae, Haliotidae, Trochidae,
		Colloniidae, Skeneidae, Tricoliidae,
		Turbinidae
GIORDANI-SOIKA	Antonio	Hymenoptera Vespidae
GIOVINE	Ferdinando	Gastropoda Atlantidae, Carinariidae,
		Pterotracheidae, Thecosomata
GIROLAMI	Vincenzo	Diptera Tephritidae
GIUSTI	Folco	Gastropoda Neritidae,
		Cochlostomatidae, Aciculidae,
		Viviparidae, Thiaridae, Melanopsidae,
		Pomatiasidae, Bithyniidae, Hydrobiidae,
		Pyrgulidae, Emmericiidae, Valvatidae;
		Pulmonata
GOBBI	Gianni	Coleoptera Cebrionidae, Cerophytidae,
		Eucnemidae, Throscidae, Buprestidae,
		Lymexylidae
GORODKOV	Kirill	Diptera Heleomyzidae, Scathophagidae
GOZMÁNY	László	Lepidoptera Pterolonchidae,
		Symmocidae, Holcopogonidae
GRAVINA	Maria	Polychaeta Questidae, Capitellidae,
		Arenicolidae, Nerillidae, Saccocirridae,
		Protodrilidae, Protodriloididae,
		Polygordiidae, Dinophilidae,
		Diurodrilidae
GREMIGNI	Vittorio	'Turbellaria'
GROPPALI	Riccardo	Aves
GUGLIELMO	Letterio	Euphausiacea
GUSSO-CHIMENZ	Carla	Pycnogonida
HÄTTENSCHWILER	Peter	Lepidoptera Psychidae
HOCHBERG	F.G.	Dicyemida
HUEMER	Peter	Lepidoptera Gelechiidae
IORI	Albertina	Siphonaptera
KARSHOLT	Ole	Lepidoptera Eriocraniidae, Tischeriidae,
		Ochsenheimeriidae, Gelechiidae,
		Heterogynidae
KATHIRITHAMBY	Jeyaraney	Strepsiptera
KOZÁNEK	Milan	Diptera Pipunculidae
KRISTENSEN	Reinhardt M.	Loricifera
KRIVOSHEINA	Nina P.	Diptera Pachyneuridae, Hesperinidae,
		Pleciidae, Bibionidae, Ditomyiidae,
		Keroplastidae, Diadocidiidae,
		Macroceridae, Mycetobiidae,
		Anisopodidae, Scatopsidae,
		Xylophagidae, Xylomyidae, Odiniidae
KRZEMINSKA	Ewa	Diptera Trichoceridae
KUZNETZOV	Sergei	Diptera Pipunculidae
LA GRECA	Marcello	Isoptera, Orthoptera
LA POSTA	Sandro	Mysidacea
LANERA	Pasquale	Polychaeta Glyceridae, Goniadidae
LANZA	Benedetto	Amphibia, Reptilia
LARDICCI	Claudio	Polychaeta Spionidae

LETARDI LIBERTI	Agostino Gianfranco	Mecoptera Coleoptera Lampyridae, Cantharidae, Phloiophilidae, Acanthocnemidae, Melyridae
LIENHARD LOMBARDO LONGO LUCCHESI LUCCHI LVOVSKY	Charles Francesco Santi Pia Andrea Aleksandr	Psocoptera Mantodea Homoptera Coccoidea 'Protozoa' Diptera Sciaridae Lepidoptera Depressariidae, Chimabachidae, Oecophoridae
LYNEBORG MACCHIONI MAJER	Leif Guido Josef	Diptera Therevidae 'Protozoa' Diptera Tabanidae, Nemestrinidae, Acroceridae, Asilidae
MALATESTA MANFREDI MANGANELLI	Ermanno Maria Giuseppe	Collembola Nematoda Gastropoda Neritidae, Cochlostomatidae, Aciculidae, Viviparidae, Thiaridae, Melanopsidae, Pomatiasidae, Bithyniidae, Hydrobiidae, Pyrgulidae, Emmericiidae, Valvatidae; Pulmonata
MANILLA MARGARITORA MARINIELLO MAROTTA MARTELLI MARULLO MASCAGNI MASON MASUTTI	Giulio Fiorenza Loredana Salvatore Minos Rita Alessandro Franco Luigi	Phthiraptera Cladocera Copepoda, Cumacea Homoptera Coccoidea Homoptera Aphidoidea Thysanoptera Coleoptera Georissidae, Dryopoidea Diptera Stratiomyidae Coleoptera Scolytidae, Platypodidae; Hymenoptera Symphyta
MATARRESE MAZZOCCHI MEI MELONE	Alfonso Maria Maurizio Giulio	Echinodermata Copepoda Hymenoptera Formicidae Gastropoda Architectonicidae, Mathildidae
MESSINA MILLS MINELLI	Angelo Claudia E. Alessandro	Blattaria, Orthoptera Ctenophora Branchiobdellae, Hirudinea, Chilopoda, Diplopoda
MINEO MORETTI MUNARI	Giovanni Giampaolo Lorenzo	Hymenoptera Scelionidae Trichoptera Diptera Phoridae, Sepsidae, Tethinidae, Sphaeroceridae
MURA NANNELLI NARDI	Graziella Roberto Gianluca	Branchiopoda 'Acari' Coleoptera Dermestidae, Lyctidae, Bostrichidae, Anobiidae, Ptinidae, Anthicidae, Aderidae
NARTSHUK	Emilia	Diptera Megamerinidae, Opomyzidae, Cryptochetidae, Chloropidae
NAVONE NEGRISOLO NICOLAI OLIVERIO	Paolo Enrico Paolo Marco	Hymenoptera Chalcidoidea Hymenoptera Sphecidae Diptera Blephariceridae Gastropoda Cingulopsidae,

		Anabathridae, Barleeiidae, Rissoidae, Truncatellidae, Assimineidae, Iravadiidae, Elachisinidae, Tornidae, Caecidae, Rissosoidea
OLMI	Massimo	Hymenoptera Bethyloidea
OMODEO	Pietro	Oligochaeta 'Megadrili'
OOSTERBROEK	Pjotr	Diptera Tipulomorpha
ORECCHIA	Paola	Digenea, Cestoda, Nematoda
OSELLA	Giuseppe	Coleoptera Curculionoidea
PAGGI	Lia	Digenea, Cestoda, Nematoda
PAGLIANO	Guido	Hymenoptera Cynipoidea, Chalcidoidea, Proctotrupidae, Heloridae, Megaspilidae, Ceraphronidae, Platygasteridae, Scoliidea, Pompilidae, Apoidea
PANSINI	Maurizio	Porifera
PANTALEONI	Roberto	Neuropteroidea
PAPE	Thomas	Diptera Sarcophagidae, Rhinophoridae, Oestridae
PAPP	László	Diptera Lauxaniidae, Clusiidae, Acarthophthalmidae, Anthomyzidae, Aulacigastridae, Periscelididae, Asteiidae, Chyromyidae, Braulidae, Carnidae, Milichiidae, Curtonotidae, Camillidae, Diastatidae
PARENTI	Umberto	Lepidoptera Elachistidae
PASSERIN	Pietro	Lepidoptera Scythrididae, Phycitinae
D'ENTRÈVES		
PATTI	Isidora	Homoptera Aphidoidea
PELLIZZARI	Giuseppina	Homoptera Coccoidea
PENATI	Fabio	Coleoptera Histeridae
PENNACCHIO	Francesco	Hymenoptera Braconidae
PESARINI	Carlo	Araneae
PESARINI	Fausto	Diptera Dolichopodidae; Hymenoptera Symphyta
PESCE	Giuseppe L.	Copepoda Cyclopidae
PIATTELLA	Emanuele	Coleoptera Lucanoidea, Scarabaeoidea
PILATO	Giovanni	Tardigrada
PIRISINU	Quirico	Coleoptera Helophoridae, Hydrochidae, Hydrophilidae, Sphaeridiidae, Spercheidae
PLATIA	Giuseppe	Coleoptera Elateridae
POGGI	Roberto	Coleoptera Ptiliidae, Dasyceridae, Pselaphidae, Eucinetidae, Scirtidae, Dascillidae, Omalisidae, Lycidae, Drilidae, Derodontidae, Nosedendridae, Sphindidae, Biphyllidae, Byturidae, Merophysiidae, Lathridiidae
POLDI	Bruno	Hymenoptera Formicidae
PONT	Adrian C.	Diptera Fanniidae, Muscidae
PRINCIPATO	Mario	Pentastomida
PRINCIPI	Maria	Neuropteroidea
PUTHZ	Volker	Coleoptera Staphylinidae
RAFFONE	Gianni	Diptera Microphoridae, Hybotidae, Empididae
RAINERI	Valter	Lepidoptera Lasiocampoidea, Bombycoidea, Drepanoidea, Axioidea,

RAMELLINI	Pietro	Geometroidea, Notodontidae,
RAPISARDA	Carmelo	Thaumetopoeidae, Lymantriidae,
RASPI	Alfio	Arctiidae, Syntomidae
RATTI	Enrico	Diplura
		Hemiptera Aleyrodoidea, Psylloidea
		Diptera Platypezidae, Chamaemyiidae
		Coleoptera Cucujidae, Silvanidae,
		Passandridae, Phloeostichidae,
		Hypocopridae, Corylophidae,
		Prostomidae
REGALIN	Renato	Coleoptera Chrysomelidae
RELINI	Giulio	Crustacea Cirripedia; Agnatha,
		Chondrichthyes, Osteichthyes
RICCI	Claudia	Rotifera
RICHTER	Vera	Diptera Tachinidae
RIEDL	Tadeusz	Lepidoptera Agonoxenidae,
		Batrachedridae, Stathmopodidae,
		Momphidae, Cosmopterygidae
		Hymenoptera Formicidae
RIGATO	Fabrizio	Tanaidacea
RIGGIO	Silvano	Diptera Thaumaleidae, Rhagionidae,
RIVOSECCHI	Leo	Athericidae, Vermileonidae, Mydidae,
		Lonchopteridae, Conopidae,
		Lonchaeidae, Otitidae, Platystomatidae,
		Pyrgotidae, Pallopteridae, Piophilidae,
		Micropezidae, Tanypezidae, Psilidae,
		Sciomyzidae, Hippoboscidae,
		Streblidae, Nycteribiidae
RIZZOTTI VLACH	Massimo	Heteroptera
ROGNES	Knut	Diptera Calliphoridae
ROSSARO	Bruno	Diptera Chironomidae
ROSSI	Lucia	Cnidaria Anthozoa
ROTA	Emilia	Oligochaeta Enchytraeidae
ROTTINI-SANDRINI	Laura	Cnidaria
ROZKOSNY	Rudolf	Diptera Anthomyiidae
RUFFO	Sandro	Crustacea Thermosbaenacea,
		Bathynellacea, Amphipoda
RUSO	Agatino	Hemiptera Coccoidea
SABATINI	Adriana	Diptera Culicidae
SABELLI	Bruno	Gastropoda Prosobranchia
SALAMANNA	Giovanni	Diptera Psychodidae
SAMA	Gianfranco	Coleoptera Cerambycidae
SAMBUGAR	Beatrice	Oligochaeta 'Microdrili'
SANTINI	Luciano	Diptera Bolytophilidae, Mycetophilidae
SCALI	Valerio	Phasmatodea
SCARAMOZZINO	Pier Luigi	Diptera Conopoidea; Hymenoptera
		Trigonalyoidea, Evanioidea,
		Stephanoidea, Ichneumonidae,
		Braconidae
SCHELLER	Ulf	Paupoda, Symphyla
SCHNEIDER	Nico	Psocoptera
SCHOLZ	Axel	Lepidoptera Alucitidae
SKURHAVÁ	Marcela	Diptera Cecidomyiidae
SOMASCHINI	Alessandra	Polychaeta Questidae, Capitellidae,
		Arenicolidae
SORDINO	Paolo	Polychaeta Hesionidae
SPADA	Gianni	Gastropoda, Conidae, Turridae; Bivalvia

SPEIDEL	Wolfgang	Lepidoptera Pyralidae
STARÝ	Jaroslav	Diptera Tipulomorpha
STEFANI	Renzo	Embioptera
STELLA	Emilia	Copepoda Calanoida
STRUMIA	Franco	Hymenoptera Chrysididae
SÜSS	Luciano	Diptera Agromyzidae
TONGIORGI	Paolo	Gastrotricha
TRANFAGLIA	Antonio	Homoptera Coccoidea
TREMATERRA	Pasquale	Lepidoptera Tortricidae
TREMBLAY	Ermenegildo	Hymenoptera Braconidae
TRIBERTI	Paolo	Lepidoptera Bucculatricidae, Gracillariidae, Phyllocnistidae
TURSI	Angelo	Cephalochordata, Urochordata
UTZERI	Carlo	Odonata
VAILATI	Dante	Coleoptera Cholevidae, Colonidae, Platypsyllidae
VAN NIEUKERKEN	Eric	Lepidoptera Nepticulidae, Opostegidae
V. SALVINI-PLAWEN	Luitfried	Caudofoveata, Solenogastres
VARALDA	Pier	Lepidoptera Elachistidae
VERNET	Guy	Nemertea
VICINI	Gianluca	Aves
VIENNA	Pierpaolo	Coleoptera Histeridae
VIGNA	Taglianti	Dermaptera; Coleoptera Carabidae
VINCIGUERRA	Maria	Nematoda
WAGNER	Ruediger	Diptera Chaoboridae, Empididae
WHITEBREAD	Steven	Lepidoptera Micropterigidae, Heliozelidae, Adelidae, Crinopterygidae, Incurvariidae
ZAITZEV	Vadim	Diptera Bombyliidae, Ulidiidae
ZAMPETTI	Marcello	Coleoptera Phalacridae, Erotylidae, Cerylonidae, Bothrideridae, Alexiidae, Endomychidae, Colydiidae, Bruchidae
ZANETTI	Adriano	Coleoptera Micropeplidae, Staphylinidae
ZANGHERI	Sergio	Lepidoptera Hepialidae, Roeslerstammiidae, Glyphipterigidae, Heliodinidae, Ethmiidae, Lecithoceridae, Blastobasidae, Cossidae, Brachodidae, Limacodidae, Choreutidae, Urodidae, Schreckensteiniidae, Carposinidae, Pyralidae, Thyridoidea
ZAPPAROLI	Marzio	Chilopoda
ZILLI	Alberto	Lepidoptera Lasiocampoidea, Bombycoidea
ZOIA	Stefano	Coleoptera Cholevidae, Colonidae, Platypsyllidae
ZULLINI	Aldo	Nematoda, Nematomorpha
ZUR STRASSEN	Richard	Thysanoptera
ZWICK	Peter	Diptera Ptychopteridae



CHECKLIST DELLE SPECIE DELLA FAUNA ITALIANA

Versione 1.0

PARTE I - PROTOZOI

Sarcomastigophora

Phytomastigophorea

Cryptomonadida

Cryptomonadidae

Chilomonas Ehrenberg, 1832

Chilomonas oblonga Pascher, 1913 (N)

Chilomonas paramecium Ehrenberg, 1832 (N)

Cryptomonas Ehrenberg, 1838

Cryptomonas compressa Pascher, 1913 (N)

Dinoflagellida

Blasidinidae

Amylodinium Brown & Hovasse, 1946

Amylodinium ocellatum (Brown, 1931) (3, 4, 5)

Blastodinium Chatton, 1920

Blastodinium contortum Chatton, 1920 (3)

Blastodinium hyalinum Chatton, 1920 (3)

Pyrocystidae

Pyrocystis Murray, 1876

Pyrocystis acuta Kofoid, 1907 (3)

Pyrocystis elegans Pavillard, 1930 (3, 4, 5)

Pyrocystis fusiformis Murray, 1876 (3, 4, 5)

Pyrocystis lanceolata Schröder, 1900 (3, 5)

Pyrocystis lunula Schütt, 1895 (3, 4, 5)

Pyrocystis robusta Kofoid, 1907 (3)

Noctilucidae

Kofoidinium Pavillard, 1928

Kofoidinium velelloides Pavillard, 1928 (3, 4, 5)

Pomatodinium Cachon & Cachon-Enjumet, 1966

Pomatodinium impatiens Cachon & Cachon-Enjumet, 1966 (3)

Pomatodinium micans Ehrenberg, 1832 (3, 4, 5)

Pomatodinium rotundatum (Schiller, 1918) (3)

Pomatodinium triestinum (Schiller, 1918) (3)

Gymnodiniidae

Actiniscus Ehrenberg, 1843

Actiniscus pentasterias Schütt, 1891 (3, 4, 5)

Heterodinium Kofoid, 1906

Heterodinium agassizi Kofoid, 1907 (3)

Heterodinium balechi Rampi, 1941 (3)

Heterodinium crassipes Schiller, 1916 (4)

Heterodinium debeauxi Rampi, 1943 (3)

Heterodinium detonii Rampi, 1934 (3)

Heterodinium dispar Kofoid & Adams, 1933 (3)

Heterodinium doma (Murray & Whitting, 1899) (3)

Heterodinium dubium Rampi, 1943 (3)

Heterodinium globosum Kofoid, 1907 (3)

Heterodinium grahami Rampi, 1941 (3)

Heterodinium kofoidi Pavillard, 1915 (3)

Heterodinium leiorhynchum (Murray & Whitting, 1899) (3)

Heterodinium mediterraneum Pavillard, 1932 (3)

Heterodinium milneri (Murray & Whitting, 1899) (3)

Heterodinium murrayi Kofoid, 1906 (3)

Heterodinium scrippsi Kofoid, 1906 (3)

Heterodinium whittingae Kofoid, 1906 (3)

Oxyrrhis Dujardin, 1841

Oxyrrhis marina Dujardin, 1841 (3, 4, 5)

Prorocentridae

Prorocentrum Ehrenberg, 1834

Prorocentrum adriaticum Schiller, 1918 (3, 4, 5)
Prorocentrum balticum Lohmann, 1902 (3, 4, 5)
Prorocentrum caudatum Lemmermann, 1913 (5)
Prorocentrum cinctum Schiller, 1925 (3, 4, 5)
Prorocentrum compressum Ostenfeld, 1902 (3, 4, 5)
Prorocentrum marinum Cienkowski, 1870 (3, 4, 5)

Dinophysidae

***Amphisolenia* Stein, 1883**

Amphisolenia bidentata Schröder, 1900 (3, 4, 5)
Amphisolenia extensa Kofoed, 1907 (3, 4, 5)
Amphisolenia inflata Murray & Whitting, 1899 (3, 4, 5)
Amphisolenia palmata Stein, 1883 (3, 4, 5)
Amphisolenia schroederi Kofoed, 1907 (3, 5)
Amphisolenia spinulosa Kofoed, 1907 (3, 4, 5)

***Citharistes* Stein, 1883**

Citharistes regius Stein, 1883 (3, 4, 5)

***Dinophysis* Ehrenberg 1840**

Dinophysis acuminata Claparède & Lachmann, 1859 (3)
Dinophysis acuta (Ehrenberg, 1840) (3, 4, 5)
Dinophysis apicata Kofoed & Skogsberg, 1928 (3)
Dinophysis argus Stein, 1883 (3, 4, 5)
Dinophysis caudata Kent, 1882 (3, 4, 5)
Dinophysis circumscuta Karsten, 1907 (3, 4, 5)
Dinophysis cuneus Schütt, 1895 (3, 4, 5)
Dinophysis dolichopterygia Murray & Whitting, 1899 (3, 4, 5)
Dinophysis doryphora Stein, 1883 (3, 4, 5)
Dinophysis expulsa Kofoed & Skogsberg, 1928 (3)
Dinophysis hastata Stein, 1883 (3, 4, 5)
Dinophysis homunculus Stein, 1883 (3)
Dinophysis mitra Schütt, 1895 (3, 4, 5)
Dinophysis nasuta (Stein, 1883) (3, 4, 5)
Dinophysis operculata Stein, 1883 (3)
Dinophysis operculoides Schütt, 1895 (3)
Dinophysis ovata (Claparède & Lachmann, 1858) (3, 4, 5)
Dinophysis ovum Schütt, 1895 (3, 4, 5)
Dinophysis parvula (Schütt, 1895) (3, 4, 5)
Dinophysis porodictya Stein, 1883 (3, 4, 5)
Dinophysis punctata Jörgensen, 1923 (3, 5)
Dinophysis rapa Stein, 1883 (3, 4, 5)

Dinophysis recurva Kofoed & Skogsberg, 1928 (3, 4, 5)
Dinophysis reticulata Kofoed, 1907 (3, 4, 5)
Dinophysis rotundata (Claparède & Lachmann, 1858) (3)
Dinophysis sacculus Stein, 1883 (3)
Dinophysis schroederi Pavillard, 1909 (3, 4, 5)
Dinophysis schuettii Murray & Whitting, 1899 (3, 4, 5)
Dinophysis sphaerica Stein, 1883 (3, 4, 5)
Dinophysis striata Kofoed, 1907 (3, 5)
Dinophysis triacantha Kofoed, 1907 (3, 5)
Dinophysis tripos Gourret, 1883 (3, 4, 5)
Dinophysis uracantha Stein, 1883 (3)

Histioneis Stein, 1883

Histioneis alata Rampi, 1947 (3)
Histioneis carinata Kofoed, 1907 (3)
Histioneis depressa Schiller, 1925 (3)
Histioneis detonii Rampi, 1941 (3)
Histioneis dolon Murray & Whitting, 1899 (3)
Histioneis expansa Rampi, 1947 (3, 4, 5)
Histioneis gubernans Schütt, 1895 (3)
Histioneis isseli Forti, 1922 (3)
Histioneis joergensi Schiller, 1925 (3, 4)
Histioneis kofoidi Forti & Issel, 1922 (3, 4, 5)
Histioneis longicollis Kofoed, 1907 (3, 4)
Histioneis marchesonii Rampi, 1941 (3)
Histioneis mediterranea Schiller, 1937 (3, 4)
Histioneis oxypteris Schiller, 1925 (4)
Histioneis paraformis Kofoed & Skogsberg, 1928 (3)
Histioneis pavillardi Rampi, 1939 (3, 4, 5)
Histioneis remora Stein, 1883 (3, 4, 5)
Histioneis sphaeroidea Rampi, 1947 (3, 4, 5)
Histioneis subcarinata Rampi, 1947 (3)
Histioneis variabilis Schiller, 1925 (3, 4)
Histioneis vouckii Schiller, 1925 (4)

Mesoporos Lillick 1928

Mesoporos adriatica (Schiller, 1928) (3, 4, 5)
Mesoporos globulos (Schiller, 1928) (3, 4, 5)

Ornithocercus Stein, 1883

Ornithocercus carolinae Kofoed, 1907 (3, 5)
Ornithocercus heteroporus Kofoed, 1907 (3, 4, 5)
Ornithocercus magnificus Stein, 1883 (3, 4, 5)
Ornithocercus quadratus Schütt, 1895 (3, 4, 5)
Ornithocercus serratus Kofoed, 1907 (3, 5)

Ornithocercus splendidus Schütt, 1895 (*)

Triposolenia Kofoid, 1906

Triposolenia abulatrix Kofoid, 1907 (3)

Triposolenia bicornis Kofoid, 1906 (3, 4, 5)

Triposolenia depressa Kofoid, 1906 (3, 4, 5)

Triposolenia truncata Kofoid, 1906 (3, 4, 5)

Note

Ornithocercus splendidus: Specie segnalata in acque italiane senza ulteriori precisazioni.

Peridiniidae

Blepharocysta Ehrenberg, 1873

Blepharocysta paulseni Schiller, 1937 (3, 4, 5)

Blepharocysta splendormaris Ehrenberg, 1873 (3, 4, 5)

Blepharocysta striata Schütt, 1895 (3, 4, 5)

Ceratium Schranck, 1793

Ceratium arietinum Cleve, 1901 (3, 4, 5)

Ceratium azoricum Cleve, 1901 (3, 4, 5)

Ceratium belone Cleve, 1901 (3, 4, 5)

Ceratium brunellii Rampi, 1942 (3)

Ceratium buceros Zaccharias, 1906 (3, 4, 5)

Ceratium carriense Gourret, 1883 (3, 4, 5)

Ceratium concilians Jörgensen, 1920 (3, 4, 5)

Ceratium contortum (Gourret, 1883) (3, 4, 5)

Ceratium contrarium (Gourret, 1883) (3, 4, 5)

Ceratium declinatum Karsten, 1907 (3, 4, 5)

Ceratium digitatum Schütt, 1896 (3)

Ceratium eurcuatum Jörgens, 1920 (3, 5)

Ceratium extensum (Gourret, 1883) (3, 4, 5)

Ceratium falcatum (Kofoid, 1907) (3, 4, 5)

Ceratium fusus (Ehrenberg, 1838) (3, 4, 5)

Ceratium gibberum Gourret, 1883 (3, 5)

Ceratium gravidium Gourret, 1883 (3, 4, 5)

Ceratium hexacanthum Gourret, 1883 (3, 4, 5)

Ceratium inflatum Kofoid, 1907 (3, 4, 5)

Ceratium kofoidi Jörgensen, 1920 (3)

Ceratium limulus Gourret, 1883 (3, 4, 5)

Ceratium longirostrum Gourret, 1883 (3, 4, 5)

Ceratium macroceros (Kofoid, 1906) (3, 4, 5)

Ceratium massiliense Gourret, 1883 (3, 4, 5)

Ceratium minutum Jörgensen, 1920 (3)
Ceratium mollis Kofoed, 1907 (3)
Ceratium pavillardii Jörgensen, 1920 (3, 4, 5)
Ceratium pentagonum Gourret, 1883 (3, 4, 5)
Ceratium ranipes Cleve, 1901 (3, 4, 5)
Ceratium setaceum Jörgensen, 1920 (3, 4, 5)
Ceratium teres Kofoed, 1907 (3, 4, 5)

Centrodinium Kofoed, 1907

Centrodinium boconicum (Murray & Whitting, 1899) (3, 4, 5)
Centrodinium complanatum (Cleve, 1903) (3, 4, 5)
Centrodinium eminens Bohm, 1933 (3)
Centrodinium intermedium Pavillard, 1905 (3, 4, 5)
Centrodinium maximum Pavillard, 1930 (3, 4, 5)
Centrodinium punctatum (Cleve, 1901) (3)
Centrodinium splendidum Rampi, 1943 (3)

Ceratocorys Stein, 1883

Ceratocorys armata Kofoed, 1910 (3, 4, 5)
Ceratocorys gourreti Paulsen, 1930 (3, 4, 5)
Ceratocorys horrida Stein 1883 (3, 4, 5)
Ceratocorys kofoidi Paulsen, 1930 (3, 4, 5)

Cladopyxis Stein, 1883

Cladopyxis brachiolatum Stein, 1883 (3, 4, 5)
Cladopyxis caryophyllum (Kofoed, 1907) (3, 4, 5)
Cladopyxis quadrispina Pavillard, 1937 (3)

Glenodinium Ehrenberg, 1883

Glenodinium lenticula (Bergh, 1882) (3)
Glenodinium pulvisculus Stein, 1883 (3)
Glenodinium uliginosum Schiller, 1935 (N)

Gonyaulax Diesing, 1866

Gonyaulax africana Schiller, 1925 (3)
Gonyaulax alaskensis Kofoed, 1907 (3)
Gonyaulax birostris Stein, 1883 (3)
Gonyaulax diacantha Athanassopoulos, 1931 (3)
Gonyaulax diegensis (Kofoed, 1907) (3)
Gonyaulax digitale (Pouchet, 1883) (3, 4, 5)
Gonyaulax fragilis (Schütt, 1895) (3)
Gonyaulax milneri (Murray & Whitting, 1899) (3)
Gonyaulax monacantha Pavillard, 1916 (3)

Gonyaulax pacifica Kofoid, 1907 (3)
Gonyaulax polyedra Stein, 1883 (3)
Gonyaulax polygramma Stein, 1883 (3, 4, 5)
Gonyaulax scripsae Kofoid, 1907 (3)
Gonyaulax sphaeroidea Kofoid, 1907 (3)
Gonyaulax turbynei Murray & Whitting, 1899 (3)

Heteraulacus Diesing, 1848

Heteraulacus polyedricum (Pouchet, 1885) (3, 4, 5)
Heteraulacus sphaericum Murray & Whitting, 1899 (3, 4, 5)

Oxytoxum Stein, 1883

Oxytoxum aceratum Rampi, 1943 (3)
Oxytoxum adriaticum Schiller, 1937 (4)
Oxytoxum areolatum Rampi, 1943 (3)
Oxytoxum brunellii Rampi, 1939 (3, 4, 5)
Oxytoxum caudatum Schiller, 1937 (4)
Oxytoxum constrictum (Stein, 1883) (3, 4, 5)
Oxytoxum coronatum Schiller, 1937 (4)
Oxytoxum crassum Schiller, 1937 (4)
Oxytoxum cristatum Kofoid, 1907 (3)
Oxytoxum depressum Schiller, 1937 (4)
Oxytoxum diploconus Stein, 1883 (3)
Oxytoxum elegans Pavillard, 1916 (3, 4, 5)
Oxytoxum frenguelli Rampi, 1943 (3)
Oxytoxum globosum Schiller, 1937 (4)
Oxytoxum gracile Schiller, 1937 (4)
Oxytoxum laticeps Schiller, 1937 (4)
Oxytoxum ligusticum Rampi, 1943 (3)
Oxytoxum longiceps Schiller, 1937 (3, 4)
Oxytoxum mediterraneum Schiller, 1937 (3, 4)
Oxytoxum milneri Murray & Whitting, 1899 (3, 4, 5)
Oxytoxum minutum Rampi, 1943 (3)
Oxytoxum obliquum Schiller, 1937 (4)
Oxytoxum ovale Schiller, 1937 (4)
Oxytoxum pachyderma Schiller, 1937 (4)
Oxytoxum parvum Schiller, 1937 (4)
Oxytoxum punctulatum Rampi, 1941 (3)
Oxytoxum radiosum Rampi, 1943 (3)
Oxytoxum reticulatum (Stein, 1883) (3, 4, 5)
Oxytoxum sceptrum (Stein, 1883) (3, 4, 5)
Oxytoxum scolopax Stein, 1883 (3, 4, 5)
Oxytoxum sphaeroideum (Stein, 1883) (3, 4, 5)
Oxytoxum spinosum Rampi, 1943 (3)
Oxytoxum tenuistriatum Rampi, 1943 (3)
Oxytoxum tessellatum (Stein, 1883) (3)

Oxytoxum turbo Kofoid, 1907 (4)
Oxytoxum variabile Schiller, 1937 (4)
Oxytoxum viride Schiller, 1937 (4)

Peridinium Ehrenberg, 1830

Peridinium adriaticum Broch, 1910 (3, 4, 5)
Peridinium brochii Kofoid & Swezy, 1921 (3, 4, 5)
Peridinium cictum Ehrenberg, 1838 (N)
Peridinium conicum Broch, 1910 (3, 4, 5)
Peridinium crassipes Kofoid, 1907 (3, 4, 5)
Peridinium curvipes Ostefeld, 1902 (3, 4, 5)
Peridinium diabolus Cleve, 1901 (3, 4, 5)
Peridinium divergens Ehrenberg, 1830 (3, 4, 5)
Peridinium globulus Stein, 1883 (3, 4, 5)
Peridinium grande Kofoid, 1907 (3, 4, 5)
Peridinium granii Ostefeld, 1902 (3, 4, 5)
Peridinium leonis Pavillard, 1916 (3, 4, 5)
Peridinium longicollis Pavillard, 1915 (3, 4, 5)
Peridinium longipes Karsten, 1907 (3)
Peridinium minusculum Pavillard, 1917 (3, 4, 5)
Peridinium ovum Schiller, 1935 (3, 4, 5)
Peridinium pallidum Ostefeld, 1902 (3, 4, 5)
Peridinium pedunculatum Schütt, 1895 (3)
Peridinium pellucidum (Bergh, 1882) (3, 4, 5)
Peridinium pusillum Lemmerman, 1901 (N)
Peridinium spiniferum Schiller, 1935 (3, 4, 5)
Peridinium subinermis Paulsen, 1903 (3, 4, 5)
Peridinium tenuissimum Kofoid, 1907 (3, 4, 5)
Peridinium trochoideum (Stein, 1883) (3)
Peridinium willei Huitfeld-Kaas, 1900 (N)

Podolampas Stein, 1883

Podolampas bipes Stein, 1883 (3, 4, 5)
Podolampas elegans Schütt, 1895 (3, 4, 5)
Podolampas palmipes Stein, 1883 (3, 4, 5)
Podolampas spinifer Okamura, 1912 (3, 4, 5)

Protoceratium Bergh, 1882

Protoceratium areolatum Kofoid, 1907 (3)
Protoceratium reticulatum (Claparède & Lachmann, 1858) (3)

Ptychodiscus Stein, 1883

Ptychodiscus inflatus Pavillard, 1916 (3, 4, 5)

Pyrophacus Stein, 1883

Pyrophacus horologium Stein, 1883 (3, 4, 5)

Spiraulax Kofoed, 1911

Spiraulax jollifei (Murray & Whitting, 1899) (3, 4, 5)

Euglenida

Eutreptiidae

Eutreptia Perty, 1852

Eutreptia viridis Perty, 1852 (N)

Astasiidae

Anisonema Dujardin, 1841

Anisonema acinus Dujardin, 1841 (N)

Anisonema striatum Klebs, 1893 (N)

Astasia Dujardin, 1841

Astasia kelbsii Lemmermann, 1913 (N)

Petalomonas Stein, 1859

Petalomonas mediocanellata Stein, 1859 (N)

Petalomonas pusilla (Stein, 1878) (N)

Euglenidae

Euglena Ehrenberg, 1830

Euglena acus Ehrenberg, 1831 (S)

Euglena deses Ehrenberg, 1833 (N)

Euglena elongata Schewiakoff, 1893 (N)

Euglena limnophila Lemmermann, 1914 (N)

Euglena oxyuris Schmarda, 1846 (N)

Euglena proxima Dangerard, 1901 (N)

Euglena terricola (Dangerard, 1901) (N)

Euglena viridis Ehrenberg, 1830 (N)

Phacus Dujardin, 1841

- Phacus alatus* Klebs, 1883 (N)
- Phacus longicaudatus* (Ehrenberg, 1838) (N)
- Phacus orbicularis* Hübner, 1886 (N)
- Phacus pyrum* (Ehrenberg, 1833) (N)

Trachelomonas Ehrenberg, 1834

- Trachelomonas obovata* Stokes, 1887 (N)
- Trachelomonas rugulosa* (Stein, 1883) (N)
- Trachelomonas verrucosa* Stokes, 1887 (N)
- Trachelomonas volvocina* Ehrenberg, 1833 (N)

Peranemidae

Entosiphon Stein, 1878

- Entosiphon sulcatum* (Dujardin, 1841) (N)

Heteronema Dujardin, 1841

- Heteronema acus* (Ehrenberg, 1840) (N)
- Heteronema acutissimum* Lemmermann, 1913 (N)

Peranema Dujardin, 1841

- Peranema trichophorum* (Ehrenberg, 1838) (N)

Chrysomonadida

Ochromonadaceae

Anthophysa Bory, 1822

- Anthophysa vegetans* (O.F. Müller, 1773) (N)

Dinobryon Ehrenberg, 1838

- Dinobryon sertularia* Ehrenberg, 1838 (N)

Oikomonas Kent, 1880

- Oikomonas mutabilis* Kent, 1880 (N, S)

Oikomonas socialis Moroff, 1910 (N, S)
Oikomonas termo (Ehrenberg, 1838) (N, S)

Spumella Cienkowski, 1870

Spumella dangeardii (Lemmermann, 1914) (N)

Synuraceae

Synura Ehrenberg, 1833

Synura uvella Ehrenberg, 1833 (N)

Prymnesiida

Coccolithophoridae

Calciosolenia Gran, 1927

Calciosolenia murrayi Gran, 1927 (3, 4, 5)

Calyptrosphaera Lohmann, 1902

Calyptrosphaera globosa Lohmann, 1902 (3, 4, 5)

Coccolithus Schwarz, 1932

Coccolithus fragilis (Lohmann, 1902) (3, 4, 5)
Coccolithus leptoporus (Lohmann, 1902) (3, 4, 5)

Discosphaera Haeckel, 1894

Discosphaera tubifer Lohmann, 1902 (3, 4, 5)

Homozygosphaera Deflandre, 1952

Homozygosphaera sp. (3, 4, 5) (*)

Pontosphaera Lohmann, 1902

Pontosphaera huxleyi Lohmann, 1902 (3, 4, 5)

Rhabdosphaera Haeckel, 1892

Rhabdosphaera stylifer Lohmann, 1902 (3, 4, 5)

***Syracosphaera* Lohmann, 1902**

Syracosphaera mediterranea Lohmann, 1902 (3, 4, 5)

Syracosphaera pulchra Lohmann, 1902 (3, 4, 5)

Note

Homozygosphaera sp.: Le citazioni sono incomplete.

Volvocida

Polyblepharidaceae

***Dunaliella* Teodoresco, 1905**

Dunaliella salina Teodoresco, 1905 (3, 4, 5)

Chlamydomonadaceae

***Chlamydomonas* Ehrenberg, 1834**

Chlamydomonas bacillaris R. Grandori & L. Grandori, 1934 (N, S)

Chlamydomonas depauperata Pascher, 1927 (N)

***Chlorogonium* Ehrenberg, 1837**

Chlorogonium euchlorum Ehrenberg, 1837 (N, S)

***Polytoma* Ehrenberg, 1894**

Polytoma dorsoventrale R. Grandori & L. Grandori, 1934 (N)

Polytoma longistigma R. Grandori & L. Grandori, 1934 (N)

Polytoma uvella (Ehrenberg, 1832) (N)

Volvocaceae

***Volvox* Linnaeus, 1758**

Volvox globator Linnaeus, 1758 (N)

Prasinomonadida

Pyramimonadaceae

Halosphaera Schmitz, 1879

Halosphaera viridis Schmitz, 1879 (3, 4, 5)

Silicoflagellida

Dictyochidae

Dictyocha Ehrenberg, 1839

Dictyocha fibula Ehrenberg, 1839 (3, 4, 5)

Dictyocha octonaria Ehrenberg, 1839 (3, 4, 5)

Dictyocha polyactis Ehrenberg, 1839 (3, 4, 5)

Dictyocha speculum Ehrenberg, 1839 (3, 4, 5)

Zoomastigophorea

Cercomonadida

Cercomonadidae

Cercomonas Dujardin, 1841

Cercomonas agilis Moroff, 1910 (S)

Cercomonas bodo (Meyer, 1897) (S)

Cercomonas crassicula Alexeieff, 1912 (N)

Cercomonas longicaudata Dujardin, 1841 (N)

Proteromonadida

Proteromonadidae

Proteromonas Kunstler, 1883

Proteromonas lacertaeviridis (Grassi, 1879) (N)

Retortamonadida

Retortamonadidae

Chilomastix Alexeieff, 1912

Chilomastix mesnili (Wenyon, 1910) (N, S, Si, Sa)

Retortamonas Grassi, 1879

Retortamonas grillotalpae Grassi, 1879 (N)

Retortamonas intestinalis (Wenyon & O'Connor, 1917) (*)

Note

Retortamonas intestinalis: Specie segnalata per il territorio italiano senza ulteriori precisazioni.

Trichomonadida

Monocercomonadidae

Dientamoeba Jepps & Dobell, 1918

Dientamoeba fragilis Jepps & Dobell, 1918 (N, S)

Histomonas Tyzzer, 1920

Histomonas meleagridis (Smith, 1895) (N, S, Si, Sa)

Monocercomonas Grassi, 1879

Monocercomonas coronellae Grassi, 1879 (N)

Trichomonadidae

Pentatrichomonas Mesnil, 1914

Pentatrichomonas hominis (Davaine, 1860) (S)

Tetratrichomonas Parisi, 1910

Tetratrichomonas gallinarum (Martin & Robertson, 1911) (*)

Trichomonas Donné, 1837

Trichomonas gallinae (Rivolta, 1878) (N, S, Si, Sa)

Trichomonas tenax (O.F. Müller, 1773) (N, S, Si)
Trichomonas vaginalis Donné, 1836 (N, S, Si, Sa)

Tritrichomonas Kofoid, 1920

Tritrichomonas batrachorum (Perty, 1852) (N)
Tritrichomonas caviae (Davaine, 1875) (N)
Tritrichomonas eberthi (Martin & Robertson, 1911) (N)
Tritrichomonas foetus (Riedmüller, 1928) (*)
Tritrichomonas muris (Grassi, 1879) (N, S, Si, Sa)

Note

Tetratrichomonas gallinarum: Specie segnalata per il territorio italiano senza ulteriori precisazioni.

Tritrichomonas foetus: Specie segnalata per il territorio italiano.

Oxymonadida

Polymastigidae

Monocercomonoides Travis, 1932

Monocercomonoides melolonthae (Grassi, 1879) (N, S, Si, Sa)

Diplomonadida

Enteromonadidae

Enteromonas da Fonseca, 1915

Enteromonas hominis da Fonseca, 1915 (N, S, Si, Sa)

Trepomonas Dujardin, 1841

Trepomonas agilis Dujardin, 1841 (N, S)

Hexamitidae

Giardia Kunstler, 1882

Giardia bovis Fantham, 1921 (N, S)
Giardia canis Hegner, 1922 (N, S)

Giardia cati Deschiens, 1925 (N)
Giardia chincillae Filice, 1952 (N, S, Si, Sa)
Giardia duodenalis (Davaine, 1875) (N, S)
Giardia intestinalis Stiles, 1915 (N, S, Si, Sa)
Giardia muris (Grassi, 1879) (N)

Hexamita Dujardin, 1838

Hexamita inflata Dujardin, 1841 (N)
Hexamita intestinalis (Dujardin, 1841) (*)
Hexamita salmonis (Moore, 1922) (N)

Spiroucleus Lavier, 1936

Spiroucleus elegans Lavier, 1936 (N)
Spiroucleus meleagridis (McNeil, Hinshaw & Kofoid, 1941) (N)

Note

Hexamita intestinalis: Specie segnalata per il territorio italiano senza ulteriori precisazioni.

Rhizomastigida

Mastigamoebidae

Mastigamoeba Schulze, 1875

Mastigamoeba limax Moroff, 1910 (N, S)
Mastigamoeba minuta R. Grandori & L. Grandori, 1934 (N)

Mastigella Frenzel, 1892

Mastigella mutabilis R. Grandori & L. Grandori, 1934 (N)

Hypermastigida

Lophomonadidae

Lophomonas Stein, 1859

Lophomonas blattarum Stein, 1859 (*)

Note

Lophomonas blattarum: Specie segnalata per il territorio italiano senza ulteriori precisazioni

Ebriida

Ebriidae

Ebria Borget, 1891

Ebria sp. (3, 4, 5) (*)

Note

Ebria sp.: Le citazioni sono incomplete.

Ebriopsidae

Hermesinum Zaccharias, 1906

Hermesinum adriaticum Zaccharias, 1906 (3, 4, 5)

Kinetoplastida

Bodonidae

Bodo Ehrenberg, 1830

Bodo angustus Dujardin, 1841 (N)

Bodo caudatus (Dujardin, 1841) (N)

Bodo edax Klebs, 1892 (N, S)

Bodo globosus Stein, 1875 (N, S)

Bodo obovatus Lemmermann, 1914 (N)

Bodo ovatus Dujardin, 1841 (N)

Bodo saltans Ehrenberg, 1830 (N)

Ichthyobodo Pinto, 1828

Ichthyobodo necator (Henneguy, 1883) (N, S)

Pleuromonas Perty, 1848

Pleuromonas jaculans Perty, 1848 (N)

Trypanosomatidae

Crithidia Léger, 1902

Crithidia bombi Gorbunov, 1987 (S)
Crithidia fasciculata Léger, 1902 (*)

Herpetomonas Kent, 1880

Herpetomonas muscarum (Leidy, 1846) (N)

Leishmania Ross, 1903

Leishmania infantum Nicolle 1909 (N, S, Si, Sa)
Leishmania major (Yakimov & Shokhov, 1915) (N)
Leishmania tarentolae Wenyon, 1921 (S)

Leptomonas Kent, 1880

Leptomonas oestri Pampiglione, 1967 (S)

Trypanosoma Gruby, 1843

Trypanosoma duttoni Thiroux, 1900 (S)
Trypanosoma equiperdum Doflein, 1901 (S, Si)
Trypanosoma gambiense Dutton, 1902 (S)
Trypanosoma granulosum Laveran & Mesnil, 1902 (S)
Trypanosoma leporis Vaccari, Pierasca & Quaglia, 1958 (N)
Trypanosoma lewisi (Kent, 1880) (N, S)
Trypanosoma platydactyli Catouillard, 1909 (S)
Trypanosoma rhodesiense Stephens & Fantham, 1910 (S)
Trypanosoma rotatorium Mayer, 1843 (N)
Trypanosoma theileri Laveran, 1902 (S)
Trypanosoma tincae Laveran & Mesnil, 1904 (N)

Note

Crithidia fasciculata: Specie segnalata per il territorio italiano senza ulteriori precisazioni.

Lobosea

Amoebida

Amoebidae

Amoeba Bory de St. Vincent, 1824

Amoeba albida Nägler, 1909 (S)
Amoeba alveolata Mareschk, 1879 (S)
Amoeba beryllifera Penard, 1902 (S)
Amoeba diffluens Ehrenberg, 1838 (S)
Amoeba fluida Gruber, 1885 (N, S)
Amoeba guttula Dujardin, 1841 (N)
Amoeba lacerata Dujardin, 1841 (S)
Amoeba lucens Penard, 1902 (S)
Amoeba proteus (Pallas, 1755) (S)
Amoeba radiosa (Ehrenberg, 1838) (N)
Amoeba spumosa Gruber, 1885 (N)
Amoeba verrucosa (Ehrenberg, 1838) (N)
Amoeba vespertilio Penard, 1902 (S)
Amoeba villosa Wallich, 1863 (N)
Amoeba vitrea Hertwig, 1902

Metachaos Schaeffer, 1926

Metachaos sp. (N)

Entamoebidae

Endamoeba Leidy, 1879

Endamoeba blattae (Bütschli, 1878) (*)

Endolimax Kuenen & Swellengrebel, 1917

Endolimax nana (Wenyon & O'Connor, 1917) (N, S, Si, Sa)

Entamoeba Casagrandi & Barbagallo, 1895

Entamoeba bovis (Liebetanz, 1905) (S)
Entamoeba coli (Grassi, 1879) (N, S, Si, Sa)
Entamoeba gingivalis (Gros, 1849) (N, S, Si, Sa)
Entamoeba histolytica Schaudinn, 1903 (N, S, Si, Sa)
Entamoeba invadens Rodhain, 1934 (S)
Entamoeba moshkovskii Tshalaia, 1941 (N, S, Si)
Entamoeba muris (Grassi, 1879) (N, S, Si, Sa)
Entamoeba ranarum Stabler, 1933 (N)
Entamoeba suis Hartmann, 1913 (Si)
Entamoeba vesicularis Penso, 1929 (S)

Iodamoeba Dobell, 1919

Iodamoeba buetschlii (von Prowazek, 1912) (N, S)

Note

Endamoeba blattae: Specie segnalata per il territorio italiano senza ulteriori precisazioni.

Hartmannellidae

Hartmannella Alexeieff, 1912

Hartmannella sp. (N) (*)

Note

Hartmannella sp.: Le uniche citazioni per l'Italia si riferiscono a specie non precisate.

Paramoebidae

Paramoeba Schaudinn, 1896

Paramoeba pigmentifera (Grassi, 1879) (*)

Note

Paramoeba pigmentifera: Specie segnalata per il territorio italiano senza ulteriori precisazioni.

Malpighamoebidae

Malpighamoeba Prell, 1927

Malpighamoeba locustae King & Taylor, 1936 (N, S)

Malpighamoeba mellificae Prell, 1927 (N, S)

Mayorellidae

Vexillifera Schaeffer, 1926

Vexillifera bacillipedes Page, 1969 (N)

Acanthamoebidae

Acanthamoeba Volkonsky, 1931

Acanthamoeba castellanii (Douglas, 1930) (N)

Schizopyrenida

Vahlkampfiidae

Naegleria Alexeieff, 1912

Naegleria australiensis (De Jonkheere, 1981) (N)

Vahlkampfia Chatton & Lalung-Bonnaire, 1912

Vahlkampfia limax (Vahlkampf, 1905) (N, S, Si)

Peliobiontida

Pelomyxidae

Pelomyxa Greeff, 1873

Pelomyxa palustris Greeff, 1873 (N)

Arcellinida

Cochliopodiidae

Cochliopodium Hertwig & Lesser, 1874

Cochliopodium granulatum Schaeffer, 1926 (N)

Arcellidae

Arcella Ehrenberg, 1832

Arcella costata Ehrenberg, 1832 (N)

Arcella discoides Ehrenberg, 1871 (N)

Arcella vulgaris Ehrenberg, 1832 (N)

Pyxidicula Ehrenberg, 1838

Pyxidicula operculata Ehrenberg, 1838 (N)

Hyalospheniidae

Cryptodiffugia Penard, 1890

Cryptodiffugia compressa Penard, 1802 (N)

Cryptodiffugia oviformis Penard, 1890

Cryptodiffugia sacculus (Penard, 1902) (N)

Hyalosphenia Stein, 1857

Hyalosphenia elegans Leidy, 1879 (N)

Diffugiidae

Cucurbitella Penard, 1902

Cucurbitella mespiliformis Penard, 1902 (N)

Diffugia Le Clerc, 1815

Diffugia acuminata Ehrenberg, 1838 (N)

Diffugia ampla Rampi, 1950 (N)

Diffugia arcula Leidy, 1879 (N)

Diffugia avellana Penard, 1890 (N)

Diffugia bombycina L. Grandori, 1934 (N)

Diffugia corona Wallich, 1864 (N)

Diffugia cyclotellina Garbini, 1898 (N)

Diffugia elegans Penard, 1890 (N)

Diffugia glans Penard, 1902 (N)

Diffugia globulosa Dujardin, 1837 (N)

Diffugia gramen Penard, 1902 (N)

Diffugia hydrostatica Zacharias, 1897 (N)

Diffugia lanceolata Penard, 1890 (N)

Diffugia lemani Blanc, 1892 (N)

Diffugia limnetica Levander, 1900 (N)

Diffugia lobostoma Leidy, 1879 (N)

Diffugia lucida Penard, 1890 (N)

Diffugia manicata Penard, 1902 (N)

Diffugia minuta Rampi, 1950 (N)

Diffugia pulex Penard, 1901 (N, S?)

Diffugia pristis Penard, 1902 (N)

Diffugia pyriformis Perty, 1849 (N)

Diffugia tuberculata (Wallich, 1864) (N)

Diffugia tubulata Rampi, 1950 (N)

Diffugia urceolata Carter, 1864 (N)

Diffugia viscidula Penard, 1902 (N)

Lesquereusia Schlumberger, 1835

Lesquereusia modesta Rhumbler, 1895 (N)

Pontigulasia Rhumbler, 1896

Pontigulasia bigibbosa Penard, 1902 (N)

Pontigulasia spiralis Rhumbler, 1896 (N)

Centropyxidae

Centropyxis Stein, 1857

Centropyxis aculeata (Ehrenberg, 1838) (N)

Centropyxis aerophila Deflandre, 1929 (N)

Centropyxis cassis Deflandre, 1929 (N)

Centropyxis constricta (Ehrenberg, 1841) (N)

Centropyxis deflandrei Rampi, 1950 (N)

Centropyxis eucornis (Ehrenberg, 1841) (N)

Centropyxis gibbosa Rampi, 1950 (N)

Centropyxis laevigata Penard, 1890 (N)

Centropyxis minuta Deflandre, 1929 (N)

Centropyxis platystoma Penard, 1890 (N)

Cyclopyxis Deflandre, 1929

Cyclopyxis arcelloides (Penard, 1902) (N)

Cyclopyxis eurystoma (Deflandre, 1929) (N)

Paraquadrulidae

Paraquadrula Deflandre, 1932

Paraquadrula globulosa (Penard, 1891) (N)

Nebelidae

Heleopera Leidy, 1879

Heleopera petricola Leidy, 1879 (N)

Nebela Leidy, 1874

Nebela bohémica Taranek, 1881 (N)

Nebela bursella Vejdovsky, 1882 (N)
Nebela collaris (Ehrenberg, 1848) (N)
Nebela galeata Penard, 1890 (N)
Nebela lageniformis Penard, 1890 (N)
Nebela tubulosa Penard, 1890 (N)
Nebela vitraea Penard, 1899 (N)
Nebela wailesi Deflandre, 1836 (N)

Phryganellidae

Phryganella Penard, 1902

Phryganella nidulus Penard, 1902 (N)
Phryganella paradoxa Penard, 1902 (N)

Filosea

Gromiida

Pseudodifflugiidae

Pseudodifflugia Schlumberger, 1845

Pseudodifflugia fulva (Archer, 1869) (N)
Pseudodifflugia gracilis Schlumberger, 1845 (N)
Pseudodifflugia spectabilis Penard, 1902 (N)

Euglyphidae

Assulina Leidy, 1879

Assulina semilunum (Ehrenberg, 1848) (N)

Corythion Taránek, 1881

Corythion dubium Taránek, 1881 (N)

Euglypha Dujardin, 1841

Euglypha alveolata Dujardin, 1841 (N, S)
Euglypha compressa Carter, 1869 (N)
Euglypha filifera Penard, 1890 (N)
Euglypha mucronata Leidy, 1879 (N, S)

Euglypha strigosa (Ehrenberg, 1871) (N)

Sphenoderia Schlumberger, 1845

Sphenoderia sp. (N) (*)

Tracheleuglypha Deflandre, 1928

Tracheleuglypha dentata (Vedjowsky, 1882) (N)

Trinema Dujardin, 1841

Trinema complanatum Penard, 1890 (N)

Trinema enchelys (Ehrenberg, 1838) (N, S)

Trinema lineare Penard, 1890 (N, S)

Note

Sphenoderia sp.: Le citazioni sono incomplete.

Cyphoderiidae

Cyphoderia Schlumberger, 1845

Cyphoderia ampulla (Ehrenberg, 1840) (N)

Cyphoderia margaritacea Schlumberger, 1845 (N)

Cyphoderia radiosa (Ehrenberg, 1840) (N, Si)

Cyphoderia trocha (Penard, 1899) (N)

Granuloreticulosea

Athalamida

Biomyxidae

Biomyxa Leidy, 1875

Biomyxa vagans Leidy, 1875 (N)

Monothalamida

Amphitremidae

Amphitrema Archer, 1869

Amphitrema sp. (N) (*)

Note

Amphitrema sp.: Le uniche citazioni per l'Italia si riferiscono a specie non precisate.

Microgromiidae

Microgromia Hertwig & Lesser, 1874

Microgromia socialis Hertwig & Lesser, 1874 (N, S)

Foraminiferida

Allogromiidae

Allogromia Rhumbler, 1904

Allogromia ovoidea Rhumbler, 1904 (4)

Marsupulina Rhumbler, 1904

Marsupulina schultzei Rhumbler, 1904 (4)

Astrorhizidae

Astrorhiza Sandahl, 1858

Astrorhiza arenaria Norman, 1877 (3)

Bathysiphonidae

Bathysiphon M. Sars, 1872

Bathysiphon filiformis M. Sars, 1872 (3)

Bathysiphon napolitanum Hofker, 1932 (3)

Bathysiphon rufus De Folin, 1886 (3)

Rhabdamminidae

Dendrophrya T.S. Wright, 1861

Dendrophrya arborescens (Norman, 1881) (3)

Marsipella Norman, 1878

Marsipella cylindrica Brady, 1882 (3)

Oculosiphon Avnimelech, 1952

Oculosiphon linearis (Brady, 1879) (3)

Rhabdammina M. Sars, 1869

Rhabdammina abyssorum M. Sars, 1869 (3)

Psammosphaeridae

Psammosphaera Schulze, 1875

Psammosphaera fusca Schulze, 1875 (3)

Psammosphaera parva Flint, 1899 (3)

Saccamminidae

Lagenammina Rhumbler, 1911

Lagenammina atlantica (Cushman, 1944) (3)

Saccammina Carpenter, 1869

Saccammina sphaerica Brady, 1871 (3)

Technitella Norman, 1878

Technitella legumen Norman, 1878 (3)

Hemisphaeramminidae

Iridia Heron-Allen & Earland, 1914

Iridia serialis (Le Calvez, 1935) (3)

Hippocrepinidae

Hyperammina Brady, 1878

Hyperammina friabilis Brady, 1884 (3)
Hyperammina levigata Wright, 1891 (3)

Jaculella Brady, 1879

Jaculella acuta Brady, 1879 (3)
Jaculella obtusa Brady, 1882 (3)

Saccorhiza Eimer & Fickert, 1899

Saccorhiza ramosa (Brady, 1879) (3)

Ammodiscidae

Ammodiscus Reuss, 1826

Ammodiscus catinus Hoeglund, 1947 (3)
Ammodiscus incertus (d'Orbigny, 1839) (3)
Ammodiscus perversus Sidebottom, 1910 (3)
Ammodiscus planorbis Hoeglund, 1947 (3)

Ammolagena Eimer & Fickert, 1899

Ammolagena clavata (Jones & Parker, 1860) (3)

Glomospira Cushman & Waters, 1927

Glomospira charoids (Jones & Parker, 1860) (3, 5)
Glomospira glomerata Hoeglund, 1947 (3)
Glomospira gordialis Jones & Parker, 1860 (3)

Tolypsammina Rhumbler, 1895

Tolypsammina vagans (Brady, 1879) (3)

Turritellella Rhumbler, 1904

Turritellella shoneana (Siddall, 1878) (3)

Hormosinidae

Hormosina Brady, 1879

Hormosina globulifera Brady, 1879 (3)

Reophax de Montfort, 1808

Reophax dentaliniformis (Brady, 1881) (3)

Reophax fusiformis (Williamson, 1851) (3)

Reophax guttifer (Brady, 1881) (3)

Reophax micaceus (Earland, 1934) (3)

Reophax nanus Rhumbler, 1911 (3)

Reophax scoriurus Montfort, 1808 (3)

Reophax scottii Chaster, 1892 (3)

Placopsilinae

Placopsilina d'Orbigny, 1850

Placopsilina bradyi Cushman & McCulloch, 1939 (3)

Haplophragmoididae

Cribr stomoides Cushman, 1910

Cribr stomoides jeffreysii (Williamson, 1858) (3)

Cribr stomoides subglobosum (O.G. Sars, 1910) (3)

Haplophragmoides Cushman, 1910

Haplophragmoides bradyi (Robertson, 1891) (3)

Discamminidae

Ammoscalaria Höglund, 1947

Ammoscalaria pseudospiralis (Williamson, 1858) (3)

Ammoscalaria tenuimargo (Brady, 1882) (3)

Discammina Lacroix, 1932

Discammina compressa (Goes, 1882) (3)

Ammosphaeroidinidae

Adercotryma Loeblich & Tappan, 1952

Adercotryma glomerata (Brady, 1878) (3)

Ammosphaeroidina Cushman, 1910

Ammosphaeroidina sphaeroidiniformis (Brady, 1884) (3)

Recurvoides Earland, 1934

Recurvoides turbinatus (Brady, 1881) (3)

Cyclamminidae

Alveolophragmium Stschedrina, 1936

Alveolophragmium scitulum (Brady, 1881) (3)

Alveolophragmium wiesneri (Parr, 1950) (3)

Cyclammina Brady, 1879

Cyclammina cancellata Brady, 1879 (3)

Cyclammina orbicularis Brady, 1881 (3)

Spiroplectamminidae

Spiroplectinella Kisel'man, 1972

Spiroplectinella earlandi (Parker, 1952) (3)

Spiroplectinella wrighti (Silvestri, 1903) (3)

Vulvulina d'Orbigny, 1826

Vulvulina pupa d'Orbigny, 1826 (4)

Nouriidae

Nouria Heron-Allen & Earland, 1914

Nouria polymorphinoides Heron-Allen & Earland, 1914 (3)

Trochamminidae

Trochammina Parker & Jones, 1859

Trochammina globigeriniformis (Parker & Jones, 1865) (3)
Trochammina inflata (Montagu, 1808) (3)
Trochammina nana (Brady, 1881) (3)
Trochammina ochracea (Williamson, 1858) (3)
Trochammina squamata Jones & Parker, 1860 (3)

Verneuilinidae

Eggerellina Marie, 1941

Eggerellina brevis (d'Orbigny, 1940) (4)

Gaudryina d'Orbigny, 1839

Gaudryina rudis Wright, 1900 (3)

Globotextulariidae

Globotextularia Eimer & Fickert, 1899

Globotextularia anceps (Brady, 1884) (3)

Eggerellidae

Bigenerina d'Orbigny, 1826

Bigenerina anulata O.G. Costa, 1856 (3)
Bigenerina cylindrica Cushman, 1922 (3)
Bigenerina levigata d'Orbigny, 1826 (4)
Bigenerina nodosaria d'Orbigny, 1826 (3, 4)
Bigenerina truncata d'Orbigny, 1826 (4)

Dorothia Plummer, 1931

Dorothia bradyana Cushman, 1936 (3)

Eggerella Cushman, 1933

Eggerella propinqua (Brady, 1884) (3)
Eggerella scabra (Williamson, 1858) (3)

Martinottiella Cushman, 1933

Martinottiella communis (d'Orbigny, 1846) (3)

Siphotextularia Finlay, 1939

Siphotextularia concava (Karrer, 1868) (3)

Textularia Defrance, 1824

Textularia aciculata d'Orbigny, 1826 (3, 4)
Textularia adriatica Fornasini, 1900 (4)
Textularia agglutinans d'Orbigny, 1839 (3, 4)
Textularia calva Lalicker, 1935 (3)
Textularia candeiana d'Orbigny, 1839 (3)
Textularia caudata d'Orbigny, 1826 (4)
Textularia conica d'Orbigny, 1839 (3)
Textularia digitata d'Orbigny, 1887 (4)
Textularia echinata d'Orbigny, 1826 (4)
Textularia gramen d'Orbigny, 1846 (3)
Textularia laevigata d'Orbigny, 1826 (4)
Textularia obtusa d'Orbigny, 1826 (4)
Textularia oviformis d'Orbigny, 1887 (4)
Textularia pala Czjzek, 1848 (3)
Textularia pseudorugosa Lacroix, 1931 (3)
Textularia punctulata d'Orbigny, 1826 (4)
Textularia pygmaea d'Orbigny, 1826 (4)
Textularia tuberosa d'Orbigny, 1826 (3)

Pseudogaudryinidae

Pseudocalvulina Cushman, 1936

Pseudocalvulina crustata Cushman, 1936 (4)
Pseudocalvulina humilis (Brady, 1884) (3)

Valvulinidae

Clavulina d'Orbigny, 1826

Clavulina angularis d'Orbigny, 1826 (4)
Clavulina crustata (Cushman, 1936) (3)

Goesella Cushman, 1933

Goesella gymnesica (Colom, 1964) (3)

Siphogenerina Schlumberger, 1883

Siphogenerina bifrons (Brady, 1881)

Siphogenerina bifrons striatula Cushman, 1917 (3)

Valvulina d'Orbigny, 1826

Valvulina sp. (3) (*)

Note

Valvulina sp.: Le uniche citazioni per l'Italia si riferiscono a specie non precisate.

Spirillinidae

Spirillina Ehrenberg, 1843

Spirillina limbata Brady, 1879 (3)

Spirillina obconica Brady, 1879 (3)

Spirillina tuberculata Brady, 1879 (3)

Spirillina vivipara Ehrenberg, 1843 (3)

Carterinidae

Carterina Brady, 1884

Carterina spiculotesta (Carter, 1877) (3)

Cornuspiridae

Cornuspira Schultze, 1854

Cornuspira carinata (O.G. Costa, 1856) (3)

Cornuspira foliacea (Philippi, 1844) (3, 5)

Cornuspira involvens (Reuss, 1850) (3)

Nubeculariidae

Nodobacularia Rhumbler, 1895

Nodobacularia glomerosa (Colom, 1959) (3)

Nubecularia Defrance, 1825

Nubecularia lucifuga Defrance, 1825 (3)

Nubecularia massutiana Colom, 1942 (3)

Ophthalmidiidae

Cornuloculina Burbach, 1886

Cornuloculina inconstans (Brady, 1879) (3)

Ophthalmidium Kübler & Zwingli, 1870

Ophthalmidium acutimargo (Brady, 1884) (3)

Ophthalmidium concavum (Wiesner, 1916) (3)

Fischerinidae

Fischerina Terquem, 1878

Fischerina compressa (Wiesner, 1923) (3)

Vertebralina d'Orbigny, 1826

Vertebralina striata d'Orbigny, 1826 (3)

Wiesnerella Cushman, 1933

Wiesnerella auriculata (Egger, 1895) (3)

Spiroloculinidae

Spiroloculina d'Orbigny, 1826

Spiroloculina acutimargo Brady, 1884 (4)

Spiroloculina canaliculata d'Orbigny, 1846 (3, 4)

Spiroloculina depressa d'Orbigny, 1826 (3)

Spiroloculina disparilis Terquem, 1878 (3)

Spiroloculina excavata d'Orbigny, 1846 (3, 4)

Spiroloculina rostrata Reuss, 1850 (3)

Spiroloculina tenuiseptata Brady, 1884 (3)

Spiroloculina terquemiana Fornasini, 1900 (4)

Haurinidae

Articulina d'Orbigny, 1826

Articulina mucronata (d'Orbigny, 1839) (3)

Articulina sagra d'Orbigny, 1839 (4)
Articulina tubulosa (Seguenza, 1862) (3)

Biloculinella Wiesner, 1931

Biloculinella cylindrica Todd, 1958 (3)
Biloculinella globulus (Bornemann, 1855) (3)
Biloculinella inflata (Wright, 1902) (3)
Biloculinella irregularis (d'Orbigny, 1839) (3, 4)
Biloculinella labiata (Schlumberger, 1891) (3)

Cruciloculina d'Orbigny, 1839

Cruciloculina navarroi Colom, 1964 (3)
Cruciloculina triangularis d'Orbigny, 1839 (3)

Massilina Schlumberger, 1893

Massilina secans (d'Orbigny, 1826) (3)

Miliolinella Wiesner, 1931

Miliolinella circularis (Bornemann, 1855)
Miliolinella circularis elongata Kruit, 1955 (3)
Miliolinella semicostata (Wiesner, 1923) (3)
Miliolinella subrotunda (Montagu, 1803) (3)
Miliolinella webbiana (d'Orbigny, 1839) (3)

Nummoloculina Steinmann, 1881

Nummoloculina contraria (d'Orbigny, 1846) (3)

Pyrgo Defrance, 1824

Pyrgo anomalia (Schlumberger, 1891) (3)
Pyrgo bradyi (Schlumberger, 1891) (3)
Pyrgo bulloides (d'Orbigny, 1826) (4)
Pyrgo depressa (d'Orbigny, 1826) (3, 4)
Pyrgo elongata (d'Orbigny, 1826) (3)
Pyrgo labiata (Schlumberger, 1891) (3)
Pyrgo inornata (d'Orbigny, 1846) (3)
Pyrgo mutabilis (Martinotti, 1921) (3)
Pyrgo oblonga d'Orbigny, 1839 (4)

Pyrgoella Cushman & White, 1936

Pyrgoella sphaera (d'Orbigny, 1839) (3)

Quinqueloculina d'Orbigny, 1826

Quinqueloculina affinis (d'Orbigny, 1826) (3)
Quinqueloculina agglutinans d'Orbigny, 1839 (4)
Quinqueloculina angularis d'Orbigny, 1826 (3)
Quinqueloculina aspera d'Orbigny, 1826 (3, 4)
Quinqueloculina auberiana d'Orbigny, 1839 (3)
Quinqueloculina berthelotiana d'Orbigny, 1839 (3)
Quinqueloculina bicarinata (d'Orbigny, 1826) (4, 5)
Quinqueloculina bidentata d'Orbigny, 1839 (3)
Quinqueloculina bosciana d'Orbigny, 1839 (3)
Quinqueloculina bradyana Cushman, 1917 (3)
Quinqueloculina contorta d'Orbigny, 1846 (3)
Quinqueloculina costata (Terquem, 1878) (4)
Quinqueloculina disparilis Schlumberger, 1893 (3)
Quinqueloculina italica Terquem, 1878 (3)
Quinqueloculina lamarckiana d'Orbigny, 1839 (3, 4, 5)
Quinqueloculina lata Terquem, 1876 (3)
Quinqueloculina miletti (Wiesner, 1912) (3)
Quinqueloculina neapolitana Sgarrella & Zei, 1993 (3)
Quinqueloculina padana Perconig, 1954 (4)
Quinqueloculina parvula Schlumberger, 1894 (3)
Quinqueloculina pentagona Giunta, 1954 (3)
Quinqueloculina poeyana d'Orbigny, 1839 (3)
Quinqueloculina pygmaea Reuss, 1850 (3)
Quinqueloculina seminulum (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)
Quinqueloculina semistriata d'Orbigny, 1826 (3, 4)
Quinqueloculina stalkerii Loeblich & Tappan, 1953 (3)
Quinqueloculina stelligera Schlumberger, 1893 (3)
Quinqueloculina striata d'Orbigny 1826 (3, 4)
Quinqueloculina tenuicollis (Wiesner, 1923) (3)
Quinqueloculina trigonula Terquem, 1876 (3)
Quinqueloculina undulata d'Orbigny, 1852 (3)
Quinqueloculina variolata Terquem, 1878 (3)
Quinqueloculina viennensis Le Calvez & Le Calvez, 1958 (3)
Quinqueloculina villafranca Le Calvez & Le Calvez, 1958 (3)
Quinqueloculina vulgaris d'Orbigny, 1826 (3, 4)

Sigmoilina Schlumberger, 1887

Sigmoilina costata Schlumberger, 1893 (3)
Sigmoilina distorta Phleger & Parker, 1951 (3)
Sigmoilina edwardsii (Schlumberger, 1887) (3)
Sigmoilina grata (Terquem, 1878) (3)
Sigmoilina sigmoidea (Brady, 1884) (3)
Sigmoilina tenuis (Czjzek, 1848) (3)
Sigmoilina tricostata (Cushman & Todd, 1944) (3)

Sigmoilnopsis Finlay, 1947

- Sigmoilnopsis asperula* (Karrer, 1868) (3)
- Sigmoilnopsis coelata* (O.G. Costa, 1855) (4, 5)
- Sigmoilnopsis schlumbergeri* (Silvestri, 1904) (3, 4)

Siphonaperta Vella, 1957

- Siphonaperta aspera* (d'Orbigny, 1826) (3)
- Siphonaperta osinclinatum* (Le Calvez & Le Calvez, 1958) (3)

Triloculina d'Orbigny, 1826

- Triloculina angusteoralis* (Wiesner, 1923) (3)
- Triloculina bermudezi* Acosta, 1940 (3)
- Triloculina circularis* Bornemann, 1855 (3)
- Triloculina dubia* d'Orbigny, 1826 (3, 4, 5)
- Triloculina laevigata* (Terquem, 1878) (3, 4, 5)
- Triloculina oblonga* (Montagu, 1803) (3)
- Triloculina planciana* (d'Orbigny, 1839) (3)
- Triloculina plicata* Terquem, 1878 (3)
- Triloculina quadrilateralis* d'Orbigny, 1839 (3)
- Triloculina rotunda* d'Orbigny, 1839 (3, 4)
- Triloculina rugosa* (Fornasini, 1905) (4)
- Triloculina tricarinata* d'Orbigny, 1826 (3, 4)
- Triloculina trigonula* (Lamarck, 1804) (3, 4, 5)

Peneroplidae

Peneroplis de Monfort, 1808

- Peneroplis pertusus* (Forsskål, 1775) (3)
- Peneroplis planatus* (Fichtel & Moll, 1798) (3, 4)

Sorites Ehrenberg, 1840

- Sorites orbicularis* (Forsskål, 1775) (3)

Spirolina Lamarck, 1804

- Spirolina clavata* Crouch, 1827 (4)

Nodosariidae

Dentalina d'Orbigny, 1826

Dentalina aciculata (d'Orbigny, 1826) (3, 4)
Dentalina albatrossi (Cushman, 1923) (3)
Dentalina arcuata d'Orbigny, 1826 (4)
Dentalina baggi Galloway & Wissler, 1927 (3)
Dentalina carinata d'Orbigny, 1826 (4)
Dentalina communis (d'Orbigny, 1826) (3)
Dentalina doliolum O.G. Costa, 1856 (5)
Dentalina ferussacii Guérin-Ménéville, 1843 (4)
Dentalina guttifera d'Orbigny, 1846 (3)
Dentalina inflexa (Reuss, 1866) (3)
Dentalina inornata d'Orbigny, 1846 (3)
Dentalina legumiformis (Batsch, 1791) (3)
Dentalina mucronata Neugeboren, 1856 (3)

Frondicularia Defrance, 1826

Frondicularia alata d'Orbigny, 1826 (4)
Frondicularia rhomboidalis d'Orbigny, 1826 (4)

Lingulina d'Orbigny, 1826

Lingulina gracillima O.G. Costa, 1861 (3)
Lingulina seminuda (Hantken, 1875) (3)
Lingulina soldani d'Orbigny, 1826 (4)

Nodosaria Lamarck, 1812

Nodosaria gibba Fornasini, 1902 (4)
Nodosaria inflexa (Reuss, 1866) (3)
Nodosaria intorta Dervieux, 1894 (4)
Nodosaria orthocera d'Orbigny, 1826 (3, 4, 5)
Nodosaria radricula (Linnaeus, 1756) (4)
Nodosaria raphanus (Linnaeus, 1758) (3, 4)
Nodosaria scalaris d'Orbigny, 1826 (3, 4, 5)
Nodosaria undulata d'Orbigny, 1902 (4)

Pseudonodosaria Boomagaart, 1949

Pseudonodosaria comatula (Schwager, 1866) (3)

Vaginulidae

Amphicoryna Schlumberger, 1881

Amphicoryna hirsuta (d'Orbigny, 1826) (3)
Amphicoryna pseudoscalaris (Silvestri, 1904) (3)
Amphicoryna scalaris Batsch, 1791 (3, 4)

Astacolus Ehrenberg, 1858

Astacolus crepidulatus (Fichtel & Moll, 1798) (3)

Dimorphina d'Orbigny, 1826

Dimorphina tuberosa d'Orbigny, 1826 (3)

Lenticulina Lamarck, 1804

Lenticulina calcar (Linnaeus, 1758) (3)

Lenticulina costata d'Orbigny, 1826 (4)

Lenticulina cultrata (Montfort, 1808) (3)

Lenticulina gibba (d'Orbigny, 1839) (3)

Lenticulina limbosa (Reuss, 1863) (3)

Lenticulina orbicularis (d'Orbigny, 1826) (3)

Marginulina d'Orbigny, 1826

Marginulina berthelotiana d'Orbigny, 1839 (3)

Marginulina costata (Batsch, 1791) (3)

Marginulina cornucopiae (d'Orbigny, 1826) (4)

Marginulina glabra d'Orbigny, 1826 (3)

Marginulina hirsuta d'Orbigny, 1826 (4)

Marginulina laevigata d'Orbigny, 1826 (4)

Marginulina litus d'Orbigny, 1826 (4)

Marginulina lobata d'Orbigny, 1826 (4)

Marginulina mellii Fornasini, 1887 (3)

Marginulina striatula Cushman, 1913 (3)

Neolenticulina McCulloch, 1977

Neolenticulina peregrina (Schwager, 1866) (3)

Saracenaria Defrance, 1824

Saracenaria italica Defrance, 1824 (3)

Vaginulina d'Orbigny, 1826

Vaginulina caudata d'Orbigny, 1826 (4)

Vaginulina costata Fornasini, 1902 (3)

Vaginulina elegans d'Orbigny, 1826 (4)

Vaginulina lequilensis Fornasini, 1901 (3)

Vaginulina marginata d'Orbigny, 1826 (4)

Vaginulina mediterranea Hofker, 1932 (3)

Vaginulina peregrina Cushman, 1923 (3)

Vaginulina recta (Reuss, 1863) (3)
Vaginulina stratoidea Gordon, 1965 (4)
Vaginulina tricarinata d'Orbigny, 1826 (4)

Lagenidae

Lagena Walker & Boys, 1784

Lagena arquata Buchner, 1940 (3)
Lagena clavata (d'Orbigny, 1846) (3)
Lagena defiorei Buchner, 1940 (5)
Lagena elongata (Ehrenberg, 1844) (3)
Lagena fornasinii Buchner, 1940 (3)
Lagena gracilis Williamson, 1848 (3)
Lagena gracillima (Seguenza, 1862)
Lagena gracillima mollis Cushman, 1944 (3)
Lagena humilis Buchner, 1940 (3)
Lagena laevis (Montagu, 1803) (3)
Lagena nebulosa Cushman, 1923 (3)
Lagena ollula Buchner, 1940 (3)
Lagena orbignyana Brady, 1884 (3)
Lagena radiata (Seguenza, 1862) (3)
Lagena semistriata Williamson, 1848 (3)
Lagena striata (d'Orbigny, 1839) (3)
Lagena sulcata (Walker & Jacob, 1798) (3)
Lagena turgida Buchner, 1940 (3)
Lagena tympaniolum Buchner, 1940 (3, 5)
Lagena uncifera Buchner, 1940 (3)

Polymorphinidae

Globulina d'Orbigny, 1839

Globulina gibba (d'Orbigny, 1826) (3)
Globulina inaequalis Reuss, 1850 (3)
Globulina minuta (Roemer, 1838) (3)

Ellispolagenidae

Fissurina Reuss, 1850

Fissurina apiculata Reuss, 1863 (3)
Fissurina aurifera (Buchner, 1940) (3)
Fissurina bicarinata Terquem, 1882 (3)
Fissurina castanea (Flint, 1899) (3)

Fissurina clathrata (Brady, 1884) (3)
Fissurina crustosa (Buchner, 1940) (3)
Fissurina cucullata Silvestri, 1902 (3)
Fissurina eburnea (Buchner, 1940) (3)
Fissurina fasciata (Egger, 1857) (3)
Fissurina furcillifera (Buchner, 1940) (3)
Fissurina granifera (Buchner, 1940) (3)
Fissurina laevigata Reuss, 1850 (3)
Fissurina lagenoides (Williamson, 1858) (3)
Fissurina neglecta (Buchner, 1940) (3)
Fissurina neptuni (Buchner, 1940) (3)
Fissurina numiformis (Buchner, 1940) (3)
Fissurina orbignyana Seguenza, 1862 (3)
Fissurina pseudomarginata (Buchner, 1940) (3)
Fissurina pseudoorbignyana (Buchner, 1940) (3)
Fissurina schlichti Silvestri, 1902 (3)
Fissurina varioperforata (Buchner, 1940) (3)
Fissurina sidebottomi (Buchner, 1940) (3)

Oolina d'Orbigny, 1839

Oolina acuticosta (Reuss, 1862) (3)
Oolina artificiosa (Buchner, 1940) (3)
Oolina felsinea (Fornasini, 1894) (3)
Oolina foveolata (Seguenza, 1862) (3)
Oolina globosa (Montagu, 1803) (3)
Oolina hexagona (Williamson, 1848) (3, 4)
Oolina lineata (Williamson, 1848) (3)
Oolina montagui (Alcock, 1865) (3)
Oolina williamsoni (Alcock, 1865) (3)

Parafissurina Parr, 1947

Parafissurina caelata (Buchner, 1940) (3)
Parafissurina inaequilateralis (Wright, 1886) (3)
Parafissurina lateralis (Cushman, 1913) (3)
Parafissurina staphyllearia (Schwager, 1866) (3)
Parafissurina uncifera (Buchner, 1940) (3)

Pytine Moncharmont Zei & Sgarrella, 1978

Pytine parthenoeia Moncharmont Zei & Sgarrella, 1978 (3)

Sipholagena Moncharmont Zei & Sgarrella, 1980

Sipholagena benevestita (Buchner, 1940) (3)

Glandulinidae

Glandulina d'Orbigny, 1839

Glandulina laevigata (d'Orbigny, 1826) (3)

Guttulina d'Orbigny, 1839

Guttulina problema (d'Orbigny, 1826) (3)

Polymorphina d'Orbigny, 1826

Polymorphina lucida Fornasini, 1902 (4)

Polymorphina silicea Schultze, 1854 (4)

Polymorphina soldani d'Orbigny, 1826 (4)

Pyrulina d'Orbigny, 1839

Pyrulina fusiformis (Remer, 1838) (3)

Ramulina Jones, 1875

Ramulina globulifera Brady, 1879 (3)

Soritidae

Ilotes de Montfort, 1808

Ilotes rotalitatus de Montfort, 1808 (3)

Ceratobuliminidae

Ceratobulimina Toulou, 1915

Ceratobulimina artica Green, 1960 (3)

Lamarckina Berthelin, 1881

Lamarckina scabra (Brady, 1884) (3)

Epistominidae

Hoeglundina Brotzen, 1948

Hoeglundina elegans (d'Orbigny, 1826) (3, 4)
Hoeglundina mediterranea Hofker, 1954 (3, 4, 5)

Anomalinidae

Anomalina d'Orbigny, 1826

Anomalina orbicularis Fornasini, 1902 (4)
Anomalina polymorpha O.G. Costa, 1856 (3, 5)
Anomalina romulea Nicolucci, 1846 (3)
Anomalina variolata d'Orbigny, 1846
Anomalina variolata evoluta Walther, 1888 (3)

Robertinidae

Alliatina Troelsen, 1954

Alliatina excentrica (Di Napoli Alliata, 1952) (3)

Robertina d'Orbigny, 1846

Robertina bradyi Cushman & Parcher, 1936 (3, 4)
Robertina traslucens Cushman & Parcher, 1936 (3)

Globorotaliidae

Globorotalia Cushman, 1927

Globorotalia crassula Cushman & R.E. Stewart, 1930 (3, 4, 5)
Globorotalia inflata Hussey, 1949 (3, 4, 5)
Globorotalia oscitans Todd, 1958 (3, 4)
Globorotalia planoconvexa Hug, 1970 (3, 4, 5)
Globorotalia scitula (Brady, 1881) (4)
Globorotalia truncatulinoides (d'Orbigny, 1839) (3, 4, 5)

Candenidae

Globigerinita Bronnimann, 1951

Globigerinita glutinata (Egger, 1893) (3, 4, 5)

Globanomalinidae

Hastigerinella Cushman, 1927

Hastigerinella digitata (Rhumbler, 1911) (3, 4, 5)

Globigerinidae

Globigerina d'Orbigny, 1826

Globigerina bulloides (d'Orbigny, 1826) (3, 4, 5)
Globigerina concinna Reuss, 1850 (3, 4)
Globigerina dutertrei d'Orbigny, 1839 (4)
Globigerina eggeri (Rhumbler, 1901) (4)
Globigerina inflata d'Orbigny, 1839 (3)
Globigerina pachyderma (Ehrenberg, 1861) (3, 4)
Globigerina puncticulata (d'Orbigny, 1826) (4)
Globigerina quinqueloba Natland, 1938 (4)

Globigerinella Cushman, 1927

Globigerinella aequilateralis (Brady, 1879) (3, 4, 5)

Globigerinoides Cushman, 1927

Globigerinoides adriaticus (Fornasini, 1899) (4)
Globigerinoides conglobatus (Brady, 1879) (3, 4, 5)
Globigerinoides elongatus (d'Orbigny, 1826) (3, 4, 5)
Globigerinoides gomitulus (Seguenza, 1880) (4)
Globigerinoides helicina (d'Orbigny, 1826) (3, 4, 5)
Globigerinoides ruber (d'Orbigny, 1839) (3, 4, 5)
Globigerinoides sacculifer (Brady, 1877) (3, 4, 5)
Globigerinoides trilobus (Reuss, 1850) (3, 5)

Hastigerina Thomson, 1876

Hastigerina aequilateralis (Brady, 1884) (4)

Orbulina d'Orbigny, 1839

Orbulina bilobata (d'Orbigny, 1846) (4)
Orbulina suturalis Bronnimann, 1951 (4)
Orbulina universa d'Orbigny, 1839 (3, 4, 5)

Bolivinidae

Bolivina d'Orbigny, 1839

Bolivina aenariensis (O.G. Costa, 1856) (3)
Bolivina alata (Seguenza, 1862) (3)
Bolivina albatrossi Cushman, 1922 (3)
Bolivina attica Parker, 1958 (3)
Bolivina catanensis Seguenza, 1862 (3, 4)
Bolivina compacta Sidebottom, 1905 (3)
Bolivina difformis (Williamson, 1858) (3, 4)
Bolivina dilatata Reuss, 1850 (3, 4, 5)
Bolivina pseudoplicata Heron-Allen & Earland, 1930 (3)
Bolivina robusta Brady, 1881 (3)
Bolivina spathula (Williamson, 1858) (3)
Bolivina striatula Cushman, 1922 (3)
Bolivina subaenariensis Cushman, 1922 (4)
Bolivina subspinescens Cushman, 1922 (3)
Bolivina usensis Conato, 1952 (4)
Bolivina variabilis (Williamson, 1858) (3)

Cassidulinidae

Cassidulina d'Orbigny, 1826

Cassidulina carinata Silvestri, 1896 (3)
Cassidulina crassa d'Orbigny, 1839 (3, 4)
Cassidulina laevigata d'Orbigny, 1826 (3, 4, 5)

Cassidulinoides Cushman, 1927

Cassidulinoides bradyi (Norman, 1881) (3)

Globocassidulina Eade, 1967

Globocassidulina oblonga (Reuss,) 1850) (3, 4)
Globocassidulina subglobosa (Brady, 1881) (3)

Stainforthiidae

Stainforthia Hofker, 1956

Stainforthia complanata (Egger, 1893) (3)

Buliminidae

Angulogerina Cushman, 1927

Angulogerina angulosa (Williamson, 1858) (3)

Bulimina d'Orbigny, 1826

- Bulimina aculeata* d'Orbigny, 1826 (3, 4)
- Bulimina ariminensis* Fornasini, 1901 (4)
- Bulimina aseriata* Emiliani, 1942 (4, 5)
- Bulimina caudigera* d'Orbigny, 1926 (4)
- Bulimina consobrina* Fornasini, 1900 (4)
- Bulimina costata* (d'Orbigny, 1852) (3, 4)
- Bulimina elegans* d'Orbigny, 1826 (4)
- Bulimina elongata* Fornasini, 1902 (3)
- Bulimina gibba* Fornasini, 1902 (3)
- Bulimina laevigata* Fornasini, 1901 (4)
- Bulimina marginata* (d'Orbigny, 1826) (3, 4)
- Bulimina punctata* Fornasini, 1902 (4)
- Bulimina striata* d'Orbigny, 1843 (3)
- Bulimina sulcata* Fornasini, 1902 (4)
- Bulimina trilobata* d'Orbigny, 1826 (4)

Globobulimina Cushman, 1927

- Globobulimina affinis* (d'Orbigny, 1839) (3)
- Globobulimina pacifica* Cushman, 1937 (3)
- Globobulimina pseudospinescens* (Emiliani, 1949) (3)
- Globobulimina pyrula* (d'Orbigny, 1846) (3)

Buliminellidae

Buliminella Cushman, 1911

- Buliminella multicamera* (Cushman & Parker, 1938) (3)

Trifarina Cushman, 1923

- Trifarina angulosa* (Williamson, 1858) (4)
- Trifarina bradyi* Cushman, 1923 (3)

Uvigerina d'Orbigny, 1826

- Uvigerina auberiana* d'Orbigny, 1839 (3)
- Uvigerina bradyana* Fornasini, 1900 (4)
- Uvigerina mediterranea* Hofker, 1932 (3, 4, 5)
- Uvigerina nodosa* d'Orbigny, 1826 (4)
- Uvigerina peregrina* Cushman, 1923 (3, 4)

Siphogenerinidae

Rectobolivina Cushman, 1927

Rectobolivina columellaris (Brady, 1881) (3)

Rectuvigerina Mathews, 1945

Rectuvigerina phleceri Le Calvez, 1959 (3)

Saidovina Haman, 1984

Saidovina karreriana (Brady, 1881) (3)

Reussellidae

Reussella Galloway, 1933

Reussella spinulosa (Reuss, 1850) (3, 4)

Fursenkoinidae

Fursenkoina Loeblich & Tappan, 1961

Fursenkoina acuta (d'Orbigny, 1846) (3)

Fursenkoina bradyi Cushman, 1922 (3)

Fursenkoina tenuis (Seguenza, 1862) (3)

Stilostomellidae

Nodogenerina Cushman, 1923

Nodogenerina pseudoscalaris (Silvestri, 1904) (3)

Nodogenerina scalaris (Batsch, 1971) (3)

Orthomorphina Stainforth, 1952

Orthomorphina calomorpha (Reuss, 1866) (3)

Bagginidae

Cancris de Montfort, 1808

Cancris auriculus (Fichtel & Moll, 1798) (3)

Valvulineria Cushman, 1926

Valvulineria bradyana (Fornasini, 1900) (3, 4)

Valvulineria bradyi Brotzen, 1936 (3, 4, 5)

Valvulineria minuta Parker, 1954 (3)

Eponididae

Eponides de Montfort, 1808

Eponides pudillus Parr, 1950 (3)

Eponides repandus (Fichtel & Moll, 1798) (3)

Eponides umbonatus (Reuss, 1851) (5)

Mississippinidae

Stomatorbina Dorreen, 1948

Stomatorbina concentrica (Parker & Jones, 1864) (3)

Pegidiidae

Discorbis Lamarck, 1804

Discorbis advena Cushman, 1922 (3, 4)

Discorbis mediterraneus Risso, 1826 (3, 4, 5)

Discorbis mira Cushman, 1922 (3)

Discorbis orbicularis (Terquem, 1875) (4)

Ungulatellidae

Gavelinopsis Hofker, 1951

Gavelinopsis praegeri (Heron-Allen & Earland, 1913) (3)

Tretomphalus Möbius, 1880

Tretomphalus concinnus (Brady, 1884) (3)

Rosalinidae

Neoconorbina Hofker, 1951

Neoconorbina orbicularis (Terquem, 1875) (4)
Neoconorbina posidonicola (Colom, 1942) (3)
Neoconorbina terquemi (Rzehak, 1888) (3, 4)

Rosalina d'Orbigny, 1826

Rosalina floridana (Cushman, 1922) (3)
Rosalina globularis d'Orbigny, 1826 (3)
Rosalina obtusa d'Orbigny, 1846 (3)
Rosalina varians Schultze, 1854 (4)

Sphaeroidinidae

Sphaeroidina d'Orbigny, 1826

Sphaeroidina bulloides d'Orbigny, 1826 (3, 4)

Glabratellidae

Glabratella Dorreen, 1948

Glabratella baccata (Heron-Allen & Earland, 1913) (3)
Glabratella erecta (Sidebottom, 1908) (3)
Glabratella hexacamerata Seiglie & Bermudez, 1965 (3)
Glabratella obtusa Rouvilloides, 1974 (3)
Glabratella torrei (Bermudez, 1935) (3)

Planoglabratella Seiglie & Bermudez, 1965

Planoglabratella opercularis (d'Orbigny, 1839) (3)

Schackoinella Weinhandl, 1958

Schackoinella imperatoria (d'Orbigny, 1846) (3)

Heronalleniidae

Heronallenia Chapman & Parr, 1931

Heronallenia stellata Takayanagi, 1953 (3)

Siphoninidae

Siphonina Reuss, 1850

Siphonina reticulata (Czjzek, 1848) (3)

Discorbinellidae

Discorbinella Cushman & Martin, 1935

Discorbinella berthelotti (d'Orbigny, 1839) (3)

Parrelloididae

Cibicidoides Thalmann, 1939

Cibicidoides pachyderma (Rzehak, 1886) (3)

Planulinidae

Hyalinea Hofker, 1951

Hyalinea baltica (Schroeter, 1782) (3, 4)

Planulina d'Orbigny, 1826

Planulina ariminensis d'Orbigny, 1926 (3, 4)

Planulina incerta d'Orbigny, 1826 (4)

Cibicididae

Cibicides de Montfort, 1808

Cibicides lobatulus (Walker & Jacob, 1798) (3, 4)

Cibicides ungerianus (d'Orbigny, 1826) (4)

Cyclocibicides Cushman, 1927

Cyclocibicides vermiculatus (d'Orbigny, 1826) (3)

Truncatulina d'Orbigny, 1826

Truncatulina ariminensis Fornasini, 1902 (4)

Truncatulina tenera Flint, 1897 (3, 4)

Planorbulinidae

Cibicibella Cushman, 1927

Cibicibella variabilis (d'Orbigny, 1826) (3)

Planorbulina d'Orbigny, 1826

Planorbulina mediterraneensis d'Orbigny, 1826 (3, 4, 5)

Planorbulina vermiculata d'Orbigny, 1826 (3, 4, 5)

Acervulinidae

Sphaerogypsina Galloway, 1933

Sphaerogypsina globula (Reuss, 1848) (3)

Homotermatidae

Miniacina Galloway, 1933

Miniacina miniacea (Pallas, 1766) (3, 4, 5)

Epistomariidae

Epistomminella Husezima & Maruhasi, 1944

Epistomminella rugosa (Phlegr & Parker, 1951) (3)

Asterigerinidae

Asterigerina d'Orbigny, 1839

Asterigerina tarentina O.G. Costa, 1856 (4, 5)

Asterigerinata Bermudez, 1949

Asterigerinata adriatica Haake, 1977 (3)

Asterigerinata mamila (Williamson, 1858) (3)

Asterigerinata mariale Sgarrella, 1990 (3)

Nonionidae

Astrononion Cushman & Edwards, 1937

Astrononion sidebottomi Cushman & Edwards, 1937 (3)

Astrononion tumidum Cushman & Edwards, 1937 (3)

Melonis de Montfort, 1808

Melonis pompilioides (Ficht & Moll, 1798) (4)

Nonion de Montfort, 1808

Nonion barleeaanum (Williamson, 1858) (4)

Nonion depressulum (Walker & Jacob, 1798) (3, 4, 5)

Nonionella Cushman, 1926

Nonionella turgida (Williamson, 1856) (3, 4, 5)

Protelphidium Haynes, 1956

Protelphidium anglicum Murray, 1965 (N)

Protelphidium granosum (d'Orbigny, 1846) (3, 4)

Pullenia Parker & Jones, 1862

Pullenia bulloides (d'Orbigny, 1846) (3)

Pullenia quinqueloba (Reuss, 1851) (5)

Chilostomellidae

Chilostomella Reuss, 1849

Chilostomella mediterraneensis Cushman & Todd, 1949 (3)

Oridorsalidae

Oridorsalis Andersen, 1961

Oridorsalis umbonatus (Reuss, 1851) (3, 5)

Alabaminidae

Svratkina Pokorný, 1956

Svratkina tuberculata (Balkwill & Wright, 1885) (3)

Heterolepidae

Anomalinoides Brotzen, 1942

Anomalinoides minimus Vismara & Parisi, 1981 (3)

Heterolepa Franzenau, 1884

Heterolepa dutemplei (d'Orbigny, 1846) (3)

Gavellinidae

Gyroidina d'Orbigny, 1826

Gyroidina altiformis Stewart & Stewart, 1930 (3)

Gyroidina longispira Tedeschi & Zanmatti, 1957 (4)

Gyroidina neosoldanii Brotzen, 1936 (3)

Gyroidina orbicularis d'Orbigny, 1826 (3, 4)

Gyroidina soldanii (d'Orbigny, 1826) (3, 4)

Gyroidina umbonata (Silvestri, 1898) (3)

Gyroidinoides Brotzen, 1942

Gyroidinoides laevigata d'Orbigny, 1826 (4)

Hanzawaia Asano, 1944

Hanzawaia boueana (d'Orbigny, 1846) (4)

Hanzawaia stellata (Fichtel & Moll, 1798) (3)

Coleitidae

Aubignyna Margerel, 1970

Aubignyna perlucida (Heron-Allen & Earland, 1930) (4)

Buccella Andersen, 1952

Buccella granulata (Di Napoli Alliata, 1952) (3, 4)

Buccella inusitata Andersen, 1952 (3, 4)

Pseudorbitoidae

Ammonia Brünnich, 1771

- Ammonia beccarii* (Linnaeus, 1758) (4)
- Ammonia gaimardi* (d'Orbigny, 1906) (3)
- Ammonia parkinsoniana* (d'Orbigny, 1839) (3, 4)

Rotalia Lamarck, 1804

- Rotalia maremini* Fornasini, 1902 (4)
- Rotalia menardi* d'Orbigny, 1826 (4)
- Rotalia pileus* d'Orbigny, 1852 (4)
- Rotalia punctulata* d'Orbigny, 1826 (4)
- Rotalia tortuosa* d'Orbigny, 1826 (4)
- Rotalia umbilicata* Fornasini, 1902 (4)

Elphidiidae

Criboelphidium Cushman & Bronnimann, 1948

- Criboelphidium decipiens* (O.G. Costa, 1856) (3, 4, 5)

Cribronion Thalmann, 1947

- Cribronion advenum* (Cushman, 1922) (4)

Elphidium de Montfort, 1808

- Elphidium complanatum* (d'Orbigny, 1839) (3, 4)
- Elphidium crispum* (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)
- Elphidium cuvilleri* Lévy, 1966 (3)
- Elphidium gibba* (Schultze, 1854) (4)
- Elphidium granosum* (d'Orbigny, 1846) (3, 4)
- Elphidium incertum* (Williamson, 1858) (3)
- Elphidium lidoense* Cushman, 1936 (4)
- Elphidium macellum* (Fichtel & Moll, 1798) (3, 4, 5)
- Elphidium maioricense* Colom, 1942 (3)
- Elphidium pauciloculum* (Cushman, 1944) (3)
- Elphidium pulvereum* Todd, 1958 (3)
- Elphidium punctatum* (Terquem, 1878) (3)
- Elphidium venusta* (Schultze, 1854) (4)

Nummulitidae

Cycloclypeus W.S. Carpenter, 1856

Cycloclypeus sp. (3, 4) (*)

Note

Cycloclypeus sp.: Le uniche citazioni per l'Italia si riferiscono a specie non precisate.

Asterocyclinidae

Pseudophragmina H. Douvillé, 1926

Pseudophragmina dorsigera (O.G. Costa, 1856) (3)

Pseudophragmina elata (O.G. Costa, 1856) (3, 4)

Foraminiferida i.s.

Ammobaculites (Cushman, 1910)

Ammobaculites prostomum Hofker, 1932 (3)

Arethusa de Montfort, 1808

Arethusa corymbosa de Montfort, 1808 (4)

Aristerospira Ehrenberg, 1858

Aristerospira platypora Ehrenberg, 1858 (4, 5)

Buccinina O.G. Costa, 1861

Buccinina recurva O.G. Costa, 1861 (3)

Buccinina subrecta O.G. Costa, 1861 (3)

Liogulolandulina Silvestri, 1903

Liogulolandulina laevigata Silvestri, 1903 (5)

Macroditis de Montfort, 1808

Macroditis cucullatus de Montfort, 1808 (4)

Acantharea

Holocanthida

Acanthochiasmatidae

Acanthochiasma Krohn, 1801

Acanthochiasma rubescens (Krohn, 1801) (3, 4, 5)

Acanthocyrta Schewiakoff, 1926

Acanthocyrt *haeckeli* Schewiakoff, 1926 (3, 4)

Acanthoplegmatidae

Acanthocolla Schewiakoff, 1926

Acanthocolla solidissima (Popofsky, 1906) (3)

Acanthoplegma Schewiakoff, 1926

Acanthoplegma *sp.* (3) (*)

Note

Acanthoplegma *sp.*: Le citazioni sono incomplete.

Symphyacanthida

Astrolithiidae

Acantholithium Haeckel, 1887

Acantholithium dicopum Haeckel, 1887 (3, 5)

Astrolithium Haeckel, 1861

Astrolithium buliferum Haeckel, 1886 (3, 5)

Astrolonche Haeckel, 1881

Astrolonche serrata Haeckel, 1881 (3)

Heliothium Schewiakoff, 1926

Heliothium aereum Schewiakoff, 1926 (3, 5)

Amphilithiidae

Amphibelne Haeckel, 1862

Amphibelne anomala Haeckel, 1862 (3, 5)

Amphibelne hydrotomica Haeckel, 1862 (3, 5)

Amphilithium Haeckel, 1881

Amphilithium concretum Haeckel, 1881 (3)

Pseudolithiidae

Haliommantidium J. Müller, 1858

Haliommantidium muelleri (3, 5)

Pseudolithium Schewiakoff, 1926

Pseudolithium sp. (3, 5) (*)

Note

Pseudolithium sp.: Le citazioni sono incomplete.

Chaunacanthida

Conacontidae

Conacon Schewiakoff, 1926

Conacon sp. (5) (*)

Note

Conacon sp.: Le citazioni sono incomplete.

Gigartacontidae

Gigartacon Schewiakoff, 1926

Gigartacon abicisus (Popofsky, 1906) (3)

Stauracontidae

Stauracon Schewiakoff, 1926

Stauracon sp. (3, 4, 5) (*)

Note

Stauracon sp.: Le citazioni sono incomplete.

Arthracanthida

Acanthometridae

Acanthometra J. Müller, 1855

Acanthometra bulbosa Haeckel, 1862 (3, 4, 5)

Acanthometra dolichoscia Haeckel, 1862 (3, 4, 5)

Acanthometra fusca J. Müller, 1855 (3, 4, 5)

Acanthometra pellucida J. Müller, 1855 (3, 4, 5)

Acanthometra prismatica Haeckel, 1862 (3, 4, 5)

Acanthometra tetracopa J. Müller, 1855 (3, 4, 5)

Amphilonche Haeckel, 1860

Amphilonche elongata (J. Müller, 1858) (3, 5)

Lithopteratidae

Lithoptera J. Müller, 1858

Lithoptera fenestrata J. Müller, 1858 (3, 5)

Dorataspidae

Dictyaspis Haeckel, 1887

Dictyaspis furcata Haeckel, 1887 (3)

Dorataspis Haeckel, 1861

Dorataspis sp. (3, 5) (*)

Hystrichaspis Haeckel, 1887

Hystrichaspis dorsata Haeckel, 1887 (3, 5)

Icosaspis Haeckel, 1881

Icosaspis elegans Haeckel, 1881 (3, 5)

Lychnaspis Haeckel, 1881

Lychnaspis sp. (3, 5) (*)

Pleuraspis Haeckel, 1881

Pleuraspis costata (J. Müller, 1858)

Note

Dorataspis sp.: Le citazioni sono incomplete.

Lychnaspis sp.: Le citazioni sono incomplete.

Hexalaspitidae

Coleaspis Haeckel, 1881

Coleaspis vaginata Haeckel, 1881 (3, 5)

Hexaconus Haeckel, 1885

Hexaconus ciliatus Haeckel, 1885 (3, 5)

Diploconidae

Diploconus Haeckel, 1860

Diploconus cylindrus Haeckel, 1860 (3, 5)

Phractopeltatidae

Phractopelta Haeckel, 1887

Phractopelta dorataspis Haeckel, 1887 (3)

Phractopelta tessaraspis Haeckel, 1887 (5)

Phyllostauridae

Acanthostaurus Haeckel, 1869

Acanthostaurus sp. (3, 5) (*)

Amphistaurus Schewiakoff, 1926

Amphistaurus sp. (3, 5) (*)

Phyllostaurus Haeckel, 1862

Phyllostaurus sp. (3, 5) (*)

Note

Acanthostaurus sp.: Le citazioni sono incomplete.

Amphistaurus sp.: Le citazioni sono incomplete.

Phyllostaurus sp.: Le citazioni sono incomplete.

Stauracanthitidae

Pristacantha Haeckel, 1887

Pristacantha octodon Haeckel, 1887 (3, 5)

Stauracantha Haeckel, 1881

Stauracantha orthostaura Haeckel, 1881 (3, 5)

Xiphacantha Haeckel, 1861

Xiphacantha alata (J. Müller, 1858) (3, 5)

Xiphacantha quadrilentata (J. Müller, 1858) (3, 5)

Polycystinea

Spumellarida

Collosphaeridae

Collozoum Haeckel, 1862

Collozoum fulvum Brandt, 1885 (3, 4, 5)
Collozoum inerme (J. Müller, 1858) (3, 4, 5)
Collozoum pelagicum Haeckel, 1862 (3, 4, 5)
Collozoum radiosum Brandt, 1885 (3, 4, 5)

Astrosphaeridae

Acanthosphaera Ehrenberg, 1858

Acanthosphaera acufera Haeckel, 1887 (3, 4, 5)

Heliosphaera Haeckel, 1887

Heliosphaera echinoides Haeckel, 1887 (3, 4, 5)

Cyrtoidae

Pteroscemium Haeckel, 1881

Pteroscemium pinnatum Haeckel, 1881 (3, 4, 5)

Discoidea

Dictyocoryne Ehrenberg, 1861

Dictyocoryne euchitonia Haeckel, 1887 (3, 4, 5)

Spongotrochus Haeckel, 1860

Spongotrochus brevispinus Haeckel, 1860 (3, 4, 5)

Stylodictya Ehrenberg, 1847

Stylodictya multispina Haeckel, 1887 (3, 4, 5)

Cryptoaxoplastida

Sphaeroidae

Arachnosphaera Haeckel, 1860

Arachnosphaera myriacantha Haeckel, 1860 (3, 4, 5)

Cladococcus J. Müller, 1856

Cladococcus cervicornis Haeckel, 1887 (3, 4, 5)

Sphaerozoum Meyen, 1834

Sphaerozoum punctatum J. Müller, 1858 (3, 4, 5)

Centroaxoplastida

Thecosphaeridae

Hexacontium Haeckel, 1908

Hexacontium asteracanthion Haeckel, 1908 (3, 4, 5)

Periaxoplastida

Hollandsphaeridae

Heliosoma Haeckel, 1881

Heliosoma sp. (3) (*)

Note

Heliosoma sp.: Le citazioni sono incomplete.

Nassellarida

Dicyrtoidae

Arachnocorys Haeckel, 1860

Arachnocorys circumtexta Haeckel, 1860 (3)

Eucecryphalus Haeckel, 1861

Eucecryphalus gegenbauri Haeckel, 1861 (3)

Litharachnium Haeckel, 1887

Litharachnium tentorium Haeckel, 1887 (3, 4, 5)

Nassellidae

Theopilium Haeckel, 1881

Theopilium cranoides Haeckel, 1881 (3)

Phaeodarea

Phaeocystida

Aulacanthidae

Aulacantha Haeckel, 1861

Aulacantha scolymantha Haeckel, 1861 (3, 4, 5)

Cannobelos Haeckel, 1887

Cannobelos cavispicula Haeckel, 1887 (3)

Phaeogromida

Medusettidae

Euphysetta Borgert, 1892

Euphysetta lucani Borgert, 1892 (3)

Challengeridae

Protocystis Wallich, 1862

Protocystis xiphodon Haeckel, 1862 (3, 4, 5)

Sethophornis Haeckel, 1881

Sethophornis eupilium Haeckel, 1881 (3)

Heliozoa

Actinophryida

Actinophryidae

Actinophrys Ehrenberg, 1830

Actinophrys sol Ehrenberg, 1830 (N, S)

Actinosphaerium Stein, 1857

Actinosphaerium eichhorni (Ehrenberg, 1840) (N)

Desmothoracida

Clathrulinidae

Hedriocystis Hertwig & Lesser, 1874

Hedriocystis reticulata Penard, 1904 (N)

Ciliophryida

Ciliophryidae

Actinomonas Kent, 1880

Actinomonas mirabilis Kent, 1880 (N)

Apicomplexa

Perkinsea

Perkinsasida

Perkinsorida

Perkinsus Levine, 1978

Perkinsus marinus (Mackin, Owen & Collier, 1950) (4)

Sporozoasida

Eugregarinorida

Lecudinidae

Ascogregarina Grassé, 1953

Ascogregarina geniculati Munstermann & Levine, 1983 (Sa)

Monocystidae

Apolocystis Cognetti de Martiis, 1923

Apolocystis sp. (N) (*)

Monocystis Stein, 1848

Monocystis sp. (*)

Nematocystis Hesse, 1909

Nematocystis sp. (N) (*)

Note

Apolocystis sp.: Le uniche citazioni per l'Italia si riferiscono a specie non precisate.

Monocystis sp.: Le uniche citazioni per l'Italia si riferiscono a specie non precisate segnalate per il territorio italiano senza ulteriori precisazioni.

Nematocystis sp.: Le uniche citazioni per l'Italia si riferiscono a specie non precisate.

Diplocystidae

Diplocystis Künstler, 1887

Diplocystis clerci Léger, 1904 (Sa)

Enterocystidae

Enterocystis Svetkov, 1926

Enterocystis ephemerae (Frantzius, 1848) (S)

Cephaloidophoridae

Rotundula Goodrich, 1949

Rotundula gammari (Diesing, 1859) (*)

Note

Rotundula gammari: Specie segnalata per il territorio italiano senza ulteriori precisazioni.

Gregarinidae

Gregarina Dufour, 1826

Gregarina ausoniae Ghidini & Moriggi, 1941 (*)

Gregarina nymphaeae Lipa & Triggiani, 1989 (N)

Note

Gregarina ausoniae: Specie segnalata per il territorio italiano senza ulteriori precisazioni.

Leidyaniidae

Leidyana Watson, 1915

Leidyana sp. (S) (*)

Note

Leidyana sp.: Le uniche citazioni per l'Italia si riferiscono a specie non precisate.

Sphaerocystidae

Sphaerocystis Léger, 1892

Sphaerocystis sp. (S) (*)

Note

Sphaerocystis sp.: Le uniche citazioni per l'Italia si riferiscono a specie non precisate.

Actinocephalidae

Actinocephalus Stein, 1848

Actinocephalus sp. (S) (*)

Ancyrophora Léger, 1892

Ancyrophora sp. (S) (*)

Asterophora Léger, 1892

Asterophora tiaroides Baudoin, 1967 (S)

Asterophora sp. (Corallini, Sorcetti & Di Giovanni, 1984) (S)

Globulocephalus Baudoin, 1965

Globulocephalus hydropsyches Baudoin, 1965 (S)

Pileocephalus Schneider, 1875

Pileocephalus nemourae (Foerster, 1938) (S)

Stylocystis Léger, 1899

Stylocystis sp. (S) (*)

Note

Actinocephalus sp.: Le citazioni sono incomplete.

Ancyrophora sp.: Le uniche citazioni per l'Italia si riferiscono a specie non precisate.

Stylocystis sp.: Le uniche citazioni per l'Italia si riferiscono a specie non precisate.

Protococcidiorida

Grellidae

Myriospora Lermantoff, 1913

Myriospora trophoniae Lermantoff, 1913 (3)

Eucoccidiorida

Adeleidae

Adelea Schneider, 1875

Adelea transita Léger, 1904 (Sa)

Haemogregarinidae

Haemogregarina Danilewsky, 1885

Haemogregarina columbae Franchini, 1927 (N)

Haemogregarina magna Grassi & Falletti, 1891 (*)

Hepatozoon Miller, 1908

Hepatozoon canis (James, 1905) (N, S, Si, Sa)

Hepatozoon cuniculi (Sangiorgi, 1914) (*)

Note

Haemogregarina magna: Specie segnalata per il territorio italiano senza ulteriori precisazioni.

Hepatozoon cuniculi: Specie segnalata per il territorio italiano senza ulteriori precisazioni.

Klossiellidae

Klossiella Smith & Johnston, 1902

Klossiella cobayae Seidelin, 1914 (*)

Klossiella equi Baumann, 1946 (*)

Klossiella muris Smith & Johnston, 1902 (*)

Note

Klossiella cobayae: Specie segnalata per il territorio italiano senza ulteriori precisazioni.

Klossiella equi: Specie segnalata per il territorio italiano senza ulteriori precisazioni.

Klossiella muris: Specie segnalata per il territorio italiano senza ulteriori precisazioni.

Cryptosporidiidae

Cryptosporidium Tyzzer, 1907

Cryptosporidium meleagridis Slavin, 1955 (N, S)

Cryptosporidium muris Tyzzer, 1907 (N, S, Si, Sa)

Lankesterellidae

Lankesterella Labbé, 1899

Lankesterella monilis (Labbé, 1894) (*)

Atoxoplasma Garnham, 1950

Atoxoplasma coccothraustis Corradetti & Scanga, 1963 (N)

Note

Lankesterella monilis: Specie segnalata per il territorio italiano senza ulteriori precisazioni.

Eimeriidae

Caryospora Léger, 1904

Caryospora colubris Matuschka, 1984 (Si)

Eimeria Schneider, 1875

Eimeria acervulina Tyzzer, 1929 (*)

Eimeria ahsata Honess, 1942 (S)

Eimeria alijevi Musaev, 1970 (S)

Eimeria anguillae Léger & Hollande, 1922 (S)

Eimeria apsheronica Musaev, 1970 (S)

Eimeria arloingi (Marotel, 1905) (N, S, Si, Sa)

Eimeria auburnensis Christensen & Porter, 1939 (S)

Eimeria belorussica Litvenkova, 1969 (S)

Eimeria bovis (Zueblin, 1908) (N, S)

Eimeria brodeni Cerruti, 1930 (Sa)

Eimeria brunetti Levine, 1942 (*)

Eimeria bukidnonensis Tubangui, 1931 (N)

Eimeria canadensis Bruce, 1921 (S)

Eimeria capreoli Galli-Valerio, 1927 (N, S)

Eimeria caprina Lima, 1979 (S)

Eimeria carpelli Léger & Stankovitch, 1921 (S)

Eimeria catubrina Mantovani, Borrelli & Bitti, 1970 (N)

Eimeria christenseni Levine, Ivens & Fritz, 1962 (S)

Eimeria crandallis Honess, 1942 (N)

Eimeria cylindrica Wilson, 1931 (S)

Eimeria deblickei Douwes, 1921 (*)

Eimeria dorcadis Mantovani, 1966 (N)

Eimeria ellipsoidalis Becker & Frye, 1929 (S)

Eimeria exigua Yakimoff, 1934 (N, S)

Eimeria faurei (Moussu & Marotel, 1902) (N, S, Si, Sa)

Eimeria franchinii Brunelli, 1935 (*)
Eimeria genettae Agostinucci & Bronzini, 1953 (S)
Eimeria gilruthi (Chatton, 1910) (N, Sa)
Eimeria granulosa Christensen, 1938 (N)
Eimeria grenieri Yvore & Aycardi, 1967 (N, S)
Eimeria hirci Chevalier, 1966 (S)
Eimeria hungarica Pellérdy, 1956 (S)
Eimeria ibicis Colombo, 1958 (N)
Eimeria intestinalis Cheissin, 1948 (N, S)
Eimeria intricata Spiegl, 1925 (N, S, Si, Sa)
Eimeria irresidua Kessel & Jankiewicz, 1931 (N, S)
Eimeria jolchijevi Musaeu, 1970 (S)
Eimeria labbeana Pinto, 1928 (*)
Eimeria leporis Nieschulz, 1923 (S)
Eimeria leuckarti (Flesch, 1883) (N, S)
Eimeria magna Pérard, 1925 (N, S)
Eimeria marsica Restani, 1971 (S, Sa)
Eimeria maxima Tyzzer, 1929 (*)
Eimeria media Kessel, 1929 (N, S)
Eimeria mivati Edgar & Seibold, 1914 (*)
Eimeria monacis Fish, 1930 (N)
Eimeria necatrix Johnson, 1930 (*)
Eimeria neodebliecki Vetterling, 1965 (N)
Eimeria ninakohlyakimovae Yakimoff & Rastegaieff, 1930 (N, S, Sa)
Eimeria numidae Pellérdy, 1962 (N, S)
Eimeria ovina Levine & Ivens, 1970 (N, S, Sa)
Eimeria ovinoidealis McDouglas, 1979 (N, S, Sa)
Eimeria pallida Christensen, 1938 (N, S)
Eimeria panda Supperer & Kutzer, 1961 (N, S)
Eimeria parva Kotlán, Mócsy & Vajda, 1929 (N, S, Sa)
Eimeria patavina Mantovani, Borrelli & Bitti, 1970 (N)
Eimeria perforans (Leuckart, 1879) (N, S)
Eimeria perforoides Crouch & Becker, 1931 (N)
Eimeria persica (Phisalix, 1925) (*)
Eimeria polita Pellerdy, 1949 (N)
Eimeria ponderosa Wetzel, 1942 (N, S)
Eimeria pternistis Bronzini & Agostinucci, 1955 (S)
Eimeria riedmulleri Yakimoff & Matschoulsky, 1940 (N)
Eimeria robertsoni (Madsen, 1938) (S)
Eimeria rotunda Pellérdy, 1955 (N, S)
Eimeria rupicaprae Galli-Valerio, 1924 (N)
Eimeria scabra Henry, 1931 (N)
Eimeria sciurorum Galli-Valerio, 1922 (N)
Eimeria semisculpta (Madsen, 1938) (S)
Eimeria stiedai (Lindemann, 1865) (N, S)
Eimeria superba Pellérdy, 1955 (N)
Eimeria tenella (Railliet & Lucet, 1891) (N, S, Si, Sa)
Eimeria townsendi (Carvalho, 1943) (S)

Eimeria truncata (Railliet & Lucet, 1891) (*)
Eimeria wyomingensis Huizinga & Winger, 1942 (N)
Eimeria yakimoffmatschoulskyi Supperer & Kutzer, 1961 (N)
Eimeria zuernii (Rivolta, 1878) (N, S, Si, Sa)
Eimeria sp. (Brunelli, 1935) (*)

***Isospora* Schneider, 1881**

Isospora aprutina (Mantovani, 1965) (S)
Isospora arrui Quesada & Cringoli, 1990 (S)
Isospora aycardii Cringoli & Quesada, 1990 (S)
Isospora belli Wenyon, 1923 (N, S, Sa)
Isospora bioccai Cringoli & Quesada, 1991 (S)
Isospora boxae Grulet, Landau & Baccam, 1982 (S)
Isospora canis Nemesèri, 1959 (N, S)
Isospora cannabina Quesada & Cringoli, 1990 (S)
Isospora colubris Matuschka, 1986 (S)
Isospora couderti Cringoli & Quesada, 1990 (S)
Isospora fatiguae Grulet, Landau & Baccam, 1982 (S)
Isospora felis Wenyon, 1923 (N, S, Si, Sa)
Isospora graculai Bathia, Chuhan, Arora & Agrawal, 1973 (S)
Isospora iansmithi Grulet, Landau & Baccam, 1982 (S)
Isospora laudanae Cringoli & Quesada, 1990 (S)
Isospora mcquistoni Cringoli & Quesada, 1990 (S)
Isospora mikei Grulet, Landau & Baccam, 1982 (S)
Isospora nortoni Papparella & Cringoli, 1991 (S)
Isospora rastegaievae (Yakimoff & Matikaschwili, 1933) (*)
Isospora rivolta (Grassi, 1879) (N, S, Sa)
Isospora serini Aragao, 1933 (S)
Isospora sprattii Grulet, Landau & Baccam, 1982 (S)
Isospora suis Biester, 1934 (N, S, Si)
Isospora sp. C (Cringoli, Quesada & Papparella, 1990) (S)
Isospora sp. G (Cringoli, Papparella, Quesada & Scelba, 1990) (S)
Isospora sp. H (Cringoli, Papparella, Quesada & Scelba, 1990) (S)
Isospora sp. L (Cringoli, Papparella, Quesada & Scelba, 1990) (S)
Isospora sp. M (Cringoli, Quesada & Papparella, 1990) (S)
Isospora sp. S (Cringoli, Papparella, Quesada & Scelba, 1990) (S)
Isospora sp. X (Cringoli, Papparella, Quesada & Scelba, 1990) (S)
Isospora sp. Y (Cringoli, Papparella, Quesada & Scelba, 1990) (S)
Isospora sp. (Canestri-Trotti & Franceschini, 1981) (N)

Note

Eimeria acervulina: Specie segnalata per il territorio italiano senza ulteriori precisazioni.
Eimeria brunetti: Specie segnalata per il territorio italiano senza ulteriori precisazioni.
Eimeria deblickei: Specie segnalata per il territorio italiano senza ulteriori precisazioni.
Eimeria franchinii: Specie segnalata per il territorio italiano senza ulteriori precisazioni.
Eimeria labbeana: Specie segnalata per il territorio italiano senza ulteriori precisazioni.

Eimeria maxima: Specie segnalata per il territorio italiano senza ulteriori precisazioni.
Eimeria mivati: Specie segnalata per il territorio italiano senza ulteriori precisazioni.
Eimeria necatrix: Specie segnalata per il territorio italiano senza ulteriori precisazioni.
Eimeria persica: Specie segnalata per il territorio italiano senza ulteriori precisazioni.
Eimeria truncata: Specie segnalata per il territorio italiano senza ulteriori precisazioni.
Eimeria sp.: Specie non identificata segnalata per il territorio italiano senza ulteriori precisazioni.
Isospora rastegaievae: Specie segnalata per il territorio italiano senza ulteriori precisazioni.

Sarcocystidae

Besnoitia Henry, 1913

Besnoitia besnoiti (Marotel, 1912) (N)

Frenkelia Biocca, 1968

Frenkelia sp. (N) (*)

Sarcocystis Lankester, 1882

Sarcocystis anophelis Missiroli, 1928 (S)
Sarcocystis bertrami Doflein, 1901 (N, S, Si, Sa)
Sarcocystis cruzi (Hasselman, 1923) (N, S, Si, Sa)
Sarcocystis gigantea (Railliet, 1886) (N, S, Si, Sa)
Sarcocystis hirsuta Moulé, 1888 (N, S, Si, Sa)
Sarcocystis hominis (Railliet & Lucet, 1891) (N, S, Si, Sa)
Sarcocystis miescheriana (Kuehn, 1865) (N, S, Si, Sa)
Sarcocystis muris Blanchard, 1885 (N)
Sarcocystis podarcicolubris Matuschka, 1981 (Sa)
Sarcocystis suihominis (Tadros & Laarman, 1976) (N, S, Si, Sa)
Sarcocystis tenella (Railliet, 1886) (N, S, Si, Sa)
Sarcocystis sp. 1 (Balbo, Rossi, Lanfranchi, Meneguz & Peirone, 19) (N)
Sarcocystis sp. 2 (Cornaglia, Guarda, Guarda & Misciattelli, 1980) (N)
Sarcocystis sp. 3 (Cornaglia, Guarda, & Misciattelli, 1980) (N)
Sarcocystis sp. 4 (Nigro, Mancianti, Rossetti & Poli, 1991) (S)
Sarcocystis sp. 5 (Poli, Mancianti, Marconcini, Nigro & Colagreco) (S)

Toxoplasma Nicolle & Manceaux, 1909

Toxoplasma gondii (Nicolle & Manceaux, 1908) (N, S, Si, Sa)
Toxoplasma hammondi (Frenkel, 1974) (*)

Note

Frenkelia sp.: Le uniche citazioni per l'Italia si riferiscono a specie non precisate.
Toxoplasma hammondi: Specie segnalata per il territorio italiano senza ulteriori precisazioni.

Plasmodiidae

Haemoproteus Kruse, 1890

- Haemoproteus alaudae* Celli & Sanfelice, 1891 (S)
- Haemoproteus aluci* Celli & Sanfelice, 1891 (N, S)
- Haemoproteus bubonis* Celli & Sanfelice, 1891 (S)
- Haemoproteus chelidonis* Franchini, 1922 (*)
- Haemoproteus columbae* Kruse, 1890 (N, S, Si, Sa)
- Haemoproteus coraciae* de Mello & Alfonso, 1935 (*)
- Haemoproteus gallinulae* (de Mello, 1935) (*)
- Haemoproteus lari* (Yakunin, 1972) (*)
- Haemoproteus noctuae* Celli & Sanfelice, 1891 (S)
- Haemoproteus plataleae* de Mello, 1935 (S)
- Haemoproteus sacharovi* Novy & Mac Neal, 1904 (*)
- Haemoproteus tinnunculi* Wasielewski & Wulker, 1918 (N)

Leucocytozoon Sambon, 1908

- Leucocytozoon laverani* Franchini, 1923 (*)
- Leucocytozoon macleani* Sambon, 1908 (*)
- Leucocytozoon mathisi* França, 1912 (N)
- Leucocytozoon simondi* Mathis & Léger, 1910 (N)
- Leucocytozoon toddi* Sambon, 1908 (N)
- Leucocytozoon ziemanni* Laveran, 1902 (N)
- Leucocytozoon* sp. 1 (Sacchi & Prigioni, 1981) (N)
- Leucocytozoon* sp. 2 (Sacchi & Prigioni, 1981) (N)
- Leucocytozoon* sp. 3 (Sacchi & Prigioni, 1981) (N)
- Leucocytozoon* sp. 4 (Sacchi & Prigioni, 1981) (N)
- Leucocytozoon* sp. 5 (Sacchi & Prigioni, 1981) (N)
- Leucocytozoon* sp. 6 (Sacchi & Prigioni, 1981) (N)

Plasmodium Marchiafava & Celli, 1885

- Plasmodium berghei* Vincke & Lips, 1948 (N, S)
- Plasmodium cathemerium* Hartmann, 1927 (S)
- Plasmodium circumflexum* Kikuth, 1931 (S)
- Plasmodium elongatum* Huff, 1930 (N, Si)
- Plasmodium falciparum* (Welch, 1897) (N, S, Si, Sa)
- Plasmodium gallinaceum* Brumpt, 1935 (S)
- Plasmodium giovannolai* Corradetti, Verolini & Neri, 1963 (S)
- Plasmodium major* (Raffaele, 1930) (*)
- Plasmodium malariae* (Laveran, 1881) (N, S, Si, Sa)
- Plasmodium matutinum* Huff, 1937 (S)
- Plasmodium ovale* Stephens, 1922 (N)
- Plasmodium polare* Manwell, 1934 (Si)

Plasmodium praecox (Grassi & Feletti, 1890) (N, Si)
Plasmodium relictum (Grassi & Feletti, 1891) (S, Si)
Plasmodium subpraecox (Grassi & Feletti, 1892) (S, Si)
Plasmodium vaughani (Novy & Mac Neal, 1904) (S)
Plasmodium vivax (Grassi & Feletti, 1890) (N, S, Si, Sa)

Polychromophilus Dionisi, 1899

Polychromophilus melanipherus Dionisi, 1899 (*)
Polychromophilus murinus Dionisi, 1899 (*)

Note

Haemoproteus chelidonis: Specie segnalata per il territorio italiano senza ulteriori precisazioni.
Haemoproteus coraciae: Specie segnalata per il territorio italiano senza ulteriori precisazioni.
Haemoproteus gallinulae: Specie segnalata per il territorio italiano senza ulteriori precisazioni.
Haemoproteus lari: Specie segnalata per il territorio italiano senza ulteriori precisazioni.
Haemoproteus sacharovi: Specie segnalata per il territorio italiano senza ulteriori precisazioni.
Leucocytozoon laverani: Specie segnalata per il territorio italiano senza ulteriori precisazioni.
Leucocytozoon macleani: Specie segnalata per il territorio italiano senza ulteriori precisazioni.
Plasmodium major: Specie segnalata per il territorio italiano senza ulteriori precisazioni.
Polychromophilus melanipherus: Specie segnalata per il territorio italiano senza ulteriori precisazioni.
Polychromophilus murinus: Specie segnalata per il territorio italiano senza ulteriori precisazioni.

Piroplasmorida

Babesiidae

Babesia Starcovici, 1893

Babesia bigemina (Smith & Kilborne, 1893) (N, S, Sa)
Babesia bovis (Babes, 1888) (N, S, Sa)
 Babesia bovis (Plantureux & Rougebief, 1924)
Babesia caballi (Nuttal & Strickland, 1910) (N, S, Sa)
Babesia canis (Piana & Galli-Valerio, 1895) (N, Sa)
Babesia divergens (M' Fadyean & Stockman, 1911) (*)
Babesia equi (Laveran, 1901) (N, S, Sa)
Babesia leporina Baldelli, 1960 (S)
Babesia missirolii Biocca & Corradetti, 1952 (S)
Babesia motasi Wenyon, 1926 (S)
Babesia ovis (Babes, 1892) (S, Sa)
Babesia perroncitoi (Cerruti, 1939) (S, Si, Sa)
Babesia shortti (Mohammed, 1958) (Si)
Babesia trautmanni (Knuth & Du Toit, 1918) (N, S, Si, Sa)

Babesia vogeli Reichenow, 1937 (N)

Note

Babesia divergens: Specie segnalata per il territorio italiano senza ulteriori precisazioni.

Theileriidae

Theileria Bettencourt, França & Borges, 1907

Theileria annulata (Dschunkowski & Luhs, 1904) (N, S, Sa)

Theileria annulata (Lestoquard, Plantureux & Rougebief, 1924)

Theileria leporis Vaccari, Pieresca & Quaglio, 1958 (N)

Theileria mutans (Theiler, 1906) (S, Sa)

Theileria ovis Rodhain, 1916 (Sa)

Microspora

Metchnikovellidea

Metchnikovellida

Chytridiopsidae

Chytridiopsis Schneider, 1884

Chytridiopsis mytilarum (Field, 1924) (*)

Note

Chytridiopsis mytilarum: Specie segnalata per il territorio italiano senza ulteriori precisazioni.

Microsporididea

Pleistophoridida

Pleistophoridae

Encephalitozoon Levaditi, Nicolau & Schoen, 1923

Encephalitozoon cuniculi Levaditi, Nicolau & Schoen, 1923 (N)

Encephalitozoon hellem P. Didier, R. Didier, Friedberg, Stenson, Orenstein, Yee, Tio, Davis, Vossbrinck, Millichamp & Shadduck, 1991 (N)

Enterocytozoon Desportes, Charpentier, Galian, Bernard, Cochand-Priollet, Lavergne, Ravisse & Modigliani, 1985

Enterocytozoon bieneusi Desportes, Charpentier, Galian, Bernard, Cochand-Priollet, Lavergne, Ravisse & Modigliani, 1985 (N, S)

Perezia Léger & Duboscq, 1909

Perezia sp. (N) (*)

Pleistophora Gurley, 1893

Pleistophora culisetae Weiser & Coluzzi, 1964 (S)

Pleistophora hyphessobryconis Schaeperclaus, 1941 (N)

Note

Perezia sp.: Le citazioni sono incomplete.

Thelohaniidae

Thelohania Henneguy, 1892

Thelohania grassii Missiroli, 1929 (*)

Note

Thelohania grassii: Specie segnalata per il territorio italiano senza ulteriori precisazioni.

Nosematidida

Nosematidae

Nosema Naegeli, 1857

Nosema anophelis Kudo, 1924 (*)

Nosema apis Zonder, 1909 (N, S)

Nosema bombycis Naegeli, 1857 (S)

Nosema lymantriae Weiser, 1963 (Sa)

Nosema pyrrhocoridis Lipa, 1977 (N, S, Si, Sa)

Note

Nosema anophelis: Specie segnalata per il territorio italiano senza ulteriori precisazioni.

Ascetospora

Stellatospora

Occlusospora

Marteiliidae

Marteilia

Marteilia sp. Grizel et al., 1974 (N, S) (*)

Note

Marteilia sp.: Le uniche citazioni per l'Italia si riferiscono a specie non precisate.

Myxozoa

Myxosporea

Bivalvulida

Myxidiidae

Myxidium Bütschli, 1882

Myxidium giardi (Thélohan, 1895) (N, S)

Myxidium truttae Léger, 1930 (N, S)

Sphaeromyxa Thélohan, 1882

Sphaeromyxa sp. (N) (*)

Zschokkella Auerbach, 1910

Zschokkella sp. (S) (*)

Note

Sphaeromyxa sp.: Le uniche citazioni per l'Italia si riferiscono a specie non precisate.
Zschokkella sp.: Le uniche citazioni per l'Italia si riferiscono a specie non precisate.

Myxobolidae

Myxobolus Bütschli, 1882

Myxobolus cyprini Doflein, 1898 (S)
Myxobolus dispar (Thélohan, 1895) (N, S)
Myxobolus ellipsoides (Thélohan, 1892) (S)
Myxobolus muelleri (Bütschli,) 1882 (S)
Myxobolus pfeifferi (Thélohan, 1895) (N)

Thelohanellus Kudo, 1933

Thelohanellus pyriformis (Thélohan, 1892) (N, S)

Myxosomatidae

Myxosoma Thélohan, 1892

Myxosoma cabedae Ghittino, 1962 (N)
Myxosoma cerebralis (Hofer, 1903) (N)

Sphaerosporidae

Chloromyxum Mingazzini, 1890

Chloromyxum truttae Léger, 1906 (N)

Kudoa Meglitsch, 1947

Kudoa clupeiidae (Hahn, 1917) (N, S, Sa)

Sphaerospora Thélohan, 1892

Sphaerospora reichenowi Jacob, 1953 (S)

Myxobilatidae

Myxobilatus Davis, 1944

Myxobilatus sp. (S) (*)

Note

Myxobilatus sp.: Le citazioni sono incomplete.

Ciliophora

Karyorelictea

Protostomatida

Trachelocercidae

Trachelocerca Ehrenberg, 1833

- Trachelocerca arenicola* Kahl, 1933 (3)
- Trachelocerca binucleata* Dragesco, 1960 (3)
- Trachelocerca coluber* Kahl, 1933 (3)
- Trachelocerca fusca* Kahl, 1928 (3)
- Trachelocerca gracilis* (Dragesco, 1958) (3)
- Trachelocerca incaudata* Kahl, 1933 (3)
- Trachelocerca lacrymariae* Dragesco, 1953 (3)
- Trachelocerca minuta* Dragesco, 1960 (3)
- Trachelocerca multinucleata* Dragesco, 1960 (3)
- Trachelocerca nigricans* Kahl, 1933 (3)
- Trachelocerca phoenicopterus* Cohn, 1866 (3)
- Trachelocerca schulzei* Dragesco, 1960 (3)

Tracheloraphis Dragesco, 1969

- Tracheloraphis fasciolata* (Sauerbrey, 1928) (3)
- Tracheloraphis marginatus* (Kahl, 1932) (3)
- Tracheloraphis prenanti* Dragesco, 1960) (3)

Kentrophoridae

Kentrophoros Sauerbrey, 1928

- Kentrophoros fasciolatus* (Sauerbrey, 1928) (3)
- Kentrophoros fistulosus* (Fauré-Fremiet, 1950) (3)

Trachelonema Dragesco, 1960

- Trachelonema minima* Dragesco, 1960 (3)

Stephanopogonidae

Stephanopogon G. Entz sen., 1884

Stephanopogon colpoda G. Entz sen., 1884 (3)

Loxodida

Loxodidae

Loxodes Ehrenberg, 1830

Loxodes rostrum (O.F. Müller, 1773) (N)

Loxodes striatus (Englemann, 1862) (N)

Loxodes vorax Stokes, 1885 (N)

Remanella Kahl, 1933

Remanella caudata (Dragesco, 1953) (3)

Remanella margaritifera (Kahl, 1933) (3)

Remanella minuta (Dragesco 1954) (3)

Remanella multinucleata (Kahl, 1933) (3)

Remanella obtusa Fauré-Fremiet, 1951 (3)

Remanella rugosa (Kahl, 1933) (3)

Protoheterotrichida

Geleidae

Geleia Kahl, 1933

Geleia fossata (Kahl, 1933) (3)

Geleia orbis Fauré-Fremiet, 1950 (3)

Geleia tenuis Dragesco, 1954 (3)

Spirotrichea

Clevelandellida

Nyctotheridae

Nyctotherus Leidy, 1849

Nyctotherus cordiformis (Ehrenberg, 1838) (N, S, Si, Sa)

Heterotrichida

Blepharismidae

Blepharisma Perty, 1949

Blepharisma clarissimum Anigstein, 1912 (3)

Blepharisma persicinum Perty, 1852 (N)

Blepharisma lateritium (Ehrenberg, 1831) (N)

Blepharisma steini Kahl, 1932 (N)

Stentor Oken, 1815

Stentor coeruleus (Pallas, 1766) (N)

Stentor igneus Ehrenbreg, 1838 (N)

Stentor polymorphus (O.F. Müller, 1773) (N)

Stentor roeselii Ehrenberg, 1835 (N)

Condylomatidae

Condylostoma Bory de St. Vincent, 1826

Condylostoma arenarium Spiegel, 1926 (3)

Condylostoma magnum Spiegel, 1926 (3)

Condylostoma minimum (Dragesco, 1954) (3)

Condylostoma patens (O.F. Müller, 1786) (S)

Condylostoma remanei (Spiegel, 1928) (3)

Condylostoma vorticella Ehrenberg, 1833 (N)

Spirostomidae

Gruberia Kahl, 1932

Gruberia uninucleata Kahl, 1932 (3)

Spirostomum Ehrenberg, 1833

Spirostomum ambiguum (O.F. Müller, 1786) (N)

Spirostomum minus Roux, 1901 (N)

Spirostomum teres Claparède & Lachmann, 1858 (N)

Folliculinidae

Folliculina Lamarck, 1815

Folliculina sp. (S) (*)

Note

Folliculina sp.: Le uniche citazioni per l'Italia si riferiscono a specie non precisate.

Armophorida

Caenomorphidae

Caenomorpha Perty, 1852

Caenomorpha medusula Perty, 1852 (N)

Metopidae

Metopus Claparède & Lachmann, 1858

Metopus acuminatus (Stockes, 1886) (N)

Metopus es O.F. Müller, 1786 (N)

Metopus extentus Kahl, 1926 (N)

Odontostomatida

Discomorphellidae

Discomorphella Corliss, 1960

Discomorphella pectinata (Levander, 1894) (N)

Choreotrichida

Codonellidae

Codonella Haeckel, 1873

Codonella apicata Kofoid & Campbell, 1929 (3)
Codonella cratera Leidy, 1877 (N)
Codonella elongata Kofoid & Campbell, 1929 (5)
Codonella galea Haeckel, 1873 (3)
Codonella oceanica Brandt, 1906 (3)

Tintinnopsis Stein, 1867

Tintinnopsis angulata Daday, 1887 (3, 4)
Tintinnopsis aperta Kofoid & Campbell, 1929 (3)
Tintinnopsis boroidea Stein, 1867 (3, 4, 5)
Tintinnopsis campanula (Ehrenberg, 1840) (3, 4, 5)
Tintinnopsis compressa Daday, 1887 (3)
Tintinnopsis cylindrica Daday, 1887 (3)
Tintinnopsis elongata Jörgensen, 1924 (3)
Tintinnopsis franknoi Daday, 1887 (3)
Tintinnopsis lobianconi Daday, 1887 (3)
Tintinnopsis minuta Wailes, 1925 (3)
Tintinnopsis radix Brandt, 1907 (3, 4, 5)

Codonellopsidae

Codonellopsis Jörgensen, 1924

Codonellopsis americana Kofoid & Campbell, 1929 (3)
Codonellopsis morchella Jörgensen, 1924 (3)
Codonellopsis orthoceras (Haeckel, 1873) (3)

Stenosemella Jörgensen, 1924

Stenosemella nivalis (Meunier, 1910) (3)
Stenosemella ventricosa (Claparède & Lachmann, 1859) (3)

Cyttarocylididae

Cyttarocylis Fol, 1881

Cyttarocylis acuminata Daday, 1887 (3)
Cyttarocylis brandti Kofoid & Campbell, 1929 (3)
Cyttarocylis eucecryphalus (Haeckel, 1873) (3)

Petalotricha Kent, 1882

Petalotricha ampulla (Fol, 1881) (3)
Petalotricha maior Jörgensen, 1924 (3)

Dictyocystidae

Dictyocystis Ehrenberg, 1854

- Dictyocystis elegans* Ehrenberg, 1854 (3, 4)
- Dictyocystis lepida* Ehrenberg, 1854 (3, 4)
- Dictyocystis obtusa* Jörgensen, 1924 (3)
- Dictyocystis polygonata* Kofoid & Campbell, 1929 (3)
- Dictyocystis reticulata* Kofoid & Campbell, 1929 (3)

Metacyclididae

Climacocylis Jörgensen, 1924

- Climacocylis scalaria* (Brandt, 1906) (3)

Coxliella Brandt, 1907

- Coxliella anulata* (Daday, 1907) (3, 4)
- Coxliella decipiens* Jörgensen, 1924 (5)
- Coxliella fasciata* (Kofoid, 1905) (3)
- Coxliella helix* (Claparède & Lachmann, 1858) (5)
- Coxliella lacinosa* (Brandt, 1907) (3)

Metacylis Jörgensen, 1924

- Metacylis joergensenii* (Cleve, 1902) (3)

Ptychocylididae

Favella Jörgensen, 1924

- Favella adriatica* (Imhof, 1886) (3)
- Favella arcuata* (Brandt, 1906) (3)
- Favella azorica* (Cleve, 1889) (3)
- Favella composita* Jörgensen, 1924 (3)
- Favella ehrenbergi* (Claparède & Lachmann, 1858) (3, 4, 5)
- Favella markusovszkyi* (Daday, 1887) (5)
- Favella serrata* (Möbius, 1888) (5)

Ptychocylis Brandt, 1896

- Ptychocylis urnula* (Claparède & Lachmann, 1858) (3)

Rhabdonellidae

Rhabdonella Brandt, 1907

- Rhabdonella amor* Brandt, 1907 (3)
- Rhabdonella conica* Kofoid & Campbell, 1929 (3)
- Rhabdonella hydra* Jörgensen, 1924 (3)
- Rhabdonella spiralis* (Fol, 1887) (3)

Tintinnidae

Amphorides Strand, 1926

- Amphorides brandti* Jörgensen, 1924 (3)
- Amphorides minor* Jörgensen, 1924 (3)
- Amphorides quadrilienta* Daday, 1887 (3)

Dadayiella Kofoid & Campbell, 1929

- Dadayiella ganymedes* (G. Entz sen., 1884) (3)

Daturella Kofoid & Campbell, 1929

- Daturella gaussi* Kofoid & Campbell, 1929 (3)

Salpingella Jörgensen, 1924

- Salpingella attenuata* Jörgensen, 1924 (3)
- Salpingella decurtata* Jörgensen, 1924 (3)

Steenstrupiella Kofoid & Campbell, 1929

- Steenstrupiella steenstrupii* (Claparède & Lachmann, 1858) (3, 4, 5)

Tintinnus Schrank, 1803

- Tintinnus macilentus* Jörgensen, 1924 (3)
- Tintinnus perminutus* Kofoid & Campbell, 1929 (3)

Undellidae

Proplectella Kofoid & Campbell, 1929

- Proplectella angustior* (Jörgensen, 1924) (3)

Proplectella fastigata (Jørgensen, 1924) (3)
Proplectella olparedi (G. Entz sen., 1884) (3)
Proplectella ostenfeldi Kofoid & Campbell, 1929 (3)
Proplectella ovata (Jørgensen, 1924) (3)

Undella Daday, 1887

Undella attenuata Jørgensen, 1924 (3)
Undella clevi Jørgensen, 1924 (3)

Undellopsis Kofoid & Campbell, 1929

Undellopsis marsupialis (Brandt, 1906) (3)
Undellopsis subangulata (Jørgensen, 1924) (3)

Xystonellidae

Xystonella Brandt, 1907

Xystonella lohmani (Brandt, 1906) (3)
Xystonella longicaudata Brandt, 1907 (3)
Xystonella treforti (Daday, 1887) (3)

Xystonellopsis Jørgensen, 1924

Xystonellopsis spicata (Brandt, 1907) (3)

Strombidinopsidae

Strombidinopsis Kent, 1881

Strombidinopsis gyrans Kent, 1881 (N)

Strombilidiidae

Strobilidium Schewiakoff, 1892

Strobilidium gyrans (Stokes, 1887) (N)
Strobilidium minimum (Gruber, 1884) (N)

Oligotrichida

Halteriidae

Halteria Dujardin, 1842

Halteria grandinella (O.F. Müller, 1773) (N, S)

Strombidiidae

Strombidium Claparède & Lachmann, 1859

Strombidium conicum (Lohmann, 1908) (S)

Strombidium latum Kahl, 1932 (3)

Strombidium sauerbreyae Kahl, 1932 (3)

Strombidium sulcatum Claparède & Lachmann, 1859 (N, S)

Strombidium viride Stein, 1867 (N)

Stichotrichida

Amphisiellidae

Amphisiella Gourret & Roeser, 1888

Amphisiella milenei Kahl, 1932 (N?)

Onychodromus Stein, 1859

Onychodromus grandis Stein, 1859 (N)

Gonostomatidae

Gonostomum Sterki, 1878

Gonostomum affine (Stein, 1859) (N, Si)

Keronidae

Kerona Ehrenberg, 1838

Kerona pediculus (O.F. Müller, 1773) (N)

Keronopsis Penard, 1922

Keronopsis rubra (Ehrenberg, 1838) (3)

Psilotrichidae

Psilotricha Stein, 1859

Psilotricha acuminata Stein, 1859 (N)

Spirophilidae

Stichotricha Perty, 1849

Stichotricha secunda Petry 1849 (N)

Urostrongylum Kahl, 1932

Urostrongylum caudatum Kahl, 1932 (3)

Strongylidiidae

Strongylidium Sterki, 1878

Strongylidium sp. (S) (*)

Note

Strongylidium sp.: Le uniche citazioni per l'Italia si riferiscono a specie non precisate.

Urostylidae

Holosticha Wrzesniowski, 1877

Holosticha arenicola Kahl, 1932 (S)

Holosticha diademata Rees, 1884 (S)

Holosticha vernalis Stokes, 1887 (N)

Uroleptus Ehrenberg, 1831

Uroleptus mobilis Engelmann, 1861 (N)

Uroleptus musculus (O.F. Müller, 1786) (N)

Uroleptus piscis (O.F. Müller, 1773) (N)

Uroleptus rattulus Stein, 1859 (N)

Urostyla Ehrenberg, 1830

Urostyla grandis Ehrenberg, 1830 (N)
Urostyla weissii Steini, 1859 (N)

Oxytrichidae

Gastrostyla Engelmann, 1862

Gastrostyla muscorum Kahl, 1932 (N)
Gastrostyla pulchra (Perejaslawzewa, 1886) (3)
Gastrostyla steinii Engelmann, 1862 (N, S)

Histriculus Corliss, 1960

Histriculus similis Quennerstedt, 1867 (S)

Opisthotricha Kent, 1881

Opisthotricha elongata Smith, 1897 (N)
Opisthotricha muscorum Kahl, 1932 (S)

Oxytricha Bory de St. Vincent, 1825

Oxytricha bifaria Stokes, 1887 (N, S)
Oxytricha fallax Stein, 1859 (N)
Oxytricha hymenostoma Stokes, 1887 (S)
Oxytricha marina Kahl, 1932 (3)

Pleurotricha Stein, 1859

Pleurotricha grandis Stein, 1859 (N)

Steinia Diesing, 1866

Steinia candens Kahl, 1932 (S)
Steinia gracilis Kahl, 1932 (S)
Steinia platystoma (Ehrenberg, 1831) (S)

Stylonychia Ehrenberg, 1830

Stylonychia grandis (Maupas, 1879) (S)
Stylonychia mytilus Ehrenberg, 1838 (N, S)
Stylonychia notophora Stokes, 1885 (N)
Stylonychia pustulata (O.F. Müller, 1786) (N, S)

Tachysoma Stokes, 1887

Tachysoma pellionella (O.F. Müller, 1773) (N, S)

Trachelostylidae

Psammomitra Borrer, 1972

Psammomitra brevicaudata (Kahl, 1933) (3)

Trachelostyla Kahl, 1932

Trachelostyla caudata Kahl, 1932 (3)

Trachelostyla pediculiformis (Cohn, 1866) (3)

Urosoma Kowalewski, 1882

Urosoma cienkowski Kowalewski, 1882 (N)

Stichotrichida i.s.

Epiclintes Stein, 1862

Epiclintes ambiguus (O.F. Müller, 1786) (3)

Euplotida

Aspidiscidae

Aspidisca Ehrenberg, 1830

Aspidisca cicada (O.F. Müller, 1786) (N)

Aspidisca lynceus (O.F. Müller, 1773) (N)

Aspidisca steini (Buddenbrock, 1920) (3)

Aspidisca turrita Ehrenberg, 1831 (N)

Aspidisca sp. (3, 4, 5) (*)

Note

Aspidisca sp.: Specie con caratteri tassonomici intermedi tra *A. leptaspis* Fresenius, 1865 e *A. pulcherrima* Kahl, 1932 segnalata da Rosati et al., 1987.

Euplotidae

Diophrys Dujardin, 1841

Diophrys appendiculata (Ehrenberg, 1838) (3)
Diophrys hystrix Buddenbrock, 1920 (3)
Diophrys irmgard Mansfeld, 1923 (3)
Diophrys oligothrix Borrer, 1965 (4)
Diophrys scutum Dujardin, 1842 (3)

Euplotes Ehrenberg, 1830

Euplotes aberrans Dragesco, 1960 (S)
Euplotes affinis Dujardin, 1841 (N)
Euplotes charon (O.F. Müller, 1776) (N)
Euplotes crassus (Dujardin, 1842) (3, 4, 5)
Euplotes crenosus Tuffrau, 1960 (N)
*Euplotes magnicirratu*s Carter, 1972 (S)
Euplotes minutus Yocum, 1930 (3, 4, 5)
Euplotes muscicola Kahl, 1932 (S)
Euplotes novemcarinatus Wang, 1930 (N)
Euplotes patella (O.F. Müller, 1773) (N)
Euplotes vannus (O.F. Müller, 1786) (3)
Euplotes woodruffi Gaw, 1939 (S)

Swedmarkia Dragesco, 1954

Swedmarkia arenicola Dragesco, 1954 (3)

Gastrocirrhidae

Euplotidium Noland, 1937

Euplotidium arenarium Magagnini & Nobili, 1964 (3)
Euplotidium itoi Ito, 1958 (3)

Uronychiidae

Uronychia Stein, 1859

Uronychia trasfuga (O.F. Müller, 1786) (3)

Prostomatea

Prostomatida

Holophryidae

Acaryophrya André, 1915

Acaryophrya collaris Kahl, 1926 (N)

Holophrya Ehrenberg, 1833

Holophrya atra Sveç, 1897 (N)

Holophrya bimacronucleata R. Grandori & L. Grandori, 1934 (N)

Holophrya simplex Schewiakoff, 1893 (N)

Prorodontida

Colepidae

Coleps Nitzsch, 1827

Coleps hirtus (O.F. Müller, 1786) (3)

Coleps pulcher Spiegel, 1926 (3)

Coleps tessellatus Kahl, 1930 (3)

Tiarina Bergh, 1881

Tiarina sp. (3, 4, 5) (*)

Note

Tiarina sp.: Le uniche citazioni per l'Italia si riferiscono a specie non precisate.

Placidae

Placus Cohn, 1866

Placus socialis Fabre-Domergue, 1889 (S)

Plagiocampidae

Plagiocampa Schewiakoff, 1892

Plagiocampa acuminata Kahl, 1933 (S)

Plagiocampa atra R. Grandori & L. Grandori, 1934 (S)

Plagiocampa incisa Kahl, 1933 (S)

Plagiocampa metabolica Kahl, 1930 (N)

Plagiocampa rouxi Kahl, 1926 (N)

Prorodontidae

Prorodon Ehrenberg, 1833

Prorodon discolor (Ehrenberg, 1831) (N)

Prorodon dubius Kahl, 1930 (S)

Prorodon ovum (Ehrenberg, 1831) (N, S)

Prorodon teres Ehrenberg, 1838 (N)

Urotrichidae

Urotricha Claparède & Lachmann, 1859

Urotricha armata Kahl, 1927 (N)

Urotricha discolor Kahl, 1932 (N)

Urotricha farcta Claparède & Lachmann, 1858 (N)

Urotricha saprophila Kahl, 1932 (N)

Prorodontida i.s.

Amphibothrella R. Grandori & L. Grandori, 1934

Amphibothrella enigmatica R. Grandori & L. Grandori, 1934 (N)

Litostomatea

Haptorida

Enchelyidae

Enchelyodon Claparède & Lachmann, 1859

Enchelyodon sp. (3) (*)

Enchelys O.F. Müller, 1773

Enchelys farcimen (O.F. Müller, 1773) (S)

Enchelys simplex Kahl, 1926 (N)

Homalozoon Stokes, 1890

Homalozoon vermiculare (Stokes, 1887) (N)

Rhopalophrya Kahl, 1926

Rhopalophrya pentacerca R. Grandori & L. Grandori, 1934 (N)

Note

Enchelyodon sp.: Le uniche citazioni per l'Italia si riferiscono a specie non precisate.

Lacrymariidae

Lacrymaria Bory de St. Vincent, 1826

Lacrymaria acuta Kahl, 1933 (3)

Lacrymaria caudata Kahl, 1933 (S)

Lacrymaria coronata Claparède & Lachmann, 1958 (3)

Lacrymaria cucumis Penard, 1922 (N)

Lacrymaria marina (Meunier, 1907) (S)

Lacrymaria multinucleata (Dragesco, 1954) (3)

Lacrymaria olor (O.F. Müller, 1786) (3)

Lacrymaria pupula (O.F. Müller, 1786) (N)

Mesodiniidae

Mesodinium Stein, 1863

Mesodinium acarus Stein, 1863 (N)

Mesodinium pulex (Claparède & Lachmann, 1858) (3)

Spathidiidae

Spathidium Dujardin, 1841

Spathidium depressum Kahl, 1930 (N)

Spathidium falciforme Penard, 1922 (S)

Spathidium muscicola Kahl, 1930 (S)

Spathidium procerum Kahl, 1930 (N)

Spathidium spathula (O.F. Müller, 1773) (N)

Trachelophyllidae

Chaenea Quennerstedt, 1867

Chaenea clavata R. Grandori & L. Grandori, 1934 (N)
Chaenea vorax Quennerstedt, 1867 (S)

Lagynophria Kahl, 1927

Lagynophria mucicola Kahl, 1927 (N)

Trachelophyllum Claparède & Lachmann, 1859

Trachelophyllum apiculatum Perty, 1852 (N)
Trachelophyllum brachypharynx Levander, 1894 (N)
Trachelophyllum pusillum Claparède & Lachmann, 1858 (N)

Pleurostomatida

Amphileptidae

Acineria Dujardin, 1841

Acineria incurvata Dujardin, 1841 (N)

Amphileptus Ehrenberg, 1930

Amphileptus sp. (3) (*)

Heminotus Kahl, 1933

Heminotus caudatus Kahl, 1933 (S)

Hemiophrys Wrzesniowski, 1870

Hemiophrys bivacuolata Kahl, 1931 (N)
Hemiophrys fusidens Kahl, 1926 (N)

Litonotus Wrzesniowski, 1870

Litonotus anser Wrzesniowski, 1870 (N)
Litonotus crinitus R. Grandori & L. Grandori, 1934 (N)
Litonotus cygnus (O.F. Müller, 1773) (N)
Litonotus digitatus R. Grandori & L. Grandori, 1934 (N)
Litonotus fasciola (O.F. Müller, 1773) (N)
Litonotus lamella (O.F. Müller, 1773) (N)

Loxophyllum Dujardin, 1841

Loxophyllum helus Stokes, 1884 (3)

Loxophyllum niemeccensis (Stein, 1859) (N)
Loxophyllum psammophilum Dragesco, 1954 (3)
Loxophyllum variabile Dragesco, 1954 (3)

Note

Amphileptus sp.: Le uniche citazioni per l'Italia si riferiscono a specie non precisate.

Pharyngophorida

Actinobolinidae

Actinobolina Strand, 1926

Actinobolina radians (Stein, 1852) (N)
Actinobolina vorax Wenrich, 1929 (N)

Enchelyomorpha Kahl, 1930

Enchelyomorpha vermicularis (Smith, 1899) (N, S)

Helicoprodontidae

Helicoprorodon Fauré-Fremiet, 1950

Helicoprorodon barbatus Dragesco, 1933 (3)
Helicoprorodon gigas Fauré-Fremiet, 1950 (3)

Tracheliidae

Dileptus Dujardin, 1841

Dileptus anser (O.F. Müller, 1773) (N, Si)
Dileptus gigas (Claparède & Lachmann, 1859) (N)
Dileptus lacazei (Gourret & Roeser, 1886) (N)
Dileptus monilatus (Stokes, 1886) (N)

Paradileptus Wenrich, 1929

Paradileptus estensis Canella, 1951 (N)

Trachelius Schrank, 1803

Trachelius ovum Ehrenberg, 1831 (3)

Vestibuliferida

Balantidiidae

Balantidium Claparède & Lachmann, 1858

Balantidium coli (Malmsten, 1857) (N, S, Si, Sa)

Balantidium minutum Schaudinn, 1899 (*)

Balantidium minutum italicum Sangiorgi & Ugdulena, 1917

Note

Balantidium minutum: Sottospecie segnalata per il territorio italiano senza ulteriori precisazioni.

Paraisotrichidae

Ampullacula Hsiung, 1930

Ampullacula ampulla (Fiorentini, 1890) (*)

Holophryoides Gassowsky, 1919

Holophryoides ovalis (Fiorentini, 1890) (*)

Paraisotricha Fiorentini, 1890

Paraisotricha colpoidea Fiorentini, 1890 (*)

Paraisotricha incisa Fiorentini, 1890 (*)

Paraisotricha oblonga Fiorentini, 1890 (*)

Paraisotricha triangularis Fiorentini, 1890 (*)

Note

Ampullacula ampulla: Specie segnalata per il territorio italiano senza ulteriori precisazioni.

Holophryoides ovalis: Specie segnalata per il territorio italiano senza ulteriori precisazioni.

Paraisotricha colpoidea: Specie segnalata per il territorio italiano senza ulteriori precisazioni.

Paraisotricha incisa: Specie segnalata per il territorio italiano senza ulteriori precisazioni.

Paraisotricha oblonga: Specie segnalata per il territorio italiano senza ulteriori precisazioni.

Paraisotricha triangularis: Specie segnalata per il territorio italiano senza ulteriori precisazioni.

Coelosomididae

Coelosomides Anigstein, 1912

Coelosomides tessieri (Dragesco, 1954) (3)

Trichospiridae

Spirozona Kahl, 1926

Spirozona caudata Kahl, 1926 (N)

Entodiniomorphida

Buetschliidae

Buetschlia Schuberg, 1888

Buetschlia lanceolata Fiorentini, 1890 (*)

Didesmis Fiorentini, 1890

Didesmis ovalis Fiorentini, 1890 (*)

Didesmis quadrata Fiorentini, 1890 (*)

Note

Buetschlia lanceolata: Specie segnalata per il territorio italiano senza ulteriori precisazioni.

Didesmis ovalis: Specie segnalata per il territorio italiano senza ulteriori precisazioni.

Didesmis quadrata: Specie segnalata per il territorio italiano senza ulteriori precisazioni.

Blepharocorythidae

Blepharocorys Bundle, 1895

Blepharocorys uncinata (Fiorentini, 1890) (*)

Blepharocorys valvata (Fiorentini, 1890) (*)

Note

Blepharocorys uncinata: Specie segnalata per il territorio italiano senza ulteriori precisazioni.

Blepharocorys valvata: Specie segnalata per il territorio italiano senza ulteriori precisazioni.

Cycloposthiidae

Cycloposthium Bundle, 1895

Cycloposthium bipalmatum (Fiorentini, 1890) (*)

Spirodinium Fiorentini, 1890

Spirodinium equi Fiorentini, 1890 (*)

Tetratoxum Gassowsky, 1919

Tetratoxum unifasciculatum (Fiorentini, 1890) (*)

Triadinium Fiorentini, 1890

Triadinium caudatum Fiorentini, 1890 (*)

Note

Cycloposthium bipalmatum: Specie segnalata per il territorio italiano senza ulteriori precisazioni.

Spirodinium equi: Specie segnalata per il territorio italiano senza ulteriori precisazioni.

Tetratoxum unifasciculatum: Specie segnalata per il territorio italiano senza ulteriori precisazioni.

Triadinium caudatum: Specie segnalata per il territorio italiano senza ulteriori precisazioni.

Ophryoscolecidae

Diplodinium Schuberg, 1888

Diplodinium dentatum (Stein, 1858) (*)

Entodinium Stein, 1859

Entodinium rostratum Fiorentini, 1889 (*)

Epidinium Crawley, 1923

Epidinium cattanei (Fiorentini, 1889) (*)

Epidinium caudatum (Fiorentini, 1889) (*)

Epidinium ecaudatum (Fiorentini, 1889) (*)

Eremoplastron Kofoed & Mac Lennan, 1932

Eremoplastron rostratum (Fiorentini, 1889) (*)

Eudiplodinium Dogiel, 1927

Eudiplodinium maggii (Fiorentini, 1889) (*)

Ostracodinium Dogiel, 1927

Ostracodinium mammosum (Railliet, 1890) (*)

Note

Diplodinium dentatum: Specie segnalata per il territorio italiano senza ulteriori precisazioni.

Entodinium rostratum: Specie segnalata per il territorio italiano senza ulteriori precisazioni.

Epidinium cattanei: Specie segnalata per il territorio italiano senza ulteriori precisazioni.

Epidinium caudatum: Specie segnalata per il territorio italiano senza ulteriori precisazioni.

Epidinium ecaudatum: Specie segnalata per il territorio italiano senza ulteriori precisazioni.

Eremoplastron rostratum: Specie segnalata per il territorio italiano senza ulteriori precisazioni.

Eudiplodinium maggii: Specie segnalata per il territorio italiano senza ulteriori precisazioni.

Ostracodinium mammosum: Specie segnalata per il territorio italiano senza ulteriori precisazioni.

Phyllopharyngea

Cyrtophorida

Chilodonellidae

Chilodonella Strand, 1926

Chilodonella calkinsi (Kahl, 1928) (S)

Chilodonella cyprini Moroff, 1902 (N, S)

Chilodonella uncinata (Ehrenberg, 1835) (N)

Phascolodon Stein, 1859

Phascolodon vorticella Stein, 1859 (N)

Pseudochilodontopsis Foissner, 1979

Pseudochilodontopsis piscatoris (Blochmann, 1895) (N)

Trithigmostoma Jankowski, 1967

Trithigmostoma cucullulus (O.F. Müller, 1786) (N, S)

Dysteriidae

Dysteria Huxley, 1857

Dysteria armata Huxley, 1857 (3)

Trochilia Dujardin, 1841

Trochilia minuta (Roux, 1901) (N)

Exogenida

Podophryidae

Podophrya Ehrenberg, 1838

Podophrya fixa (O.F. Müller, 1786) (N)

Podophrya maupasi Bütschli, 1889 (N)

Parapodophryidae

Parapodophrya Kahl, 1931

Parapodophrya sp. (N) (*)

Note

Parapodophrya sp.: Le uniche citazioni per l'Italia si riferiscono a specie non precisate.

Endogenida

Acinetidae

Kellicotta Curds, 1985

Kellicotta cuspidata (Kellicott, 1885) (N)

Tokophryidae

Tokophrya Butschli, 1889

Tokophrya sp. (N) (*)

Note

Tokophrya sp.: Le uniche citazioni per l'Italia si riferiscono a specie non precisate.

Nassophorea

Synhymeniida

Scaphidiodontidae

Chilodontopsis Blochmann, 1895

Chilodontopsis vorax (Stokes, 1887) (3)

Nassulida

Nassulidae

Nassula Ehrenberg, 1833

Nassula elegans Ehrenberg, 1833 (N)

Nassula ornata Ehrenberg, 1833 (N)

Nassula picta (Greef, 1888) (N)

Nassula tumida (Maskell, 1887) (N)

Obertrumia Foissner & Adam, 1981

Obertrumia aurea Ehrenberg, 1833 (N)

Furgasoniidae

Naxella Fryd-Versavel, Iftode & Deroux, 1980

Naxella lateritia (Claparède & Lachman, 1859) (N)

Microthoracida

Microthoracidae

Drepanomonas Fresenius, 1858

Drepanomonas revoluta Penard, 1922 (N)

Microthorax Engelmann, 1862

Microthorax sp. (N) (*)

Note

Microthorax sp.: Le uniche citazioni per l'Italia si riferiscono a specie non precisate.

Propeniculida

Leptopharyngidae

Leptopharynx Mermod, 1914

Leptopharynx costatus Mermod, 1914 (N, S, Si)

Pseudomicrothorax Mermod, 1914

Pseudomicrothorax agilis Mermod, 1914 (N)

Pseudomicrothorax dubius (Maupas, 1883) (N)

Peniculida

Clathrostomatidae

Clathrostoma Penard, 1922

Clathrostoma viminale Penard, 1922 (S)

Frontoniidae

Frontonia Ehrenberg, 1838

Frontonia acuminata (Ehrenberg, 1833) (N)

Frontonia arenaria Kahl, 1933 (3)

Frontonia atra (Ehrenberg, 1833) (N)

Frontonia elliptica Beardsley, 1902 (N)

Frontonia leucas (Ehrenberg, 1833) (N)

Frontonia marina Fabre-Domergue, 1891 (3)

Frontonia microstomata Kahl, 1931 (3)

Lembadionidae

Lembadion Perty, 1849

Lembadion bullinum (O.F. Müller, 1786) (N)

Lembadion lucens (Maskell, 1887) (N)

Parameciidae

Paramecium O. F. Müller, 1773

Paramecium aurelia O.F. Müller, 1773 (N)

Paramecium bursaria (Ehrenberg, 1831) (N)

Paramecium caudatum Ehrenberg, 1833 (N, S)

Paramecium putrinum Claparède & Lachmann, 1858 (N, S)

Paramecium woodruffi Wenrich, 1928 (N, S)

Urocentridae

Urocentrum Nitzsch, 1827

Urocentrum turbo (O.F. Müller, 1786) (N)

Oligohymenophorea

Hymenostomatida

Glaucomidae

Glaucoma Ehrenberg, 1830

Glaucoma gigantea R. Grandori & L. Grandori, 1934 (N, S)

Glaucoma maupasi Kahl, 1926 (S)

Glaucoma pyriformis (Ehrenberg, 1830) (N, S)

Glaucoma scintillans Ehrenberg, 1830 (N, S)

Monochilium Schewiakoff, 1893

Monochilium frontatum Schewiakoff, 1893 (N)

Tetrahymenidae

Stegochilium Schewiakoff, 1893

Stegochilium fusiforme Schewiakoff, 1893 (N)

Tetrahymena Furgason, 1940

Tetrahymena pyriformis (Ehrenberg, 1830) (N)

Turaniellidae

Colpidium Stein, 1860

Colpidium campylum (Stokes, 1886) (N, S)

Colpidium colpoda (Losana, 1829) (N, S)

Ichthyophthiriidae

Cryptocaryon Brown, 1951

Cryptocaryon irritans Brown, 1951 (N)

Ichthyophthirius Fouquet, 1876

Ichthyophthirius multifiliis Fouquet, 1876 (N, S)

Sagittariidae

Sagittaria R. Grandori & L. Grandori, 1934

Sagittaria polygonalis R. Grandori & L. Grandori, 1934 (N)

Hymenostomatida i.s.

Malacophrys Kahl, 1926

Malacophrys sphagni (Penard, 1922) (N, S)

Scuticociliatida

Cinetochilidae

Cinetochilum Perty, 1852

Cinetochilum margaritaceum (Ehrenberg, 1831) (N, S)

Cohnilembidae

Cohnilembus Kahl, 1933

Cohnilembus fusiformis Kahl, 1926 (N, Si)

Cohnilembus pusillus Quennerstedt, 1869 (N, S)

Cohnilembus reesi Kahl, 1931 (N)

Loxocephalidae

Dexiotricha Stokes, 1885

Dexiotricha plagia Stokes, 1885 (N)

Loxocephalus Eberhard, 1862

Loxocephalus colpidiopsis Kahl, 1926 (N)

Loxocephalus ellipticus Kahl, 1935 (N)

Loxocephalus lucidus Smith, 1897 (S)

Pseudocohnilembidae

Pseudocohnilembus Evans & Thompson, 1964

Pseudocohnilembus pusillus Evans & Thompson, 1964 (N)

Uronematidae

Uronema Dujardin, 1841

Uronema griseolum (Maupas, 1883) (N)

Uronema halophilum (Kahl, 1931) (N)

Uronema marinum Dujardin, 1841 (N)

Uronema nigricans Thompson & Evans, 1968 (N)

Uronema rabaudi Cépède, 1910 (S)

Uronema schewiakoffi v. Buddenbrock, 1920 (N)

Urozonidae

Urozona Schewiakoff, 1889

Urozona buetschlii Schewiakoff, 1889 (N)

Ctedectomatidae

Ctedectoma Stokes, 1884

Ctedectoma acanthocrypta Stokes, 1884 (N)

Cyclidiidae

Calyptotricha Phillips, 1892

Calyptotricha alpina Enriquez, 1933 (N)

Cristigera Roux, 1899

Cristigera phoenix Penard, 1922 (N)

Cyclidium O.F. Müller, 1786

Cyclidium citrullus (Cohn, 1865) (N)

Cyclidium glaucoma O.F. Müller, 1773 (N, Si)

Cyclidium oblongum Kahl, 1931 (N, S)

Cyclidium opisthostoma R. Grandori & L. Grandori, 1934 (N, S)

Cyclidium versatile Penard, 1922 (N)

Pleuronematidae

Pleuronema Dujardin, 1836

Pleuronema coronatum Kent, 1881 (3)

Pleuronema marinum Dujardin, 1841 (3)

Schizocalyptra Dragesco, 1968

Schizocalyptra sp. (3) (*)

Note

Schizocalyptra sp.: Le uniche citazioni per l'Italia si riferiscono a specie non precisate.

Cinetochilidae

Sathrophilus Corliss, 1960

Sathrophilus oviformis Kahl, 1926 (N)

Sessilida

Astylozoidae

Astylozoon Engelmann, 1862

Astylozoon faurei Kahl, 1935 (N)

Epistylididae

Campanella Goldfuss, 1820

Campanella umbellaria (Linnaeus, 1767) (N)

Epistylis Ehrenberg, 1830

Epistylis plicatilis Ehrenberg, 1831 (N)

Epistylis rotans Svec, 1897 (N)

Operculariidae

Opercularia Goldfuss, 1820

Opercularia coarctata Claparède & Lachmann, 1858 (N)

Opercularia microdiscum Fauré-Fremiet, 1904 (N)

Scyphidiidae

Apiosoma Blanchard, 1883

Apiosoma cylindriformis (Chen, 1955) (3)

Scyphidia Dujardin, 1841

Scyphidia sp. (3) (*)

Note

Scyphidia sp.: Le uniche citazioni per l'Italia si riferiscono a specie non precisate.

Vaginicolidae

Cyclodonta Matthes, 1958

Cyclodonta bipartita Stokes, 1885 (N)

Vaginicola Lamarck, 1816

Vaginicola crystallina Ehrenberg, 1830 (N)

Vorticellidae

Carchesium Ehrenberg, 1830

Carchesium polypinum (Linnaeus, 1758) (N)

Vorticella Linnaeus, 1767

Vorticella campanula Ehrenberg, 1831 (N, S)

Vorticella convallaria Linnaeus, 1758 (N)

Vorticella gracilis Dujardin, 1841 (N)

Vorticella longifilum Kent, 1881 (N)

Vorticella mayeri Fauré-Fremiet, 1920 (N)

Vorticella microstoma Ehrenberg, 1830 (N, S)

Vorticella monilata Tatem, 1870 (N)

Vorticella nebulifera Ehrenberg, 1838 (N)

Vorticella nutans O.F. Müller, 1773 (S)

Vorticella picta Ehrenberg, 1831 (N)

Vorticella similis Stokes, 1887 (S)

Vorticella striata Dujardin, 1841 (N)

Zoothamniidae

Zoothamnium Bory de St. Vincent, 1826

Zoothamnium pygmaeum D'Udekem, 1862 (N)

Mobilida

Trichodinidae

Trichodina Ehrenberg, 1830

Trichodina anguilli Wu, 1961 (S)
Trichodina domerguei (Wallengren, 1897) (N, S)
Trichodina pediculus Ehrenberg, 1830 (N)
Trichodina ranae da Cunha, 1950 (*)
Trichodina sp. (Giavenni, 1988) (4)

Note

Trichodina ranae: Specie segnalata per il territorio italiano senza ulteriori precisazioni.

Plagiopylida

Plagiopylidae

Plagiopyla Stein, 1860

Plagiopyla nasuta Stein, 1860 (N)

Colpodea

Colpodida

Colpodidae

Colpoda O.F. Müller, 1773

Colpoda cucullus O.F. Müller, 1773 (N, S, Si)
Colpoda inflata (Stokes, 1884) (N, S, Si)
Colpoda magna (Gruber, 1879) (N)
Colpoda maupasi Enriquez, 1908 (N, S, Si)
Colpoda steinii Maupas, 1883 (N, Si)

Grandoriidae

Grandoria Corliss, 1930

Grandoria aculeata R. Grandori & L. Grandori, 1934 (N)

Cyrtolophosidida

Cyrtolophosididae

Cyrtolophosis Stokes, 1885

Cyrtolophosis elongata (Schewiakoff, 1892) (S)

Cyrtolophosis mucicola Stokes, 1885 (N, S, Si)

Bryometopida

Kreyellidae

Microdiaphanosoma Wenzel, 1953

Microdiaphanosoma arcuata (R. Grandori & L. Grandori, 1934) (N, S)

Protozoa i.s.

Blastocystis Alexeieff, 1911

Blastocystis hominis (Brumpt, 1912) (N, S, Si, Sa)



CHECKLIST DELLE SPECIE DELLA FAUNA ITALIANA

Versione 1.0

PARTE II - INVERTEBRATI

Dicyemida

Dicyemidae

Dicyema von K  lliker, 1849

Dicyema macrocephalum (van Beneden, 1876) (3, 4, 5?) (*)

Dicyema microcephalum Whitman, 1883 (3) (*)

Dicyema moschatum Whitman, 1883 (3, 4, 5?) (*)

Dicyema paradoxum von K  lliker, 1849 (3, 4, 5) (*)

Dicyema rondeletiolae Nouvel, 1944 (3) (*)

Dicyema schulzianum (van Beneden, 1876) (3, 4, 5?) (*)

Dicyema typus van Beneden, 1876 sensu Nouvel, 1944 (3, 4, 5?) (*)

Dicyemennea Whitman, 1883

Dicyemennea eledones (Wagener, 1857) (3, 4, 5?) (*)

Dicyemennea gracile (Wagener, 1857) (3, 4, 5?) (*)

Dicyemennea lameerei Nouvel, 1932 (3, 4, 5) (*)

Pseudicyema Nouvel, 1933

Pseudicyema truncatum (Whitman, 1883) (3, 4, 5?) (*)

Note

Dicyema macrocephalum: Parassita di *Sepia elegans*, *Sepiola rondeletii*, *S. steenstrupiana*, *Sepietta oweniana* e *S. obscura*.

Dicyema microcephalum: Parassita di *Sepiola steenstrupiana* e *Octopus defilippi*.

Dicyema moschatum: Parassita di *Sepiola rondeletii* ed *Eledone moschata*.

Dicyema paradoxum: Parassita di *Octopus macropus* e *O. vulgaris*.

Dicyema rondeletiolae: Parassita di *Rondeletiola minor*, *Sepietta oweniana* e *S. neglecta*.

Dicyema schulzianum: Parassita di *Sepia elegans* e *Rondeletiola minor*.

Dicyema typus: Parassita di *Octopus vulgaris*.

Dicyemennea eledones: Parassita di *Octopus salutii*, *Eledone moschata* ed *E. cirrhosa*.

Dicyemennea gracile: Parassita di *Sepia officinalis* e *S. orbignyana*.

Dicyemennea lameerei: Parassita di *Octopus vulgaris* ed *Eledone cirrhosa*.

Pseudicyema truncatum: Parassita di *Sepia officinalis*, *S. elegans* e *Rossia macrosoma*.

Conocyemidae

Conocyema van Beneden, 1882

Conocyema polymorpha van Beneden, 1882 (3) (*)

Microcyema van Beneden, 1882

Microcyema vespa van Beneden, 1882 (3, 4, 5?) (*)

Note

Conocyema polymorpha: Parassita di *Octopus vulgaris*.

Microcyema vespa: Parassita di *Sepia officinalis*.

Orthonectida

Rhopaluridae

Rhopalura Giard, 1877

Rhopalura ophiocomae Giard, 1877 (3, 4?, 5?) (*)

Rhopalura intoshi Metschnikoff, 1881 (5) (E) (*)

Note

Rhopalura ophiocomae: Specie ad ampia distribuzione geografica, parassita dell'ofiura *Amphipholis squamata*.

Rhopalura intoshi: Ritrovata solo a Messina, nel nemertino *Lineus lacteus*; secondo Kozloff (1992), non è attribuibile a nessuno dei quattro generi noti di Orthonectida.

Porifera

Hexactinellida

Amphidiscosa

Pheronematidae

Pheronema Leidy, 1868

Pheronema grayi Saville-Kent, 1869 (3, 5)

Hexactinosa

Tretodictyidae

Tretodictyum Schulze, 1886

Tretodictyum tubulosum Schulze, 1886 (3)

Calcarea

Clathrinida

Clathrinidae

Clathrina Gray, 1867

Clathrina cerebrum (Haeckel, 1872) (3, 5)

Clathrina clathrus (Schmidt, 1864) (3, 4, 5)

Clathrina contorta (Bowerbank, 1866) (3, 4)

Clathrina coriacea (Montagu, 1818) (3, 4)

Clathrina primordialis (Haeckel, 1872) (3)

Clathrina reticulum (Schmidt, 1862) (3)

Clathrina rubra Sarà, 1958 (3, 5)

Guancha Miklucho Maclay, 1868

Guancha blanca Miklucho Maclay, 1868 (3, 4)

Guancha lacunosa (Johnston, 1842) (3, 4)

Leucaltidae

Ascandra Haeckel, 1872

Ascandra falcata Haeckel, 1872 (3, 4, 5)

Leucosoleniida

Leucosoleniidae

Leucosolenia Bowerbank, 1861

Leucosolenia botryoides (Ellis & Solander, 1786) (3, 4, 5)

Leucosolenia parthenopea Sarà, 1953 (3)

Leucosolenia variabilis Haeckel, 1870 (3, 4)

Ascyssa Haeckel, 1872

Ascyssa troglodytes (Haeckel, 1870) (3)

Amphoriscidae

Amphoriscus Haeckel, 1870

Amphoriscus chrysalis (Schmidt, 1864) (4)

Amphoriscus cylindrus (Haeckel, 1872) (4)

Amphoriscus dohrni Sarà, 1960 (3)

Amphoriscus gregorii Lendenfeld, 1891 (4)

Grantiidae

Grantia Fleming, 1828

Grantia capillosa (Schmidt, 1862) (3, 4)

Aphroceras Gray, 1858

Aphroceras caespitosa (Haeckel, 1872) (3)

Aphroceras corticata (Lendenfeld, 1891) (4)

Ute Schmidt, 1862

Ute glabra Schmidt, 1862 (3, 4)

Leuconia Grant, 1833

Leuconia aspera (Schmidt, 1862) (3, 4, 5)

Leuconia crambessa Haeckel, 1872 (3)

Leuconia fistulosa (Johnston, 1842) (4)

Leuconia solida (Schmidt, 1862) (3, 4, 5)

Sycyssa Haeckel, 1872

Sycyssa huxleyi Haeckel, 1872 (4)

Sycettidae

Sycetta Haeckel, 1872

Sycetta conifera (Haeckel, 1872) (4)

Sycon Risso, 1826

Sycon ciliatum (Fabricius, 1780) (3, 4, 5)
Sycon elegans (Bowerbank, 1845) (3, 4, 5)
Sycon helleri (Lendenfeld, 1891) (4)
Sycon humboldti Risso, 1826 (4)
Sycon quadrangulatum (Schmidt, 1868) (4)
Sycon raphanus Schmidt, 1862 (3, 4, 5)
Sycon schmidtii (Haeckel, 1872) (4)
Sycon setosum Schmidt, 1862 (3, 4)
Sycon tenellum (Lendenfeld, 1891) (4)
Sycon tuba (Lendenfeld, 1891) (4)
Sycon vigilans Sarà & Gaino, 1971 (3)

Lithonida

Petrobionidae

Petrobiona Vacelet & Lévi, 1958

Petrobiona incrustans Sarà, 1963 (5)
Petrobiona massiliana Vacelet & Lévi, 1958 (3)

Demospongiae

Homosclerophorida

Oscarellidae

Oscarella Vosmaer, 1887

Oscarella lobularis (Schmidt, 1862) (3, 4, 5)

Plakinidae

Corticium Schmidt, 1862

Corticium bowerbanki Sarà, 1960 (3)
Corticium candelabrum Schmidt, 1862 (3, 4, 5)
Corticium reductum Pulitzer-Finali, 1983 (5)
Corticium topsenti Pouliquen, 1972 (3)

Placinolopha Topsent, 1897

Placinolopha moncharmonti (Sarà, 1960) (3)

Plakina Schulze, 1880

- Plakina dilopha* Schulze, 1880 (3, 4)
- Plakina monolopha* Schulze, 1880 (3, 4, 5)
- Plakina trilopha* Schulze, 1880 (3, 4, 5)

Plakinastrella Schulze, 1880

- Plakinastrella copiosa* Schulze, 1880 (3)

Plakortis Schulze, 1880

- Plakortis simplex* Schulze, 1880 (3, 4, 5)

Astrophorida

Geodiidae

Caminella Lendenfeld, 1894

- Caminella loricata* Lendenfeld, 1894 (4)

Caminus Schmidt, 1862

- Caminus vulcani* Schmidt, 1862 (3, 4, 5)

Erylus Gray, 1867

- Erylus corsicus* Pulitzer-Finali, 1983 (3)
- Erylus deficiens* (Topsent, 1927) (3)
- Erylus discophorus* (Schmidt, 1862) (3, 4, 5)
- Erylus euastrum* (Schmidt, 1868) (3, 4, 5)
- Erylus mamillaris* (Schmidt, 1862) (3, 4)
- Erylus papulifer* Pulitzer-Finali, 1983 (3)

Geodia Lamarck, 1815

- Geodia conchilega* Schmidt, 1862 (3, 4, 5)
- Geodia cydonium* (Jameson, 1811) (3, 4, 5)
- Geodia tuber* Lendenfeld, 1894 (4)

Isops Sollas, 1886

- Isops anceps* (Vosmaer, 1894) (3)
- Isops intuta* (Topsent, 1892) (3, 4)

Pachymatisma Bowerbank, 1866

Pachymatisma johnstonia (Bowerbank, 1844) (3, 4)

Sidonops Sollas, 1889

Sidonops geodina (Schmidt, 1868) (3)

Ancorinidae

Ancorina Schmidt, 1862

Ancorina radix Marenzeller, 1889 (4)

Ancorina wageneri (Schmidt, 1862) (4)

Dercitancorina Topsent, 1902

Dercitancorina lesinensis (Lendenfeld, 1894) (4)

Penares Gray, 1867

Penares helleri (Schmidt, 1864) (3, 4, 5)

Stelletta Schmidt, 1862

Stelletta defensa Pulitzer-Finali, 1983 (3)

Stelletta dichoclada Pulitzer-Finali, 1983 (3)

Stelletta dorsigera Schmidt, 1864 (3, 4)

Stelletta grubii Schmidt, 1862 (3, 4, 5)

Stelletta hispida (Buccich, 1886) (4)

Stelletta lactea Carter, 1871 (3, 5)

Stelletta pumex (Nardo, 1847) (3, 4, 5)

Stelletta simplicissima (Schmidt, 1868) (4)

Stelletta stellata Topsent, 1893 (5)

Stryphnus Sollas, 1888

Stryphnus mucronatus (Schmidt, 1868) (3, 4, 5)

Stryphnus ponderosus (Bowerbank, 1866) (4)

Calthropellidae

Calthropella Sollas, 1888

Calthropella inopinata Pulitzer-Finali, 1983 (3)

Calthropella recondita Pulitzer-Finali, 1972 (3)
Calthropella stelligera (Schmidt, 1868) (4)

Pachastrellidae

Dercitus Gray, 1867

Dercitus plicatus (Schmidt, 1868) (3, 4, 5)

Nethea Sollas, 1888

Nethea dissimilis Sarà, 1959 (3)

Pachastrella Schmidt, 1868

Pachastrella echinorhabda Pulitzer-Finali, 1972 (3)
Pachastrella monilifera Schmidt, 1868 (3, 4, 5)

Poecillastra Sollas, 1888

Poecillastra amygdaloides (Carter, 1876) (3)
Poecillastra compressa (Bowerbank, 1866) (3, 4)
Poecillastra rudiastra Pulitzer-Finali, 1983 (3)
Poecillastra saxicola (Topsent, 1892) (3)

Sphinctrella Schmidt, 1870

Sphinctrella gracilis Sollas, 1888 (3)
Sphinctrella horrida Schmidt, 1870 (3)
Sphinctrella verruculosa Pulitzer-Finali, 1983 (3)

Triptolemus Sollas, 1888

Triptolemus simplex Sarà, 1959 (3)

Theneidae

Thenea Gray, 1867

Thenea muricata (Bowerbank, 1858) (3, 4, 5)

Thrombidae

Thrombus Sollas, 1888

Thrombus abyssi (Carter, 1873) (3)

Coppatiidae

Jaspis Gray, 1867

Jaspis johnstoni (Schmidt, 1862) (3, 4, 5)

Spiroxya Topsent, 1896

Spiroxya heteroclita Topsent, 1896 (3)

Spirophorida

Tetillidae

Cinachyrella Wilson, 1925

Cinachyrella tarentina (Pulitzer-Finali, 1983) (5)

Craniella Schmidt, 1870

Craniella cranium (O.F. Müller, 1789) (3, 4, 5)

Craniella repens Sarà, 1958 (3)

Samidae

Samus Gray, 1867

Samus anonyma Gray, 1867 (5)

Lithistida i.s.

Desmanthidae

Desmanthus Topsent, 1893

Desmanthus incrustans (Topsent, 1889) (3, 5)

Cladopeltidae

Siphonidium Schmidt, 1879

Siphonidium ramosum (Schmidt, 1870) (3)

Petromicidae

Petromica Topsent, 1898

Petromica grimaldi Topsent, 1898 (3)

Hadromerida

Tethyidae

Tethya Lamarck, 1815

Tethya aurantium (Pallas, 1766) (3, 4, 5)

Tethya citrina Sarà & Melone, 1965 (3, 4, 5)

Clionidae

Alectona Carter, 1879

Alectona millari Carter, 1879 (3, 4, 5)

Cliona Grant, 1826

Cliona albicans Volz, 1939 (4, 5)

Cliona burtoni Topsent, 1932 (3)

Cliona celata Grant, 1826 (3, 4, 5)

Cliona copiosa Sarà, 1959 (3, 4, 5)

Cliona janitrix Topsent, 1932 (3)

Cliona labyrinthica Hancock, 1849 (3)

Cliona levispira Topsent, 1898 (3)

Cliona nigricans (Schmidt, 1862) (3, 4)

Cliona rhodensis Rützler & Bromley, 1981 (3, 4, 5)

Cliona rovigensis Volz, 1939 (4)

Cliona sarai Melone, 1965 (3)

Cliona schmidtii (Ridley, 1881) (3, 4, 5)

Cliona topsenti (Lendenfeld, 1896) (4, 5)

Cliona tremitensis Sarà, 1961 (4)

Cliona vastifica Hancock, 1849 (3, 4, 5)

Cliona vermifera Hancock, 1867 (3, 4, 5)

Cliona viridis (Schmidt, 1862) (3, 4, 5)

Cliothesa Topsent, 1920

Cliothesa hancocki (Topsent, 1888) (3, 4, 5)

Thoosa Hancock, 1849

Thoosa mollis Volz, 1939 (3, 4, 5)

Spirastrellidae

Spirastrella Schmidt, 1868

Spirastrella cunctatrix Schmidt, 1868 (3, 4, 5)

Spirastrella minax (Topsent, 1888) (3, 4, 5)

Suberitidae

Laxosuberites Topsent, 1896

Laxosuberites rugosus (Schmidt, 1868) (4)

Prosuberites Topsent, 1893

Prosuberites epiphytum (Lamarck, 1815) (3, 4, 5)

Prosuberites longispina Topsent, 1893 (3, 4, 5)

Prosuberites modestus Pulitzer-Finali, 1978 (3)

Pseudosuberites Topsent, 1896

Pseudosuberites hyalinus (Ridley & Dendy, 1887) (3, 5)

Pseudosuberites sulphureus (Bowerbank, 1866) (3, 5)

Rhizaxinella Keller, 1880

Rhizaxinella elongata (Ridley & Dendy, 1887) (3, 4)

Rhizaxinella gracilis (Lendenfeld, 1896) (3, 4)

Rhizaxinella pyrifera (Delle Chiaje, 1828) (3, 4)

Suberites Nardo, 1862

Suberites carnosus (Johnston, 1842) (3, 4)

Suberites domuncula (Olivi, 1792) (3, 4)

Suberites ficus (Esper, 1806) (3, 4)

Suberites massa Nardo, 1847 (3, 4)

Suberites syringella (Schmidt, 1868) (3)

Terpios Duchassaing & Michelotti, 1864

Terpios fugax Duchassaing & Michelotti, 1864 (3, 4, 5)

Polymastiidae

Aaptos Gray, 1867

Aaptos aaptos (Schmidt, 1864) (3, 4, 5)

Aaptos papillata (Keller, 1880) (3)

Polymastia Bowerbank, 1864

Polymastia inflata Cabioch, 1968 (3)

Polymastia mammillaris (Müller, 1806) (3, 4)

Polymastia polytylota Vacelet, 1969 (3)

Polymastia robusta (Bowerbank, 1861) (4)

Polymastia sola Pulitzer-Finali, 1983 (3)

Pseudotrachya Hallmann, 1914

Pseudotrachya hystrix (Topsent, 1892) (3)

Pseudotrachya oxystyla Sarà, 1959 (3)

Quasillina Norman, 1869

Quasillina brevis (Bowerbank, 1861) (4)

Radiella Schmidt, 1870

Radiella sol Schmidt, 1870 (3)

Weberella Vosmaer, 1885

Weberella verrucosa Vacelet, 1960 (3)

Chondrosiidae (sedis incerta)

Chondrilla Schmidt, 1862

Chondrilla nucula Schmidt, 1862 (3, 4, 5)

Chondrosia Nardo, 1847

Chondrosia reniformis Nardo, 1847 (3, 4, 5)

Placospongiidae

Placospongia Gray, 1867

Placospongia decorticans (Hanitsch, 1895) (3, 5)

Timeidae

Diplastrella Topsent, 1918

Diplastrella bistellata (Schmidt, 1862) (3, 4, 5)

Diplastrella ornata Rützler & Sarà, 1962 (3, 4, 5)

Timea Gray, 1867

Timea bifidostellata Pulitzer-Finali, 1983 (4)

Timea crassa (Topsent, 1900) (3, 5)

Timea cumana Pulitzer-Finali, 1978 (3)

Timea fasciata Topsent, 1934 (3, 4, 5)

Timea geministellata Pulitzer-Finali, 1978 (3)

Timea irregularis Sarà & Siribelli, 1960 (3)

Timea mixta (Topsent, 1896) (3)

Timea simplicistellata Pulitzer-Finali, 1983 (3)

Timea stellata (Bowerbank, 1866) (3, 4, 5)

Timea stellifasciata Sarà & Siribelli, 1960 (3)

Timea unistellata (Topsent, 1892) (3, 4, 5)

Latrunculiidae

Didiscus Dendy, 1922

Didiscus styliferus Tsumamal, 1969 (3, 5)

Latrunculia du Bocage, 1869

Latrunculia tarentina Pulitzer-Finali, 1983 (5)

Podospongia du Bocage, 1869

Podospongia lovenii Du Bocage, 1870 (3)

Axinellida

Axinellidae

Acanthella Schmidt, 1862

Acanthella acuta Schmidt, 1862 (3, 4, 5)

Acanthella annulata Sarà, 1958 (3)

Auletta Schmidt, 1870

Auletta pedunculata (Topsent, 1896) (3)

Axinella Schmidt, 1862

Axinella babici Vacelet, 1961 (3)

Axinella cannabina (Esper, 1794) (3, 4, 5)

Axinella centrotylota Pansini, 1982 (3)

Axinella damicornis (Esper, 1794) (3, 4, 5)

Axinella macrostyla Babic, 1922 (4)

Axinella minuta Lévi, 1957 (3)

Axinella polypoides Schmidt, 1862 (3, 4)

Axinella pumila Babic, 1922 (4)

Axinella vaceleti Pansini, 1982 (3)

Axinella verrucosa (Esper, 1794) (3, 4, 5)

Ceratopsion Strand, 1928

Ceratopsion minor Pulitzer-Finali, 1983 (3)

Phakellia Bowerbank, 1864

Phakellia rugosa (Bowerbank, 1866) (5)

Phakellia ventilabrum (Linné, 1767) (3)

Bubaridae

Bubaris Gray, 1867

Bubaris carcisis Vacelet, 1969 (3)

Bubaris subtyla Pulitzer-Finali, 1983 (3)

Bubaris vermiculata (Bowerbank, 1866) (3, 4, 5)

Hymerhabdia Topsent, 1892

Hymerhabdia contracta Sarà & Siribelli, 1962 (3)

Hymerhabdia intermedia Sarà & Siribelli, 1960 (3)

Hymerhabdia oxytrunca Topsent, 1904 (3)

Hymerhabdia papillosa Sarà & Siribelli, 1962 (3)
Hymerhabdia typica Topsent, 1892 (3)

Lithobubaris Vacelet, 1969

Lithobubaris tenens Vacelet, 1969 (3)

Monocrepidium Topsent, 1898

Monocrepidium vermiculatum Topsent, 1898 (3)

Rhabdobaris Pulitzer-Finali, 1983

Rhabdobaris implicata Pulitzer-Finali, 1983 (3)

Desmoxyidae

Halicnemis Bowerbank, 1862

Halicnemis geniculata Sarà, 1958 (3)
Halicnemis patera Bowerbank, 1864 (3)

Halicortex Sarà, 1958

Halicortex loricata Sarà, 1958 (3)

Higginsia Higgin, 1877

Higginsia mediterranea Pulitzer-Finali, 1978 (3)

Holoxea Topsent, 1892

Holoxea furtiva Topsent, 1892 (3, 5)

Hemiasterellidae

Paratimea Hallmann, 1916

Paratimea oxeata Pulitzer-Finali, 1978 (3)
Paratimea pierantonii (Sarà, 1958) (3)

Stelligera Gray, 1867

Stelligera nux Lendenfeld, 1896 (4)
Stelligera stuposa (Ellis & Solander, 1786) (3, 4)

Raspailiidae

Endectyon Topsent, 1920

Endectyon delaubenfelsi Burton, 1930 (3)

Endectyon pilosus (Vacelet, 1961) (3)

Eurypon Gray, 1867

Eurypon cinctum Sarà, 1960 (3)

Eurypon clavatum (Bowerbank, 1866) (3)

Eurypon coronula (Bowerbank, 1874) (3)

Eurypon lacazei (Topsent, 1891) (3)

Eurypon major Sarà & Siribelli, 1960 (3, 4)

Eurypon topsenti Pulitzer-Finali, 1983 (3, 5)

Eurypon vescicularis Sarà & Siribelli, 1960 (3, 4)

Hymeraphia Bowerbank, 1862

Hymeraphia stellifera (Bowerbank, 1866) (3)

Raspaciona Topsent, 1936

Raspaciona aculeata (Johnston, 1842) (3, 4)

Raspaciona calva Sarà, 1958 (3)

Raspaciona robusta Sarà, 1958 (3)

Raspailia Nardo, 1847

Raspailia gracillima Topsent, 1894 (3)

Raspailia viminalis Schmidt, 1862 (3, 4)

Raspailia virgultosa (Bowerbank, 1866) (3)

Tethyspira Topsent, 1890

Tethyspira spinosa (Bowerbank, 1874) (3, 5)

Tricheurypon Topsent, 1928

Tricheurypon viride (Topsent, 1889) (3, 5)

Rhabderemiidae

Rhabderemia Topsent, 1892

Rhabderemia indica Dendy, 1905 (3, 4, 5)
Rhabderemia minutula (Carter, 1876) (3, 4)

Agelasida

Agelasidae

Agelas Duchassaing & Michelotti, 1864

Agelas oroides (Schmidt, 1864) (3, 4, 5)

Merliida

Merliidae

Merlia Kirkpatrick, 1908

Merlia deficiens Vacelet, 1980 (3)
Merlia normani Kirkpatrick, 1908 (3, 5)

Halichondrida

Halichondriidae

Amorphinopsis Carter, 1887

Amorphinopsis filigrana (Schmidt, 1862) (4)
Amorphinopsis pallescens (Topsent, 1892) (5)

Astromimus Lendenfeld, 1896

Astromimus luteus Lendenfeld, 1896 (4)

Batzella Topsent, 1893

Batzella friabilis Pulitzer-Finali, 1978 (3)
Batzella inops (Topsent, 1891) (3)

Ciocalypta Bowerbank, 1862

Ciocalypta penicillus Bowerbank, 1864 (3)

Halichondria Fleming, 1828

Halichondria bowerbanki Burton, 1930 (3, 4, 5)

Halichondria convolvens Sarà, 1960 (3)

Halichondria panicea (Pallas, 1766) (3, 4)

Myrmekioderma Ehlers, 1870

Myrmekioderma laxa (Topsent, 1892) (3)

Myrmekioderma spelaea (Pulitzer-Finali, 1983) (3, 4, 5)

Spongosorites Topsent, 1896

Spongosorites flavens Pulitzer-Finali, 1983 (3, 4, 5)

Spongosorites intricatus (Topsent, 1892) (3, 4, 5)

Spongosorites pachastrelloides (Topsent, 1892) (3, 4)

Topsentia Berg, 1899

Topsentia aurantiaca (Schmidt, 1862) (3, 4, 5)

Topsentia contorta Sarà, 1961 (3, 4, 5)

Topsentia hyalina (Pulitzer-Finali, 1978) (3)

Topsentia mixta Sarà, 1958 (3)

Topsentia subtilis (Pulitzer-Finali, 1983) (3)

Hymeniacidonidae

Dictyonella Schmidt, 1868

Dictyonella incisa (Schmidt, 1880) (3, 4, 5)

Dictyonella marsillii (Topsent, 1893) (3)

Dictyonella obtusa (Schmidt, 1862) (3, 4, 5)

Dictyonella pelligera (Schmidt, 1864) (3, 4)

Hemimyscale Burton, 1934

Hemimyscale columella (Bowerbank, 1874) (3, 4, 5)

Hymeniacidon Bowerbank, 1858

Hymeniacidon mammeata Bowerbank, 1866 (3, 4)

Hymeniacidon sanguinea (Grant, 1826) (3, 4, 5)

Scopalina Schmidt, 1862

Scopalina lophyropoda Schmidt, 1862 (3, 4)

Ulosa de Laubenfels, 1936

Ulosa digitata (Schmidt, 1866) (3, 4)
Ulosa stuposa (Esper, 1794) (3, 5)
Ulosa tenellula Pulitzer-Finali, 1983 (5)
Ulosa tubulata Pulitzer-Finali, 1983 (3)

Poecilosclerida

Mycalidae

Mycale Gray, 1867

Mycale contarenii (Martens, 1824) (3, 4, 5)
Mycale dentata (Sarà, 1958) (3)
Mycale lingua (Bowerbank, 1866) (3, 4)
Mycale macilenta (Bowerbank, 1866) (3)
Mycale massa (Schmidt, 1862) (3, 4, 5)
Mycale minima (Waller, 1880) (3)
Mycale retifera Topsent, 1924 (3)
Mycale rotalis (Bowerbank, 1874) (3, 4, 5)
Mycale serrulata Sarà & Siribelli, 1960 (3)
Mycale syrinx (Schmidt, 1862) (3, 4, 5)
Mycale tunicata (Schmidt, 1862) (3, 4)

Hamacanthidae

Hamacantha Gray, 1867

Hamacantha falcula (Bowerbank, 1874) (3)
Hamacantha implicans Lundbeck, 1902 (3)
Hamacantha johnsoni (Bowerbank, 1864) (3)
Hamacantha megancistra Pulitzer-Finali, 1978 (3)

Biemnidae

Biemna Gray 1867

Biemna partenopea Pulitzer-Finali, 1978 (3)
Biemna tenuisigma Pulitzer-Finali, 1978 (3)

Desmacellidae

Desmacella Schmidt, 1870

Desmacella inornata (Bowerbank, 1866) (3)

Sigmattoxella de Laubenfels, 1936

Sigmattoxella annexa (Schmidt, 1870) (3, 4)

Esperiopsidae

Crambe Vosmaer, 1880

Crambe crambe (Schmidt, 1862) (3, 4, 5)

Crambe tailliezi Vacelet & Boury-Esnault, 1982 (3)

Desmacidon Bowerbank, 1862

Desmacidon adriatica Sarà, 1969 (4)

Coelosphaeridae

Coelectys Topsent, 1936

Coelectys insinuans Topsent, 1936 (3)

Histodermella Lundbeck, 1910

Histodermella apuliae Sarà, 1969 (4)

Crellidae

Crella Gray, 1867

Crella elegans (Schmidt, 1862) (3, 4)

Crella pulvinar (Schmidt, 1868) (3)

Pytheas Topsent, 1892

Pytheas digitifera Lévi, 1959 (3)

Pytheas fusifera (Sarà, 1969) (4)

Pytheas nodulosa (Sarà, 1959) (3)

Pytheas rosea (Topsent, 1892) (3, 5)

Pytheas sigmata (Topsent, 1925) (3)

Yvesia Topsent, 1892

Yvesia topsenti (Babic, 1922) (3, 4)

Myxillidae

Damiriella Burton, 1935

Damiriella cavernosa (Topsent, 1892) (3, 4)

Jophon Gray, 1867

Jophon pattersoni (Bowerbank, 1866) (4)

Lissodendoryx Topsent, 1892

Lissodendoryx basispinosa Sarà, 1958 (3)

Lissodendoryx cavernosa (Topsent, 1892) (3)

Lissodendoryx isodictyalis (Carter, 1882) (3, 4)

Melonanchora Carter, 1874

Melonanchora emphysema (Schmidt, 1875) (3)

Myxilla Schmidt, 1862

Myxilla iotrochotina (Topsent, 1892) (3, 5)

Myxilla prouhoi (Topsent, 1892) (3, 4)

Myxilla rosacea (Lieberkühn, 1859) (3, 4, 5)

Plocamionida Topsent, 1927

Plocamionida ambigua (Bowerbank, 1866) (3)

Tedaniidae

Tedania Gray, 1867

Tedania anhelans (Lieberkühn, 1859) (3, 4, 5)

Tedania digitata (Schmidt, 1862) (3, 4)

Hymedesmiidae

Hymedesmia Bowerbank, 1864

Hymedesmia baculifera (Topsent, 1901) (3)

Hymedesmia castanea Sarà, 1964 (3)

Hymedesmia consanguinea Lundbeck, 1910 (4)
Hymedesmia gracilisigma Topsent, 1928 (3)
Hymedesmia mollis Lundbeck, 1910 (4)
Hymedesmia pansa Bowerbank, 1882 (3, 5)
Hymedesmia peachi Bowerbank, 1882 (3, 4, 5)
Hymedesmia rissoi (Topsent, 1936) (3)
Hymedesmia versicolor (Topsent, 1893) (3, 4)

Hymetrichita Topsent, 1928

Hymetrichita rectiraphis Pulitzer-Finali, 1983 (3)

Leptolabis Topsent, 1904

Leptolabis luciensis (Topsent, 1888) (3)

Spanioplion Topsent, 1890

Spanioplion armaturum (Bowerbank, 1866) (3)

Stylopus Fristedt, 1885

Stylopus dujardini (Bowerbank, 1866) (3, 5)
Stylopus nigrescens Topsent, 1925 (3, 5)
Stylopus pulposus (Topsent, 1925) (3)

Anchinoidea

Anchinoe Gray, 1867

Anchinoe coriaceus (Fristedt, 1885) (3)
Anchinoe fictitius (Bowerbank, 1866) (3, 4, 5)
Anchinoe mercator (Schmidt, 1868) (3, 4, 5)
Anchinoe paupertas (Bowerbank, 1866) (3, 5)
Anchinoe tenacior Topsent, 1925 (3, 5)

Hamigera Gray, 1867

Hamigera hamigera (Schmidt, 1862) (3, 4, 5)

Stylostichon Topsent, 1892

Stylostichon dives (Topsent, 1891) (3, 5)
Stylostichon fibulatum Topsent, 1893 (3)
Stylostichon lieberkuehni (Burton, 1930) (3)
Stylostichon plumosum (Montagu, 1818) (3, 4)

Microcionidae

Acanthacarnus Lévi, 1952

Acanthacarnus souriei Lévi, 1952 (3)

Acarnus Gray, 1867

Acarnus polytylus Pulitzer-Finali, 1983 (5)

Acarnus tortilis Topsent, 1892 (3, 5)

Antho Gray, 1867

Antho involvens (Schmidt, 1864)

Antho involvens involvens (Schmidt, 1864) (3, 4, 5)

Antho involvens inconstans Topsent, 1925 (3)

Antho paradoxa Babic, 1922 (4)

Antho paucispina Sarà & Siribelli, 1962 (3)

Clathria Schmidt, 1862

Clathria compressa Schmidt, 1862 (3, 4)

Clathria coralloides (Olivi, 1792) (3, 4, 5)

Clathria depressa Sarà & Melone, 1966 (3)

Clathria marissuperi Pulitzer-Finali, 1983 (4)

Clathria pluralityla Pulitzer-Finali, 1983 (3)

Clathria toxistricta Topsent, 1925 (3)

Clathria toxistyla (Sarà, 1959) (3, 4, 5)

Clathria toxivaria (Sarà, 1959) (3, 4, 5)

Microciona Bowerbank, 1862

Microciona angularis Sarà & Siribelli, 1960 (3)

Microciona armata Bowerbank, 1866 (4, 5)

Microciona assimilis Topsent, 1925 (3, 4)

Microciona atrasanguinea Bowerbank, 1862 (3)

Microciona chelifera Lévi, 1960 (5)

Microciona cleistochela (Topsent, 1925) (3)

Microciona duplex (Sarà, 1958) (3, 5)

Microciona gradalis (Topsent, 1925) (3)

Microciona levii Sarà & Siribelli, 1960 (3)

Microciona poecilosclera Sarà & Siribelli, 1960 (3)

Microciona strepsitoxa Hope, 1889 (3, 5)

Microciona toximajor (Topsent, 1925) (3)

Microciona toxirecta Sarà & Siribelli, 1960 (3)

Microciona toxitenuis (Topsent, 1925) (3, 4, 5)

Ophlitaspongia Bowerbank, 1866

Ophlitaspongia seriata (Grant, 1826) (4)

Ophlitaspongia translata Pulitzer-Finali, 1978 (4)

Plocamilla Topsent, 1928

Plocamilla circonflexa Lévi, 1960 (3)

Plocamilla coriacea (Bowerbank, 1874) (3)

Rhaphidophlus Ehlers, 1870

Rhaphidophlus jolicoeuri Topsent, 1892 (3)

Haplosclerida

Haliclonidae

Dendroxea Griessinger, 1971

Dendroxea lenis (Topsent, 1892) (3)

Gellius Gray, 1867

Gellius angulatus (Bowerbank, 1866) (3, 4, 5)

Gellius apertus Sarà, 1960 (3)

Gellius cucurbitiformis Kirkpatrick, 1907 (4)

Gellius dubius Babic, 1922 (4)

Gellius fibulatus (Schmidt, 1862) (3, 4, 5)

Gellius flagellifer Ridley & Dendy, 1886 (3, 4)

Gellius marismedi Pulitzer-Finali, 1978 (3)

Gellius microsigma Babic, 1922 (3, 4)

Gellius microxifer Topsent, 1925 (3)

Gellius ravus Stephens, 1912 (3)

Gellius tenuisigma Sarà & Siribelli, 1960 (3)

Haliclona Grant, 1835

Haliclona citrina (Topsent, 1892) (3)

Haliclona elegans (Bowerbank, 1866) (3, 4, 5)

Haliclona fertilis (Keller, 1879) (3, 4)

Haliclona limbata (Montagu, 1818) (3, 4)

Haliclona mediterranea Griessinger, 1971 (3, 4, 5)

Haliclona renieroides (Schmidt, 1868) (3)

Haliclona stirpescens Topsent, 1925 (5)

Haliclona subtilis Griessinger, 1971 (4, 5)

Reniera Nardo, 1833

- Reniera alba* Schmidt, 1862 (4)
- Reniera aquaeductus* Schmidt, 1862 (4)
- Reniera arenata* Griessinger, 1971 (4)
- Reniera crassa* (Topsent, 1925) (3)
- Reniera cratera* Schmidt, 1862 (3, 4, 5)
- Reniera fulva* Topsent, 1893 (3, 4, 5)
- Reniera grossa* Schmidt, 1864 (3, 4)
- Reniera implexa* Schmidt, 1868 (3, 4)
- Reniera mamillata* Griessinger, 1971 (4, 5)
- Reniera mucosa* Griessinger, 1971 (3, 4)
- Reniera perlucida* Griessinger, 1971 (5)
- Reniera plana* Topsent, 1892 (3)
- Reniera pocilliformis* Griessinger, 1971 (3)
- Reniera poecillastroides* Vacelet, 1969 (3)
- Reniera sarai* Pulitzer-Finali, 1969 (3, 4, 5)
- Reniera valliculata* Griessinger, 1971 (3, 5)
- Reniera viscosa* Topsent, 1888 (3)

Adociidae

Adocia Gray, 1867

- Adocia cribrata* Pulitzer-Finali, 1983 (3)
- Adocia palmata* (Schmidt, 1862) (3, 4)
- Adocia reptans* Griessinger, 1971 (3)
- Adocia simulans* (Johnston, 1842) (3, 4)
- Adocia varia* Sarà, 1958 (3, 4)
- Adocia venata* Sarà, 1960 (3)

Niphatidae

Amphimedon Duchassaing & Michelotti, 1864

- Amphimedon rustica* (Schmidt, 1868) (3)

Oceanapiidae

Calyx Vosmaer, 1883

- Calyx nicaeensis* (Risso, 1826) (3, 4, 5)

Oceanapia Norman, 1869

- Oceanapia constructa* (Rützler, 1965) (4)
- Oceanapia decipiens* (Sarà, 1958) (3, 4, 5)
- Oceanapia isodictyiiformis* (Carter, 1882) (3)
- Oceanapia perforata* (Sarà, 1960) (3)
- Oceanapia vacua* (Sarà, 1961) (4)

Pachypellina Burton, 1934

- Pachypellina parietalis* (Topsent, 1893) (3, 4)

Pellina Schmidt, 1870

- Pellina semitubulosa* (Lieberkühn, 1859) (3, 4, 5)

Haplosclerida i.s.

Dendrectilla Pulitzer-Finali, 1983

- Dendrectilla tremitensis* Pulitzer-Finali, 1983 (4)

Callyspongiidae

Siphonochalina Schmidt, 1868

- Siphonochalina balearica* Ferrer-Hernandez, 1916 (5)
- Siphonochalina coriacea* Schmidt, 1868 (3, 5)
- Siphonochalina expansa* Sarà, 1960 (3)
- Siphonochalina subcornea* Griessinger, 1971 (3)

Spongillidae

Spongilla Lamarck, 1816

- Spongilla alba* Carter, 1849 (N)
- Spongilla fragilis* Leidy, 1851 (N)
- Spongilla lacustris* (Linné, 1758) (N, S, Sa)

Ephydatia Lamouroux, 1816

- Ephydatia fluviatilis* (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)
- Ephydatia muelleri* (Lieberkühn, 1855) (N, S, Sa)

Trochospongilla Vejdovsky, 1883

Trochospongilla horrida Weltner, 1893 (N)

Heteromeyen*ia* Potts, 1881

*Heteromeyen**ia* *stepanowii* (Dybowsky, 1884) (N)

Petrosiida

Petrosiidae

Petrosia Vosmaer, 1885

Petrosia clavata (Esper, 1794) (3)

Petrosia ficiformis (Poiret, 1789) (3, 4, 5)

Dictyoceratida

Spongiidae

Hippospongia Schulze, 1879

Hippospongia communis (Lamarck, 1813) (3, 4, 5)

Spongia Linné, 1759

Spongia agaricina Pallas, 1766 (3, 4, 5)

Spongia nitens (Schmidt, 1862) (3, 4, 5)

Spongia officinalis Linné, 1759

Spongia officinalis officinalis Linné, 1759 (3, 4, 5)

Spongia officinalis adriatica (Schmidt, 1862) (3, 4)

Spongia virgultosa (Schmidt, 1868) (3, 4, 5)

Spongia zimocca Schmidt, 1862 (3, 4)

Thorectidae

Cacospongia Schmidt, 1862

Cacospongia mollior Schmidt, 1862 (3, 4)

Cacospongia proficiens Pulitzer-Finali & Pronzato, 1980 (4)

Cacospongia scalaris Schmidt, 1862 (3, 4)

Fasciospongia Burton, 1934

Fasciospongia cavernosa (Schmidt, 1862) (3, 4, 5)

Hyrtios Duchassaing & Michelotti, 1864

Hyrtios collectrix (Schulze, 1879) (3)

Ircinia Nardo, 1833

Ircinia dendroides (Schmidt, 1862) (3, 4, 5)

Ircinia foetida (Schmidt, 1862) (3, 4, 5)

Ircinia oros (Schmidt, 1864) (3, 4, 5)

Ircinia pipetta (Schmidt, 1868) (3)

Ircinia retidermata Pulitzer-Finali & Pronzato, 1980 (3)

Ircinia spinosula (Schmidt, 1862) (3, 4, 5)

Ircinia variabilis (Schmidt, 1862) (3, 4, 5)

Dysideidae

Dysidea Johnston, 1842

Dysidea avara (Schmidt, 1862)

Dysidea avara avara (Schmidt, 1862) (3, 4, 5)

Dysidea avara pallescens (Schmidt, 1862) (3, 4)

Dysidea fragilis (Montagu, 1818) (3, 4)

Dysidea incrustans (Schmidt, 1862) (3, 4, 5)

Dysidea perfistulata Pulitzer-Finali & Pronzato, 1980 (4)

Dysidea tupha (Martens, 1824) (3, 4)

Psammopemma Marshall, 1881

Psammopemma nicaeense Pulitzer-Finali & Pronzato, 1980 (3)

Spongionella Bowerbank, 1862

Spongionella gracilis (Vosmaer, 1883) (3)

Spongionella pulchella (Sowerby, 1806) (3, 5)

Dendroceratida

Aplysillidae

Aplysilla Schulze, 1878

Aplysilla rosea (Barrois, 1876) (3, 4, 5)

Chelonaplysilla de Laubenfels, 1948

Chelonaplysilla noevus (Carter, 1876) (3, 4)

Darwinella F. Müller, 1865

Darwinella australiensis Carter, 1885 (3)

Darwinella dalmatica Topsent, 1905 (4)

Darwinella gardineri Topsent, 1905 (3)

Hexadella Topsent, 1896

Hexadella detritifera Topsent, 1913 (3)

Hexadella racovitzai Topsent, 1896 (3, 5)

Pleraplysilla Topsent, 1905

Pleraplysilla minchini Topsent, 1905 (3)

Pleraplysilla spinifera (Schulze, 1878) (3, 4)

Halisarcidae

Halisarca Dujardin, 1838

Halisarca dujardini Johnston, 1842 (3, 4)

Halisarca sputum Topsent, 1893 (4)

Verongida

Aplysinidae

Aplysina Nardo, 1834

Aplysina aerophoba Schmidt, 1862 (3, 4, 5)

Aplysina cavernicola Vacelet, 1959 (3, 4, 5)

Cnidaria

Scyphozoa

Stauromedusae

Eleutherocarpidae

Haliclystus Clark, 1863

Haliclystus salpinx Clark, 1863 (4) (*)

Lucernariopsis Uchida, 1929

Lucernariopsis campanulata (Lamouroux, 1815) (4)

Lipkea Vogt, 1886

Lipkea strudzi (Antipa, 1893) (3)

Stylocoronella Salvini-Plawen, 1966

Stylocoronella riedlii Salvini-Plawen, 1966 (3)

Note

Haliclystus salpinx: Segnalazione dubbia.

Coronatae

Nausithoidae

Nausithoe Kölliker, 1853

Nausithoe planulophora (Werner, 1974) (3)

Nausithoe punctata Kölliker, 1853 (3, 4, 5)

Paraphyllinidae

Paraphyllina Maas, 1913

Paraphyllina intermedia Maas, 1913 (3, 4, 5)

Periphyllidae

Periphylla Haeckel, 1880

Periphylla periphylla (Péron & Lesueur, 1809) (3)

Semaeostomeae

Pelagiidae

Chrysaora Péron & Lesueur, 1809

Chrysaora hysoscella (Linnaeus, 1766) (3, 4, 5)

Pelagia Péron & Lesueur, 1809

Pelagia noctiluca (Forsskål, 1775) (3, 4, 5)

Cyaneidae

Drymonema Haeckel, 1880

Drymonema dalmatinum Haeckel, 1880 (4) (*)

Note

Drymonema dalmatinum: Specie atlantica, occasionale in Mediterraneo.

Ulmaridae

Aurelia Lamarck, 1816

Aurelia aurita (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Discomedusa Claus, 1877

Discomedusa lobata Claus, 1877 (3)

Rhizostomeae

Cepheidae

Cotylorhiza Agassiz, 1862

Cotylorhiza tuberculata (Macri, 1778) (3, 4, 5)

Rhizostomatidae

Rhizostoma Cuvier, 1800

Rhizostoma pulmo (Macri, 1778) (3, 4, 5)

Tetraplatiidae

Tetraplatia Busch, 1851

Tetraplatia volitans Busch, 1851 (3, 5)

Cubozoa

Carybdeida

Carybdeidae

Carybdea Péron & Lesueur, 1809

Carybdea marsupialis (Linnaeus, 1758) (3, 4)

Hydrozoa

Cystonectae

Physaliidae

Physalia Linnaeus, 1758

Physalia physalis Linnaeus, 1758 (3, 4, 5)

Rhizophysidae

Rhizophysa Péron & Lesueur, 1807

Rhizophysa filiformis (Forsskål, 1775) (3)

Physonectae

Apolemiidae

Apolemia Eschscholtz, 1829

Apolemia uvaria (Lesueur, 1811) (3, 5)

Agalmidae

Halistemma Huxley, 1859

Halistemma rubrum (Vogt, 1852) (3, 4)

Nanomia Agassiz, 1865

Nanomia bijuga (Delle Chiaje, 1841) (3, 4)

Agalma Eschscholtz, 1825

Agalma elegans (M. Sars, 1846) (3)

Agalma okeni Eschscholtz, 1825 (3)

Physophoridae

Physophora Forsskål, 1775

Physophora hydrostatica Forsskål, 1775 (3)

Forskaliidae

Forskalia Kölliker, 1853

Forskalia contorta Milne-Edwards, 1841 (3, 4, 5)

Forskalia edwardsi Kölliker, 1853 (3)

Forskalia formosa Keferstein & Ehlers, 1860 (3, 4, 5)

Calycophorae

Prayidae

Rosacea Bigelow, 1911

Rosacea cymbiformis (Delle Chiaje, 1822) (3, 4, 5)

Rosacea plicata Bigelow, 1911 (3)

Lilyopsis Chun, 1885

Lilyopsis rosea Chun, 1885 (3)

Desmophyes Haeckel, 1888

Desmophyes annectens Haeckel, 1888 (3)

Prayola Carré, 1969

Prayola tottoni Carré, 1969 (3)

Hippopodiidae

Hippopodius Quoy & Gaimard, 1827

Hippopodius hippopus Forsskål, 1776 (3, 4, 5)

Vogtia Kölliker, 1853

Vogtia glabra Bigelow, 1918 (3, 5)

Vogtia pentacantha Kölliker, 1853 (3, 5)

Vogtia serrata Moser, 1925 (3)

Vogtia spinosa Keferstein & Ehlers, 1861 (3, 5)

Diphyidae

Sulculeolaria Blainville, 1834

Sulculeolaria biloba M. Sars, 1846 (3, 4, 5)

Sulculeolaria chuni (Lens & van Riemsdijk, 1908) (3, 4, 5)

Sulculeolaria quadrivalvis Blainville, 1834 (3, 4, 5)

Sulculeolaria turgida (Gegenbaur, 1853) (3, 4, 5)

Lensia Totton, 1932

Lensia campanella (Moser, 1925) (3, 4, 5)

Lensia conoidea (Keferstein & Ehlers, 1860) (3, 5)

Lensia fowleri (Bigelow, 1911) (3, 4, 5)

Lensia meteori (Leloup, 1934) (3, 4, 5)

Lensia multicristata (Moser, 1925) (3, 5)

Lensia subtilis (Chun, 1886) (3, 4, 5)

Lensia subtiloides (Lens & van Riemsdijk, 1908) (3, 5)

Chelophyes Totton, 1932

Chelophyes appendiculata (Eschscholtz, 1829) (3, 4, 5)

Muggiaea Busch, 1851

Muggiaea atlantica Cunningham, 1892 (3, 5)

Muggiaea kochi (Will, 1844) (3, 4, 5)

Diphyes Cuvier, 1817

Diphyes dispar Chamisso & Eysenhardt, 1821 (3, 5)

Eudoxoides Huxley, 1859

Eudoxoides spiralis (Bigelow, 1911) (3, 4, 5)

Sphaeronectidae

Sphaeronectes Huxley, 1859

Sphaeronectes fragilis Carré, 1968 (4)

Sphaeronectes gamulini Carré, 1966 (3, 4)

Sphaeronectes gracilis (Claus, 1873) (3, 4, 5)

Sphaeronectes irregularis (Claus, 1873) (3, 4, 5)

Abylidae

Abylopsis Chun, 1888

Abylopsis eschscholtzi (Huxley, 1859) (3, 4, 5)

Abylopsis tetragona (Otto, 1823) (4, 5)

Bassia Agassiz, 1862

Bassia bassensis (Quoy & Gaimard, 1834) (3, 5)

Enneagonum Quoy & Gaimard, 1827

Enneagonum hyalinum Quoy & Gaimard, 1827 (3)

Anthomedusae

Bougainvilliidae

Bimeria Wright, 1859

Bimeria vestita Wright, 1859 (3, 4, 5)

Bougainvillia Lesson, 1836

Bougainvillia maniculata Haeckel, 1864 (3)

Bougainvillia ramosa (van Beneden, 1844) (3, 4, 5)

Clavopsella Stechow, 1919

Clavopsella michaeli (Berrill, 1948) (3) (*)

Dicoryne Allman, 1859

Dicoryne confena (Alder, 1857) (3, 4, 5)

Dicoryne conybeari Allman, 1864 (3, 4, 5)

Garveia Wright, 1859

Garveia franciscana (Torrey, 1902) (5) (*)

Garveia grisea Motz-Kossowska, 1905 (3)

Garveia nutans (Wright, 1859) (4)

Koellikerina Kramp, 1939

Koellikerina fasciculata (Péron & Lesueur, 1810) (3, 4, 5)

Lizzia Forbes, 1846

Lizzia blondina Forbes, 1848 (3, 4)

Lizzia fulgurans (A. Agassiz, 1865) (3)

Lizzia octostyla (Haeckel, 1879) (3)

Pachycordyle Weissmann, 1883

Pachycordyle napolitana Weismann, 1883 (3)

Rhizorhagium M. Sars, 1874

Rhizorhagium arenosum (Alder, 1862) (3)

Thamnostoma Haeckel, 1879

Thamnostoma dibalium (Busch, 1851) (4)

Note

Clavopsella michaeli: Segnalata solo per il Golfo di Napoli.

Garveia franciscana: Segnalata solo per la Laguna di Venezia.

Cytaeidae

Cytaeis Eschscholtz, 1829

Cytaeis pusilla Gegenbaur, 1857 (4)

Cytaeis tetrastyla Eschscholtz, 1829 (3, 4, 5)

Perarella Stechow, 1922

Perarella propagulata Bavestrello, 1987 (3)

Perarella schneideri (Motz-Kossowska, 1905) (3)

Clavidae

Clava Gmelin, 1791

Clava multicornis Forsskål, 1775 (3, 4, 5)

Cordylophora Allman, 1844

Cordylophora caspia (Pallas, 1771) (3, 4, 5) (*)

Cordylophora pusilla Motz-Kossowska, 1905 (3, 5)

Corydendrium van Beneden, 1844

Corydendrium parasiticum (Linnaeus, 1767) (3)

Oceania Kölliker, 1853

Oceania armata Kölliker, 1853 (3, 4, 5)

Turritopsis McCrady, 1856

Turritopsis nutricula McCrady, 1859 (3, 4, 5)

Note

Cordylophora caspia: Presente in lagune e stagni costieri.

Eudendriidae

Eudendrium Ehrenberg, 1834

Eudendrium armatum Tichomiroff, 1887 (3, 5)
Eudendrium calceolatum Motz-Kossowska, 1905 (3)
Eudendrium capillare Alder, 1856 (3, 4, 5)
Eudendrium carneum Clarke, 1882 (3)
Eudendrium cunninghami Kirkpatrick, 1910 (3)
Eudendrium fragile Motz-Kossowska, 1905 (3, 5)
Eudendrium glomeratum Picard, 1952 (3, 5)
Eudendrium merulum Watson, 1985 (3)
Eudendrium motzkossowskiae Picard, 1952 (3, 5)
Eudendrium racemosum (Gmelin, 1791) (3, 4, 5)
Eudendrium rameum (Pallas, 1766) (3, 4, 5)
Eudendrium ramosum (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Hydractiniidae

Hydractinia Van Beneden, 1841

Hydractinia aculeata (Wagner, 1833) (3, 4, 5)
Hydractinia echinata Fleming, 1828 (3)
Hydractinia fucicola (M. Sars, 1857) (3)
Hydractinia ornata Bonnevie, 1899 (3)

Hydractomma Stechow, 1921

Hydractomma pruvoti (Motz-Kossowska, 1905) (3)

Podocoryne M. Sars, 1846

Podocoryne areolata (Alder, 1862) (3, 4)
Podocoryne borealis (Mayer, 1900) (4)
Podocoryne carnea M. Sars, 1846 (3, 4, 5)
Podocoryne exigua (Haeckel, 1879) (4)
Podocoryne hartlaubi Neppi & Stiasny, 1911 (3, 4)
Podocoryne minima (Trinci, 1903) (3, 4)
Podocoryne minuta (Mayer, 1900) (3, 4)

Stylactaria Stechow, 1921

Stylactaria inermis (Allman, 1872) (3, 4, 5)

Tregoubovia Picard, 1958

Tregoubovia atentaculata Picard, 1958 (3)

Ptilocodiidae

Thecocodium Bouillon, 1967

Thecocodium brieni Bouillon, 1967 (3)

Rhysiidae

Rhysia Brinckmann, 1965

Rhysia autumnalis Brinckmann, 1965 (3)

Stylasteridae

Erenna Gray, 1835

Erenna aspera (Linnaeus, 1767) (5) (*)

Note

Erenna aspera: Segnalata per lo Stretto di Messina.

Calycopsidae

Bythotiara Günther, 1903

Bythotiara murrayi Günther, 1903 (3, 4, 5)

Calycopsis Fewkes, 1882

Calycopsis simplex Kramp & Damas, 1925 (3)

Niobiidae

Niobia Mayer, 1900

Niobia dendrotentaculata Mayer, 1900 (3)

Pandeidae

Amphinema Haeckel, 1879

Amphinema dinema (Péron & Lesueur, 1810) (3, 4, 5)

Amphinema rubrum (Kramp, 1957) (3)

Amphinema rugosum (Mayer, 1900) (3, 5)

Amphinema turrida (Mayer, 1900) (3)

Leuckartiara Hartlaub, 1913

Leuckartiara nobilis Hartlaub, 1913 (3)

Leuckartiara octona (Fleming, 1823) (3, 4, 5)

Merga Hartlaub, 1913

Merga galleri Brinckmann, 1962 (3)

Merga tergestina (Neppi & Stiasny, 1912) (3, 4)

Merga tregoubovi Picard, 1960 (3)

Merga violacea (Agassiz & Mayer, 1899) (3, 5)

Neoturris Hartlaub, 1913

Neoturris pileata (Forsskål, 1775) (3, 4)

Octotiara Kramp, 1953

Octotiara violacea Kramp, 1959 (3)

Pandea Lesson, 1843

Pandea conica (Quoy & Gaimard, 1827) (3, 5)

Protiaridae

Halitiara Fewkes, 1882

Halitiara formosa Fewkes, 1882 (3)

Protiara Haeckel, 1879

Protiara tetranema (Péron & Lesueur, 1810) (3)

Rathkeidae

Rathkea Brandt, 1838

Rathkea octopunctata (M. Sars, 1835) (3, 4, 5)

Acaulidae

Acauloides Bouillon, 1965

Acauloides ilonae (Brinckmann-Voss, 1966) (3)

Cladonematidae

Cladonema Dujardin, 1843

Cladonema radiatum Dujardin, 1843 (3, 4, 5)

Corynidae

Coryne Gaertner, 1774

Coryne caespes Allman, 1871 (3)

Coryne epizoica Stechow, 1921 (3, 4)

Coryne fucicola De Filippi, 1866 (3)

Coryne muscoides (Linnaeus, 1761) (3)

Coryne pintneri Schneider, 1897 (3, 4)

Coryne pusilla Gaertner, 1774 (3, 4, 5)

Dicodonium Haeckel, 1879

Dicodonium adriaticum Graeffe, 1884 (3, 4)

Dicodonium ocellatum (Busch, 1851) (3, 4)

Dipurena McCrady, 1857

Dipurena dolichogaster (Haeckel, 1864) (3)

Dipurena halterata (Forbes, 1846) (3, 4, 5)

Dipurena ophiogaster (Haeckel, 1879) (3)

Dipurena reesi Vannucci, 1956 (3)

Sarsia Lesson, 1843

Sarsia eximia (Allman, 1859) (3, 4)

Sarsia gemmifera Forbes, 1848 (3, 4)

Sarsia producta (Wright, 1858) (3, 4, 5)

Sarsia prolifera Forbes, 1848 (3)

Eleutheriidae

Eleutheria Quatrefages, 1842

Eleutheria claparedei Hartlaub, 1889 (3)

Eleutheria dichotoma Quatrefages, 1842 (3, 4, 5)

Staurocladia Hartlaub, 1917

Staurocladia portmanni Brinckmann, 1964 (3)

Hydridae

Hydra Linnaeus, 1758

Hydra attenuata Pallas, 1766 (N?, S?)

Hydra oligactis (Pallas, 1766) (N?, S?)

Hydra viridissima (Pallas, 1766) (N?, S?)

Hydra vulgaris Pallas, 1766 (N?, S?)

Moerisiidae

Moerisia Boulenger, 1908

Moerisia inkermanica Paltschikowa-Ostroumova, 1925 (3)

Odessia Paspaleff, 1937

Odessia maeotica (Ostroumoff, 1896) (3, 4)

Tricyclusidae

Tricyclusa Stechow, 1919

Tricyclusa singularis (Schultze, 1876) (4)

Boreohydridae

Psammohydra Schulz, 1950

Psammohydra nana Schulz, 1950 (4)

Corymorphidae

Branchiocerianthus Mark, 1898

Branchiocerianthus italicus Stechow, 1923 (3) (*)

Corymorpha M. Sars, 1835

Corymorpha nutans M. Sars, 1835 (3, 4)

Eucodonium Hartlaub, 1907

Eucodonium brownei Hartlaub, 1907 (3, 4)

Paragotoea Kramp, 1942

Paragotoea bathybia Kramp, 1942 (3)

Vannuccia Brinckmann-Voss, 1967

Vannuccia forbesii (Mayer, 1894) (3)

Note

Branchiocerianthus italicus: Segnalata solo per il Golfo di Napoli.

Euphysidae

Euphysa Forbes, 1848

Euphysa aurata Forbes, 1848 (3, 4)

Siphonohydra Salvini-Plawen, 1966

Siphonohydra adriatica Salvini-Plawen, 1966 (4)

Halocordylidae

Halocordyle Allman, 1872

Halocordyle disticha (Goldfuss, 1820) (3, 4, 5)

Paracorynidae

Paracoryne Picard, 1957

Paracoryne huvei Picard, 1957 (3)

Tubulariidae

Ectopleura Agassiz, 1862

Ectopleura dumortieri (Van Beneden, 1844) (3, 4)

Ectopleura minerva Mayer, 1900 (3)

Ectopleura sacculifera Kramp, 1957 (3)

Ectopleura wrighti Petersen, 1979 (3, 4, 5)

Eugotoea Margulis, 1989

Eugotoea petalina Margulis, 1989 (5)

Rhabdoon Keferstein & Ehlers, 1861

Rhabdoon singularis Keferstein & Ehlers, 1861 (3, 4, 5)

Tubularia Linnaeus, 1758

Tubularia crocea Agassiz, 1862 (3, 4)

Tubularia indivisa Linnaeus, 1758 (4)

Tubularia larynx Ellis, 1755 (3)

Porpitidae

Porpita Lamarck, 1801

Porpita porpita (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Velella Lamarck, 1801

Velella velella (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Cladocorynidae

Cladocoryne Rotch, 1871

Cladocoryne floccosa Rotch, 1871 (3, 4, 5)

Halocorynidae

Halocoryne Hadzi, 1917

Halocoryne epizoica Hadzi, 1917 (3, 4, 5)

Rosalindidae

Rosalinda Totton, 1949

Rosalinda incrustans Totton, 1949 (3)

Zancleidae

Zanclea Gegenbaur, 1856

Zanclea costata Gegenbaur, 1857 (3, 4, 5)

Zanclea sessilis (Gosse, 1853) (3, 4, 5)

Leptomedusae

Aequoreidae

Aequorea Péron & Lesueur, 1810

Aequorea forskalea Péron & Lesueur, 1810 (3, 4, 5)

Zygocanna Haeckel, 1879

Zygocanna sp. Babnik, 1948 (4)

Campanulinidae

Calycella Hincks, 1861

Calycella syringa (Linnaeus, 1767) (3)

Campanulina van Beneden, 1847

Campanulina hincksii Hartlaub, 1897 (3)

Lafoeina M. Sars, 1874

Lafoeina tenuis M. Sars, 1874 (3)

Malagazziidae

Octophialucium Kramp, 1955

Octophialucium funerarium (Quoy & Gaimard, 1827) (3, 4)

Phialellidae

Phialella Browne, 1902

Phialella quadrata (Forbes, 1848) (3, 4, 5)

Melicertidae

Orchistomella Kramp, 1959

Orchistomella graeffei (Neppi & Stiasny, 1911) (3, 4)

Orchistomidae

Orchistoma Haeckel, 1879

Orchistoma agariciforme Keller, 1884 (3)

Eirenidae

Eirene Eschscholtz, 1829

Eirene viridula (Péron & Lesueur, 1810) (3, 4, 5)

Eugymnanthea Palombi, 1935

Eugymnanthea inquilina Palombi, 1935 (3, 4, 5)

Eutima McCrady, 1857

Eutima gegenbauri (Haeckel, 1864) (3, 4)

Eutima gracilis (Forbes & Goodsir, 1853) (3, 4)

Eutonina Hartlaub, 1897

Eutonina scintillans (Bigelow, 1909) (4)

Helgicirrha Hartlaub, 1909

Helgicirrha cari (Haeckel, 1864) (3)

Helgicirrha schulzei Hartlaub, 1909 (3, 4)

Neotima Petersen, 1962

Neotima lucullana (Delle Chiaje, 1822) (3, 4)

Laodiceidae

Krampella Russell, 1957

Krampella dubia Russell, 1957 (3, 4)

Laodicea Lesson, 1843

Laodicea bigelowi Neppi & Stiasny, 1912 (4)

Laodicea neptuna Mayer, 1900 (3)

Laodicea ocellata Babnik, 1948 (4)

Laodicea undulata (Forbes & Goodsir, 1851) (3, 4, 5)

Meliceritissa Haeckel, 1879

Meliceritissa adriatica Neppi, 1915 (4)

Tiarannidae

Modeeria Forbes, 1848

Modeeria rotunda (Quoy & Gaimard, 1827) (3, 4, 5)

Tiaropsiidae

Octogonade Zoja, 1896

Octogonade mediterranea Zoja, 1896 (4)

Tiaropsidium Torrey, 1909

Tiaropsidium mediterraneum (Metshnikoff, 1886) (5)

Cirrhloveniidae

Cirrholovenia Kramp, 1959

Cirrholovenia tetranema Kramp, 1959 (3)

Eucheilotidae

Eucheilota McCrady, 1857

Eucheilota maasi Neppi & Stiasny, 1911 (4)

Eucheilota paradoxa Mayer, 1900 (3)

Lovenellidae

Lovenella Hincks, 1868

Lovenella cirrata (Haeckel, 1879) (3, 4, 5)

Mitrocomidae

Mitrocoma Haeckel, 1864

Mitrocoma annae Haeckel, 1864 (3, 4, 5)

Mitrocomella Haeckel, 1879

Mitrocomella brownei (Kramp, 1930) (3)

Hebellidae

Hebella Allman, 1888

Hebella brochii (Hadzi, 1913) (3, 4, 5)

Hebella parasitica (Ciamician, 1880) (3, 4, 5)

Hebella scandens (Bale, 1888) (3, 4, 5)

Scandia Fraser, 1912

Scandia gigas (Pieper, 1884) (3, 4, 5)

Lafoeidae

Acryptolaria Norman, 1875

Acryptolaria confena (Allman, 1877) (3)

Filellum Hincks, 1868

Filellum serpens (Hassall, 1848) (3, 4, 5)

Filellum serratum (Clarke, 1879) (3)

Lafoea Lamouroux, 1821

Lafoea dumosa (Fleming, 1820) (3, 4)

Haleciidae

Campalecium Torrey, 1902

Campalecium medusiferum Torrey, 1902 (3, 4, 5) (*)

Halecium Oken, 1815

- Halecium beani* (Johnston, 1838) (3, 4)
- Halecium conicum* Stechow, 1919 (3)
- Halecium halecinum* (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)
- Halecium labrosum* Alder, 1859 (3, 4, 5)
- Halecium lankesteri* (Bourne, 1890) (3)
- Halecium mediterraneum* Weismann, 1883 (3, 4, 5)
- Halecium muricatum* (Ellis & Solander, 1786) (3)
- Halecium nanum* Alder, 1859 (3, 4, 5)
- Halecium petrosum* Stechow, 1919 (3)
- Halecium pusillum* (M. Sars, 1857) (3, 4, 5)
- Halecium sessile* Norman, 1867 (3)
- Halecium tenellum* Hincks, 1861 (3)

Hydranthea Hincks, 1868

- Hydranthea aloysii* (Zoja, 1893) (3, 4)
- Hydranthea margarica* (Hincks, 1863) (3, 4, 5)

Ophiodissa Stechow, 1919

Ophiodissa mirabilis (Hincks, 1868) (3, 5)

Note

Campalecium medusiferum: Recentemente attribuita al genere *Mitrocomium* Haeckel, 1879.

Aglaopheniidae

Aglaophenia Lamouroux, 1812

- Aglaophenia acacia* Allman, 1883 (3, 5)
- Aglaophenia elongata* Meneghini, 1845 (3, 4, 5)
- Aglaophenia harpago* Von Schenk, 1963 (3, 4, 5)
- Aglaophenia kirchenpaueri* (Heller, 1868) (3, 4, 5)

Aglaophenia lophocarpa Allman, 1877 (3, 5)
Aglaophenia picardi Svoboda, 1979 (3, 4, 5)
Aglaophenia octodonta (Heller, 1868) (3, 4, 5)
Aglaophenia tubiformis (Marktanner-Turneretscher, 1890) (3, 4, 5)

Thecocarpus Nutting, 1900

Thecocarpus distans (Allman, 1877) (3)
Thecocarpus myriophyllum (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Halopteriidae

Antennella Allman, 1877

Antennella secundaria (Gmelin, 1791) (3, 4, 5)
Antennella siliquosa (Hincks, 1877) (3, 4)

Halopteris Allmann, 1877

Halopteris catharina (Johnston, 1833) (3)
Halopteris diaphana (Heller, 1868) (3, 4, 5)
Halopteris liechtensterni (Marktanner, 1890) (3)

Schizotricha Allman, 1883

Schizotricha frutescens (Ellis & Solander, 1786) (4)

Kirchenpaueriidae

Kirchenpaueria Jickeli, 1883

Kirchenpaueria echinulata (Hincks, 1868) (3, 4)
Kirchenpaueria pinnata (Linnaeus, 1758) (3, 4)

Ventromma Stechow, 1923

Ventromma halecioides (Alder, 1859) (3, 4, 5)

Plumulariidae

Nemertesia Lamouroux, 1812

Nemertesia antennina (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)
Nemertesia ramosa Lamouroux, 1816 (3, 4, 5)
Nemertesia tetrasticha (Meneghini, 1845) (3, 4)

Plumularia Lamarck, 1815

Plumularia obliqua (Thompson, 1844) (3, 4, 5)

Plumularia setacea (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Sertulariidae

Dynamena Lamouroux, 1812

Dynamena disticha (Bosc, 1802) (3, 4, 5)

Salacia Lamouroux, 1816

Salacia desmoides (Torrey, 1902) (3)

Sertularella Gray, 1847

Sertularella crassicaulis (Heller, 1868) (3, 4, 5)

Sertularella fusiformis (Hincks, 1861) (3)

Sertularella gaudichaudi (Lamouroux, 1824) (3, 4, 5)

Sertularella gayi (Lamouroux, 1821) (3)

Sertularella picta (Meyen, 1834) (3)

Sertularella polyzonias (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Sertularia Linnaeus, 1758

Sertularia distans Lamouroux, 1816 (3)

Sertularia perpusilla Stechow, 1919 (3, 4, 5)

Syntheeciidae

Synthecium Allman, 1872

Synthecium evansi (Ellis & Solander, 1786) (3, 4, 5)

Campanulariidae

Campanularia Lamarck, 1816

Campanularia hincksi Alder, 1856 (3, 4, 5)

Clytia Lamouroux, 1812

Clytia discoidea (Mayer, 1900) (3)

Clytia gracilis (M. Sars, 1851) (3, 4, 5)
Clytia hemisphaerica (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)
Clytia linearis (Thornely, 1899) (3, 4, 5)
Clytia mccradyi (Brooks, 1888) (3)
Clytia noliformis (McCrary, 1859) (3, 4)
Clytia paulensis (Vanhöffen, 1910) (3)
Clytia pentata (Mayer, 1900) (3)

Gonothyraea Allman, 1864

Gonothyraea loveni Allman, 1864 (3, 4)

Laomedea Lamouroux, 1812

Laomedea angulata (Hincks, 1859) (3, 4, 5)
Laomedea calceolifera (Hincks, 1871) (3, 4, 5)

Obelia Péron & Lesueur, 1810

Obelia bidentata Clarke, 1875 (3, 4, 5)
Obelia dichotoma (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)
Obelia geniculata (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)
Obelia longissima (Pallas, 1766) (3, 4)

Orthopyxis Agassiz, 1862

Orthopyxis asymmetrica (Stechow, 1919) (3, 4, 5)
Orthopyxis crenata (Hartlaub, 1901) (3)
Orthopyxis integra (MacGillivray, 1842) (3, 4, 5)

Limnomedusae

Armohydridae

Armohydra Swedmark & Teissier, 1958

Armohydra janowiczi Swedmark & Teissier, 1958 (4)

Olindiasidae

Craspedacusta Lankester 1880

Craspedacusta sowerbyi Lankester, 1880 (N, S, Sa)

Gonionemus A. Agassiz, 1862

Gonionemus venens A. Agassiz, 1862 (3, 4)

Olindias F. Müller, 1861

Olindias phosphorica (Delle Chiaje, 1841) (3, 4)

Scolionema Kishinouye, 1910

Scolionema suvaense (Agassiz & Mayer, 1899) (3)

Proboscidactylidae

Proboscidactyla Brandt, 1835

Proboscidactyla ornata (Mc Crady, 1857) (3, 4)

Narcomedusae

Aeginidae

Solmundella Haeckel, 1879

Solmundella bitentaculata (Quoy & Gaimard, 1833) (3, 4, 5)

Cuninidae

Cunina Eschscholtz, 1829

Cunina globosa Eschscholtz, 1829 (3)

Cunina lativentris Gegenbaur, 1856 (3)

Cunina octonaria McCrady, 1857 (3)

Cunina polygonia (Haeckel, 1879) (3, 4)

Cunina proboscidea E. Metschnikoff & L. Metschnikoff, 1871 (3)

Cunina vitrea Gegenbaur, 1856 (3, 5)

Solmissus Haeckel, 1879

Solmissus albescens (Gegenbaur, 1856) (3, 4, 5)

Solmarisidae

Pegantha Haeckel, 1879

Pegantha mollicina (Forsskål, 1775) (5)
Pegantha rubiginosa (Kölliker, 1853) (3, 4, 5)
Pegantha zonaria (Haeckel, 1879) (3)

Solmaris Haeckel, 1879

Solmaris flavescens (Kölliker, 1853) (3, 4)
Solmaris leucostyla (Will, 1844) (3, 4)
Solmaris solmaris (Gegenbaur, 1856) (5)
Solmaris vanhoeffeni Neppi & Stiasny, 1911 (4)

Trachymedusae

Geryoniidae

Geryonia Péron & Lesueur, 1810

Geryonia proboscidalis (Forsskål, 1775) (3, 4, 5)

Liriope Lesson, 1843

Liriope tetraphylla (Chamisso & Eysenhardt, 1821) (3, 4, 5)

Halicreatidae

Haliscera Vanhöffen, 1902

Haliscera conica Vanhöffen, 1902 (3)

Ptychogastridae

Ptychogastria Allman, 1878

Ptychogastria asteroides (Haeckel, 1879) (3, 4)

Rhopalonematidae

Aglaura Péron & Lesueur, 1810

Aglaura hemistoma Péron & Lesueur, 1810 (3, 4, 5)

Amphogona Browne, 1905

Amphogona pusilla Hartlaub, 1909 (3)

Arctapodema Dall, 1907

Arctapodema ampla (Vanhöffen, 1902) (3, 4, 5)

Homeonema Maas, 1893

Homeonema platygonon Browne, 1903 (4)

Persa McCrady, 1857

Persa incolorata McCrady, 1857 (3, 4, 5)

Rhopalonema Gegenbaur, 1856

Rhopalonema funerarium Vanhöffen, 1902 (3)

Rhopalonema velatum Gegenbaur, 1856 (3, 4, 5)

Sminthea Gegenbaur, 1856

Sminthea eurygaser Gegenbaur, 1856 (3, 4, 5)

Actinulidae

Halammohydridae

Halammohydra Remane, 1927

Halammohydra octopodides Remane, 1927 (4)

Halammohydra shulzei Remane, 1927 (3, 4)

Otohydridae

Otohydra Swedmark & Teissier, 1958

Otohydra vagans Swedmark & Teissier, 1958 (4)

Anthozoa

Stolonifera

Cornulariidae

Cornularia Lamarck, 1816

Cornularia cornucopiae (Pallas, 1766) (3, 4)

Clavulariidae

Clavularia De Blainville, 1890

Clavularia crassa (Milne-Edwards, 1848) (3)

Clavularia marioni von Koch, 1891 (3)

Clavularia ocracea von Koch, 1878 (3, 4)

Telestacea

Telestidae

Telestula Madsen, 1944

Telestula septentrionalis Madsen, 1944 (3) (*)

Note

Telestula septentrionalis: In Mediterraneo rinvenuta una sola volta su fondi di 600-700 m al largo del Tigullio su banco di *Lophelia prolifera*.

Alcyonacea

Alcyoniidae

Alcyonium Linnaeus, 1758

Alcyonium acaule Marion, 1878 (3, 4)

Alcyonium palmatum Pallas, 1766 (3, 4, 5)

Parerythropodium Kükenthal, 1916

Parerythropodium coralloides (Pallas, 1766) (3, 4)

Rolandia Forbes, 1847

Rolandia rosea (Philippi, 1842) (3, 4, 5)

Maasellidae

Maasella Poche, 1914

Maasella edwardsi (Lacaze-Duthiers, 1888) (3, 5)

Paralcyonium Milne-Edwards & Haime, 1850

Paralcyonium spinulosum (Delle Chiaje, 1822) (3)

Gorgonacea

Acanthogorgiidae

Acanthogorgia Gray, 1857

Acanthogorgia hirsuta Gray, 1857 (3)

Coralliidae

Corallium Cuvier, 1798

Corallium rubrum (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Gorgoniidae

Lophogorgia Milne-Edwards & Haime, 1857

Lophogorgia ceratophyta (Linnaeus, 1758) (3, 4)

Isidiidae

Isidella Gray, 1858

Isidella elongata (Esper, 1788) (3, 4)

Paramuriceidae

Bebryce Philippi, 1842

Bebryce mollis Philippi, 1842 (3, 5)

Paramuricea Kölliker, 1865

Paramuricea clavata (Risso, 1826) (3, 4)

Paramuricea macrospina (Koch, 1882) (3, 4, 5)

Spinimuricea Grasshoff, 1992

Spinimuricea klavareni (Carpine & Grasshoff, 1975) (3) (*)

Swiftia Duchaissaing & Michelotti, 1864

Swiftia pallida Madsen, 1970 (3) (*)

Villogorgia Duchaissaing & Michelotti, 1860

Villogorgia bebrycoides (Koch, 1887) (3, 5) (*)

Note

Spinimuricea klavareni: Tradizionalmente attribuita al genere *Paramuricea*.

Swiftia pallida: Segnalata in Mare d'Alboran, Marsiglia, Porquerolles, Corsica occ., Capo Matapan; è da supporre presente in Italia.

Villogorgia bebrycoides: Tradizionalmente attribuita al genere *Paracamptogorgia* Kükenthal, 1919.

Plexauridae

Eunicella Verrill

Eunicella cavolinii (Koch, 1887) (3, 4)

Eunicella singularis (Esper, 1791) (3, 4, 5)

Eunicella verrucosa (Pallas, 1766) (3) (*)

Note

Eunicella verrucosa: È stata rinvenuta in Mediterraneo esclusivamente a Marsiglia, Golfo di Genova, Corsica occidentale.

Primnoidae

Callogorgia Gray, 1858

Callogorgia verticillata (Pallas, 1766) (3)

Pennatulacea

Kophobelemnidae

Kophobelemnon Asbjörnsen, 1866

Kophobelemnon leukarti Kölliker, 1872 (3) (*)

Note

Kophobelemnon leukarti: Considerato sinonimo di *K. stelliferum* (O. F. Müller, 1776). Osservazioni non pubblicate di L. Rossi dimostrano tuttavia l'esistenza di proporzioni diverse nelle dimensioni delle spicole dell'apice e della rachide tra le due specie.

Funiculinidae

Funiculina Lamarck, 1816

Funiculina quadrangularis (Pallas, 1766) (3, 4)

Pennatulidae

Pennatula Linnaeus, 1758

Pennatula phosphorea Linnaeus, 1758 (3, 4, 5)

Pennatula rubra (Ellis, 1764) (3) (*)

Note

Pennatula rubra: Distribuzione non ben definita in quanto non sempre correttamente distinta da *P. phosphorea*.

Pteroeididae

Pteroeides Herklots, 1858

Pteroeides spinosum (Ellis & Solander, 1786) (3, 4, 5) (*)

Note

Pteroeides spinosum: Forse presente anche nel bacino sud-orientale italiano in quanto segnalato a Costantinopoli.

Veretillidae

Veretillum Cuvier, 1798

Veretillum cynomorium (Pallas, 1776) (3, 4)

Virgulariidae

Virgularia Lamarck, 1816

Virgularia mirabilis (O.F. Müller, 1776) (3, 4, 5)

Antipatharia

Antipathidae

Antipathes Pallas, 1766

Antipathes dichotoma Pallas, 1766 (3)

Antipathes fragilis Gravier, 1918 (3) (*)

Antipathes subpinnata (Ellis & Solander, 1786) (3, 4)

Leiopathes Gray, 1892

Leiopathes glaberrima (Esper, 1792) (3) (*)

Paranthipates Brook, 1792

Paranthipates larix (Esper, 1792) (3)

Note

Antipathes fragilis: Trovati alcuni frammenti una sola volta a Napoli. Specie dubbia.

Leiopathes glaberrima: La segnalazione in Adriatico si basa su un errore di determinazione.

Ceriantharia

Arachnanthidae

Arachnactis M. Sars, 1846

Arachnactis albida M. Sars, 1846 (3) (*)

Note

Arachnactis albida: Forma larvale di cui non si conosce l'adulto.

Botrucnidiferidae

Cerianthula van Beneden, 1897

Cerianthula mediterranea van Beneden, 1897 (3, 4) (*)

Note

Cerianthula mediterranea: Forma larvale di cui non si conosce l'adulto.

Cerianthidae

Cerianthus Delle Chiaje, 1832

Cerianthus lloydi Gosse, 1859 (3) (*)

Cerianthus membranaceus (Spallanzani, 1784) (3, 4, 5)

Cerianthus viridis (Andres, 1883) (3)

Note

Cerianthus lloydi: In Mediterraneo solo lo stadio larvale.

Actiniaria

Gonactiniidae

Gonactinia M. Sars, 1851

Gonactinia prolifera (M. Sars, 1835) (3, 4)

Andresiidae

Andresia Stephenson, 1921

Andresia partenopea (Andres, 1884) (3, 4)

Edwardsiidae

Edwardsia Quatrefages, 1842

Edwardsia claparedi Panceri, 1859 (3, 4)

Edwardsia grubii Andres, 1883 (3, 4)

Edwardsiella Andres, 1883

Edwardsiella carnea (Gosse, 1856) (3)

Halcampoididae

Halcampella Andres, 1883

Halcampella endomitrata (Andres, 1880) (3)

Halcampoides Danielssen, 1890

Halcampoides purpurea (Studer, 1878) (3)

Haloclavidae

Anemonactis Andres, 1880

Anemonactis mazeli (Jourdan, 1880) (3, 4)

Fagesia Delphy, 1938

Fagesia loveni (Carlgren, 1892) (3)

Mesacmea Andres, 1883

Mesacmea mitchelli (Gosse, 1853) (4)

Peachia Gosse, 1855

Peachia cylindrica (Reid, 1848) (3, 4)

Scolanthus Gosse, 1853

Scolanthus callimorphus (Gosse, 1853) (3, 4) (*)

Note

Scolanthus callimorphus: Da alcuni ritenuto sinonimo di *Edwardsia clapedi*.

Boloceroididae

Bunodeopsis Andres, 1880

Bunodeopsis strumosa Andres, 1881 (3, 4)

Actiniidae

Actinia Linnaeus, 1767

Actinia cari Delle Chiaje, 1841 (3, 4)

Actinia equina (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Actinia striata Rizzi, 1907 (3, 4)

Anemonia Risso, 1826

Anemonia viridis (Forsskål, 1775) (3, 4, 5)

Anthopleura Duchassaing & Michelotti, 1860

Anthopleura ballii (Cocks, 1850) (3, 4)

Anthopleura rubripunctata (Grube, 1840) (3, 4, 5)

Bunodactis Verrill, 1899

Bunodactis verrucosa Pennant, 1777 (3, 4, 5)

Condylactis Duchassaing & Michelotti, 1866

Condylactis aurantiaca (Delle Chiaje, 1825) (3, 4)

Cribrinopsis Carlgren, 1921

Cribrinopsis crassa (Andres, 1884) (3, 4)

Paranemonia Carlgren, 1900

Paranemonia cinerea (Contarini, 1844) (3, 4, 5)

Aliciidae

Alicia Johnson, 1861

Alicia mirabilis Johnson, 1861 (3)

Aurelianidae

Aureliana Gosse, 1860

Aureliana heterocera (Thompson, 1853) (3, 4)

Phymanthidae

Phymanthus Milne-Edwards, 1857

Phymanthus pulcher Andres, 1883 (3, 4)

Actinostolidae

Paranthus Andres, 1883

Paranthus rugosus (Andres, 1880) (3, 4)

Aiptasiidae

Aiptasia Gosse, 1858

Aiptasia diaphana (Rapp, 1829) (3, 4)

Aiptasia mutabilis (Gravenhorst, 1831) (3, 4)

Aiptasiogeton Schmidt, 1972

Aiptasiogeton pellucidus (Holland, 1848) (3) (*)

Note

Aiptasiogeton pellucidus: Tradizionalmente attribuita ad *Aiptasia*.

Diadumenidae

Diadumene Stephenson, 1920

Diadumene luciae Verrill, 1898 (3, 4)

Hormathiidae

Actinauge Verrill, 1883

Actinauge richardi (Marion, 1882) (3, 4)

Adamsia Forbes, 1840

Adamsia palliata (Bohadsch, 1761) (3, 4, 5)

Amphianthus R. Hertwig, 1882

Amphianthus dohrni (Koch, 1878) (3, 4)

Calliactis Verrill, 1869

Calliactis parasitica (Couch, 1838) (3, 4, 5)

Hormathia Gosse, 1859

Hormathia coronata (Gosse, 1858) (3, 4)

Paracalliactis Carlgren, 1928

Paracalliactis mediterranea Ross & Zamponi, 1982 (3)

Paractinia Andres, 1884

Paractinia striata (Risso, 1826) (3)

Isophelliidae

Telmatactis Gravier, 1818

Telmatactis forskali (Ehrenberg, 1834) (3, 4)

Sagartiidae

Cereus Oken, 1816

Cereus pedunculatus (Pennant, 1777) (3, 4, 5)

Sagartia Gosse 1855

Sagartia elegans (Dalyell, 1848) (3, 4)

Sagartia troglodytes (Price, 1847) (3, 4)

Sagartiogeton Carlgren 1924

Sagartiogeton entellae Schmidt, 1972 (3, 4)

Sagartiogeton undatus (O.F. Müller, 1788) (3, 4) (*)

Note

Sagartiogeton undatus: Tradizionalmente attribuita ad *Actinothoe* Fischer, 1889.

Corallimorpharia

Corallimorphidae

Corynactis Allman, 1846

Corynactis viridis Allman, 1846 (3)

Scleractinia

Seriatoporidae

Madracis Milne-Edwards & Haime, 1849

Madracis pharensis (Heller, 1868) (3, 4, 5)

Astrangiidae

Phyllangia Milne-Edwards & Haime, 1848

Phyllangia mouchezi (Lacaze-Duthiers, 1897) (3, 5)

Polycyathus Duncan, 1876

Polycyathus mullerae (Abel, 1959) (3, 4, 5)

Faviidae

Cladocora Ehrenberg, 1834

Cladocora caespitosa (Linnaeus, 1767) (3, 4, 5)

Cladocora debilis Milne-Edwards & Haime, 1849 (3, 5)

Oculinidae

Madrepora Linnaeus, 1758

Madrepora oculata Linnaeus, 1758 (3, 4, 5) (*)

Oculina Lamarck, 1816

Oculina patagonica De Angelis, 1908 (3) (*)

Note

Madrepora oculata: In Adriatico e Mediterraneo Sud-Est solo subfossile.

Oculina patagonica: Descritta su materiale subfossile dell'Argentina. Vive esclusivamente nei dintorni di Savona.

Caryophylliidae

Caryophyllia Lamarck, 1801

Caryophyllia calveri Duncan, 1873 (3, 5)

Caryophyllia cyathus (Ellis & Solander, 1786) (3, 5)

Caryophyllia inornata (Duncan, 1878) (3, 4)

Caryophyllia smithi Stokes & Broderip, 1828 (3, 4, 5)

Ceratotrochus Milne-Edwards & Haime, 1848

Ceratotrochus magnaghii (Cecchini, 1914) (3, 4, 5)

Coenocyathus Milne-Edwards & Haime, 1848

Coenocyathus anthophyllites Milne-Edwards & Haime, 1848 (3) (*)

Coenocyathus cylindricus Milne-Edwards & Haime, 1848 (3) (*)

Paracyathus Milne-Edwards & Haime, 1848

Paracyathus pulchellus (Philippi, 1842) (3, 4) (*)

Trochocyathus Milne-Edwards & Haime, 1848

Trochocyathus mediterraneus Zibrowius, 1980 (3) (*)

Note

Coenocyathus anthophyllites: Raro, segnalato in base a vecchi esemplari di museo (località

incerta).

Coenocyathus cylindricus: Unica segnalazione sicura: Nord-Est Sicilia.

Paracyathus pulchellus: In Adriatico la presenza è dubbia.

Trochocyathus mediterraneus: Fossile del Quaternario trovato al largo di Savona.

Desmophyllidae

Desmophyllum Ehrenberg, 1834

Desmophyllum cristagalli Milne-Edwards & Haime, 1848 (3, 5) (*)

Hoplangia Gosse, 1860

Hoplangia durotrix Gosse, 1860 (3, 4, 5)

Lophelia Milne-Edwards & Haime, 1848

Lophelia pertusa (Linnaeus, 1758) (3, 5) (*)

Thalamophyllia Duchassaing, 1870

Thalamophyllia gasti (Döderlein, 1913) (3) (*)

Note

Desmophyllum cristagalli: Esemplari generalmente morti e sub-fossili. Provatamente vivi solo a sud della Spagna, Banyuls, Marsiglia, Stretto di Zubea.

Lophelia pertusa: Grandi banchi subfossili. In N Adriatico presenza non provata.

Thalamophyllia gasti: Tradizionalmente attribuita al genere *Desmophyllum*.

Flabellidae

Javania Duncan, 1876

Javania cailleti (Duchassaing & Michelotti, 1864) (3) (*)

Monomyces Ehrenberg, 1834

Monomyces pygmaea (Risso, 1826) (3, 4, 5)

Note

Javania cailleti: Tradizionalmente attribuita al genere *Flabellum* Lesson, 1831.

Guyniidae

Guynia Duncan, 1872

Guynia annulata Duncan, 1872 (3, 4, 5)

Stenocyathus Pourtalès, 1871

Stenocyathus vermiformis (Portalès, 1868) (3, 5)

Parasmiliidae

Portalosmilia Duncan, 1884

Portalosmilia anthophyllites (Ellis & Solander, 1786) (3) (*)

Note

Portalosmilia anthophyllites: La presenza di colonie viventi (probabilmente nel bacino sud-occidentale) deve essere confermata.

Turbinolidae

Sphenotrochus Milne-Edwards & Haime, 1848

Sphenotrochus andrewianus Milne-Edwards & Haime, 1848 (3) (*)

Note

Sphenotrochus andrewianus: Osservato da Rossi allo stadio giovanile in sabbia ad anfiosso del Golfo di Napoli.

Dendrophylliidae

Astroides Quoy & Gaimard, 1827

Astroides calycularis (Pallas, 1766) (3, 5) (*)

Balanophyllia Searles Wood, 1844

Balanophyllia europaea (Risso, 1826) (3, 4, 5)

Balanophyllia regia Gosse, 1860 (3, 5)

Cladopsammia Lacaze-Duthiers, 1897

Cladopsammia rolandi Lacaze- Duthiers, 1897 (3, 5)

Dendrophyllia Blainville, 1830

Dendrophyllia cornigera (Lamarck, 1816) (3, 5)

Dendrophyllia ramea (Linnaeus, 1758) (3, 5) (*)

Leptopsammia Milne- Edwards & Haime, 1848

Leptopsammia pruvoti Lacaze-Duthiers, 1897 (3, 4, 5)

Note

Astroides calycularis: Il Golfo di Napoli è il limite Nord della presenza di questa specie.

Dendrophyllia ramea: La sua presenza è confermata solo per Napoli, Sicilia e zoccolo Siculo-Tunisino.

Zoantharia

Epizoanthidae

Epizoanthus Gray, 1867

Epizoanthus arenaceus (Delle Chiaje, 1822) (3, 4)

Epizoanthus mediterraneus Carlgren, 1935 (3, 4)

Epizoanthus paxi Abel, 1955 (3, 4)

Gerardiidae

Gerardia Lacaze-Duthiers, 1864

Gerardia savaglia (Bertoloni, 1819) (3, 4, 5)

Parazoanthidae

Parazoanthus Haddon & Shackleton, 1891

Parazoanthus axinellae (Schmidt, 1862) (3, 4, 5)

Ctenophora

Tentaculifera

Cydippida

Ctenellidae

Ctenella C. Carré & D. Carré, 1993

Ctenella aurantia C. Carré & D. Carré, 1993 (3) (*)

Note

Ctenella aurantia: Questa specie verrà probabilmente posta in sinonimia con altra specie, ma - poiché questo non è successo negli ultimi 150 anni - potrà passare del tempo prima che tale sinonimia venga chiarita.

Euplokamidae

Euplokamis Chun, 1880

Euplokamis stationis Chun, 1880 (3)

Haeckeliidae

Haeckelia Carus, 1863

Haeckelia bimaculata C. Carré & D. Carré, 1989 (3) (*)

Haeckelia filigera (Chun, 1880) (3)

Haeckelia rubra (Kölliker, 1853) (3, 4, 5)

Note

Haeckelia bimaculata: Questa specie è stata raccolta vicino a Nizza e Villefranche-sur-Mer (Francia), ma non è ancora stata segnalata nelle acque italiane. Non c'è dubbio che gli ctenofori planctonici segnalati in questa parte della Francia esistano anche nelle acque italiane.

Lampeidae

Lampea Stechow, 1921

Lampea pancerina (Chun, 1880) (3, 4, 5)

Mertensiidae

Callianira Péron & Lesueur, 1810

Callianira bialata Delle Chiaje, 1841 (3, 5)

Callianira ficalbi Curreri, 1900 (3, 5)

Charistephane Chun, 1880

Charistephane fugiens Chun, 1880 (3, 5)

Pleurobrachiidae

Ceroctena C. Carré & D. Carré, 1991

Ceroctena bicornis C. Carré & D. Carré, 1991 (3) (*)

Hormiphora L. Agassiz, 1860

Hormiphora plumosa L. Agassiz, 1860 (3, 5)

Minictena C. Carré & D. Carré, 1993

Minictena luteola C. Carré & D. Carré, 1993 (3) (*)

Pleurobrachia Fleming, 1822

Pleurobrachia pileus (O.F. Müller, 1776) (3) (*)

Pleurobrachia rhododactyla L. Agassiz, 1860 (3, 4, 5)

Pleurobrachia rhodopis Chun, 1880 (3, 4, 5)

Pleurobrachia sp. (4)

Note

Ceroctena bicornis: Questa specie è stata raccolta vicino a Nizza e Villefranche-sur-Mer (Francia), ma non è ancora stata segnalata nelle acque italiane. Non c'è dubbio che gli ctenofori planctonici segnalati in questa parte della Francia esistano anche nelle acque italiane.

Minictena luteola: Questa specie è stata raccolta vicino a Nizza e Villefranche-sur-Mer (Francia), ma non è ancora stata segnalata nelle acque italiane. Non c'è dubbio che gli ctenofori planctonici segnalati in questa parte della Francia esistano anche nelle acque italiane.

Pleurobrachia pileus: Questa specie è stata raccolta vicino a Nizza e Villefranche-sur-Mer (Francia), ma non è ancora stata segnalata nelle acque italiane. Non c'è dubbio che gli ctenofori planctonici segnalati in questa parte della Francia esistano anche nelle acque italiane.

Cydippida i.s.

Cydippe Eschscholtz, 1829

Cydippe brevicostata Will, 1844 (4) (*)

Cydippe ovata Lesson, 1843 (5) (*)

Thoe Chun, 1878

Thoe paradoxa Chun, 1878 (3, 5) (*)

Eschscholtzia K  lliker, 1853

Eschscholtzia pectinata K  lliker, 1853 (*)

Note

Cydippe brevicostata: Questa specie verr   probabilmente posta in sinonimia con altra specie, ma - poich   questo non    successo negli ultimi 150 anni - potr   passare del tempo prima che tale sinonimia venga chiarita.

Cydippe ovata: Questa specie verr   probabilmente posta in sinonimia con altra specie, ma - poich   questo non    successo negli ultimi 150 anni - potr   passare del tempo prima che tale sinonimia venga chiarita.

Thoe paradoxa: Questa specie verr   probabilmente posta in sinonimia con altra specie, ma - poich   questo non    successo negli ultimi 150 anni - potr   passare del tempo prima che tale sinonimia venga chiarita.

Eschscholtzia pectinata: Questa specie verr   probabilmente posta in sinonimia con altra specie, ma - poich   questo non    successo negli ultimi 150 anni - potr   passare del tempo prima che tale sinonimia venga chiarita.

Thalassocalycida

Thalassocalycidae

Thalassocalyce Madin & Harbison, 1978

Thalassocalyce sp. (3) (*)

Note

Thalassocalyce sp.: Questa specie    stata raccolta vicino a Nizza e Villefranche-sur-Mer (Francia), ma non    ancora stata segnalata nelle acque italiane. Non c'   dubbio che gli ctenofori planctonici segnalati in questa parte della Francia esistano anche nelle acque italiane.

Lobata

Bathocyroidae

Bathocyroe Madin & Harbison, 1978

Bathocyroe sp. (3) (*)

Note

Bathocyroe sp.: Questa specie è stata raccolta vicino a Nizza e Villefranche-sur-Mer (Francia), ma non è ancora stata segnalata nelle acque italiane. Non c'è dubbio che gli ctenofori planctonici segnalati in questa parte della Francia esistano anche nelle acque italiane.

Bolinopsidae

Bolinopsis L. Agassiz, 1860

Bolinopsis vitrea (L. Agassiz, 1860) (3)

Deiopea Chun, 1880

Deiopea kaloktenota Chun, 1880 (3, 4)

Lesueuria Milne Edwards, 1841

Lesueuria vitrea Milne Edwards, 1841 (3)

Eurhamphaeidae

Eurhamphaea Gegenbaur, 1856

Eurhamphaea vexilligera Gegenbaur, 1856 (3, 5)

Leucotheidae

Leucothea Mertens, 1833

Leucothea multicornis (Quoy & Gaimard, 1824) (3, 4, 5)

Cestida

Cestidae

Cestum Lesueur, 1813

Cestum veneris Lesueur, 1813 (3, 4, 5)

Velamen Krumbach, 1925

Velamen parallelum (Fol, 1869) (3, 5)

Atentaculata

Beroida

Beroidae

Beroe Browne, 1756

Beroe forskalii Milne Edwards, 1841 (3, 4, 5)

Beroe mitrata (Moser, 1908) (3) (*)

Beroe ovata Bosc, 1802 (3, 4, 5)

Note

Beroe mitrata: Questa specie è stata raccolta vicino a Nizza e Villefranche-sur-Mer (Francia), ma non è ancora stata segnalata nelle acque italiane. Non c'è dubbio che gli ctenofori planctonici segnalati in questa parte della Francia esistano anche nelle acque italiane.

Platyhelminthes

Turbellaria

Catenulida

Catenulidae

Catenula Dugès, 1832

Catenula lemnae Dugès, 1832 (N, S)

Catenula macrura Marcus, 1945 (S)

Catenula sekerai Beauchamp, 1919 (N, S)

Dasyhormus Marcus, 1945

Dasyhormus pygmaeus (Reisinger, 1924) (S)

Suomina Marcus, 1945

Suomina turgida (Zacharias, 1902) (S)

Stenostomidae

Stenostomum O. Schmidt, 1848

Stenostomum agile (Silliman, 1885) (N)

Stenostomum anatirostrum Marcus, 1945 (S)

Stenostomum anops Nuttycombe & Waters, 1938 (S)

Stenostomum arevaloi Gieysztor, 1931 (S)

Stenostomum beauchampi Papi, 1967 (S)

Stenostomum caudatum (Markov, 1904) (N)

Stenostomum constrictum Luther, 1960 (S)

Stenostomum leucops (Dugès, 1828) (N, S)

Stenostomum occultum Kolasa, 1971 (S)

Stenostomum pegephilum Nuttycombe & Waters, 1938 (S)

Stenostomum predatorium Kepner & Carter, 1931 (S)

Stenostomum romanae Kolasa, 1980 (S)

Stenostomum sieboldi Graff, 1878 (4) (*)

Stenostomum sphagnetorum Luther, 1960 (S)

Stenostomum temporaneum Kolasa, 1980 (S)

Stenostomum ventonephrium Nuttycombe, 1932 (S)

Myostenostomum Luther, 1960

Myostenostomum fasciatum (Vejdovský, 1880) (N)

Myostenostomum tauricum (Nasonov, 1923) (S)

Rhynchoscolex Leidy, 1851

Rhynchoscolex evelinae Marcus, 1945 (S)

Rhynchoscolex simplex Leidy, 1851 (S)

Note

Stenostomum sieboldi: Specie di dubbia validità.

Tyrrheniellidae

Tyrrheniella Riedl, 1959

Tyrrheniella sigillata Riedl, 1959 (3)

Acoela

Anaperidae

Anaperus Graff, 1911

Anaperus rubellus Westblad, 1945 (3, 4)

Paranaperus Westblad, 1942

Paranaperus pellucidus Westblad, 1942 (4)

Antroposthiidae

Adenopea Antonius, 1968

Adenopea illardata (Löhner & Micoletzsky, 1911) (4)

Childiidae

Childia Graff, 1911

Childia groenlandica (Levinsen, 1879) (4)

Paraphanostoma Steinböck, 1931

Paraphanostoma brachyposthium Westblad, 1942 (4)

Paraphanostoma crassum Westblad, 1942 (4)

Paraphanostoma cycloposthium Westblad, 1942 (4)

Paraphanostoma dubium Westblad, 1942 (4)

Paraphanostoma macroposthium (Steinböck, 1931) (4)

Paraphanostoma submaculatum Westblad, 1942 (4)

Paraphanostoma trianguliferum Westblad, 1942 (4)

Paraproporus Westblad, 1945

Paraproporus rubescens Westblad, 1945 (4)

Pelophila Dörjes, 1968

Pelophila lutheri (Westblad, 1946) (4)

Philactinoposthia Dörjes, 1968

Philactinoposthia saliens (Graff, 1882) (4)

Convolutidae

Amphiscolops Graff, 1905

Amphiscolops cinereus (Graff, 1874) (3)

Amphiscolops langerhansi (Graff, 1882) (3, 5)

Amphiscolops zeii Riedl, 1956 (4)

Archaphanostoma Dörjes, 1968

Archaphanostoma agile (Jensen, 1878) (4)

Avagina Leiper, 1902

Avagina tenuissima (Westblad, 1946) (4)

Convoluta Örsted, 1844

Convoluta convoluta (Abildgaard, 1806) (3, 4, 5)

Convoluta elegans Pereyaslavzewa, 1892 (4)

Convoluta henseni Böhmig, 1895 (4)

Convoluta hipparchia Pereyaslavzewa, 1892 (4)

Convoluta pelagica Löhner & Micoletzki, 1911 (4)

Convoluta punctata Riedl, 1959 (4)

Convoluta saliens (Graff, 1905) (4)

Convoluta sordida Graff, 1882 (3, 4)

Convoluta subtilis (Graff, 1882) (4)

Conaperta Antonius, 1968

Conaperta flavibacillum (Jensen, 1878) (3)

Haplodiscus Weldon, 1889

Haplodiscus ussowi Sabussow, 1896 (3, 4)

Proaphanostoma Dörjes, 1972

Proaphanostoma tenuissima (Westblad, 1946) (4)

Pseudaphanostoma Westblad, 1946

Pseudaphanostoma variabilis Westblad, 1946 (4)

Diopisthoporidae

Diopisthoporus Westblad, 1940

Diopisthoporus longitubus Westblad, 1940 (4)

Hallangiidae

Hallangia Westblad, 1946

Hallangia proporoides Westblad, 1946 (4)

Haploposthiidae

Haploposthia An der Lan, 1936

Haploposthia rubra (An der Lan, 1936) (4)

Haploposthia rubropunctata Westblad, 1945 (4)

Haplogonaria Dörjes, 1968

Haplogonaria minima Westblad, 1946 (4)

Kuma Marcus, 1950

Kuma viridis (An der Lan, 1936) (4)

Pseudohaplogonaria Dörjes, 1968

Pseudohaplogonaria viridipunctata (Westblad, 1946) (3, 4)

Hofsteniidae

Hofsteniola Papi, 1957

Hofsteniola pardii Papi, 1957 (3)

Mecynostomidae

Mecynostomum van Beneden, 1870

Mecynostomum auritum (Schultze, 1851) (3)

Mecynostomum sicilianum Riedl, 1954 (4, 5)

Paramecynostomum Dörjes, 1968

Paramecynostomum diversicolor (Örsted, 1845) (4)

Nadinidae

Nadina Uljanin, 1870

Nadina pulchella Uljanin, 1870 (3, 4, 5)

Otocelididae

Otocelis Diesing, 1862

Otocelis rubropunctata (O. Schmidt, 1852) (3)

Notocelis Dörjes, 1968

Notocelis gullmarensis (Westblad, 1946) (3)

Paratomellidae

Paratomella Dörjes, 1966

Paratomella rubra Rieger & Ott, 1971 (3, 4)

Proporidae

Proporus O. Schmidt, 1852

Proporus venenosus (O. Schmidt, 1852) (3, 4, 5)

Sagittiferidae

Symsagittifera Kostenko & Mamkaev, 1990

Symsagittifera psammophila (Beklemischev, 1957) (3)

Symsagittifera shultzei (O. Schmidt, 1852) (3, 4)

Nemertodermatida

Nemertodermatidae

Nemertoderma Steinböck, 1930

Nemertoderma bathycola Steinböck, 1930 (4)

Flagellophora Faubel & Dörjes, 1978

Flagellophora apelti Faubel & Dörjes, 1978 (4)

Macrostomida

Dolichomacrostomidae

Cylindromacrostomum Rieger, 1971

Cylindromacrostomum mediterraneum Ax, 1955 (3)

Myozonaria Rieger, 1968

Myozonaria mediterranea Rieger, 1971 (3)

Paromalostomum Meixner in Ax, 1951

Paromalostomum atratum Rieger, 1971 (3)

Paromalostomum minutum Rieger, 1971 (4)

Paromalostomum parvum Rieger, 1971 (4)

Macrostomidae

Axia Ferguson, 1954

Axia gieysztori (Ferguson, 1939) (S)

Macrostomum O. Schmidt, 1848

Macrostomum appendiculatum (O. Fabricius, 1826) (N) (*)

Macrostomum axi Papi, 1951 (3)

Macrostomum balticum Luther, 1947

Macrostomum balticum meridionale Papi, 1953 (3)

Macrostomum caprariae Papi, 1959 (3)
Macrostomum distinguendum (Papi, 1951) (S)
Macrostomum finlandense (Ferguson, 1940) (N, S)
Macrostomum gilberti Ferguson, 1939 (S)
Macrostomum hystricinum Beklemischev, 1951 (3)
Macrostomum karlingi Papi, 1953 (S)
Macrostomum longituba Papi, 1953 (3)
Macrostomum mystrophorum Meixner, 1926 (3)
Macrostomum orthostylum (M. Braun, 1885) (N, S)
Macrostomum pithecusae Papi, 1959 (S)
Macrostomum quirritium Beklemischev, 1951 (S)
Macrostomum retortum Papi, 1951 (S)
Macrostomum romanicum Mack-Fira, 1968 (3)
Macrostomum rostratum (Papi, 1951) (S)
Macrostomum sensitivum (Silliman, 1884) (N, S)
Macrostomum tuba (Graff, 1882) (N, S)

Myozona Marcus, 1949

Myozona lutheri Papi, 1953 (3)

Note

Macrostomum appendiculatum: Pool di specie che necessita di revisione.

Microstomidae

Microstomum O. Schmidt, 1848

Microstomum lineare (O.F. Müller, 1874)
 Microstomum lineare lineare Dorner, 1902 (N, S)
 Microstomum lineare giganteum Graff, 1912 (N)
Microstomum melanophthalmus Steinböck, 1933 (3, 4, 5)
Microstomum ornatum Uljanin, 1870 (4)
Microstomum papillosum (Graff, 1882) (3, 4, 5)
Microstomum rubromaculatum Graff, 1882 (3)

Haplopharyngidae

Haplopharynx Meixner, 1938

Haplopharynx sp. (3) (*)

Note

Haplopharynx sp.: Specie inedita descritta nella tesi di laurea di Agostini (1963) discussa

presso l'Università di Pisa.

Polycladida

Callioplanidae

Callioplana Stimpson, 1857

Callioplana marginata Stimpson, 1857 (3)

Trigonoporus Lang, 1884

Trigonoporus cephalophthalmus Lang, 1884 (3)

Cestoplanidae

Cestoplana Lang, 1884

Cestoplana faraglioneensis Lang, 1884 (3)

Cestoplana rubrocincta (Grube, 1840) (3, 5)

Acestoplana Faubel, 1983

Acestoplana raffaelei (Ranzi, 1928) (3)

Cryptocelididae

Cryptocelis Lang, 1884

Cryptocelis alba Lang, 1884 (3)

Cryptocelis compacta Lang, 1884 (3)

Discocelididae

Discocelis Ehrenberg, 1836

Discocelis tigrina (Blanchard, 1847) (3, 4)

Enantiidae

Enantia Graff, 1889

Enantia spinifera Graff, 1889 (4)

Gnesiocerotidae

Echinoplana Haswell, 1907

Echinoplana celerrima Haswell, 1907 (3)

Leptoplanidae

Comoplana Faubel, 1983

Comoplana agilis (Lang, 1884) (3)

Comoplana palmula (Quatrefages, 1845) (3, 5)

Emprostopharynx Bock, 1913

Emprostopharynx pallida (Quatrefages, 1845) (3, 4, 5)

Haploplana Laidlaw, 1902

Haploplana insignis (Lang, 1884) (4)

Haploplana papillosa (Lang, 1884) (3)

Haploplana villosa (Lang, 1884) (3)

Leptoplana Ehrenberg, 1831

Leptoplana diaphana Stummer-Traunfels, 1933 (3)

Leptoplana luteola (Delle Chiaje, 1822) (3)

Leptoplana tremellaris (O.F. Müller, 1774) (3, 4, 5)

Notoplana Laidlaw, 1903

Notoplana alcinoi (O. Schmidt, 1861) (3, 4, 5)

Notoplana igiliensis Galleni, 1974 (3) (*)

Notoplana kuekenthali (Plehn, 1896) (4)

Pleioplana Faubel, 1983

Pleioplana atomata (O.F. Müller, 1776) (3)

Stylochoplana Stimpson, 1857

Stylochoplana maculata (Quatrefages, 1845) (3, 4)

Stylochoplana tarda (Lang, 1878) (3, 4) (*)

Note

Notoplana igiliensis: Specie ritenuta da alcuni autori una varietà di *N. alcinoi*.

Stylochoplana tarda: Specie incertae sedis.

Planoceridae

Planocera Blainville, 1828

Planocera folia (Grube, 1840) (3, 5)

Planocera graffi Lang, 1879 (3)

Planocera pellucida (Mertens, 1832) (3)

Stylochidae

Stylochus (Stylochus) Ehrenberg, 1831

Stylochus (Stylochus) alexandrinus Steinbock, 1937 (3)

Stylochus (Stylochus) luteus (O.F. Müller, 1854) (3, 5) (*)

Stylochus (Stylochus) neapolitanus (Delle Chiaje, 1841) (3)

Stylochus (Stylochus) pilidium (Götte, 1881) (3, 4)

Stylochus (Stylochus) plessisii Lang, 1884 (3)

Stylochus (Imogine) Girard, 1853

Stylochus (Imogine) mediterraneus Galleni, 1976 (3, 4)

Note

Stylochus (Stylochus) luteus: Specie di dubbia validità.

Theamatidae

Theama Marcus, 1949

Theama sp. (3, 4, 5) (*)

Note

Theama sp.: Specie interstiziale molto comune in tutti i litorali italiani, descrizione in corso di stampa da parte di M. Curini-Galletti.

Anonymidae

Anonymus Lang, 1884

Anonymus virilis Lang, 1884 (3)

Euryleptidae

Acerotisa Strand, 1926

Acerotisa inconspicua (Lang, 1884) (3)

Cycloporus Lang, 1884

Cycloporus papillosus (M. Sars in Jensen, 1878) (3, 4)

Eurylepta Ehrenberg, 1831

Eurylepta cornuta (O.F. Müller, 1776) (3)

Eurylepta lobianchii (Lang, 1879) (3, 4) (*)

Oligocladus Lang, 1884

Oligocladus sanguinolentus (Quatrefages, 1845) (3, 4)

Prostheceraeus Schmarda, 1859

Prostheceraeus albocinctus Lang, 1884 (3)

Prostheceraeus giesbrechti Lang, 1884 (3)

Prostheceraeus moseleyi Lang, 1884 (3)

Prostheceraeus pseudolimax Lang, 1884 (3)

Prostheceraeus roseus Lang, 1884 (3)

Prostheceraeus rubropunctatus Lang, 1884 (3)

Prostheceraeus violaceus (Delle Chiaje, 1822) (3)

Prostheceraeus vittatus (Montagu, 1815) (3)

Stylostomum Lang, 1884

Stylostomum ellipse (Dalyell, 1853) (3, 4)

Note

Eurylepta lobianchii: Secondo A. Faubel è una varietà di *E. cornuta*.

Prosthiostomidae

Euprosthiostomum Bock, 1925

Euprosthlostomum viscosum Palombi, 1936 (3)

Prosthlostomum Quatrefages, 1845

Prosthlostomum dohrni Lang, 1884 (3)

Prosthlostomum pellucidum (Grube, 1840) (3, 5)

Prosthlostomum siphunculus (Delle Chiaje, 1828) (3, 4)

Pseudocerotidae

Monobicerus Faubel, 1984

Monobicerus langi Faubel, 1984 (3)

Pseudobicerus Faubel, 1984

Pseudobicerus undulatus (Schmarda, 1859) (3)

Pseudoceros Lang, 1884

Pseudoceros maximus Lang, 1884 (3, 4)

Pseudoceros muelleri (Delle Chiaje, 1829) (3) (*)

Pseudoceros velutinus (Blanchard, 1847) (3, 4)

Thysanozoon Grube, 1840

Thysanozoon brocchii (Risso, 1818) (3, 4, 5)

Yungia Lang, 1884

Yungia aurantiaca (Delle Chiaje, 1822) (3, 4, 5)

Yungia dicquemari (Risso, 1818) (3)

Note

Pseudoceros muelleri: Specie incertae sedis.

Lecithoepitheliata

Prorhynchidae

Geocentrophora de Man, 1876

Geocentrophora applanata (Kennel, 1889) (N)

Geocentrophora baltica (Kennel, 1883) (N, S)

Geocentrophora spirocephala de Man, 1876 (N)

Prorhynchus M. Schultze, 1851

Prorhynchus alpinus Steinbröck, 1923 (N)

Prorhynchus fontinalis Vejdovský, 1895 (N) (*)

Prorhynchus hastatus Steinböck, 1923 (N)

Prorhynchus ponticus Steinböck, 1927 (N)

Prorhynchus stagnalis M. Schultze, 1851 (N, S)

Note

Prorhynchus fontinalis: Specie incertae sedis.

Gnosonesimidae

Gnosonesima Reisinger, 1926

Gnosonesima mediterranea Martens & Schockaert, 1985 (3)

Prolecithophora

Cylindrostomidae

Allostoma van Beneden, 1861

Allostoma pallidum van Beneden, 1861 (3, 4)

Cylindrostoma Örsted, 1845

Cylindrostoma laetum Riedl, 1959 (3)

Cylindrostoma luridum Riedl, 1954 (3)

Cylindrostoma monotrochum (Graff, 1882) (4)

Cylindrostoma zooxanthella (Graff, 1886) (3, 4, 5)

Enterostomula Resinger, 1926

Enterostomula dura (Fuhrmann, 1896) (3, 4)

Monoophorum Böhmig, 1891

Monoophorum striatum (Graff, 1878) (4)

Protomonotresidae

Prorogonophora Riedl, 1954

Prorogonophora perspicua Riedl, 1954 (3, 5)

Pseudostomidae

Pseudostomum O. Schmidt, 1848

Pseudostomum klostermanni (Graff, 1874) (3, 4)

Pseudostomum quadrioculatum (Leuckart, 1847) (3, 4)

Multipeniidae

Paramultipeniata Kulitnitch, 1974

Paramultipeniata lemani (Forel & Du Plessis, 1874) (N, S)

Plagiostomidae

Acmostomum Schmarda, 1859

Acmostomum dioicum Mecznirow, 1865 (3, 4)

Akamptostoma Riedl, 1959

Akamptostoma spongiphilum Riedl, 1959 (3)

Plagiostomum O. Schmidt, 1852

Plagiostomum album Hyman, 1938 (4)

Plagiostomum benedeni (O. Schmidt, 1852) (4)

Plagiostomum chromogastrum (Graff, 1913) (4)

Plagiostomum girardi (O. Schmidt, 1857) (3, 4, 5)

Plagiostomum maculatum (Graff, 1882) (3, 4)

Plagiostomum meledanum (Graff, 1911) (4)

Plagiostomum ponticum Pereyaslawzewa, 1892 (3, 4)

Plagiostomum reticulatum (O. Schmidt, 1852) (3, 4, 5)

Plagiostomum rovigense An der Lan, 1936 (4)

Plagiostomum sorrentinum Riedl, 1954 (3)

Plagiostomum striatum Westblad, 1956 (4)

Plagiostomum sulphureum (Graff, 1882) (4)

Plagiostomum whitmani Graff, 1911 (3)

***Plicastoma* Graff, 1908**

- Plicastoma bimaculatum* (Graff, 1908) (4)
- Plicastoma cavernae* Riedl, 1959 (3)
- Plicastoma glaucum* Riedl, 1959 (3)
- Plicastoma productum* Riedl, 1959 (3)
- Plicastoma spadix* Riedl, 1959 (3)
- Plicastoma xenophthalmus* Riedl, 1959 (3)

***Vorticeros* O. Schmidt, 1852**

- Vorticeros auriculatum* (O.F. Müller, 1784) (3, 4, 5)
- Vorticeros luteum* Hallez, 1879 (3, 4)
- Vorticeros rudis* Riedl, 1959 (3)
- Vorticeros schmidtii* Hallez, 1890 (3)

Uljaniniidae

***Uljaninia* Levinsen, 1879**

- Uljaninia mollissima* (Levinsen, 1879) (4)

Proseriata

Archimonocelididae

***Archimonocelis* Meixner, 1938**

- Archimonocelis carmelitana* Martens & Curini-Galletti, 1993 (5)
- Archimonocelis crucifera* Martens & Curini-Galletti, 1993 (3, 5)
- Archimonocelis mediterranea* Meixner, 1938 (3)
- Archimonocelis meixneri* Martens & Curini-Galletti, 1993 (3)
- Archimonocelis staresoi* Martens & Curini-Galletti, 1993 (3, 5)

***Calviria* Martens & Curini-Galletti, 1993**

- Calviria solaris* Martens & Curini-Galletti, 1993 (3, 5)
- Calviria sublittoralis* Martens & Curini-Galletti, 1993 (3)

Bothrioplanidae

***Bothrioplana* M. Braun, 1881**

- Bothrioplana semperi* M. Braun, 1881 (N)

Coelogynoporidae

Coelogynopora Steinböck, 1924

Coelogynopora gynocotyla Steinböck, 1924 (3, 4, 5)

Invenusta Sopott-Ehlers, 1976

Invenusta aestus Sopott-Ehlers, 1976 (3, 5)

Invenusta sp. (3, 5) (*)

Vannuccia Marcus, 1948

Vannuccia campana Sopott-Ehlers, 1976 (3, 4, 5)

Note

Invenusta sp.: Specie interstiziale molto comune in tutti i litorali italiani di cui è in corso la descrizione da parte di M. Curini-Galletti.

Monocelididae

Monocelis Ehrenberg, 1831

Monocelis fuhrmanni Midelburg, 1908 (4)

Monocelis lineata (O.F. Müller, 1774) (3, 4, 5)

Monocelis longiceps (Dugès, 1830) (3, 4)

Monocelis longistyla Martens & Curini-Galletti, 1987 (3, 4, 5)

Monocelis nitida Riedl, 1959 (3)

Archilina Ax, 1959

Archilina biselenifera Martens & Curini-Galletti, 1994 (3)

Archilina brachycirrus Martens & Curini-Galletti, 1994 (3)

Archilina caliban Martens & Curini-Galletti, 1994 (5)

Archilina deceptoris Martens & Curini-Galletti, 1994 (3)

Archilina endostyla Ax, 1959 (3, 4, 5)

Archilina etrusca Martens & Curini-Galletti, 1994 (3)

Archiloea de Beauchamp, 1910

Archiloea petiti Ax, 1956 (3, 5)

Boreocelis Westblad, 1952

Boreocelis filicauda Westblad, 1952 (3)
Boreocelis urodasyoides Ax, 1963 (3)

Duplominona Karling, 1966

Duplominona corsicana Martens, 1984 (3)
Duplominona longicirrus Martens, 1984 (3)
Duplominona paucispina Martens, 1984 (3)

Inaloea Martens & Curini-Galletti, 1994

Inaloea cirrifera (Meixner, 1943) (4)

Promonotus Beklemischev, 1927

Promonotus ponticus Ax, 1959 (3)
Promonotus schultzei Meixner, 1943 (5)

Pseudomonocelis Meixner, 1943

Pseudomonocelis agilis (M. Schultze, 1851) (3)
Pseudomonocelis ophiocephala (Schmidt, 1861) (3, 5)

Digenobothrium Palombi, 1926

Digenobothrium inerme Palombi, 1926 (5) (*)

Note

Digenobothrium inerme: Specie di dubbia validità.

Monotoplanidae

Monotoplana Meixner, 1938

Monotoplana diorchis Meixner, 1938 (3, 4)

Nematoplanidae

Nematoplana Meixner, 1938

Nematoplana corsicana Curini-Galletti & Martens, 1992 (3)
Nematoplana riegeri Curini-Galletti & Martens, 1992 (3, 4)

Otomesostomidae

Otomesostoma Graff, 1882

Otomesostoma auditivum (du Plessis, 1874) (N)

Otoplanidae

Otoplana du Plessis, 1889

Otoplana intermedia du Plessis, 1889 (3, 5)

Otoplana truncaspina Lanfranchi, 1969 (3)

Archotoplana Ax, 1956

Archotoplana holotricha Ax, 1956 (3)

Monostichoplana Ax, 1956

Monostichoplana filum (Meixner, 1938)

Monostichoplana filum neapolitana Ax, Weidemann & Ehlers, 1978 (3)

Napoliplana Ax, Weidemann & Ehlers, 1978

Napoliplana cinctata Ax, Weidemann & Ehlers, 1978 (3)

Notocaryoturbella Lanfranchi, 1969

Notocaryoturbella bigermaria Lanfranchi, 1969 (3)

Orthoplana Steinböck, 1927

Orthoplana mediterranea Ax, 1956 (3)

Parotoplana Meixner, 1938

Parotoplana circinnata (Calandruccio, 1897) (3)

Parotoplana macrostyla Lanfranchi, 1978 (3)

Parotoplana multispinosa Ax, 1956 (3)

Parotoplana papii Ax, 1956 (5)

Parotoplana procerostyla Ax, 1956 (3)

Parotoplana renatae Ax, 1956 (3)

Parotoplana uncinata Lanfranchi, 1978 (3)

Parotoplanella Ax, 1956

Parotoplanella heterorhabditica Lanfranchi, 1969 (3, 5)

Parotoplanella progermaria Ax, 1956 (5)

Postbursoplana Ax, 1956

Postbursoplana fibulata Ax, 1956 (3)

Postbursoplana macromystax Lanfranchi, 1969 (3)

Postbursoplana tyrrhenica Lanfranchi, 1969 (3)

Triporoplana Ax, 1956

Triporoplana synsiphonioides Ax, 1956 (3)

Xenotoplana Ax, Weidemann & Ehlers, 1978

Xenotoplana acus Ax, Weidemann & Ehlers, 1978 (3)

Xenotoplana tyrrhenica Ax, Weidemann & Ehlers, 1978 (3)

Seriata

Cercyridae

Cercyra Schmidt, 1861

Cercyra hastata Schmidt, 1861 (3, 4)

Cerbussowia Wilhelmi, 1909

Cerbussowia cerruti Wilhelmi, 1909 (3, 4)

Sabussowia Böhmig, 1906

Sabussowia dioica (Claparède, 1863) (3, 4)

Procerodidae

Procerodes Girard, 1850

Procerodes dohrni Wilhelmi, 1909 (3, 5)

Procerodes lobatus Schmidt, 1861 (3, 4, 5)

Rhynchodemidae

Geobenazzia Minelli, 1974

Geobenazzia tyrrhenica Minelli, 1974 (S)

Microplana Vejdovský, 1890

Microplana giustii Minelli, 1977 (S)

Microplana henrici (Bendl, 1908) (N)

Microplana terrestris (O.F. Müller, 1774) (N, S)

Rhynchodemus Leidy, 1851

Rhynchodemus sylvaticus (Leidy, 1851) (N, S)

Bipaliidae

Bipalium Stimpson, 1857

Bipalium kewense Moseley, 1878 (N, S, Si, Sa) (*)

Note

Bipalium kewense: Specie importata dal nuovo continente tramite la terra di piante tropicali ed oggi presente in molte serre e giardini di tutta Italia.

Dugesiidae

***Dugesia* (*Schmidtea*)** Ball, 1974

Dugesia (*Schmidtea*) *lugubris* (Schmidt, 1861) (N, S, Si, Sa)

Dugesia (*Schmidtea*) *polychroa* (Schmidt, 1861) (N, S, Si, Sa)

Dugesia (*Schmidtea*) *mediterranea* Benazzi, Baguñá, Ballester, Puccinelli & Del Papa, 1975 (Si, Sa)

Dugesia (*Schmidtea*) *nova* Benazzi, 1983 (N, S)

***Dugesia* (*Dugesia*)** Ball, 1974

Dugesia (*Dugesia*) *benazzii* Lepori, 1951 (N, S, Si, Sa)

Dugesia (*Dugesia*) *brigantii* De Vries & Benazzi, 1983 (N)

Dugesia (*Dugesia*) *etrusca* Benazzi, 1944

Dugesia (*Dugesia*) *etrusca etrusca* Benazzi, 1944 (S)

Dugesia (*Dugesia*) *etrusca labronica* Lepori, 1950 (S)

Dugesia (*Dugesia*) *etrusca monoadenodactyla* Lepori, 1947 (S, Sa)

Dugesia (*Dugesia*) *gonocephala* (Dugès, 1830) (N, S, Si, Sa)

Dugesia (*Dugesia*) *hepta* Pala, Casu & Vacca, 1980 (Sa)

Dugesia (*Dugesia*) *ilvana* Lepori, 1948 (S)

Dugesia (*Dugesia*) *liguriensis* De Vries, 1988 (N)

Dugesia (*Dugesia*) *sicula* Lepori, 1948 (S, Si, Sa)

Dugesia (Dugesia) subtentaculata (Draparnaud, 1801) (N, S)

Dugesia (Girardia) Ball, 1974

Dugesia (Girardia) tigrina (Girard, 1850) (N, S) (*)

Note

Dugesia (Schmidtea): De Vries & Sluys (1991) hanno proposto di elevare a rango di genere questo sottogenere.

Dugesia (Dugesia): De Vries & Sluys (1991) hanno proposto di elevare a rango di genere questo sottogenere.

Dugesia (Girardia): De Vries & Sluys (1991) hanno proposto di elevare a rango di genere questo sottogenere.

Dugesia (Girardia) tigrina: Specie importata dal Nord America.

Planariidae

Planaria O.F. Müller, 1776

Planaria torva (O.F. Müller, 1774) (N, S)

Atrioplanaria de Beauchamp, 1932

Atrioplanaria morisii Benazzi & Gourbault, 1977 (N)

Atrioplanaria racovitzae (de Beauchamp, 1928) (S, Sa)

Crenobia Kenk, 1930

Crenobia alpina (Dana, 1766)

Crenobia alpina alpina (Dana, 1766) (N, S, Si, Sa)

Crenobia alpina teratophila (Steinmann, 1908) (N)

Phagocata Leidy, 1847

Phagocata vitta (Dugès, 1830) (S, Sa)

Polycelis Ehrenberg, 1831

Polycelis benazzii de Beauchamp, 1955 (N)

Polycelis felina (Dalyell, 1814) (N, S)

Polycelis nigra (O.F. Müller, 1774) (N, S)

Polycelis tenuis Ijima, 1884 (N, S)

Dendrocoelidae

Dendrocoelum Örsted, 1844

- Dendrocoelum album* (Steinmann, 1910) (N)
- Dendrocoelum beauchampi* Del Papa, 1952 (N)
- Dendrocoelum benazzii* Del Papa, 1973 (S)
- Dendrocoelum collini* (de Beauchamp, 1919) (N)
- Dendrocoelum italicum* Vialli, 1937 (N, S)
- Dendrocoelum lacteum* (O.F. Müller, 1774) (N, S)

Rhabdocoela

Dalyelliidae

Dalyellia Flemming, 1822

- Dalyellia cetica* Reisinger, 1924 (N)
- Dalyellia scoparia* (O. Schmidt, 1858) (N)
- Dalyellia styriaca* Reisinger, 1924 (N)
- Dalyellia tatraica* Gieysztor, 1938 (N)
- Dalyellia viridis* (G. Shaw, 1791) (N, S)

Castrella Fuhrmann, 1900

- Castrella truncata* (Abildgaard, 1789) (N, S)

Fulinskiella Gieysztor & Szynal, 1939

- Fulinskiella bordeau* (Steinböck, 1926) (N)

Gieysztor Ruebush & Hayes, 1939

- Gieysztor* *cuspidata* (O. Schmidt, 1861) (N, S)
- Gieysztor* *diadema* (Hofsten, 1907) (N, S)
- Gieysztor* *euchroa* (Gieysztor, 1926) (N)
- Gieysztor* *expedita* (Hofsten, 1907) (N)
- Gieysztor* *foreli* (Hofsten, 1911) (N)
- Gieysztor* *infundiboliformis* (Fuhrmann, 1894) (N)
- Gieysztor* *italica* Luther, 1955 (N)
- Gieysztor* *lugubris* Reisinger, 1924 (N)
- Gieysztor* *macrovariata* (Weise, 1942) (S)
- Gieysztor* *ornata* (Hofsten, 1907) (N)
- Gieysztor* *pisana* Kolasa, 1980 (S)
- Gieysztor* *rubra* (Fuhrmann, 1894) (N)
- Gieysztor* *triquetra* (Fuhrmann, 1894) (N)
- Gieysztor* *virgulifera* (Plotnikov, 1906) (N)

Microdalyellia Gieysztor, 1938

- Microdalyellia armigera* (O. Schmidt, 1861) (N, S)
- Microdalyellia brevimana* (Beklemischev, 1921) (N)
- Microdalyellia dastychi* Kolasa, 1980 (S)
- Microdalyellia fusca* (Fuhrmann, 1894) (N)
- Microdalyellia microphthalma* (Vejdovský, 1895) (S)
- Microdalyellia schmidtii* (Graff, 1882) (S)
- Microdalyellia tennesseensis* (Ruebush & Hayes, 1939) (S)

Thalassovortex Papi, 1956

- Thalassovortex tyrrhenicus* Papi, 1956 (3)

Fecampiidae

Fecampia Giard, 1886

- Fecampia erythrocephala* Giard, 1886 (3, 5)

Graffillidae

Graffilla Ihering, 1880

- Graffilla muricicola* Ihering, 1880 (4)

Bresslauilla Reisinger, 1929

- Bresslauilla relictata* Reisinger, 1929 (N, S)

Paravortex Wahl, 1906

- Paravortex scrobiculariae* (Graff, 1882) (4)

Provorticidae

Hangethelia Karling, 1940

- Hangethelia calceifera* Karling, 1940 (4)

Haplovortex Reisinger, 1924

- Haplovortex bryophilus* Reisinger, 1924 (N)

Pogaina Marcus, 1954

Pogaina suecica (Luther, 1948) (4)

Provortex Graff, 1882

Provortex sphagnorum (Sekera, 1911) (S)

Vejdovskya Graff, 1905

Vejdovskya adriatica Dörler, 1900 (4)

Vejdovskya pellucida (M. Schultze, 1851) (3, 4)

Umagillidae

Anoplodiopsis Westblad, 1953

Anoplodiopsis gracilis Westblad, 1953 (4)

Anoplodium Schneider, 1858

Anoplodium parasiticum Schneider, 1858 (4)

Syndesmis Silliman, 1881

Syndesmis echinorum François, 1886 (4)

Umagilla Wahl, 1909

Umagilla forskalensis Wahl, 1909 (4)

Urastomidae

Urastoma Dörler, 1900

Urastoma cyprinae (Graff, 1882) (3, 4)

Genostomidae

Genostoma Dörler, 1900

Genostoma marsiliensis (Calandruccio, 1897) (3, 4)

Genostoma tergestinum (Calandruccio, 1897) (3, 4)

Byrsophlebidae

Maehrenthalia Graff, 1905

Maehrenthalia agilis (Levinsen, 1879) (3)

Carcharodopharyngidae

Carcharodopharynx Poche, 1926

Carcharodopharynx arcanus (Reisinger, 1924) (N)

Promesostomidae

Brinkmaniella Luther, 1943

Brinkmaniella macrostomoides Luther, 1948 (4)

Promesostoma Graff, 1882

Promesostoma marmoratum (M. Schultze, 1851) (3, 4, 5)

Promesostoma solea (O. Schimdt, 1857) (3, 4, 5)

Westbladiella Luther, 1943

Westbladiella angulifera Riedl, 1954 (3)

Westbladiella falcifera Riedl, 1954 (3, 5)

Westbladiella tubifera Riedl, 1956 (4)

Solenopharyngidae

Culleopharynx Ehlers, 1972

Culleopharynx armatus (Riedl, 1956) (4)

Solenopharynx Graff, 1882

Solenopharynx flavidus Graff, 1882 (3, 4)

Sopharynx Beklemischev, 1929

Sopharynx oculatus (Pereyaslavzewa, 1892) (3)

Trigonostomidae

Ceratopera Den Hartog, 1964

- Ceratopera axi* (Riedl, 1954) (3, 5)
- Ceratopera gracilis* (Graff, 1882) (3, 4)
- Ceratopera reisingeri* (Riedl, 1959) (3)
- Ceratopera sellai* (Steinböck, 1933) (4)
- Ceratopera steinbocki* (Riedl, 1959) (3)

Marinellia Riedl, 1954

- Marinellia lingulifera* Riedl, 1954 (3)

Paramesostoma Attems, 1896

- Paramesostoma neapolitanum* (Graff, 1882) (3, 5)

Proxenetes Jensen, 1878

- Proxenetes angustus* Ax, 1951 (3)
- Proxenetes flabellifer* Jensen, 1878 (4)

Ptychopera den Hartog, 1964

- Ptychopera plebeia* (Beklemischev, 1927) (3)
- Ptychopera westbladi* (Luther, 1943) (3)

Trigonostomum O. Schmidt, 1852

- Trigonostomum coronatum* (Graff, 1882) (3)
- Trigonostomum penicillatum* (O. Schmidt, 1857) (3, 5)
- Trigonostomum quadrifolium* Riedl, 1954 (3, 5)
- Trigonostomum setigerum* O. Schmidt, 1852 (3, 4)
- Trigonostomum venenosum* (Uljanin, 1870) (3)

Typhloplanidae

Acrochordonoposthia Reisinger, 1924

- Acrochordonoposthia conica* Reisinger, 1924 (S)

Adenocerca Reisinger, 1924

- Adenocerca minima* Kolasa, 1980 (S)

Adenoplea Reisinger, 1924

Adenoplea meridionalis Kolasa, 1980 (S)

Amphibolella Findenegg, 1924

Amphibolella segnis Findenegg, 1924 (N)

Ascophora Findenegg, 1924

Ascophora elegantissima Findenegg, 1924 (S)

Ascophora paradoxa Findenegg, 1924 (N, S)

Bothromesostoma M. Braun, 1885

Bothromesostoma personatum (O. Schmidt, 1848) (N, S)

Castrada O. Schmidt, 1861

Castrada affinis Hofsten, 1907 (N)

Castrada armata (Fuhrmann, 1894) (N)

Castrada beklemischevi Papi, 1959 (3)

Castrada brevispina Papi, 1959 (S)

Castrada cristatispina Papi, 1951 (S)

Castrada hofmanni Braun, 1885 (N, S)

Castrada inermis Hofsten, 1911 (N)

Castrada infernalis Papi, 1951 (S)

Castrada instructa Hofsten, 1907 (N)

Castrada intermedia (Volz, 1898) (N, S)

Castrada lanceola M. Braun, 1885 (N)

Castrada luteola Hofsten, 1907 (N)

Castrada montana Papi, 1959 (S)

Castrada neocomensis Volz, 1898 (N)

Castrada noemiae Papi, 1951 (N)

Castrada perspicua Fuhrmann, 1894 (N)

Castrada quadridentata Hofsten, 1911 (N)

Castrada rhaetica Hofsten, 1911 (N)

Castrada sphagnetorum Luther, 1904 (N)

Castrada spinulosa Hofsten, 1907 (N) (*)

Castrada stagnorum Luther, 1904 (N)

Castrada viridis Volz, 1898 (N, S)

Castradella (Nasonov, 1926)

Castradella baldii (Steinböck, 1949) (N, S)

Castradella utheri Papi, 1959 (S)

Chorizogynopora Reisinger, 1924

Chorizogynopora italica Kolasa, 1980 (S)

Dochmiotrema Hofsten, 1907

Dochmiotrema limicola Hofsten, 1907 (S)

Haloplanella Luther, 1946

Haloplanella multifida Riedl, 1954 (3, 5)

Haloplanella pusilla Riedl, 1959 (3)

Krumbachia Reisinger, 1924

Krumbachia paludicola Schwank, 1979 (S)

Krumbachia subterranea Reisinger, 1924 (N)

Limonoruanis Kolasa, 1977

Limonoruanis romanae Kolasa, 1977 (S)

Lioniella Riedl, 1954

Lioniella petiti Riedl, 1954 (3, 5)

Lutheria Hofsten, 1907

Lutheria maroderi (Gieysztor, 1938) (S)

Lutheria minuta Hofsten, 1907 (N, S)

Mesocastrada Volz, 1898

Mesocastrada fuhrmanni Volz, 1898 (S)

Mesostoma Ehrenberg, 1837

Mesostoma benazzii Papi, 1949 (S)

Mesostoma craci (O. Schmidt, 1858) (N, S)

Mesostoma ehrenbergii (Föcke, 1836) (N, S)

Mesostoma lingua (Abildgaard, 1789) (N, S)

Mesostoma productum (O. Schmidt, 1848) (N, S)

Mesostoma sibollae Kolasa, 1976 (S)

Mesostoma viaregginum Kolasa, 1976 (S)

Notomonoophorum Luther, 1948

Notomonoophorum caecum Luther, 1948 (4)

Olisthanella Voigt, 1892

Olisthanella lutheophila Kolasa, 1980 (S)
Olisthanella obtusa (M. Schultze, 1851) (N)
Olisthanella truncula (O. Schmidt, 1858) (N, S)

Opisthomum O. Schmidt, 1848

Opisthomum fuscum Weise, 1942 (S)
Opisthomum pallidum (O. Schmidt, 1848) (S)

Phaenocora Ehrenberg, 1835

Phaenocora clavigera Hofsten, 1907 (N)
Phaenocora rufodorsata (Sekera, 1904) (N)
Phaenocora salinarum (Graff, 1882) (4)
Phaenocora typhlops (Vejdovský, 1880) (N)
Phaenocora unipunctata (Örsted, 1843) (N, S)

Pseudobockia Kolasa, 1980

Pseudobockia limicola Kolasa, 1980 (S)

Rhynchomesostoma Luther, 1904

Rhynchomesostoma rostratum (O.F. Müller, 1774) (N, S)

Strongylostoma Örsted, 1843

Strongylostoma elongatum Hofsten, 1907 (N)
Strongylostoma radiatum (O.F. Müller, 1774) (N, S)
Strongylostoma simplex Meixner, 1915 (N)

Tetracelis Ehrenberg, 1831

Tetracelis marmorosa (O.F. Müller, 1774) (S)

Typhloplana Ehrenberg, 1831

Typhloplana viridata (Abildgaard, 1789) (N, S)

Typhloplanella Sekera, 1912

Typhloplanella halleziana (Vejdovski, 1880) (S)

Ventrociliella Kolasa, 1977

Ventrociliella romanae Kolasa, 1977 (S)

Note

Castrada spinulosa: Specie di dubbia validità.

Cicerinidae

Cicerina Giard, 1904

Cicerina remanei Meixner, 1928 (3)

Cystiplanidae

Cystiplex Karling, 1964

Cystiplex axi Karling, 1964 (3)

Gnathorhynchidae

Uncinorhyncus Karling, 1947

Uncinorhyncus flavidus Karling, 1947 (4)

Uncinorhyncus karlingi Kolasa, 1977 (S)

Koinocystidae

Itaipusa Marcus, 1949

Itaipusa acerosa (Brunet, 1972) (3)

Itaipusa karlingi Mack Fira, 1968 (3, 4)

Itaipusa similis (Brunet, 1972) (3)

Koinocystis Meixner, 1924

Koinocystis lacustris Meixner, 1926 (N, S)

Koinocystis neocomensis (Fuhrmann, 1904) (N)

Leguta Karling, 1980

Leguta chelifera (Karling, 1954) (3, 4)

Sekerana Strand, 1914

Sekerana stolzi (Sekera, 1911) (N, S)

Utelga Marcus, 1948

Utelga pseudohincke (Attems, 1897) (3)

Utelga vesiculata Brunet, 1972 (3)

Plachorynchidae

Placorhynchus Karling, 1931

Placorhynchus octaculeatus Karling, 1931 (4)

Polycystidae

Annulorhynchus Karling, 1956

Annulorhynchus adriaticus Karling, 1956 (4)

Austrorhynchus Karling, 1952

Austrorhynchus bruneti Karling, 1977 (3)

Carcharodorhynchus Meixner, 1938

Carcharodorhynchus polyorchis L'Hardy, 1963 (3)

Carcharodorhynchus subterraneus Meixner, 1938 (3)

Gallorhynchus Schockaert & Brunet, 1971

Gallorhynchus mediterraneus Schockaert & Brunet, 1971 (3)

Gyratricella Karling, 1955

Gyratricella attemsi (Graff, 1913) (3) (*)

Gyratrix Ehrenberg, 1831

Gyratrix hermaphroditus Ehrenberg, 1831 (3, 4, 5)

Gyratrix proavus Meixner, 1929 (3)

Neopolycystis Meixner, 1938

Neopolycystis tridentata Karling, 1955 (3)

Opisthocystis Sekera, 1911

Opisthocystis goettei (Bresslau, 1906) (N, S)

***Phonorhynchus* Graff, 1905**

Phonorhynchus helgolandicus (Mecznicow, 1863) (4)

Phonorhynchus mamertinus (Graff, 1874) (3, 4, 5)

***Polycystis* Kölliker, 1845**

Polycystis contorta Schockaert & Karling, 1975 (3)

Polycystis crocea (O. Fabricius, 1826) (4) (*)

Polycystis naegeli Kölliker, 1845 (3, 4)

Polycystis riedli Karling, 1956 (3, 4)

***Rogneda* Uljanin, 1870**

Rogneda minuta Uljanin, 1870 (4)

Rogneda reticulata (Sekera, 1901) (4)

Rogneda steueri (Steinböck, 1933) (4)

***Typhlopolycystis* Karling, 1956**

Typhlopolycystis coomansi Schockaert & Karling, 1975 (3)

Typhlopolycystis mediterranea Brunet, 1965 (3)

Note

Gyratricella attemsi: Secondo Puccinelli e Curini-Galletti (1987) si tratta di un complesso gruppo di sibling species pressochè cosmopolita, di cui in Italia sono note almeno tre specie di acqua dolce e una marina.

Polycystis crocea: Specie di dubbia validità.

Karkinorhynchidae

***Cheliplana* de Beauchamp, 1927**

Cheliplana hypergyna Boaden, 1965 (3)

***Cheliplanilla* Meixner, 1938**

Cheliplanilla caudata Meixner, 1938 (3)

Temnocephalida

Scutariellidae

Bubaloceros Matjasic, 1958

Bubaloceros sp. (N) (*)

Scutariella Mrazek, 1907

Scutariella sp. (N) (*)

Troglocaridicola Matjasic, 1958

Troglocaridicola istriana Matjasic, 1958 (N)

Note

Bubaloceros sp.: Trovata da Gasparo, Brandmayr & Minelli (1984) in grotte carsiche.

Scutariella sp.: Trovata da Gasparo, Brandmayr & Minelli (1984) in grotte carsiche.

Digenea

Gasterostomata

Bucephalidae

Bucephalopsis (Diesing, 1855)

Bucephalopsis gracilescens (Rudolphi, 1819) Eckmann, 1932 (4) (O)

Bucephalopsis tergestina (Stossich, 1883) Nagaty, 1937 (4) (O)

Bucephalus Baer, 1827

Bucephalus labracis Paggi & Orecchia, 1965 (3) (O)

Bucephalus polymorphus Baer, 1827 (3, 4) (O)

Labratrema Maillard, 1975

Labratrema minimus (Stossich, 1887) Maillard, 1975 (3, 4) (O)

Prosorhynchus Odhner, 1905

Prosorhynchus crucibulum (Rudolphi, 1819) Odhner, 1905 (3) (O)

Rhipidocotyle Diesing, 1858

Rhipidocotyle galeata (Rudolphi, 1819) Eckmann, 1932 (3, 4) (O)

Rhipidocotyle illensis (Ziegler, 1883) Dyk, 1954 (N) (O)

Prosostomata

Acanthocolpidae

Deropristis Odhner, 1902

Deropristis hispida (Rudolphi, 1819) Odhner, 1902 (4) (O)

Deropristis inflata (Molin, 1858) Odhner, 1902 (3, 4, 5) (O)

Stephanostomum Loos, 1899

Stephanostomum baccatum (Nicoll, 1907) Manter, 1934 (3) (O)

Stephanostomum bicoronatum (Stossich, 1883) Fuhrmann, 1928 (3, 4) (O)

Stephanostomum caducum (Looss, 1901) Manter, 1934 (4) (O)

Stephanostomum cesticillus (Molin, 1858) Looss, 1899 (3, 4) (O)

Acanthostomidae

Acanthostomum Looss, 1899

Acanthostomum absconditum (Looss, 1901) Sohar, 1934 (4) (O)

Acanthostomum inerme Stossich, 1905 (4) (O)

Anisocladium Looss, 1902

Anisocladium fallax (Rudolphi, 1819) Looss, 1902 (3, 4) (O)

Anisocoelium Lühe, 1900

Anisocoelium capitellatum (Rudolphi, 1819) Lühe, 1900 (3, 4) (O)

Anoiktostoma Stossich, 1894

Anoiktostoma coronatum (Wagener, 1852) Stossich, 1899 (3, 4) (O)

Timoniella Rebecq, 1960

Timoniella imbutiforme (Molin, 1859) Brooks, 1980 (3, 4) (O)

Timoniella praeteritum (Looss, 1901) Maillard, 1974 (3) (O)

Accacoeliidae

Accacladocoelium Odhner, 1928

Accacladocoelium macrocotyle (Diesing, 1858) Robinson, 1934 (3) (O)
Accacladocoelium nigroflavum (Rudolphi, 1819) Robinson, 1934 (3) (O)
Accacladocoelium petasiporum Odhner, 1928 (3, 4) (O)

Accacoelium Monticelli, 1893

Accacoelium contortum (Rudolphi, 1819) Looss, 1899 (3) (O)
Accacoelium pelagiae (Kölliker, 1849) Monticelli, 1893 (3) (O)

Odhnerium Yamaguti, 1934

Odhnerium calyptocotyle (Monticelli, 1893) Yamaguti, 1934 (4) (O)

Orophocotyle Looss, 1902

Orophocotyle divergens Looss, 1902 (4) (O)
Orophocotyle planci (Stossich, 1899) Looss, 1902 (4) (O)

Rhynchopharynx Odhner, 1928

Rhynchopharynx paradoxa Odhner, 1928 (4) (O)

Tetrochetus Looss, 1912

Tetrochetus raynerii (Nardo, 1833) Looss, 1912 (3, 4) (O)

Allocreadiidae

Allocreadium Looss, 1900

Allocreadium isoporum (Looss, 1894) Odhner, 1901 (N) (O)

Crepidostomum Braun, 1900

Crepidostomum auriculatum (Wedl, 1858) Lühe, 1909 (N) (O)
Crepidostomum farionis (O.F. Müller, 1780) (S) (O)

Nicolla Wisniewski, 1934

Nicolla gallica (Dollfus, 1941) Dollfus, 1959 (3) (O)

Angiodictyidae

Deuterobaris Looss, 1900

Deuterobaris proteus (Brandes, 1891) Looss, 1902 (5?) (R Te) (*)

Note

Deuterobaris proteus: Ospite indicato, "Chelonia viridis"; manca la zona di raccolta.

Aporocotyliidae

Aporocotyle Odhner, 1900

Aporocotyle spinosicanalis Williams, 1958 (3) (O)

Azygiidae

Azygia Looss, 1899

Azygia lucii (O.F. Müller, 1776) (S) (O)

Otodistomum Stafford, 1904

Otodistomum veliporum (Creplin, 1837) Stafford, 1904 (3, 4) (C)

Brachycoeliidae

Brachycoelium Dujardin, 1845

Brachycoelium retusum (Dujardin, 1845) Hall, 1929 (N) (A An)

Brachycoelium salamandrae (Froelich, 1789) Lühe, 1909 (N, S, Si, Sa) (A An) (*)

Note

Brachycoelium salamandrae: Sin. B. crassicolle Rudolphi, 1809; in Parona (1912).

Brachylaimidae

Brachylaima Dujardin, 1843

Brachylaima columbae (Mazzanti, 1889) Dollfus, 1934 (S) (U Co)

Brachylaima corrugatum (Dujardin, 1845) Dollfus, 1934 (M In) (*)

Brachylaima erinacei Blanchard, 1847 (N, S) (M In) (*)

Brachylaima fuscatum (Rudolphi, 1819) Joyeux, Baer & Timon-David, 1932 (S) (U Ga) (*)

Brachylaima mesostoma (Rudolphi, 1803) Baer, 1933 (N) (U Co)

Brachylaima migrans Dujardin, 1845 (M In) (*)

Brachylaima recurvum (Dujardin, 1845) Joyeux & Foley, 1930 (S) (M Ro)

Brachylaima suis Balozet, 1936 (S) (M Ar)

Ityogonimus Lühe, 1899

Ityogonimus ocreatus (Goeze, 1782) Lühe, 1899 (S) (M In) (*)

Postharmostomum Witenberg, 1923

Postharmostomum commutatum (Diesing, 1858) Skrjabin, 1923 (N, S, Si) (U Ga)

Postharmostomum gallinum Witenberg, 1923 (N, S, Sa) (U Co)

Note

Brachylaima corrugatum: In Stossich (1892). Esistono dubbi sulla località di raccolta.

Brachylaima erinacei: Sin. *Distoma renale* Filippi, 1855 e *B. heliciis-pomatiae* (Diesing, 1850), entrambe considerate metacercarie di *B. erinacei* Blanchard, 1847; sin. *Mesogonimus linguaeformis* Stossich, 1896, in Parona (1912).

Brachylaima fuscatum: Sin. *Distomum heteroclitum* Molin, 1858, in Parona (1912); l'assegnazione generica della specie è ancora sub judice.

Brachylaima migrans: In Stossich (1892). Esistono dubbi sulla località di raccolta.

Ityogonimus ocreatus: In Parona come *Monostomum ocreatum* Zeder, 1800.

Brauninidae

Braunina Heider, 1900

Braunina cordiformis Wolf, 1903 (4) (M Ce)

Bunocotylidae

Aphanurus Looss, 1907

Aphanurus stossichi (Monticelli, 1891) Looss, 1907 (3) (O)

Saturnius Manter, 1969

Saturnius papernai Overstreet, 1977 (3, 5) (O)

Campulidae

Campula Cobbold, 1858

Campula oblonga (Cobbold, 1858) Braun, 1900 (3, 4) (M Ce) (*)

Campula rochebruni (Poirier, 1886) Bittner & Sprehn, 1928 (3) (M Ce) (*)

Lecithodesmus Braun, 1902

Lecithodesmus delphini (Poirier, 1886) Yamaguti, 1958 (3, 4, 5) (M Ce) (*)
Lecithodesmus goliath (van Beneden, 1858) Odhner, 1905 (3, 4, 5) (M Ce)
Lecithodesmus palliatus (Looss, 1885) Yamaguti, 1958 (3) (M Ce) (*)

Leucasiella Krotov & Deliamure, 1952

Leucasiella deliamurei Raga, 1988 (3) (M Ce)

Oschmarinella Skrjabin, 1947

Oschmarinella mascomai Raga, 1987 (3) (M Ce)

Synthesium Stunkard & Alvey, 1930

Synthesium tursionis (Marchi, 1873) Price, 1932 (4) (M Ce) (*)

Note

Campula oblonga: In Stossich (1892) come Distoma (Brachylaimus) oblongum (Cobbold, 1858); sinonimia riportata da Dawes (1946), omessa da Yamaguti (1971).
Campula rochebruni: Assegnata da Stossich (1892) al genere Cladocoelium.
Lecithodesmus delphini: Assegnata da Stossich (1892) al genere Cladocoelium.
Lecithodesmus palliatus: Assegnata da Stossich (1892) al genere Cladocoelium.
Synthesium tursionis: Distoma (Dicrocoelium) t. in Parona (1896).

Cathaemasiidae

Cathaemasia Looss, 1899

Cathaemasia hians (Rudolphi, 1809) Looss, 1899 (N, Sa) (U Cc)

Clinostomidae

Clinostomum Leidy, 1856

Clinostomum complanatum (Rudolphi, 1814) Braun, 1899 (N) (U As) (*)
Clinostomum foliiforme Braun, 1899 (N, S, Si, Sa) (U Cc)

Euclinostomum Travassos, 1928

Euclinostomum heterostomum (Rudolphi, 1809) Travassos, 1928 (N) (U Cc)

Note

Clinostomum complanatum: Sin. Distoma (Clinostomum) marginatum (Rudolphi, 1819) citato, come specie valida, da Parona (1912). *C. marginatum* sensu Molin, 1858 in *Anas* sp. (Padova) va considerato species inquirenda.

Collyriclidae

Collyriclum Kossack, 1911

Collyriclum faba (Bremser in Schmalz, 1831) Kossack, 1911 (N, S, Sa) (U Pa)

Cryptogonimidae

Aphallus Poche, 1926

Aphallus fuscescens (Rudolphi, 1819) (4) (O)

Aphallus tubarium (Rudolphi, 1819) Poche, 1926 (3) (O)

Metadena Linton, 1910

Metadena depressa (Stossich, 1883) Janiszewska, 1951 (4) (O)

Cyathocotylidae

Cyathocotyle Mühling, 1896

Cyathocotyle prussica Mühling, 1896 (N) (U As)

Cyclocoelidae

Allopyge Johnston, 1913

Allopyge adolphi (Stossich, 1902) Johnston, 1914 (N) (U Gr)

Cyclocoelum Brandes, 1892

Cyclocoelum dollfusi Timon-David, 1950 (N) (U Pa)

Cyclocoelum mutabile (Zeder, 1800) Stossich, 1902 (N, S) (U Ca) (*)

Cyclocoelum obscurum (Leidy, 1887) Harrah, 1922 (S) (U Ca)

Cyclocoelum ovopunctatum Stossich, 1902 (N) (U Ca) (*)

Cyclocoelum polonicum (Machalska, 1980) (N) (U Pa)

Cycloprimum Witenberg, 1923

Cycloprimum exile (Stossich, 1902) Witenberg, 1922 (N) (U Ca)

***Haematotrephus* Stossich, 1902**

Haematotrephus fasciatum Stossich, 1902 (S) (U Ca) (*)

Haematotrephus lanceolatum (Wedl, 1858) Stossich, 1902 (N, S) (U Ca) (*)

***Hyptiasmus* Kossack, 1911**

Hyptiasmus arcuatus (Stossich, 1902) Kossack, 1911 (N) (U As)

Hyptiasmus robustus (Stossich, 1902) Kossack, 1911 (N) (U As) (*)

***Ophthalmophagus* Stossich, 1902**

Ophthalmophagus singularis Stossich, 1902 (N) (U Cc)

***Promptenovum* Witenberg, 1923**

Promptenovum vanbenedeni Witenberg, 1923 (S) (U Ca)

***Tracheophilus* Skrjabin, 1913**

Tracheophilus sisowi Skrjabin, 1913 (N) (U As)

Note

Cyclocoelum mutabile: Sin. *Cephalogonimus ovatus* (Rudolphi, 1803) in Stossich (1896). Di *Monostomum ovatum* Molin, 1859, assegnato a *Notocotylus* da Monticelli (1892) e citato da Parona (1912), non ritroviamo più tracce nella letteratura.

Cyclocoelum ovopunctatum: Specie valida secondo Dubois (1959) e non sinonimo di *C. obscurum* (Leidy, 1887).

Haematotrephus fasciatum: *Monostomum fasciatum* in Parona (1912); Witenberg (1923) trasferisce la specie a *Haematoprimum*.

Haematotrephus lanceolatum: In *Monostomum lanceolatum* in Parona (1912).

Hyptiasmus robustus: Stossich (1902), citato da Parona (1912), usa il nome generico *Cyclocoelum*. Specie assegnata da alcuni autori al genere *Prohyptiasmus* Witenberg, 1923, sinonimo di *Hyptiasmus* secondo Lal (1939).

Derogenidae

***Arnola* Strand, 1942**

Arnola microcirrus (Vlasenko, 1931) (4) (O)

***Derogenes* Lühe, 1900**

Derogenes adriaticus Nikolaeva, 1966 (4) (O)

Derogenes affine (Rudolphi, 1819) Lühe, 1900 (4) (O)

Derogenes latus Janiszewska, 1953 (3, 4) (O)
Derogenes minor Looss, 1901 (4) (O)
Derogenes varicus (O.F. Müller, 1784) Looss, 1901 (3, 4) (O)

Tyrrhenia Paggi & Orecchia, 1975

Tyrrhenia blennii Paggi & Orecchia, 1975 (3) (O)

Dicrocoeliidae

Brachylecithum Shtrom, 1940

Brachylecithum aetechini Dollfus, 1951 (S) (M In)
Brachylecithum attenuatum (Dujardin, 1845) Shtrom, 1940 (N, S, Si, Sa) (U Pa)
Brachylecithum filum (Dujardin, 1845) Shtrom & Sondak, 1935 (N, S, Si, Sa) (U Pa)
Brachylecithum platynosomoides Potekhina, 1948 (N) (U Co)

Dicrocoelium Dujardin, 1845

Dicrocoelium dendriticum (Rudolphi, 1819) Looss, 1899 (N, S, Si, Sa) (M Ar) (*)

Lyperosomum Looss, 1899

Lyperosomum longicauda (Rudolphi, 1809) Looss, 1899 (S) (U Pa) (*)
Lyperosomum vulpis Paggi & Biocca, 1959 (N, S, Si, Sa) (M Cv)

Paradistomum Kossack, 1910

Paradistomum mutabile (Molin, 1859) Travassos, 1920 (N, S, Si) (R Sq)

Platynosomum Looss, 1907

Platynosomum semifusum Looss, 1907 (N) (U Ac)

Note

Dicrocoelium dendriticum: Sin. *D. lanceolatum* Mehlis (?), in Parona (1912).
Lyperosomum longicauda: Sin. *Distoma macrourum* Rudolphi, 1819, in Parona (1912).

Didymozoidae

Coeliotrema Yamaguti, 1938

Coeliotrema thynni Yamaguti, 1938 (3) (O)

Didymocystis Ariola, 1902

Didymocystis thynni (Taschenberg, 1879) Ariola, 1902 (3, 4) (O)
Didymocystis wedli Ariola, 1902 (3) (O)

Didymozoon Taschenberg, 1878

Didymozoon auxis Taschenberg, 1879 (3) (O)
Didymozoon pretiosum Ariola, 1902 (3) (O)
Didymozoon serrani Monticelli, 1889 (3) (O)
Didymozoon sphyraenae Taschenberg, 1878 (3) (O)
Didymozoon taenioides Monticelli, 1883 (3) (O)

Kollikeria Cobbold, 1860

Kollikeria benedenii (Monticelli, 1893) MacCallum & MacCallum, 1916 (3) (O)
Kollikeria bipartita (Wedl, 1855) Ishii, 1935 (3, 4) (O)
Kollikeria exocoeti (Parona & Perugia, 1893) MacCallum & MacCallum, 1916 (3) (O)
Kollikeria filicollis (Rudolphi, 1819) Cobbold, 1860 (3) (O)
Kollikeria micropterygis (Richardi, 1902) MacCallum & MacCallum, 1916 (3) (O)

Nematobothrium (Maclarenouzoum) Ishii, 1935

Nematobothrium (Maclarenouzoum) molae (Maclaren, 1904) (3) (O)

Nematobothrium (Nematobothrium) van Beneden, 1858

Nematobothrium (Nematobothrium) pelamydis (Taschenberg, 1879) Ishii, 1935 (3) (O)
Nematobothrium (Nematobothrium) scombri (Taschenberg, 1879) Ishii, 1935 (3, 4) (O)

Tricharrhen Poche, 1926

Tricharrhen okenii (Koelliker, 1849) Poche, 1926 (3) (O)

Diplostomidae

Alaria Schrank, 1788

Alaria alata (Goeze, 1782) Krause, 1914 (N) (M Cv) (*)

Diplostomum v. Nordmann, 1832

Diplostomum auriflavum Molin, 1859 (N) (U Cc)
Diplostomum commutatum (Diesing, 1850) Dubois, 1937 (N, S, Si, Sa) (U La) (*)
Diplostomum spathaceum (Rudolphi, 1819) Olsson, 1876 (N) (U La) (*)

Hysteromorpha Lutz, 1931

Hysteromorpha triloba (Rudolphi, 1819) Lutz, 1931 (N) (U Cc) (*)

Neodiplostomum Railliet, 1819

Neodiplostomum pseudattenuatum (Dubois, 1928) Dubois, 1932 (Sa) (U Ac)

Neodiplostomum spathula (Creplin, 1829) La Rue, 1926 (N) (U Ac) (*)

Posthodiplostomum Dubois, 1936

Posthodiplostomum cuticola (v. Nordmann, 1832) Dubois, 1936 (N) (U Cc) (*)

Tylodelphys Diesing, 1850

Tylodelphys excavata (Rudolphi, 1803) Szidat, 1935 (N, S, Si, Sa) (U Ac) (*)

Uvulifer Yamaguti, 1934

Uvulifer denticulatus (Rudolphi, 1819) Dubois, 1937 (N) (U Co)

Note

Alaria alata: Hemistomum alatum, in Parona (1912).

Diplostomum commutatum: Proveniente da una delle tre frazioni in cui è stato suddiviso il materiale descritto da Brandes (1888) come Hemistomum pileatum (vedi nota seguente). La presenza in Italia di commutatum è ancora dubbia.

Diplostomum spathaceum: Sin. Hemistomum pileatum sensu Brandes, 1888 partim; le altre frazioni sono: Diplostomum mergi Dubois, 1932, non rinvenuto in Italia; Diplostomum commutatum (Diesing, 1850) (=069.0.002.0) e Cotylurus pileatus (Rudolphi, 1802) (=228.0.005.0). In Stossich (1895) troviamo Hemistomum pileatum Brandes, erroneamente elencato da Parona (1912), con riferimento a Stossich, come Holostomum pileatum sensu Dujardin, 1845, il quale invece corrisponde alla specie di Rudolphi (1802).

Hysteromorpha triloba: In Parona (1912) si legge Hemistomum triloba Diesing, 1850, anziché Rudolphi, 1819.

Neodiplostomum spathula: In Parona (1912) si legge Hemistomum spathula Diesing, 1850, anziché Creplin, 1829.

Posthodiplostomum cuticola: Segnalato da Parona (1912) come Diplostomum c. Diesing, 1850, allo stadio di metacercaria in Cobitis sp. La forma adulta deve trovarsi nei Cicogniformi, ospiti definitivi.

Tylodelphys excavata: Esistono dubbi sull'esatta località di raccolta per Cicogniformi ed Anseriformi. Segnalata da Parona (1912) come metacercaria in Anfibi.

Echinostomatidae

Acanthoparyphium Dietz, 1909

Acanthoparyphium phoenicopteri (Lühe, 1898) Dietz, 1909 (Si, Sa) (U Fe)

Aporchis Stossich, 1905

Aporchis croaticus (Stossich, 1889) Stossich, 1905 (N) (U Pe)

Chaunocephalus Dietz, 1909

Chaunocephalus ferox (Rudolphi, 1795) Dietz, 1909 (N) (U Cc)

Echinochasmus Dietz, 1909

Echinochasmus beleocephalus (v. Linstow, 1873) Dietz, 1909 (N, S, Si, Sa) (U Cc)

Echinochasmus perfoliatus (Ratz, 1908) Dietz, 1909 (S) (M Cv)

Echinochasmus spinulosus (Rudolphi, 1809) Yamaguti, 1971 (N) (U Ca) (*)

Echinoparyphium Dietz, 1909

Echinoparyphium anceps (Molin, 1859) Yamaguti, 1958 (N) (U Ra)

Echinoparyphium baculus (Diesing, 1850) Lühe, 1909 (U As)

Echinoparyphium bioccalerouxii Dollfus, 1953 (U) (*)

Echinoparyphium elegans Looss, 1899 (Sa) (U Fe)

Echinoparyphium recurvatum (v. Linstow, 1873) Lühe, 1909 (N, S) (U As)

Echinostoma Rudolphi, 1809

Echinostoma columbae Zunker, 1925 (N) (U Co)

Echinostoma echiniferum (La Valette, 1855) Stossich, 1892 (N) (U As)

Echinostoma revolutum (Froelich, 1802) Looss, 1899 (N, S) (U As) (*)

Echinostoma sarcinum Dietz, 1909 (S) (U Ra)

Echinostoma stridulae (Reich, 1801) Dietz, 1909 (N, S, Si) (U St) (*)

Echinostoma turdi Rudolphi, 1819 (N) (U Pa) (*)

Euparyphium Dietz, 1909

Euparyphium melis (Schränk, 1788) Dietz, 1909 (N, S) (M Cv) (*)

Himasthla Dietz, 1909

Himasthla leptosoma (Creplin, 1829) Dietz, 1909 (U Ca) (*)

Himasthla militaris (Rudolphi, 1803) Dietz, 1909 (U) (*)

Hypoderaeum Dietz, 1909

Hypoderaeum conoideum (Bloch, 1782) Dietz, 1908 (N, S) (U As)

Parechinostomum Dietz, 1909

Parechinostomum cinctum (Rudolphi, 1803) Dietz, 1909 (N) (U Ra)

Patagifer Dietz, 1909

Patagifer bilobus (Rudolphi, 1819) Dietz, 1909 (N, Sa) (U Cc)

Petasisiger Dietz, 1909

Petasisiger magniovatus (Stossich, 1898) Pande, 1939 (N) (U Po)

Petasisiger pungens (v. Linstow, 1894) Yamaguti, 1971 (N) (U Pr)

Sodalis Kowalewsky, 1902

Sodalis spathulatus (Rudolphi, 1819) Kowalewsky, 1902 (N) (U Cc)

Stephanoprora Odhner, 1902

Stephanoprora denticulata (Rudolphi, 1802) Odhner, 1910 (N) (U La) (*)

Note

Echinochasmus spinulosus: Sin. *Monilifer spinulosus* (Rudolphi, 1809) Dietz, 1909.

Echinoparyphium bioccalerouxii: Forma larvale segnalata in Molluschi il cui adulto si trova in Uccelli e Mammiferi.

Echinostoma revolutum: *Distoma echinatum* Zeder, 1803 in Parona (1912) ed *E. echinocephalum*, Rudolphi, 1819 in Stossich (1892), sono entrambi sinonimi di *E. revolutum* (Froelich, 1802).

Echinostoma stridulae: Sin. *E. apiculatum* (Rudolphi, 1803) Cobbold, 1860, in Stossich (1892).

Echinostoma turdi: Sin. *E. nephrocephalum* Diesing, 1850, in Stossich (1892).

Euparyphium melis: Sin. *Distomum trigonocephalum* Rudolphi, 1802 e *D. putorii* Molin, 1859, citate entrambe da Parona (1912).

Himasthla leptosoma: Esistono dubbi sull'esatta località di raccolta.

Himasthla militaris: Esistono dubbi sull'esatta località di raccolta. Segnalato in "uccelli acquatici".

Stephanoprora denticulata: Rudolphi (1809) assegna la specie descritta nel 1802 al sottogenere *Distomum* (*Echinostomum*). In Stossich (1892) troviamo *D. (E.) denticulatum* Rudolphi, 1809, in cui la data (1802) è stata omessa.

Eumegacetidae

Eumegacetes Looss, 1900

Eumegacetes triangularis (Looss, 1899) Looss, 1900 (N) (U Cr)

Fasciolidae

Fasciola Linnaeus, 1758

Fasciola gigantica Cobbold, 1855 (N, S, Si, Sa) (M Ar)

Fasciola hepatica Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa) (M Ar)

Fascioloides Ward, 1917

Fascioloides magnus (Bassi, 1875) Ward, 1917 (N, S, Si, Sa) (M Ar)

Fellodistomidae

Bacciger Nicoll, 1914

Bacciger bacciger (Rudolphi, 1819) Nicoll, 1914 (3, 4) (O)

Monascus Looss, 1907

Monascus filiformis (Rudolphi, 1819) Looss, 1907 (3, 4) (O) (*)

Proctoeces Odhner, 1911

Proctoeces maculatus (Looss, 1901) Odhner, 1911 (4) (O)

Pronoprymna Poche, 1926

Pronoprymna ventricosa (Rudolphi, 1819) Poche, 1926 (3, 4) (O)

Steringophorus Odhner, 1905

Steringophorus furciger (Olsson, 1868) Odhner, 1905 (3) (O)

Steringotrema Odhner, 1911

Steringotrema divergens (Rudolphi, 1809) Odhner, 1911 (3, 4) (O)

Steringotrema pagelli (van Beneden, 1871) Odhner, 1911 (4) (O)

Tergestia Stossich, 1899

Tergestia laticollis (Rudolphi, 1819) Stossich, 1899 (4) (O)

Note

Monascus filiformis: Citata da Orecchia & Paggi (1978) come *Haplocladus typicus* Odhner, 1911.

Gorgoderidae

Gorgodera Looss, 1899

Gorgodera cygnoides (Zeder, 1800) Looss, 1899 (N) (A An)

Phyllodistomum Braun, 1899

Phyllodistomum acceptum Looss, 1901 (4) (O)

Phyllodistomum elongatum Nybelin, 1926 (S) (O)

Plesiochorus Looss, 1901

Plesiochorus cymbiformis (Rudolphi, 1819) Looss, 1901 (4) (R Te)

Haematoloechidae

Haematoloechus Looss, 1899

Haematoloechus variegatus (Rudolphi, 1819) Looss, 1899 (N) (A An) (*)

Note

Haematoloechus: Il genere contiene altre specie parassite di Anfibi Anuri e non si possono escludere confusioni nelle passate identificazioni (vedi nota seguente).

Haematoloechus variegatus: Secondo Monticelli (1892) anche *Monostomum ellipticum* (Rudolphi, 1819), citato da Parona (1912) e di cui si è persa ogni traccia nella letteratura, sarebbe sinonimo di *variegatus*. Looss ha descritto col nome di *variegatum* sia la specie di Rudolphi sia altre specie dello stesso genere.

Haploporidae

Dicrogaster Looss, 1902

Dicrogaster contractus Looss, 1902 (3, 4) (O)

Dicrogaster perpusilla Looss, 1902 (3, 4) (O)

Haploporus Looss, 1902

Haploporus benedeni (Stossich, 1887) Looss, 1902 (3, 4) (O)

Haploporus lateralis Looss, 1902 (5) (O)

Lecithobotrys Looss, 1902

Lecithobotrys prutrescens Looss, 1902 (3) (O)

Saccocoelium Looss, 1902

Saccocoelium obesum Looss, 1902 (3, 5) (O)

Saccocoelium tensum Looss, 1902 (3, 5) (O)

Haplospalchnidae

Haplospalchnus Looss, 1902

Haplospalchnus caudatus (Srivastava, 1937) Skrjabin & Guschanskaja, 1955 (3) (O)

Haplospalchnus pachysomus (Eysenhardt, 1829) Looss, 1902 (3, 4) (O)

Schikhobalotrema Skrjabin & Guschanskaja, 1955

Schikhobalotrema longivesiculatum Orecchia & Paggi, 1975 (3) (O)

Hemiuridae

Adinosoma Manter, 1947

Adinosoma robustum (Manter, 1934) Manter, 1947 (3) (O) (*)

Ectenurus Looss, 1907

Ectenurus lepidus Looss, 1907 (4) (O)

Halipegus Looss, 1899

Halipegus ovocaudatus (Vulpian, 1859) Looss, 1899 (S, Sa) (A An)

Hemiurus Rudolphi, 1809

Hemiurus appendiculatus (Rudolphi, 1802) Looss, 1899 (3, 4) (O)

Hemiurus luehei Odhner, 1905 (3) (O) (*)

Lecithochirium Lühe, 1901

Lecithochirium fusiforme Lühe, 1901 (4) (O) (*)

Lecithochirium musculus (Looss, 1907) Nasir & Diaz, 1971 (3, 4) (O)

Lecithochirium physcon Lühe, 1901 (4) (O) (*)

Lecithochirium rufoviride (Rudolphi, 1819) Lühe, 1901 (3, 4, 5) (O)

Lecithocladium Lühe, 1901

Lecithocladium cristatum (Rudolphi, 1819) Looss, 1907 (3, 4) (O)

Lecithocladium excisum (Rudolphi, 1819) Lühe, 1901 (3, 4, 5) (O)

Parahemiurus Vaz & Pereira, 1930

Parahemiurus merus (Linton, 1910) Manter, 1940 (3) (O)

Synaptobothrium v. Linstow, 1904

Synaptobothrium caudiporum (Rudolphi, 1819) Looss, 1907 (4) (O)

Note

Adinosoma robustum: Segnalata in Italia da Orecchia & Paggi (1978).

Hemiurus luehei: Segnalata da Orecchia & Paggi (1978) come *Hemiurus rugosus*, sinonimo di *H. luehei* secondo Gibson & Bray (1986).

Lecithochirium fusiforme: Gibson & Bray (1986) ritengono che gli esemplari raccolti in Conger conger a Venezia e identificati come *Apoblema rufoviride* da Parona (1902) siano da riferire alla specie *Lecithochirium fusiforme*.

Lecithochirium physcon: Citata da Yamaguti (1971) in *Lophius piscatorius* a Trieste.

Heterophyidae

Cryptocotyle Lühe, 1899

Cryptocotyle concava (Creplin, 1825) Lühe, 1899 (N) (U As)

Cryptocotyle jejuna (Nicoll, 1908) (N, S, Si, Sa) (M Cv)

Cryptocotyle lingua (Creplin, 1825) Fiscoeder, 1903 (N) (U La)

Euryhormis Poche, 1926

Euryhormis squamula (Rudolphi, 1819) Poche, 1926 (S) (M Cv)

Galactosomum Looss, 1899

Galactosomum erinaceum (Poirier, 1886) Bittner & Sprehn, 1928 (M Ce) (*)

Heterophyes Cobbold, 1886

Heterophyes dispar Looss, 1902 (Sa) (M Cv)

Heterophyes heterophyes (Siebold, 1852) Stiles & Hassall, 1900 (Sa) (M Cv) (*)

Phagicola Faust, 1920

Phagicola italica (Alessandrini, 1906) Price, 1932 (N, S, Sa) (M Cv)

Phagicola longicollis Kuntz & Chandler, 1956 (Sa) (M Cv)

Phagicola minuta (Looss, 1899) Price, 1932 (S) (M Cv) (*)

Note

Galactosomum erinaceum: Citata come *Astiotrema erinacea* (Poirier, 1886) da Stossich (1904). Species inquirenda segnalata nel delfino comune del Mediterraneo, senza

precisazione dell'area di raccolta.

Heterophyes heterophyes: Questa specie parassita anche uccelli, ospiti non segnalati in Italia.

Phagicola minuta: Specie riportata da Parona (1912) come *Distomum (Ascocotyle) minutum* Looss, 1899 nel cane (Roma).

Hirudinellidae

Hirudinella de Blainville, 1828

Hirudinella ventricosa (Pallas, 1774) Baird, 1853 (3, 4, 5) (O)

Lecithasteridae

Aponurus Looss, 1907

Aponurus laguncula Looss, 1907 (3) (O)

Lecithaster Lühe, 1901

Lecithaster atherinae Orecchia, Paggi & Radujkovic, 1988 (4) (O)

Lecithaster blennii Paggi & Orecchia, 1973 (3) (O)

Lecithaster confusus Odhner, 1905 (3, 4) (O)

Lecithaster gibbosus (Rudolphi, 1802) Lühe, 1901 (3, 4) (O)

Lecithaster stellatus Looss, 1906 (4) (O)

Lecithodendriidae

Allassogonoporus Olivier, 1938

Allassogonoporus amphoraeformis (Mödlinger, 1930) Odening, 1964 (N) (M Cp)

Brandesia Stossich, 1899

Brandesia turgida (Brandes, 1888) Stossich, 1899 (N) (A An)

Lecithodendrium Looss, 1896

Lecithodendrium granulosum Looss, 1907 (N) (M Cp)

Lecithodendrium linstowi Dollfus, 1931 (N) (M Cp) (*)

Lecithodendrium moedlingeri (Pande, 1935) Dollfus, 1937 (N) (M Cp)

Lecithodendrium rotundum Shtrom, 1935 (S) (M Cp)

Longitrema Chen, 1954

Longitrema chilostomum (Mehlis, 1831) Chen, 1954 (N, S) (M Cp) (*)

Matovius Jancev, 1970

Matovius rhinolophi Jancev, 1970 (S) (M Cp)

Parabascoides Stunkard, 1938

Parabascoides duboisi (Hurkova, 1961) Yamaguti, 1971 (N) (M Cp)

Parabascus Looss, 1907

Parabascus lepidotus Loos, 1907 (S) (M Cp)

Parabascus semisquamosus (Braun, 1900) Yamaguti, 1971 (N) (M Cp)

Pleurogenes Looss, 1896

Pleurogenes claviger (Rudolphi, 1819) Looss, 1899 (N, S) (A An)

Pleurogenoides Travassos, 1921

Pleurogenoides medians (Olsson, 1876) Travassos, 1921 (N) (A An)

Pleuropsolus Mehra, 1935

Pleuropsolus micrococcus (Rudolphi, 1819) Skarvilovich, 1948 (N) (U Ca)

Prosotocus Looss, 1899

Prosotocus confusus (Looss, 1894) Looss, 1899 (N) (A An)

Prosthodendrium Dollfus, 1931

Prosthodendrium ascidia (van Beneden, 1873) Bhalerao, 1936 (N, S) (M Cp) (*)

Prosthodendrium herardovae Rysavy, 1954 (S) (M Cp)

Prosthodendrium hurkovae Dubois, 1960 (S) (M Cp)

Prosthodendrium longiforme (Bhalerao, 1926) Macy, 1936 (N, S) (M Cp)

Prosthodendrium megacotyle (Ogata, 1939) Yamaguti, 1958 (N) (M Cp)

Prosthodendrium parvouterus Bhalerao, 1926 (S) (M Cp)

Pycnopor Looss, 1899

Pycnopor heteroporus (Dujardin, 1845) Looss, 1899 (N, S) (M Cp) (*)

Pycnopor hurkovae (Dubois, 1960) Caballero, 1961 (N) (M Cp)

Pycnopor macrolaimus (v. Linstow, 1894) Mehra, 1935 (N) (M Cp)

Note

Lecithodendrium linstowi: Vedi nota 136.0.001.0.

Longitrema chilostomum: In Stossich (1892) leggiamo *Distomum ascidioides* v. Beneden, 1873, sinonimo di *chilostomum* Mehlis, 1831. Secondo Macy (1936) la specie andrebbe assegnata al genere *Prosthodendrium*.

Prosthodendrium ascidia: Segnalata in Italia da Ricci (in stampa). Identificazione della specie molto difficile, letteratura confusa. Specie citata in forma larvale in *Anopheles* sp. da Parona (1912), indeterminabile.

Pycnopus heteroporus: Da Stossich (1892) e Ricci (in stampa).

Lepocreadiidae

Dihemistephanus Looss, 1901

Dihemistephanus lydiae (Stossich, 1896) Looss, 1901 (4) (O)

Holorchis Stossich, 1901

Holorchis micracanthum (Stossich, 1888) Orecchia & Paggi, 1974 (3, 4) (O)

Holorchis pycnopus Stossich, 1901 (3, 4) (O)

Lepidapedon Stafford, 1904

Lepidapedon elongatum (Lebour, 1908) Nicoll, 1915 (3) (O)

Lepidapedon guevarai Lopez-Roman & Maillard, 1973 (3) (O)

Lepidauchen Nicoll, 1913

Lepidauchen stenostoma Nicoll, 1913 (3, 4) (O)

Lepocreadium Stossich, 1904

Lepocreadium album (Stossich, 1890) Stossich, 1903 (3, 4) (O)

Lepocreadium pegorchis (Stossich, 1900) Stossich, 1903 (3, 4) (O)

Lepocreadium trullaforme Linton, 1940 (3) (O)

Opechona Looss, 1907

Opechona bacillaris (Molin, 1859) Dollfus, 1927 (3, 4) (O)

Prodistomum Linton, 1910

Prodistomum polonii (Molin, 1859) Bray & Gibson, 1990 (3, 4) (O)

Leucochloridiidae

Dollfusinus Biocca & Ferretti, 1958

Doliffusinus frontalis Biocca & Ferretti, 1958 (N, S, Si, Sa) (M In)

Leucochloridium Carus, 1835

Leucochloridium macrostomum (Rudolphi, 1803) Poche, 1907 (N) (U Ca) (*)

Note

Leucochloridium macrostomum: Normalmente parassita di Passeriformi, talvolta di Ralliformi, entrambi ospiti non segnalati in Italia. Stossich (1896) assegna la specie al genere *Urogonimus*.

Macroderidae

Macrodera Looss, 1899

Macrodera longicollis (Abildgaard, 1789 in Müller) Lühe, 1909 (N) (R Sq) (*)

Note

Macrodera longicollis: Sin. *Distoma naja* Rudolphi, 1819, in Parona (1912).

Macroderoididae

Haplometra Looss, 1899

Haplometra cylindracea (Zeder, 1800) Looss, 1899 (N, S, Si, Sa) (A An)

Mesometridae

Centroderma Lühe, 1901

Centroderma spinosissima (Stossich, 1883) Lühe, 1901 (3, 4) (O) (*)

Elstia Bray, 1984

Elstia stossichianum (Monticelli 1892) Bray, 1984 (3) (O) (*)

Mesometra Lühe, 1901

Mesometra brachycoelia Lühe, 1901 (3) (O)

Mesometra orbicularis (Rudolphi, 1819) Lühe, 1901 (3, 4) (O)

Wardula Poche, 1926

Wardula capitellata (Rudolphi, 1819) Poche, 1926 (3, 4) (O)
Wardula sarguicola Bartoli & Gibson, 1989 (3) (O)

Note

Centroderma spinosissima: Citata da Orecchia & Paggi (1978) come *Stossichiella spinosissima* (Stossich, 1888) Orecchia & Paggi, 1964.
Elstia stossichianum: Citata da Orecchia & Paggi (1978) come *Centroderma stossichianum* (Monticelli, 1892) Lühe, 1901 e revisionata da Bray (1984).

Mesotretidae

Mesotretes Braun, 1900

Mesotretes peregrinus (Braun, 1900) Braun, 1900 (N, S) (M Cp)

Microphallidae

Levinseniella Stiles & Hassall, 1902

Levinseniella brachysomum (Creplin, 1837) Stiles & Hassall, 1901 (N, S, Si, Sa) (U Ca)
Levinseniella macrophallos (v. Linstow, 1875) Jägerskiöld, 1907 (N) (U Ca)

Pleorchis Railliet, 1896

Pleorchis polyorchis (Stossich, 1889) Stiles, 1896 (3) (O)

Spelotrema Jägerskiöld, 1901

Spelotrema claviforme (Brandes, 1888) Nicoll, 1907 (N) (U Ca)

Monorchidae

Asymphyrodora Looss, 1890

Asymphyrodora tincae (Modeer, 1790) (N, S) (O)

Lasiotocus Looss, 1907

Lasiotocus mulli (Stossich, 1883) Looss, 1907 (3, 4) (O)

Monorchis Looss, 1902

Monorchis monorchis (Stossich, 1890) Loos, 1902 (3, 4) (O)
Monorchis parvus Looss, 1902 (4) (O)

Paratimonia Prevot & Bartoli, 1967

Paratimonia gobii Prevot & Bartoli, 1967 (3) (O)

Proctotrema Odhner, 1911

Proctotrema bacilliovatum Odhner, 1911 (3, 4) (O)

Timonia Bartoli & Prevot, 1966

Timonia mediterranea Bartoli & Prevot, 1966 (3) (O)

Notocotylidae

Catatropis Odhner, 1905

Catatropis verrucosa (Froelich, 1789) Odhner, 1905 (N) (U Ra) (*)

Notocotylus Diesing, 1839

Notocotylus attenuatus (Rudolphi, 1809) Kossack, 1911 (N) (U As) (*)

Notocotylus gibbus (Mehlis in Creplin, 1845) Kossack, 1911 (N, S) (U Ra)

Notocotylus imbricatus (Looss, 1893) Szidat, 1935 (N, S, Si, Sa) (U Ga)

Note

Catatropis verrucosa: Probabilmente anche in Anseriformi, Galliformi e Columbiformi.

Notocotylus attenuatus: In Parona assegnata al genere Monostoma. Ulteriore distribuzione: U Ga N S Si Sa; U Ra Si.

Omphalometridae

Opisthioglyphe Looss, 1899

Opisthioglyphe hystrix (Molin, 1858) Kossack, 1911 (N) (A An)

Opisthioglyphe natricis Dollfus, 1957 (N) (R Sq)

Opisthioglyphe ranae (Froelich, 1791) Looss, 1907 (N) (A An) (*)

Opisthioglyphe rastellus (Olsson, 1876) Looss, 1907 (N) (A An)

Note

Opisthioglyphe ranae: In Parona (1912) viene citato Monostomum hystrix Molin, senza data (Probabilmente 1858) e non si può sapere se intende hystrix Molin, 1858, specie valida, o hystrix Molin, 1861, sinonimo di ranae.

Opecoelidae

Allopodocotyle Pritchard, 1966

Allopodocotyle pedicellata (Stossich, 1887) Pritchard, 1966 (4) (O)

Bathycreadium Kabata, 1961

Bathycreadium biscayense Bray, 1973 (3) (O)

Bathycreadium elongatum (Maillard, 1970) Bray, 1973 (3) (O)

Bathycreadium flexicollis Kabata, 1961 (3) (O)

Cainocreadium Nicoll, 1909

Cainocreadium labracis (Dujardin, 1845) Nicoll, 1909 (3, 4) (O)

Helicometra Odhner, 1902

Helicometra fasciata (Rudolphi, 1819) Odhner, 1902 (3) (O)

Helicometra flava Stossich, 1903 (4) (O)

Helicometra gobii (Stossich, 1883) Stossich, 1904 (4) (O)

Helicometra labri (Stossich, 1886) (4) (O)

Helicometra mutabilis (Stossich, 1902) Stossich, 1903 (4) (O)

Helicometra pulchella (Rudolphi, 1819) Odhner, 1902 (3) (O)

Helicometra sinuata (Rudolphi, 1819) Odhner, 1902 (3) (O)

Macvicaria Gibson & Bray, 1982

Macvicaria dubia (Stossich, 1905) Bartoli, Bray & Gibson, 1989 (3, 4) (O) (*)

Macvicaria grassigula (Linton, 1910) Bartoli, Bray & Gibson, 1989 (3) (O)

Macvicaria mormyri (Stossich, 1885) Bartoli, Gibson & Bray, 1993 (3, 4) (O)

Macvicaria obovata (Stossich, 1885) Bartoli, Bray & Gibson, 1989 (3, 4) (O)

Neonotoporus Srivastava, 1942

Neonotoporus trachuri (Yamaguti, 1938) Srivastava, 1942 (3) (O)

Opecoeloides Odhner, 1928

Opecoeloides furcatus (Bremser in Rudolphi, 1819) Odhner, 1928 (3, 4) (O)

Pachycreadium Manter, 1954

Pachycreadium carnosum (Rudolphi, 1819) Cortini & Ferretti, 1959 (3, 4) (O)

Peracreadium Nicoll, 1909

Peracreadium characis (Stossich, 1886) Bartoli, Gibson & Bray, 1989 (4) (O)
Peracreadium genu (Rudolphi, 1819) Nicoll, 1909 (3) (O)

Plagioporus (Caudotestis) Issaitchikow, 1920

Plagioporus (Caudotestis) tyrrhenicus Paggi & Orecchia, 1976 (3) (O)

Plagioporus (Plagioporus) Stafford, 1904

Plagioporus (Plagioporus) alacer (Looss, 1901) Price, 1934 (4) (O)

Podocotyle Dujardin, 1845

Podocotyle atomon (Rudolphi, 1802) Odhner, 1905 (3, 4) (O)
Podocotyle scorpaenae (Rudolphi, 1819) Bartoli & Gibson, 1991 (3, 4) (O)

Poracanthium Dollfus, 1948

Poracanthium furcatum Dollfus, 1948 (4) (O)

Pseudopychnadena Saad-Fares & Maillard, 1986

Pseudopychnadena fischthali Saad-Fares & Maillard, 1986 (3) (O)

Pycnadenoides Yamaguti, 1938

Pycnadenoides senegalensis Fischthal & Thomas, 1972 (3) (O)
Pycnadenoides umbrinae (Stossich, 1885) Gibson & Bray, 1989 (3, 4) (O) (*)

Sphaerostoma Rudolphi, 1809

Sphaerostoma bramae (O.F. Müller, 1776) Lühe, 1909 (N) (O)

Note

Macvicaria dubia: Segnalata da Stossich (1905) come *Allocreadium dubium*.
Pycnadenoides umbrinae: Citata da Orecchia & Paggi (1978) come *Allocreadium umbrinae* (Stossich, 1885) Stossich, 1905.

Opisthorchiidae

Cystagora Stafford, 1905

Cystagora tetracystis (Gastaldi, 1854) Stafford, 1905 (N) (A An) (*)

Euamphymeros Yamaguti, 1941

Euamphymeros pancreaticus Baer, 1960 (N) (U Pa)

Metorchis Looss, 1899

Metorchis albidus (Braun, 1893) Looss, 1899 (N, S, Si, Sa) (M Cv)

Metorchis bilis (Braun, 1890) Odening, 1962 (N, S, Si, Sa) (U Ac)

Metorchis crassiusculus (Rudolphi, 1809) Looss, 1899 (N, S, Si, Sa) (U Ac) (*)

Metorchis xanthosomus (Creplin, 1846) Braun, 1902 (*)

Metorchis xanthosomus xanthosomus (Creplin, 1846) Braun, 1902 (S) (U As)

Metorchis xanthosomus minor Nardelli, 1946 (U As)

Opisthorchis Blanchard, 1895

Opisthorchis felineus (Rivolta, 1884) Blanchard, 1895 (N, S, Si, Sa) (M Cv)

Pachytrema Looss, 1907

Pachytrema calculus Looss, 1907 (N) (U La)

Pseudamphistomum Lühe, 1908

Pseudamphistomum truncatum (Rudolphi, 1819) Lühe, 1909 (N, S) (M Cv) (*)

Ratzia Poche, 1926

Ratzia parva (Stossich, 1904) Poche, 1926 (N) (A An) (*)

Note

Cystagora tetracystis: Specie conosciuta in Italia solo come forma larvale.

Metorchis crassiusculus: Non è chiara la sinonimia con *M. bilis* (Braun, 1890) proposta da Yamaguti, (1971).

Metorchis xanthosomus: Ospite *Cairina moscata*, specie d' allevamento, importata.

Pseudamphistomum truncatum: Specie elencata da Parona (1912) sia come *Amphistomum truncatum* Rudolphi, 1819, sia come *Distomum truncatum* Ercolani, 1848.

Ratzia parva: Specie neotenica.

Orchipedidae

Orchipedum Braun, 1901

Orchipedum formosum (Sonsino, 1890) Odnher, 1913 (N, S) (U Gr)

Pachypsolidae

Pachypsolus Looss, 1901

Pachypsolus irroratus (Rudolphi, 1819) Looss, 1902 (4) (R Te)

Paramphistomidae

Cotylophoron Stiles & Goldberger, 1910

Cotylophoron cotylophorum (Fischoeder, 1901) Stiles & Goldberger, 1910 (S) (M Ar)

Diplodiscus Diesing, 1836

Diplodiscus conicum Polonio, 1859 (N) (R Sq) (*)

Diplodiscus subclavatus (Goeze, 1782) Diesing, 1835 (N) (A An)

Diplodiscus unguiculatus (Rudolphi, 1819) Diesing, 1836 (N) (A An)

Paramphistomum Fischoeder, 1900

Paramphistomum cervi (Schränk, 1790) Fischoeder, 1901 (N, S, Si, Sa) (M Ar)

Paramphistomum daubneyi Dinnik, 1962 (N) (M Ar)

Paramphistomum microbothrium Fischoeder, 1901 (N) (M Ar)

Schizamphistomoides Stunkard, 1925

Schizamphistomoides spinulosus (Looss, 1901) Stunkard, 1925 (3, 4, 5) (R Te)

Schizamphistomum Looss, 1912

Schizamphistomum scleroporum (Creplin, 1844) Looss, 1912 (3, 4, 5) (R Te)

Stichorchis Fischoeder, 1901

Stichorchis subtriquetrus (Rudolphi, 1814) Fischoeder, 1901 (S) (M Ro)

Note

Diplodiscus conicum: Specie citata da Parona (1912); nomen nudum secondo Yamaguti (1971); valida secondo altri autori; certamente species inquirenda, in attesa di ridescrizione.

Plagiorchiidae

Astiotrema Looss, 1900

Astiotrema monticellii Stossich, 1904 (S) (R Sq)

Encyclometra Baylis & Cannon, 1924

Encyclometra caudata (Polonio, 1859) Houdemer, 1927 (N) (R Sq)
Encyclometra colubrimurorum (Rudolphi, 1819) Dollfus, 1926 (N, S) (R Sq)

Leptophallus Lühe, 1909

Leptophallus nigrovenosus (Bellingham, 1844) Lühe, 1909 (N, S, Si) (R Sq) (*)

Manodistomum Stafford, 1905

Manodistomum signatum (Dujardin, 1845) Yamaguti, 1971 (N) (R Sq) (*)

Ochetosoma Braun, 1901

Ochetosoma inerme (Lebour, 1913) Yamaguti, 1958 (N) (R Sq)
Ochetosoma sauromates (Poirier, 1885) Skrjabin & Antipin, 1957 (N, Sa) (R Sq) (*)

Paralepoderma Dollfus, 1950

Paralepoderma acervocalciferum (Gastaldi, 1854) Yamaguti, 1971 (N, Si) (R Sq) (*)
Paralepoderma cloacicola (Lühe, 1909) Dollfus, 1950 (N) (R Sq) (*)

Plagiorchis Lühe, 1899

Plagiorchis asper Stossich, 1904 (N) (M Cp)
Plagiorchis maculosus (Rudolphi, 1802) Braun, 1901 (N, S, Si, Sa) (U Pa)
Plagiorchis mentulatus (Rudolphi, 1819) Stossich, 1904 (N) (R Sq)
Plagiorchis molini Lent & Freitas, 1940 (N) (R Sq) (*)
Plagiorchis vespertilionis (O.F. Müller, 1784) Braun, 1900 (N, S) (M Cp)

Rhytidodes Looss, 1901

Rhytidodes elatinosus (Rudolphi, 1819) Looss, 1901 (4) (R Te) (*)

Note

Leptophallus nigrovenosus: *Distomum baraldii* Sonsino, 1892, specie citata da Parona (1912), è sinonimo di *D. nigrovenosum* e non di *D. signatum* Dujardin, 1845 (=200.0.001.0). Forma larvale negli Anfibi Anuri.

Manodistomum signatum: Contrariamente al parere di Parona (1912), *signatum* di Ercolani, 1881, non corrisponde alla specie di Dujardin (1845).

Ochetosoma sauromates: In Stossich (1895).

Paralepoderma acervocalciferum: Segnalata soltanto la forma larvale negli Anfibi Anuri.

Paralepoderma cloacicola: Probabilmente sinonima di *P. acervocalciferum* (=202.0.001.0).

Plagiorchis molini: Probabilmente la specie descritta da Stossich (1895) come *arrectum* Dujardin, 1845 e citata da Parona (1912), corrisponde alla specie di Molin. La specie *arrectum* Dujardin, 1845 in rettili è stata dubitativamente assegnata al genere *Pleurogenoides*, normalmente parassita di Anfibi, da Dollfus (1961). E' comunque dubbio che la specie di

Dujardin possa essere inclusa nella fauna italiana. *Distoma molini* Polonio (?) in Anfibi, citato da Parona (1912) è nomen oblitum e di specie probabilmente diversa.

Rhytidodes: Odhner (1926) istituiva per questo genere la famiglia Rhytidodidae accettata da Yamaguti (1971).

Rhytidodes elatinosus: Vedi anche 234.0.005.0.

Pronocephalidae

Diaschistorchis Johnston, 1913

Diaschistorchis pandus (Braun, 1901) Johnston, 1913 (3) (R Te)

Pleurogonius Looss, 1901

Pleurogonius longiusculus Looss, 1901 (3, 4, 5) (R Te) (*)

Note

Pleurogonius longiusculus: Specie citata da Parona (1912) col nome generico di *Monostomum*. Questa identificazione va considerata con riserva, perché nel Mediterraneo esistono anche *trigonocephalus* van Beneden nec Rudolphi, in seguito denominata *Pleurogonius longiusculus* Loos, 1901, e *trigonocephalum* Loos, 1899 nec Rudolphi, in seguito denominata *Pronocephalus obliquus* Loos, 1901.

Prosthogonimidae

Prosthogonimus Lühe, 1899

Prosthogonimus cuneatus (Rudolphi, 1809) Braun, 1901 (N, S, Si, Sa) (U Ra)

Prosthogonimus macrorchis Macy, 1934 (U As) (*)

Prosthogonimus ovatus (Rudolphi, 1803) Lühe, 1899 (N) (U Ga)

Note

Prosthogonimus macrorchis: Esistono dubbi sulla località di raccolta per Anseriformi e Passeriformi.

Psilostomidae

Psilochasmus Lühe, 1909

Psilochasmus oxyurus (Creplin, 1825) Lühe, 1909 (N, S) (U As)

Psilorchis Thapar & Lal, 1935

Psilorchis pianae (Galli-Valerio, 1898) Yamaguti, 1971 (N) (U As)

Psilostomum Looss, 1899

Psilostomum fulicae Ricci & Carrescia, 1961 (N, S) (U Ra)

Sphaeridiotrema Odhner, 1913

Sphaeridiotrema globulosus (Rudolphi, 1814) Odhner, 1913 (N, S, Si, Sa) (U As)

Ptychogonimidae

Ptychogonimus Lühe, 1900

Ptychogonimus megastoma (Rudolphi, 1819) Lühe, 1900 (4) (O)

Robphildollfusiidae

Robphildollfusium Paggi & Orecchia, 1963

Robphildollfusium fractum (Rudolphi, 1819) Paggi & Orecchia, 1963 (3, 4) (O)

Schistosomatidae

Bilharziella Looss, 1899

Bilharziella polonica (Kowalewski, 1895) Yamaguti, 1971 (N, S, Si, Sa) (U As) (*)

Dendritobilharzia Skrjabin & Zakharow, 1920

Dendritobilharzia pulverulenta (Braun, 1901) Skrjabin, 1924 (N, S) (U Ra)

Ornithobilharzia Odhner, 1912

Ornithobilharzia canaliculata (Rudolphi, 1819) Odhner, 1912 (N, S, Si, Sa) (U La) (*)

Ornithobilharzia kowalewskii (Parona & Ariola, 1896) Odhner, 1912 (N) (U La) (*)

Schistosoma Weinland, 1858

Schistosoma bovis (Sonsino, 1876) Blanchard, 1895 (Si, Sa) (M Ar)

Schistosoma curassoni (Brumpt, 1931) Grétilat, 1962 (Sa) (M)

Schistosoma haematobium (Bilharz, 1852) Weinland, 1858 (M Ho) (*)

Schistosoma mansoni Sambon, 1907 (M Ho) (*)

Trichobilharzia Skrjabin & Zakharow, 1920

Trichobilharzia ocellata (La Valette, 1855) Brumpt, 1931 (N) (U As)

Note

Bilharziella polonica: In Italia segnalata solo la forma larvale in Molluschi.

Ornithobilharzia canaliculata: Vedi nota seguente.

Ornithobilharzia kowalewskii: Talvolta confusa con *O. canaliculata* (Macko, 1963; Witenberg & Lengy, 1967).

Schistosoma haematobium: Accidentale in Italia.

Schistosoma mansoni: Accidentale in Italia.

Sclerodistomidae

Kenmackenzia Gibson, 1983

Kenmackenzia gigas (Nardo, 1827) Gibson, 1983 (4, 5) (O)

Sclerodistomum Looss, 1912

Sclerodistomum italicum (Stossich, 1893) (4) (O)

Spirorchiidae

Learedius Price, 1934

Learedius europaeus Price, 1934 (3, 4, 5) (R Te) (*)

Hapalotrema Looss, 1899

Hapalotrema mistroides (Monticelli, 1896) Stiles & Hassall, 1908 (3) (R Te) (*)

Note

Learedius europaeus: Sin. *Distomum constrictum* Leared, 1862, pre-occupato.

Hapalotrema mistroides: Sin. *Mesogonimus constrictus* (Leared, 1862) sensu Monticelli, 1896, in Parona (1912).

Strigeidae

Apatemon Szidat, 1928

Apatemon gracilis (Rudolphi, 1819) Szidat, 1928 (S) (U As)

Apharyngostrigea Ciurea, 1927

Apharyngostrigea cornu (Zeder, 1800) Ciurea, 1927 (N, S) (U Cc)

Bolbocephalodes Strand, 1935

Bolbocephalodes intestiniforax (Dubois, 1934) Strand, 1935 (S) (U Cc)

Cardiocephalus Szidat, 1928

Cardiocephalus longicollis (Rudolphi, 1819) Szidat, 1928 (N) (U La) (*)

Codonocephalus Diesing, 1850

Codonocephalus urniger (Rudolphi, 1819) Lühe, 1909 (N, S) (U Cc) (*)

Cotylurus Szidat, 1928

Cotylurus brevis Dubois & Rausch, 1950 (N) (U As)

Cotylurus cornutus (Rudolphi, 1808) Szidat, 1928 (N, S) (U As) (*)

Cotylurus erraticus (Rudolphi, 1809) Szidat, 1928 (N) (U Po) (*)

Cotylurus flabelliformis (Faust, 1917) v. Haitzma, 1931 (N) (U As)

Cotylurus hebraicus Dubois, 1934 (S) (U Ra)

Cotylurus pileatus (Rudolphi, 1802) Dubois, 1937 (U La) (*)

Nematostrigea Sandground, 1934

Nematostrigea serpens (Nitzsch, 1819) Sandground, 1934 (N) (U Ac)

Ophiosoma Szidat, 1928

Ophiosoma patagiatum (Creplin, 1846) Dubois, 1937 (N) (U Cc) (*)

Pseudapatemon Dubois, 1936

Pseudapatemon elassocotylus (Dubois, 1934) Dubois, 1936 (N, S) (U Ca) (*)

Strigea Abildgaard, 1790

Strigea falconis Szidat, 1928 (N) (U Ac) (*)

Strigea sphaerula (Rudolphi, 1803) Mathias, 1925 (N) (U Pa)

Strigea strigis (Schrank, 1788) Abildgaard, 1790 (N) (U St) (*)

Note

Cardiocephalus longicollis: Alla specie di Rudolphi corrisponde solo una parte di *Holostomum longicolle* sensu Dujardin, 1845 ed è a questa frazione che alludono Parona (1912) e Stossich (1890, 1897). Si veda Dubois (1938).

Codonocephalus urniger: Citata da Parona (1912) come *Codonocephalus mutabilis* Diesing,

forma larvale in *Rana esculenta*. Evidentemente, nei Cicogniformi della fauna italiana, deve esistere anche l'adulto.

Cotylurus cornutus: Sin. *Holostomum erraticum* Ercolani, 1882 nec Dujardin, 1845; nome usato anche da Monticelli (1888) e citato da Parona (1912).

Cotylurus erraticus: Sin. *Holostomum erraticum* (Rudolphi, 1809) Dujardin, 1845. Parona (1896) cita in *Colymbus* sp. questa specie attribuendola erroneamente a Diesing (1850) che in realtà aveva solo in parte ridescritto *erraticum* Rudolphi. Parona (1899) cita nuovamente *Holostomum erraticum* attribuendolo a Dujardin (1845), omettendo il nome di Rudolphi, primo autore. Solo una parte di quest'ultimo materiale di Parona appartiene a *erraticum*, la restante frazione dovendo essere attribuita a *Pseudapatemon ellassocotylus* (vedi nota 231.0.001.0).

Cotylurus pileatus: Località imprecisata.

Ophiosoma patagiatum: Sin. *Holostomum longicolle* sensu Dujardin, 1845, partim, citato da Parona (1912); è la seconda frazione di Dujardin che corrisponde a *patagiatum* (vedi nota 226.0.001.0).

Pseudapatemon ellassocotylus: Sin. *Holostomum erraticum* (Rudolphi, 1809) Dujardin, 1845 sensu Parona 1899, partim; si veda Dubois (1938) e nota 228.0.002.0.

Strigea falconis: La specie *macrocephalum* Rudolphi, 1803 e 1819, ripresa da Brandes (1888), descritta da Stossich e citata da Parona (1887), è in parte sinonima di *strigis* Schrank, 1788 (Rudolphi, 1803 e 1819 partim) ed in parte diventa *falconis* Szidat, 1928, entrambe facenti parte della fauna italiana. Per la complicatissima sinonimia di queste specie vedi Dubois (1938).

Strigea strigis: Sin. *Holostomum cornucopiae* Molin, 1859; *H. variabile* Nitzsch, 1819. Sotto il nome di *variabile*, Stossich e Parona hanno descritto o citato sia *strigis*, sia *falconis* (vedi nota 232.0.001.0).

Telorchidae

Orchidasma Looss, 1900

Orchidasma amphiorchis (Braun, 1899) Braun, 1901 (4) (R Te)

Telorchis Lühe, 1899

Telorchis aculeatus (v. Linstow, 1879) Braun, 1901 (4) (R Te) (*)

Telorchis assula (Dujardin, 1845) Dollfus, 1957 (N, S) (R Sq)

Telorchis ercolanii (Monticelli, 1893) Braun, 1901 (N, S) (R Sq) (*)

Telorchis parvus Braun, 1901 (3) (R Te)

Telorchis poirieri (Stossich, 1895) Odhner, 1902 (3, 4) (R Te) (*)

Telorchis stossichi Goldberger, 1911 (3, 4) (R Te) (*)

Note

Telorchis aculeatus: Specie citata da Parona (1912) col nome del sinonimo.

Telorchis ercolanii: In Parona (1912) col nome generico di *Cercorchis*. È dubbia la sinonimia con *assula* Dujardin, 1845 (234.0.002.0).

Telorchis poirieri: Stossich (1895, nec 1904) descrive la specie col nome generico di *Distomum* e Parona (1912) la cita come *Cercorchis poirieri*. Vedi anche nota seguente.

Telorchis stossichi: Stossich (1904), usando il nome di *Telorchis poirieri*, descrive una specie diversa da quella del 1895. Parona (1912) non fa distinzione tra *poirieri* Stossich, 1895 e *poirieri* Stossich, 1904.

Troglotrematidae

Pholeter Odhner, 1914

Pholeter gastrophilus (Kossack, 1910) Odhner, 1914 (4) (M Ce)

Troglotrema Odhner, 1914

Troglotrema acutum (Leuckart, 1842) Odhner, 1914 (N, S) (M Cv)

Zoogonidae

Deretrema Linton, 1910

Deretrema scorpaenicola Bartoli & Bray, 1990 (3) (O)

Deretrema sp. Paggi & Orecchia, 1976 (3) (O)

Diphterostomum Stossich, 1903

Diphterostomum brusinae (Stossich, 1888) Stossich, 1903 (3, 4) (O)

Diphterostomum luteum (van Beneden, 1870) Stossich, 1904 (4) (O)

Limnoderetrema Bray, 1987

Limnoderetrema minutum (Manter, 1954) Bray, 1987 (3) (O)

Steganoderma Stafford, 1904

Steganoderma retroflexum (Molin, 1859) Yamaguti, 1953 (4) (O)

Cestoda

Amphilinidea

Amphilinidae

Amphilina Wagener, 1858

Amphilina foliacea (Rudolphi, 1819) Wagener, 1859 (N, S) (O)

Gyrocotylidea

Gyrocotylidae

Gyrocotyle Diesing, 1850

Gyrocotyle urna (Grube & Wagener, 1852) Olsson, 1886 (3, 5) (C)

Spathebothriidea

Acrobothriidae

Bothrimonus Duvernoy, 1842

Bothrimonus sturionis Duvernoy, 1842 (N) (O)

Cyathocephalus Kessler, 1782

Cyathocephalus truncatus (Pallas, 1781) (S) (O)

Caryophyllidea

Caryophyllaeidae

Caryophyllaeus O.F. Müller, 1787

Caryophyllaeus fimbriceps Annenkova-Chlopina, 1919 (N) (O)

Caryophyllaeus laticeps Pallas, 1781 (N, S) (O)

Caryophyllaeus trisignatus Molin, 1858 (4) (O)

Caryophyllaeus sp. Aisa & Gattaponi, 1981 (S) (O) (*)

Monobothrium Nybelin, 1922

Monobothrium wagneri Nybelin, 1922 (N, S) (O)

Monobothrium sp. Aisa & Gattaponi, 1981 (S) (O) (*)

Note

Caryophyllaeus sp.: Si tratta di cestode adulto rinvenuto in pesci d'acqua dolce (Aisa & Gattaponi, 1981).

Monobothrium sp.: Si tratta di cestode adulto rinvenuto in *Barbus barbus plebejus* (Aisa & Gattaponi, 1981).

Diphyllidea

Echinobothriidae

Echinobothrium Beneden, 1849

Echinobothrium affine Diesing, 1863 (3, 4) (C)

Echinobothrium brachysoma Pintner, 1889 (4) (C)

Echinobothrium musteli Pintner, 1889 (3, 4) (C)

Echinobothrium typus van Beneden, 1849 (3, 4, 5) (C)

Trypanorhyncha

Tentaculariidae

Nybelinia Poche, 1926

Nybelinia lingualis (Cuvier, 1817) Poche, 1926 (3) (C) (*)

Tentacularia Box, 1797

Tentacularia bicolor (Bartels in Nordmann, 1832) Dollfus, 1942 (3) (C) (*)

Note

Nybelinia lingualis: Forme larvali riferite alla specie sono segnalate in Pesci Ossei, in Italia.

Tentacularia bicolor: Forme larvali riferite alla specie sono segnalate in Pesci Ossei, in Italia.

Sphyriocephalidae

Sphyriocephalus Pintner, 1913

Sphyriocephalus tergestinus Pintner, 1913 (4) (C)

Sphyriocephalus viridis (Wagener, 1854) Pintner, 1913 (3) (C)

Hepatoxylidae

Hepatoxylon Box, 1811

Hepatoxylon squali (Martin, 1797) Box, 1811 (3) (C)

Hepatoxylon sp. Di Paolo, D'Amelio, Mattiucci, Orecchia & Paggi, 1994 (5) (O) (*)

Note

Hepatoxylon sp.: Si tratta di forma larvale rinvenuta in *Xiphias gladius* (Di Paolo et al., 1994).

Eutetrarhynchidae

Eutetrarhynchus Pintner, 1913

Eutetrarhynchus ruficollis (Eysenhardt, 1829) Pintner, 1913 (4) (C)

Otobothriidae

Otobothrium Linton, 1890

Otobothrium pronosomum (Stossich, 1901) Dollfus, 1942 (3, 4) (C)

Pterobothriidae

Pterobothrium Diesing, 1850

Pterobothrium fragile (Diesing, 1850) Diesing, 1850 (3) (C)

Lacistorhynchidae

Grillotia Guiart, 1927

Grillotia epinepheli Scholz, Garippa & Scala, 1993 (3) (O) (*)

Grillotia erinaceus (Beneden, 1858) Guiart, 1927 (3, 5) (C)

Grillotia institata (Pintner, 1913) (3, 5) (C)

Grillotia scolecina (Rudolphi, 1819) Guiart, 1927 (3, 5) (C)

Lacistorhynchus Pintner, 1913

Lacistorhynchus tenuis (Beneden, 1858) Pintner, 1913 (3, 5) (C)

Note

Grillotia epinepheli: La descrizione della nuova specie è basata sul plerocercus rinvenuto in *Epinephelus guaza* (Scholz et al., 1993).

Gymnorhynchidae

Gymnorhynchus Rudolphi, 1819

Gymnorhynchus gigas (Cuvier, 1817) Rudolphi, 1819 (3) (C) (*)

Note

Gymnorhynchus gigas: Forme larvali riferite alla specie sono segnalate in Osteichthyes.

Tetraphyllidea

Onchobothriidae

Acanthobothrium van Beneden, 1849

Acanthobothrium benedeni Lömberg, 1889 (3, 4) (C)

Acanthobothrium coronatum (Rudolphi, 1819) Beneden, 1849 (3, 4) (C)

Acanthobothrium crassicolle Wedl, 1855 (3, 5) (C)

Acanthobothrium filicolle (Zschokke, 1887) (3, 4, 5) (C)

Acanthobothrium musculosum (Baer, 1948) (3, 4) (C)

Acanthobothrium zschokkei Baer, 1948 (3, 4) (C)

Calliobothrium van Beneden, 1850

Calliobothrium eschrichtii (van Beneden, 1849) van Beneden, 1850 (3, 4, 5) (C)

Calliobothrium verticillatum (Rudolphi, 1819) van Beneden, 1850 (3, 4, 5) (C)

Ceratobothrium Monticelli, 1892

Ceratobothrium xanthocephalum Monticelli, 1892 (3, 4) (C)

Onchobothrium Blainville, 1828

Onchobothrium ganfini Mola, 1934 (3, 4) (C)

Onchobothrium lintoni Mola, 1934 (3, 4) (C)

Onchobothrium pseudouncinatum (Rudolphi, 1819) Beauchamps, 1905 (3, 4) (C)

Platybothrium Linton, 1890

Platybothrium baeri Euzet, 1952 (3, 4) (C)

Phyllobothriidae

Anthobothrium van Beneden, 1850

Anthobothrium auriculatum (Rudolphi, 1819) Diesing, 1863 (3, 4) (C)

Anthobothrium cornucopia van Beneden, 1850 (4) (C)

Anthobothrium parvum Stossich, 1895 (4) (C)

Anthobothrium variabile (Linton, 1889) (4) (C)

Aocobothrium Mola, 1907

Aocobothrium carrucci Mola, 1907 (S) (O)

Echeneibothrium van Beneden, 1850

Echeneibothrium gracile Zschokke, 1889 (3, 4, 5) (C)

Echeneibothrium tumidulum (Rudolphi, 1819) Diesing, 1863 (4) (C)

Echeneibothrium variabile van Beneden, 1850 (4) (C)

Monorygma Diesing, 1863

Monorygma grimaldii Moniez, 1889 (4) (M Ce) (*)

Monorygma perfectum (van Beneden, 1853) Diesing, 1863 (3) (C) (*)

Orymatobothrium Diesing, 1863

Orymatobothrium musteli (van Beneden, 1850) (3, 4) (C)

Orymatobothrium versatile Diesing, 1863 (3, 4) (C)

Pelichnibothrium Monticelli, 1889

Pelichnibothrium speciosum Monticelli, 1889 (3) (C)

Phyllobothrium van Beneden, 1849

Phyllobothrium delphini (Bosc, 1802) Gervais, 1870 (4) (M Ce) (*)

Phyllobothrium dohrnii (Oerley, 1885) Zschokke, 1889 (3) (C)

Phyllobothrium gracile Wedl, 1855 (4) (C)

Phyllobothrium laciniatum (Linton, 1889) (3) (C)

Phyllobothrium lactuca van Beneden, 1850 (3) (C)

Phyllobothrium riggii (Monticelli, 1893) (3) (C)

Phyllobothrium rotundum (Klaptocz, 1906) (4) (C)

Phyllobothrium thridax van Beneden, 1850 (4, 5) (C)

Phyllobothrium unilaterale Southwell, 1925 (C)

Note

Monorygma grimaldii: Forma larvale rinvenuta in delfino (vedi Macchioni & Barducci, 1989-1990); l'adulto certamente esiste nei Condroitti del Mediterraneo.

Monorygma perfectum: Mediterraneo, senza ulteriori precisazioni.

Phyllobothrium delphini: Forma larvale denominata *Cysticercus delphini* da Rudolphi (1810) ed altri e *Cephalocotyleum delphini* da Parona (1912).

Pseudophyllidea

Bothriocephalidae

Bothriocephalus Rudolphi, 1808

- Bothriocephalus acheilognathi* Yamaguti, 1934 (N) (O)
- Bothriocephalus alessandrinii* Condorelli-Francaviglia, 1898 (O) (*)
- Bothriocephalus andresi* Porta, 1911 (3) (O)
- Bothriocephalus angustatus* Rudolphi, 1819 (O) (*)
- Bothriocephalus bramae* Ariola, 1899 (O) (*)
- Bothriocephalus clavibothrium* Ariola, 1901 (O) (*)
- Bothriocephalus claviceps* (Goeze, 1782) Rudolphi, 1810 (3, 4) (O)
- Bothriocephalus lophii* Rudolphi, 1819 (O) (*)
- Bothriocephalus minutus* Ariola, 1896 (O) (*)
- Bothriocephalus monticelli* Ariola, 1899 (O) (*)
- Bothriocephalus proboscideus* (Batsch, 1786) Rudolphi, 1810 (O) (*)
- Bothriocephalus scorpii* (O.F. Müller, 1776) Rudolphi, 1808 (O) (*)
- Bothriocephalus squali* Ariola, 1900 (O) (*)
- Bothriocephalus trachypteri* Ariola, 1896 (O) (*)
- Bothriocephalus trachypteriiris* Ariola, 1896 (O) (*)
- Bothriocephalus trachypteriliopteri* Ariola, 1896 (O) (*)
- Bothriocephalus vallei* Stossich, 1899 (4) (O)
- Bothriocephalus* sp. Aisa & Gattaponi, 1981 (S) (O) (*)

Clestobothrium Lühe, 1899

- Clestobothrium crassiceps* (Rudolphi, 1819) Lühe, 1899 (3, 4, 5) (O)

Ptychobothrium Lömberg, 1889

- Ptychobothrium belones* (Dujardin, 1845) Lömberg, 1889 (3) (O)

Note

- Bothriocephalus alessandrinii*: Citata genericamente per l'Italia.
- Bothriocephalus angustatus*: Citata genericamente per l'Italia.
- Bothriocephalus bramae*: Citata genericamente per l'Italia.
- Bothriocephalus clavibothrium*: Citata genericamente per l'Italia.
- Bothriocephalus lophii*: Citata genericamente per l'Italia.
- Bothriocephalus minutus*: Citata genericamente per l'Italia.
- Bothriocephalus monticelli*: Citata genericamente per l'Italia.
- Bothriocephalus proboscideus*: Citata genericamente per l'Italia.
- Bothriocephalus scorpii*: Citata genericamente per l'Italia.
- Bothriocephalus squali*: Citata genericamente per l'Italia.

Bothriocephalus trachypteri: Citata genericamente per l'Italia.

Bothriocephalus trachypteriiris: Citata genericamente per l'Italia.

Bothriocephalus trachypteriliopteri: Citata genericamente per l'Italia.

Bothriocephalus sp.: Si tratta di cestode adulto rinvenuto in *Leuciscus cephalus* (Aisa & Gattaponi, 1981).

Echinophallidae

Echinophallus Schumacher, 1914

Echinophallus settii (Ariola, 1895) Schumacher, 1914 (3) (O)

Echinophallus wageneri (Monticelli, 1890) Schumacher, 1914 (3, 4) (O)

Triaenophoridae

Amphicotyle Diesing, 1863

Amphicotyle heteropleura (Diesing, 1850) Lühe, 1902 (4) (O)

Anchistrocephalus Monticelli, 1890

Anchistrocephalus imbricatus (Diesing, 1850) (3) (R Te) (*)

Anchistrocephalus microcephalus (Rudolphi, 1819) Monticelli, 1890 (3) (O)

Eubothrium Nybelin, 1922

Eubothrium fragile (Rudolphi, 1802) Nybelin, 1922 (4) (O)

Fistulicola Lühe, 1899

Fistulicola dalmatinus (Stossich, 1897) Lühe, 1902 (4) (O)

Fistulicola plicatus (Rudolphi, 1819) Lühe, 1899 (3, 5) (O)

Triaenophorus Rudolphi, 1793

Triaenophorus lucii (O.F. Müller, 1776) Rudolphi, 1793 (N, S) (O)

Note

Anchistrocephalus imbricatus: Brevemente descritta da Diesing (1850) come *Dibothrium imbricatum*; provenienza Napoli. Citata da Parona (1912) come *Bothriocephalus* (*Bothriotaenia*) *imbricatum* Diesing. Ma *Bothriotaenia* è nomen nudum secondo Yamaguti e da escludersi anche come parassita di uccelli. Questa specie, che sembra dimenticata, fu per la prima volta ridescritta e raffigurata da Joyeux & Baer (1936) nella Faune de France. Perciò va ricordata.

Diphyllbothriidae

Digramma Cholodkovsky, 1915

Digramma alternans (Rudolphi, 1810) Cholodkovsky, 1915 (N, S, Si, Sa) (U As)

Diphyllbothrium Cobbold, 1858

Diphyllbothrium elegans (Krabbe, 1865) (M Cv) (*)

Diphyllbothrium erinaceieuropaei (Rudolphi, 1819) (N, S, Si, Sa) (M Cv) (*)

Diphyllbothrium fuhrmanni Hsü, 1935 (M Ce) (*)

Diphyllbothrium hians (Diesing, 1850) (N, Sa) (M Cv) (*)

Diphyllbothrium latum (Linnaeus, 1758) Cobbold, 1858 (N, S) (M Cv)

Ligula Bloch, 1782

Ligula intestinalis (Linnaeus, 1858) Bloch, 1782 (N, S, Si, Sa) (U As) (*)

Schistocephalus Creplin, 1829

Schistocephalus solidus (O.F. Müller, 1776) (N, S, Si, Sa) (U As) (*)

Schistocephalus sp. Aisa 1968, 1969 (N) (O) (*)

Schistocephalus sp. Scholz, Paggi, Di Cave & Orecchia, 1992 (N, S) (O) (*)

Note

Diphyllbothrium elegans: Specie poco conosciuta. Parona (1912), con riferimento ad Ariola (1896), la elenca, in forma dubitativa, come parassita in *Phoca vitulina*. Errore d'ospite o presenza occasionale nel Mediterraneo?

Diphyllbothrium erinaceieuropaei: Segnalata da Parona (1912), allo stadio larvale, in *Erinaceus europaeus* come *Sparganum lanceolatum* Molin, 1859 (da non confondere con *Diphyllbothrium lanceolatum* Krabbe, 1865), in Carnivori (Padova) come *Sparganum* (*Cisticercus*) *ellipticum* Molin, 1859, in Anfibi Anuri col nome di *Ligula ranarum* Gastaldi, 1854 e in Rettili Squamati col nome di *L. panceri* Polonio, 1860. Altri sinonimi usati da Parona (1912) per la forma adulta sono: *felis* Creplin, 1825; *maculatus* Leuckart, 1848; *serratus* Diesing, 1850.

Diphyllbothrium fuhrmanni: In Delphinidae. Specie descritta nei mari della Cina, forse presente anche in Mediterraneo. Zona imprecisata.

Diphyllbothrium hians: Parona (1912) elenca entrambe le specie: *hians* nella *Foca monaca* e *polycalceolus*, dubitativamente in *Phoca vitulina* (vedi nota 040.0.001.0).

Ligula intestinalis: Forme larvali riferite alla specie sono segnalate in Pesci Ossei.

Schistocephalus solidus: In Parona (1912) si legge "*S. nodosus* Bloch (= *S. dimorphus* Creplin)". Bloch (1782) descrive *Taenia lanceolata nodosa* e si ritiene che *Schistocephalus dimorphus* Creplin, 1829 ne sia sinonimo. Comunque, entrambe sono oggi considerate sinonimi di *solidus* O.F. Müller, 1776.

Schistocephalus sp.: Si tratta di forme larvali rinvenute in *Rutilus* sp. (Aisa, 1968, 1969).

Schistocephalus sp.: Si tratta di forme larvali rinvenute in *Gasterosteus aculeatus* (Scholz, 1992).

Proteocephalidea

Proteocephalidae

Ophiotaenia La Rue, 1911

Ophiotaenia nattereri (Parona, 1901) La Rue, 1911 (N, S, Si, Sa) (R Sq)

Ophiotaenia racemosa (Rudolphi, 1819) La Rue, 1911 (N) (R Sq)

Proteocephalus Weinland, 1858

Proteocephalus agonis Barbieri, 1909 (O) (*)

Proteocephalus hemisphaericus (Molin, 1859) La Rue, 1911 (N) (O)

Proteocephalus macrocephalus (Creplin, 1825) (N, S) (O)

Proteocephalus neglectus La Rue, 1911 (N) (O)

Proteocephalus percae (O.F. Müller, 1780) (S) (O)

Proteocephalus sp. Grimaldi, 1964 (N) (O) (*)

Note

Proteocephalus agonis: Citata genericamente per l'Italia.

Proteocephalus sp.: Si tratta di forme larvali rinvenute in *Coregonus* sp. nel Lago Maggiore (Grimaldi, 1964).

Tetrabothriidea

Tetrabothriidae

Strobilocephalus Baer, 1932

Strobilocephalus triangularis (Diesing, 1850) Baer, 1932 (3) (M Ce)

Tetrabothrius Rudolphi, 1819

Tetrabothrius cylindraceus Rudolphi, 1819 (N) (U La)

Tetrabothrius erostris Lönnberg, 1896 (N) (U La)

Tetrabothrius forsteri (Kreff, 1871) Fuhrmann, 1904 (3) (M Ce)

Tetrabothrius heteroclitus Diesing, 1850 (N) (U Pr)

Tetrabothrius macrocephalus (Rudolphi, 1810) Rudolphi, 1819 (N) (U Ca)

Tetrabothrius porrigens Molin, 1858 (N) (U Cc)

Trigonocotyle Baer, 1932

Trigonocotyle monticellii (Linton, 1923) Baer, 1932 (3) (M Ce)

Cyclophyllidea

Mesocestoididae

Mesocestoides Vaillant, 1863

Mesocestoides alaudae Stossich, 1896 (N) (U Pa)

Mesocestoides ambiguus Vaillant, 1863 (N) (M Cv)

Mesocestoides imbutiformis (Polonio, 1860) (N, Si, Sa) (U As)

Mesocestoides lineatus (Goeze, 1782) Railliet, 1893 (N, S, Si, Sa) (M Cv)

Mesocestoides litteratus (Batsch, 1786) (N, S) (M Cv)

Mesocestoides perlatus (Goeze, 1782) Mühling, 1898 (S, Sa) (U Ac)

Anoplocephalidae

Andrya Railliet, 1893

Andrya cuniculi (Blanchard, 1891) Railliet, 1893 (N) (M Lg)

Andrya rhopalocephala (Riehm, 1881) Railliet, 1893 (N) (M Lg)

Anoplocephala Blanchard, 1848

Anoplocephala magna (Abildgaard, 1789) Sprengel, 1905 (N, S, Si, Sa) (M Ps) (*)

Anoplocephala perfoliata (Goeze, 1782) Blanchard, 1848 (N, S, Si, Sa) (M Ps)

Anoplocephaloides Baer, 1923

Anoplocephaloides dentata (Galli-Valerio, 1905) Spasskii, 1951 (N) (M Ro) (*)

Anoplocephaloides mamillana (Mehlis, 1831) Rausch, 1976 (N, S, Si, Sa) (M Ps) (*)

Anoplocephaloides wimerosa (Moniez, 1880) Rausch, 1976 (N) (M Lg)

Avitellina Gough, 1911

Avitellina centripunctata (Rivolta, 1874) Gough, 1911 (N, S) (M Ar) (*)

Cittotaenia Riehm, 1881

Cittotaenia denticulata (Rudolphi, 1804) Stiles & Hassal, 1896 (N, S, Si, Sa) (M Lg) (*)

Ctenotaenia Railliet, 1893

Ctenotaenia marmotae (Froelich, 1802) Railliet, 1893 (N) (M Ro)

Cycloskrjabinia Spasskii, 1951

Cycloskrjabinia taborensis (Loewen, 1934) Spasskii, 1951 (N) (M Cp)

Killigrewia Meggitt, 1927

Killigrewia delafondi (Railliet, 1892) Meggitt, 1927 (N) (U Co) (*)

Moniezia Blanchard, 1891

Moniezia benedeni (Moniez, 1879) Blanchard, 1891 (N, S, Si, Sa) (M Ar) (*)

Moniezia expansa (Rudolphi, 1805) Blanchard, 1891 (N, S, Si, Sa) (M Ar)

Moniezia trigonophora Stiles & Hassall, 1893 (N) (M Ar) (*)

Mosgovoyia Spasskii, 1951

Mosgovoyia ctenoides (Railliet, 1890) Beveridge, 1978 (N) (M Lg)

Mosgovoyia pectinata (Goeze, 1782) Spasskii, 1951 (N, S, Si, Sa) (M Lg)

Oochoristica Lühe, 1898

Oochoristica rostellata Zschokke, 1905 (N, S, Si, Sa) (R Sq)

Oochoristica tuberculata (Rudolphi, 1819) Lühe, 1898 (N, S, Si, Sa) (R Sq) (*)

Paranoplocephala Lühe, 1910

Paranoplocephala omphalodes (Hermann, 1783) Lühe, 1910 (N) (M In) (*)

Stilesia Railliet, 1893

Stilesia globipunctata (Rivolta, 1874) Railliet, 1893 (N, S, Si, Sa) (M Ar)

Thysaniezia Skrjabin, 1926

Thysaniezia ovilla (Rivolta, 1878) Skrjabin, 1926 (N, S, Si, Sa) (M Ar)

Thysanosoma Diesing, 1835

Thysanosoma actinioides Diesing, 1835 (N) (M Ar)

Note

Anoplocephala magna: Sin. *Taenia plicata* Zeder, 1800 elencata da Parona (1912).

Anoplocephaloides dentata: In Parona (1912) ancora ascritta al genere *Anoplocephala*.

Anoplocephaloides mamillana: In Parona (1912) ancora ascritta al genere *Anoplocephala*.

Avitellina centripunctata: In Parona (1912) ancora ascritta al genere *Stilesia*.

Cittotaenia denticulata: Sin. *Taenia alba* Perroncito, 1879, citata anche da Parona (1912).
Killigrewia delafondi: In Parona (1912) ancora ascritta al genere *Bertiella*.
Moniezia benedeni: In Parona (1912) entrambi i sinonimi sono elencati tra le specie valide.
Moniezia trigonophora: Specie considerata da alcuni autori sinonimo di *expansa* (057.0.002.0).
Oochoristica tuberculata: Sinonimo elencato tra le specie valide da Parona (1912).
Paranoplocephala omphalodes: Esistono dubbi sulla località di raccolta.

Catenotaeniidae

Catenotaenia Janicki, 1904

Catenotaenia pusilla (Goeze, 1782) Janicki, 1904 (N, S, Si, Sa) (M Ro) (*)

Note

Catenotaenia pusilla: *Taenia umbonata* Molin, 1858, in pratica un nomen oblitum, ma elencata da Parona (1912), è probabilmente sinonimo di *pusilla*.

Nematotaeniidae

Nematotaenia Lühe, 1899

Nematotaenia dispar (Goeze, 1782) Lühe, 1899 (N, Si, Sa) (A An)
Nematotaenia minor Ricci, 1987 (Sa) (A Ur)

Acoleidae

Acoleus Fuhrmann, 1899

Acoleus longispiculus (Stossich, 1895) Fuhrmann, 1899 (N) (U Ra)
Acoleus vaginatus (Rudolphi, 1819) Fuhrmann, 1899 (N, S) (U Ca)

Diplophallus Fuhrmann, 1900

Diplophallus polymorphus (Rudolphi, 1819) Fuhrmann, 1899 (N) (U Ca)

Dioecocestidae

Dioecocestus Fuhrmann, 1900

Dioecocestus asper (Mehlis, 1831) Fuhrmann, 1900 (U Po) (*)

Note

Dioecocestus asper: Esistono dubbi sulla località di raccolta e l'ospite è stato indicato semplicemente come "Podicepediforme".

Amabiliidae

Amabilia Diamare, 1893

Amabilia lamelligera (Owen, 1832) Diamare, 1893 (Sa) (U Fe)

Schistotaenia Cohn, 1900

Schistotaenia macrorhyncha (Rudolphi, 1810) Cohn, 1900 (N) (U Po)

Davaineidae

Davainea Blanchard, 1891

Davainea proglottina (Davaine, 1860) Blanchard, 1891 (N, Si, Sa) (U Ga)

Fernandezia Lopez-Neyra, 1936

Fernandezia spinosisima (v. Linstow, 1894) Lopez-Neyra, 1936 (N) (U Pa)

Fuhrmannetta Stiles & Orleman, 1926

Fuhrmannetta crassula Rudolphi, 1819 (N, S) (U Co)

Fuhrmannetta hertwigi (Mola, 1907) Stiles & Orleman, 1926 (Sa) (U Ac)

Fuhrmannetta pluriuncinata (Crety, 1890) Stiles & Orleman, 1926 (S) (U Ga)

Ophryocotyle Friis, 1870

Ophryocotyle proteus Friis, 1870 (N) (U Ca)

Raillietina Fuhrmann, 1920

Raillietina anatina (Fuhrmann, 1909) Fuhrmann, 1920 (N, S, Si, Sa) (U As) (*)

Raillietina echinobothrida (Méglin, 1880) Fuhrmann, 1924 (N, S, Si, Sa) (U Ga)

Raillietina friedbergeri (v. Linstow, 1878) Fuhrmann, 1924 (N, Sa) (U Ga)

Raillietina frontina (Dujardin, 1845) Fuhrmann, 1924 (N) (U Pc)

Raillietina longicollis (Molin, 1858) Lopez-Neyra, 1931 (N) (U Ga) (*)

Raillietina sartica (Skrjabin, 1914) Fuhrmann, 1932 (N) (U Pa)

Raillietina tetragona (Molin, 1858) Fuhrmann, 1924 (N, S, Si, Sa) (U Ga)

Skrjabinia Fuhrmann, 1920

Skrjabinia bonini (Méglin, 1899) Fuhrmann, 1932 (S) (U Co)
Skrjabinia cesticillus (Molin, 1858) Fuhrmann, 1920 (N, S, Si, Sa) (U Ga)
Skrjabinia circumvallata (Krabbe, 1869) Baer, 1925 (N, S, Sa) (U Ga)
Skrjabinia microcotyle (Skrjabin, 1914) Fuhrmann, 1920 (N, S, Si, Sa) (U As)
Skrjabinia polyuterina (Fuhrmann, 1909) Fuhrmann, 1920 (N) (U Ga)

Note

Raillietina anatina: Species inquirenda, comunemente assegnata a *Raillietina* s.l..
Raillietina longicollis: Species inquirenda, comunemente assegnata a *Raillietina* s.l. Sin.
Bothriotaenia longicollis Molin, 1858, elencata da Parona (1912).

Dilepididae

Alcataenia Spasskaya, 1971

Alcataenia armillaris (Rudolphi, 1810) Spasskaya, 1971 (N) (U Al) (*)

Amoebotaenia Cohn, 1899

Amoebotaenia cuneata (v. Linstow, 1872) Cohn, 1900 (N, Si, Sa) (U Ga)

Angularella Strand, 1928

Angularella beema (Clerc, 1906) Strand, 1928 (N) (U Pa)

Anomotaenia Cohn, 1900

Anomotaenia bacilligera (Krabbe, 1869) Fuhrmann, 1908 (N) (U Ca)
Anomotaenia cyathiformis (Froelich, 1791) (N) (U Pa)
Anomotaenia microphallos (Krabbe, 1869) Fuhrmann, 1908 (S) (U Ca)
Anomotaenia microrhyncha (Krabbe, 1869) Cohn, 1900 (N) (U Ca)
Anomotaenia papilla (Wedl, 1855) Fuhrmann, 1908 (N) (U Cv) (*)
Anomotaenia stentorea (Froelich, 1802) Fuhrmann, 1908 (Sa) (U Ca)

Choanotaenia Railliet, 1896

Choanotaenia crateriformis (Goeze, 1782) (N) (U Pc) (*)
Choanotaenia infundibuliformis (Goeze, 1782) Railliet, 1856 (N, S, Si, Sa) (U Ga) (*)
Choanotaenia littoriae De Muro, 1934 (S) (U St)

Dendrouterina Fuhrmann, 1912

Dendrouterina herodiae (Fuhrmann, 1912) Baer & Bona, 1960 (N) (U Cc)
Dendrouterina macrosphincter (Fuhrmann, 1909) Baer & Bona, 1960 (N) (U Cc)

Dictymetra Clark, 1952

Dictymetra discoidea (van Beneden, 1868) Spasskaya & Schumilo, 1971 (N, S) (U Cc)
Dictymetra nymphaea (Schränk, 1790) Spasskaya & Spasskii, 1971 (N) (U Ca)

Dilepis Weinland, 1858

Dilepis undula (Schränk, 1788) Weinland, 1858 (N, S, Si, Sa) (U Pa) (*)

Fuhrmannolepis Spasskii & Spasskaya, 1965

Fuhrmannolepis birostrata (Belogurov & Zueva, 1968) (N) (U Ca) (*)

Himantaurus Spasskaya & Spasskii, 1971

Himantaurus minutus (Cohn, 1901) Spasskaya & Spasskii, 1971 (N) (U Ca)

Hirundinicola Birova-Volosinovicova, 1969

Hirundinicola chelidonariae (Spasskaya, 1957) (N) (U Pa)
Hirundinicola parvirostris (Krabbe, 1869) (N) (U Pa) (*)

Kowalewskiella Baczyńska, 1914

Kowalewskiella cingulifera (Krabbe, 1868) Lopez-Neyra, 1952 (N, Sa) (U Ca)

Monopylidium Fuhrmann, 1899

Monopylidium musculosum (Fuhrmann, 1896) Fuhrmann, 1899 (N) (U Pa)

Monosertum Bona, 1994

Monosertum parinum (Dujardin, 1845) Bona, 1994 (N) (U Pa)

Multitesticulata Meggitt, 1927

Multitesticulata filamentosa (Goeze, 1782) Meggitt, 1927 (N, S) (M In) (*)

Neogryporhynchus Baer & Bona, 1960

Neogryporhynchus cheilancristrotus (Wedl, 1855) Baer & Bona, 1960 (N) (U Cc) (*)
Neogryporhynchus lasiopeiis Baer & Bona, 1960 (N) (U Cc)

Neoliga Singh, 1952

Neoliga depressa (v. Siebold, 1836) Bona, 1994 (N, Sa) (U Ap) (*)

Paricterotaenia Fuhrmann, 1932

Paricterotaenia coronata (Creplin, 1829) Fuhrmann, 1932 (N) (U Ca)
Paricterotaenia dodecacantha (Krabbe, 1869) Fuhrmann, 1932 (S) (U La)
Paricterotaenia embryo (Krabbe, 1869) Fuhrmann, 1932 (N) (U Ca) (*)
Paricterotaenia inversa (Rudolphi, 1819) Fuhrmann, 1932 (Sa) (U La)
Paricterotaenia porosa (Rudolphi, 1810) Fuhrmann, 1932 (N) (U La) (*)

Parvitaenia Burt, 1940

Parvitaenia macropeos (Wedl, 1855) Baer & Bona, 1960 (N) (U Cc)

Polycercus Villot, 1883

Polycercus lumbrici Villot, 1883 (N) (U Ca)

Prochoanotaenia Meggitt, 1924

Prochoanotaenia marchali (Mola, 1907) Meggitt, 1924 (N, Sa) (U Ra)

Sacciuterina Matevosyan, 1963

Sacciuterina paradoxa (Rudolphi, 1802) Bona, 1994 (N) (U Ca)

Spasspasskya Bona, 1994

Spasspasskya passerum (Joyeux & Timon-David, 1934) Bona, 1994 (N) (U Pa)

Spiniglans Yamaguti, 1959

Spiniglans constricta (Molin, 1858) (N) (U Pa) (*)
Spiniglans infundibulum (Bloch, 1779) (N) (U Pa) (*)

Valipora Linton, 1927

Valipora campylancristrota (Wedl, 1855) Baer & Bona, 1960 (N) (U Cc)
Valipora mutabilis Linton, 1927 (N) (U Cc)

Vitta Burt, 1938

Vitta rustica (Neslobinsky, 1911) Baer, 1957 (N) (U Pa)

Note

Alcataenia armillaris: Secondo Fuhrmann (1932), *armillaris* Rudolphi, 1810 sarebbe sinonimo di *tordae* Fabricius, 1780, mentre Baer (1956) ritiene quest'ultima nomen nudum, riconvalidando perciò *armillaris*. Secondo Parona (1902), nel proprio materiale raccolto in Alca torda (Portoferraio) esiste una specie diversa da *armillaris* che Fuhrmann avrebbe dovuto descrivere col nome preannunciato di *T. calcareus* (citata anche in Parona, 1912). Questa pubblicazione non è mai comparsa, perciò *calcareus* (che nulla ha a che fare con *Davainea*

calcaria Fuhrmann, 1906) rimane nomen nudum.

Anomotaenia papilla: Species inquirenda, citata anche come *Drepanidotaenia* p. da Parona (1912).

Choanotaenia crateriformis: Esistono dubbi se assegnarla al genere *Krimi* Burt, 1944.

Choanotaenia infundibuliformis: Specie valida, tipo del genere, (vedi Bona, 1994 p. 200 e fig. 10) non più sinonimo di *infundibulum* Bloch, 1779, con la quale fu a lungo confusa (vedi *Spiniglans*).

Dictymetra: Numerose specie di questo genere sono state erroneamente ascritte al genere *Anomotaenia* anche in tempi recenti.

Dilepis undula: Specie citata da Molin (1858) in Italia settentrionale col nome di *Taenia undulata* Rudolphi. Parona (1912) la elenca come *Hymenolepis undulata*.

Fuhrmannolepis birostrata: Il trasferimento al genere *Fuhrmannolepis* è automatico dopo la revisione delle diagnosi generiche effettuata da Bona in Khalil et al. (1994).

Hirundinicola parvirostris: Il trasferimento al genere *Hirundinicola* è automatico dopo la revisione delle diagnosi generiche effettuata da Bona in Khalil et al. (1994).

Multitesticulata filamentosa: Il nome *blanchardi* figura anche in Parona (1912). Specie ascritta in passato anche a *Monopylidium* e altri generi.

Neogryporhynchus cheilancristrotus: Sin. *Taenia brevirostris* Weld, 1855, elencata da Parona (1912).

Neoliga depressa: In Parona come *T. (Anomotaenia) depressa* v. Siebold, 1836. Da non confondere con *Taenia depressa* sensu v. Linstow (1875 e 1896) e vari altri autori.

Paricterotaenia embryo: Specie talora ascritta a *Choanotaenia* o a *Polycercus*.

Paricterotaenia porosa: In Stossich (1898) figura come *Drepanidotaenia porosa*.

Spiniglans constricta: Il trasferimento di *constricta* dal genere *Choanotaenia* a *Spiniglans* è automatico dopo la revisione delle diagnosi generiche effettuata da Bona in Khalil et al. (1994). Rimane da verificare l'eventuale sinonimia di *constricta* con *infundibulum*.

Spiniglans infundibulum: Per il trasferimento al genere *Spiniglans* vedi nota 100.0.001.0.

Specie da non confondere con *infundibuliformis* Goeze, 1782, parassita di Galliformi, con la quale è stata a lungo confusa (vedi 081.0.002.0).

Dipylidiidae

Diplopylidium Beddard, 1913

Diplopylidium acanthotera (Parona, 1887) Beddard, 1913 (S, Sa) (M Cv) (*)

Dipylidium Leuckart, 1863

Dipylidium caninum (Linnaeus, 1758) Leuckart, 1863 (N, S, Si, Sa) (M Cv)

Dipylidium sexcoronatum Ratz, 1900 (N, S, Si, Sa) (M Cv) (*)

Joyeuxiella Fuhrmann, 1935

Joyeuxiella echinorhynchoides (Sonsino, 1889) Fuhrmann, 1935 (N, S, Si, Sa) (M Cv)

Joyeuxiella pasqualei (Diamare, 1893) Schmidt, 1986 (N, S) (M Cv)

Note

Diplopylidium acanthotera: Parona (1912) elenca trinchesi come specie valida.
Dipylidium sexcoronatum: Osservazioni personali.

Paruterinidae

Anonchotaenia Cohn, 1900

Anonchotaenia globata (v. Linstow, 1879) Cohn, 1900 (N, S) (U Pa) (*)

Biuterina Fuhrmann, 1902

Biuterina meropina (Krabbe, 1869) Fuhrmann, 1908 (N) (U Co)

Biuterina passerina Fuhrmann, 1908 (N) (U Pa)

Biuterina triangula (Krabbe, 1869) Fuhrmann, 1908 (N) (U Pa)

Cladotaenia Cohn, 1901

Cladotaenia cylindracea (Bloch, 1782) Cohn, 1901 (N) (U Ac)

Cladotaenia globifera (Batsch, 1786) Cohn, 1901 (N, Sa) (U Ac)

Lyruterina Spasskaya & Spasskii, 1971

Lyruterina nigropunctata (Crety, 1890) Spasskaya & Spasskii, 1971 (S, Sa) (U Ga)

Metroliaesthes Ransom, 1900

Metroliaesthes sp. (Sa) (U Ga) (*)

Neyraia Joyeux & Timon-David, 1934

Neyraia intricata (Krabbe, 1882) Joyeux & Timon-David, 1934 (N) (U Co)

Orthoskrjabinia Spasskii, 1947

Orthoskrjabinia bobica (Clerc, 1903) Spasskii, 1947 (N) (U Pa) (*)

Orthoskrjabinia conica (Fuhrmann, 1908) Spasskii, 1947 (N) (U Pa) (*)

Paruterina Fuhrmann, 1906

Paruterina candelabraria (Goeze, 1782) Fuhrmann, 1906 (N, S) (U St)

Paruterina parallelepipedata (Rudolphi, 1810) Fuhrmann, 1906 (N) (U Pa)

Paruterina vesiculigera (Krabbe, 1882) Fuhrmann, 1926 (N) (U Ap)

Sphaeruterina Johnston, 1914

Sphaeruterina purpurata (Dujardin, 1845) (N) (U Pa)

Note

Anonchotaenia globata: Entrambi i sinonimi sono elencati come specie valide in Parona (1912). Per la specie di Stossich vedi la nota 048.0.001.0.

Metroliaesthes sp.: Probabilmente *M. lucida* Ransom, 1900.

Orthoskrjabinia bobica: Specie originariamente ascritta al genere *Anochotaenia*.

Orthoskrjabinia conica: Da non confondere con *Taenia conica* Molin, 1858 citata dal Parona (1912) in Anseriformi (Nord Italia). (Vedi 116.0.004.0).

Hymenolepididae

Anatinella Spasskii & Spasskaya, 1954

Anatinella brachycephala (Creplin, 1829) Schmidt, 1986 (N, S) (U Ca)

Anatinella tenuirostris (Rudolphi, 1819) Schmidt, 1986 (N) (U As)

Aploparaksis Clerc, 1903

Aploparaksis crassirostris (Krabbe, 1869) Clerc, 1903 (N) (U Ca)

Aploparaksis dujardini (Krabbe, 1869) Clerc, 1903 (N) (U Pa)

Aploparaksis filum (Goeze, 1782) Clerc, 1903 (N, S, Sa) (U Ca)

Aploparaksis furcigera (Nitzsch in Rudolphi, 1819) Linstow, 1905 (N) (U As) (*)

Armadoskrjabinia Spasskii & Spasskaya, 1954

Armadoskrjabinia medici (Stossich, 1890) Spasskii & Spasskaya, 1954 (N, S) (U Pe)

Armadoskrjabinia rostellata (Abildgaard, 1790) Yamaguti, 1959 (N) (U Gv)

Cladogynia Baer, 1938

Cladogynia caroli (Parona, 1887) (Sa) (U Fe) (*)

Cladogynia flamingo (Skrjabin, 1914) (N, S, Sa) (U Fe) (*)

Cladogynia liguloides (Gervais, 1847) (Sa) (U Fe) (*)

Cladogynia rosenthali (Mola, 1913) (Sa) (U Pt) (*)

Dicranotaenia Railliet, 1892

Dicranotaenia coronula (Dujardin, 1845) Railliet, 1892 (N, S) (U As)

Dicranotaenia creplini (Krabbe, 1869) Stossich, 1898 (N) (U As)

Dicranotaenia fallax (Krabbe, 1869) Yamaguti, 1959 (N) (U As)

Dicranotaenia himantopodis (Krabbe, 1869) Lopez-Neyra, 1942 (N) (U Ca)

Dicranotaenia multistriata (Rudolphi, 1810) Lopez-Neyra, 1942 (N) (U Po)

Dicranotaenia riggenbachi (Mola, 1913) Yamaguti, 1959 (Sa) (U As)

Diorchis Clerc, 1903

Diorchis inflata (Rudolphi, 1819) Clerc, 1903 (N) (U Po)
Diorchis ransomi Schultz, 1940 (N) (U Ra)

Diploposthe Jacobi, 1896

Diploposthe laevis (Bloch, 1782) Jacobi, 1896 (N) (U As) (*)

Drepanidotaenia Railliet, 1892

Drepanidotaenia lanceolata (Bloch, 1782) Railliet, 1892 (N) (U As)

Echinocotyle Blanchard, 1891

Echinocotyle anatina (Krabbe, 1869) Blanchard, 1891 (N) (U As)
Echinocotyle longirostris (Rudolphi, 1819) Deblock, 1964 (N) (U Ca)
Echinocotyle rosseteri Blanchard, 1891 (N) (U As)

Echinolepis Spasskii & Spasskaya, 1954

Echinolepis carioca (Magalhaes, 1898) Spasskii & Spasskaya, 1954 (N, S, Si, Sa) (U Ga)

Fimbriaria Froelich, 1802

Fimbriaria fasciolaris (Pallas, 1781) Froelich, 1802 (N, S, Si, Sa) (U As) (*)

Hispaniolepis Lopez-Neyra, 1942

Hispaniolepis villosa (Bloch, 1782) Lopez-Neyra, 1942 (N) (U Ot)

Hymenolepis Weinland, 1858

Hymenolepis arvicolae (Blanchard, 1891) (M In) (*)
Hymenolepis cantaniana (Polonio, 1860) Ransom, 1909 (N) (U Ga) (*)
Hymenolepis coraciae (Rudolphi, 1819) Parona, 1902 (N) (U Cr) (*)
Hymenolepis diminuta (Rudolphi, 1819) Weinland, 1858 (N, S, Si) (M Ro)
Hymenolepis linea (Goeze, 1782) (S, Sa) (U Ga) (*)
Hymenolepis megalops (Nitzsch in Creplin, 1829) Parona, 1899 (N) (U As) (*)
Hymenolepis nasuta (Rudolphi, 1802) (N) (U Pa) (*)
Hymenolepis sphaerophora (Rudolphi, 1810) (S, Sa) (U Ca) (*)

Microsomacanthus Lopez-Neyra, 1942

Microsomacanthus collaris (Batsch, 1786) Lopez-Neyra, 1942 (N) (U As) (*)
Microsomacanthus microcephalus (Rudolphi, 1819) Czaplinski & Vaucher, 1994 (N, Sa) (U Ci) (*)
Microsomacanthus microsoma (Creplin, 1829) Lopez-Neyra, 1942 (N) (U As)
Microsomacanthus parvulus (Kowalewski, 1904) Spasskii & Spasskaya, 1954 (N, S, Si, Sa) (U As) (*)

Microsomacanthus pseudorostellatus (Joyeux & Baer, 1950) Yamaguti, 1959 (N, S, Si) (U Gv) (*)

Microsomacanthus setiger (Froelich, 1789) Schmidt, 1986 (N, S, Si, Sa) (U As)

Microsomacanthus simulans (Joyeux & Baer, 1941) Yamaguti, 1959 (N, S) (U Gv)

Milina van Beneden, 1873

Milina crimensis (Skarbilovitsch, 1946) (N) (M Cp)

Milina grisea van Beneden, 1873 (S) (M Cp)

Nadejdolepis Spasskii & Spasskaya, 1954

Nadejdolepis vallei (Stossich, 1892) Yamaguti, 1959 (N) (U Ca)

Passerilepis Spasskii & Spasskaya, 1954

Passerilepis crenata (Goeze, 1782) Sultanov & Spasskaya, 1959 (N) (U Pa)

Passerilepis passeris (Gmelin, 1790) Spasskii & Spasskaya, 1954 (N) (U Pa)

Passerilepis stylosa (Rudolphi, 1809) Spasskii & Spasskaya, 1954 (N) (U Pa)

Pseudhymenolepis Joyeux & Baer, 1935

Pseudhymenolepis redonica Joyeux & Baer, 1935 (N, Sa) (M In)

Rodentolepis Spasskii, 1954

Rodentolepis asymmetrica (Janicki, 1904) Spasskii, 1954 (N?, S?) (M In)

Rodentolepis erinacei (Gmelin, 1790) Spasskii, 1954 (N) (M In)

Rodentolepis hamanni (Mrazek, 1891) (N) (M In) (*)

Rodentolepis nana (Siebold, 1852) Spasskii, 1954 (N, S, Si, Sa) (M Ro)

Rodentolepis straminea (Goeze, 1782) Spasskii, 1954 (N, S, Si, Sa) (M Ro)

Sobolevicanthus Spasskii & Spasskaya, 1954

Sobolevicanthus gracilis (Zeder, 1803) Spasskii & Spasskaya, 1954 (N) (U As)

Sobolevicanthus wisniewskii (Czaplinski, 1956) (N) (U As)

Soricinia Spasskii & Spasskaya, 1954

Soricinia soricis (Baer, 1927) Spasskii & Spasskaya, 1954 (N) (M In)

Staphylocystis Villot, 1877

Staphylocystis acuta (Rudolphi, 1819) Spasskii, 1950 (N, S) (M Cp)

Staphylocystis dodecacantha (Baer, 1925) Spasskii, 1950 (Sa?) (M In) (*)

Staphylocystis obtusata (Rudolphi, 1819) (S) (M Cp) (*)

Staphylocystis pistillum (Dujardin, 1845) Spasskii, 1950 (N, Sa) (M In)

Staphylocystis scalaris (Dujardin, 1845) Villot, 1877 (N) (M In)

***Vampirolepis* Spasskii, 1954**

- Vampirolepis baeri* Murai, 1976 (N) (M Cp)
- Vampirolepis balsaci* (Joyeux & Baer, 1934) Spasskii, 1954 (N, S) (M Cp)
- Vampirolepis novadomensis* Rysavy, 1961 (N) (M Cp)
- Vampirolepis pipistrelli* (Lopez-Neyra, 1941) Spasskii, 1954 (S) (M Cp)
- Vampirolepis rysavyi* Tenora & Barus, 1960 (N) (M Cp)

***Wardium* Mayhew, 1925**

- Wardium bilharzi* (Krabbe, 1869) Spasskii & Spasskaya, 1954 (N) (U Pa)
- Wardium capillaris* (Rudolphi, 1810) Schmidt, 1986 (N) (U Gv)
- Wardium farciminosa* (Goeze, 1782) Spasskii & Spasskaya, 1954 (N, Sa) (U Pa) (*)

Note

Aploparaksis furcigera: Entrambi i sinonimi sono elencati da Parona (1912) come specie valide.

Cladogynia: Le quattro specie sono state ascritte al genere *Cladogynia* sulla base delle sinonimie generiche stabilite da Czaplinski & Vaucher in Khalil et al. (1994).

Cladogynia caroli: Ascritta da Schmidt (1986) a *Retinometra*.

Cladogynia flamingo: Ascritta da Spasskii & Spasskaya (1954) a *Flamingolepis*.

Cladogynia liguloides: Ascritta da Spasskii & Spasskaya (1954) a *Flamingolepis*.

Cladogynia rosenthali: Ascritta da Spasskii & Spasskaya (1954) a *Octacanthus*.

Diploposthe laevis: Guberti et al. (1991) considerano valide entrambe le specie. La sinonimia andrà riesaminata.

Fimbriaria fasciolaris: *T. malleus* è elencata in Parona (1912) come distinta da *fasciolaris*.

Hymenolepis arvicolae: Da intendersi *sensu lato*. Esistono dubbi sulla località di raccolta.

Hymenolepis cantaniana: In Meleagris gallopavo, specie d'allevamento importata. Ascritta da Spasskii & Oshmarin (1954) al genere *Staphylepis*, oggi considerato sinonimo di *Hymenolepis* (vedi Czaplinski & Vaucher in Khalil et al., 1994).

Hymenolepis coraciae: Da intendersi *Hymenolepis sensu lato*.

Hymenolepis linea: Da intendersi *Hymenolepis sensu lato*.

Hymenolepis megalops: Ascritta da Wolffhügel (1938) al genere *Cloacotaenia* ora sinonimo di *Hymenolepis* (vedi Czaplinski & Vaucher in Khalil et al., 1994).

Hymenolepis nasuta: Da intendersi *Hymenolepis sensu lato*.

Hymenolepis sphaerophora: Da intendersi *Hymenolepis sensu lato*.

Microsomacanthus collaris: In Parona (1912) il nome usato è *Taenia sinuosa* (Rudolphi) (leggi Zeder, 1803), sinonimo di *collaris*.

Microsomacanthus microcephalus: Parona (1912) considera ancora valida *multiformis* Creplin, specie che, tra l'altro, era stata ascritta da Spasskii & Spasskaya (1954) al genere *Oshmarinolepis* oggi caduto in sinonimia con *Microsomacanthus* (vedi Czaplinski & Vaucher in Khalil et al., 1994).

Microsomacanthus parvulus: Specie ascritta da Yamaguti (1959) al genere *Kowalewskius* che sembrerebbe oggi sinonimo di *Microsomacanthus* (vedi Czaplinski & Vaucher in Khalil et al., 1994).

Microsomacanthus pseudorostellatus: Parona (1912) cita *Taenia capitellata* Rudolphi, 1810

partim, frazione che venne succesivamente rinominata pseudorostellatus da Joyeux & Baer (1950).

Milina: Sinonimia dei generi stabilita da Czaplinski & Vaucher in Khalil et al. (1994). Di conseguenza le due specie elencate assumono automaticamente il nome generico Milina.

Passerilepis: Secondo Czaplinski & Vaucher in Khalil et al. (1994) *Passerilepis* sarebbe sinonimo di *Microsomacanthus*. Sinonimia ancora da confermare.

Rodentolepis hamanni: Assegnata a *Vampirolepis* da Yamaguti (1959), trasferita a *Rodentolepis* sulla base delle diagnosi generiche di Czaplinski & Vaucher in Khalil et al. (1994).

Staphylocystis dodecacantha: Segnalata dubitativamente per la Sardegna da Vaucher (1971).

Staphylocystis obtusata: Specie citata da Parona (1912) che, secondo Sprehn (1932), potrebbe essere sinonima di *Staphylocystis acuta*.

Wardium: Sinonimia recentemente stabilita da Czaplinski & Vaucher in Khalil et al. (1994).

Wardium farciminosa: In Parona (1912) figura una *Taenia farciminalis* Batsch, 1786, sinonimo di *farcimiosa* Goeze, 1782.

Taeniidae

Echinococcus Rudolphi, 1801

Echinococcus granulosus (Batsch, 1786) Rudolphi, 1810 (N, S, Si, Sa) (M Cv)

Taenia Linnaeus, 1758

Taenia brauni Setti, 1897 (N) (M Cv) (*)

Taenia crassiceps (Zeder, 1800) Rudolphi, 1810 (N) (M Cv)

Taenia hydatigena Pallas, 1766 (N, S, Si, Sa) (M Cv) (*)

Taenia multiceps Leske, 1780 (N, S, Si, Sa) (M Cv) (*)

Taenia ovata Molin, 1858 (N, S, Si, Sa) (M Cv)

Taenia ovis (Cobbold, 1869) Ransom, 1913 (N, S, Si, Sa) (M Cv) (*)

Taenia pisiformis (Bloch, 1780) Gmelin, 1790 (N) (M Cv) (*)

Taenia polyacantha Leuckart, 1856 (N) (M Cv)

Taenia saginata (Goeze, 1782) Weinland, 1858 (M Ho) (*)

Taenia serialis (Gervais, 1847) Baillet, 1867 (N, S, Si, Sa) (M Cv)

Taenia solium Linnaeus, 1758 (M Ho) (*)

Taenia taeniaeformis Batsch, 1786 (N, S, Si, Sa) (M Cv) (*)

Taenia tenuicollis Rudolphi, 1819 (N, S, Si, Sa) (M Cv)

Note

Taenia brauni: *T. brachysoma* è il nome usato da Parona (1912).

Taenia hydatigena: In Parona (1912) il nome usato è *T. marginata* Batsch (leggi Goeze, 1782), sinonimo di *hidatigena*.

Taenia multiceps: Ospiti intermedi: Bovidi, Suidi, Equidi. La larva cenuro può svilupparsi anche nel cervello umano.

Taenia ovis: Ospiti intermedi: Bovidi, Suidi.

Taenia pisiformis: Sin. *T. serrata* Goeze, 1782 citata da Parona (1912). Ospiti intermedi:

Lagomorfi.

Taenia saginata: Assegnata da alcuni autori a *Taeniarhynchus* Weinland, 1858. Segnalata da Parona (1912) come forma larvale in *Bos taurus* a Catania col nome di *T. (Ophryoscolex) inermis* probabilmente del Moquin-Tandon, 1860.

Taenia solium: Attualmente rarissima, se non scomparsa.

Taenia taeniaeformis: *T. crassicollis* è ancora elencata da Parona (1912) come specie valida.

Monogenea

Acanthocotylidae

Acanthocotyle Monticelli, 1903

Acanthocotyle elegans (Monticelli, 1890) (3) (C)

Acanthocotyle lobianchi (Monticelli, 1890) (3) (C)

Acanthocotyle oligoterus (Monticelli, 1899) (3) (C)

Ancyrocephalidae

Ligophorus Euzet & Suriano, 1977

Ligophorus acuminatus Euzet & Suriano, 1977 (3) (O)

Ligophorus chabaudi Euzet & Suriano, 1977 (3) (O)

Ligophorus confusus Euzet & Suriano, 1977 (3, 4) (O)

Ligophorus heteronchus Euzet & Suriano, 1977 (3) (O)

Ligophorus imitans Euzet & Suriano, 1977 (3, 4) (O)

Ligophorus macrocolpos Euzet & Suriano, 1977 (3, 4) (O)

Ligophorus minimus Euzet & Suriano, 1977 (3, 4) (O)

Ligophorus mugilinus (Hargis, 1955) (3, 4) (O)

Ligophorus parvicirrus Euzet & Suriano, 1977 (3, 4) (O)

Ligophorus szidati Euzet & Suriano, 1977 (3, 4) (O)

Ligophorus vanbenedeni (Parona & Perugia, 1890) (3, 4) (O)

Paradiplectanotrema Gerashev, Gayevskaya & Kovaleva, 1987

Paradiplectanotrema trachuri (Kovaleva, 1970) (3) (O)

Tetraonchus Diesing, 1858

Tetraonchus monenteron (Wagener, 1857) (S) (O)

Axinidae

Gastrocotyle van Beneden & Hesse, 1863

Gastrocotyle trachuri (van Beneden & Hesse, 1863) (3) (O)

Pseudaxine Parona & Perugia, 1890

Pseudaxine trachuri (Parona & Perugia, 1890) (3) (O)

Calceostomatidae

Calceostoma van Beneden, 1858

Calceostoma calceostoma (Wagener, 1857) (3) (O)

Calceostomella Palombi, 1943

Calceostomella inermis (Parona & Perugia, 1889) (3) (O)

Capsalidae

Ancyrocotyle Parona & Monticelli, 1903

Ancyrocotyle vallei (Parona & Perugia, 1895) (4) (O)

Anoplodiscus Sonsino, 1890

Anoplodiscus richiardii Sonsino, 1890 (3) (O)

Benedenia Diesing, 1858

Benedenia monticellii (Parona & Perugia, 1895) (3, 4) (O)

Benedenia sciaenae (van Beneden, 1856) (3) (O)

Capsala Bosc, 1811

Capsala martinieri (Bosc, 1811) (3, 4) (O)

Capsala pelamidis (Taschenberg, 1878) (3, 4) (O)

Encotyllabe Dising, 1850

Encotyllabe nordmanni (Diesing, 1850) (3) (O)

Encotyllabe vallei (Monticelli, 1907) (3) (O)

Entobdella Lamarck, 1818

Entobdella diadema (Monticelli, 1901) (3) (O)

Megacotyle Folda, 1929

Megacotyle hexacantha (Parona & Perugia, 1889) (3) (O)

Tristoma Cuvier, 1817

Tristoma coccineum (Cuvier, 1817) (3, 4) (O)

Tristoma integrum (Diesing, 1850) (3, 4) (O)

Tristoma perugiai (Setti, 1898) (3) (O)

Tristomella Guiart, 1938

Tristomella interrupta (Monticelli, 1891) (3) (O)

Tristomella onchidiocotyle (Setti, 1899) (3) (O)

Trochopus Diesing, 1850

Trochopus pini (van Beneden & Hesse, 1863) (3) (O)

Dactylogyridae

Amphibdella Chatin, 1874

Amphibdella torpedinis (Chatin, 1874) (3, 4) (C)

Dactylogyrus Diesing, 1850

Dactylogyrus auriculatus (Nordmann, 1832) (N) (O)

Diclidophoridae

Chimaericola Brinckmann, 1942

Chimaericola leptogaster (Leuckart, 1830) (3) (C)

Dactylocotyle Marshall, 1873

Dactylocotyle denticulatum (Olsson, 1876) (3) (O)

Diclidophora Diesing, 1850

Diclidophora bellones (Otto, 1821) (3) (O)

Diclidophora denticulata (Olsson, 1878) (3) (O)

Diclidophora minor (Olsson, 1876) (3) (O)

Diclidophora phycidis (Parona & Perugia, 1889) (3) (O)

Diclidophoropsis Gallien, 1937

Diclidophoropsis taschenbergi (Parona & Perugia, 1889) (3) (O)

Vallisia Parona & Perugia, 1890

Vallisia striata (Parona & Perugia, 1890) (3, 4) (O)

Diplectanidae

Diplectanum Diesing, 1858

Diplectanum aculeatum (Parona & Perugia, 1889) (3) (O)

Diplectanum aequans (Wagener, 1857) (3, 4) (O)

Diplectanum grassei (Oliver, 1974) (3) (O)

Diplectanum sciaenae (van Beneden & Hesse, 1863) (3, 4) (O)

Furnestia Euzet & Audouin, 1959

Furnestia echeneis (Parona & Perugia, 1889) (3) (O)

Lamellodiscus Johnston & Tiegs, 1922

Lamellodiscus erythrini Euzet & Oliver, 1967 (3) (O)

Diplozoidae

Diplozoon Nordmann, 1832

Diplozoon paradoxum (Nordmann, 1832) (S) (O)

Discocotylidae

Anthocotyle van Beneden & Hesse, 1863

Anthocotyle merluccii (van Beneden & Hesse, 1879) (3) (O)

Hexabothriidae

Erpocotyle van Beneden & Hesse, 1863

Erpocotyle catenulata (Guberlet, 1933) (3) (C)

Erpocotyle laevis (van Beneden & Hesse, 1863) (3) (C)

Hexabothrium Nordmann, 1840

Hexabothrium appendiculatum (Kuhn, 1829) (3) (C)

Protocotyle Euzet & Maillard, 1974

Protocotyle grisea (Cerfontaine, 1899) (3) (C)

Rajonchocotyle Cerfontaine, 1899

Rajonchocotyle prenanti (St. Remy, 1890) (4) (C)

Hexostomatidae

Hexostoma Rafinesque, 1815

Hexostoma auxisi Palombi, 1943 (3) (O)

Hexostoma thynni (De la Roche, 1811) (3) (O)

Mazocraeidae

Grubea Diesing, 1858

Grubea cochlear Diesing, 1858 (3) (O)

Kuhnia Sproston, 1945

Kuhnia scombri (Kuhn, 1829) (3) (O)

Winkenthunghesia Price, 1943

Winkenthunghesia bramae (Parona & Perugia, 1896) (3) (O)

Microcotylidae

Aspinatrium Yamaguti, 1963

Aspinatrium trachini (Parona & Perugia, 1889) (3) (O)

Atrispinum Maillard & Noisy, 1979

Atrispinum labracis (van Beneden & Hesse, 1863) (3, 4) (O)

Atrispinum mormyri (Lorenz, 1878) (3) (O)

Atrispinum salpae (Parona & Perugia, 1890) (3) (O)

Atrispinum seminalis (Euzet & Maillard, 1973) (3, 4) (O)

Axine Abildgaard, 1794

Axine belones Abildgaard, 1794 (3, 4) (O)

Metamicrocotyla Yamaguti, 1953

Metamicrocotyla cephalus (Azim, 1939) (3, 4) (O)

Microcotyle van Beneden & Hesse, 1863

Microcotyle acanthurum Parona & Perugia, 1896 (3) (O)

Microcotyle alcedinis Parona & Perugia, 1889 (3) (O)

Microcotyle canthari van Beneden & Hesse, 1863 (3, 4) (O)

Microcotyle erythrini van Beneden & Hesse, 1863 (3, 4) (O)

Microcotyle lichiae Ariola, 1899 (3) (O)

Microcotyle mormyri Lorenz, 1878 (3, 4) (O)

Microcotyle pancerii Sonsino, 1891 (3) (O)

Microcotyle salpae Parona & Perugia, 1890 (3) (O)

Microcotyle sargi Parona & Perugia, 1889 (3) (O)

Serranicotyle Maillard, Euzet & Silan, 1988

Serranicotyle labracis (van Beneden & Hesse, 1863) (3, 4) (O)

Sparicotyle Mamaev, 1984

Sparicotyle chrysophryii (van Beneden & Hesse, 1863) (3, 4) (O)

Solostamenides Unnithan, 1971

Solostamenides mugilis (Vogt, 1878) (3, 4) (O)

Monocotylidae

Calicotyle Diesing, 1850

Calicotyle kroyeri Diesing, 1850 (3, 4) (C)

Calicotyle stossiichi Braun, 1899 (4) (C)

Enoplocotyle Tagliani, 1909

Enoplocotyle minima Tagliani, 1909 (3) (O)

Leptocotyle Monticelli, 1905

Leptocotyle minor (Monticelli, 1888) (3) (C)

Monocotyle Taschenberg, 1878

Monocotyle myliobatis Taschenberg, 1878 (3, 4) (C)

Plectanocotyle Diesing, 1850

Plectanocotyle gurnardi (van Beneden & Hesse, 1863) (3) (O)

Pseudocotyle van Beneden & Hesse, 1865

Pseudocotyle squatinae van Beneden & Hesse, 1865 (3) (C)

Polystomatidae

Polystoma Zeder, 1800

Polystoma integerrimum (Froelich, 1791) (N) (A An)

Polystomoides Ward, 1917

Polystomoides ocellatum (Rudolphi, 1819) (N) (R Te)

Gnathostomulida

Bursovaginoidea

Austrognathiidae

Austrognathia Sterrer, 1965

Austrognathia riedli Sterrer, 1965 (3, 4)

Triplignathia Sterrer, 1991

Triplignathia adriatica Sterrer, 1991 (4)

Agnathiellidae

Agnathiella Sterrer, 1971

Agnathiella sp. (5) (*)

Note

Agnathiella sp.: Un discreto numero di esemplari di questa specie sono stati rinvenuti vicino a Marsala da M. Curini-Galletti nel 1994.

Gnathostomulidae

Gnathostomula Ax, 1956

Gnathostomula axi Kirsteuer, 1964 (4)

Gnathostomula paradoxa Ax, 1956 (3)

Filospermoidea

Haplognathiidae

Haplognathia Sterrer, 1970

Haplognathia rosacea Sterrer, 1970 (3)

Nemertea

Anopla

Archinemertea

Cephalothricidae

Cephalothrix Oersted, 1843

Cephalothrix bipunctata Burger, 1892 (3)

Cephalothrix linearis (Rathke, 1799) (3, 4)

Cephalothrix mediterranea Gerner, 1969 (3)

Cephalothrix rutifrons (Johnston, 1837) (3)

Procephalothrix Wijnhoff, 1912

Procephalothrix filiformis (Johnston, 1829) (3)

Cephalotrichella (Wijnhoff, 1913)

Cephalotrichella signata (Hubrecht, 1879) (3)

Palaeonemertea

Hubrechtidae

Hubrechtia Burger, 1892

Hubrechtia desiderata (Kennel, 1891) (3)

Tubulanidae

Tubulanus Renier, 1804

- Tubulanus annulatus* (Montagu, 1804) (3, 4)
- Tubulanus inexpectatus* (Hubrecht, 1880) (3)
- Tubulanus linearis* (W.C. McIntosh, 1874) (3)
- Tubulanus miniatus* (Burger, 1892) (3)
- Tubulanus nothus* (Burger, 1892) (3)
- Tubulanus polymorphus* Renier, 1804 (3, 4)
- Tubulanus rubicundus* (Burger, 1892) (3)
- Tubulanus superbus* (Kölliker, 1845) (3, 4)
- Tubulanus tubicola* (v. Kennel, 1891) (3)

Heteronemertea

Baseodiscidae

Baseodiscus Diesing, 1850

- Baseodiscus delineatus* (Delle Chiaje, 1825) (3)
- Baseodiscus minor* (Hubrecht, 1879) (3)
- Baseodiscus pellucidus* (Kennel, 1891) (3)

Lineidae

Cerebratulus Renier, 1804

- Cerebratulus fuscus* (W.C. McIntosh, 1874) (3)
- Cerebratulus hepaticus* Hubrecht, 1879 (3)
- Cerebratulus liguricus* Blanchard, 1849 (3)
- Cerebratulus marginatus* Renier, 1804 (3, 4)
- Cerebratulus pantherinus* Hubrecht, 1879 (3)

Cerebratulus roseus (Delle Chiaje, 1841) (3)
Cerebratulus urticans (J. Müller, 1854) (3)

Lineus Sowerby, 1806

Lineus bilineatus (Renier, 1804) (3, 4)
Lineus lacteus (Rathke, 1843) (3)
Lineus nigricans Burger, 1892 (3)
Lineus ruber (O.F. Müller, 1774) (3)
Lineus sanguineus (Rathke, 1799) (3, 4)
Lineus viridis (O.F. Müller, 1774) (3)

Micrura Ehrenberg, 1831

Micrura aurantiaca (Grube, 1855) (3, 4)
Micrura dellechiajei (Hubrecht, 1879) (3)
Micrura fasciolata Ehrenberg, 1831 (3, 4)
Micrura lactea (Hubrecht, 1879) (3)
Micrura purpurea (Dalyell, 1853) (3, 4)
Micrura tristis (Hubrecht, 1879) (3)

Diplopleura Stimpson, 1857

Diplopleura formosa (Hubrecht, 1879) (3)

Euborlasia Vaillant, 1890

Euborlasia elizabethae (W.C. McIntosh, 1874) (3)

Notospermus Henschke, 1830

Notospermus geniculatus (Delle Chiaje, 1823) (3, 5)

Valenciniidae

Valencinia Quatrefages, 1846

Valencinia longirostris Quatrefages, 1846 (3)

Enopla

Hoplonemetea

Amphiporidae

Amphiporus Ehrenberg, 1831

- Amphiporus allucens* Burger, 1895 (3)
- Amphiporus bioculatus* (W.C. McIntosh, 1874) (3)
- Amphiporus lactifloreus* (Johnston, 1828) (3, 4)

Valdivianemertes Grube, 1840

- Valdivianemertes stannii* (Grube, 1840) (3)

Zygonemertes Burger, 1895

- Zygonemertes algensis* (Burger, 1895) (3)

Duosnemertes Friedrich, 1955

- Duosnemertes marmoratus* (Burger, 1895) (3)

Nipponnemertes Friedrich, 1968

- Nipponnemertes pulcher* (Johnston, 1837) (3, 4)

Cyanophthalma Norenburg, 1986

- Cyanophthalma cordiceps* (Jensen, 1878) (3)

Carcinonemertidae

Carcinonemertes Coe, 1902

- Carcinonemertes carcinophila* (Kölliker, 1845)
- Carcinonemertes carcinophila carcinophila* (Kölliker, 1845) (3)

Emplectonematidae

Emplectonema Stimpson, 1857

- Emplectonema echinoderma* (Marion, 1873) (3)
- Emplectonema gracile* (Johnston, 1837) (3, 4)
- Emplectonema neesi* (Oersted, 1843) (3)

Nemertopsis Burger, 1895

- Nemertopsis bivittata* (Delle Chiaje, 1841) (3)

Nemertopsis flavida (McIntosh, 1873) (3)
Nemertopsis peronea (Quatrefages, 1846) (3)
Nemertopsis tenuis Burger, 1895 (3)

Ototyphlonemertidae

Ototyphlonemertes Diesing, 1863

Ototyphlonemertes aurantiaca (Plessis, 1891) (3)
Ototyphlonemertes brunnea Burger, 1895 (3)
Ototyphlonemertes claparedii (Plessis, 1891) (3)
Ototyphlonemertes duplex Burger, 1895 (3)
Ototyphlonemertes macintoshi Burger, 1895 (3)

Prosorhochmidae

Oerstedtia Quatrefages, 1846

Oerstedtia dorsalis (Abildgaard, 1806) (3, 4)
Oerstedtia vittata Hubrecht, 1879 (3)

Prosorhochmus Keferstein, 1862

Prosorhochmus claparedii Keferstein, 1862 (3, 4)

Oerstedtiella Kirsteuer, 1963

Oerstedtiella tenuicollis Kirsteuer, 1963 (4)

Tetrastemmatidae

Tetrastemma Ehrenberg, 1831

Tetrastemma candidum (O.F. Müller, 1774) (3, 4, 5)
Tetrastemma cephalophorum Burger, 1895 (3)
Tetrastemma coronatum (Quatrefages, 1846) (3, 4)
Tetrastemma cruciatum Burger, 1895 (3)
Tetrastemma diadema Hubrecht, 1879 (3, 4)
Tetrastemma flavidum Ehrenberg, 1831 (3, 4)
Tetrastemma fulvum Kirsteuer, 1963 (4)
Tetrastemma helvolum Burger, 1895 (3, 4)
Tetrastemma longissimum Burger, 1895 (3, 4)
Tetrastemma melanocephalum (Johnston, 1837) (3, 4, 5)
Tetrastemma nimbatum Burger, 1895 (3)
Tetrastemma peltatum Burger, 1895 (3, 4)

Tetrastemma quatrefagesi Burger, 1904 (3)
Tetrastemma vastum Burger, 1895 (3, 4)
Tetrastemma vermiculus (Quatrefages, 1846) (3)
Tetrastemma virgatum Kirsteuer, 1963 (4)
Tetrastemma vittigerum (Burger, 1904) (3)

Prostomatella Friedrich, 1935

Prostomatella arenicola Friedrich, 1935 (*)

Prostoma Dugès, 1828

Prostoma graecense (Bohmig, 1892) (S)

Note

Prostomatella arenicola: Specie non segnalata per le acque italiane.

Drepanogigantidae

Drepanogigas Burger, 1895

Drepanogigas albolineatus (Burger, 1895) (3)

Paradrepanophoridae

Paradrepanophorus Stiasny-Wijnhoff, 1926

Paradrepanophorus corallinicola Stiasny-Wijnhoff, 1926 (3)
Paradrepanophorus crassus (Quatrefages, 1846) (3)
Paradrepanophorus nisidensis (Hubrecht, 1874) (3)

Brinckmanniidae

Brinkmannia Stiasny-Wijnhoff, 1926

Brinkmannia mediterranea Stiasny-Wijnhoff, 1926 (3)

Drepanophoridae

Drepanophorus Hubrecht, 1879

Drepanophorus rubrostriatus (Hubrecht, 1874) (3)

Punnettia Stiasny-Wijnhoff, 1926

Punnettia hubrechtii Stiasny-Wijnhoff, 1926 (3)

Punnettia spectabilis (Quatrefages, 1846) (3, 4)

Punnettia splendida (Keferstein, 1862) (3)

Bdellonemertea

Malacobdellidae

Malacobdella Blainville, 1827

Malacobdella grossa (O.F. Müller, 1776) (3, 5)

Gastrotricha

Macrodasysida

Dactylopodolidae

Dactylopodola Strand, 1929

Dactylopodola typhle (Remane, 1927 partim) (3, 4, 5)

Dactylopodola sp. A (3) (*)

Dendrodasys Wilke, 1954

Dendrodasys affinis Wilke, 1954 (3)

Dendrodasys gracilis Wilke, 1954 (3)

Dendrodasys sp. A (3) (*)

Dendropodola Hummon, Todaro & Tongiorgi, 1993

Dendropodola transitionalis Hummon, Todaro & Tongiorgi, 1993 (3)

Note

Dactylopodola sp. A: Specie inedita di imminente descrizione.

Dendrodasys sp. A: Specie inedita di imminente descrizione.

Lepidodasyidae

Cephalodasys Remane, 1926

Cephalodasys hadrosomus Hummon, Todaro & Tongiorgi, 1993 (4)
Cephalodasys littoralis Renaud-Debyser, 1964 (3)
Cephalodasys turbanelloides (Boaden, 1960) (3, 5)

Dolichodasys Gagne, 1977

Dolichodasys elongatus Gagne, 1977 (3, 4, 5)

Lepidodasys Remane, 1926

Lepidodasys martini Remane, 1926 (3, 4, 5)
Lepidodasys platyurus Remane, 1927 (3)
Lepidodasys unicarenotus Balsamo, Fregni & Tongiorgi, 1994 (3)

Megadasys Schmidt, 1974

Megadasys minor Kisielewski, 1987 (3)

Mesodasys Remane, 1951

Mesodasys adenotubulatus Hummon, Todaro & Tongiorgi, 1993 (3, 5)
Mesodasys ischiensis Hummon, Todaro & Tongiorgi, 1993 (3)
Mesodasys laticaudatus Remane, 1951 (3, 4)
Mesodasys littoralis Remane, 1951 (3)

Pleurodasys Remane, 1927

Pleurodasys helgolandicus Remane, 1927 sensu Boaden, 1963 (3)

Macrodasysidae

Macrodasys Remane, 1924

Macrodasys caudatus Remane, 1927 (3, 4, 5)
Macrodasys gerlachi Papi, 1957 (3)
Macrodasys neapolitanus Papi, 1957 (3)
Macrodasys thuscus Luporini, Magagnini & Tongiorgi, 1973 (3, 5)

Urodasys Remane, 1926

Urodasys viviparus Wilke, 1954 (3, 4, 5)

Thaumastodermatidae

Acanthodasys Remane, 1927

Acanthodasys aculeatus Remane, 1927 (3, 4, 5)

Diplodasys Remane, 1927

Diplodasys ankeli Wilke, 1954 (3, 4, 5)

Diplodasys meloriae Todaro, Balsamo & Tongiorgi, 1992 (3)

Diplodasys minor Remane, 1926 (3, 4)

Diplodasys platydasyoides Remane, 1927 (3)

Hemidasys Claparède, 1867

Hemidasys agaso Claparède, 1867 (3) (*)

Platydasys Remane, 1927

Platydasys maximus Remane, 1927 (3)

Platydasys phacellatus Clausen, 1965 (3)

Platydasys styliferus Boaden, 1965 (3)

Platydasys tentaculatus Swedmark, 1956 (3)

Pseudostomella Swedmark, 1956

Pseudostomella etrusca Hummon, Todaro & Tongiorgi, 1993 (3)

Pseudostomella roscovita Swedmark, 1956 (3, 4, 5)

Ptychostomella Remane, 1926

Ptychostomella mediterranea Remane, 1927 (3, 5)

Ptychostomella tyrrhenica Hummon, Todaro & Tongiorgi, 1993 (3)

Tetranchyroderma Remane, 1926

Tetranchyroderma antennatum Luporini, Magagnini & Tongiorgi, 1973 (3, 4)

Tetranchyroderma apum Remane, 1927 (3, 5)

Tetranchyroderma boadeni Schrom, 1972 (4, 5)

Tetranchyroderma cirrophorum Levi, 1950 (3)

Tetranchyroderma esarhabdophorum Tongiorgi & Balsamo, 1984 (3, 5)

Tetranchyroderma heterotubulatum Hummon, Todaro & Tongiorgi, 1993 (3, 4, 5)

Tetranchyroderma hirtum Luporini, Magagnini & Tongiorgi, 1973 (3)

Tetranchyroderma hypopsilancrum Hummon, Todaro & Tongiorgi, 1993 (3, 4, 5)

Tetranchyroderma insulare Balsamo, Fregni & Tongiorgi, 1994 (3)

Tetranchyroderma megastomum (Remane, 1927) (3, 4)

Tetranchyroderma pachysomum Hummon, Todaro & Tongiorgi, 1993 (3, 4)

Tetranchyroderma papii Gerlach, 1953 (3, 4, 5)

Tetranchyroderma polypodium Luporini, Magagnini & Tongiorgi, 1973 (3)

Tetranchyroderma quadritentaculatum Todaro, Balsamo & Tongiorgi, 1992 (3)

Tetranchyroderma sanctaecaterinae Todaro, Balsamo & Tongiorgi, 1992 (3)

Tetranchyroderma sardum Todaro, Balsamo & Tongiorgi, 1988 (3, 5)
Tetranchyroderma thysanogaster Boaden, 1965 (3)
Tetranchyroderma thysanophorum Hummon, Todaro & Tongiorgi, 1993 (3, 5)
Tetranchyroderma varum Wilke, 1954 (3)
Tetranchyroderma sp. A (3, 4) (*)
Tetranchyroderma sp. B (5) (*)
Tetranchyroderma sp. C (3) (*)
Tetranchyroderma sp. D (4) (*)
Tetranchyroderma sp. E (3) (*)
Tetranchyroderma sp. F (5) (*)
Tetranchyroderma sp. G (3) (*)

***Thaumastoderma* Remane, 1927**

Thaumastoderma mediterraneum Remane, 1927 (3, 4, 5)
Thaumastoderma ramuliferum Clausen, 1965 (3, 5)

Note

Acanthodasys: Ci sono note 3 specie di questo genere, tuttora inedite (distribuzione: 3 5).
Diplodasys: Ci è nota una ulteriore specie di questo genere, tuttora inedita (distribuzione: 4).
Hemidasys agaso: Specie dubbia.
Platydasys: Ci è nota una ulteriore specie di questo genere, tuttora inedita (distribuzione: 3).
Ptychostomella: Ci è nota una ulteriore specie di questo genere, tuttora inedita (distribuzione 3).
Tetranchyroderma: Ci sono note 20 specie di questo genere, tuttora inedite (distribuzione: 3).
Tetranchyroderma sp. A: Specie inedita di imminente descrizione.
Tetranchyroderma sp. B: Specie inedita di imminente descrizione.
Tetranchyroderma sp. C: Specie inedita di imminente descrizione.
Tetranchyroderma sp. D: Specie inedita di imminente descrizione.
Tetranchyroderma sp. E: Specie inedita di imminente descrizione.
Tetranchyroderma sp. F: Specie inedita di imminente descrizione.
Tetranchyroderma sp. G: Specie inedita di imminente descrizione.

Turbanellidae

***Paraturbanella* Remane, 1927**

Paraturbanella dohrni Remane, 1927 (3, 4, 5)
Paraturbanella microptera Wilke, 1954 (3)
Paraturbanella pallida Luporini, Magagnini & Tongiorgi, 1973 (3, 4, 5)
Paraturbanella teissieri Swedmark, 1954 (3, 4, 5)

***Turbanella* Schultze, 1853**

Turbanella ambronensis Remane, 1943 (3, 4, 5)
Turbanella bocqueti Kaplan, 1958 sensu Boaden, 1974 (3, 4)

Turbanella cirrata Papi, 1957 (3, 4, 5)
Turbanella cornuta Remane, 1924 (3, 5)
Turbanella hyalina Schultze, 1853 (3, 5)
Turbanella italica Gerlach, 1953 (5)
Turbanella otti Schrom, 1972 (5)
Turbanella petiti Remane, 1952 (3)
Turbanella thiophila Boaden, 1974 (3, 4, 5)
Turbanella veneziana Schrom, 1972 (5)

Chaetonotida

Dichaeturidae

Dichaetura Lauterborn, 1913

Dichaetura capricornia (Metschnikoff, 1865) (Sa)

Chaetonotidae

Aspidiophorus Voigt, 1904

Aspidiophorus cf. heterodermus Saito, 1937 (N)
Aspidiophorus mediterraneus Remane, 1927 (3, 4, 5)
Aspidiophorus oculifer Kisielewski, 1981 (N, S)
Aspidiophorus ophiodermus Balsamo, 1983 (S)
Aspidiophorus paradoxus (Voigt, 1902) (Sa)
Aspidiophorus paramediterraneus Hummon, 1974 (3, 4, 5)
Aspidiophorus polystictos Balsamo & Todaro, 1987 (3, 4, 5)
Aspidiophorus squamulosus Roszczak, 1935 (S)
Aspidiophorus tentaculatus Wilke, 1954 (3)
Aspidiophorus sp. A (5) (*)

Chaetonotus (Brevipedichaeta) Schwank, 1990

Chaetonotus (Brevipedichaeta) brachyurus Balsamo, 1981 (S)
Chaetonotus (Brevipedichaeta) uncinus Voigt, 1902 (Sa)

Chaetonotus (Diversichaetatella) Schwank, 1990

Chaetonotus (Diversichaetatella) acanthocephalus Valkanov, 1937 (S)

Chaetonotus (Euchaetonotus) Schwank, 1990

Chaetonotus (Euchaetonotus) aegilonensis Balsamo, Todaro & Tongiorgi, 1992 (3)
Chaetonotus (Euchaetonotus) aequispinosus Schrom, 1972 (5)

Chaetonotus (Euchaetonotus) angustus Schrom, 1972 (5)
Chaetonotus (Euchaetonotus) apechochaetus Hummon, Balsamo & Todaro, 1992 (3, 5)
Chaetonotus (Euchaetonotus) apolemmus Hummon, Balsamo & Todaro, 1992 (3, 4, 5)
Chaetonotus (Euchaetonotus) arethusae Balsamo & Todaro, 1995 (N)
Chaetonotus (Euchaetonotus) brevispinosus Zelinka, 1889 (N, S, Sa)
Chaetonotus (Euchaetonotus) chuni Voigt, 1901 (N, Sa)
Chaetonotus (Euchaetonotus) daphnes Balsamo & Todaro, 1995 (N)
Chaetonotus (Euchaetonotus) disjunctus Greuter, 1917 (N, S, Sa)
Chaetonotus (Euchaetonotus) fluviatilis Balsamo & Kisielewski, 1986 (N)
Chaetonotus (Euchaetonotus) heideri Brehm, 1917 (N, S, Sa) (*)
Chaetonotus (Euchaetonotus) heterospinosus Balsamo, 1978 (N, S)
Chaetonotus (Euchaetonotus) hirsutus Marcolongo, 1910 (N, S)
Chaetonotus (Euchaetonotus) laroides Marcolongo, 1910 (S)
Chaetonotus (Euchaetonotus) larus Müller, 1786 (N, S, Sa)
Chaetonotus (Euchaetonotus) lunatospinosus Balsamo, 1980 (N)
Chaetonotus (Euchaetonotus) mariae Todaro, 1992 (3)
Chaetonotus (Euchaetonotus) maximus Ehrenberg, 1830 (N, S, Sa)
Chaetonotus (Euchaetonotus) microchaetus Preobrajenskaia, 1926 (N, S)
Chaetonotus (Euchaetonotus) minimus Marcolongo, 1910 (S)
Chaetonotus (Euchaetonotus) multispinosus Grünspan, 1908 (N, S, Sa)
Chaetonotus (Euchaetonotus) mutinensis Balsamo, 1978 (N, S)
Chaetonotus (Euchaetonotus) naiadis Balsamo & Todaro, 1995 (N)
Chaetonotus (Euchaetonotus) napoleonicus Balsamo, Todaro & Tongiorgi, 1992 (3)
Chaetonotus (Euchaetonotus) cf. oculifer Kisielewski, 1981 (N)
Chaetonotus (Euchaetonotus) parthenopeius Wilke, 1954 (3)
Chaetonotus (Euchaetonotus) polyspinosus Balsamo, 1983 (N, S, Sa)
Chaetonotus (Euchaetonotus) poznaniensis Kisielewski, 1981 (N, S)
Chaetonotus (Euchaetonotus) siciliensis Hummon, Balsamo & Todaro, 1992 (3, 4, 5)
Chaetonotus (Euchaetonotus) similis Zelinka, 1889 (N, S)
Chaetonotus (Euchaetonotus) simrothi Voigt, 1909 (Sa)
Chaetonotus (Euchaetonotus) sphagnophilus Kisielewski, 1981 (N)
Chaetonotus (Euchaetonotus) sp. A (5)

***Chaetonotus (Hystricochaetonotus)* Schwank, 1990**

Chaetonotus (Hystricochaetonotus) acanthophorus Stokes, 1888 (S)
Chaetonotus (Hystricochaetonotus) aemilianus Balsamo, 1978 (N, S)
Chaetonotus (Hystricochaetonotus) benacensis Balsamo & Fregni, 1995 (N)
Chaetonotus (Hystricochaetonotus) decemsetosus Marcolongo, 1910 (S)
Chaetonotus (Hystricochaetonotus) enormis Stokes, 1888 (N, S, Sa)
Chaetonotus (Hystricochaetonotus) hystrix Metschnikoff, 1865 (N, S, Sa)
Chaetonotus (Hystricochaetonotus) italicus Balsamo & Todaro, 1995 (N)
Chaetonotus (Hystricochaetonotus) lacunosus Mock, 1979 (3, 4, 5)
Chaetonotus (Hystricochaetonotus) longispinosus Stokes, 1887 (Sa)
Chaetonotus (Hystricochaetonotus) macrochaetus Zelinka, 1889 (N, S, Sa)
Chaetonotus (Hystricochaetonotus) novenarius Greuter, 1917 (S)
Chaetonotus (Hystricochaetonotus) paucisetosus Marcolongo, 1910 (S)
Chaetonotus (Hystricochaetonotus) persetosus Zelinka, 1889 (N, S, Sa)

Chaetonotus (Hystricochaetonotus) pungens Balsamo, 1990 (S)
Chaetonotus (Hystricochaetonotus) spinulosus Stokes, 1887 (Sa)
Chaetonotus (Hystricochaetonotus) trispinosus Balsamo, 1990 (S)
Chaetonotus (Hystricochaetonotus) variosquamatus Mock, 1979 (3, 4)

***Chaetonotus (Schizochaetonotus)* Schwank, 1990**

Chaetonotus (Schizochaetonotus) atrox Wilke, 1954 (3, 4, 5)
Chaetonotus (Schizochaetonotus) dispar Wilke, 1954 (3, 4, 5)
Chaetonotus (Schizochaetonotus) hilarus Schrom, 1972 (5)
Chaetonotus (Schizochaetonotus) inaequidentatus Kisielewski, 1988 (3)
Chaetonotus (Schizochaetonotus) modestus Schrom, 1972 (5)
Chaetonotus (Schizochaetonotus) neptuni Wilke, 1954 (3, 4)
Chaetonotus (Schizochaetonotus) oplites Balsamo, Fregni & Tongiorgi, 1994 (N)
Chaetonotus (Schizochaetonotus) robustus Davison, 1938 (N)
Chaetonotus (Schizochaetonotus) schultzei Metschnikoff, 1865 (N, S, Sa)
Chaetonotus (Schizochaetonotus) serenus Schrom, 1972 (5)

***Chaetonotus (Zonochaeta)* Remane, 1927**

Chaetonotus (Zonochaeta) cf. acanthodes Stokes, 1887 (N)
Chaetonotus (Zonochaeta) bisacer Greuter, 1917 (N, S)
Chaetonotus (Zonochaeta) cestacanthus Balsamo, 1990 (S)
Chaetonotus (Zonochaeta) dracunculus Balsamo, 1990 (S)
Chaetonotus (Zonochaeta) ophiogaster Remane, 1927 (N, S)
Chaetonotus (Zonochaeta) pentacanthus Balsamo, 1981 (S)

***Fluxiderma* d'Hondt, 1974**

Fluxiderma concinnum (Stokes, 1887) (Sa)

***Halichaetonotus* Schrom, 1972**

Halichaetonotus aculifer (Gerlach, 1953) (3, 4, 5)
Halichaetonotus atlanticus Kisielewski, 1988 (3)
Halichaetonotus batillifer (Luporini, Magagnini & Tongiorgi, 1972) (3, 4)
Halichaetonotus decipiens (Remane, 1929) (3, 5)
Halichaetonotus etrolomus Hummon, Balsamo & Todaro, 1992 (3)
Halichaetonotus jucundus (d'Hondt, 1971) sensu Mock, 1979 (3, 4, 5)
Halichaetonotus margaretae Hummon, Balsamo & Todaro, 1992 (3, 4, 5)
Halichaetonotus paradoxus (Remane, 1927) (3, 4)
Halichaetonotus parvus (Wilke, 1954) (3)
Halichaetonotus riedli Schrom, 1972 (5)
Halichaetonotus spinosus Mock, 1979 (3, 4, 5)
Halichaetonotus swedmarki Schrom, 1972 (5)
Halichaetonotus thalassopais Hummon, Balsamo & Todaro, 1992 (3, 4)

***Heterolepidoderma* Remane, 1926**

Heterolepidoderma armatum Schrom, 1972 (5)
Heterolepidoderma brevitubulatum Kisielewski, 1981 (S)
Heterolepidoderma clipeatum Schrom, 1972 (5)
Heterolepidoderma contectum Schrom, 1972 (5)
Heterolepidoderma gracile Remane, 1927 (S)
Heterolepidoderma hermaphroditum Wilke, 1954 (3)
Heterolepidoderma istrianum Schrom, 1972 (5)
Heterolepidoderma lamellatum Balsamo & Fregni, 1995 (N, S)
Heterolepidoderma loricatum Schrom, 1972 (3, 4, 5)
Heterolepidoderma macrops Kisielewski, 1981 (N, S)
Heterolepidoderma majus Remane, 1927 (N, S)
Heterolepidoderma marinum Remane, 1926 (3)
Heterolepidoderma multiseriatum Balsamo, 1978 (N)
Heterolepidoderma ocellatum (Metschnikoff, 1865) (N, S, Sa)
Heterolepidoderma pineisquamatum Balsamo, 1980 (N)

Ichthydium Ehrenberg, 1830

Ichthydium cyclocephalum Grünspan, 1908 (3, 5)
Ichthydium diacanthum Balsamo & Todaro, 1995 (N)
Ichthydium forcipatum Voigt, 1901 (Sa)
Ichthydium forficula Remane, 1927 (S)
Ichthydium fossae d'Hondt, 1971 (N, S)
Ichthydium plicatum Balsamo & Fregni, 1995 (N, S)
Ichthydium podura (O.F. Müller, 1773) (N, S, Sa)
Ichthydium squamigerum Balsamo & Fregni, 1995 (N, S, Sa)
Ichthydium tanytrichum Balsamo, 1983 (S)
Ichthydium tergestinum Grünspan, 1908 (5)

Lepidochaetus Kisielewski, 1991

Lepidochaetus zelinkai (Grünspan, 1908) (N, S)

Lepidodermella Blake, 1933

Lepidodermella limogena Schrom, 1972 (5)
Lepidodermella punctata (Greuter, 1917) (N)
Lepidodermella squamata (Dujardin, 1841) (3?)

Musellifer Hummon, 1969

Musellifer delamarei (Renaud-Mornant, 1968) (3, 4)

Polymerurus Remane, 1927

Polymerurus nodicaudus (Voigt, 1901) (N, S, Sa)
Polymerurus nodifurca (Marcolongo, 1910) (S, Sa)

Polymerurus serraticaudus (Voigt, 1901) (Sa)
Polymerurus rhomboides (Stokes, 1887) (N, S, Sa)

Note

Aspidiophorus: Ci sono note ulteriori 3 specie di questo genere, tuttora inedite (distribuzione: 3 5).

Aspidiophorus sp. A: Specie inedita di imminente descrizione.

Chaetonotus (*Euchaetonotus*): Ci sono note 15 specie marine e 10 dulcacquicole di questo genere, tuttora inedite (distribuzione: N S Sa 3 4 5).

Chaetonotus (*Euchaetonotus*) *heideri*: Specie inedita di imminente descrizione.

Halichaetonotus: Ci sono note ulteriori 8 specie di questo genere, tuttora inedite (distribuzione: 3 5).

Heterolepidoderma: Ci sono note ulteriori 3 specie di questo genere, tuttora inedite (distribuzione: 3 5).

Dasydytidae

Anacanthoderma Marcolongo, 1910

Anacanthoderma paucisetosum (Marcolongo, 1910) (S, Sa)

Anacanthoderma punctatum Marcolongo, 1910 (S, Sa)

Haltidytes Remane, 1936

Haltidytes crassus (Greuter, 1917) (S)

Haltidytes saltitans (Stokes, 1887) (Sa)

Chitonodytes Remane, 1967

Chitonodytes longisetosus (Metschnikoff, 1865) (Sa)

Dasydytes Gosse, 1851

Dasydytes ornatus Voigt, 1909 (S)

Setopus Grünspan, 1908

Setopus tongiorgii (Balsamo, 1983) (S)

Stylochaeta Hlava, 1904

Stylochaeta fusiformis (Spencer, 1890) (N, S)

Stylochaeta stylifera (Voigt, 1901) (Sa)

Neogosseidae

Neogosseia Remane, 1927

Neogosseia antennigera (Gosse, 1851) (N, Sa)

Xenotrichulidae

Draculiciteria Hummon, 1974

Draculiciteria tessellata (Renaud-Mornant, 1968) (3, 4, 5)

Heteroxenotrichula Wilke, 1954

Heteroxenotrichula pygmaea (Remane, 1934) (3, 4, 5)

Heteroxenotrichula squamosa Wilke, 1954 (3, 4, 5)

Heteroxenotrichula subterranea (Remane, 1934) (3, 4)

Xenotrichula Remane, 1927

Xenotrichula cornuta Wilke, 1954 (3)

Xenotrichula intermedia Remane, 1934 (3, 4, 5)

Xenotrichula lineata Schrom, 1972 (5)

Xenotrichula punctata Wilke, 1954 (3, 4, 5)

Xenotrichula soikai Schrom, 1972 (5)

Rotifera

Bdelloidea

Habrotrochidae

Habrotrocha Bryce, 1910

Habrotrocha bidens (Gosse, 1851) (N)

Habrotrocha constricta (Dujardin, 1841) (N)

Habrotrocha elegans (Milne, 1886) (N)

Habrotrocha elusa Milne, 1916 (N)

Habrotrocha gracilis Montet, 1915 (N)

Habrotrocha ligula Bryce, 1913 (N)

Habrotrocha sylvestris Bryce, 1915 (N)

Habrotrocha tranquilla Milne, 1916 (N)

Habrotrocha tripus (Murray, 1907) (N)

Otostephanos Milne, 1916

Otostephanos monteti Milne, 1916 (N)

Scepanotrocha Bryce, 1910

Scepanotrocha corniculata Bryce, 1910 (N)

Philodinidae

Macrotrachela Milne, 1886

Macrotrachela cancrophila (Piovanelli, 1903) (S)

Macrotrachela ehrenbergii (Janson, 1893) (N)

Macrotrachela kallosoma (Schulte, 1954) (N)

Macrotrachela papillosa (Thompson, 1892) (N)

Macrotrachela plicata (Bryce, 1892) (N)

Macrotrachela quadricornifera Milne, 1886 (N) (*)

Rotaria Scopoli, 1777

Rotaria citrina (Ehrenberg, 1838) (N, S)

Rotaria elongata (Weber, 1888) (N, S, Sa)

Rotaria haptica (Gosse, 1886) (S)

Rotaria inflata (Dujardin, 1841) (N)

Rotaria macroceros (Gosse, 1851) (N)

Rotaria macrura (Schränk, 1803) (N, S, Sa)

Rotaria magnacalcarata (Parsons, 1892) (N)

Rotaria megaceros (Schmarda, 1854) (S)

Rotaria neptunia (Ehrenberg, 1832) (N, S)

Rotaria rotatoria (Pallas, 1766) (N, S, Sa)

Rotaria socialis (Kellicott, 1888) (N)

Rotaria sordida (Western, 1893) (N)

Rotaria tardigrada (Ehrenberg, 1832) (N, S)

Dissotrocha Bryce, 1910

Dissotrocha aculeata (Ehrenberg, 1832) (N, Sa)

Dissotrocha macrostyla (Ehrenberg, 1838) (N, S)

Embata Bryce, 1910

Embata laticeps (Murray, 1905) (N)

Embata parasitica (Giglioli, 1863) (N)

Philodina Ehrenberg, 1830

Philodina acuticornis Milne, 1916 (N)

Philodina citrina Ehrenberg, 1832 (N, Sa)
Philodina erythrophthalma Ehrenberg, 1832 (S)
Philodina flaviceps Bryce, 1906 (N)
Philodina inopinata Milne, 1916 (N)
Philodina megalotrocha Ehrenberg, 1832 (N, Sa)
Philodina plena (Bryce, 1894) (N)
Philodina proterva Milne, 1916 (N)
Philodina roseola Ehrenberg, 1832 (N, Sa)
Philodina vorax (Janson, 1893) (N)

Mniobia Bryce, 1910

Mniobia circinata (Murray, 1908) (N)
Mniobia montium Murray, 1911 (N)
Mniobia russeola (Zelinka, 1891) (N)
Mniobia symbiotica (Zelinka, 1886) (Sa)

Anomopus Piovaneli, 1903

Anomopus telphusae Piovaneli, 1903 (S)

Zelinkiella (Zelinka, 1988)

Zelinkiella synaptae Zelinka, 1988 (3, 4, 5)

Note

Macrotrachela quadricornifera: Rinvenute anche le forme M. q. ligulata Berzins, 1950 (N) e M. q. scutellata Schulte, 1954 (N).

Adinetidae

Adineta Hudson & Gosse, 1886

Adineta barbata Janson, 1893 (N)
Adineta bartosi Wulfert, 1960 (N)
Adineta vaga (Davis, 1873) (N)

Philodinavidae

Abrochtha Bryce, 1910

Abrochtha intermedia (De Beauchamp, 1909) (N) (*)

Note

Abrochtha intermedia: Specie di dubbia validità.

Bdelloidea i.s.

Callidina Ehrenberg, 1830

Callidina bihamata Gosse, 1886 (Sa)

Seisonidea

Seisonidae

Seison Grube, 1861

Seison annulatus Claus, 1876 (3, 4, 5)

Seison nebaliae Grube, 1861 (3, 4, 5)

Monogononta

Epiphanidae

Epiphanes Ehrenberg, 1832

Epiphanes brachionus (Ehrenberg, 1837) (*)

Epiphanes senta (O.F. Müller, 1773) (N, S)

Note

Epiphanes brachionus: Rinvenuta solamente la forma *E. brachionus* v. *spinosus* (Rousselet, 1901) (N, Sa).

Brachionidae

Platyias Haring, 1913

Platyias quadricornis (Ehrenberg, 1832) (N, S, Sa)

Brachionus Pallas, 1766

Brachionus angularis Gosse, 1851 (N, S, Si) (*)

Brachionus bidentata Andersen, 1889 (N)

Brachionus gruppo calyciflorus Pallas, 1766 sensu Koste, 1978 (*)

Brachionus dimidiatus (Bryce, 1931) (N)
Brachionus falcatus Zacharias, 1898 (N, Si)
Brachionus leydigi Cohn, 1862 (S)
Brachionus patulus (O.F. Müller, 1786) (N, S, Sa)
Brachionus polyacanthus (Ehrenberg, 1834) (N)
Brachionus gruppo quadridentatus Hermann, 1783 sensu Koste, 1978 (*)
Brachionus gruppo urceolaris (O.F. Müller, 1773) sensu Koste, 1978 (*)

Keratella Bory De Saint Vincent, 1822

Keratella cochlearis (Gosse, 1851) (N, S, Sa) (*)
Keratella cruciformis (Thompson, 1892) (3, 4, 5)
Keratella hiemalis (Carlin, 1943) (N, S)
Keratella quadrata (O.F. Müller, 1786) (N, S, Si, Sa)
Keratella testudo (Ehrenberg, 1832) (S)
Keratella ticinensis (Callerio, 1920) (N, S)
Keratella tropica (Apstein, 1907) (N, S, Si, Sa) (*)

Notholca Gosse, 1886

Notholca gruppo acuminata - labis (Ehrenberg, 1832) - Gosse, 1887 sensu Ruttner Kolisko, 1974 (N) (*)
Notholca foliacea (Ehrenberg, 1838) (N, S)
Notholca squamula (O.F. Müller, 1786) (N, S, Si)
Notholca striata (O.F. Müller, 1786) (N)

Kellicottia Ahlstrom, 1938

Kellicottia longispina (Kellicott, 1879) (N, S)

Anuraeopsis Lauterborn, 1900

Anuraeopsis fissa (Gosse, 1851) (N, S, Si, Sa)

Note

Brachionus angularis: Rinvenuta anche la forma *B. angularis f. bidens* (Plate, 1886) (Si).
Brachionus gruppo calyciflorus: Rinvenute *B. calicyflorus calicyflorus* Pallas, 1766 (N, S, Si, Sa), *B. c. f. anuraeiformis* (Brehm, 1909) (N, S, Sa) e *B. c. f. amphiceros* (Ehrenberg, 1838) (N, S, Sa).
Brachionus gruppo quadridentatus: Forme rinvenute: *B. quadridentatus quadridentatus* (Hermann, 1783) (N, S, Si, Sa); *B. q. brevispinus* (Ehrenberg, 1832) (N, S, Sa); *B. q. mirabilis* (Daday, 1897) (N, S, Sa); *B. q. f. melheni* (Barrois & Daday, 1894) (N, S, Sa); *B. q. f. rhenanus* (Lauterborn, 1893) (N, S, Sa); *B. q. v. cluniorbicularis* (Skorikov, 1894) (N, S, Sa).
Brachionus gruppo urceolaris: Forme rinvenute: *B. urceolaris urceolaris* (O.F. Müller, 1773) (N, S); *B. u. bennini* (Leissling, 1924) (N, S); *B. u. sessilis* (Varga, 1951) (N, S); *B. u. v. rubens* (Ehrenberg, 1838) (N, S); *B. u. nilsoni* (Ahlstrom, 1940) (N).
Keratella cochlearis: Rinvenute anche le forme: *K. c. f. tecta* (Lauterborn, 1900) (N, S, Si, Sa);

K. c. f. *macracantha* (Lauterborn, 1900) (N, S, Si, Sa); K. c. serie *irregularis* (Lauterborn, 1900) sensu Ruttner-Kolisko 1974 (S); K. c. serie *hispida* (Lauterborn, 1900) sensu Ruttner-Kolisko 1974 (N).

Keratella tropica: Rinvenuta anche K. t. f. *valga* sensu Ruttner-Kolisko 1974 (S, Sa).

Notholca gruppo acuminata - labis: Rinvenuti anche i taxa seguenti: N. *acuminata* (Ehrenberg, 1832) (N); N. *labis* Gosse, 1887 (N).

Euchlanidae

Beauchampiella Remane, 1929

Beauchampiella eudactylota (Gosse, 1886) (Sa)

Euchlanis Ehrenberg, 1832

Euchlanis alata Voronkov, 1912 (N, S, Sa)

Euchlanis calpidia Myers, 1930 (N, S, Sa)

Euchlanisapidula Parise, 1963 (N)

Euchlanis deflexa (Gosse, 1851) (N, S, Sa)

Euchlanis gruppo dilatata - parva Ehrenberg, 1832 - Rousselet, 1832 (N, S, Sa)

Euchlanis hyphidactyla Parise, 1963 (N)

Euchlanis incisa Carlin, 1939 (N, S)

Euchlanis lyra Hudson, 1886 (N, S)

Euchlanis meneta Myers, 1930 (N, S)

Euchlanis pyriformis Gosse, 1851 (N, S, Sa)

Euchlanis triquetra Ehrenberg, 1838 (N)

Tripleuchlanis Myers, 1930

Tripleuchlanis plicata (Levander, 1984) (N, Sa)

Mytilinidae

Mytilina Bory De Saint Vincent, 1836

Mytilina mucronata (O.F. Müller, 1773) (N, S, Si)

Mytilina gruppo ventralis (Ehrenberg, 1832) sensu Koste, 1978 (*)

Lophocharis Ehrenberg, 1838

Lophocharis naitas Wulfert, 1942 (S)

Lophocharis rubens Wulfert, 1939 (N)

Lophocharis ciclo di forme salpina - oxysternon (Ehrenberg, 1834) - (Gosse, 1851) sensu Koste, 1978 (N, S, Si, Sa) (*)

Note

Mytilina gruppo ventralis: Rinvenute le forme: *M. ventralis ventralis* (Ehrenberg, 1832) (N); *M. v. brevispina* Ehrenberg, 1832 (N, S, Sa); *M. v. v. macracantha* (Gosse, 1886) (N, S, Sa).
Lophocharis ciclo di forme salpina - oxysternon: Rinvenuti anche i taxa seguenti: *L. oxysternon* (Gosse, 1851) (N); *L. salpina* (Ehrenberg, 1834) (N).

Trichotriidae

Trichotria Bory De Saint Vincent, 1827

Trichotria pocillum (O.F. Müller, 1776) (N, S, Si, Sa)
Trichotria tetractis (Ehrenberg, 1830) (N, S, Sa) (*)

Macrochaetus Perty, 1850

Macrochaetus subquadratus Perty, 1850 (N)

Note

Trichotria tetractis: Rinvenuta anche *T. t. v. truncata* (Whitelegge, 1889) (N).

Colurellidae

Colurella Bory De Saint Vincent, 1824

Colurella adriatica Ehrenberg, 1831 (3, 4, 5)
Colurella colurus (Ehrenberg, 1830) (N, S, Sa)
Colurella dicentra (Gosse, 1887) (N)
Colurella obtusa (Gosse, 1886) (N)
Colurella uncinata (O.F. Müller, 1773) (N)

Squatinella Bory De Saint Vincent, 1826

Squatinella mutica (Ehrenberg, 1832)
Squatinella mutica mutica (Ehrenberg, 1832) sensu Koste, 1978 (N, S)
Squatinella rostrum (Schmarda, 1846) (N)
Squatinella tridentata (Fresenius, 1858) (N, S)

Lepadella Bory De Saint Vincent, 1826

Lepadella acuminata (Ehrenberg, 1834) (N, S, Sa)
Lepadella amphitropis Haring, 1916 (N)
Lepadella dactyliseta (Stenroos, 1898) (N)
Lepadella ehrenbergi (Perty, 1950) (N, S)
Lepadella ovalis (O.F. Müller, 1786) (N, S, Sa)
Lepadella patella (O.F. Müller, 1786) (N, S, Sa) (*)

Lepadella rhomboides (Gosse, 1886) (N, S, Sa)

***Lecane* Nitzsch, 1827**

Lecane bulla (Gosse, 1886) (N, S, Sa)
Lecane closteroerca (Schmarda, 1859) (N, S, Sa)
Lecane crenata (Harring, 1913) (N)
Lecane curvicornis (Murray, 1913) (N, Si)
Lecane flexilis (Gosse, 1889) (N, S, Sa)
Lecane furcata (Murray, 1913) (N, S, Sa)
Lecane hamata (Stokes, 1896) (N, S, Sa)
Lecane hornemanni (Ehrenberg, 1834) (N)
Lecane inopinata Harring & Myers, 1926 (N, S)
Lecane ivli (Wiszniewski, 1935) (N)
Lecane ludwigi (Eckstein, 1893) (N)
Lecane luna (O.F. Müller, 1776) (N, S, Sa)
Lecane gruppo lunaris Pejler, 1962 (N, S, Si, Sa)
Lecane mira (Murray, 1913) (N)
Lecane gruppo ohioensis Herrick, 1885 sensu Koste, 1978 (*)
Lecane paxiana (Hauer, 1940) (Sa)
Lecane psammophila (Wiszniewski, 1932) (N)
Lecane quadridentata (Ehrenberg, 1932) (N, S, Sa)
Lecane stenroosi (Meissner, 1908) (S)
Lecane stichaea Harring, 1913 (N)
Lecane stokesi (Pell, 1890) (N)
Lecane subtilis Harring & Myers, 1926 (N)
Lecane tenuiseta Harring, 1914 (N)
Lecane tudicola Harring & Myers, 1926 (N)
Lecane unguolata (Gosse, 1887) (N)
Lecane venusta Harring & Myers, 1926 (N)

Note

Lepadella patella: Rinvenuta anche L. p. f. oblonga (Ehrenberg, 1834) (N).

Lecane gruppo ohioensis: Rinvenuta solamente L. o. f. ichthyoura (Anderson & Shephard, 1892) (S, Sa).

Proalidae

***Proales* Gosse, 1886**

Proales decipiens (Ehrenberg, 1831) (N)
Proales reinhardtii (Ehrenberg, 1934) (3, 4, 5)
Proales theodora (Gosse, 1887) (N)

Lindiidae

Lindia Dujardin, 1841

Lindia janickii Wiszniewski, 1934 (N)

Lindia torulosa Dujardin, 1841 (N, S)

Lindia truncata Jennings, 1894 (N)

Notommatidae

Scaridium Ehrenberg, 1830

Scaridium longicaudum (O.F. Müller, 1786) (N, S, Sa)

Monommata Bartsch, 1870

Monommata longiseta (O.F. Müller, 1786) (N, S, Sa)

Itura Harring & Myers, 1928

Itura gruppo aurita (Ehrenberg, 1839) sensu Koste, 1978 (*)

Resticula Harring & Myers, 1924

Resticula gelida Harring & Myers, 1922 (N, S)

Notommata Ehrenberg, 1830

Notommata copeus Ehrenberg, 1834 (N, S)

Notommata glyphura Wulfert, 1935 (N, S, Sa)

Notommata pseudocerberus De Beauchamp, 1908 (N)

Notommata tripus Ehrenberg, 1838 (N)

Pleurotrocha Ehrenberg, 1830

Pleurotrocha petromyzon Ehrenberg, 1830 (N)

Cephalodella Bory De Saint Vincent, 1826

Cephalodella auricolata (O.F. Müller, 1773) (N, S)

Cephalodella catellina (O.F. Müller, 1786) (N, S, Sa)

Cephalodella compacta Wiszniewski, 1934 (N)

Cephalodella delicata Wulfert, 1937 (N)

Cephalodella eva (Gosse, 1886) (N)

Cephalodella forficata (Ehrenberg, 1832) (N, S)

Cephalodella forficula (Ehrenberg, 1838) (N, S)

Cephalodella gruppo gibba (Ehrenberg, 1838) sensu Koste, 1978 (N, S)

Cephalodella gruppo hoodi (Gosse, 1896) sensu Koste, 1978 (N)
Cephalodella megalcephala (Glascott, 1893) (N, S) (*)
Cephalodella gruppo tenuiseta Haring & Myers, 1924 sensu Koste, 1978 (N)
Cephalodella gruppo ventripes Dixon-Nuttall, 1901 sensu Koste, 1978 (N) (*)

Note

Itura gruppo aurita: Rinvenuta solamente *I. aurita* f. *intermedia* (Wulfert, 1935) (N, S).
Cephalodella megalcephala: Rinvenuta anche *C. m. f. rotunda* (Donner, 1949) (N).
Cephalodella gruppo ventripes: Rinvenuta anche *C. ventripes* v. *angustior* Donner, 1949 (N).

Trichocercidae

Trichocerca Lamarck, 1801

Trichocerca bicristata (Gosse, 1887) (N)
Trichocerca bidens (Lucks, 1912) (N, S, Sa)
Trichocerca capucina Wierzejski & Zacharias, 1893 (N, S)
Trichocerca cavia (Gosse, 1886) (N)
Trichocerca ciclo di forme cylindrica - chattoni (Imhof, 1851) - (De Beauchamp, 1907) sensu Koste, 1978 (N, Sa) (*)
Trichocerca elongata Gosse, 1884 (N, S)
Trichocerca insignis (Herrick, 1885) (N, S)
Trichocerca insulana (Hauer, 1937) (N, S, Sa)
Trichocerca intermedia (Stenroos, 1898) (N)
Trichocerca longiseta (Schrank, 1802) (N, S)
Trichocerca musculus Hauer, 1935 (N, S, Sa)
Trichocerca myersi (Hauer, 1931) (N)
Trichocerca porcellus (Gosse, 1886) (N, S)
Trichocerca ciclo di forme pusilla - stylata (Lauterborn, 1898) (Gosse, 1851) sensu Koste, 1978 (N, S) (*)
Trichocerca pygocera (Wiszniewski, 1932) (N)
Trichocerca rattus (O.F. Müller, 1776) (N, Sa)
Trichocerca rousseleti (Voigt, 1902) (N, S)
Trichocerca ruttneri (Donner, 1953) (S, Si, Sa)
Trichocerca ciclo di forme similis - birostris (Wierzejski, 1893) - (Minkiewicz, 1900) sensu Koste, 1978 (N, S)
Trichocerca tigris (O.F. Müller, 1786) (N)
Trichocerca vernalis Hauer, 1936 (N)
Trichocerca weberi Jennings, 1903 (N, S)

Note

Trichocerca ciclo di forme cylindrica - chattoni: Rinvenuta anche *T. cylindrica* (Imhof, 1891) (N).
Trichocerca ciclo di forme pusilla - stylata: Rinvenuta anche *T. pusilla* (Lauterborn, 1898) (N).

Gastropodidae

Gastropus (Imhof, 1898)

Gastropus hyptopus (Ehrenberg, 1838) (N, S)

Gastropus styliifer Imhof, 1891 (N)

Ascomorpha Perty, 1850

Ascomorpha ecaudis Perty, 1850 (N)

Ascomorpha ovalis (Bergendahl, 1892) (N, S)

Ascomorpha saltans Bartsch, 1870 (N, Si)

Synchaetidae

Synchaeta Ehrenberg, 1832

Synchaeta neapolitana Rousselet, 1902 (3, 4, 5)

Synchaeta gruppo stylata - pectinata Wierzejski, 1893 - Ehrenberg, 1832 sensu Ruttner-Kolisko, 1974 (N, S, Sa) (*)

Synchaeta gruppo tremula - oblonga (O.F. Müller, 1786) - (Ehrenberg, 1831) sensu Ruttner-Kolisko, 1974 (N, S, Si, Sa) (*)

Polyarthra Ehrenberg, 1834

Polyarthra gruppo major - euryptera Burckhardt, 1900 - (Wierzejski, 1893) sensu Ruttner-Kolisko, 1974 (N, Si) (*)

Polyarthra gruppo remata - minor (Skorikov, 1896) - Voigt, 1904 sensu Ruttner Kolisko, 1974 (*)

Polyarthra gruppo vulgaris - dolichoptera Carlin, 1943 - Idelson, 1925 sensu Ruttner-Kolisko, 1974 (N, S, Si, Sa) (*)

Ploesoma Herrick, 1885

Ploesoma hudsoni (Imhof, 1891) (N)

Ploesoma triacanthum (Bergendahl, 1892) (N, S)

Ploesoma truncatum (Levander, 1894) (N)

Note

Synchaeta gruppo stylata - pectinata: Rinvenute anche *S. grandis* Zacharias, 1893 (N); *S. longipes* Gosse, 1887 (N, S); *S. pectinata* Ehrenberg, 1832 (N, S, Si, Sa); *S. stylata* Wierzejski, 1893.

Synchaeta gruppo tremula - oblonga: Rinvenute anche *S. tremula* (O.F. Müller, 1786) (N); *S. kitina* Rousselet, 1902 (N); *S. lakowitziana* Lucks, 1938 (N); *S. oblonga* Ehrenberg, 1831 (N);

S. tremula (O.F. Müller, 1786) (N).

Polyarthra gruppo major - euryptera: Rinvenute anche *P. euryptera* (Wierzejski, 1893) (N, Si); *P. maior* Burckhardt, 1900 (N).

Polyarthra gruppo remata - minor: Rinvenuta anche *P. remata* (Skorikov, 1896) (N, S).

Polyarthra gruppo vulgaris - dolichoptera: Rinvenute anche *P. dolichoptera* Idelson, 1925 (N, S) e *P. vulgaris* Carlin, 1943 (N, S).

Asplanchnidae

Asplanchnopus de Guerne, 1888

Asplanchnopus multiceps (Schrank, 1793) (N)

Asplanchna Gosse, 1850

Asplanchna gruppo girodi - brightwelli (de Guerne, 1888) - (Gosse, 1850) sensu Ruttner-Kolisko, 1974 (N, S, Si, Sa) (*)

Asplanchna gruppo priodonta Gosse, 1850 sensu Ruttner-Kolisko, 1974 (N, S, Sa) (*)

Note

Asplanchna gruppo girodi - brightwelli: Rinvenute anche *A. girodi* de Guerne, 1884 (N, S, Si, Sa); *A. intermedia* Hudson, 1886 (N); *A. brightwelli* (Gosse, 1850) (N, Sa); *A. sieboldi* (Leydig, 1854) (N, S, Sa).

Asplanchna gruppo priodonta: Rinvenute anche *A. priodonta* Gosse, 1850 (N, S, Sa); *A. p. f. helvetica* (Imhof, 1884) (N); *A. p. v. henrietta* (Langhans, 1906) (N, Sa).

Dicranophoridae

Dicranophorus Nitzsch, 1827

Dicranophorus caudatus (Ehrenberg, 1834) (N)

Dicranophorus epicharis Harring & Myers, 1928 (N, S, Sa)

Dicranophorus forcipatus (O.F. Müller, 1786) (N, S, Sa)

Dicranophorus hercules Wiszniewski, 1932 (N) (*)

Dicranophorus robustus Harring & Myers, 1928 (N)

Dicranophorus uncinatus (Milne, 1886) (N, S)

Encentrum Ehrenberg, 1838

Encentrum arvicola Wulfert, 1936 (N)

Encentrum incisum Wulfert, 1936 (N, Si)

Encentrum mustela (Milne, 1885) (N) (*)

Encentrum putorius Wulfert, 1936 (N)

Note

Dicranophorus hercules: Rinvenuta D. h. v. capucinoides Wismiewski, 1932 (N).
Encentrum mustela: Rinvenuta anche E. p. v. armatum Donner, 1943 (N).

Testudinellidae

Testudinella Bory De Saint Vincent, 1826

Testudinella caeca (Parsons, 1892) (N, S)
Testudinella elliptica (Ehrenberg, 1834) (N, S, Si)
Testudinella ciclo di forme incisa (Ternetz, 1892) sensu Koste, 1978 (N, Sa) (*)
Testudinella mucronata (Gosse, 1886) (N, S, Si, Sa)
Testudinella parva (Ternetz, 1892) (N, S, Sa) (*)
Testudinella patina (Hermann, 1783) (N, S, Si, Sa) (*)
Testudinella reflexa (Gosse, 1887) (N, S, Sa)
Testudinella truncata (Gosse, 1896) (N)

Pompholyx Gosse, 1851

Pompholyx complanata Gosse, 1851 (N, S)
Pompholyx sulcata (Hudson, 1885) (N, S)
Pompholyx triloba Pejler, 1957 (N, S)

Note

Testudinella ciclo di forme incisa: Rinvenute le forme seguenti: E. i. ahlstromi (Hauer, 1956) (N); E. i. incisa (Ternetz, 1892) (N); E. i. f. naumanni (Carlin, 1939) (N); E. i. v. emarginula (Stenroos, 1898) (N).

Testudinella parva: Rinvenute anche P. p. v. semiparva Hauer, 1938 (N, S, Sa); P. p. v. bidentata (Ternetz, 1892) (N, S, Sa).

Testudinella patina: Rinvenute anche: P. p. f. intermedia Anderson, 1889 (N, S, Si, Sa) e P. p. f. trilobata Anderson & Shephard, 1892 (N, S, Si, Sa).

Flosculariidae

Floscularia Cuvier, 1798

Floscularia janus (Hudson, 1881) (N)

Ptygura Ehrenberg, 1832

Ptygura ciclo di forme longicornis - brevis (Davis, 1867) - (Rousselet, 1893) sensu Koste, 1978 (N, S)

Sinantherina Bory De Saint Vincent, 1826

Sinantharina socialis (Linnaeus, 1758) (N)

Conochilidae

Conochilus Ehrenberg, 1834

Conochilus natans (Seligo, 1900) (N)

Conochilus unicornis (Rousselet, 1892) (N)

Hexarthridae

Hexarthra Schmarda, 1854

Hexarthra bulgarica (Wiszniowski, 1933) (N)

Hexarthra fennica (Levander, 1892) (N)

Hexarthra mira (Hudson, 1871) (N, S, Si, Sa)

Hexarthra mollis (Bartôs, 1948) (N)

Hexarthra oxyuris (Sernov, 1903) (N, Sa)

Hexarthra propinqua (Bartôs, 1948) (S)

Filiniidae

Filinia Bory De Saint Vincent, 1824

Filinia gruppo longiseta - terminalis (Ehrenberg, 1834) - (Plate, 1886) sensu Ruttner-Kolisko, 1974 (N, S, Si, Sa) (*)

Filinia opoliensis (Zacharias, 1898) (N, S, Sa)

Note

Filinia gruppo longiseta - terminalis: Rinvenute anche *F. longiseta* (Ehrenberg, 1834) (N, S, Si, Sa); *F. l. v. limnetica* (Zacharias, 1893) (N); *F. l. v. passa* (O.F. Müller, 1786) (N); *F. terminalis* (Plate, 1886) (N, S, Sa).

Collothecidae

Collothea Harring, 1913

Collothea sp. (N, S)

Nematoda

Adenophorea

Enoplida

Enoplidae

Enoplus Dujardin, 1845

- Enoplus brevis* Bastian, 1865 (5)
- Enoplus littoralis* Filipjev, 1918 (3)
- Enoplus quadridentatus* Berlin, 1853 (3, 4, 5)
- Enoplus schulzi* Gerlach, 1952 (3)
- Enoplus striatus* Eberth, 1863 (3, 4, 5)
- Enoplus tridentatus* Dujardin, 1845 (4)

Enoplida i.s.

Lineolia Gerlach & Riemann, 1974

- Lineolia sieboldi* (Kölliker, 1845) (5)

Thoracostomopsidae

Trileptium Cobb, 1933

- Trileptium subterraneum* (Gerlach, 1952) (3)

Enoplolaimus de Man, 1893

- Enoplolaimus attenuatus* Brunetti, 1949 (3)
- Enoplolaimus glaber* Brunetti, 1949 (3, 5)
- Enoplolaimus litoralis* Schulz, 1936 (3)
- Enoplolaimus subterraneus* Gerlach, 1953 (3)
- Enoplolaimus villosus* Gerlach, 1953 (3)

Mesacanthion Filipjev, 1927

- Mesacanthion hirsutum* Gerlach, 1953 (3)

Paramesacanthion Wieser, 1953

- Paramesacanthion tricuspis* (Stekhoven, 1950) (4)

Anoplostomatidae

Anoplostoma Bütschli, 1874

Anoplostoma exceptum Schulz, 1935 (3)

Enoploides Ssaweljev, 1912

Enoploides brunettii Gerlach, 1953 (3, 5)

Enoploides tyrrhenicus Brunetti, 1949 (3)

Epacanthion Wieser, 1953

Epacanthion buetschlii (Southern, 1914) (3, 5)

Epacanthion enoploidiforme (Gerlach, 1953) (3)

Phanodermatidae

Phanoderma (*Phanoderma*) Bastian, 1865

Phanoderma (*Phanoderma*) *cocksii* Bastian, 1865 (3, 4, 5)

Phanoderma (*Phanoderma*) *laticolle* (Marion, 1870) (3, 4, 5)

Phanoderma (*Phanoderma*) *tuberculatum* (Eberth, 1863) (3, 4, 5)

Crenopharynx Filipjev, 1934

Crenopharynx paralepturus (Stekhoven, 1950) (3)

Klugea (*Nasinema*) Filipjev, 1927

Klugea (*Nasinema*) *filiformis* (Allgén, 1929) (3)

Klugea (*Nasinema*) *stenolaima* (Wieser, 1954) (3)

Anticomidae

Anticoma Bastian, 1865

Anticoma acuminata (Eberth, 1863) (3, 4, 5)

Anticoma arctica Steiner, 1916 (3, 5)

Anticoma longicaudata Kreis, 1928 (3)

Ironidae

Ironus Bastian, 1865

Ironus elegans Colomba & Vinciguerra, 1979 (Si)
Ironus tenuicaudatus de Man, 1876 (N, S, Si)

Dolicholaimus de Man, 1888

Dolicholaimus marioni de Man, 1888 (5)

Syringolaimus de Man, 1888

Syringolaimus brevicaudatus Micoletzky, 1922 (3, 4, 5)
Syringolaimus filicaudatus Vitiello, 1970 (4)
Syringolaimus striatocaudatus de Man, 1888 (3, 4, 5)

Trissonchulus Cobb, 1920

Trissonchulus benepapillosus (Schulz, 1935) (3)
Trissonchulus oceanus Cobb, 1920 (3, 5)

Leptosomatidae

Leptosomatum Bastian, 1865

Leptosomatum bacillatum (Eberth, 1863) (3, 5)
Leptosomatum punctatum (Eberth, 1863) (3, 5)

Eusynonchus Platonova, 1970

Eusynonchus hirsutus (Cobb, 1894) (3)

Paratuerkiana Platonova, 1970

Paratuerkiana comes (Türk, 1903) (3)

***Synonchus* (*Synonchus*)** Cobb, 1894

Synonchus (*Synonchus*) *dubius* Wieser, 1954 (3)

Tuerkiana Platonova, 1970

Tuerkiana strasseni (Türk, 1903) (3)

Pseudocella Filipjev, 1927

Pseudocella cavernicola Wieser, 1954 (3)
Pseudocella citronicauda Wieser, 1954 (3)

Thoracostoma Marion, 1870

Thoracostoma coronatum (Eberth, 1863) (3, 5)

Thoracostoma steineri Micoletzky, 1922 (3)

Cylicolaimus de Man, 1889

Cylicolaimus edentulus Platonova, 1970 (3)

Cylicolaimus jaegerskioeldi Türk, 1903 (3)

Paracylicolaimus Platonova, 1970

Paracylicolaimus brevisetosus Platonova, 1970 (3)

Oxystominidae

Litinium Cobb, 1920

Litinium parmatum Wieser, 1954 (3)

Oxystomina Filipjev, 1921

Oxystomina alpha Chitwood, 1937 (3)

Oxystomina pulchella Vitiello, 1970 (4)

Thalassoalaimus de Man, 1893

Thalassoalaimus aceratus Vitiello, 1970 (4)

Thalassoalaimus mediterraneus Vitiello, 1970 (4)

Halalaimus (Halalaimus) de Man, 1888

Halalaimus (Halalaimus) cirrhatus Gerlach, 1953 (3)

Halalaimus (Halalaimus) delamarei Vitiello, 1970 (4)

Halalaimus (Halalaimus) gracilis de Man, 1888 (3, 4, 5)

Halalaimus (Nuada) Southern, 1914

Halalaimus (Nuada) filicorpus Vitiello, 1970 (4)

Halalaimus (Nuada) monstrocaudatus Vitiello, 1970 (4)

Halalaimus (Nuada) pachyodoroides Vitiello, 1970 (4)

Paroxystomina Micoletzky, 1924

Paroxystomina asymmetrica Micoletzky, 1924 (4)

Oncholaimidae

Pelagonema Cobb, 1894

Pelagonema obtusicauda Filipjev, 1918 (4)

Pelagonema simplex Cobb, 1894 (3, 4)

Oncholaimellus de Man, 1890

Oncholaimellus mediterraneus Stekhoven, 1942 (3)

Viscosia de Man, 1890

Viscosia cobbi Filipjev, 1918 (3, 5)

Viscosia glabra (Bastian, 1865) (3, 4, 5)

Viscosia profunda (Vitiello, 1970) (4)

Metaparoncholaimus De Coninck & Stekhoven, 1933

Metaparoncholaimus campylocercus (de Man, 1876) (3, 4, 5)

Metoncholaimus Filipjev, 1918

Metoncholaimus albidus (Bastian, 1865) (3)

Metoncholaimus demani (Zur Strassen, 1894) (3)

Metoncholaimus pristiurus (Zur Strassen, 1894) (3)

Oncholaimus Dujardin, 1845

Oncholaimus aegypticus Steiner, 1921 (4, 5)

Oncholaimus campylocercoides De Coninck & Stekhoven, 1933 (3, 5)

Oncholaimus dujardinii de Man, 1876 (3, 4, 5)

Oncholaimus echini Leydig, 1854 (3)

Prooncholaimus Micoletzky, 1924

Prooncholaimus megastoma (Eberth, 1863) (3, 4)

Pontonema Leidy, 1855

Pontonema parocellatum Wieser, 1954 (3)

Pontonema parpapilliferum (Micoletzky, 1924) (3, 4)

Enchelidiidae

Aronema Fadeeva & Belogurov, 1988

Aronema setiferum (Gerlach, 1953) (3)

Calyptronema (Calyptronema) Marion, 1870

Calyptronema (Calyptronema) acuminatum (Eberth, 1863) (3, 4, 5)

Calyptronema (Catalaimus) Cobb, 1920

Calyptronema (Catalaimus) eberthi (de Man, 1876) (3)

Calyptronema (Catalaimus) sabulicola (Filipjev, 1918) (3, 5)

Enchelidium Ehrenberg, 1836

Enchelidium marinum Ehrenberg, 1836 (3, 5)

Eurystomina Filipjev, 1921

Eurystomina assimilis (de Man, 1876) (3)

Eurystomina ornata (Eberth, 1863) (3, 4, 5)

Eurystomina retrocellata Micoletzky, 1930 (3)

Eurystomina terricola (de Man, 1907) (3)

Pareurystomina Micoletzky & Kreis, 1930

Pareurystomina combesi (Luc & De Coninck, 1959) (3)

Polygastrophora de Man, 1922

Polygastrophora hexabulba (Filipjev, 1918) (3, 4)

Symplocostoma Bastian, 1865

Symplocostoma acutum (Cobb, 1929) (3, 5)

Symplocostoma tenuicolle (Eberth, 1863) (3, 4, 5)

Symplocostomella Micoletzky, 1930

Symplocostomella mediterranea Stekhoven, 1950 (3)

Thoonchus Cobb, 1920

Thoonchus inermis Gerlach, 1953 (3)

Tripylodidae

Bathylaimus Cobb, 1894

Bathylaimus stenolaimus Stekhoven & De Coninck, 1933 (3)

Tripyloides de Man, 1886

Tripyloides marinus (Bütschli, 1874) (3, 4)

Tobrilidae

Tobrilus Andrassy, 1959

Tobrilus aberrans (Filipjev, 1928) (Si)
Tobrilus allophysis (Steiner, 1919) (N, S, Si, Sa)
Tobrilus diversipapillatus (Daday, 1905) (N, S)
Tobrilus gracilis (Bastian, 1865) (N, S, Si, Sa)
Tobrilus grandipapillatus (Brakenhoff, 1914) (N, S)
Tobrilus helveticus (Hofmänner, 1915) (N, S, Si)
Tobrilus longicaudatus (Linstow, 1876) (N, S)
Tobrilus pellucidus (Bastian, 1865) (N, S, Si, Sa)
Tobrilus sardus Vinciguerra & Zullini, 1992 (Sa)
Tobrilus siculus Vinciguerra & Zullini, 1992 (Si)
Tobrilus stefanskii (Micoletzky, 1925) (N, S)
Tobrilus zakopanensis (Stefanski, 1924) (N)

Tripylidae

Tripyla Bastian, 1865

Tripyla affinis de Man, 1880 (N, S)
Tripyla cornuta Skwarra, 1921 (N)
Tripyla filicaudata de Man, 1880 (N, S)
Tripyla glomerans Bastian, 1865 (N, S, Sa)
Tripyla setifera Bütschli, 1873 (N, S)

Tripylella Brzeski & Winiszewska, 1993

Tripylella intermedia (Bütschli, 1873) (N, S, Si, Sa)

Tripylina Brzeski, 1963

Tripylina arenicola (de Man, 1880) (N, Sa)
Tripylina macroseta (Vinciguerra & La Fauci, 1978) (N, S, Si)

Trischistoma Cobb, 1913

Trischistoma monohystera (de Man, 1880) (N, S, Si, Sa)

Rhabdodemaniidae

Rhabdodemanina Baylis & Daubney, 1926

Rhabdodemanina coronata Gerlach, 1952 (3)

Trefusiida

Trefusiidae

Trefusia de Man, 1893

Trefusia filicauda Allgén, 1933 (4)

Onchulidae

Onchulus Cobb, 1920

Onchulus nollii Goffart, 1950 (N)

Stenonchulus W. Schneider, 1940

Stenonchulus troglodytes W. Schneider, 1940 (N)

Lauratonematidae

Lauratonema Gerlach, 1953

Lauratonema adriaticum Gerlach, 1953 (3)

Lauratonema reductum Gerlach, 1953 (3)

Xenellidae

Xenella Cobb, 1920

Xenella suecica Allgén, 1935 (3)

Mononchida

Mononchidae

Clarkus Jairajpuri, 1970

Clarkus papillatus (Bastian, 1865) (N, S, Si, Sa)

Coomansus Jairajpuri & Khan, 1977

Coomansus parvus (de Man, 1880) (N, S)

Coomansus zschokkei (Menzel, 1913) (N, S)

Mononchus Bastian, 1865

Mononchus aquaticus Cotzee, 1968 (N, S)

Mononchus italicus Andr ssy, 1959 (N)

Mononchus truncatus Bastian, 1865 sensu Andr ssy, 1993 (N, S, Si, Sa)

Prionchuloides Mulvey, 1963

Prionchuloides micoletzkyi (Meyl, 1954) (S)

Prionchulus Cobb, 1916

Prionchulus muscorum (Dujardin, 1845) (N, S, Si, Sa)

Prionchulus obtusidentatus Vinciguerra, 1984 (Sa)

Prionchulus punctatus Cobb, 1917 (S)

Mylonchulus Cobb, 1916

Mylonchulus andrassyi Loof, 1993 (N)

Mylonchulus brachyuris (B tschli, 1873) (N, S, Si)

Mylonchulus micrurus Cobb, 1917 (S)

Mylonchulus rotundicaudatus (Skwarra, 1921) (S)

Mylonchulus sigmaturus Cobb, 1917 (N, S, Sa)

Anatonchus Cobb, 1916

Anatonchus amiciae Coomans & Lima, 1965 (N)

Anatonchus tridentatus (de Man, 1876) (N, S)

Miconchus Andr ssy, 1958

Miconchus studeri (Steiner, 1914) (N, S)

Dorylaimida

Dorylaimidae

Afrodorylaimus Andrassy, 1964

Afrodorylaimus mediterraneus Vinciguerra & La Fauci, 1978 (Si)

Chrysodorus Jiménez-Guirado & Cadenas, 1985

Chrysodorus filiformis (Bastian, 1865) (S)

Crocodyrilyaimus Andrassy, 1988

Crocodyrilyaimus flavomaculatus (Linstow, 1876) (N, S)

Dorylaimus Dujardin, 1845

Dorylaimus asymphydorus Andrassy, 1969 (N, S, Si)

Dorylaimus stagnalis Dujardin, 1845 (N, S)

Dorylaimus tepidus Andrassy, 1959 (N)

Drepanodorylaimus Jairajpuri, 1966

Drepanodorylaimus szekessyi (Andrassy, 1960) (N)

Ischiodorylaimus Andrassy, 1969

Ischiodorylaimus robustus Zullini, 1975 (N)

Laimydorus Siddiqi, 1969

Laimydorus pseudostagnalis (Micoletzky, 1927) (N, Sa)

Mesodorylaimus Andrassy, 1959

Mesodorylaimus bastiani (Bütschli, 1873) (N, S, Si, Sa)

Mesodorylaimus dolomiticus Vinciguerra, 1982 (N)

Mesodorylaimus hoffmaenneri (Menzel, 1914) (S)

Mesodorylaimus litoralis Loof, 1969 (S)

Mesodorylaimus lopadusae Vinciguerra & La Fauci, 1978 (Si)

Mesodorylaimus mesonyctius (Kreis, 1930) (N, S, Si)

Mesodorylaimus meyli (Andrassy, 1958) (N)

Mesodorylaimus nudus (Thorne, 1939) (S)

Mesodorylaimus recurvus Andrassy, 1964 (N)

Opisthodorylaimus Ahmad & Jairajpuri, 1982

Opisthodorylaimus sylphoides (Williams, 1959) (S)

Prodorylaimium Andrassy, 1969

Prodorylaimium brigdammense (de Man, 1876) (S, Si)

Aporcelaimidae

Aporcelaimellus Heyns, 1965

Aporcelaimellus hylophilus Tjepkema, Ferris & Ferris, 1971 (N)

Aporcelaimellus obtusicaudatus (Bastian, 1865) (N, S, Si, Sa)

Aporcelaimellus papillatus (Bastian, 1865) (S)

Aporcelaimellus silvanus Vinciguerra & Giannetto, 1983 (S, Si)

Aporcelaimellus simplex (Thorne & Swanger, 1936) (*)

Aporcelaimium Loof & Coomans, 1970

Aporcelaimium labiatum (de Man, 1880) (Sa)

Aporcelaimus Thorne & Swanger, 1936

Aporcelaimus cobbi Thorne, 1937 (S)

Aporcelaimus regius (de Man, 1876) (S)

Aporcelaimus superbus (de Man, 1880) (N)

Paraxonchium Krall, 1958

Paraxonchium laetificans (Andrassy, 1956) (S)

Sectonema Thorne, 1930

Sectonema barbatoides Heyns, 1965 (S)

Note

Aporcelaimellus simplex: Citato da località italiana non precisata.

Qudsianematidae

Allodorylaimus Andrassy, 1986

Allodorylaimus andrassyi (Meyl, 1955) (Si)

Allodorylaimus diadematus (Cobb in Thorne & Swanger, 1936) (Si)

Allodorylaimus holdemani (Andrassy, 1959) (N, S, Si)

Discolaimium Thorne, 1939

Discolaimium conura Thorne, 1939 (S)
Discolaimium discolaimoideum (Andrássy, 1958) (N)

Discolaimoides Heyns, 1963

Discolaimoides bulbiferus (Cobb, 1906) (S)
Discolaimoides gracilis (Thorne, 1939) (N)
Discolaimoides symmetricus Das, Khan & Loof, 1969 (S)

Discolaimus Cobb, 1913

Discolaimus paramajor Coomans, 1966 (Si)
Discolaimus similis Thorne, 1939 (N)
Discolaimus texanus Cobb, 1913 (S)

Ecumenicus Thorne, 1974

Ecumenicus monohystera (de Man, 1880) (N, S, Si)

Epidorylaimus Andrásy, 1986

Epidorylaimus lugdunensis (de Man, 1880) (N, S)
Epidorylaimus pseudoagilis (Altherr, 1952) (N)

Eudorylaimus Andrásy, 1959

Eudorylaimus acuticauda (de Man, 1880) (N, S)
Eudorylaimus arcus (Thorne & Swanger, 1936) (Si)
Eudorylaimus brevis (Altherr, 1952) (N, S)
Eudorylaimus carteri (Bastian, 1865) (N, S, Si, Sa)
Eudorylaimus centrocerus (de Man, 1880) (N, S, Si)
Eudorylaimus iners (Bastian, 1865) (N)
Eudorylaimus maritus Andrásy, 1959 (N, Si)
Eudorylaimus opisthystera (Altherr, 1953) (N, S, Si)
Eudorylaimus pseudocarteri Loof, 1975 (N)
Eudorylaimus subdigitalis Tjepkema, Ferris & Ferris, 1971 (S)
Eudorylaimus tritici (Bastian, 1865) (S)

Labronema Thorne, 1939

Labronema angeloi Vinciguerra & Clausi, 1995 (S)
Labronema digiturum Vinciguerra, 1984 (Sa)
Labronema pulchrum Vinciguerra & Zullini, 1980 (S)
Labronema vulvapapillatum (Meyl, 1954) (S)

Talanema Andrásy, 1991

Talanema avolai Vinciguerra & Clausi, 1995 (S)

Talanema salinae Vinciguerra & Clausi, 1995 (S)

Lordellonema Andrásy, 1960

Lordellonema porosum (Heyns, 1963) (S)

Microdorylaimus Andrásy, 1986

Microdorylaimus brunettii Meyl, 1953 (S)

Microdorylaimus miser (Thorne & Swanger, 1936) (Si)

Microdorylaimus modestus (Altherr, 1952) (Si)

Microdorylaimus parvus (de Man, 1880) (N, S)

Microdorylaimus rapsus (Heyns, 1963) (Si)

Neodiscolaimium Patil & Khan, 1983

Neodiscolaimium dubium (Das, Khan & Loof, 1969) (S)

Nygolaimoides Meyl in Andrásy, 1960

Nygolaimoides borborophilus (de Man, 1876) (S)

Takamangai Yeates, 1967

Takamangai circulifera (Loof, 1961) (S)

Takamangai ettersbergensis (de Man, 1885) (Sa)

Takamangai kaszabi (Andrásy, 1959) (N)

Takamangai laticollis (de Man, 1906) (S)

Takamangai pusilla (Andrásy, 1985) (S)

Takamangai rhopalocercus (de Man, 1876) (N)

Thornia Meyl, 1954

Thornia goffarti (Meyl, 1953) (S)

Thornia parathermophila (Meyl, 1953) (S)

Thornia pitheculusana Meyl, 1954 (S)

Thornia propinqua (Paesler, 1941) (S)

Thornia steatopyga (Thorne & Swanger, 1936) (N, Sa)

Thornia thermophila (Meyl, 1953) (S)

Nordiidae

Dorydorella Andrásy, 1987

Dorydorella bryophila (de Man, 1880) (S, Sa)

Dorydorella pratensis (de Man, 1880) (S)

Enchodelus Thorne, 1939

- Enchodelus altherri* Vinciguerra & De Francisci, 1973 (S)
- Enchodelus arcuatus* Thorne, 1939 (N, S, Si)
- Enchodelus brevidentatus* Thorne, 1939 (N, Si)
- Enchodelus macrodorus* (de Man, 1880) (N, Sa)
- Enchodelus microdorus* Schiemer, 1965 (S)
- Enchodelus teres* Thorne, 1939 (N)
- Enchodelus vesuvianus* (Cobb, 1893) (N, S, Si, Sa)
- Enchodelus vulvostriatus* (Stefansky, 1924) (N)

Enchodorus Vinciguerra, 1976

- Enchodorus dolichurus* Vinciguerra, 1976 (Si)

Longidorella Thorne, 1939

- Longidorella arenicola* Vinciguerra & Zullini, 1980 (S)
- Longidorella macramphis* (Altherr, 1950) (N)
- Longidorella microdora* (de Man, 1880) (N, S, Si)
- Longidorella murithi* Altherr, 1950 (N, Si)

Pungentus Thorne & Swanger, 1936

- Pungentus alpinus* Vinciguerra & Giannetto, 1985 (N)
- Pungentus clavatus* Ahmad & Jairajpuri, 1979 (Si)
- Pungentus engadinensis* (Altherr, 1950) (N)
- Pungentus fagi* Vinciguerra & Giannetto, 1984 (S)
- Pungentus minor* Vinciguerra & Giannetto, 1985 (N)
- Pungentus silvestris* (de Man, 1912) (N)

Actinolaimidae

Afractinolaimus Andr ssy, 1970

- Afractinolaimus minor* (Vinciguerra & De Francisci, 1973) (S)

Paractinolaimus Meyl, 1957

- Paractinolaimus intermedius* Altherr, 1968 (N, S, Si, Sa)
- Paractinolaimus macrolaimus* (de Man, 1880) (N, S, Si)

Carcharolaimidae

Carcharolaimus Thorne, 1939

Carcharolaimus banaticus Krnjaic & Loof, 1976 (S)
Carcharolaimus teres Thorne, 1939 (N, S)

Longidoridae

Longidorus Micoletzky, 1922

Longidorus aetnaeus Roca, Lamberti, Agostinelli & Vinciguerra, 1986 (S, Si)
Longidorus apulus Lamberti & Bleve Zacheo, 1977 (S)
Longidorus athesinus Lamberti, Coiro & Agostinelli, 1992 (N)
Longidorus caespiticola Hooper, 1961 (Sa)
Longidorus closelongatus Stoianov, 1964 (N)
Longidorus elongatus (de Man, 1876) (N)
Longidorus eridanicus Roca, Lamberti & Agostinelli, 1985 (N, S)
Longidorus euonymus Mali & Hooper, 1974 (N, S, Si, Sa)
Longidorus intermedius Kosłowska & Seinhorst, 1979 (S)
Longidorus iuglandis Roca, Lamberti & Agostinelli, 1985 (S)
Longidorus juvenilis Dalmasso, 1969 (N, S, Si)
Longidorus kuiperi Brinkman, Loof & Barbez, 1987 (N, S)
Longidorus magnus Lamberti, Bleve Zacheo & Arias, 1982 (S)
Longidorus major Roca & D'Errico, 1987 (S)
Longidorus moesicus Lamberti, Choleva & Agostinelli, 1983 (N, S, Si, Sa)
Longidorus picens Roca, Lamberti & Agostinelli, 1985 (N, S)
Longidorus protae Lamberti & Bleve-Zacheo, 1977 (Sa)
Longidorus proximus Sturhan & Argo, 1983 (S)
Longidorus silvae Roca, 1993 (N, S)

Paralongidorus Siddiqi, Hooper & Khan, 1963

Paralongidorus maximus (Bütschli, 1874) (N, S)

Xiphinema Cobb, 1913

Xiphinema aequum Roca & Lamberti, 1988 (S)
Xiphinema barens Lamberti, Roca, Agostinelli & Bleve Zacheo, 1986 (S)
Xiphinema coronatum Roca, 1991 (S)
Xiphinema diversicaudatum (Micoletzky, 1927) (N, S, Sa)
Xiphinema fortuitum Roca, Lamberti & Agostinelli, 1988 (N)
Xiphinema globosum Sturhan, 1978 (N, S)
Xiphinema histriae Lamberti, Coiro & Agostinelli, 1993 (N)
Xiphinema index Thorne & Allen, 1950 (N, S, Si, Sa)
Xiphinema italiae Meyl, 1953 (N, S, Si, Sa)
Xiphinema macroacanthum Lamberti, Roca & Agostinelli, 1990 (S, Si)
Xiphinema melitense Lamberti, Bleve Zacheo & Arias, 1982 (S, Si)
Xiphinema nuragicum Lamberti, Castillo, Gomez Barcina & Agostinelli, 1992 (Sa)
Xiphinema pachtaicum (Tulaganov, 1938) (N, S, Si, Sa)
Xiphinema porosum Roca & Agostinelli, 1986 (S)

Xiphinema taylori Lamberti, Ciancio, Agostinelli & Coiro, 1992 (N, S, Si, Sa)
Xiphinema vuittenezi Luc, Lima, Weischer & Flegg, 1964 (N, S)

Belondiridae

Axonchium Cobb, 1920

Axonchium leptcephalum Altherr, 1953 (N)
Axonchium progoneatum Vinciguerra & Zullini, 1980 (S)

Dorylaimellus Cobb, 1913

Dorylaimellus demani Goodey, 1963 (N)
Dorylaimellus monticolus Clark, 1963 (S)

Oxydirus Thorne, 1939

Oxydirus amplicephalus Colomba & Vinciguerra, 1979 (Si)
Oxydirus oxycephaloides (de Man, 1921) (N, Si)

Tylencholaimidae

Meylonema Andr  ssy, 1960

Meylonema buchneri (Meyl, 1953) (S)

Tylencholaimus de Man, 1876

Tylencholaimus congestus Loof & Jairajpuri, 1968 (S)
Tylencholaimus constrictus Vinciguerra, 1986 (N, Si)
Tylencholaimus crassus Loof & Jairajpuri, 1968 (N)
Tylencholaimus maritus Loof & Jairajpuri, 1968 (N, Si)
Tylencholaimus minimus de Man, 1876 (N, S)
Tylencholaimus minutus Vinciguerra, 1986 (N, Si)
Tylencholaimus mirabilis (B  tschli, 1873) (N, S, Si)
Tylencholaimus mongolicus Andr  ssy, 1967 (S)
Tylencholaimus porosus Vinciguerra & Zullini, 1980 (S)
Tylencholaimus proximus Thorne, 1939 (N, S, Si)
Tylencholaimus stecki Steiner, 1914 (N, S)
Tylencholaimus teres Thorne, 1939 (N, S)
Tylencholaimus zeelandicus de Man, 1876 (S)

Xiphinemella Loos, 1950

Xiphinemella globilabiata Vinciguerra & Giannetto, 1983 (S, Si)

Leptonchidae

Funaria Van der Linde, 1938

Funaria obtusa (Thorne, 1939) (S)

Tylencholaimellus Cobb in M.V. Cobb, 1915

Tylencholaimellus incertus Colomba & Vinciguerra, 1979 (Si)

Tylencholaimellus polonicus Szczygiel, 1962 (N)

Mydonomidae

Dorylaimoides Thorne & Swanger, 1936

Dorylaimoides bulbosus (Brzeski & Szczygiel, 1961) (N)

Nygolaimidae

Aquatides Heyns, 1968

Aquatides aquaticus (Thorne, 1930) (S)

Clavicaudoides Heyns, 1968

Clavicaudoides clavicaudatus (Altherr, 1953) (N)

Laevides Heyns, 1968

Laevides loofi (Heyns, 1968) (N)

Nygolaimus Cobb, 1913

Nygolaimus brachyuris (de Man, 1880) (N, S, Sa)

Nygolaimus brachyuroides Vinciguerra & Zullini, 1980 (S)

Nygolaimus intermedius (de Man, 1880) (Sa)

Nygolaimus minimus Vinciguerra & Zullini, 1980 (S)

Paravulvus Heyns, 1968

Paravulvus hartingii (de Man, 1880) (N, S)

Paravulvus heynsi Vinciguerra, 1986 (N)

Paravulvus planposae (Altherr, 1952) (N)

Campydoridae

Campydora Cobb, 1920

Campydora demonstrans Cobb, 1920 (S)

Diphterophoridae

Diphterophora de Man, 1880

Diphterophora brevicollis Thorne, 1939 (N)

Diphterophora communis de Man, 1880 (N, S)

Diphterophora vanoyei De Coninck, 1931 (S)

Trichodoridae

Nanidorus Siddiqi, 1974

Nanidorus nanus (Allen, 1957) (N)

Paratrichodorus Siddiqi, 1974

Paratrichodorus minor (Colbran, 1956) (Si)

Paratrichodorus tansaniensis Siddiqi, 1974 (N, S)

Paratrichodorus teres Hopper, 1962 (N)

Paratrichodorus tunisiensis (Siddiqi, 1963) (S, Si)

Trichodorus Cobb, 1913

Trichodorus coomansi de Waele & Carbonell, 1983 (N)

Trichodorus primitivus (de Man, 1880) (N)

Trichodorus similis Seinhorst, 1963 (Si)

Trichodorus sparsus Szczygiel, 1968 (N, S)

Trichodorus taylori de Waele, Mancini, Roca & Lamberti, 1982 (N)

Trichodorus variopapillatus Hooper, 1972 (S)

Trichodorus viruliferus Hooper, 1962 (N, S, Si, Sa)

Alaimidae

Alaimus de Man, 1880

Alaimus arcuatus Thorne, 1939 (Si)

Alaimus hamulus Siddiqi & Husain, 1967 (S)

Alaimus jaulasali Siddiqi & Husain, 1967 (N)
Alaimus mucronatus Altherr, 1950 (N)
Alaimus parvus Thorne, 1939 (N)
Alaimus primitivus de Man, 1880 (N, S, Si)

Amphidelus Thorne, 1939

Amphidelus lagrecai Vinciguerra & De Francisci, 1973 (S)

Paramphidelus Andr ssy, 1977

Paramphidelus dolichurus (de Man, 1876) (S)
Paramphidelus hortensis (Andr ssy, 1961) (N)
Paramphidelus macer Andr ssy, 1977 (Si)

Isolaimida

Isolaimiidae

Isolaimium Cobb, 1920

Isolaimium andrassyi Hogewind & Heyns, 1967 (N)

Stichosomida

Trichuridae

Trichuris Roederer, 1761

Trichuris capreoli Artjuch, 1948 (S) (, M)
Trichuris discolor (Linstow, 1906) (N, Sa) (, M)
Trichuris globulosa (Linstow, 1901) (N) (, M)
Trichuris leporis (Froelich, 1789) (N) (, M)
Trichuris muris Schrank, 1788 (N) (, M)
Trichuris ovis (Abildgaard, 1795) (N, S, Si, Sa) (, M)
Trichuris skrjabini (Baskakov, 1924) (N, S) (, M)
Trichuris suis (Schrank, 1789) (N, S, Sa) (, M)
Trichuris trichiurus (Linnaeus, 1771) (N, S, Si) (, M)
Trichuris vulpis (Froelich, 1789) (N, S, Si, Sa) (, M)

Capillaria Zeder, 1800

Capillaria aerophila (Creplin, 1839) (N, S, Sa) (, M)
Capillaria anatis (Schrank, 1790) Travassos, 1915 (N) (U)

Capillaria annulata (Molin, 1858) (N) (U)
Capillaria bovis (Schnyder, 1906) (S) (, M)
Capillaria caudinflata (Molin, 1858) (N, S, Sa) (U)
Capillaria collaris (Linstow, 1873) (S) (U)
Capillaria contorta (Creplin, 1839) (N, S) (U)
Capillaria corvorum (Rudolphi, 1819) (N) (U)
Capillaria euryali Ricci, 1949 (S) (U)
Capillaria falconis Goeze, 1782 (S) (U)
Capillaria gracilis (Bellingham, 1844) (3, 4) (P)
Capillaria hepatica (Bancroft, 1893) (S) (, M)
Capillaria inflexa (Rudolphi, 1819) (S) (U)
Capillaria italica Ricci, 1949 (S) (, M)
Capillaria mingazzinii (Rizzo, 1902) (Si) (R)
Capillaria mucronata (Molin, 1856) (N) (, M)
Capillaria obsignata (Madsen, 1945) (Sa) (U)
Capillaria plica (Rudolphi, 1819) (N) (, M)
Capillaria putorii (Rudolphi, 1819) (N, S) (, M)
Capillaria rara Ricci, 1949 (S) (, M)
Capillaria romana Ricci, 1949 (S) (, M)
Capillaria sonsinoi (Parona, 1897) (S) (R)
Capillaria spiralis (Molin, 1858) (N) (U)
Capillaria vanelli (Rudolphi, 1819) (S) (U)
Capillaria vespertilionis Rudolphi, 1819 (N) (, M)

***Pseudocapillaria* Freitas, 1959**

Pseudocapillaria adriatica (Nikolaeva & Naidenova, 1964) (4) (P)
Pseudocapillaria microspicula (Mamaev, Parukhin & Baeva, 1963) (3) (P)
Pseudocapillaria parablennii Moravec, Orecchia & Paggi, 1988 (3) (P)
Pseudocapillaria tomentosa (Dujardin, 1843) Moravec, 1987 (3) (P)

***Trichosomoides* Railliet, 1895**

Trichosomoides crassicauda Bellingham, 1840 (N, S) (, M)
Trichosomoides nasalis Biocca & Aurizi, 1961 (S) (, M)

***Schulmanella* Ivashkin, 1964**

Schulmanella petruschewskii (Shulman, 1948) Ivashkin, 1964 (N) (P)

Trichinellidae

***Trichinella* Railliet, 1895**

Trichinella britovi Pozio, La Rosa, Darwin, Murrell & Lichtenfels, 1992 (N, S) (, M)

Cystoopsidae

Trichuroides Ricci, 1949

Trichuroides chiropteri Ricci, 1949 (S) (, M)

Mermithidae

Hexamermis Steiner, 1924

Hexamermis albicans (von Siebold, 1854) (S) (I)

Orthomermis Poinar, 1964

Orthomermis oedobranchnus Poinar, 1964 (N) (I)

Chromadorida

Chromadoridae

Spiliphera Bastian, 1865

Spiliphera dolichura de Man, 1893 (3, 5)

Spiliphera gracilicauda de Man, 1893 (5)

Atrochromadora Wieser, 1959

Atrochromadora microlaima (de Man, 1889) (3)

Atrochromadora parva (de Man, 1893) (3, 4, 5)

Chromadora Bastian, 1865

Chromadora macrolaimoides Steiner, 1915 (3, 5)

Chromadora nudicapitata Bastian, 1865 (3, 4, 5)

Chromadorella Filipjev, 1918

Chromadorella ariminensis (Gerlach, 1953) (3)

Chromadorella membranata (Micoletzky, 1922) (3, 4, 5)

Chromadorella parapoecilosoma (Micoletzky, 1922) (3, 5)

Chromadorella trilix Wieser & Hopper, 1967 (3)

Chromadorina Filipjev, 1918

Chromadorina erythrophthalma (Schneider, 1906) (3)
Chromadorina germanica (Bütschli, 1874) (3)
Chromadorina laeta (de Man, 1876) (3, 4, 5)
Chromadorina macropunctata (Wieser, 1954) (5)
Chromadorina nuda Wieser, 1954 (3)

Prochromadora Filipjev, 1922

Prochromadora magna (Schulz, 1935) (3, 5)

Prochromadorella Micoletzky, 1924

Prochromadorella mediterranea (Micoletzky, 1922) (3, 4, 5)
Prochromadorella neapolitana (de Man, 1876) (3, 4, 5)
Prochromadorella subterranea Gerlach, 1953 (3)

Actinonema Cobb, 1920

Actinonema fidatum Vitiello, 1970 (4)
Actinonema longicaudatum (Steiner, 1918) (3)
Actinonema pachydermatum Cobb, 1920 (3)

Euchromadora de Man, 1886

Euchromadora africana Linstow, 1908 (3)
Euchromadora striata (Eberth, 1863) (3, 4, 5)
Euchromadora vulgaris (Bastian, 1865) (3)

Parapapinnanema Inglis, 1969

Parapapinnanema shirleyae (Coles, 1965) (5)

Graphonema Cobb, 1898

Graphonema mediterranea (Allgén, 1942) (3)

Steineridora Inglis, 1969

Steineridora adriatica (Daday, 1901) (3, 4)

Chromadorissa Filipjev, 1917

Chromadorissa strandi Kreis, 1928 (3)

Chromadorita Filipjev, 1922

Chromadorita brevisetosa Gerlach, 1953 (3)
Chromadorita leuckarti (de Man, 1876) (N, S, Si, Sa)

Chromadorita minor (Allgén, 1927) (5)
Chromadorita obliqua (Gerlach, 1953) (3)

Dichromadora Kreis, 1929

Dichromadora abnormis Gerlach, 1953 (3)

Hypodontolaimus de Man, 1886

Hypodontolaimus geophilus (de Man, 1876) (Sa)
Hypodontolaimus inaequalis (Bastian, 1865) (3)
Hypodontolaimus mediterraneus Brunetti, 1949 (3)

Neochromadora Micoletzky, 1924

Neochromadora amembranata Wieser, 1954 (3, 5)
Neochromadora brevisetosa Wieser, 1954 (5)
Neochromadora izhorica (Filipjev, 1930) (3)
Neochromadora poecilosomoides (Filipjev, 1918) (3, 5)
Neochromadora trichophora (Steiner, 1921) (3)

Ptycholaimellus Cobb, 1920

Ptycholaimellus ponticus (Filipjev, 1922) (3)

Spilophorella Filipjev, 1917

Spilophorella paradoxa (de Man, 1888) (3, 4, 5)

Ethmolaimidae

Comesa Gerlach, 1956

Comesa pseudocorcunda (Vitiello, 1971) (4)

Ethmolaimus de Man, 1880

Ethmolaimus distephanus de Cillis, 1928 (S) (*)
Ethmolaimus pratensis de Man, 1880 (N, S, Si, Sa)

Note

Ethmolaimus distephanus: Nomen nudum.

Achromadoridae

***Achromadora* Cobb, 1913**

Achromadora ruricola (de Man, 1880) (N, S, Si, Sa)

Achromadora terricola (de Man, 1880) (N, S, Sa)

Cyatholaimidae

***Pomponema* Cobb, 1917**

Pomponema lineatum (Gerlach, 1953) (3)

Pomponema multipapillatum (Filipjev, 1922) (4)

***Acanthonchus* (*Acanthonchus*) Cobb, 1920**

Acanthonchus (*Acanthonchus*) *arcuatus* (Kreis, 1928) (3)

***Paracanthonchus* Micoletzky, 1924**

Paracanthonchus stekhoveni Wieser, 1954 (5)

Paracanthonchus steueri (Micoletzky, 1922) (3, 4)

Paracanthonchus sunesoni (Allgén, 1942) (3, 5)

Paracanthonchus tyrrhenicus (Brunetti, 1949) (3, 5)

***Paracyatholaimoides* Gerlach, 1953**

Paracyatholaimoides multispiralis Gerlach, 1953 (3)

***Paracyatholaimus* Micoletzky, 1922**

Paracyatholaimus dubiosus (Bütschli, 1874) (3)

Paracyatholaimus intermedius (de Man, 1880) (S)

Paracyatholaimus separatus Wieser, 1954 (3)

***Cyatholaimus* Bastian, 1865**

Cyatholaimus canariensis Steiner, 1921 (3, 5)

Cyatholaimus gracilis (Eberth, 1863) (3, 5)

Cyatholaimus microsetosus Wieser, 1954 (3)

***Longicyatholaimus* Micoletzky, 1924**

Longicyatholaimus cervoides Vitiello, 1970 (4)

Longicyatholaimus longicaudatus (de Man, 1876) (3)

***Metacyatholaimus* Stekhoven, 1942**

Metacyatholaimus chabaudi Gourbault, 1980 (3)

Praeacanthonchus Micoletzky, 1924

Praeacanthonchus punctatus (Bastian, 1865) (3)

Selachinematidae

Gammanema Cobb, 1920

Gammanema conicauda Gerlach, 1953 (3)

Halichoanolaimus de Man, 1886

Halichoanolaimus dolichurus Ssaweljev, 1912 (3, 5)

Halichoanolaimus lanceolatus Vitiello, 1970 (4)

Halichoanolaimus robustus (Bastian, 1865) (3)

Latronema Wieser, 1954

Latronema orcinum (Gerlach, 1952) (3)

Richtersia Steiner, 1916

Richtersia elongata Stekhoven, 1950 (3)

Synonchiella Cobb, 1933

Synonchiella micramphis (Stekhoven, 1950) (4)

Synonchiella minuta Vitiello, 1970 (4)

Synonchium Cobb, 1920

Synonchium obtusum Cobb, 1920 (3)

Desmodoridae

Acanthopharyngoides Chitwood, 1936

Acanthopharyngoides tyrrhenicus Wieser, 1954 (3)

Acanthopharynx Marion, 1870

Acanthopharynx micans (Eberth, 1863) (3, 4)

Acanthopharynx perarmata Marion, 1870 (3, 4, 5)

Desmodora (Croconema) Cobb, 1920

Desmodora (Croconema) cincta (Cobb, 1920) (3)
Desmodora (Croconema) mediterranea (Wieser, 1954) (3)

Desmodora (Pseudochromadora) Daday, 1899

Desmodora (Pseudochromadora) microchaeta Allgén, 1929 (3)
Desmodora (Pseudochromadora) pontica Filipjev, 1922 (3, 5)

Desmodora (Xenodesmodora) Wieser, 1951

Desmodora (Xenodesmodora) porifera Wieser, 1951 (3)
Desmodora (Xenodesmodora) varioannulata (Kreis, 1928) (3)

Desmodora (Zalonema) Cobb, 1920

Desmodora (Zalonema) ditlevseni Micoletzky, 1922 (3, 4, 5)

Chromaspirina Filipjev, 1918

Chromaspirina crinita Gerlach, 1952 (3)
Chromaspirina pontica Filipjev, 1918 (3)
Chromaspirina thieryi De Coninck, 1943 (3)

Onyx Cobb, 1891

Onyx sagittarius Gerlach, 1950 (3)

Sigmophoranema Hope & Murphy, 1972

Sigmophoranema litorale (Schulz, 1938) (3)

Spirinia (Perspiria) Wieser & Hopper, 1967

Spirinia (Perspiria) flagellata Vitiello, 1971 (4)

Pseudonchus Cobb, 1920

Pseudonchus gerlachi Warwick, 1969 (3)

Molgolaimus Ditlevsen, 1921

Molgolaimus lazonus (Vitiello, 1971) (4)

Prodesmodora Micoletzky, 1923

Prodesmodora circulata (Micoletzky, 1913) (N, S)
Prodesmodora pantalicae Colomba & Vinciguerra, 1979 (Si)

Prodesmodora terricola Altherr, 1952 (N)

Epsilonematidae

Epsilonema Steiner, 1927

Epsilonema byssicola Lorenzen, 1973 (3)

Epsilonema cygnoides (Metschnikoff, 1867) (3, 4, 5)

Epsilonema pustulatum (Gerlach, 1952) (3)

Draconematidae

Draconema Cobb, 1913

Draconema claparedii (Metschnikoff, 1867) (3, 5)

Draconema inarimense (Panceri, 1876) (3) (*)

Draconema longuirostrum (Schepotieff, 1907) (3)

Draconema ophicephalum (Claparède, 1863) (3)

Note

Draconema inarimense: Species inquirenda.

Microlaimidae

Bolbolaimus Cobb, 1920

Bolbolaimus crassiceps (Gerlach, 1953) (3)

Bolbolaimus denticulatus Gerlach, 1953 (3)

Calomicrolaimus Lorenzen, 1976

Calomicrolaimus compridus (Gerlach, 1956) (3)

Calomicrolaimus honestus (de Man, 1922) (5)

Calomicrolaimus microseta (Gerlach, 1953) (3)

Calomicrolaimus monstrosus (Gerlach, 1953) (3)

Calomicrolaimus tenuicollis (Gerlach, 1952) (3)

Microlaimus de Man, 1880

Microlaimus dentatus Allgén, 1935 (3)

Microlaimus honestoides Meyl, 1954 (3)

Microlaimus pygmaeus Meyl, 1954 (3)

Microlaimus undulatus Gerlach, 1953 (3)

Aponchiidae

Synonema Cobb, 1920

Synonema obtusicaudatum (de Man, 1899) (3, 4)

Monoposthiidae

Monoposthia de Man, 1889

Monoposthia costata (Bastian, 1865) (3, 5)

Monoposthia mirabilis Schulz, 1932 (3)

Nudora Cobb, 1920

Nudora thorakista (Schulz, 1935) (3)

Leptolaimidae

Aphanolaimus de Man, 1880

Aphanolaimus aquaticus Daday, 1894 (N, S, Si, Sa)

Aphanolaimus attentus de Man, 1880 (N)

Aphanolaimus solitudinis Andr  ssy, 1968 (N)

Dagda Southern, 1914

Dagda asymmetrica Gerlach, 1953 (3)

Halaphanolaimus Southern, 1914

Halaphanolaimus pellucidus Southern, 1914 (3)

Leptolaimus de Man 1876

Leptolaimus setiger Stekhoven & De Coninck, 1933 (3)

Paraphanolaimus Micoletzky, 1923

Paraphanolaimus behningi Micoletzky, 1923 (N, S)

Paraplectonema Strand, 1934

Paraplectonema pedunculatum (Hofmaenner, 1913) (N, S, Si)

Setostephanolaimus Chesunov, 1994

Setostephanolaimus flevensis (Stekhoven, 1935) (3)
Setostephanolaimus paraflevensis (Gerlach, 1953) (3)

Anonchus Cobb, 1913

Anonchus mirabilis (Hofmaenner, 1914) (N)

Camacolaimus de Man 1889

Camacolaimus longicauda de Man, 1922 (3)
Camacolaimus tardus de Man, 1889 (3)

Ionema Cobb, 1920

Ionema cobbi (Steiner, 1916) (4)

Procamacolaimus Gerlach, 1954

Procamacolaimus acer Gerlach, 1954 (3)
Procamacolaimus dolichostylus Gerlach, 1953 (3)

Chronogasteridae

Chronogaster Cobb, 1913

Chronogaster typicus (de Man, 1921) (N, S, Si, Sa)

Plectidae

Anaplectus De Coninck & Stekhoven, 1933

Anaplectus granulosus (Bastian, 1865) (N, S, Si, Sa)

Chiloplectus Andr ssy, 1984

Chiloplectus andrassyi (Timm, 1971) (N, S, Sa)

Plectus Bastian, 1865

Plectus acuminatus Bastian, 1865 (N, S, Si, Sa)
Plectus aquatilis Andr ssy, 1985 (N, S, Si, Sa)
Plectus armatus B tschli, 1873 (N, S, Si, Sa)
Plectus assimilis B tschli, 1873 (N, Si)

Plectus cirratus Bastian, 1865 sensu Zell, 1993 (N)
Plectus communis Bütschli, 1873 (S)
Plectus cornus Maggenti, 1961 (N, Si)
Plectus elongatus Maggenti, 1961 (N, Si)
Plectus geophilus de Man, 1880 (N, S)
Plectus inquirendus Andrásy, 1958 (N)
Plectus longicaudatus Bütschli, 1873 (N, S)
Plectus palustris de Man, 1880 (N, Si)
Plectus parietinus Bastian, 1865 (N, S, Si, Sa)
Plectus parvus Bastian, 1865 (N, S, Si, Sa)
Plectus pusteri Fuchs, 1930 (Sa)
Plectus rhizophilus de Man, 1880 (N, S, Si)
Plectus tenuis Bastian, 1865 (N, S)
Plectus thornei Rühm, 1956 (N, Sa)
Plectus velox Bastian, 1865 (Sa)

Tylocephalus Crossman, 1933

Tylocephalus auriculatus (Bütschli, 1873) (N, S, Si, Sa)

Wilsonema Cobb, 1913

Wilsonema otophorum (de Man, 1880) (N, S)

Teratocephalidae

Teratocephalus de Man, 1876

Teratocephalus dadayi Andrásy, 1968 (Si)
Teratocephalus terrestris (Bütschli, 1873) (N, S, Si, Sa)

Euteratocephalus Andrásy, 1958

Euteratocephalus palustris (de Man, 1880) (N, Sa)

Metateratocephalus Eroshenko, 1975

Metateratocephalus crassidens (de Man, 1880) (N, S, Sa)

Haliplectidae

Haliplectus Cobb, 1913

Haliplectus bibulbosus (Schulz, 1934) (3)
Haliplectus leptcephalus Vinciguerra & Zullini, 1980 (S)

Setoplectus Vitiello, 1971

Setoplectus gerlachi Vitiello, 1971 (4)

Aulolaimidae

Aulolaimus de Man, 1880

Aulolaimus costatus Andr  ssy, 1967 (S)

Aulolaimus oxycephalus de Man, 1880 (N, S)

Tarvaiidae

Tarvaia Allg  n, 1934

Tarvaia angusta Gerlach, 1953 (3)

Aegialoalaimidae

Aegialoalaimus de Man, 1907

Aegialoalaimus tenuis Kreis, 1928 (3)

Ceramonematidae

Ceramonema Cobb, 1920

Ceramonema pisanum Gerlach, 1953 (3)

Dasynemoides Chitwood, 1936

Dasynemoides pselionemoides (Gerlach, 1953) (3)

Metadasynemoides Haspeslagh, 1972

Metadasynemoides longicollis (Gerlach, 1952) (3)

Pselionema Cobb, 1913

Pselionema longissimum Gerlach, 1953 (3)

Bastianiidae

Bastiania de Man, 1876

Bastiania gracilis de Man, 1876 (N, S)

Bastiania longicaudata de Man, 1880 (N)

Bastiania octopapillata (Meyl, 1954) (S)

Prismatolaimidae

Prismatolaimus de Man, 1880

Prismatolaimus dolichurus de Man, 1880 (N, Sa)

Prismatolaimus intermedius (Bütschli, 1873) (N, S, Si, Sa)

Prismatolaimus verrucosus Hirschmann, 1952 (S)

Odontolaimidae

Odontolaimus de Man, 1880

Odontolaimus aquaticus Schneider, 1937 (N, Sa)

Odontolaimus chlorurus de Man, 1880 (N, S)

Rhabdolaimidae

Rhabdolaimus de Man, 1880

Rhabdolaimus brachyuris Meyl, 1954 (S)

Rhabdolaimus terrestris de Man, 1880 (N, S)

Monhysterida

Monhysteridae

Diplolaimella Allgén, 1929

Diplolaimella ocellata (Bütschli, 1874) (3)

Eumonhystera Andrassy, 1981

Eumonhystera andrassyi (Biró, 1969) (S)

Eumonhystera barbata Andrassy, 1981 (N)

Eumonhystera dispar (Bastian, 1865) (N, S, Si, Sa)

Eumonhystera filiformis (Bastian, 1865) (N, S, Si, Sa)

Eumonhystera longicaudatula (Gerlach & Riemann, 1973) (N)

Eumonhystera pseudobulbosa (Daday, 1896) (N, Sa)
Eumonhystera similis (Bütschli, 1873) (N, S)
Eumonhystera vulgaris (de Man, 1880) (N, S, Sa)

Geomonhystera Andrásy, 1981

Geomonhystera aenariensis (Meyl, 1953) (S)
Geomonhystera australis (Cobb, 1893) (S)
Geomonhystera tripyloides (Andrásy, 1968) (Si)
Geomonhystera villosa (Bütschli, 1873) (N, S, Si, Sa)

Monhystera Bastian, 1865

Monhystera macrolabiata Kreis, 1928 (S) (*)
Monhystera paludicola de Man, 1881 (N, S, Sa)
Monhystera psilcephala (De Cillis, 1917) (S)
Monhystera riemanni Jacobs & Heyns, 1987 (N, S, Si, Sa)
Monhystera wangi Wu & Hoeppli, 1929 (N, S, Sa)

Monhystrella Cobb, 1918

Monhystrella paramacrura (Meyl, 1954) (S)
Monhystrella thermophila (Meyl, 1953) (S)

Thalassomonhystera Jacobs, 1987

Thalassomonhystera cartaromanae (Meyl, 1954) (3)
Thalassomonhystera cephalophora (de Man, 1876) (3)
Thalassomonhystera cuspidospiculum (Allgén, 1932) (3)
Thalassomonhystera gerlachii (Meyl, 1954) (S)
Thalassomonhystera parva (Bastian, 1865) (3, 4, 5)

Note

Monhystera macrolabiata: Species inquirenda.

Xyalidae

Cobbia de Man, 1907

Cobbia dentata Gerlach, 1953 (3)

Daptonema Cobb, 1920

Daptonema circulum (Vitiello, 1971) (4)
Daptonema curvispiculum (Gerlach, 1953) (3)
Daptonema longissimecaudatum (Kreis, 1935) (4)

Daptonema microspiculum (Gerlach, 1953) (3)
Daptonema mirabile (Stekhoven & De Coninck, 1933) (3)
Daptonema paratortum (Vitiello, 1971) (4)
Daptonema pseudotortum (Vitiello, 1971) (4)
Daptonema setifer (Gerlach, 1952) (3)
Daptonema setosum (Bütschli, 1874) (3, 5)
Daptonema tortum (Wieser & Hopper, 1967) (3)

Hofmaenneria Gerlach & Meyl, 1957

Hofmaenneria brachystoma (Hofmänner, 1914) (S)

Metadesmolaimus Stekhoven, 1935

Metadesmolaimus aversivulva Gerlach, 1953 (3)

Paramonohystera Steiner, 1916

Paramonohystera elliptica Filipjev, 1918 (3, 4, 5)

Rhynchonema Cobb, 1920

Rhynchonema brevituba Gerlach, 1953 (3)
Rhynchonema longituba Gerlach, 1953 (3)

Scaptrella Cobb, 1917

Scaptrella brevicaudata Gerlach, 1953 (3, 4)

Theristus Bastian, 1865

Theristus acer Bastian, 1865 (5)
Theristus aculeatus Schulz, 1935 (3)
Theristus agilis (de Man, 1880) (N, S)
Theristus ambronensis Schulz, 1936 (3)
Theristus athesinus Andrásy, 1962 (N)
Theristus bastiani Wieser in Gerlach & Riemann, 1973 (3)
Theristus flevensis Schuurmans Stekhoven, 1935 (S)
Theristus gracilis (de Man, 1876) (3)
Theristus heterospiculoides Gerlach, 1953 (3)
Theristus heterospiculum (Allgén, 1932) (3)
Theristus inermis Gerlach, 1953 (3, 4)
Theristus longisetosus (Stekhoven & De Coninck, 1933) (3)
Theristus pertenuis Bresslau & Stekhoven, in Stekhoven, 1935 (3)
Theristus pictus Gerlach, 1951 (3)
Theristus ruffoi Andrásy, 1959 (N)
Theristus vesentinae Andrásy, 1962 (N)

Xyala Cobb, 1920

Xyala striata Cobb, 1920 (3)

Sphaerolaimidae

Parasphaerolaimus Ditlevsen, 1918

Parasphaerolaimus dispar (Filipjev, 1918) (5)

Sphaerolaimus Bastian, 1865

Sphaerolaimus macrocirculoides Wieser, 1954 (5)

Sphaerolaimus macrocirculus Filipjev, 1918 (4, 5)

Sphaerolaimus minutus Vitiello, 1971 (4)

Sphaerolaimus pacificus Allgén, 1947 (5)

Sphaerolaimus profundus Vitiello, 1971 (4)

Siphonolaimidae

Siphonolaimus de Man, 1893

Siphonolaimus niger de Man, 1893 (3)

Siphonolaimus weismanni (Zur Strassen, 1904) (3)

Astomonema Ott, Rieger, Rieger & Enders, 1982

Astomonema brevicauda Stekhoven, 1950 (4) (*)

Note

Astomonema brevicauda: Species inquirenda.

Linhomoeidae

Megadesmolaimus Wieser, 1954

Megadesmolaimus incisus Wieser, 1954 (5)

Terschellingia de Man, 1888

Terschellingia communis de Man, 1888 (5)

Terschellingia longicaudata de Man, 1907 (4)

Metalaimus Kreis, 1928

Metalaimus gracilis Kreis, 1928 (3)

Anticyclus Cobb, 1920

Anticyclus gigas Vitiello, 1969 (4)

Anticyclus pachyamphis (Wieser, 1956) (4)

Disconema Filipjev, 1918

Disconema minutum Vitiello, 1969 (4)

Linhomoeus Bastian, 1865

Linhomoeus hirsutus Bastian, 1865 (3, 5)

Linhomoeus pilosus (Stekhoven, 1950) (3)

Axonolaimidae

Ascolaimus Ditlevsen, 1919

Ascolaimus elongatus (Bütschli, 1874) (3)

Axonolaimus de Man, 1889

Axonolaimus setosus Filipjev, 1918 (3, 4, 5)

Axonolaimus tirrenicus Brunetti, 1941 (3)

Odontophora Bütschli, 1874

Odontophora fatisca Vitiello, 1971 (4)

Odontophora setosa (Allgén, 1929) (3)

Odontophora tenuicaudata Allgén, 1935 (3)

Odontophoroides Boucher & Helléouët, 1977

Odontophoroides monhystera (Gerlach, 1953) (3)

Comesomatidae

Dorylaimopsis Ditlevsen, 1918

Dorylaimopsis mediterranea Grimaldi De Zio, 1968 (4, 5)

Laimella Cobb, 1920

Laimella filipjevi Jensen, 1979 (4)

Pierrickia Vitiello, 1970

Pierrickia decasetosa Vitiello, 1970 (4)

Sabatieria Rouville, 1903

Sabatieria abyssalis (Filipjev, 1918) (4, 5?)

Sabatieria armata Gerlach, 1952 (3)

Sabatieria granifer Wieser, 1954 (5)

Sabatieria stekhoveni Vitiello, 1970 (4)

Setosabatieria Platt, 1985

Setosabatieria hilarula (de Man, 1922) (3, 4, 5)

Diplopeltidae

Araeolaimus de Man, 1888

Araeolaimus bioculatus (de Man, 1876) (3, 4, 5)

Araeolaimus elegans de Man, 1888 (3, 4, 5)

Araeolaimus filipjevi Stekhoven & Adam, 1931 (5)

Araeolaimus longisetosus Wieser, 1954 (5)

Araeolaimus mediterraneus (de Man, 1876) (3)

Araeolaimus microphthalmus de Man, 1893 (3, 5)

Campylaimus Cobb, 1920

Campylaimus inaequalis Cobb, 1920 (4)

Diplopeltis Cobb in Stiles & Hassal, 1905

Diplopeltis cirrhatus (Eberth, 1863) (3)

Metaraeolaimoides De Coninck, 1936

Metaraeolaimoides oxystoma De Coninck, 1936 (3)

Cylindrolaimus de Man, 1880

Cylindrolaimus bambus Andrásy, 1968 (N)

Cylindrolaimus communis de Man, 1880 (N, S, Si)

Nematoda i.s.

Nematoda famiglia i.s.

Diplohystera De Cillis, 1917

Diplohystera inflata De Cillis, 1917 (S)

Phanoglene Nordmann, 1840

Phanoglene obtusicaudata (Kölliker, 1845) (5)

Phanoglene rosea (Kölliker, 1845) (5)

Secernentea

Rhabditida

Rhabditidae

Ablechroiulus Andrásy, 1966

Ablechroiulus cristatus (Hirschmann, 1952) (N)

Bursilla Andrásy, 1976

Bursilla monhystera (Bütschli, 1873) (S)

Caenorhabditis Osche, 1952

Caenorhabditis elegans (Maupas, 1899) (N)

Cruznema Artigas, 1927

Cruznema tripartitum (Linstow, 1906) (N, Sa)

Curviditis Dougherty, 1953

Curviditis curvicaudata (Schneider, 1866) (N, S, Si, Sa)

Curviditis friderici (Hirschmann in Osche, 1952) (S)

Cuticularia Van der Linde, 1938

Cuticularia oxycerca (de Man, 1895) (N, S, Si, Sa)

Dolichorhabditis Andrásy, 1983

Dolichorhabditis dolichura (Schneider, 1866) (N, S)

Mesorhabditis Osche, 1952

Mesorhabditis inarimensis (Meyl, 1953) (S)

Mesorhabditis spiculigera (Steiner, 1936) (Si)

Oryctonema Poinar, 1970

Oryctonema pentodonis Poinar & Triggiani, 1979 (S) (I)

Pellioiditis Dougherty, 1953

Pellioiditis pellioides (Bütschli, 1873) (N)

Pelodera Schneider, 1866

Pelodera punctata (Cobb, 1914) (N, S)

Pelodera strongyloides (Schneider, 1860) (N) (, M)

Pelodera teres Schneider, 1866 (N)

Protorhabditis Osche, 1952

Protorhabditis filiformis (Bütschli, 1873) (N)

Rhabditella Cobb, 1929

Rhabditella pseudoelongata (Micoletzky, 1913) (N, S)

Rhabditis Dujardin, 1845

Rhabditis longicaudata Bastian, 1865 (S)

Rhabditis producta (A. Schneider, 1866) (S, Sa)

Rhabditis resistens Meyl, 1954 (S)

Rhabditis terricola Dujardin, 1845 (N)

Rhitis Andrassy, 1982

Rhitis inermiformis (Osche, 1952) (N)

Odontorhabditidae

Cephaloboides Rahm, 1928

Cephaloboides musicola (Rahm, 1928) (S)

Diploscapteridae

Diploscapter Cobb, 1913

Diploscapter coronatus (Cobb, 1893) (N, S)

Rhabdiasidae

Rhabdias Stiles & Hassall, 1905

Rhabdias bufonis Schrank, 1788 (N) (A)

Rhabdias fuscovenosa (Railliet, 1899)

Rhabdias fuscovenosa catanensis (Rizzo, 1902) (Si) (I)

Steinernematidae

Steinernema Travassos, 1927

Steinernema carpocapsae Weiser, 1955 sensu Poinar, 1989 (N, S) (I)

Steinernema feltiae Filipjev, 1934 (N, S) (I)

Steinernema menozzii Travassos, 1931 (N, S) (I)

Heterorhabditidae

Heterorhabditis Poinar, 1976

Heterorhabditis bacteriophora Poinar, 1976 (N) (I)

Heterorhabditis helioidis (Khan, Brooks & Hirschmann, 1976) (N) (I)

Strongyloididae

Strongyloides Grassi, 1879

Strongyloides avium Cram, 1929 (S) (U)

Strongyloides papillosus (Wedl, 1856) (N, S, Si, Sa) (, M)

Strongyloides ransomi Schwartz & Alicata, 1930 (N, S) (, M)

Strongyloides ratti Sandground, 1925 (S) (, M)

Strongyloides stercoralis (Bavay, 1876) (N, S, Si) (, M)

Strongyloides westeri Ihle, 1917 (N) (, M)

Bunonematidae

Bunonema Jägerskiöld, 1905

Bunonema penardi Stefanski, 1914 (S)

Cosmocercidae

Cosmocercoides Wilkie, 1930

Cosmocercoides speleomantis Ricci, 1987 (Sa) (A)

Cosmocerca Diesing, 1861

Cosmocerca commutata (Diesing, 1851) (N) (A)

Cosmocerca sardiniae Ricci, 1987 (Sa) (A)

Oxysomatium Railliet & Henry, 1916

Oxysomatium acuminatum (Schrank, 1788) (N) (A)

Oxysomatium brevicaudatum (Zeder, 1800) (N, S) (A)

Aplectana Railliet & Henry, 1916

Aplectana leesi Hristovski & Riggio, 1975 (Si) (A)

Atractidae

Probstmayria Ransom, 1917

Probstmayria vivipara (Probstmayr, 1865) (N, S) (, M)

Atractis Dujardin, 1845

Atractis dactyluris (Rudolphi, 1819) (N, S, Sa) (R)

Labiduris Schneider, 1866

Labiduris gulosa (Rudolphi, 1819) (Sa) (R)

Oxyuridae

Aspiculuris Schulz, 1924

Aspiculuris tetraptera (Nitzsch, 1821) (N, S) (, M)

Enterobius Leach, 1853

Enterobius vermicularis (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa) (, M)

Oxyuris Rudolphi, 1803

Oxyuris equi (Schrank, 1788) (N) (, M)

Passalurus Dujardin, 1845

Passalurus ambiguus (Rudolphi, 1819) (N, S, Sa) (, M)

Citellina Prendel, 1928

Citellina alpina Jettmar & Anschau, 1951 (N) (, M)

Skrjabinema Werestchajin, 1926

Skrjabinema ovis (Skrjabin, 1915) (N, S) (, M)

Skrjabinema rupicapra Bohm & Gebauer, 1930 (N) (, M)

Syphacia Seurat, 1916

Syphacia frederici Roman, 1945 (N) (, M)

Syphacia muris Yamaguti, 1935 (N) (, M)

Syphacia obvelata (Rudolphi, 1802) (S, Sa) (, M)

Syphacia stroma (Linstow, 1884) (N) (, M)

Archeonema Ricci, 1987

Archeonema lanzai Ricci, 1987 (Sa) (A)

Pharyngodon Diesing, 1861

Pharyngodon acanthura (Molin, 1859) (N) (A)

Pharyngodon italicus Ricci, 1987 (Sa) (A)

Pharyngodon spinicauda (Dujardin, 1845) (N, Si) (R)

Mehdiella Seurat, 1918

Mehdiella microstoma (Drasche, 1884) (N) (R)

Mehdiella uncinata (Drasche, 1884) (N, Si) (R)

Tachygonetria Wedl, 1862

Tachygonetria conica (Drasche, 1883) (N, Si) (R)

Tachygonetria dentata (Drasche, 1884) (N, Si) (R)

Tachygonetria longicollis (Schneider, 1866) (N, Si) (R)

Thelastomatidae

Blatticola Schwenk, 1926

Blatticola blattae (Graeffe, 1860) (I) (*)

Hammerschmidtella Chitwood, 1932

Hammerschmidtella diesingi (Hammerschmidt, 1838) (I) (*)

Thelastoma Leidy, 1849

Thelastoma pachyjuli (Parona, 1896) (Si) (I)

Note

Blatticola blattae: Citato da località italiana imprecisata.

Hammerschmidtella diesingi: Citato da località italiana imprecisata.

Heterakidae

Heterakis Dujardin, 1945

Heterakis dispar (Shrank, 1790) (N) (U)

Heterakis gallinarum (Shrank, 1788) (N, S, Sa) (U)

Heterakis isolonche (Linstow, 1906) (N) (U)

Heterakis spumosa (Schneider, 1866) (N, S) (, M)

Spinicauda Travassos, 1920

Spinicauda sonsinoi (Linstow, 1894) (Si) (R)

Ascaridiidae

Ascaridia Dujardin, 1845

Ascaridia columbae (Gmelin, 1790) (N, S, Sa) (U)

Ascaridia compar (Shrank, 1790) (N, S) (U)

Ascaridia dissimilis Pérez & Viguera, 1931 (S) (U)

Ascaridia galli (Shrank, 1788) (S, Si) (U)

Ascaridia numidae Leiper, 1908 (S) (U)

Cephalobidae

Acrobeles Linstow, 1877

Acrobeles ciliatus Linstow, 1877 (N, S, Si, Sa)
Acrobeles prominens Andr ssy, 1964 (N, S, Si)

Acrobeloides Cobb, 1924

Acrobeloides buchneri (Meyl, 1953) (S)
Acrobeloides buetschlii (de Man, 1884) (N, S, Si, Sa)
Acrobeloides emarginatus (de Man, 1880) (S, Sa)
Acrobeloides nanus (de Man, 1880) (N, S, Si, Sa)

Cephalobus Bastian, 1865

Cephalobus persegneis Bastian, 1865 (N, S, Sa)
Cephalobus thermophilus Meyl, 1953 (S)

Cervidellus Thorne, 1937

Cervidellus serratus (Thorne, 1925) (Si)

Chiloplacus Thorne, 1937

Chiloplacus bisexualis (Mikoletzky, 1916) (S)
Chiloplacus quadricarinatus (Thorne, 1925) (S, Sa)
Chiloplacus symmetricus (Thorne, 1925) (Si)
Chiloplacus trilineatus Steiner, 1940 (Si)

Eucephalobus Steiner, 1936

Eucephalobus hooperi Marinari, 1967 (N)
Eucephalobus oxyuroides (de Man, 1876) (N, S)
Eucephalobus striatus (Bastian, 1865) (N, S, Si, Sa)

Heterocephalobus Brzeski, 1960

Heterocephalobus elongatus (de Man, 1880) (N, S, Si, Sa)
Heterocephalobus eurystoma Andr ssy, 1967 (S)

Pseudacrobeles Steiner, 1938

Pseudacrobeles pauciannulatus (Marinari, 1967) (N)

Seleborca Andr ssy, 1985

Seleborca complexa (Thorne, 1925) (S, Si)

Ypsylonellus Andrásy, 1984

Ypsylonellus insubricus (Steiner, 1914) (Si)

Ypsylonellus vexilliger (de Man, 1880) (S)

Panagrolaimidae

Halicephalobus Timm, 1956

Halicephalobus gingivalis (Stefanski, 1954) (N) (, M) (*)

Panagrellus Thorne, 1938

Panagrellus redivivoides (Goodey, 1943) (N)

Panagrellus redivivus (Linnaeus, 1767) (N)

Panagrolaimus Fuchs, 1930

Panagrolaimus brunettii (Marinari, 1957) (N, Si)

Panagrolaimus detritophagus Fuchs, 1930 (S)

Panagrolaimus halophilus Meyl, 1954 (S)

Panagrolaimus hygrophilus Bassen, 1940 (N, S, Si)

Panagrolaimus rigidus (A. Schneider, 1866) (N, S, Si, Sa)

Panagrolaimus ruffoi Andrásy, 1962 (N)

Note

Halicephalobus gingivalis: Raramente è parassita dei vertebrati.

Myolaimidae

Myolaimus Cobb, 1920

Myolaimus heterurus Cobb, 1920 (S)

Alloionematidae

Rhabditophanes Fuchs, 1930

Rhabditophanes schneideri (Bütschli, 1873) (S)

Strongylida

Diaphanocephalidae

Kalicephalus Molin, 1861

Kalicephalus mucronatus Molin, 1861 (N, Si) (A)

Kalicephalus vallei (Stossich, 1895) (N) (R)

Ancylostomatidae

Globocephalus Molin, 1861

Globocephalus urosubulatus Alessandrini, 1909 (N, S, Sa) (, M)

Ancylostoma Dubini, 1843

Ancylostoma caninum Ercolani, 1859 (N, S, Si, Sa) (, M)

Ancylostoma duodenale Dubini, 1843 (N, S, Si) (, M)

Ancylostoma tubaeforme (Zeder, 1800) (N, S, Sa) (, M)

Uncinaria Froelich, 1789

Uncinaria criniformis (Goeze, 1782) (S) (, M)

Uncinaria stenocephala Railliet, 1884 (N, S, Si, Sa) (, M)

Necator Stiles, 1903

Necator americanus (Stiles, 1902) (N) (, M)

Bunostomum Railliet, 1902

Bunostomum phlebotomum (Railliet, 1900) (N, Sa) (, M)

Bunostomum trigonocephalum (Rudolphi, 1808) (N, S, Si, Sa) (, M)

Grammocephalus Railliet & Henry, 1909

Grammocephalus hybridatus van der Vesthuysen, 1938 (S) (, M) (*)

Note

Grammocephalus hybridatus: In Italia (S) conosciuto solo come parassita di animali in giardino zoologico.

Strongylidae

Oesophagodontus Railliet & Henry, 1902

Oesophagodontus sp. (S) (, M)

Triodontophorus Looss, 1902

Triodontophorus brevicauda Boulenger, 1916 (N, S, Sa) (, M)

Triodontophorus serratus (Looss, 1900) (N, S, Sa) (, M)

Triodontophorus tenuicollis Boulenger, 1916 (N, Sa) (, M)

Strongylus O.F. Müller, 1780

Strongylus edentatus Looss, 1900 (S, Sa) (, M)

Strongylus equinus O.F. Müller, 1780 (N, S, Sa) (, M)

Strongylus vulgaris Looss, 1900 (S, Sa) (, M)

Cyathostomum Molin, 1861

Cyathostomum alveatum Looss, 1900 (S) (, M)

Cyathostomum catinatum Looss, 1900 (N, S) (, M)

Cyathostomum coronatum Looss, 1900 (N, S) (, M)

Cyathostomum labiatum (Looss, 1902) (N, S) (, M)

Cyathostomum labratum Looss, 1900 (N, S) (, M)

Cyathostomum pateratum (Yorke & Macfie, 1919) (S) (, M)

Cyathostomum sagittatum (Kotlan, 1920) (S) (, M)

Cyathostomum tetracanthum (Mehlis, 1831) Molin, 1861 (N, S) (, M)

Cylicodontophorus Ihle, 1922

Cylicodontophorus bicoronatus (Looss, 1900) (N, S) (, M)

Cylicocyclus Ihle, 1922

Cylicocyclus auriculatus (Looss, 1900) (S) (, M)

Cylicocyclus elongatus (Looss, 1900) (S) (, M)

Cylicocyclus insigne (Boulenger, 1917) (S) (, M)

Cylicocyclus leptostomus (Kotlan, 1920) (S) (, M)

Cylicocyclus nassatus (Looss, 1900) (N, S) (, M)

Cylicocyclus radiatus Looss, 1900 (N, S) (, M)

Cylicostephanus (Ihle, 1922)

Cylicostephanus calicatus (Looss, 1900) (N, S) (, M)

Cylicostephanus goldi (Boulenger, 1917) (S) (, M)

Cylicostephanus hybridus (Kotlan, 1920) (S) (, M)

Cylicostephanus longibursatus (Yorke & Macfie, 1918) (N, S) (, M)

Cylicostephanus minutus (Yorke & Macfie, 1918) (N, S) (, M)

Cylicostephanus ornatus (Kotlan, 1919) (S) (, M)

Cylicostephanus poculatus (Looss, 1900) (S) (, M)
Cylicostephanus skrjabini (Ershov, 1930) (S) (, M)

Poteriostomum Quiel, 1919

Poteriostomum imparidentatum Quiel, 1919 (Sa) (, M)
Poteriostomum ratzii (Kotlan, 1919) (S) (, M)

Gyalocephalus Looss, 1900

Gyalocephalus capitatus Looss, 1900 (S) (, M)

Chabertiidae

Chabertia Railliet & Henry, 1909

Chabertia ovina (Fabricius, 1788) (N, S, Si, Sa) (, M)

Oesophagostomum Railliet & Henry, 1913

Oesophagostomum bifurcum (Creplin, 1849) (, M) (*)
Oesophagostomum columbianum (Curtice, 1890) (Sa) (, M)
Oesophagostomum dentatum (Rudolphi, 1803) (N, S, Sa) (, M)
Oesophagostomum quadrispinulatum (Marcone, 1901) (N) (, M)
Oesophagostomum radiatum (Rudolphi, 1803) (N, S, Sa) (, M)
Oesophagostomum venulosum (Rudolphi, 1809) (N, S, Sa) (, M)

Note

Oesophagostomum bifurcum: Per l'Italia, noto solo come parassita di mammiferi importati.

Syngamidae

Syngamus Siebold, 1836

Syngamus trachealis (Montagu, 1811) (N) (U)

Cyathostoma Blanchard, 1849

Cyathostoma lari Blanchard, 1849 (Si) (U)

Archeostrongylus Biocca & Ferretti, 1958

Archeostrongylus italicus Biocca & Ferretti, 1958 (S) (, M)

Strongylacanthidae

Strongylacantha van Beneden, 1873

Strongylacantha glycirrhiza van Beneden, 1873 (S) (, M)

Amidostomatidae

Amidostomum Railliet & Henry, 1909

Amidostomum acutum (Lundahl, 1848) (N, S) (U)

Amidostomum anseris (Zeder, 1800) (N) (U)

Amidostomum fulicae (Rudolphi, 1819) (N) (U)

Epomidiostomum Skrjabin, 1915

Epomidiostomum orispinum (Molin, 1861) (N) (U)

Trichostrongylidae

Cooperia Ransom, 1907

Cooperia curticei (Giles, 1892) (N, S, Sa) (, M)

Cooperia oncophora (Railliet, 1898) (N, S, Sa) (, M)

Cooperia pectinata Ransom, 1907 (N) (, M)

Cooperia punctata (Linstow, 1906) (N, S, Sa) (, M)

Cooperia zurnabada Antipin, 1931 (N, Sa) (, M)

Paracooperia Travassos, 1935

Paracooperia sp. (S) (, M)

Graphidium Railliet & Henry, 1909

Graphidium strigosum (Dujardin, 1845) (N) (, M)

Hyostromylus Hall, 1921

Hyostromylus rubidus (Hassall & Stiles, 1892) (N) (, M)

Marshallagia Orloff, 1933

Marshallagia marshalli (Ransom, 1907) (N, Si) (, M)

Marshallagia occidentalis (Ransom, 1907) (N) (, M)

Marshallagia tricuspis Marotel, 1911 (Si) (, M)

Camelostrongylus Orloff, 1933

Camelostrongylus lyratus (Sjoberg, 1926) (N, Sa) (, M) (*)

Ostertagia Ransom, 1907

Ostertagia antipini Matschulskii, 1950 (N) (, M) (*)

Ostertagia arctica Mitzkewisch, 1929 (S) (, M)

Ostertagia drozdzi Jancev, 1977 (N, S) (, M)

Ostertagia kolchida Popova, 1937 (N, S) (, M)

Ostertagia leptospicularis Assadov, 1953 (N, S) (, M)

Ostertagia lyrataeformis (Drozdz, 1965) (N, S) (, M)

Ostertagia mossi Dikmans, 1931 (Sa) (, M)

Ostertagia ostertagi (Stiles, 1892) (N, S, Si, Sa) (, M)

Spiculopteragia Orloff, 1933

Spiculopteragia asymmetrica (Ware, 1925) (N, S) (, M)

Spiculopteragia mathevossiani Ruchliadev, 1948 (N, S) (, M)

Spiculopteragia quadrispiculata (Jansen, 1958) (N, S) (, M)

Spiculopteragia spiculoptera (Gushanskaya in Skrjabin & Orloff, 1934) (N, S) (, M)

Teladorsagia Andreeva & Satubaldin, 1954

Teladorsagia circumcincta (Stadelman, 1894) (N, S, Si, Sa) (, M)

Teladorsagia pinnata (Daubney, 1933) (N, S, Sa) (, M)

Teladorsagia trifurcata (Ransom, 1907) (N, S, Sa) (, M)

Trichostrongylus Looss, 1905

Trichostrongylus axei (Cobbold, 1879) (N, S, Si, Sa) (, M)

Trichostrongylus capricola Ransom, 1911 (N, S, Si, Sa) (, M)

Trichostrongylus colubriformis (Giles, 1892) (N, S, Sa) (, M)

Trichostrongylus lerouxi Biocca, Chabaud & Ghadirian, 1974 (Sa) (, M)

Trichostrongylus longispicularis Gordon, 1933 (Sa) (, M)

Trichostrongylus macy Travassos, 1937 (3, 4) (P)

Trichostrongylus probolurus (Railliet, 1898) (Si) (, M)

Trichostrongylus retortaeformis (Zeder, 1800) (N, S, Si, Sa) (, M)

Trichostrongylus skrjabini Kalantarian, 1930 (N) (, M)

Trichostrongylus tenuis (Mehlin, 1846) (Sa) (U)

Trichostrongylus vitrinus Looss, 1905 (N, S, Si, Sa) (, M)

Haemonchus Cobb, 1898

Haemonchus contortus (Rudolphi, 1803) (N, S, Si, Sa) (, M)

Haemonchus placei (Place, 1893) (N, Sa) (, M)

Note

Camelostrongylus lyratus: È più conosciuto come *Ostertagia lyrata*.
Ostertagia antipini: Species inquirenda.

Dictyocaulidae

Dictyocaulus Railliet & Henry, 1907

Dictyocaulus arnfieldi (Cobbold, 1884) (S, Sa) (, M)
Dictyocaulus eckerti Skrjabin, 1931 (N, S) (, M)
Dictyocaulus filaria (Rudolphi, 1809) (N, S, Si, Sa) (, M)
Dictyocaulus viviparus (Bloch, 1782) (N, S) (, M)

Molineidae

Ollulanus Leuckart, 1865

Ollulanus tricuspis Leuckart, 1865 (N, S) (, M)

Oswaldocruzia Travassos, 1917

Oswaldocruzia bialata (Molin, 1860) (N) (A)
Oswaldocruzia denudata (Rudolphi, 1819) (N) (R)
Oswaldocruzia filiformis (Goeze, 1782) (N, Sa) (A)
Oswaldocruzia goezei Skrjabin & Schultz, 1952 (S) (R)

Molineus Cameron, 1923

Molineus patens (Dujardin, 1845) (N, S) (, M)
Molineus torulosus (Molin, 1861) (S) (, M) (*)

Nematodirus Ransom, 1907

Nematodirus abnormalis May, 1920 (N, S, Sa) (, M)
Nematodirus battus Crofton & Thomas, 1951 (N, S, Sa) (, M)
Nematodirus chabaudi Rossi, 1983 (N) (, M)
Nematodirus davtiani Grigorian, 1951
 Nematodirus davtiani davtiani Grigorian, 1951 (S) (, M)
 Nematodirus davtiani alpinus Biocca, Balbo & Costantini, 1974 (N) (, M)
Nematodirus europaeus Jansen, 1972 (N) (, M)
Nematodirus filicollis (Rudolphi, 1802) (N, S, Si, Sa) (, M)
Nematodirus helvetianus May, 1920 (N, Sa) (, M)
Nematodirus ibicis Biocca, Balbo & Costantini, 1983 (N) (, M)
Nematodirus oiratianus Rajevskaja, 1929 (N) (, M)
Nematodirus roscidus Railliet, 1911 (N, S) (, M)

Nematodirus rupicaprae Biocca, Balbo & Costantini, 1983 (N) (, M)
Nematodirus spathiger (Railliet, 1896) (N, S, Si, Sa) (, M)

Note

Molineus torulosus: Per l'Italia, noto solo come parassita di mammiferi importati.

Heligmosomidae

Longistriata Schulz, 1926

Longistriata elpatievskii Shakhnazarova, 1949 (S) (, M)
Longistriata minuta (Dujardin, 1845) (N) (, M)

Heligmosomum Railliet & Henry, 1909

Heligmosomum azerbadjani Schachnasarova, 1949 (S) (, M)
Heligmosomum gracile (Leukart, 1842) (S) (, M)
Heligmosomum polygyrus (Dujardin, 1845)
Heligmosomum polygyrus polygyrus (Dujardin, 1845) (N) (, M)
Heligmosomum tatricum Erhardova, 1955 (N) (, M)

Heligmonellidae

Nippostrongylus Lane, 1923

Nippostrongylus brasiliensis (Travassos, 1914) (N) (, M)

Metastrongylidae

Metastrongylus Molin, 1861

Metastrongylus apri (Gmelin, 1790) (N, S, Si) (, M)
Metastrongylus asymmetricus Noda, 1973 (N, S) (, M)
Metastrongylus confusus Jansen, 1964 (N, S, Si) (, M)
Metastrongylus pudendotectus Vostokov, 1905 (N, S, Si, Sa) (, M)
Metastrongylus salmi Geddoelst, 1923 (N, S) (, M)

Protostrongylidae

Muellerius Cameron, 1927

Muellerius capillaris (Mueller, 1889) (N, S) (, M)
Muellerius tenuispiculatus Gebauer, 1932 (N) (, M)

Neostrongylus Gebauer, 1932

Neostrongylus linearis (Marotel, 1913) (N, S) (, M)

Varestrongylus Bhalerao, 1932

Varestrongylus capreoli (Stroh & Schmid, 1938) (N) (, M)

Varestrongylus sagittatus (Mueller, 1890) (N) (, M)

Cystocaulus Schulz, Orlov & Kutass, 1933

Cystocaulus ocreatus (Railliet & Henry, 1907) (N, S, Si, Sa) (, M)

Spiculocaulus Schulz, Orlov & Kutass, 1933

Spiculocaulus austriacus (Gebauer, 1932) (N) (, M)

Protostrongylus (Protostrongylus) Kamensky, 1905

Protostrongylus (Protostrongylus) cuniculorum (Joyeux & Gaud, 1946) (S) (, M)

Protostrongylus (Protostrongylus) rufescens (Leuckart, 1865)

Protostrongylus (Protostrongylus) rufescens rufescens (Leuckart, 1865) (N, S, Sa) (, M)

Protostrongylus (Protostrongylus) rufescens boevi Biocca, Balbo & Costantini, 1976 (N) (, M)

Protostrongylus (Protostrongylus) terminalis (Passerini, 1884) (S) (, M)

Protostrongylus (Pulmostrongylus) Boev, 1975

Protostrongylus (Pulmostrongylus) hobmaieri (Schulz, Orlov & Kutass, 1933) (N) (, M)

Protostrongylus (Pulmostrongylus) pulmonalis (Frölich, 1802) (N) (, M)

Protostrongylus (Pulmostrongylus) rupicaprae Gebauer, 1932 (N) (, M)

Crenosomatidae

Crenosoma Molin, 1861

Crenosoma striatum (Zeder, 1800) (N, S) (, M)

Crenosoma vulpis (Dujardin, 1845) (N, S) (, M)

Troglostrongylus Vevers, 1923

Troglostrongylus brevior Gerichter, 1948 (S) (, M)

Otostrongylus De Bruyn, 1933

Otostrongylus sp. (N) (, M) (*)

Note

Otostrongylus sp.: Per l'Italia, noto solo come parassita di mammiferi importati.

Angiostrongylidae

Stefanskostrongylus Drozd, 1970

Stefanskostrongylus soricis (Soltys, 1954) (N) (, M)

Aelurostrongylus Cameron, 1927

Aelurostrongylus abstrusus Railliet, 1898 (N, S, Sa) (, M)

Angiostrongylus Kamensky, 1905

Angiostrongylus chabaudi Biocca, 1957 (S) (, M)

Angiostrongylus vasorum (Railliet, 1866) (S, Sa) (, M)

Filaroididae

Filaroides van Beneden, 1858

Filaroides arator Chandler, 1931 (S) (, M)

Filaroides hirthei Georgi & Anderson, 1975 (N) (, M)

Filaroides martis (Werner, 1782) (S) (, M)

Skrjabinigylidae

Skrjabinigylus Petrov, 1927

Skrjabinigylus nasicola (Leuckart, 1842) (S) (, M)

Pseudaliidae

Stenurus Dujardin, 1845

Stenurus minor (Kuehn, 1829) (4) (, M)

Stenurus ovatus Linstow, 1910 (3, 4, 5) (, M)

Skrjabinalius Delyamure, 1942

Skrjabinalius guevarai Gallego & Selva, 1979 (3, 4, 5) (, M)

Halocerchus Baylis & Daubney, 1925

Halocerchus delphini Baylis & Daubney, 1925 (4, 5) (, M)

Halocerchus lagenorhynchi Baylis & Daubney, 1925 (4, 5) (, M)

Ascaridida

Kathlaniidae

Kathlania Lane, 1914

Kathlania leptura Rudolphi, 1819 (3, 4, 5) (R)

Cucullanidae

Truttaedacnitis Petter, 1974

Truttaedacnitis sphaerocephala (Rudolphi, 1809) (N) (P)

Truttaedacnitis truttae (Fabricius, 1794) Petter, 1974 (S) (P)

Cucullanus O.F. Müller, 1777

Cucullanus attenuata (Molin, 1858) (3, 4) (P) (*)

Cucullanus bioccai Orecchia & Paggi, 1987 (3) (P)

Cucullanus campanae Lèbre & Petter, 1984 (3) (P)

Cucullanus cirratus O.F. Müller, 1777 (3, 4) (P)

Cucullanus heterochrous Rudolphi, 1802 (3) (P)

Cucullanus hians (Dujardin, 1845) (3) (P)

Cucullanus lacustris Zoega, 1776 (N) (P)

Cucullanus longicollis (Stossich, 1899) Barreto, 1922 (3, 4) (P)

Cucullanus lophii Campana-Rouget & Chalsaud, 1956 (3) (P)

Cucullanus micropapillatus Törnquist, 1931 (3) (P)

Cucullanus orthagorisci Rudolphi, 1819 (3) (P) (*)

Cucullanus parvus Törnquist, 1931 (3) (P)

Cucullanus rotundata (Molin, 1859) (3, 4) (P) (*)

Dichelyne Jägerskiöld, 1902

Dichelyne abbreviatus (Rudolphi, 1819) (3) (P)

Dichelyne adriaticus (Törnquist, 1931) (4) (P)

Dichelyne elongatus (Törnquist, 1931) (3) (P)

Dichelyne minutus (Rudolphi, 1819) (3, 4) (P)

Dichelyne tripapillatus (Gendre, 1927) (3) (P) (*)

Note

Cucullanus attenuata: Species inquirenda.

Cucullanus orthagorisci: Species inquirenda.

Cucullanus rotundata: Species inquirenda.

Dichelyne tripapillatus: In Italia è stata segnalata (Orecchia et al., 1970) la varietà *brevispiculatus* di questa specie.

Anisakidae

Goezia Zeder, 1800

Goezia annulata (Molin, 1860) (3, 4) (P)

Goezia ascaroides (Goeze, 1782) (4) (P)

Goezia kollari (Molin, 1858) (4) (P)

Goezia sp. Di Paolo et al., 1992 (S) (P) (*)

Anisakis Dujardin, 1845

Anisakis pegreffii Campana-Rouget & Biocca, 1955 (3) (, M)

Anisakis physeteris Baylis, 1923 (3) (, M) (*)

Anisakis simplex (Rudolphi, 1809) (3) (M)

Anisakis simplex A (3) (M) (*)

Anisakis simplex B (3) (P) (*)

Anisakis sp. Orecchia & Paggi, 1978 (3) (P) (*)

Contracaecum Railliet & Henry, 1912

Contracaecum microcephalum (Rudolphi, 1819) (N, S, Sa) (U)

Contracaecum rudolphii Hartwich, 1964 (N, S) (U) (*)

Contracaecum rudolphii A (S) (U) (*)

Contracaecum rudolphii B (S) (U) (*)

Hysterothylacium Ward & Magath, 1917

Hysterothylacium aduncum (Rudolphi, 1802) Derdoff & Overstreet, 1981 (3, 4) (P)

Hysterothylacium arnoglossi Lebre & Petter, 1983 (3) (P)

Hysterothylacium clavatum (Rudolphi, 1809) Derdoff & Overstreet, 1981 (4) (P)

Hysterothylacium cornutum (Stossich, 1904) Derdoff & Overstreet, 1981 (3, 4) (P)

Hysterothylacium corrugatum Deardoff & Overstreet, 1981 (3) (P)

Hysterothylacium fabri (Rudolphi, 1819) Derdoff & Overstreet, 1981 (3, 4) (P)

Hysterothylacium gadi (O.F. Müller, 1777) Derdoff & Overstreet, 1981 (3) (P)

Hysterothylacium increscens (Molin, 1858) Derdoff & Overstreet, 1981 (4) (P)

Hysterothylacium incurvum (Rudolphi, 1819) Derdoff & Overstreet, 1981 (3) (P)

Hysterothylacium rhacodes (Deardoff & Overstreet, 1979) Derdoff & Overstreet, 1981 (4) (P)

Hysterothylacium rigidum (Rudolphi, 1809) Derdoff & Overstreet, 1981 (3, 4) (P)

***Acanthocheilus* Molin, 1858**

Acanthocheilus bicuspis (Wedl, 1855) (3, 4, 5) (P)

Acanthocheilus quadridentatus Moli, 1858 (3, 4, 5) (P)

Acanthocheilus rotundatus Petter, Paradiznik, Radujkovic & Cassone, 1991 (3, 4) (P)

***Paranisakiopsis* Yamaguti, 1941**

Paranisakiopsis coelorhynchi Yamaguti, 1941 (3) (P)

***Paranisakis* Baylis, 1923**

Paranisakis monodi (Gendre, 1928) Hartwich, 1974 (3) (P)

***Pseudanisakis* (Layman & Borovkova, 1926)**

Pseudanisakis baylisi (Rudolphi, 1819) (3, 5) (P)

***Raphidascaris* Railliet & Henry, 1915**

Raphidascaris acus (Bloch, 1779) (3, 4) (P)

Raphidascaris mediteraneus Lèbre & Petter, 1983 (3) (P)

Note

Goezia sp.: Il reperto non identificato a livello di specie si riferisce ad adulti reperiti in *Anguilla anguilla* (Di Paolo et al., 1992).

Anisakis physeteris: Lo stadio larvale (L3) è stato identificato in cefalopodi e pesci marini mediante multilocus elettroforesi (Orecchia et al., 1986).

Anisakis simplex A: Si tratta di una specie gemella del complesso *Anisakis simplex* identificata allo stadio adulto in mammiferi marini e allo stadio larvale (L3) in pesci marini mediante elettroforesi multilocus (Nascetti et al., 1986).

Anisakis simplex B: Si tratta di una specie gemella del complesso *Anisakis simplex* identificata allo stadio larvale (L3) in *Scomber scombrus* mediante elettroforesi multilocus (Nascetti et al., 1986).

Anisakis sp.: Il reperto si riferisce a larve (L3) in pesci marini.

Contracaecum rudolphii: La specie *rudolphii* comprende in parte la specie *C. spiculigerum* Rudolphi, 1809, segnalata in Italia.

Contracaecum rudolphii A: Si tratta di una specie gemella del complesso *Contracaecum rudolphii* identificata allo stadio adulto in uccelli ittiofagi e allo stadio larvale (L3) in pesci marini mediante elettroforesi multilocus (D'Amelio et al., 1990).

Contracaecum rudolphii B: Si tratta di una specie gemella del complesso *Contracaecum rudolphii* identificata allo stadio adulto in uccelli ittiofagi mediante elettroforesi multilocus (D'Amelio et al., 1990).

Ascarididae

Parascaris Yorke & Maplestone, 1926

Parascaris equorum (Goeze, 1782) (N, S, Sa) (, M)

Ascaris Linnaeus, 1758

Ascaris lumbricoides Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa) (, M)

Ascaris suum Goeze, 1782 (N, S, Sa) (, M)

Baylisascaris Sprent, 1968

Baylisascaris transfuga (Rudolphi, 1819) (S) (, M)

Baylisascaris laevis (Leidy, 1856) (N) (, M)

Toxascaris Leiper, 1907

Toxascaris leonina (von Linstow, 1902) (N, S, Si, Sa) (, M)

Toxocara Stiles, 1905

Toxocara canis (Werner, 1782) (N, S, Si, Sa) (, M)

Toxocara cati (Schrank, 1788) (N, S) (, M)

Toxocara vitulorum (Goeze, 1782) (S, Sa) (, M)

Porracaecum Railliet & Henry, 1912

Porracaecum angusticollae Molin, 1860 (N) (U)

Porracaecum ardeae (Fröhlich, 1802) (N, Sa) (U)

Porracaecum depressum (Zeder, 1800) (N, Sa) (U)

Porracaecum ensicaudatum (Zeder, 1800) (N, S, Sa) (U)

Porracaecum semiteres (Zeder, 1800) (N) (U)

Porracaecum spiralis (Rudolphi, 1792) (N, S) (R)

Porracaecum sulcatum (Rudolphi, 1819) (3, 4, 5) (R)

Angusticaecum Baylis, 1920

Angusticaecum holopterum (Rudolphi, 1819) (N, S) (R)

Subuluridae

Allodapa Diesing, 1861

Allodapa sp. (Sa) (U)

Subulura Molin, 1860

Subulura differens (Sonsino, 1890) (S) (U)

Camallanidae

Camallanus Railliet & Henry, 1915

Camallanus lacustris (Zoega, 1776) (N) (P)

Camallanus microcephalus (Dujardin, 1845) (R)

Camallanus papillifer (Molin, 1858) (N) (P)

Oncophora Diesing, 1851

Oncophora melanocephala (Rudolphi, 1819) Laurencin, 1970 (3) (P)

Anguillicolidae

Anguillicola Yamaguti, 1935

Anguillicola crassus Kuwahara, Niimi & Itagaki, 1974 (N, S, Si, Sa) (P)

Anguillicola novaezealandiae Moravec & Taraschewski, 1988 (S) (P)

Diectophymatidae

Diectophyme Collet-Meygret, 1802

Diectophyme renale (Goeze, 1782) (N, S) (, M)

Hystrichis Dujardin, 1845

Hystrichis coronatus Molin, 1858 (N) (U)

Hystrichis neglectus Jägerskiöld, 1909 (N) (U)

Hystrichis pachycephalus Molin, 1861 (N) (U)

Hystrichis tricolor Dujardin, 1845 (N) (U)

Hystrichis varispinosus Jägerskiöld, 1909 (N) (U)

Eustrongylides Jägerskiöld, 1909

Eustrongylides tubifex (Nitzsch in Rudolphi, 1819) (N, Sa) (U)

Spirurida

Dracunculidae

Dracunculus Reichard, 1759

Dracunculus medinensis (Linnaeus, 1758) (N, S) (M)

Philometridae

Molnaria Moravec, 1968

Molnaria intestinalis (Dogiel & Bychovsky, 1934) (N) (P) (*)

Philometra O.G. Costa, 1845

Philometra congerivulgaris (Molin, 1859) (3, 4) (P)

Philometra filiformis (Stossich, 1896) (3, 4) (P)

Philometra fusca (Rudolphi, 1819) (3, 4) (P)

Philometra globiceps (Rudolphi, 1819) (3) (P)

Philometra rischta Skrjabin, 1923 (N) (P) (*)

Note

Molnaria intestinalis: La specie segnalata da Boni et al. (1990) come *P. erytrophthalmi* è considerata sinonimo di *P. intestinalis* da Moravec (1994).

Philometra rischta: La specie segnalata da Boni et al. (1989) come *Thwaitia rischta* è riferita a *Philometra rischta* da Moravec (1994).

Gnathostomatidae

Spiroxys Schneider, 1866

Spiroxys contortus (Rudolphi, 1819) (N, S) (U)

Echinocephalus Molin, 1858

Echinocephalus uncinatus Molin, 1858 (3, 4) (P)

Gnathostoma Owen, 1836

Gnathostoma hispidum Fedtschenko, 1872 (N) (, M)

Gnathostoma spinigerum Owen, 1836 (N) (, M)

Gnathostoma turgidum Stossich, 1902 (N) (, M)

Physalopteridae

Proleptus Dujardin, 1845

- Proleptus acutus* Dujardin, 1845 (3, 4) (P)
- Proleptus obtusus* Dujardin, 1845 (3) (P)
- Proleptus rajae* Diesing, 1851 (4) (P)
- Proleptus robustus* (Beneden, 1871) (3, 4) (P)

Abbreviata Travassos, 1920

- Abbreviata abbreviata* (Rudolphi, 1819) (N) (R)

Physaloptera Rudolphi, 1819

- Physaloptera alata* Rudolphi, 1819
- Physaloptera alata alata* Rudolphi, 1819 (Sa) (U)
- Physaloptera clausa* Rudolphi, 1819
- Physaloptera clausa clausa* Rudolphi, 1819 (N) (U)
- Physaloptera sibirica* Petrow & Gorbunow, 1931 (N) (, M)

Rictulariidae

Rictularia Froelich, 1802

- Rictularia* sp. (S, Sa) (, M)

Pterygodermatites (Multipectines) Quentin, 1969

- Pterygodermatites (Multipectines) affinis* (Jägerskiöld, 1904) (N) (, M)

Thelaziidae

Thelazia Bosc, 1819

- Thelazia callipaeda* Railliet & Henry, 1910 (N) (, M)
- Thelazia lacrymalis* Gurlt, 1831 (N) (, M)
- Thelazia rhodesii* Desmarest, 1822 (S, Si) (, M)

Gongylonematidae

Gongylonema Molin, 1857

- Gongylonema pulchrum* Molin, 1857 (N, S, Sa) (, M)

Spiruridae

Spirura Blanchard, 1849

Spirura rytipleurites (Deslongchamps, 1824) (S) (, M)

Spirura talpae (Gmelin, 1790) (N) (, M)

Protopirura Seurat, 1914

Protopirura muris (Gmelin, 1790) (S) (, M)

Spirocercidae

Spirocerca Railliet & Henry, 1917

Spirocerca lupi (Rudolphi, 1809) (N, S, Si, Sa) (, M)

Ascarops van Beneden, 1873

Ascarops strongylina (Rudolphi, 1819) (N, S, Sa) (, M)

Simondsia Cobbold, 1864

Simondsia paradoxa Cobbold, 1864 (S, Sa) (, M)

Physocephalus Diesing, 1861

Physocephalus sexalatus (Molin, 1860) (N, S, Sa) (, M)

Mastophorus Diesing, 1853

Mastophorus muris (Gmelin, 1790) (S) (, M)

Habronematidae

Draschia Chitwood & Wehr, 1934

Draschia megastoma (Rudolphi, 1819) (N, S) (, M)

Cyrnea Seurat, 1914

Cyrnea eurycerca Seurat, 1914 (S) (U)

Cyrnea mansioni Seurat, 1914 (Sa) (U)

Habronema Diesing, 1861

Habronema microstoma Schneider, 1866 (N, S) (, M)
Habronema muscae Carter, 1861 (S) (, M)
Habronema leptoptera (Rudolphi, 1819) (S) (U)

Hedruridae

Hedruris Nitzsch, 1812

Hedruris androphora Nitzsch, 1821 (N, S) (R)

Tetrameridae

Tetrameres Creplin, 1846

Tetrameres fissispina Diesing, 1861 (S) (U)
Tetrameres gynaecophila Molin, 1858 (N) (U)

Crassicauda Leiper & Atkinson, 1914

Crassicauda sp. (3, 4) (, M)

Drilonematidae

Drilonema Pierantoni, 1916

Drilonema acuminatum (Pierantoni, 1916) (L) (*)

Note

Drilonema acuminatum: Distribuzione in Italia da precisare.

Cystidicolidae

Spinitectus Fourment, 1883

Spinitectus oviflagellis Fourment, 1884 (3) (P)

Pseudoproleptus Khera, 1953

Pseudoproleptus sp. Orecchia & Paggi, 1978 (3) (P) (*)

Ascarophis van Beneden, 1853

Ascarophis mullus Naidenova & Nikolaeva, 1868 (3) (P)

Ascarophis sp. Orecchia & Paggi, 1978 (3) (P) (*)

Note

Pseudoproleptus sp.: Il reperto non identificato a livello di specie è stato segnalato da Orecchia & Paggi (1978) in *Gadiculus argenteus*, *Molva elongata*, *Phycis blennoides*, *Coelorhynchus coelorhynchus* e *Hymenocephalus italicus*.

Ascarophis sp.: Il reperto non identificato a livello di specie è stato segnalato da Orecchia & Paggi (1978) come *Ascarophis* sp. in *Coelorhynchus coelorhynchus*.

Acuariidae

Acuaria Bremser, 1811

Acuaria anthuris Rudolphi, 1819 (N, S) (U)

Acuaria attenuata Rudolphi, 1819 (N) (U)

Acuaria hamulosa Diesing, 1851 (N) (U)

Syncuaria Gilbert, 1927

Syncuaria contorta (Molin, 1858) (N) (U)

Chordocephalus Alegret, 1941

Chordocephalus squamata (Linstow, 1883) (N) (U)

Synhimantus Railliet, Henry & Sisoff, 1912

Synhimantus elliptica (Molin, 1858) (N) (U)

Synhimantus laticeps (Rudolphi, 1819) (N, S) (U)

Cosmocephalus Molin, 1858

Cosmocephalus aduncus (Creplin, 1846) (N, S, Sa) (U)

Cosmocephalus obvelatus (Creplin, 1825) (N, Sa) (U)

Streptocara Railliet, Henry & Sisoff, 1912

Streptocara formosensis Sugimoto, 1930 (N) (U)

Dispharynx Railliet, Henry & Sisoff, 1912

Dispharynx nasuta (Rudolphi, 1819) (N, S, Sa) (, M)

Filariidae

Filaria O.F. Müller, 1787

Filaria martis Gmelin, 1790 (N) (, M)

Parafilaria Yorke & Maplestone, 1926

Parafilaria multipapillosa (Condamine & Drouilly, 1878) (N) (, M)

Onchocercidae

Setaria Viborg, 1795

Setaria digitata Linstow, 1906 (N) (, M)

Setaria equina (Abildgaard, 1789) (N, S, Si) (, M)

Setaria labiatopapillosa Alessandrini, 1848 (N) (, M)

Dirofilaria Railliet & Henry, 1910

Dirofilaria immitis (Leidy, 1856) (N, S, Si, Sa) (, M)

Dirofilaria repens Railliet & Henry, 1911 (N, S, Si, Sa) (, M)

Litomosa Yorke & Maplestone, 1926

Litomosa filaria Yorke & Maplestone, 1926 (S) (, M)

Litomosa ottaviani Lagrange & Bettini, 1948 (S) (, M)

Dipetalonema Cobbold, 1870

Dipetalonema dracunculoides Cobbold, 1870 (S) (, M)

Dipetalonema gracile (Rudolphi, 1809) (S) (, M)

Dipetalonema grassi Noè, 1907 (S) (, M)

Dipetalonema reconditum Grassi, 1889 (S, Si, Sa) (, M)

Onchocerca Diesing, 1841

Onchocerca cervicalis Railliet & Henry, 1910 (N) (, M)

Onchocerca reticulata Diesing, 1841 (N, S) (, M)

Onchocerca volvulus Leuckart, 1893 (, M) (*)

Micipsella Seurat, 1917

Micipsella numidica Seurat, 1917 (N) (, M)

Note

Onchocerca volvulus: Per l'Italia, conosciuto solo come parassita di mammiferi importati.

Aproctidae

Aprocta Linstow, 1883

Aprocta matronensis Railliet & Henry, 1910 (N) (U)

Aprocta turgida Stossich, 1902 (N) (U)

Squamofilaria Schmerling, 1925

Squamofilaria coronata (Rudolphi, 1809) (N) (U)

Diplotriaenidae

Diplotriaena Railliet & Henry, 1909

Diplotriaena obtusa (Rudolphi, 1802) (N) (U)

Diplotriaena tricuspis (Fedtschenko, 1874) (N, S) (U)

Dicheilonema Diesing, 1861

Dicheilonema ciconiae (Gmelin, 1791) (N, S) (U)

Hamatospiculum Skrjabin, 1916

Hamatospiculum cylindrica (Zeder, 1803) (N, Sa) (U)

Hamatospiculum quadridens (Molin, 1858) (N) (U)

Serratospiculum Skrjabin, 1915

Serratospiculum tendo (Nitzsch, 1857) (N) (U)

Diplogasterida

Cylindrocorporidae

Cylindrocorpus Goodey, 1939

Cylindrocorpus longistoma (Stefanski, 1922) (N)

Odontopharyngidae

Odontopharynx de Man, 1912

Odontopharynx longicaudata de Man, 1912 (3)

Diplogasteroididae

Goffartia Hirschmann, 1952

Goffartia heteroceri Hirschmann, 1952 (N, S)

Goffartia variabilis (Micoletzky, 1922) (N, S, Si)

Rhabdontolaimus Fuchs, 1931

Rhabdontolaimus longispiculus (Meyl, 1954) (S)

Rhabdontolaimus stigmatus (Steiner, 1930) (N, S)

Diplogasteridae

Butlerius Goodey, 1929

Butlerius demani (Schneider, 1923) (N)

Butlerius micans Pillai & Taylor, 1968 (N, S)

Demaniella Steiner, 1914

Demaniella cibourgensis Steiner, 1914 (S)

Diplogaster Schultze in Carus, 1857

Diplogaster rivalis (Leydig, 1854) (N, S, Si)

Diplogasteritus Paramonov, 1952

Diplogasteritus nudicapitatus (Steiner, 1914) (N, S, Si, Sa)

Diplogasteritus superbus (Paesler, 1946) (S)

Diplogastrellus Paramonov, 1952

Diplogastrellus gracilis (Bütschli, 1876) (S)

Diplogastrellus monhysteroides (Bütschli, 1874) (S)

Diplogastrellus stammeri (Weingärtner in Meyl, 1954) (S)

Metadiplogaster Meyl, 1961

Metadiplogaster inaequidens (Paesler, 1946) (S)

Paroigolaimella Paramonov, 1952

Paroigolaimella bernensis (Steiner, 1914) (N, S, Si, Sa)

Paroigolaimella coprophaga (de Man, 1876) (S)

Paroigolaimella paraspirifera Zullini & Loof, 1980 (S)

Neodiplogasteridae

Fictor Paramonov, 1952

Fictor vorax (Goodey, 1929) (S)

Koerneria Meyl, 1961

Koerneria fictor (Bastian, 1865) (N, S, Sa)

Mononchoides Rahm, 1928

Mononchoides isolae (Meyl, 1953) (S)

Mononchoides pulcher Zullini, 1981 (N)

Mononchoides ruffoi Zullini, 1981 (N)

Mononchoides striatus (Bütschli, 1876) (S)

Oigolaimella Paramonov, 1952

Oigolaimella agilis (Skwarra, 1921) (N)

Oigolaimella carinata Zullini, 1981 (N, S)

Pristionchus Kreis, 1932

Pristionchus Iheritieri (Maupas, 1919) (*)

Pristionchus maupasi (Potts, 1910) (N)

Note

Pristionchus Iheritieri: Citato da località italiana non precisata.

Tylopharyngidae

Tylopharynx de Man, 1876

Tylopharynx foetida (Bütschli, 1874) (N)

Tylenchida

Tylenchidae

Tylenchus Bastian, 1865

Tylenchus arcuatus Siddiqi, 1963 (N)
Tylenchus davainei Bastian, 1865 (N, S, Si, Sa)
Tylenchus elegans de Man, 1876 (N)

Filenchus Andrassy, 1954

Filenchus andrassyi (Szczygiel, 1969) (Si)
Filenchus cynodontus (Husain & Khan, 1967) (Si)
Filenchus filiformis (Bütschli, 1873) (N, S, Sa)
Filenchus orbus Andrassy, 1954 (N)
Filenchus thornei (Andrassy, 1954) (N, Si)

Malenchus Andrassy, 1968

Malenchus bryophilus (Steiner, 1914) (S)
Malenchus exiguus (Massey, 1969) (Si)
Malenchus fusiformis (Thorne & Malek, 1968) (Si)
Malenchus pachycephalus Andrassy, 1981 (N)

Lelenchus Andrassy, 1954

Lelenchus leptosoma (de Man, 1880) (N)
Lelenchus minutus (Cobb, 1893) (N)

Aglenchus Andrassy, 1954

Aglenchus agricola (de Man, 1884) (N, S)

Coslenchus Siddiqi, 1978

Coslenchus costatus (de Man, 1921) (N)
Coslenchus pycnocephalus Siddiqi, 1981 (N)
Coslenchus turkeyensis Siddiqi, 1981 (S)

Psilenchus de Man, 1921

Psilenchus hilarulus de Man, 1921 (S)
Psilenchus vinciguerrae Brzeski, 1991 (Si)

Boleodorus Thorne, 1941

Boleodorus thylactus Thorne, 1941 (Si)

Basiria Siddiqi, 1959

Basiria flandriensis Geraert, 1968 (N)

Basiria graminophila Siddiqi, 1959 (N)

Anguinidae

Anguina Scopoli, 1777

Anguina agrostis (Steinbuch, 1799) (*)

Anguina graminis (Hardy, 1850) (S)

Anguina tritici (Steinbuch, 1799) (*)

Ditylenchus Filipjev, 1936

Ditylenchus acris (Thorne, 1941) (S)

Ditylenchus dauniae Brzeski & Marinari, 1991 (S)

Ditylenchus destructor Thorne, 1945 (S)

Ditylenchus dipsaci (Kühn, 1857) (N, S, Si)

Ditylenchus intermedius (de Man, 1880) (S, Sa)

Ditylenchus myceliophagus Goodey, 1958 (S)

Sychnotylenchus Rühm, 1956

Sychnotylenchus rarus (Meyl, 1954) (S)

Subanguina Paramonov, 1968

Subanguina askenasyi (Bütschli, 1873) (S)

Note

Anguina agrostis: Citato da località italiana non precisata.

Anguina tritici: Citato da località italiana non precisata.

Dolichodoridae

Neodolichodorus Andrassy, 1976

Neodolichodorus cassati (Luc & Dalmasso, 1971) (N)

Belonolaimidae

Tylenchorhynchus Cobb, 1913

Tylenchorhynchus acti Hopper, 1959 (N)
Tylenchorhynchus aduncus De Guiran, 1967 (S)
Tylenchorhynchus capitatus Allen, 1955 (N)
Tylenchorhynchus clarus Allen, 1955 (S)
Tylenchorhynchus claytoni Steiner, 1937 (N)
Tylenchorhynchus dubius (Bütschli, 1873) (N, S)
Tylenchorhynchus ewingi Hopper, 1959 (S)
Tylenchorhynchus goffarti Sturhan, 1966 (S)
Tylenchorhynchus huesingi Paetzold, 1958 (S)
Tylenchorhynchus latus Allen, 1955 (S)
Tylenchorhynchus maximus Allen, 1955 (S)
Tylenchorhynchus parvus Allen, 1955 (N, S)
Tylenchorhynchus striatus Allen, 1955 (S)
Tylenchorhynchus ventralis (Loof, 1963) (N)

Trophurus Loof, 1957

Trophurus scognamiglii Talamè, 1974 (S)

Nagelus Thorne & Malek, 1968

Nagelus leptus (Allen, 1955) (N)
Nagelus obscurus (Allen, 1955) (S)

Geocenamus Thorne & Malek, 1968

Geocenamus brevidens (Allen, 1955) (S)
Geocenamus microdorus (Geraert, 1966) (S)
Geocenamus nanus (Allen, 1955) (S)
Geocenamus paniculus Vovlas & Esser, 1990 (N)
Geocenamus quadrifer (Andrassy, 1954) (N)

Amplimerlinius Siddiqi, 1976

Amplimerlinius icarus (Wallace & Greet, 1964) (Si)

Pratylenchidae

Pratylenchus Filipjev, 1936

Pratylenchus bicaudatus (Meyl, 1954) (S)
Pratylenchus brachyurus (Godfrey, 1929) (S)
Pratylenchus coffeae (Zimmermann, 1898) (N)
Pratylenchus crenatus Loof, 1960 (S)
Pratylenchus fallax Seinhorst, 1968 (S)
Pratylenchus neglectus (Rensch, 1924) (N, S, Sa)
Pratylenchus penetrans (Cobb, 1917) (N, S)

Pratylenchus pratensis (de Man, 1880) (S)
Pratylenchus scribneri Steiner, 1943 (N, S)
Pratylenchus thornei Sher & Allen, 1953 (N, S)
Pratylenchus vulnus Allen & Jensen, 1951 (N, S)

Radopholus Thorne, 1949

Radopholus similis (Cobb, 1893) (S)

Pratylenchoides Winslow, 1958

Pratylenchoides crenicauda Winslow, 1958 (S)
Pratylenchoides laticauda Braun & Loof, 1967 (S)
Pratylenchoides ritteri Sher, 1970 (S)

Zygotylenchus Siddiqi, 1963

Zygotylenchus guevarai (Tobar Jiménez, 1963) (N, S)

Hirschmanniella Luc & Goodey, 1964

Hirschmanniella gracilis (de Man, 1880) (N)
Hirschmanniella loofi Sher, 1968 (S)

Hoplolaimidae

Rotylenchus Filipjev, 1936

Rotylenchus buxophilus Golden, 1956 (N)
Rotylenchus goodeyi Loof & Oostenbrink, 1958 (N)
Rotylenchus laurentinus Scognamiglio & Talamè, 1973 (S)
Rotylenchus pumilus (Perry, 1959) (N)
Rotylenchus quartus (Andrássy, 1958) (N)
Rotylenchus robustus (de Man, 1876) (N, S)

Helicotylenchus Steiner, 1945

Helicotylenchus digonicus Perry, 1959 (N, S, Si)
Helicotylenchus multicinctus (Cobb, 1893) (S)
Helicotylenchus neopaxilli Inserra, Vovlas & Golden, 1979 (S)
Helicotylenchus oleae Inserra, Vovlas & Golden, 1979 (S)
Helicotylenchus pseudorobustus (Steiner, 1914) (N, S)
Helicotylenchus sandersae Ali & Loof, 1975 (N)
Helicotylenchus varicaudatus Yuen, 1964 (S)
Helicotylenchus vulgaris Yuen, 1964 (N, S)

Pararotylenchus Baldwin & Bell, 1981

Pararotylenchus hopperi Baldwin & Bell, 1984 (N, S)

Rotylenchulus Linford & Oliveira, 1940

Rotylenchulus borealis Loof & Oostenbrink, 1962 (N)

Rotylenchulus macrodoratus Dasgupta, Raski & Sher, 1968 (N, S)

Heteroderidae

Heterodera Schmidt, 1871

Heterodera avenae Wollenweber, 1924 (N, S)

Heterodera carotae Jones, 1950 (N, S, Si)

Heterodera cruciferae Franklin, 1945 (S)

Heterodera daverti Wouts & Sturhan, 1979 (S)

Heterodera fici Kirjanova, 1954 (N, S)

Heterodera goettingiana Liebscher, 1892 (N, S, Si, Sa)

Heterodera hordecalis Andersson, 1975 (N, S)

Heterodera latipons Franklin, 1969 (N, S, Sa)

Heterodera mediterranea Vovlas, Inserra & Stone, 1981 (S, Sa)

Heterodera schachtii Schmidt, 1871 (N, S)

Heterodera trifolii Goffart, 1932 (N, S)

Globodera Skarbilovich, 1959

Globodera pallida Stone, 1973 (N, S)

Globodera rostochiensis (Wollenweber, 1923) (N, S)

Cactodera Krall & Krall, 1978

Cactodera cacti (Filipjev & Stekhoven, 1941) (S)

Meloidogyne Goeldi, 1892

Meloidogyne arenaria (Neal, 1889) (N, S, Si)

Meloidogyne artiellia Franklin, 1961 (N, S)

Meloidogyne bauruensis Lordello, 1956 (S)

Meloidogyne exigua Goeldi, 1892 (S)

Meloidogyne hapla Chitwood, 1949 (N, S, Si, Sa)

Meloidogyne incognita (Kofoid & White, 1919) (N, S, Si)

Meloidogyne javanica (Treub, 1885) (N, S, Si)

Meloidogyne kikuyensis De Grisse, 1961 (S)

Meloidogyne naasi Franklin, 1965 (S)

Meloidogyne thamesi Chitwood, 1952 (N, S)

Criconematidae

Criconema Hofmänner & Menzel, 1914

- Criconema annuliferum* (de Man, 1921) (N, S)
- Criconema demani* Micoletzky, 1925 (N)
- Criconema loofi* (De Grisse, 1967) (N, S)
- Criconema mutabile* (Taylor, 1936) (S)

Ogma Southern, 1914

- Ogma menzeli* (Stefanski, 1924) (N)
- Ogma octangulare* (Cobb, 1914) (S)
- Ogma palmatum* (Siddiqi & Southey, 1962) (N)
- Ogma rhombosquamatum* (Mehta & Raski, 1971) (S)

Hemicriconemoides Chitwood & Birchfield, 1957

- Hemicriconemoides brachyurus* Loos, 1949 (S)
- Hemicriconemoides gaddi* (Loos, 1949) (N, S)

Bakernema Wu, 1964

- Bakernema dauniense* Vovlas, 1992 (S)

Criconemella De Grisse & Loof, 1965

- Criconemella amorpha* (De Grisse, 1967) (S)
- Criconemella antipolitana* (De Guiran, 1963) (N, S)
- Criconemella crenata* (Loof, 1964) (N)
- Criconemella curvata* (Raski, 1952) (N)
- Criconemella dherdei* (De Grisse, 1967) (N)
- Criconemella eroshenkoi* (Siddiqi, 1986) (N, S)
- Criconemella informis* (Micoletzky, 1922) (N, S)
- Criconemella irregularis* (De Grisse, 1964) (N)
- Criconemella macrodora* (Taylor, 1936) (S)
- Criconemella microdora* (De Grisse, 1964) (*)
- Criconemella mongolensis* (Andrassy, 1962) (S)
- Criconemella mongomorgum* (Darekar & Khan, 1979) (S)
- Criconemella parva* (Raski, 1952) (N, S)
- Criconemella pseudosolivaga* (De Grisse, 1964) (N)
- Criconemella raskiensis* (De Grisse, 1964) (N)
- Criconemella rusium* (Khan, Chawla & Saha, 1976) (S)
- Criconemella sricula* (Vovlas, 1982) (Si)
- Criconemella solivaga* (Andrassy, 1962) (S)
- Criconemella sphaerocephala* (Taylor, 1936) (S)
- Criconemella xenoplax* (Raski, 1952) (N, S)

Criconemella yossifovichi (Krnjaic, 1967) (N)

Hemicycliophora de Man, 1921

Hemicycliophora conida Thorne, 1955 (N)

Hemicycliophora epicharoides Loof, 1968 (S, Si)

Hemicycliophora italiae Brzeski & Ivanova, 1978 (S)

Hemicycliophora thienemanni (Schneider, 1925) (N)

Hemicycliophora typica de Man, 1921 (N)

Note

Criconemella microdora: Citato da località italiana non precisata.

Tylenchulidae

Tylenchulus Cobb, 1913

Tylenchulus semipenetrans Cobb, 1913 (N, S, Si, Sa)

Paratylenchus Micoletzky, 1922

Paratylenchus baldaccii Raski, 1975 (S, Si)

Paratylenchus ciccaronei Raski, 1975 (N)

Paratylenchus curvatus van der Linde, 1938 (N, S) (*)

Paratylenchus dianthus Jenkins & Taylor, 1956 (N, S)

Paratylenchus italiensis Raski, 1975 (Si)

Paratylenchus microdorus Andrásy, 1959 (N, Si)

Paratylenchus nainianus Edward & Mistra, 1963 (N, Si)

Paratylenchus nanus Cobb, 1923 (S)

Paratylenchus neoamblycephalus Geraert, 1965 (S)

Paratylenchus projectus Jenkins, 1956 (S)

Paratylenchus vandenbrandei De Gisse, 1962 (S, Si)

Gracilacus Raski, 1962

Gracilacus goodeyi (Oostenbrink, 1953) (S)

Gracilacus idalimus Raski, 1962 (S)

Gracilacus peraticus Raski, 1962 (N, S, Si)

Gracilacus steineri (Golden, 1961) (N)

Gracilacus straeleni (De Coninck, 1931) (N)

Note

Paratylenchus curvatus: Species inquirenda.

Neotylenchidae

Deladenus Thorne, 1941

Deladenus durus (Cobb, 1922) (Si)

Aphelenchidae

Aphelenchus Bastian, 1865

Aphelenchus avenae Bastian, 1865 (N, S, Sa)

Aphelenchoididae

Aphelenchoides Fischer, 1894

Aphelenchoides besseyi Christie, 1942 (N, S)

Aphelenchoides blastophthorus Franklin, 1952 (S)

Aphelenchoides composticola Franklin, 1957 (N, Si)

Aphelenchoides cyrtus Paesler, 1957 (Si)

Aphelenchoides ferrandini Meyl, 1954 (S)

Aphelenchoides fragariae (Ritzema-Bos, 1890) (N, S)

Aphelenchoides hamatus Thorne & Malek, 1968 (S)

Aphelenchoides helophilus (de Man, 1880) (N)

Aphelenchoides parietinus (Bastian, 1865) (N, S, Si)

Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz, 1911) (N, S)

Aphelenchoides rutgersi Hooper & Myers, 1971 (S)

Aphelenchoides saprophilus Franklin, 1957 (N)

Aprutides Scognamiglio, Talamè & s'Jacob, 1970

Aprutides guidettii Scognamiglio, 1974 (S)

Aprutides martuccii Scognamiglio, Talamè & s'Jacob, 1970 (S)

Bursaphelenchus Fuchs, 1937

Bursaphelenchus mucronatus Mamiya & Enda, 1979 (N)

Laimaphelenchus Fuchs, 1937

Laimaphelenchus penardi (Steiner, 1914) (N)

Seinura Fuchs, 1931

Seinura tenuicaudata (de Man, 1885) (S)

Schistonchus Cobb, 1927

Schistonchus caprifici (Gasperrini, 1864) (S)

Sheraphelenchus Nickle, 1970

Sheraphelenchus entomophagus Nickle, 1970 (Si)

Sphaerulariidae

Sphaerularia Dufour, 1837

Sphaerularia bombi Dufour, 1837 (I) (*)

Note

Sphaerularia bombi: Distribuzione in Italia da precisare.

Nematomorpha

Nectonematoida

Nectonematidae

Nectonema Verrill, 1879

Nectonema agile Verrill, 1879 (3)

Gordioida

Gordiidae

Gordius Linnaeus, 1766

Gordius affinis Villot, 1885 (N)

Gordius aquaticus Linnaeus, 1766 (N, S, Sa)

Gordius hispidus Linstow, 1906 (N)

Gordius nonmaculatus Heinze, 1937 (N)

Gordius panighettensis Sciacchitano, 1955 (N)

Gordius parisii Sciacchitano, 1932 (N)

Gordius perronciti Camerano, 1887 (N)

Gordius pioltii Camerano, 1886 (N)

Gordius setiger Schneider, 1866 (N, S)
Gordius stellatus Linstow, 1906 (N)
Gordius valgannensis Sciacchitano, 1932 (N)
Gordius villoti Rosa, 1882 (N, S, Sa)

Chordodidae

Parachordodes Camerano, 1897

Parachordodes gemmatus (Villot, 1886) (S)
Parachordodes pustulosus (Baird, 1853) (N, Sa)
Parachordodes tolosanus (Dujardin, 1842) (N, S, Sa)

Gordionus G.W. Müller, 1927

Gordionus alpestris (Villot, 1884) (N)
Gordionus preslii (Veidovski, 1886) (N)
Gordionus violaceus (Baird, 1853) (S)
Gordionus wolterstorffi (Camerano, 1888) (N, S)

Paragordius Camerano, 1897

Paragordius tricuspidatus (Dufour, 1828) (N, Si)
Paragordius stylosus (Linstow, 1883) (N, S)

Neochordodes Camerano, 1897

Neochordodes tellini (Camerano, 1888) (N)

Acanthocephala

Oligacanthorhynchidae

Macracanthorhynchus Travassos, 1917

Macracanthorhynchus hirudinaceus (Pallas, 1781) (Sa) (M)

Nephridiorhynchus Meyer, 1931

Nephridiorhynchus major (Bremser, 1811) (Si) (M)

Arhythmacanthidae

Acanthocephaloides Meyer, 1932

Acanthocephaloides incrassatus (Molin, 1858) (N, S) (O)
Acanthocephaloides propinquus (Dujardin, 1845) (N, S) (O)
Acanthocephaloides soleae (Porta, 1905) (S) (O)

Breizacanthus Golvan, 1969

Breizacanthus ligur Paggi, Orecchia & Della Seta, 1975 (S) (O)

Euzetacanthus Golvan & Houin, 1964

Euzetacanthus simplex (Rudolphi, 1810) (S) (O)

Paracanthocephaloides Golvan, 1969

Paracanthocephaloides soleae (Porta, 1905) (S) (O)

Echinorhynchidae

Acanthocephalus Koelreuther, 1771

Acanthocephalus anguillae (O.F. Müller, 1780) (N) (O)
Acanthocephalus clavula (Dujardin, 1845) (N) (O)
Acanthocephalus curtus (Achmerov & Dombrowskja-Achmerova, 1941) (S) (O)
Acanthocephalus lucii (O.F. Müller, 1776) (N) (O)
Acanthocephalus paronai (Condorelli, 1897) (S) (O)

Illiosentidae

Telosentis Van Cleave, 1923

Telosentis exiguus (Von Linstow, 1901) (N, S) (O)
Telosentis molini Van Cleave, 1923 (N, S) (O)

Pomphorhynchidae

Pomphorhynchus Monticelli, 1905

Pomphorhynchus laevis (O.F. Müller, 1776) (N, S) (O)

Rhadinorhynchidae

Golvanacanthus Paggi & Orecchia, 1972

Golvanacanthus blennii Paggi & Orecchia, 1972 (S) (O)

Leptorhynchoides Kostylev, 1924

Leptorhynchoides plagicephalus (Westrumb, 1821) (N) (O)

Rhadinorhynchus Lühe, 1911

Rhadinorhynchus lintoni Cable & Linderöth, 1963 (S) (O)

Serrasentis Van Cleave, 1923

Serrasentis sagittifer (Linton, 1889) (S) (O)

Centrorhynchidae

Centrorhynchus Lühe, 1911

Centrorhynchus globocaudatus (Zeder, 1800) (S) (U)

Centrorhynchus lancea (Westrumb, 1821) (S) (U)

Centrorhynchus lesiniformis (Molin, 1859) (S) (A)

Centrorhynchus ninnii (Stossich, 1891) (S) (M)

Centrorhynchus teres (Westrumb, 1821) (S) (U)

Neoechinorhynchidae

Neoechinorhynchus Stiles & Hassall, 1905

Neoechinorhynchus agilis (Rudolphi, 1819) (S) (O)

Neoechinorhynchus rutili (O.F. Müller, 1780) (N) (O)

Kinorhyncha

Cyclorhagida

Echinoderidae

Echinoderes Claparède, 1863

Echinoderes capitatus (Zelinka, 1928) (3, 4)

Echinoderes citrinus Zelinka, 1928 (3)

Echinoderes druxi d'Hondt, 1973 (5)

Echinoderes dujardinii Claparède, 1863 (3, 4, 5)

Echinoderes ferrugineus Zelinka, 1928 (4)
Echinoderes gerardi Higgins, 1978 (5) (*)
Echinoderes riedli Higgins, 1966 (5) (*)
Echinoderes setiger Greeff, 1869 (4)
Echinoderes subfuscus Zelinka, 1928 (4)

Note

Echinoderes gerardi: Sono stati rinvenuti lungo le coste della Tunisia. Sono inoltre segnalati da Marcotte e Coull (1974) nella Baia di Piran (Yugoslavia) un *Pycnophyes* sp., un *Kinorhynchus* sp. (classificato come *Trachydemus* sp.) e un *Neocentrophyes* sp.
Echinoderes riedli: Sono stati rinvenuti lungo le coste della Tunisia. Sono inoltre segnalati da Marcotte e Coull (1974) nella Baia di Piran (Yugoslavia) un *Pycnophyes* sp., un *Kinorhynchus* sp. (classificato come *Trachydemus* sp.) e un *Neocentrophyes* sp.

Centroderidae

Centroderes Zelinka, 1907

Centroderes eisigi Zelinka, 1928 (3)
Centroderes spinosus (Reinhardt, 1881) (5)

Semnoderidae

Semnoderes Zelinka, 1907

Semnoderes armiger Zelinka, 1928 (4)

Homalorhagida

Pycnophyidae

Pycnophyes Zelinka, 1907

Pycnophyes carinatus Zelinka, 1928 (3, 4)
Pycnophyes communis Zelinka, 1928 (3, 4)
Pycnophyes echinoderoides Zelinka, 1928 (3)
Pycnophyes flagellatus Zelinka, 1928 (3)
Pycnophyes flaveolatus Zelinka, 1928 (3, 4)
Pycnophyes ponticus Zelinka, 1928 (3)
Pycnophyes quadridentatus Zelinka, 1928 (3)
Pycnophyes robustus Zelinka, 1928 (3, 4)
Pycnophyes rugosus Zelinka, 1928 (3)

Kinorhynchus Sheremetevskij, 1974

Kinorhynchus giganteus Zelinka, 1928 (3, 4)

Loricifera

Pliciloricidae

Pliciloricus

Pliciloricus sp. A (3) (*)

Pliciloricus sp. B (3) (*)

Rugiloricus

Rugiloricus sp. (3) (*)

Note

Pliciloricus sp. A: Specie nuova per la scienza.

Pliciloricus sp. B: Specie nuova per la scienza.

Rugiloricus sp.: Specie nuova per la scienza.

Loricifera i.s.

Genere indeterminato

Genere indeterminato sp. (3) (*)

Note

Genere indeterminato sp.: Genere e specie nuovi per la scienza.

Priapulida

Priapulida

Priapulida

Priapulidae

Priapul Lamarck, 1816

Priapulus caudatus Lamarck, 1816 (*)

Priapulopsis Salvini-Plawen, 1973

Priapulopsis cnidephorus Salvini-Plawen, 1973 (4)

Note

Priapulus caudatus: Specie mai segnalata per le acque italiane. È stata trovata a Banuyls da Guille & Laubier (1965) e poi non più raccolta.

Seticoronaria

Maccabeidae

Maccabeus Por, 1973

Maccabeus tentaculatus Pro, 1973 (4, 5)

Kamptozoa

Loxosomatidae

Loxocalyx Mortensen, 1911

Loxocalyx cochlear (O. Schmidt, 1876) (3) (E)

Loxocalyx leptoclini (Harmer, 1885) (3)

Loxocalyx neapolitanus (Kowalesky, 1866) (3) (E)

Loxocalyx pes (O. Schmidt, 1878) (3) (E)

Loxocalyx raja (O. Schmidt, 1876) (3) (E)

Loxocalyx tethyae (Salensky, 1877) (3)

Loxosomella Mortensen, 1911

Loxosomella claviformis (Hincks, 1880) (3)

Loxosomella crassicauda (Salensky, 1877) (3)

Loxosomella globosa Bobin & Prenant, 1953 (3) (E)

Loxosomella kefersteinii (Claparède, 1867) (3, 4)

Pedicellinidae

Pedicellina M. Sars, 1835

Pedicellina cernua (Pallas, 1771)
 Pedicellina cernua cernua (Pallas, 1771) (3, 5)
 Pedicellina cernua echinata M. Sars, 1835 (3)
Pedicellina nutans Dalyell, 1848 (4)

Barentsia Hincks, 1880

Barentsia benedeni (Foettinger, 1887) (3, 4)
Barentsia gracilis (M. Sars, 1835) (3)
Barentsia macropus Ehlers, 1890 (3)
Barentsia stiria Jullien, 1903 (3)

Mollusca

Monoplacophora

Neopilinidae

Neopilina Lemche, 1957

Neopilina zografi (Dautzenberg & Fischer, 1896) (3)

Polyplacophora

Leptochitonidae

***Lepidopleurus* (*Lepidopleurus*)** Risso, 1826

Lepidopleurus (*Lepidopleurus*) *cajetanus* (Poli, 1791) (3, 4, 5)

***Lepidopleurus* (*Leptochiton*)** Gray, 1847

Lepidopleurus (*Leptochiton*) *algasirensis* (Capellini, 1859) (3, 5)
Lepidopleurus (*Leptochiton*) *boettgeri* Sulc, 1934 (3, 4, 5)
Lepidopleurus (*Leptochiton*) *cancellatus* (Sowerby, 1840) (3, 4, 5)
Lepidopleurus (*Leptochiton*) *cimicoides* (Monterosato, 1879) (3, 4, 5)
Lepidopleurus (*Leptochiton*) *geronensis* (Kaas & Van Belle, 1985) (3)
Lepidopleurus (*Leptochiton*) *scabridus* (Jeffreys, 1880) (3, 4, 5)

***Lepidopleurus* (*Parachiton*)** Thiele, 1909

Lepidopleurus (*Parachiton*) *africanus* Nierstrasz, 1906 (3, 5)

Hanleyidae

Hanleya Gray, 1857

Hanleya hanleyi (Bean in Thorpe, 1844) (3, 4, 5)

Bathychitonidae

Bathychiton Dell'Angelo & Palazzi, 1988

Bathychiton biondii Dell'Angelo & Palazzi, 1988 (3)

Ischnochitonidae

Ischnochiton Gray, 1847

Ischnochiton rissoi (Payraudeau, 1826) (3, 4, 5)

Ischnochiton vanbellei Kaas, 1985 (3)

Callistochiton Dall, 1879

Callistochiton pachylasmae (Monterosato, 1878) (3)

Callochiton Gray, 1847

Callochiton calcatus Dell'Angelo & Palazzi, 1994 (3, 5)

Callochiton septemvalvis (Montagu, 1803)

Callochiton septemvalvis euplaeae (O.G. Costa, 1829) (3, 4, 5)

Lepidochitona Gray, 1821

Lepidochitona caprearum (Scacchi, 1836) (3, 4, 5)

Lepidochitona cinerea (Linnaeus, 1767) (3, 4, 5)

Lepidochitona furtiva (Monterosato, 1879) (3, 5)

Lepidochitona monterosatoi Kaas & Van Belle, 1981 (3, 5)

Chitonidae

Chiton Linnaeus, 1758

Chiton corallinus (Risso, 1826) (3, 5)

Chiton olivaceus Spengler, 1797 (3, 4, 5)

Chiton phaseolinus Monterosato, 1879 (3, 5)

Acanthochitonidae

Acanthochitona Gray, 1821

Acanthochitona crinita (Pennant, 1777) (3, 5)

Acanthochitona fascicularis (Linnaeus, 1767) (3, 4, 5)

Caudofoveata

Limifossoridae

Scutopus Salvini-Plawen, 1968

Scutopus robustus Salvini-Plawen, 1970 (3)

Prochaetodermatidae

Prochaetoderma Thiele, 1902

Prochaetoderma raduliferum (Kowalevsky, 1901) (3, 4, 5)

Chaetodermatidae

Falcidens Salvini-Plawen, 1968

Falcidens aequabilis Salvini-Plawen, 1972 (3, 4)

Falcidens gutturosus (Kowalevsky, 1901) (3, 4, 5)

Solenogastres

Dondersiidae

Dondersia Hubrecht, 1888

Dondersia festiva Hubrecht, 1888 (3)

Nematomenia Simroth, 1893

Nematomenia banyulensis (Pruvot, 1890) (3, 4)

Lepidomeniidae

Aesthoherpia Salvini-Plawen, 1985

Aesthoherpia glandulosa Salvini-Plawen, 1985 (4)

Tegulaherpia Salvini-Plawen, 1983

Tegulaherpia myodoryata Salvini-Plawen, 1988 (3)

Neomeniidae

Neomenia Tullberg, 1875

Neomenia carinata Tullberg, 1875 (3, 5)

Pararrhopaliidae

Hypomenia Lummel, 1930

Hypomenia nierstraszi Lummel, 1930 (3)

Rhopalomeniidae

Rhopalomenia Simroth, 1893

Rhopalomenia aglaopheniae (Kowalewsky & Marion, 1887) (3)

Simrothiellidae

Simrothiella Pilsbry, 1898

Simrothiella minima (Nierstrasz, 1903) (3)

Uncimenia Nierstrasz, 1903

Uncimenia neapolitana Nierstrasz, 1903 (3)

Strophomeniidae

Anamenia Nierstrasz, 1908

Anamenia gorgonophila (Kowalewsky, 1880) (3)

Proneomeniidae

Dorymenia Heath, 1911

Dorymenia vagans (Kowalewsky & Marion, 1887) (3)

Amphimeniidae

Amphimenia Thiele, 1894

Amphimenia neapolitana (Thiele, 1889) (3)

Gastropoda

Docoglossa

Patellidae

Patella Linnaeus, 1758

Patella caerulea Linnaeus, 1758 (3, 4, 5)

Patella ferruginea Gmelin, 1791 (3) (*)

Patella rustica Linnaeus, 1758 (3, 4, 5)

Patella ulysiponensis Gmelin, 1791 (3, 4, 5)

Note

Patella ferruginea: Specie con distribuzione limitata alla Corsica.

Acmaeidae

Acmaea (Tectura) J.E. Gray, 1847

Acmaea (Tectura) virginea (O.F. Müller, 1776) (3, 4, 5)

Lepetidae

Iothia Forbes, 1849

lothia fulva (O.F. Müller, 1776) (3)

Propilidium Forbes & Hanley, 1849

Propilidium exiguum (Thompson, 1844) (3, 5)

Propilidium pertenuae Jeffreys, 1883 (3)

Propilidium scabrosum Jeffreys, 1883 (3, 5)

Cocculiniformia

Cocculinidae

Cocculina Dall, 1882

Cocculina mamilla Di Geronimo, 1974 (3, 5)

Coccopigya Marshall, 1886

Coccopigya viminensis (Rocchini, 1990) (3)

Lepetellidae

Lepetella Verrill, 1880

Lepetella laterocompressa (Rayneval & Ponzi, 1854) (3, 4, 5)

Bogia Dantart & Luque, 1994

Bogia labronica (Bogi, 1984) (3, 4, 5)

Addisoniidae

Addisonia Dall, 1882

Addisonia excentrica (Tiberi, 1857) (3, 4, 5)

Choristellidae

Choristella Bush, 1897

Choristella nofronii McLean, 1992 (3, 4?, 5) (*)

Note

Choristella nofronii: Specie poco conosciuta vivente all'interno di gusci di uova di condroitti. Citata, fino a pochi anni fa, come *C. naticiformis* (Jeffreys, 1883).

Pseudocculinidae

Copulabyssia Haszprunar, 1988

Copulabyssia corrugata (Jeffreys, 1883) (3, 4, 5)

Pilus Warén, 1991

Pilus conicus (Verrill, 1884) (3) (*)

Note

Pilus conicus: Bonfitto et al. (1994 - Boll. malacol., 30: 141-157) hanno recentemente segnalato questa specie sulla base di una conchiglia proveniente dal Tirreno occidentale. Tuttavia, l'appartenenza di questa entità alla fauna attuale del Mediterraneo è incerta.

Neritimorpha

Neritidae

Theodoxus Montfort, 1810

Theodoxus danubialis (Pfeiffer, 1828) (N)

Theodoxus fluviatilis (Linnaeus, 1758) (N, S, Sa)

Theodoxus meridionalis (Philippi, 1836) (Si) (*)

Smaragdia Issel, 1869

Smaragdia viridis (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Note

Theodoxus: Le specie qui incluse nel genere *Theodoxus* sono state attribuite nel passato a *Neritina* Lamarck, 1816, un genere della fauna extraeuropea, la cui validità non è stata ancora chiarita. Potrebbe trattarsi di un più giovane sinonimo di *Theodoxus* o di un genere distinto (cf. Pace, 1973 - Malacol. Rev., Suppl. 1: 118 pp).

Theodoxus meridionalis: Possibile sinonimo di *Theodoxus varius* (Rossmässler, 1835), una specie presente nell'area ellenica. Kristensen (1986 - Rev. Zool. afr., 100: 329-335) cita *T. meridionalis* anche per la Tunisia.

Vetigastropoda

Fissurellidae

Fissurella Bruguière, 1789

Fissurella nubecula (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Diodora J.E. Gray, 1821

Diodora dorsata (Monterosato, 1878) (3, 4, 5)

Diodora gibberula (Lamarck, 1822) (3, 4, 5)

Diodora graeca (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Diodora italica (Defrance, 1820) (3, 4, 5)

Diodora producta (Monterosato, 1880) (3, 5) (*)

Emarginula Lamarck, 1801

Emarginula adriatica O.G. Costa, 1829 (3, 4, 5)

Emarginula christiaensi Piani, 1984 (3, 4, 5)

Emarginula fissura (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Emarginula multistriata Jeffreys, 1882 (3) (*)

Emarginula octaviana Coen, 1939 (3, 4, 5)

Emarginula punctulum Piani, 1980 (3, 5)

Emarginula pustula Thiele in Küster, 1913 (3, 5?) (*)

Emarginula rosea T. Bell, 1824 (3, 4, 5)

Emarginula sicala J.E. Gray, 1825 (3, 5)

Emarginula solidula O.G. Costa, 1829 (3, 5) (*)

Emarginula tenera Locard, 1892 (3, 5) (*)

Emarginula tuberculosa Libassi, 1859 (3) (*)

Emarginella Pilsbry in Tryon & Pilsbry, 1891

Emarginella huzardii (Payraudeau, 1826) (3, 4, 5)

Fissurisepta G. Seguenza, 1863

Fissurisepta granulosa Jeffreys, 1883 (3)

Fissurisepta papillosa G. Seguenza, 1863 (3)

Puncturella Lowe, 1827

Puncturella noachina (Linnaeus, 1771) (3, 5) (*)

Zeidora A. Adams, 1860

Zeidora naufraga Watson, 1883 (3)

Note

Diodora producta: Specie di dubbia validità.

Emarginula multistriata: Non esistono segnalazioni recenti di questa specie per le acque italiane.

Emarginula pustula: Le pochissime segnalazioni (3) per la zona 5 dovrebbero essere ricontrollate per una corretta identificazione della specie.

Emarginula solidula: Le segnalazioni al di fuori della Sicilia andrebbero ricontrollate.

Emarginula tenera: Nella zona 5 nessun'altra segnalazione a nord del Golfo di Taranto.

Emarginula tuberculosa: Le poche segnalazioni per il Tirreno di questa specie eminentemente atlantica potrebbero riferirsi a tanatocenosi wurmiane.

Puncturella noachina: Nella zona 5 soltanto nelle coste della Sicilia Orientale.

Scissurellidae

Scissurella d'Orbigny, 1824

Scissurella costata d'Orbigny, 1824 (3, 4, 5)

Anatoma Woodward, 1859

Anatoma crispata Fleming, 1828 (3, 4, 5)

Anatoma umbilicata (Jeffreys, 1883) (3, 4)

Sinezona Finlay, 1927

Sinezona cingulata (O.G. Costa, 1861) (3, 4, 5)

Haliotidae

Haliotis Linnaeus, 1758

Haliotis tuberculata Linnaeus, 1758 (*)

Haliotis tuberculata lamellosa Lamarck, 1822 (3, 4, 5)

Note

Haliotis tuberculata: Non vi è accordo tra gli autori se la forma mediterranea debba essere ritenuta specie separata o sottospecie. Conchigliologicamente esistono forme intermedie fra i due estremi di scultura; le analisi enzimatiche non hanno finora dato risultati significativi. Provvisoriamente assegniamo valore subspecifico alle popolazioni italiane.

Trochidae

Clanculus (Clanculus) Montfort, 1810

Clanculus (Clanculus) corallinus (Gmelin, 1791) (3, 5)

Clanculus (Clanculopsis) Monterosato, 1888

Clanculus (Clanculopsis) cruciatus (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Clanculus (Clanculopsis) jussieui (Payraudeau, 1826) (3, 4, 5)

Calliostoma (Calliostoma) Swainson, 1840

Calliostoma (Calliostoma) conulus (Linnaeus, 1758) (3, 5)

Calliostoma (Calliostoma) dubium (Philippi, 1844) (3, 5)

Calliostoma (Calliostoma) gualterianum (Philippi, 1848) (3, 4, 5)

Calliostoma (Calliostoma) laugierii (Payraudeau, 1826)

Calliostoma (Calliostoma) laugierii laugierii (Payraudeau, 1826) (3, 4, 5)

Calliostoma (Calliostoma) laugierii spongiarum (Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1885) (3)

Calliostoma (Calliostoma) zizyphinum (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5) (*)

Calliostoma (Ampullotrochus) Monterosato, 1890

Calliostoma (Ampullotrochus) granulatum (von Born, 1778) (3, 4, 5)

Gibbula (Gibbula) Risso, 1826

Gibbula (Gibbula) albida (Gmelin, 1791) (3, 4, 5)

Gibbula (Gibbula) ardens (Salis Marschlins, 1793) (3, 4, 5)

Gibbula (Gibbula) magus (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Gibbula (Colliculus) Monterosato, 1888

Gibbula (Colliculus) adansonii (Payraudeau, 1826) (3, 4, 5)

Gibbula (Colliculus) adriatica (Philippi, 1844) (3, 4, 5)

Gibbula (Colliculus) nivosa A. Adams, 1851 (5) (*)

Gibbula (Colliculus) racketti (Payraudeau, 1826) (3, 4, 5)

Gibbula (Colliculus) turbinoides (Deshayes, 1835) (3, 4, 5)

Gibbula (Forskalea) Iredale, 1918

Gibbula (Forskalea) fanulum (Gmelin, 1791) (3, 4, 5)

Gibbula (Forskalea) guttadauri (Philippi, 1836) (3, 4, 5)

Gibbula (Phorcus) Risso, 1826

Gibbula (Phorcus) leucophaea (Philippi, 1836) (3, 4, 5) (*)

Gibbula (Phorcus) philberti (Récluz, 1843) (3, 4, 5)
Gibbula (Phorcus) richardi (Payraudeau, 1826) (3, 4, 5)
Gibbula (Phorcus) varia (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

***Gibbula (Pseudodiloma)* Cossmann, 1888**

Gibbula (Pseudodiloma) drepanensis (Brugnone, 1873) (3, 5)
Gibbula (Pseudodiloma) vimontiae Monterosato, 1884 (3)

***Gibbula (Steromphala)* J.E. Gray, 1847**

Gibbula (Steromphala) divaricata (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)
Gibbula (Steromphala) rarilineata (Michaud, 1829) (3, 4, 5)

***Gibbula (Tumulus)* Monterosato, 1888**

Gibbula (Tumulus) umbilicaris (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5) (*)

***Danilia* Brusina, 1865**

Danilia otaviana (Cantraine, 1835) (3, 4, 5)

***Putzeysia* Sullioti, 1889**

Putzeysia wiseri (Calcara, 1842) (3, 5)

***Osilinus* Philippi, 1847**

Osilinus articulatus Lamarck, 1822 (3, 4, 5)
Osilinus mutabilis (Philippi, 1846) (3, 4, 5)
Osilinus turbinatus (von Born, 1778) (3, 4, 5)

***Jujubinus* Monterosato, 1884**

Jujubinus exasperatus (Pennant, 1777) (3, 4, 5)
Jujubinus gravinae (Dautzenberg, 1881) (3, 4, 5) (*)
Jujubinus montagui (W. Wood, 1828) (3, 4, 5)
Jujubinus ruscurianus (Weinkauff, 1868) (3)
Jujubinus seguenzae Ghisotti & Melone, 1975 (3) (*)
Jujubinus striatus (Linnaeus, 1758) (*)
 Jujubinus striatus striatus (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)
 Jujubinus striatus delpreteanus Sullioti, 1889 (3)
 Jujubinus striatus fraterculus (Monterosato, 1879) (3)
Jujubinus tumidulus (Aradas, 1846) (3)

***Clelandella* Winckworth, 1932**

Clelandella miliaris (Brocchi, 1814) (3, 5)

***Callumbonella* Thiele, 1924**

Callumbonella suturale (Philippi, 1836) (3, 5) (*)

Note

Calliostoma (Calliostoma) zizyphinum: Sottospecie tipica delle acque della piattaforma nord africana segnalata, nelle acque italiane, solo per la Sicilia Nord-Occidentale.

Gibbula (Colliculus) nivosa: Specie endemica delle isole maltesi.

Gibbula (Phorcus) leucophaea: Nella zona 5 pochissime segnalazioni limitate al basso Adriatico.

Gibbula (Tumulus) umbilicaris: Questa specie mostra un cline O/E umbilicaris/nebulosa e un cline N/S umbilicaris/latior.

Jujubinus gravinae: Nella zona 4 le segnalazioni sono limitate alla costa Est dell'Adriatico Settentrionale.

Jujubinus sequenzae: Specie endemica dello stretto di Messina.

Jujubinus striatus: Sottospecie endemica del Lago Faro presso Messina.

Callumbonella suturale: Nella zona 5 limitatamente al basso Ionio e Canale di Sicilia.

Colloniidae

***Cantrainea* Jeffreys, 1883**

Cantrainea peloritana (Cantraine, 1835) (3)

***Homalopoma* Carpenter, 1864**

Homalopoma sanguineum (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Skeneidae

***Skenea* Fleming, 1825**

Skenea pelagia Nofroni & Valenti, 1987 (3)

Skenea serpuloides (Montagu, 1808) (3, 4, 5)

***Akritogyra* Warén, 1992**

Akritogyra conspicua (Monterosato, 1880) (3)

***Anekes* Bouchet & Warén, 1979**

Anekes giustii Bogi & Nofroni, 1989 (3)

Anekes paucistriata Warén, 1992 (3, 5)

Anekes sculpturata Warén, 1992 (3)

Cirsonella Angas, 1877

Cirsonella romettensis (G. Seguenza, 1873) (3)

Dikoleps Høisaeter, 1968

Dikoleps cutleriana (Clark, 1848) (3, 4, 5)

Dikoleps depressa (Monterosato, 1880) (3)

Dikoleps nitens (Philippi, 1844) (3, 4, 5)

Dikoleps pusilla (Jeffreys, 1847) (3)

Granigyra Dall, 1889

Granigyra granulifera Warén, 1992 (3)

Lissomphalia Warén, 1992

Lissomphalia bithynoides (Monterosato, 1880) (3, 4, 5)

Lissotesta Iredale, 1915

Lissotesta gittenbergeri (van Aartsen & Bogi, 1988) (3)

Lissotesta turrita (Gaglioli, 1987) (3, 5)

Lodderena Iredale, 1924

Lodderena catenoides (Monterosato, 1877) (3, 4, 5)

Moelleriopsis Bush, 1897

Moelleriopsis messanensis (G. Seguenza, 1876) (3)

Palazzia Warén, 1991

Palazzia ausonia (Palazzi, 1988) (3)

Parviturbo Pilsbry & McGinty, 1945

Parviturbo elegantulus (Philippi, 1844) (3)

Parviturbo fenestratus (Chaster, 1896) (3)

Pseudorbis Monterosato, 1884

Pseudorbis granum (Brugnone, 1873) (3, 5)

Tricoliidae

***Tricolia* Risso, 1826**

- Tricolia miniata* (Monterosato, 1884) (3)
- Tricolia pullus* (Linnaeus, 1758) (*)
- Tricolia pullus pullus* (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)
- Tricolia punctura* Gofas, 1993 (3, 5)
- Tricolia speciosa* (von Muehlfeldt, 1824) (3, 4, 5)
- Tricolia tenuis* (Michaud, 1829) (3, 4, 5)

Note

Tricolia pullus: Sottospecie mediterranea a fronte di *T. pullus picta* dell'Atlantico e del Mare di Alboran.

Turbinidae

***Bolma* Risso, 1826**

- Bolma rugosa* (Linnaeus, 1767) (3, 4, 5)

Architaenioglossa

Cochlostomatidae

***Cochlostoma* Jan, 1830**

- Cochlostoma adamii* (Paulucci, 1879) (S) (E) (*)
- Cochlostoma affine* (Benoit, 1882) (Si) (E) (*)
- Cochlostoma alleryanum* (Paulucci, 1879) (Si) (E) (*)
- Cochlostoma canestrinii* (Adami, 1876) (N) (E) (*)
- Cochlostoma crosseanum* (Paulucci, 1879) (S) (E) (*)
- Cochlostoma henricae* (Strobel, 1851)
 - Cochlostoma henricae henricae* (Strobel, 1851) (N)
 - Cochlostoma henricae lissogyrus* (Westerlund, 1881) (N) (E)
 - Cochlostoma henricae strigillatum* (Wagner, 1897) (N) (E)
- Cochlostoma montanum* (Issel, 1866) (E)
 - Cochlostoma montanum cassiniacum* (Saint Simon in Paulucci, 1878) (S)
 - Cochlostoma montanum montanum* (Issel, 1866) (S)
- Cochlostoma paladilhianum* (Saint Simon, 1869) (Si) (E) (*)
- Cochlostoma patulum* (Draparnaud, 1801) (*)
 - Cochlostoma patulum simrothi* (Pollonera in Caziot, 1908) (N)
- Cochlostoma philippianum* (Gredler, 1853) (N) (E)
- Cochlostoma porroi* (Strobel, 1850) (E) (*)
 - Cochlostoma porroi gredleri* (Westerlund, 1879) (N)

Cochlostoma porroi porroi (Strobel, 1850) (N)
Cochlostoma porroi stabilei (Pini, 1884) (N)
Cochlostoma sardoum (Westerlund, 1890) (Sa) (E) (*)
Cochlostoma scalarinum (Villa & Villa, 1841) (N) (*)
Cochlostoma septemspirale (Razoumowsky, 1789)
Cochlostoma septemspirale septemspirale (Razoumowsky, 1789) (N)
Cochlostoma subalpinum (Pini, 1884) (N) (E) (*)
Cochlostoma tergestinum (Westerlund, 1878) (N) (*)
Cochlostoma villae (De Betta & Martinati, 1855) (N) (E) (*)
Cochlostoma westerlundi (Paulucci, 1879) (E) (*)
Cochlostoma westerlundi dionysi (Paulucci, 1879) (Si)
Cochlostoma westerlundi westerlundi (Paulucci, 1879) (S)
Cochlostoma westerlundi yapigium (Westerlund, 1885) (S)

Toffoletia Giusti, 1971

Toffoletia striolata (Porro, 1840) (N) (E) (*)

Note

Cochlostoma: Fino ai primi del novecento è stato utilizzato il nome *Pomatias* Studer, 1789 per indicare il genere in oggetto, ma tale nome, dopo la designazione della specie tipo, è divenuto disponibile per un altro gruppo (vedi *Pomatiasidae*). Il genere *Cochlostoma* è usualmente suddiviso in sette sottogeneri (cf. Zilch, 1958 - Arch. Molluskenkd., 87: 53-76). In questo contesto viene seguito Giusti (1971 - Atti Soc. ital. Sci. nat. Mus. civ. Stor. nat. Milano, 61: 353-380) che propose di abolire l'uso dei sottogeneri, mancando validi elementi diagnostici per la loro discriminazione. Per un aggiornamento sul problema vedi Raven (1990 - Basteria, 54: 17-62), Gofas (1994 - Les *Cochlostoma* (Gastropoda, Prosobranchia) des Pyrénées et monts Cantabriques: systématique et évolution. Tesi di Dottorato, Paris, 147 + a102 pp.) e Gofas & Backeljau (1994 - Iberus, 12: 45-54). L'inquadramento nomenclaturistico-tassonomico a livello specifico dei *Cochlostoma* italiani è lontano dall'essere soddisfacente, essendo ancora molti i problemi irrisolti.

Cochlostoma adamii: *Cochlostoma adamii* ha una distribuzione limitata alle aree calcaree della Calabria (Forcart, 1965 - Verh. naturforsch Ges. Basel, 76: 59-184) e potrebbe essere una sottospecie o un più giovane sinonimo di *C. montanum* (Issel, 1866).

Cochlostoma affine: Specie da confermare, limitata alle Madonie ed ai Nebrodi.

Cochlostoma alleryanum: Specie da confermare, circoscritta alla Sicilia nordoccidentale.

Cochlostoma canestrinii: Entità endemica del Monte Presolana in Lombardia.

Cochlostoma crosseanum: Riscontri recenti sembrano convalidare, in alcune località dell'Appennino centrosettentrionale, la presenza di una seconda specie, diversa da *Cochlostoma montanum* (Issel, 1866). Questa specie fu scoperta da Paulucci nell'Appennino toscano (Paulucci, 1878 - *Materiaux pour servir a l'étude de la faune malacologique terrestre et fluviatile de l'Italie et de ses îles*. 54 pp.; Paris) e descritta l'anno successivo (Paulucci, 1879a - Bull. Soc. malacol. ital., 5: 13-21) con il nome di *Pomatias crosseanus*. De Stefani (1879 - Bull. Soc. malacol. ital., 5: 92-106) e Pini (1879 - Atti Soc. ital., Sci. nat., 22: 156-175) accusarono in maniera infondata Paulucci di aver descritto una specie già pubblicata da Bourguignat, col nome di *Pomatias pinianum* [sic], nella seconda "centuria" delle *Species novissimae molluscorum in Europaeo systemati detectae*. Nello stesso anno Paulucci (1879b -

Bull. Soc. malacol. ital., 5: 168-173) replicò in modo puntuale alle accuse, illustrando tutti gli sforzi fatti per procurarsi il lavoro di Bourguignat, lavoro che, in realtà, non solo non era stato pubblicato, ma che non lo sarà mai (cf. Connolly, 1934 - Proc. malacol. Soc. Lond., 31: 70-73; Dance, 1969 - J. Conchol., 27: 65-86). *Pomatias pinianus* è, quindi, disponibile solo da De Stefani (1879) e come tale rappresenta un più giovane sinonimo di *Pomatias crosseanus*.

Cochlostoma paladilhianum: Distribuzione circoscritta alla Sicilia nordoccidentale ed all'Isola di Favignana. La specie è descritta per la Sicilia, senza ulteriore indicazione di località. L'applicazione di questo nome al *Cochlostoma* del Monte Pellegrino (Palermo) iniziò con Kobelt (1901 - Das Tierreich, 16: xxxix + 662), il quale dimostrò come il nome *Pomatias turriculatus* Philippi, 1836 non Menke, 1830, non fosse disponibile per indicare questa specie. Alzona (1971 - Atti Soc. ital. Sci. nat. Mus. civ. Stor. nat. Milano, 111: 1-433) non recepisce la rettifica di Kobelt (1901) e, seguendo Wagner (1897 - Denkschr. k. Akad. Wiss. math.-naturwiss. Kl., 64: 565-632), continua a citare la specie come *C. turriculatum* (Philippi, 1836). Giusti (1971 - Atti Soc. ital. Sci. nat. Mus. civ. Stor. nat. Milano, 61: 353-380) è il primo autore dopo Alzona (1971) a indicare la specie con il nome di Saint Simon (1869). Secondo Zilch (1958 - Arch. Molluskenkd., 87: 53-76) *Pomatias pirajnoi* dell'Isola di Favignana rappresenterebbe una sottospecie distinta. L'attribuzione di materiale della Campania a *C. paladilhianum* (cf. Alzona, 1971) è molto dubbia.

Cochlostoma patulum: Entità localizzata, in Italia, sul confine tra la Liguria e la Francia. In accordo con Zilch (1958 - Arch. Molluskenkd., 87: 53-76), si ritiene possibile attribuire le popolazioni dell'Italia e della Francia sudorientale ad una sottospecie di *Cochlostoma patulum*, anziché ad una specie distinta come proposto da Boato et al. (1985 - Lav. Soc. ital. Biogeogr. (N.S.), 9: 237-371).

Cochlostoma porroi: La sottospecie nominotipica è limitata alle Prealpi Lombarde centrali, la sottospecie *gredleri* a quelle orientali e la sottospecie *stabilei* a quelle occidentali. Il "correct original spelling" del nome specifico è "porro" non "porroi". Strobel (1848-1851), infatti, come in altri casi, introduce un nuovo nome specifico basato su di un nome personale trattato come nome in apposizione. Tali nomi sono validi (ICZN, 1985: Art. 31a) e il loro "original spelling" corretto. Tuttavia, essendo stati successivamente emendati e trattati come sostantivi al genitivo, sono praticamente conosciuti nella letteratura soltanto in questa forma. Per cui, sull'opportunità di riproporre l'"original spelling" sussistono molte perplessità.

Cochlostoma sardous: La relativa precedenza tra i nomi *Pomatias apostata*, *P. sardous*, *P. maltzani* e *P. perdix* pubblicati simultaneamente da Westerlund (1890 - Fauna der in der paläarktischen Region. I. Supplement, 179 pp.) per indicare la specie in oggetto, è stata definita da Wagner (1897 - Denkschr. k. Akad. Wiss. math.-naturwiss. Kl., 64: 565-632, 10 Pls.) e da Alzona & Alzona Bisacchi (1938 - Malacofauna italiana, 1 (2): 93-128; Genova). Wagner e Alzona & Alzona Bisacchi, riunendo alcuni (Wagner, 1897: *P. apostata* e *P. sardous*) o tutti (Alzona & Alzona Bisacchi, 1938) questi taxa in un'unica specie, per la quale usano il nome *P. sardous*, hanno agito come primi revisori (ICZN, 1985: Art. 24).

Cochlostoma scalarinum: Entità limitata, in Italia, al Colle di Medea e al Carso Goriziano e Triestino. La sottospecie, *Cochlostoma scalarinum schmidtii* (De Betta, 1870), alla quale viene riferito il materiale italiano da Bank (1988 - Basteria, 52: 151-174), è di dubbia validità e non convalidata da Bole (1994 - Slov. Akad. Znan. Umet. Razpr., 25: 187-217).

Cochlostoma subalpinum: Specie limitata alle Alpi Liguri.

Cochlostoma tergestinum: In Italia, specie limitata al Carso Goriziano e Triestino. Una parte dei materiali italiani è stata riferita a *Cochlostoma tergestinum tortivum* (Westerlund, 1885), una sottospecie di dubbio significato, sebbene recentemente convalidata da Bole (1994 - Slov. Akad. Znan. Umet. Razpr., 25: 187-217).

Cochlostoma villae: Specie endemica delle Prealpi Venete e dei Colli Berici ed Euganei.
Cochlostoma westerlundi: La sottospecie nominotipica è limitata alle aree calcaree del sud della Calabria, la sottospecie yapigium al Salento (Forcart, 1965 - Verh. naturforsch Ges. Basel, 76: 59-184; Sacchi, 1954 - Boll. Zool., 21: 51-76) e la sottospecie dionysi al siracusano (Pinter & Szigethy, 1976 - Soosiana, 4: 27-38). Quest'ultima, secondo Girod & Sacchi (1967 - Atti Soc. ital. Sci. nat. Mus. civ. Stor. nat. Milano, 61: 268-269), potrebbe corrispondere a qualche entità ellenica. L'intero gruppo di forme attribuite a *Cochlostoma westerlundi* necessita di essere rivisto.
Toffolettia striolata: Specie circoscritta all'Appennino Ligure, con stazioni puntiformi nell'Imperiese (Boato et al., 1985 - Lav. Soc. ital. Biogeogr. (N.S.), 9: 237-371). La presenza in Francia, nelle Alpi Marittime, non ha conferme recenti.

Aciculidae

Acicula Hartmann, 1821

*Acicula benecke*i (Andreae, 1883) (N) (E) (*)
Acicula benoiti (Bourguignat, 1864) (Si) (E)
Acicula disjuncta Boeters, Gittenberger & Subai, 1989 (S) (*)
Acicula lineata (Draparnaud, 1805) (*)
 Acicula lineata sublineata (Andreae, 1883) (N)
Acicula lineolata (Pini, 1884) (*)
 Acicula lineolata banki Boeters, Gittenberger & Subai, 1989 (N)
 Acicula lineolata lineolata (Pini, 1884) (N)
Acicula szigethyannae Subai, 1977 (N, S) (*)
Acicula vezzanii Bodon, 1994 (N) (E) (*)

Platyla Moquin-Tandon, 1856

Platyla curtii (Wagner, 1912) (N) (*)
Platyla foliniana (Nevill, 1879) (N) (*)
Platyla gracilis (Clessin, 1877) (N, S)
Platyla microspira (Pini, 1884) (N) (*)
Platyla pezzolii Boeters, Gittenberger & Subai, 1979 (N) (E) (*)
Platyla polita (Hartmann, 1840) (*)
 Platyla polita polita (Hartmann, 1840) (N, S?, Si)
 Platyla polita regina (Subai, 1977) (S) (E)
Platyla similis (Reinhardt, 1880) (N, S)
Platyla stussineri (Boettger, 1884) (N, S)
Platyla subdiaphana (Bivona, 1839) (Si) (E)

Renea Nevill, 1880

Renea bourguignatiana Nevill, 1880 (N) (E, M) (*)
Renea elegantissima (Pini, 1886) (N, S) (*)
Renea gentilei (Pollonera, 1889) (N) (E) (*)
Renea paillona Boeters, Gittenberger & Subai, 1989 (N) (*)

Renea spectabilis (Rossmässler, 1839) (N) (*)

Renea veneta (Pirona, 1865) (N)

Renea sp. (N) (E) (*)

Note

Acicula beneckeii: Entità endemica della Val Brembana.

Acicula disjuncta: Specie con distribuzione transadriatica, presente in Calabria ed in Dalmazia.

Acicula lineata: La sottospecie sublineata è presente, fuori dai confini italiani, solo nel Canton Ticino. Le segnalazioni per il S (Eikenboom, 1993 - De Kreukel, 29: 103-104) richiedono conferma.

Acicula lineolata: La sottospecie tipica è limitata, fuori dai confini italiani, al Canton Ticino.

Acicula szigethyannae: La distribuzione settentrionale coincide con il confine ligure-toscano. Fuori dai confini italiani è nota solo per il Montenegro.

Acicula vezzanii: Entità conosciuta soltanto per l'Appennino ligure (Bodon, 1994 - Boll. malacol., 29: 211-222).

Platyla curtii: Distribuzione limitata al Friuli occidentale (*Acicula* (*Platyla*) sp. sensu Boato et al., 1989 - Biogeographia, Lav. Soc. ital. Biogeogr. N.S., 12: 429-528), all'Istria ed ai territori prossimi della Slovenia e della Croazia.

Platyla foliniana: Presenza puntiforme in Liguria, presso il confine francese; in Francia è limitata ai dintorni di Mentone.

Platyla microspira: Specie nota solo per poche stazioni in Lombardia, Liguria, Toscana e Romania (Eikenboom, 1993 - De Kreukel, 29: 105-111; dati personali inediti).

Platyla pezzolii: Distribuzione limitata alla provincia di Treviso.

Platyla polita: *Platyla polita* è la specie del gruppo più frequentemente citata in Italia, ma molte segnalazioni richiedono conferma. Fino ad oggi, la sottospecie tipica è nota, con certezza, solo per pochissime stazioni italiane. P. p. regina è endemica del Gargano.

Renea bourguignatiana: Specie conosciuta vivente solo per una località presso Ventimiglia e nota, come fossile, al confine tra la Liguria e la Francia.

Renea elegantissima: Nella penisola, questa specie si spinge a sud fino alle Alpi Apuane; fuori dai confini italiani è presente solo nelle Alpi Marittime francesi. Le segnalazioni di *Renea moutonii* (Dupuy, 1849) per la Liguria (cf. Boato et al., 1985 - Lav. Soc. ital. Biogeogr. (N.S.), 9: 237-371) potrebbero riferirsi a questa specie.

Renea gentilei: Specie endemica della Val Corsaglia, in Piemonte.

Renea paillona: Specie nota, in Italia, solo per una stazione presso il confine francese (*Renea bourguignatiana* sensu Bodon & Boato, 1987 - Arch. Molluskenkd., 117: 151-157).

Renea spectabilis: Specie limitata, in Italia, alle Alpi Giulie.

Renea sp.: Distribuzione limitata a poche località delle Alpi Cozie (*Renea* (*Pleuracme*) sp. sensu Boato et al., 1985 - Lav. Soc. ital. Biogeogr. (N.S.), 9: 237-371).

Viviparidae

Viviparus Montfort, 1810

Viviparus ater (De Cristofori & Jan, 1832) (N, S) (*)

Viviparus contectus (Millet, 1813) (N, S)

Note

Viviparus ater: Recenti segnalazioni di *Viviparus viviparus* (Linnaeus, 1758) per l'entroterra veneziano (Cesari, 1978 - Soc. veneziana Sci. nat. Lav., 3: 7-28) sono riferibili a *V. ater*. A S, *V. ater* risultava presente soltanto in un laghetto agricolo nei dintorni di Siena dove era stato accidentalmente introdotto. La segnalazione per il Salento (Ferrerri, 1994 - Thal. salentina, 20: 67-75) si basa su materiale spiaggiato.

Neotaenioglossa

Cerithiidae

Cerithium Bruguière, 1789

- Cerithium alucaster* (Brocchi, 1814) (3, 4)
- Cerithium haustellum* Monterosato in Crema, 1903 (4, 5)
- Cerithium lividulum* Risso, 1826 (3, 4)
- Cerithium protractum* Ant. Bivona in And. Bivona, 1838 (3)
- Cerithium rupestre* Risso, 1826 (3, 5)
- Cerithium scabridum* Philippi, 1848 (5)
- Cerithium vulgatum* Bruguière, 1792 (3, 4, 5)

Bittium Gray, 1847

- Bittium jadertinum* (Brusina, 1865) (3, 4, 5)
- Bittium lacteum* (Philippi, 1836)
- Bittium lacteum lacteum* (Philippi, 1836) (3, 5)
- Bittium latreillii* (Payraudeau, 1826) (3, 4, 5)
- Bittium reticulatum* (Da Costa, 1778) (3, 4, 5)
- Bittium scabrum* (Olivi, 1792) (3, 4)

Cerithidium Monterosato, 1884

- Cerithidium submamillatum* (De Rayneval & Ponzi, 1854) (3, 4, 5)

Potamididae

Pirenella Gray, 1847

- Pirenella conica* (Blainville, 1826) (3, 5)

Thiaridae

Melanoides Olivier, 1804

Melanoides tuberculata (O.F. Müller, 1774) (N, S) (*)

Note

Melanoides tuberculata: Specie originaria delle aree tropicali e subtropicali; la presenza in Italia è sporadica e, con tutta probabilità, dovuta ad esemplari liberati da acquari. Raccolta a N solo nelle Valli di Comacchio e, a S, in Toscana presso Marina di Massa (dati personali inediti). Beckmann (1987 - Heldia, 1 (Sonderheft): 1-38) e Falkner (1990 - Weichtiere. Europäische Meeres- und Binnenmollusken: 112-273) emendano il nome specifico della specie in accordo agli "Examples" per Art. 30(b) dell'ICZN (1985). Poiché *Melanoides* è coerentemente usato in tutta la letteratura come femminile, un parere fu richiesto al Dr. P. Tubbs (Segretario della International Commission on Zoological Nomenclature), il quale (com. pers., 20.3.95) replicò che "The Example to Art. 30b in the Code states that all names ending in -oides are masculine. This was the view of Canon L. W. Grensted, at one time "Classical Adviser" to the Commission, but not all authorities agree: R. W. Brown's Composition of Scientific Words (1954) says that such names take the gender of the names of the basal (not -oides) name, while the Botanical Code says they are feminine! The implication in the Code is clearly that they are masculine, although strictly speaking the Examples are not part of the "legislative" text [...] Personally I should retain any usage that is really well established".

Melanopsidae

Melanopsis Férussac, 1807

Melanopsis dufouri Férussac, 1807 (S) (M) (*)

Note

Melanopsis dufouri: Glaubrecht (1993 - Mitt. hamb. zool. Mus. Inst., 90: 41-97) ritiene che *Melanopsis dufouri* rappresenti una specie della superspecie *M. praemorsa* (Linnaeus, 1758) comprendente tutte le diverse entità specifiche dell'area mediterranea. In Italia, distribuzione limitata alle acque termali della Maremma Toscana (Cianfanelli et al., 1989 - Quad. Mus. Stor. Nat. Livorno, 10: 59-76). Glaubrecht (1993) riporta la specie anche per l'agro pontino, riprendendo vecchie segnalazione mai confermate.

Fossaridae

Fossarus Philippi, 1841

Fossarus ambiguus Auct. (nec Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Turritellidae

Turritella Lamarck, 1799

Turritella communis Risso, 1826 (3, 4, 5)
Turritella decipiens Monterosato, 1878 (5)
Turritella turbona Monterosato, 1877 (3, 4, 5)

Siliquariidae

Tenagodus Guettard, 1770

Tenagodus obtusus (Schumacher, 1817) (3, 5)

Littorinidae

***Littorina* (*Littorivaga*)** Dall, 1918

Littorina (*Littorivaga*) *saxatilis* (Olivi, 1792) (4)

***Littorina* (*Melaraphe*)** Menke, 1828

Littorina (*Melaraphe*) *neritoides* (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Littorina (*Melaraphe*) *punctata* (Gmelin, 1791) (3, 5)

Pomatiasidae

Pomatias Studer, 1789

Pomatias elegans (Müller, 1774) (N, S, Si, Sa)

Pomatias sulcatus (Draparnaud, 1801) (Si, Sa) (*)

Note

Pomatias sulcatus: A S, segnalato da Ghirardelli & Cricca-Gordini (1948 - Acta pont. Accad. Sci., 12: 41-56) per la Puglia, ma il dato è da ricontrollare.

Skeneopsidae

Skeneopsis Iredale, 1915

Skeneopsis pellucida (Monterosato, 1874) (3, 5)

Skeneopsis planorbis (O. Fabricius, 1780) (3, 5)

Cingulopsidae

Eatonina Thiele, 1912

- Eatonina coelata* (Monterosato, 1884) (3)
- Eatonina cossurae* (Calcara, 1841) (3, 4, 5)
- Eatonina fulgida* (J. Adams, 1797) (3, 4, 5)
- Eatonina ochroleuca* (Brusina, 1869) (3, 4, 5)
- Eatonina pumila* (Monterosato, 1884) (3, 4, 5)

Tubbreva Ponder, 1965

- Tubbreva micrometrica* (Aradas & Benoit, 1876) (3, 5)

Anabathridae

Nodulus Monterosato, 1878

- Nodulus contortus* (Jeffreys, 1856) (3, 4, 5)

Pisinna Monterosato, 1878

- Pisinna glabrata* (von Muehlfeldt, 1824) (3, 4, 5)

Barleeiidae

Barleeia W. Clark, 1853

- Barleeia compacta* (Jeffreys, 1884) (5)
- Barleeia unifasciata* (Montagu, 1803) (3, 4, 5)

Rissoidae

Rissoa Fréminville in Desmarest, 1814

- Rissoa auriscalpium* (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)
- Rissoa decorata* Philippi, 1846 (4)
- Rissoa guerinii* Récluz, 1843 (3, 5)
- Rissoa italiensis* Verduin, 1985 (3, 5) (E)
- Rissoa labiosa* (Montagu, 1803) (3, 4, 5)
- Rissoa lia* (Monterosato, 1884) (3, 4, 5)
- Rissoa monodonta* Philippi, 1836 (3, 4, 5)
- Rissoa multincta* Smriglio & Mariottini, 1995 (3) (E)
- Rissoa panhormensis* Verduin, 1985 (3) (E)
- Rissoa paradoxa* (Monterosato, 1884) (3, 5)
- Rissoa rodhensis* Verduin, 1985 (5)
- Rissoa scurra* (Monterosato, 1917) (4, 5)

Rissoa similis Scacchi, 1836 (3, 4, 5)
Rissoa splendida Eichwald, 1830 (4, 5)
Rissoa variabilis (von Muehlfeldt, 1824) (3, 4, 5)
Rissoa ventricosa Desmarest, 1814 (3, 4, 5)
Rissoa violacea Desmarest, 1814 (3, 4, 5)

***Alvania* Risso, 1826**

Alvania aartseni Verduin, 1986 (5) (*)
Alvania aeoliae Palazzi, 1988 (3) (E)
Alvania beani (Hanley in Thorpe, 1844) (3, 4, 5)
Alvania beniamina (Monterosato, 1884) (3, 5)
Alvania cancellata (Da Costa, 1778) (3, 4, 5)
Alvania carinata (Da Costa, 1778) (3, 4, 5)
Alvania cimex (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)
Alvania cimicoides (Forbes, 1844) (3, 4, 5)
Alvania clathrella (L. Seguenza, 1903) (5) (E)
Alvania daniensis Oliverio, 1988 (3) (E)
Alvania dictyophora (Philippi, 1844) (3, 5) (E)
Alvania dipacoi Giusti & Nofroni, 1989 (3)
Alvania discors (Allan, 1818) (3, 4, 5)
Alvania disparilis Monterosato, 1890 (3) (E)
Alvania electa (Monterosato, 1874) (5)
Alvania elegantissima (Monterosato, 1874) (3, 5)
Alvania fischeri (Jeffreys, 1884) (5)
Alvania gagliniae Amati, 1985 (3, 5) (E)
Alvania geryonia (Nardo, 1847) (3, 4, 5)
Alvania hallgassi Amati & Oliverio, 1985 (5)
Alvania hirta Monterosato, 1884 (3, 5)
Alvania lactea (Michaud, 1832) (3, 4, 5)
Alvania lanciae (Calcara, 1841) (3, 4, 5)
Alvania lineata Risso, 1826 (3, 4, 5)
Alvania litoralis (F. Nordsieck, 1972) (3, 4, 5)
Alvania lucinae Oberling, 1970 (3)
Alvania mamillata Risso, 1826 (3, 4, 5)
Alvania marioni Fasulo & Gaglini, 1987 (3, 5)
Alvania pagodula (Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1884) (3, 5)
Alvania pseudocingulata (F. Nordsieck, 1972) (5)
Alvania punctura (Montagu, 1803) (3, 4, 5)
Alvania rudis (Philippi, 1844) (3, 4, 5)
Alvania scabra (Philippi, 1844) (3, 4, 5)
Alvania schwartziana Brusina, 1866 (4?)
Alvania semistriata (Montagu, 1808) (3, 4, 5)
Alvania settepassii Amati & Nofroni, 1985 (3, 4, 5)
Alvania simulans Locard, 1886 (3, 5)
Alvania sororcula (Granata-Grillo, 1877) (5) (E)
Alvania subareolata (Monterosato, 1869) (3, 5) (E)
Alvania subcrenulata (Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1884) (3, 4, 5)

Alvania subsoluta (Aradas, 1847) (3, 4, 5)
Alvania tenera (Philippi, 1844) (3, 4, 5)
Alvania testae (Aradas & Maggiore, 1844) (3, 4, 5)
Alvania tomentosa Pallary, 1920 (3)
Alvania weinkauffi (Weinkauff, 1868)
 Alvania weinkauffi weinkauffi (Weinkauff, 1868) (5)
 Alvania weinkauffi jacobusi (Oliverio, Amati & Nofroni, 1986) (3, 5) (E)
Alvania zetlandica (Montagu, 1815) (3, 5)
Alvania zylensis Gofas & Warén, 1982 (3, 5)

Benthonella Dall, 1889

Benthonella tenella (Jeffreys, 1869) (3, 4, 5)

Manzonina Brusina, 1870

Manzonina crassa (Kanmacher, 1798) (3, 4, 5)

Obtusella Cossmann, 1921

Obtusella intersecta (S.W. Wood, 1857) (3, 4, 5)
Obtusella macilenta (Monterosato, 1880) (3, 4, 5)

Onoba H. Adams & A. Adams, 1854

Onoba dimassai Nofroni & Giusti, 1990 (3) (E)
Onoba gianninii (F. Nordsieck, 1974) (3, 5)

Peringiella Monterosato, 1878

Peringiella denticulata Ponder, 1985 (3, 4, 5)
Peringiella elegans (Locard, 1892) (3, 4, 5)

Botryphallus Ponder, 1988

Botryphallus epidauricus (Brusina, 1866) (3, 4, 5)

Pusillina Monterosato, 1884

Pusillina benzi (Aradas & Maggiore, 1844) (5)
Pusillina diversa (F. Nordsieck, 1972) (3, 4, 5)
Pusillina inconspicua (Alder, 1844) (3, 4, 5)
Pusillina lineolata (Michaud, 1832) (3, 4, 5)
Pusillina marginata (Michaud, 1832) (5)
Pusillina munda (Monterosato, 1884) (3, 4, 5)
Pusillina parva (Da Costa, 1778) (3)
Pusillina philippi (Aradas & Maggiore, 1844) (3, 4, 5)
Pusillina radiata (Philippi, 1836) (3, 4, 5)

Setia H. Adams & A. Adams, 1854

Setia amabilis (Locard, 1886) (3, 5)
Setia ambigua (Brugnone, 1873) (3, 5)
Setia antipolitana (van der Linden & Wagner, 1987) (3)
Setia fusca (Philippi, 1841) (3, 5)
Setia maculata (Monterosato, 1869) (3, 5)
Setia slikorum (Verduin, 1984) (3, 4, 5)
Setia soluta (Philippi, 1844) (5)
Setia turgida (Jeffreys, 1870) (3?) (*)
Setia turriculata Monterosato, 1884 (3, 4, 5)

Rissoina d'Orbigny, 1840

Rissoina bruguieri (Payraudeau, 1826) (3, 4, 5)
Rissoina spirata (G.B. Sowerby I, 1825) (3?)

Note

Alvania aartseni: L'evidente sinonimia tra *Alvania aartseni* (segnalata dalle coste nordafricane e francesi) ed *Alvania depauperata* (descritta dalle coste Siciliane), ne estende l'areale anche all'Italia.

Setia turgida: *Setia turgida* è stata più volte segnalata per le coste italiane, ma l'appartenenza di tali esemplari alla fauna recente o a questa medesima specie, comunissima nei mari del Nord, appare dubbia. Usualmente attribuita ad un sottogenere distinto, *Pseudosetia* Monterosato, 1884.

Bithyniidae

Bithynia Leach, 1818

Bithynia leachi (Sheppard, 1823) (N, S, Si) (*)
Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Note

Bithynia leachi: L'inquadrimento tassonomico del materiale siciliano e, forse, anche dell'Italia meridionale, spesso citato come *Bithynia rubens* (Menke, 1830) (cf. Forcart, 1965 - Verh. naturforsch. Ges. Basel, 76: 59-184), richiede ulteriori verifiche. Le segnalazioni di *B. rubens* per la Sardegna (Forcart, 1965; Alzona, 1971 - Atti Soc. ital. Sci. nat. Mus. civ. Stor. nat. Milano, 111: 1-433) sono difficilmente interpretabili e potrebbero riferirsi a *B. tentaculata* (Linnaeus, 1758). La recente segnalazione di *B. leachi* per la Sardegna (cf. Giusti & Castagnolo, 1983 - Lav. Soc. ital. Biogeogr. (N.S.), 8: 227-249) è dovuta ad un errore di determinazione.

Hydrobiidae

Hydrobia Hartmann, 1821

Hydrobia acuta (Draparnaud, 1805) (3, 4, 5) (*)

Hydrobia ventrosa (Montagu, 1803) (3, 4, 5) (*)

Pseudamnicola (Pseudamnicola) Paulucci, 1878

Pseudamnicola (Pseudamnicola) conovula (Frauenfeld, 1863) (S, Si) (*)

Pseudamnicola (Pseudamnicola) lucensis (Issel, 1866) (S) (E, M) (*)

Pseudamnicola (Pseudamnicola) moussonii (Calcara, 1841) (N, S, Si, Sa) (*)

Mercuria Boeters, 1971

Mercuria similis (Draparnaud, 1805) (N, S, Si) (*)

Mercuria zopissa (Paulucci, 1882) (Sa) (E)

Bythiospeum Bourguignat, 1882

Bythiospeum vallei (Giusti & Pezzoli, 1976) (N) (E) (*)

Paladilhiopsis Pavlovic, 1913

Paladilhiopsis robiciana (Clessin, 1882) (N) (*)

Paladilhiopsis virei (Locard, 1903) (N, S) (E) (*)

Paladilhiopsis sp. (N) (E) (*)

Iglica Wagner, 1927

Iglica concii (Allegretti, 1944) (N) (E) (*)

Iglica forumjuliana (Pollonera, 1887) (N) (*)

Iglica giustii Bodon & Giovannelli, 1995 (N) (E) (*)

Iglica hauffeni (Brusina, 1886) (N) (*)

Iglica pezzolii Boeters, 1971 (N) (E) (*)

Iglica tellinii (Pollonera, 1887) (N) (E) (*)

Iglica vobarnensis (Pezzoli & Toffoletto, 1968) (N) (E) (*)

Plagigeyeria Tomlin, 1930

Plagigeyeria sp. (N) (E) (*)

Phreatica Velkovrh, 1970

Phreatica bolei Velkovrh, 1970 (N) (E) (*)

Moitessieria Bourguignat, 1863

Moitessieria massoti Bourguignat, 1863 (Sa) (*)
Moitessieria simoniana (De Charpentier, 1848) (N) (*)

Graziana Radoman, 1975

Graziana alpestris (Frauenfeld, 1863) (N) (*)
Graziana pupula (Westerlund, 1886) (N) (*)

Istriania Velkovrh, 1971

Istriania mirnae Velkovrh, 1971 (N) (*)

Arganiella Giusti & Pezzoli, 1980

Arganiella pescei Giusti & Pezzoli, 1980 (S) (E) (*)

Hadziella Kušcer, 1932

Hadziella anti Schütt, 1960 (N) (*)
Hadziella deminuta Bole, 1961 (N) (*)
Hadziella ehippiostoma Kušcer, 1932 (N) (*)

Hauffenia Pollonera, 1898

Hauffenia subpiscinalis (Kušcer, 1932) (N) (*)
Hauffenia tellinii (Pollonera, 1898) (N)

Sadleriana Clessin, 1890

Sadleriana fluminensis (Küster, 1852) (N, S) (*)

Orientalina Radoman, 1978

Orientalina callosa (Paulucci, 1881) (S) (E, M) (*)

Belgrandia Bourguignat, 1869

Belgrandia bonelliana (De Stefani, 1879) (S) (E, M) (*)
Belgrandia latina (Settepassi, 1965) (S) (E) (*)
Belgrandia mariatheresiae Giusti & Pezzoli, 1972 (S) (E) (*)
Belgrandia minuscula (Paulucci, 1881) (S) (E) (*)
Belgrandia thermalis (Linnaeus, 1767) (N, S) (E) (*)

Pauluccinella Giusti & Pezzoli, 1990

Pauluccinella minima (Paulucci, 1881) (S) (E)

Litthabitella Boeters, 1970

Litthabitella chilodia (Westerlund, 1886) (S) (*)

Alzoniella Giusti & Bodon, 1984

Alzoniella cornucopia (De Stefani, 1880) (S) (E) (*)

Alzoniella fabrianensis (Pezzoli, 1969) (S) (E) (*)

Alzoniella feneriensis Giusti & Bodon, 1984 (N) (E) (*)

Alzoniella finalina Giusti & Bodon, 1984 (N) (E) (*)

Alzoniella sigestra Giusti & Bodon, 1984 (N) (E) (*)

Alzoniella sp. (N) (E) (*)

Fissuria Boeters, 1981

Fissuria sp. (N) (E) (*)

Pseudavenionia Bodon & Giusti, 1982

Pseudavenionia pedemontana Bodon & Giusti, 1982 (N) (E) (*)

Avenionia Nicolas, 1882

Avenionia ligustica Giusti & Bodon, 1981 (N, S) (E)

Avenionia parvula Giusti & Bodon, 1981 (N) (E) (*)

Avenionia sp. 1 (N) (E) (*)

Avenionia sp. 2 (N) (E) (*)

Pezzolia Bodon & Giusti, 1986

Pezzolia radapalladis Bodon & Giusti, 1986 (N) (E) (*)

Pezzolia sp. 1 (N) (E) (*)

Pezzolia sp. 2 (N) (E) (*)

Islamia Radoman, 1983

Islamia cianensis Bodon, Manganelli, Sparacio & Giusti, 1995 (Si) (E)

Islamia gaiteri Bodon, Manganelli, Sparacio & Giusti, 1995 (S) (E) (*)

Islamia pusilla (Piersanti, 1952) (S) (E)

Islamia sp. 1 (N) (E) (*)

Islamia sp. 2 (S) (E) (*)

Islamia sp. 3 (S) (E) (*)

Islamia sp. 4 (N, S) (E) (*)

Potamopyrgus Stimpson, 1865

Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1843) (N, S) (*)

***Heleobia* Stimpson, 1865**

Heleobia aponensis (Martens, 1858) (N) (E, M) (*)
Heleobia foxianensis (De Stefani, 1883) (S) (E, M) (*)
Heleobia spinellii (Gredler, 1859) (N) (E, M) (*)
Heleobia stagnorum (Gmelin, 1791) (S, Si) (*)

***Bythinella* Moquin-Tandon, 1855**

Bythinella schmidtii (Küster, 1852) (N, S) (*)

***Marstoniopsis* Van Regteren Altena, 1936**

Marstoniopsis insubrica (Küster, 1852) (N) (E)

Note

Hydrobia acuta: Entità presente solitamente in acque salmastre, anche oligoaline, o a salinità molto variabile, ma talvolta anche in acque marine costiere. Boeters (1984 - Heldia, 1: 3-5) seleziona per *Cyclostoma acutum* un lectotypus che, apparentemente, rende il nome disponibile in senso diverso da quello di Radoman (1977 - Arch. Molluskenkd., 107: 203-223). Boeters (1984), infatti, identifica come corrispondenti viventi del suo lectotypus esemplari anatomicamente riferibili ad *Hydrobia ventrosa* (Montagu, 1803). Giusti & Pezzoli (1984 - Lav. Soc. ital. Malacol. (Atti del Simposio di Bologna, 24-26.9.1982), 21: 117-148) contestano tale identificazione, in quanto i caratteri del lectotypus non permetterebbero chiaramente di individuare la specie, mentre il paralectotypus, illustrato nello stesso lavoro, è sicuramente riferibile ad esemplari anatomicamente attribuiti ad *H. acuta* sensu Radoman (1977). Nel caso che le conclusioni di Boeters (1984) venissero accettate, *H. acuta* (Draparnaud, 1805) diverrebbe un sinonimo più giovane di *H. ventrosa* (Montagu, 1803) e un nuovo nome dovrebbe essere individuato per *H. acuta* sensu Radoman (1977). Lungo le coste italiane risulta frequentemente segnalata *Hydrobia ulvae* (Pennant, 1777), una specie delle coste dell'Europa atlantica e settentrionale. La presenza di *H. ulvae* nel Mediterraneo non è mai stata documentata con sicurezza (cf. Giusti & Pezzoli, 1984). E' verosimile che la maggior parte dei materiali riportati con questo nome sia da riferire ad *H. acuta*. Giusti & Pezzoli (1984) e Giusti et al. (1995 - Mus. reg. Sci. Nat. Monogr. (Torino), 15, in stampa) suggeriscono come probabili sinonimi di *H. acuta* le seguenti specie: *Paludestrina procerula* Paladilhé, 1869, *P. minoricensis* Paladilhé, 1869, *Hydrobia neglecta* Muus, 1963, *Obrovia salaria* Radoman, 1973 e *O. testadura* Radoman, 1973.

Hydrobia ventrosa: Specie diffusa soprattutto in acque mesoaline, come quelle delle lagune costiere salmastre. Giusti & Pezzoli (1984 - Lav. Soc. ital. Malacol. (Atti del Simposio di Bologna, 24-26.9.1982), 21: 117-148) e Giusti et al. (1995 - Mus. reg. Sci. Nat. Monogr. (Torino), 15, in stampa) suggeriscono come probabili sinonimi di *Hydrobia ventrosa* le seguenti specie: *Ventrosia spatiana* Radoman, 1977, *V. cissana* Radoman, 1977 e *V. pontieuxini* Radoman, 1977.

Pseudamnicola (Pseudamnicola) conovula: *Pseudamnicola conovula* è un'entità che deve essere rivista, in quanto i caratteri anatomici usualmente ritenuti discriminanti rispetto a *P. moussonii* (Calcara, 1841) sono variabili.

Pseudamnicola (Pseudamnicola) lucensis: Distribuzione limitata alle acque termali di Bagni di

Lucca, Toscana.

Pseudamnicola (Pseudamnicola) moussonii: *Pseudamnicola moussonii* è la specie del genere più vecchia per data di descrizione (Giusti et.al., 1995a - Mus. reg. Sci. Nat. Monogr. (Torino), 15, in stampa; 1995b - I molluschi terrestri, d'acqua dolce e salmastri delle Isole Toscane, in stampa). L'esame di esemplari topotipici, di sesso maschile, recentemente effettuato da Giusti et al. (1995a, 1995b), esclude, infatti, che la specie possa essere riferita al genere *Mercuria*, anch'esso presente in Sicilia. Mancano ancora, invece, dati sull'anatomia degli esemplari topotipici di sesso femminile, importanti per stabilire le relazioni di questa specie con *P. conovula* (Frauenfeld, 1863). Il "correct original spelling" del nome specifico è "moussonii" non "moussoni". Infatti, anche se basato su A. Mousson, "moussonii" è disponibile in accordo all'Art. 31a(i) dell'ICZN (1985); "moussoni", invece, costituisce un "incorrect subsequent spelling" (ICZN, 1985: Art. 33 d). La distribuzione settentrionale di *P. moussonii* arriva alla Liguria orientale. La segnalazione per l'Emilia (Bellavere & Peretti, 1984 - Pubbl. Mus. St. Nat. Univ. Parma, 1: 107 pp.) è alquanto dubbia.

Mercuria similis: Sull'uso del nome *Mercuria similis* (Draparnaud, 1805), al posto di *M. confusa* (Frauenfeld, 1865) vedi Giusti (1979 - Arch. Molluskenkd., 110: 1-14) e Giusti et al. (1995 - Mus. reg. Sci. Nat. Monogr. (Torino), 15, in stampa). Secondo Boeters & Beckmann (1991 - Arch. Molluskenkd., 120: 179-182), *Paludina cocchii* Benoit, 1882 sarebbe un più giovane sinonimo di *M. confusa* e, quindi, di *M. similis*. Entità presente, a N, in aree litorali del Veneto e, forse, in Friuli; a S confermata solo per la Puglia; la presenza in Sicilia è documentata su materiali storici.

Bythiospeum valleii: La specie è conosciuta soltanto per la località tipica, la sorgente dell'Orrido di Bracca di Costa Serina in Val Brembana. L'assegnazione generica è incerta per mancanza di dati anatomici.

Paladilhiosis: La sinonimia tra *Bythiospeum Bourguignat*, 1882 e *Paladilhiosis Pavlovic*, 1913, proposta da alcuni autori (Giusti & Pezzoli, 1982 - Malacologia, 22: 463-468) richiede ulteriori verifiche.

Paladilhiosis robiciana: Possibile sottospecie o sinonimo più giovane di *Paladilhiosis virei* (Locard, 1903); a questa entità sono, comunque, accostabili solo le popolazioni presenti nel Friuli orientale.

Paladilhiosis virei: *Paladilhiosis virei* è stata considerata sinonimo più giovane di *Lartetia cornucopia* De Stefani, 1880 (cf. Giusti, 1975 - Atti Soc. toscana Sci. nat. resid. Pisa Mem. Ser. B, 76: 128-141). Il recente ritrovamento di esemplari topotipici della specie di De Stefani ha, però, escluso tale sinonimia. *L. cornucopia* è, stata riferita, seppur con qualche incertezza, al genere *Alzoniella* (Manganelli et al., 1995 - J. molluscan Stud., 61: 173-184). *P. virei*, a S, è stata reperita solo per i dintorni di Siena (Giusti, 1975), ma non più ritrovata, in anni recenti.

Paladilhiosis sp.: Alcune popolazioni del Veneto e del Friuli occidentale, attribuite a *Paladilhiosis virei* (Locard, 1903) (cf. Giusti & Pezzoli, 1977 - Atti Soc. ital. Sci. nat. Mus. civ. Stor. nat. Milano, 118: 273-280; Pezzoli, 1989 - Quad. civ. Staz. Idrobiol. Milano, 16: 43-69), potrebbero appartenere ad un'entità a sé stante (Pezzoli, 1988 - Quad. civ. Staz. Idrobiol. Milano, 15: 65-103).

Iglica concii: Specie concordante, per i caratteri anatomici, con la specie tipo di *Iglica*, cioè *Vitrella gratulabunda* Wagner, 1910. Ritenuta da Giusti & Pezzoli (1980 - Boll. malacol., 16: 53-78) un più giovane sinonimo di *I. forumjuliana* (Pollonera, 1887), si è rilevata diversa dopo l'esame anatomico di quest'ultima entità (dati personali inediti).

Iglica forumjuliana: A questa specie sono riferibili le sole popolazioni del Friuli orientale e della Slovenia, distinte anatomicamente da *Iglica concii* (Allegretti, 1944) delle Prealpi lombardo-venete (dati personali inediti). L'assegnazione generica di *I. forumjuliana* permane

dubbia.

Iglica giustii: Assegnazione generica incerta, per mancanza di dati anatomici. Distribuzione limitata alle acque sotterranee del basso corso del Fiume Isonzo (Bodon & Giovannelli, 1994 - Basteria, 58: 233-244).

Iglica hauffeni: Assegnazione generica dubbia, per mancanza di dati anatomici. Distribuzione limitata, in Italia, alle acque sotterranee del Friuli orientale (Bodon & Giovannelli, 1994 - Basteria, 58: 233-244).

Iglica pezzolii: Assegnazione generica da verificare. Distribuzione limitata al Monte Fenera, Piemonte.

Iglica tellinii: Assegnazione generica dubbia, per mancanza di dati anatomici. Specie limitata alle acque sotterranee del Friuli orientale.

Iglica vobarnensis: Per i caratteri anatomici sembra riferibile al genere *Iglica* (dati personali inediti). Distribuzione limitata a poche stazioni delle Prealpi bresciane e vicentine (*Bythiospeum* ? sensu Pezzoli, 1989 - Quad. civ. Staz. Idrobiol. Milano, 16: 43-69) (Pezzoli, 1988 - Mus. civ. Sci. nat. Brescia - Monogr. "Natura Bresciana", 9: 151 pp.; dati personali inediti).

Plagigeyeria sp.: Assegnazione generica dubbia. Entità conosciuta soltanto per le acque sotterranee del Fiume Timavo in VeneziaGiulia (Stoch & Dolce, 1994 - Atti Mem. Comm. Grotte "E. Boegan", 31: 59-71).

Phreatica bolei: Distribuzione limitata alle acque sotterranee del Friuli.

Moitessieria massoti: Le popolazioni sarde sono state attribuite a questa specie con riserva (Bodon & Giusti, 1991 - Malacologia, 33: 1-30).

Moitessieria simoniana: Specie diffusa nelle Alpi Marittime e Liguri e ritrovata anche in Emilia, in provincia di Piacenza (dati personali inediti).

Graziana alpestris: Specie usualmente citata come *Belgrandiella lacheineri* (Küster, 1855) e, più recentemente come *B. saxatilis* (De Reynies, 1844) (Pezzoli & Giusti, 1980 - Atti IV Congr. Soc. Malacol. ital. (Siena, 6-9 ottobre 1978): 319-351). Haase (1994 - Zool. J. Linn. Soc., 111: 219-246) ha separato le *Belgrandiella* italiane da *B. saxatilis* su base anatomica e da *B. lacheineri* su base elettroforetica. Inoltre, Haase (1994) ha assegnato le *Belgrandiella* italiane e *B. lacheineri* al genere *Graziana* Radoman, 1975. Si ritiene, in accordo con Pezzoli & Giusti (1980), che le *Belgrandiella* dell'Italia settentrionale centroccidentale costituiscano una sola entità per la quale il nome più vecchio disponibile è *Paludinella lacheineri* var. *alpestris* Frauenfeld, 1863. Fuori dai confini italiani è presente solo in Francia, nel dipartimento delle Alpes Maritimes, e nel Canton Ticino.

Graziana pupula: Specie solitamente assegnata al genere *Belgrandiella*; l'attribuzione al genere *Graziana* è basata su caratteri anatomici ed elettroforetici (Haase, 1994 - Zool. J. Linn. Soc., 111: 219-246).

Istriana mirnae: Specie endemica dell'Istria e limitata, in territorio italiano, a poche stazioni presso Trieste (Bodon & Giovannelli, 1993 - Gortania, Atti Mus. Friulano Stor. nat., 14: 195-206).

Arganiella pescei: Specie endemica dell'Appennino marchigiano, laziale ed abruzzese.

Hadziella anti: Il materiale italiano è stato, usualmente, attribuito ad *Hadziella ehippiostoma* Kušcer, 1932, ma questa entità sembra presente solo in una stazione della Venezia Giulia.

Hadziella diminuta: Specie nota per la Slovenia e presente, in Italia, solo nelle acque sotterranee del Fiume Isonzo (Bodon & Giovannelli, 1994 - Basteria, 58: 233-244).

Hadziella ehippiostoma: L'attribuzione a questa entità del materiale italiano, proveniente dalle acque sotterranee del Fiume Timavo, richiede ulteriori esami. La specie è conosciuta per la Slovenia.

Hauffenia subpiscinalis: Specie diffusa in Slovenia e nota, in Italia, solo per poche stazioni del Friuli-Venezia Giulia (Bodon & Giovannelli, 1993 - Gortania, Atti Mus. Friulano Stor. nat., 14: 195-206; 1994 - Basteria, 58: 233-244).

Sadleriana fluminensis: A S, la specie era segnalata in Toscana (Giusti, 1975 - Atti Soc. toscana Sci. nat. resid. Pisa Mem. Ser. B, 81: 248-258), dove risulta estinta; recentemente, è stata ritrovata nei dintorni di Rieti (dati personali inediti).

Orientalina callosa: Distribuzione limitata a poche sorgenti in Abruzzo (Bodon et al. 1991 - J. molluscan. Stud., 58: 83-92).

Belgrandia bonelliana: Specie nota, con certezza, solo per Sarteano, in Toscana meridionale.

Belgrandia latina: Specie descritta su materiale fossile e ritrovata vivente nei laghi di Bolsena e di Bracciano (dati personali inediti).

Belgrandia mariatheresia: L'esame conchiliologico di materiale tipico e topotipico e lo studio anatomico di esemplari topotipici di *Hydrobia minuscula* var. *curta* Paulucci, 1881 ha permesso di accertare una completa corrispondenza di questa entità con *Belgrandia mariatheresia* Giusti & Pezzoli, 1972. Si preferisce tuttavia, sul momento, non formalizzare la sinonimia non essendo chiaro se il nome proposto da Paulucci possa soddisfare i requisiti di validità. L'attribuzione generica di questa entità necessita di essere verificata.

Belgrandia minuscula: L'attribuzione generica di questa entità necessita di essere verificata.

Belgrandia thermalis: Specie presente a N solo in Liguria al confine con la Toscana e, probabilmente, in Friuli. La citazione di *Belgrandia gibba* (Draparnaud, 1805) per il territorio italiano è erronea, in quanto questa specie è stata segnalata solo per il Nizzardo.

Litthabittella chilodia: Specie balcanica presente in Puglia ed in Calabria (Bodon et al., in preparazione).

Alzoniella cornucopia: Attribuzione generica da verificare (Manganelli et al., 1995 - J. molluscan. Stud., 61: 173-184); endemica dell'acquifero dell'alto corso del Fiume Arbia in Toscana.

Alzoniella fabrianensis: Attribuzione generica dubbia (Manganelli et al., 1995 - J. molluscan. Stud., 61: 173-184); conosciuta solo per due stazioni nelle Marche ed in Umbria.

Alzoniella feneriensis: Distribuzione limitata ad una stazione del Monte Fenera in Piemonte (Giusti & Bodon, 1984 - Arch. Molluskenkd., 114: 157-181).

Alzoniella finalina: Distribuzione limitata alla Liguria occidentale (Giusti & Bodon, 1984 - Arch. Molluskenkd., 114: 157-181).

Alzoniella sigestra: Distribuzione limitata a poche stazioni a ponente di Genova (Giusti & Bodon, 1984 - Arch. Molluskenkd., 114: 157-181).

Alzoniella sp.: Distribuzione limitata alla Liguria orientale (Pezzoli, 1988 - Mus. civ. Sci. nat. Brescia - Monogr. "Natura Bresciana", 9: 151 pp.).

Fissuria sp.: Specie endemica della valle Scrivia e affluenti (Liguria-Piemonte) (Pezzoli, 1988 - Mus. civ. Sci. nat. Brescia - Monogr. "Natura Bresciana", 9: 151 pp.).

Pseudavenionia pedemontana: Distribuzione limitata al basso Piemonte ed alla Liguria occidentale (Bodon & Giusti, 1982 - Boll. malacol., 18: 41-56; Boato et al., 1985 - Lav. Soc. ital. Biogeogr. (N.S.), 9: 237-371).

Avenionia parvula: Distribuzione limitata alla Liguria orientale (Giusti & Bodon, 1981 - Arch. Molluskenkd., 111: 223-242; A. *parvula* partim sensu Pezzoli, 1988 - Mus. civ. Sci. nat. Brescia - Monogr. "Natura Bresciana", 9: 151 pp.).

Avenionia sp. 1: Distribuzione limitata alla Liguria centrale (Pezzoli, 1988 - Mus. civ. Sci. nat. Brescia - Monogr. "Natura Bresciana", 9: 151 pp.).

Avenionia sp. 2: Specie conosciuta solo per due stazioni delle Alpi Liguri (Pezzoli, 1988 - Mus. civ. Sci. nat. Brescia - Monogr. "Natura Bresciana", 9: 151 pp.).

Pezzolia radapalladis: Specie endemica della Liguria orientale (Bodon & Giusti, 1986 - Arch. Molluskenkd., 117: 61-71).

Pezzolia sp. 1: Distribuzione limitata alla Liguria orientale (Pezzoli, 1988 - Mus. civ. Sci. nat. Brescia - Monogr. "Natura Bresciana", 9: 151 pp.).

Pezzolia sp. 2: Distribuzione limitata alla Liguria orientale (Pezzoli, 1988 - Mus. civ. Sci. nat. Brescia - Monogr. "Natura Bresciana", 9: 151 pp.).

Islamia gaiteri: Specie endemica dell'Isola d'Elba (Bodon et al., 1995 - J. molluscan Stud., 61: 43-54).

Islamia sp. 1: Specie probabilmente endemica della Lombardia e del Veneto (*Islamia* sp. forma A sensu Giusti et al., 1981 - Lav. Soc. malacol. Ital. Atti del V Convegno (Salice Terme, Pavia, 9-11.5.1981), [20]: 49-71).

Islamia sp. 2: Specie conosciuta solo per una sorgente del Lazio (*Islamia* sp. forma B sensu Giusti et al., 1981 - Lav. Soc. malacol. Ital. Atti del V Convegno (Salice Terme, Pavia, 9-11.5.1981), [20]: 49-71).

Islamia sp. 3: Gruppo eterogeneo, comprendente più entità diffuse in Toscana (*Islamia* sp. forma C sensu cf. Giusti et al., 1981 - Lav. Soc. malacol. Ital. Atti del V Convegno (Salice Terme, Pavia, 9-11.5.1981), [20]: 49-71).

Islamia sp. 4: Specie diffusa, a N, nell'Appennino piemontese ed emiliano ed in Liguria orientale e, a S, in Toscana (Pezzoli, 1988 - Mus. civ. Sci. nat. Brescia - Monogr. "Natura Bresciana", 9: 151 pp.).

Potamopyrgus antipodarum: Specie importata dalla Nuova Zelanda (Ponder, 1988 - J. molluscan Stud., 54: 271-285). Le prime segnalazioni per l'Europa risalgono alla fine del secolo scorso. In Italia è stata segnalata a partire dal 1961, nel Fiume Roia (Berner, 1963 - Arch. Molluskenkd., 92: 19-29). Attualmente è stata accertata in diverse regioni (Modena & Turin, 1991 - Boll. Malacol., 27: 141-143) e risulta, quindi, in fase di rapida diffusione (Favilli et al., in preparazione). Segnalata anche in acque salmastre ma, in Italia, non si hanno dati certi per tali ambienti.

Heleobia aponensis: Distribuzione limitata alle acque termali dei Colli Euganei.

Heleobia foxianensis: Entità incerta, limitata a poche stazioni delle Alpi Apuane.

Heleobia spinellii: Entità incerta, segnalata per poche stazioni tra il Lago di Garda ed il Lago d'Idro.

Heleobia stagnorum: Le popolazioni partenogenetiche, viventi nell'area costiera del Mediterraneo, sono state riferite a questa entità (Giusti & Pezzoli, 1984 - Lav. Soc. ital. Malacol. (Atti del Simposio di Bologna, 24-26.9.1982), 21: 117-148). Tuttavia è possibile che queste possano non corrispondere geneticamente alle popolazioni gonocoriche nordeuropee (Giusti & Manganelli, 1992 - Proc. ninth int. malacol. Congr. (Edinburgh, 31 August - 6 September 1986): 153-172). Specie presente nelle acque costiere, dolci o a debole salinità.

Bythinella schmidtii: Lo status tassonomico di *Bythinella dodderleini* Benoit, 1882 è incerto. Da ciò deriva che la presenza di una specie di *Bythinella* in Sicilia non può, al momento, essere confermata. Il "correct original spelling" del nome specifico è "schmidtii" non "schmidtii", disponibile in accordo all'Art. 31a(i) dell'ICZN (1985); "schmidtii" è, invece, un "incorrect subsequent spelling" (ICZN, 1985: Art. 33d).

Pyrgulidae

Pyrgula De Cristofori & Jan, 1832

Pyrgula annulata (Linnaeus, 1767) (N) (M)

Emmericiidae

Emmericia Brusina, 1870

Emmericia patula (Brumati, 1838) (N, S) (*)

Note

Emmericia: Ponder & Waren (1988 - Malacol. Rev., Suppl. 4: 288-326.) considerano Emmericiidae un sinonimo di Hydrobiidae. Considerate le rimarchevoli peculiarità anatomiche di *Emmericia* il suo inquadramento negli Hydrobiidae lascia molte perplessità.

Emmericia patula: La presenza, a S, è limitata al Lago di Piediluco (Cianfanelli et al., 1991 - Boll. malacol., 27: 15-19), e potrebbe essere dovuta ad una recente importazione.

Truncatellidae

Truncatella Risso, 1826

Truncatella subcylindrica (Linnaeus, 1767) (3, 4, 5)

Assimineidae

Assimineia Fleming, 1828

Assimineia grayana Fleming, 1828 (*)

Paludinella Pfeiffer, 1841

Paludinella littorina (Delle Chiaje, 1828) (3, 5)

Paludinella sicana (Brugnone, 1876) (3, 5)

Note

Assimineia grayana: Cesari (1988 - Boll. Mus. civ. Stor. nat. Venezia, 38: 7-42) riporta *Assimineia* cf. *grayana* per la laguna veneta. Probabilmente si tratta di una specie recentemente introdotta.

Iravadiidae

Ceratia H. Adams & A. Adams, 1852

Ceratia proxima (Forbes & Hanley, 1850) (3, 4, 5)

Hyala H. Adams & A. Adams, 1852

*Hyal*a vitrea (Montagu, 1803) (3, 4, 5)

Elachisinidae

Laeviphitus van Aartsen, Bogi & Giusti, 1989

Laeviphitus verduini van Aartsen, Bogi & Giusti, 1989 (3) (E)

Tornidae

Tornus Turton & Kingston, 1830

Tornus subcarinatus (Montagu, 1803) (3, 4, 5)

Caecidae

Caecum Fleming, 1813

Caecum auriculatum De Folin, 1868 (3, 4, 5)

Caecum clarkii Carpenter, 1858 (3, 5)

Caecum subannulatum De Folin, 1870 (3, 4, 5)

Caecum trachea (Montagu, 1803) (3, 4, 5)

Parastrophia De Folin in De Folin & Perier, 1869

Parastrophia asturiana De Folin, 1870 (3, 5)

Rissooidea i.s.

Circulus Jeffreys, 1865

Circulus striatus (Philippi, 1836) (3, 4, 5)

Circulus tricarinatus (Wood, 1848) (3, 4, 5) (*)

Cyclostremiscus Pilsbry & Olsson, 1945

Cyclostremiscus dariae Liuzzi & Stolfi-Zucchi, 1979 (3, 4) (E) (*)

Skeneoides Warén, 1992

Skeneoides exilissima (Philippi, 1844) (3, 5)

Skeneoides jeffreysi (Monterosato, 1872) (3, 4, 5)

Note

Circulus: La posizione sistematica di questo genere appare alquanto dubbia. Viene provvisoriamente incluso in questa lista pur essendo possibile una sua affinità con Archaeogastropoda o Heterobranchia, e quindi lontano dai Caenogastropoda Rissooidea.

Circulus tricarinatus: L'identificazione degli esemplari recenti mediterranei con la specie di Wood (fossile del Crag inglese) appare dubbia.

Cyclostremiscus dariae: Bonfitto et al. (1994 - Boll. malacol., 30: 141-157) hanno proposto di assegnare provvisoriamente questa specie al genere Orbitestella (Fam. Orbitestellidae), a causa delle sua affinità con alcuni eterobranchi eterostrofi.

Skeneoides: La posizione sistematica di questo genere appare alquanto dubbia. Viene provvisoriamente incluso in questa lista pur essendo possibile una sua affinità con Archaeogastropoda o Heterobranchia, e quindi lontano dai Caenogastropoda Rissooidea.

Aporrhaidae

Aporrhais Da Costa, 1778

Aporrhais pespelecani (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Aporrhais serresianus (Michaud, 1828) (3, 4, 5)

Vanikoridae

Megalomphalus Brusina, 1875

Megalomphalus azonus (Brusina, 1865) (3, 4, 5)

Megalomphalus disciformis (Granata-Grillo, 1877) (3)

Megalomphalus petitianus (Tiberi, 1869) (3)

Talassia Warén & Bouchet, 1988

Talassia dagueneti (De Folin, 1873) (3, 5)

Calyptraeidae

Calyptraea Lamarck, 1799

Calyptraea chinensis (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Crepidula Lamarck, 1799

Crepidula fornicata (Linnaeus, 1758) (3)

Crepidula gibbosa DeFrance, 1818 (3, 5)

Crepidula unguiformis Lamarck, 1822 (3, 4, 5)

Capulidae

Capulus Montfort, 1810

Capulus ungaricus (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Xenophoridae

Xenophora Fischer von Waldheim, 1807

Xenophora crispa (Koenig, 1825) (3, 5)

Vermetidae

Vermetus (**Vermetus**) Cuvier, 1800

Vermetus (*Vermetus*) *cristatus* Biondi, 1857 (3, 5)

Vermetus (*Vermetus*) *rugulosus* Monterosato, 1878 (3, 5)

Vermetus (*Vermetus*) *triquetrus* Ant. Bivona, 1832 (3, 4, 5)

Vermetus (**Thylacodus**) Moersch, 1862

Vermetus (*Thylacodus*) *granulatus* (Gravenhorst, 1831) (3, 5)

Vermetus (*Thylacodus*) *semisurrectus* Ant. Bivona, 1832 (3, 5)

Dendropoma Moersch, 1862

Dendropoma petraeum (Monterosato, 1884) (3, 5)

Petalconchus (**Macrophragma**) Carpenter, 1857

Petalconchus (*Macrophragma*) *glomeratus* (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Serpulorbis Sassi, 1827

Serpulorbis arenaria (Linnaeus, 1767) (3, 4, 5)

Cypraeidae

Erosaria Troschel, 1863

Erosaria spurca (Linnaeus, 1758) (3, 5)

Luria Jousseaume, 1884

Luria lurida (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Schilderia Tomlin, 1930

Schilderia achatidea (Gray in G.B. Sowerby II, 1837) (3)

Zonaria Jousseaume, 1884

Zonaria pyrum (Gmelin, 1791) (3, 4, 5)

Ovulidae

Aperiovula Cate, 1973

Aperiovula adriatica (G.B. Sowerby I, 1828) (3, 4, 5)

Neosimnia P. Fischer, 1884

Neosimnia spelta (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Pseudosimnia Schilder, 1927

Pseudosimnia carnea (Poiret, 1789) (3, 5)

Simnia Risso, 1826

Simnia nicaeensis Risso, 1826 (3, 5)

Simnia purpurea Risso, 1826 (3)

Pedicularia Swainson, 1840

Pedicularia sicula Swainson, 1840 (3, 5)

Triviidae

Trivia J.E. Gray, 1837

Trivia arctica (Pulteney, 1789) (3, 4, 5)

Trivia monacha (Da Costa, 1778) (5)

Trivia multilirata (G.B. Sowerby II, 1870) (4)

Trivia pulex (Solander in J.E. Gray, 1828) (3, 5)

Erato Risso, 1826

Erato voluta (Montagu, 1803) (3, 4, 5)

Lamellariidae

Lamellaria Montagu, 1815

Lamellaria latens (O.F. Müller, 1776) (3)

Lamellaria perspicua (Linnaeus, 1758) (3, 5)

Naticidae

***Natica* (*Natica*)** Scopoli, 1777

Natica (*Natica*) *dillwynii* Payraudeau, 1826 (3, 4, 5)

***Natica* (*Naticarius*)** Duméril, 1806

Natica (*Naticarius*) *hebraea* (Martyn, 1784) (3, 4, 5)

Natica (*Naticarius*) *stercusmuscarum* (Gmelin, 1791) (3, 4, 5)

Cryptonatica Dall, 1892

Cryptonatica operculata (Jeffreys, 1885) (3, 5)

Tectonatica Sacco, 1890

Tectonatica filosa Philippi, 1845 (3, 5)

Tectonatica settepassii Gaglini in Settepassi, 1985 (3)

Tectonatica rizzae (Philippi, 1844) (3)

Euspira Agassiz, 1838

Euspira grossularia (Marche-Marchad, 1957) (3)

Polinices Montfort, 1810

Polinices catena (Da Costa, 1778) (3, 5)

Polinices fusca (Blainville, 1825) (3, 5)

Polinices guillemini (Payraudeau, 1826) (3, 5)

Polinices macilenta (Philippi, 1844) (3, 4, 5)

Polinices nitida (Donovan, 1804) (3, 4, 5)

Neverita Risso, 1826

Neverita josephinia Risso, 1826 (3, 4, 5)

Payraudeautia Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1883

Payraudeautia intricata (Donovan, 1804) (3, 4, 5)

Cassidae

Galeodea Link, 1807

Galeodea echinophora (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Galeodea rugosa (Linnaeus, 1771) (3, 5)

Phalium Link, 1807

Phalium granulatum (Born, 1778) (3, 5)

Phalium saburon (Bruguère, 1792) (3, 5)

Tonnidae

Tonna Brünnich, 1771

Tonna galea (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Eudolium Dall, 1889

Eudolium bairdii (Verril & Smith, 1881) (3, 5)

Eudolium crosseanum (Monterosato, 1869) (3)

Ranellidae

Ranella J.E. Gray, 1854

Ranella olearia (Linnaeus, 1758) (3, 5)

Cymatium (Monoplex) Perry, 1811

Cymatium (Monoplex) corrugatum (Lamarck, 1816)

Cymatium (Monoplex) corrugatum corrugatum (Lamarck, 1816) (3, 5)

Cymatium (Monoplex) parthenopeum (Salis Marschlins, 1793)

Cymatium (Monoplex) parthenopeum parthenopeum (Salis Marschlins, 1793) (3, 5)

Cabestana Roeding, 1798

Cabestana cutacea (Linnaeus, 1767)

Cabestana cutacea cutacea (Linnaeus, 1767) (3, 5)

Charonia Gistel, 1848

Charonia lampas (Linnaeus, 1758)

Charonia lampas lampas (Linnaeus, 1758) (3, 5)

Charonia tritonis (Linnaeus, 1758)

Charonia tritonis variegata (Lamarck, 1816) (5)

Bursidae

Bursa Roeding, 1798

Bursa scrobilator Linnaeus, 1758

Bursa scrobilator scrobilator Linnaeus, 1758 (3, 5)

Atlantidae

Atlanta Lesueur, 1817

Atlanta brunnea Gray, 1850 (3, 5) (*)

Atlanta helicinoides Souleyet, 1852 (3, 5?) (*)

Atlanta inclinata Souleyet, 1852 (3?) (*)

Atlanta inflata Souleyet, 1852 (3, 4, 5) (*)

Atlanta lesueurii Souleyet, 1852 (3, 4?, 5) (*)

Atlanta peresi Frontier, 1966 (5?) (*)

Atlanta peronii Lesueur, 1817 (3, 4, 5)

Oxygyrus Benson, 1835

Oxygyrus keraudrenii (Lesueur, 1817) (3, 4, 5)

Protatlanta Tesch, 1908

Protatlanta mediterranea Issel, 1915 (3?, 5) (*)

Protatlanta souleyeti (Smith, 1888) (3?, 5) (*)

Note

Atlanta brunnea: Il nome *Atlanta brunnea* Gray, 1850, convalidato da Tesch (1949 - Dana rep., 34: 1-55), ha la priorità su quello di *Atlanta fusca* Souleyet, 1852.

Atlanta helicinoides: Tenuto conto dell'omeomorfia tra *Atlanta helicinoides* ed *A. lesueurii* Souleyet, 1852 è possibile che le due specie siano state confuse l'una con l'altra. È, quindi, difficile definire la distribuzione della specie in questione che, vivente, è nota con certezza solo per il Tirreno.

Atlanta inclinata: Nel Tirreno sono note solo poche conchiglie vuote.

Atlanta inflata: In attesa di una revisione tassonomico-nomenclaturistica si consiglia di

continuare ad usare questo nome, anche se *Atlanta inflata* Souleyet, 1852 è preoccupato da *A. inflata* D'Orbigny, 1836 (Giovine, 1987 - La Conchiglia, 19 (218-219): 22-23). La specie è nota vivente solo nello Stretto di Messina e nel Golfo di Napoli.

Atlanta lesueurii: In attesa di una revisione tassonomico-nomenclaturistica si consiglia di continuare ad usare questo nome anche se *Atlanta lesueurii* Souleyet, 1852 è preoccupato da *A. lesueurii* D'Orbigny, 1836 (Giovine, 1987 - La Conchiglia, 19 (218-219): 22-23). La specie è estremamente simile ad *A. helicinoides*, per cui è possibile che le due specie siano state confuse l'una con l'altra. Anche in questo caso è, quindi, difficile definire la distribuzione della specie in esame. La specie è nota vivente solo nello Stretto di Messina e nel Golfo di Napoli.

Atlanta peresi: *Atlanta peresi* è, probabilmente, un sinonimo più giovane di *A. steindachneri* Oberwimmer, 1899. Quest'ultima, descritta per lo Jonio, è attualmente considerata, forse erroneamente, un sinonimo più giovane di *A. peronii* Lesueur, 1817.

Protatlanta mediterranea: Si ritiene di seguire Di Geronimo (1970 - Thal. salentina, 4: 41-115) nel considerare *Protatlanta sculpta* var. *mediterranea* Issel, 1915 una specie a sé stante.

Quest'ultima vive in simpatria con *P. souleyeti* (Smith, 1888) da cui si distingue per la morfologia della conchiglia. La specie è stata raccolta vivente solo nello Stretto di Messina.

Protatlanta souleyeti: Specie cosmopolita, nel Mediterraneo era sinora nota esclusivamente per il mare di Alboran (Tesch, 1949 - Dana rep., 34: 1-55). Un esemplare vivente è stato recentemente raccolto nello Stretto di Messina (Giovine, in prep.).

Carinariidae

Carinaria Lamarck, 1801

Carinaria lamarckii Peron & Lesueur, 1810 (3, 5)

Pterotracheidae

Firoloida Lesueur, 1817

Firoloida desmarestia Lesueur, 1817 (3, 5) (*)

Pterotrachea Forskål, 1775

Pterotrachea coronata Forskål, 1776 (3, 4, 5)

Pterotrachea frederica (Lesueur & Peron, 1817) sensu Philippi, 1836 (5) (*)

Pterotrachea hippocampus Philippi, 1836 (3, 5)

Pterotrachea minuta Bonnevie, 1920 (3, 5) (*)

Pterotrachea mutica (Lesueur & Peron, 1817) (3?, 5) (*)

Pterotrachea scutata Gegenbaur, 1855 (3, 5) (*)

Note

Firoloida: Sabelli et al. (1992) riferiscono dell'esistenza di un sinonimo più antico di *Pterotracheidae* Gray, 1840: *Firolidae* Bruguière, 1829, basato su di un più giovane sinonimo di *Pterotrachea*, *Firola* Bruguière, 1791. In accordo con l'Art. 23b dell'ICZN si ravvisa

l'opportunità di sottoporre il caso alla Commissione e si preferisce qui mantenere il nome Pterotracheidae, universalmente e coerentemente utilizzato da praticamente tutti gli autori.

Firoloida desmarestia: Specie frequentemente segnalata nel Mediterraneo sulla base del ritrovamento di conchiglie larvali in fanghi profondi. Tuttavia, gli esemplari viventi sono molto rari. Ciò fa sospettare che le segnalazioni effettuate sulla base delle conchiglie larvali siano erranee.

Pterotrachea: Le specie di questo genere sono di difficile determinazione su esemplari conservati in alcool o in formalina.

Pterotrachea frederica: Specie dubbia, attualmente ritenuta un sinonimo più giovane di *Pterotrachea hippocampus* Philippi, 1836. La ridescrizione fornita da Philippi (1836) suggerisce, tuttavia, che essa sia una specie distinta. È comune nello Stretto di Messina.

Pterotrachea minuta: Specie dubbia, probabilmente basata su esemplari giovanili di *Pterotrachea hippocampus* Philippi, 1836 (Seapy, 1985 - Malacologia, 26: 125-135).

Pterotrachea mutica: Malgrado la descrizione originale sia piuttosto carente, esistono ottime ridescrizioni basate su materiale vivente, che non lasciano dubbi sulla sua validità. È la specie più comune della famiglia.

Pterotrachea scutata: Esistono delle sostanziali differenze tra la diagnosi e l'iconografia originali e la ridescrizione proposta da Tesch (1949 - Dana rep., 34: 1-55), quest'ultima accolta, per riferimento, da tutti i successivi autori. Peraltro, un'entità corrispondente alla descrizione originale non è mai stata, a tutt'oggi, ritrovata.

Cerithiopsidae

Cerithiopsis Forbes & Hanley, 1851

- Cerithiopsis acuminata* Hallgass, 1985 (3)
- Cerithiopsis atalaya* Watson, 1874 (3, 4)
- Cerithiopsis barleei* Jeffreys, 1867 (3)
- Cerithiopsis contigua* Monterosato, 1878 (3)
- Cerithiopsis diadema* Monterosato, 1874 (3, 4)
- Cerithiopsis fayalensis* Watson, 1886 (3)
- Cerithiopsis jeffreysi* Watson, 1885 (3, 4, 5)
- Cerithiopsis minima* (Brusina, 1865) (3)
- Cerithiopsis nana* Jeffreys, 1867 (3, 4, 5)
- Cerithiopsis nofronii* Amati, 1987 (3)
- Cerithiopsis tiara* Monterosato, 1874 (3, 5)
- Cerithiopsis tubercularis* (Montagu, 1803) (3, 4, 5)
- Cerithiopsis urioi* Hallgass, 1985 (3, 5)

Cerithiella Verrill, 1882

- Cerithiella metula* (Lovén, 1846) (5)

Dizoniopsis Sacco in Bellardi Sacco, 1895

- Dizoniopsis bilineata* (Hoernes, 1848) (3, 5)
- Dizoniopsis clarkii* (Forbes in Hanley, 1851) (3)

Dizoniopsis coppolae (Aradas, 1870) (3)

Seila A. Adams, 1861

Seila trilineata (Philippi, 1836) (3, 5)

Triphoridae

Cheirodonta Marshall, 1983

Cheirodonta pallescens (Jeffreys, 1867) (3, 4, 5)

Cosmotriphora Olsson & Harbison, 1953

Cosmotriphora pseudocanarica Bouchet, 1985 (3, 5)

Marshallora Bouchet, 1984

Marshallora adversa (Montagu, 1803) (3, 4, 5)

Monophorus Granata Grillo, 1877

Monophorus erythrosoma (Bouchet & Guillemot, 1978) (3)

Monophorus perversus (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Monophorus thiriotae Bouchet, 1984 (3)

Obesula Jousseaume, 1897

Obesula marinostri Bouchet, 1985 (3, 4, 5)

Similiphora Bouchet, 1984

Similiphora similior (Bouchet & Guillemot, 1978) (3, 5)

Strobiligera Dall, 1924

Strobiligera brychia (Bouchet & Guillemot, 1978) (3, 5)

Strobiligera flammulata Bouchet & Warén, 1993 (3, 5)

Metaxia Monterosato, 1884

Metaxia metaxa (Delle Chiaje, 1828) (3, 4, 5)

Epitoniidae

Epitonium Roeding, 1798

Epitonium aculeatum (Allan, 1818) (3, 4)
Epitonium algerianum (Weinkauff, 1866) (3, 5)
Epitonium celesti (Aradas, 1854) (3, 4, 5)
Epitonium clathratulum (Kanmacher, 1798) (3)
Epitonium commune (Lamarck., 1822) (3, 4, 5)
Epitonium dendrophylliae Bouchet & Warén, 1986 (3, 5)
Epitonium hispidulum (Monterosato, 1874) (3, 5)
Epitonium linctum (De Boury & Monterosato, 1890) (3, 5)
Epitonium pseudonatum Bouchet & Warén, 1986 (3, 5)
Epitonium pulchellum (Ant. Bivona, 1832) (3, 5)
Epitonium striatissimum (Monterosato, 1878) (3, 5)
Epitonium tiberii (De Boury, 1890) (3, 5)
Epitonium tryoni (De Boury, 1913) (3, 5)
Epitonium turtoni (Turton, 1819) (3, 4, 5)

Acirsa Moerch, 1857

Acirsa subdecussata (Cantraine, 1835) (3, 5)

Acrilloscala Sacco, 1891

Acrilloscala lamyi (De Boury, 1909) (3)

Gyroscala De Boury, 1887

Gyroscala lamellosa (Lamarck, 1822) (3, 5)

Opalia (Dentiscala) De Boury, 1887

Opalia (Dentiscala) crenata (Linnaeus, 1758) (3, 5)

Opalia (Nodiscala) De Boury, 1889

Opalia (Nodiscala) abbotti Clench & Turner, 1952 (3, 4, 5)

Opalia (Nodiscala) hellenica (Forbes, 1844) (3, 5)

Punctiscala De Boury, 1890

Punctiscala cerigottana (Sturany, 1896) (3, 5)

Iphitus Jeffreys, 1883

Iphitus tuberatus Jeffreys, 1883 (5)

Narrimania Taviani, 1984

Narrimania concinna (Sykes, 1925) (5)

Papuliscala De Boury, 1911

Papuliscala tavianii Bouchet & Warén, 1986 (3, 4, 5)

Janthinidae

Janthina Roeding, 1798

Janthina janthina (Linnaeus, 1758) (3, 5)

Janthina nitens Menke, 1828 (3, 5)

Janthina pallida Thompson, 1840 (3, 5)

Acilididae

Aclis Lovén, 1846

Aclis ascaris (Turton, 1819) (3, 4)

Aclis attenuans Jeffreys, 1883 (3, 4, 5)

Aclis gulsonae (W.Clark, 1850) (3, 4)

Aclis minor (Brown, 1827) (3, 4, 5)

Cima Chaster, 1898

Cima cylindrica (Jeffreys, 1856) (3)

Cima minima (Jeffreys, 1858) (3)

Graphis Jeffreys, 1867

Graphis albida (Kanmacher, 1798) (3, 5)

Graphis gracilis (Monterosato, 1874) (3, 4)

Eulimidae

Eulima Risso, 1826

Eulima bilineata Alder, 1848 (3, 4, 5)

Eulima cionella Monterosato, 1878 (3)

Eulima glabra (Da Costa, 1778) (3, 4, 5)

Eulima leptozona Dautzenberg & P. Fischer, 1896 (5)

Auriculigerina Dautzenberg, 1925

Auriculigerina miranda Dautzenberg, 1925 (5)

Campylorhaphion Bouchet & Warén, 1986

Campylorhaphion famelicum (Watson, 1883) (3)

Crinophtheiros Bouchet & Warén, 1986

Crinophtheiros comatulicola (Graff, 1875) (3)

Crinophtheiros giustii Gaglioli, 1991 (3)

Entoconcha Müller, 1852

Entoconcha mirabilis Müller, 1852 (4)

Ersilia Monterosato, 1872

Ersilia mediterranea (Monterosato, 1869) (3, 5)

Fusceulima Laseron, 1955

Fusceulima minuta (Jeffreys, 1884) (3, 5)

Haliella Monterosato, 1878

Haliella stenostoma (Jeffreys, 1858) (3, 4, 5)

Halielloides Bouchet & Warén, 1986

Halielloides fragilis Bouchet & Warén, 1986 (5)

Melanella Bowdich, 1822

Melanella alba (Da Costa, 1778) (3, 5)

Melanella boscii (Payraudeau, 1827) (3, 4, 5)

Melanella compactilis (Monterosato, 1884) (3, 4, 5)

Melanella frielei (Jordan, 1895) (3)

Melanella glypta Bouchet & Warén, 1986 (5)

Melanella lineata (Monterosato, 1869) (3, 5)

Melanella lubrica (Monterosato, 1890) (3)

Melanella microsculpta Bouchet & Warén, 1986 (5)

Melanella monterosatoi (Monterosato, 1890) (3)

Melanella petitiiana (Brusina, 1869) (3)

Melanella polita (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Melanella praecurta (Pallary, 1904) (3)

Melanella spiridioni (Dautzenberg & P. Fischer, 1896) (3, 5)

Melanella stalioti (Brusina, 1869) (3, 5)

Melanella translucens (Brusina in Monterosato, 1890) (3)

Oceanida De Folin, 1870

Oceanida confluens Bouchet & Warén, 1986 (5)

Parvioris Warén, 1981

Parvioris microstoma (Brusina, 1864) (3, 5)

Parvioris nana (Monterosato, 1878) (3)

Pelseneeria Koehler & Vaney, 1908

Pelseneeria minor Koehler & Vaney, 1908 (3, 5)

Sabinella Monterosato, 1890

Sabinella piriformis Brugnone, 1873 (3, 5)

Sticteulima Laseyron, 1955

Sticteulima jeffreysiana (Brusina, 1869) (3, 4, 5)

Vitreolina Monterosato, 1884

Vitreolina antiflexa Monterosato, 1884 (3, 5)

Vitreolina curva (Monterosato, 1874) (3, 4, 5)

Vitreolina incurva (Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1883) (3, 5)

Vitreolina philippi (Rayneval & Ponzi, 1854) (3, 5)

Neogastropoda

Muricidae

Bolinus Pusch, 1837

Bolinus brandaris (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Dermomurex Monterosato, 1890

Dermomurex scalaroides (Blainville, 1829) (3, 4, 5)

Hadriania Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1882

Hadriania oretea (De Gregorio, 1885) (3, 4, 5)

Hexaplex Perry, 1811

Hexaplex trunculus (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Murexsul Iredale, 1915

Murexsul aradasii (Poirier, 1883) (3, 5)

Muricopsis Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1882

Muricopsis cristata (Brocchi, 1814) (3, 4, 5)

Ocenebra J.E. Gray, 1847

Ocenebra erinaceus (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Ocinebrina Jousseaume, 1880

Ocinebrina aciculata (Lamarck, 1822) (3, 4, 5)

Ocinebrina edwardsii (Payraudeau, 1826) (3, 4, 5)

Ocinebrina hybrida (Aradas & Benoit, 1876) (3)

Trophon Montfort, 1810

Trophon barvicensis (Johnston, 1825) (3, 4, 5)

Trophon echinatus (Kiener, 1840) (3, 5)

Trophon muricatus (Montagu, 1803) (3, 5)

Typhinellus Jousseaume, 1880

Typhinellus sowerbyi (Broderip, 1833) (3, 4, 5)

Orania Pallary, 1900

Orania fusulus (Brocchi, 1814) (3)

Rapana Schumacher, 1817

Rapana venosa (Valenciennes, 1846) (3, 4) (*)

Stramonita Schumacher, 1817

Stramonita haemastoma (Linnaeus, 1766) (3, 4, 5)

Coralliophila H. Adams & A. Adams, 1853

Coralliophila brevis (Blainville, 1832) (3, 5)

Coralliophila meyendorffii (Calcara, 1845) (3, 5)

Coralliophila panormitana (Monterosato, 1869) (3, 5)

Coralliophila richardi (P. Fischer, 1882) (3, 5)

Coralliophila serrata (Coen, 1929) (3, 5)

Coralliophila sofiae (Aradas & Benoit, 1876) (3, 5)
Coralliophila squamosa (Bivona, 1838) (3, 4, 5)

Latiaxis Swainson, 1840

Latiaxis amaliae (Kobelt, 1907) (3, 5)
Latiaxis babelis (Requién, 1848) (3, 5)

Note

Rapana venosa: Specie introdotta.

Buccinidae

Buccinulum Deshayes, 1830

Buccinulum corneum (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Chauvetia Monterosato, 1884

Chauvetia brunnea (Donovan, 1804) (3, 5)
Chauvetia candidissima (Philippi, 1836) (3, 5)
Chauvetia lefebvrei (Maravigna, 1840) (3, 5)
Chauvetia lineolata (Tiberi, 1868) (3, 5)
Chauvetia mamillata (Risso, 1826) (3)
Chauvetia procerula Monterosato, 1889 (3, 5)
Chauvetia recondita (Brugnone, 1873) (3, 5)
Chauvetia turritellata (Deshayes, 1835) (3, 5)
Chauvetia ventrosa F. Nordsieck, 1976 (3, 5)

Colubraria Schumacher, 1817

Colubraria reticulata (Blainville, 1826) (3, 5)

Engina J.E. Gray, 1839

Engina leucozona (Philippi, 1843) (3, 5)

Pisania Ant. Bivona, 1832

Pisania striata (Gmelin, 1791) (3, 4, 5)

Polia J.E. Gray in G.B. Sowerby I, 1834

Polia dorbignyi (Payraudeau, 1826) (3, 4, 5)
Polia scabra Locard, 1886 (3, 5)
Polia scacchiana (Philippi, 1844) (3, 5)

Nassarius (Nassarius) Duméril, 1806

Nassarius (Nassarius) turulosus (Risso, 1826) (5)

Nassarius (Gussonea) Monterosato, 1912

Nassarius (Gussonea) corniculus (Olivi, 1792) (3, 4, 5)

Nassarius (Gussonea) tinei (Maravigna in Guérin, 1840) (3)

Nassarius (Hima) Leach in J.E. Gray, 1852

Nassarius (Hima) incrassatus (Stroem, 1768) (3, 4, 5)

Nassarius (Hima) pygmaeus (Lamarck, 1822) (3, 4)

Nassarius (Hinia) Leach in J.E. Gray, 1847

Nassarius (Hinia) reticulatus (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Nassarius (Naytiopsis) Thiele, 1929

Nassarius (Naytiopsis) granum (Lamarck, 1822) (3, 5)

Nassarius (Sphaeronassa) Locard, 1886

Nassarius (Sphaeronassa) mutabilis (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Nassarius (Telasco) H. Adams & A. Adams, 1853

Nassarius (Telasco) costulatus Brocchi, 1814

Nassarius (Telasco) costulatus cuvierii (Payraudeau, 1826) (3, 4, 5)

Nassarius (Uzita) H. Adams & A. Adams, 1853

Nassarius (Uzita) lima (Dillwin, 1817) (3, 4, 5)

Cyclope (Cyclope) Risso, 1826

Cyclope (Cyclope) neritea (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Cyclope (Cyclope) pellucida Risso, 1826 (3, 5)

Fasciolaria Lamarck, 1799

Fasciolaria lignaria (Linnaeus, 1758) (3, 5)

Fusinus (Fusinus) Rafinesque, 1815

Fusinus (Fusinus) pulchellus (Philippi, 1844) (3, 4, 5)

Fusinus (Fusinus) rostratus (Olivi, 1792) (3, 4, 5)

Fusinus (Barbarofusus) Grabau & Shimer, 1909

Fusinus (Barbarofusus) rudis (Philippi, 1844) (3, 4)

Fusinus (Aptyxis) Troschel, 1868

Fusinus (Aptyxis) syracusanus (Linnaeus, 1758) (3, 5)

Columbellidae

Columbella Lamarck, 1799

Columbella rustica (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Amphissa H. Adams & A. Adams, 1853

Amphissa acutocostata (Philippi, 1844) (3, 5)

Mitrella Risso, 1826

Mitrella coccinea (Philippi, 1836) (3, 4, 5)

Mitrella decollata (Brusina, 1865) (3, 5)

Mitrella gervillii (Payraudeau, 1826) (3, 5)

Mitrella minor (Scacchi, 1836) (3, 4, 5)

Mitrella pallaryi (Dautzenberg, 1927) (3, 5)

Mitrella scripta (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Mitrella vatovai (Coen, 1933) (4)

Marginellidae

Gibberula Swainson, 1840

Gibberula miliaria (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Gibberula philippii (Monterosato, 1878) (3, 4, 5)

Gibberula recondita Monterosato, 1884 (3, 5)

Gibberula turgidula (Locard & Caziot, 1900) (3)

Volvarina Hinds, 1844

Volvarina mitrella (Risso, 1826) (3, 5)

Granulina Jousseaume, 1888

Granulina boucheti Gofàs, 1992 (3, 5)

Granulina marginata (Bivona, 1832) (3, 4, 5)
Granulina occulta (Monterosato, 1869) (3, 5)

Mitridae

Mitra Lamarck, 1798

Mitra cornicula (Linnaeus, 1758) (3, 5)
Mitra nigra (Gmelin, 1791) (3, 5)
Mitra zonata Marryat, 1818 (3, 4, 5)

Costellariidae

Vexillum (*Pusia*) Swainson, 1840

Vexillum (*Pusia*) *ebenus* (Lamarck, 1811) (3, 4, 5)
Vexillum (*Pusia*) *littorale* (Forbes, 1844) (3, 4, 5)
Vexillum (*Pusia*) *savignyi* (Payraudeau, 1826) (3, 4, 5)
Vexillum (*Pusia*) *tricolor* (Gmelin, 1791) (3, 4, 5)

Cancellariidae

Cancellaria (*Cancellaria*) Lamarck, 1799

Cancellaria (*Cancellaria*) *cancellata* (Linnaeus, 1767) (3, 5)

Cancellaria (*Sveltia*) Jousseaume, 1887

Cancellaria (*Sveltia*) *coronata* Scacchi, 1835 (5)

Conidae

Conus Linnaeus, 1758

Conus mediterraneus Hwass in Bruguière, 1792 (3, 4, 5)

Turridae

Fusiturris Swainson, 1840

Fusiturris similis (Ant. Bivona, 1838) (5)
Fusiturris undatiruga (Ant. Bivona in And. Bivona, 1838) (5)

Bela Leach in J.E. Gray, 1847

Bela brachystoma (Philippi, 1844) (3, 4, 5)
Bela fuscata (Deshayes, 1835) (3, 4, 5)
Bela laevigata (Philippi, 1836) (3, 4, 5)
Bela menkhorsti van Aartsen, 1988 (3, 5)
Bela nebula (Montagu, 1803) (4, 5)
Bela nuperrima (Tiberi, 1855) (3, 4, 5) (*)
Bela serga (Dall, 1881) (3, 5) (*)
Bela zenetouae van Aartsen, 1988 (3, 5)

Smithiella Monterosato, 1880

Smithiella costulata (Blainville, 1829) (3, 4, 5)
Smithiella smithi (Forbes, 1840) (3, 4, 5) (*)

Benthomangelia Thiele, 1925

Benthomangelia macra (Watson, 1881) (3, 5)

Clathromangelia Monterosato, 1884

Clathromangelia granum (Philippi, 1844) (3, 5) (*)

Gymnobela Verrill, 1884

Gymnobela abyssorum (Locard, 1897) (3)
Gymnobela subaraneosa (Dautzenberg & Fischer, 1896) (5) (*)

Mangelia Risso, 1826

Mangelia attenuata (Montagu, 1803) (3, 4, 5)
Mangelia bertrandi (Payraudeau, 1826) (3, 5)
Mangelia brusinae van Aartsen & Fehr de Wal, 1978 (4)
Mangelia callosa (Nordsieck, 1977) (3, 5)
Mangelia coarctata (Forbes, 1840) (3, 4, 5)
Mangelia farina (Nordsieck, 1977) (3, 5)
Mangelia fieldeni van Aartsen & Fehr de Wal, 1978 (3, 5)
Mangelia multilineolata (Deshayes, 1835) (3, 5)
Mangelia paciniana (Calcara, 1839) (3, 4, 5)
Mangelia scabrida Monterosato, 1890 (3, 4, 5)
Mangelia sricula (Reeve, 1846) (5) (M) (*)
Mangelia stossiciana Brusina, 1840 (3, 4, 5)
Mangelia taeniata (Deshayes, 1835) (3, 5)
Mangelia unifasciata (Deshayes, 1835) (3, 4, 5)
Mangelia vauquelini (Payraudeau, 1826) (3, 4, 5)

Taranis Jeffreys, 1870

Taranis moerchi (Malm, 1863) (3, 5)

Typhlomangelia G.O. Sars, 1878

Typhlomangelia nivalis (Lovén, 1846) (3)

Drilliola Locard, 1897

Drilliola emendata (Monterosato, 1872) (3, 4, 5)

Microdrillia Casey, 1903

Microdrillia loprestiana (Calcara, 1841) (3, 4, 5)

Haedropleura Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1883

Haedropleura secalina (Philippi, 1844) (3, 4, 5)

Haedropleura septangularis (Montagu, 1803) (3)

Pleurotomella Verrill, 1872

Pleurotomella demosia (Dautzenberg & H. Fischer, 1896) (3) (*)

Pleurotomella euribrocha (Dautzenberg & H. Ficher, 1896) (3) (*)

Pleurotomella gibbera Bouchet & Warén, 1980 (3, 5) (*)

Pleurotomella packardi Verrill, 1872 (3) (*)

Crassopleura Monterosato, 1884

Crassopleura incrassata (Dujardin, 1837) (3, 4, 5)

Spirotropis G.O. Sars, 1878

Spirotropis modiolus (De Cristofori & Jan, 1832) (3, 5)

Mitrolumna Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1883

Mitrolumna leontocroma (Brusina, 1866) (5)

Mitrolumna olivoidea (Cantraine, 1835) (3, 4, 5)

Raphitoma Bellardi, 1847

Raphitoma aequalis (Jeffreys, 1867) (3, 5)

Raphitoma bicolor (Risso, 1826) (3, 5)

Raphitoma contigua Monterosato, 1884 (3)

Raphitoma densa Monterosato, 1884 (3, 5)

Raphitoma echinata (Brocchi, 1814) (3, 4, 5)

Raphitoma horrida Monterosato, 1884 (3, 5)

Raphitoma laviae (Philippi, 1844) (3)
Raphitoma linearis (Montagu, 1803) (3, 4, 5)
Raphitoma neapolitana Nordsieck, 1977 (3)
Raphitoma philberti (Michaud, 1829) (3, 5)
Raphitoma pseudohystrix (Sykes, 1906) (3, 5)
Raphitoma pupoides (Montereosato, 1884) (3)

Leufroyia Montereosato, 1884

Leufroyia concinna (Scacchi, 1836) (3, 4, 5)
Leufroyia leufroyi (Michaud, 1828) (3, 4, 5)

Comarmondia Montereosato, 1884

Comarmondia gracilis (Montagu, 1803) (3, 4, 5)

Teretia Norman, 1888

Teretia teres (Reeve, 1844) (3, 4, 5)

Lusitanops Nordsieck, 1977

Lusitanops sp. A sensu Bouchet & Warén, 1980 (5)

Note

Bela nuperrima: Le due specie nuperrima e serga sono di difficile collocazione generica. Poste da alcuni AA. in *Mangelia* per analogia della scultura della teleoconca, da altri in *Benthomangelia*, forse per affinità di habitat, sono qui situate in *Bela* per l'affinità della protoconca. In realtà occorrono dati sulla morfologia e anatomia delle parti molli per una corretta collocazione in uno di questi raggruppamenti od anche per l'istituzione di un nuovo genere.

Bela serga: Vedi nota precedente.

Smithiella smithi: Validità specifica incerta. Il taxon é abitualmente applicato ad esemplari simili a *S. costulata*, ma con taglia inferiore e colorazione più sbiadita, raccolti su fondali fangosi al largo anziché su detriti grossolani costieri come per quest'ultima specie. Necessita un esame comparativo delle parti molli per stabilire se non si tratti di un caso di variabilità legato alle caratteristiche ambientali.

Clathromangelia granum: Oliverio (1995 - Zool. Scripta, in stampa) ha distinto *C. quadrillum* (Dujardin, 1837), fossile del Mio-Pliocene con sviluppo planctotrofico, da *C. granum*, specie del Quaternario e della fauna attuale con sviluppo larvale non planctotrofico.

Gymnobela subaraneosa: Rinvenuta solo la conchiglia mediante dragaggi profondi; specie estinta (würmiana?) o realmente vivente.

Mangelia sicula: Specie minacciata. Attualmente è conosciuta solo per le acque antistanti la provincia di Trapani e per l'isola di Malta. Autori del passato (Philippi, Montereosato) la rinvenivano lungo le coste settentrionali della Sicilia, anche nel porto di Palermo, ove adesso sembra essere del tutto assente.

Pleurotomella demosia: Rinvenuta solo la conchiglia mediante dragaggi profondi, potrebbe

essere una specie estinta (würmiana).

Pleurotomella euribrocha: Rinvenuta solo la conchiglia mediante dragaggi profondi, potrebbe essere una specie estinta (würmiana).

Pleurotomella gibbera: Rinvenuta solo la conchiglia mediante dragaggi profondi, potrebbe essere una specie estinta (würmiana).

Pleurotomella packardi: Rinvenuta solo la conchiglia mediante dragaggi profondi, potrebbe essere una specie estinta (würmiana).

Heterostropha

Valvatidae

Valvata Müller, 1774

Valvata cristata Müller, 1774 (N, S, Si)

Valvata piscinalis (Müller, 1774) (N, S, Si, Sa)

Valvata pulchella Studer, 1820 (N) (*)

Valvata saulcyi Bourguignat, 1853 (Si) (*)

Note

Valvata: Nella letteratura recente il genere *Valvata* è suddiviso in alcuni sottogeneri. *Valvata cristata* Müller, 1774 è attribuita a *Valvata* (*Valvata*), *V. piscinalis* (Müller, 1774) al sottogenere *Cincinna* Huebner, 1810 e *V. pulchella* Studer, 1820 al sottogenere *Atropidina* Linholm, 1906. Falcinowski (1989 - Zesz. Nauk. Uniw. Jagiellon. Pr. Zool., 35: 1-148) assegna a *Valvata* (*Valvata*) anche *V. piscinalis* e *V. pulchella*. Altri autori, infine, evitano l'uso dei sottogeneri. A causa di questa incertezza i sottogeneri sono stati omessi. Tuttavia il problema deve essere attentamente riesaminato in quanto *V. piscinalis* presenta notevoli peculiarità anatomiche rispetto alle altre specie.

Valvata pulchella: I pochi dati, relativi a segnalazioni di letteratura e alla presenza di esemplari in collezioni storiche, richiedono verifiche approfondite. Anche la possibile presenza di *Valvata macrostoma* Mörch, 1864 (se effettivamente distinta da *V. pulchella* di cui è spesso considerata un più giovane sinonimo) richiede ulteriori accertamenti.

Valvata saulcyi: Il materiale della Sicilia, talvolta segnalato con il nome di *Valvata pulchella* Studer, 1820 o con altri nomi di dubbia validità, sembra riferibile a questa entità. La determinazione, tuttavia, richiede conferma.

Architectonicidae

Basisulcata Melone & Taviani, 1984

Basisulcata lepida (Bayer, 1942) (3, 5)

Discotectonica Marwick, 1931

Discotectonica discus (Philippi, 1844) (3, 4, 5)

Heliacus (Grandeliacus) Iredale, 1957

Heliacus (Grandeliacus) subvariegatus d'Orbigny, 1852 (3, 4, 5)

Heliacus (Granoeliacus) Melone & Taviani, 1984

Heliacus (Granoeliacus) alleryi (G. Seguenza, 1876) (3, 4, 5)

Heliacus (Gyriscus) Tiberi, 1867

Heliacus (Gyriscus) jeffreysianus (Tiberi, 1867) (3)

Heliacus (Redivivus) Melone & Taviani, 1984

Heliacus (Redivivus) contextus (L. Seguenza, 1902) (3)

Philippia J.E. Gray, 1847

Philippia hybrida (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Pseudomalaxis P. Fischer, 1885

Pseudomalaxis zancaeus (Philippi, 1844) (3, 5)

Pseudotorinia Sacco, 1892

Pseudotorinia architae (O.G. Costa, 1839) (3, 4, 5)

Solatisonax Iredale, 1931

Solatisonax bannocki (Melone & Taviani, 1980) (3, 5)

Spirolaxis Monterosato, 1913

Spirolaxis clenchi Jaume & Borro, 1916 (3, 5)

Mathildidae

Mathilda Semper, 1865

Mathilda cochlaeformis Brugnone, 1873 (3, 5)

Mathilda coronata Monterosato, 1875 (3, 5)

Mathilda gemmulata Semper, 1865 (3, 5)

Mathilda quadricarinata (Brocchi, 1814) (3, 5)

Mathilda retusa Brugnone, 1873 (3, 5)

Rissoellidae

Rissoella J.E. Gray, 1847

- Rissoella diaphana* (Alder, 1848) (3, 4)
- Rissoella globularis* (Forbes & Hanley, 1853) (3, 4)
- Rissoella inflata* Locard, 1892 (3, 5)
- Rissoella opalina* (Jeffreys, 1848) (3, 5)

Omalogyridae

Omalogyra Jeffreys, 1860

- Omalogyra atomus* (Philippi, 1841) (3, 4, 5)

Ammonicera Vayssière, 1893

- Ammonicera fischeriana* (Monterosato, 1869) (3, 5)
- Ammonicera rota* (Forbes & Hanley, 1850) (3, 5)

Retrotortina Chaster, 1896

- Retrotortina fuscata* Chaster, 1896 (3, 5)

Adeuomphalus G. Seguenza, 1876

- Adeuomphalus ammoniformis* G. Seguenza, 1876 (3, 5)

Pyramidellidae

Pyramidella Lamarck, 1799

- Pyramidella minuscula* Monterosato, 1880 (3, 4, 5)
- Pyramidella octaviana* Di Geronimo, 1973 (5)

Chrysallida Carpenter, 1857

- Chrysallida angulosa* (Monterosato, 1889) (3, 5)
- Chrysallida brattstroemi* Warén, 1991 (3)
- Chrysallida brusinai* (Cossmann, 1921) (3, 4, 5)
- Chrysallida clathrata* (Jeffreys, 1848) (3, 4, 5)
- Chrysallida decussata* (Montagu, 1803) (3, 4, 5)
- Chrysallida dollfusi* (Kobelt, 1903) (3, 4, 5)
- Chrysallida doliolum* (Philippi, 1844) (3, 4, 5)

Chrysallida emaciata (Brusina, 1866) (3, 4, 5)
Chrysallida farolita F. Nordsieck, 1972 (3, 4, 5)
Chrysallida flexuosa (Monterosato, 1874) (3, 4, 5)
Chrysallida indistincta (Montagu, 1808) (3, 4, 5)
Chrysallida intermixta (Monterosato, 1884) (3, 4, 5)
Chrysallida jeffreysiana (Monterosato, 1884) (3, 5)
Chrysallida juliae (De Folin, 1872) (3, 4, 5)
Chrysallida monozona (Brusina, 1869) (3, 4, 5)
Chrysallida monterosatii (Clessin, 1900) (3, 4, 5)
Chrysallida moolenbeeki Amati, 1987 (3, 5)
Chrysallida obtusa (Brown, 1827) (3, 4, 5)
Chrysallida palazzii Micali, 1984 (3, 4, 5)
Chrysallida pellucida (Dillwyn, 1817) (3, 5)
Chrysallida penchynati (Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1883) (3)
Chrysallida stefanisi (Jeffreys, 1869) (3, 4, 5)
Chrysallida suturalis (Philippi, 1844) (3, 4, 5)
Chrysallida terebellum (Philippi, 1844) (3, 4, 5)

Clathrella Récluz, 1864

Clathrella clathrata (Philippi, 1844) (3, 4, 5)

Euparthenia Thiele, 1929

Euparthenia bulinea (Lowe, 1841) (3, 4, 5)
Euparthenia humboldti (Risso, 1826) (3, 4, 5)

Folinella Dall & Bartsch, 1904

Folinella excavata (Philippi, 1836) (3, 4, 5)
Folinella ghisottii Van Aartsen, 1984 (3, 4, 5)

Tragula Monterosato, 1884

Tragula fenestrata (Jeffreys, 1848) (3, 4, 5)

Eulimella J.E. Gray, 1847

Eulimella laevis (Blainville, 1827) (3, 4, 5)
Eulimella neoattenuata Gaglini, 1991 (3)
Eulimella praelonga (Jeffreys, 1884) (3, 4, 5)
Eulimella scillae (Scacchi, 1835) (3, 4, 5)
Eulimella superflua (Monterosato, 1875) (3)
Eulimella turris (Forbes, 1844) (3, 4, 5)
Eulimella ventricosa (Forbes, 1844) (3, 4, 5)

Anisocycla Monterosato, 1880

Anisocycla folini (P. Fischer in De Folin, 1869) (3)
Anisocycla macilenta (Monterosato, 1878) (3, 5)
Anisocycla nitidissima (Montagu, 1803) (3, 4, 5)
Anisocycla pointeli (Folin, 1867) (3, 4, 5)

***Syrnola* A. Adams, 1860**

Syrnola minuta H. Adams, 1869 (3, 4, 5)
Syrnola striatula (Jeffreys, 1856) (3)
Syrnola unifasciata (Forbes, 1844) (3, 4, 5)
Syrnola wenzi F. Nordsieck, 1972 (4)

***Odostomia* (*Odostomia*) Fleming, 1813**

Odostomia (*Odostomia*) *aartseni* Nofroni, 1988 (3)
Odostomia (*Odostomia*) *acuta* Jeffreys, 1848 (3, 4, 5)
Odostomia (*Odostomia*) *angusta* Jeffreys, 1867 (3, 4, 5)
Odostomia (*Odostomia*) *carrozzai* Van Aartsen, 1987 (3, 4, 5)
Odostomia (*Odostomia*) *eulimoides* Hanley, 1844 (3, 4, 5)
Odostomia (*Odostomia*) *glabrata* Forbes & Hanley, 1850 (3, 5)
Odostomia (*Odostomia*) *kromi* Van Aartsen, Menkhorst & Gittenberger, 1984 (3, 5)
Odostomia (*Odostomia*) *lorellae* Micali, 1987 (3, 5)
Odostomia (*Odostomia*) *lukisii* Jeffreys, 1859 (3, 4, 5)
Odostomia (*Odostomia*) *nardoi* Brusina, 1869 (4)
Odostomia (*Odostomia*) *plicata* (Montagu, 1803) (3, 4, 5)
Odostomia (*Odostomia*) *scalaris* MacGillivray, 1843 (3, 4, 5)
Odostomia (*Odostomia*) *sileusi* Nofroni, 1988 (3)
Odostomia (*Odostomia*) *striolata* Forbes & Hanley, 1850 (3, 4, 5)
Odostomia (*Odostomia*) *suboblonga* Jeffreys, 1884 (3, 5)
Odostomia (*Odostomia*) *turriculata* Monterosato, 1869 (3, 4, 5)
Odostomia (*Odostomia*) *turrita* Hanley, 1844 (3, 4, 5)
Odostomia (*Odostomia*) *unidentata* (Montagu, 1803) (3, 4, 5)
Odostomia (*Odostomia*) *verduini* Van Aartsen, 1987 (3)

***Odostomia* (*Auristomia*) Monterosato, 1884**

Odostomia (*Auristomia*) *erjaveciana* Brusina, 1869 (3, 4, 5)
Odostomia (*Auristomia*) *fusulus* Monterosato, 1878 (3, 5)

***Odostomia* (*Doliella*) Monterosato, 1880**

Odostomia (*Doliella*) *nitens* Jeffreys, 1870 (3, 4)

***Odostomia* (*Megastomia*) Monterosato, 1884**

Odostomia (*Megastomia*) *conoidea* (Brocchi, 1814) (3, 4, 5)
Odostomia (*Megastomia*) *conspicua* Alder, 1850 (3, 4, 5)

Liostomia G.O. Sars, 1878

- Liostomia afzelii* (Warén, 1991) (4, 5)
Liostomia clavulus (Lovén, 1846) (3, 4, 5)

Noemiamea Hoyle, 1886

- Noemiamea dolioliformis* (Jeffreys, 1848) (3, 4, 5)

Ondina De Folin, 1870

- Ondina anceps* Gaglini, 1991 (3)
Ondina dilucida (Monterosato, 1884) (3, 4, 5)
Ondina divisa (J. Adams, 1797) (4)
Ondina neocrystallina Gaglini, 1991 (3, 5)
Ondina obliqua (Alder, 1844) (3, 5)
Ondina scandens (Monterosato, 1844) (3, 4, 5)
Ondina vitrea (Brusina, 1866) (3, 4, 5)

Turbonilla Risso, 1826

- Turbonilla acutissima* Monterosato, 1884 (3, 4, 5)
Turbonilla attenuata (Jeffreys, 1884) (3)
Turbonilla compressa (Jeffreys, 1884) (3, 5)
Turbonilla delicata Monterosato, 1874 (3, 4, 5)
Turbonilla gradata Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1883 (3, 4, 5)
Turbonilla hamata F. Nordsieck, 1972 (3, 4, 5)
Turbonilla internodula (S. Wood, 1848) (3, 5)
Turbonilla jeffreysii (Jeffreys, 1848) (3, 4, 5)
Turbonilla lactea (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)
Turbonilla magnifica (G. Seguenza, 1879) (3)
Turbonilla micans (Monterosato, 1875) (3, 5)
Turbonilla multilirata (Monterosato, 1875) (3, 5)
Turbonilla obliquata (Philippi, 1844) (3, 4, 5)
Turbonilla paucistriata (Jeffreys, 1884) (3)
Turbonilla postacuticostata Sacco, 1892 (5)
Turbonilla pseudogradata F. Nordsieck, 1972 (3, 5)
Turbonilla pumila G. Seguenza, 1876 (3, 5)
Turbonilla pusilla (Philippi, 1844) (3, 4, 5)
Turbonilla rufa (Philippi, 1836) (3, 4, 5)
Turbonilla sinuosa (Jeffreys, 1884) (3, 4, 5)
Turbonilla striatula (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Tjaernoidea

Tjaernoidea Warén & Bouchet, 1988

Tjaernoeria exquisita (Jeffreys, 1883) (3)

Cephalaspidea

Actaeonidae

Acteon Montfort, 1810

Acteon monterosatoi Dautzenberg, 1889 (3)

Acteon tornatilis (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Crenilabium Cossmann, 1889

Crenilabium exile (Jeffreys, 1870) (3, 5)

Liocarenus Harris & Burrows, 1891

Liocarenus globulinus (Forbes, 1844) (3, 5)

Japonacteon Taki, 1956

Japonacteon pusillus (McGillivray, 1843) (3, 5)

Ovulacteon Dall, 1889

Ovulacteon cf. amabilis (Watson, 1886) (3)

Pupa Roeding, 1798

Pupa candidula (Monterosato, 1923) (5)

Diaphanidae

Diaphana Brown, 1827

Diaphana expansa (Jeffreys, 1865) (3)

Diaphana lactea (Jeffreys, 1877) (5)

Diaphana minuta Brown, 1827 (3)

Diaphana quadrata (Monterosato, 1874) (3)

Colobocephalus M. Sars, 1870

Colobocephalus striatulus (Monterosato, 1874) (3)

Colpodaspis M. Sars, 1870

Colpodaspis pusilla M. Sars, 1870 (3)

Retusidae

Retusa Brown, 1827

Retusa leptoneilema (Brusina, 1866) (3)

Retusa mammillata (Philippi, 1836) (3, 4, 5)

Retusa obtusa (Montagu, 1803) (3, 5)

Retusa semisulcata (Philippi, 1836) (3, 4, 5)

Retusa truncatula (Bruguière, 1792) (3, 5)

Cylichnina Monterosato, 1884

Cylichnina laevisculpta (Granata-Grillo, 1877) (3)

Cylichnina umbilicata (Montagu, 1803) (3, 4, 5)

Pyrunculus Pilsbry, 1895

Pyrunculus hoernesii (Weinkauff, 1866) (3, 5)

Pyrunculus minutissimus (Monterosato, 1878) (3)

Pyrunculus ovatus (Jeffreys, 1871)

Volvulella Newton, 1891

Volvulella acuminata (Bruguière, 1792) (3, 4, 5)

Ringiculidae

Ringicula Deshayes, 1838

Ringicula auriculata (Menard de la Groye, 1811) (3, 4, 5)

Ringicula conformis Monterosato, 1877 (3, 4)

Ringicula leptocheila Brugnone, 1873 (3, 5)

Bulla Linnaeus, 1758

Bulla striata Bruguière, 1792 (3, 4, 5)

Haminoea Turton & Kingston, 1830

Haminoea exigua Schaefer, 1992 (5)

Haminoea fusaroi Alvarez, Garcia & Villani, 1993 (3)

Haminoea hydatis (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Haminoea navicula (da Costa, 1778) (3, 4, 5)

Haminoea orbignyana (Ferussac, 1822) (3)

Atys Montfort, 1810

Atys blainvilliana (Recluz, 1843) (3)

Atys brocchi (Michelotti, 1847) (3)

Atys jeffreysi (Weinkauff, 1868) (3, 4)

Weinkauffia Monterosato, 1884

Weinkauffia turgidula (Forbes, 1844) (3, 4, 5)

Philineidae

Philine Ascanius, 1772

Philine aperta (Linné, 1767) (3, 4, 5)

Philine catena (Montagu, 1803) (3, 4)

Philine intricata Monterosato, 1875 (3)

Philine lima (Brown, 1827) (3)

Philine monterosati Monterosato, 1874 (3, 4)

Philine punctata (J. Adams, 1800) (3)

Philine quadrata (S. Wood, 1839) (3)

Philine scabra (O.F. Müller, 1784) (3, 4, 5)

Johania Monterosato, 1884

Johania retifera (Forbes, 1844) (3)

Laona A. Adams, 1865

Laona finmarchica (M. Sars, 1858) (3)

Laona flexuosa M. Sars, 1870 (3)

Laona pruinosa (Clark, 1827) (3, 4)

Aglajidae

Aglaja Renier, 1804

Aglaja taila Ev. Marcus & Er. Marcus, 1966 (3)

Aglaja tricolorata Renier, 1804 (3, 4, 5)

Chelidonura A. Adams, 1850

Chelidonura italica Sordi, 1980 (3)

Philinopsis Pease, 1860

Philinopsis depicta (Renier, 1804) (3, 4, 5)

Akeridae

Akera O.F. Müller, 1776

Akera bullata O.F. Müller, 1776 (3, 4, 5)

Cylichnidae

Cylichna Lovén, 1846

Cylichna alba (Brown, 1827) (3)

Cylichna crossei B.D.D., 1886 (3, 4)

Cylichna cylindracea (Pennant, 1777) (3, 4, 5)

Cylichna hoernesii (Weinkauff, 1866) (3)

Cylichna parvula Jeffreys, 1883 (3)

Roxania Leach in Gray, 1847

Roxania monterosatoi Dautzenberg & Fischer, 1896 (3, 5)

Roxania semilacvis (Seguenza, 1880) (3, 4)

Roxania utriculus (Brocchi, 1814) (3, 5)

Scaphander Montfort, 1810

Scaphander lignarius (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Scaphander punctostriatus (Mighels & Adams, 1842) (3)

Gastropteridae

Gastropteron Meckel in Kosse, 1813

Gastropteron meckeli Kosse, 1813 (3, 4, 5)

Runcinoidea

Runciniidae

Runcina Forbes & Hanley, 1851

Runcina adriatica Thompson, 1980 (4)
Runcina brenkoe Thompson, 1980 (4)
Runcina capreensis (Mazzarelli, 1894) (3)
Runcina coronata (Quatrefages, 1844) (3)
Runcina ferruginea Kress, 1977 (3)
Runcina zavodniki Thompson, 1980 (4)

Acochlidoidea

Hedylopsidae

Hedylopsis Thiele, 1931

Hedylopsis suecica Odhner, 1937 (3)

Microhedyle Henling, 1930

Microhedyle cryptophthalma (Westheide & Wawra, 1974) (3)

Stellaspina Rankin, 1979

Stellaspina lactea Hertling, 1930 (3)

Stellaspina neapolitana Rankin, 1979 (3)

Sabulincolidae

Sabulincola Rankin, 1979

Sabulincola odhneri (Ev. Marcus & Er. Marcus, 1955) (3)

Asperspinidae

Anademia Rankin, 1979

Anademia rhopalotecta (Salvini-Plawen, 1973) (3)

Livorniellidae

Livorniella Rankin, 1979

Livorniella glomerans Salvini-Plawen, 1973 (3)

Philinoglossidae

Philinoglossa Hertling, 1932

Philinoglossa helgolandica Hertling, 1932 (3, 4)

Philinoglossa latosoleata Salvini-Plawen, 1973 (3)

Philinoglossa praelongata Salvini-Plawen, 1973 (3, 4)

Philinoglossa remanei Ev. Marcus & Er. Marcus, 1958 (3)

Sacoglossa

Volvatellidae

Ascobulla Ev. Marcus, 1972

Ascobulla fragilis (Jeffreys, 1856) (3)

Oxynoidae

Oxynoe Rafinesque, 1814

Oxynoe olivacea Rafinesque, 1814 (3, 5)

Lobiger Krohn, 1847

Lobiger serradifalci (Calcara, 1840) (3, 5)

Elysiidae

Elysia Risso, 1818

Elysia flava Verrill, 1901 (3, 5)

Elysia gordanae Thompson & Jaklin, 1988 (4)

Elysia hetta Perrone, 1990 (5)

Elysia timida (Risso, 1818) (3, 4, 5)

Elysia translucens Pruvot-Fol, 1957 (3, 5)

Elysia viridis (Montagu, 1804) (3, 4, 5)

Thuridilla Bergh, 1872

Thuridilla hopei (Vérany, 1853) (3, 4, 5)

Bosellidae

Bosellia Trinchese, 1891

Bosellia mimetica Trinchese, 1882 (3, 5)

Polybranchiidae

Polybranchia Pease, 1860

Polybranchia borgninii (Trinchese, 1888) (3, 5)

Caliphylla A. Costa, 1867

Caliphylla mediterranea A. Costa, 1867

Cyerce Bergh, 1871

Cyerce cristallina (Trinchese, 1881) (3, 5)

Cyerce graeca Thompson, 1988 (5)

Aplysiopsis Deshayes, 1864

Aplysiopsis elegans Deshayes, 1853 (3, 5)

Costasiella Pruvot-Fol, 1951

Costasiella virescens Pruvot-Fol, 1951 (3)

Hermaea Loven, 1844

Hermaea bifida (Montagu, 1815) (3)

Hermaea saronica Thompson, 1988 (5)

Hermaeopsis A. Costa, 1869

Hermaeopsis variopicta A. Costa, 1869 (3, 5)

Stiligeridae

Ercolania Trinchese, 1872

Ercolania coerulea Trinchese, 1892 (3)

Ercolania cremoniana (Trinchese, 1892) (3)

Ercolania dendritica (Alder & Hancock, 1843) (3, 4, 5)

Ercolania funerea (A. Costa, 1867) (3)

Ercolania viridis (Trinchese, 1873) (3)

Calliopaea D'Orbigny, 1837

Calliopaea bellula D'Orbigny, 1837 (4, 5)

Limapontia Johnston, 1835

Limapontia capitata (O.F. Müller, 1774) (3)

Alderia Allman, 1845

Alderia comosa (A. Costa, 1867) (3)

Alderia modesta (Lovén, 1844) (3)

Platyhedylidae

Platyhedyle Salvini-Plawen, 1973

Platyhedyle denudata Salvini-Plawen, 1973 (3, 4)

Anaspidea

Aplysiidae

Aplysia Linnaeus, 1767

Aplysia depilans Gmelin, 1791 (3, 4, 5)

Aplysia fasciata Poiret, 1789 (3, 4, 5)

Aplysia parvula Guilding in Morch, 1863 (3, 5)

Aplysia punctata (Cuvier, 1803) (3, 4, 5)

Bursatella Blainville, 1817

Bursatella leachi Blainville, 1817 (3, 4, 5)

Dolabriferidae

Petalifera J.E. Gray, 1847

Petalifera petalifera (Rang, 1828) (3, 5)

Phyllaplysia Fischer, 1872

Phyllaplysia lafonti (Fischer, 1870) (3, 4, 5)

Notarchus Cuvier, 1817

Notarchus punctatus Philippi, 1836 (3, 4, 5)

Notaspidea

Tylodinidae

Tylodina Rafinesque, 1819

Tylodina perversa (Gmelin, 1791) (3, 4, 5)

Umbraculidae

Umbraculum Schumacher, 1817

Umbraculum mediterraneum (Roeding, 1798) (3, 4)

Spiricella Rang, 1827

Spiricella unguiculus Rang, 1827 (3)

Pleurobranchidae

Pleurobranchus Cuvier, 1805

Pleurobranchus membranaceus (Montagu, 1803) (3, 4, 5)

Pleurobranchus testudinarius Cantraine, 1835 (3, 4)

Berthella Blainville, 1824

Berthella aurantiaca (Risso, 1818) (3, 5)

Berthella ocellata (Delle Chiaje, 1830) (3, 5)

Berthella plumula (Montagu, 1803) (3, 4, 5)

Berthella stellata (Risso, 1826) (3, 5)

Berthellina Gardiner, 1936

Berthellina engeli (Gardiner, 1936) (3, 5)

Pleurobranchaea Meckel in Leue, 1813

Pleurobranchaea meckelii Meckel in Leue, 1812 (3, 4, 5)

Nudibranchia

Tritoniidae

Tritonia Cuvier, 1798

Tritonia lineata Alder & Hancock, 1848 (3)
Tritonia manicata Deshayes, 1853 (3, 4, 5)
Tritonia nilsodhneri Ev. Marcus, 1983 (3, 5)
Tritonia striata Haefelfinger, 1963 (3, 5)

Marionia Vayssière, 1877

Marionia blainvillea (Risso, 1818) (3, 4, 5)

Tritoniopsis Eliot, 1905

Tritoniopsis cincta (Pruvot-Fol, 1937) (3)

Lomanotidae

Lomanotus Vérany, 1844

Lomanotus genei Vérany, 1846 (3, 4)

Dotidae

Doto Oken, 1815

Doto acuta Schmekel & Kress, 1977 (3)
Doto cervicenigra Ortea & Bouchet, 1988 (3)
Doto coronata (Gmelin, 1791) (3, 4, 5)
Doto cuspidata Alder & Hancock, 1862 (3)
Doto doerga Ev. Marcus & Er. Marcus, 1963 (3)
Doto floridicola Simroth, 1888 (3)
Doto fragaria (Ortea & Bouchet, 1988) (3)
Doto lemchei Ortea & Urgorri, 1978 (3)
Doto paulinae Trinchese, 1881 (3)
Doto rosea Trinchese, 1881 (3)

Hanckockiidae

Hancockia Gosse, 1877

Hancockia uncinata (Hesse, 1872) (3, 5)

Tethyidae

Tethys Linnaeus, 1767

Tethys fimbria Linnaeus, 1767 (3, 4, 5)

Scyllaeidae

Scyllaea Linnaeus, 1758

Scyllaea pelagica Linnaeus, 1758 (3, 4, 5)

Phylliroidae

Phylliroe Peron & Lesueur, 1810

Phylliroe bucephala Peron & Lesueur, 1810 (3, 5)

Cephalopyge Hanel, 1905

Cephalopyge trematoides (Chun, 1889) (3)

Goniodorididae

Goniodoris Forbes & Goodsir, 1839

Goniodoris castanea Alder & Hancock, 1845 (3, 4, 5)

Okenia Menke, 1830

Okenia elegans (Leuckart, 1828) (3)

Okenia impexa Er. Marcus, 1957 (3)

Okenia leachi (Alder & Hancock, 1854) (3)

Okenia mediterranea (von Ihering, 1886) (3)

Ancula Loven, 1846

Ancula gibbosa (Risso, 1818) (3)

Trapania Pruvot-Fol, 1931

Trapania fusca (Lafont, 1874) (3)

Trapania lineata Haefelfinger, 1960 (3)

Trapania maculata Haefelfinger, 1960 (3)

Trapania tartanella (von Ihering, 1885) (3)

Onchidorididae

Onchidoris Blainville, 1816

Onchidoris albonigra (Pruvot-Fol, 1951) (3, 5)

Onchidoris neapolitana (Delle Chiaje, 1841) (3)

Diaphorodoris Iredale & O'Donoghue, 1923

Diaphorodoris luteocincta (M. Sars, 1870) (3)

Diaphorodoris papillata Portmann & Sandmeier, 1960 (3)

Acanthodoris M.E. Gray, 1850

Acanthodoris pilosa (Abildgaard in Müller, 1789) (5)

Adalaria Bergh, 1878

Adalaria proxima (Alder & Hancock, 1854) (5)

Triophidae

Kaloplocamus Bergh, 1892

Kaloplocamus filus Cattaneo-Vietti & Sordi, 1987 (3)

Kaloplocamus ramosus (Cantraine, 1835) (3)

Crimora Alder & Hancock, 1862

Crimora papillata Alder & Hancock, 1862 (3)

Aegiretidae

Aegires Lovén, 1844

Aegires leuckarti Vérany, 1853 (3)

Aegires punctilucens (D'Orbigny, 1837) (3, 5)

Dorididae

Doris Linnaeus, 1758

- Doris bertheloti* (D'Orbigny, 1839) (4)
- Doris marmorata* Risso, 1818 (3)
- Doris ocelligera* (Bergh, 1881) (3)
- Doris sticta* (Iredale & O'Donoghue, 1923) (3)
- Doris verrucosa* Linnaeus, 1758 (3, 4, 5)

Chromodorididae

Cadlina Bergh, 1878

- Cadlina excavata* (Pruvot-Fol, 1951) (3)
- Cadlina laevis* (Linnaeus, 1767) (3)
- Cadlina pellucida* (Risso, 1826) (3)

Chromodoris Alder & Hancock, 1855

- Chromodoris britoi* Ortea & Perez, 1982 (3, 5)
- Chromodoris elegantula* (Philippi, 1844) (3, 5)
- Chromodoris krohni* (Vérany, 1846) (3, 4, 5)
- Chromodoris luteorosea* (Rapp, 1846) (3, 4, 5)
- Chromodoris purpurea* (Risso in Guérin, 1831) (3, 4, 5)
- Chromodoris quadricolor* (Ruppell & Leuckart, 1828) (3)

Hypselodoris Stimpson, 1855

- Hypselodoris coelestis* (Deshayes in Fredol, 1865) (3, 4, 5) (*)
- Hypselodoris messinensis* (von Ihering, 1880) (3, 5)
- Hypselodoris elegans* Cantraine, 1835 (3, 4, 5)
- Hypselodoris villafranca* (Risso, 1818) (3, 4, 5)
- Hypselodoris webbi* (D'Orbigny, 1839) (5)

Note

Hypselodoris coelestis: La validità tassonomica della specie *H. tricolor* è dubbia e probabilmente è stata utilizzata per forme giovanili di diverse specie di *Hypselodoris*.

Aldisidae

Aldisa Bergh, 1878

Aldisa banyulensis Pruvot-Fol, 1951 (3, 5)
Aldisa binotata Pruvot-Fol, 1953 (3)

Rostangidae

Rostanga Bergh, 1879

Rostanga anthelia Perrone, 1991 (5)
Rostanga rubra (Risso, 1818) (3, 4, 5)

Archidorididae

Archidoris Bergh, 1878

Archidoris pseudoargus (Rapp, 1827) (3, 4, 5)

Atagema M. E. Gray, 1850

Atagema gibba Pruvot-Fol, 1951 (3)
Atagema rugosa Pruvot-Fol, 1951 (3, 5)

Anisodoris Bergh, 1898

Anisodoris marmorata (Bergh, 1881) (4)

Sclerodoris Eliot, 1903

Sclerodoris cf. tuberculata Eliot, 1903 (5)

Discodorididae

Geitodoris Bergh, 1891

Geitodoris bonosi Ortea & Ballesteros, 1981 (5)
Geitodoris planata (Alder & Hancock, 1846) (4)
Geitodoris portmanni (Schmekel, 1972) (3, 5)

Discodoris Bergh, 1877

Discodoris atromaculata (Bergh, 1880) (3, 4, 5)
Discodoris erubescens Bergh, 1884 (4)
Discodoris fragilis (Alder & Hancock, 1864) (5)
Discodoris maculosa Bergh, 1884 (5)
Discodoris patriziae Perrone, 1991 (5)
Discodoris sordii Perrone, 1990 (5)

Discodoris stellifera (Vayssière, 1904) (3, 5)

Thordisa Bergh, 1877

Thordisa aurea Pruvot-Fol, 1951 (3)

Thordisa filix Pruvot-Fol, 1951 (3)

Paradoris Bergh, 1884

Paradoris granulata Bergh, 1884 (4)

Paradoris indecora (Bergh, 1881) (3, 4, 5)

Kentrodorididae

Jorunna Bergh, 1876

Jorunna atypha Bergh, 1881 (4)

Jorunna tomentosa (Cuvier, 1804) (3, 4, 5)

Platydorididae

Platydoris Bergh, 1877

Platydoris argo (Linnaeus, 1767) (3, 4, 5)

Platydoris dura Pruvot-Fol, 1951 (3)

Platydoris maculata Bouchet, 1977 (3)

Platydoris philippi Bergh, 1877 (3)

Taringa Er. Marcus, 1955

Taringa pinoi Perrone, 1985 (5)

Baptodoris Bergh, 1884

Baptodoris cinnabarina Bergh, 1884 (5)

Baptodoris perezii Llera & Onea, 1982 (5)

Polyceridae

Polycera Cuvier, 1817

Polycera dubia M. Sars, 1829 (3)

Polycera hedgpethi Er. Marcus, 1964 (3)

Polycera maculata Pruvot-Fol, 1951 (3)

Polycera quadrilineata (O.F. Müller, 1776) (4, 5)

Polycerella Verrill, 1881

Polycerella emertoni Verrill, 1881 (3)

Thecacera Fleming, 1828

Thecacera pennigera (Montagu, 1815) (3)

Limacia O.F. Müller, 1781

Limacia clavigera (O.F. Müller, 1776) (3, 5)

Phyllidiidae

Phyllidia Cuvier, 1797

Phyllidia flava Aradas, 1847 (3, 5)

Fryeria J.E. Gray, 1853

Fryeria bayi Bouchet, 1983 (3)

Dendrodorididae

Dendrodoris Ehrenberg, 1831

Dendrodoris grandiflora (Rapp, 1827) (3, 4, 5)

Dendrodoris languida Pruvot-Fol, 1951 (3)

Dendrodoris limbata (Cuvier, 1804) (3, 4, 5)

Dendrodoris longula Pruvot-Fol, 1951 (3)

Dendrodoris minima Pruvot-Fol, 1951 (3)

Dendrodoris pseudorubra Pruvot-Fol, 1951 (3)

Dendrodoris racemosa Pruvot-Fol, 1951 (3)

Doriopsilla Bergh, 1880

Doriopsilla areolata Bergh, 1880 (3, 4)

Doriopsilla pusilla Pruvot-Fol, 1951 (3)

Doriopsilla rarispina Pruvot-Fol, 1951 (3, 5)

Arminidae

Armina Rafinesque, 1814

Armina maculata Rafinesque, 1814 (3)
Armina neapolitana (Delle Chiaje, 1824) (3)
Armina tigrina Rafinesque, 1814 (3, 5)
Armina tricuspidata Thompson, Cattaneo-Vietti & Wong, 1990 (3)

Linguella Blainville, 1823

Linguella elfortiana Blainville, 1823 (3)

Madrellidae

Madrella Alder & Hancock, 1864

Madrella aurantiaca Vayssière, 1902 (3)

Eliotia Vayssière, 1909

Eliotia souleyeti Vayssière, 1909 (3)

Zephyrinidae

Janolus Bergh, 1884

Janolus cristatus (Delle Chiaje, 1841) (3, 4, 5)

Hero Alder & Hancock, 1855

Hero blanchardi Vayssière, 1888 (3)

Flabellinidae

Coryphella M.E. Gray, 1850

Coryphella lineata (Lovén, 1846) (3, 5)
Coryphella pedata (Montagu, 1815) (3, 4, 5)

Flabellina Voigt, 1834

Flabellina affinis (Gmelin, 1791) (3, 4, 5)
Flabellina babai Schmekel, 1972 (3, 5)
Flabellina baetica Garcia, 1984 (3)
Flabellina ischitana Hirano & Thompson, 1990 (3, 5)

Calmella Eliot, 1906

Calmella cavolinii (Vérany, 1846) (3, 4, 5)

Piseinotecidae

Piseinotecus Er. Marcus, 1955

Piseinotecus gabinieri (Vicente, 1975) (3)

Piseinotecus sphaeripherus (Schmekel, 1965) (3)

Facelinidae

Facelina Alder & Hancock, 1855

Facelina annulicornis (Chamisso & Eisenhart, 1821) (3)

Facelina bostoniensis (Couthouy, 1838) (3)

Facelina coronata (Forbes & Goodsir, 1839) (3)

Facelina dubia Pruvot-Fol, 1948 (3)

Facelina fusca Schmekel, 1966 (3)

Facelina lugubris (Bergh, 1882) (4)

Facelina quatrefagesi (Vayssière, 1888) (3)

Facelina rubrovittata (A. Costa, 1866) (3)

Facelina rutila Pruvot-Fol, 1951 (3)

Cratena Bergh, 1864

Cratena peregrina (Gmelin, 1791) (3, 4, 5)

Caloria Trinchese, 1888

Caloria elegans (Alder & Hancock, 1845) (3, 5)

Antonietta Schmekel, 1966

Antonietta luteorufa Schmekel, 1966 (3)

Facelinopsis Pruvot-Fol, 1954

Facelinopsis marioni (Vayssière, 1888) (3)

Favorinidae

Godiva Macnae, 1954

Godiva banyulensis (Portmann & Sandmeier, 1960)

Favorinus M.E. Gray, 1850

Favorinus branchialis (Rathke, 1806) (3, 4, 5)

Dicata Schmekel, 1967

Dicata odhneri Schmekel, 1967 (3)

Glaucidae

Glaucus Forster, 1777

Glaucus atlanticus Forster, 1777 (3)

Aeolidiidae

Aeolidiella Bergh, 1867

Aeolidiella alderi (Cocks, 1852) (3, 4, 5)

Aeolidiella glauca (Alder & Hancock, 1845) (3, 4, 5)

Aeolidiella indica (Bergh, 1888) (3)

Aeolidiella rubra (Alder & Hancock, 1835) (3)

Spurilla Bergh, 1864

Spurilla neapolitana (Delle Chiaje, 1844) (3, 4, 5)

Berghia Trinchese, 1877

Berghia coerulescens (Laurillard, 1838) (3, 5)

Berghia verrucicornis (A. Costa, 1867) (3, 4, 5)

Cerberilla Bergh, 1873

Cerberilla bernadettae Tardy, 1962 (3)

Baeolidia Bergh, 1888

Baeolidia nodosa (Haefelfinger & Stamm, 1958) (3)

Eubranchidae

Eubranchus Forbes, 1838

Eubranchus cingulatus (Alder & Hancock, 1847) (3)

Eubbranchus doriae (Trinchese, 1874) (3)
Eubbranchus exiguus (Alder & Hancock, 1848) (3)
Eubbranchus farrani (Alder & Hancock, 1847) (3, 5)
Eubbranchus pallidus (Alder & Hancock, 1842) (3)
Eubbranchus vittatus (Alder & Hancock, 1842) (3)

Pseudovermidae

Pseudovermis Periaslavzewa, 1891

Pseudovermis axi Ev. Marcus & Er. Marcus, 1955 (3)
Pseudovermis papillifer Kowalewsky, 1901 (4)
Pseudovermis schulzi Ev. Marcus & Er. Marcus, 1955 (4)
Pseudovermis thompsoni Salvini-Plawen, 1991 (4)

Tergipedidae

Cuthona Alder & Hancock, 1855

Cuthona albopunctata (Schmekel, 1968) (3)
Cuthona caerulea (Montagu, 1804) (3, 5)
Cuthona genovae (O'Donoghue, 1929) (3)
Cuthona granosa (Schmekel, 1966) (3)
Cuthona ilonae (Schmekel, 1966) (3)
Cuthona miniostrata (Schmekel, 1968) (3) (*)
Cuthona ocellata (Schmekel, 1966) (3, 5)

Catriona Winckworth, 1941

Catriona gymnota (Couthouy, 1838) (3)
Catriona maua Ev. Marcus & Er. Marcus, 1960 (3)

Embletonia Alder & Hancock, 1851

Embletonia pulchra (Alder & Hancock, 1844) (3, 4)

Tergipes Cuvier, 1805

Tergipes tergipes (Forsk. 1775) (3, 4)

Tenellia A. Costa, 1866

Tenellia adspersa (Nordmann, 1845) (3, 4)

Note

Cuthona miniostrata: Molto probabilmente C. miniostrata è sinonimo di C. timida.

Calmidæ

Calma Alder & Hancock, 1855

Calma glaucoides (Alder & Hancock, 1854) (3, 5)

Fionidæ

Fiona Alder & Hancock in Forbes & Hanley, 1851

Fiona pinnata (Eschscholtz, 1831) (3)

Thecosomata

Cavoliniidæ

Cavolinia Abildgaard, 1791

Cavolinia gibbosa (D'Orbigny, ex Rang ms., 1835)

Cavolinia gibbosa gibbosa (D'Orbigny, ex Rang ms., 1835) (3, 5)

Cavolinia inflexa (Lesueur, 1813) (3, 4?, 5)

Cavolinia longirostris (Lesueur, 1821) (3?, 5?) (*)

Cavolinia tridentata (Niebuhr, ex Forsskål ms., 1775) (3, 4, 5)

Diacria Gray, 1840

Diacria quadridentata (Lesueur, 1821) (3?, 5) (*)

Diacria trispinosa (Lesueur, 1821) (3, 5?) (*)

Clio Linnaeus, 1767

Clio cuspidata (Bosc, 1802) (3, 5)

Clio pyramidata Linnaeus, 1767 (*)

Clio pyramidata lanceolata (Lesueur, 1813) (3, 5)

Creseis Rang, 1828

Creseis acicula Rang, 1828 (3, 4, 5)

Creseis chierchiae (Boas, 1886) (5?) (*)

Creseis virgula Rang, 1828

Creseis virgula virgula Rang, 1828 (3, 4?, 5)

Hyalocylis De Folin, 1875

Hyalocylis obtusa Di Geronimo, 1974 (5) (E) (*)

Hyalocylis striata (Rang, 1828) (3, 5)

Styliola Gray, 1850

Styliola subula (Quoy & Gaimard, 1827) (3, 5)

Cuvierina Boas, 1886

Cuvierina columella (Rang, 1827) (5?) (*)

Note

Cavolinia longirostris: Nelle acque italiane un solo esemplare vivente è stato raccolto nello Stretto di Messina. Si tratta probabilmente di una presenza accidentale, in quanto la distribuzione della specie è analoga a quella di *Cuvierina columella* (v. nota 153.0.001.0).

Diacria quadridentata: Van der Spoel (1967) la cita per il Mediterraneo Occidentale, ma contemporaneamente ne ipotizza la penetrazione nel Mediterraneo attraverso il Mar Rosso, a causa della sua stretta affinità tropicale. Nelle acque italiane sono note le sole conchiglie. L'attuale distribuzione nel Mediterraneo riguarda le coste del Marocco, Libia e parte della Tunisia.

Diacria trispinosa: Van der Spoel (1967) la cita per il Mediterraneo, escluso nord Adriatico e Mar di Levante. Esemplari viventi sono stati pescati con certezza solo nel Tirreno (Tesch, 1946).

Clio pyramidata: La sottospecie nominale è praticamente assente nel Mediterraneo; di quest'ultima sono note solo conchiglie vuote.

Creseis chierchiae: È stato ampiamente dimostrato che "*Creseis*" *chierchiae* non è un giovanile di *Hyalocylis striata* così come ipotizzato da Van der Spoel (1967). La specie è posta dubitativamente in *Creseis* in accordo con gli AA. Nelle acque italiane è nota solo per conchiglie vuote nei fanghi profondi.

Hyalocylis obtusa: Recenti raccolte di esemplari viventi nello Stretto di Messina (Giovine, in progress) garantiscono l'attuale presenza nel Mediterraneo. Si tratta probabilmente di un endemita del bacino ionico.

Cuvierina columella: L'attuale distribuzione nel Mediterraneo è strettamente legata al Mare di Alboran e alle aree vicine sottoposte al flusso delle correnti fredde provenienti dall'Atlantico. Nel bacino ionico sono noti solo conchiglie fossili o subfossili.

Limacinidae

Limacina Bosc, 1817

Limacina bulimoides (D'Orbigny, 1836) (3, 4?, 5)

Limacina inflata (D'Orbigny, 1836) (3, 4, 5)

Limacina retroversa (Fleming, 1823) (5?) (*)

Limacina trochiformis (D'Orbigny, 1836) (3, 4, 5)

Note

Limacina: Si è preferito non dividere il genere in sottogeneri dati i notevoli problemi tassonomici legati ad alcuni di questi taxa.

Limacina retroversa: La specie non è nota vivente nelle acque italiane. Dubbia è pure la sua presenza nel Mediterraneo, probabilmente confusa con la simile *L. trochiformis*. La specie è attualmente utilizzata come indicatore delle acque atlantiche nel Mare del Nord (Tesch, 1946). Conchiglie subfossili sono note solo nel bacino ionico.

Cymbuliidae

Cymbulia Peron & Lesueur, 1810

Cymbulia "minor" (3, 5) (*)

Cymbulia parvidentata Pelseneer, 1888 (3, 5)

Cymbulia peronii Lamarck, 1819 (3, 4, 5)

Gleba Niebuhr, ex Forsskål ms., 1776

Gleba chrysosticta (Troschel, ex Krohn ms., 1854) (3?, 5)

Gleba cordata Niebuhr, ex Forsskål ms., 1776 (3, 5)

Corolla Dall, 1871

Corolla calceola (Verrill, 1880) (5) (*)

Note

Cymbulia "minor": Per le distintive caratteristiche della pseudoconcha e la simpatricità con *C. peronii* è da considerarsi specie distinta. Il taxon "minor" proposto da Van der Spoel (1976) non è utilizzabile (art. 45 g ICZN).

Corolla calceola: Ulteriori ritrovamenti di pseudoconche hanno permesso di attribuire con buona certezza la specie al taxon di Verrill. Nel Mediterraneo la specie è nota esclusivamente per lo Stretto di Messina.

Desmopteridae

Desmopterus Chun, 1889

Desmopterus papilio Chun, 1889 (3)

Peraclidae

***Peracle* ((*Peraclis*))** Pelseneer, em. ing.) 1888

Peracle ((*Peraclis*) *diversa* (Monterosato, 1875) (3?, 5?) (*))

Peracle ((*Peraclis*) *reticulata* (D'Orbigny, 1836) (3, 5))

Peracle ((*Peraclis*) *triacantha* (Fischer, 1882) (3?) (*))

Note

Peracle ((*Peraclis*) *diversa*: Per i problemi tassonomici legati a questa specie si rimanda a Giovine (1988). Dubbia è la presenza vivente nel Mediterraneo.

Peracle ((*Peraclis*) *triacantha*: Non è nota come vivente nel Mediterraneo. Le poche segnalazioni riguardano esclusivamente conchiglie prive di animale.

Gymnosomata

Clionidae

Clione Pallas, 1744

Clione limacina (Phipps, 1744) (3?)

Fowlerina Pelseneer, 1906

Fowlerina punctata (Tesch, 1903) (3?)

Fowlerina zetesios Pelseneer, 1906 (3)

Paraclione Tesch, 1903

Paraclione flavescens (Gegenbaur, 1855) (3, 5)

Paraclione longicaudata (Souleyet, 1852) (3)

Thalassopterus Kwietniewski, 1910

Thalassopterus zancleus Kwietniewski, 1910 (3, 5)

Thliptodon Boas, 1886

Thliptodon gegenbauri Boas, 1886 (3, 5)

Cliopsidae

Cliopsis Troschel, 1854

Cliopsis krohni Troschel, 1854 (3, 5)

Notobranchaeidae

Notobranchaea Pelseneer, 1886

Notobranchaea macdonaldi Pelseneer, 1886 (3, 5)

Schleschia Strand, 1932

Schleschia tetrabanchiata (Bonnievie, 1913) (3)

Pneumodermatidae

Pneumoderma Roissy, 1805

Pneumoderma mediterraneum (Van Beneden, 1838) (3, 5)

Pneumoderma violaceum D'Orbigny, 1836 (3, 5) (*)

Pneumodermopsis Keferstein, 1862

Pneumodermopsis canephora Pruvot-Fol, 1924 (3)

Pneumodermopsis ciliata (Gegenbaur, 1855) (3, 4, 5)

Pneumodermopsis paucidens (Boas, 1886) (3, 5)

Pneumodermopsis pupula Pruvot-Fol, 1926 (3?)

Pneumodermopsis teschi Van der Spoel, 1973 (3, 5)

Note

Pneumoderma violaceum: Il nome *atlanticum* è stato soppresso dall'International Commission on Zoological Nomenclature (Op. 417/1956).

Siphonarioidea

Siphonariidae

Williamia Monterosato, 1884

Williamia gussonii (O.G. Costa, 1829) (3, 4, 5)

Trimusculidae

Trimusculus Schmidt, 1818

Trimusculus mammilaris (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Onchidiida

Onchidiidae

Onchidella M.E. Gray, 1850

Onchidella celtica (Cuvier, 1817) (3, 4)

Archaeopulmonata

Ellobiidae

***Ovatella* (*Ovatella*)** Bivona, 1832

Ovatella (*Ovatella*) *firmini* (Payraudeau, 1827) (3, 4, 5) (*)

***Ovatella* (*Myosotella*)** Monterosato, 1906

Ovatella (*Myosotella*) *myosotis* (Draparnaud, 1801) (3, 4, 5) (*)

***Auriculinella* (*Leucophytia*)** Winckworth, 1945

Auriculinella (*Leucophytia*) *bidentata* (Montagu, 1806) (3, 4, 5) (*)

Carychium O.F. Müller, 1774

Carychium biondii Paulucci, 1882 (Sa) (E) (*)

Carychium mariae Paulucci, 1878 (N) (*)

Carychium minimum O.F. Müller, 1774 (N, S)

Carychium paganettii Zimmermann, 1925 (S, Si) (E) (*)

Carychium tridentatum (Risso, 1826) (N, S) (*)

Zospeum Bourguignat, 1856

Zospeum globosum Kuscer, 1928 (N) (E) (*)

Zospeum isselianum Pollonera, 1887 (N) (*)

Zospeum lautum (Frauenfeld, 1854) (N) (*)

Zospeum spelaeum (Rossmässler, 1839) (N) (*)

Note

Ovatella (*Ovatella*) *firmini*: Spesso citata come *Auricula firminii*. *Auricula* Lamarck, 1799 è un sinonimo più giovane di *Ellobium* Röding, 1798, un genere che include specie delle Filippine,

dell'Oceano Indiano e del Pacifico occidentale (cf. Zilch, 1959-60 - Handb. Paläozool., 6: 834 pp.).

Ovatella (Myosotella) myosotis: Spesso citata come *Auricula myosotis*. Per *Auricula* vedi sopra.

Auriculinella (Leucophytia) bidentata: Sabelli et al. (1990. - Catalogo annotato dei Molluschi Marini del Mediterraneo, 1: 348 pp.) hanno scoperto che *Voluta bidentata* Montagu, 1808 è un omonimo primario più giovane di *V. bidentata* Schröter, 1804 e, quindi, hanno proposto di usare il nome *Auriculinella erosa* (Jeffreys, 1830) per la presente specie. Poiché, tuttavia, il nome di Montagu è universalmente e coerentemente usato per denotare questa specie, appare opportuno verificare la possibilità di sottoporre il caso alla International Commission on Zoological Nomenclature affinché venga conservato il nome di Montagu, sopprimendo il nome di Schröter ai fini della legge dell'omonimia.

Carychium biondii: L'inquadramento dei *Carychium* sardi, talvolta riferiti al *C. minimum* O.F. Müller, 1774 (cf. Giusti & Castagnolo, 1983 - Lav. Soc. ital. Biogeogr. (N.S.), 8: 227-249) è da rivedere.

Carychium mariae: La specie, fuori dai confini italiani, è nota solo per l'Istria e per alcune località della ex Jugoslavia (Maassen, 1978 - Basteria, 51: 2; Slapnik, 1991 - Biol. Vestn., 39: 45-62). Le segnalazioni per la Toscana (Bank & Gittenberger, 1985 - Basteria, 49: 85-100) devono essere confermate.

Carychium paganettii: Entità incerta, riportata solo per la Calabria e la Sicilia (Bank & Gittenberger, 1985 - Basteria, 49: 85-100).

Carychium tridentatum: Strauch (1977 - Arch. Molluskenkd., 107: 149-193) riporta come "*Carychium* sp. aff. *sandebergi* Handmann, 1877" esemplari di "Neapel, Castello di Stabia" che, probabilmente, sono riferibili a *C. tridentatum*.

Zospeum globosum: Specie presente nell'area prealpina dal Bresciano alla valle del Brenta e al Monte Grappa e nei Monti Berici (Pezzoli, 1990 - Quad. civ. Staz. Idrobiol. Milano, 17: 55-66). Il complesso di forme riferibili a questo gruppo necessita di essere rivisto.

Zospeum isselianum: Specie nota, in Italia, per poche stazioni del Friuli, recentemente distinta da *Zospeum alpestre* (Freyer, 1855) (Slapnik, 1991 - Slov. Akad. Znan. Umet. Razpr., 32: 3-73). A questa specie corrispondono i materiali pubblicati da Giusti & Pezzoli (1982 - Lav. Soc. ital. Biogeogr. (N.S.), 7: 431-451) come *Z. alpestre* (Freyer, 1855).

Zospeum lautum: Specie segnalata, in Italia, per alcune grotte del Carso Triestino.

Zospeum spelaeum: Entità presente, in Italia, nell'area prealpina compresa tra la provincia di Treviso e il Carso. Bole (1975 - Slov. Akad. Znan. Umet. Razpr., 17: 251-291) convalida un certo numero di sottospecie, meglio inquadrabili come semplici forme.

Basommatophora

Physidae

Aplexa Fleming, 1820

Aplexa hypnorum (Linnaeus, 1758) (N) (M)

Physa (Physa) Draparnaud, 1801

Physa (Physa) fontinalis (Linnaeus, 1758) (N, S) (*)

Physa (Physella) Haldemar, 1843

Physa (Physella) acuta Draparnaud, 1805 (N, S, Si, Sa) (*)

Note

Physa (Physa) fontinalis: Alzona (1971 - Atti Soc. ital. Sci. nat. Mus. civ. Stor. nat. Milano, 111: 1-433) riporta *Physa fontinalis* anche per la Sicilia, ma la presenza della specie in quest'isola, basata su segnalazioni della prima metà dell'Ottocento, è stata esclusa da Benoit (1882 - Nuovo Catalogo delle conchiglie terrestri e fluviatili della Sicilia, 176 pp. Messina).

Physa (Physella) acuta: Secondo Brown (1980 - Freshwater snails of Africa and their medical importance, x + 487 pp.), *Physa acuta* potrebbe essere una specie nordamericana introdotta in Europa e quindi in Africa. Al contrario, Alexandrowicz (1986 - Acta zool. Cracov., 15: 355-372), Burch (1989 - North American freshwater snails, 365 pp.) e Smith (1989 - J. med. appl. Malacol., 1: 195-204) ritengono che sia una specie europea diffusasi in tutto il mondo. La specie è, infatti, attualmente cosmopolita.

Lymnaeidae

Lymnaea (Lymnaea) Lamarck, 1799

Lymnaea (Lymnaea) stagnalis (Linnaeus, 1758) (N, S)

Lymnaea (Stagnicola) Jeffreys, 1830

Lymnaea (Stagnicola) corvus (Gmelin, 1791) (N) (*)

Lymnaea (Stagnicola) fusca (Pfeiffer, 1821) (N, S) (*)

Lymnaea (Stagnicola) palustris (O.F. Müller, 1774) (N?, S?, Si?, Sa?) (*)

Lymnaea (Galba) Schrank, 1803

Lymnaea (Galba) truncatula (O.F. Müller, 1774) (N, S, Si, Sa)

Lymnaea (Radix) Montfort, 1890

Lymnaea (Radix) auricularia (Linnaeus, 1758) (N, S, Sa)

Lymnaea (Radix) peregra (O.F. Müller, 1774) (N, S, Si, Sa) (*)

Note

Lymnaea (Lymnaea): Molti autori assegnano i Lymnaeidae dell'Europa centroccidentale al solo genere *Lymnaea*, suddiviso in alcuni sottogeneri (*Galba*, *Lymnaea*, *Radix*, *Stagnicola*, etc.). Al contrario, molti altri autori trattano questi sottogeneri come generi distinti, rifacendosi a dati cariologici (cf. Burch, 1989 - North American freshwater snails, 365 pp.) di opinabile significato tassonomico (cf. Giusti, 1976 - Lav. Soc. ital. Biogeogr. (N.S.), 5: 99-355). A

complicare il problema sono venute, infine, un certo numero di revisioni recenti (Jackiewicz, 1989 - Malakol. Abh. (Dres.), 14: 1-5; 1990 - Folia malacol., 4: 7-147-155; 1992 - Proc. ninth int. malacol. Congr. (Edinburgh, 31 August - 6 September 1986): 179-179; Kruglov & Starobogatov, 1993a - Ruthenica, 3: 65-92; 1993b - Ruthenica, 3: 161-180) che propongono nuovi, differenti e discordanti ordinamenti sottogenerici. In tale incertezza, si ritiene preferibile conservare l'impostazione tradizionale.

Lymnaea (Stagnicola) corvus: Jackiewicz (1989a - Malakol. Abh. (Dres.), 14: 1-5; 1989b - Malakol. Abh. (Dres.), 14: 7-14; 1990 - Folia malacol., 4: 147-155) ha rivisto il gruppo di entità usualmente assegnato a Stagnicola. Sebbene contestati da alcuni (Kilias, 1992 - Malakol. Abh. (Dresd.), 16: 25-29), i risultati delle ricerche di Jackiewicz suggeriscono come distinte alcune entità di incerto status tassonomico e sembrano indicare l'appartenenza di alcune di queste, come *L. corvus*, a *Lymnaea* piuttosto che a Stagnicola. Se tali conclusioni saranno confermate, andranno completamente riviste tutte le segnalazioni di *L. palustris* (O.F. Müller, 1774) per l'Italia. La presenza di *L. corvus* in Italia risulterebbe accertata almeno per il Lago Maggiore, in base ai dati anatomici di Mirolli (1958 - Mem. Ist. ital. Idrobiol., 10: 209-316). Kruglov & Starobogatov (1993a - Ruthenica, 3: 65-92; 1993b - Ruthenica, 3: 161-180) attribuiscono *Lymnaea corvus* al sottogenere *Corvusiana* Servain, 1881. Falkner (1995 - Abstr. 12th intern. malacol. Congress (Vigo, 1995): 378-379), probabilmente in accordo con l'Art. 30a (1) dell'ICZN (1985), assume che il genere grammaticale del nome Stagnicola sia maschile. L'articolo in oggetto afferma che "a genus-group name that is or ends in a noun of variable gender [...] is to be treated as masculine [...] unless its author states, when establishing the name that it is feminine or treats it as feminine in combination with a species-group name". Stagnicola viene introdotta per la prima volta da Jeffreys (1830) nella sinonimia di *Limneus communis*, combinata con un epiteto specifico (*communis*) che non permette di dirimere oggettivamente il problema. Tutti i numerosi autori che hanno recentemente trattato Stagnicola come genere distinto lo considerano, tuttavia, femminile. Si ritiene, pertanto, che tale accezione, in accordo con l'uso, vada conservata.

Lymnaea (Stagnicola) fusca: La presenza di *Lymnaea fusca*, più nota nella recente letteratura come *L. vulnerata* (Küster, 1862) (cfr. Falkner, 1995 - Abstr. 12th intern. malacol. Congress (Vigo, 1995): 378-379) è stata accertata, su base anatomica, solo per il Friuli, per la Toscana e per la Puglia (dati personali inediti), ma la sua distribuzione in Italia potrebbe essere più estesa. Jackiewicz (1990 - Folia malacol., 4: 147-155) attribuisce *Lymnaea vulnerata* non a Stagnicola ma a *Lymnaea*.

Lymnaea (Stagnicola) palustris: La distribuzione è desunta dalla letteratura, ma in questa entità sembrano incluse più specie simili. Al momento non vi sono dati anatomici sufficienti a confermare la presenza di *Lymnaea palustris* in Italia.

Lymnaea (Galba): Gli autori americani (cf. Clarke, 1981 - The freshwater molluscs of Canada, 446 pp.; Burch, 1989 - North American freshwater snails, 365 pp.) utilizzano il nome *Fossaria* Westerlund, 1885 (specie tipo: *Buccinum truncatum* O.F. Müller, 1774) al posto di *Galba* Schrank, 1803 (specie tipo: *Galba pusilla* Schrank, 1803). Ciò dipende dal fatto che l'identità di *G. pusilla* non è mai stata accertata con chiarezza. Data, tuttavia, la sua ampia utilizzazione in Europa, si preferisce conservare il nome di *Galba*.

Lymnaea (Radix) peregra: La possibile sinonimia tra *Lymnaea ovata* e *L. peregra* è ancora da dimostrare in modo convincente; alcuni autori separano le due entità e convalidano, inoltre, altre entità come specie distinte all'interno del gruppo (Kruglov & Starobogatov, 1993a - Ruthenica, 3: 65-92, 1993b - Ruthenica, 3: 161-180). Kruglov & Starobogatov (1993a, 1993b), inoltre, attribuiscono *L. peregra* al sottogenere *Peregriana* Servain, 1881.

Planorbidae

Bulinus (Isidora) Ehrenberg, 1831

Bulinus (Isidora) truncatus (Audoin, 1827) (Si, Sa)

Planorbis O.F. Müller, 1774

Planorbis carinatus (O.F. Müller, 1774) (N, S)

Planorbis moquini Requier, 1848 (N, S, Si, Sa) (*)

Planorbis planorbis (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Anisus (Anisus) Studer, 1820

Anisus (Anisus) leucostomus (Millet, 1813) (N) (*)

Anisus (Anisus) septemgyratus (Rossmässler, 1835) (N) (*)

Anisus (Anisus) spirorbis (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Anisus (Disculifer) Boettger, 1944

Anisus (Disculifer) vortex (Linnaeus, 1758) (N, S)

Anisus (Disculifer) vorticulus (Troschel, 1834) (N, S) (M)

Bathyomphalus Charpentier, 1837

Bathyomphalus contortus (Linnaeus, 1758) (N, S)

Gyraulus (Armiger) Hartmann, 1844

Gyraulus (Armiger) crista (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Gyraulus (Gyraulus) Charpentier, 1837

Gyraulus (Gyraulus) acronicus (Férussac, 1807) (N?) (*)

Gyraulus (Gyraulus) albus (O.F. Müller, 1774) (N, S)

Gyraulus (Gyraulus) chinensis (Dunker, 1848) (N) (*)

Gyraulus (Torquis) Dall, 1905

Gyraulus (Torquis) laevis (Alder, 1838) (N)

Hippeutis Charpentier, 1837

Hippeutis complanatus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Segmentina Fleming, 1822

Segmentina nitida (O.F. Müller, 1774) (N, S) (M)

Planorbarius Froriep, 1806

Planorbarius corneus (Linnaeus, 1758) (N, S)

Helisoma Swainson, 1840

Helisoma duryi (Wetherby, 1879) (S, Si) (*)

Note

Planorbis moquini: Presente, a N, solo in Liguria. Spesso citato nella letteratura italiana come *Planorbis agraulus* Bourguignat, 1864, *P. brondeli* Raymond, 1853 e *P. numidicus* Bourguignat, 1864 (cf. Giusti, 1976 - Lav. Soc. ital. Biogeogr. (N.S.), 5: 99-355).

Anisus (Anisus) leucostomus: Hubendick (1951 - Ark. Zool. Ser. 2, 2: 551-557) analizza criticamente le relazioni tra *Anisus spirorbis* (Linnaeus, 1758) e *A. leucostomus*, concludendo che queste due entità non possono essere considerate specie diverse. Successivamente, ritornando sul problema ritiene possibile che *A. spirorbis* e *A. leucostomus* possano essere due specie diverse (Hubendick in Kerney, 1976 - J. Conchol., 29: 26-28). Quasi tutti gli autori recenti tendono a considerarle distinte.

Anisus (Anisus) septemgyratus: I rapporti tra *Anisus septemgyratus* e *A. leucostomus* (Millet, 1813) sono da rivedere. Alcuni autori (ad esempio, Glöer et al., 1992 - Süßwassermollusken. Ein Bestimmungsschlüssel für die Bundesrepublik Deutschland, 111 pp.) ritengono che *A. septemgyratus* sia una sottospecie di *A. leucostomus*.

Gyraulus (Gyraulus) acronicus: La presenza di questa specie in Italia rimane da confermare su base anatomica.

Gyraulus (Gyraulus) chinensis: Specie originaria dall'Asia ed introdotta recentemente in Italia; raccolta nelle risaie dell'Italia settentrionale ed in corsi d'acqua della Liguria (Meier-Brook, 1983 - Malacologia, 24: 1-113; dati personali inediti).

Helisoma duryi: Specie originaria del Nord America e raccolta nel Lago di Albano ed a Siracusa (dati personali inediti). Presente anche nelle Isole Maltesi (Giusti et al., 1995a - Mus. reg. Sci. Nat. Monogr. (Torino), 15, in stampa). Un'altra specie del genere *Helisoma*, *H. anceps* (Menke, 1830), originaria del Nord America, è stata segnalata per il Fiume Frigido in Toscana (Henrard, 1966 - Basteria, 32: 2-3), ma non più ritrovata.

Acroloxidae

Acroloxus Beck, 1837

Acroloxus lacustris (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)

Ancylidae

Ancylus O.F. Müller, 1774

Ancylus fluviatilis O.F. Müller, 1774 (N, S, Si, Sa) (*)

Ferrissia Walker, 1903

Ferrissia wautieri (Mirolli, 1960) (N, S, Sa) (*)

Note

Ancylus fluviatilis: Spesso citato come *Ancylastrum fluviatile*. *Ancylastrum* Bourguignat, 1853 è un genere endemico della Tasmania (Hubendick, 1964 - Göteb. K. Vetensk. Vitter Hets-samh. Handl. Sjatte Foljden Ser. B, 9: 72 pp.).

Ferrissia wautieri: Hubendick (1972 - Inf. Soc. bel. Malacol. Ser. 1, 8-9: 109-128) ritiene possibile che questa specie, descritta solo di recente, possa essere conspecifica con qualche specie esotica, accidentalmente introdotta in Europa. Anche se inizialmente conosciuta da poche località, *Ferrissia wautieri* risulta abbastanza diffusa sul territorio italiano (Boato et al., 1985 - Lav. Soc. ital. Biogeogr. (N.S.), 9: 237-371; Baldaccini & Papasogli, 1990 - Boll. malacol., 25: 355-359; Favilli et al., in preparazione).

Stylommatophora

Succineidae

Succinea (Succinea) Draparnaud, 1801

Succinea (Succinea) putris (Linnaeus, 1758) (N) (*)

Succinea (Succinella) Mabilie, 1870

Succinea (Succinella) oblonga Draparnaud, 1801 (N, S) (*)

Catinella (Quickella) Boettger, 1939

Catinella (Quickella) arenaria (Bouchard-Chantereaux, 1837) (N) (*)

Oxyloma Westerlund, 1885

Oxyloma elegans (Risso, 1826) (N, S, Si, Sa) (*)

Oxyloma sarsii (Esmark, 1886) (N) (*)

Note

Succinea (Succinea) putris: La specie è nota in letteratura per l'Italia settentrionale e centrale e per la Sardegna. La maggior parte di queste segnalazioni necessita, però, di essere verificata con riscontri anatomici. Finora è stata confermata su base anatomica solo per il Friuli (dati personali inediti). Appare difficile, in questo contesto, inquadrare molte delle entità descritte o

citare per l'Italia e riprese da Alzona (1971 - Atti Soc. ital. Sci. nat. Mus. civ. Stor. nat. Milano, 111: 1-433) in quanto potrebbero corrispondere a questa specie o a *Oxyloma elegans* (Risso, 1826).

Succinea (Succinella) oblonga: Schileyko & Likharev (1986 - Sbornik Trud. zool. Muz. MGU, 24: 197-239) considerano *Succinella* un genere distinto.

Catinella (Quickella) arenaria: Specie riportata per varie località, soprattutto dell'Italia settentrionale, ma, fino ad oggi, confermata anatomicamente soltanto per una località delle Alpi occidentali (dati personali inediti).

Oxyloma elegans: Questa è la succinea più diffusa in Italia. A questa specie potrebbero corrispondere molte delle entità descritte o citate per l'Italia e riportate da Alzona (1971 - Atti Soc. ital. Sci. nat. Mus. civ. Stor. nat. Milano, 111: 1-433). I sinonimi elencati sono ripresi da Zilch (1978 - Arch. Molluskenkd., 109: 109-136), l'unico autore ad aver tentato recentemente una parziale revisione dei Succineidae dell'Europa occidentale.

Oxyloma sarsii: Presenza probabile in Alto Adige (Bank, in preparazione; dati personali inediti).

Cochlicopidae

Cochlicopa Férussac, 1821

Cochlicopa lubrica (O.F. Müller, 1774) (N, S, Si, Sa) (*)

Hypnophila Bourguignat, 1858

Hypnophila bisacchii Giusti, 1970 (Sa) (E) (*)

Hypnophila cylindrica (Calcara, 1840) (Si) (E)

Hypnophila dohrni (Paulucci, 1882) (S, Sa) (*)

Hypnophila emiliana (Bourguignat, 1858) (Si) (E) (*)

Hypnophila girottii Esu, 1978 (Sa) (E) (*)

Hypnophila incerta (Bourguignat, 1858) (Si) (E) (*)

Note

Cochlicopa lubrica: Gli autori centroeuropei distinguono 3-4 specie di *Cochlicopa* ritenute, fino agli anni '60, semplici sinonimi di *C. lubrica* (cf. Zilch, 1962 - Arch. Molluskenkd., 91: 219-236): *C. lubrica* (Müller, 1774), *C. lubricella* (Porro, 1838), *C. nitens* (Gallenstein, 1848) e *C. repentina* Hudec, 1960. Fenotipi corrispondenti ad alcune di queste entità sono presenti anche nel materiale italiano. Giusti & Manganeli (1992 - Proc. ninth int. malacol. Congr. (Edinburgh, 31 August - 6 September 1986): 153-172), riportano, all'interno di una stessa popolazione, numerose forme conchiliologiche, alcune delle quali corrispondenti a quelle caratteristiche delle specie a tutt'oggi riconosciute come valide ed altre intermedie tra queste, evidenziando così, almeno per il materiale italiano, la difficoltà di riconoscere più entità sulla sola base della forma del nicchio. Recentemente Falkner (1992 - Abstr. 11th int. malacol. Congr. Siena 1992: 337-340) ha evidenziato differenze anatomiche (struttura dell'appendice peniale e dell'epifallo) all'interno delle *Cochlicopa* centroeuropee, ma Armbruster (1993 - Malakol. Abh. (Dresd.), 16: 141-145; 1994 - Malakol. Abh. (Dresd.), 17: 47-56) ritiene che tali differenze siano legate alla maturità sessuale o ad altri fattori e, quindi, siano prive di un reale valore diagnostico. L'analisi

di variabili conchiliologiche in 900 esemplari riferibili a 50 diverse popolazioni dell'Europa centrale dimostrerebbe che fenotipi corrispondenti ai tre gruppi *nitens*, *lubrica-repentina*, *lubricella* sono discriminabili sia in simpatria, che in allopatria (Armbruster, 1995 - J. molluscan Stud. 61: 225-235). Lo studio allozimico (Armbruster & Schlegel, 1994 - J. zool. Syst. evol. Res., 32: 282-296) di 16 delle popolazioni precedentemente analizzate da un punto di vista conchiliologico e anatomico, ha evidenziato che gli esemplari di *C. repentina* non sono separabili da quelli di *C. lubrica*; che le due popolazioni di *C. nitens* sono distinte da tutte le altre; e che, infine, le tre popolazioni di *C. lubricella* si raccordano in maniera diversa con quelle di *lubrica-repentina* a seconda del tipo di elaborazione usato. Le due popolazioni di *C. nitens* e due delle tre popolazioni di *C. lubricella* si staccano da tutte le altre (11 di *C. lubrica-C. repentina* + 1 di *C. lubricella*) intorno ad un valore dell'indice di Nei (1978) pari a 0,2, suggerendo così che potrebbero appartenere a specie distinte. Purtroppo, mancando studi allozimici su esemplari topotipici di *C. lubricella* e su altro materiale italiano, i problemi nomenclaturistici e tassonomici relativi all'inquadramento delle *Cochlicopa* italiane rimangono ancora irrisolti.

Hypnophila bisacchii: Specie endemica della Sardegna centrorientale.

Hypnophila dohrni: La sinonimia con *Hypnophila etrusca* (Paulucci, 1886) e i rapporti con *H. boissii* (Dupuy, 1850) dei Pirenei e della Francia meridionale, *H. remyi* (Boettger, 1949) della Corsica e *H. incerta* (Bourguignat, 1858) delle Isole Eolie, trattate nella recente letteratura come entità distinte (Giusti, 1970 - Atti Soc. toscana Sci. nat. resid. Pisa Mem. Ser. B, 77: 67-87; 1973 - Lav. Soc. ital. Biogeogr. (N.S.), 2: 423-576; 1976 - Lav. Soc. ital. Biogeogr. (N.S.), 5: 99-355; Giusti & Manganelli, 1984 - In: Solem A. & van Bruggen A. C. (eds.), World-wide snails. Biogeographical studies on non-marine Mollusca: 70-92; Gittenberger, 1983 - Zool. Meded. (Leiden), 57: 301-320; Eikenboom, 1995 - De Kreukel, 31: 7-8) rimangono da verificare. A S, *Hypnophila dohrni* è presente solo nell'Arcipelago Toscano, nel Monte Calvi, nel Promontorio di Piombino e nel Monte Argentario in Toscana (Meluzzi, 1980 - Quad. Mus. Stor. nat. Livorno, 1: 41-54; Eikenboom, 1995). Fuori dai confini italiani citata per la Corsica (Giusti, 1976).

Hypnophila emiliana: Specie endemica dell'Isola di Marettimo.

Hypnophila girottii: Specie descritta come fossile, ma ritrovata, di recente, vivente in alcune aree orientali della Sardegna (Bodon et al., in preparazione).

Hypnophila incerta: Entità endemica delle Isole Eolie.

Pyramidulidae

Pyramidula Fitzinger, 1833

Pyramidula rupestris (Draparnaud, 1801) (N, S, Si, Sa)

Vertiginidae

Vertigo (Vertigo) O.F. Müller, 1774

Vertigo (Vertigo) alpestris Alder, 1838 (N)

Vertigo (Vertigo) antivertigo (Draparnaud, 1801) (N, S, Si, Sa)

Vertigo (Vertigo) arctica (Wallenberg, 1858) (N) (M) (*)

Vertigo (Vertigo) genesii (Gredler, 1856) (N) (M) (*)
Vertigo (Vertigo) geyeri Lindholm, 1925 (N) (M) (*)
Vertigo (Vertigo) moulinsiana (Dupuy, 1849) (N, S, Sa) (M) (*)
Vertigo (Vertigo) pusilla (O.F. Müller, 1774) (N, S, Si)
Vertigo (Vertigo) pygmaea (Draparnaud, 1801) (N, S, Sa)
Vertigo (Vertigo) substriata (Jeffreys, 1833) (N) (*)

***Vertigo (Vertilla)* Moquin-Tandon, 1855**

Vertigo (Vertilla) angustior Jeffreys, 1830 (N, S)

***Columella* Westerlund, 1878**

Columella aspera Waldén, 1966 (S) (*)
Columella columella (Martens, 1830) (N)
Columella edentula (Draparnaud, 1805) (N, S)

***Truncatellina* Lowe, 1852**

Truncatellina callicratis (Scacchi, 1833) (N, S, Si, Sa) (*)
Truncatellina claustralis (Gredler, 1856) (N, S) (*)
Truncatellina cylindrica (Férussac, 1807) (N, S, Si, Sa)
Truncatellina monodon (Held, 1837) (N)

Note

Vertigo (Vertigo) arctica: Spesso considerata un sinonimo più giovane o una sottospecie di *Vertigo modesta* (Say, 1824), è ritenuta da Pokryszko (1990 - Ann. zool. (Warsaw), 43: 133-257) una specie distinta. Segnalata per il Trentino-Alto Adige.

Vertigo (Vertigo) genesii: Presente, in Italia, solo in Alto Adige.

Vertigo (Vertigo) geyeri: Presente, in Italia, solo nelle Alpi orientali (Bank, in preparazione; dati personali inediti).

Vertigo (Vertigo) moulinsiana: Specie segnalata anche per la Sicilia, ma il materiale storico controllato appartiene ad altre specie (Manganelli et al., in preparazione).

Vertigo (Vertigo) substriata: Entità citata per l'Alto Adige e per le Dolomiti.

Columella aspera: Raccolta nell'Isola d'Elba (Giusti et al., 1995b - I molluschi terrestri, d'acqua dolce e salmastri delle Isole Toscane, in stampa).

Truncatellina callicratis: *Truncatellina costulata* (Nilsson, 1823), segnalata da Giusti & Castagnolo (1983 - Lav. Soc. ital. Biogeogr. (N.S.), 8: 227-249) per la Sardegna, è lapsus calami per *T. callicratis*.

Truncatellina claustralis: A S, distribuzione limitata all'Abruzzo (dati personali inediti).

Orculidae

***Odontocyclas* Schlüter, 1838**

Odontocyclas kokeili (Rossmässler, 1837) (N) (*)

Walklea Gittenberger, 1978

Walklea rossmaessleri (Rossmässler, 1838) (N) (*)

Orculella Steenberg, 1925

Orculella templorum (Benoit, 1862) (*)

Orculella templorum templorum (Benoit, 1862) (Si) (E)

Orcula Held, 1837

Orcula conica (Rossmässler, 1837) (N) (*)

Orcula dolium (Draparnaud, 1801) (N)

Orcula gularis (Rossmässler, 1837) (N) (*)

Orcula spoliata (Rossmässler, 1837) (N)

Sphyradium Charpentier, 1837

Sphyradium doliolum (Bruguière, 1792) (N, S, Sa)

Pagodulina Clessin, 1876

Pagodulina austeniana (Nevill, 1880) (N)

Pagodulina pagodula (Des Moulins, 1830) (N, S) (*)

Pagodulina subdola (Gredler, 1856)

Pagodulina subdola subdola (Gredler, 1856) (N)

Note

Odontocyclas kokeili: Specie nota, in Italia, per il Friuli-Venezia Giulia e per una stazione isolata della Lombardia (Boato et al., 1989 - Biogeographia Lav. Soc. ital. Biogeogr. N.S., 12: 429-528; Eikenboom, 1993 - De Kreukel, 29: 69-70).

Walklea rossmaessleri: Entità presente, in Italia, nel Friuli centroorientale e nel Carso.

Orculella templorum: La sottospecie tipica è nota solo per la Sicilia sudoccidentale (Hausdorf, 1988 - Arch. Molluskenkd., 119: 77-81).

Orcula conica: Distribuzione limitata, in Italia, alle Alpi Giulie ed al Carso.

Orcula gularis: Distribuzione limitata, in Italia, al Comelico ed alla valle del Fella.

Pagodulina pagodula: A S, segnalata solo per la Calabria.

Chondrinidae

Granopupa Boettger, 1889

Granopupa granum (Draparnaud, 1801) (N, S, Si, Sa)

Granaria Held, 1837

Granaria illyrica (Rossmässler, 1837) (N, S) (*)

Granaria stabilei (Martens, 1865) (N) (*)

Granaria variabilis (Draparnaud, 1801) (N) (*)

***Abida* Turton, 1831**

Abida secale (Draparnaud, 1801) (*)

Abida secale secale (Draparnaud, 1801) (N, S, Sa)

***Solatopupa* Pilsbry, 1917**

Solatopupa guidoni (Caziot, 1903) (S, Sa) (*)

Solatopupa juliana (Issel, 1866) (N, S) (E) (*)

Solatopupa pallida (Rossmässler, 1842) (N) (E) (*)

Solatopupa psarolena (Bourguignat, 1859) (N) (*)

Solatopupa similis (Bruguière, 1792) (N)

***Rupestrella* Monterosato, 1894**

Rupestrella occulta (Rossmässler, 1839) (Si) (E) (*)

Rupestrella philippii (Cantraine, 1840) (S, Si, Sa)

Rupestrella rupestris (Philippi, 1836) (S, Si) (E) (*)

Rupestrella scalaris (Benoit, 1882) (Si) (E) (*)

***Chondrina* Reichenbach, 1828**

Chondrina avenacea (Bruguière, 1792) (*)

Chondrina avenacea avenacea (Bruguière, 1792) (N, S, Si, Sa)

Chondrina avenacea istriana Ehrmann, 1931 (N)

Chondrina avenacea latilabris (Stossich, 1895) (N) (E)

Chondrina avenacea leptota (Westerlund, 1887) (N)

Chondrina avenacea lessinica (Adami, 1885) (N) (E)

Chondrina avenacea veneta Nordsieck, 1962 (N) (E)

Chondrina bergomensis (Küster, 1850) (N) (E) (*)

Chondrina clienta (Westerlund, 1883) (*)

Chondrina clienta clienta (Westerlund, 1883) (N)

Chondrina megacheilos (De Cristofori & Jan, 1832) (*)

Chondrina megacheilos avenoides (Westerlund, 1874) (N) (E)

Chondrina megacheilos caziotana Pilsbry, 1918 (N)

Chondrina megacheilos generosensis Nordsieck, 1962 (N)

Chondrina megacheilos megacheilos (De Cristofori & Jan, 1832) (N)

Chondrina megacheilos toscolana (Schröder, 1913) (N) (E)

Chondrina multidentata (Strobel, 1851) (E) (*)

Chondrina multidentata gredleriana (Clessin, 1887) (N)

Chondrina multidentata multidentata (Strobel, 1851) (N)

Chondrina multidentata schista (Westerlund, 1887) (N)

Chondrina oligodonta (Del Prete, 1879) (S) (E) (*)

Note

Granaria illyrica: Questa entità è, talvolta, considerata un sinonimo più giovane o una sottospecie di *Granaria frumentum* (Draparnaud, 1801). Zullini et al. (1968 - Rend. Accad. naz. XL, (IV), 18: 22 pp.) segnalano "*Abida frumentum*" per l'Isola di Tavolara, ma il dato, l'unico per la Sardegna, è basato su materiale spiaggiato.

Granaria stabilei: Distribuzione limitata alle Alpi occidentali; oltre i confini italiani è circoscritta alla Francia sudorientale.

Granaria variabilis: Entità presente, in Italia, in Liguria occidentale e in alcune località della Liguria centrale, del Piemonte e dell'Emilia-Romagna.

Abida secale: Per una località della Liguria occidentale è stata citata *Abida polyodon* (Draparnaud, 1801) sulla base di reperti storici (Boato et al., 1985 - Lav. Soc. ital. Biogeogr. (N.S.), 9: 237-371). Tuttavia, ricerche recenti escludono la presenza della specie in territorio italiano.

Solatopupa guidoni: S. Gofas ha, recentemente, rintracciato nella collezione del Muséum National d'Histoire Naturelle di Parigi (Francia) 3 sintipi di *Pupa similis* var. *guidoni* che hanno permesso di dimostrare, inequivocabilmente, che *Solatopupa simonettae* descritta da Giusti (1970) è un suo più giovane sinonimo. Presente in Sardegna nordorientale e, a S, solo nell'Isola d'Elba.

Solatopupa juliana: Entità recentemente separata su base elettroforetica da *Solatopupa similis* (Bruguère, 1792) e presente, a N, solo in Liguria in provincia di La Spezia (Boato, 1991 - Boll. Zool., 58: 345-354).

Solatopupa pallida: Specie nota con certezza solo per l'Italia, in Liguria orientale, con un'unica stazione nella Riviera di ponente (Boato et al., 1985 - Lav. Soc. ital. Biogeogr. (N.S.), 9: 237-371).

Solatopupa psarolena: Presente in poche stazioni delle Alpi Liguri (Boato et al., 1985 - Lav. Soc. ital. Biogeogr. (N.S.), 9: 237-371); fuori dai confini è stata segnalata solo per la Val Roia.

Rupestrella occulta: Entità da rivedere. Distribuzione limitata alla Sicilia nordoccidentale.

Rupestrella rupestris: Specie segnalata, a S, solo per l'Isola di Capri.

Rupestrella scalaris: Entità da rivedere. Distribuzione limitata alla Sicilia nordoccidentale.

Chondrina avenacea: Le entità sottospecifiche occupano areali più o meno estesi lungo l'arco alpino centrorientale (Nordsieck, 1962 - Arch. Molluskenkd., 91: 1-20; Gittenberger, 1973 - Zool. Verh. (Leiden), 127: 1-267).

Chondrina bergomensis: Distribuzione limitata ai dintorni di Bergamo.

Chondrina clienta: Distribuzione limitata, in Italia, alle Alpi Carniche e Giulie.

Chondrina megacheilos: La specie occupa con le sue sottospecie areali più o meno estesi lungo l'arco alpino centrale (Nordsieck, 1962 - Arch. Molluskenkd., 91: 1-20; Gittenberger, 1973 - Zool. Verh. (Leiden), 127: 1-267); la sottospecie tipica è diffusa anche nel Canton Ticino, mentre *C. megacheilos caziotana* è presente nelle Alpi Liguri presso il confine francese (dati personali inediti) e nel SE della Francia. *C. m. generosensis* si trova solo nel Canton Ticino e nell'area italiana confinante; Groh (1990 - Mitt. dtsch. malakozool. Ges., 46: 31-39) ritiene che quest'ultima sottospecie possa rappresentare una specie a sé stante.

Chondrina multidentata: La specie occupa con le sue entità sottospecifiche areali più o meno estesi lungo l'arco alpino centrorientale (Nordsieck, 1962 - Arch. Molluskenkd., 91: 1-20; Gittenberger, 1973 - Zool. Verh. (Leiden), 127: 1-267).

Chondrina oligodonta: Distribuzione limitata alle Alpi Apuane.

Pupillidae

***Pupilla* (*Pupilla*) Fleming, 1828**

- Pupilla* (*Pupilla*) *alpicola* (Charpentier, 1837) (N)
- Pupilla* (*Pupilla*) *muscorum* (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)
- Pupilla* (*Pupilla*) *sterri* (Voith, 1838) (N)
- Pupilla* (*Pupilla*) *triplicata* (Studer, 1820) (N, S)

***Lauria* (*Lauria*) Gray in Turton, 1840**

- Lauria* (*Lauria*) *cylindracea* (Da Costa, 1778) (N, S, Si, Sa)
- Lauria* (*Lauria*) *sempronii* (Charpentier, 1837) (N, S, Sa)

***Argna* Cossmann, 1889**

- Argna biplicata* (Michaud, 1831) (*)
- Argna biplicata biplicata* (Michaud, 1831) (N, S)
- Argna biplicata excessiva* (Gredler, 1856) (N)
- Argna bourguignatiana* (Nevill, 1880) (N, S?) (E) (*)
- Argna ferrarii* (Porro, 1838) (*)
- Argna ferrarii blanci* (Bourguignat, 1863) (N)
- Argna ferrarii ferrarii* (Porro, 1838) (N)
- Argna ligustica* (Pollonera, 1887) (N) (E) (*)
- Argna valsabina* (Spinelli, 1851) (N) (E) (*)

***Agardhiella* Hesse, 1923**

- Agardhiella truncatella* (Pfeiffer, 1841) (*)
- Agardhiella truncatella truncatella* (Pfeiffer, 1841) (N)

Note

Argna biplicata: La sottospecie tipica è presente, in Italia, nelle Langhe (Repetto, 1986 - Riv. piemont. Stor. nat., 7: 213-216), nelle Alpi Liguri (Boato et al., 1985 - Lav. Soc. ital. Biogeogr. (N.S.), 9: 237-371) e nelle regioni appenniniche; in collezione Paulucci (Museo di Zoologia dell'Università di Firenze) esiste materiale storico, raccolto in un giardino a Palermo, ma non essendo mai stata citata per la Sicilia, si ritiene possibile che si tratti di materiale importato; la sottospecie *A. biplicata excessiva* è diffusa, in Italia, solo nelle regioni nordorientali.

Argna bourguignatiana: Entità dubbia, presente solo in Liguria occidentale e, forse, anche nella Francia sudorientale; a S risultano reperti incerti per la Toscana.

Argna ferrarii: Specie diffusa, con la sottospecie tipica, lungo l'arco alpino, dal Trentino al Piemonte e, con la sottospecie *A. ferrarii blanci*, nelle Alpi Liguri. Quest'ultima è presente, fuori dai confini italiani, in Francia, nelle Alpi Marittime, mentre la sottospecie tipica è diffusa anche nel Canton Ticino, in Svizzera.

Argna ligustica: Entità di incerta validità, diffusa solo in Liguria.

Argna valsabina: Specie endemica delle Prealpi Lombarde e Venete (Eikenboom, 1993 - De Kreukel, 29: 71-74).

Agardhiella truncatella: Distribuzione limitata, in Italia, alle regioni orientali.

Spelaeodiscidae

Spelaeodiscus (Spelaeodiscus) Brusina, 1886

Spelaeodiscus (Spelaeodiscus) hauffeni (Schmidt, 1855) (N?) (*)

Note

Spelaeodiscus (Spelaeodiscus) hauffeni: Le segnalazioni per il territorio italiano appaiono estremamente dubbie in quanto la specie sembra presente solo in una ristretta area della Slovenia (Bole, 1964 - Speleology, 1: 349-356).

Valloniidae

Vallonia Risso, 1826

Vallonia costata (O.F. Müller, 1774) (N, S) (*)

Vallonia enniensis (Gredler, 1856) (N)

Vallonia pulchella (O.F. Müller, 1774) (N, S, Si, Sa) (*)

Acanthinula Beck, 1846

Acanthinula aculeata (O.F. Müller, 1774) (N, S, Si, Sa)

Gittenbergia Giusti & Manganelli, 1986

Gittenbergia sororcula (Benoit, 1857) (N, S, Si)

Note

Vallonia costata: Citata erroneamente da Giusti & Castagnolo (1983 - Lav. Soc. ital. Biogeogr. (N.S.), 8: 227-249) per la Sardegna.

Vallonia pulchella: *Vallonia excentrica* Sterki, 1892 è ritenuta da molti autori una specie distinta da *V. pulchella* (O.F. Müller, 1774).

Pleurodiscidae

Pleurodiscus Wenz, 1919

Pleurodiscus balmei (Potiez & Michaud, 1838) (S, Si) (*)

Note

Pleurodiscus balmei: Distribuzione limitata, a S, alla Calabria meridionale.

Enidae

Chondrula (Chondrula) Beck, 1837

Chondrula (Chondrula) quinquedentata (Rossmässler, 1837) (N) (*)

Chondrula (Chondrula) tridens (O.F. Müller, 1774) (N, S) (*)

Chondrula (Mastus) Beck, 1837

Chondrula (Mastus) pupa (Linnaeus, 1758) (S, Si, Sa) (*)

Jaminia (Jaminia) Risso, 1826

Jaminia (Jaminia) quadridens (O.F. Müller, 1774) (N, S, Sa)

Ena (Ena) Turton, 1831

Ena (Ena) montana (Draparnaud, 1801) (N)

Ena (Merdigera) Held, 1837

Ena (Merdigera) obscura (O.F. Müller, 1774) (N, S, Si, Sa) (*)

Zebrina (Zebrina) Held, 1837

Zebrina (Zebrina) detrita (O.F. Müller, 1774) (N, S)

Note

Chondrula (Chondrula) quinquedentata: In Italia, distribuzione limitata a poche stazioni nel settore orientale del Friuli-Venezia Giulia.

Chondrula (Chondrula) tridens: Alzona (1971 - Atti Soc. ital. Sci. nat. Mus. civ. Stor. nat. Milano, 111: 1-433) riporta *Chondrula tridens* anche per la Sardegna, ma la presenza della specie in quest'isola non è confermata da Giusti & Castagnolo (1983 - Lav. Soc. ital. Biogeogr. (N.S.), 8: 227-249).

Chondrula (Mastus) pupa: *Mastus*, talvolta riportato come genere distinto da *Chondrula*, appare privo di caratteri anatomici di rilevanza diagnostica.

Ena (Merdigera) obscura: Schileyko (1984 - Fauna SSSR (N.S.), 130: 1-399) rivaluta per questa specie il genere *Merdigera* Held, 1837. Tuttavia, le differenze anatomiche tra *Ena obscura* ed *E. montana* (Draparnaud, 1801), quest'ultima specie tipo di *Ena*, non sembrano così rilevanti da giustificare la loro attribuzione a due distinti generi.

Punctidae

Punctum Morse, 1864

Punctum pygmaeum (Draparnaud, 1801) (N, S, Si, Sa)

Paralaoma Iredale, 1913

Paralaoma caputspinulae (Reeve, 1852) (N, S, Si, Sa) (*)

Note

Paralaoma caputspinulae: Questa entità è conosciuta nelle letteratura recente con il nome di *Punctum pusillum* (Lowe, 1831) o di *Toltecia pusilla* (Lowe, 1831). Roth (1987 - Veliger, 30: 95-96) dimostra che il nome *Helix pusilla* Lowe, 1831, non può essere usato, in quanto invalidato dall'esistenza di due omonimi primari più vecchi: *H. pusilla* Vallot, 1801 e *H. pusilla* Fleming, 1828. Roth (1987) propone, quindi, di sostituirlo con *Helix caputspinulae* Reeve, 1852, descritto su materiale raccolto in Nuova Zelanda, la cui sinonimia con *H. pusilla* Lowe, 1831 è sostenuta da Climo (in Roth, 1987). La sinonimia tra *Paralaoma* Iredale, 1913 e *Toltecia* Pilsbry, 1926 deriva dal fatto che le specie tipo di questi due generi, rispettivamente *Paralaoma raoulensis* Iredale, 1913 e *Thysanophora* (*Toltecia*) *jaliscoense* Pilsbry, 1926, risultano, a loro volta, sinonimi più giovani di *H. caputspinulae* Reeve, 1852 (Roth, 1987). Seppur con qualche margine di dubbio (mancano del tutto notizie anatomiche su *H. caputspinulae*, *P. raoulensis* e *T. jaliscoense*) viene accettata questa soluzione del problema. Nel caso che la sinonimia tra *H. pusilla* Lowe, 1831 e *H. caputspinulae* Reeve, 1852 si dimostrasse infondata, il nome più vecchio disponibile, per questa specie, diventerebbe *Helix micropleuros* Paget, 1854. *Helix tenuicostata* Pfeiffer, 1846, descritta su materiale della Sardegna, è un sinonimo più vecchio di *Helix caputspinulae* Reeve, 1852, ma non disponibile in quanto invalidato dall'esistenza di un omonimo primario più vecchio: *Helix tenuicostata* Philippi, 1845. E' probabile che *P. caputspinulae* sia una specie introdotta.

Helicodiscidae

***Helicodiscus* (*Hebetodiscus*)** Baker, 1929

Helicodiscus (*Hebetodiscus*) *riparbellii* Giusti, 1976 (N, S, Si, Sa) (*)

Helicodiscus (*Hebetodiscus*) *singleyanus* (Pilsbry, 1890) (N, S) (*)

Note

Helicodiscus (*Hebetodiscus*) *riparbellii*: Specie descritta come endemica dell'Isola di Montecristo ma, recentemente, ritrovata in molte località italiane ed anche estere (Boato et al., 1985 - Lav. Soc. ital. Biogeogr. (N.S.), 9: 237-371; dati personali inediti). La maggior parte di questi reperti è stato determinata solo su base conchiliologica e necessita, quindi, di una verifica anatomica. È possibile che si tratti di una specie introdotta, anche se non sembra che siano stati descritti taxa extraeuropei con essa coincidenti.

Helicodiscus (Hebetodiscus) singleyanus: Specie introdotta dall'America settentrionale e raccolta in Italia a partire dal 1971 (Pezzoli, 1985 - Soc. venez. Sci. Nat. Lav., Suppl., 10: 129-134). Attualmente risulta molto diffusa, in ambienti endogei, lungo il greto dei torrenti, sia in aree collinari che planiziarie.

Discidae

Discus (Discus) Fitzinger, 1833

Discus (Discus) perspectivus (Megerle von Mühlfeld, 1816) (N) (*)

Discus (Discus) rotundatus (O.F. Müller, 1774) (N, S, Si, Sa)

Discus (Discus) ruderatus (Férussac, 1821) (N)

Note

Discus (Discus) perspectivus: Distribuzione limitata, in Italia, al Friuli-Venezia Giulia. Alzona (1971 - Atti Soc. ital. Sci. nat. Mus. civ. Stor. nat. Milano, 111: 1-433) riporta la specie anche per le Isole Tremiti, tuttavia questa segnalazione appare incerta, dato che Sacchi (1955 - Boll. Zool., 22: 93-111) esclude la presenza di specie del genere *Discus* nelle Isole Tremiti.

Arionidae

Arion Férussac, 1819

Arion circumscriptus Johnston, 1828 (N) (*)

Arion distinctus Mabille, 1868 (N) (*)

Arion euthymeanus Florence, 1888 (N) (*)

Arion franciscoloi Boato, Bodon & Giusti, 1983 (N, S) (E) (*)

Arion intermedius Normand, 1852 (N, S, Si) (*)

Arion isseli (Lessona & Pollonera, 1882) (Sa) (E) (*)

Arion lusitanicus Mabille, 1868 (N) (*)

Arion rufus (Linnaeus, 1758) (N) (*)

Arion subfuscus (Draparnaud, 1805) (N) (*)

Ariunculus Lessona, 1881

Ariunculus speziae Lessona, 1881 (N) (E) (*)

Note

Arion: Le specie del genere *Arion* vengono inquadrare dalla maggior parte degli autori in alcuni sottogeneri (*Arion* s. str., *Carinarion* Hesse, 1926, *Ichnusarion* Pollonera, 1890, *Kobeltia* Schübert, 1873, *Microarion* Hesse, 1926 e *Mesarion* Hesse, 1926) il cui significato tassonomico non è stato, ancora, del tutto accertato (Boato et al., 1983 - Arch. Molluskenkd., 114: 35-44; Backeljau & De Bruyn, 1990 - Bull. Inst. r. Sci. nat. Belg. Biol., 60: 35-68).

Arion circumscriptus: *Arion circumscriptus* è attribuito al sottogenere *Carinarion*. Le specie di

Carinarion, *A. circumscriptus*, *A. fasciatus* (Nilsson, 1822) e *A. silvaticus* Lohmander, 1937, sono costituite da "genetic strains" il cui inquadramento tassonomico-nomenclaturistico non è chiaro (Backeljau et al., 1987 - Zool. Scr., 16: 209-222). Ciascuno degli "strains" potrebbe essere trattato come una specie distinta o, alternativamente, tutti i "genetic strains" potrebbero essere assegnati ad una sola specie. In questo contesto si ritiene di adottare quest'ultima soluzione per uniformità con quanto avviene nel caso simile di *A. intermedius*.

Arion distinctus: Parte del materiale italiano, citato come *Arion hortensis* Férussac, 1819, corrisponde, per i tratti anatomici, ad *A. alpinus* sensu Reischütz (1980 - Festschrift zur 50-Jahr-Feier des Höbarthmuseums und Museumvereins in Horn 1930-1980: 259-275), specie che potrebbe ricadere in *A. distinctus* (dati personali inediti). Attribuito a Kobeltia.

Arion euthymeanus: Il materiale della Liguria occidentale accostato erroneamente da Boato et al. (1985 - Lav. Soc. ital. Biogeogr. (N.S.), 9: 237-371) ad *Arion atripunctatus* Dumont & Mortillet, 1857 corrisponde ad *A. euthymeanus*, entità diffusa nel sud-est della Francia, la cui validità è ancora incerta. Assegnabile al sottogenere *Mesarion*.

Arion franciscoloi: Distribuzione limitata, a N, alla Liguria ed, a S, alle Alpi Apuane (Boato et al., 1983 - Arch. Molluskenkd., 114: 35-44). Non rientra in alcuno dei sottogeneri usualmente riconosciuti.

Arion intermedius: *Arion alpinus* Pollonera, 1887 è un sinonimo più giovane di *A. intermedius*. Reischütz (1980 - Festschrift zur 50-Jahr-Feier des Höbarthmuseums und Museumvereins in Horn 1930-1980: 259-275) tratta *A. alpinus* Pollonera, 1887 come una specie distinta, ma lo schema dell'anatomia degli esemplari austriaci esaminati è completamente diverso da quello illustrato da Pollonera (1887 - Atti r. Accad. Sci. Torino, 22: 290-313) e da quello dei topotipi (dati personali inediti). Attribuito al sottogenere *Microarion* dalla maggior parte degli autori e, più recentemente, a Kobeltia.

Arion isseli: Attribuito a *Ichnusarion*.

Arion lusitanicus: L'areale originario si estende nell'Europa occidentale; specie raccolta in Italia a partire dal 1965 (Cesari, 1978 - Soc. venez. Sci. nat. Lav., 3: 3-7) ed attualmente in espansione in molte località del Nord Italia, in ambienti antropizzati, ma anche in aree incolte. Citata da Boato et al. (1985 - Lav. Soc. ital. Biogeogr. (N.S.), 9: 237-371) per le Alpi Apuane sulla base di vecchie segnalazioni di *Arion rufus*, ma la presenza della specie in questa area non ha mai avuto conferme. Attribuito ad *Arion* (*Mesarion*).

Arion rufus: Alcuni autori considerano *Arion rufus* una sottospecie di *A. ater* (Linnaeus, 1758). La presenza, almeno in alcune località nel settore occidentale del N Italia, è dovuta ad importazione; le segnalazioni per il S non hanno conferme recenti. Attribuito ad *Arion* (*Arion*).

Arion subfuscus: Attribuito al sottogenere *Mesarion*.

Ariunculus speziae: Distribuzione limitata alle Alpi Graie e Pennine. Bishop (1976 - Atti Soc. ital. Sci. nat. Mus. civ. Stor. nat. Milano, 117: 265-299) tratta *Ariunculus* come genere distinto da *Arion*. Tuttavia, lo stato di questo genere deve essere rivisto nel contesto di una revisione della sistematica sopraspecifica degli Arionidae.

Vitrinidae

Vitrina Draparnaud, 1801

Vitrina pellucida (O.F. Müller, 1774) (N, S, Si, Sa)

Eucobresia Baker, 1929

Eucobresia diaphana (Draparnaud, 1805) (N)
Eucobresia nivalis (Dumont & Mortillet, 1852) (N)
Eucobresia pegorarii (Pollonera, 1884) (N)

Phenacolimax Stabile, 1859

Phenacolimax blanci (Pollonera, 1884) (N) (E) (*)
Phenacolimax stabilei (Lessona, 1880) (N) (*)

Oligolimax Fischer in Paulucci, 1878

Oligolimax annularis (Studer, 1820) (N, S)
Oligolimax glacialis (Forbes, 1837) (N) (*)
Oligolimax paulucciae (Fischer in Paulucci, 1878) (S, Si) (E) (*)
Oligolimax pollonerianus (Pollonera in Fra Piero, 1897) (Sa) (E) (*)

Semilimax (Semilimax) Agassiz, 1845

Semilimax (Semilimax) carinthiacus (Westerlund, 1886) (N)
Semilimax (Semilimax) kotulae (Westerlund, 1883) (N)
Semilimax (Semilimax) semilimax (Férussac, 1802) (N?) (*)

Semilimacella Soós, 1917

Semilimacella bonelli (Targioni Tozzetti, 1873) (N, S) (E) (*)
Semilimacella carniolica (Boettger, 1884) (N) (*)

Vitrinobrachium Künkel, 1929

Vitrinobrachium baccettii Giusti & Mazzini, 1970 (N, S) (E) (*)
Vitrinobrachium breve (Férussac, 1821) (N, S) (*)
Vitrinobrachium tridentinum Forcart, 1956 (N) (E) (*)

Note

Phenacolimax blanci: Specie localizzata nelle Alpi Liguri. Le segnalazioni di *Phenacolimax major* (Férussac, 1807) (cf. Alzona, 1971 - Atti Soc. ital. Sci. nat. Mus. civ. Stor. nat. Milano, 111: 1-433; Bishop, 1976 - Atti Soc. ital. Sci. nat. Mus. civ. Stor. nat. Milano, 117: 265-299; Boato et al., 1985 - Lav. Soc. ital. Biogeogr. (N.S.), 9: 237-371) per l'Italia non hanno, finora, ricevuto conferma. Quelle per l'Italia nordoccidentale potrebbero riferirsi a *P. blanci* o a *P. stabilei* (Lessona, 1880).

Phenacolimax stabilei: Distribuzione limitata alle Alpi occidentali. Fuori dai confini italiani la specie è nota solo per l'area limitrofa della Francia (De Winter, 1990 - Basteria, 54: 223-236). *Oligolimax*: L'esame dei sintipi di *Vitrina paulucciae*, specie tipo di *Oligolimax*, ha permesso di accertare che la sinonimia tra *V. paulucciae* e *V. bonelli* (Targioni Tozzetti, 1873) proposta da Forcart (1965 - Verh. naturforsch Ges. Basel, 76: 59-184) è errata. L'esame anatomico di esemplari perfettamente corrispondenti ai sintipi ha evidenziato che la struttura dell'apparato

genitale corrisponde a quella delle specie assegnate ai generi *Insulivitrina* e *Gallandia*. Conseguentemente tanto *Gallandia* che *Insulivitrina* devono essere trattati come sinonimi più giovani di *Oligolimax* (Giusti et al., in preparazione).

Oligolimax glacialis: L'appartenenza di questa specie al genere *Oligolimax* deve essere verificata.

Oligolimax paulucciae: Distribuzione limitata alla Sicilia nordorientale e alla Calabria.

Oligolimax pollonerianus: Attribuzione generica da verificare (dati personali inediti).

Semilimax (Semilimax) semilimax: Le segnalazioni di *Semilimax semilimax* per l'Italia (cf. Alzona, 1971 - Atti Soc. ital. Sci. nat. Mus. civ. Stor. nat. Milano, 111: 1-433) devono essere verificate su base anatomica.

Semilimacella bonelli: A N, distribuzione limitata alla Romagna (Zangheri, 1969 - Mus. civ. Stor. nat. Verona Mem. f.s., 1 (4): 1415-1693).

Semilimacella carniolica: Specie limitata, in Italia, alle Alpi Giulie e al Carso.

Vitrinobrachium baccettii: Specie accertata, per il N, solo in Liguria e, per il S, nelle Alpi Apuane.

Vitrinobrachium breve: A S, accertato solo per il Monte Amiata in Toscana.

Vitrinobrachium tridentinum: Distribuzione localizzata nella valle del Brenta ed in Trentino-Alto Adige.

Zonitidae

Vitrea Fitzinger, 1833

Vitrea botterii (Pfeiffer, 1853) (S)

Vitrea contracta (Westerlund, 1871) (N, S, Si, Sa) (*)

Vitrea diaphana (Studer, 1820)

Vitrea diaphana erjavecii (Brusina, 1870) (N)

Vitrea etrusca (Paulucci, 1878) (N, S) (E)

Vitrea minellii Pintér & Giusti, 1983 (N) (E) (*)

Vitrea pseudotrolli Pintér, 1983 (N) (*)

Vitrea subrimata (Reinhardt, 1871) (N, S, Si, Sa) (*)

Vitrea trolli (Wagner, 1922) (N) (E) (*)

Vitrea sp. (Si) (*)

Zonites Montfort, 1810

Zonites algirus (Linnaeus, 1758) (N?, S) (*)

Aegopis Fitzinger, 1833

Aegopis gemonensis (Férussac, 1832) (N) (*)

Aegopis italicus (Kobelt, 1876) (S) (E)

Aegopis verticillus (Férussac, 1822) (N) (*)

Aegopinella Lindholm, 1927

Aegopinella cisalpina Riedel, 1983 (N) (E)

Aegopinella forcarti Riedel, 1983 (N)
Aegopinella graziadeii (Boeckel, 1940) (N) (E) (*)
Aegopinella minor (Stabile, 1864) (N, S) (*)
Aegopinella nitens (Michaud, 1831) (N) (*)
Aegopinella pura (Alder, 1830) (N, S, Sa)
Aegopinella ressmanni (Westerlund, 1883) (N) (*)

***Retinella* Fischer, 1877**

Retinella hiulca (Albers, 1850) (N)
Retinella olivetorum (Gmelin, 1791) (E) (*)
 Retinella olivetorum icterica (Tiberi, 1872) (S, Si)
 Retinella olivetorum olivetorum (Gmelin, 1791) (N, S)
Retinella pseudoaegopinella Giusti, Boato & Bodon, 1986 (N) (E)
Retinella stabilei (Pollonera, 1886) (N) (E) (*)

***Nesovitrea* Cooke, 1921**

Nesovitrea hammonis (Ström, 1765) (N)
Nesovitrea petronella (Pfeiffer, 1853) (N)

***Oxychilus (Oxychilus)* Fitzinger, 1833**

Oxychilus (Oxychilus) clarus (Held, 1837) (N, S)
Oxychilus (Oxychilus) diductus (Westerlund, 1886) (Si) (E) (*)
Oxychilus (Oxychilus) draparnaudi (Beck, 1837) (N, S, Si) (*)
Oxychilus (Oxychilus) fuscus (Rossmässler, 1838) (Si) (E) (*)
Oxychilus (Oxychilus) gardinii Manganelli, Bodon & Giusti, 1992 (N) (E) (*)
Oxychilus (Oxychilus) lagrecai Giusti, 1973 (Si) (E) (*)
Oxychilus (Oxychilus) lanzai Forcart, 1967 (S) (E) (*)
Oxychilus (Oxychilus) majori (Westerlund in Paulucci, 1886) (S) (E) (*)
Oxychilus (Oxychilus) meridionalis (Paulucci, 1881) (N, S) (E) (*)
Oxychilus (Oxychilus) mortilleti (Pfeiffer, 1859) (N)
Oxychilus (Oxychilus) perspectivus (Kobelt, 1881) (S, Si) (*)
Oxychilus (Oxychilus) pilula (Westerlund in Paulucci, 1886) (S) (E) (*)
Oxychilus (Oxychilus) oppressus (Fisher & Studer, 1878) (Sa) (E)
Oxychilus (Oxychilus) uziellii (Issel, 1872) (N, S) (E) (*)

***Oxychilus (Alzonula)* Giusti, 1968**

Oxychilus (Alzonula) oglasicola Giusti, 1968 (S) (E) (*)

***Oxychilus (Hyalocornea)* Monterosato, 1892**

Oxychilus (Hyalocornea) alicurensis (Benoit, 1857) (Si) (E) (*)
Oxychilus (Hyalocornea) canini (Benoit, 1843) (Si) (E) (*)
Oxychilus (Hyalocornea) egadiensis Riedel, 1973 (Si) (E) (*)
Oxychilus (Hyalocornea) nortoni (Calcara, 1843) (Si) (E) (*)

***Oxychilus (Hyalofusca)* Monterosato, 1892**

Oxychilus (Hyalofusca) denatale (Pfeiffer, 1856) (Si) (E) (*)

***Oxychilus (Mediterranea)* Clessin, 1880**

Oxychilus (Mediterranea) adamii (Westerlund, 1886) (N) (*)

Oxychilus (Mediterranea) depressus (Sterki, 1880) (N) (*)

Oxychilus (Mediterranea) hydatinus (Rossmässler, 1838) (N, S, Si, Sa)

Oxychilus (Mediterranea) ionicus Riedel & Subai, 1978 (S?) (*)

Oxychilus (Mediterranea) polygyrus (Pollonera, 1885) (N) (E) (*)

***Oxychilus (Schistophallus)* Wagner, 1914**

Oxychilus (Schistophallus) carotii (Paulucci, 1878) (S) (E) (*)

***Oxychilus (Morlina)* Wagner, 1914**

Oxychilus (Morlina) glaber (Rossmässler, 1835) (*)

Oxychilus (Morlina) glaber ercicus (Benoit, 1859) (S, Si) (E)

Oxychilus (Morlina) glaber glaber (Rossmässler, 1835) (N)

Note

Vitrea contracta: Per la penisola italiana e le isole tirreniche è stata frequentemente citata *Vitrea crystallina* (O.F. Müller, 1774). Tuttavia, la specie non risulta essere mai stata documentata con sicurezza nell'Europa mediterranea con l'eccezione dell'ex Jugoslavia (Pintér, 1972 - Ann. zool. (Warsaw), 29: 209-315; Riedel, 1980 - Genera Zonitidarum, 197 pp.). Materiali italiani così determinati si sono sempre rivelati appartenere ad altre specie di *Vitrea* o ad *Oxychilus hydatinus* (Rossmässler, 1838). Gli unici reperti italiani realmente attribuibili a questa specie sono costituiti da materiali storici provenienti da Bordighera per il N e da Palermo per la Sicilia. È possibile che questi materiali siano stati oggetto di inavvertito scambio o di casuale importazione.

Vitrea minellii: Specie limitata al Trevigiano, al Bellunese ed alle Alpi Carniche.

Vitrea pseudotrolli: Specie distribuita nella Liguria occidentale e nel basso Piemonte. Fuori dai confini italiani è nota solo per il territorio limitrofo della Francia, nelle Alpi Marittime.

Vitrea subrimata: *Vitrea subrimata*, entità ampiamente diffusa in Italia, potrebbe essere costituita da un insieme eterogeneo di specie conchiliologicamente simili. A questa specie vengono attribuite molte entità descritte nel passato. Alcune di queste sono state, talvolta, considerate come specie distinte: *V. petricola* (Paulucci, 1882), *V. targioniana* (Paulucci, 1882), *V. hyblensis* (Kobelt, 1881) (cf. Giusti & Castagnolo, 1983 - Lav. Soc. ital. Biogeogr. (N.S.), 8: 227-249; Riedel, 1980 - Genera Zonitidarum, 197 pp.). Queste e le altre entità dovranno essere riesaminate nel contesto di una revisione dell'intero gruppo di forme (dati personali inediti).

Vitrea trolli: Specie localizzata in aree ristrette del Veneto e del Trentino.

Vitrea sp.: Entità conosciuta per le Isole Maltesi e le Isole Eolie (Giusti et al., 1995a - Mus. reg. Sci. Nat. Monogr. (Torino), 15, in stampa).

Zonites algerus: Specie segnalata, a N, in poche località della Liguria orientale, ma probabilmente estinta (Boato et al., 1985 - Lav. Soc. ital. Biogeogr. (N.S.), 9: 237-371); a S nota solo per la Puglia e la Calabria (Forcart, 1965 - Verh. naturforsch Ges. Basel, 76: 59-184). Secondo Riedel (1992 - Fauna Graeciae, 5: 59-61) la presenza di *Zonites algerus* nelle aree centroccidentali del bacino del Mediterraneo è dovuta all'intervento dell'uomo, in quanto la specie sarebbe originaria della Grecia.

Aegopis gemonensis: *Aegopis gemonensis*, fuori dai confini italiani, è presente soltanto nel territorio limitrofo della Slovenia. *Aegopis carniolicus* (Mousson, 1859), specie che potrebbe rientrare in *A. croaticus* (Rossmässler, 1836) (cf. Bole, 1983 - Slov. Akad. Znan. Umet. Razpr., 24: 133-154) è stato segnalato, in Italia, solo per il Carso, ma probabilmente non è presente entro gli attuali confini.

Aegopis verticillus: Specie diffusa, in Italia, dal Cansiglio al Carso.

Aegopinella graziadeii: Distribuzione limitata ai Monti Lessini ed al Trentino.

Aegopinella minor: A S, trovata recentemente sul Gran Sasso (dati personali inediti).

Aegopinella nitens: Un'altra specie, *A. nitidula* (Draparnaud, 1805), spesso segnalata in Italia, non è mai stata confermata su base anatomica.

Aegopinella ressmanni: Distribuzione limitata, in Italia, alle Alpi Carniche e Giulie.

Retinella olivetorum: Per *Retinella olivetorum* icterica è, probabilmente, disponibile un sinonimo più vecchio: *Helix maurolyci* Benoit, 1843.

Retinella stabilei: Distribuzione limitata al Colle S. Giovanni in Piemonte (Giusti et al., 1986 - J. Conchol., 32: 167-179).

Oxychilus (Oxychilus) diductus: Specie da rivedere, considerata endemica dell'Isola di Lampedusa.

Oxychilus (Oxychilus) draparnaudi: A questa entità è, probabilmente, da riferire la maggior parte delle segnalazioni di *Oxychilus cellarius* (O.F. Müller, 1774) per la penisola italiana. *O. cellarius* è, infatti, una specie dell'Europa centrosettentrionale finora mai accertata, con sicurezza, per la fauna italiana.

Oxychilus (Oxychilus) fuscus: La maggior parte degli *Oxychilus (Oxychilus)* della Sicilia sembra accostarsi anatomicamente ad *Oxychilus draparnaudi*. Tuttavia sono necessarie ulteriori ricerche sia su *O. fuscus*, che rappresenta la specie più vecchia per data di descrizione introdotta per gli *Oxychilus* della Sicilia, sia sulle altre specie del gruppo come *O. alleryi* (Paulucci, 1878), *O. benoitii* (Kobelt, 1879), *O. calcarae* (Kobelt, 1879) e *O. fulgidus* (Kobelt, 1879) e su altre entità di incerto inquadramento come *O. planellus* (Pfeiffer, 1853).

Oxychilus (Oxychilus) gardinii: Distribuzione limitata all'Appennino della Liguria occidentale (Manganelli et al., 1991 - J. molluscan Stud., 57: 401-412).

Oxychilus (Oxychilus) lagreci: Specie endemica dell'Isola di Filicudi (Eolie).

Oxychilus (Oxychilus) lanzai: Specie descritta come endemica delle Alpi Apuane, ma da rivedere nel contesto di una revisione delle numerose entità descritte per la Toscana.

Oxychilus (Oxychilus) majori: Distribuzione limitata all'Isola di Giannutri, al Monte Argentario ed al Promontorio di Ansedonia (Manganelli & Giusti, 1993 - Arch. Molluskenkd., 121: 67-78).

Oxychilus (Oxychilus) meridionalis: Forcart (1967 - Arch. Molluskenkd., 96: 113-123) pubblicò una controversa revisione sugli *Oxychilus* della Toscana, equivocando molte delle classiche entità descritte per la fauna dell'Appennino. È in preparazione una revisione di tutte le numerose entità descritte o segnalate per questa regione (Manganelli et al., in preparazione). Le segnalazioni di *Oxychilus alliarius* (Miller, 1822), specie estranea alla fauna d'Italia, potrebbero riferirsi a questa o ad altre entità. La distribuzione di *O. meridionalis*, a N, raggiunge l'estremità orientale della Liguria.

Oxychilus (Oxychilus) perspectivus: Distribuzione, a S, limitata alla Puglia. Fuori dai confini

italiani è nota per la Dalmazia (Riedel com. pers., 16.06.1995).

Oxychilus (Oxychilus) pilula: Specie endemica dell'Isola di Capraia (Arcipelago Toscano).

Oxychilus (Oxychilus) uziellii: Specie localizzata, a N, nella provincia di Forlì ed a S in Toscana (Manganelli & Giusti, 1985 - Arch. Molluskenkd., 115: 311-323; Manganelli & Giusti, 1993 - Arch. Molluskenkd., 121: 67-78).

Oxychilus (Alzonula) oglasticola: Specie endemica dell'Isola di Montecristo e dello Scoglio La Scola presso Pianosa (Arcipelago Toscano).

Oxychilus (Hyalocornea) alicurensis: Specie endemica dell'Isola di Alicudi (Eolie).

Oxychilus (Hyalocornea) canini: Entità limitata alla Sicilia nordoccidentale .

Oxychilus (Hyalocornea) egadiensis: Specie endemica delle Isole Egadi (Favignana e Levanzo). Il nome *Hyalinia aegusina*, usato da Monterosato (1892) e ripreso da Alzona (1971 - Atti Soc. ital. Sci. nat. Mus. civ. Stor. nat. Milano, 111: 1-433) per gli *Oxychilus* di Favignana, non è disponibile essendo un nomen nudum.

Oxychilus (Hyalocornea) nortoni: Specie endemica dell'Isola di Ustica.

Oxychilus (Hyalofusca) denatale: Specie endemica dell'Isola di Marettimo (Egadi).

Oxychilus (Mediterranea) adamii: Specie localizzata nelle Prealpi Lombarde; fuori dai confini italiani è stata segnalata solo per il Canton Ticino.

Oxychilus (Mediterranea) depressus: Specie nota in Italia, con certezza, solo per le Alpi Carniche.

Oxychilus (Mediterranea) ionicus: Entità segnalata, dubitativamente, per Brindisi (Riedel, 1992 - Fauna Graeciae, 5: 88).

Oxychilus (Mediterranea) polygyrus: Distribuzione limitata alle Alpi Graie.

Oxychilus (Schistophallus) carotii: Distribuzione limitata alla Calabria (Manganelli et al., 1990 - Arch. Molluskenkd., 119: 181-203). La precedenza tra i nomi *Hyalinia carotii* e *H. fragrans* pubblicati simultaneamente da Paulucci (1878 - *Materiaux pour servir a l'etude de la faune malacologiques terrestre et fluviale de l'Italie et de ses îles*, iv + 54 pp.) per indicare la specie in oggetto, è stata determinata da Manganelli et al. (1990 - Arch. Molluskenkd., 119: 181-203) (ICZN, 1985: Art. 24).

Oxychilus (Morlina) glaber: La sottospecie *ercicus* è localizzata, a S, nella Basilicata ed in Calabria (Manganelli et al., 1990 - Arch. Molluskenkd., 119: 181-203).

Dauebardiidae

Dauebardia (Dauebardia) Hartmann, 1821

Dauebardia (Dauebardia) brevipes (Draparnaud, 1805) (*)

Dauebardia (Dauebardia) brevipes sicula Bivona, 1839 (S, Si) (E)

Dauebardia (Dauebardia) brevipes sardoa (Issel, 1873) (Sa) (E)

Dauebardia (Dauebardia) rufa (Draparnaud, 1805)

Dauebardia (Dauebardia) rufa maravignae (Pirajno, 1840) (S, Si, Sa) (E)

Carpathica Wagner, 1805

Carpathica langi (Pfeiffer, 1846) (N) (*)

Carpathica sp. (N) (*)

Note

Daudebardia (Daudebardia) brevipes: Fino a pochi anni fa, alcuni autori attribuivano una parte dei materiali dell'Appennino di *Daudebardia brevipes* (Draparnaud, 1805) a *D. tarentina* De Stefani & Pantanelli, 1879, una entità che Riedel (1980 - *Genera Zonitidarum*, 197 pp.) considera un più giovane sinonimo di *D. b. sicula* (Bivona, 1839). Tuttavia *D. tarentina* non è in alcun modo disponibile in tal senso in quanto, secondo Zilch (1985 - *Arch. Molluskenkd.*, 115: 291-300), i materiali spiaggiati su cui fu descritta la specie appartengono al gasteropode marino *Pleurobranchus testudinarius* Cantraine, 1835 (Nudibranchia, Notaspidea: Pleurobranchidae).

Carpathica langi: A questa entità sono attribuiti, con riserva, soltanto i materiali provenienti dalla Valsugana che, comunque, non sembrano rientrare nella specie seguente. Fuori dai confini italiani *C. langi* è nota solo per la Romania.

Carpathica sp.: La posizione del materiale italiano attribuito a *Carpathica stussineri* (Wagner, 1895) è incerta in quanto, pur accostandosi anatomicamente alla specie di Wagner, secondo quanto figurato da Riedel (1967 - *Ann. Zool. (Warsaw)*, 24: 463-483), differisce per alcuni dettagli. Schileyko (1986 - *Tr. zool. Inst. Akad. Nauk. SSSR*, 148: 97-123) illustra per *C. stussineri* un tratto genitale ben diverso e colloca questa specie in un genere distinto, *Illyrica* Wagner, 1895.

Gastrodontidae

Zonitoides (Zonitoides) Lehmann, 1862

Zonitoides (Zonitoides) nitidus (O.F. Müller, 1774) (N, S, Sa)

Milacidae

Milax Gray, 1855

Milax gagates (Draparnaud, 1801) (Si, Sa) (*)

Milax nigricans (Philippi, 1836) (N, S, Si, Sa)

Tandonia Lessona & Pollonera, 1882

Tandonia baldensis (Simroth, 1910) (N) (E) (*)

Tandonia budapestensis (Hazay, 1881) (N)

Tandonia ehmanni (Simroth, 1910) (N) (E) (*)

Tandonia robici (Simroth, 1885) (N) (*)

Tandonia rustica (Millet, 1843) (N, S)

Tandonia simrothi (Hesse, 1923) (N) (*)

Tandonia sowerbyi (Férussac, 1823) (N, S, Si, Sa)

Note

Milax gagates: La maggior parte delle segnalazioni nella letteratura malacologica italiana sono da riferire a *Milax nigricans* (Philippi, 1836); *M. gagates* risulta accertato (con determinazioni

su base anatomica) solo per la Sardegna e la Sicilia (Wiktor, 1987 - Ann. Zool. (Warsaw), 41: 153-319; dati personali inediti).

Tandonia baldensis: Specie incerta che necessita un riesame approfondito. Al momento, esemplari riferiti a questa entità sono stati citati per l'area intorno al Lago di Garda.

Tandonia ehrmanni: Specie incerta, nota solo per la località tipica, nelle Alpi Carniche.

Tandonia robici: Distribuzione, in Italia, limitata al Friuli orientale ed al Carso.

Tandonia simrothi: Specie di dubbia validità, presente nelle Alpi orientali.

Limacidae

Limax Linnaeus, 1758

Limax aeolianus Giusti, 1973 (Si) (E) (*)

Limax bielzi Siebert, 1873 (N) (*)

Limax canapicianus Pollonera, 1885 (N) (E) (*)

Limax ciminensis Pollonera, 1890 (S) (E) (*)

Limax corsicus Moquin-Tandon, 1855 (S, Sa) (*)

Limax dacampoi Menegazzi, 1854 (*)

Limax dacampoi cruentus Lessona, 1880 (N) (E)

Limax dacampoi dacampoi Menegazzi, 1854 (N) (E)

Limax erythrus Bourguignat, 1864 (N) (*)

Limax ianninii Giusti, 1971 (S) (E) (*)

Limax maximus Linnaeus, 1758 (N, S, Sa)

Limax millipunctatus Pini, 1884 (N) (E) (*)

Limax pironae Pini, 1876 (N) (*)

Limax polipunctatus Pollonera, 1888 (N) (E) (*)

Limax punctulatus Sordelli, 1870 (N) (*)

Limax subalpinus Lessona, 1880 (N) (E) (*)

Limax veronensis Lessona & Pollonera, 1882 (N) (E) (*)

Limax sp. 1 (N) (E) (*)

Limax sp. 2 (N, S) (E) (*)

Limax sp. 3 (S) (E) (*)

Malacolimax Malm, 1868

Malacolimax tenellus (O.F. Müller, 1774) (N)

Lehmannia Heynemann, 1862

Lehmannia janetscheki Forcart, 1966 (N) (*)

Lehmannia marginata (O.F. Müller, 1774) (N, S) (*)

Lehmannia melitensis (Lessona & Pollonera, 1882) (S, Si, Sa) (*)

Lehmannia nyctelia (Bourguignat, 1861) (S) (*)

Lehmannia rupicola Lessona & Pollonera, 1882 (N)

Lehmannia valentiana (Férussac, 1823) (N) (*)

Limacus Lehmann, 1864

Limacus flavus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Note

Limax: I Limacidae italiani, e in particolare i *Limax*, presentano numerosi problemi irrisolti. Infatti, molti taxa sono stati descritti (o rivisti) in modo sommario sulla base di caratteri privi di reale validità tassonomica, come la colorazione del corpo, o dopo indagini anatomiche molto superficiali. Inoltre, le molte revisioni ad oggi pubblicate sono state, spesso, effettuate senza considerare materiali tipici o topotipici, finendo così per aggiungere ulteriore confusione. La difficoltà di rintracciare materiali tipici o topotipici delle entità descritte per l'Italia ha sin qui impedito la loro revisione anatomica e, quindi, ha reso difficile orientarsi nel centinaio di taxa, tra specie e sottospecie, che Alzona (1971 - Atti Soc. ital. Sci. nat. Mus. civ. Stor. nat. Milano, 111: 1-433) ascrive alla nostra fauna. L'elenco che viene proposto è, in parte, basato su indagini anatomiche inedite e, quindi, del tutto preliminare.

Limax aeolianus: *Limax aeolianus* è endemico delle Isole Eolie.

Limax bielzi: Esemplari probabilmente riferibili a questa entità, diffusa nell'Europa centroorientale, sono stati raccolti nel Friuli-Venezia Giulia.

Limax canapicianus: Distribuzione limitata alle Alpi Graie.

Limax ciminensis: Specie di dubbia validità.

Limax corsicus: Specie nota a S solo per l'Arcipelago Toscano e per la Toscana meridionale. *Limax genei* Lessona & Pollonera, 1882, un'entità incerta ritenuta endemica della Sardegna, potrebbe corrispondere a *L. corsicus*.

Limax dacampoi: Il materiale italiano, spesso citato sotto il nome di *L. cinereoniger* Wolf, 1803, sembra riferibile ad una entità distinta. La sottospecie *L. d. cruentus* è limitata al versante piemontese delle Alpi Liguri.

Limax erythrus: Distribuzione limitata alle Alpi Marittime e Cozie (*Limax* sp. A sensu Boato et al., 1985 - Lav. Soc. ital. Biogeogr. (N.S.), 9: 237-371). Oltre i confini italiani la specie è nota solo per il Dipartimento delle Hautes Alpes, in Francia (De Winter, 1990 - Basteria, 54: 227-229).

Limax ianninii: Distribuzione conosciuta limitata ai Monti Reatini ed al Gran Sasso.

Limax millipunctatus: Distribuzione limitata all'Appennino ligure-piemontese e alla Lombardia.

Limax pironae: Distribuzione limitata al massiccio della Grigna in Lombardia.

Limax polipunctatus: Distribuzione limitata, a N, alle Alpi Graie e all'Appennino della Liguria occidentale.

Limax punctulatus: Distribuzione limitata alle Prealpi Lombarde occidentali e, fuori dai confini italiani, al Canton Ticino. Le segnalazioni per la Bulgaria e per altre zone d'Italia richiedono conferma (cf. Wiktor, 1983 - Ann. Zool. (Warsaw), 37: 135-139).

Limax subalpinus: Specie diffusa lungo l'arco alpino occidentale e segnalata, dubitativamente, per la Bulgaria. Tali reperti, tuttavia, non sono sufficientemente documentati da dati anatomici (Wiktor, 1983 - Ann. Zool. (Warsaw), 37: 129-130).

Limax veronensis: L'areale conosciuto comprende i dintorni di Verona ed i Colli Euganei.

Limax sp. 1: Distribuzione limitata alla Liguria orientale (*Limax* sp. B sensu Boato et al., 1985 - Lav. Soc. ital. Biogeogr. (N.S.), 9: 237-371).

Limax sp. 2: L'areale noto comprende, a N, la Liguria orientale e a S la Toscana (*L. callichrous* sensu Giusti & Mazzini, 1970 - Lav. Soc. ital. Biogeogr. (N.S.), 1: 201-335; *Limax* sp. C sensu Boato et al., 1985 - Lav. Soc. ital. Biogeogr. (N.S.), 9: 237-371).

Limax sp. 3: Entità probabilmente endemica delle Alpi Apuane (Boato et al., 1985 - Lav. Soc.

ital. Biogeogr. (N.S.), 9: 237-371) (*L. albipes* sensu Giusti & Mazzini, 1970 - Lav. Soc. ital. Biogeogr. (N.S.), 1: 201-335; *Limax* sp. D sensu Boato et al., 1985).

Lehmannia janetscheki: Distribuzione limitata a poche località dell'Alto Adige e del territorio austriaco confinante.

Lehmannia marginata: Le segnalazioni di *Lehmannia marginata* per il S, limitate alla Toscana, alla Basilicata e alla Calabria (*L. mongianensis* (Paulucci, 1879)), potrebbero riferirsi, in parte, a *L. rupicola*.

Lehmannia melitensis: Specie propria dell'Isola di Malta e segnalata, successivamente, in Sicilia, nelle Isole Eolie, nell'Arcipelago Toscano e in Sardegna.

Lehmannia nyctelia: Specie, probabilmente, originaria dell'Europa orientale, ma attualmente cosmopolita. In Italia segnalata solo per l'Isola d'Elba.

Lehmannia valentiana: Specie originaria dalla Penisola Iberica e probabilmente introdotta in Italia; segnalata, a N, solo per la Liguria occidentale presso il confine francese (Falkner, 1981 - Mitt. zool. Ges. Braunau, 3: 388-391).

Agriolimacidae

Deroceras Rafinesque, 1820

Deroceras agreste (Linnaeus, 1758) (N)

Deroceras bisacchianum Bodon, Boato & Giusti, 1982 (N) (E) (*)

Deroceras dallaii Giusti, 1970 (Sa) (E)

Deroceras golcheri Van Regteren Altena, 1962 (S?) (*)

Deroceras klemmi Grossu, 1972 (N)

Deroceras laeve (O.F. Müller, 1774) (N, Sa)

Deroceras lothari Giusti, 1971 (S) (E) (*)

Deroceras panormitanum (Lessona & Pollonera, 1882) (N, S, Si)

Deroceras planarioides (Simroth, 1910) (N) (E)

Deroceras reticulatum (O.F. Müller, 1774) (N, S)

Deroceras rodnae Grossu & Lupu, 1965 (N) (*)

Deroceras sardum (Simroth, 1886) (Sa) (E)

Deroceras sp. (N) (E) (*)

Note

Deroceras: Le specie del genere *Deroceras* vengono inquadrare dalla maggior parte degli autori in alcuni sottogeneri (*Agriolimax* Mörch, 1865, *Deroceras* Rafinesque, 1820, *Malino* Gray, 1855, *Plathystimulus* Wiktor, 1973) il cui significato tassonomico non è stato, ancora, del tutto accertato (Bodon et al., 1982 - *Animalia*, 9: 53-71; De Winter, 1986 - *Zool. Meded. (Leiden)*, 60: 135-158).

Deroceras bisacchianum: Distribuzione limitata alla Liguria occidentale.

Deroceras golcheri: Specie propria di Malta e segnalata, dubitativamente, solo per l'Isola di Montecristo (Arcipelago Toscano).

Deroceras lothari: Specie endemica dei Monti Reatini.

Deroceras rodnae: Specie segnalata in Liguria occidentale.

Deroceras sp.: Distribuzione limitata alle Alpi Liguri (Bodon et al., 1982 - *Animalia*, 9: 53-71).

Euconulidae

Euconulus (Euconulus) Reinhardt, 1883

Euconulus (Euconulus) fulvus (O.F. Müller, 1774) (N, S, Si, Sa) (*)

Note

Euconulus (Euconulus) fulvus: Per l'Italia è stato citato anche *E. alderi* (Gray, 1840), entità spesso considerata come specie a sè stante.

Ferussaciidae

Cecilioides (Cecilioides) Férussac, 1814

Cecilioides (Cecilioides) acicula (O.F. Müller, 1774) (N, S, Si, Sa)

Cecilioides (Cecilioides) janii (De Betta & Martinati, 1855) (N, S, Sa) (*)

Hohenwartiana Bourguignat, 1864

Hohenwartiana aradasiana (Benoit, 1862) (Si) (E) (*)

Hohenwartiana hohenwarti (Rossmässler, 1839) (N, S, Si, Sa)

Ferussacia (Ferussacia) Risso, 1826

Ferussacia (Ferussacia) folliculus (Gmelin, 1791) (N, S, Si, Sa) (*)

Ferussacia (Pegea) Risso, 1826

Ferussacia (Pegea) carnea (Risso, 1826) (S, Si) (*)

Note

Cecilioides (Cecilioides): L'attuale assetto tassonomico delle *Cecilioides* italiane deriva da due lavori di Giusti (1973 - Lav. Soc. ital. Biogeogr. (N.S.), 2: 423-576; 1976 - Lav. Soc. ital. Biogeogr. (N.S.), 5: 99-355) il quale, dopo l'esame di numerosi esemplari (compresi i sintipi e/o topotipi di *Achatina bourguignatiana* Benoit, 1862, *Achatina petitiana* Benoit, 1862 e *Acicula lauta* Paulucci, 1886), conservati nelle collezioni De Betta, Del Prete, Monterosato e Paulucci, ha convalidato soltanto due specie: *Cecilioides acicula* (O.F. Müller, 1774) e *C. janii* (De Betta & Martinati, 1855), proponendo di ricondurre a *C. acicula* molte delle entità descritte per la fauna italiana. Nonostante che le conclusioni di Giusti (1973, 1976) non siano mai state formalmente contestate, la maggior parte degli autori tende ad accettare anche altre entità (cf. Zilch, 1973 - Arch. Molluskenkd., 103: 99-152; Kerney et al, 1983 - Die Landschnecken Nord- und Mitteleuropas, 384 pp.; Falkner, 1990 - Weichtiere. Europäische Meeres- und Binnenmollusken: 112-273). In particolare, per la fauna italiana vengono convalidate, oltre a *C.*

acicula e *C. janii*, anche *Cecilioides actoniana* (Benoit, 1862) e *C. petitiana* (Benoit, 1862). Al fine di chiarire lo stato di questi ed altri taxa sono necessarie ulteriori indagini, basate su caratteri anatomici ed elettroforetici, che permettano di raccogliere dati più significativi.

Beckmann (1987 - *Heldia*, 1 (Sonderheft): 1-38) e Falkner (1990) emendano il nome specifico di alcune specie di *Cecilioides* assumendo che, in accordo agli "Examples" per l'Art. 30(b) dell'ICZN (1985), i: "names [of the genus group] ending in [...], oides, are substantivized adjectives and are masculine". Poiché *Cecilioides* è inserito nella Official List of the Generic Names in Zoology, come femminile, un parere fu richiesto al Dr. P. Tubbs (Secretary of the International Commission on Zoological Nomenclature), il quale (com. pers., 23.10.92) replicò che "this is really a non sequitur, and the gender should be determined by the noun part of the compound word and not by the adjectival ending oides (which refers to likeness or similarity) [...] The "Examples" are not part of the legislative text of the Code [...] *Cecilioides* is in the Official List as feminine, and this should be retained if it accords with usage".

Cecilioides (Cecilioides) janii: Il "correct original spelling" del nome specifico è "janii", non "jani" (cf. De Betta & Martinati, 1855: 59). Seppur basato su "Jan", "janii" è disponibile (ICZN, 1985: Art. 31a(i)); "jani" costituisce, invece, un "incorrect subsequent spelling" (ICZN, 1985: Art. 33d). Anche se il nome *Achatina janii* è stato introdotto da De Betta & Martinati (1855) in modo condizionale, ciò non pregiudica la sua disponibilità (ICZN, 1985: Art. 15).

Hohenwartiana aradasiana: La denominazione specifica rimane da verificare, in quanto l'uso di questo nome si basa sullo studio di materiali non topotipici (cf. Giusti, . 1973 - *Lav. Soc. ital. Biogeogr.* (N.S.), 2: 423-576).

Ferussacia (Ferussacia): Sebbene ripreso dal *Nomenclator Zoologicus* (2: 405) e da Zilch (1959-60 - *Handb. Paläozool.*, 6: 834 pp.), *Ferussacia* è un "incorrect original spelling", in quanto il nome è chiaramente basato su J. B. D'Audebard Baron de Férussac. A riprova di ciò è il nome volgare scritto sulla stessa riga, cioè "Férussacie".

Ferussacia (Ferussacia) folliculus: A N, presente con certezza solo in Liguria occidentale. Secondo Zangheri (1969 - *Mus. civ. Stor. nat. Verona Mem. f.s.*, 1 (4): 1415-1693) sarebbe presente anche in Romagna, ma il dato è da controllare.

Ferussacia (Pegea) carnea: Distribuzione limitata, a S, all'Isola di Pianosa (Arcipelago Toscano) ed in Sicilia alle Isole Eolie. Probabilmente importata dal Nord Africa.

Subulinidae

Rumina Risso, 1826

Rumina decollata (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa) (*)

Note

Rumina decollata: Spesso citata come *Stenogyra decollata*. *Stenogyra* Shuttleworth, 1854 è considerato un sottogenere di *Obeliscus* Beck, 1837, un genere dei Subulinidae vivente in America meridionale e nelle Indie occidentali.

Oleacinidae

Poiretia Fischer, 1883

Poiretia cornea (Brumati, 1838) (N, S) (*)

Poiretia dilatata (Philippi, 1836)

Poiretia dilatata dilatata (Philippi, 1836) (S, Si) (E)

Note

Poiretia: Le *Poiretia* ed anche alcuni *Ferussaciidae* sono stati spesso riferiti a *Glandina* Schumacher, 1817, un più giovane sinonimo di *Oleacina* Röding, 1798 un genere vivente nelle Indie occidentali.

Poiretia cornea: Specie diffusa, a N, nel Friuli orientale e nel Carso e limitata, a S, al Gargano (Subai, 1980 - Arch. Molluskenkd., 110: 151-172).

Testacellidae

Testacella Cuvier, 1800

Testacella gestroi Issel, 1873 (Sa) (*)

Testacella haliotideae Draparnaud, 1801 (N) (*)

Testacella scutulum Sowerby, 1821 (N, S, Si)

Note

Testacella gestroi: Specie nota solo per la Sardegna e l'estremità meridionale della Corsica (dati personali inediti). Attribuita al sottogenere *Testacelloides*, Wagner, 1915, ma la validità di questo sottogenere è da riconsiderare nel contesto di una revisione della sistematica sopraspecifica dei *Testacellidae* (Giusti et al. in preparazione).

Testacella haliotideae: A N dati certi solo per la Collina di Torino. A S citata da Colosi (1919 - Monit. zool. ital., 30: 57-63) per i dintorni di Firenze. Ciò che rimane al Museo di Zoologia dell'Università di Firenze del materiale di quest'ultima località esaminato da Colosi corrisponde, tuttavia, a *Testacella scutulum* Sowerby, 1821.

Clausiliidae

Medora Adams, 1855

Medora albescens (Menke, 1830) (S) (*)

Medora dalmatina (Rossmässler, 1835) (S) (*)

Lampedusa Boettger, 1877

Lampedusa lopadusae (Calcara, 1846) (Si) (E) (*)

Muticaria Lindholm, 1925

Muticaria neuteboomi Beckmann, 1990 (Si) (E) (*)

Muticaria syracusana (Philippi, 1836) (Si) (E) (*)

***Leucostigma* Wagner, 1919**

Leucostigma candidescens (Rossmässler, 1835) (S) (E) (*)

***Cochlodina* (*Cochlodina*) Férussac, 1821**

Cochlodina (*Cochlodina*) *costata* (Pfeiffer, 1828) (*)

Cochlodina (*Cochlodina*) *costata commutata* (Rossmässler, 1836) (N)

Cochlodina (*Cochlodina*) *costata curta* (Rossmässler, 1836) (N)

Cochlodina (*Cochlodina*) *costata fusca* (De Betta, 1852) (N) (E)

Cochlodina (*Cochlodina*) *costata psila* (Werterlund, 1884) (N) (E)

Cochlodina (*Cochlodina*) *dubiosa* (Clessin, 1882)

Cochlodina (*Cochlodina*) *dubiosa dubiosa* (Clessin, 1882) (N)

Cochlodina (*Cochlodina*) *fimbriata* (Rossmässler, 1835) (N, S) (*)

Cochlodina (*Cochlodina*) *laminata* (Montagu, 1803) (*)

Cochlodina (*Cochlodina*) *laminata grossa* (Rossmässler, 1835) (N)

Cochlodina (*Cochlodina*) *laminata laminata* (Montagu, 1803) (N, S)

Cochlodina (*Cochlodina*) *triloba* (Boettger, 1877) (N) (*)

***Cochlodina* (*Procochlodina*) Nordsieck, 1969**

Cochlodina (*Procochlodina*) *incisa* (Küster, 1876) (N, S) (E) (*)

Cochlodina (*Procochlodina*) *kuesteri* (Rossmässler, 1836) (S, Sa) (E) (*)

***Cochlodina* (*Cochlodinastra*) Nordsieck, 1977**

Cochlodina (*Cochlodinastra*) *comensis* (Pfeiffer, 1850)

Cochlodina (*Cochlodinastra*) *comensis comensis* (Pfeiffer, 1850) (N)

Cochlodina (*Cochlodinastra*) *comensis lucensis* (Gentiluomo, 1868) (N, S) (E)

Cochlodina (*Cochlodinastra*) *comensis trilamellata* (Schmidt, 1868) (N) (E)

***Cochlodina* (*Paracochlodina*) Nordsieck, 1969**

Cochlodina (*Paracochlodina*) *orthostoma* (Menke, 1828) (N?) (*)

***Delima* (*Delima*) Hartmann, 1842**

Delima (*Delima*) *binotata* (Rossmässler, 1836) (*)

Delima (*Delima*) *binotata binotata* (Rossmässler, 1836) (N?)

Delima (*Delima*) *laevissima* (Rossmässler, 1835) (S?) (*)

Delima (*Delima*) *piceata* (Rossmässler, 1836) (S) (E)

***Delima* (*Semirugata*) Boettger, 1877**

Delima (*Semirugata*) *bilabiata* (Wagner, 1829) (*)

Delima (*Semirugata*) *bilabiata biasoletiana* (Charpentier, 1852) (N)

***Dilataria* Vest, 1867**

Dilataria boettgeriana (Paulucci, 1878) (S) (E) (*)

Dilataria succineata (Rossmässler, 1836) (N) (*)

***Charpentieria* (*Charpentieria*) Stabile, 1864**

Charpentieria (*Charpentieria*) *dyodon* (Studer, 1820) (N) (*)

Charpentieria (*Charpentieria*) *thomasi* (Küster, 1850) (N) (*)

***Charpentieria* (*Itala*) Boettger, 1877**

Charpentieria (*Itala*) *clavata* (Rossmässler, 1836) (E) (*)

Charpentieria (*Itala*) *clavata balsamoi* (Strobel, 1850) (N)

Charpentieria (*Itala*) *clavata clavata* (Rossmässler, 1836) (N)

Charpentieria (*Itala*) *clavata lorinae* (Gredler, 1869) (N)

Charpentieria (*Itala*) *clavata variscoi* (Pini, 1883) (N)

Charpentieria (*Itala*) *itala* (Martens, 1824) (*)

Charpentieria (*Itala*) *itala albopustulata* (De Cristofori & Jan, 1832) (N)

Charpentieria (*Itala*) *itala baldensis* (Charpentier, 1852) (N) (E)

Charpentieria (*Itala*) *itala braunii* (Rossmässler, 1836) (N)

Charpentieria (*Itala*) *itala itala* (Martens, 1824) (N) (E)

Charpentieria (*Itala*) *itala latestriata* (Küster, 1850) (N) (E)

Charpentieria (*Itala*) *itala leccoensis* (Saint Simon, 1848) (N) (E)

Charpentieria (*Itala*) *itala punctata* (Michaud, 1831) (N, S)

Charpentieria (*Itala*) *itala rubiginea* (Rossmässler, 1836) (N) (E)

Charpentieria (*Itala*) *itala serravalensis* (Nordsieck, 1963) (N) (E)

Charpentieria (*Itala*) *ornata* (Rossmässler, 1836) (N?) (*)

Charpentieria (*Itala*) *stenzii* (Rossmässler, 1836) (*)

Charpentieria (*Itala*) *stenzii butoti* Bank, 1987 (N) (E)

Charpentieria (*Itala*) *stenzii cincta* (Brumati, 1838) (N)

Charpentieria (*Itala*) *stenzii costulatostriata* (Westerlund, 1878) (N) (E)

Charpentieria (*Itala*) *stenzii faueri* Bank, 1987 (N) (E)

Charpentieria (*Itala*) *stenzii letochana* (Gredler, 1874) (N) (E)

Charpentieria (*Itala*) *stenzii nordsiecki* Fauer, 1991 (N) (E)

Charpentieria (*Itala*) *stenzii paroliniana* (De Betta & Martinati, 1855) (N) (E)

Charpentieria (*Itala*) *stenzii stenzii* (Rossmässler, 1836) (N) (E)

Charpentieria (*Itala*) *stenzii westerlundii* Nordsieck, 1993 (N) (E)

***Siciliaria* (*Siciliaria*) Vest, 1867**

Siciliaria (*Siciliaria*) *calcarae* (Philippi, 1844) (E) (*)

Siciliaria (*Siciliaria*) *calcarae belliemi* Brandt, 1961 (Si)

Siciliaria (*Siciliaria*) *calcarae calcarae* (Philippi, 1844) (Si)

Siciliaria (*Siciliaria*) *crassicostata* (Pfeiffer, 1856) (Si) (E) (*)

Siciliaria (*Siciliaria*) *ferrox* Brandt, 1961 (Si) (E) (*)

Siciliaria (*Siciliaria*) *grohmanniana* (Rossmässler, 1836) (Si) (E) (*)

Siciliaria (Siciliaria) leucophryna (Pfeiffer, 1862) (Si) (E) (*)
Siciliaria (Siciliaria) nobilis (Pfeiffer, 1848) (Si) (E) (*)
Siciliaria (Siciliaria) scarificata (Pfeiffer, 1857) (Si) (E) (*)
Siciliaria (Siciliaria) septemplicata (Philippi, 1836) (E) (*)
 Siciliaria (Siciliaria) septemplicata alcamoensis Brandt, 1961 (Si)
 Siciliaria (Siciliaria) septemplicata septemplicata (Philippi, 1836) (Si)
Siciliaria (Siciliaria) spezialensis Nordsieck, 1984 (Si) (E) (*)
Siciliaria (Siciliaria) tiberii (Schmidt, 1868) (E) (*)
 Siciliaria (Siciliaria) tiberii riberothi Brandt, 1961 (Si)
 Siciliaria (Siciliaria) tiberii tiberii (Schmidt, 1868) (Si)

***Siciliaria (Stigmatica)* Boettger, 1877**

Siciliaria (Stigmatica) ernae Fauer, 1978 (S) (E) (*)
Siciliaria (Stigmatica) incerta (Küster, 1861) (Si) (E)
Siciliaria (Stigmatica) kobeltiana (Küster, 1876) (S) (E) (*)
Siciliaria (Stigmatica) paestana (Philippi, 1836) (S) (E) (*)
Siciliaria (Stigmatica) stigmatica (Rossmässler, 1836) (S) (*)

***Siciliaria (Gibbularia)* Monterosato, 1908**

Siciliaria (Gibbularia) gibbula (Rossmässler, 1836) (*)
 Siciliaria (Gibbularia) gibbula gibbula (Rossmässler, 1836) (N, S)
 Siciliaria (Gibbularia) gibbula niethammeri (Rensch, 1934) (S) (E)
 Siciliaria (Gibbularia) gibbula vulcanica (Paulucci, 1878) (S, Si) (E)

***Papillifera* Hartmann, 1842**

Papillifera deburghiae (Paulucci, 1878) (S) (E) (*)
Papillifera papillaris (Müller, 1774) (N, S, Si, Sa)
Papillifera solida (Draparnaud, 1805) (N, S) (*)

***Ruthenica* Lindholm, 1924**

Ruthenica filograna (Rossmässler, 1836) (N, S) (*)

***Pseudofusulus* Nordsieck, 1977**

Pseudofusulus varians (Pfeiffer, 1828) (N)

***Erjavecina* Brusina, 1870**

Erjavecina bergeri (Rossmässler, 1836) (N) (*)

***Macrogastra (Macrogastra)* Hartmann, 1840**

Macrogastra (Macrogastra) asphaltina (Rossmässler, 1836) (N)
Macrogastra (Macrogastra) attenuata (Rossmässler, 1835) (*)

Macrogastra (Macrogastra) attenuata attenuata (Rossmässler, 1835) (N)
Macrogastra (Macrogastra) attenuata iriana (Pollonera, 1885) (N, S) (E)
Macrogastra (Macrogastra) attenuata mellae (Stabile, 1864) (N) (E)
Macrogastra (Macrogastra) badia (Pfeiffer, 1828) (N)
Macrogastra (Macrogastra) densestriata (Rossmässler, 1836) (N?) (*)
Macrogastra (Macrogastra) plicatula (Draparnaud, 1801) (N, S) (*)
Macrogastra (Macrogastra) ventricosa (Draparnaud, 1801) (N)

Julica Nordsieck, 1963

Julica schmidtii (Pfeiffer, 1841) (N) (*)

Clausilia (Clausilia) Draparnaud, 1805

Clausilia (Clausilia) bidentata (Ström, 1765) (*)
Clausilia (Clausilia) bidentata crenulata Risso, 1826 (N)
Clausilia (Clausilia) cruciata (Studer, 1820) (*)
Clausilia (Clausilia) cruciata amiatiae Martens in Bonelli, 1873 (S) (E)
Clausilia (Clausilia) cruciata cruciata (Studer, 1820) (N, S)
Clausilia (Clausilia) cruciata pedemontana Nordsieck, 1990 (N) (E)
Clausilia (Clausilia) pumila Pfeiffer, 1828 (N) (*)
Clausilia (Clausilia) rugosa Draparnaud, 1801
Clausilia (Clausilia) rugosa parvula (Férussac, 1807) (N)
Clausilia (Clausilia) rugosa pinii Westerlund, 1878 (N, S) (E)

Clausilia (Strobeliella) Nordsieck, 1979

Clausilia (Strobeliella) whateliana Strobel, 1850 (E) (*)
Clausilia (Strobeliella) whateliana brembina Strobel, 1850 (N)
Clausilia (Strobeliella) whateliana exoptata Schmidt, 1856 (N)
Clausilia (Strobeliella) whateliana klemmi Nordsieck, 1966 (N)
Clausilia (Strobeliella) whateliana umbrosella Nordsieck, 1993 (N)
Clausilia (Strobeliella) whateliana whateliana Strobel, 1850 (N)

Clausilia (Andraea) Pfeiffer, 1848

Clausilia (Andraea) dubia Draparnaud, 1805 (*)
Clausilia (Andraea) dubia dubia Draparnaud, 1805 (N)

Neostyriaca Wagner, 1920

Neostyriaca strobili (Strobel, 1850) (N) (*)

Fusulus (Fusulus) Fitzinger, 1833

Fusulus (Fusulus) interruptus (Pfeiffer, 1828) (N)

Laciniaria (Laciniaria) Hartmann, 1844

Laciniaria (Laciniaria) plicata (Draparnaud, 1801) (N) (*)

Balea (Alinda) Adams, 1855

Balea (Alinda) biplicata (Montagu, 1803) (*)

Balea (Alinda) biplicata biplicata (Montagu, 1803) (N)

Balea (Balea) Gray, 1824

Balea (Balea) perversa (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa) (M)

Bulgarica (Denticularia) Lindholm, 1924

Bulgarica (Denticularia) thessalonica (Rossmässler, 1839) (N) (*)

Note

Medora albescens: Nordsieck (1970 - Arch. Molluskenkd., 100: 23-75; com. pers., 27.6.95) considera *Medora italiana* (Küster, 1847), dell'Appennino centromeridionale, una specie distinta da *M. albescens*, della penisola balcanica, sulla base di particolarità conchiliologiche ed anatomiche (modalità di inserzione del diverticolo della borsa copulatrice). Inoltre, assegna a *M. italiana* le seguenti sottospecie: *M. i. garganensis* (Wagner, 1918), *M. i. italiana* (Küster, 1847), *M. i. kobelti* Nordsieck, 1970, *M. i. miletiana* Giusti, 1967), *M. i. punctulata* (Küster, 1850). Una successiva revisione (Giusti et al., 1986 - Lav. Soc. ital. Malacol. (Atti del Congresso di Palermo 13-16.9.1984) 22: 259-362; Giusti & Manganelli, 1992 - Proc. ninth int. malacol. Congr. (Edinburgh, 31 August - 6 September 1986): 153-172), basata su dati conchiliologici, anatomici e allozimici ha dimostrato come non sia possibile distinguere le due specie e come non esistano, ancora, elementi sicuri per arrivare a proporre un corretto inquadramento sottospecifico della varie popolazioni italiane.

Medora dalmatina: Specie nuova per la fauna italiana, presente in una ristretta area della Calabria. Le *Medora* italiane sono state spesso accostate a *Medora dalmatina* (cf. Forcart, 1965 - Verh. naturforsch. Ges. Basel, 76: 59-184; Alzona, 1971 - Atti Soc. ital. Sci. nat. Mus. civ. Stor. nat. Milano, 111: 1-433), ma la presenza di questa specie nella penisola italiana era stata esclusa da Nordsieck (1970 - Arch. Molluskenk., 100: 23-75) e Giusti et al. (1986 - Lav. Soc. ital. Malacol. (Atti del Congresso di Palermo 13-16.9.1984), 22: 259-362), dopo l'esame di tutte le popolazioni italiane fino ad allora conosciute. Recentemente sono state individuate due nuove popolazioni che tanto l'analisi morfologica quanto lo studio elettroforetico hanno confermato come *M. dalmatina*, anche se il loro inquadramento sottospecifico rimane da accertare (dati personali inediti).

Lampedusa: *Imitatrix*, spesso utilizzato come sottogenere di *Lampedusa* per includere due specie delle Isole Maltesi, è ritenuto un più giovane sinonimo di quest'ultimo genere da Giusti et al. (1995 - Mus. reg. Sci. Nat. Monogr. (Torino), 15, in stampa).

Lampedusa lopadusae: Distribuzione limitata alle isole di Lampedusa e Lampione.

Muticaria neuteboomi: Dati elettroforetici sembrano far rientrare *M. neuteboomi* in *M. syracusana* (Giusti et al., 1995 - Mus. reg. Sci. Nat. Monogr. (Torino), 15, in stampa). Distribuzione limitata alla Sicilia sudorientale.

Muticaria syracusana: Distribuzione limitata alla Sicilia sudorientale.

Leucostigma candidescens: Zilch (1977 - Arch. Molluskenkd., 108: 109-161), pur sottolineando la necessità di una revisione critica, elenca come sottospecie di *Leucostigma candidescens*: L. c. *candidescens* (Rossmässler, 1835), L. c. *bulimella* (Paulucci, 1878), L. c. *candidilabris* (Villa & Villa, 1841), L. c. *cinerea* (Philippii, 1836), L. c. *convertita* (Flach, 1907), L. c. *leucostigma* (Rossmässler, 1836), L. c. *marsicana* (Tiberi, 1872), L. c. *megachilus* (Paulucci, 1881), L. c. *opalina* (Rossmässler, 1836), L. c. *samnitica* (Rossmässler, 1842) e L. c. *vestina* (Tiberi, 1872).

Cochlodina (Cochlodina) costata: Bole (1991 - Razprave IV. Razreda Sazu, 32: 75-88) ritiene *Cochlodina costata* commutata una specie distinta. Oltre a *C. costata* commutata, Nordsieck (1969 - Arch. Molluskenkd., 99: 21-25; com. pers., 27.06.1995) convalida, per l'Italia, altre tre sottospecie: *C. c. curta*, *C. c. fusca* e *C. c. psila*. A questo gruppo sono attribuite altre sottospecie di incerta validità (cf. Alzona, 1971 - Atti Soc. ital. Sci. nat. Mus. civ. Stor. nat. Milano, 111: 1-433).

Cochlodina (Cochlodina) fimbriata: A S, distribuzione limitata alle Alpi Apuane.

Cochlodina (Cochlodina) laminata: Per l'Italia sono state citate altre entità sottospecifiche di dubbia validità (cf. Alzona, 1971 - Atti Soc. ital. Sci. nat. Mus. civ. Stor. nat. Milano, 111: 1-433).

Cochlodina (Cochlodina) triloba: Specie segnalata per le Alpi Giulie ed il Carso.

Cochlodina (Procochlodina) incisa: A N, distribuzione limitata alla Liguria e all'Appennino emiliano. La validità del sottogenere *Procochlodina* Nordsieck, 1969 è messa in dubbio da Giusti (1971 - Lav. Soc. ital. Biogeogr. (N.S.), 2: 423-576).

Cochlodina (Procochlodina) kuesteri: I risultati preliminari di una revisione sia morfologica che allozimica sul complesso delle *Cochlodina sardocorse*, basata sull'esame di 37 popolazioni (1 dell'isola Gorgona, 5 della Corsica e 31 della Sardegna), sembrano indicare la presenza di pool genici distinti, uno della Corsica, corrispondente a *C. meisneriana* (Shuttleworth, 1843), e gli altri della Sardegna. Di questi ultimi quello corrispondente a *C. kuesteri* risulta il più diffuso in Sardegna e presente anche a Gorgona. I dati sono ancora in fase di acquisizione ed elaborazione per cui è impossibile formalizzare un inquadramento più preciso di queste popolazioni (Giusti et. al., in preparazione). Nordsieck (1969 - Arch. Molluskenkd., 99: 21-25) ha separato, su base conchiliologica, le popolazioni della Sardegna settentrionale come *C. kuesteri sassariensis* Nordsieck, 1969.

Cochlodina (Paracochlodina) orthostoma: La presenza di questa specie in Italia, basata su materiale storico raccolto in Friuli e presente in collezione De Betta (Museo Civico di Storia Naturale di Verona), è dubbia.

Delima (Delima) binotata: Entità segnalata per il Carso ma, probabilmente, non presente entro gli attuali confini italiani.

Delima (Delima) laevissima: Distribuzione limitata, in Italia, al Gargano dove è stata citata da Holdhaus (1911 - Denkschr. k. Akad. Wiss. math.-naturwiss. Kl., 87:431-465). Questa segnalazione necessita, tuttavia, di essere confermata.

Delima (Semirugata) bilabiata: Distribuzione limitata, in Italia, al Colle di Medea ed al Carso.

Dilataria boettgeriana: Distribuzione limitata all'Appennino centromeridionale (Abruzzo, Campania e Calabria).

Dilataria succineata: Distribuzione limitata, in Italia, alle Alpi Carniche e Giulie.

Charpentieria (Charpentieria) dyodon: Distribuzione limitata a poche stazioni nei versanti meridionali del Monte Rosa e del Passo del Sempione, in Italia ed in Svizzera.

Charpentieria (Charpentieria) thomasiana: Entità praticamente endemica in quanto, al di fuori dei confini italiani, mostra una presenza puntiforme nel Canton Ticino.

Charpentieria (Itala) clavata: Entità solo recentemente separata da *Charpentieria itala*

(Martens, 1824) (Nordsieck, 1979 - Arch. Molluskenkd., 109: 249-275; 1993 - Heldia, 2: 33-42). Il "correct original spelling" del nome "balsamoi" è "balsamo". Strobel (1848-1851), infatti, come in altri casi, introduce un nuovo nome specifico basato su di un nome personale trattato come nome in apposizione. Tali nomi sono validi (ICZN, 1985: Art. 31a) e il loro "original spelling" è corretto. Tuttavia, essendo stati successivamente emendati e trattati come sostantivi al genitivo, sono praticamente conosciuti nella letteratura soltanto in questa forma. *Charpentieria (Itala) itala*: Molte delle entità sottospecifiche convalidate da Nordsieck (1963 - Arch. Molluskenkd., 92: 169-203) e da Zilch (1972 - Arch. Molluskenkd., 102: 247-259) qui riportate appaiono di validità dubbia. L'attribuzione del materiale della Liguria e dell'Appennino a C. i. punctata permane incerta.

Charpentieria (Itala) ornata: In Italia, riportata per una località delle Alpi Giulie (Marchesetti, 1879 - Boll. Soc. adriat. Sci. nat., 4: 168-190) e per la Romagna (Zangheri, 1969 - Mus. civ. Stor. nat. Verona Mem. f.s., 1 (4): 1415-1693). Mentre la segnalazione di Marchesetti (1879) rimane da confermare, quella di Zangheri (1969) è sicuramente errata.

Charpentieria (Itala) stenzii: Le entità sottospecifiche sono state recentemente riesaminate da Bank (1987 - Basteria, 51: 135-140).

Siciliaria (Siciliaria): Le *Siciliaria* (s.str.) della Sicilia sono un gruppo di Clausiliidae della Sicilia occidentale e delle Isole Egadi su cui mancano moderne revisioni. In questo contesto vengono riportate solo le entità ritenute valide da Nordsieck (com. pers., 27.6.1995).

Siciliaria (Siciliaria) calcarae: Distribuzione limitata alla Sicilia nordoccidentale e alle Isole Egadi. La validità di *S. calcarae* adelina (Küster, 1847) e *S. calcarae* nodosa (Westerlund, 1901) citate da Alzona (1971 - Atti Soc. ital. Sci. nat. Mus. civ. Stor. nat. Milano, 111: 1-433) è incerta.

Siciliaria (Siciliaria) crassicostata: Distribuzione limitata alla Sicilia nordoccidentale e alle Isole Egadi. La validità di *S. crassicosta* eminens (Schmidt, 1868) citata da Alzona (1971 - Atti Soc. ital. Sci. nat. Mus. civ. Stor. nat. Milano, 111: 1-433) è incerta.

Siciliaria (Siciliaria) ferrox: Entità descritta per la Sicilia nordoccidentale.

Siciliaria (Siciliaria) grohmanniana: Distribuzione limitata alla Sicilia nordoccidentale. Alzona (1971 - Atti Soc. ital. Sci. nat. Mus. civ. Stor. nat. Milano, 111: 1-433) riporta alcune sottospecie di dubbia validità.

Siciliaria (Siciliaria) leucophryna: Distribuzione limitata alla Sicilia nordoccidentale.

Siciliaria (Siciliaria) nobilis: Distribuzione limitata alla Sicilia nordoccidentale.

Siciliaria (Siciliaria) scarificata: Distribuzione limitata all'Isola di Marettimo (Egadi). Alzona (1971 - Atti Soc. ital. Sci. nat. Mus. civ. Stor. nat. Milano, 111: 1-433) riporta due sottospecie di dubbia validità.

Siciliaria (Siciliaria) septemPLICATA: Distribuzione limitata alla Sicilia nordoccidentale. Brandt (1961 - Arch. Molluskenkd., 90: 1-20) descrive *Siciliaria alcamoensis* come specie distinta. La validità di *S. septemPLICATA* prasina (Schmidt, 1868) citata da Alzona (1971 - Atti Soc. ital. Sci. nat. Mus. civ. Stor. nat. Milano, 111: 1-433) è incerta.

Siciliaria (Siciliaria) spezialensis: Distribuzione limitata alla Sicilia nordoccidentale.

Siciliaria (Siciliaria) tiberii: Secondo Brandt (1961 - Arch. Molluskenkd., 90: 1-20) *Siciliaria tiberii* è una sottospecie di *S. leucophryne* (Pfeiffer, 1862), insieme con *S. l. riberothi*.

Siciliaria (Stigmatica) ernae: Entità descritta per i Monti Alburni in Campania.

Siciliaria (Stigmatica) kobeltiana: Distribuzione limitata alla Lucania e alla Calabria.

Siciliaria (Stigmatica) paestana: Alzona (1971 - Atti Soc. ital. Sci. nat. Mus. civ. Stor. nat. Milano, 111: 1-433) riporta alcune sottospecie di dubbia validità.

Siciliaria (Stigmatica) stigmatica: Specie importata dai Balcani e segnalata solo per la Puglia come *S. stigmatica* maritima (Kleciak, 1875); la validità di sottospecie permane dubbia (cf.

Girod & Sacchi, 1967 - Atti Soc. ital. Sci. nat. Mus. civ. Stor. nat. Milano, 61: 268-269).

Siciliaria (Gibbularia) gibbula: *S. gibbula niethammeri* è un'entità incerta, con distribuzione limitata al Gargano (Forcart, 1965 - Verh. naturforsch. Ges. Basel, 76: 59-184). *S. g. vulcanica* è limitata alla Calabria, alla Sicilia nordorientale e alle Isole Eolie. Alzona (1971 - Atti Soc. ital. Sci. nat. Mus. civ. Stor. nat. Milano, 111: 1-433) elenca altre sottospecie di incerto significato. Nordsieck (1979 - Arch. Molluskenkd., 109: 249-275; com. pers., 27.6.1995) considera *S. vulcanica* specie distinta.

Papillifera deburghiae: Entità da rivedere; considerata da Forcart (1965 - Verh. naturforsch. Ges. Basel, 76: 59-184) e, con riserva, da Giusti (1973 - Lav. Soc. ital. Biogeogr. (N.S.), 2: 423-576) un più giovane sinonimo di *P. papillaris* (O.F. Müller, 1774). Secondo Nordsieck (com. pers. 21.08.1995) sarebbe una sottospecie di *P. solida* (Draparnaud, 1805). Descritta per la Calabria e citata anche per la Sicilia, ma le segnalazioni per quest'isola rimangono da verificare.

Papillifera solida: Distribuzione limitata, a N, agli estremi orientale ed occidentale della Liguria.

Ruthenica filograna: Distribuzione limitata, a S, al Gran Sasso e ai Monti della Laga in Abruzzo (dati personali inediti).

Erjavecchia bergeri: Distribuzione limitata, in Italia, alle Alpi Carniche e Giulie.

Macrogastra (Macrogastra) attenuata: Recentemente Falkner (1990 - Weichtiere. Europäische Meeres- und Binnenmollusken: 112-273) e Nordsieck (1993 - Heldia, 2: 33-42) assumono che il nome di una entità considerata una sottospecie di *Macrogastra lineolata* (Held, 1836), cioè *Clausilia attenuata* Rossmässler, 1838, sia disponibile da Rossmässler (1835), così da risultare un più vecchio sinonimo di *M. lineolata*. Questa opinione viene qui seguita anche se con molte riserve, in quanto l'adozione del nome *attenuata* comporta l'uscita di scena del nome *lineolata*, utilizzato in tutta la letteratura scientifica e manualistica del Novecento per indicare questa specie. Secondo Bank (1985 - De Kreukel, 21: 57-78) e Falkner (1990) le popolazioni delle Alpi centrorientali sono riferibili alla sottospecie nominotipica. Alzona (1971 - Atti Soc. ital. Sci. nat. Mus. civ. Stor. nat. Milano, 111: 1-433) elenca altre entità sottospecifiche, di dubbia validità.

Macrogastra (Macrogastra) densestriata: Segnalata per il Carso, ma la presenza della specie in questa area richiede conferma (Nordsieck, com. pers., 27.6.1995).

Macrogastra (Macrogastra) plicatula: Alzona (1971 - Atti Soc. ital. Sci. nat. Mus. civ. Stor. nat. Milano, 111: 1-433) riporta alcune sottospecie di incerta validità.

Julica schmidtii: Distribuzione limitata, in Italia, alle Alpi Giulie.

Clausilia (Clausilia) bidentata: Nordsieck (1990 - Arch. Molluskenkd., 119: 133-179) assegna le popolazioni italiane, presenti nella Liguria occidentale, a *C. b. crenulata*; le citazioni della sottospecie tipica, in Boato et al. (1985 - Lav. Soc. ital. Biogeogr. (N.S.), 9: 237-371) sono riferibili, almeno in parte, a tale entità.

Clausilia (Clausilia) cruciata: *Clausilia cruciata amiatae* è endemica del Monte Amiata; *C. c. pedemontana* è limitata alle Alpi occidentali (Nordsieck, 1990 - Arch. Molluskenkd., 119: 133-179). Sulle entità sottospecifiche segnalate per le Alpi centrorientali (cf. Alzona, 1971 - Atti Soc. ital. Sci. nat. Mus. civ. Stor. nat. Milano, 111: 1-433) non esistono recenti revisioni.

Clausilia (Clausilia) pumila: Distribuzione limitata, in Italia, alle Alpi Giulie ed al Carso.

Clausilia (Strobiliella) whateliana: Le varie entità sottospecifiche occupano areali compresi tra il Lago di Como ed il Lago d'Idro (Nordsieck, 1966 - Arch. Molluskenkd., 95: 19-47). La priorità tra i nomi *Clausilia whateliana* e *C. brembina* pubblicati simultaneamente da Strobel (1850) per indicare la specie in oggetto, è stata determinata da Nordsieck (1966 - Arch. Molluskenkd., 95: 19-47) (ICZN, 1985: Art. 24).

Clausilia (Andraea) dubia: Alzona (1971 - Atti Soc. ital. Sci. nat. Mus. civ. Stor. nat. Milano,

111: 1-433) riporta alcune sottospecie di incerta validità per l'arco alpino centrorientale.

Neostyriaca strobeli: Le segnalazioni per il territorio italiano di *Neostyriaca corynodes* (Held, 1836) (Gallenstein, 1901 - Jahrb. naturhist. Landes-Mus. Kärnten, 26: 1-169) sono probabilmente erronee (Nordsieck, com. pers., 21.08.1995). Il "correct original spelling" del nome specifico è "stobel" non "strobeli". Strobel (1848-1851) infatti, come in altri casi, introduce un nuovo nome specifico basato su di un nome personale trattato come nome in apposizione. Tali nomi sono validi (ICZN, 1985: Art. 31a) e il loro "original spelling" corretto. Tuttavia, essendo stati successivamente emendati e trattati come sostantivi al genitivo, sono praticamente conosciuti nella letteratura soltanto in questa forma.

Laciniaria (Laciniaria) plicata: Presenza limitata, in Italia, al settore alpino centrale.

Balea (Alinda) biplicata: Specie segnalata per l'Alto Adige.

Bulgarica (Denticularia) thessalonica: Specie originaria delle regioni europee sudorientali, introdotta nelle pinete del litorale di Ravenna, dove è stata, erroneamente, segnalata da Zangheri (1969 - Mus. civ. Stor. nat. Verona Mem. f.s., 1 (4): 1415-1693) come *Laciniaria plicata* (Draparnaud, 1801). Materiale determinato dal Dr. H. Nordsieck (Villingen-Schwenningen, Germania).

Sphincterochilidae

Sphincterochila (Albea) Pallary, 1909

Sphincterochila (Albea) candidissima (Draparnaud, 1801) (N, S, Si, Sa) (*)

Note

Sphincterochila (Albea): Questo gruppo di specie è erroneamente riferito da Alzona (1971 - Atti Soc. ital. Sci. nat. Mus. civ. Stor. nat. Milano, 111: 1-433) al genere *Leucochroa* Beck, 1837. Tale genere è stato, infatti, utilizzato per includere *Sphincterochila candidissima* e specie affini, sulla base della designazione di *Helix candidissima* Draparnaud, 1801 come specie tipo fatta da Martens (in Albers, 1860 - Die Helicen nach natürlicher Verwandtschaft systematisch geordnet. Zweite Ausgabe nach dem hinterlassenen Manuskript besorgt von Eduard von Martens, xviii + 359 pp.). Tuttavia, già Lindholm (1925 - Zool. Anz., 63: 161-165) aveva dimostrato l'esistenza di una precedente designazione di specie tipo e, quindi, l'impossibilità di usare *Leucochroa* in questo senso.

Sphincterochila (Albea) candidissima: *Sphincterochila candidissima* ha, in Italia, una distribuzione limitata, a N, alla Liguria occidentale ed, a S, alla Puglia.

Bradybaenidae

Bradybaena (Bradybaena) Beck, 1837

Bradybaena (Bradybaena) fruticum (O.F. Müller, 1774) (N)

Hygromiidae

Trichia Hartmann, 1840

- Trichia hispida* (Linnaeus, 1758) (N)
- Trichia montana* (Studer, 1820) (N) (*)
- Trichia plebeia* (Draparnaud, 1805) (N) (*)
- Trichia suberecta* (Clessin, 1873) (N) (*)

Petasina (Petasina) Beck, 1847

- Petasina (Petasina) unidentata* (Draparnaud, 1805) (N)

Petasina (Edentiella) Polinski, 1929

- Petasina (Edentiella) edentula* (Draparnaud, 1805) (N)
- Petasina (Edentiella) filicina* (Pfeiffer, 1841) (N) (*)
- Petasina (Edentiella) leucozona* (Pfeiffer, 1828) (N)
- Petasina (Edentiella) lurida* (Pfeiffer, 1828) (N)

Xerotricha Monterosato, 1892

- Xerotricha apicina* (Lamarck, 1822) (N, S, Si, Sa)
- Xerotricha conspurcata* (Draparnaud, 1801) (N, S, Si, Sa)

Candidula Kobelt, 1871

- Candidula cavannae* (Paulucci, 1881) (S) (E)
- Candidula fiorii* (Alzona & Alzona Bisacchi, 1938) (S) (E) (*)
- Candidula gigaxii* (Pfeiffer, 1850) (N) (*)
- Candidula grovesiana* (Paulucci, 1881) (S) (E) (*)
- Candidula spadae* (Calcara, 1845) (S) (E) (*)
- Candidula unifasciata* (Poiret, 1801) (*)
 - Candidula unifasciata unifasciata* (Poiret, 1801) (N, S)
 - Candidula unifasciata vincae* (De Stefani, 1883) (S) (E)

Xerolenta Monterosato, 1892

- Xerolenta obvia* (Menke, 1828)
 - Xerolenta obvia obvia* (Menke, 1828) (N)

Xeromunda Monterosato, 1892

- Xeromunda durieui* (Pfeiffer, 1848) (S) (M) (*)

Hygromia (Hygromia) Risso, 1826

- Hygromia (Hygromia) cinctella* (Draparnaud, 1801) (N, S, Si)

Ganula Gittenberger, 1970

Ganula lanuginosa (Boissy, 1835) (Sa) (*)

Ichnusotricha Giusti & Manganelli, 1987

Ichnusotricha berninii Giusti & Manganelli, 1987 (Sa) (*)

Nienhuisiella Giusti & Manganelli, 1987

Nienhuisiella antonellae Giusti & Manganelli, 1987 (Sa) (E) (*)

***Cernuella* (*Cernuella*)** Schlüter, 1838

Cernuella (*Cernuella*) *aginnica* (Locard, 1894) (N) (*)

Cernuella (*Cernuella*) *aradasi* (Pirajno, 1842) (Si) (E, M) (*)

Cernuella (*Cernuella*) *cisalpina* (Rossmässler, 1837) (N, S, Si, Sa) (*)

Cernuella (*Cernuella*) *hydruntina* (Kobelt, 1884) (S) (E) (*)

Cernuella (*Cernuella*) *rugosa* (Lamarck, 1822) (Si) (E, M) (*)

Cernuella (*Cernuella*) *virgata* (Da Costa, 1778) (N, S, Si, Sa)

***Cernuella* (*Xeroamanda*)** Monterosato, 1892

Cernuella (*Xeroamanda*) *amanda* (Rossmässler, 1838) (Si) (E) (*)

Cernuella (*Xeroamanda*) *caruanae* (Kobelt, 1888) (Si) (*)

Cernuella (*Xeroamanda*) *usticensis* (Calcara, 1842) (Si) (E) (*)

***Cernuella* (*Xerocincta*)** Monterosato, 1892

Cernuella (*Xerocincta*) *neglecta* (Draparnaud, 1805) (N, S) (*)

Cernuellopsis Manganelli & Giusti, 1988

Cernuellopsis ghisottii Manganelli & Giusti, 1988 (S) (E)

***Xerosecta* (*Xerosecta*)** Monterosato, 1892

Xerosecta (*Xerosecta*) *cespitum* (Draparnaud, 1801) (*)

Xerosecta (*Xerosecta*) *cespitum cespitum* (Draparnaud, 1801) (N, S)

Xerosecta (*Xerosecta*) *cespitum arigonis* (Schmidt, 1853) (Sa)

Xerosecta (*Xerosecta*) *dohrni* (Paulucci, 1882) (Sa) (E) (*)

Xerosecta (*Xerosecta*) *hillyeriana* (Paulucci, 1882) (Sa) (E) (*)

Xerosecta (*Xerosecta*) *sp.* (S) (E, M) (*)

***Xerosecta* (*Polloneriella*)** Alzona & Alzona Bisacchi, 1940

Xerosecta (*Polloneriella*) *contermina* (Pfeiffer, 1848) (S, Sa) (*)

Microxeromagna Ortiz de Zárate López, 1950

Microxeromagna armillata (Lowe, 1852) (N, S) (*)

Helicotricha Giusti, Manganelli & Crisci, 1992

Helicotricha carusoi Giusti, Manganelli & Crisci, 1992 (Si) (E) (*)

Monachoides Gude & Woodward, 1921

Monachoides incarnata (O.F. Müller, 1774) (N)

Urticicola Lindholm, 1927

Urticicola glabella (Draparnaud, 1801) (N) (*)

Urticicola telonensis (Mittre, 1848) (N) (*)

Urticicola umbrosa (Pfeiffer, 1828) (N)

Urticicola ventouxiana (Forcart, 1946) (N) (*)

Pseudotrichia Likharev, 1949

Pseudotrichia rubiginosa (Rossmässler, 1838) (N, S) (M) (*)

Caracollina (Caracollina) Beck, 1837

Caracollina (Caracollina) lenticula (Michaud, 1831) (S, Si, Sa)

Ciliella Mousson, 1872

Ciliella ciliata (Hartmann, 1821) (N, S) (*)

Ciliellopsis Giusti & Manganelli, 1990

Ciliellopsis oglasae Giusti & Manganelli, 1990 (S) (E, M) (*)

Schileykiella Manganelli, Sparacio & Giusti, 1989

Schileykiella parlatoris (Bivona, 1839) (Si) (*)

Schileykiella reinae (Pfeiffer, 1856) (Si) (E)

Tyrrheniellina Giusti & Manganelli, 1992

Tyrrheniellina josephi (Giusti & Manganelli, 1989) (S, Sa) (E, M) (*)

Trochoidea (Trochoidea) Brown, 1827

Trochoidea (Trochoidea) caroni (Deshayes, 1830) (S, Si) (E) (*)

Trochoidea (Trochoidea) cumiae (Calcara, 1847) (S?, Si) (E) (*)

Trochoidea (Trochoidea) elegans (Gmelin, 1791) (N, S, Sa) (*)

Trochoidea (Trochoidea) pyramidata (Draparnaud, 1805) (N, S, Si, Sa)
Trochoidea (Trochoidea) trochoides (Poiret, 1789) (N, S, Si, Sa)

Trochoidea (Xeroclausia) Monterosato, 1892

Trochoidea (Xeroclausia) meda (Porro, 1840) (S, Si, Sa) (*)

Euomphalia Westerlund, 1889

Euomphalia strigella (Draparnaud, 1801) (N)

Monacha (Monacha) Fitzinger, 1833

Monacha (Monacha) cartusiana (O.F. Müller, 1774) (N, S, Si, Sa)

Monacha (Eutheba) Nordsieck, 1993

Monacha (Eutheba) cantiana (Montagu, 1803) (N, S) (*)
Monacha (Eutheba) consona (Rossmässler, 1839) (Si) (E) (*)
Monacha (Eutheba) orsinii (Villa & Villa, 1841) (S) (E) (*)
Monacha (Eutheba) parumcincta (Pfeiffer, 1837) (S) (*)
Monacha (Eutheba) ruffoi Giusti, 1971 (S) (E) (*)

Monacha (Szentgalya) Pinter, 1977

Monacha (Szentgalya) gregaria (Rossmässler, 1839) (Si) (E) (*)

Cochlicella Férussac, 1821

Cochlicella acuta (O.F. Müller, 1774) (N, S, Si, Sa)
Cochlicella barbara (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
Cochlicella conoidea (Draparnaud, 1801) (S, Si, Sa)

Helicodonta Férussac, 1821

Helicodonta angigyra (Rossmässler, 1835) (N) (*)
Helicodonta obvoluta (O.F. Müller, 1774) (N, S) (*)

Falkneria Nordsieck, 1989

Falkneria camerani (Lessona, 1880) (N) (E) (*)

Drepanostoma Porro, 1836

Drepanostoma nautiliforme Porro, 1836 (N) (*)

Lindholmiola Hesse, 1931

Lindholmiola girva (Frivaldszky, 1835) (S) (*)

Note

Trichia: L'inquadramento specifico e sopraspecifico delle specie qui elencate in *Trichia* e *Petasina* presenta ancora molti problemi irrisolti. Alzona (1971 - Atti Soc. ital. Sci. nat. Mus. civ. Stor. nat. Milano, 111: 1-433) attribuisce erroneamente le specie qui incluse nei generi *Trichia* e *Petasina* al genere *Fruticicola* Held, 1837. *Fruticicola* è stato usato per un certo periodo per includere queste specie sulla base della designazione di *Helix hispida* come specie tipo fatta da Martens (in Albers, 1860 - Die Helicen nach natürlicher Verwandtschaft systematisch geordnet. Zweite Ausgabe nach dem hinterlassenen Manuskript besorgt von Eduard von Martens, xviii + 359 pp.). Tuttavia Lindholm (1927 - Arch. Molluskenkd., 59: 118-138) aveva dimostrato l'esistenza di una precedente designazione di specie tipo e, quindi, l'impossibilità di usare *Fruticicola* in questo senso.

Trichia montana: In Italia distribuzione limitata alle Alpi occidentali.

Trichia plebeia: L'identità di *Helix sericea* O.F. Müller, 1774, *Helix sericea* Draparnaud, 1801 non O.F. Müller, 1774 e *Helix plebeia* Draparnaud, 1805 è molto controversa. L'impostazione recente del problema, derivata da Forcart (1965 - Proc. First Europ. Malacol. Congr., London: 79-93; 1966 - Arch. Molluskenkd., 95: 79-80), potrebbe non essere corretta (cf. De Winter, 1990 - Basteria, 54: 227-237). Le segnalazioni di *Trichia plebeia* per l'Italia richiedono conferma per l'esistenza di più specie simili facilmente equivocabili (cf. De Winter, 1990).

Trichia suberecta: In Italia, segnalata solo per una località della Val d'Aosta (Forcart, 1965 - Proc. First Europ. Malacol. Congr., London: 79-93).

Petasina (Edentiella) filicina: In Italia, specie presente solo nelle Alpi Giulie e nel Carso.

Candidula: La classificazione sopraspecifica degli igromiidi xerofili rappresenta uno problemi che più hanno travagliato la letteratura malacologica della prima metà del Novecento e che, lungi dall'essere risolto, ha iniziato a trovare una soddisfacente soluzione solo negli ultimi anni. Le specie qui elencate nei generi *Candidula*, *Xerolenta*, *Xeromunda*, *Cernuella*, *Xerosecta* sono state riferite prima al genere *Xerophila* Held, 1837 e, a partire dagli anni venti, al genere *Helicella* Férussac, 1821. *Xerophila* è un più giovane sinonimo di *Theba* Risso, 1826 (*Helicidae*) e, quindi, non disponibile per gli igromiidi, mentre *Helicella* è un genere valido degli igromiidi xerofili, vicino a *Candidula*, ma estraneo alla fauna italiana. L'uso di *Helicella* perdura tuttora nella letteratura non specialistica. Le *Candidula* dell'Appennino costituiscono un piccolo gruppo di specie con molti problemi irrisolti. E' grazie alla cortese disponibilità del Dr. A. Hallgass (Roma), impegnato da anni in una accurata revisione del gruppo, che si è potuto compilare l'elenco qui proposto. I risultati delle ricerche di Hallgass sembrano attestare l'esistenza in Italia centrale, oltreché di *C. unifasciata* e di *C. spadae*, di due altre distinte entità. Una di queste, più settentrionale, corrisponderebbe a *C. grovesiana*, l'altra, più meridionale, a *C. cavannae*. Per il momento, rimane ancora incerto lo status di *Helix cavannae* var. *scissa* Paulucci, 1881, descritta per la Maiella e possibile sinonimo di *C. grovesiana*. *C. claudia*, descritta per la penisola sorrentina, sembra, invece, del tutto corrispondente a *C. cavannae* dei Monti del Matese (Hallgass, in preparazione).

Candidula fiorii: Entità da rivedere, conosciuta soltanto per il Gran Sasso.

Candidula gigaxii: Specie presente, in Italia, soltanto in Liguria occidentale.

Candidula grovesiana: Distribuzione limitata agli Abruzzi.

Candidula spadae: Entità endemica dell'Appennino centrale.

Candidula unifasciata: Lo stato di *C. unifasciata* *vincae*, descritta per le Alpi Apuane e considerata da Alzona (1971 - Atti Soc. ital. Sci. nat. Mus. civ. Stor. nat. Milano, 111: 1-433) e

da Giusti & Mazzini (1970 - Lav. Soc. ital. Biogeogr. (N.S.), 1: 201-335) come una sottospecie di *C. unifasciata*, necessita di ulteriori approfondimenti.

Xeromunda durieui: Specie psammofila localizzata, in Italia, lungo le coste del Golfo di Taranto.

Ganula lanuginosa: Specie con distribuzione limitata alle Isole Baleari, al sud della Spagna ed alla Sardegna.

Ichnusotricha berninii: Per indicare la specie in oggetto sono stati impiegati i nomi di due entità descritte per la Corsica: *Helix corsica* Shuttleworth, 1843 e *H. perlevis* Shuttleworth, 1852.

Come dimostrato da Giusti & Manganelli (1987 - Boll. malacol., 23: 123-205), *H. corsica* è una specie, endemica della Corsica, appartenente ad un genere anch'esso endemico: *Cyrnotheba* Germain, 1929. *H. perlevis* è, invece, un più giovane sinonimo di *Monacha cantiana* (Montagu, 1803). *Ichnusotricha berninii* è presente, al di fuori della Sardegna, solo nel sud della Corsica.

Nienhuisiella antonellae: Entità presente solo nella Sardegna sudoccidentale.

Cernuella (Cernuella) aginnica: Distribuzione limitata, in Italia, alla Liguria occidentale.

Cernuella (Cernuella) aradasi: Entità psammofila limitata ad una località della Sicilia nordorientale.

Cernuella (Cernuella) cisalpina: Le *Cernuella* del gruppo *cisalpina-virgata* sono note per l'ampia variabilità conchiliologica intra- ed interpopolazione che ha portato alla descrizione di decine di entità durante la seconda metà dell'Ottocento, in particolare, da parte degli autori francesi della Nouvelle Ecole. Soltanto per le *Cernuella* italiane risulta descritto più di un centinaio di taxa nominali del gruppo della specie (Favilli, 1994 - Per una revisione nomenclaturistica e tassonomica del genere *Cernuella* in Italia. Tesi di Dottorato, Università di Siena, 113 pp.). A queste vanno, però, aggiunte anche altre entità, originariamente descritte per altri paesi europei, che sono state segnalate in località italiane. Non può, così, stupire che le *Cernuella* del gruppo *cisalpina-virgata* siano tra i molluschi terrestri maggiormente suddivisi della fauna italiana. A riprova di questo fatto, basti considerare che Alzona (1971 - Atti Soc. ital. Sci. nat. Mus. civ. Stor. nat. Milano, 111: 1-433) elenca più di cinquanta entità, fra specie e sottospecie, che rientrano in questo gruppo. Lo stato di questi taxa è problematico e la loro revisione complessa, implicando l'analisi e lo studio delle descrizioni originali, di sintipi e topotipi, sia per analisi classiche (conchiliologiche e anatomiche), che genetiche (polimorfismo allozimico). È comprensibile, quindi, che nonostante gli innumerevoli tentativi di revisione effettuati da vari autori a partire dagli inizi del '900, la speciografia del genere *Cernuella* non abbia ancora trovato una soddisfacente sistemazione. In questo contesto, oltre ad elencare come distinte alcune entità accettate come tali nella letteratura recente, ci si è limitati a riportare solo *C. cisalpina* (comprendente le forme di taglia medio-piccola) e *C. virgata* (comprendente le forme medio-grandi). Una soluzione questa che rimane tutta da verificare.

Cernuella (Cernuella) hydruntina: Entità di dubbia validità, citata come specie endemica della penisola salentina da Forcart (1965 - Verh. naturforsch. Ges. Basel, 76: 59-184) e Girod & Sacchi (1967 - Atti Soc. ital. Sci. nat. Mus. civ. Stor. nat. Milano, 61: 268-269).

Cernuella (Cernuella) rugosa: Entità endemica della Sicilia occidentale, recentemente rivista (Favilli, 1994 - Per una revisione nomenclaturistica e tassonomica del genere *Cernuella* in Italia. Tesi di Dottorato, Università di Siena, 113 pp.; Manganelli et al., 1995 - Veliger, in stampa).

Cernuella (Xeroamanda) amanda: Entità endemica della Sicilia occidentale, recentemente rivista (Favilli, 1994 - Per una revisione nomenclaturistica e tassonomica del genere *Cernuella* in Italia. Tesi di Dottorato, Università di Siena, 113 pp.; Manganelli et al., 1995 - Malacologia, in stampa).

Cernuella (Xeroamanda) caruanae: Distribuzione limitata alla Sicilia, alle Isole Maltesi e alla

Tripolitania, dove potrebbe essere stata introdotta (Favilli, 1994 - Per una revisione nomenclaturistica e tassonomica del genere *Cernuella* in Italia. Tesi di Dottorato, 113 pp.; Giusti et al., 1995a - Mus. reg. Sci. Nat. Monogr. (Torino), 15, in stampa).

Cernuella (Xeroamanda) usticensis: Specie endemica dell'Isola di Ustica. Assegnazione generica alquanto dubbia per carenza di dati anatomici (Manganelli & Giusti, 1988 - Boll. malacol., 23: 237-379).

Cernuella (Xerocincta) neglecta: Le vicende nomenclaturistico-tassonomiche di questa specie sono, senza dubbio, meno travagliate rispetto a quelle del gruppo della *C. virgata* - *C. cisalpina*. Questo è principalmente dovuto al fatto che *C. neglecta* è meno ampiamente diffusa delle altre due specie di *Cernuella* e, almeno apparentemente, meno variabile (Favilli, 1994 - Per una revisione nomenclaturistica e tassonomica del genere *Cernuella* in Italia. Tesi di Dottorato, Università di Siena, 113 pp.). Lo stato di *Helix umbilicaris* Olivi, 1792, usato da Alzona (1971 - Atti Soc. ital. Sci. nat. Mus. civ. Stor. nat. Milano, 111: 1-433) per indicare una parte delle popolazioni italiane, successivamente riferite a *C. neglecta*, è incerto (Favilli, 1994) e, quindi, questo nome non è proponibile come sinonimo più vecchio della specie di Draparnaud. Alzona (1971) cita *C. neglecta* anche in Sardegna, ma la presenza della specie in quest'isola è molto controversa (Favilli, 1994).

Xerosecta (Xerosecta) cespitum: Distribuzione limitata, a S, alla Toscana settentrionale e all'Isola d'Elba. La validità della sottospecie *X. cespitum arigonis*, talvolta considerata specie distinta, è incerta.

Xerosecta (Xerosecta) dohrni: Entità da rivedere, inquadrata in *Xerosecta* sulla base di dati personali inediti.

Xerosecta (Xerosecta) hillyeriana: Entità da rivedere, inquadrata in *Xerosecta* sulla base di dati personali inediti.

Xerosecta (Xerosecta) sp.: Specie nuova, endemica delle Colline Metallifere (Toscana), la cui descrizione è ancora in stampa (Manganelli & Favilli, 1995 - J. Conchol., 35).

Xerosecta (Polloneriella) contermina: Entità psammofila presente, in Italia, solo in alcuni tratti del litorale tirrenico e della Sardegna.

Microxeromagna armillata: Entità riportata, in Italia, per pochissime località (Giusti & Manganelli, 1989 - Boll. malacol., 25: 23-62). È nota con certezza, a N, solo per la Liguria occidentale in prossimità del confine francese (Falnker, 1981 - Mitt. zool. Ges. Braunau, 3: 388-391) e a S, solo per l'Isola di Capraia nell'Arcipelago Toscano (Giusti & Manganelli, 1989) e la Versilia (dati personali inediti). È verosimile che si tratti di una specie introdotta.

Helicotricha carusoi: Distribuzione limitata alle Isole Eolie e, forse, presente anche nell'Isola di Ustica.

Monachoides: Schileyko (1978 - Fauna SSSR, (N.S.), 17: 1-384) suddivide il genere *Perforatella* Schlüter, 1838 (comprendente igromiidi con il complesso del sacco del dardo formato da 0+1 stilofori, talora erroneamente attribuiti a *Monacha* Fitzinger, 1833), in quattro distinti generi: *Monachoides* Gude & Woodward, 1921, *Perforatella*, *Pseudotrichia* Likharev, 1949 e *Urticicola* Lindholm, 1927. Sebbene questo smembramento abbia incontrato un vasto consenso, rimangono molti problemi irrisolti, primo fra tutti la mancanza di precise diagnosi differenziali. Le differenze fra questi taxa non sono, infatti, molto chiare, forse anche a causa della scarsa accuratezza dell'indagine anatomica di Schileyko (peraltro la più completa che sia stata fatta fino ad oggi). Ad esempio, a parte, forse, *Pseudotrichia* che sembra il gruppo più distinto rispetto agli altri, non ci sono differenze ben apprezzabili tra lo schema dei genitali distali di *Monachoides* vicina (Rossmässler, 1842) e *Urticicola* umbrosa (Pfeiffer, 1828) o di *Monachoides* incarnata (O.F. Müller, 1774) e *Perforatella* dibothrion (Kimakowicz, 1884) che possano inequivocabilmente supportare la loro collocazione in distinti generi, piuttosto che in

distinti sottogeneri. Sul problema del genere grammaticale di *Monachoides*, considerato femminile da tutti gli autori con l'eccezione di Falkner (1990 - Weichtiere. Europäische Meeres- und Binnenmollusken: 112-273) vedi la nota a *Melanoides tuberculata* (Fascicolo 14) e a *Cecilioides acicula*.

Urticicola: Falkner (1990 - Weichtiere. Europäische Meeres- und Binnenmollusken: 112-273) ha modificato i nomi specifici delle specie collocate in *Urticicola*, assumendo, probabilmente in accordo all'Art. 30a(1) dell'ICZN (1985), che il genere del nome *Urticicola* sia maschile. Tuttavia il comma dell'articolo in oggetto afferma che "a genus-group name that is or ends in a noun of variable gender [...] is to be treated as masculine [...] unless its author states, when establishing the name that it is feminine or treats it as feminine in combination with a species-group name". Quando Lindholm stabilisce *Urticicola* non dice nulla in proposito, né tratta alcuna specie in combinazione diretta con *Urticicola*. Il primo autore a portare *Urticicola* a rango di genere è Schileyko (1978), il quale considera il nome come femminile. Si ritiene, pertanto, che tale accezione vada conservata. Ciò è anche in accordo con la prassi molto diffusa nella letteratura malacologica di trattare i nomi terminanti in -cola come femminili (cf. l'uso di *Amnicola*, *Pseudamnicola*, *Stagnicola*, etc.).

Urticicola glabella: L'assegnazione ad *Urticicola glabella* delle popolazioni italiane, presenti nel settore alpino occidentale, presenta qualche margine di incertezza.

Urticicola telonensis: Entità da rivedere. Distribuzione limitata alle Alpi Liguri ed alla Francia sudorientale (*Perforatella* (*Monachoides*) sp. sensu Boato et al., 1985 - Lav. Soc. ital. Biogeogr. (N.S.), 9: 237-371).

Urticicola ventouxiana: L'attribuzione del materiale italiano a questa specie è incerta; presente in poche stazioni delle Alpi occidentali.

Pseudotrichia rubiginosa: Entità igrofila nota, in Italia, solo per pochissime località.

Ciliella ciliata: Bank (1978 - De Kreukel, 14: 9-16) ritiene che alcuni materiali del Trentino possano essere attribuibili ad un'altra entità ancora inedita.

Ciliellopsis oglasae: Entità endemica dell'Isola di Montecristo (Giusti & Manganelli, 1990 - J. Conchol., 33: 269-277).

Schileykiella parlatoris: Entità conosciuta, al di fuori della Sicilia, per un esemplare raccolto sull'Isola di Gozo (Isole Maltesi) (Giusti et al., 1995 - Mus. reg. Sci. Nat. Monogr. (Torino), 15, in stampa).

Tyrrheniellina josephi: A S, distribuzione limitata all'isolotto La Praiola nei pressi della costa occidentale dell'Isola di Capraia (Arcipelago Toscano); in Sardegna distribuzione puntiforme (Giusti & Manganelli, 1989 - Boll. malacol., 25: 23-62).

Trochoidea (*Trochoidea*) *caroni*: A S, distribuzione limitata a Capri.

Trochoidea (*Trochoidea*) *cumiae*: Lo stato di *Trochoidea cumiae*, una entità descritta per l'Isola di Lampedusa, è incerto. Potrebbe essere una sottospecie o un più giovane sinonimo di *T. spratti* (Pfeiffer, 1841) delle Isole Maltesi (Giusti et al., 1995 - Mus. reg. Sci. Nat. Monogr. (Torino), 15, in stampa). Le segnalazioni per il S, limitate alla Calabria e alla Sicilia, sono molto incerte.

Trochoidea (*Trochoidea*) *elegans*: Distribuzione limitata, a N, alla Liguria.

Trochoidea (*Xeroclausia*) *meda*: Distribuzione, a S, limitata alla Calabria e alla Puglia (dove è stata introdotta); fuori dai confini italiani, nota solo per Malta.

Monacha (*Monacha*): Alzona (1971 - Atti Soc. ital. Sci. nat. Mus. civ. Stor. nat. Milano, 111: 1-433) attribuisce erroneamente le specie qui incluse in *Monacha* al genere *Theba* Risso, 1826, usato, soprattutto tra gli anni venti e trenta, per includere *Monacha cartusiana* e specie affini. Questo uso era legittimato dalla designazione di *Helix cartusiana* a specie tipo di *Theba* fatta da Pilsbry (1895 - Manual of Conchology, 9 (36): iii-xlvi + 161-366) e venne mantenuto

fino a quando Lindholm (1927 - Arch. Molluskenkd., 59: 118-138) non dimostrò l'esistenza di una precedente designazione di specie tipo e, quindi, l'impossibilità di usare *Theba* in questo senso.

Monacha (Eutheba) cantiana: Nelle *Monacha*, qui riferite al sottogenere *Eutheba*, possono essere individuati due gruppi. Il primo, diffuso a nord e nell'Appennino, comprende entità con conchiglia di forma molto variabile, ma provvista di ombelico; l'altro, presente nell'Italia centromeridionale e in Sicilia, comprende entità con conchiglia sprovvista di ombelico o, tutt'al più, con ombelico appena aperto. Giusti (1971 - Lav. Soc. ital. Biogeogr. (N.S.), 2: 423-576) mise in sinonimia con *M. cantiana* (Montagu, 1803) un certo numero di entità descritte per l'Appennino centrale che presentavano conchiglia variabile per forma e dimensioni, ombelico aperto ma uno stesso schema dell'apparato genitale. Tuttavia, mancando notizie su alcuni caratteri non considerati in quella circostanza si preferisce assumere una posizione più prudente, lasciando in sospeso la posizione dei seguenti taxa: *Helix parreyssi* Pfeiffer, 1853, *H. martensiana* Tiberi, 1869, *H. alphabucelliana* Paulucci, 1881, *H. cantiana* var. *campanica* Paulucci, 1881, etc. *Monacha martensiana* è stata, recentemente, ritenuta specie distinta da Falkner (1990 - Weichtiere. Europäische Meeres- und Binnenmollusken: 112-273).

Monacha (Eutheba) consona: Entità da rivedere. Descritta su materiali siciliani da Rossmässler (1839), rappresenta uno dei nomi più vecchi per le *Monacha* della Sicilia. La località tipica è stata ristretta da Forcart (1965 - Verh. naturforsch Ges. Basel, 76: 59-184) ai dintorni di Palermo. In Sicilia occidentale vivono, però, due specie distinguibili con sicurezza solo anatomicamente. Ad una di queste viene applicato il nome di *M. gregaria* (Rossmässler, 1839) (cf. Hesse, 1931 - Zoologica (Stuttg.), 81: 1-118; Pintér, 1987 - Arch. Molluskend., 108: 53-55) (vedi sotto), mentre l'altra potrebbe corrispondere a *M. consona* (Rossmässler, 1839). Incerto rimane lo status di tutte le altre entità descritte per la Sicilia: *Helix bicincta* Benoit, 1840 nec Menke, 1830; *H. rizzae* Aradas, 1844, *H. hiberna* Benoit, 1859, *H. pirajnea* Benoit, 1859, *H. bidinensis* Cafici, 1883, etc. La specie potrebbe essere endemica della Sicilia o estesa anche all'Italia meridionale.

Monacha (Eutheba) orsinii: Entità di incerto valore tassonomico. Segnalata anche a N, ma probabilmente su determinazioni erronee (Palazzi, 1983 - Atti Soc. Nat. Mat. Modena, 114: 19-30). La distribuzione sembra limitata all'Appennino Abruzzese e Umbro-Marchigiano.

Monacha (Eutheba) parumcincta: Recenti riscontri anatomici sembrano confermare, in Italia, la presenza di una terza specie di *Monacha* con ombelico chiuso (le altre corrispondono a quelle qui indicate come *M. consona* e *M. gregaria*). Questa entità, diffusa in Italia centromeridionale, viene accostata ad una specie descritta per Corfù e riportata in gran parte del Mediterraneo nordorientale. Questa specie è nota in letteratura anche per il N (Lombardia e Friuli) e per la Sicilia, ma queste segnalazioni richiedono conferma.

Monacha (Eutheba) ruffoi: Entità descritta per i Monti Reatini.

Monacha (Szentgalya) gregaria: Entità da rivedere. Descritta su materiali siciliani, senza ulteriore indicazione di località, da Rossmässler (1839), rappresenta uno dei nomi più vecchi per le *Monacha* della Sicilia. Attualmente viene identificata con una specie che presenta un apparato genitale molto peculiare in quanto sprovvisto degli elementi distali accessori (ghiandole digitiformi e appendice atriale) (cf. Hesse, 1931 - Zoologica (Stuttg.), 81: 1-118; Pintér, 1987 - Arch. Molluskend., 108: 53-55). La specie, così come è correntemente intesa, è endemica della Sicilia occidentale e dell'Isola di Favignana.

Helicodonta angigyra: Distribuzione limitata, fuori dai confini italiani, al Canton Ticino e a poche altre località della Svizzera (Girod, 1968 - Arch. Molluskenkd., 98: 121-133).

Helicodonta obvoluta: Le popolazioni della Basilicata e della Calabria sono state attribuite ad una sottospecie distinta, *Helicodonta obvoluta calabrica* Degner, 1927, talvolta considerata

specie a sé stante. Al momento, però, la validità di questa entità è molto incerta.

Falkneria camerani: Specie nota solo per poche località del Piemonte e della Val d'Aosta, nelle Alpi Pennine.

Drepanostoma nautiliforme: Entità presente nel settore alpino centrale, dalle Alpi Graie alle Prealpi Lombarde occidentali; fuori dai confini italiani, limitata al Canton Ticino (Girod, 1968 - Arch. Molluskenkd., 98: 121-133).

Lindholmiola girva: Specie della Penisola Balcanica, nota, in Italia, solo per la Puglia dove è stata probabilmente importata (Girod & Sacchi, 1967 - Atti Soc. ital. Sci. nat. Mus. civ. Stor. nat. Milano, 61: 258-274). Questa entità è stata riportata fino ad anni recenti come *Lindholmiola corcyrensis* (Rossmässler, 1838). Secondo Falkner (1990 - Weichtiere.

Europäische Meeres- und Binnenmollusken: 112-273) il primo nome disponibile per la specie sarebbe, invece, *L. girva* (Frivaldszky, 1835).

Helicidae

Helicigona Férussac, 1819

Helicigona lapicida (Linnaeus, 1758) (N) (*)

Chilostoma (Delphinatia) Hesse, 1931

Chilostoma (Delphinatia) alpinum (Michaud, 1831) (*)

Chilostoma (Delphinatia) alpinum alpinum (Michaud, 1831) (N)

Chilostoma (Delphinatia) glaciale (Férussac, 1832) (N) (*)

Chilostoma (Chilostoma) Fitzinger, 1833

Chilostoma (Chilostoma) achates (Rossmässler, 1835) (*)

Chilostoma (Chilostoma) achates achates (Rossmässler, 1835) (N)

Chilostoma (Chilostoma) achates rhaeticum (Strobel, 1857) (N)

Chilostoma (Chilostoma) adelozona (Strobel, 1857) (N) (E) (*)

Chilostoma (Chilostoma) cingulatum (Studer, 1820) (*)

Chilostoma (Chilostoma) cingulatum anauniense (De Betta, 1852) (N) (E)

Chilostoma (Chilostoma) cingulatum anconae (Gentiluomo, 1868) (S) (E)

Chilostoma (Chilostoma) cingulatum apuanum (Issel, 1866) (S) (E)

Chilostoma (Chilostoma) cingulatum asperulum (Ehrmann, 1910) (N) (E)

Chilostoma (Chilostoma) cingulatum baldense (Rossmässler, 1839) (N) (E)

Chilostoma (Chilostoma) cingulatum bizona (Rossmässler, 1842) (N)

Chilostoma (Chilostoma) cingulatum cingulatum (Studer, 1820) (N)

Chilostoma (Chilostoma) cingulatum colubrinum (De Cristofori & Jan, 1832) (N) (E)

Chilostoma (Chilostoma) cingulatum frigidum (De Cristofori & Jan, 1832) (N) (E)

Chilostoma (Chilostoma) cingulatum frigidissimum (Paulucci, 1881) (N) (E)

Chilostoma (Chilostoma) cingulatum frigidosum (Pollonera, 1890) (N) (E)

Chilostoma (Chilostoma) cingulatum gobanzi (Frauenfeld, 1867) (N) (E)

Chilostoma (Chilostoma) cingulatum hermesianum (Pini, 1874) (N) (E)

Chilostoma (Chilostoma) cingulatum infernale (Hesse, 1931) (S) (E)

Chilostoma (Chilostoma) cingulatum insubricum (De Cristofori & Jan, 1832) (N) (E)

Chilostoma (Chilostoma) cingulatum liguricum (Kobelt, 1876) (N) (E)
Chilostoma (Chilostoma) cingulatum medoacense (Adami, 1886) (N) (E)
Chilostoma (Chilostoma) cingulatum nicatis (Costa, 1836) (S) (E)
Chilostoma (Chilostoma) cingulatum nicolisianum (Adami, 1886) (N) (E)
Chilostoma (Chilostoma) cingulatum philippii (Kobelt, 1905) (S) (E)
Chilostoma (Chilostoma) cingulatum preslii (Rossmässler, 1836) (N)
Chilostoma (Chilostoma) cingulatum sentinense (Piersanti, 1933) (S) (E)
Chilostoma (Chilostoma) cingulatum tigrinum (De Cristofori & Jan, 1832) (N) (E)
Chilostoma (Chilostoma) millieri (Bourguignat, 1880) (N) (*)
Chilostoma (Chilostoma) zonatum (Studer, 1820) (*)
Chilostoma (Chilostoma) zonatum foetens (Studer, 1820) (N)
Chilostoma (Chilostoma) zonatum zonatum (Studer, 1820) (N)

***Chilostoma (Kosicia)* Brusina, 1904**

Chilostoma (Kosicia) ambrosi (Strobel, 1851) (N) (E) (*)
Chilostoma (Kosicia) intermedium (Férussac, 1821) (N) (*)

***Chilostoma (Faustina)* Kobelt, 1904**

Chilostoma (Faustina) illyricum (Stabile, 1864) (*)
Chilostoma (Faustina) illyricum illyricum (Stabile, 1864) (N)
Chilostoma (Faustina) illyricum tiesenhauseni (Gredler, 1889) (N) (E)
Chilostoma (Faustina) lefeburiannum (Férussac, 1822) (N) (*)
Chilostoma (Faustina) padanum (Stabile, 1864) (N) (E) (*)

***Chilostoma (Campylaea)* Beck, 1837**

Chilostoma (Campylaea) planospira (Lamarck, 1822) (E) (*)
Chilostoma (Campylaea) planospira benedictum (Kobelt, 1872) (Si)
Chilostoma (Campylaea) planospira macrostoma (Rossmässler, 1837) (Si)
Chilostoma (Campylaea) planospira occultatum (Paulucci, 1886) (S)
Chilostoma (Campylaea) planospira planospira (Lamarck, 1822) (N, S)
Chilostoma (Campylaea) planospira setulosum (Briganti, 1825) (S, Si)

***Arianta* Turton, 1831**

Arianta arbustorum (Linnaeus, 1758) (*)
Arianta arbustorum arbustorum (Linnaeus, 1758) (N)
Arianta arbustorum repellini (Charpentier, 1852) (N)
Arianta chamaeleon (Pfeiffer, 1868) (*)
Arianta chamaeleon carnica (Ehrmann, 1910) (N)
Arianta chamaeleon chamaeleon (Pfeiffer, 1868) (N?)
Arianta chamaeleon wiedemayri (Kobelt, 1903) (N)
Arianta stenzii (Rossmässler, 1835) (N) (*)

***Isognomostoma* Fitzinger, 1833**

Isognomostoma isognomostomos (Schröter, 1784) (N)

Causa Schileyko, 1971

Causa holosericea (Studer, 1820) (N) (*)

Marmorana (Marmorana) Hartmann, 1844

Marmorana (Marmorana) serpentina (Férussac, 1821) (S, Sa) (*)

Marmorana (Murella) Pfeiffer, 1877

Marmorana (Murella) globularis (Philippi, 1836) (Si) (E) (*)

Marmorana (Murella) muralis (O.F. Müller, 1774) (N, S, Si, Sa) (*)

Marmorana (Murella) nebrodensis (Pirajno, 1842) (Si) (E) (*)

Marmorana (Murella) platychela (Menke, 1830) (Si) (E) (*)

Marmorana (Murella) scabriuscula (Deshayes, 1830) (Si) (E) (*)

Marmorana (Ambigua) Westerlund, 1902

Marmorana (Ambigua) fuscolabiata (Rossmässler, 1842) (S, Si) (E) (*)

Marmorana (Ambigua) saxetana (Paulucci, 1886) (S) (E) (*)

Marmorana (Ambigua) signata (Férussac, 1821) (S) (E) (*)

Tyrrheniberus Kobelt & Hesse, 1904

Tyrrheniberus ridens (Martens, 1884) (Sa) (E) (*)

Tyrrheniberus sardonius (Martens, 1884) (Sa) (E) (*)

Tyrrheniberus villicus (Paulucci, 1882) (Sa) (E) (*)

Macularia Albers, 1850

Macularia niciensis (Férussac, 1821) (N) (M) (*)

Tacheocampylaea Pfeiffer, 1877

Tacheocampylaea carotii (Paulucci, 1882) (Sa) (E) (*)

Tacheocampylaea tacheoides (Pollonera, 1909) (S) (E, M) (*)

Theba Risso, 1826

Theba pisana (O.F. Müller, 1774) (*)

Theba pisana pisana (O.F. Müller, 1774) (N, S, Si, Sa)

Eobania Hesse, 1913

Eobania vermiculata (O.F. Müller, 1774) (N, S, Si, Sa) (*)

Otala (Otala) Schumacher, 1817

Otala (Otala) punctata (O.F. Müller, 1774) (Sa) (*)

Cepaea (Cepaea) Held, 1837

Cepaea (Cepaea) nemoralis (Linnaeus, 1758) (N, S)

Cepaea (Cepaea) sylvatica (Draparnaud, 1801) (N) (*)

Cepaea (Cepaea) vindobonensis (Férussac, 1821) (N) (*)

Cantareus Risso, 1826

Cantareus apertus (Born, 1778) (N, S, Si, Sa) (*)

Cantareus aspersus (O.F. Müller, 1774) (N, S, Si, Sa)

Cantareus mazzullii (De Cristofori & Jan, 1832) (Si) (E) (*)

Helix (Helix) Linnaeus, 1758

Helix (Helix) cincta O.F. Müller, 1774

Helix (Helix) cincta cincta O.F. Müller, 1774 (N)

Helix (Helix) delpretiana Paulucci, 1878 (S) (E) (*)

Helix (Helix) ligata O.F. Müller, 1774 (S) (E) (*)

Helix (Helix) lucorum Linnaeus, 1758 (*)

Helix (Helix) lucorum lucorum Linnaeus, 1758 (N, S, Sa)

Helix (Helix) mileti Kobelt, 1906 (S) (E) (*)

Helix (Helix) pomatia Linnaeus, 1758 (N)

Note

Helicigona: L'inquadramento sopraspecifico delle entità assegnate ai generi *Helicigona*, *Chilostoma* ed *Arianta* presenta molti aspetti controversi e risulta, quindi, lontano da potersi considerare definitivo. Nella recente letteratura specialistica e manualistica si affrontano due posizioni: alcuni ricercatori accettano uno (*Helicigona*), due (*Helicigona*, *Arianta*) o, al massimo, tre taxa generici (*Helicigona*, *Chilostoma*, *Arianta*) (cf. Zilch & Jaeckel, 1962 - Die Tierwelt Mitteleuropas, 2 (1), 294 pp.; Forcart, 1965 - Verh. naturforsch. Ges. Basel, 76: 59-184; Kerney et al., 1983 - Die Landschnecken Nord- und Mitteleuropas, 384 pp.), mentre altri suddividono il gruppo in una decina di generi diversi (cf. Falkner, 1990 - Weichtiere. Europäische Meeres- und Binnenmollusken: 112-273; Schileyko, 1991 - Arch. Molluskenkd., 120: 187-236). Le differenze anatomiche tra questi generi/sottogeneri sono, tuttavia, molto modeste, in accordo con la generale uniformità anatomica degli *Helicidae* alla quale, peraltro, corrisponde una notevole variabilità conchiliologica (cf. le conchiglie di *Arianta*, *Helicigona* s.l., *Causa*, *Isognomostoma*, *Cylindrus*, *Theba*, *Eobania*, *Helix*, etc.). Pertanto, senza una più accurata revisione dell'intero gruppo che tenga conto anche di altri caratteri, si è preferito attenersi allo schema più tradizionalmente seguito.

Helicigona lapicida: In Italia, distribuzione limitata alle valli della Dora Riparia e Dora Baltea.

Chilostoma (Delphinatia) alpinum: Distribuzione limitata alle Alpi occidentali ed alle regioni limitrofe della Francia.

Chilostoma (Delphinatia) glaciale: Distribuzione limitata alle Alpi occidentali ed alle regioni

limitrofe della Francia.

Chilostoma (Chilostoma) achates: Nella letteratura recente, *Chilostoma achates* e *C. zonatum* (Studer, 1820) sono trattate come specie distinte (Kerney et al., 1983 - Die Landschnecken Nord- und Mitteleuropas, 384 pp.; Falkner, 1990 - Weichtiere. Europäische Meeres- und Binnenmollusken: 112-273) anche se Forcart (1933 - Verh. naturforsch. Ges. Basel, 44: 51-107), le aveva ricondotte ad un'unica entità comprendente anche *C. adelozona* (Strobel, 1857). I rapporti che intercorrono tra di esse e il reale valore delle entità sottospecifiche che vengono loro assegnate rimangono molto incerti. In Italia, la distribuzione di *C. a. achates* è limitata all'Alto Adige ed alle Alpi Carniche, mentre quella di *C. a. rhaeticum* è limitata alla Valtellina.

Chilostoma (Chilostoma) adelozona: Vedi nota 183.0.001.0. Distribuzione limitata alle Prealpi Lombarde e alle Alpi Retiche.

Chilostoma (Chilostoma) cingulatum: A *Chilostoma cingulatum* sono state attribuite moltissime sottospecie, alcune delle quali considerate nel passato specie distinte. L'ordinamento qui proposto è ripreso, con lievi modifiche, dalla monografia di Pfeiffer (1951 - Arch. Molluskenkd., 80: 89-214), il quale riunisce le diverse sottospecie in sette gruppi geografici, cinque alpini e due appenninici. A parte una revisione delle forme viventi nelle Alpi Apuane (Giusti & Mazzini, 1970 - Lav. Soc. ital. Biogeogr. (N.S.), 1: 201-335) e un'indagine sul gruppo di forme di *C. c. gobanzi* (Girod, 1974 - Natura bresciana. Annu. Mus. civ. Stor. nat. Brescia, 11: 101-106; 1976 - Natura bresciana. Annu. Mus. civ. Stor. nat. Brescia, 13: 93-114), non si registrano altri significativi contributi. Il gruppo rimane, quindi, in attesa di una revisione basata su più moderni metodi di indagine. Così come intese da Pfeiffer (1951), le diverse sottospecie occupano areali geografici, talvolta abbastanza estesi, altre volte puntiformi. Le popolazioni dell'Emilia non sono state inquadrare a livello sottospecifico.

Chilostoma (Chilostoma) millieri: *Chilostoma millieri* (Bourguignat, 1880) (non *Helicigona zonata* cf. *millieri* sensu Boato et al., 1985 - Lav. Soc. ital. Biogeogr. (N.S.), 9: 237-371) è un'entità da rivedere. Presente in un'area molto ristretta delle Alpi Marittime, tra l'Italia e la Francia.

Chilostoma (Chilostoma) zonatum: Vedi nota 183.0.001.0. Le popolazioni dell'arco alpino sudoccidentale, attribuibili a *Chilostoma zonatum flavovirens* (Dumont & Mortillet, 1852) (= *Helix monozonata* Pollonera, 1886; = *Helicigona zonata* cf. *millieri* sensu Boato et al., 1985 - Lav. Soc. ital. Biogeogr. (N.S.), 9: 237-371), potrebbero ricadere in un'entità sottospecifica distinta (dati personali inediti). *C. zonatum foetens*, con una distribuzione limitata alla Valle d'Aosta e all'area limitrofa della Svizzera, è un'entità da riesaminare.

Chilostoma (Kosicia) ambrosi: Inquadramento sottogenerico da riesaminare (dati personali inediti). Distribuzione limitata al Trentino orientale e alle Prealpi Venete.

Chilostoma (Kosicia) intermedium: In Italia, distribuzione limitata alle regioni orientali, dal Bellunese al Carso.

Chilostoma (Faustina) illyricum: Alzona (1971 - Atti Soc. ital. Sci. nat. Mus. civ. Stor. nat. Milano, 111: 1-433) attribuisce a *Chilostoma illyricum* altre entità sottospecifiche la cui validità rimane da chiarire: *C. i. illasyacum* (Adami, 1885), *H. i. erjavecii* (Clessin, 1887) ed *H. i. ullepitschi* (Westerlund, 1876).

Chilostoma (Faustina) lefebrianum: Distribuzione limitata, in Italia, al Friuli orientale ed al Carso.

Chilostoma (Faustina) padanum: Entità di dubbia validità, con distribuzione limitata alle Alpi Cozie.

Chilostoma (Campylaea) planospira: A *Chilostoma planospira* sono attribuite un certo numero di entità sottospecifiche: *benedictum* (Kobelt, 1872), *confusum* (Benoit, 1857), *macrostoma*

(Rossmässler, 1837), neapolitanum (Paulucci, 1879), occultatum (Paulucci, 1886) planospira (Lamarck, 1822), setulosum (Briganti, 1825), etc. (cf. Alzona, 1971 - Atti Soc. ital. Sci. nat. Mus. civ. Stor. nat. Milano, 111: 1-433). Con l'eccezione di C. p. planospira, H. p. occultatum, H. p. setulosum, convalidate seppur con riserva (cf. Forcart, 1965 - Verh. naturforsch. Ges. Basel, 76: 59-184; Giusti & Mazzini, 1970 - Lav. Soc. ital. Biogeogr. (N.S.), 1: 201-335; Giusti, 1973 - Lav. Soc. ital. Biogeogr. (N.S.), 2: 423-576; 1976 - Lav. Soc. ital. Biogeogr. (N.S.), 5: 99-355), le altre non sono state recentemente riviste.

Arianta arbustorum: La sottospecie A. arbustorum repellini, a distribuzione alpino-occidentale, è probabilmente presente in Italia sulle Alpi Cozie (Gittenberger, 1991 - J. molluscan Stud., 57: 99-109). Alzona (1971 - Atti Soc. ital. Sci. nat. Mus. civ. Stor. nat. Milano, 111: 1-433) elenca altre sottospecie di dubbia validità.

Arianta chamaeleon: Distribuzione limitata, in Italia, al settore alpino orientale. La presenza della sottospecie tipica e di altre sottospecie entro i confini italiani permane dubbia.

Arianta stenzii: Distribuzione limitata al settore alpino orientale.

Causa holosericea: Helix holosericea Studer, 1820 è un più giovane omonimo primario di Helix holosericea Gmelin, 1791, quest'ultima è ritenuta un più giovane sinonimo di Helicodonta obvoluta (O.F. Müller, 1774). Gmelin, infatti, elenca H. obvoluta ed H. holosericea come specie distinte ma dà una diagnosi di quest'ultima che concorda ("[...] supra subconca [...]" con la specie di Müller e riferisce ad H. holosericea le stesse citazioni iconografiche riportate per H. obvoluta (con la sola eccezione di una figura dell'Index conchyliorum testarum del Gualtieri, ma si tratta di un errore tipografico). Al fine di conservare il nome specifico "holosericea", coerentemente utilizzato in tutta la letteratura per la specie in oggetto occorre valutare se sia possibile designare un neotypus per Helix holosericea Gmelin, 1791 in accordo con l'uso del nome fatto a partire da Studer (1820) (ICZN, 1985: Recommendation, 75E) o, alternativamente, sottoporre il caso alla International Commission on Zoological Nomenclature affinché il nome più vecchio venga soppresso ai fini del principio dell'omonimia (ICZN, 1985: 79b(i)).

Marmorana (Marmorana) serpentina: La specie, originaria del complesso sardocorso, è stata diffusa dall'uomo in alcune località del Mediterraneo occidentale. Marmorana serpentina è, usualmente, suddivisa in un certo numero di sottospecie di dubbia validità. Alzona (1971 - Atti Soc. ital. Sci. nat. Mus. civ. Stor. nat. Milano, 111: 1-433) e Giusti & Castagnolo (1983 - Lav. Soc. ital. Biogeogr. (N.S.), 8: 227-249) elencano per l'Italia le seguenti: M. s. carae (Cantraine, 1841), M. s. hospitans (Rossmässler, 1836), M. s. isarae (Paulucci, 1882), M. s. isilensis (Mabille, 1867), M. s. jaspidea (Moquin-Tandon, 1855), M. s. serpentina (Férussac, 1821). Alzona (1971), inoltre, elenca M. suburbana (Paulucci, 1882) come una possibile specie distinta. La validità di questa entità e delle varie sottospecie di M. serpentina deve essere riesaminata nel contesto di una revisione dell'intero complesso di forme. M. serpentina è presente, a S, solo in Toscana.

Marmorana (Murella): Le Marmorana della Sicilia, riferite al sottogenere Murella, sono un altro gruppo di chioccioline terrestri frammentato in una miriade di entità. Alzona (1971 - Atti Soc. ital. Sci. nat. Mus. civ. Stor. nat. Milano, 111: 1-433), ad esempio, accetta cinque specie con circa 60 sottospecie. In mancanza di moderne revisioni dell'intero gruppo appare impossibile districarsi nella loro tassonomia. Per questo sono riportate soltanto le cinque specie accettate da Alzona (1971), omettendo del tutto i sinonimi e le numerose sottospecie.

Marmorana (Murella) globularis: Distribuzione limitata alla Sicilia nordoccidentale. Sono state descritte varie entità sottospecifiche, di validità estremamente dubbia.

Marmorana (Murella) muralis: Distribuzione, a N, limitata a poche località della Liguria orientale. Sono state descritte varie entità sottospecifiche, di validità estremamente dubbia.

Marmorana (Murella) nebrodensis: Sono state descritte varie entità sottospecifiche, di validità estremamente dubbia. Distribuzione limitata ai Monti Nebrodi e Peloritani.

Marmorana (Murella) platychela: Sono state descritte varie entità sottospecifiche, di validità estremamente dubbia. Distribuzione limitata alla Sicilia nordoccidentale.

Marmorana (Murella) scabriuscula: Sono state descritte varie entità sottospecifiche, di validità estremamente dubbia. Distribuzione limitata alla Sicilia nordoccidentale.

Marmorana (Ambigua) fuscolabiata: Entità recentemente rivista da Oliverio et al. (1992 - Lav. Soc. ital. Malacol., 24: 225-248, 24: 225-248). In Sicilia distribuzione limitata ai Monti Peloritani.

Marmorana (Ambigua) saxetana: La relativa precedenza tra i nomi *Helix argentarolae*, *H. forsythi*, *H. forsythi* var. *orta* e *Helix saxetana*, pubblicati simultaneamente da Paulucci (1886) per indicare la specie in oggetto, può essere determinata solo dal primo revisore (ICZN, 1985: Art. 24). Pfeiffer (1932 - Arch. Molluskenkd., 64: 173-189, Pl. 13), riunendo questi taxa in un'unica specie, per la quale utilizza il nome di *Murella (Opica) saxetana*, agisce di fatto come primo revisore. Ciò comporta la sostituzione del nome *Marmorana argentarolae*, usato negli ultimi anni per denotare questa specie. *Marmorana saxetana* ha una distribuzione limitata alla Toscana meridionale e all'Isola del Giglio.

Marmorana (Ambigua) signata: C'è molta confusione sulle date di pubblicazione dei nomi più vecchi, *Helix carsoliana*, *H. signata* e *H. strigata*, in parte dovuta all'annoso problema dell'interpretazione dell'*Histoire* e del *Prodrome* di Férussac. Nell'*Histoire*, *H. carsoliana* è illustrata nella tavola 41, fig. 1, stampata il 10 Novembre 1821, la didascalia della tavola è stata pubblicata il 6 Aprile 1821 e la descrizione della specie (1, p. 125) da Deshayes, nel 1850. *H. signata* è illustrata nella tavola 30, fig. 3, stampata il 17 Luglio 1820, la didascalia della tavola è stata pubblicata il 6 Aprile 1821 e la descrizione della specie (1, p. 243 non 287 come riporta Alzona, 1971 - Atti Soc. ital. Sci. nat. Mus. civ. Stor. nat. Milano, 111: 1-433) da Deshayes, nel 1850. *H. strigata* (non O.F. Müller, 1774) è illustrata nella tavola 67, fig. 6, stampata con relativa didascalia il 4 Agosto 1832 e nella tavola 75B, pubblicata con relativa didascalia il 2 Novembre 1822; la descrizione della specie (1, p. 44) è pubblicata da Deshayes, nel 1850. Il testo del *Prodrome* (le pp. si riferiscono all'edizione in quarto), relativo a *H. carsoliana* (p. 32, nomen nudum), a *H. signata* (p. 31, nomen nudum) ed a *H. strigata* (p. 38, nomen nudum), è stato pubblicato il 26 Maggio 1821 (vedi per l'interpretazione delle due opere di Férussac: Sherborn & Woodward, 1901 - Ann. Mag. nat. Hist. (VII), 8: 74-76; Kennard, 1942 - Proc. malacol. Soc. Lond., 25: 12-17, 105-118). Ricapitolando, *H. signata* è disponibile dal 6 Aprile 1821, *H. carsoliana* dal 10 Novembre 1821 ed *H. strigata* dal 2 Novembre 1822. È incerta, al momento, l'identità di *H. strigata* O.F. Müller, 1774. La maggior parte dei vecchi autori usa questo nome per indicare una *Marmorana* dell'Italia centrale o centromeridionale. Martens (1874 - Nachrichtsbl. dtsch. malakozool. Ges., 6: 12-13) dimostra che la specie descritta da Müller (1774) appartiene, in realtà, ad un altro gruppo e, quindi, il nome non è disponibile per indicare una specie di *Marmorana*. Secondo Oliverio et al. (1992 - Lav. Soc. ital. Malacol., 24: 225-248, 24: 225-248) potrebbero esistere due gruppi di popolazioni con valore sottospecifico.

Tyrrheniberus: *Tyrrheniberus* è usualmente trattato come un sottogenere di *Marmorana*, ma riscontri anatomici inediti supportano nel considerarlo un genere distinto.

Tyrrheniberus ridens: Distribuzione limitata alla Sardegna centrorientale.

Tyrrheniberus sardonius: Distribuzione limitata alla Sardegna centrorientale.

Tyrrheniberus villicus: Distribuzione limitata alla Sardegna centrorientale.

Macularia niciensis: Presenza limitata, in Italia, all'Imperiese.

Tacheocampylaea carotii: Distribuzione limitata alla Sardegna centrorientale.

Tacheocampylaea tacheoides: Specie endemica dell'Isola di Capraia (Arcipelago Toscano).

Theba pisana: Forcart (1965 - Arch. Molluskenkd., 94: 255-257) per risolvere l'identità di *Helix albella* Linnaeus, 1758 designa un lectotypus che rende tale nome disponibile come sinonimo più vecchio di *Helix pisana* O.F. Müller, 1774. Gittenberger & Ripken (1987 - Zool. Verh. (Leiden), 241: 1-59) rilevano giustamente che non è opportuno sostituire il nome di Müller con il sinonimo più vecchio e per questo intendono sollevare il caso di fronte alla International Commission on Zoological Nomenclature.

Eobania vermiculata: Alzona (1971 - Atti Soc. ital. Sci. nat. Mus. civ. Stor. nat. Milano, 111: 1-433) elenca alcune sottospecie di incerta validità.

Otala (Otala) punctata: Segnalata da Malatesta & Settepassi (1954 - Boll. Serv. geol. Ital., 76: 33-39) come *Archelix apalolena* (Bourguignat, 1867) per i dintorni di Alghero in Sardegna dove, probabilmente, è stata introdotta per uso alimentare (Carrada et al., 1967 - Atti Soc. ital. Sci. nat. Mus. civ. Stor. nat. Milano, 105: 377-388). Per l'Italia peninsulare, Paulucci (1886 - Bull. Soc. malacol. ital., 12: 5-62) riporta *Otala lactea* (O.F. Müller, 1774) per l'Isolotto dell'Argentara (Arcipelago Toscano). L'esemplare raccolto da C. Caroti nel 1883, conservato in collezione Paulucci (Museo di Zoologia dell'Università di Firenze), non è riferibile ad *O. lactea*. Probabilmente potrebbe appartenere ad *O. punctata*, anche se non si può del tutto escludere che appartenga a *Eobania vermiculata* (O.F. Müller, 1774). In ogni caso la presenza di una specie del genere *Otala* sullo scoglio dell'Argentara, che rimaneva inspiegabile anche alla stessa Paulucci, non trova recenti conferme (Giusti, 1976 - Lav. Soc. ital. Biogeogr. (N.S.), 5: 99-355).

Cepaea (Cepaea) sylvatica: Entità limitata alle Alpi occidentali e diffusa, fuori dai confini italiani, solo nelle limitrofe regioni alpine della Francia.

Cepaea (Cepaea) vindobonensis: Distribuzione, in Italia, limitata al Friuli-Venezia Giulia.

Cantareus: *Cantareus apertus* (Born, 1778) e *C. aspersus* (O.F. Müller, 1774) vengono tradizionalmente assegnati al genere *Helix*, rispettivamente nei sottogeneri *Cantareus* (*H. aperta*) e *Cornu* o *Cryptomphalus* (*H. aspersa*) dei quali sono le rispettive specie tipo. Giusti et al. (1995a - Mus. reg. Sci. Nat. Monogr. (Torino), 15, in stampa) dimostrano che queste due entità condividono gli stessi caratteri anatomici differenziandosi nettamente dalle specie incluse nel genere *Helix*. Il nome generico più vecchio per denotare il gruppo in esame sarebbe *Cornu* Born, 1778, il quale, tuttavia non è disponibile perché basato su di un taxon nominale, quello della sua specie tipo, *Cornu copiae* Born 1778, deliberatamente introdotto per un esemplare teratologico (una conchiglia despiralizzata di *C. aspersus*) e come tale escluso dalla nomenclatura zoologica (ICZN, 1985: Art. 1b(2)).

Cantareus apertus: *Cantareus apertus* ha una distribuzione limitata, a N, alla Liguria (Boato et al., 1985 - Lav. Soc. ital. Biogeogr. (N.S.), 9: 237-371) e alla Romagna (Zangheri, 1969 - Mus. civ. Stor. nat. Verona Mem. f.s., 1 (4): 1415-1693).

Cantareus mazzullii: Quando Giannuzzi-Savelli et al. (1986 - - Lav. Soc. ital. Malacol. (Atti del Congresso di Palermo 13-16.9.1984), 22: 195-208) designano un lectotypus per il nome manoscritto "*Helix cephalaeidana* Pirajno", di fatto (anche se la loro azione presenta aspetti molti equivoci), introducono una nuova specie: *Helix cephalaeidana* Giannuzzi et al., 1986. Infatti, anche se essi omettono una formale descrizione di questo taxon, riferiscono che Pirajno pubblica una diagnosi (riportata nella discussione) di una "*Helix mazzullii* var. β " che, secondo loro, corrisponderebbe a "*Helix cephalaeidana*". Inoltre, pur affermando che la validità di *Helix cephalaeidana* è dubbia, trattano questa entità con la stessa impostazione tipografica delle altre specie valide. In questo modo sembrerebbero ottemperate le disposizioni degli Artt. 11 (d) e 13 (a) dell'ICZN (1985). Distribuzione limitata alla Sicilia nordoccidentale.

Helix (Helix) delpretiana: Entità endemica dell'Appennino centrale.

Helix (Helix) ligata: Lo stato tassonomico delle numerose entità descritte per l'Appennino centromeridionale, usualmente ritenute riferibili a *Helix ligata*, sia come semplici sinonimi, sia come sottospecie (cf. Alzona, 1971 - Atti Soc. ital. Sci. nat. Mus. civ. Stor. nat. Milano, 111: 1-433), è molto lontano da essere stato adeguatamente risolto (cf. Giusti, 1971 - Lav. Soc. ital. Biogeogr. (N.S.), 2: 423-576).

Helix (Helix) lucorum: Recentemente la specie si è acclimatata in Sardegna dove è stata introdotta per uso alimentare (M. Sosso, com. pers.).

Helix (Helix) mileti: Sono necessari ulteriori accertamenti per un corretto inquadramento tassonomico di questa entità (cf. Giusti, 1971 - Lav. Soc. ital. Biogeogr. (N.S.), 2: 423-576).

Bivalvia

Solemyoida

Solemyidae

Solemya Lamarck, 1818

Solemya togata (Poli, 1795) (3, 4, 5)

Nuculoida

Nuculidae

Nucula Lamarck, 1799

Nucula hanleyi Winckworth, 1931 (5)

Nucula nitidosa Winckworth, 1930 (3, 4, 5)

Nucula nucleus (Linné, 1758) (3, 4, 5)

Nucula sulcata Bronn, 1831 (3, 4, 5)

Nuculoma Cossmann, 1907

Nuculoma aegeensis Forbes, 1844 (3, 4, 5)

Nuculoma corbuloides G. Seguenza, 1877 (3, 5)

Nuculanidae

Nuculana Link, 1807

Nuculana commutata (Philippi, 1844) (3, 4, 5)

Nuculana illirica Carrozza, 1987 (4)

Nuculana pella (Linné, 1767) (3, 4, 5)

Phaseolidae

Phaseolus Monterosato, 1875

Phaseolus ovatus G. Seguenza, 1877 (3)

Phaseolus pusillus (Jeffreys, 1879) (3)

Phaseolus tumidulus (Monterosato, 1880) (3)

Malletiidae

Malletia Des Moulins, 1832

Malletia cuneata Jeffreys, 1876 (3, 5)

Malletia obtusa G.O. Sars, 1872 (3, 5)

Neilonellidae

Neilonella Dall, 1881

Neilonella pusio (Philippi, 1844) (3)

Neilonella striolata (Brugnone, 1877) (3)

Yoldiidae

Yoldia Moeller, 1842

Yoldia micrometrica Seguenza G., 1877 (3)

Yoldiella Verrill & Bush, 1897

Yoldiella frigida (Torell, 1859) (3)

Yoldiella lucida (Lovén, 1846) (3)

Yoldiella messanensis (Jeffreys, 1870) (3, 4, 5)

Yoldiella philippiana (Nyst, 1845) (3, 5)

Arcoida

Arcidae

Arca Linné, 1758

Arca noae Linné, 1758 (3, 4, 5)
Arca tetragona Poli, 1795 (3, 4, 5)

Barbatia J.E.Gray, 1842

Barbatia barbata (Linné, 1758) (3, 4, 5)
Barbatia clathrata (Defrance, 1816) (3, 5)
Barbatia scabra (Poli, 1795) (3, 5)

Anadara J.E. Gray, 1847

Anadara corbuloides (Monterosato, 1878) (3, 5)
Anadara diluvii (Lamarck, 1805) (3, 5)

Bathyarca Kobelt, 1891

Bathyarca glacialis (J.E. Gray, 1824) (3, 5)
Bathyarca grenophia (Risso, 1826) (3, 4, 5)
Bathyarca philippiana (Nyst, 1848) (3, 4, 5)

Scapharca J.E. Gray, 1847

Scapharca inaequalvis (Bruguière, 1789) (3, 4, 5) (*)

Note

Scapharca inaequalvis: Introdotta involontariamente in Adriatico nel 1972 col traffico mercantile; areale originario: Oceano Indopacifico.

Noetidae

Striarca Conrad, 1862

Striarca lactea (Linné, 1758) (3, 4, 5)

Limopsidae

Limopsis Sassi, 1827

Limopsis aurita (Brocchi, 1814) (3, 5)
Limopsis minuta (Philippi, 1836) (3, 5)
Limopsis tenuis G. Seguenza, 1876 (3, 5)

Glycymerididae

Glycymeris Da Costa, 1778

Glycymeris bimaculata (Poli, 1795) (3, 4, 5)
Glycymeris glycymeris (Linné, 1758) (3, 4, 5)
Glycymeris insubrica (Brocchi, 1814) (3, 4, 5)

Mytiloida

Mytilidae

Mytilus Linné, 1758

Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819 (3, 4, 5)

Brachidontes Swainson, 1840

Brachidontes pharaonis (P. Fischer, 1870) (5) (*)

Mytilaster Monterosato, 1883

Mytilaster lineatus (Gmelin, 1791) (3, 4, 5)
Mytilaster marioni (Locard, 1889) (3, 4, 5)
Mytilaster minimus (Poli, 1795) (3, 4, 5)
Mytilaster solidus Monterosato, 1872 (3, 4, 5)

Perna Philippson, 1788

Perna picta (Von Born, 1778) (5) (*)

Crenella Brown, 1827

Crenella arenaria Monterosato, 1875 (3)
Crenella pellucida (Jeffreys, 1850) (3)

Gregariella Monterosato, 1883

Gregariella petagnae (Scacchi, 1832) (3, 4, 5)
Gregariella subclavata (Libassi, 1859) (3, 4)

Modiolarca J.E.Gray, 1842

Modiolarca subpicta (Cantraine, 1835) (3, 4, 5)

Musculus Roeding, 1798

Musculus costulatus (Risso, 1826) (3, 4, 5)
Musculus discors (Linné, 1767) (3, 4, 5)

Rhomboidella Monterosato, 1884

Rhomboidella prideauxi (Leach, 1815) (3, 4, 5)

Lithophaga Roeding, 1798

Lithophaga lithophaga (Linné, 1758) (3, 4, 5) (M)

Myoforceps P. Fischer, 1886

Myoforceps aristata (Dillwyn, 1817) (3)

Modiolus Lamarck, 1799

Modiolus adriaticus (Lamarck, 1819) (3, 4, 5)
Modiolus barbatus (Linné, 1758) (3, 4, 5)

Xenostrobus Wilson, 1967

Xenostrobus sp. (4)

Adipicola Dautzenberg, 1927

Adipicola modiolaeformis (Sturany, 1896) (3)

Amygdalum Von Muhelfeldt, 1811

Amygdalum agglutinans (Cantraine, 1835) (3, 5)
Amygdalum politum (Verrill & Smith, 1880) (3, 5)

Dacrydium Torell, 1859

Dacrydium hyalinum Monterosato, 1875 (3, 4, 5)

Idasola Iredale, 1915

Idasola ghisottii Waren & Carrozza, 1990 (3)
Idasola simpsoni (Marshall, 1900) (3)

Modiolula Sacco in Bellardi & Sacco, 1898

Modiolula phaseolina (Philippi, 1844) (3, 4, 5)

Note

Brachidontes pharaonis: Specie lessepsiana; presente in Mediterraneo dal 1893; areale originario: Oceano Indopacifico.

Perna picta: Immigrata in Mediterraneo dall'Oceano Atlantico.

Pinnidae

Pinna Linné, 1758

Pinna nobilis Linné, 1758 (3, 4, 5) (M)

Pinna rudis Linné, 1758 (3, 5) (M)

Atrina J.E. Gray, 1842

Atrina pectinata (Linné, 1767) (3, 4, 5)

Pterioida

Pteriidae

Pteria Scopoli, 1777

Pteria hirundo (Linné, 1758) (3, 4, 5)

Pinctada Roeding, 1798

Pinctada radiata (Leach, 1814) (3, 5) (*)

Note

Pinctada radiata: Specie lessepsiana; presente in Mediterraneo dal 1800; areale originario: Oceano Indiano.

Pectinidae

Pecten O.F. Müller, 1776

Pecten jacobaeus (Linné, 1758) (3, 4, 5)

Aequipecten P. Fischer, 1886

Aequipecten commutatus (Monterosato, 1875) (3, 5)

Aequipecten opercularis (Linné, 1758) (3, 4, 5)

Propeamussium De Gregorio, 1884

Propeamussium fenestratum (Forbes, 1844) (3, 4, 5)
Propeamussium lucidum (Wyville Thompson, 1873) (5)

Camptonectes Meek, 1864

Camptonectes striatus (O.F. Müller, 1776) (3)
Camptonectes tigrinus (O.F. Müller, 1776) (3)

Pseudamussium Moerch, 1853

Pseudamussium clavatum (Poli, 1795) (3, 4, 5)

Cyclopecten Verrill, 1897

Cyclopecten brundisiensis Smriglio & Mariottini, 1990 (3, 5)
Cyclopecten hoskynsi (Forbes, 1844) (3, 5)

Delectopecten Stewart, 1930

Delectopecten vitreus (Gmelin, 1791) (3, 5)

Hyalopecten Verrill, 1897

Hyalopecten similis (Laskey, 1811) (3, 4, 5)

Lissopecten Verrill, 1897

Lissopecten hyalinus (Poli, 1795) (3, 4, 5)

Palliolum Monterosato, 1884

Palliolum incomparabile (Risso, 1826) (3, 4, 5)

Chlamys Roeding, 1798

Chlamys bruei (Payraudeau, 1826) (3, 4, 5)
Chlamys flexuosa (Poli, 1795) (3, 4, 5)
Chlamys glabra (Linné, 1758) (3, 4, 5)
Chlamys multistriata (Poli, 1795) (3, 4, 5)
Chlamys pesfelis (Linné, 1758) (3, 5)
Chlamys proteus (Dillwyn, 1817) (3, 4, 5)
Chlamys varia (Linné, 1758) (3, 4, 5)

Spondylidae

Spondylus Linné, 1758

Spondylus gaederopus Linné, 1758 (3, 4, 5) (M)
Spondylus gussonii O.G. Costa, 1829 (3, 5)

Anomiidae

Anomia Linné, 1758

Anomia ephippium Linné, 1758 (3, 4, 5)

Pododesmus Philippi, 1837

Pododesmus aculeatus (O.F. Müller, 1776) (3)
Pododesmus glaucus (Monterosato, 1884) (4)
Pododesmus patelliformis (Linné, 1761) (3, 4, 5)
Pododesmus squamula (Linné, 1758) (3, 4, 5)

Limidae

Lima Bruguière, 1797

Lima exilis S.V. Wood, 1839 (3, 4, 5)
Lima hians (Gmelin, 1791) (3, 4, 5)
Lima lima (Linné, 1758) (3, 4, 5)

Acesta H. Adams & A. Adams, 1858

Acesta excavata (J.C. Fabricius, 1779) (3)

Limatula S.V. Wood, 1839

Limatula gwyni (Sykes, 1903) (3, 4, 5)
Limatula subauriculata (Montagu, 1808) (3, 4, 5)
Limatula subovata (Jeffreys, 1876) (3, 5)

Limea Bronn, 1831

Limea loscombi (G.B. Sowerby I, 1823) (3, 4, 5)

Notolimea Iredale, 1924

Notolimea crassa (Forbes, 1844) (3, 4, 5)

Ostreoida

Ostreidae

Ostrea Linné, 1758

Ostrea edulis Linné, 1758 (3, 4, 5)

Crassostrea Sacco, 1897

Crassostrea gigas (Thunberg, 1793) (3, 4)

Ostreola Monterosato, 1884

Ostreola parenzani Settepassi, 1978 (4, 5)

Ostreola stentina (Payraudeau, 1826) (3, 4, 5)

Saccostrea Dolfuss & Dautzenberg, 1920

Saccostrea commercialis (Iredale & Roughley, 1933) (4) (*)

Note

Saccostrea commercialis: Introdotta per l'allevamento a Chioggia nel 1980; areale originario: Oceano Indopacifico.

Gryphaeidae

Neopycnodonte Stenzel, 1971

Neopycnodonte cochlear (Poli, 1795) (3, 4, 5)

Unionoida

Unionidae

Anodonta Lamarck, 1799

Anodonta anatina Linné, 1758 (N, S)

Microcondylaea von Vest, 1866

Microcondylaea compressa Menke, 1828 (N)

Unio Retzius, 1788

Unio elongatulus C. Pfeiffer, 1825 (N, S, Si, Sa)

Veneroida

Lucinidae

Ctena Moersch, 1860

Ctena decussata (O.G. Costa, 1829) (3, 4, 5)

Loripes Poli, 1791

Loripes lacteus (Linné, 1758) (3, 4, 5)

Megaxinus Brugnone, 1880

Megaxinus unguiculinus Pallary, 1904 (5)

Lucinella Monterosato, 1883

Lucinella divaricata (Linné, 1758) (3, 4, 5)

Anodontia Link, 1807

Anodontia fragilis (Philippi, 1836) (3, 4, 5)

Myrtea Turton, 1822

Myrtea spinifera (Montagu, 1803) (3, 4, 5)

Lucinoma Dall, 1901

Lucinoma boreale (Linné, 1767) (3, 4, 5)

Thyasiridae

Thyasira Lamarck, 1818

Thyasira alleni Carozza, 1981 (3, 4)

Thyasira flexuosa (Montagu, 1803) (3, 4, 5)

Thyasira granulosa (Monterosato, 1874) (3, 5)

Thyasira oblonga (Monterosato, 1875) (3)

Thyasira orbiculata (G. Seguenza, 1876) (5)

Thyasira succisa (Jeffreys, 1876) (3)

Axinulus Verrill & Bush, 1898

Axinulus croulinensis (Jeffreys, 1847) (3, 4, 5)

Axinulus cycladius (S. Wood, 1848) (3)

Leptaxinus Verrill & Bush, 1898

Leptaxinus eumyarius (M. Sars, 1870) (3, 5)

Leptaxinus ferruginosus (Forbes, 1844) (3, 5)

Leptaxinus incrassatus (Jeffreys, 1876) (3, 5)

Leptaxinus subovatus (Jeffreys, 1881) (3, 5)

Ungulinidae

Diplodonta Bronn, 1831

Diplodonta apicalis Philippi, 1836 (3, 5)

Diplodonta brocchi (Deshayes, 1852) (3, 4)

Diplodonta rotundata (Montagu, 1803) (3, 4, 5)

Chamidae

Chama Linné, 1758

Chama circinata Monterosato, 1878 (3, 5)

Chama gryphoides Linné, 1758 (3, 4, 5)

Pseudochama Odhner, 1917

Pseudochama gryphina (Lamarck, 1819) (3, 4, 5)

Galeommatidae

Galeomma Turton, 1825

Galeomma turtoni Turton, 1825 (3, 4, 5)

Kelliidae

Kellia Turton, 1822

Kellia suborbicularis (Montagu, 1803) (3, 4, 5)

Pseudopythina P. Fischer, 1878

Pseudopythina macandrewi (P. Fischer, 1867) (3)

Bornia Philippi, 1836

Bornia geoffroyi (Payraudeau, 1826) (3)

Bornia sebetia (O.G. Costa, 1829) (3, 4, 5)

Lasaeidae

Lasaea Brown, 1827

Lasaea rubra (Montagu, 1803) (3, 4, 5)

Hemilepton Cossmann & Peyrot, 1911

Hemilepton nitidum (Turton, 1822) (3, 4, 5)

Litigiella Monterosato, 1909

Litigiella glabra (P. Fischer, 1873) (3)

Scacchia Philippi, 1844

Scacchia oblonga (Philippi, 1836) (3, 4, 5)

Scacchia ovata Philippi, 1844 (3)

Leptonidae

Lepton Turton, 1822

Lepton squamosum (Montagu, 1803) (3, 4, 5)

Montacutidae

Montacuta Turton, 1822

Montacuta convexa Monterosato, 1875 (3)

Montacuta substriata (Montagu, 1808) (3, 5)

Montacuta voeringi Friele, 1879 (3)

Mancikellia Dall, 1899

Mancikellia pumila (J. Sowerby de C., 1846) (3)

Tellimya Brown, 1827

Tellimya ferruginosa (Montagu, 1808) (3, 4, 5)

Tellimya phascolionis (Dautzenberg & H. Fischer, 1925) (3)

Mysella Angas, 1877

Mysella bidentata (Montagu, 1803) (3, 4, 5)

Mysella ovata (Jeffreys, 1881) (3)

Mysella pellucida (Jeffreys, 1881) (3)

Mysella tumidula (Jeffreys, 1866) (3, 5)

Epilepton Dall, 1899

Epilepton clarkiae (W. Clark, 1852) (3, 4, 5)

Neoleptonidae

Neolepton Monterosato, 1875

Neolepton obliquatum Chaster, 1897 (3, 4)

Neolepton sulcatulum (Jeffreys, 1859) (3, 5)

Sportellidae

Sportella Deshayes, 1858

Sportella recondita (P. Fischer, 1872) (3, 5)

Carditidae

Cardita Bruguière, 1792

Cardita calyculata (Linné, 1758) (3, 5)

Glans Muhelfeldt, 1811

Glans aculeata (Poli, 1795) (3, 4, 5)

Glans trapezia (Linné, 1767) (3, 4, 5)

Pteromeris Conrad, 1862

Pteromeris jozinae Van Aartsen, 1984 (5)

Pteromeris minuta (Scacchi, 1836) (3, 4, 5)

Venericardia Lamarck, 1801

Venericardia antiquata (Linné, 1758) (3, 4, 5)

Astartidae

Astarte J. Sowerby, 1816

Astarte fusca (Poli, 1795) (3, 5)

Astarte sulcata (Da Costa, 1778) (3, 5)

Digitaria S. Wood, 1853

Digitaria digitaria (Linné, 1758) (3, 4, 5)

Gonilia Stoliczka, 1871

Gonilia calliglypta (Dall, 1903) (3, 5)

Goodallia Turton, 1822

Goodallia macandrewi (Smith, 1881) (3, 5)

Goodallia pusilla (Forbes, 1844) (3)

Goodallia triangularis (Montagu, 1803) (3, 5)

Cardiidae

Acanthocardia J.E. Gray, 1851

Acanthocardia aculeata (Linné, 1758) (3, 4, 5)

Acanthocardia deshayesii (Payraudeau, 1826) (3, 5)

Acanthocardia echinata (Linné, 1758) (3, 4, 5)

Acanthocardia paucicostata (G. B. Sowerby II, 1841) (3, 4, 5)

Acanthocardia tuberculata (Linné, 1758) (3, 4, 5)

Parvicardium Monterosato, 1884

Parvicardium exiguum (Gmelin, 1791) (3, 4, 5)

Parvicardium minimum (Philippi, 1836) (3, 4, 5)

Parvicardium ovale (G.B. Sowerby II, 1840) (3, 4, 5)

Parvicardium roseum (Lamarck, 1819) (3, 4, 5)

Plagiocardium Cossmann, 1887

Plagiocardium papillosum (Poli, 1795) (3, 4, 5)

Laevicardium Swainson, 1840

Laevicardium crassum (Gmelin, 1791) (3, 4, 5)

Laevicardium oblongum (Gmelin, 1791) (3, 4, 5)

Cerastoderma Poli, 1795

Cerastoderma glaucum (Poiret, 1789) (3, 4, 5)

Mactridae

Mactra Linné, 1767

Mactra glauca Von Born, 1778 (3, 5)

Mactra stultorum (Linné, 1758) (3, 4, 5)

Spisula J.E. Gray, 1837

Spisula subtruncata (Da Costa, 1778) (3, 4, 5)

Lutraria Lamarck, 1799

Lutraria angustior Philippi, 1844 (3, 5)

Lutraria lutraria (Linné, 1758) (3, 5)

Lutraria magna (Da Costa, 1778) (3, 5)

Eastonia J.E. Gray, 1853

Eastonia rugosa (Helbling, 1779) (5)

Mesodesmatidae

Donacilla Philippi, 1836

Donacilla cornea (Poli, 1795) (3, 5)

Monterosatus Beu, 1971

Monterosatus primus (Locard, 1899) (3)

Solenidae

Solen Linné, 1758

Solen marginatus Pulteney, 1799 (3, 4, 5)

Pharellidae

Ensis Schumacher, 1817

Ensis ensis (Linné, 1758) (3, 4, 5)

Ensis minor (Chenu, 1843) (3, 4, 5)

Phaxas Leach, 1852

Phaxas adriaticus (Coen, 1933) (3, 4, 5)

Tellinidae

Tellina Linné, 1758

Tellina balaustina Linné, 1758 (3, 4, 5)

Tellina crassa Pennant, 1777 (3, 5)

Tellina distorta Poli, 1791 (3, 4, 5)

Tellina donacina Linné, 1758 (3, 4, 5)

Tellina exigua Poli, 1791 (3, 5)

Tellina fabula Gmelin, 1791 (3, 4, 5)

Tellina incarnata Linné, 1758 (3, 4, 5)

Tellina nitida Poli, 1791 (3, 4, 5)

Tellina pygmaea Lovén, 1846 (3, 5)

Tellina planata Linné, 1758 (3, 4, 5)

Tellina pulchella Lamarck, 1818 (3, 4, 5)

Tellina serrata Brocchi, 1814 (3, 4, 5)

Tellina tenuis Da Costa, 1778 (3, 4, 5)

Macoma Leach in Ross, 1819

Macoma cumana (O.G. Costa, 1829) (3, 4, 5)

Gastrana Schumacher, 1817

Gastrana fragilis (Linné, 1758) (3, 4, 5)

Donacidae

Donax Linné, 1758

Donax semistriatus Poli, 1795 (3, 4, 5)

Donax trunculus Linné, 1758 (3, 4, 5)

Donax venustus Poli, 1795 (3, 4, 5)

Donax variegatus Gmelin, 1791 (3, 4, 5)

Psammobiidae

Psammobia Lamarck, 1818

Psammobia costulata Turton, 1822 (3, 4, 5)

Psammobia depressa (Pennant, 1777) (3, 4, 5)

Psammobia fervensis (Gmelin, 1791) (3, 4, 5)

Psammobia tellinella Lamarck, 1818 (3, 5)

Psammobia weinkauffi Crosse, 1864 (5)

Scrobiculariidae

Scrobicularia Schumacher, 1816

Scrobicularia cottardi (Payraudeau, 1826) (3, 4, 5)

Scrobicularia plana (Da Costa, 1778) (3, 4, 5)

Semelidae

Abra Lamarck, 1818

Abra alba (W. Wood, 1802) (3, 4, 5)

Abra nitida (O.F. Müller, 1776) (3, 4, 5)

Abra longicallus (Scacchi, 1834) (3, 4, 5)

Abra prismatica (Montagu, 1808) (3, 4, 5)

Abra segmentum (Récluz, 1843) (3, 4, 5)

Abra tenuis (Montagu, 1803) (3, 4, 5)

Solecurtidae

Solecurtus Blainville, 1824

Solecurtus multistriatus (Scacchi, 1835) (3)

Solecurtus scopula (Turton, 1822) (3, 4, 5)

Solecurtus strigilatus (Linné, 1758) (3, 4, 5)

Azorinus Récluz, 1869

Azorinus chamasolen (Da Costa, 1778) (3, 4, 5)

Pharus J.E. Gray, 1840

Pharus legumen (Linné, 1758) (3, 4, 5)

Dreissenidae

Dreissena van Beneden, 1835

Dreissena polymorpha (Pallas, 1754) (N)

Kelliellidae

Kelliella M. Sars, 1870

Kelliella abyssicola (Forbes, 1844) (3, 4, 5)

Trapeziidae

Coralliophaga Blainville, 1824

Coralliophaga lithophagella (Lamarck, 1819) (3, 4, 5)

Glossidae

Glossus Poli, 1795

Glossus humanus (Linné, 1758) (3, 4, 5)

Sphaeriidae

Pisidium C. Pfeiffer, 1821

Pisidium amnicum (O.F. Müller, 1774) (N, S, Si)

Pisidium annandalei Prashad, 1925 (S, Si)

Pisidium casertanum (Poli, 1791) (N, S, Si, Sa)

Pisidium conventus Clessin, 1877 (N)

Pisidium henslowanum (Sheppard, 1825) (N, S)

Pisidium hibernicum Westerlund, 1894 (N)

Pisidium lilljeborgii Clessin, 1886 (N)

Pisidium milium Held, 1836 (N, S)

Pisidium moitessierianum Paladilhe, 1866 (N) (*)

Pisidium nitidum Jenyns, 1845 (N, S, Si, Sa)

Pisidium obtusale D. Pfeiffer, 1821 (N, S)

Pisidium personatum Malm, 1855 (N, S, Si, Sa)

Pisidium pseudosphaerium Schlesch, 1947 (N) (*)

Pisidium subtruncatum Malm, 1855 (N, S, Sa)
Pisidium tenuilineatum Stelfox, 1918 (N)

Sphaerium Scopoli, 1777

Sphaerium corneum (Linné, 1758) (N, S, Sa)

Musculium Link, 1807

Musculium lacustre (O.F. Müller, 1774) (N, S, Si, Sa)

Note

Pisidium: Kuiper (1964) segnala anche il ritrovamento nei dintorni del Lago di Garda di esemplari subfossili di *P. pulchellum* Jenyhns, tuttavia non essendo mai stato rinvenuto vivente non viene qui riportato.

Pisidium moitessierianum: Segnalato solo nel lago di Biandronno (Varese, Lombardia).

Pisidium pseudosphaerium: Segnalato solo nel lago di Mergozzo (Varese, Lombardia).

Veneridae

Venus Linné, 1758

Venus casina Linné, 1758 (3, 5)
Venus nux Gmelin, 1791 (5)
Venus verrucosa Linné, 1758 (3, 4, 5)

Globivenus Coen, 1934

Globivenus effossa (Philippi, 1836) (3, 5)

Chamelea Moerch, 1853

Chamelea gallina (Linné, 1758) (3, 4, 5)

Clausinella J.E. Gray, 1851

Clausinella brongniartii (Payraudeau, 1826) (3, 4, 5)

Timoclea Brown, 1827

Timoclea ovata (Pennant, 1777) (3, 4, 5)

Gouldia C.B. Adams, 1847

Gouldia minima (Montagu, 1803) (3, 4, 5)

Dosinia Scopoli, 1777

Dosinia exoleta (Linné, 1758) (3, 5)

Dosinia lupinus (Linné, 1758) (4, 5)

Pitar Roemer, 1857

Pitar rudis (Poli, 1795) (3, 4, 5)

Callista Poli, 1791

Callista chione (Linné, 1758) (3, 4, 5)

Tapes Von Muhelfeldt, 1811

Tapes decussatus (Linné, 1758) (3, 4, 5)

Tapes philippinarum (Adams & Reeve, 1850) (4) (*)

Irus F.C. Schmidt, 1818

Irus irus (Linné, 1758) (3, 4, 5)

Paphia Roeding, 1798

Paphia aurea (Gmelin, 1791) (3, 4, 5)

Paphia lucens Locard, 1886 (3, 5)

Paphia rhomboides (Pennant, 1777) (3, 4, 5)

Venerupis Lamarck, 1818

Venerupis senegalensis (Gmelin, 1791) (3, 4, 5)

Note

Tapes philippinarum: Introdotta per l'allevamento in Adriatico nel 1983; areale originario: Oceano Indopacifico.

Petricolidae

Petricola Lamarck, 1801

Petricola lajonkairii (Payraudeau, 1826) (3, 4, 5)

Petricola lithophaga (Retzius, 1786) (3, 4, 5)

Mysia Lamarck, 1818

Mysia undata (Pennant, 1777) (4, 5)

Myoida

Myidae

Sphenia Turton, 1822

Sphenia binghami Turton, 1822 (3, 4)

Corbulidae

Corbula Bruguière, 1797

Corbula gibba (Olivi, 1792) (3, 4, 5)

Lentidium De Cristoforis & Jan, 1832

Lentidium mediterraneum (O.G. Costa, 1839) (3, 4, 5)

Gastrochaenidae

Gastrochaena Spengler, 1783

Gastrochaena dubia (Pennant, 1777) (3, 4, 5)

Hiatellidae

Hiatella Bosc, 1801

Hiatella arctica (Linné, 1767) (3, 4, 5)

Hiatella rugosa (Linné, 1767) (3, 4, 5)

Panopea Menard de la Groye, 1807

Panopea glycymeris (Von Born, 1778) (3, 5)

Saxicavella P. Fischer, 1878

Saxicavella jeffreysi Winckworth, 1930 (3, 4, 5)

Pholadina

Pholadidae

Pholas Linné, 1758

Pholas dactylus Linné, 1758 (3, 4)

Barnea Risso, 1826

Barnea candida (Linné, 1758) (3, 4, 5)

Pholadidea Turton, 1819

Pholadidea loscombiana Goodall in Turton, 1819 (3, 5)

Teredinidae

Teredo Linné, 1758

Teredo navalis Linné, 1758 (3, 4, 5)

Lyrodus Binney, 1870

Lyrodus pedicellatus (Quatrefages, 1849) (3, 4, 5)

Psiloteredo Bartsch, 1922

Psiloteredo megotara (Hanley in Forbes & Hanley, 1848) (3)

Teredora Bartsch, 1921

Teredora malleolus (Turton, 1822) (3)

Bankia J.E. Gray, 1840

Bankia carinata (J.E. Gray, 1827) (3, 4)

Nototerredo Bartsch, 1923

Nototerredo norvegica (Spengler, 1792) (3, 4, 5)

Xylophagidae

Xylophaga Turton, 1822

Xylophaga dorsalis (Turton, 1819) (3, 4, 5)

Xylophaga praestans E.A. Smith, 1885 (3, 4)

Pholadomyoida

Pholadomyidae

Pholadomya G.B. Sowerby I, 1823

Pholadomya loveni Jeffreys, 1882 (3, 5)

Thraciidae

Thracia Leach in Blainville, 1824

Thracia convexa (W. Wood, 1815) (3, 4, 5)

Thracia corbuloides Deshayes, 1830 (3, 4, 5)

Thracia distorta (Montagu, 1803) (3, 4, 5)

Thracia papyracea (Poli, 1791) (3, 4, 5)

Thracia pubescens (Pulteney, 1799) (3, 4, 5)

Thracia villosiuscula (MacGillivray, 1827) (3)

Periplomatidae

Cochlodesma Couthouy, 1839

Cochlodesma praetenue (Pulteney, 1799) (3)

Cochlodesma tenerum (P. Fischer, 1882) (*)

Note

Cochlodesma tenerum: Distribuzione italiana non conosciuta.

Clavagellidae

Clavagella Blainville, 1817

Clavagella aperta G.B. Sowerby I, 1823 (3, 5)

Clavagella balanorum Scacchi, 1841 (3, 5)

Clavagella melitensis Broderip, 1835 (3, 5)

Pandoridae

Pandora Bruguère, 1797

Pandora inaequalis (Linné, 1758) (3, 4, 5)

Pandora pinna (Montagu, 1803) (3, 4, 5)

Lyonsiidae

Lyonsia Turton, 1822

Lyonsia formosa Jeffreys, 1882 (3)

Lyonsia norvegica (Gmelin, 1791) (3, 4, 5)

Poromyidae

Poromya Forbes, 1844

Poromya granulata (Nyst & Westendorp, 1839) (3, 5)

Poromya neaeroides G. Seguenza, 1877 (3)

Verticordiidae

Verticordia J.E. Gray, 1842

Verticordia granulata G. Seguenza, 1860 (3)

Halicardia Dall, 1895

Halicardia ferruginea G. Di Geronimo, 1974 (5)

Haliris Dall, 1886

Haliris lamothei Dautzenberg & Fischer, 1897 (5)

Laevicordia G. Seguenza, 1876

Laevicordia gemma (Verrill, 1880) (3, 5)

Cuspidariidae

Cuspidaria Nardo, 1840

Cuspidaria abbreviata (Forbes, 1843) (3, 5)

Cuspidaria cuspidata (Olivi, 1792) (3, 4, 5)

Cuspidaria depressa (Jeffreys, 1882) (3)

Cuspidaria elliptica (Di Geronimo, 1974) (5)
Cuspidaria jugosa (S. Wood, 1856) (3)
Cuspidaria obesa (Lovén, 1846) (5)
Cuspidaria rostrata (Spengler, 1793) (3, 4, 5)

Cardiomya A. Adams, 1864

Cardiomya costellata (Deshayes, 1835) (3, 4, 5)
Cardiomya striolata (Locard, 1898) (5)

Scaphopoda

Dentaliidae

Dentalium (Antalis) H. Adams & A. Adams, 1854

Dentalium (Antalis) agile M. Sars in G.O. Sars, 1872 (3, 4, 5)
Dentalium (Antalis) dentalis Linné, 1758 (3, 4, 5)
Dentalium (Antalis) inaequicostatum Dautzenberg, 1891 (3, 4, 5)
Dentalium (Antalis) panormum Chenu, 1842 (3, 4)
Dentalium (Antalis) vulgare Da Costa, 1778 (3, 4, 5)

Fustiaria Stoliczka, 1868

Fustiaria filum (G.B. Sowerby II, 1860) (3?)
Fustiaria rubescens (Deshayes, 1826) (3, 4, 5)

Siphonodentaliidae

Cadulus (Cadulus) Philippi, 1844

Cadulus (Cadulus) ovulum (Philippi, 1844) (3, 4)

Cadulus (Dischides) Jeffreys, 1867

Cadulus (Dischides) politus (S. Wood, 1842) (3, 4, 5)

Cadulus (Gadila) J. E. Gray, 1847

Cadulus (Gadila) jeffreysi (Monterosato, 1845) (3, 4)
Cadulus (Gadila) subfusiformis (M. Sars, 1865) (3, 4)

Entalina Monterosato, 1872

Entalina tetragona (Brocchi, 1814) (3, 4, 5)

Pulsellum Stoliczka, 1868

Pulsellum lofotense (M. Sars, 1865) (3, 4, 5)

Cephalopoda

Sepiidae

Sepia Linnaeus, 1758

Sepia elegans Blainville, 1827 (3, 4, 5)

Sepia officinalis Linnaeus, 1758 (3, 4, 5)

Sepia orbignyana Férussac, 1826 (3, 4, 5)

Sepiolidae

Sepiola Leach, 1817

Sepiola affinis Naef, 1912 (3, 4, 5)

Sepiola aurantiaca Jatta, 1896 (3)

Sepiola intermedia Naef, 1912 (3, 4, 5)

Sepiola ligulata Naef, 1912 (3, 4, 5)

Sepiola robusta Naef, 1912 (3, 4, 5)

Sepiola rondeletii Leach, 1817 (3, 4, 5)

Sepiola steenstrupiana Levy, 1912 (3, 5)

Sepietta Naef, 1912

Sepietta neglecta Naef, 1916 (3, 4, 5)

Sepietta obscura Naef, 1916 (3, 4, 5)

Sepietta oweniana (d'Orbigny, 1841) (3, 4, 5)

Rondeletiola Naef, 1921

Rondeletiola minor (Naef, 1912) (3, 4, 5)

Heteroteuthis Gray, 1849

Heteroteuthis atlantis G.L. Voss, 1955 (5) (*)

Heteroteuthis dispar (Rüppell, 1844) (3, 4, 5)

Stoloteuthis Verrill, 1881

Stoloteuthis leucoptera (Verrill, 1878) (3)

Rossia Owen, 1835

Rossia macrosoma (Delle Chiaje, 1830) (3, 4, 5)

Neorossia Boletzky, 1971

Neorossia caroli (Joubin, 1902) (3, 4, 5)

Note

Heteroteuthis atlantis: Nesis (1987) mette in dubbio la validità di questa specie e considerare H. atlantis sinonimo di H. dispar.

Loliginidae

Loligo Lamarck, 1798

Loligo forbesii Steenstrup, 1856 (3, 4, 5)

Loligo vulgaris Lamarck, 1798 (3, 4, 5)

Alloteuthis Wülker, 1920

Alloteuthis media (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Alloteuthis subulata (Lamarck, 1798) (3, 4, 5)

Chtenopterygidae

Chtenopteryx Appellöf, 1890

Chtenopteryx sicula (Verany, 1851) (3, 5)

Thysanoteuthidae

Thysanoteuthis Troschel, 1857

Thysanoteuthis rhombus Troschel, 1857 (3, 5)

Brachioteuthidae

Brachioteuthis Verrill, 1881

Brachioteuthis riisei (Steenstrup, 1882) (3, 4, 5)

Pyroteuthidae

Pyroteuthis Hoyle, 1904

Pyroteuthis margaritifera (Rüppell, 1844) (3, 5)

Pterygioteuthis H. Fischer, 1895

Pterygioteuthis giardi H. Fischer, 1895 (3, 5)

Enoploteuthidae

Abralia Gray, 1849

Abralia verany (Rüppell, 1844) (3, 4, 5)

Abraliopsis Joubin, 1896

Abraliopsis morisii (Verany, 1839) (3, 5)

Onychoteuthidae

Onychoteuthis Lichtenstein, 1818

Onychoteuthis banksii (Leach, 1817) (3, 4?, 5)

Ancistroteuthis Gray, 1849

Ancistroteuthis lichtensteinii (Férussac, 1835) (3, 4, 5)

Chaunoteuthis Appellöf, 1891

Chaunoteuthis mollis Appellöf, 1891 (3, 5) (*)

Note

Chaunoteuthis mollis: Specie di dubbia validità.

Ommastrephidae

Ommastrephes d'Orbigny, 1835

Ommastrephes bartramii (Lesueur, 1821) (3, 4, 5)

Illex Steenstrup, 1880

Illex coindetii (Verany, 1839) (3, 4, 5)

Todaropsis Girard, 1890

Todaropsis eblanae (Ball, 1841) (3, 4, 5)

Todarodes Steenstrup, 1880

Todarodes sagittatus (Lamarck, 1798) (3, 4, 5)

Bathyteuthidae

Bathyteuthis Hoyle, 1885

Bathyteuthis abyssicola Hoyle, 1885 (5)

Histioteuthidae

Histioteuthis d'Orbigny, 1841

Histioteuthis bonnellii (Férussac, 1835) (3, 4, 5)

Histioteuthis elongata (N.A. Voss & G.L. Voss, 1962) (3) (*)

Histioteuthis reversa (Verrill, 1880) (3, 4, 5)

Note

Histioteuthis elongata: Specie di dubbia validità.

Ancistrocheiridae

Ancistrocheirus Gray, 1849

Ancistrocheirus lesueurii (d'Orbigny, 1842) (3, 5)

Octopoteuthidae

Octopoteuthis Rüppell, 1844

Octopoteuthis sricula Rüppell, 1844 (3, 5)

Cycloteuthidae

Cycloteuthis Joubin, 1919

Cycloteuthis sirventi Joubin, 1919 (3, 5)

Chiroteuthidae

Chiroteuthis d'Orbigny, 1839

Chiroteuthis veranii (Férussac, 1835) (3, 4, 5)

Cranchiidae

Galiteuthis Joubin, 1898

Galiteuthis armata Joubin, 1898 (3, 5)

Octopodidae

Octopus Cuvier, 1797

Octopus defilippi Verany, 1851 (3, 5)

Octopus macropus Risso, 1826 (3, 4, 5)

Octopus salutii Verany, 1839 (3, 4, 5)

Octopus vulgaris Cuvier, 1797 (3, 4, 5)

Scaevurgus Troschel, 1857

Scaevurgus unicirrhus (Delle Chiaje, 1841) (3, 4, 5)

Pteroctopus P. Fischer, 1882

Pteroctopus tetracirrhus (Delle Chiaje, 1830) (3, 4, 5)

Eledone Leach, 1817

Eledone cirrhosa (Lamarck, 1798) (3, 4, 5)

Eledone moschata (Lamarck, 1798) (3, 4, 5)

Bathypolypus Grimpe, 1921

Bathypolypus sponsalis (P. Fischer & H. Fischer, 1892) (3, 5)

Tremoctopodidae

Tremoctopus Delle Chiaje, 1830

Tremoctopus violaceus Delle Chiaje, 1830 (3, 4, 5)

Ocythoidae

Ocythoe Rafinesque, 1814

Ocythoe tuberculata Rafinesque, 1814 (3, 4, 5)

Argonautidae

Argonauta Linnaeus, 1758

Argonauta argo Linnaeus, 1758 (3, 4, 5)

Annelida

Polychaeta

Orbiniidae

Naineris Blainville, 1828

Naineris laevigata (Grube, 1855) (3, 4, 5)

Orbinia Quatrefages, 1865

Orbinia cuvieri (Audouin & Milne-Edwards, 1833) (3, 4, 5)

Orbinia latreillii (Audouin & Milne-Edwards, 1833) (3) (*)

Phylo Kinberg, 1866

Phylo foetida (Claparède, 1870) (3, 4, 5)

Phylo grubei Mc Intosh, 1910 (4?) (*)

Phylo kupfferi (Ehlers, 1874) (4, 5)

Phylo ligustica (Orlandi, 1896) (3, 5)

Phylo norvegica (M. Sars, 1872) (3, 4, 5)

Scolaricia Eisig, 1914

Scolaricia typica Eisig, 1914 (3, 4, 5)

Scoloplos Blainville, 1828

Scoloplos armiger (O.F. Müller, 1776) (3, 4) (*)

Protoaricia Czerniavsky, 1881

Protoaricia oerstedii (Claparède, 1864) (3, 4, 5)

Schroederella Laubier, 1962

Schroederella laubieri Badalamenti & Castelli, 1990 (3, 5) (E)

Note

Orbinia: Le specie di questo genere sono state tradizionalmente attribuite a Aricia Savigny, 1820.

Orbinia latreillii: Presente in Italia solo nel Golfo di Napoli.

Phylo: Le specie di questo genere vengono tradizionalmente attribuite a Aricia Savigny, 1820.

Phylo grubei: Presente solo nel Medio Adriatico, intorno al confine dell'area presa in esame; la sua effettiva presenza nei mari italiani è pertanto dubbia.

Scoloplos armiger: Specie di dubbia presenza nei mari italiani; spesso è stata confusa con *Scolaricia typica*.

Apistobrachidae

Apistobrachus Levinsen, 1883

Apistobrachus tullbergi (Theel, 1879) (4) (*)

Note

Apistobrachus tullbergi: Presente in Italia solo nel Medio Adriatico.

Spionidae

Aonides Claparède, 1864

Aonides oxycephala (M. Sars, 1862) (3, 4, 5)

Aonides paucibranchiata Southern, 1914 (3, 5)

Boccardia Carazzi, 1895

Boccardia polybranchia (Haswell, 1885) (4, 5)

Dispio Hartman, 1951

Dispio uncinata Hartman, 1951 (3)

Laonice Malmgren, 1867

Laonice cirrata (M. Sars, 1851) (3, 4, 5)

Malacoceros Quatrefages, 1843

Malacoceros fuliginosus (Claparède, 1870) (3, 4, 5)

Malacoceros girardi Quatrefages, 1843 (3, 4, 5)

Malacoceros tetracerus (Schmarda, 1861) (3?) (*)

Microspio Mesnil, 1896

Microspio mecznikovianus (Claparède, 1869) (3, 4, 5)

Paraprionospio Caullery, 1914

Paraprionospio pinnata (Ehlers, 1901) (3, 4, 5)

Polydora Bosc, 1802

Polydora armata Langerhans, 1880 (3, 4, 5)

Polydora caeca (Oersted, 1843) (3)

Polydora caulleryi Mesnil, 1897 (3) (*)

Polydora ciliata (Johnston, 1838) (3, 4, 5)

Polydora flava Claparède, 1870 (3, 4)

Polydora hoplura Claparède, 1870 (3, 4)

Polydora quadrilobata Jacobi, 1883 (4)

Prionospio (Apoprionospio) Foster, 1971

Prionospio (Apoprionospio) pygmaea Hartman, 1955 (3) (*)

Prionospio (Aquilaspio) Foster, 1971

Prionospio (Aquilaspio) sexoculata Augener, 1918 (3) (*)

Prionospio (Minuspio) Foster, 1971

Prionospio (Minuspio) cirrifera Wiren, 1883 (3, 4, 5)

Prionospio (Minuspio) multibranchiata Berkeley, 1926 (3, 4)

Prionospio (Prionospio) Malmgren, 1867

Prionospio (Prionospio) banyulensis Laubier, 1966 (4) (*)

Prionospio (Prionospio) caspersi Laubier, 1962 (3, 4)
Prionospio (Prionospio) ehlersi Fauvel, 1928 (3, 4, 5)
Prionospio (Prionospio) malmgreni Claparède, 1870 (3, 4, 5)
Prionospio (Prionospio) steenstrupi Malmgren, 1867 (3, 4, 5)

Pseudopolydora Czerniavsky, 1881

Pseudopolydora antennata (Claparède, 1870) (3, 4, 5)

Pygospio Claparède, 1863

Pygospio elegans Claparède, 1863 (3, 4, 5)

Scoelelepis Blainville, 1828

Scoelelepis bonnieri (Mesnil, 1896) (3)
Scoelelepis cantabra (Rioja, 1918) (3, 4, 5)
Scoelelepis foliosa (Audouin & Milne-Edwards, 1833) (3)
Scoelelepis mesnili Bellan & Lagardère, 1972 (3) (*)
Scoelelepis squamata (O.F. Müller, 1789) (3, 4)
Scoelelepis tridentata (Southern, 1914) (3, 4, 5)

Spio Fabricius, 1785

Spio decoratus Bobretzky, 1870 (3, 4, 5)
Spio filicornis (O.F. Müller, 1766) (3, 4, 5)
Spio multioculata (Rioja, 1918) (3, 4, 5)

Spiophanes Grube, 1860

Spiophanes bombyx (Claparède, 1870) (3, 4, 5)
Spiophanes kroyeri Grube, 1860
 Spiophanes kroyeri kroyeri Grube, 1860 (3, 4)
 Spiophanes kroyeri reyssi Laubier, 1961 (3, 4, 5)
Spiophanes wigleyi Pettibone, 1962 (3, 5)

Streblospio Webster, 1879

Streblospio shrubsolii (Buchanan, 1890) (3, 4, 5)

Note

Malacoceros: Le specie appartenenti a questo genere vengono tradizionalmente attribuite a *Scoelelepis* Blainville, 1828.

Malacoceros tetracerus: Specie di dubbia presenza nei mari italiani, segnalata solo una volta lungo le coste toscane.

Paraprionospio: Le specie di questo genere vengono tradizionalmente attribuite a *Prionospio* Malmgren, 1867.

Polydora caulleryi: Presente in Italia solo lungo le coste del Lazio.

Prionospio (Apoprionospio) pygmaea: Presente in Italia solo nella Baia di Porto Pozzo (Sardegna Settentrionale).

Prionospio (Aquilaspio) sexoculata: Specie di dubbia presenza nei mari italiani; probabilmente gli esemplari attribuiti ad essa appartengono ad una specie non descritta.

Prionospio (Prionospio) banyulensis: Presente in Italia solo nel Medio Adriatico.

Pseudopolydora: Le specie di questo genere vengono tradizionalmente attribuite a *Polydora* Bosc, 1802.

Scoletepis mesnili: Presente in Italia solo lungo le coste toscane.

Magelonidae

Magelona F. Müller, 1858

Magelona alleni Wilson, 1958 (3, 4)

Magelona filiformis Wilson, 1959 (3?) (*)

Magelona minuta Eliason, 1962 (3, 4)

Magelona papillicornis F. Müller, 1858 (3, 4)

Magelona rosea Moore, 1907 (3, 4)

Note

Magelona filiformis: Specie di dubbia presenza nei mari italiani, segnalata solo una volta sui fondali dell'Arcipelago Toscano.

Poecilochaetidae

Poecilochaetus Claparède, 1875

Poecilochaetus fauchaldi Pilato & Cantone, 1976 (3, 4, 5)

Poecilochaetus fulgoris Claparède, 1875 (3) (*)

Poecilochaetus serpens Allen, 1904 (3, 4, 5)

Note

Poecilochaetus fulgoris: Presente nell'area presa in esame solo nella Corsica Orientale.

Heterospionidae

Heterospio Ehlers, 1874

Heterospio mediterranea Laubier, Picard & Ramos, 1972 (3) (*)

Note

Heterospio mediterranea: Presente in Italia solo sui fondali dell'Arcipelago Toscano.

Chaetopteridae

Chaetopterus Cuvier, 1827

Chaetopterus variopedatus (Renier, 1804) (3, 4)

Mesochaetopterus Potts, 1914

Mesochaetopterus sagittarius (Claparède, 1870) (3, 4)

Phyllochaetopterus Grube, 1863

Phyllochaetopterus gracilis Grube, 1863 (4)

Phyllochaetopterus major Claparède, 1868 (3)

Phyllochaetopterus socialis Claparède, 1868 (3, 5)

Phyllochaetopterus solitarius Rioja, 1917 (3)

Spiochaetopterus M. Sars, 1853

Spiochaetopterus costarum (Claparède, 1868) (3, 4, 5)

Paraonidae

Aedicira Hartman, 1957

Aedicira mediterranea Laubier & Ramos, 1974 (3, 4, 5)

***Aricidea* (*Acmira*)** Hartley, 1981

Aricidea (*Acmira*) *assimilis* Tebble, 1959 (3, 4, 5)

Aricidea (*Acmira*) *catherinae* Laubier, 1967 (3, 4, 5)

Aricidea (*Acmira*) *cerrutii* Laubier, 1966 (3, 4, 5)

Aricidea (*Acmira*) *simonae* Laubier & Ramos, 1974 (3, 4, 5)

***Aricidea* (*Allia*)** Strelzov, 1973

Aricidea (*Allia*) *claudiae* Laubier, 1967 (3, 4)

Aricidea (*Allia*) *mariannae* Katzmann & Laubier, 1975 (4) (E)

Aricidea (*Allia*) *monicae* Laubier, 1967 (3, 4)

Aricidea (*Allia*) *pseudannae* Katzmann & Laubier, 1975 (4) (E)

Aricidea (*Allia*) *quadrilobata* Webster & Benedict, 1887 (4)

Aricidea (*Allia*) *suecica* Eliason, 1920

Aricidea (*Allia*) *suecica meridionalis* Laubier & Ramos, 1974 (3)

Aricidea (Aricidea) Webster, 1879

Aricidea (Aricidea) capensis Day, 1961

Aricidea (Aricidea) capensis bansei Laubier & Ramos, 1974 (3, 4, 5)

Aricidea (Aricidea) fragilis Webster, 1879

Aricidea (Aricidea) fragilis mediterranea Laubier & Ramos, 1974 (3, 4, 5)

Aricidea (Aricidea) wassi Pettibone, 1965 (4)

Cirrophorus Ehlers, 1908

Cirrophorus branchiatus Ehlers, 1908 (3, 4, 5)

Cirrophorus furcatus (Hartman, 1957) (3, 4, 5) (*)

Levinsenia Mesnil, 1897

Levinsenia gracilis (Tauber, 1879) (3, 4, 5)

Levinsenia oculata (Hartman, 1957) (3, 4, 5) (*)

Paradoneis Hartman, 1965

Paradoneis armata Glémarec, 1966 (3, 4, 5)

Paradoneis drachi Laubier & Ramos, 1974 (4, 5)

Paradoneis ilvana Castelli, 1985 (3, 5)

Paradoneis lyra (Southern, 1914) (3, 4, 5)

Paraonides Cerruti, 1909

Paraonides myriamae Katzmann & Laubier, 1975 (4) (E)

Paraonides neapolitana (Cerruti, 1909) (3, 4, 5) (*)

Paraonis Cerruti, 1909

Paraonis fulgens (Levinsen, 1883) (3, 5)

Note

Cirrophorus furcatus: Specie di dubbia presenza nei mari italiani; probabilmente gli esemplari attribuiti ad essa appartengono ad una specie non descritta.

Levinsenia: Le specie di questo genere vengono tradizionalmente attribuite a *Paraonis* Cerruti, 1909.

Levinsenia oculata: Specie di dubbia presenza nei mari italiani; probabilmente gli esemplari attribuiti ad essa appartengono ad una specie non descritta.

Paradoneis: Alcuni autori considerano *Paradoneis* Hartman, 1965, un sinonimo juniore di *Cirrophorus* Ehlers, 1908.

Paraonides: Genere di dubbia validità in relazione alla dubbia validità della specie tipo (vedi nota 041.0.002.0).

Paraonides neapolitana: Specie di dubbia validità; trattandosi della specie tipo del genere *Paraonides* Cerruti, 1909, risulta dubbia anche la validità di tale nome generico, che, in caso di

invalidità, andrebbe rimpiazzato da Paraonella Strelzov, 1973.

Questidae

Questa Hartman, 1966

Questa caudicirra Hartman, 1966 (3) (*)

Note

Questa caudicirra: Presente in Italia solo lungo le coste settentrionali del Lazio.

Cirratulidae

Aphelochaeta Blake, 1991

Aphelochaeta marioni (Saint-Joseph, 1894) (3, 4, 5)

Aphelochaeta multibranchiis (Grube, 1863) (4, 5)

Caulleriella Chamberlin, 1919

Caulleriella alata (Southern, 1914) (3, 5)

Caulleriella bioculata (Keferstein, 1862) (3, 4, 5)

Caulleriella caputesocis (Saint-Joseph, 1894) (3, 4, 5)

Caulleriella zetlandica (Mc Intosh, 1911) (3, 4)

Chaetozone Malmgren, 1867

Chaetozone setosa Malmgren, 1867 (3, 4, 5)

Cirratulus Lamarck, 1801

Cirratulus chrysoderma Claparède, 1870 (3, 5)

Cirratulus cirratus (O.F. Müller, 1776) (3, 4, 5)

Cirriformia Hartman, 1936

Cirriformia filigera (Delle Chiaje, 1808) (3, 4)

Cirriformia tentaculata (Montagu, 1808) (3, 4, 5)

Dodecaceria Oersted, 1843

Dodecaceria concharum Oersted, 1843 (3, 4, 5)

Monticellina Laubier, 1961

Monticellina dorsobranchialis (Kirkegaard, 1959) (3, 4, 5)

Tharyx Webster & Benedict, 1887

Tharyx killariensis (Southern, 1914) (3, 4)

Ctenodrilidae

Ctenodrilus Claparède, 1863

Ctenodrilus serratus (Schmidt, 1857) (3, 4)

Raphidrilus Monticelli, 1910

Raphidrilus nemasoma Monticelli, 1910 (3, 4)

Cossuridae

Cossura Webster & Benedict, 1887

Cossura soyeri Laubier, 1962 (3, 4)

Capitellidae

Capitella Blainville, 1828

Capitella capitata (Fabricius, 1780) (3, 4, 5)

Capitella giardi (Mesnil, 1897) (3?) (*)

Capitomastus Eisig, 1887

Capitomastus minimus (Langerhans, 1880) (3, 4, 5)

Dasybranchus Grube, 1850

Dasybranchus caducus (Grube, 1846) (3, 4, 5)

Dasybranchus gajolae Eisig, 1887 (3, 4, 5)

Heteromastus Eisig, 1887

Heteromastus filiformis (Claparède, 1864) (3, 4, 5)

Leiocapitella Hartman, 1947

Leiocapitella dollfusi (Fauvel, 1936) (3, 5)

Mastobranthus Eisig, 1887

Mastobranthus trinchessii Eisig, 1887 (3, 5)

Mediomastus Hartman, 1944

Mediomastus capensis Day, 1961 (3, 4, 5)

Mediomastus fragilis Rasmussen, 1973 (3)

Neopseudocapitella Rullier & Amoureux, 1979

Neopseudocapitella brasiliensis Rullier & Amoureux, 1979 (4) (*)

Notomastus M. Sars, 1850

Notomastus aberrans Day, 1963 (3, 4)

Notomastus formianus Eisig, 1887 (3)

Notomastus latericeus M. Sars, 1851 (3, 4, 5)

Notomastus lineatus Claparède, 1868 (3)

Notomastus profundus Eisig, 1887 (3, 4)

Peresiella Harmelin, 1968

Peresiella clymenoides Harmelin, 1968 (3)

Pseudocapitella Fauvel, 1913

Pseudocapitella incerta Fauvel, 1913 (3, 5)

Pseudoleiocapitella Harmelin, 1964

Pseudoleiocapitella fauveli Harmelin, 1964 (3, 4, 5)

Note

Capitella: Alcune specie vengono tradizionalmente attribuite a *Capitellides* Mesnil, 1897.

Capitella giardi: Specie di dubbia presenza nei mari italiani, segnalata solo nel porto di Palermo.

Neopseudocapitella brasiliensis: Presente nell'area presa in esame solo presso Rovigno.

Arenicolidae

Abarenicola Wells, 1959

Abarenicola affinis (Ashworth, 1909)

Abarenicola affinis africana Wells, 1963 (5)

Abarenicola claparedii (Levinsen, 1884) (3, 4) (*)

Arenicola Lamarck, 1801

Arenicola cristata Stimpson, 1856 (3) (*)

Arenicola marina (Linnaeus, 1758) (4)

Arenicolides Mesnil, 1898

Arenicolides grubii (Claparède, 1870) (3, 4)

Branchiomaldane Langerhans, 1881

Branchiomaldane vincenti Langerhans, 1881 (3, 5)

Note

Abarenicola claparedii: Presente in Italia solo lungo le coste orientali della Sicilia.

Arenicola cristata: Presente in Italia solo nel Golfo di Trieste.

Maldanidae

Axiothella Verrill, 1900

Axiothella constricta (Claparède, 1870) (3, 4, 5)

Clymenura Verrill, 1900

Clymenura clypeata (Saint-Joseph, 1894) (3, 4, 5)

Euclymene Verrill, 1900

Euclymene collaris (Claparède, 1868) (3, 4)

Euclymene lumbricoides (Quatrefages, 1865) (3, 4, 5)

Euclymene oerstedii (Claparède, 1863) (3, 4, 5)

Euclymene palermitana (Grube, 1840) (3, 4, 5)

Euclymene santanderensis (Rioja, 1917) (3, 4)

Praxillella Verrill, 1881

Praxillella affinis (M. Sars, 1872) (3, 4, 5)

Praxillella gracilis (M. Sars, 1861) (3, 4, 5)

Praxillella lophoseta (Orlandi, 1898) (3, 4)

Praxillella praetermissa (Malmgren, 1865) (3, 4, 5)

Lumbriclymene M. Sars, 1872

Lumbriclymene minor Ardwisson, 1906 (3)

Chirimia Light, 1991

Chirimia biceps (M. Sars, 1861) (3, 4)

Maldane Grube, 1860

Maldane glebifex Grube, 1860 (3, 4)

Maldane sarsi Malmgren, 1865 (3, 4)

Metasychis Light, 1991

Metasychis gotoi (Izuka, 1902) (3, 4)

Nichomache Malmgren, 1865

Nichomache lumbricalis (Fabricius, 1780) (3)

Nichomache trispinata Ardwisson, 1907 (3) (*)

Petaloproctus Quatrefages, 1865

Petaloproctus terricolus Quatrefages, 1865 (3, 4)

Rhodine Malmgren, 1865

Rhodine gracilior Tauber, 1879 (3)

Note

Clymenura: Le specie di questo genere vengono tradizionalmente attribuite a Leiochone Saint-Joseph, 1894.

Chirimia: Le specie di questo genere vengono tradizionalmente attribuite a Asychis Kinberg, 1867.

Metasychis: Le specie di questo genere vengono tradizionalmente attribuite a Asychis Kinberg, 1867.

Nichomache trispinata: Presente in Italia solo lungo le coste dell'Arcipelago Toscano.

Opheliidae

Armandia Philippi, 1861

Armandia cirrhosa Philippi, 1865 (3, 4)

Armandia polyophthalma Kükenthal, 1887 (3, 4, 5)

Ophelia Savigny, 1818

Ophelia barquii Fauvel, 1917 (5)
Ophelia bicornis Savigny, 1818 (3, 4, 5)
Ophelia radiata (Delle Chaje, 1828) (3, 4, 5)

Ophelina Oersted, 1843

Ophelina abranchiata Stop-Bowitz, 1948 (4) (*)
Ophelina aulogaster (Rathke, 1843) (3, 5)
Ophelina cylindricaudata (Hansen, 1878) (4) (*)
Ophelina modesta (Stop-Bowitz, 1958) (4) (*)
Ophelina norvegica (Stop-Bowitz, 1945) (4) (*)

Polyophthalmus Quatrefages, 1850

Polyophthalmus pictus (Dujardin, 1839) (3, 4, 5)

Pseudophelia Katzmann, 1973

Pseudophelia translucens Katzmann, 1973 (4) (E) (*)

Tachytrypane Mc Intosh, 1878

Tachytrypane jeffreysii Mc Intosh, 1878 (4)

Note

Ophelina abranchiata: Presente in Italia solo nel Medio Adriatico.
Ophelina cylindricaudata: Presente in Italia solo nel Medio Adriatico.
Ophelina modesta: Presente in Italia solo nel Medio Adriatico.
Ophelina norvegica: Presente in Italia solo nel Medio Adriatico.
Pseudophelia translucens: Presente in Italia solo nel Medio Adriatico.

Scalibregmatidae

Asclerocheilus Ashworth, 1901

Asclerocheilus intermedius (Saint-Joseph, 1894) (4)

Hyboscolex Schmarda, 1861

Hyboscolex longiseta Schmarda, 1861 (3, 4)

Polyphysia Quatrefages, 1865

Polyphysia crassa (Oersted, 1843) (3, 4, 5) (*)

Scalibregma Rathke, 1843

Scalibregma inflatum Rathke, 1843 (3, 4, 5)

Sclerocheilus Grube, 1863

Sclerocheilus minutus Grube, 1863 (4)

Note

Polyphysia: Le specie di questo genere sono state precedentemente attribuite al genere *Lipobranchius* Cunningham & Ramage, 1888.

Polyphysia crassa: Gli esemplari di *P. crassa* presenti nei mari italiani sono stati precedentemente attribuiti alla specie *Lipobranchius jeffreysii* (Mc Intosh, 1879).

Phyllodocidae

Eteone Savigny, 1818

Eteone flava (Fabricius, 1780) (3) (*)

Eteone foliosa Quatrefages, 1865 (3) (*)

Eteone lactea Claparède, 1868 (3, 4)

Eteone longa (Fabricius, 1780) (3, 4, 5)

Eulalia Savigny, 1818

Eulalia rubiginosa Saint-Joseph, 1888 (3)

Eulalia trilineata Saint-Joseph, 1888 (3, 5)

Eulalia tripunctata Mc Intosh, 1874 (3) (*)

Eulalia venustissima Banse, 1959 (4)

Eulalia viridis (Linnaeus, 1767) (3, 4, 5)

Eumida Malmgren, 1865

Eumida sanguinea (Oersted, 1843) (3, 4, 5)

Genetyllis Malmgren, 1865

Genetyllis nana (Saint-Joseph, 1906) (3, 5)

Genetyllis rubiginosa (Saint-Joseph, 1888) (3, 4)

Hesionura Hartmann-Schroeder, 1958

Hesionura augeneri (Friedrich, 1937) (3, 4, 5)

Lugia Ehlers, 1864

Lugia pterophora (Ehlers, 1864) (4, 5)

Mysta Malmgren, 1865

- Mysta picta* (Quatrefages, 1865) (3, 4, 5)
Mysta siphonodonta (Delle Chiaje, 1822) (3, 4, 5)

Mystides Theel, 1879

- Mystides borealis* Theel, 1879 (3, 4)
Mystides elongata Southern, 1914 (5)
Mystides limbata Saint-Joseph, 1888 (3, 4, 5)

Nereiphylla Blainville, 1828

- Nereiphylla paretii* Blainville, 1828 (3, 4)

Notophyllum Oersted, 1843

- Notophyllum foliosum* (M. Sars, 1835) (3, 4, 5)

Phyllodoce Savigny, 1818

- Phyllodoce albovittata* Grube, 1860 (3, 4)
Phyllodoce kosteriensis (Malmgren, 1867) (3) (*)
Phyllodoce lamelligera (Linnaeus, 1791) (3, 4, 5)
Phyllodoce laminosa Savigny, 1818 (3, 4, 5)
Phyllodoce lineata (Claparède, 1870) (3, 4, 5)
Phyllodoce macrophthalma Schmarda, 1861 (3, 4)
Phyllodoce maculata (Linnaeus, 1767) (5)
Phyllodoce madeirensis (Langerhans, 1880) (3, 4, 5)
Phyllodoce mucosa (Oersted, 1843) (3, 4, 5)
Phyllodoce pusilla (Claparède, 1868) (3, 4)
Phyllodoce subulifera Eliason, 1962 (4)
Phyllodoce vittata Ehlers, 1864 (3, 4)

Pirakia Bergström, 1914

- Pirakia punctifera* (Grube, 1860) (3, 4, 5)

Protomystides Czerniavsky, 1885

- Protomystides bidentata* (Langerhans, 1880) (3)

Pterocirrus Claparède, 1868

- Pterocirrus limbatus* (Claparède, 1868) (3, 4, 5)
Pterocirrus macroceros (Grube, 1860) (3, 4, 5)
Pterocirrus microcephalus (Claparède, 1868) (3)

Note

Eteone flava: Presente in Italia solo nell'Arcipelago Toscano.

Eteone foliosa: Presente in Italia solo nel Mar Ligure.

Eulalia tripunctata: Presente in Italia solo nell'Arcipelago Toscano.

Eumida: Le specie di questo genere vengono tradizionalmente attribuite a Eulalia Savigny, 1818.

Genetyllis: Le specie di questo genere vengono tradizionalmente attribuite a Phyllodoce Savigny, 1818.

Mysta: Le specie di questo genere vengono tradizionalmente attribuite a Eteone Savigny, 1818.

Nereiphylla: Le specie di questo genere vengono tradizionalmente attribuite a Phyllodoce Savigny, 1818.

Phyllodoce: Alcune specie di questo genere vengono tradizionalmente attribuite a Paranaitis Southern, 1814.

Phyllodoce kosteriensis: Presente in Italia solo nel Mar Ligure.

Pirakia: Le specie di questo genere vengono tradizionalmente attribuite a Eulalia Savigny, 1818.

Pterocirrus: Le specie di questo genere vengono tradizionalmente attribuite a Eulalia Savigny, 1818 e a Sige Malmgren, 1865.

Alciopidae

Alciopina Claparède & Panceri, 1867

Alciopina parasitica Claparède & Panceri, 1867 (3, 4)

Krohnia Quatrefages, 1865

Krohnia lepidota (Krohn, 1845) (3, 4, 5)

Naiades Delle Chiaje, 1830

Naiades cantrainii Delle Chiaje, 1828 (3, 4, 5)

Plotohormis Chamberlin, 1919

Plotohormis capitata (Greef, 1876) (3, 4)

Rhynchonerella A. Costa, 1862

Rhynchonerella gracilis A. Costa, 1862 (3, 4)

Rhynchonerella petersi (Langerhans, 1880) (3) (*)

Torrea Quatrefages, 1850

Torrea candida (Delle Chiaje, 1828) (3, 4, 5)

Vanadis Claparède, 1870

Vanadis cristallina Greef, 1876 (3, 4, 5)

Vanadis formosa Claparède, 1870 (3, 4)

Note

Rhynchonerella petersi: Presente in Italia solo nel Golfo dell'Asinara.

Lopadorrhynchidae

Lopadorrhynchus Grube, 1855

Lopadorrhynchus brevis Grube, 1855 (3, 4, 5)

Lopadorrhynchus krohnii (Claparède, 1870) (3, 5)

Lopadorrhynchus uncinatus Fauvel, 1915 (4)

Maupasia Viguier, 1886

Maupasia isochaeta (Reibisch, 1895) (3)

Pedinosoma Reibisch, 1895

Pedinosoma curtum Reibisch, 1895 (3)

Pelagobia Greef, 1879

Pelagobia longicirrata Greef, 1879 (3, 4)

Pontodoridae

Pontodora Greef, 1879

Pontodora pelagica Greef, 1879 (3)

Lacydoniidae

Lacydonia Marion & Bobretzky, 1875

Lacydonia miranda Marion & Bobretzky, 1875 (3)

Iospilidae

Iospilus Viguier, 1886

Iospilus phalocroides Viguier, 1886 (3)

Phalocrophorus Greef, 1879

Phalocrophorus pictus Greef, 1879 (3)

Tomopteridae

Enapteris Rosa, 1908

Enapteris euchaeta (Chun, 1887) (3, 4, 5)

Tomopteris Eschscholtz, 1825

Tomopteris apsteini Rosa, 1908 (3, 4, 5)

Tomopteris biancoi Terio, 1947 (3)

Tomopteris cavallii Rosa, 1907 (3, 4)

Tomopteris duccii Rosa, 1907 (3)

Tomopteris dunckeri Rosa, 1908 (5)

Tomopteris elegans Chun, 1888 (3, 4, 5)

Tomopteris helgolandica Greef, 1879 (4, 5)

Tomopteris ligulata Rosa, 1908 (3, 4, 5)

Tomopteris marginata Caroli, 1932 (3)

Tomopteris miriaglandulata Terio, 1947 (5)

Tomopteris partenopea Caroli, 1928 (3, 5)

Tomopteris pediculosa Terio, 1947 (3)

Tomopteris pierantonii Terio, 1947 (3)

Tomopteris planktonis Apstein, 1900 (3, 4, 5)

Tomopteris poliglandulata Caroli, 1932 (3, 4)

Tomopteris septentrionalis Quatrefages, 1866 (3, 4, 5)

Typhloscolecidae

Sagitella Wagner, 1872

Sagitella kowalewskyi Wagner, 1872 (4)

Travisiopsis Levinsen, 1885

Travisiopsis lanceolata Southern, 1910 (4)

Typhloscolex Busch, 1851

Typhloscolex muelleri Busch, 1851 (3, 4)

Glyceridae

Glycera Savigny, 1818

*Glycer*a *alba* (O.F. Müller, 1776) (3, 4, 5)

*Glycer*a *capitata* Oersted, 1843 (3, 4, 5)

*Glycer*a *celtica* O'Connor, 1987 (3)

*Glycer*a *gigantea* Quatrefages, 1865 (3, 4, 5)

*Glycer*a *lapidum* Quatrefages, 1865 (3, 4, 5)

*Glycer*a *oxycephala* Ehlers, 1887 (3)

*Glycer*a *rouxii* Audouin & Milne-Edwards, 1833 (3, 4, 5)

*Glycer*a *tesselata* Grube, 1863

*Glycer*a *tesselata tessellata* Grube, 1863 (3, 5)

*Glycer*a *tesselata minor* La Greca, 1946 (3, 5)

*Glycer*a *tridactyla* Schmarda, 1861 (3, 4, 5)

*Glycer*a *unicornis* Savigny, 1818 (3, 4, 5)

Goniadidae

Glycinde F. Müller, 1858

Glycinde nordmanni (Malmgren, 1866) (3, 4, 5)

Goniada Audouin & Milne-Edwards, 1833

Goniada emerita Audouin & Milne-Edwards, 1833 (3, 4, 5)

Goniada maculata Oersted, 1843 (3, 4, 5)

Goniada norvegica Oersted, 1844 (4, 5)

Sphaerodoridae

Clavodorum Hartman & Fauchald, 1971

Clavodorum adriaticum (Katzmann, 1973) (4) (E) (*)

Sphaerodoropsis Hartmann & Fauchald, 1971

Sphaerodoropsis balticum (Reimers, 1933) (4) (*)

Sphaerodoropsis longiparapodium Katzmann, 1973 (4) (E) (*)

Sphaerodoropsis minutum (Webster & Benedict, 1887) (4) (*)

Sphaerodoropsis philippi (Fauvel, 1911) (4) (*)

Sphaerodoropsis sphaerulifer (Moore, 1911) (3) (*)

Sphaerodorum Oersted, 1843

Sphaerodorum gracilis (Rathke, 1843) (3, 4)

Note

Clavodorum: Le specie di questo genere vengono tradizionalmente attribuite a *Sphaerodoridium* Lützen, 1961.

Clavodorum adriaticum: Presente in Italia solo nel Medio Adriatico.

Sphaerodoropsis: Le specie appartenenti a questo genere vengono tradizionalmente attribuite a *Sphaerodoridium* Lützen, 1961.

Sphaerodoropsis balticum: Presente in Italia solo nel Medio Adriatico.

Sphaerodoropsis longiparapodium: Presente in Italia solo nel Medio Adriatico.

Sphaerodoropsis minutum: Presente in Italia solo nel Medio Adriatico.

Sphaerodoropsis philippi: Presente in Italia solo nel Medio Adriatico.

Sphaerodoropsis sphaerulifer: Presente in Italia solo nel Golfo di Napoli.

Hesionidae

Amphiduros Hartman, 1959

Amphiduros fucescens (Marenzeller, 1875) (4, 5)

Gyptis Marion & Bobretzky, 1875

Gyptis arenicola (La Greca, 1946) (3) (E) (*)

Gyptis mediterranea Pleijel, 1993 (5) (*)

Gyptis propinqua Marion & Bobretzky, 1875 (3, 4, 5) (*)

Hesione Savigny, 1818

Hesione splendida Savigny, 1818 (3, 4, 5)

Hesionides Friedrich, 1937

Hesionides arenaria Friedrich, 1937 (3, 5)

Hesionides gohari Hartmann-Schroeder, 1960 (3, 5)

Hesiospina Imajima & Hartman, 1964

Hesiospina similis (Hessle, 1925) (3) (*)

Kefersteinia Quatrefages, 1865

Kefersteinia cirrata (Keferstein, 1862) (3, 4, 5)

Leocrates Kinberg, 1866

Leocrates atlanticus (Mc Intosh, 1885) (3, 5)

Leocrates chinensis Kinberg, 1866 (3, 4, 5)

Microphthalmus Mecznirow, 1865

Microphthalmus aberrans (Webster & Benedict, 1887) (3, 4)

Microphthalmus fragilis Bobretzky, 1870 (3)

Microphthalmus similis Bobretzky, 1870 (3, 4, 5)

Microphthalmus tyrrhenicus Zunarelli Vandini, 1967 (3) (E)

Nereimyra Blainville, 1828

Nereimyra punctata (O.F. Müller, 1776) (3)

Ophiodromus M. Sars, 1862

Ophiodromus agilis (Ehlers, 1864) (3, 4, 5)

Ophiodromus flexuosus (Delle Chiaje, 1825) (3, 4, 5)

Ophiodromus pallidus (Claparède, 1864) (3, 4, 5)

Orseis Ehlers, 1864

Orseis pulla Ehlers, 1864 (4, 5)

Periboea Ehlers, 1864

Periboea longocirrata Ehlers, 1864 (3?, 4) (*)

Podarkeopsis Laubier, 1961

Podarkeopsis capensis (Day, 1963) (3, 4, 5)

Syllidia Quatrefages, 1865

Syllidia armata Quatrefages, 1865 (3, 4, 5)

Note

Gyptis arenicola: Presente in Italia solo nel Golfo di Napoli.

Gyptis mediterranea: Presente in Italia solo lungo le coste orientali siciliane.

Gyptis propinqua: Nella bibliografia recente gli esemplari italiani appartenenti a questa specie sono stati attribuiti a *G. rosea* (Malmgren, 1874) di cui *G. propinqua* era considerata sinonimo; un recente lavoro di Pleijel (1993) distingue nuovamente le due specie e attribuisce gli esemplari mediterranei a *G. propinqua*.

Hesiospina similis: Presente in Italia solo sui fondali circostanti l'isola di Capraia (LI) nell'Arcipelago Toscano.

Periboea longocirrata: La presenza di questa specie in 3, dove è stata segnalata solo lungo le coste della Sardegna, è dubbia.

Podarkeopsis: Le specie di questo genere vengono tradizionalmente attribuite a Gyptis Marion & Bobretzky, 1875.

Pilargiidae

Ancistargis Jones, 1961

Ancistargis hamata (Hartman, 1969) (3) (*)

Ancystrosyllis Mc Intosh, 1879

Ancystrosyllis groenlandica Mc Intosh, 1879 (3, 4)

Litocorsa Pearson, 1970

Litocorsa stremma Pearson, 1970 (4) (*)

Otopsis Ditlevsen, 1917

Otopsis chardyi Katzmann, Laubier & Ramos, 1974 (4) (E)

Pilargis Saint-Joseph, 1899

Pilargis verrucosa (Saint-Joseph, 1899) (3, 4)

Sigambra F. Müller, 1858

Sigambra tentaculata (Treadwell, 1941) (3, 4, 5)

Synelmis Chamberlin, 1919

Synelmis dineti Katzmann, Laubier & Ramos, 1974 (4) (E)

Note

Ancistargis: Le specie di questo genere vengono tradizionalmente attribuite a *Ancystrosyllis* Mc Intosh, 1879.

Ancistargis hamata: Presente in Italia solo nel Mar Ligure.

Litocorsa stremma: Presente in Italia solo lungo il litorale romagnolo.

Syllidae

Amblyosyllis Grube, 1857

Amblyosyllis dorsigera Claparède, 1864 (3)
Amblyosyllis formosa (Claparède, 1863) (3, 4, 5)

Dioplosyllis Gidholm, 1962

Dioplosyllis cirrosa Gidholm, 1962 (3)

Eusyllis Malmgren, 1867

Eusyllis assimilis Marenzeller, 1875 (3, 4)
Eusyllis blomstrandi Malmgren, 1867 (3, 4)
Eusyllis lamelligera Marion & Bobretzky, 1875 (3, 4, 5)

Odontosyllis Claparède, 1863

Odontosyllis ctenostoma Claparède, 1868 (3, 4)
Odontosyllis dugesiana Claparède, 1864 (3, 5)
Odontosyllis fulgurans (Audouin & Milne-Edwards, 1934) (3, 4, 5)
Odontosyllis gibba Claparède, 1863 (3, 4, 5)

Opisthodonta Langerhans, 1879

Opisthodonta morena Langerhans, 1879 (3)

Palposyllis Hartmann-Schroeder, 1977

Palposyllis prosostoma Hartmann-Schroeder, 1977 (3) (*)

Pionosyllis Malmgren, 1867

Pionosyllis anophthalma Capaccioni & San Martin, 1990 (3, 4)
Pionosyllis divaricata Keferstein, 1862 (3)
Pionosyllis lamelligera Saint-Joseph, 1856 (3)
Pionosyllis longocirrata Saint-Joseph, 1887 (3)
Pionosyllis morenoae San Martin, 1984 (3)
Pionosyllis pulligera Krohn, 1852 (3, 4)
Pionosyllis serrata Southern, 1914 (3, 4)
Pionosyllis weissmanni Langerhans, 1879 (3)

Streptosyllis Webster & Benedict, 1884

Streptosyllis arenae Webster & Benedict, 1884 (3) (*)
Streptosyllis templadoi San Martin, 1984 (5)
Streptosyllis websteri Southern, 1914 (3, 5)

Syllides Oersted, 1845

Syllides convolutus Webster & Benedict, 1884 (3, 5)

Syllides edentatus Westheide, 1974 (3, 5)
Syllides edentulus Claparède, 1868 (3, 4)
Syllides fulvus Marion & Bobretzy, 1875 (3, 4, 5)
Syllides japonicus Imajima, 1966 (3)

Brania Quatrefages, 1865

Brania arminii Langerhans, 1880 (3)
Brania pusilla (Dujardin, 1839) (3, 4, 5)

***Exogone* (*Exogone*)** Oersted, 1845

Exogone (*Exogone*) *brevipes* Claparède, 1864 (3, 4)
Exogone (*Exogone*) *dispar* Webster, 1879 (3, 4, 5)
Exogone (*Exogone*) *naidina* Oersted, 1845 (3, 4, 5)
Exogone (*Exogone*) *rostrata* Naville, 1933 (3)
Exogone (*Exogone*) *verugera* (Claparède, 1868) (3, 4)

***Exogone* (*Parexogone*)** Mesnil & Caullery, 1916

Exogone (*Parexogone*) *cognettii* Castelli, Badalamenti & Lardicci, 1987 (3) (E)
Exogone (*Parexogone*) *gambiae* Lanera, Sordino & San Martin, 1994 (3)
Exogone (*Parexogone*) *meridionalis* Cognetti, 1955 (3, 5)

Grubeosyllis Verrill, 1900

Grubeosyllis alvaradoi (San Martin, 1984) (3)
Grubeosyllis clavata (Claparède, 1863) (3, 4, 5)
Grubeosyllis euritmica (Sardà, 1984) (3) (*)
Grubeosyllis limbata (Claparède, 1868) (3, 4, 5)
Grubeosyllis subterranea (Hartmann-Schroeder, 1956) (3, 5)
Grubeosyllis tenuicirrata (Claparède, 1864) (3, 4)
Grubeosyllis vieitezi (San Martin, 1984) (3)
Grubeosyllis yraidae (San Martin, 1984) (3)

Parapionosyllis Fauvel, 1923

Parapionosyllis brevicirra Day, 1954 (3)
Parapionosyllis elegans (Pierantoni, 1903) (3, 5)
Parapionosyllis gestans (Pierantoni, 1903) (3)
Parapionosyllis labronica Cognetti, 1965 (3, 5)
Parapionosyllis minuta (Pierantoni, 1903) (3, 5)
Parapionosyllis papillosa (Pierantoni, 1903) (3)

***Sphaerosyllis* (*Prosphaerosyllis*)** San Martin, 1984

Sphaerosyllis (*Prosphaerosyllis*) *adela* San Martin, 1984 (3)
Sphaerosyllis (*Prosphaerosyllis*) *brandhorsti* Hartmann-Schroeder, 1965 (3) (*)

- Sphaerosyllis (Prosphaerosyllis) brevicirra* Hartmann-Schroeder, 1960 (3)
Sphaerosyllis (Prosphaerosyllis) brevifrons Webster & Benedict, 1884 (3) (*)
Sphaerosyllis (Prosphaerosyllis) campoyi San Martin, Acero, Contonente & Gomez, 1983
 (3)
Sphaerosyllis (Prosphaerosyllis) tetralix Eliason, 1920 (3, 4, 5)
Sphaerosyllis (Prosphaerosyllis) xarifae Hartmann-Schroeder, 1960 (3, 5)

***Sphaerosyllis (Sphaerosyllis)* Claparède, 1863**

- Sphaerosyllis (Sphaerosyllis) austriaca* Banse, 1959 (3, 5)
Sphaerosyllis (Sphaerosyllis) bulbosa Southern, 1914 (3, 5)
Sphaerosyllis (Sphaerosyllis) clapedii Ehlers, 1864 (3, 4, 5)
Sphaerosyllis (Sphaerosyllis) cryptica Ben-Eliahu, 1977 (3)
Sphaerosyllis (Sphaerosyllis) erinaceus Claparède, 1863 (3, 4)
Sphaerosyllis (Sphaerosyllis) glandulata Perkins, 1981 (3) (*)
Sphaerosyllis (Sphaerosyllis) hystrix Claparède, 1863 (3, 4, 5)
Sphaerosyllis (Sphaerosyllis) ovigera Langerhans, 1879 (4, 5)
Sphaerosyllis (Sphaerosyllis) pirifera Claparède, 1868 (3, 5)
Sphaerosyllis (Sphaerosyllis) piriferopsis Perkins, 1981 (3) (*)
Sphaerosyllis (Sphaerosyllis) taylori Perkins, 1981 (3, 5)
Sphaerosyllis (Sphaerosyllis) thomasi San Martin, 1984 (3, 5)

***Branchiosyllis* Ehlers, 1887**

- Branchiosyllis exilis* (Gravier, 1900) (3, 5)

***Ehlersia* Quatrefages, 1865**

- Ehlersia ferrugina* (Langerhans, 1881) (3, 4, 5)

***Eurysyllis* Ehlers, 1864**

- Eurysyllis tuberculata* Ehlers, 1864 (3, 4, 5)

***Haplosyllis* Langerhans, 1879**

- Haplosyllis spongicola* (Grube, 1855) (3, 4, 5)

***Plakosyllis* Hartmann-Schroeder, 1956**

- Plakosyllis brevipes* Hartmann-Schroeder, 1956 (3, 5)

***Pseudosyllides* Augener, 1927**

- Pseudosyllides balearica* San Martin, 1982 (3, 5)

***Pseudosyllis* Grube, 1863**

Pseudosyllis brevipennis Grube, 1863 (3, 4, 5)

Syllis Savigny, 1818

Syllis alternata (Moore, 1908) (3)
Syllis amica Quatrefages, 1865 (3, 4, 5)
Syllis armillaris O.F. Müller, 1771 (3, 4, 5)
Syllis beneliahuae Campoy & Alquezar, 1982 (3)
Syllis bouvieri Gravier, 1900 (3)
Syllis caeca (Katzmann, 1973) (4)
Syllis cirropunctata Michel, 1909 (3, 4, 5)
Syllis columbretensis Campoy, 1982 (3)
Syllis cornuta Rathke, 1843 (3, 4, 5)
Syllis ferrani Alos & San Martin, 1987 (3) (*)
Syllis garciai Campoy, 1982 (3, 5)
Syllis gerlachi Hartmann-Schroeder, 1960 (3?) (*)
Syllis golfonovoensis (Hartmann-Schroeder, 1962) (3)
Syllis gracilis Grube, 1840 (3, 4, 5)
Syllis krohnii Ehlers, 1864 (3, 4, 5)
Syllis hyalina Grube, 1863 (3, 4, 5)
Syllis lutea (Hartmann-Schroeder, 1960) (3)
Syllis mediterranea Ben-Eliahu, 1977 (3)
Syllis nuchalis Hartmann-Schroeder, 1960 (5?) (*)
Syllis nigricirris Grube, 1863 (4)
Syllis prolifera (Krohn, 1852) (3, 4, 5)
Syllis rosea Langerhans, 1879 (3)
Syllis torquata (Marion & Bobretzky, 1875) (3, 5)
Syllis truncata Haswell, 1920
 Syllis truncata cryptica Ben-Eliahu, 1977 (3, 5)
Syllis variegata Grube, 1860 (3, 4, 5)
Syllis vittata Grube, 1840 (3, 4, 5)
Syllis westheidei San Martin, 1984 (3)
Syllis zonata Haswell, 1883 (3)

Trypanosyllis Claparède, 1864

Trypanosyllis coeliaca Claparède, 1868 (3, 4)
Trypanosyllis rosea (Grube, 1863) (4)
Trypanosyllis zebra (Grube, 1860) (3, 4, 5)

Xenosyllis Marion & Bobretzky, 1875

Xenosyllis scabra (Ehlers, 1864) (3, 4, 5)

Autolytus Grube, 1850

Autolytus benazzii Cognetti, 1953 (3, 4)
Autolytus brachycephalus (Marenzeller, 1874) (4)

Autolytus convolutus Cognetti, 1953 (3)
Autolytus edwardsii Saint-Joseph, 1887 (3, 4)
Autolytus inermis Saint-Joseph, 1887 (3)
Autolytus longeferiens Saint-Joseph, 1887 (3)
Autolytus neapolitanus Cognetti, 1953 (3) (E) (*)
Autolytus prolifer (O.F. Müller, 1788) (3, 4)
Autolytus quindecimdentatus Langerhans, 1884 (3)
Autolytus rubropunctatus (Grube, 1860) (3, 4)

Myrianida Milne-Edwards, 1845

Myrianida pinnigera (Montagu, 1808) (3, 4, 5)

Procerea Ehlers, 1864

Procerea aurantiaca Claparède, 1868 (3, 4)
Procerea macrophthalma Marenzeller, 1875 (3, 4)
Procerea picta Ehlers, 1864 (3, 4, 5)

Procerastea Langerhans, 1884

Procerastea halleziana Malaquin, 1893 (4)
Procerastea nematodes Langerhans, 1884 (4)

Umbellisyllis M. Sars, 1869

Umbellisyllis clavata (Langerhans, 1879) (3, 4, 5)

Note

Palposyllis prosostoma: Presente in Italia solo nella Baia di Carini (Sicilia settentrionale).

Streptosyllis arenae: Presente in Italia solo lungo le coste toscane.

Grubeosyllis: Le specie di questo genere vengono tradizionalmente attribuite a Grubea Quatrefages, 1865 o a Brania Quatrefages, 1865.

Grubeosyllis euritmica: Presente in Italia solo lungo le coste del Lazio.

Sphaerosyllis (Prosphaerosyllis) brandhorsti: Presente in Italia solo lungo le coste del Lazio.

Sphaerosyllis (Prosphaerosyllis) brevifrons: Presente in Italia solo lungo le coste del Lazio.

Sphaerosyllis (Sphaerosyllis) glandulata: Presente in Italia solo lungo le coste del Lazio.

Sphaerosyllis (Sphaerosyllis) piriferopsis: Presente in Italia solo lungo le coste del Lazio.

Ehlersia: Le specie di questo genere vengono tradizionalmente attribuite a Syllis Savigny, 1818.

Haplosyllis: Le specie di questo genere vengono tradizionalmente attribuite a Syllis Savigny, 1818.

Pseudosyllis: Le specie di questo genere vengono tradizionalmente attribuite a Syllis Savigny, 1818.

Syllis: Alcune specie di questo genere sono tradizionalmente attribuite a Ehlersia Quatrefages, 1865.

Syllis ferrani: Presente in Italia solo lungo le coste del Lazio.

Syllis gerlachi: Specie di dubbia presenza nell'area presa in esame, segnalata solo nella Baia di Calvi (Corsica settentrionale).

Syllis nuchalis: Specie di dubbia presenza nell'area presa in esame, segnalata solo nella Baia di Porto Cesareo lungo le coste ioniche pugliesi.

Autolytus neapolitanus: Presente in Italia solo nel Golfo di Napoli.

Procerea: Le specie di questo genere vengono tradizionalmente attribuite a *Autolytus* Grube, 1855.

Nereididae

Laeonereis Hartman, 1945

Laeonereis glauca (Claparède, 1870) (3, 4, 5)

Namanereis Chamberlin, 1919

Namanereis quadriceps (Blanchard, 1849) (3, 4, 5)

Rullierinereis Pettibone, 1971

Rullierinereis anoculata Cantone, 1982 (5) (E) (*)

Ceratonereis Kinberg, 1866

Ceratonereis costae (Grube, 1840) (3, 4, 5)

Ceratonereis hircinicola (Eisig, 1870) (3, 4, 5)

Eunereis Malmgren, 1865

Eunereis longissima (Johnston, 1840) (3, 4, 5)

Hediste Malmgren, 1867

Hediste diversicolor (O.F. Müller, 1776) (3, 4, 5) (*)

Micronereis Claparède, 1863

Micronereis siciliensis Cantone, 1971 (3, 5) (E)

Micronereis variegata Claparède, 1863 (3, 4, 5)

Neanthes Kinberg, 1866

Neanthes caudata (Delle Chiaje, 1828) (3, 4, 5)

Neanthes fucata (Savigny, 1818) (3, 4, 5)

Neanthes kerguelensis (Mc Intosh, 1885) (3, 4, 5)

Neanthes succinea (Frey & Leuchart, 1847) (3, 4, 5)

Nereis Linnaeus, 1758

Nereis falsa Quatrefages, 1865 (3, 5)
Nereis flavipes Ehlers, 1868 (3, 4)
Nereis irrorata (Malmgren, 1868) (3, 4)
Nereis jacksoni Kinberg, 1866 (3)
Nereis lamellosa Ehlers, 1868 (4, 5)
Nereis pelagica Linnaeus, 1758 (3, 4, 5)
Nereis rava Ehlers, 1868 (3, 4, 5)
Nereis zonata Malmgren, 1867 (3, 4, 5)

Perinereis Kinberg, 1866

Perinereis cultrifera (Grube, 1840) (3, 4, 5)
Perinereis macropus (Claparède, 1870) (3, 5)
Perinereis marioni (Audouin & Milne-Edwards, 1833) (3)
Perinereis oliveirae (Horst, 1889) (3, 5) (*)
Perinereis rullieri Pilato, 1974 (3, 4, 5)

Platynereis Kinberg, 1866

Platynereis australis (Schmarda, 1861) (4) (*)
Platynereis coccinea (Delle Chiaje, 1841) (3, 4, 5)
Platynereis dumerilii (Audouin & Milne-Edwards, 1833) (3, 4, 5)
Platynereis nadiae Abbiati & Castelli, 1992 (3) (E) (*)

Note

Namanereis: Le specie di questo genere vengono tradizionalmente attribuite a *Lycastoides* Jabukova, 1930.

Rullierinereis anoculata: Presente in Italia solo lungo le coste ioniche della Sicilia.

Ceratonereis: Le specie di questo genere vengono tradizionalmente attribuite a *Nereis* Linnaeus, 1758.

Eunereis: Le specie di questo genere vengono tradizionalmente attribuite a *Nereis* Linnaeus, 1758.

Hediste: Le specie di questo genere vengono tradizionalmente attribuite a *Nereis* Linnaeus, 1758.

Hediste diversicolor: Specie la cui attribuzione generica è tuttora in discussione.

Neanthes: Le specie di questo genere vengono tradizionalmente attribuite a *Nereis* Linnaeus, 1758.

Perinereis oliveirae: Specie di dubbia presenza nei mari italiani; spesso è stata confusa con *Perinereis rullieri*.

Platynereis australis: Specie di dubbia presenza nei mari italiani; probabilmente gli esemplari attribuiti ad essa appartengono a specie inedita; segnalata in Italia solo presso la foce del Po.

Platynereis nadiae: Presente in Italia solo lungo le coste di Capraia (LI) nell'Arcipelago Toscano.

Nephtyidae

Aglaophamus Kinberg, 1866

Aglaophamus rubella (Michaelsen, 1897) (3, 4)

Inermonephtys Fauchald, 1968

Inermonephtys inermis (Ehlers, 1887) (4, 5)

Micronephtys Friedrich, 1939

Micronephtys mariae San Martin, 1982 (3)

Micronephtys sphaerocirrata (Wesenberg-Lund, 1949) (3, 4)

Micronephtys stammeri (Augener, 1932) (4, 5)

Nephtys Cuvier, 1817

Nephtys assimilis Oersted, 1843 (3) (*)

Nephtys cirrosa Ehlers, 1868 (3, 5)

Nephtys hombergi Savigny, 1818 (3, 4, 5)

Nephtys hystericis Mc Intosh, 1900 (3, 4)

Nephtys incisa Malmgren, 1865 (*)

Nephtys incisa bilobata Heinen, 1911 (3)

Nephtys incisa incisa Malmgren, 1865 (3, 5)

Note

Aglaophamus: Le specie di questo genere vengono tradizionalmente attribuite a *Nephtys* Cuvier, 1817.

Inermonephtys: Le specie di questo genere vengono tradizionalmente attribuite a *Nephtys* Cuvier, 1817.

Micronephtys: Le specie di questo genere vengono tradizionalmente attribuite a *Nephtys* Cuvier, 1817.

Nephtys assimilis: Gli esemplari di questa specie sono stati tradizionalmente attribuiti a *Nephtys hombergii*; è pertanto possibile che *N. assimilis* abbia una distribuzione più ampia nei mari italiani e, al contrario, *N. hombergii*, più ristretta.

Nephtys incisa: La sottospecie *bilobata* è presente nell'area presa in esame solo lungo le coste della Corsica.

Paralacydoniidae

Paralacydonia Fauvel, 1913

Paralacydonia paradoxa Fauvel, 1913 (3, 4)

Aphroditidae

Aphrodita Linnaeus, 1758

Aphrodita aculeata Linnaeus, 1761 (3, 4)

Aphrodita pallida (Roule, 1906) (3)

Laetmonice Kinberg, 1855

Laetmonice filicornis Kinberg, 1855 (3)

Laetmonice hystrix (Savigny, 1820) (3, 4, 5)

Pontogenia Claparède, 1868

Pontogenia chrysocoma (Baird, 1865) (3, 4, 5)

Polynoidae

Acholoe Claparède, 1870

Acholoe squamosa (Delle Chiaje, 1825) (3, 4, 5)

Lepidasthenia Malmgren, 1867

Lepidasthenia elegans (Grube, 1840) (3, 4, 5)

Lepidasthenia maculata Potts, 1909 (3, 5)

Lepidonotus Leach, 1816

Lepidonotus clava (Montagu, 1808) (3, 4, 5)

Lepidonotus squamatus (Linnaeus, 1767) (3, 4, 5)

Adyte Saint-Joseph, 1899

Adyte pellucida (Ehlers, 1864) (3, 4, 5)

Gattyana Mc Intosh, 1900

Gattyana cirrhosa (Pallas, 1766) (3) (*)

Harmothoe Kinberg, 1855

Harmothoe andreapolis (Mc Intosh, 1874) (3)

Harmothoe antilopes Mc Intosh, 1876 (3, 4, 5)

Harmothoe areolata Grube, 1860 (3, 4, 5)

Harmothoe castanea (Mc Intosh, 1876) (3, 5)

Harmothoe extenuata (Grube, 1840) (3, 4, 5)
Harmothoe fraserthompsoni Mc Intosh, 1897 (3)
Harmothoe glabra (Malmgren, 1865) (3, 4)
Harmothoe imbricata (Linnaeus, 1767) (3, 4)
Harmothoe impar (Johnston, 1839) (3, 4, 5)
Harmothoe johnstoni (Mc Intosh, 1885) (4, 5)
Harmothoe ljunghmani (Malmgren, 1867) (3, 4)
Harmothoe lunulata (Delle Chiaje, 1841) (3, 4, 5)
Harmothoe marphisae Mc Intosh, 1876 (3, 5)
Harmothoe spinifera (Ehlers, 1864) (3, 4, 5)

Polynoe Savigny, 1818

Polynoe scolopendrina Savigny, 1822 (3, 4)

Note

Gattyana cirrhosa: Presente in Italia solo lungo le coste laziali presso la foce del Tevere.
Harmothoe: Alcune specie di questo genere vengono tradizionalmente attribuite a *Lagisca* Malmgren, 1865 e a *Malmgrenia* Mc Intosh, 1874.

Polyodontidae

Euarche Ehlers, 1887

Euarche tubifex Ehlers, 1887 (5) (*)

Eupanthalis Mc Intosh, 1876

Eupanthalis kinbergi Mc Intosh, 1876 (3, 5)

Panthalis Kinberg, 1855

Panthalis oerstedii Kinberg, 1855 (3, 4, 5)

Polyodontes Renier in Audouin & Milne-Edwards, 1832

Polyodontes maxillosa Ranzani, 1817 (4)

Note

Euarche tubifex: Presente in Italia solo nel Canale di Sicilia.

Sigalionidae

Neoleanira Pettibone, 1970

Neoleanira tetragona (Oersted, 1845) (4)

Pholoe Johnston, 1839

Pholoe dorsipapillata Marenzeller, 1893 (3, 4)

Pholoe minuta (Fabricius, 1780) (3, 5)

Pholoe sinophthalmica Claparède, 1868 (3, 5)

Psammolyce Kinberg, 1855

Psammolyce arenosa (Delle Chiaje, 1841) (3, 4, 5)

Psammolyce inclusa (Claparède, 1868) (3, 4, 5)

Sigalion Audouin & Milne-Edwards, 1832

Sigalion mathildae Audouin & Milne-Edwards, 1832 (3, 4, 5)

Sigalion squamatum Delle Chiaje, 1830 (4)

Sthenelais Kinberg, 1855

Sthenelais boa (Johnston, 1833) (3, 4, 5)

Sthenelais ctenolepis Claparède, 1868 (4, 5)

Sthenelais limicola (Ehlers, 1864) (3, 4, 5)

Sthenelais minor Pruvot & Racovitza, 1895 (3, 4, 5)

Sthenolepis Willey, 1905

Sthenolepis yhleni (Malmgren, 1867) (3, 4, 5)

Thalenessa Baird, 1868

Thalenessa dendrolepis (Claparède, 1868) (3, 4, 5)

Eulepethidae

Pareulepis Darboux, 1899

Pareulepis geayi (Fauvel, 1918) (4) (*)

Note

Pareulepis geayi: Presente in Italia solo nel Medio Adriatico.

Chrysopetalidae

Bhawania Schmarda, 1861

Bhawania reyssi Katzmann, Laubier & Ramos, 1974 (4, 5)

Chrysopetalum Ehlers, 1864

Chrysopetalum debile (Grube, 1855) (3, 4, 5)

Pisionidae

Pisione Grube, 1857

Pisione remota (Southern, 1914) (3, 4, 5)

Amphinomidae

Chloeia Savigny, 1818

Chloeia venusta Quatrefages, 1865 (3, 4, 5)

Eurythoe Kinberg, 1857

Eurythoe complanata (Pallas, 1776) (3)

Hermodice Kinberg, 1857

Hermodice carunculata (Pallas, 1776) (4, 5)

Notopygos Grube, 1855

Notopygos megalops Mc Intosh, 1885 (5) (*)

Note

Notopygos megalops: Presente in Italia solo lungo le coste orientali siciliane.

Euphrosynidae

Euphrosyne Savigny, 1818

Euphrosyne armadillo Sars, 1851 (3, 5)

Euphrosyne foliosa Audouin & Milne-Edwards, 1833 (3, 4, 5)

Euphrosyne myrtosa Savigny, 1818 (4)

Spintheridae

Spinther Johnston, 1845

Spinther arcticus (M. Sars, 1851) (4) (*)

Note

Spinther arcticus: Presente in Italia solo nel Golfo di Trieste.

Onuphidae

Aponuphis Kucheruk, 1978

Aponuphis bilineata (Baird, 1870) (3, 4, 5)

Aponuphis brementi (Fauvel, 1916) (3, 4, 5)

Aponuphis fauveli (Rioja, 1918) (3, 4, 5)

Diopatra Audouin & Milne-Edwards, 1833

Diopatra neapolitana Delle Chiaje, 1841 (3, 4, 5)

Epidiopatra Augener, 1918

Epidiopatra hupferiana Augener, 1918 (5) (*)

Hyalinoecia Malmgren, 1867

Hyalinoecia tubicola (O.F. Müller, 1776) (3, 4, 5)

Longibranchium Paxton, 1986

Longibranchium atlanticum (Day, 1973) (3) (*)

Nothria Malmgren, 1867

Nothria conchylega (M. Sars, 1835) (3, 4, 5)

Onuphis Audouin & Milne-Edwards, 1833

Onuphis eremita Audouin & Milne-Edwards, 1833 (3, 4, 5)

Onuphis falesia Castelli, 1982 (3) (E)

Paradiopatra (Ehlers, 1887)

Paradiopatra lepta (Chamberlin, 1919) (3, 4, 5)

Ramphobrachium Ehlers, 1887

Ramphobrachium brevibrachiatum (Ehlers, 1875) (3, 4, 5)

Note

Aponuphis: Le specie di questo genere vengono tradizionalmente attribuite a *Hyalinoecia* Malmgren, 1867.

Epidiopatra hupferiana: Presente in Italia solo lungo le coste orientali siciliane.

Longibranchium atlanticum: Presente in Italia solo lungo le coste calabresi tirreniche.

Nothria: Le specie di questo genere vengono tradizionalmente attribuite a *Onuphis* Audouin & Milne-Edwards, 1833.

Paradiopatra: Le specie di questo genere vengono tradizionalmente attribuite a *Onuphis* Audouin & Milne-Edwards, 1833.

Eunicidae

Eunice Cuvier, 1817

Eunice antennata (Lamarck, 1818) (5) (*)

Eunice aphroditois (Pallas, 1788) (4, 5)

Eunice harassii Audouin & Milne-Edwards, 1834 (3, 4, 5)

Eunice oerstedii Stimpson, 1854 (3, 5)

Eunice pennata (O.F. Müller, 1778) (3, 4, 5)

Eunice schizobranchia Claparède, 1870 (3, 4, 5)

Eunice torquata Quatrefages, 1865 (3, 4, 5)

Eunice vittata (Delle Chiaje, 1828) (3, 4, 5)

Lysibranchia Cantone, 1983

Lysibranchia paucibranchiata Cantone, 1983 (5) (E) (*)

Lysidice Savigny, 1818

Lysidice collaris Grube, 1870 (3, 5)

Lysidice ninetta Audouin & Milne-Edwards, 1833 (3, 4, 5)

Marphysa Quatrefages, 1865

Marphysa bellii (Audouin & Milne-Edwards, 1833) (3, 4, 5)

Marphysa fallax Marion & Bobretzky, 1875 (3, 4, 5)

Marphysa kinbergi Mc Intosh, 1910 (3, 4, 5)

Marphysa sanguinea (Montagu, 1815) (3, 4, 5)

Nematonereis Schmarda, 1861

Nematonereis unicornis Schmarda, 1861 (3, 4, 5)

Palola Gray, 1847

Palola siciliensis (Grube, 1840) (3, 4, 5)

Note

Eunice antennata: Presente in Italia solo lungo le coste orientali siciliane, nella Rada di Augusta.

Lysibranhia paucibranchiata: Presente in Italia solo lungo le coste orientali siciliane.

Euniphysidae

Euniphysa Wesenberg-Lund, 1949

Euniphysa italica Cantone & Gravina, 1991 (3) (E) (*)

Note

Euniphysa italica: Presente in Italia solo lungo le coste laziali.

Lumbrineridae

Lumbrineris Blainville, 1828

Lumbrineris adriatica (Fauvel, 1940) (3, 4)

Lumbrineris coccinea (Renier, 1804) (3, 4, 5)

Lumbrineris emandibulata Pillai, 1961

Lumbrineris emandibulata mabiti Ramos, 1976 (3, 4, 5)

Lumbrineris fragilis (O.F. Müller, 1776) (3, 4, 5)

Lumbrineris funchalensis (Kinberg, 1865) (3, 4, 5)

Lumbrineris gracilis (Ehlers, 1868) (3, 4, 5)

Lumbrineris inflata Moore, 1911 (3, 5)

Lumbrineris latreilli Audouin & Milne-Edwards, 1834 (3, 4, 5)

Lumbrineris longipodiata Cantone, 1989 (5) (E) (*)

Lumbrineris nonatoi Ramos, 1976 (3) (*)

Lumbrineris rovigensis (Fauvel, 1940) (3, 4)

Lumbrineris tetraura (Schmarda, 1861) (3, 4, 5)

Lumbrinerides Orensanz, 1973

Lumbrinerides acuta (Verrill, 1875) (3, 5)

Lumbrinerides neogesae Ramos, 1976 (3) (*)

Lumbrineriopsis Orensanz, 1973

Lumbrineriopsis paradoxa (Saint-Joseph, 1888) (3, 4, 5)

Ninoe Kinberg, 1865

Ninoe armoricana Glémarec, 1968 (3, 4, 5)

Ninoe kinbergi Ehlers, 1887 (3, 4, 5)

Note

Lumbrineris longipodiata: Presente in Italia solo lungo le coste orientali siciliane.

Lumbrineris nonatoi: Presente in Italia solo lungo le coste laziali.

Lumbrinerides: Le specie di questo genere vengono tradizionalmente attribuite a *Lumbrineris* Blainville, 1828.

Lumbrinerides neogesae: Presente in Italia solo lungo le coste laziali.

Lumbrineriopsis: Le specie di questo genere vengono tradizionalmente attribuite a *Lumbrineris* Blainville, 1828.

Iphitimidae

Iphitime Marenzeller, 1902

Iphitime cuenoti Fauvel, 1914 (3) (*)

Note

Iphitime cuenoti: Presente in Italia solo lungo le coste adriatiche pugliesi.

Ichthyotomidae

Ichthyotomus Eisig, 1906

Ichthyotomus sanguinarius Eisig, 1906 (3) (*)

Note

Ichthyotomus sanguinarius: Presente in Italia solo nel Golfo di Napoli.

Arabellidae

Arabella Grube, 1850

Arabella coeca Fauvel, 1940 (4) (*)

Arabella geniculata (Claparède, 1868) (3, 4, 5)

Arabella iricolor (Montagu, 1804) (3, 4, 5)

Drilonereis Claparède, 1870

Drilonereis filum (Claparède, 1868) (3, 4, 5)

Labrorostratus Saint-Joseph, 1888

Labrorostratus jonicus Tenerelli, 1961 (5) (*)

Notocirrus Schmarda, 1861

Notocirrus scoticus Mc Intosh, 1869 (3) (*)

Oligognathus Spengel, 1882

Oligognathus bonelliae Spengel, 1882 (3, 4)

Oligognathus parasiticus Cerruti, 1909 (3) (*)

Note

Arabella coeca: Presente nell'area presa in esame solo presso Rovigno.

Labrorostratus jonicus: Presente in Italia solo lungo le coste orientali siciliane.

Notocirrus scoticus: Presente in Italia solo nel basso Tirreno.

Oligognathus parasiticus: Presente in Italia solo nel Golfo di Napoli.

Oenonidae

Halla A. Costa, 1844

Halla parthenopeia (Delle Chiaje, 1828) (3, 5)

Oenone Savigny, 1818

Oenone fulgida (Savigny, 1818) (3) (*)

Note

Oenone fulgida: Specie di dubbia presenza nei mari italiani; probabilmente gli esemplari attribuiti ad essa appartengono ad una specie non descritta.

Dorvilleidae

Dorvillea Parfitt, 1866

Dorvillea rubrovittata (Grube, 1855) (3, 4, 5)

Ophryotrocha Claparède & Metschnikow, 1869

- Ophryotrocha geryoncola* (Esmark, 1878) (3)
- Ophryotrocha hartmanni* Huth, 1933 (3)
- Ophryotrocha labronica* Bacci & La Greca, 1962 (3, 5)
- Ophryotrocha macrovifera* Åkesson, 1976 (4)
- Ophryotrocha puerilis* Claparède & Metschnikow, 1869 (3, 4)

Pettiboneia Orensanz, 1973

- Pettiboneia urciensis* Campoy & San Martin, 1982 (3, 5)

Protodorvillea Pettibone, 1951

- Protodorvillea atlantica* (Mc Intosh, 1875) (5) (*)
- Protodorvillea egena* (Ehlers, 1913) (5)
- Protodorvillea kefersteini* (Mc Intosh, 1879) (3, 4, 5)

Schistomeringos Jumars, 1974

- Schistomeringos neglectus* (Fauvel, 1923) (3, 4, 5)
- Schistomeringos rudolphii* (Delle Chiaje, 1828) (3, 4, 5)

Note

Dorvillea: Le specie di questo genere vengono tradizionalmente attribuite a *Staurocephalus* Grube, 1855.

Protodorvillea: Le specie di questo genere vengono tradizionalmente attribuite a *Staurocephalus* Grube, 1855.

Protodorvillea atlantica: Presente in Italia solo lungo le coste adriatiche pugliesi.

Schistomeringos: Le specie di questo genere vengono tradizionalmente attribuite a *Staurocephalus* Grube, 1855.

Sternaspidae

Sternaspis Otto, 1821

- Sternaspis scutata* (Renier, 1807) (3, 4, 5)

Oweniidae

Myriochele Malmgren, 1867

- Myriochele oculata* Zachs, 1923 (3, 4) (*)

Owenia Delle Chiaje, 1841

Owenia fusiformis Delle Chiaje, 1841 (3, 4, 5)

Note

Myriochele: Alcuni Autori attribuiscono a *Galatowenia* Kirkegaard, 1959 le specie appartenenti a *Myriochele* Malmgren, 1867.

Myriochele oculata: Gli esemplari presenti nei mari italiani che, nella bibliografia recente, sono stati attribuiti a *M. heeri* Malmgren, 1867, sono da ritenere appartenenti a *M. oculata*.

Flabelligeridae

Brada Stimpson, 1854

Brada villosa (Rathke, 1843) (3, 4, 5)

Diplocirrus Haase, 1915

Diplocirrus glaucus Haase, 1915 (3, 4, 5)

Flabelligera M. Sars, 1829

Flabelligera affinis M. Sars, 1829 (3, 4, 5)

Flabelligera diplochaitus (Otto, 1821) (3, 4)

Pherusa Oken, 1807

Pherusa monilifera (Delle Chiaje, 1841) (3, 4, 5)

Pherusa plumosa (O.F. Müller, 1776) (3, 4)

Piromis Kinberg, 1867

Piromis eruca (Claparède, 1870) (3, 4, 5)

Therochaeta Chamberlin, 1919

Therochaeta flabellata (M. Sars, 1872) (3, 4)

Acrocirridae

Acrocirrus Grube, 1872

Acrocirrus frontifilis (Grube, 1860) (3, 4, 5)

Macrochaeta Grube, 1850

Macrochaeta clavicornis (M. Sars, 1835) (3, 4)

Fauveliopsidae

Fauveliopsis Mc Intosh, 1922

Fauveliopsis adriatica Katzmann & Laubier, 1974 (3, 4)

Fauveliopsis arabica Hartman, 1974 (3) (*)

Fauveliopsis fauchaldi Katzmann & Laubier, 1974 (4)

Note

Fauveliopsis arabica: Specie di dubbia presenza nei mari italiani; probabilmente gli esemplari attribuiti ad essa appartengono ad una specie non descritta.

Pectinariidae

***Pectinaria* (*Amphictene*)** Savigny, 1818

Pectinaria (*Amphictene*) *auricoma* (O.F. Müller, 1776) (3, 4)

***Pectinaria* (*Lagis*)** Malmgren, 1866

Pectinaria (*Lagis*) *koreni* (Malmgren, 1866) (3, 4, 5)

***Pectinaria* (*Pectinaria*)** Savigny, 1818

Pectinaria (*Pectinaria*) *belgica* (Pallas, 1776) (4)

Petta Malmgren, 1866

Petta pusilla Malmgren, 1866 (3, 4, 5)

Ampharetidae

Adercodon Mackie, 1994

Adercodon pleijeli Mackie, 1994 (5) (*)

Amage Malmgren, 1866

Amage adspersa (Grube, 1863) (3, 4, 5)

Amage gallasi Marion, 1875 (3)

Ampharete Malmgren, 1866

Ampharete acutifrons (Grube, 1860) (3, 4, 5)

Amphicteis Grube, 1850

Amphicteis gunneri (M. Sars, 1835) (3, 4, 5) (*)

Amphicteis midas (Gosse, 1855) (3)

Anobothrus Levinsen, 1884

Anobothrus gracilis (Malmgren, 1866) (3)

Auchenoplax Ehlers, 1887

Auchenoplax crinita Ehlers, 1887 (3)

Eclysippe Eliason, 1955

Eclysippe vanelli (Fauvel, 1936) (3)

Lysippe Malmgren, 1866

Lysippe labiata Malmgren, 1866 (3, 4)

Sabellides Milne-Edwards in Malmgren, 1866

Sabellides octocirrata (M. Sars, 1835) (3, 4, 5)

Sosane Malmgren, 1866

Sosane sulcata Malmgren, 1866 (3, 4)

Melinna Malmgren, 1867

Melinna monoceroides Fauvel, 1936 (3, 4)

Melinna palmata Grube, 1870 (3, 4, 5)

Note

Adercodon pleijeli: Presente in Italia solo lungo le coste orientali della Sicilia.

Amphicteis gunneri: Specie di dubbia presenza e comunque di dubbia distribuzione nei mari italiani; è possibile infatti che gli esemplari attribuiti a *A. gunneri*, o almeno una parte di essi, appartengano a *A. midas* (vedi 285.0.002.0).

Trichobranchiidae

Octobranchus Marion & Bobretzky, 1875

Octobranthus lingulatus (Grube, 1863) (4)

Terebellides M. Sars, 1835

Terebellides stroemi M. Sars, 1835 (3, 4, 5)

Trichobranthus Malmgren, 1866

Trichobranthus glacialis Malmgren, 1866 (3, 4, 5)

Terebellidae

Amphitrite O.F. Müller, 1771 sensu Hessle, 1917

Amphitrite cirrata O.F. Müller, 1771 (3, 4, 5)

Amphitrite oculata Hessle, 1917 (3)

Amphitrite rubra (Risso, 1828) (3, 4)

Amphitrite variabilis (Risso, 1826) (3, 4, 5)

Amphitritides Augener, 1922

Amphitritides gracilis (Grube, 1860) (3, 4)

Axionice Malmgren, 1866

Axionice maculata (Dalyell, 1853) (3, 4)

Eupolymnia Verrill, 1900

Eupolymnia nebulosa (Montagu, 1818) (3, 4, 5)

Eupolymnia nesidensis (Delle Chiaje, 1828) (3, 4, 5)

Lanice Malmgren, 1866

Lanice conchylega (Pallas, 1766) (3, 4, 5)

Neoamphitrite Hessle, 1917

Neoamphitrite figulus (Dalyell, 1853) (5)

Nicolea Malmgren, 1866

Nicolea venustula (Montagu, 1818) (3, 4, 5)

Pista Malmgren, 1866

Pista brevibranchia Caullery, 1915 (5)
Pista cretacea (Grube, 1860) (3, 4, 5)
Pista cristata (O.F. Müller, 1776) (3, 4, 5)
Pista unibranchia Day, 1963 (3, 5)

Terebella Linnaeus, 1767

Terebella lapidaria Linnaeus, 1767 (3, 4, 5)

Parathelepus Caullery, 1915

Parathelepus collaris (Southern, 1914) (3) (*)

Streblosoma M. Sars, 1872

Streblosoma bairdi (Malmgren, 1866) (3, 4)
Streblosoma hesslei (Day, 1955) (3)

Thelepus Leuckart, 1849

Thelepus cincinnatus (Fabricius, 1780) (3, 4, 5)
Thelepus triserialis (Grube, 1855) (3, 4, 5)

Amaeana Hartman, 1959

Amaeana trilobata (M. Sars, 1863) (3, 4, 5)

Lysilla Malmgren, 1866

Lysilla loveni Malmgren, 1866 (3)

Polycirrus Grube, 1850

Polycirrus aurantiacus Grube, 1860 (3, 4, 5)
Polycirrus caliendrum Claparède, 1870 (3)
Polycirrus denticulatus Saint-Joseph, 1894 (3)
Polycirrus haematodes (Claparède, 1864) (3, 4)
Polycirrus medusa Grube, 1850 (3)

Note

Amphitritides: Le specie di questo genere vengono tradizionalmente attribuite a Amphitrite O.F. Müller, 1771.

Axionice: Le specie di questo genere vengono tradizionalmente attribuite a Pista Malmgren, 1866.

Parathelepus collaris: Presente in Italia solo nell'Arcipelago Toscano.

Sabellariidae

Sabellaria Linnaeus, 1767

Sabellaria alveolata Linnaeus, 1767 (3, 5)

Sabellaria spinulosa Leuckart, 1849 (3, 4, 5)

Sabellaria halcocki Gravier, 1906 (3, 5)

Sabellidae

Echinofabricia (Hartmann-Schroeder, 1965)

Echinofabricia dubia (Hartmann-Schroeder, 1965) (3) (*)

Fabricia Blainville, 1828

Fabricia stellaris (O.F. Müller, 1774) (*)

Fabricia stellaris adriatica Banse, 1956 (4)

Fabricia stellaris stellaris (O.F. Müller, 1774) (3, 4, 5)

Fabriciola Friedrich, 1939

Fabriciola ghardaqa Banse, 1959 (5) (*)

Fabriciola tonerella Banse, 1956 (3) (E)

Pseudofabricia Cantone, 1972

Pseudofabricia aberrans Cantone, 1972 (3, 5) (E)

Pseudofabriciola Fitzhugh, 1990

Pseudofabriciola analis Fitzhugh, Giangrande & Simboura, 1993 (5) (E) (*)

Amphicorina Quatrefages, 1850

Amphicorina alata (Banse, 1957) (*)

Amphicorina alata pectinata (Banse, 1957) (3)

Amphicorina armandi (Claparède, 1864) (3, 4, 5)

Amphicorina eimeri (Langerhans, 1880) (3, 5)

Amphiglana Claparède, 1864

Amphiglana mediterranea (Leydig, 1851) (3, 4, 5)

Bispira Krøyer, 1856

Bispira mariae Lo Bianco, 1893 (3) (E) (*)

Branchiomma Kölliker, 1858

Branchiomma bombyx (Dalyell, 1853) (3, 4, 5)

Branchiomma luctuosum Grube, 1869 (3, 5)

Branchiomma lucullanum (Delle Chiaje, 1828) (3, 4, 5)

Branchiomma moebii (Knight-Jones, 1994) (4) (*)

Chone Krøyer, 1856

Chone acustica (Claparède, 1870) (3, 5)

Chone arenicola Langerhans, 1880 (3, 5)

Chone collaris Langerhans, 1880 (3, 4, 5)

Chone duneri Malmgren, 1867 (3, 5)

Chone filicaudata Southern, 1914 (5)

Chone kroyeri M. Sars, 1851 (3, 4)

Chone longiseta Giangrande, 1992 (3, 5) (E)

Demonax Kinberg, 1867

Demonax brachychona (Claparède, 1870) (3, 4, 5)

Demonax langerhansi Knight-Jones, 1983 (5) (*)

Demonax tenuicollaris Grube, 1870 (5) (*)

Demonax tommasi Giangrande, 1994 (5) (E) (*)

Desdemona Banse, 1957

Desdemona ornata Banse, 1957 (3, 4, 5)

Euchone Malmgren, 1866

Euchone rosea Langerhans, 1884 (3, 5)

Euchone rubrocincta (M. Sars, 1861) (3, 4, 5)

Euchone southerni Banse, 1972 (5)

Hypsicomus Grube, 1870

Hypsicomus stichophthalmos (Grube, 1863) (4, 5)

Jasmineira Langerhans, 1880

Jasmineira candela (Grube, 1863) (3, 4, 5)

Jasmineira caudata Langerhans, 1880 (3, 4, 5)

Jasmineira elegans Saint-Joseph, 1884 (3, 4)

Laonome Malmgren, 1866

Laonome salmacidis Claparède, 1868 (3, 5)

Megalomma Johansson, 1927

Megalomma vesiculosum (Montagu, 1815) (3, 4, 5)

Megalomma vigilans (Claparède, 1870) (3)

Myxicola Koch in Renier, 1847

Myxicola aestetica (Claparède, 1870) (3)

Myxicola infundibulum (Renier, 1804) (3, 4, 5)

Perkinsiana Knight-Jones, 1983

Perkinsiana rubra (Langerhans, 1880) (5) (*)

Perkinsiana socialis (Langerhans, 1884) (5) (*)

Pseudopotamilla Bush, 1905

Pseudopotamilla ceresinae Grube, 1870 (5) (*)

Pseudopotamilla reniformis (Bruguiera, 1789) (3, 4, 5)

Sabella Linnaeus, 1767

Sabella discifera Grube, 1874 (3, 5)

Sabella pavonina Savigny, 1822 (3, 4)

Sabella spallanzanii (Gmelin, 1791) (3, 4, 5)

Note

Echinofabricia: Le specie di questo genere vengono tradizionalmente attribuite a Augeneriella Banse, 1957.

Echinofabricia dubia: Presente in Italia solo nella Baia di Porto Pozzo (Sardegna Settentrionale).

Fabricia stellaris: La sottospecie adriatica è presente in Italia solo nella Laguna di Venezia.

Fabriciola ghardaqa: Presente in Italia solo lungo le coste adriatiche pugliesi.

Pseudofabriciola analis: Presente in Italia solo lungo le coste ioniche pugliesi.

Amphicorina alata: Presente in Italia solo lungo le coste di Capraia (LI) nell'Arcipelago Toscano.

Bispira mariae: Presente in Italia solo nel Golfo di Napoli.

Branchiomma moebii: Presente in Italia solo presso Trieste.

Chone: Alcune specie di questo genere sono tradizionalmente attribuite a Dialychone Claparède, 1870.

Demonax: Alcune specie di questo genere sono tradizionalmente attribuite a Sabella Linnaeus, 1767.

Demonax langerhansi: Presente in Italia solo lungo le coste adriatiche pugliesi.

Demonax tenuicollaris: Presente in Italia solo lungo le coste adriatiche pugliesi.

Demonax tommasi: Presente in Italia solo lungo le coste adriatiche pugliesi.

Hypsicomus: Le specie di questo genere vengono tradizionalmente attribuite a Potamilla Malmgren, 1866.

Perkinsiana: Le specie di questo genere vengono tradizionalmente attribuite a Potamilla Malmgren, 1866.

Perkinsiana rubra: Presente in Italia solo lungo le coste adriatiche pugliesi.

Perkinsiana socialis: Presente in Italia solo lungo le coste adriatiche pugliesi.

Pseudopotamilla: Le specie di questo genere vengono tradizionalmente attribuite a Potamilla Malmgren, 1866.

Pseudopotamilla ceresinae: Presente in Italia solo lungo le coste adriatiche pugliesi.

Sabella: Alcune specie di questo genere sono tradizionalmente attribuite a Spirographis Viviani, 1805.

Serpulidae

Apomatus Philippi, 1844

Apomatus ampulliferus Philippi, 1844 (3, 4, 5)

Apomatus similis Marion & Bobretzky, 1875 (3, 4, 5)

Ditrupa Berkeley, 1835

Ditrupa arietina (O.F. Müller, 1776) (3, 4, 5)

Ficopomatus Southern, 1921

Ficopomatus enigmaticus (Fauvel, 1923) (3, 4, 5)

Filograna Berkeley, 1827

Filograna implexa Berkeley, 1827 (3, 4, 5)

Filogramula Langerhans, 1884

Filogramula annulata (O.G. Costa, 1861) (3, 4, 5)

Filogramula calyculata (O.G. Costa, 1861) (3, 4, 5)

Filogramula gracilis Langerhans, 1884 (3)

Filogramula stellata (Southward, 1963) (3)

Hyalopomatus Marenzeller, 1878

Hyalopomatus marenzelleri Langerhans, 1884 (3)

Hydroides Gunnerus, 1768

Hydroides dianthus (Verrill, 1873) (3, 4, 5)

Hydroides dirampha Mörch, 1863 (3, 5)

Hydroides elegans (Haswell, 1883) (3, 4, 5)

Hydroides helmatus (Iroso, 1921) (3, 4, 5)
Hydroides niger Zibrowius, 1971 (3, 4, 5)
Hydroides norvegicus Gunnerus, 1768 (3, 4, 5)
Hydroides pseudouncinatus Zibrowius, 1968 (*)
 Hydroides pseudouncinatus africanus Zibrowius, 1971 (5)
 Hydroides pseudouncinatus pseudouncinatus Zibrowius, 1968 (3, 4, 5)
Hydroides stoichadon Zibrowius, 1971 (3, 4)

Janita Saint-Joseph, 1894

Janita fimbriata (Delle Chiaje, 1822) (3, 4, 5)

Josephella Caullery & Mesnil, 1896

Josephella marenzelleri Caullery & Mesnil, 1896 (3, 4, 5)

Marifugia Absolon & Hrabe, 1930

Marifugia cavatica Absolon & Hrabe, 1930 (N) (*)

Metavermilia Bush, 1905

Metavermilia multicristata (Philippi, 1844) (3, 4, 5)

Placostegus Philippi, 1844

Placostegus crystallinus Zibrowius, 1968 (3, 5)
Placostegus tridentatus (Fabricius, 1779) (3, 5)

Pomatoceros Philippi, 1844

Pomatoceros lamarckii (Quatrefages, 1865) (3, 4, 5)
Pomatoceros triqueter (Linnaeus, 1767) (3, 4, 5)

Protula Risso, 1826

Protula tubularia (Montagu, 1803) (3, 4, 5)

Salmacina Claparède, 1870

Salmacina dysteri (Huxley, 1855) (3, 4, 5)

Semivermilia Ten Hove, 1975

Semivermilia agglutinata (Marenzeller, 1893) (3)
Semivermilia crenata (O.G. Costa, 1861) (3, 4, 5)
Semivermilia cribrata (O.G. Costa, 1861) (3, 5)
Semivermilia pomatostegoides (Zibrowius, 1969) (3, 5)

Semivermilia torulosa (Delle Chiaje, 1822) (3)

Serpula Linnaeus, 1758

Serpula concharum Langerhans, 1880 (3, 4, 5) (*)

Serpula cavernicola Fassari & Mollica, 1991 (5) (E) (*)

Serpula lobiancoi Rioja, 1917 (3, 4, 5)

Serpula vermicularis Linnaeus, 1767 (3, 4, 5)

Spiraserpula Regenhart, 1961

Spiraserpula massiliensis (Zibrowius, 1968) (3, 5)

Spirobranchus Blainville, 1828

Spirobranchus lima (Grube, 1862) (3, 4)

Spirobranchus polytrema (Philippi, 1844) (3, 4, 5)

Vermiliopsis Saint-Joseph, 1894

Vermiliopsis infundibulum (Philippi, 1844) (3, 4, 5)

Vermiliopsis labiata (O.G. Costa, 1861) (3, 4, 5)

Vermiliopsis monodiscus Zibrowius, 1968 (3)

Vermiliopsis striaticeps (Grube, 1862) (3, 4, 5)

Note

Apomatus: La discussione sulla definizione delle specie all'interno del genere *Apomatus* non permette di stabilire con chiarezza la effettiva distribuzione delle specie segnalate nei mari italiani; il genere è comunque presente in tutte 3 aree marine individuate con almeno due specie.

Filograna: La discussione sulla definizione delle specie all'interno del genere *Filograna* non permette di stabilire con chiarezza la effettiva distribuzione delle specie segnalate nei mari italiani; il genere è peraltro presente in tutte le 3 aree marine individuate.

Hydroides pseudouncinatus: La sottospecie *africanus* è di dubbia presenza in Italia ed è stata segnalata solo una volta in 5, lungo le coste pugliesi.

Marifugia cavatica: Specie dulcacquicola presente in acque sotterranee nella zona del Carso.

Protula: La discussione sulla definizione delle specie all'interno del genere *Protula* non permette di stabilire con chiarezza la effettiva distribuzione delle specie segnalate nei mari italiani; il genere è comunque presente in tutte le 3 aree marine individuate.

Salmacina: La discussione sulla definizione delle specie all'interno del genere *Salmacina* non permette di stabilire con chiarezza la effettiva distribuzione delle specie segnalate nei mari italiani; il genere è comunque presente in tutte le 3 aree marine individuate.

Serpula concharum: Esiste una specie affine a *S. concharum* ma chiaramente differente, che non è stata ancora descritta, ma è stata segnalata in 3 e in 5.

Serpula cavernicola: Presente in Italia solo lungo le coste orientali della Sicilia.

Spiraserpula: Le specie di questo genere vengono tradizionalmente attribuite a *Serpula* Linnaeus, 1758.

Spirorbidae

Janua Saint-Joseph, 1894

Janua pagenstecheri (Quatrefages, 1865) (3, 4, 5)

Neodexiospira Pillai, 1970

Neodexiospira pseudocorrugata (Bush, 1904) (3, 4, 5)

Nidificaria Knight-Jones, 1984

Nidificaria clavus (Harris, 1968) (3, 5)

Pileolaria Claparède, 1868

Pileolaria berkeleyana (Rioja, 1942) (3)

Pileolaria heteropoma (Zibrowius, 1968) (3, 5)

Pileolaria militaris Claparède, 1870 (3, 4, 5)

Protolaeospira Pixell, 1912

Protolaeospira striata (Quiévreux, 1963) (3, 5)

Simplaria Knight-Jones, 1984

Simplaria pseudomilitaris (Thiriot-Quévreux, 1965) (3, 4, 5)

Spirorbis Daudin, 1800

Spirorbis cuneatus Gee, 1964 (3, 5)

Spirorbis infundibulum Harris & Knight-Jones, 1964 (3, 5)

Spirorbis marioni Caullery & Mesnil, 1897 (3)

Vinearia Knight-Jones, 1984

Vinearia endoumensis (Zibrowius, 1968) (3, 5)

Vinearia koehlerii (Caullery & Mesnil, 1897) (3, 5)

Nerillidae

Mesonerilla Remane, 1949

Mesonerilla intermedia Wilke, 1953 (3)

Nerilla O. Schmidt, 1848

Nerilla antennata O. Schmidt, 1848 (3, 5)

Nerilla inopinata Gray, 1968 (3)

Nerillidium Remane, 1925

Nerillidium mediterraneum Remane, 1928 (3)

Troglochaetus Delachaux, 1921

Troglochaetus beranecki Delachaux, 1921 (N) (*)

Note

Troglochaetus beranecki: Polichete dulcacquicolo recentissimamente segnalato in Italia, raccolto nei pressi del Lago di Tovel (TN).

Saccocirridae

Saccocirrus Bobretzky, 1871

Saccocirrus maculatus Tenerelli, 1964 (5)

Saccocirrus major Pierantoni, 1907 (3, 5)

Saccocirrus papillocercus Bobretzky, 1871 (3, 5)

Saccocirrus parvus Gerlach, 1953 (3)

Protodrilidae

Protodrilus Hatschek, 1882

Protodrilus adhaerens Jägersten, 1952 (3)

Protodrilus affinis Jouin, 1968 (3)

Protodrilus brevis Jouin, 1970 (3)

Protodrilus ciliatus Jägersten, 1952 (3)

Protodrilus flavocapitatus Uljanin, 1877 (3)

Protodrilus gracilis Von Nordheim, 1989 (3)

Protodrilus hatscheki Pierantoni, 1908 (3)

Protodrilus hypoleucus Armenante, 1903 (3)

Protodrilus leuckartii Hatschek, 1882 (3, 5)

Protodrilus oculifer Pierantoni, 1908 (3)

Protodrilus purpureus (Schneider, 1868) (3)

Protodrilus spongioides Pierantoni, 1903 (3)

Protodriloididae

Protodriloides Jouin, 1966

Protodriloides chaetifer (Remane, 1926) (5)

Polygordiidae

Polygordius Schneider, 1868

Polygordius appendiculatus Fraipont, 1887 (3, 5)

Polygordius neapolitanus Fraipont, 1884 (3)

Polygordius triestinus Woltereck in Hempleman, 1906 (4)

Dinophilidae

Dinophilus O. Schmidt, 1848

Dinophilus gyrotilatus O. Schmidt, 1857 (3, 4)

Diurodrilidae

Diurodrilus Remane, 1925

Diurodrilus benazzii Gerlach, 1952 (3)

Diurodrilus dohrni Gerlach, 1953 (3)

Myzostomidae

Myzostomum Leuckart, 1827

Myzostomum alatum von Graff, 1884 (3)

Myzostomum cirriferum Leuckart in von Graff, 1884 (3, 4)

Myzostomum glabrum Leuckart in von Graff, 1877 (3, 4)

Myzostomum pulvinar von Graff, 1884 (3)

Oligochaeta

Lumbriculidae

Lumbriculus Grube, 1844

Lumbriculus variegatus (O.F. Müller, 1774) (N, S)

Trichodrilus Claparède, 1862

Trichodrilus allobrogum Claparède, 1862 (N, S)
Trichodrilus claparedei Hrabe, 1937 (S)
Trichodrilus leruthi Hrabe, 1937 (S)
Trichodrilus pragensis Vejdovský, 1875 (N)
Trichodrilus stammeri Hrabe, 1937 (N) (*)
Trichodrilus strandi Hrabe, 1936 (N)

Bichaeta Bretscher, 1900

Bichaeta sanguinea Bretscher, 1900 (N, S)

Stylodrilus Claparède, 1862

Stylodrilus aurantiacus (Pierantoni, 1904) (S) (*)
Stylodrilus brachystylus Hrabe, 1928 (S)
Stylodrilus heringianus Claparède, 1862 (N, S)
Stylodrilus lemani (Grube, 1879) (N, S)

Eclipidrilus Eisen, 1881

Eclipidrilus lacustris (Verrill, 1871) (N)

Rhynchelmis Hoffmeister, 1843

Rhynchelmis limosella Hoffmeister, 1843 (N)

Note

Trichodrilus stammeri: Specie di incerto stato sistematico.
Stylodrilus aurantiacus: Specie di dubbia validità, probabile sinonimo di *S. lemani*.

Haplotaxidae

Haplotaxis Hoffmeister, 1843

Haplotaxis gordioides (Hartmann, 1821) (N, S)

Tubificidae

Tubifex Lamarck, 1816

Tubifex blanchardi Vejdovský, 1891 (N)
Tubifex ignotus (Stolc, 1886) (N, S)

Tubifex nerthus Michaelsen, 1908 (N)
Tubifex newaensis (Michaelsen, 1903) (N) (*)
Tubifex tubifex (O.F. Müller, 1774) (N, S)

Heterochaeta Claparède, 1863

Heterochaeta costata Claparède, 1863 (N)

Limnodrilus Claparède, 1862

Limnodrilus claparedeianus Ratzel, 1868 (N, S)
Limnodrilus hoffmeisteri Claparède, 1862 (N, S)
Limnodrilus profundicula (Verrill, 1871) (N, S)
Limnodrilus udekemianus Claparède, 1862 (N, S)

Psammoryctides Hrabe, 1964

Psammoryctides albicola (Michaelsen, 1901) (N, S)
Psammoryctides barbatus (Grube, 1861) (N, S)

Potamotheix Vejdovský & Mrazek, 1902

Potamotheix bavaricus (Öschmann, 1913) (N)
Potamotheix bedoti (Piguet, 1913) (N)
Potamotheix hammoniensis (Michaelsen, 1901) (N, S)
Potamotheix heuscheri (Bretscher, 1900) (N, S)
Potamotheix vejdoskyi (Hrabe, 1941) (N)

Spirosperma Eisen, 1879

Spirosperma benedeni (d'Udekem, 1855) (N)
Spirosperma ferox (Eisen, 1879) (N)
Spirosperma velutinus (Grube, 1879) (N, S)

Frearidrilus Dumnicka, 1987

Frearidrilus pescei (Dumnicka, 1980) (S)

Haber Holmquist, 1978

Haber monfalconensis (Hrabe, 1966) (N)
Haber speciosus (Hrabe, 1931) (N)
Haber zavreli (Hrabe, 1942) (S)

Ilyodrilus Eisen, 1879

Ilyodrilus templetoni (Southern, 1909) (N)

Aulodrilus Bretscher, 1899

Aulodrilus limnobius Bretscher, 1899 (N, S)

Aulodrilus pigueti Kowalewski, 1914 (N)

Aulodrilus pluriseta (Piguet, 1906) (N, S)

Sketodrilus Karaman, 1976

Sketodrilus flabellisetosus (Hrabe, 1966) (N)

Rhyacodrilus Bretscher, 1901

Rhyacodrilus coccineus (Vejdovský, 1875) (N, S)

Rhyacodrilus falciformis Bretscher, 1901 (N) (*)

Monopylephorus Levinsen, 1884

Monopylephorus limosus (Hatai, 1888) (N)

Branchiura Beddard, 1892

Branchiura sowerbyi Beddard, 1892 (N, S)

Bothrioneurum Stolc, 1888

Bothrioneurum vej dovskyanum Stolc, 1888 (N, S)

Abyssidrilus Erséus, 1992

Abyssidrilus cuspis (Erséus & Dumnicka, 1988) (S)

Phallodrilus Pierantoni, 1902

Phallodrilus parthenopaeus Pierantoni, 1902 (3)

Aktedrilus Knöllner, 1935

Aktedrilus cuneus Erséus, 1984 (3, 4)

Aktedrilus magnus Erséus, 1980 (3) (E)

Aktedrilus mediterraneus (Erséus, 1980) (3, 4) (E)

Aktedrilus monospermathecus Knöllner, 1935 (4)

Aktedrilus sardus Erséus, 1987 (3) (E)

Gianius Erséus, 1992

Gianius densespectinis (Erséus, 1987) (3) (E)

Adelodrilus Cook, 1969

Adelodrilus pusillus Erséus, 1978 (3)

Thalassodrilus Brinkhurst, 1963

Thalassodrilus messanensis (Erséus, 1987) (3) (E)

Pectinodrilus Erséus, 1992

Pectinodrilus rectisetosus (Erséus, 1979) (3) (E)

Coralliodrilus Erséus, 1979

Coralliodrilus giacobbei Erséus, 1982 (3)

Coralliodrilus statutus Erséus, 1982 (3)

Coralliodrilus tyndariensis Erséus, 1982 (3)

Bathydrilus Cook, 1970

Bathydrilus adriaticus (Hrabe, 1971) (3)

Inanidrilus Erséus, 1979

Inanidrilus bononii Erséus, 1984 (3)

Heterodrilus Pierantoni, 1902

Heterodrilus arenicolus Pierantoni, 1902 (3) (E)

Heterodrilus subtilis (Pierantoni, 1917) (3) (E)

Limnodriloides Pierantoni, 1903

Limnodriloides agnes Hrabe, 1967 (3) (E)

Limnodriloides appendiculatus Pierantoni, 1903 (4, 5)

Limnodriloides hrabetovae Erséus, 1987 (4)

Limnodriloides maslinicensis (Hrabe, 1971) (4)

Limnodriloides pectinatus Pierantoni, 1904 (3) (E) (*)

Limnodriloides pierantonii (Hrabe, 1971) (3)

Limnodriloides roseus Pierantoni, 1904 (3) (E) (*)

Tectidrilus Erséus, 1982

Tectidrilus pranzoi Erséus, 1987 (3) (E)

Thalassodrilides Brinkhurst & Baker, 1979

Thalassodrilides gurwitschi (Hrabe, 1971) (3, 4)

Tubificoides Lastockin, 1937

Tubificoides swirencowi (Jaroshenko, 1948) (4)

Tubificoides vestibulatus Erséus & Bonomi, 1987 (4, 5) (E)

Note

Tubifex newaensis: Reperto da confermare.

Rhyacodrilus falciformis: Prima segnalazione italiana.

Limnodriloides pectinatus: Specie di dubbia validità.

Limnodriloides roseus: Specie di dubbia validità.

Naididae

Nais O.F. Müller, 1773

Nais alpina Sperber, 1948 (N, S)

Nais barbata O.F. Müller, 1773 (N, S, Si, Sa)

Nais behningi Michaelsen, 1923 (N)

Nais bretscheri Michaelsen, 1899 (N, S)

Nais christinae Kasprzak, 1973 (N, S) (*)

Nais communis Piguët, 1906 (N, S, Si, Sa)

Nais elinguis O.F. Müller, 1773 (N, S)

Nais pardalis Piguët, 1906 (N, S, Si, Sa)

Nais pseudobtusa Piguët, 1909 (N, S, Si, Sa)

Nais simplex Piguët, 1906 (N, S)

Nais stolci Hrabe, 1981 (S) (*)

Nais variabilis Piguët, 1906 (N, S, Si, Sa)

Uncinais Levinsen, 1884

Uncinais uncinata (Ørsted, 1842) (N, S)

Ophidonais Gervais, 1838

Ophidonais serpentina (O.F. Müller, 1773) (N, S)

Specaria Sperber, 1939

Specaria josinae (Vejdovský, 1883) (N, S)

Dero (Aulophorus) Schmarda, 1861

Dero (Aulophorus) furcata (O.F. Müller, 1773) (N, S, Sa)

Dero (Dero) Oken, 1815

Dero (Dero) digitata (O.F. Müller, 1773) (N, S, Sa)
Dero (Dero) dorsalis Ferronière, 1899 (Sa) (*)
Dero (Dero) nivea Aiyer, 1930 (Sa) (*)
Dero (Dero) obtusa d'Udekem, 1855 (N, S, Si, Sa)

Haemonais Bretscher, 1900

Haemonais waldvogeli Bretscher, 1900 (N)

Pristina Ehrenberg, 1828

Pristina aequisetata Bourne, 1891 (N, S, Si, Sa)
Pristina longisetata Ehrenberg, 1828 (S, Si, Sa)

Pristinella Brinkhurst, 1985

Pristinella amphibiotica (Lastockin, 1927) (N)
Pristinella bilobata (Bretscher, 1903) (N, Sa)
Pristinella jenkiniae (Stephenson, 1931) (N, S, Si, Sa)
Pristinella menoni (Aiyer, 1930) (N, S, Sa)
Pristinella notopora (Cernosvitov, 1937) (N) (*)
Pristinella osborni (Walton, 1906) (S) (*)
Pristinella rosea (Piguet, 1906) (N, S)
Pristinella sima (Marcus, 1944) (S) (*)

Chaetogaster von Baer, 1827

Chaetogaster cristallinus Vejdovský, 1883 (N, S)
Chaetogaster diaphanus (Gruithuisen, 1828) (N, S, Sa)
Chaetogaster diastrophus (Gruithuisen, 1828) (N, S, Si, Sa)
Chaetogaster langi Bretscher, 1896 (N, S)
Chaetogaster limnaei von Baer, 1827 (N, Si)
Chaetogaster parvus Pointner, 1914 (N) (*)

Amphichaeta Tauber, 1879

Amphichaeta leydigii Tauber, 1879 (S) (*)
Amphichaeta sannio Kallstenius, 1892 (S) (*)

Paranais Czerniavsky, 1880

Paranais birsteini Sokolskaya, 1971 (Si) (*)
Paranais frici Hrabe, 1941 (N, S)
Paranais litoralis (O.F. Müller, 1784) (N, Si)

Homochaeta Bretscher, 1896

Homochaeta naidina Bretscher, 1896 (N)

Homochaeta setosa (Moszynski, 1933) (N)

Stylaria Lamarck, 1816

Stylaria lacustris (Linnaeus, 1767) (N, S)

Vejdovskyella Michaelsen, 1903

Vejdovskyella comata (Vejdovský, 1883) (N, S)

Vejdovskyella intermedia (Bretscher, 1896) (N)

Slavina Vejdovský, 1883

Slavina appendiculata (d'Udekem, 1855) (N, S, Sa)

Note

Nais christinae: Prima segnalazione italiana.

Nais stolci: Prima segnalazione italiana.

Dero (Dero) dorsalis: Prima segnalazione italiana.

Dero (Dero) nivea: Prima segnalazione italiana.

Pristinella notopora: Prima segnalazione italiana.

Pristinella osborni: Prima segnalazione italiana.

Pristinella sima: Prima segnalazione italiana.

Chaetogaster parvus: Prima segnalazione italiana.

Amphichaeta leydigii: Prima segnalazione italiana.

Amphichaeta sannio: Prima segnalazione italiana.

Paranais birsteini: Prima segnalazione italiana.

Propappidae

Propappus Michaelsen, 1905

Propappus volki Michaelsen, 1922 (N, S)

Enchytraeidae

Mesenchytraeus Eisen, 1878

Mesenchytraeus armatus (Levinsen, 1884) (N, S)

Mesenchytraeus beumeri (Michaelsen, 1886) (N)

Mesenchytraeus flavidus Michaelsen, 1887 (N)

Mesenchytraeus gaudens Cognetti, 1903 (N)

Mesenchytraeus glandulosus (Levinsen, 1884) (N, S)

Mesenchytraeus pelicensis Issel, 1905 (N, S)

Mesenchytraeus straminicolus Rota, 1995 (S) (E)

Cernosvitoviella Nielsen & Christensen, 1959

Cernosvitoviella atrata (Bretscher, 1903) (S)

Cernosvitoviella goodhui Healy, 1975 (S)

Cernosvitoviella omodeoi Rota, 1995 (S) (E)

Stercutus Michaelsen, 1888

Stercutus niveus Michaelsen, 1888 (S)

Cognettia Nielsen & Christensen, 1959

Cognettia cognettii (Issel, 1905) (N)

Cognettia glandulosa (Michaelsen, 1888) (N)

Cognettia sphagnetorum (Vejdovský, 1878) (N, S)

Achaeta Vejdovský, 1878

Achaeta affinis Nielsen & Christensen, 1959 (S)

Achaeta bohémica (Vejdovský, 1879) sensu Nielsen & Christensen, 1959 (N, S) (*)

Achaeta camerani (Cognetti, 1899) (N)

Achaeta eiseni (Vejdovský, 1878) (N, S)

Achaeta etrusca Rota, 1995 (S) (E)

Enchytronia Nielsen & Christensen, 1959

Enchytronia parva Nielsen & Christensen, 1959 (S)

Henlea Michaelsen, 1889

Henlea heleotropha Stephenson, 1922 (N)

Henlea montana Rota, 1994 (S)

Henlea nasuta (Eisen, 1878) (N, S)

Henlea perpusilla Friend, 1911 (N, S) (*)

Henlea similis Nielsen & Christensen, 1959 (N)

Henlea stollii Bretscher, 1900 (N) (*)

Henlea ventriculosa (d'Udekem, 1854) (N, S, Sa)

Oconnorella Rota, 1995

Oconnorella chalupskyi Rota, 1995 (S)

Buchholzia Michaelsen, 1887

Buchholzia appendiculata (Buchholz, 1882) (N, S, Si)

Buchholzia fallax Michaelsen, 1887 (N, S, Si)

Buchholzia sarda Cognetti, 1901 (S, Sa) (E) (*)

Buchholzia simplex Nielsen & Christensen, 1963 (N, S)

Hemifridericia Nielsen & Christensen, 1959

Hemifridericia parva Nielsen & Christensen, 1959 (S)

Fridericia Michaelsen, 1889

Fridericia alpina Bretscher, 1899 (S) (*)

Fridericia aurita Issel, 1905 (N, S)

Fridericia bisetosa (Levinsen, 1884) (N, S, Sa)

Fridericia bretscheri Southern, 1907 (S) (*)

Fridericia bulboides Nielsen & Christensen, 1959 (S)

Fridericia bulbosa Rosa, 1887 (N, S, Si, Sa) (*)

Fridericia caprensis Bell, 1947 (S, Si) (*)

Fridericia connata Bretscher, 1902 (N, S)

Fridericia digitata Cognetti, 1901 (Sa) (E) (*)

Fridericia discifera Healy, 1975 (S)

Fridericia florentina Dequal, 1914 (S) (E)

Fridericia galba (Hoffmeister, 1843) (N, Sa)

Fridericia gamotheca Issel, 1905 (N, S) (*)

Fridericia gigantea Dequal, 1912 (S) (E)

Fridericia globuligera Rota, 1995 (S)

Fridericia ilvana Issel, 1905 (S) (E)

Fridericia isseli Rota, 1994 (S, Si)

Fridericia leydigi (Vejdovský, 1878) (N, S)

Fridericia maculata Issel, 1905 (N, S)

Fridericia miraflores Sesma & Dózsa-Farkas, 1993 (S)

Fridericia monochaeta Rota, 1995 (S) (E)

Fridericia monopera Cognetti, 1903 (N) (E) (*)

Fridericia nix Rota, 1995 (S) (E)

Fridericia paroniana Issel, 1904 (N, S)

Fridericia perrieri (Vejdovský, 1878) (N, S)

Fridericia polychaeta Bretscher, 1900 sensu Southern, 1907 (S) (*)

Fridericia ratzeli (Eisen, 1872) (N, S) (*)

Fridericia sardorum Cognetti, 1901 (Si, Sa) (*)

Fridericia strenua Rota, 1995 (S)

Fridericia striata (Levinsen, 1884) (N, S)

Fridericia tuberosa Rota, 1995 (S)

Fridericia tusca Dequal, 1914 (S) (E) (*)

Fridericia udei Bretscher, 1899 (S) (*)

Fridericia valdarnensis Dequal, 1914 (S) (E) (*)

Fridericia viridula Issel, 1904 (N, S) (*)

Enchytraeus Henle, 1837

Enchytraeus buchholzi Vejdovský, 1878 (N, S, Si, Sa) (*)

Enchytraeus bulbosus Nielsen & Christensen, 1963 (N, S, Si)

Enchytraeus florentinus Bell, 1947 (S) (E)
Enchytraeus minutus Nielsen & Christensen, 1959
Enchytraeus minutus minutus Nielsen & Christensen, 1959 (N, S, Si)
Enchytraeus norvegicus Abrahamsen, 1969 (S)

***Lumbricillus* Ørsted, 1844**

Lumbricillus catanensis Drago, 1887 (Si) (E) (*)
Lumbricillus lineatus (O.F. Müller, 1774) (N) (*)
Lumbricillus litoreus (Hesse, 1893) (S) (E) (*)
Lumbricillus pagenstecheri (Ratzel, 1869) (N) (*)
Lumbricillus russoi Drago, 1908 (Si) (E)

***Marionina* Michaelsen, 1889**

Marionina adriatica (Vejdovský, 1878) (N) (*)
Marionina argentea (Michaelsen, 1889) (N, S) (*)
Marionina brendae Rota, 1995 (S)
Marionina clavata Nielsen & Christensen, 1961 (S)
Marionina communis Nielsen & Christensen, 1959 (S)
Marionina eleonora Rota, 1995 (S) (E)
Marionina litterata (Hesse, 1893) (S) (*)
Marionina riparia Bretscher, 1899 (S)
Marionina rubens Rota, 1995 (S) (E)
Marionina simillima Nielsen & Christensen, 1959 (S)

***Grania* Southern, 1913**

Grania macrochaeta (Pierantoni, 1901) (3)
Grania maricola Southern, 1913 (3)
Grania ovitheca Erséus, 1977 (3)

Note

Achaeta bohemica: La segnalazione per il Nord (Piemonte) si riferisce forse a specie diversa.
Henlea perpusilla: Specie eterogenea su base morfologica e citologica.
Henlea stollii: Specie di dubbia validità ed incerta attribuzione generica.
Buchholzia sarda: Specie di dubbia validità.
Fridericia alpina: Specie di dubbia validità.
Fridericia bretscheri: Specie recentemente rivalidata (Rota, 1995).
Fridericia bulbosa: Comprende un complesso di specie.
Fridericia caprensis: Specie circummediterranea.
Fridericia digitata: Considerata specie dubbia da Nielsen & Christensen (1959).
Fridericia gamotheca: Considerata specie dubbia da Nielsen & Christensen (1959), recentemente rivalidata da Dózsa-Farkas (1989).
Fridericia monopera: Considerata specie dubbia (1959) e poi (1963) rivalidata da Nielsen & Christensen.
Fridericia polychaeta: Considerata specie dubbia da Nielsen & Christensen (1959), rivalidata

da Healy (1979).

Fridericia ratzei: Comprende un complesso di specie.

Fridericia sardorum: Considerata specie dubbia da Nielsen & Christensen (1959), rivalidata da Dózsa-Farkas (1989).

Fridericia tusca: Specie di dubbia validità.

Fridericia udei: Specie di dubbia validità.

Fridericia valdarnensis: Specie di dubbia validità.

Fridericia viridula: Specie recentemente rivalidata (Rota, 1995).

Enchytraeus buchholzi: Probabilmente comprende più specie.

Lumbricillus catanensis: Specie marina litoranea. Considerata specie dubbia da Nielsen & Christensen (1959).

Lumbricillus lineatus: Specie marina litoranea. Segnalazione dubbia da suoli ed acque cavernicole in Lombardia.

Lumbricillus litoreus: Specie marina litoranea. Considerata specie dubbia da Nielsen & Christensen (1959).

Lumbricillus pagenstecheri: Specie marina litoranea. Segnalazioni dubbie da suoli forestali in Emilia Romagna e acque sorgive in quota nelle Dolomiti.

Marionina adriatica: Specie marina litoranea. Considerata dubbia da Nielsen & Christensen (1959).

Marionina argentea: Frequente negli ambienti acquatici.

Marionina litterata: Specie marina litoranea. Considerata dubbia da Nielsen & Christensen (1959).

Criodrilidae

Criodrilus Hoffmeister, 1845

Criodrilus lacuum Hoffmeister, 1845 (N, S, Si) (*)

Note

Criodrilus lacuum: Forse comprende più specie.

Hormogastridae

Hormogaster Rosa, 1887

Hormogaster pretiosa Michaelsen, 1889 (Sa) (E)

Hormogaster redii Rosa, 1887 (S, Si, Sa)

Hormogaster samnitica Cognetti, 1914 (S, Sa)

Lumbricidae

Diporodrilus Bouché, 1970

Diporodrilus bouchei Omodeo, 1984 (Sa) (E)
Diporodrilus pilosus Bouché, 1970 (Sa)

Eiseniella Michaelsen, 1900

Eiseniella neapolitana (Oerley, 1885) (N, S, Si, Sa) (*)
Eiseniella tetraedra (Savigny, 1826) (N, S, Si, Sa)

Eisenia Michaelsen, 1900

Eisenia andrei Bouché, 1972 (N)
Eisenia fetida (Savigny, 1826) (N, S, Si, Sa) (*)
Eisenia parva (Eisen, 1874) (N)
Eisenia spelaea Rosa, 1901 (N, S)

Eiseniona Omodeo, 1956

Eiseniona gabriellae Omodeo, 1984
Eiseniona gabriellae gabriellae Omodeo, 1984 (Sa) (E)
Eiseniona gabriellae gallurae Omodeo, 1984 (Sa) (E)
Eiseniona handlirschi Rosa, 1827 (N)
Eiseniona sineporis Omodeo, 1952 (N) (E)

Lumbricus Linnaeus, 1758

Lumbricus castaneus Savigny, 1826 (N)
Lumbricus moeliboeus Rosa, 1884 (N)
Lumbricus rubellus Hoffmeister, 1843 (N, S, Si)
Lumbricus terrestris Linnaeus, 1758 (N)

Helodrilus Hoffmeister, 1845

Helodrilus antipai (Michaelsen, 1891) (N)
Helodrilus festai (Rosa, 1892) (Sa) (E)
Helodrilus oculatus Hoffmeister, 1845 (N, S)
Helodrilus patriarchalis (Rosa, 1893) (N)
Helodrilus tuberculatus Cernosvitov, 1935 (N)

Allolobophora Eisen, 1874

Allolobophora chlorotica (Savigny, 1826) (N, S, Si)
Allolobophora georgii Michaelsen, 1890 (N, S)
Allolobophora icterica (Savigny, 1826) (N)
Allolobophora jassyensis (Michaelsen, 1891) (N, S)
Allolobophora leoni Michaelsen, 1891 (N)
Allolobophora minuscula (Rosa, 1905) (N, S)
Allolobophora nematogena Rosa, 1903 (N)
Allolobophora rosea (Savigny, 1826) (N, S, Si, Sa)

Allolobophora schneideri Michaelsen, 1900 (N) (E)
Allolobophora smaragdina Rosa, 1892 (N)

Nicodrilus Bouché, 1972

Nicodrilus caliginosus Savigny, 1826 (N, S, Si, Sa)
Nicodrilus rubicundus Bouché, 1972 (N)
Nicodrilus terrestris Savigny, 1826 (N)
Nicodrilus trapezoides Dugès, 1828 (N, S, Si, Sa)

Microeophila Omodeo, 1956

Microeophila marcuzzii (Omodeo, 1952) (N)

Eophila Rosa, 1894

Eophila asconensis Bretscher, 1900 (N)
Eophila gestroi Cognetti, 1905 (N) (E)
Eophila tellinii (Rosa, 1888) (N) (E)

Scherotheca Bouché, 1972

Scherotheca corsicana (Pop, 1947) (*)
 Scherotheca corsicana corsicana (Pop, 1947) (Sa)
 Scherotheca corsicana simplex Zicsi, 1981 (S) (E)
Scherotheca dugesi (Rosa, 1895) (N)
Scherotheca januaeargenti (Cognetti, 1903) (S, Sa) (E)
Scherotheca osellai (Zicsi, 1981) (S) (E)
Scherotheca targionii Baldasseroni, 1906 (S) (E)

Bimastos Moore, 1893

Bimastos eiseni Levinsen, 1884 (N, S, Si) (*)

Dendrodrilus Omodeo, 1956

Dendrodrilus rubidus (Savigny, 1826) (N, S, Si, Sa)
Dendrodrilus subrubicundus (Eisen, 1874) (S)

Dendrobaena Eisen, 1874

Dendrobaena alpina (Rosa, 1884) (N)
Dendrobaena attemsi Michaelsen, 1902 (N)
Dendrobaena byblica (Rosa, 1893) (S, Si, Sa)
Dendrobaena cognettii Michaelsen, 1903
 Dendrobaena cognettii cognettii Michaelsen, 1903 (N, S, Si, Sa)
 Dendrobaena cognettii gallurensis Rota, 1992 (Sa) (E)
Dendrobaena hortensis (Michaelsen, 1889) (N, S)

Dendrobaena octaedra Savigny, 1826 (N)
Dendrobaena pantaleonis (Chinaglia, 1913) (S, Si, Sa)
Dendrobaena schmidtii Michaelsen, 1907
 Dendrobaena schmidtii juliana Omodeo, 1956 (N) (E)
Dendrobaena veneta (Rosa, 1886) (N)

Octolasium Oerley, 1885

Octolasium cyaneum Savigny, 1826 (N)
Octolasium lacteum Oerley, 1885 (N, S, Si)

Octodrilus Omodeo, 1956

Octodrilus boninoi (Omodeo, 1962) (N) (E)
Octodrilus complanatus (Dugès, 1828) (N, S, Si)
Octodrilus croaticus (Rosa, 1885) (N)
Octodrilus damiani (Cognetti, 1905) (N, S) (E) (*)
Octodrilus hemiandrus (Cognetti, 1901) (N, S, Si) (E) (*)
Octodrilus kamnensis Baldasseroni, 1919 (N) (E)
Octodrilus kovacevici Zicsi, 1970 (N)
Octodrilus lissaensioides Zicsi, 1971 (N) (*)
Octodrilus lissaensis (Michaelsen, 1881) (N)
Octodrilus mima (Rosa, 1889) (N) (E)
Octodrilus omodeoi Zicsi, 1981 (S) (E) (*)
Octodrilus phaenohemiandrus (Zicsi, 1971) (N) (*)
Octodrilus pseudocomplanatus (Omodeo, 1962) (N) (E)
Octodrilus pseudokovacevici Zicsi, 1971 (N)
Octodrilus rucneri Plisko & Zicsi, 1970 (N)
Octodrilus ruffoi Zicsi, 1981 (S)
Octodrilus transpadanoides Zicsi, 1981 (N)
Octodrilus transpadanus (Rosa, 1884) (N, S)

Note

Eiseniella neapolitana: Specie buona spesso indicata come sottospecie di *E. tetraedra*.

Eisenia fetida: Specie introdotta nell'Orto Botanico di Cagliari.

Eiseniona: Specie spesso incluse nel genere *Allolobophora* Eisen, 1874.

Scherotheca corsicana: La ssp. *simplex* è forse buona specie.

Bimastos eiseni: Specie di incerta attribuzione generica.

Octodrilus damiani: Specie di dubbia validità, probabile variante di *O. hemiander*.

Octodrilus hemiandrus: Specie molto variabile.

Octodrilus lissaensioides: Specie di dubbia validità, probabile variante di *O. lissaensis*.

Octodrilus omodeoi: Specie di dubbia validità, probabile variante di *O. hemiander*.

Octodrilus phaenohemiandrus: Specie di dubbia validità, probabile variante di *O. hemiander*.

Megascolecidae

***Amyntas* Kinberg, 1867**

Amyntas corticis (Kinberg, 1867) (N, S, Sa) (*)

Amyntas diffringens (Baird, 1869) (S) (*)

***Pontodrilus* Perrier, 1874**

Pontodrilus litoralis Grube, 1885 (Sa) (*)

Note

Amyntas corticis: Specie introdotta, originaria dell'Oriente asiatico.

Amyntas diffringens: Specie cosmopolita circumtropicale (introdotta con la coltura del riso?).

Pontodrilus litoralis: Specie marina litoranea.

Ocnerodrilidae

***Ocnerodrilus* Eisen, 1878**

Ocnerodrilus occidentalis Eisen, 1878 (Sa) (*)

Note

Ocnerodrilus occidentalis: Specie introdotta con la coltura del riso (dall'Africa?).

Acanthodrilidae

***Microscolex* Rosa, 1887**

Microscolex dubius (Fletscher, 1887) (S, Si, Sa) (*)

Microscolex phosphoreus (Dugès, 1837) (S, Si, Sa) (*)

Note

Microscolex dubius: Specie introdotta dal Sud-Africa o Sud-America.

Microscolex phosphoreus: Specie introdotta dal Sud-Africa o Sud-America.

Octochaetidae

***Dichogaster* Beddard, 1888**

Dichogaster modiglianii (Rosa, 1896) (N) (*)

Note

Dichogaster modiglianii: Specie circumtropicale rinvenuta presso le acque termali di Abano.

Branchiobdellae

Branchiobdellidae

Cambarincola Ellis, 1913

Cambarincola mesochoreus Hoffman, 1963 (N) (*)

Branchiobdella Odier, 1823

Branchiobdella astaci Odier, 1823 (N)

Branchiobdella hexodonta Gruber, 1883 (N)

Branchiobdella italica Canegallo, 1929 (N)

Branchiobdella parasita Henle, 1835 (N)

Branchiobdella pentodonta Whitman, 1882 (N, S)

Note

Cambarincola mesochoreus: Introdotta dall'America settentrionale.

Hirudinea

Glossiphoniidae

Glossiphonia Johnson, 1816

Glossiphonia complanata (Linnaeus, 1758) (N, S)

Glossiphonia heteroclita (Linnaeus, 1761) (N, S, Sa)

Helobdella Blanchard, 1896

Helobdella stagnalis (Linnaeus, 1758) (N, S, Sa)

Batracobdella Viguier, 1879

Batracobdella algira (Moquin-Tandon, 1846) (Sa)

Batracobdella paludosa (Carena, 1824) (N, S)

Theromyzon Philippi, 1867

Theromyzon tessulatum (O.F. Müller, 1774) (N)

Hemiclepsis Vejdowsky, 1884

Hemiclepsis marginata (O.F. Müller, 1774) (N, S)

Placobdella Blanchard, 1893

Placobdella costata (Fr. Müller, 1846) (N, S)

Piscicolidae

Piscicola De Blainville, 1818

Piscicola geometra (Linnaeus, 1758) (N, S)

Cystobranthus Diesing, 1859

Cystobranthus respirans (Troschel, 1850) (N)

Hemibdella Van Beneden & Hesse, 1863

Hemibdella soleae Van Beneden & Hesse, 1863 (3)

Pontobdella Leach, 1815

Pontobdella muricata (Linnaeus, 1758) (3, 5)

Pontobdella vosmaeri Apáthy, 1888 (3)

Trachelobdella Diesing, 1850

Trachelobdella lubrica (Grube, 1840) (3, 4)

Trachelobdella muelleri Diesing, 1850 (3)

Branchellion Savigny, 1820

Branchellion torpedinis Savigny, 1820 (3)

Ozobranchidae

Ozobranthus De Quatrefages, 1852

Ozobranthus margo (Apáthy, 1890) (3)

Hirudinidae

Hirudo Linnaeus, 1758

Hirudo medicinalis (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Limnatis Moquin-Tandon, 1826

Limnatis nilotica (Savigny, 1820) (S, Si, Sa)

Haemopidae

Haemopsis Savigny, 1820

Haemopsis sanguisuga (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Xerobdellidae

Xerobdella Von Frauenfeld, 1868

Xerobdella lecomtei Von Frauenfeld, 1868 (N)

Xerobdella praealpina Minelli, 1971 (N) (E)

Erpobdellidae

Erpobdella De Blainville, 1818

Erpobdella octoculata (Linnaeus, 1758) (N, S, Sa)

Erpobdella testacea (Savigny, 1820) (N, S)

Dina Blanchard, 1892

Dina lineata (O.F. Müller, 1774) (N, S, Si, Sa)

Dina apathyi Gedroyc, 1916 (N)

Trocheta Dutrochet, 1817

Trocheta subviridis Dutrochet, 1817 (N, S)

Trocheta bykowskii Gedroyc, 1913 (N, S)

Aphanoneura

Aeolosomatidae

Aeolosoma Ehrenberg, 1828

Aeolosoma balsamo Maggi, 1865 (N) (*)
Aeolosoma decorum Ehrenberg, 1831 (N) (*)
Aeolosoma headleyi (Beddard, 1888) (N)
Aeolosoma hemprichi Ehrenberg, 1828 (N, S)
Aeolosoma quaternarium (Ehrenberg, 1831) (N)
Aeolosoma variegatum Vejdovský, 1885 (N)
Aeolosoma viride Stephenson, 1911 (N)

Rheomorpha Ruttner-Kolisko, 1955

Rheomorpha neizvestnovae (Lastockin, 1935) (N)

Note

Aeolosoma balsamo: Specie di dubbia validità.
Aeolosoma decorum: Specie di dubbia validità.

Pogonophora

Siboglinidae

Siboglinum Caullery, 1914

Siboglinum carpinei (Ivanov, 1970) (3) (E) (*)

Note

Siboglinum carpinei: Presente nell'area presa in esame solo nel Mar di Corsica.

Echiura

Bonelliidae

Bonellia Rolando, 1821

Bonellia minor Marion, 1886 (3) (*)
Bonellia viridis Rolando, 1821 (3, 4, 5)

Maxmuelleria Bock, 1942

Maxmuelleria gigas (M. Müller, 1852) (3?, 4) (E) (*)

Protobonellia Ikeda, 1908

Protobonellia brevirhynchus Murina, 1982 (3) (E)

Note

Bonellia minor: Presente in Italia solo nel Golfo di Napoli.

Maxmuelleria: Le specie appartenenti a questo genere vengono attribuite tradizionalmente a *Thalassema* Lamarck, 1801.

Maxmuelleria gigas: La presenza di questa specie in 3, e quindi nei mari italiani, è da confermare.

Echiuridae

Echiurus Guerin-Meneville, 1831

Echiurus abyssalis Skorikov, 1906 (3)

Sipuncula

Aspidosiphonidae

Aspidosiphon Diesing, 1851

Aspidosiphon hispitrophus Li Graci, 1980 (5) (*)

Aspidosiphon kowalewski Murina, 1964 (4, 5?) (*)

Aspidosiphon muelleri Diesing, 1851 (3, 4, 5)

Note

Aspidosiphon hispitrophus: Le citazioni di *A. clavatus* Blainville, 1827 nei mari italiani sono da riferire ad *A. muelleri* Diesing, 1851.

Aspidosiphon kowalewski: La presenza di questa specie in 5, e quindi nei mari italiani, è da confermare.

Golfingiidae

Golfingia Lankester, 1885

Golfingia adriatica Murina, 1975 (4)

Golfingia elongata (Keferstein, 1863) (3, 4, 5)

Golfingia margaritacea (M. Sars, 1851) (3)

Golfingia vulgaris (Blainville, 1827) (3, 4, 5)

Nephasoma Pergament, 1946

Nephasoma abyssorum (Koren & Danielssen, 1876)
Nephasoma abyssorum mediterraneum Isern, 1975 (3)
Nephasoma minutum (Keferstein, 1862) (3?) (*)

Thysanocardia Fisher, 1950

Thysanocardia catharinae (Grube, 1868) (3, 4)
Thysanocardia procera (Möbius, 1875) (3)

Note

Golfingia: Alcune specie vengono attribuite tradizionalmente a *Phascolosoma* Leuckart, 1828.
Nephasoma: Alcune specie vengono attribuite tradizionalmente a *Golfingia* Lankaster, 1885.
Nephasoma minutum: La presenza di questa specie in 3, e quindi nei mari italiani, è da confermare.
Thysanocardia: Alcune specie vengono attribuite tradizionalmente a *Golfingia* Lankaster, 1885.

Phascolionidae

Onchnesoma Koren & Danielssen, 1875

Onchnesoma squamatum (Koren & Danielssen, 1875) (3, 5?) (*)
Onchnesoma steenstrupii Koren & Danielssen, 1875 (3, 4, 5)

Phascolion Théel, 1875

Phascolion mediterraneum Fisher, 1922 (3)
Phascolion strombi (Montagu, 1804) (3, 4, 5)

Note

Onchnesoma squamatum: La presenza di questa specie in 5, e quindi nei mari italiani, è da confermare.

Phascolosomatidae

Phascolosoma Leuckart, 1828

Phascolosoma agassizii Keferstein, 1866 (3)
Phascolosoma granulatum Leuckart, 1828 (3, 4, 5?) (*)

Note

Phascolosoma: Alcune specie vengono attribuite tradizionalmente a *Physcosoma* Selenka, 1897.

Phascolosoma granulatum: La presenza di questa specie in 5, e quindi nei mari italiani, è da confermare.

Sipunculidae

Sipunculus Linnaeus, 1766

Sipunculus nudus Linnaeus, 1766 (3, 4, 5)

Arthropoda

Arachnida

Scorpiones

Chactidae

Euscorpius Thorell, 1876

Euscorpius carpathicus (Linnaeus, 1767) (N, S, Si, Sa)

Euscorpius flavicaudis (de Geer, 1778) (N, S, Sa)

Euscorpius germanus (Schaeffer, 1766) (N)

Euscorpius italicus (Herbst, 1800) (N, S)

Palpigradi

Eukoeneniidae

Eukoenenia Börner, 1901

Eukoenenia austriaca (Hansen, 1926)

Eukoenenia austriaca austriaca (Hansen, 1926) (N)

Eukoenenia austriaca peregrina Condé, 1989 (N) (E)

Eukoenenia austriaca stinyi (Strouhal, 1936) (N)

Eukoenenia berlesei (Silvestri, 1905) (S)

Eukoenenia brignolii Condé, 1979 (S) (E)

Eukoenenia gasparoi Condé, 1988 (N)

Eukoenenia mirabilis (Grassi & Calandruccio, 1885) (Si)

Eukoenenia patrizii (Condé, 1956) (Sa) (E)

Eukoenenia spelaea (Peyerimhoff, 1902)

Eukoenenia spelaea hauseri Condé, 1974 (N)

Eukoenenia strinatii Condé, 1977 (N) (E)

Eukoenenia subangusta (Silvestri, 1905) (S) (E)

Solifugae

Daesiidae

Biton Karsch, 1880

Biton ehrenbergi Karsch, 1880 (Si)

Biton velox Simon, 1885 (Si)

Opiliones

Sironidae

Siro Latreille, 1796

Siro duricorius (Joseph, 1868) (N)

Siro valleurum Chemini, 1992 (N) (E)

Parasiro Hansen & Soerensen, 1904

Parasiro minor Juberthie, 1958 (Sa)

Travuniidae

Buemarinoa Roewer, 1956

Buemarinoa patrizii Roewer, 1956 (Sa) (E)

Peltonychia Roewer, 1935

Peltonychia leprieuri (Lucas, 1860) (N)

Peltonychia postumicola (Roewer, 1935) (N)

Erebomastriidae

Holoscotolemon Roewer, 1915

Holoscotolemon lessiniense Martens, 1978 (N) (E)

Holoscotolemon oreophilum Martens, 1978 (N) (E)

Holoscotolemon unicolor Roewer, 1915 (N)

Phalangodidae

Ptychosoma Soerensen, 1873

Ptychosoma vitellinum Soerensen, 1873 (S, Si, Sa)

Scotolemon Lucas, 1860

Scotolemon terricola Simon, 1872 (N, S, Si, Sa)

Nemastomatidae

Carinostoma Kratochvil, 1958

Carinostoma carinatum (Roewer, 1914) (N)

Centetostoma Kratochvil, 1958

Centetostoma centetes (Simon, 1881) (N)

Histicostoma Kratochvil, 1958

Histicostoma argenteolunulatum (Canestrini, 1875) (N, S, Si, Sa)

Histicostoma dentipalpe (Ausserer, 1867) (N)

Mitostoma Roewer, 1951

Mitostoma alpinum (Hadzi, 1931) (N)

Mitostoma anophthalmum (Fage, 1946) (N) (E)

Mitostoma chrysomelas (Hermann, 1804) (N, S)

Mitostoma orobicum (Caporiacco, 1949) (N) (E)

Mitostoma patrizii Roewer, 1953 (Sa) (E)

Mitostoma valdemonense Marcellino, 1975 (S, Si) (E)

Nemastoma C.L. Koch, 1836

Nemastoma bidentatum Roewer, 1914

Nemastoma bidentatum bidentatum Roewer, 1914 (N)

Nemastoma dentigerum Canestrini, 1873 (N, S)

Nemastoma triste (C.L. Koch, 1835) (N)

Paranemastoma Redikorzew, 1936

Paranemastoma quadripunctatum (Perty, 1833) (N)

Dicranolasmatidae

Dicranolasma Soerensen, 1873

- Dicranolasma apuanum* Marcellino, 1970 (N, S) (E)
- Dicranolasma cristatum* Thorell, 1876 (N, S) (E)
- Dicranolasma hirtum* Loman, 1894 (S) (E)
- Dicranolasma kettysae* Marcellino, 1968 (S) (E)
- Dicranolasma opilionoides* (L. Koch, 1867) (S)
- Dicranolasma pauper* Dahl, 1903 (N) (E)
- Dicranolasma soerenseni* Thorell, 1876 (N, S, Si, Sa)

Trogulidae

Calathocratus Simon, 1879

- Calathocratus africanus* (Lucas, 1847) (Si)

Trogulocratus Roewer, 1940

- Trogulocratus sinuosus* (Soerensen, 1873) (S) (E)

Trogulus Latreille, 1892

- Trogulus cisalpinus* Chemini & Martens, 1988 (N)
- Trogulus coriziformis* C. L. Koch, 1839 (N, S)
- Trogulus graecus* Dahl, 1903 (S)
- Trogulus martensi* Chemini, 1983 (N) (E)
- Trogulus nepaeformis* (Scopoli, 1763) (N, S)
- Trogulus tingiformis* C. L. Koch, 1848 (N)
- Trogulus tricarinatus* (Linnaeus, 1767) (N, S)

Anelasmaocephalus Simon, 1879

- Anelasmaocephalus brignolii* Martens & Chemini, 1988 (Sa) (E)
- Anelasmaocephalus calcaneatus* Martens & Chemini, 1988 (Si) (E)
- Anelasmaocephalus cambridgei* (Westwood, 1874) (N)
- Anelasmaocephalus hadzii* Martens, 1978 (N)
- Anelasmaocephalus lycosinus* Soerensen, 1873 (S) (E)
- Anelasmaocephalus osellai* Martens & Chemini, 1988 (S) (E)
- Anelasmaocephalus rufitarsis* Simon, 1879 (N)
- Anelasmaocephalus tenuiglandis* Martens & Chemini, 1988 (N)
- Anelasmaocephalus tuscus* Martens & Chemini, 1988 (N, S) (E)

Ischyropsalididae

Ischyropsalis C.L. Koch, 1839

- Ischyropsalis adamii* Canestrini, 1873 (N, S, Sa) (E)
- Ischyropsalis carli* Lessert, 1905 (N)
- Ischyropsalis dentipalpis* Canestrini, 1872 (N) (E)
- Ischyropsalis kollari* C. L. Koch, 1839 (N)
- Ischyropsalis muellneri* Hamann, 1898 (N)
- Ischyropsalis pyrenaea* Simon, 1872
 - Ischyropsalis pyrenaea alpinula* Martens, 1978 (N) (E)
- Ischyropsalis ravasinii* Hadzi, 1942 (N) (E)
- Ischyropsalis strandi* Kratochvil, 1936 (N) (E)

Sabaconidae

Sabacon Simon, 1879

- Sabacon simoni* Dresco, 1952 (N, S)

Phalangiidae

Metaphalangium Roewer, 1911

- Metaphalangium mirabilis* (Caporiacco, 1949) (Si) (E)
- Metaphalangium propinquum* (Lucas, 1847) (N, S, Si, Sa)

Zachaeus C.L. Koch, 1839

- Zachaeus crista* (Brullé, 1832) (S)

Dasylobus Simon, 1879

- Dasylobus argentatus* (Canestrini, 1871)
 - Dasylobus argentatus argentatus* (Canestrini, 1871) (Sa)
 - Dasylobus argentatus cavipalpis* Gruber, 1965 (S, Si) (E)
- Dasylobus cavannae* Simon, 1882 (S) (E)
- Dasylobus gestroi* (Thorell, 1876) (Sa)
- Dasylobus graniferus* (Canestrini, 1871) (N, S, Si)

Phalangium Linnaeus, 1758

- Phalangium ligusticum* (Roewer, 1923) (N)
- Phalangium opilio* Linnaeus, 1758 (N, S, Sa)
- Phalangium targionii* (Canestrini, 1871) (Si, Sa)

Rilaena Silhavy, 1965

Rilaena augusti Chemini, 1986 (S) (E)
Rilaena triangularis (Herbst, 1799) (N)

Lophopilio Hadzi, 1931

Lophopilio palpinalis (Herbst, 1799) (N)

Metaplatybunus Roewer, 1911

Metaplatybunus denticulatus Marcellino, 1972 (Si) (E)

Megabunus Meade, 1855

Megabunus armatus (Kulczynski, 1887) (N)
Megabunus bergomas Chemini, 1985 (N) (E)
Megabunus rhinoceros (Canestrini, 1872) (N)
Megabunus vignai Martens, 1978 (N) (E)

Platybunus C.L. Koch, 1848

Platybunus alpinorelictus Martens, 1978 (N) (E)
Platybunus bucephalus (C. L. Koch, 1835) (N)
Platybunus pinetorum (C. L. Koch, 1835) (N)

Opilio Herbst, 1798

Opilio canestrinii (Thorell, 1876) (N, S, Si)
Opilio dinaricus Silhavy, 1938 (N)
Opilio parietinus (De Geer, 1778) (N, S)
Opilio saxatilis C. L. Koch, 1839 (N, S)
Opilio transversalis Roewer, 1956 (N, S)

Mitopus Thorell, 1876

Mitopus glacialis (Fabricius, 1799) (N)
Mitopus morio (Fabricius, 1799) (N, S)

Oligolophus C. Koch, 1871

Oligolophus tridens (C. L. Koch, 1836) (N)

Lacinius Thorell, 1876

Lacinius dentiger (C. L. Koch, 1848) (N)
Lacinius ehippiatus (C. L. Koch, 1835) (N)

Lacinius horridus (Panzer, 1794) (N, S, Si)

Odiellus Roewer, 1923

Odiellus granulatus (Canestrini, 1871) (N, S)

Odiellus spinosus (Bosc, 1792) (N, S, Si?)

Odiellus troguloides (Lucas, 1847) (N, S)

Sclerosomatidae

Astrobunus Thorell, 1876

Astrobunus bernardinus Simon, 1879 (N, S)

Astrobunus helleri (Ausserer, 1867) (N)

Astrobunus kochi Thorell, 1876 (N, S) (E)

Astrobunus laevipes (Canestrini, 1872) (N)

Metasclerosoma Roewer, 1912

Metasclerosoma depressum (Canestrini, 1872) (N, S) (E)

Metasclerosoma sardum (Thorell, 1876) (Sa) (E)

Metasclerosoma siculum Marcellino, 1970 (Si) (E)

Mastobunus Simon, 1879

Mastobunus tuberculifer (Lucas, 1847) (Si)

Homalenotus C.L. Koch, 1839

Homalenotus buchneri (Schenkel, 1936) (S)

Leiobunum C.L. Koch, 1839

Leiobunum limbatum L. Koch, 1861 (N)

Leiobunum nigripalpe Simon, 1879 (N)

Leiobunum religiosum Simon, 1879 (N)

Leiobunum roseum C. L. Koch, 1839 (N)

Leiobunum rotundum (Latreille, 1798) (N)

Leiobunum rupestre (Herbst, 1799) (N)

Nelima Roewer, 1910

Nelima apenninica Martens, 1969 (N, S)

Nelima doriae (Canestrini, 1871) (N, S, Si, Sa)

Nelima meridionalis Marcellino, 1972 (S, Si) (E)

Nelima recurvipenis Martens, 1969 (S)

Nelima semproni Szalay, 1951 (N, S)

Gyas Simon, 1879

Gyas annulatus (Olivier, 1791) (N)

Gyas titanus Simon, 1879 (N?, S)

Amilenus Martens, 1969

Amilenus aurantiacus (Simon, 1881) (N)

Dicranopalpus Doleschall, 1852

Dicranopalpus brevipes Marcellino, 1970 (Si) (E)

Dicranopalpus gasteinensis Doleschall, 1852 (N)

Dicranopalpus larvatus (Canestrini, 1874) (S, Si) (E)

Pseudoscorpionida

Chthoniidae

Chthonius (*Chthonius*) C.L. Koch, 1843

Chthonius (*Chthonius*) *agazzii* Beier, 1966 (N) (E)

Chthonius (*Chthonius*) *alpicola* Beier, 1951 (N)

Chthonius (*Chthonius*) *baccettii* Callaini, 1980 (N) (E)

Chthonius (*Chthonius*) *brandmayri* Callaini, 1986 (N)

Chthonius (*Chthonius*) *caprai* Gardini, 1977 (N, S, Si) (E)

Chthonius (*Chthonius*) *caoduroi* Callaini, 1987 (S) (E)

Chthonius (*Chthonius*) *comottii* Inzaghi, 1987 (N) (E)

Chthonius (*Chthonius*) *doderoi* Beier, 1930

Chthonius (*Chthonius*) *doderoi doderoi* Beier, 1930 (N)

Chthonius (*Chthonius*) *doderoi horridus* Beier, 1934 (N) (E)

Chthonius (*Chthonius*) *ellingseni* Beier, 1939 (N)

Chthonius (*Chthonius*) *elongatus* Lazzeroni, 1970 (S) (E)

Chthonius (*Chthonius*) *euganeus* Gardini, 1991 (N) (E)

Chthonius (*Chthonius*) *guglielmii* Callaini, 1986 (N) (E)

Chthonius (*Chthonius*) *ilvensis* Beier, 1963 (N, S) (E)

Chthonius (*Chthonius*) *ischnocheles* (Hermann, 1804) (N, S, Si, Sa)

Chthonius (*Chthonius*) *ischnocheloides* Beier, 1973 (N) (E)

Chthonius (*Chthonius*) *italicus* Beier, 1930 (N)

Chthonius (*Chthonius*) *jonicus* Beier, 1931 (S, Si)

Chthonius (*Chthonius*) *jugorum* Beier, 1952 (N)

Chthonius (*Chthonius*) *lanzai* Caporiacco, 1947

Chthonius (*Chthonius*) *lanzai lanzai* Caporiacco, 1947 (S) (E)

Chthonius (*Chthonius*) *lanzai vannii* Callaini, 1986 (S) (E)

Chthonius (*Chthonius*) *leoi* (Callaini, 1988) (Sa) (E)

Chthonius (Chthonius) lessiniensis Schawaller, 1982 (N) (E)
Chthonius (Chthonius) ligusticus Beier, 1930 (N) (E)
Chthonius (Chthonius) malatestai Callaini, 1980 (N) (E)
Chthonius (Chthonius) mingazzinii Callaini, 1991 (N) (E)
Chthonius (Chthonius) multidentatus Beier, 1963 (Si) (E)
Chthonius (Chthonius) orthodactylus (Leach, 1817) (N, S, Si, Sa)
Chthonius (Chthonius) paolettii Beier, 1973 (N) (E)
Chthonius (Chthonius) pivai Gardini, 1991 (N) (E)
Chthonius (Chthonius) pygmaeus Beier, 1934
 Chthonius (Chthonius) pygmaeus carinthiacus Beier, 1951 (N)
Chthonius (Chthonius) raridentatus Hadzi, 1930 (N)
Chthonius (Chthonius) resslie Beier, 1956 (N)
Chthonius (Chthonius) ruffoi Caporiacco, 1949 (S, Si) (E)
Chthonius (Chthonius) stammeri Beier, 1942 (S) (E)
Chthonius (Chthonius) submontanus Beier, 1963 (N)
Chthonius (Chthonius) tenuis L. Koch, 1873 (N, S, Si, Sa)

***Chthonius (Globochthonius)* Beier, 1931**

Chthonius (Globochthonius) globifer E. Simon, 1879 (N)
Chthonius (Globochthonius) spelaeophilus Hadzi, 1930
 Chthonius (Globochthonius) spelaeophilus histicus Beier, 1931 (N)

***Chthonius (Ephippiochthonius)* Beier, 1930**

Chthonius (Ephippiochthonius) aegatensis Callaini, 1989 (Si) (E)
Chthonius (Ephippiochthonius) apulicus Beier, 1958 (S, Si) (E)
Chthonius (Ephippiochthonius) bartolii Gardini, 1976 (N) (E)
Chthonius (Ephippiochthonius) bauneensis Callaini, 1983 (Sa) (E)
Chthonius (Ephippiochthonius) berninii Callaini, 1983 (Sa) (E)
Chthonius (Ephippiochthonius) boldorii Beier, 1934 (N)
Chthonius (Ephippiochthonius) cassolai Beier, 1973 (Sa) (E)
Chthonius (Ephippiochthonius) cavicola Gardini, 1990 (N) (E)
Chthonius (Ephippiochthonius) concii Beier, 1953 (N) (E)
Chthonius (Ephippiochthonius) elbanus Beier, 1963 (N, S, Sa)
Chthonius (Ephippiochthonius) fuscimanus E. Simon, 1900 (N)
Chthonius (Ephippiochthonius) genuensis Gardini, 1990 (N) (E)
Chthonius (Ephippiochthonius) gestroi E. Simon, 1896 (N) (E)
Chthonius (Ephippiochthonius) gibbus Beier, 1953 (S, Si, Sa)
Chthonius (Ephippiochthonius) grafitii Gardini, 1981 (Sa) (E)
Chthonius (Ephippiochthonius) lucanus Callaini, 1984 (S) (E)
Chthonius (Ephippiochthonius) maltensis Mahnert, 1975 (Si)
Chthonius (Ephippiochthonius) nanus Beier, 1953 (N) (E)
Chthonius (Ephippiochthonius) parmensis Beier, 1963 (N, S) (E)
Chthonius (Ephippiochthonius) pieltaini Beier, 1930 (N) (E)
Chthonius (Ephippiochthonius) poseidonis Gardini, 1993 (Sa) (E)
Chthonius (Ephippiochthonius) sculus Beier, 1961 (S, Si, Sa)
Chthonius (Ephippiochthonius) tetrachelatus (Preyssler, 1790) (N, S, Si, Sa)

Chthonius (Ehippichthonius) troglophilus Beier, 1930 (N) (E)
Chthonius (Ehippichthonius) zoiai Gardini, 1990 (N) (E)

Spelyngochthonius Beier, 1955

Spelyngochthonius beieri Gardini, 1994 (Sa) (E)
Spelyngochthonius grafittii Gardini, 1994 (Sa) (E)
Spelyngochthonius sardous Beier, 1955 (Sa) (E)

Paraliochthonius Beier, 1956

Paraliochthonius singularis (Menozzi, 1924) (N, S, Si, Sa)

Troglochthonius Beier, 1939

Troglochthonius doratodactylus Helversen, 1968 (N) (E)

Neobisiidae

Neobisium (Neobisium) J.C. Chamberlin, 1930

Neobisium (Neobisium) apuanicum Callaini, 1981 (S) (E)
Neobisium (Neobisium) bernardi Vachon, 1937
 Neobisium (Neobisium) bernardi gennargentui Callaini, 1983 (Sa) (E)
Neobisium (Neobisium) caporiaccoi Heurtault-Rossi, 1966 (N) (E)
Neobisium (Neobisium) carcinoides (Hermann, 1804) (N, S, Si, Sa)
Neobisium (Neobisium) chironomum (L. Koch, 1873) (N) (E)
Neobisium (Neobisium) distinctum (Beier, 1928) (N)
Neobisium (Neobisium) doderoi (E. Simon, 1896) (N, S, Si, Sa)
Neobisium (Neobisium) doliodactylum (Canestrini, 1874) (N, S)
Neobisium (Neobisium) dolomiticum Beier, 1952 (N)
Neobisium (Neobisium) erythrodactylum (L. Koch, 1873) (N, S)
Neobisium (Neobisium) fuscilli Callaini, 1983 (S) (E)
Neobisium (Neobisium) fuscimanum (C.L. Koch, 1843) (N)
Neobisium (Neobisium) galeatum Beier, 1953 (N)
Neobisium (Neobisium) incertum J.C. Chamberlin, 1930 (Sa) (E)
Neobisium (Neobisium) jugorum (L. Koch, 1873) (N)
Neobisium (Neobisium) lombardicum Beier, 1934
 Neobisium (Neobisium) lombardicum lombardicum Beier, 1934 (N) (E)
 Neobisium (Neobisium) lombardicum martaе Menozzi, 1920 (N) (E)
Neobisium (Neobisium) minimum (Beier, 1928) (N, S)
Neobisium (Neobisium) nemorense Callaini, 1991 (Si) (E)
Neobisium (Neobisium) osellai Callaini, 1983 (S) (E)
Neobisium (Neobisium) pacei Callaini, 1991 (Si)
Neobisium (Neobisium) praecipuum (E. Simon, 1879) (N, Sa)
Neobisium (Neobisium) ruffoi Beier, 1958 (S) (E)
Neobisium (Neobisium) simile (L. Koch, 1873) (N, S, Si)

Neobisium (Neobisium) simoni (L. Koch, 1873)
 Neobisium (Neobisium) simoni simoni (L. Koch, 1873) (N, S)
 Neobisium (Neobisium) simoni petzi Beier, 1939 (N)
Neobisium (Neobisium) sublaeve (E. Simon, 1879) (Sa)
Neobisium (Neobisium) sylvaticum (C.L. Koch, 1835) (N, S)
Neobisium (Neobisium) trentinum Beier, 1931
 Neobisium (Neobisium) trentinum trentinum Beier, 1931 (N) (E)
 Neobisium (Neobisium) trentinum ghidinii Beier, 1942 (N) (E)

***Neobisium (Ommatoblothrus)* Beier, 1956**

Neobisium (Ommatoblothrus) battonii Beier, 1966 (S) (E)
Neobisium (Ommatoblothrus) cerrutii Beier, 1955 (S) (E)
Neobisium (Ommatoblothrus) henroti Beier, 1956 (Sa) (E)
Neobisium (Ommatoblothrus) lulense Gardini, 1982 (Sa) (E)
Neobisium (Ommatoblothrus) oenotricum Callaini, 1987 (S) (E)
Neobisium (Ommatoblothrus) patrizii Beier, 1953
 Neobisium (Ommatoblothrus) patrizii patrizii Beier, 1953 (S) (E)
 Neobisium (Ommatoblothrus) patrizii romanum Mahnert, 1980 (S) (E)
Neobisium (Ommatoblothrus) samniticum Mahnert, 1980 (S) (E)
Neobisium (Ommatoblothrus) sardoum Beier, 1956 (Sa) (E)
Neobisium (Ommatoblothrus) zoiai Gardini & Rizzerio, 1986 (N) (E)

***Neobisium (Blothrus)* Schiödte, 1847**

Neobisium (Blothrus) reimoseri (Beier, 1929) (N)
Neobisium (Blothrus) spelaeum (Schiödte, 1847)
 Neobisium (Blothrus) spelaeum istriacum (G. Müller, 1931) (N)
Neobisium (Blothrus) torrei (E. Simon, 1881) (N) (E)

***Neobisium (Neoccitanobisium)* Callaini, 1981**

Neobisium (Neoccitanobisium) ligusticum (Callaini, 1981) (N)

***Roncus* L. Koch, 1873**

Roncus abditus (J.C. Chamberlin, 1930) (Sa)
Roncus aetnensis Gardini & Rizzerio, 1987 (Si) (E)
Roncus alpinus L. Koch, 1873 (N)
Roncus andreinii (Caporiacco, 1925) (N, S) (E)
Roncus antrorum (E. Simon, 1896) (N) (E)
Roncus assimilis Beier, 1931 (N) (E)
Roncus baccettii Lazzeroni, 1969 (Sa) (E)
Roncus beieri Caporiacco, 1947 (S) (E)
Roncus belluatii Gardini, 1992 (N) (E)
Roncus binaghii Gardini, 1991 (N)
Roncus caprai Gardini, 1993 (N) (E)
Roncus caralitanus Gardini, 1981 (Sa) (E)

Roncus carusoi Gardini & Rizzerio, 1987 (Si) (E)
Roncus cassolai Beier, 1973 (Sa) (E)
Roncus dallaii Callaini, 1979 (Sa) (E)
Roncus gestroi Beier, 1930 (N) (E)
Roncus grafittii Gardini, 1982 (Sa) (E)
Roncus ingaunus Gardini, 1991 (N) (E)
Roncus italicus (E. Simon, 1896) (N) (E)
Roncus julianus Caporiacco, 1949 (N)
Roncus leonidae Beier, 1942
 Roncus leonidae leonidae Beier, 1942 (N) (E)
 Roncus leonidae ruffoi Gardini, 1991 (N) (E)
Roncus ligusticus Beier, 1930 (N) (E)
Roncus melloguensis Gardini, 1982 (Sa) (E)
Roncus menozzii (Caporiacco, 1923) (N) (E)
Roncus paolettii Mahnert, 1980 (N) (E)
Roncus puddui Mahnert, 1976 (Sa) (E)
Roncus sandalioticus Gardini, 1982 (Sa) (E)
Roncus sardous Beier, 1955 (Sa) (E)
Roncus siculus Beier, 1963 (Si) (E)
Roncus troglophilus Beier, 1931 (N) (E)
Roncus tuberculatus Gardini, 1991 (N) (E)
Roncus turritanus Gardini, 1982 (Sa) (E)
Roncus zoiai Gardini & Rizzerio, 1987 (Sa) (E)
Roncus sp. (N, S, Si, Sa) (A)

Microbisium J.C. Chamberlin, 1930

Microbisium suecicum Lohmander, 1945 (N)

Acanthocreagris Mahnert, 1974

Acanthocreagris agazzii (Beier, 1966) (N) (E)
Acanthocreagris apuanica Callaini, 1986 (S) (E)
Acanthocreagris apulica Callaini, 1986 (S) (E)
Acanthocreagris italica (Beier, 1958)
 Acanthocreagris italica italica (Beier, 1958) (S, Si)
 Acanthocreagris italica ruffoi (Lazzeroni, 1969) (S) (E)
Acanthocreagris lanzai (Beier, 1961) (S) (E)
Acanthocreagris microphthalma Callaini, 1986 (S) (E)
Acanthocreagris myops (E. Simon, 1881) (N)
Acanthocreagris sandaliotica Callaini, 1986 (Sa) (E)
Acanthocreagris sardoa (Beier, 1959) (Sa) (E)

Balkanoroncus Curcic, 1975

Balkanoroncus boldorii (Beier, 1931) (N) (E)

Syarinidae

Microcreagrina Beier, 1961

Microcreagrina hispanica (Ellingsen, 1910) (Si, Sa)

Hadoblothrus Beier, 1952

Hadoblothrus gigas (Caporiacco, 1951) (S) (E)

Pseudoblothrus Beier, 1931

Pseudoblothrus ellingseni (Beier, 1929) (N) (E)

Pseudoblothrus regalini Inzaghi, 1983 (N) (E)

Pseudoblothrus sp. (N) (E, A)

Garypidae

Garypus L. Koch, 1873

Garypus beauvoisi (Audouin, 1826) (S, Si, Sa)

Garypus levantinus Navás, 1925 (N, S, Si, Sa)

Larcidae

Larca J.C. Chamberlin, 1930

Larca italica Gardini, 1983 (S) (E)

Cheiridiidae

Cheiridium Menge, 1855

Cheiridium museorum (Leach, 1817) (N, S)

Apocheiridium J.C. Chamberlin, 1924

Apocheiridium ferum (E. Simon, 1879) (N, S, Sa)

Geogarypidae

Geogarypus J.C. Chamberlin, 1930

Geogarypus minor (L. Koch, 1873) (N, S, Si, Sa)
Geogarypus nigrimanus (E. Simon, 1879) (N, S, Si, Sa)

Olpiidae

Olpium L. Koch, 1873

Olpium pallipes (Lucas, 1849) (N, S, Si, Sa)

Minniza E. Simon, 1881

Minniza algerica Beier, 1931 (Si)
Minniza deserticola E. Simon, 1885 (S, Si)

Calocheiridius Beier & Turk, 1952

Calocheiridius libanoticus Beier, 1955 (S, Si, Sa)
Calocheiridius mavromoustakisi Beier & Turk, 1952 (N, S)
Calocheiridius olivieri (E. Simon, 1879) (Sa)

Garypinus Daday, 1888

Garypinus dimidiatus (L. Koch, 1873) (Si)

Amblyolpium E. Simon, 1898

Amblyolpium dollfusi E. Simon, 1898 (S, Sa)

Withiidae

Withius Kew, 1911

Withius hispanus (L. Koch, 1873) (N, S, Si, Sa)
Withius piger (E. Simon, 1878) (N, S, Si, Sa)

Cheliferidae

Hysterochelifer J.C. Chamberlin, 1932

Hysterochelifer meridianus (L. Koch, 1873) (N, S, Si, Sa)
Hysterochelifer tuberculatus (Lucas, 1849) (N, S, Si, Sa)
Hysterochelifer sp. A (Si, Sa)

Mesochelifer Vachon, 1940

*Mesochelifer ressl*i Mahnert, 1981 (N)
Mesochelifer sp. A (S, Si)

Chelifer Geoffroy, 1762

Chelifer cancroides (Linné, 1758) (N, S, Sa)

Dactylochelifer Beier, 1932

Dactylochelifer falsus (Beier, 1930) (Si, Sa)
Dactylochelifer latreillei (Leach, 1817) (N, S, Si, Sa)

Rhacochelifer Beier, 1932

Rhacochelifer corcyrensis (Beier, 1930) (N, S)
Rhacochelifer disjunctus (L. Koch, 1873) (N, S)
Rhacochelifer maculatus (L. Koch, 1873) (N, S, Si, Sa)
Rhacochelifer peculiaris (L. Koch, 1873) (N, S, Si, Sa)

Beierochelifer Mahnert, 1977

Beierochelifer peloponnesiacus (Beier, 1929) (S, Sa)

Cheirochelifer Beier, 1967

Cheirochelifer heterometrus (L. Koch, 1873) (Sa)

Chernetidae

Lamprochernes Tömösváry, 1882

Lamprochernes chyzeri (Tömösváry, 1882) (N, S)
Lamprochernes nodosus (Schränk, 1803) (N, S)

Pselaphochernes Beier, 1932

Pselaphochernes anachoreta (E. Simon, 1878) (S, Sa)
Pselaphochernes italicus Beier, 1966 (S) (E)
Pselaphochernes lacertosus (L. Koch, 1873) (N, S, Si, Sa)
Pselaphochernes litoralis Beier, 1956
 Pselaphochernes litoralis litoralis Beier, 1956 (S)
 Pselaphochernes litoralis siculus Beier, 1963 (Si, Sa) (E)
Pselaphochernes scorpoides (Hermann, 1804) (N, S, Si, Sa)

Lasiochernes Beier, 1932

Lasiochernes pilosus (Ellingsen, 1910) (N)

Lasiochernes sculus Beier, 1961 (S, Si) (E)

Allochernes Beier, 1932

Allochernes aetnaeus Beier, 1975 (Si) (E)

Allochernes contarinii Callaini, 1991 (N) (E)

Allochernes masi (Navás, 1923) (Si, Sa)

Allochernes powelli (Kew, 1916) (N, S, Sa)

Allochernes siciliensis (Beier, 1963) (S, Si, Sa)

Allochernes solarii (E. Simon, 1898) (N) (E)

Allochernes wideri (C.L. Koch, 1843)

Allochernes wideri wideri (C.L. Koch, 1843) (N)

Allochernes wideri phaleratus (E. Simon, 1879) (N, S, Sa)

Dinocheirus J.C. Chamberlin, 1929

Dinocheirus panzeri (C.L. Koch, 1837) (N, S, Sa)

Chernes Menge, 1855

Chernes cimicoides (Fabricius, 1793) (N, S, Si, Sa)

Chernes montigenus (E. Simon, 1879) (N)

Dendrochernes Beier, 1932

Dendrochernes cyrneus (L. Koch, 1873) (S, Si)

Atemnidae

Atemnus Canestrini, 1884

Atemnus politus (E. Simon, 1878) (N, S, Si, Sa)

Araneae

Atypidae

Atypus Latreille, 1804

Atypus affinis Eichwald, 1830 (N, S)

Atypus muralis Bertkau, 1890 (N)

Atypus piceus (Sulzer, 1776) (N)

Ctenizidae

Aepycephalus Ausserer, 1871

Aepycephalus brevidens Doleschall, 1871 (Si, Sa) (E)

Amblyocarenum Simon, 1892

Amblyocarenum doleschalli (Ausserer, 1871) (S, Si)

Amblyocarenum obscurum (Ausserer, 1871) (Si) (E)

Amblyocarenum walckenaeri (Lucas, 1846) (S, Si)

Cteniza Latreille, 1829

Cteniza moggridgei Pickard-Cambridge, 1874 (N)

Cteniza sauvagesi (Rossi, 1788) (N, S, Si)

Cteniza sicula Latreille, 1832 (Si) (E)

Nemesia Savigny, 1825

Nemesia africana (C.L. Koch, 1839) (Sa)

Nemesia badia Ausserer, 1871 (S, Sa)

Nemesia caementaria (Latreille, 1798) (N, S, Si, Sa)

Nemesia carminans (Latreille, 1818) (S)

Nemesia cellicola Savigny, 1825 (S, Sa)

Nemesia eleanora Pickard-Cambridge, 1873 (N)

Nemesia fertoni Simon, 1914 (Sa)

Nemesia ilvae di Caporiacco, 1950 (S) (E)

Nemesia kahmani Kraus, 1955 (Sa) (E)

Nemesia macrocephala Ausserer, 1871 (Si)

Nemesia manderstjernae (L. Koch, 1871) (N, Sa)

Nemesia meridionalis (O. Costa, 1838) (S, Si)

Nemesia pavani Dresco, 1978 (S) (E)

Nemesia sanzoi Fage, 1917 (Si) (E)

Nemesia simoni Pickard-Cambridge, 1874 (S)

Theraphosidae

Ischnocolus Ausserer, 1871

Ischnocolus triangulifer Doleschall, 1871 (Si) (E)

Dipluridae

Brachytele Ausserer, 1871

Brachytele icterica (C.L. Koch, 1839) (N)

Filistatidae

Filistata Latreille, 1810

Filistata insidiatrix (Forskål, 1775) (N, S, Si, Sa)

Pritha Lehtinen, 1967

Pritha nana (Simon, 1868) (N, S)

Scytodidae

Loxosceles Heineken & Lowe, 1832

Loxosceles distincta (Lucas, 1846) (S)

Loxosceles rufescens (Dufour, 1820) (N, S, Si, Sa)

Scytodes Latreille, 1804

Scytodes ruficeps Doleschall, 1852 (N) (E) (*)

Scytodes thoracica (Latreille, 1802) (N, S, Sa)

Scytodes velutina Heineken, 1835 (S, Si)

Note

Scytodes ruficeps: Species inquirenda.

Pholcidae

Holocnemus Simon, 1873

Holocnemus caudatus (Dufour, 1820) (Si)

Holocnemus pluchii (Scopoli, 1773) (N, S, Si, Sa)

Pholcus Walckenaer, 1805

Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) (N, S, Sa)

Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) (N, S, Si, Sa)

Pholcus ruber Pavesi, 1888 (N) (E) (*)

Psilochorus Simon, 1893

Psilochorus simoni (Berland, 1911) (N, S)

Spermophora Hentz, 1841

Spermophora elevata Simon, 1873 (S)

Spermophora senoculata (Dugès, 1836) (N, S, Sa)

Note

Pholcus ruber: Species inquirenda.

Dysderidae

Dasumia Thorell, 1875

Dasumia canestrinii (L. Koch, 1876) (N) (E)

Dasumia diomedea di Caporiacco, 1948 (S) (E)

Dasumia taeniifera Thorell, 1875 (N, S)

Dysdera Latreille, 1804

Dysdera ancora Grasshof, 1959 (Si, Sa) (E)

Dysdera andreinii di Caporiacco, 1928 (S) (E)

Dysdera apenninica Alicata, 1964 (S) (E)

Dysdera bottazziae di Caporiacco, 1953 (S) (E)

Dysdera crocota C.L. Koch, 1839 (N, S, Si, Sa)

Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) (N, S, Si)

Dysdera flagellata Grasshof, 1959 (Si) (E)

Dysdera flagellifera di Caporiacco, 1948 (S) (E)

Dysdera fustigans Alicata, 1966 (S) (E)

Dysdera granulata Kulczynski, 1897 (N)

Dysdera lagrecai Alicata, 1964 (Si) (E)

Dysdera monterossoi Alicata, 1964 (S) (E)

Dysdera nicaeensis Thorell, 1873 (N)

Dysdera ninnii Canestrini, 1868 (N, S)

Dysdera nubila Simon, 1882 (S)

Dysdera osellai Alicata, 1973 (Si) (E)

Dysdera paganettii Deeleman-Reinhold, 1988 (S) (E)

Dysdera pavani di Caporiacco, 1941 (N) (E)

Dysdera pominii di Caporiacco, 1948 (S) (E)

Dysdera sibyllinica Kritscher, 1956 (S) (E)

Dysdera silana Alicata, 1966 (S) (E)

Dysdera subsquarrosa Simon, 1914 (N)

Dysdera transadriatica Deeleman-Reinhold, 1988 (S) (E)

Dysdera ventricosa Grasshof, 1959 (Si, Sa) (E)

Dysdera westringi Pickard-Cambridge, 1872 (N, S)

Harpactea Bristowe, 1939

Harpactea aeoliensis Alicata, 1973 (Si) (E)
Harpactea alicatai Brignoli, 1979 (Sa) (E)
Harpactea arguta (Simon, 1907) (N, S)
Harpactea carusoi Alicata, 1974 (Si) (E)
Harpactea corticalis (Simon, 1882) (N, S)
Harpactea gridellii (di Caporiacco, 1951) (S, Si) (E)
Harpactea grisea (Canestrini, 1868) (N)
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) (N, S)
Harpactea nuragica Alicata, 1966 (Sa) (E)
Harpactea oglosana Gasparo, 1992 (S) (E)
Harpactea piligera (Thorell, 1875) (S) (E)
Harpactea sabina Brignoli, 1979 (S) (E)
Harpactea sardoa Alicata, 1966 (Sa) (E)
Harpactea sricula Alicata, 1966 (Si) (E)
Harpactea strandi (di Caporiacco, 1939) (S) (E)
Harpactea thaleri Alicata, 1966 (N)
Harpactea zannonensis Alicata, 1966 (S) (E)

Harpactocrates Simon, 1914

Harpactocrates apennicola Simon, 1914 (N, S)
Harpactocrates drassoides (Simon, 1882) (N)

Harpassa Simon, 1882

Harpassa circe Brignoli, 1975 (S) (E)

Parachtes Alicata, 1964

Parachtes andreinii Alicata, 1966 (S) (E)
Parachtes inaequipipes (Simon, 1882) (Sa)
Parachtes latialis Alicata, 1966 (S) (E)
Parachtes limbarae (Kraus, 1955) (Sa) (E)
Parachtes romandirolae (di Caporiacco, 1949) (N, S) (E)
Parachtes siculus (di Caporiacco, 1949) (S, Si) (E)
Parachtes verna (di Caporiacco, 1936) (S) (E)

Rhode Simon, 1882

Rhode aspinifera (Nikolic, 1963) (N)
Rhode biscutata Simon, 1893 (N, S)
Rhode testudinea Pesarini, 1984 (N) (E)

Stalita Schiödte, 1848

Stalita lynx Brignoli, 1978 (N) (E)
Stalita patrizii Roewer, 1956 (Sa) (E)

Stalita taenaria Schiödte, 1848 (N)

Segestriidae

Ariadna Savigny & Audoin, 1825

Ariadna insidiatrix Savigny & Audoin, 1825 (N, S)

Segestria Latreille, 1804

Segestria bavarica C.L. Koch, 1843 (N, S)

Segestria florentina (Rossi, 1790) (N, S, Sa)

Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) (N, S)

Oonopidae

Dysderina Simon, 1891

Dysderina loricata (Simon, 1873) (N, S, Si, Sa)

Oonops Templeton, 1835

Oonops placidus Dalmas, 1916 (S, Sa)

Oonops pulcher Templeton, 1835 (N, S)

Oonops tubulatus Dalmas, 1916 (S)

Orchestina Simon, 1882

Orchestina longipes Dalmas, 1922 (S) (E)

Orchestina pavesii (Simon, 1873) (S, Sa)

Orchestina simoni Dalmas, 1922 (S)

Tapinesthis Simon, 1914

Tapinesthis inermis (Simon, 1882) (N)

Leptonetidae

Leptoneta Simon, 1872

Leptoneta baccettii Brignoli, 1979 (S) (E)

Leptoneta crypticola Simon, 1907 (N)

Leptoneta insularis Roewer, 1953 (Sa) (E)

Leptoneta patrizii Roewer, 1953 (Sa) (E)

Leptoneta serbariuana Roewer, 1953 (Sa) (E)

Leptoneta taramellii Roewer, 1956 (Sa) (E)

Paraleptoneta Fage, 1913

Paraleptoneta italica (Simon, 1907) (N) (E)

Paraleptoneta spinimana (Simon, 1884) (N, S, Si, Sa)

Palpimanidae

Palpimanus Dufour, 1820

Palpimanus gibbulus Dufour, 1820 (S, Si, Sa)

Eresidae

Eresus Walckenaer, 1805

Eresus albopictus Simon, 1873 (Si)

Eresus fulvus Rossi, 1846 (S)

Eresus niger (Petagna, 1787) (N, S, Si)

Eresus walckenaerius Brullé, 1832 (N, S, Si)

Stegodyphus Simon, 1873

Stegodyphus lineatus (Latreille, 1817) (S, Si)

Zodariidae

Zodarion Walckenaer, 1825

Zodarion algericum (Lucas, 1846) (Si)

Zodarion confusum Denis, 1935 (N) (E)

Zodarion denisi di Caporiacco, 1940 (N) (E)

Zodarion elegans (Simon, 1873) (N, S, Si, Sa)

Zodarion gallicum (Simon, 1873) (N, S)

Zodarion hamatum Wiehle, 1964 (N)

Zodarion italicum (Canestrini, 1868) (N, S)

Zodarion ludibundum Simon, 1814 (S)

Zodarion maculatum (Simon, 1870) (Si)

Zodarion neapolitanum Denis, 1935 (S) (E)

Zodarion nigriceps (Simon, 1873) (Sa)

Zodarion nitidum (Savigny & Audoin, 1825) (S)

Zodarion obscurum Denis, 1935 (S) (E)

Zodarion pusio Simon, 1914 (N, S)

Zodarion rubidum Simon, 1914 (N)

Zodarion ruffoi di Caporiacco, 1953 (S) (E)
Zodarion sabbadinii Pesarini, 1993 (Si) (E)
Zodarion vicinum Denis, 1935 (S) (E)

Oecobiidae

Oecobius Lucas, 1846

Oecobius annulipes Lucas, 1846 (S, Si)
Oecobius cellariorum (Dugès, 1836) (N, S)
Oecobius kahmanni Kritscher, 1966 (N)

Uroctea Dufour, 1820

Uroctea durandi (Walckenaer, 1809) (N, S, Si)

Uloboridae

Uloborus Latreille, 1806

Uloborus gilvus (Blackwall, 1870) (S) (E) (*)
Uloborus plumipes Lucas, 1846 (S, Si)
Uloborus walckenaerius Latreille, 1806 (N, S)

Uptiotes Walckenaer, 1837

Uptiotes flavidus (Blackwall, 1862) (N)
Uptiotes paradoxus (C.L. Koch, 1864) (N, S)

Note

Uloborus gilvus: Species inquirenda.

Tetragnathidae

Eucta Simon, 1881

Eucta zangherii di Caporiacco, 1926 (N) (E)

Pachygnatha Sundevall, 1823

Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 (N, S)
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1829 (N, S)
Pachygnatha listeri Sundevall, 1829 (N, S) (*)
Pachygnatha terilis Thaler, 1991 (N)

Tetragnatha Latreille, 1804

Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 (N)
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
Tetragnatha montana Simon, 1874 (N, S)
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 (N, S)
Tetragnatha nitens (Savigny & Audoin, 1825) (N, S, Si, Sa)
Tetragnatha obtusa C.L. Koch, 1837 (N, S)
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 (N, S)

Note

Pachygnatha listeri: È possibile che le segnalazioni di questa specie per la nostra fauna vadano riferite a *Pachygnatha terilis* Thaler, 1991.

Metidae

Louisfagea Brignoli, 1971

Louisfagea rupicola (Simon, 1884) (N, S)

Meta C.L. Koch, 1836

Meta bourneti Simon, 1922 (S, Si, Sa)
Meta menardi (Latreille, 1804) (N, S)
Meta mengei (Blackwall, 1869) (N, S)
Meta merianae (Scopoli, 1763) (N, S, Si, Sa)
Meta segmentata (Clerck, 1758) (N, S, Si, Sa)

Nesticidae

Nesticus Thorell, 1869

Nesticus cellulanus (Clerck, 1758) (N)
Nesticus eremita Simon, 1879 (N, S, Si)
Nesticus idriacus Roewer, 1931 (N)
Nesticus menozzii di Caporiacco, 1934 (N) (E)
Nesticus morisii Brignoli, 1975 (N) (E)
Nesticus sbordonii Brignoli, 1979 (S) (E)
Nesticus speluncarum Pavesi, 1873 (N, S) (E)

Araneidae

Aculepeira Chamberlin & Ivie, 1942

Aculepeira armida (Savigny & Audoin, 1825) (N, S, Si, Sa)

Aculepeira carbonaria (C.L. Koch, 1869) (N)

Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) (N, S, Si, Sa)

Agalenatea Archer, 1951

Agalenatea redii (Scopoli, 1763) (N, S, Si, Sa)

Araneus Clerck, 1758

Araneus alsine (Walckenaer, 1802) (N)

Araneus angulatus Clerck, 1758 (N, S)

Araneus circe (Savigny & Audoin, 1825) (N, S, Si)

Araneus diadematus Clerck, 1758 (N, S, Si, Sa)

Araneus grossus (C.L. Koch, 1845) (N, S)

Araneus marmoreus Clerck, 1758 (N, S)

Araneus nordmanni (Thorell, 1856) (N)

Araneus pallidus (Olivier, 1789) (N)

Araneus quadratus Clerck, 1758 (N, S)

Araneus saevus L. Koch, 1872 (N)

Araneus sturmi (Hahn, 1831) (N, S)

Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) (N, S)

Araniella Chamberlin & Ivie, 1942

Araniella alpica (L. Koch, 1869) (N, Sa)

Araniella cucurbitina (Clerck, 1758) (N, S, Si, Sa)

Araniella inconspicua (Simon, 1875) (N, S, Si)

Araniella opisthographa (Kulczynski, 1905) (N)

Argiope Savigny & Audoin, 1825

Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) (N, S, Si, Sa)

Argiope lobata (Pallas, 1772) (N, S, Si, Sa)

Cercidia Thorell, 1869

Cercidia prominens (Westring, 1851) (N, S, Sa)

Cyclosa Menge, 1866

Cyclosa conica (Pallas, 1772) (N, S, Si, Sa)

Cyclosa insulana (Costa, 1834) (N, S, Si, Sa)

Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802) (N, S, Si)

Cyclosa sierrae Simon, 1870 (N, S, Sa)

Cyrtarachne Thorell, 1868

Cyrtarachne ixodoides (Simon, 1870) (S)

Cyrtophora Simon, 1864

Cyrtophora citricola (Forskål, 1775) (S, Si, Sa)

Gibbaranea Archer, 1951

Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) (N, S, Si, Sa)

Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) (N, S, Si, Sa)

Gibbaranea omoeda (Thorell, 1856) (N, S)

Glyptogona Simon, 1884

Glyptogona sextuberculata (Keyserling, 1863) (N, S)

Hypsosinga Ausserer, 1871

Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) (N, S, Si, Sa)

Hypsosinga aussereri (Thorell, 1873) (N, S, Sa)

Hypsosinga decora (C.L. Koch, 1835) (N)

Hypsosinga heri (Hahn, 1836) (N, S, Si)

Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) (N, S, Si, Sa)

Hypsosinga sanguinea (C.L. Koch, 1845) (N, S)

Larinioides di Caporiacco, 1934

Larinioides cornutus (Clerck, 1758) (N, S, Si, Sa)

Larinioides folium (Schrank, 1803) (N)

Larinioides patagiatus (Clerck, 1758) (N, S, Sa)

Larinioides sclopetarius (Clerck, 1758) (N, S, Si)

Larinioides suspicax (Pickard-Cambridge, 1876) (S)

Mangora Pickard-Cambridge, 1889

Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) (N, S, Si, Sa)

Neoscona Simon, 1864

Neoscona adiantum (Walckenaer, 1802) (N, S, Si, Sa)

Neoscona subfusca (C.L. Koch, 1837) (N, S)

Nuctenea Simon, 1864

Nuctenea silvicultrix (C.L. Koch, 1835) (N)

Nuctenea umbratica (Clerck, 1758) (N, S)

Singa C.L. Koch, 1836

Singa hamata (Clerck, 1758) (N, S, Sa)

Singa nitidula (C.L. Koch, 1845) (N, S)

Singa semiatra (L. Koch, 1867) (N, S, Si)

Zilla C.L. Koch, 1834

Zilla diodia (Walckenaer, 1802) (N, S, Si, Sa)

Zygiella Pickard-Cambridge, 1902

Zygiella atrica (C.L. Koch, 1843) (N, S, Sa)

Zygiella keyserlingi (Ausserer, 1871) (N)

Zygiella kochi (Thorell, 1870) (N, S, Sa)

Zygiella montana (C.L. Koch, 1839) (N, S, Sa)

Zygiella stroemi (Thorell, 1870) (N)

Zygiella thorelli (Ausserer, 1871) (N)

Zygiella x-notata (Clerck, 1758) (N, S, Si, Sa)

Mimetidae

Ero C.L. Koch, 1836

Ero aphana (Walckenaer, 1802) (N, S)

Ero cambridgei Kulczynski, 1911 (N)

Ero flammeola Simon, 1881 (N)

Ero furcata (Villers, 1789) (N, S)

Ero tuberculata (Degeer, 1778) (N, S)

Mimetus Hentz, 1832

Mimetus laevigatus (Keyserling, 1863) (N, S, Si)

Linyphiidae

Agyneta Hull, 1911

Agyneta conigera (Pickard-Cambridge, 1863) (N)

Agyneta subtilis (Pickard-Cambridge, 1863) (N)

Alioranus Simon, 1926

Alioranus pauper (Simon, 1881) (N, S)

Allomengea Strand, 1912

Allomengea scopigera (Grube, 1859) (N)

Aphileta Hull, 1920

Aphileta misera (Pickard-Cambridge, 1882) (S)

Araeoncus Simon, 1884

Araeoncus altissimus Simon, 1884 (N, Si)

Araeoncus anguineus (L. Koch, 1869) (N, S)

Araeoncus discedens (Simon, 1881) (N)

Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) (N, S)

Araeoncus longiusculus (Pickard-Cambridge, 1875) (S)

Araeoncus sicanus Brignoli, 1979 (Si) (E)

Araeoncus vaporariorum (Pickard-Cambridge, 1875) (N)

Asthenargus Simon & Fage, 1922

Asthenargus brachianus Thaler, 1976 (N) (E)

Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 (N)

Asthenargus paganus (Simon, 1884) (N)

Baryphyma Simon, 1884

Baryphyma trifrons (Pickard-Cambridge, 1863) (N)

Bathyphantes Menge, 1866

Bathyphantes approximatus (Pickard-Cambridge, 1871) (N)

Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) (N, S)

Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) (N, S)

Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) (N)

Bathyphantes setiger (Pickard-Cambridge, 1894) (N)

Bathyphantes similis Kulczynski, 1894 (N)

Bolyphantes C.L. Koch, 1837

Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1832) (N)

Bolyphantes crucifer (Menge, 1866) (N)

Bolyphantes index (Thorell, 1856) (N)

Bolyphantes luteolus (Blackwall, 1833) (N)

Bolyphantes nigropictus Simon, 1884 (N)

Caracladus Simon, 1884

Caracladus avicula (L. Koch, 1869) (N)

Caracladus leberti (Roewer, 1942) (N)

Centromerita Dahl, 1912

- Centromerita bicolor* (Blackwall, 1833) (N, S)
Centromerita concinna (Thorell, 1875) (N)

Centromerus Dahl, 1886

- Centromerus aequalis* (C.L. Koch, 1841) (N)
Centromerus bonaeviae Brignoli, 1979 (Sa) (E)
Centromerus brevipalpis (Menge, 1866) (N)
Centromerus capucinus (Simon, 1884) (N)
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) (N)
Centromerus cottarellii Brignoli, 1979 (N) (E)
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) (N)
Centromerus leruthi Fage, 1933 (N)
Centromerus levitarsis (Simon, 1884) (N)
Centromerus pabulator (Pickard-Cambridge, 1875) (N)
Centromerus pasquinii Brignoli, 1971 (S) (E)
Centromerus prudens (Pickard-Cambridge, 1873) (S)
Centromerus puddui Brignoli, 1979 (Sa) (E)
Centromerus satyrus (Simon, 1884) (S)
Centromerus sellarius (Simon, 1884) (N, S)
Centromerus serratus (Pickard-Cambridge, 1875) (N)
Centromerus similis Kulczynski, 1887 (N)
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) (N, S)
Centromerus tridentinus di Caporiacco, 1952 (N) (E)
Centromerus vindobonensis Kulczynski, 1890 (N)

Centrophantes Miller & Polenec, 1975

- Centrophantes crosbyi* (Fage & Kratochvil, 1933) (N)

Ceratinella Emerton, 1882

- Ceratinella apollonii* di Caporiacco, 1938 (N) (E)
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) (N)
Ceratinella brevis (Wider, 1834) (N, S)
Ceratinella scabrosa (Pickard-Cambridge, 1871) (N)
Ceratinella wideri (Thorell, 1871) (N)

Ceratinopsis Emerton, 1882

- Ceratinopsis austera* (Simon, 1884) (N)
Ceratinopsis romana (Pickard-Cambridge, 1872) (N, S)
Ceratinopsis stativa (Simon, 1881) (N)

Cineta Simon, 1884

Cineta gradata (Simon, 1881) (N)

Cnephalocotes Simon, 1884

Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) (N)

Cresmatoneta Simon, 1929

Cresmatoneta eleonora (A. Costa, 1883) (Sa) (E)

Cresmatoneta mutinensis (Canestrini, 1868) (N, S)

Cresmatoneta pullata (Pickard-Cambridge, 1863) (N)

Dicymbium Menge, 1868

Dicymbium brevisetosum Locket, 1962 (N)

Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) (N, S)

Diplocentria Hull, 1911

Diplocentria mediocris (Simon, 1884) (N)

Diplocephalus Bertkau, 1883

Diplocephalus connectens Kulczynski, 1894 (N)

Diplocephalus crassiloba (Simon, 1884) (N)

Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) (N, S)

Diplocephalus dentatus Tullgren, 1955 (N)

Diplocephalus foraminifer (Pickard-Cambridge, 1875) (N)

Diplocephalus graecus (Pickard-Cambridge, 1872) (N, S)

Diplocephalus helleri (L. Koch, 1869) (N)

Diplocephalus latifrons (Pickard-Cambridge, 1863) (N, S)

Diplocephalus longicarpus (Simon, 1884) (N)

Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) (S)

Diplocephalus procer (Simon, 1884) (N, S)

Diplocephalus protuberans (Pickard-Cambridge, 1875) (N)

Diplocephalus tiberinus (di Caporiacco, 1936) (S) (E)

Diplostyla Emerton, 1882

Diplostyla concolor (Wider, 1834) (N)

Dismodicus Simon, 1884

Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) (N)

Dismodicus elevatus (C.L. Koch, 1838) (N)

Donacochara Simon, 1884

Donacochara speciosa (Thorell, 1875) (N)

Drapetisca Menge, 1866

Drapetisca socialis (Sundevall, 1832) (N)

Entelecara Simon, 1884

Entelecara acuminata (Wider, 1834) (N, S)

Entelecara aestiva Simon, 1918 (N)

Entelecara italica Thaler, 1984 (S) (E)

Entelecara media Kulczynski, 1887 (N, S)

Erigone Savigny & Audoin, 1825

Erigone atra Blackwall, 1833 (N, S)

Erigone autumnalis Emerton, 1882 (N)

Erigone cristatipalpus Simon, 1884 (N)

Erigone dentipalpis (Wider, 1834) (N, S)

Erigone longipalpis (Sundevall, 1829) (N)

Erigone remota L. Koch, 1869 (N)

Erigone vagans Savigny & Audoin, 1825 (N, S, Si, Sa) (*)

Erigonella Dahl, 1901

Erigonella ignobilis (Pickard-Cambridge, 1871) (N, S)

Erigonella subelevata (L. Koch, 1869) (N)

Erigonoplus Simon, 1884

Erigonoplus globipes (L. Koch, 1872) (N)

Erigonoplus nobilis Thaler, 1991 (N) (E)

Erigonoplus simplex Millidge, 1979 (S) (E)

Evansia Pickard-Cambridge, 1900

Evansia merens Pickard-Cambridge, 1900 (N, S)

Floronia Simon, 1887

Floronia bucculenta (Clerck, 1758) (N)

Frontinellina Helsdingen, 1969

Frontinellina frutetorum (C.L. Koch, 1834) (N, S, Si)

Gnathonarium Karsch, 1881

Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) (N, S)

Gonatium Menge, 1866

Gonatium biimpressum Simon, 1884 (Sa) (S)

Gonatium corallipes (Pickard-Cambridge, 1875) (S)

Gonatium ensipotens (Simon, 1882) (S)

Gonatium hilare (Thorell, 1875) (N, S, Si)

Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) (S)

Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) (N)

Gonatium rubens (Blackwall, 1833) (N)

Gongylidiellum Simon, 1884

Gongylidiellum edentatum Miller, 1951 (N)

Gongylidiellum latebricola (Pickard-Cambridge, 1871) (N)

Gongylidiellum murcidum (Simon, 1884) (N)

Gongylidiellum vivum (Pickard-Cambridge, 1875) (N, S, Si)

Gongylidium Menge, 1868

Gongylidium soror Thaler, 1993 (N, S)

Halorates Hull, 1911

Halorates distinctus (Simon, 1884) (S)

Helophora Menge, 1866

Helophora insignis (Blackwall, 1841) (N, S)

Hilaira Simon, 1884

Hilaira excisa (Pickard-Cambridge, 1871) (N)

Hilaira montigena (L. Koch, 1872) (N)

Hylyphantes Simon, 1884

Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1829) (N)

Hylyphantes nigrinus (Simon, 1881) (N, S)

Hypomma Dahl, 1886

Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) (N)

Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) (N, S)

Hypomma fulvum (Bösenberg, 1902) (N)

Hypselisthes Simon, 1894

Hypselisthes proclivis (Simon, 1884) (S) (E)

Hypsocephalus Millidge, 1978

Hypsocephalus paulae (Simon, 1918) (N)

Janetschekia Schenkel, 1939

Janetschekia monodon (Pickard-Cambridge, 1872) (N, S)

Labulla Simon, 1884

Labulla thoracica (Wider, 1834) (N, S)

Lasiargus Kulczynski, 1894

Lasiargus hirsutus (Menge, 1869) (N)

Lepthyphantes Menge, 1866

Lepthyphantes agnellus Maurer & Thaler, 1988 (N) (E)

Lepthyphantes alacris (Blackwall, 1853) (N)

Lepthyphantes alutacius Simon, 1884 (N, S)

Lepthyphantes angustiformis Simon, 1884 (S, Sa)

Lepthyphantes aridus (Thorell, 1875) (N)

Lepthyphantes armatus Kulczynski, 1905 (N)

Lepthyphantes auruncus Brignoli, 1979 (S) (E)

Lepthyphantes baebleri Lessert, 1910 (N)

Lepthyphantes brunneri Thaler, 1984 (N) (E)

Lepthyphantes carnicus Helsdingen, 1982 (N) (E)

Lepthyphantes carusoi Brignoli, 1979 (Si) (E)

Lepthyphantes collinus (L. Koch, 1872) (N)

Lepthyphantes conradini Brignoli, 1971 (S) (E)

Lepthyphantes cristatus (Menge, 1966) (N, S)

Lepthyphantes culicinus Simon, 1884 (N)

Lepthyphantes decolor (Westring, 1861) (S)

Lepthyphantes falteronensis di Caporiacco, 1936 (S) (E)

Lepthyphantes flavipes (Blackwall, 1854) (N, S)

Lepthyphantes florentinus di Caporiacco, 1947 (S) (E)

Lepthyphantes fragilis (Thorell, 1875) (N)

Lepthyphantes frigidus Simon, 1884 (N)

Lepthyphantes furciger (Canestrini, 1873) (Sa) (E)

Lepthyphantes garganicus di Caporiacco, 1951 (S) (E)

Lepthyphantes gladiola Simon, 1884 (N)

Lepthyphantes handschini Schenkel, 1919 (N)

Lepthyphantes herbicola Simon, 1884 (S)

Lepthyphantes ignavus Simon, 1884 (N)
Lepthyphantes improbulus Simon, 1929 (S)
Lepthyphantes istrianus Kulczynski, 1914 (N)
Lepthyphantes keyserlingi (Ausserer, 1867) (N)
Lepthyphantes kochi Kulczynski, 1898 (N)
Lepthyphantes kolosvaryi di Caporiacco, 1936 (S) (E)
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) (N)
Lepthyphantes liguricus Simon, 1929 (N, S)
Lepthyphantes mansuetus (Thorell, 1875) (N)
Lepthyphantes mengei Kulczynski, 1887 (N)
Lepthyphantes merretti Millidge, 1974 (N) (E)
Lepthyphantes messapicus di Caporiacco, 1939 (S) (E)
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) (N)
Lepthyphantes monachus Simon, 1884 (N)
Lepthyphantes montanus Kulczynski, 1898 (N)
Lepthyphantes monticola (Kulczynski, 1881) (N)
Lepthyphantes mughii (Fickert, 1875) (N, S)
Lepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1829) (N)
Lepthyphantes nitidus (Thorell, 1875) (N)
Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 (N)
Lepthyphantes notabilis Kulczynski, 1887 (N)
Lepthyphantes obscurus (Blackwall, 1841) (N)
Lepthyphantes pallidus (Pickard-Cambridge, 1871) (N, S)
Lepthyphantes parallelogrammus Simon, 1884 (N)
Lepthyphantes pinicola Simon, 1884 (N)
Lepthyphantes pulcher (Kulczynski, 1881) (N)
Lepthyphantes pulcheroides Wunderlich, 1985 (N) (E)
Lepthyphantes rossii di Caporiacco, 1927 (N) (E)
Lepthyphantes salfi Dresco, 1949 (S) (E)
Lepthyphantes sardous Gozo, 1908 (Sa) (E)
Lepthyphantes simoni Kulczynski, 1894 (N, S)
Lepthyphantes tenebricola (Wider, 1834) (N, S)
Lepthyphantes tenuis (Blackwall, 1852) (N, S)
Lepthyphantes variabilis Kulczynski, 1887 (N)
Lepthyphantes zimmermanni Bertkau, 1890 (N, S)
Lepthyphantes zonatus Simon, 1884 (S)

Leptorhoptrum Kulczynski, 1894

Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) (N)

Lessertia Smith, 1908

Lessertia denticelis (Simon, 1884) (N, S, Sa)

Lessertinella Denis, 1947

Lessertinella kulczynskii (Lessert, 1909) (N)

Linyphia Latreille, 1804

Linyphia alpicola Helsdingen, 1969 (N)
Linyphia hortensis Sundevall, 1829 (N, S)
Linyphia mimonti Simon, 1884 (S)
Linyphia tenuipalpis Simon, 1884 (N)
Linyphia triangularis (Clerck, 1758) (N, S)

Lophomma Menge, 1868

Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) (N)

Macrargus Dahl, 1886

Macrargus carpentieri (Pickard-Cambridge, 1894) (N)
Macrargus rufus (Wider, 1834) (N)

Maso Simon, 1884

Maso gallicus Simon, 1894 (N)
Maso sundevalli (Westring, 1851) (S)

Mecopisthes Simon, 1884

Mecopisthes alter Thaler, 1991 (N) (E)
Mecopisthes latinus Millidge, 1978 (S)
Mecopisthes nicaeensis (Simon, 1881) (N)
Mecopisthes peuceticus di Caporiacco, 1953 (S) (E)
Mecopisthes silus (Cambridge, 1862) (N, S)

Mecynargus Chyzer & Kulczynski, 1894

Mecynargus brocchus (L. Koch, 1872) (N)
Mecynargus foveolatus (Wiehle, 1960) (N)
Mecynargus paetulus (Pickard-Cambridge, 1875) (N)

Meioneta Hull, 1920

Meioneta arietans (Pickard-Cambridge, 1872) (N)
Meioneta beata (Pickard-Cambridge, 1905) (N)
Meioneta equestris (L. Koch, 1881) (N)
Meioneta fuscipalpis (C.L. Koch, 1836) (N, S)
Meioneta gulosa (L. Koch, 1869) (N)
Meioneta mollis (Pickard-Cambridge, 1871) (N)
Meioneta nigripes (Simon, 1884) (N)
Meioneta resslili Wunderlich, 1973 (N)
Meioneta rurestris (C.L. Koch, 1836) (N, S)

Meioneta simplicitarsis (Simon, 1884) (N)

Metopobactrus Simon, 1884

Metopobactrus nadigi Thaler, 1976 (N)

Metopobactrus prominulus (Pickard-Cambridge, 1872) (N)

Metopobactrus rayi (Simon, 1881) (N)

Metopobactrus schenkeli Thaler, 1976 (N)

Micrargus Dahl, 1886

Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) (N, S)

Micrargus laudatus (Pickard-Cambridge, 1881) (N)

Micrargus subaequalis (Westring, 1851) (N)

Microctenonyx Dahl, 1886

Microctenonyx apuliae (di Caporiacco, 1953) (S) (E)

Microctenonyx subitaneus (Pickard-Cambridge, 1875) (N, S, Sa)

Microlinyphia Gerhardt, 1928

Microlinyphia impigra (Pickard-Cambridge, 1871) (N)

Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1829) (N, S)

Microneta Menge, 1869

Microneta forensis (Pickard-Cambridge, 1872) (S) (E)

Microneta viaria (Blackwall, 1841) (N, S)

Minicia Thorell, 1875

Minicia candida Denis, 1946 (N)

Minicia marginella (Wider, 1834) (N)

Minyrioloides Schenkel, 1930

Minyrioloides trifrons (Pickard-Cambridge, 1863) (N)

Minyriolus Simon, 1884

Minyriolus phaulobius (Thorell, 1875) (N) (E) (*)

Minyriolus pusillus (Wider, 1834) (N)

Mioxena Simon, 1926

Mioxena blanda (Simon, 1884) (N)

Moebelia Dahl, 1886

Moebelia penicillata (Westring, 1851) (N)

Monocephalus Smith, 1906

Monocephalus fuscipes (Blackwall, 1836) (N)

Montitextrix Denis, 1963

Montitextrix glacialis (L. Koch, 1872) (N, S)

Nematogmus Simon, 1884

Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) (N, S)

Nerienne Blackwall, 1833

Nerienne clathrata (Sundevall, 1829) (N, S)

Nerienne emphana (Walckenaer, 1842) (N, S)

Nerienne furtiva (Pickard-Cambridge, 1871) (N, S)

Nerienne montana (Clerck, 1758) (N, S)

Nerienne peltata (Wider, 1834) (N, S)

Nerienne radiata (Walckenaer, 1841) (N, S)

Oedothorax Bertkau, 1883

Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) (N)

Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) (N, S)

Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) (N)

Oedothorax gibbifer (Kulczynski, 1881) (N)

Oedothorax paludigena Simon, 1926 (S)

Oedothorax retusus (Westring, 1851) (N)

Oreonetides Strand, 1901

Oreonetides vaginatus (Thorell, 1872) (N)

Ostearius Hull, 1911

Ostearius melanopygius (Pickard-Cambridge, 1879) (N, S)

Panamomops Simon, 1884

Panamomops inconspicuus (Miller & Valesova, 1964) (N)

Panamomops tauricornis (Simon, 1881) (N)

Pelecopsis Simon, 1884

Pelecopsis elongata (Wider, 1834) (N, S)
Pelecopsis eminula (Simon, 1884) (S)
Pelecopsis inedita (Pickard-Cambridge, 1875) (N, S)
Pelecopsis insana (Simon, 1884) (N)
Pelecopsis krausi Wunderlich, 1980 (N)
Pelecopsis medusa (Simon, 1881) (N, S)
Pelecopsis nemoralis (Blackwall, 1841) (N, S)
Pelecopsis parallela (Wider, 1834) (N)

Peponocranium Simon, 1884

Peponocranium ludicrum (Pickard-Cambridge, 1861) (S)
Peponocranium orbiculatum (Pickard-Cambridge, 1882) (N)

Pityohyphantes Simon, 1929

Pityohyphantes phrygianus (C.L. Koch, 1836) (N)

Pocadicnemis Simon, 1884

Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) (N, S)

Poeciloneta Kulczynski, 1894

Poeciloneta globosa (Wider, 1834) (N, S)

Porrhomma Simon, 1884

Porrhomma campbelli Pickard-Cambridge, 1894 (N)
Porrhomma convexum (Westring, 1851) (N, S)
Porrhomma egeria Simon, 1884 (N, S)
Porrhomma errans (Blackwall, 1841) (N)
Porrhomma microphthalmum (Pickard-Cambridge, 1871) (N)
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 (N)
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) (N)
Porrhomma rosenhaueri (L. Koch, 1872) (N)
Porrhomma spipolae di Caporiacco, 1949 (N) (E)

Pseudomaro Denis, 1966

Pseudomaro aenigmaticus Denis, 1966 (N, S)

Saaristoa Millidge, 1978

Saaristoa abnormis (Blackwall, 1841) (N)
Saaristoa firma (Pickard-Cambridge, 1905) (N)

Saloca Simon, 1926

Saloca diceros (Pickard-Cambridge, 1871) (N)

Sciastes Bishop & Crosby, 1938

Sciastes carli (Lessert, 1907) (N)

Scotargus Simon, 1913

Scotargus pilosus Simon, 1913 (N, S)

Scotinotylus Simon, 1884

Scotinotylus alpigenus (L. Koch, 1869) (N)

Scotinotylus antennatus (Pickard-Cambridge, 1875) (N)

Scotinotylus clavatus (Schenkel, 1927) (N)

Scotinotylus venetus (Thorell, 1875) (N) (E) (*)

Scotoneta Simon, 1910

Scotoneta barbara (Simon, 1884) (Si)

Silometopus Simon, 1926

Silometopus braunianus Thaler, 1978 (N) (E)

Silometopus parallelus (Westring, 1841) (N)

Silometopus rosaemariae Wunderlich, 1969 (N)

Sintula Simon, 1884

Sintula corniger (Blackwall, 1856) (N)

Sintula retroversus (Pickard-Cambridge, 1875) (N, S)

Sisicus Bishop & Crosby, 1938

Sisicus apertus (Holm, 1939) (N)

Stemonyphantes Menge, 1866

Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) (N, S)

Tallusia Lehtinen & Saaristo, 1972

Tallusia experta (Pickard-Cambridge, 1871) (N)

Tapinocyba Simon, 1884

Tapinocyba abetoneensis Wunderlich, 1980 (S) (E)
Tapinocyba corsica (Simon, 1884) (S)
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) (N)
Tapinocyba latia Millidge, 1979 (S) (E)
Tapinocyba ligurica Thaler, 1976 (N) (E)
Tapinocyba lucana Millidge, 1979 (S) (E)
Tapinocyba maureri Thaler, 1991 (N)
Tapinocyba pallens (Pickard-Cambridge, 1872) (N)
Tapinocyba praecox (Pickard-Cambridge, 1873) (N)

Tapinocyboides Wiehle, 1960

Tapinocyboides simoni (Lessert, 1904) (N)

Tapinopa Westring, 1851

Tapinopa longidens (Wider, 1834) (N)

Theonina Simon, 1929

Theonina cornix (Simon, 1881) (N, S)

Thyreosthenius Simon, 1884

Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1841) (N, S)

Tiso Simon, 1884

Tiso vagans (Blackwall, 1834) (N)

Trachelocamptus Simon, 1884

Trachelocamptus minor Millidge, 1979 (S) (E)

Trichoncoides Denis, 1950

Trichoncoides piscator (Simon, 1884) (S)

Trichoncus Simon, 1884

Trichoncus hackmani Millidge, 1955 (N)
Trichoncus helveticus Denis, 1965 (N)
Trichoncus patrizii di Caporiacco, 1953 (S) (E)
Trichoncus sordidus Simon, 1884 (N, S)

Trichopterna Kulczynski, 1894

Trichopterna cito (Pickard-Cambridge, 1872) (N)

Trichopterna rufithorax (Simon, 1881) (S)

Trichopterna thorelli (Westring, 1861) (N)

Troglohyphantes Joseph, 1882

Troglohyphantes albopictus Pesarini, 1989 (N) (E)

Troglohyphantes bolognai Brignoli, 1975 (N) (E)

Troglohyphantes bonzanoi Brignoli, 1979 (N) (E)

Troglohyphantes caligatus Pesarini, 1989 (N)

Troglohyphantes di Caporiaccoi Brignoli, 1971 (N) (E)

Troglohyphantes cavadinii Pesarini, 1989 (N) (E)

Troglohyphantes comottii Pesarini, 1989 (N) (E)

Troglohyphantes dominici Pesarini, 1988 (N) (E)

Troglohyphantes excavatus Fage, 1919 (N)

Troglohyphantes exul Thaler, 1987 (N) (E)

Troglohyphantes fagei Roewer, 1931 (N)

Troglohyphantes fatalis Pesarini, 1988 (N) (E)

Troglohyphantes gestroi Fage, 1933 (N) (E)

Troglohyphantes julianae Brignoli, 1971 (N) (E)

Troglohyphantes juris Thaler, 1982 (N) (E)

Troglohyphantes konradi Brignoli, 1975 (N) (E)

Troglohyphantes lessinensis di Caporiacco, 1936 (N) (E)

Troglohyphantes lucifuga (Simon, 1884) (N)

Troglohyphantes nigraerosae Brignoli, 1971 (N) (E)

Troglohyphantes pavesii Pesarini, 1988 (N) (E)

Troglohyphantes pedemontanus (Gozo, 1908) (N) (E)

Troglohyphantes pluto di Caporiacco, 1938 (N) (E)

Troglohyphantes poleneci Wiehle, 1964 (N)

Troglohyphantes regalini Pesarini, 1989 (N) (E)

Troglohyphantes ruffoi di Caporiacco, 1936 (N) (E)

Troglohyphantes rupicapra Brignoli, 1971 (N) (E)

Troglohyphantes sbordonii Brignoli, 1975 (N) (E)

Troglohyphantes sciakyi Pesarini, 1989 (N) (E)

Troglohyphantes scientificus Deeleman-Reinhold, 1978 (N)

Troglohyphantes sordellii (Pavesi, 1875) (N)

Troglohyphantes vignai Brignoli, 1971 (N) (E)

Troglohyphantes zanoni Pesarini, 1988 (N) (E)

Troxochrus Simon, 1884

Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) (N)

Turinyphia Helsdingen, 1982

Turinyphia clairi (Simon, 1884) (N)

Typhochraestus Simon, 1884

Typhochraestus digitatus (Pickard-Cambridge, 1872) (N)
Typhochraestus inflatus Thaler, 1980 (N)
Typhochraestus simoni Lessert, 1907 (N)

Walckenaeria Blackwall, 1833

Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 (S)
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) (N)
Walckenaeria angelicae Millidge, 1979 (S) (E)
Walckenaeria antica (Wider, 1834) (N)
Walckenaeria atrotibialis (Pickard-Cambridge, 1878) (N)
Walckenaeria capito (Westring, 1861) (N)
Walckenaeria corniculans (Pickard-Cambridge, 1875) (N)
Walckenaeria cucullata (C.L. Koch, 1836) (N)
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 (N)
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) (N)
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) (N)
Walckenaeria insperata Millidge, 1979 (S) (E)
Walckenaeria languida (Simon, 1915) (N, S)
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) (N)
Walckenaeria monoceros (Wider, 1834) (N, S)
Walckenaeria nodosa Pickard-Cambridge, 1873 (N)
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) (N)
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 (N)
Walckenaeria plumata Millidge, 1979 (N, S) (E)
Walckenaeria stylifrons (Pickard-Cambridge, 1875) (N)
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) (N, S)

Note

Erigone vagans: Per questa specie, ben distinta dalle altre usualmente attribuite al genere *Erigone*, Millidge (1988, Bull. Br. Arachnol. Soc., 7: 216) ha istituito il gen.nov. *Prinerigone*, che però non può essere mantenuto, essendo *vagans* la specie tipo del genere *Erigone*.

Minyriolus phaulobius: Species inquirenda.

Scotinotylus venetus: Species inquirenda.

Anapidae

Zangherella di Caporiacco, 1949

Zangherella algerica (Simon, 1895) (N, S)
Zangherella apuliae (di Caporiacco, 1949) (S)

Mysmenidae

Cepheia Simon, 1894

Cepheia longiseta (Simon, 1881) (N)

Mysmena Simon, 1894

Mysmena leucoplagiata (Simon, 1879) (S, Si)

Mysmenella Brignoli, 1980

Mysmenella jobi (Kraus, 1967) (N)

Theridiidae

Achaeearanea Strand, 1929

Achaeearanea lunata (Clerck, 1758) (N, S, Si)

Achaeearanea riparia (Blackwall, 1834) (N)

Achaeearanea simulans (Thorell, 1875) (N)

Achaeearanea tepidariorum (C.L. Koch, 1841) (N, S)

Anelosimus Simon, 1891

Anelosimus aulicus (C.L. Koch, 1838) (N, S, Si, Sa)

Anelosimus pulchellus (Walckenaer, 1802) (N, S)

Anelosimus vittatus (C.L. Koch, 1836) (N, S)

Argyrodes Simon, 1864

Argyrodes argyrodes (Walckenaer, 1841) (S, Si, Sa)

Argyrodes nasica (Simon, 1873) (S)

Comaroma Bertkau, 1889

Comaroma simoni Bertkau, 1889 (N)

Coressa Simon, 1894

Coressa minutissima (Pickard-Cambridge, 1879) (N)

Crustulina Menge, 1868

Crustulina guttata (Wider, 1834) (N, S)

Crustulina scabripes Simon, 1881 (N, S, Si)

Crustulina sticta (Pickard-Cambridge, 1861) (N)

Dipoena Thorell, 1869

Dipoenia braccata (C.L. Koch, 1841) (N, S, Si)
Dipoenia convexa (Blackwall, 1870) (N, S)
Dipoenia coracina (C.L. Koch, 1841) (S)
Dipoenia erythropus (Simon, 1881) (N, S)
Dipoenia inornata (Cambridge, 1861) (N, S)
Dipoenia melanogaster (C.L. Koch, 1845) (N, S, Si)
Dipoenia prona (Menge, 1868) (N)
Dipoenia testaceomarginata (Simon, 1881) (N)
Dipoenia torva (Thorell, 1875) (N, S)
Dipoenia tristis (Hahn, 1831) (N, S)
Dipoenia umbratilis (Simon, 1873) (S)

Enoplognatha Pavesi, 1880

Enoplognatha caricis (Fickert, 1876) (N, S)
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 (N)
Enoplognatha mandibularis (Lucas, 1846) (N, S, Si)
Enoplognatha nigromarginata (Lucas, 1846) (S)
Enoplognatha ovata (Clerck, 1758) (N, S, Si, Sa)
Enoplognatha testacea (Simon, 1884) (N)
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1831) (N, S, Si)

Episinus Walckenaer, 1809

Episinus algericus (Lucas, 1846) (S)
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) (N, S)
Episinus maculipes Cavanna, 1876 (N, S)
Episinus truncatus Latreille, 1809 (N, S, Sa)

Euryopis Menge, 1868

Euryopis acuminata (Lucas, 1846) (N, S, Sa)
Euryopis duodecimguttata di Caporiacco, 1950 (S) (E)
Euryopis flavomaculata (C.L. Koch, 1836) (N, S)
Euryopis giordanii di Caporiacco, 1950 (N) (E)
Euryopis laeta (Westring, 1861) (N)
Euryopis margaritata (L. Koch, 1867) (S)
Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875 (N, S)
Euryopis tarsalis Pavesi, 1873 (S, Si)

Latrodectus Walckenaer, 1805

Latrodectus tredecimguttatus (Rossi, 1790) (N, S, Si, Sa)

Neottiura Menge, 1868

Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
Neottiura herbigrada (Simon, 1873) (N)

Neottiura suaveolens (Simon, 1879) (N)
Neottiura uncinata (Lucas, 1846) (N)

Pholcomma Thorell, 1869

Pholcomma gibbum (Westring, 1851) (N)

Phoroncidia Westwood, 1835

Phoroncidia paradoxa (Lucas, 1846) (S)

Robertus Pickard-Cambridge, 1879

Robertus alpinus Dresco, 1959 (N)
Robertus arganoi Brignoli, 1980 (Sa) (E)
Robertus arundineti (Pickard-Cambridge, 1871) (N, S, Sa)
Robertus cottarellii Brignoli, 1980 (S) (E)
Robertus insignis Pickard-Cambridge, 1907 (N)
Robertus lividus (Blackwall, 1836) (N, S)
Robertus mediterraneus Eskov, 1987 (N, S)
Robertus neglectus (Pickard-Cambridge, 1871) (N)
Robertus truncorum (L. Koch, 1872) (N)
Robertus unguatus Vogelsanger, 1944 (N)

Steatoda Sundevall, 1833

Steatoda albomaculata (Degeer, 1778) (N, S, Sa)
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) (N, S)
Steatoda castanea (Clerck, 1758) (S)
Steatoda grossa (C.L. Koch, 1838) (N, S, Si)
Steatoda latifasciata (Simon, 1873) (Si)
Steatoda paykulliana (Walckenaer, 1806) (N, S, Si, Sa)
Steatoda phalerata (Panzer, 1801) (N, S, Si)
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) (N, S, Si)

Theridion Walckenaer, 1805

Theridion bellicosum Simon, 1873 (N)
Theridion berkeleyi Emerton, 1924 (N)
Theridion betteni Wiehle, 1960 (N)
Theridion blackwalli Pickard-Cambridge, 1871 (N)
Theridion crinigerum Simon, 1881 (S)
Theridion familiare Pickard-Cambridge, 1871 (Sa)
Theridion furfuraceum Simon, 1914 (S)
Theridion genistae Simon, 1873 (S)
Theridion gentile Simon, 1881 (S)
Theridion hannoniae Denis, 1944 (N)
Theridion histrionicum Thorell, 1875 (N) (E) (*)

Theridion impressum L. Koch, 1881 (N, S, Si)
Theridion instabile Pickard-Cambridge, 1871 (N, S)
Theridion laevigatum Blackwall, 1870 (Si) (E) (*)
Theridion melanurum Hahn, 1831 (N, S)
Theridion musivum Simon, 1873 (N)
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 (S, Si)
Theridion nigropunctatum Lucas, 1846 (S, Si)
Theridion nigrovariegatum Simon, 1873 (N, S, Si)
Theridion ohlertii Thorell, 1870 (N)
Theridion pallens Blackwall, 1834 (N, S, Si)
Theridion parvulum Blackwall, 1870 (Si) (E) (*)
Theridion petraeum L. Koch, 1872 (N, S)
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) (N, S, Si)
Theridion pinastrum L. Koch, 1872 (N, S)
Theridion prominens Blackwall, 1870 (Si) (E) (*)
Theridion simile C.L. Koch, 1836 (N, S, Si)
Theridion sisypium (Clerck, 1758) (N, S, Si)
Theridion tinctum (Walckenaer, 1802) (N, S, Si)
Theridion uncinatum Lucas, 1846 (N)
Theridion varians Hahn, 1831 (N, S)

Theridula Emerton, 1882

Theridula gonygaster (Simon, 1873) (N, S)

Note

Theridion histrionicum: Species inquirenda.
Theridion laevigatum: Species inquirenda.
Theridion parvulum: Species inquirenda.
Theridion prominens: Species inquirenda.

Pisauridae

Dolomedes Latreille, 1804

Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1758) (N, S)
Dolomedes italicus Thorell, 1875 (S) (E)
Dolomedes plantarius (Clerck, 1758) (N, S, Sa)

Pisaura Simon, 1885

Pisaura maderiana Kulczynski, 1895 (Si, Sa)
Pisaura mirabilis (Clerck, 1758) (N, S, Sa)
Pisaura orientalis Kulczynski, 1913 (S)

Lycosidae

Acantholycosa Dahl, 1908

Acantholycosa pedestris (Simon, 1876) (N)

Alopecosa Simon, 1885

Alopecosa accentuata (Latreille, 1817) (N, S, Si, Sa)

Alopecosa aculeata (Clerck, 1758) (N)

Alopecosa albofasciata (Brullé, 1832) (N, S, Si, Sa)

Alopecosa alpicola (Simon, 1876) (N)

Alopecosa cuneata (Clerck, 1758) (N, S)

Alopecosa cursor (Hahn, 1831) (N, S)

Alopecosa etrusca Lugetti & Tongiorgi, 1969 (S) (E)

Alopecosa fabrilis (Clerck, 1758) (N, S, Si, Sa)

Alopecosa inquilina (Clerck, 1758) (N, S)

Alopecosa kuntzi Denis, 1953 (Si)

Alopecosa laciniosa (Simon, 1876) (Sa)

Alopecosa mariae (Dahl, 1908) (N)

Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1758) (N, S, Si, Sa)

Alopecosa simonis (Thorell, 1872) (N)

Alopecosa solitaria (Herman, 1876) (N)

Alopecosa striatipes (C.L. Koch, 1837) (N)

Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) (N)

Alopecosa trabalis (Clerck, 1758) (N, S)

Arctosa C.L. Koch, 1848

Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) (N, S, Si, Sa)

Arctosa figurata (Simon, 1876) (N)

Arctosa fulvolineata (Lucas, 1846) (N, S, Sa)

Arctosa latithorax Lugetti & Tongiorgi, 1965 (N, S, Si, Sa)

Arctosa lacustris (Simon, 1876) (N, S, Si, Sa)

Arctosa leopardus (Sundevall, 1832) (N, S, Si, Sa)

Arctosa maculata (Hahn, 1822) (N, S)

Arctosa perita (Latreille, 1799) (N, S, Si, Sa)

Arctosa personata (L. Koch, 1872) (N, S)

Arctosa renidens (Simon, 1876) (N)

Arctosa variana C.L. Koch, 1848 (N, S, Si, Sa)

Arctosa villica (Lucas, 1846) (N)

Aulonia C.L. Koch, 1848

Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) (N, S)

Hogna Simon, 1885

Hogna radiata (Walckenaer, 1837) (N, S, Si, Sa)

Lycosa Latreille, 1804

Lycosa bedeli Simon, 1876 (Si)

Lycosa narbonensis Walckenaer, 1806 (N, S, Si)

Lycosa tarentula (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)

Pardosa C.L. Koch, 1848

Pardosa aenigmatica Tongiorgi, 1966 (S) (E)

Pardosa agrestis (Westring, 1861) (N, S)

Pardosa agricola (Thorell, 1856) (N, S)

Pardosa albata (L. Koch, 1870) (N)

Pardosa amentata (Clerck, 1758) (N, S)

Pardosa arenicola (Pickard-Cambridge, 1875) (S)

Pardosa bifasciata (C.L. Koch, 1834) (N)

Pardosa blanda (C.L. Koch, 1833) (N, S)

Pardosa cavannae Simon, 1881 (S) (E)

Pardosa cribrata Simon, 1876 (N, S, Sa)

Pardosa femoralis Simon, 1876 (S)

Pardosa ferruginea (L. Koch, 1870) (N)

Pardosa hortensis (Thorell, 1872) (N, S)

Pardosa italica Tongiorgi, 1966 (S) (E)

Pardosa lapponica (Thorell, 1872) (N)

Pardosa luctinosa Simon, 1876 (S)

Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) (N, S)

Pardosa mixta (Kulczynski, 1887) (N, S)

Pardosa monticola (Clerck, 1758) (N, S)

Pardosa morosa (L. Koch, 1870) (N)

Pardosa naevia (L. Koch, 1875) (Sa)

Pardosa nebulosa (Thorell, 1872) (N)

Pardosa nigra (C.L. Koch, 1834) (N)

Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) (N, S)

Pardosa oreophila Simon, 1937 (N)

Pardosa paludicola (Clerck, 1758) (N)

Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) (N, S)

Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) (N, S)

Pardosa proxima (C.L. Koch, 1848) (N, S, Si, Sa)

Pardosa pseudostrigillata Tongiorgi, 1966 (N, S) (E)

Pardosa pullata (Clerck, 1758) (S)

Pardosa riparia (C.L. Koch, 1833) (N)

Pardosa saturatior Simon, 1937 (N)

Pardosa sordidata (Thorell, 1875) (N)

Pardosa strigillata Simon, 1878 (N, S, Sa)

Pardosa torrentum Simon, 1876 (N, S)

Pardosa vittata (Keyserling, 1863) (N, S)

Pardosa wagleri (Hahn, 1822) (N, S)

Pirata Sundevall, 1833

Pirata hygrophilus Thorell, 1872 (N, S)

Pirata knorri (Scopoli, 1773) (N, S)

Pirata latitans (Blackwall, 1841) (N, S)

Pirata piraticus (Clerck, 1758) (N, S)

Pirata piscatorius (Clerck, 1758) (N)

Pirata tenuitarsis Simon, 1876 (N)

Trabaea Simon, 1876

Trabaea paradoxa Simon, 1876 (S)

Tricca Simon, 1888

Tricca alpigena (Doleschall, 1852) (N)

Tricca lamperti (Dahl, 1908) (N)

Tricca lutetiana (Simon, 1876) (N)

Trochosa C.L. Koch, 1848

Trochosa hispanica Simon, 1870 (N, S, Sa)

Trochosa robusta (Simon, 1876) (N)

Trochosa ruricola (Degeer, 1778) (N, S, Si)

Trochosa terricola Thorell, 1856 (N, S, Si)

Vesubia Simon, 1909

Vesubia jugorum (Simon, 1881) (N)

Xerolycosa Dahl, 1908

Xerolycosa miniata (C.L. Koch, 1834) (N)

Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) (N, S)

Agelenidae

Agelena Walckenaer, 1805

Agelena agelenoides (Walckenaer, 1841) (N, S)

Agelena gracilens C.L. Koch, 1841 (N, S, Si, Sa)

Agelena labyrinthica (Clerck, 1758) (N, S, Si, Sa)

Agelena orientalis C.L. Koch, 1841 (S)

Cicurina Menge, 1869

Cicurina cicur (Fabricius, 1793) (N)

Coelotes Blackwall, 1841

Coelotes alpinus Polenec, 1972 (N)
Coelotes anoplus Kulczynski, 1897 (N)
Coelotes inermis (L. Koch, 1855) (N)
Coelotes italicus Kritscher, 1956 (N, S) (E)
Coelotes matesianus De Blauwe, 1973 (S) (E)
Coelotes mediocris Kulczynski, 1887 (N, S)
Coelotes microlepidus De Blauwe, 1973 (N) (E)
Coelotes osellai De Blauwe, 1973 (N)
Coelotes pabulator Simon, 1875 (N)
Coelotes pastor Simon, 1875 (N)
Coelotes poweri Simon, 1875 (N)
Coelotes rudolfi (Schenkel, 1925) (N)
Coelotes solitarius L. Koch, 1868 (N)
Coelotes valle Brignoli, 1976 (N) (E)

Cryphoeca Thorell, 1870

Cryphoeca brignolii Thaler, 1980 (N)
Cryphoeca lichenum L. Koch, 1876 (N)
Cryphoeca silvicola (C.L. Koch, 1834) (N, S)

Cybaeus L. Koch, 1868

Cybaeus intermedius Maurer, 1992 (N)
Cybaeus minor Chyzer & Kulczynski, 1897 (N)
Cybaeus montanus Maurer, 1992 (N)
Cybaeus tetricus (C.L. Koch, 1839) (N)
Cybaeus vignai Brignoli, 1976 (N) (E)

Histo*pona* Thorell, 1879

*Histo**pona italica* Brignoli, 1976 (N, S)
*Histo**pona palaeolithica* (Brignoli, 1971) (N) (E)
*Histo**pona torpida* (C.L. Koch, 1834) (N)

Lycosoides Lucas, 1846

Lycosoides coarctata (Dufour, 1831) (N, S, Si, Sa)
Lycosoides flavomaculata Lucas, 1846 (Si)

Malthonica Simon, 1898

Malthonica arganoi (Brignoli, 1971) (S) (E)

Malthonica sardoa Brignoli, 1976 (Sa) (E)
Malthonica sicana Brignoli, 1976 (Si) (E)

Mizaga Simon, 1898

Mizaga racovitzai (Fage, 1909) (N, S)

Paracoelotes Brignoli, 1982

Paracoelotes garibaldii (Kritscher, 1969) (S, Si) (E)

Tegenaria Latreille, 1804

Tegenaria agrestis (Walckenaer, 1802) (N, S, Si, Sa)
Tegenaria aliquoi Brignoli, 1971 (Si) (E)
Tegenaria armigera Simon, 1873 (Sa)
Tegenaria atrica C.L. Koch, 1834 (N)
Tegenaria baronii Brignoli, 1976 (S) (E)
Tegenaria campestris (C.L. Koch, 1834) (N, S, Sa)
Tegenaria capolongoi Brignoli, 1976 (S) (E)
Tegenaria cerrutii Roewer, 1960 (Si) (E)
Tegenaria domestica (Clerck, 1758) (N, S, Sa)
Tegenaria drescoi Brignoli, 1971 (Sa) (E)
Tegenaria eleonora Brignoli, 1974 (Sa) (E)
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) (N)
Tegenaria fuesslini Pavesi, 1873 (N, S)
Tegenaria henroti Dresco, 1956 (Sa) (E)
Tegenaria ligurica Simon, 1916 (N, S)
Tegenaria marinae Brignoli, 1971 (S) (E)
Tegenaria mirifica Thaler, 1987 (N)
Tegenaria nemorosa Simon, 1916 (N, S)
Tegenaria osellai Brignoli, 1971 (S) (E)
Tegenaria pagana C.L. Koch, 1841 (N, S, Si, Sa)
Tegenaria parietina (Fourcroy, 1785) (N, S, Si, Sa)
Tegenaria parmenidis Brignoli, 1971 (S) (E)
Tegenaria parvula Thorell, 1875 (S, Si)
Tegenaria picta Simon, 1870 (N, S)
Tegenaria rhaetica Thorell, 1875 (N)
Tegenaria sbordonii Brignoli, 1971 (S) (E)
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 (N, S)
Tegenaria soriculata Simon, 1873 (Sa)
Tegenaria thyrronica Dalmás, 1922 (N, S)
Tegenaria tridentina L. Koch, 1872 (N)
Tegenaria trinacriae Brignoli, 1971 (Si) (E)
Tegenaria vomeroi Brignoli, 1976 (S) (E)
Tegenaria zinzulusensis Dresco, 1959 (S, Si) (E)

Textrix Sundevall, 1830

Textrix caudata L. Koch, 1872 (N, S, Si, Sa)
Textrix denticulata (Olivier, 1789) (N, S, Sa)
Textrix pinicola Simon, 1875 (N, S)
Textrix rubrofoliata Pesarini, 1991 (Si) (E)

Tuberta Simon, 1884

Tuberta merens (Pickard-Cambridge, 1863) (N)

Argyronetidae

Argyroneta Latreille, 1804

Argyroneta aquatica (Clerck, 1758) (N)

Hahniidae

Antistea Simon, 1898

Antistea elegans (Blackwall, 1841) (N, S)

Hahnia C.L. Koch, 1841

Hahnia candida Simon, 1875 (N, S)
Hahnia helveola Simon, 1875 (N)
Hahnia maginii Brignoli, 1976 (N, S)
Hahnia nava (Blackwall, 1841) (N)
Hahnia ononidum Simon, 1875 (S)
Hahnia petrobia Simon, 1875 (N)
Hahnia pusilla C.L. Koch, 1841 (N)
Hahnia rossii Brignoli, 1976 (S) (E)

Dictynidae

Altella Simon, 1884

Altella aussereri Thaler, 1989 (N, S)
Altella biuncata (Miller, 1949) (N)
Altella lucida (Simon, 1874) (N)

Archaeodyctina di Caporiacco, 1928

Archaeodyctina ammophila (Menge, 1871) (N)
Archaeodyctina consecuta (Pickard-Cambridge, 1872) (N, S)

Argenna Thorell, 1870

Argenna albopunctata (Menge, 1869) (N)
Argenna subnigra (Pickard-Cambridge, 1861) (N)

Brigittea Lehtinen, 1967

Brigittea brevidens (Chyzer & Kulczynski, 1897) (N)
Brigittea civica (Lucas, 1849) (N, S, Si)
Brigittea latens (Fabricius, 1775) (N, S)
Brigittea vicina (Simon, 1873) (N, S)

Brommella Tullgren, 1948

Brommella falcigera (Balogh, 1935) (N)

Dictyna Sundevall, 1833

Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)
Dictyna pusilla Thorell, 1856 (N, S)
Dictyna uncinata Thorell, 1856 (N)

Lathys Simon, 1884

Lathys humilis (Blackwall, 1855) (N, S)
Lathys stigmatisata (Menge, 1869) (N)

Marylinia Lehtinen, 1967

Marylinia bicolor (Simon, 1870) (N, S)

Nigma Lehtinen, 1967

Nigma flavescens (Walckenaer, 1825) (N, S)
Nigma hortensis (Simon, 1870) (N, S)
Nigma puella (Simon, 1870) (N, S)
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) (N, S)

Amaurobiidae

Amaurobius C.L. Koch, 1837

Amaurobius crassipalpis Canestrini & Pavesi, 1870 (N)
Amaurobius erberi (Keyserling, 1873) (N, S)
Amaurobius fenestralis (Stroem, 1768) (N, S)
Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) (N, S)

Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 (N)
Amaurobius obustus L. Koch, 1868 (N)
Amaurobius pavesii Pesarini, 1991 (N, S) (E)
Amaurobius pallidus L. Koch, 1868 (S)
Amaurobius ruffoi Thaler, 1990 (N) (E)
Amaurobius scopolii Thorell, 1871 (N, S)

Callobius Chamberlin, 1947

Callobius claustrarius (Hahn, 1831) (N)

Titanoecidae

Titanoeca Thorell, 1870

Titanoeca albomaculata (Lucas, 1846) (N, S, Sa)
Titanoeca flavicoma L. Koch, 1872 (N, S)
Titanoeca monticola (Simon, 1870) (S)
Titanoeca obscura (Walckenaer, 1802) (N, S)
Titanoeca tristis (L. Koch, 1872) (N, S)

Oxyopidae

Oxyopes Latreille, 1804

Oxyopes heterophthalmus (Latreille, 1802) (N, S, Si, Sa)
Oxyopes lineatus Latreille, 1806 (N, S, Si, Sa)
Oxyopes nigripalpis Kulczynski, 1891 (N, S, Si)
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) (N, S, Si)

Anyphaenidae

Anyphaena Sundevall, 1833

Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) (N, S, Sa)
Anyphaena alboirrorata Simon, 1878 (N)
Anyphaena sabina L. Koch, 1876 (N, S, Sa)

Miturgidae

Prochora Simon, 1885

Prochora lycosiformis (Pickard-Cambridge, 1872) (Si)

Clubionidae

Ceto Simon, 1874

Ceto laticeps (Canestrini, 1868) (N, S, Sa)

Cheiracanthium C.L. Koch, 1839

Cheiracanthium angulitarse Simon, 1878 (S)
Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 (N, S)
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) (N, S)
Cheiracanthium fulvotestaceum Simon, 1878 (N)
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 (N, S, Si)
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1868 (N)
Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 (N)
Cheiracanthium pelasgicum (C.L. Koch, 1837) (N, S, Si)
Cheiracanthium pennatum Simon, 1878 (N)
Cheiracanthium pennyi Pickard-Cambridge, 1873 (S)
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) (N, S)
Cheiracanthium seidlitzii L. Koch, 1864 (N, S, Si, Sa)
Cheiracanthium striolatum Simon, 1878 (N, S)
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) (N, S)

Clubiona Latreille, 1804

Clubiona andreinii di Caporiacco, 1936 (S) (E)
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 (N, S)
Clubiona coerulescens C.L. Koch, 1867 (N, S)
Clubiona compta C.L. Koch, 1839 (N, S)
Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) (N, S)
Clubiona diniensis Simon, 1878 (N)
Clubiona diversa Pickard-Cambridge, 1862 (N, S)
Clubiona frutetorum L. Koch, 1866 (N, S)
Clubiona genevensis L. Koch, 1866 (N, S)
Clubiona germanica Thorell, 1870 (N, S)
Clubiona hilaris Simon, 1878 (N)
Clubiona leucaspis Simon, 1932 (N, S)
Clubiona lutescens Westring, 1851 (N, S)
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 (N)
Clubiona neglecta Pickard-Cambridge, 1862 (N, S)
Clubiona pallidula (Clerck, 1758) (N, S)
Clubiona phragmitis C.L. Koch, 1843 (N, S)
Clubiona reclusa Pickard-Cambridge, 1863 (N, S)
Clubiona similis L. Koch, 1866 (S)
Clubiona stagnatilis Kulczynski, 1897 (N)
Clubiona subsultans Thorell, 1875 (N)

Clubiona subtilis L. Koch, 1866 (N, S)
Clubiona terrestris Westring, 1851 (N, S)
Clubiona trivialis C.L. Koch, 1843 (N)
Clubiona vegeta L. Koch, 1874 (N, S)

Trachelas L. Koch, 1866

Trachelas minor Pickard-Cambridge, 1872 (N, S)
Trachelas purus Kritscher, 1968 (N) (E)
Trachelas rayi Simon, 1878 (S)

Liocranidae

Agroeca Westring, 1861

Agroeca brunnea (Blacwall, 1833) (N)
Agroeca cuprea Menge, 1873 (N)
Agroeca lineata Simon, 1878 (N, S)
Agroeca lusatica (L. Koch, 1875) (N)
Agroeca proxima (Pickard-Cambridge, 1871) (N)
Agroeca pullata Thorell, 1875 (N, S)

Apostenus Westring, 1851

Apostenus fuscus Westring, 1851 (N)

Liocranum L. Koch, 1866

Liocranum giersbergi Kraus, 1955 (Sa) (E)
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) (N, S)
Liocranum rutilans (Thorell, 1875) (N)
Liocranum segmentatum Simon, 1878 (N)

Mesiotelus Simon, 1897

Mesiotelus mauritanicus Simon, 1909 (Si)
Mesiotelus tenellus (Thorell, 1875) (N)
Mesiotelus tenuissimus (L. Koch, 1866) (S, Si, Sa)

Scotina Menge, 1873

Scotina celans (Blackwall, 1841) (N, S)

Gnaphosidae

Aphantaulax Simon, 1878

Aphantaulax cinctus (L. Koch, 1866) (S, Sa)
Aphantaulax seminiger Simon, 1878 (N, S, Sa)

Berlandina Dalmas, 1922

Berlandina nubivaga (Simon, 1878) (N)
Berlandina plumalis (Pickard-Cambridge, 1872) (S)

Callilepis Westring, 1874

Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) (N, S)
Callilepis schusztleri (Herman, 1879) (N)

Camillina Berland, 1919

Camillina europaea Dalmas, 1922 (S)

Cybaeodes Simon, 1878

Cybaeodes marinae Di Franco, 1988 (S, Si) (E)

Drassodes Westring, 1851

Drassodes albicans (Simon, 1878) (S)
Drassodes canagliensis di Caporiacco, 1927 (N) (E)
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) (N)
Drassodes decorus (Blackwall, 1870) (S) (E)
Drassodes difficilis (Simon, 1878) (N)
Drassodes fugax (Simon, 1878) (N)
Drassodes heeri (Pavesi, 1873) (N)
Drassodes hispanus (L. Koch, 1866) (Sa)
Drassodes hypocrita (Simon, 1878) (N, S)
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) (N, S, Si, Sa)
Drassodes luteomicans (Simon, 1878) (N)
Drassodes lutescens (C.L. Koch, 1839) (N, S, Si, Sa)
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) (N, S)
Drassodes rubidus (Simon, 1878) (Sa)
Drassodes tenuis (L. Koch, 1866) (N)
Drassodes villosus (Thorell, 1856) (N)
Drassodes vinosus (Simon, 1878) (N, S)

Echemus Simon, 1878

Echemus angustifrons (Westring, 1862) (N)

Gnaphosa Latreille, 1804

Gnaphosa alacris Simon, 1878 (N, S)
Gnaphosa badia (L. Koch, 1866) (N)
Gnaphosa basilicata Simon, 1882 (S) (E)
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1831) (N, S)
Gnaphosa leporina (L. Koch, 1866) (N)
Gnaphosa lonai di Caporiacco, 1849 (Si) (E)
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) (N, S, Si, Sa)
Gnaphosa lugubris (C.L. Koch, 1839) (N, S)
Gnaphosa modestior Chyzer & Kulczynski, 1897 (N)
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) (N, S)
Gnaphosa muscorum (L. Koch, 1866) (N)
Gnaphosa petrobia L. Koch, 1872 (N)
Gnaphosa rhenana Müller & Schenkel, 1895 (N)
Gnaphosa rufula (L. Koch, 1866) (Si)
Gnaphosa spadicea Simon, 1914 (S)
Gnaphosa tigrina Simon, 1878 (Si)

Haplodrassus Chamberlin, 1922

Haplodrassus cognatus (Westring, 1861) (N)
Haplodrassus concertor (Simon, 1878) (N)
Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) (N, S, Si)
Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 (N)
Haplodrassus macellinus (Thorell, 1871) (N, S, Sa)
Haplodrassus minor (Pickard-Cambridge, 1879) (S)
Haplodrassus severus (C.L. Koch, 1839) (N, S, Si, Sa)
Haplodrassus signifer (C.L. Koch, 1839) (N, S, Si, Sa)
Haplodrassus sylvestris (Blackwall, 1833) (N)

Leptodrassus Simon, 1878

Leptodrassus diomedeus di Caporiacco, 1953 (S) (E)
Leptodrassus femineus (Simon, 1873) (Si)

Micaria Westring, 1851

Micaria albimana Pickard-Cambridge, 1872 (S)
Micaria alpina L. Koch, 1872 (N)
Micaria cyrnea Brignoli, 1983 (N, S)
Micaria dives (Lucas, 1846) (N)
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) (N)
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) (N, S)
Micaria funerea Simon, 1878 (S)
Micaria nivosa L. Koch, 1866 (S)
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) (N, S)
Micaria romana L. Koch, 1866 (N, S)
Micaria scenica Simon, 1878 (N)
Micaria silesiaca L. Koch, 1875 (N)

Micaria sociabilis Kulczynski, 1897 (N)
Micaria subopaca Westring, 1862 (S)

Nomisia Dalmas, 1921

Nomisia aussereri (L. Koch, 1872) (N, S, Si, Sa)
Nomisia exornata (C.L. Koch, 1839) (N, S, Si, Sa)
Nomisia molendinaria (L. Koch, 1866) (S) (*)
Nomisia recepta (Pavesi, 1880) (S, Si)

Phaeocedus Simon, 1893

Phaeocedus braccatus (L. Koch, 1866) (N, S)

Phrurolithus C.L. Koch, 1839

Phrurolithus festivus (C.L. Koch, 1835) (N, S)
Phrurolithus flavitarsis (Lucas, 1846) (N, S, Sa)
Phrurolithus florentinus di Caporiacco, 1923 (S) (E)
Phrurolithus minimus C.L. Koch, 1839 (N, S)
Phrurolithus pullatus Kulczynski, 1897 (N)

Poecilochroa Westring, 1874

Poecilochroa albomaculata (Lucas, 1846) (N, S, Si, Sa)
Poecilochroa conspicua (L. Koch, 1866) (N, S)
Poecilochroa variana (C.L. Koch, 1839) (S, Si)

Pterotricha Kulczynski, 1903

Pterotricha sinoniae di Caporiacco, 1953 (S) (E)

Scotophaeus Simon, 1893

Scotophaeus blackwalli (Thorell, 1871) (N, S, Si)
Scotophaeus fabrisae di Caporiacco, 1950 (S) (E)
Scotophaeus loricatus (L. Koch, 1866) (N)
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) (N, S)
Scotophaeus retusus (Simon, 1878) (N)
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) (N, S)
Scotophaeus validus (Lucas, 1846) (N, S, Si, Sa)

Zelotes Gistel, 1848

Zelotes adriaticus di Caporiacco, 1953 (S)
Zelotes aeneus (Simon, 1878) (N, S)
Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) (N, S)
Zelotes atrocoeruleus (Simon, 1878) (S)

Zelotes barbatus (L. Koch, 1866) (N, S)
Zelotes bimaculatus (C.L. Koch, 1837) (N, S)
Zelotes brachialis (Garneri, 1902) (Sa) (E)
Zelotes calactinus Di Franco, 1988 (Si) (E)
Zelotes callidus (Simon, 1878) (S)
Zelotes caprearum (Pavesi, 1875) (S) (E)
Zelotes di Caporiaccoi Denis, 1953 (S) (E)
Zelotes carmeli (Pickard-Cambridge, 1872) (N, S, Sa)
Zelotes caucasicus (L. Koch, 1866) (S)
Zelotes circumspectus (Simon, 1878) (N, S, Si)
Zelotes civicus (Simon, 1878) (N, S)
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) (N, S)
Zelotes criniger Denis, 1937 (Si)
Zelotes cyanescens Simon, 1914 (N)
Zelotes denisi Marinaro, 1967 (Si) (E)
Zelotes dentatidens Simon, 1914 (S)
Zelotes devotus Grimm, 1985 (N)
Zelotes electus (C.L. Koch, 1839) (N, S)
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) (N, S)
Zelotes exiguus (Müller & Schenkel, 1895) (N)
Zelotes femellus (L. Koch, 1866) (N, S)
Zelotes fuscipes (L. Koch, 1866) (N, S)
Zelotes fuscorufus (Simon, 1878) (S)
Zelotes gallicus Simon, 1914 (N, S)
Zelotes gracilis (Canestrini, 1868) (N)
Zelotes hermani Chyzer, 1896 (N)
Zelotes hirtus (Thorell, 1875) (N)
Zelotes insulanus Dalmas, 1922 (S) (E) (*)
Zelotes kochi (Canestrini, 1868) (N, S)
Zelotes latreillei (Simon, 1878) (N, S)
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) (N, S)
Zelotes lutetianus (L. Koch, 1866) (N, S)
Zelotes lyonneti (Savigny & Audoin, 1825) (N)
Zelotes manius (Simon, 1878) (N)
Zelotes mutabilis (Simon, 1878) (Si)
Zelotes nilicola (Pickard-Cambridge, 1874) (S)
Zelotes oblongus (C.L. Koch, 1833) (N, S)
Zelotes pedestris (C.L. Koch, 1837) (N, S)
Zelotes petrensis (C.L. Koch, 1839) (N, S)
Zelotes praeficus (L. Koch, 1866) (N, S)
Zelotes prognathus (Canestrini, 1874) (N) (*)
Zelotes pumilus (C.L. Koch, 1839) (N, S)
Zelotes pusillus (C.L. Koch, 1833) (N, S)
Zelotes reconditus Simon, 1914 (S)
Zelotes rusticus (L. Koch, 1872) (N, S)
Zelotes sardus (Canestrini, 1873) (Sa) (E)
Zelotes semirufus (L. Koch, 1882) (S)
Zelotes siculus (Simon, 1878) (Si) (E)

Zelotes similis (Kulczynski, 1887) (N)
Zelotes subterraneus (C.L. Koch, 1833) (N, S)
Zelotes talpinus (L. Koch, 1872) (N, S)
Zelotes vespertinus (Thorell, 1875) (N, S)
Zelotes villicus (Thorell, 1875) (N)

Note

Nomisia molendinaria: Species inquirenda.

Zelotes insulanus: Species inquirenda il cui nome, una volta accertata la validità del taxon, andrebbe sostituito perché secondariamente preoccupato da *Zelotes insulana* (C.L. Koch, 1867) (= *Melanophora insulana* C.L. Koch, 1867), specie egeica.

Zelotes prognathus: Species inquirenda.

Zoridae

Zora C.L. Koch, 1848

Zora armillata Simon, 1878 (N)
Zora manicata Simon, 1878 (N)
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) (N, S)
Zora parallela Simon, 1878 (N)
Zora pardalis Simon, 1878 (N)
Zora spinimana (Sundevall, 1832) (N, S)

Zoropsidae

Zoropsis Simon, 1878

Zoropsis media Simon, 1878 (N)
Zoropsis spinimana (Dufour, 1820) (N, S, Si, Sa)

Eusparassidae

Eusparassus Simon, 1903

Eusparassus dufouri Simon, 1932 (N, S)

Micrommata Latreille, 1804

Micrommata formosa Pavesi, 1878 (Si)
Micrommata ligurina (C.L. Koch, 1845) (N, S, Si, Sa)
Micrommata virescens (Clerck, 1758) (N, S, Sa)

Olios Walckenaer, 1837

Olios argelasius (Walckenaer, 1806) (N, S, Si)

Philodromidae

Paratibellus Simon, 1932

Paratibellus oblongiusculus (Lucas, 1846) (N, Sa)

Philodromus Walckenaer, 1826

Philodromus aureolus (Clerck, 1758) (N, S, Si, Sa)

Philodromus buxi Simon, 1884 (N, S)

Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) (N, S)

Philodromus collinus C.L. Koch, 1835 (N, S)

Philodromus corticinus C.L. Koch, 1835 (N)

Philodromus dispar Walckenaer, 1826 (N, S)

Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) (N, S)

Philodromus fallax Sundevall, 1832 (N, S)

Philodromus glaucinus Simon, 1870 (N, S)

Philodromus histrio (Latreille, 1819) (N, Sa)

Philodromus lepidus Blackwall, 1870 (N)

Philodromus margaritatus (Clerck, 1758) (N, S, Si)

Philodromus poecilus (Thorell, 1872) (N, S)

Philodromus praedatus Pickard-Cambridge, 1871 (N, S, Si)

Philodromus pulchellus Lucas, 1846 (S, Si, Sa)

Philodromus rufus (Walckenaer, 1802) (N, S)

Philodromus vagulus Simon, 1875 (N, S)

Thanatus C.L. Koch, 1837

Thanatus arenarius Thorell, 1872 (N, S)

Thanatus formicinus (Clerck, 1758) (N, S)

Thanatus sabulosus (Menge, 1875) (N)

Thanatus striatus C.L. Koch, 1845 (N, S)

Thanatus vulgaris Simon, 1870 (N, S, Si, Sa)

Tibellus Simon, 1875

Tibellus macellus Simon, 1875 (N, S)

Tibellus maritimus (Menge, 1875) (N, S)

Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) (N, S)

Thomisidae

Diaea Thorell, 1869

Diaea dorsata (Fabricius, 1777) (N, S)

Heriaeus Simon, 1875

Heriaeus hirtus (Latreille, 1819) (N, S, Si, Sa)

Heriaeus mellottei Simon, 1886 (N, S)

Heriaeus orientalis Simon, 1918 (N, Si)

Misumena Latreille, 1804

Misumena occidentalis Kulczynski, 1911 (N, S)

Misumena vatia (Clerck, 1758) (N, S, Si, Sa)

Misumenops Pickard-Cambridge, 1900

Misumenops tricuspidatus (Fabricius, 1775) (N, S)

Monaeses Thorell, 1869

Monaeses paradoxus (Lucas, 1846) (S)

Ozyptila Simon, 1864

Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) (N, S, Si, Sa)

Ozyptila blackwalli Simon, 1875 (N, S, Sa)

Ozyptila blitea Simon, 1875 (N, S, Sa)

Ozyptila brevipes (Hahn, 1831) (N, S, Sa)

Ozyptila confluens (C.L. Koch, 1845) (N, S, Sa)

Ozyptila elegans (Blackwall, 1840) (S)

Ozyptila nigristerium Dalmás, 1922 (S) (E)

Ozyptila nigrita (Thorell, 1875) (N)

Ozyptila praticola (C.L. Koch, 1837) (N, S)

Ozyptila pullata (Thorell, 1875) (N)

Ozyptila rauda Simon, 1875 (N, S)

Ozyptila sanctuaria (Pickard-Cambridge, 1871) (N, S)

Ozyptila scabricula (Westring, 1851) (N)

Ozyptila secreta Thaler, 1967 (N)

Ozyptila simplex (Pickard-Cambridge, 1862) (N, S)

Ozyptila trux (Blackwall, 1846) (N, S)

Pistius Simon, 1875

Pistius truncatus (Pallas, 1777) (N, S, Si)

Runcinia Simon, 1875

Runcinia lateralis (C.L. Koch, 1838) (N, S, Si, Sa)

Synaema Simon, 1864

Synaema globosum (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa)

Thomisus Walckenaer, 1805

Thomisus hilarulus Simon, 1875 (S, Si)

Thomisus onustus Walckenaer, 1805 (N, S, Si, Sa)

Tmarus Simon, 1875

Tmarus piger (Walckenaer, 1802) (N, S)

Tmarus piochardi (Simon, 1866) (S)

Tmarus staintoni (Pickard-Cambridge, 1873) (S)

Tmarus stellio Simon, 1875 (N)

Xysticus C.L. Koch, 1835

Xysticus acerbus Thorell, 1872 (N, S)

Xysticus audax (Schrank, 1803) (N, S, Sa)

Xysticus bifasciatus C.L. Koch, 1837 (N, S, Sa)

Xysticus bufo (Dufour, 1820) (N, S, Sa)

Xysticus caperatus Simon, 1875 (Sa)

Xysticus cor Canestrini, 1873 (N, S, Sa)

Xysticus cribratus Simon, 1885 (S)

Xysticus cristatus (Clerck, 1758) (N, S, Sa)

Xysticus desidiosus Simon, 1875 (N)

Xysticus diversus (Blackwall, 1870) (Si) (E) (*)

Xysticus doriai (Dalmas, 1922) (S, Si) (E)

Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) (N)

Xysticus ferrugineus Menge, 1876 (N)

Xysticus gallicus Simon, 1875 (N)

Xysticus gortanii di Caporiacco, 1922 (N) (E)

Xysticus graecus C.L. Koch, 1838 (N, Sa)

Xysticus grillator Simon, 1932 (Sa)

Xysticus ibex Simon, 1875 (N)

Xysticus kempeleni Thorell, 1872 (N)

Xysticus kochi Thorell, 1872 (N, S, Sa)

Xysticus lanio C.L. Koch, 1835 (N, S, Sa)

Xysticus lineatus (Westring, 1851) (S)

Xysticus luctator L. Koch, 1870 (N)

Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) (N, S, Sa)

Xysticus ninnii Thorell, 1872 (N, S)

Xysticus nubilus Simon, 1875 (N, S, Sa)

Xysticus parallelus Simon, 1873 (N, S)

Xysticus pavesii Pickard-Cambridge, 1873 (S) (E)

Xysticus robustus (Hahn, 1831) (N, S)

Xysticus sabulosus (Hahn, 1831) (N, S)
Xysticus striatipes L. Koch, 1870 (N)
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) (N, S)
Xysticus uncatus Thorell, 1875 (S)

Note

Xysticus diversus: Species inquirenda.

Salticidae

Aelurillus Simon, 1884

Aelurillus aeruginosus (Simon, 1871) (Si)
Aelurillus affinis (Lucas, 1846) (Si)
Aelurillus festivus (C.L. Koch, 1834) (N, Sa)
Aelurillus lopadusae Cantarella, 1984 (Si) (E)
Aelurillus monardi (Lucas, 1846) (S, Si, Sa)
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1758) (N, S, Sa)

Ballus C.L. Koch, 1851

Ballus armadillo (Simon, 1871) (Si, Sa)
Ballus depressus (Walckenaer, 1802) (N, S, Si, Sa)
Ballus rufipes (Simon, 1868) (N, S, Si)
Ballus variegatus Simon, 1876 (N)

Bianor Peckham, 1855

Bianor albobimaculatus (Lucas, 1846) (Si, Sa)
Bianor aurocinctus (Ohlert, 1865) (N)

Carrhotus Thorell, 1891

Carrhotus bicolor (Walckenaer, 1902) (N, S)

Chalcoscirtus Bertkau, 1880

Chalcoscirtus infimus (Simon, 1868) (N, S, Si)

Cyrba Simon, 1876

Cyrba algerina (Lucas, 1846) (N, S, Si, Sa)

Dendryphantes C.L. Koch, 1837

Dendryphantes hastatus (Clerck, 1758) (N)

Dendryphantes rudis (Sundevall, 1832) (N)

Eris C.L. Koch, 1846

Eris nidicolens (Walckenaer, 1802) (N, S, Sa)

Euophrys C.L. Koch, 1834

Euophrys acripes (Simon, 1871) (N)
Euophrys aequipes (Pickard-Cambridge, 1871) (N, S)
Euophrys difficilis (Simon, 1868) (N, S, Si)
Euophrys erratica (Walckenaer, 1825) (N, S, Sa)
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) (N, S, Sa)
Euophrys gambosa (Simon, 1868) (N, S, Si)
Euophrys herbigrada (Simon, 1871) (N, S)
Euophrys innotata (Simon, 1868) (S)
Euophrys lanigera (Simon, 1871) (N, S, Si)
Euophrys luridata (Simon, 1868) (N)
Euophrys petrensis C.L. Koch, 1837 (N)
Euophrys rufibarbis (Simon, 1868) (N, S, Si, Sa)
Euophrys sulfurea (L. Koch, 1867) (N, Si, Sa)
Euophrys terrestris (Simon, 1871) (N, S, Sa)
Euophrys testaceozonata di Caporiacco, 1922 (N)
Euophrys vafra (Blackwall, 1867) (N, S, Si)

Evarcha Simon, 1902

Evarcha arcuata (Clerck, 1758) (N, S, Si)
Evarcha falcata (Clerck, 1758) (N, S, Si, Sa)
Evarcha jucunda (Lucas, 1846) (N, S, Si, Sa)
Evarcha laetabunda (C.L. Koch, 1848) (N)

Habrocestum Simon, 1876

Habrocestum latifasciatum (Simon, 1868) (S)
Habrocestum pullatum Simon, 1876 (S)

Hasarius Simon, 1871

Hasarius adansoni (Savigny & Audoin, 1825) (Si)

Heliophanus C.L. Koch, 1833

Heliophanus aeneus (Hahn, 1831) (N, S, Si)
Heliophanus apiatius Simon, 1868 (S, Si, Sa)
Heliophanus auratus C.L. Koch, 1835 (N, S, Sa)
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) (N, S, Si, Sa)
Heliophanus cognatus Simon, 1868 (N) (*)

Heliophanus dubius C.L. Koch, 1835 (N, S)
Heliophanus encifer Simon, 1871 (N)
Heliophanus equester L. Koch, 1867 (Si)
Heliophanus flavipes (Hahn, 1831) (N, S, Si, Sa)
Heliophanus furcillatus Simon, 1868 (Si)
Heliophanus kochi Simon, 1868 (N, S, Sa)
Heliophanus lineiventris Simon, 1868 (N, S, Si)
Heliophanus melinus L. Koch, 1867 (N, S, Si, Sa)
Heliophanus nitens C.L. Koch, 1846 (N, Si) (*)
Heliophanus nitidus (Lucas, 1846) (Si) (*)
Heliophanus patagiatus Thorell, 1875 (N)
Heliophanus recurvus Simon, 1868 (N, S, Sa)
Heliophanus rufithorax Simon, 1868 (N, S, Sa)
Heliophanus simplex Simon, 1868 (S)
Heliophanus tribulosus Simon, 1868 (N, S, Si)
Heliophanus tricinctus C.L. Koch, 1837 (N) (*)

Icius Simon, 1876

Icius castriesianus (Grube, 1861) (N, S, Si)
Icius congener (Simon, 1871) (N, S, Si, Sa)
Icius erraticus (Lucas, 1846) (S)
Icius hamatus (C.L. Koch, 1846) (N, S, Si, Sa)
Icius subinermis Simon, 1837 (S, Si, Sa)

Leptorchestes Thorell, 1870

Leptorchestes berolinensis (C.L. Koch, 1846) (N, S)
Leptorchestes mutilloides (Lucas, 1846) (N, S, Si, Sa)
Leptorchestes perezii (Simon, 1868) (N)

Marpissa C.L. Koch, 1846

Marpissa muscosa (Clerck, 1758) (N, S, Sa)
Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) (N, S)
Marpissa pomatia (Walckenaer, 1802) (N, Sa)
Marpissa radiata (Grube, 1859) (N, S)

Menemerus Simon, 1868

Menemerus bivittatus (Dufour, 1831) (N)
Menemerus falsificus Simon, 1868 (N, S) (*)
Menemerus semilimbatus (Hahn, 1827) (N, S, Si, Sa)
Menemerus taeniatus (L. Koch, 1867) (N, S, Si)

Mithion Simon, 1884

Mithion canestrinii (Ninni, 1868) (N, S, Si, Sa)

Mogrus Simon, 1882

Mogrus canescens (C.L. Koch, 1846) (N)
Mogrus frontosus (Simon, 1871) (N, Sa)

Myrmarachne McLeay, 1839

Myrmarachne formicaria (Degeer, 1778) (N, S, Si, Sa)

Naetha Simon, 1876

Naetha cerussata (Simon, 1868) (Si)
Naetha membrosa (Simon, 1868) (N, Si, Sa)

Neon Simon, 1876

Neon laevis (Simon, 1871) (N, Si)
Neon rayi (Simon, 1875) (N)
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) (N)

Pellenes Simon, 1876

Pellenes arciger (Walckenaer, 1837) (N, Sa)
Pellenes brevis (Simon, 1868) (N)
Pellenes geniculatus (Simon, 1868) (N, Si, Sa)
Pellenes nigrociliatus (Simon, , 1875) (N, S, Si)
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) (S, Si)

Philaeus Thorell, 1869

Philaeus albovariegatus (Simon, 1868) (Si)
Philaeus chrysops (Poda, 1761) (N, S, Si, Sa)

Phlegra Simon, 1876

Phlegra bresnieri (Lucas, 1846) (N, S, Si, Sa)
Phlegra cinereofasciata (Simon, 1868) (N)
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) (N, S)
Phlegra fulvastra (Simon, 1868) (Si)
Phlegra lineata (C.L. Koch, 1848) (N, S, Si, Sa)
Phlegra nobilis (L. Koch, 1876) (N)
Phlegra rogenhoferi (Simon, 1868) (N)

Plexippus C.L. Koch, 1846

Plexippus paykulli (Savigny & Audoin, 1825) (S, Si, Sa)

Pseudicius Simon, 1885

- Pseudicius badius* (Simon, 1868) (N, S, Si)
- Pseudicius encarpatus* (Walckenaer, 1802) (N, S, Si, Sa)
- Pseudicius picaceus* (Simon, 1868) (N, S, Si)

Saitis Simon, 1876

- Saitis barbipes* (Simon, 1868) (N, S)
- Saitis sancteuphemiae* Kolosvary, 1938 (S) (E)

Salticus Latreille, 1804

- Salticus cingulatus* (Panzer, 1797) (N)
- Salticus conjunctus* (Simon, 1868) (N, S, Sa)
- Salticus mandibularis* (Simon, 1868) (N)
- Salticus mutabilis* Lucas, 1846 (N, S, Si, Sa)
- Salticus propinquus* Lucas, 1846 (S, Si)
- Salticus scenicus* (Clerck, 1758) (N, S, Si, Sa)
- Salticus scitulus* (Simon, 1868) (Si)
- Salticus simoni* Kulczynski, 1907 (N, S, Si)
- Salticus unciger* (Simon, 1868) (N, Si)
- Salticus zebraneus* (C. Koch, 1837) (N, S)

Sitticus Simon, 1901

- Sitticus caricis* (Westring, 1861) (N, S)
- Sitticus distinguendus* (Simon, 1868) (N)
- Sitticus dzieduszyckii* (C.L. Koch, 1870) (S)
- Sitticus floricola* (L. Koch, 1837) (N, S)
- Sitticus histrio* (Simon, 1875) (N, S)
- Sitticus longipes* (Canestrini, 1873) (N)
- Sitticus penicillatus* (Simon, 1875) (N)
- Sitticus pubescens* (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa)
- Sitticus rupicola* (C.L. Koch, 1837) (N)
- Sitticus saxicola* (C.L. Koch, 1848) (N)
- Sitticus terebratus* (Clerck, 1758) (N, S)
- Sitticus zimmemanni* (Simon, 1877) (N, S)

Synageles Simon, 1876

- Synageles albotrimaculatus* (Lucas, 1846) (S, Si, Sa)
- Synageles dalmaticus* (Keyserling, 1863) (S, Si)
- Synageles hilarulus* (C.L. Koch, 1846) (N)
- Synageles venator* (Lucas, 1836) (N, S, Sa)

Thyene Simon, 1885

Thyene imperialis (Rossi, 1846) (S, Si, Sa)

Yllenus Simon, 1868

Yllenus salsicola (Simon, 1937) (Si)

Yllenus univittatus (Simon, 1871) (Sa)

Note

Heliophanus cognatus: Species inquirenda.

Heliophanus nitens: Species inquirenda.

Heliophanus nitidus: Species inquirenda.

Heliophanus tricinctus: Species inquirenda.

Menemerus falsificus: Species inquirenda.

Opilioacarida

Opilioacaridae

Opilioacarus With, 1902

Opilioacarus italicus (With, 1904) (S, Si, Sa)

Ixodida

Argasidae

Argas (Persicargas) Kaiser, Hoogstraal & Kohls, 1964

Argas (Persicargas) persicus (Oken, 1818) (N, S)

Argas (Argas) Latreille, 1796

Argas (Argas) reflexus (Fabricius, 1794) (N, S)

Argas (Secretargas) Hoogstraal, 1957

Argas (Secretargas) transgaripepinus White, 1846 (N, S, Sa)

Argas (Carios) Latreille, 1796

Argas (Carios) vespertilionis (Latreille, 1802) (N, S, Si, Sa)

Ornithodoros (Alectorobius) Pocock, 1907

Ornithodoros (Alectorobius) coniceps (G. Canestrini, 1890) (N, S, Si)
Ornithodoros (Alectorobius) maritimus Vermeil & Marguet, 1967 (Sa)

Ornithodoros (Pavlovskyella) Pespeleva-Shtrom, 1950

Ornithodoros (Pavlovskyella) erraticus (Lucas, 1849) (S)

Ixodidae

Boophilus Curtice, 1891

Boophilus annulatus (Say, 1821) (S, Si, Sa)

Dermacentor C.L. Koch, 1844

Dermacentor marginatus (Sulzer, 1776) (N, S, Si, Sa)

Haemaphysalis (Haemaphysalis) C.L. Koch, 1844

Haemaphysalis (Haemaphysalis) concinna C.L. Koch, 1844 (N)

Haemaphysalis (Haemaphysalis) parva Neumann, 1897 (S)

Haemaphysalis (Rhipistoma) C.L. Koch, 1844

Haemaphysalis (Rhipistoma) erinacei Pavesi, 1884 (S)

Haemaphysalis (Alloceraea) Schulze, 1918

Haemaphysalis (Alloceraea) inermis Birula, 1895 (N, S)

Haemaphysalis (Aboimisalis) Santos Dia, 1963

Haemaphysalis (Aboimisalis) punctata G. Canestrini & Fanzago, 1877 (N, S, Si, Sa)

Haemaphysalis (Herpetobia) G. Canestrini, 1890

Haemaphysalis (Herpetobia) sulcata (G. Canestrini & Fanzago, 1878) (N, S, Sa)

Hyalomma (Hyalomma) C.L. Koch, 1844

Hyalomma (Hyalomma) anatolicum C.L. Koch, 1844

Hyalomma (Hyalomma) anatolicum excavatum C.L. Koch, 1844 (S, Si, Sa)

Hyalomma (Hyalomma) detritum Schulze, 1919

Hyalomma (Hyalomma) detritum detritum Schulze, 1919 (S, Si, Sa)

Hyalomma (Hyalomma) detritum scupense Schulze, 1918 (S, Si, Sa)

Hyalomma (Hyalomma) lusitanicum C.L. Koch, 1844 (S, Si, Sa)

Hyalomma (Hyalomma) marginatum C.L. Koch, 1844

Hyalomma (Hyalomma) marginatum marginatum C.L. Koch, 1844 (N, S, Si, Sa)

Hyalomma (Hyalomma) marginatum rufipes C.L. Koch, 1844 (Si)

***Hyalomma (Hyalommasta)* Schulze, 1930**

Hyalomma (Hyalommasta) aegyptium (Linnaeus, 1758) (S, Sa)

***Ixodes (Ixodes)* Latreille, 1795**

Ixodes (Ixodes) acuminatus Neumann, 1901 (N, S)

Ixodes (Ixodes) gibbosus Nuttall, 1916 (S)

Ixodes (Ixodes) ricinus (Linnaeus, 1758) (N, S)

Ixodes (Ixodes) ventalloi Gil Collado, 1936 (S)

***Ixodes (Eschatocephalus)* Frauenfeld, 1853**

Ixodes (Eschatocephalus) simplex Neumann, 1906 (Sa)

Ixodes (Eschatocephalus) vespertilionis C.L. Koch, 1844 (N, S, Sa)

***Ixodes (Exopalpiger)* Schulze, 1935**

Ixodes (Exopalpiger) trianguliceps (Birula, 1895) (N, S) (*)

***Ixodes (Pholeoixodes)* Schulze, 1942**

Ixodes (Pholeoixodes) arboricola Schulze & Schlottke, 1929 (S)

Ixodes (Pholeoixodes) canisuga Johnston, 1849 (N, S)

Ixodes (Pholeoixodes) hexagonus Leach, 1815 (N, S, Sa)

***Ixodes (Scaphixodes)* Schulze, 1941**

Ixodes (Scaphixodes) caledonicus Nuttall, 1910 (Sa)

Ixodes (Scaphixodes) frontalis (Panzer, 1795) (N, S, Sa)

***Rhipicephalus (Digineus)* Pomerantzev, 1936**

Rhipicephalus (Digineus) bursa G. Canestrini & Fanzago, 1877 (N, S, Si, Sa)

***Rhipicephalus (Rhipicephalus)* C.L. Koch, 1844**

Rhipicephalus (Rhipicephalus) pusillus Gil Collado, 1938 (S, Si, Sa)

Rhipicephalus (Rhipicephalus) sanguineus (Latreille, 1806) (N, S, Si, Sa)

Rhipicephalus (Rhipicephalus) turanicus Pomerantzev, 1940 (S, Si, Sa)

Note

Ixodes (Exopalpiger) trianguliceps: Trovato da G. Manilla sulla Maiella.

Gamasida

Sejidae

Sejus C.L. Koch, 1836

Sejus italicus Berlese, 1916 (S)

Sejus togatus C.L. Koch, 1836 (S)

Ichthyostomatogasteridae

Asternolaelaps Berlese, 1923

Asternolaelaps fecundus Berlese, 1923 (S)

Epicriidae

Epicrius G. Canestrini & Fanzago, 1877

Epicrius canestrinii (Haller, 1881) (N)

Epicrius mollis (Kramer, 1876) (N, S, Si)

Berlesiana Turk, 1943

Berlesiana cirrata (Berlese, 1916) (N, S)

Zerconidae

Parazercon Trägårdh, 1931

Parazercon belunensis Lombardini, 1962 (N)

Parazercon radiatus (Berlese, 1910) (N)

Prozercon Sellnick, 1943

Prozercon fimbriatus (C.L. Koch, 1839) (N, S, Si, Sa)

Prozercon ornatus (Berlese, 1904) (S, Si, Sa)

Prozercon traegardhi (Halbert, 1923) (N)

Zercon C.L. Koch, 1836

Zercon andrei Sellnick, 1958 (N)

Zercon berlesei Sellnick, 1958 (N)
Zercon capillatus Berlese, 1914 (N, Si)
Zercon colligans Berlese, 1920 (N, S)
Zercon crinitus Berlese, 1920 (N)
Zercon echinatus Schweizer, 1922 (N)
Zercon forliensis Sellnick, 1944 (N)
Zercon franzi (Willmann, 1943) (N)
Zercon furcatus G. Canestrini & Fanzago, 1876 (N)
Zercon hispanicus Sellnick, 1958 (N)
Zercon italicus Sellnick, 1944 (N)
Zercon latissimus Sellnick, 1944 (N)
Zercon montanus Willmann, 1953 (N)
Zercon mucronatus G. Canestrini & Fanzago, 1876 (N)
Zercon perforatulus Berlese, 1904 (N, S, Si)
Zercon plumatopilus Athias-Henriot, 1961 (S)
Zercon rhoi Valle, 1965 (N)
Zercon romagniolus Sellnick, 1944 (N)
Zercon sarasinorum Schweizer, 1949 (N)
Zercon similis Sellnick, 1958 (N)
Zercon triangularis C.L. Koch, 1836
 Zercon triangularis triangularis C.L. Koch, 1836 (N, S, Si)
 Zercon triangularis caudatus Berlese, 1910 (N, S)
Zercon zangherii Sellnick, 1944 (N)

Cillibidae

Cilliba von Heyden, 1826

Cilliba antennurelloides Lombardini, 1943 (N) (*)
Cilliba cassidea (Hermann, 1804) (N, S, Si)
Cilliba foroliviensis (Lombardini, 1961) (N)
Cilliba triplicitercutata Lombardini, 1943 (N) (*)

Note

Cilliba antennurelloides: Descritta su una ninfa come *Discopoma antennurelloides*; attribuzione generica incerta e specie inquirenda.
Cilliba triplicitercutata: Specie di dubbia validità.

Dinychidae

Dinychus Kramer, 1886

Dinychus carinatus Berlese, 1903 (N, S)
Dinychus perforatus Kramer, 1886 (N, S)
Dinychus stratus Sellnick, 1945 (N, S)

Dinychus tetraphyllus Berlese, 1903 (N, S)

Nenteriidae

Nenteria Oudemans, 1915

Nenteria pilosella (Berlese, 1904) (S)

Nenteria stylifera (Berlese, 1904) (S)

Discourellidae

Discourella Berlese, 1910

Discourella cosmogyna Berlese, 1910 (Sa)

Discourella modesta (Leonardi, 1899) (N, S, Si)

Discourella venusta (Berlese, 1884) (Si)

Metagynuridae

Metagynella Berlese, 1919

Metagynella paradoxa Berlese, 1919 (S)

Oplitidae

Oplitis Berlese, 1884

Oplitis berleseiphiloctena Hirschmann, 1991 (S)

Oplitis conspicua (Berlese, 1903) (N)

Oplitis farrieri Gorirossi Bourdeau, 1993 (N)

Oplitis leonardiana (Berlese, 1903) (N, S)

Oplitis minutissima (Berlese, 1903)

Oplitis minutissima minutissima (Berlese, 1903) (N)

Oplitis minutissima villosella Berlese, 1904 (S)

Oplitis ovatula (Berlese, 1903) (S)

Oplitis paradoxa (G. Canestrini & Berlese, 1884) (N, S)

Oplitis ricasoliana (Berlese, 1889) (S)

Oplitis zavattarii Valle, 1955 (S)

Phaulodinychidae

Phaulodinychus Berlese, 1903

Phaulodinychus hamuliferus (Michael, 1884) (S)
Phaulodinychus mitis (Leonardi, 1899) (N, S)
Phaulodinychus porticensis (Berlese, 1903) (S, Sa)
Phaulodinychus pulcherrimus (Berlese, 1903) (N, S)
Phaulodinychus simplex (Berlese, 1904) (S)
Phaulodinychus splendidus Kramer, 1882 (N, S, Si, Sa)

Polyaspididae

Polyaspis Berlese, 1881

Polyaspis patavinus Berlese, 1881 (N, S)
Polyaspis repandus Berlese, 1883 (N, S)
Polyaspis sansonei Berlese, 1916 (S)

Polyaspinidae

Apionoseius Berlese, 1904

Apionoseius infirmus (Berlese, 1887) (N)
Apionoseius ovatus (Leonardi, 1896) (S)

Uroseius Berlese, 1888

Uroseius acuminatus (C.L. Koch, 1847) (N, S)
Uroseius hunzikeri Schweizer, 1922 (N, S)
Uroseius sorrentinus (Lombardini, 1952) (S)

Thrichocyllibidae

Thrichocylliba Berlese, 1903

Thrichocylliba comata (Leonardi, 1895) (S)

Trachytidae

Trachytes Michael, 1894

Trachytes aegrota (C.L. Koch, 1841) (N, S)
Trachytes lambda Berlese, 1904 (S)
Trachytes mystacinus Berlese, 1910 (N)
Trachytes pauperior (Berlese, 1914) (N)
Trachytes pi Berlese, 1910 (S, Si)
Trachytes tuberifer Berlese, 1914 (N, S)

Trachyuropodidae

Trachyuropoda Berlese, 1888

- Trachyuropoda belunensis* (Lombardini, 1962) (N)
- Trachyuropoda berlesiana* (Berlese, 1887) (N)
- Trachyuropoda canestriniana* (Berlese, 1891) (S)
- Trachyuropoda coccinea* (Michael, 1891) (N, S)
- Trachyuropoda cristiceps* (G. Canestrini, 1884) (N, S)
- Trachyuropoda excavata* (Wasmann, 1899) (N)
- Trachyuropoda imperforata* (Berlese, 1904) (S)
- Trachyuropoda lagrecai* Lombardini, 1947 (S) (*)
- Trachyuropoda magna* (Leonardi, 1895) (S)
- Trachyuropoda pseudoperforata* Lombardini, 1947 (N, S) (*)
- Trachyuropoda riccardiana* (Leonardi, 1895) (N, S)
- Trachyuropoda sinuata* Berlese, 1904 (N, S)
- Trachyuropoda troguloides* (Gervais, 1844) (N)

Note

Trachyuropoda lagrecai: Secondo Hirschmann & Wisniewski (1993): species incertae sedis.
Trachyuropoda pseudoperforata: Non contemplata nei cataloghi recenti.

Trematuridae

Trichouropoda Berlese, 1916

- Trichouropoda campomolendina* (Berlese, 1887) (N)
- Trichouropoda karawaievi* (Berlese, 1904) (N, S)
- Trichouropoda latina* (Berlese, 1916) (S)
- Trichouropoda livorniana* Wisniewski & Hirschmann, 1988 (*)
- Trichouropoda orbicularis* (C.L. Koch, 1839) (N, S)
- Trichouropoda ovalis* (C.L. Koch, 1839)
 - Trichouropoda ovalis ovalis* (C.L. Koch, 1839) (N)
 - Trichouropoda ovalis thorianae* (Berlese, 1904) (S)
- Trichouropoda patavina* (G. Canestrini, 1885) (N, S)
- Trichouropoda sardensis* Hirschmann & Zirngiebl-Nicol, 1961 (Sa)
- Trichouropoda schreiberi* Valle, 1951 (N, S) (*)
- Trichouropoda zocchii* (Lombardini, 1962) (S) (*)

Note

Trichouropoda livorniana: Su coleottero (Cerambycidae) in Italia.
Trichouropoda schreiberi: Specie di dubbia validità.
Trichouropoda zocchii: Hirschmann & Wisniewski (1993) riportano T. ? zocchii.

Urodiaspididae

Urodiaspis Berlese, 1916

Urodiaspis rectangulovata Berlese, 1916 (S)

Urodiaspis tecta (Kramer, 1876) (N, S)

Urodinychidae

Uroobovella Berlese, 1903

Uroobovella appendiculata (Berlese, 1910) (S, Sa)

Uroobovella belunensis Lombardini, 1962 (N)

Uroobovella carinata (Berlese, 1888) (N, S)

Uroobovella fimicola (Berlese, 1903) (N, S, Si)

Uroobovella flabelliger (Berlese, 1910) (S)

Uroobovella foraminifera (Berlese, 1903) (S)

Uroobovella fracta (Berlese, 1916) (S)

Uroobovella marginata (C.L. Koch, 1839) (N, S, Si)

Uroobovella nostras Berlese, 1918 (N)

Uroobovella obovata (G. Canestrini & Berlese, 1884) (N)

Uroobovella pulchella (Berlese, 1904) (S)

Uroobovella pyriformis (Berlese, 1920) (S)

Uroobovella rackei (Oudemans, 1912) (N, S)

Uroobovella rackeialpha (Valle, 1954) (N)

Uroobovella valle (Sellnick, 1959) (N, S, Sa)

Uroobovella venusta (Berlese, 1916) (S)

Uropodidae

Phaulocylliba Berlese, 1903

Phaulocylliba ventricosa Berlese, 1904 (N, S) (*)

Uropoda Latreille, 1806

Uropoda alpina Berlese, 1904 (N) (*)

Uropoda distinguenda Berlese, 1903 (S) (*)

Uropoda inflata (Berlese, 1916) (S)

Uropoda italica Hirschmann & Zirngiebl-Nicol, 1969 (N, S)

Uropoda lagena (Berlese, 1882) (S)

Uropoda michaeliana Leonardi, 1896 (N, S) (*)

Uropoda minima Kramer, 1882 (N, S, Si, Sa)

Uropoda minor (Berlese, 1885) (S)

Uropoda orbicularis (O.F. Müller, 1776) (N, S, Sa)
Uropoda productior Berlese, 1916 (S) (*)
Uropoda tridentina (G. Canestrini & Fanzago, 1878) (N) (*)

Note

Phaulocylliba ventricosa: Secondo Hirschmann & Wisniewski (1993): species incertae sedis.
Uropoda alpina: Secondo Hirschmann & Wisniewski (1993): species incertae sedis.
Uropoda distinguenda: Secondo Hirschmann & Wisniewski (1993): species incertae sedis.
Uropoda michaeliana: Non contemplata nei cataloghi recenti.
Uropoda productior: Secondo Hirschmann & Wisniewski (1993): species incertae sedis.
Uropoda tridentina: Secondo Hirschmann & Wisniewski (1993): species incertae sedis.

Asternoseiidae

Asternoseius Berlese, 1910

Asternoseius ciliatus Berlese, 1910 (N)

Seioididae

Seiodes Berlese, 1887

Seiodes histricinus Berlese, 1892 (N)
Seiodes ursinus Berlese, 1887 (Si)

Messoracaridae

Messoracarus Silvestri, 1912

Messoracarus mirandus Silvestri, 1912 (S, Si)

Antennophoridae

Antennophorus Haller, 1877

Antennophorus uhlmanni Haller, 1877 (N)

Celaenopsidae

Celaenopsis Berlese, 1886

Celaenopsis andreinii Berlese, 1910 (S)

Celaenopsis badius (C.L. Koch, 1839) (N, S)

Parantennulidae

Parantennulus Berlese, 1904

Parantennulus scolopendrarum (Berlese, 1886) (S, Si)

Parasitidae

Amblygamasus Berlese, 1903

Amblygamasus dentipes (C.L. Koch, 1839) (S)

Amblygamasus hamatus (C.L. Koch, 1839) (N, S, Si, Sa)

Amblygamasus mirifactus Athias-Henriot, 1967 (S)

Amblygamasus sagitta (Berlese, 1903) (S)

Amblygamasus tiberinus (G. Canestrini, 1883) (S)

Colpothylax Athias-Henriot, 1980

Colpothylax exilis (Berlese, 1883) (N, S)

Cornigamasus Evans & Till, 1979

Cornigamasus lunaris (Berlese, 1882) (N, S)

Eugamasus Berlese, 1892

Eugamasus berlesei (Willmann, 1935) (N)

Eugamasus comelicensis Lombardini, 1962 (N)

Eugamasus magnus (Kramer, 1876) (N)

Eugamasus monticolus (Berlese, 1906) (N)

Holoparasitus Oudemans, 1936

Holoparasitus apenninorum (Berlese, 1905) (S)

Holoparasitus calcaratus (C.L. Koch, 1839) (N, S)

Holoparasitus cultriger (Berlese, 1906) (S)

Holoparasitus dallaii Witalinski, 1993 (Sa)

Holoparasitus excipuliger (Berlese, 1903) (N)

Holoparasitus peraltus (Berlese, 1903) (N)

Holoparasitus pollicipatus (Berlese, 1903) (N, S)

Holoparasitus pseudoperforatus (Berlese, 1903) (N)

Holoparasitus sculus (Berlese, 1906) (Si)

Leptogamasus Trägårdh, 1936

Leptogamasus parvulus (Berlese, 1903)
Leptogamasus parvulus parvulus (Berlese, 1903) (N)
Leptogamasus parvulus dilatatellus (Berlese, 1906) (S)
Leptogamasus parvulus distinctellus (Berlese, 1906) (N)

Lysigamasus Karg, 1971

Lysigamasus falculiger (Berlese, 1906) (N)
Lysigamasus misellus (Berlese, 1903) (N, S)
Lysigamasus runcatellus (Berlese, 1903) (N)
Lysigamasus runciger (Berlese, 1903) (N)

Paracarpais Athias-Henriot, 1978

Paracarpais furcatus (G. Canestrini & R. Canestrini, 1882) (N)

Paragamasus Hull, 1918

Paragamasus alpestris (Berlese, 1903) (N)
Paragamasus decipiens (Berlese, 1903) (N, S)
Paragamasus varpulus Athias-Henriot, 1967 (N)

Parasitellus Willmann, 1939

Parasitellus fucorum de Geer, 1778 (N, S, Si, Sa)

Parasitus Latreille, 1795

Parasitus coleoptratorum (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)
Parasitus consanguineus Oudemans & Voigts, 1906 (Sa)
Parasitus distinctus Berlese, 1903 (N, S)
Parasitus fimetorum (Berlese, 1903) (N, S, Si)
Parasitus hortivagus (Berlese, 1903) (N, S, Sa)
Parasitus kempersi Oudemans, 1902 (S)
Parasitus loricatus (Wankel, 1861) (N, S)
Parasitus lunulatus (J. Müller, 1859) (N, S)
Parasitus mustelarum Oudemans, 1902 (N, S)
Parasitus mycophilus Karg, 1971 (N)
Parasitus neglectus (Berlese, 1903) (S)
Parasitus reticulatus Berlese, 1903 (N, S, Si)

Pergamasus Berlese, 1904

Pergamasus alpinus (Berlese, 1903) (N, S)
Pergamasus belunensis Lombardini, 1962 (N)
Pergamasus brevipes (Berlese, 1906) (S)
Pergamasus canestrinii (Berlese, 1884) (N, S)

Pergamasus clavornatus Athias-Henriot, 1967 (S)
Pergamasus crassipes (Linnaeus, 1758) (N, S)
Pergamasus franzi Willmann, 1951 (N)
Pergamasus giganteus Willmann, 1932 (*)
Pergamasus italicus Oudemans, 1905 (N)
Pergamasus longicornis (Berlese, 1906) (S)
Pergamasus minor (Berlese, 1892)
 Pergamasus minor minor (Berlese, 1892) (N)
 Pergamasus minor pugillator (Berlese, 1903) (N)
Pergamasus noster (Berlese, 1903) (N)
Pergamasus oxygynellus (Berlese, 1903)
 Pergamasus oxygynellus oxygynellus (Berlese, 1903) (N)
 Pergamasus oxygynellus minimus (Berlese, 1906) (N)
Pergamasus policensis (Berlese, 1910) (Si)
Pergamasus quisquiliarum (G. Canestrini & R. Canestrini, 1882) (N, S, Si, Sa)
Pergamasus rhopalognus (Berlese, 1910) (Si)
Pergamasus theseus (Berlese, 1903) (N, S)

Poecilochirus G. Canestrini & R. Canestrini, 1882

Poecilochirus carabi G. Canestrini & R. Canestrini, 1882 (N)

Trachygamasus Berlese, 1906

Trachygamasus pusillus (Berlese, 1892) (N, S)

Vulgarogamasus Tichomirov, 1969

Vulgarogamasus chortophilus (Berlese, 1904) (N, S)
Vulgarogamasus remberti (Oudemans, 1912) (N)

Note

Pergamasus giganteus: In grotte, in Italia.

Ologamasidae

Hydrogamasus Berlese, 1892

Hydrogamasus giardi (Berlese & Trouessart, 1889) (*)
Hydrogamasus littoralis (G. Canestrini & R. Canestrini, 1881) (N, S)

Stylochyrus G. Canestrini & R. Canestrini, 1882

Stylochyrus ampulliger (Berlese, 1908) (S)
Stylochyrus rovennensis G. Canestrini & R. Canestrini, 1882 (N)

Note

Hydrogamasus giardi: Segnalata per l'Italia senza indicazione di località.

Rhodacaridae

Gamasiphis Berlese, 1904

Gamasiphis pulchellus (Berlese, 1887) (N, S)

Rhodacarellus Willmann, 1935

Rhodacarellus silesiacus Willmann, 1935 (S)

Rhodacarus Oudemans, 1902

Rhodacarus coronatus Berlese, 1920 (S)

Rhodacarus denticulatus Berlese, 1920 (S)

Rhodacarus roseus Oudemans, 1902 (N, S)

Rhodacarus strenzkei Willmann, 1957

Rhodacarus strenzkei strictior Lombardini, 1962 (N)

Digamasellidae

Cornodendrolaelaps Hirschmann & Wisniewski, 1982

Cornodendrolaelaps presepum (Berlese, 1918) (N, S)

Digamasellus Berlese, 1905

Digamasellus gracilis Berlese, 1920 (S)

Digamasellus punctum (Berlese, 1904) (N, S)

Digamasellus reticulatus Berlese, 1920 (N, S, Si, Sa)

Digamasellus rhodacaroides Berlese, 1920 (S)

Digamasellus simplex Berlese, 1920 (S)

Insectolaelaps Shcherbak, 1980

Insectolaelaps quadrisetus (Berlese, 1920) (S)

Euryparasitidae

Cyrtolaelaps Berlese, 1887

Cyrtolaelaps aster (Berlese, 1918) (Sa)

Cyrtolaelaps mucronatus (G. Canestrini & R. Canestrini, 1881) (N, S)
Cyrtolaelaps subnudus (Berlese, 1918) (S)

Euryparasitus Oudemans, 1902

Euryparasitus emarginatus (C.L. Koch, 1839) (N)

Starkovia Lombardini, 1947

Starkovia termitophila Lombardini, 1947 (S) (*)

Note

Starkovia: Genere dubbio.

Starkovia termitophila: Specie inquirenda.

Gamasellidae

Gamasellus Berlese, 1892

Gamasellus bisetus (Berlese, 1891) (S)
Gamasellus falciger (G. Canestrini & R. Canestrini, 1881) (N, S)
Gamasellus iphidiformis (Berlese, 1904) (S)
Gamasellus montanus (Willmann, 1936)
Gamasellus montanus italicus Lombardini, 1962 (N)
Gamasellus nepotulus Berlese, 1908 (S, Sa)
Gamasellus nivalis Schweizer, 1949 (N)
Gamasellus quadripilus Berlese, 1920 (S)
Gamasellus robustipes Berlese, 1908 (S)
Gamasellus spiricornis (G. Canestrini & R. Canestrini, 1882) (N)

Veigaiidae

Gamasolaelaps Berlese, 1904

Gamasolaelaps aurantiacus (Berlese, 1903) (N, S)

Veigaia Oudemans, 1905

Veigaia agilis (Berlese, 1916) (S)
Veigaia cerva (Kramer, 1876) (N)
Veigaia exigua (Berlese, 1916) (S)
Veigaia kochi (Trägårdh, 1901) (N, S)
Veigaia nemorensis (C.L. Koch, 1839) (N, S, Si, Sa)
Veigaia planicola (Berlese, 1892) (N, S, Si, Sa)

Macrochelidae

Geholaspis Berlese, 1918

- Geholaspis alpina* (Berlese, 1887) (N, S)
- Geholaspis berlesei* Valle, 1953 (N)
- Geholaspis bianchii* Valle & Mazzoleni, 1967 (S)
- Geholaspis comelicensis* Lombardini, 1962 (N)
- Geholaspis foroliviensis* Lombardini, 1943 (N)
- Geholaspis hortorum* (Berlese, 1904) (N, S)
- Geholaspis ilvana* Valle & Mazzoleni, 1967 (S)
- Geholaspis lagrecai* Valle, 1963 (Si)
- Geholaspis longispinosa* (Kramer, 1876) (N, S)
- Geholaspis longula* (Berlese, 1882) (N, S, Si, Sa)
- Geholaspis mandibularis* (Berlese, 1904) (N, S)
- Geholaspis pauperior* (Berlese, 1918) (N, S)

Glyphtholaspis Filipponi & Pegazzano, 1960

- Glyphtholaspis americana* (Berlese, 1888) (N, S)
- Glyphtholaspis confusa* (Foà, 1900) (N, S)
- Glyphtholaspis fimicola* (Sellnick, 1931) (N, S, Si)
- Glyphtholaspis pontina* Filipponi & Pegazzano, 1960 (S)

Holostaspella Berlese, 1903

- Holostaspella bifoliata* (Trägårdh, 1952) (S)
- Holostaspella exornata* Filipponi & Pegazzano, 1967 (S)

Macrocheles Latreille, 1829

- Macrocheles carinatus* (C.L. Koch, 1839) (N)
- Macrocheles glaber* (J. Müller, 1860) (N, S, Si, Sa)
- Macrocheles hamatus* Oudemans, 1915 (*)
- Macrocheles insignitus* Berlese, 1918 (S)
- Macrocheles matrius* Hull, 1925 (N, S)
- Macrocheles merdarius* (Berlese, 1889) (N, S)
- Macrocheles minervae* Cicolani, 1982 (S)
- Macrocheles montivagus* (Berlese, 1887) (N, S)
- Macrocheles muscaedomesticae* (Scopoli, 1772) (N, S)
- Macrocheles penicilliger* (Berlese, 1904) (N, S)
- Macrocheles peniculatus* Berlese, 1918 (S)
- Macrocheles perglaber* Filipponi & Pegazzano, 1962 (N, S)
- Macrocheles pisentii* (Berlese, 1882) (N, S)
- Macrocheles punctatissimus* Berlese, 1918 (N)
- Macrocheles robustulus* Berlese, 1904 (N, S)

Macrocheles scutatus (Berlese, 1904) (N, S)
Macrocheles subbadius (Berlese, 1904) (N, S)
Macrocheles submarginatus Foà, 1900 (N, S)
Macrocheles terreus (G. Canestrini & Fanzago, 1876) (N, S, Sa)
Macrocheles tridentinus (G. Canestrini & R. Canestrini, 1882) (N, S)
Macrocheles vernalis (Berlese, 1887) (N, S, Si)

Neopodocinum Oudemans, 1902

Neopodocinum caputmedusae (Berlese, 1908) (S)

Note

Macrocheles hamatus: Segnalata per l'Italia senza indicazione di località.

Parholaspididae

Gamasholaspis Berlese, 1904

Gamasholaspis gamasoides (Berlese, 1904) (N, S)

Holaspulus Berlese, 1904

Holaspulus tenuipes (Berlese, 1904) (S)

Pachylaelapidae

Olopachys Berlese, 1910

Olopachys scutatus Berlese, 1910 (S, Si)

Onchodellus Berlese, 1904

Onchodellus reticulatus Berlese, 1904 (N)

Pachylaelaps Berlese, 1886

Pachylaelaps bellicosus Berlese, 1920 (S)
Pachylaelaps bifurciger Berlese, 1920 (Sa)
Pachylaelaps dubius Hirschmann & Krauss, 1965 (S)
Pachylaelaps ensifer Oudemans, 1902 (N, S)
Pachylaelaps fusciculiger Berlese, 1920 (Sa)
Pachylaelaps hispani Berlese, 1908 (S)
Pachylaelaps imitans Berlese, 1920 (N)
Pachylaelaps insularis (Berlese, 1883) (S, Si)
Pachylaelaps karawaiewi Berlese, 1920 (S)

Pachylaelaps latior Berlese, 1920 (N, S)
Pachylaelaps novus Sellnick, 1945 (N)
Pachylaelaps pectinifer (G. Canestrini & R. Canestrini, 1881) (N, S, Si)
Pachylaelaps regularis Berlese, 1920 (N)
Pachylaelaps sculptus Berlese, 1920 (N, S)
Pachylaelaps sculus Berlese, 1892 (N, S, Si)
Pachylaelaps squamifer Berlese, 1920 (N, S)
Pachylaelaps strigifer Berlese, 1892 (N, S)
Pachylaelaps tessellatus Berlese, 1920 (S)
Pachylaelaps tetragonoides (Dugès, 1834) (N)
Pachylaelaps virago Berlese, 1920 (S)

Pachyseius Berlese, 1910

Pachyseius humeralis Berlese, 1910 (S)

Sphaerolaelaps Berlese, 1903

Sphaerolaelaps calcariger (Berlese, 1902) (S)
Sphaerolaelaps holothyroides (Leonardi, 1896) (N, S)

Eviphididae

Alliphis Halbert, 1923

Alliphis halleri (G. Canestrini & R. Canestrini, 1881) (N, S)
Alliphis sculus (Oudemans, 1905) (S, Si)

Copriphis Berlese, 1910

Copriphis crinitus (Berlese, 1882) (N, S)
Copriphis falcinellus (R. Canestrini & G. Canestrini, 1882) (S, Si)
Copriphis pterophilus (Berlese, 1882) (N)

Evimirus Karg, 1963

Evimirus uropodinus (Berlese, 1903) (N, S)

Eviphis Berlese, 1903

Eviphis hirtellus (Berlese, 1892) (Si) (*)
Eviphis ostrinus (C.L. Koch, 1835) (N, S)

Iphidosoma Berlese, 1892

Iphidosoma fimetarium (J. Müller, 1859) (N)
Iphidosoma ovatum Berlese, 1892 (S)

Peletiphis Berlese, 1911

Peletiphis insignis Berlese, 1911 (N, S)

Scamaphis Karg, 1976

Scamaphis equestris (Berlese, 1911) (S)

Scarabaspis Womersley, 1956

Scarabaspis inexpectatus (Oudemans, 1903) (S)

Uroiphis Berlese, 1903

Uroiphis scabratus Berlese, 1903 (S)

Uroiphis striatus Berlese, 1903 (N, S, Sa)

Note

Eviphis hirtellus: Attribuzione generica incerta, specie non più reperita o citata in epoca recente.

Ascidae

Arctoseius Thor, 1930

Arctoseius cetratus Sellnick, 1940 (S)

Arctoseius eremita (Berlese, 1918) (N)

Arctoseius minutus (Halbert, 1915) (S)

Arctoseius semiscissus (Berlese, 1892) (S)

Arctoseius venustulus (Berlese, 1916) (S, Si)

Asca von Heyden, 1826

Asca aphidioides (Linnaeus, 1758) (N, S, Sa)

Asca bicornis (G. Canestrini & Fanzago, 1876) (N, S)

Blattisocius Keegan, 1944

Blattisocius dentriticus (Berlese, 1918) (S, Sa)

Blattisocius keegani Fox, 1947 (S)

Blattisocius tarsalis (Berlese, 1918) (S)

Cheiroseius Berlese, 1916

Cheiroseius alpestris Berlese, 1916 (N)

Cheiroseius borealis (Berlese, 1904)
 Cheiroseius borealis borealis (Berlese, 1904) (N, S)
 Cheiroseius borealis temperatus Berlese, 1916 (S, Si)
Cheiroseius curtipes (Halbert, 1923) (N)
Cheiroseius glaber (Berlese, 1886) (N)
Cheiroseius laelaptoides (Berlese, 1887) (N, S)
Cheiroseius mutilus (Berlese, 1916) (N, S)
Cheiroseius unguiculatus (Berlese, 1887) (N)
Cheiroseius viduus C.L. Koch, 1839 (N, S)

Iphidozercon Berlese, 1903

Iphidozercon gibbus (Berlese, 1903) (N, S, Sa)

Lasioseius Berlese, 1916

Lasioseius berlesei (Oudemans, 1938) (N, S)
 Lasioseius cynari Chant, 1963 (*)
 Lasioseius fissuratus Berlese, 1916
 Lasioseius fissuratus nostras Berlese, 1916 (S)
 Lasioseius furcisetus Athias-Henriot, 1959 (S, Sa)
 Lasioseius grandis Berlese, 1916 (N, S, Si)
 Lasioseius penicilliger Berlese, 1916 (N)
 Lasioseius pusillus Berlese, 1916 (N, S)
 Lasioseius similis Berlese, 1916 (N, S) (*)

Leioseius Berlese, 1916

Leioseius bicolor (Berlese, 1918) (N, S, Sa)
 Leioseius elongatus Evans, 1958 (*)
 Leioseius minusculus (Berlese, 1905) (N)
 Leioseius setosulus Berlese, 1916 (S)

Platyseius Berlese, 1916

Platyseius subglaber (Oudemans, 1903) (N)

Plesiosejus Evans & Hyatt, 1960

Plesiosejus italicus (Berlese, 1905) (N, S)

Proctolaelaps Berlese, 1914

Proctolaelaps eccoptogasteris Vitzthum, 1923 (S) (*)
 Proctolaelaps pygmaeus (J. Müller, 1860) (N, S, Si)
 Proctolaelaps striatus Westerboer, 1963 (Si)
 Proctolaelaps ventrianalis Karg, 1971 (S)

Protogamasellus Karg, 1962

Protogamasellus massulus (Athias-Henriot, 1961) (S)

Zerconopsis Hull, 1918

Zerconopsis remiger (Kramer, 1876) (S, Si)

Zercoseius Berlese, 1916

Zercoseius paliger Berlese, 1916 (S)

Zercoseius spathuliger (Leonardi, 1899) (S, Si)

Note

Lasioseius cynari: Intercettata alla dogana di Philadelphia, U.S.A., su vegetali provenienti dall'Italia.

Lasioseius similis: Forse sinonimo di *L. serratus* Halbert, 1915.

Leioseius elongatus: Segnalata per l'Italia senza indicazione di località.

Proctolaelaps eccoptogasteris: Secondo Karg (1993) da attribuirsi al genere *Garmaniella* Westerboer, 1963 (Fam. Ameroseiidae).

Halolaelapidae

Dinychella Berlese, 1888

Dinychella asperata Berlese, 1888 (S)

Halolaelaps Berlese & Trouessart, 1889

Halolaelaps sexclavatus (Oudemans, 1902) (S)

Leitneria Evans, 1957

Leitneria pugio (Karg, 1961) (S)

Phytoseiidae

Amblyseius Berlese, 1914

Amblyseius alpinus Schweizer, 1922 (S)

Amblyseius andersoni (Chant, 1957) (N, S, Si, Sa)

Amblyseius bicaudus Wainstein, 1962 (N, S)

Amblyseius californicus (McGregor, 1954) (N, S, Si)

Amblyseius cucumeris (Oudemans, 1930) (N, S, Si)

Amblyseius erlangensis (Bernhard, 1963) (N) (*)

Amblyseius finlandicus (Oudemans, 1915) (N, S, Si)
Amblyseius foenalis Berlese, 1914 (S)
Amblyseius garganicus Lombardini, 1958 (S) (*)
Amblyseius graminis (Chant, 1956) (S)
Amblyseius herbarius Wainstein, 1960 (N) (*)
Amblyseius italicus (Chant, 1959) (S, Si)
Amblyseius largoensis (Muma, 1955) (S, Si)
Amblyseius longulus Berlese, 1914 (S, Sa)
Amblyseius messor Wainstein, 1960 (N, Si)
Amblyseius meridionalis (Berlese, 1914) (N, S)
Amblyseius obtusus (C.L. Koch, 1839) (*)
 Amblyseius obtusus obtusus (C.L. Koch, 1839) (N, S)
 Amblyseius obtusus tuscus Berlese, 1914 (S)
Amblyseius rademacheri Dosse, 1958 (N, S, Si)
Amblyseius rubini (Swirski & Amitai, 1961) (Si)
Amblyseius sellnicki (Karg, 1960) (S)
Amblyseius stipulatus Athias-Henriot, 1960 (N, S, Si)
Amblyseius swirskii Athias-Henriot, 1962 (Si)

Anthoseius De Leon, 1959

Anthoseius clavatus Wainstein, 1972 (S)
Anthoseius verrucosus Wainstein, 1972 (S)

Kampimodromus Nesbitt, 1951

Kampimodromus aberrans (Oudemans, 1930) (N, S, Si)
Kampimodromus ericinus Ragusa & Tsolakis, 1994 (S, Si)

Iphidulus Ribaga, 1904

Iphidulus communis Ribaga, 1904 (*)
 Iphidulus communis communis Ribaga, 1904 (S)
 Iphidulus communis hederæ Ribaga, 1904 (S)
Iphidulus longicaudus Ribaga, 1904 (S) (*)

Iphiseius Berlese, 1916

Iphiseius degenerans (Berlese, 1889) (S, Si)

Neoseiulus Hughes, 1948

Neoseiulus barkeri Hughes, 1948 (N, S, Si, Sa)

Paraseiulus Muma, 1961

Paraseiulus erevanicus Wainstein & Arutunian, 1967 (Si)
Paraseiulus minutus Athias-Henriot, 1978 (N)

Paraseiulus soleiger (Ribaga, 1904) (N?, S)
Paraseiulus talbii Athias-Henriot, 1960 (N, S, Si, Sa)
Paraseiulus triporus (Chant & Yoshida Shaul, 1982) (S)

Phytoseiulus Evans, 1952

Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot, 1957 (N, S, Si)

Phytoseius Ribaga, 1904

Phytoseius finitimus Ribaga, 1904 (N, S, Si)
Phytoseius horridus Ribaga, 1904 (S)
Phytoseius macropilis (Banks, 1909) (N, S)
Phytoseius panormita Ragusa & Swirski, 1982 (S, Si)
Phytoseius plumifer (G. Canestrini & Fanzago, 1876) (N, S?)

Seiulus Berlese, 1887

Seiulus amaliae Ragusa & Swirski, 1976 (S, Si)
Seiulus calabriae Ragusa & Swirski, 1976 (S)
Seiulus curtipilus Ribaga, 1904 (S)
Seiulus eleonorae Ragusa & Swirski, 1981 (S, Si)
Seiulus eliahuswirskii Ragusa, 1992 (Si)
Seiulus hirsutigenus Berlese, 1887 (N, S)
Seiulus isotrichus Athias-Henriot, 1958 (S)
Seiulus simplex (Chant, 1956) (N, S, Si)

Typhloctonus Muma, 1961

Typhloctonus squamiger (Wainstein, 1960) (N)

Typhlodromus Scheuten, 1857

Typhlodromus aceri Collyer, 1957 (N)
Typhlodromus athenas Swirski & Ragusa, 1976 (N, S, Si)
Typhlodromus baccettii Lombardini, 1960 (S)
Typhlodromus bakeri (Garman, 1948) (N, S)
Typhlodromus caucasicus (Abbasova, 1970) (N, S)
Typhlodromus conspicuus (Garman, 1948) (N)
Typhlodromus corticis Herbert, 1958 (N)
Typhlodromus cotoneastri Wainstein, 1961 (N, S)
Typhlodromus cryptus Athias-Henriot, 1960 (S, Si)
Typhlodromus ernesti Ragusa & Swirski, 1978 (S, Si)
Typhlodromus exhilaratus Ragusa, 1977 (S, Si)
Typhlodromus hadzhievi (Abbasova, 1970) (S)
Typhlodromus halinae (Wainstein & Kolodochka, 1974) (S)
Typhlodromus intercalaris Livshits & Kuznetsov, 1972 (N, S, Sa)
Typhlodromus invectus Chant, 1959 (S, Si)

Typhlodromus involutus Livshits & Kuznetzov, 1972 (N, S, Sa)
Typhlodromus kerkirae Swirski & Ragusa, 1976 (N, S)
Typhlodromus laurentii Ragusa & Swirski, 1968 (S, Si)
Typhlodromus longipilus Nesbitt, 1951 (N)
Typhlodromus pegazzani Ragusa & Swirski, 1978 (S)
Typhlodromus phialatus Athias-Henriot, 1960 (S, Si)
Typhlodromus pyri Scheuten, 1857 (N, S, Si, Sa)
Typhlodromus recki Wainstein, 1958 (S)
Typhlodromus rhenanoides Athias-Henriot, 1960 (N, S, Si, Sa)
Typhlodromus rhenanus (Oudemans, 1905) (N, S, Si)
Typhlodromus sapiens Athias-Henriot, 1960 (S, Si)
Typhlodromus setubali Dosse, 1961 (Si)
Typhlodromus sternlichti Swirski & Amitai, 1968 (Si)
Typhlodromus tiliarum Oudemans, 1930 (S)
Typhlodromus tranquillus Livshits & Kuznetzov, 1972 (S)
Typhlodromus vepallidus (C.L. Koch, 1839) (S, Si)

Note

Amblyseius erlangensis: Forse sinonimo di *A. affatisetus* Wainstein, 1960.
Amblyseius garganicus: In grotte; specie dubbia, probabilmente non riferibile ai Phytoseiidae.
Amblyseius herbarius: Forse sinonimo di *A. graminis* Chant, 1956.
Amblyseius obtusus: *A. o. tuscus* è varietà o sottospecie non più raccolta nè studiata.
Iphidulus: Genere insufficientemente definito.
Iphidulus communis: Secondo De Moraes et al. (1983): species incertae sedis.
Iphidulus longicaudus: Secondo De Moraes et al. (1983): species incertae sedis.

Podocinidae

Podocinum Berlese, 1882

Podocinum pacificum Berlese, 1895 (N, S)
Podocinum sagax Berlese, 1882 (N)

Ameroseiidae

Ameroseius Berlese, 1903

Ameroseius corbiculus (Sowerby, 1806) (N, S, Sa)
Ameroseius delicatus Berlese, 1918 (N, S)
Ameroseius dubitatus Berlese, 1918 (N, S, Sa)
Ameroseius hypogaeus Berlese, 1920 (Sa)
Ameroseius laelaptoides Berlese, 1904 (S)
Ameroseius plumosus (Oudemans, 1902) (N, S)
Ameroseius sculptilis Berlese, 1916 (S)
Ameroseius tenellus Berlese, 1916 (N, S, Si)

***Epicriopsis* Berlese, 1916**

Epicriopsis horrida (Kramer, 1876)

Epicriopsis horrida horrida (Kramer, 1876) (N, S, Si)

Epicriopsis horrida sicala Berlese, 1916 (Si)

Iphiopsidae

***Iphiopsis* Berlese, 1882**

Iphiopsis mirabilis Berlese, 1882 (N, S)

Laelapidae

***Alloparasitus* Berlese, 1920**

Alloparasitus oblongus (Halbert, 1915) (S)

Alloparasitus sardous (Berlese, 1911) (S, Sa)

***Androlaelaps* Berlese, 1903**

Androlaelaps casalis (Berlese, 1887) (N, S)

Androlaelaps concurrens Berlese, 1918 (S, Sa)

Androlaelaps cubicularis (Berlese, 1887) (N, S)

Androlaelaps domesticus (Berlese, 1887) (N)

Androlaelaps elongatus Berlese, 1918 (N, S, Sa)

Androlaelaps foenalis (Berlese, 1887) (N, S)

Androlaelaps hermaphrodita (Berlese, 1887) (S)

Androlaelaps subterraneus (Berlese, 1920) (S)

***Anystipalpus* Berlese, 1911**

Anystipalpus percicola Berlese, 1911 (S)

***Coleolaelaps* Berlese, 1914**

Coleolaelaps agrestis (Berlese, 1887) (N, S)

Coleolaelaps inopinatus Grandi, 1925 (S) (*)

***Cosmolaelaps* Berlese, 1903**

Cosmolaelaps aciphila Karg, 1987 (N)

Cosmolaelaps claviger (Berlese, 1882) (N, S, Si)

Cosmolaelaps corpulentus Berlese, 1920 (S)

Cosmolaelaps cuneifer (Michael, 1903) (N, S)

Cosmolaelaps lingua Karg, 1987 (N)
Cosmolaelaps miles (Berlese, 1892) (N, S)
Cosmolaelaps onustus Berlese, 1904 (N, S)
Cosmolaelaps ornatus Berlese, 1903 (S)
Cosmolaelaps vacuus (Michael, 1891)
 Cosmolaelaps vacuus ensiger Berlese, 1904 (N, S)
 Cosmolaelaps vacuus hastiger Berlese, 1920 (S)
 Cosmolaelaps vacuus scalpiger Berlese, 1902 (S)

Eulaelaps Berlese, 1903

Eulaelaps feideri (Fain, 1962) (S)
Eulaelaps stabularis (C.L. Koch, 1840) (N, S, Sa)

Geolaelaps Berlese, 1923

Geolaelaps aculeifer (G. Canestrini, 1884)
 Geolaelaps aculeifer aculeifer (G. Canestrini, 1884) (N, S, Sa)
 Geolaelaps aculeifer longior (Berlese, 1882) (Si)
Geolaelaps pinnae Karg, 1987 (N)
Geolaelaps schusteri Hirschmann, 1966 (N)

Gymnolaelaps Berlese, 1916

Gymnolaelaps canestrinii (Berlese, 1892) (S)
Gymnolaelaps lignicola (G. Canestrini & R. Canestrini, 1882) (N, S)
Gymnolaelaps myrmecophilus (Berlese, 1892) (*)
 Gymnolaelaps myrmecophilus myrmecophilus (Berlese, 1892)
 Gymnolaelaps myrmecophilus longisetosus (Oudemans, 1902) (N)
Gymnolaelaps myrmophilus (Michael, 1891) (S, Sa)
Gymnolaelaps spinosus Berlese, 1920 (S)

Haemogamasus Berlese, 1889

Haemogamasus arvicolarum Berlese, 1920 (N, Sa)
Haemogamasus hirsutus Berlese, 1889 (N, S)
Haemogamasus horridus (Michael, 1892) (N, S)
Haemogamasus nidi (Michael, 1892) (N)
Haemogamasus pontiger (Berlese, 1904) (N, S)

Hirstionyssus Fonseca, 1948

Hirstionyssus arcuatus (C.L. Koch, 1836) (N, S, Si, Sa)
Hirstionyssus carnifex (C.L. Koch, 1839) (N)

Holostaspis Kolenati, 1858

Holostaspis comelicensis Lombardini, 1962 (N)

Hypoaspis G. Canestrini, 1884

Hypoaspis campestris (Berlese, 1887) (N, S)
Hypoaspis elegantula (Berlese, 1903) (N)
Hypoaspis elimata Berlese, 1920 (S)
Hypoaspis expolita (Berlese, 1904) (S)
Hypoaspis hermaphroditoides Oudemans, 1902 (N)
Hypoaspis krameri (G. Canestrini & R. Canestrini, 1881) (N, S)
Hypoaspis integer (Berlese, 1911) (S, Sa)
Hypoaspis lepta Oudemans, 1902 (N)
Hypoaspis militiformis Oudemans, 1902 (N)
Hypoaspis nana (Méglin, 1876) (N)
Hypoaspis nollii Karg, 1965 (S)
Hypoaspis pellucida Berlese, 1904 (N)
Hypoaspis praesternalis Willmann, 1949 (S)
Hypoaspis terrestris Leonardi, 1899 (S) (*)
Hypoaspis tripodiger Berlese, 1916 (S)
Hypoaspis trispinosa Berlese, 1920 (S)

Laelaps C.L. Koch, 1836

Laelaps agilis C.L. Koch, 1836 (N, S)
Laelaps echidninus Berlese, 1887 (N, S)
Laelaps hilaris (C.L. Koch, 1836)
 Laelaps hilaris siculus Willmann, 1955 (Si)
Laelaps hispidulus (Targioni Tozzetti, 1875) (N)
Laelaps spinitarsis (Targioni Tozzetti, 1878) (N)
Laelaps uncinatus (G. Canestrini & R. Canestrini, 1881) (N)

Laelaspis Berlese, 1903

Laelaspis astronomica (C.L. Koch, 1839) (N, Si)
Laelaspis aviator Berlese, 1920 (S)
Laelaspis equitans (Michael, 1891)
 Laelaspis equitans equitans (Michael, 1891) (S)
 Laelaspis equitans unguiculata Berlese, 1904 (N)
Laelaspis finitima Berlese, 1903 (S)
Laelaspis ovisuga Berlese, 1903 (S)

Melittiphis Berlese, 1918

Melittiphis alvearius (Berlese, 1895) (S)

Myonyssus Tiraboschi, 1904

Myonyssus decumanus Tiraboschi, 1904 (S, Sa)

Myrmoleichus Berlese, 1903

Myrmoleichus coronatus Berlese, 1903 (N)

Myrmonyssus Berlese, 1903

Myrmonyssus acuminatus Berlese, 1903 (S)
Myrmonyssus antennophoroides Berlese, 1903 (S)
Myrmonyssus brachiatus Berlese, 1903 (S)
Myrmonyssus diplogenus Berlese, 1903 (S)
Myrmonyssus liguricus Vitzthum, 1930 (N)

Myrmozercon Berlese, 1902

Myrmozercon brevipes Berlese, 1902 (S)

Neoberlesia Berlese, 1892

Neoberlesia equitans Berlese, 1892 (S)

Ololaelaps Berlese, 1904

Ololaelaps holaspis (Oudemans, 1902) (N, S)
Ololaelaps holostaspoides (G. Canestrini, 1884) (S, Si)
Ololaelaps placentula (Berlese, 1887) (N, S)
Ololaelaps sellnicki Bregetova & Koroleva, 1964 (N)
Ololaelaps venetus (Berlese, 1904) (N, S, Si, Sa)

Pneumolaelaps Berlese, 1920

Pneumolaelaps asperatus (Berlese, 1904) (N, S)
Pneumolaelaps bombicolens (G. Canestrini, 1885) (N)
Pneumolaelaps lubricus Voigts & Oudemans, 1904 (N, S)
Pneumolaelaps montanus (Berlese, 1904) (N)

Pseudolaelaps Berlese, 1916

Pseudolaelaps doderoi (Berlese, 1910) (N)
Pseudolaelaps gamaselloides Berlese, 1920 (S)
Pseudolaelaps paulseni (Berlese, 1910) (S, Si)

Pseudoparasitus Oudemans, 1902

Pseudoparasitus centralis Berlese, 1920 (S, Sa)
Pseudoparasitus juvenicus Berlese, 1916 (S, Sa)
Pseudoparasitus meridionalis (G. Canestrini & R. Canestrini, 1882)
Pseudoparasitus meridionalis meridionalis (G. Canestrini & R. Canestrini, 1882) (N, S, Si, Sa)

Pseudoparasitus meridionalis strictior Berlese, 1916 (Si)
Pseudoparasitus parasitizans Berlese, 1916 (N)
Pseudoparasitus spathulatus Berlese, 1920 (Sa)

Note

Coleolaelaps inopinatus: Forse sinonimo di *C. agrestis* (Berlese, 1887).
Gymnolaelaps myrmecophilus: Segnalata per l'Italia senza indicazione di località.
Hypoaspis terrestris: Berlese (1908) descrive una femmina di *Coleolaelaps terrestris* su *Copris hispanus*; la specie di Berlese è probabilmente un sinonimo di quella di Leonardi.

Dermanyssidae

Dermanyssus de Geer, 1778

Dermanyssus chelidonis Oudemans, 1939 (N, S, Si, Sa)
Dermanyssus gallinae (de Geer, 1778) (N, S, Si, Sa)
Dermanyssus lacertarum Contarini, 1883 (N, Si)
Dermanyssus passerinus Berlese & Trouessart, 1889 (N, S, Si, Sa)
Dermanyssus richiardi G. Canestrini & Fanzago, 1877 (N)

Macronyssidae

Macronyssus Kolenati, 1858

Macronyssus flavus (Kolenati, 1856) (N, S)
Macronyssus granulosus (Kolenati, 1856) (N)
Macronyssus longimanus (Kolenati, 1856) (N, S)
Macronyssus rhinolophi (Oudemans, 1902) (N, S)
Macronyssus uncinatus (G. Canestrini, 1885) (N, S)

Ophionyssus Mégnin, 1884

Ophionyssus lacertinus (Berlese, 1892) (S)
Ophionyssus natricis (Gervais, 1844) (N, S)
Ophionyssus saurarum (Oudemans, 1901) (*)

Ornithonyssus Sambon, 1928

Ornithonyssus bacoti (Hirst, 1913) (*)
Ornithonyssus sylviarum (G. Canestrini & Fanzago, 1878) (N, S)

Note

Ophionyssus saurarum: Segnalata per l'Italia senza indicazione di località.
Ornithonyssus bacoti: Segnalata per l'Italia senza indicazione di località.

Rhinonyssidae

Ptilonyssus Berlese & Trouessart, 1889

Ptilonyssus nudus Berlese & Trouessart, 1889 (S)

Sternostoma Berlese & Trouessart, 1889

Sternostoma cryptorhynchum Berlese & Trouessart, 1889 (S)

Sternostoma tracheacolum Lawrence, 1948 (Sa)

Spinturnicidae

Eyndhovenia Rudnick, 1960

Eyndhovenia euryalis (G. Canestrini, 1885) (N, S)

Paraperiglischrus Rudnick, 1960

Paraperiglischrus rhinolophinus (C.L. Koch, 1841) (N, S) (*)

Spinturnix von Heyden, 1826

Spinturnix acuminatus (C.L. Koch, 1836) (N)

Spinturnix lanzai Lombardini, 1944 (S) (*)

Spinturnix myoti (Kolenati, 1856) (N)

Spinturnix mystacinus (Kolenati, 1857) (S)

Note

Paraperiglischrus rhinolophinus: Probabilmente in tutta Italia.

Spinturnix: L'originaria specie tipo del genere, *P. vespertilionis* (Linnaeus, 1758), è stata invalidata con Opinione n. 128 della Commissione Internazionale di Nomenclatura Zoologica (1936). Le segnalazioni di *vespertilionis*, creduto diffuso in tutta Italia sono da attribuirsi, probabilmente, parte alle altre specie del genere già segnalate, parte ad altre entità da definire.

Spinturnix lanzai: Descritta come varietà del *vespertilionis*, è probabilmente una specie inquirenda.

Halarachnidae

Halarachne Allman, 1847

Halarachne halichoeri Allman, 1884 (3) (*)

Pneumonyssoides Fain, 1955

Pneumonyssoides caninum (Chandler & Rhue, 1940) (N)

Note

Halarachne halichoeri: Su foca, Mar Tirreno e coste della Sardegna.

Ixodorhynchidae

Ixodorhynchus Ewing, 1922

Ixodorhynchus piger (Berlese, 1917) (S)

Varroidae

Varroa Oudemans, 1904

Varroa jacobsoni Oudemans, 1904 (N, S, Si, Sa)

Actinedida

Alichorhagiidae

Alichorhagia Berlese, 1910

Alichorhagia fragilis Berlese, 1910 (S)

Hybalicidae

Hybalicus Berlese, 1913

Hybalicus ornatus (Berlese, 1904) (S)

Bimichaeliidae

Alychus C.L. Koch, 1847

Alychus roseus (C.L. Koch, 1841) (N)

Bimichaelia Thor, 1902

Bimichaelia augustana (Berlese, 1884) (N)
Bimichaelia setigera (Berlese, 1904) (N, S)
Bimichaelia subnuda (Berlese, 1910) (S)

Pachygnathus Dugès, 1834

Pachygnathus berlesei Bottazzi, 1950 (N, S, Si)
Pachygnathus lombardinii Bottazzi, 1956 (N)

Nanorchestidae

Nanorchestes Topset & Trouessart, 1890

Nanorchestes arboriger (Berlese, 1904) (N, S)
Nanorchestes siculus (Berlese, 1910) (Si)

Speleorchestes Trägårdh, 1909

Speleorchestes elongatus (Berlese, 1904) (N, S)
Speleorchestes paolii (Berlese, 1910) (Si)

Sphaerolichidae

Sphaerolichus Berlese, 1904

Sphaerolichus armipes Berlese, 1904 (S)

Bdellidae

Bdella Latreille, 1795

Bdella caeca (Berlese, 1904) (S)
Bdella captiosa Atyeo, 1963 (Si)
Bdella cruentata C.L. Koch, 1839 (N)
Bdella histrionica C.L. Koch, 1844 (N)
Bdella iconica Berlese, 1923 (S, Sa)
Bdella longicornis (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)
Bdella muscorum Ewing, 1909 (N, S, Sa)
Bdella phoenicea C.L. Koch, 1839 (N)
Bdella pulchella Berlese, 1923 (N, S)
Bdella sardoa Berlese, 1923 (Sa)
Bdella semiscutata Thor, 1930 (N)
Bdella cf. septentrionalis Atyeo, 1962 (S)
Bdella subulirostris Berlese, 1923 (S)

Bdella veneta (Berlese, 1910) (N)

Bdellodes Oudemans, 1937

Bdellodes longirostris (Hermann, 1804) (N, S)

Biscirus Thor, 1927

Biscirus norvegicus (Thor, 1905)

Biscirus norvegicus sardica (Vitzthum, 1920) (Sa)

Cyta von Heyden, 1826

Cyta coerulipes (Dugès, 1834) (N, S, Si)

Cyta latirostris (Hermann, 1804) (N, S, Sa)

Cyta veneta (Lombardini, 1960) (N)

Neomolgus Oudemans, 1937

Neomolgus berlesei (Trägårdh, 1902) (S, Si)

Neomolgus capillatus (Kramer, 1881) (N, S)

Neomolgus lacustris (Hull, 1918) (N)

Odontoscirus Thor, 1913

Odontoscirus virgulatus (G. Canestrini & Fanzago, 1876) (N, S, Si)

Spinibdella Thor, 1930

Spinibdella cronini (Baker & Balock, 1944) (S)

Spinibdella lignicola (G. Canestrini, 1886) (N, S)

Trachymolgus Berlese, 1923

Trachymolgus nigerrimus (G. Canestrini & Fanzago, 1876) (N, S, Si)

Cunaxidae

Armascirus Den Heyer, 1978

Armascirus taurus (Kramer, 1881) (N, S)

Cunaxa von Heyden, 1826

Cunaxa capreolus (Berlese, 1889) (N, Si)

Cunaxa setirostris (Hermann, 1804) (N, S, Si, Sa)

Coleoscirus Berlese, 1916

Coleoscirus brevicornis (Berlese, 1905) (S)
Coleoscirus brevirostris (G. Canestrini, 1886) (N)
Coleoscirus simplex (Ewing, 1917) (Si)

Cunaxoides Baker & Hoffmann, 1948

Cunaxoides coecus (Oudemans, 1931) (N)
Cunaxoides croceus (C.L. Koch, 1838) (N, S, Sa)

Pulaeus Den Heyer, 1979

Pulaeus glebulentus Den Heyer, 1979 (Si)
Pulaeus pectinatus (Ewing, 1909) (Si)
Pulaeus subterraneus (Berlese, 1916) (N)

Pseudobonzia Smiley, 1975

Pseudobonzia parvirostris (Berlese, 1910) (S)

Scirula Berlese, 1887

Scirula impressa (Berlese, 1887) (N)

Eupodidae

Cocceupodes Thor, 1934

Cocceupodes clavifrons (R. Canestrini, 1886) (N)

Eupodes C.L. Koch, 1835

Eupodes fusifer R. Canestrini, 1886 (N, S)
Eupodes gilvus C.L. Koch, 1838 (*)
Eupodes hiemalis C.L. Koch, 1838 (N)
Eupodes iconicus C.L. Koch, 1838 (N)
Eupodes milvinus C.L. Koch, 1838 (*)
Eupodes pseudoclavifrons R. Canestrini, 1886 (N)
Eupodes unifasciatus C.L. Koch, 1838 (N)
Eupodes vallombrosae Thor, 1934 (S)
Eupodes variegatus C.L. Koch, 1838 (N, S)

Linopodes C.L. Koch, 1835

Linopodes eupodoides R. Canestrini, 1886 (N)
Linopodes motatorius (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)

Note

Eupodes gilvus: Segnalata per l'Italia senza indicazione di località.

Eupodes milvinus: Segnalata per l'Italia senza indicazione di località.

Penthalodidae

Penthalodes Murray, 1877

Penthalodes ovalis (Dugès, 1834) (N)

Penthalodes ovatus (C.L. Koch, 1838) (N, S, Si, Sa)

Penthaleidae

Halotydeus Berlese, 1891

Halotydeus egregius (Berlese, 1891) (N, S)

Halotydeus hydrodromus (Berlese & Trouessart, 1889) (N)

Penthaleus C.L. Koch, 1836

Penthaleus bipustulatus (Hermann, 1804) (S)

Penthaleus illustris Berlese, 1916 (S)

Penthaleus longipilis (R. Canestrini, 1886) (N, S)

Penthaleus maior (Dugès, 1834) (N, S)

Penthaleus minor (R. Canestrini, 1886) (N)

Rhagidiidae

Coccorhagidia Thor, 1934

Coccorhagidia berlesei Thor & Willmann, 1941 (S)

Coccorhagidia clavifrons (R. Canestrini, 1886) (N)

Foveacheles Zacharda, 1980

Foveacheles terricola (C.L. Koch, 1836) (N)

Poecilophysis Cambridge, 1876

Poecilophysis pratensis (C.L. Koch, 1835) (N)

Rhagidia Thorrell, 1871

Rhagidia cerina (C.L. Koch, 1838) (N)
Rhagidia comelicensis Lombardini, 1962 (N)
Rhagidia gigas (G. Canestrini, 1886) (N, S, Si)
Rhagidia heteropoda (Berlese, 1910) (S)

Troglocheles Zacharda, 1980

Troglocheles conciana (Lombardini, 1951) (N) (*)
Troglocheles strasseri (Willmann, 1932) (N)

Note

Troglocheles conciana: Specie dubbia, forse sinonimo di *T. gineti* (Cooreman, 1959).

Halacaridae

Acarochelopodia E. Angelier, 1954

Acarochelopodia delamarei E. Angelier, 1954 (3)

Acaromantis Trouessart & Neumann, 1893

Acaromantis monnioti Morselli, 1970 (3)

Actacarus Schulz, 1937

Actacarus bacescui Konnerth-Ionescu, 1970 (3)
Actacarus pygmaeus Schulz, 1937 (3, 5)

Agaue Lohmann, 1889

Agaue adriatica Viets, 1940 (3)
Agaue chevreuxi (Trouessart, 1889) (3, 4)
Agaue panopae (Lohmann, 1893) (3)

Agauopsis Viets, 1927

Agauopsis brevipalpus (Trouessart, 1889) (3, 4, 5)
Agauopsis conjuncta Viets, 1940 (3)
Agauopsis hirsuta (Trouessart, 1889) (3)
Agauopsis microrhyncha (Trouessart, 1889) (3)
Agauopsis spinipes (Police, 1909) (3)
Agauopsis tricuspis Benard, 1962 (4)

Anomalohalacarus Newell, 1949

Anomalohalacarus affinis Morselli & Mari, 1980 (3)

Anomalohalacarus anomalus (Trouessart, 1894) (3)
Anomalohalacarus mollis Morselli & Mari, 1981 (5)
Anomalohalacarus ruffoi Morselli & Mari, 1978 (3)
Anomalohalacarus similis Bartsch, 1976 (5)
Anomalohalacarus singularis Morselli & Mari, 1989 (3)

Arhodeoporus Newell, 1947

Arhodeoporus gracilipes (Trouessart, 1889) (3)

Camactognathus Newell, 1984

Camactognathus tessellatus (Morselli & Mari, 1981) (5)

Coloboceras Trouessart, 1889

Coloboceras longiusculus Trouessart, 1889 (3)

Copidognathus Trouessart, 1888

Copidognathus adriaticus Viets, 1940 (3)
Copidognathus brachystomus Viets, 1940 (3, 4, 5)
Copidognathus brevipes Viets, 1940 (3)
Copidognathus cribrosoma (Police, 1909) (3, 5)
Copidognathus dactyloporus Benfatti, Mari & Morselli, 1989 (N)
Copidognathus gibbus (Trouessart, 1889) (3)
Copidognathus hephaestios Benfatti, Mari & Morselli, 1992 (S)
Copidognathus lamellosus (Lohmann, 1893) (5)
Copidognathus longirostris (Trouessart, 1896) (3)
Copidognathus majusculus (Trouessart, 1894) (3)
Copidognathus magnipalpus (Police, 1909) (3, 4)
Copidognathus rhodostigma (Grosse, 1855)
Copidognathus rhodostigma rondus Bartsch, 1978 (3)
Copidognathus sculptus (Police, 1909) (3)
Copidognathus trouessarti (Voinov, 1896) (3)

Halacarellus Viets, 1927

Halacarellus basteri (Johnston, 1836)
Halacarellus basteri affinis (Trouessart, 1896) (4)
Halacarellus cf. petiti E. Angelier, 1950 (3)
Halacarellus cf. phreaticus Petrova, 1972 (S)

Halacarus Gosse, 1855

Halacarus bisulcus Viets, 1927 (3)
Halacarus longiunguis Police, 1909 (3)
Halacarus rismondoi Viets, 1940 (3)

Halacarus subtilis Viets, 1940 (3)

Lohmannella Trouessart, 1901

Lohmannella falcata (Hodge, 1863) (3, 4)

Lohmannella stammeri Viets, 1939 (5)

Plegadognathus Morselli, 1980

Plegadognathus labronicus Morselli, 1980 (3)

Rhombognathus Trouessart, 1888

Rhombognathus paranotops Bartsch, 1986 (3)

Rhombognathus praegracilis Viets, 1939 (3)

Rhombognathus sphaerorhynchus Police, 1909 (3)

Scaptognathus Trouessart, 1889

Scaptognathus hallezi Trouessart, 1894 (3)

Scaptognathus neretinus Morselli & Mari, 1981 (5)

Werthella Lohmann, 1907

Werthella aculeata (Trouessart, 1896) (3) (*)

Note

Werthella aculeata: La specie va forse riferita al genere *Pelacarus* Bartsch, 1986.

Limnohalacaridae

Limnohalacarus Walter, 1917

Limnohalacarus wackeri (Walter, 1914) (N, S)

Lobohalacarus Viets, 1939

Lobohalacarus weberi (Romijn & Viets, 1924)

Lobohalacarus weberi weberi (Romijn & Viets, 1924) (N, S)

Lobohalacarus weberi quadriporus (Walter, 1947) (N, Si, Sa)

Parasoldanellonyx Viets, 1929

Parasoldanellonyx parviscutatus (Walter, 1917) (N)

Parasoldanellonyx typhlops Viets, 1933 (S)

Porohalacarus Thor, 1922

- Porohalacarus alpinus* (Thor, 1910)
 - Porohalacarus alpinus alpinus* (Thor, 1910) (N, S)
 - Porohalacarus alpinus brachypeltatus* Viets, 1927 (N)
- Porohalacarus caecus* Husmann & Teschner, 1970 (Si, Sa) (*)
- Porohalacarus hydrachnoides* (Lohmann, 1893) (N) (*)

Porolohmannella Viets, 1933

- Porolohmannella fortipalpis* Teschner, 1988 (Si)
- Porolohmannella violacea* (Kramer, 1879) (N, S, Si)

Soldanellonyx Walter, 1917

- Soldanellonyx chappuisi* Walter, 1917 (N, S, Si, Sa)
- Soldanellonyx monardi* Walter, 1919 (N, S, Si)

Note

- Porohalacarus caecus*: Specie di dubbia validità. Forse si tratta di una deutoninfa di *Lobohalacarus weberi* (Romijn & Viets, 1924).
- Porohalacarus hydrachnoides*: Specie di dubbia validità.

Ereynetidae

Ereynetes (Anereynetes) Fain, 1965

- Ereynetes (Anereynetes) biscutatus* Berlese, 1923 (N)
- Ereynetes (Anereynetes) inermis* (Berlese, 1910) (S)
- Ereynetes (Anereynetes) ministralis* (C.L. Koch, 1839) (N) (*)

Ereynetes (Ereynetes) Berlese, 1883

- Ereynetes (Ereynetes) agilis* (Berlese, 1923) (Si)
- Ereynetes (Ereynetes) arcuatus* (Berlese, 1923) (S)
- Ereynetes (Ereynetes) centralis* (Berlese, 1923) (S, Sa)
- Ereynetes (Ereynetes) galeatus* (Berlese, 1923)
 - Ereynetes (Ereynetes) galeatus galeatus* (Berlese, 1923) (N, S, Si)
- Ereynetes (Ereynetes) pegazzanoae* Fain, 1965 (N)
- Ereynetes (Ereynetes) septentrionalis* (Berlese, 1923) (N)

Ereynetes (Gymnereynetes) Fain, 1965

- Ereynetes (Gymnereynetes) brevipes* (Berlese, 1923) (S)

Riccardoella Berlese, 1923

Riccardoella limacum (Schrank, 1776) (N, S)

Note

Ereynetes (*Anereynetes*) *ministralis*: Specie inadeguatamente descritta e tentativamente inserita in questo sottogenere.

Tydeidae

Coleotydaeus Berlese, 1910

Coleotydaeus rhombicus Berlese, 1910 (Si)

Homeopronematus H. André, 1980

Homeopronematus anconai (Baker, 1944) (N, S, Si)

Krantzlorryia H. André, 1980

Krantzlorryia grewia (Baker, 1968) (Si)

Lasiotydaeus Berlese, 1908

Lasiotydaeus glycyphaginus Berlese, 1908 (N, S)

Lasiotydaeus tyroglyphinus Berlese, 1910 (Si)

Lorryia Oudemans, 1925

Lorryia australensis (Baker, 1960) (Si)

Lorryia bedfordiensis Evans, 1952 (N, S, Sa)

Lorryia ferula Baker, 1944 (N, S, Si, Sa)

Lorryia formosa Cooreman, 1958 (S, Si, Sa)

Lorryia granulosa (R. Canestrini, 1886) (N)

Lorryia humeralis (Berlese, 1910) (Si)

Lorryia italica (Oudemans, 1928) (*)

Lorryia longiuscula (Kuznetzov, 1972) (Si)

Lorryia mali (Oudemans, 1929) (N, S, Si, Sa)

Lorryia mammillaris (Berlese, 1908) (N, S)

Lorryia mississippiensis (Baker, 1970) (Si)

Lorryia nesziyyonensis (Gerson, 1968) (N, S, Sa)

Lorryia placita Livshits, 1973 (N, S, Sa)

Lorryia raphignatoides (Berlese, 1910) (Si)

Lorryia reticulata (Oudemans, 1928) (N, S, Si)

Lorryia simplex (Berlese, 1910)

Lorryia simplex simplex (Berlese, 1910) (S, Si)

Lorryia simplex baculiger (Berlese, 1910) (S)

Lorryia styliger (Berlese, 1910) (N, S) (*)
Lorryia teresae (Carmona, 1970) (Si)
Lorryia venustula (Berlese, 1910) (Si) (*)
Lorryia zaheri Baker, 1968 (Si)

Metalorryia H. André, 1980

Metalorryia armaghensis (Baker, 1968) (N, S, Sa)
Metalorryia magdalenae (Gerson, 1968) (Si)

Microtydeus Thor, 1931

Microtydeus foenilis (R. Canestrini, 1886) (N, S)
Microtydeus rectangulus (Berlese, 1910) (Si)
Microtydeus similis (R. Canestrini, 1886) (N)

Pronematus R. Canestrini, 1886

Pronematus bonatii R. Canestrini, 1886 (N, S)
Pronematus ubiquitus (McGregor, 1923) (S, Si)

Pseudolorryia Kazmierski, 1989

Pseudolorryia chapultepecensis (Baker, 1943) (S, Sa)

Pseudotriophthydeus H. André, 1980

Pseudotriophthydeus vegei H. André, 1980 (N, Sa)

Triophthydeus Oudemans, 1929

Triophthydeus immanis Kuznetzov, 1973 (S)
Triophthydeus lebruni (H. André, 1980) (N, S, Si, Sa)
Triophthydeus triophthalmus (Oudemans, 1929) (Si)

Tydeus C.L. Koch, 1835

Tydeus aberrans (Oudemans, 1932) (N)
Tydeus acutus Berlese, 1910 (Si)
Tydeus calabrus (Castagnoli, 1984) (N, S, Sa)
Tydeus californicus (Banks, 1904) (N, S, Si)
Tydeus caudatus (Dugès, 1834) (N, S, Si, Sa)
Tydeus curtus Berlese, 1910 (N, S)
Tydeus ellipticus Lombardini, 1949 (S) (*)
Tydeus goetzi Schruft, 1972 (N)
Tydeus kochi Oudemans, 1928 (N, S, Si)
Tydeus lolitae (Baker, 1965) (N, Sa)
Tydeus olivaceus C.L. Koch, 1838 (N)

Tydeus ovatus Berlese, 1910 (S)
Tydeus pinicola Oudemans, 1929 (N)
Tydeus velox C.L. Koch, 1835 (N)

Note

Lorryia italica: Segnalata per l'Italia senza indicazione di località.
Lorryia styliger: Attribuzione generica incerta.
Lorryia venustula: Attribuzione generica incerta.
Tydeus ellipticus: Specie dubbia, probabilmente non è un Tydeidae.

Paratydeidae

Scolotydeus Berlese, 1910

Scolotydeus bacillus Berlese, 1910 (S, Si)

Labidostommatidae

Eunicolina Berlese, 1911

Eunicolina tuberculata Berlese, 1911 (N)

***Labidostomma* (*Labidostomma*)** Kramer, 1879

Labidostomma (*Labidostomma*) *integrum* Berlese, 1911 (N, S, Si)
Labidostomma (*Labidostomma*) *zangherii* Lombardini, 1943 (N) (*)

***Labidostomma* (*Nicolettiella*)** G. Canestrini, 1882

Labidostomma (*Nicolettiella*) *cornutum* (G. Canestrini & Fanzago, 1878) (N, S)
Labidostomma (*Nicolettiella*) *denticulatum* (Schränk, 1776) (N)
Labidostomma (*Nicolettiella*) *jaquemarti* (Coineau, 1964) (S)
Labidostomma (*Nicolettiella*) *luteum* Kramer, 1879 (N, S, Si)
Labidostomma (*Nicolettiella*) *repetitor* Grandjean, 1942 (S)
Labidostomma (*Nicolettiella*) *virescens* (Targioni Tozzetti, 1886) (S) (*)

Note

Labidostomma (*Labidostomma*) *zangherii*: Forse riferibile al genere *Akrostoma* Robaux, 1977.
Labidostomma (*Nicolettiella*) *virescens*: Assegnata dall'Autore al genere *Caligonus* C. L. Koch, 1836, non è stato più raccolto, nè menzionato. Attribuzione generica incerta.

Anystidae

Anystis von Heyden, 1826

Anystis agilis (Banks, 1894) (N)
Anystis baccharum (Linnaeus, 1758) (*)
Anystis cornigerum (Hermann, 1804) (N)
Anystis pallescens (C.L. Koch, 1838) (N)
Anystis vitis (Schrank, 1781) (N, S)

Bechsteinia Oudemans, 1936

Bechsteinia schneideri Oudemans, 1936 (N)

Chaussieria Oudemans, 1937

Chaussieria berlesei (Oudemans, 1906) (N, S, Si)
Chaussieria venustissima (Berlese, 1882) (N, S, Si)

Erythracarus Berlese, 1903

Erythracarus parietinus (Hermann, 1804) (S)
Erythracarus ruricola (Dugès, 1834) (N, S)
Erythracarus sabulosus (Berlese, 1885) (N, S)

Erythrocheylus Berlese, 1903

Erythrocheylus littoralis Berlese, 1903 (S)

Tarsotomus Berlese, 1882

Tarsotomus hercules Berlese, 1882 (N, S, Si)
Tarsotomus nivalis (Schweizer, 1922) (N)

Note

Anystis baccharum: Segnalata per l'Italia senza indicazione di località.

Pseudocheylidae

Anoplocheylus Berlese, 1910

Anoplocheylus europaeus Berlese, 1910 (N, Si)

Pomerantziidae

Stigmocheylus Berlese, 1910

Stigmocheylus brevisetus Berlese, 1910 (S)

Caeculidae

Caeculus Dufour, 1832

Caeculus echinipes Dufour, 1832 (N, S, Si)

Caeculus pisanus M. André, 1936 (S)

Pterygosomidae

Geckobia Mégnin, 1878

Geckobia latasti Mégnin, 1878 (S, Si)

Geckobia loricata Berlese, 1892 (S)

Hirstiella Berlese, 1920

Hirstiella insignis (Berlese, 1892) (S)

Erythraeidae

Abrolophus Berlese, 1891

Abrolophus complanatus (Berlese, 1910) (N, S) (*)

Abrolophus curtipapillum (Schweizer, 1951) (N)

Abrolophus epigaeus (Berlese, 1918) (S) (*)

Abrolophus miniatus (Hermann, 1804) (N, S, Si)

Abrolophus passerinii (Berlese, 1904) (S)

Abrolophus pulcher (G. Canestrini, 1885) (N) (*)

Abrolophus quisquiliarum (Hermann, 1804) (N, S, Si)

Balaustium von Heyden, 1826

Balaustium araneoides Berlese, 1910 (Si)

Balaustium madeirense Willmann, 1939 (S)

Balaustium murorum (Hermann, 1804) (N, S)

Charletonia (Cavannea) Berlese, 1910

Charletonia (Cavannea) cavannae (Berlese, 1885) (N, S)

Charletonia (Cavannea) mollicomus Berlese, 1910 (S)

Charletonia (Charletonia) Oudemans, 1910

Charletonia (Charletonia) berlesiana (Paoli, 1937) (S)
Charletonia (Charletonia) cardinalis (C.L. Koch, 1837) (N)
Charletonia (Charletonia) globiger (Berlese, 1885) (N, S)
Charletonia (Charletonia) venus Southcott, 1961 (S)

Erythraeus Latreille, 1806

Erythraeus acis (Berlese, 1882) (Si)
Erythraeus cinereus (Dugès, 1834) (N, S, Sa)
Erythraeus crocatus (C.L. Koch, 1837) (N) (*)
Erythraeus electoralis (C.L. Koch, 1837) (N, Sa) (*)
Erythraeus hibernans Oudemans, 1903 (N)
Erythraeus italicus Berlese, 1920 (N, S)
Erythraeus opilionoides (C.L. Koch, 1837) (N, S)
Erythraeus phalangioides (de Geer, 1778) (N, S)
Erythraeus regalis (C.L. Koch, 1837) (N, S, Sa)
Erythraeus similis G. Canestrini, 1885 (Sa)

Erythrombium Berlese, 1910

Erythrombium eusisyrum Berlese, 1910 (Si)

Grognieria Oudemans, 1941

Grognieria agilis (G. Canestrini, 1884) (N) (*)

Leptus Latreille, 1776

Leptus bocsettii Lombardini, 1958 (Sa) (*)
Leptus curtipes Schweizer, 1951 (N)
Leptus dubius Paoli, 1937 (S)
Leptus eupodes (Berlese, 1910) (S) (*)
Leptus holmiae Southcott, 1992 (N, S) (*)
Leptus ignotus Oudemans, 1903 (S)
Leptus longipilis (Berlese, 1910) (N, S)
Leptus murteri Schweizer, 1951 (N)
Leptus nemorum (C.L. Koch, 1836) (N, S)
Leptus pulchellus (Leonardi, 1896) (N) (*)
Leptus sículus (G. Canestrini, 1884) (N, Si)
Leptus trimaculatus (Rossi, 1794) (N, S, Si, Sa)
Leptus vertex (Kramer, 1886) (S)

Phanolopus M. André, 1927

Phanolopus oedipodarum (Frauenfeld, 1868) (S)

Note

Abrolophus complanatus: Secondo alcuni Autori è riferibile al genere *Leptus* Latreille, 1776.
Abrolophus epigaeus: Secondo alcuni Autori è riferibile al genere *Leptus* Latreille, 1776.
Abrolophus pulcher: Specie di dubbia validità.
Erythraeus crocatus: Attribuzione generica incerta.
Erythraeus electoralis: Secondo alcuni Autori è sinonimo di *E. apendiculatus* (Schanrk, 1781).
Erythrombium: Secondo alcuni Autori il genere appartiene alla famiglia Microtrombidiidae.
Grognieria agilis: Specie di dubbia validità.
Leptus bocsettii: Attribuzione generica incerta.
Leptus eupodes: Secondo alcuni Autori è varietà di *L. nemorum* (C.L.Koch, 1836).
Leptus holmiae: Probabilmente uguale a *L. phalangii* de Geer, 1778, nome illegittimo.
Leptus pulchellus: Attribuzione generica incerta.

Smarididae

Fessonina von Heyden, 1826

Fessonina papillosa (Hermann, 1804) (N, S, Si)

Hirstiosoma Womersley, 1934

Hirstiosoma ampulligera (Berlese, 1887) (N, S)

Smaris Latreille, 1796

Smaris granatae Di Caporiacco, 1938 (N) (*)

Smaris intermedia Lombardini, 1949 (S)

Smaris squamata (Hermann, 1804) (N, S, Si)

Veithia Oudemans, 1941

Veithia schneideri Oudemans, 1941 (N) (*)

Note

Smaris granatae: Attribuzione generica incerta.

Veithia: Genere dubbio secondo Southcott (1961).

Veithia schneideri: Specie inquirenda.

Calyptostomidae

Calyptostoma Cambridge, 1875

Calyptostoma expalpe (Hermann, 1804) (N, S, Sa)

Calyptostoma lyncaeum (Berlese, 1887) (N, S)

Johnstonianidae

Diplothrombium Berlese, 1910

Diplothrombium longipalpe (Berlese, 1887) (N, S)

Diplothrombium septentrionale (Berlese, 1910) (N)

Johnstoniana George, 1852

Johnstoniana errans (Johnston, 1852) (N)

Johnstoniana insignia (Berlese, 1916) (N, S)

Trombellidae

Nothrotrombidium Womersley, 1954

Nothrotrombidium otiorum (Berlese, 1902) (N, S, Sa)

Trombella Berlese, 1887

Trombella glandulosa Berlese, 1887 (N)

Chyzeriidae

Parawenhoekia Paoli, 1937

Parawenhoekia dectici Paoli, 1937 (S) (*)

Note

Parawenhoekia: Genere da ridefinire.

Parawenhoekia dectici: Specie inquirenda.

Tanaupodidae

Eothrombium Berlese, 1902

Eothrombium dubium Lombardini, 1961 (N, S)

Eothrombium echinatum Berlese, 1910 (N, S)

Eothrombium incertum Lombardini, 1961 (N)

Eothrombium leptotarsum Berlese, 1910 (S)

Eothrombium siculum Berlese, 1910 (Si)

Rhinothrombium Berlese, 1902

Rhinothrombium nemoricola (Berlese, 1886) (N, S)

Tanaupodus Haller, 1882

Tanaupodus passimpilosus Berlese, 1910 (S)

Trombidiidae

Allothrombium Berlese, 1903

Allothrombium erythraellum (C.L. Koch, 1837) (N, S)

Allothrombium fuliginosum (Hermann, 1804) (N, S)

Allothrombium meridionale Berlese, 1910 (S, Si, Sa)

Allothrombium neapolitanum Oudemans, 1910 (S)

Allothrombium pergrande Berlese, 1903 (S)

Allothrombium wolffi Krausse, 1926 (N)

Emitrombidium Lombardini, 1949

Emitrombidium variepilosum Lombardini, 1949 (S)

Heterotrombidium Verdun, 1909

Heterotrombidium sanremense (Oudemans, 1902) (N) (*)

Mastothrombium Feider, 1957

Mastothrombium oltenicum (Feider, 1935) (*)

Metathrombium Oudemans, 1909

Metathrombium daunium Paoli, 1937 (S)

Parathrombium Bruyant, 1910

Parathrombium insulare (Berlese, 1910) (N)

Parathrombium setosulum (Berlese, 1885) (S, Sa)

Parathrombium wolffi (Krausse, 1913) (Sa)

Podothrombium Berlese, 1910

Podothrombium bicolor (Hermann, 1804) (N, S)

Podothrombium cisalpinum Berlese, 1910 (N)

Podothrombium macrocarpum Berlese, 1910

Podothrombium macrocarpum macrocarpum Berlese, 1910 (N)

Podothrombium macrocarpum meridionale Berlese, 1910 (S)

Podothrombium macrocarpum septentrionale Berlese, 1910 (N)
Podothrombium macrocarpum teutonicum Berlese, 1910 (N)
Podothrombium montanum Berlese, 1910 (N, S)
Podothrombium peragile Berlese, 1910 (N)
Podothrombium subnudum Berlese, 1910 (S, Si)

Schoutedenichia Jadin & Vercammen-Grandjean, 1954

Schoutedenichia krampitzi (Willmann, 1955) (Si) (*)

Trombidium Fabricius, 1775

Trombidium brevipanum (Berlese, 1910) (N)
Trombidium granulatum Oudemans, 1902 (N)
Trombidium holosericeum (Linnaeus, 1758) (N, S)
Trombidium hortense C.L. Koch, 1837 (N)
Trombidium latum (C.L. Koch, 1837) (N)
Trombidium mediterraneum (Berlese, 1910) (Sa)
Trombidium megalochirum (Berlese, 1910) (N)
Trombidium meyeri Krausse, 1916 (N, S)
Trombidium philogeum C.L. Koch, 1837 (N, S)
Trombidium quadrimaculatum Berlese, 1912 (Sa)
Trombidium scharlatinum (Berlese, 1912) (N, S, Si, Sa)

Note

Heterotrombidium: Riportato da Thor & Willmann (1941) e non più contemplato nei cataloghi recenti.

Heterotrombidium sanremense: Secondo alcuni Autori è riferibile al genere *Podothrombium* Berlese, 1910.

Mastothrombium oltenicum: Segnalata per l'Italia senza indicazione di località.

Schoutedenichia krampitzi: Secondo alcuni Autori è riferibile al genere *Podothrombium* Berlese, 1910.

Neothrombidiidae

Calothrombium Berlese, 1918

Calothrombium paolii (Berlese, 1918) (S)

Neothrombium Oudemans, 1909

Neothrombium neglectum (Bruyant, 1909) (*)

Note

Calothrombium: Genere di incerta posizione.

Neothrombium neglectum: Larve su *Gryllotalpa vulgaris*, Italia.

Eutrombidiidae

Eutrombidium Verdun, 1909

Eutrombidium canestrinii Berlese, 1910 (N)
Eutrombidium diecki Krausse, 1916 (*)
Eutrombidium ferox (Berlese, 1887) (S)
Eutrombidium locustarum (Walsh, 1866) (S)
Eutrombidium trigonum (Hermann, 1804) (N, S)
Eutrombidium vandeli M. André, 1931 (N)
Eutrombidium zavattarii Lombardini, 1957 (Si)

Leptothrombium Berlese, 1912

Leptothrombium oblongum (Trägårdh, 1905) (Sa)

Note

Eutrombidium diecki: Segnalato per l'Italia senza indicazione di località.

Microtrombidiidae

Camerotrombidium Thor, 1936

Camerotrombidium pexatum (C.L. Koch, 1837) (*)
Camerotrombidium sanguineum (C.L. Koch, 1837) (N, S, Sa)

Campylothrombium Krausse, 1916

Campylothrombium densipapillum (Berlese, 1910) (N, S)

Echinothrombium Womersley, 1937

Echinothrombium spinosum (G. Canestrini, 1885) (N, S)

Enemothrombium Berlese, 1910

Enemothrombium acutum Lombardini, 1961 (N)
Enemothrombium bifoliosum (G. Canestrini, 1884) (S)
Enemothrombium confusum Berlese, 1910 (N, S)
Enemothrombium geographicum (Berlese, 1910)
Enemothrombium geographicum sardoum (Berlese, 1912) (Sa)

Eutrichothrombium Womersley, 1937

Eutrichothrombium itale Cooreman, 1955 (N)

Georgia Hull, 1906

Georgia pulcherrima (Haller, 1882) (N)

Microtrombidium Haller, 1882

Microtrombidium fasciatum (C.L. Koch, 1836)

Microtrombidium fasciatum fasciatum (C.L. Koch, 1836) (Sa)

Microtrombidium fasciatum interruptum Krausse, 1913 (Sa)

Microtrombidium fasciatum paucisignatum Krausse, 1913 (Sa)

Microtrombidium italicum (Berlese, 1910) (N, S, Si)

Microtrombidium pusillum (Hermann, 1804) (N, S, Si)

Platythrombidium Thor, 1936

Platythrombidium insulanum (Oudemans, 1901) (N)

Platythrombidium platychirum Berlese, 1912 (N)

Platythrombidium sylvaticum (C.L. Koch, 1835) (N)

Platythrombidium vagabundum (Berlese, 1903) (N, S, Si)

Valgothrombium Willmann, 1940

Valgothrombium carnicum Bottazzi, 1951 (N)

Note

Camerotrombidium pexatum: Segnalato per l'Italia senza indicazione di località.

Trombiculidae

Euschoengastia Ewing, 1938

Euschoengastia donaldi Kepka, 1958 (N)

Neotrombicula Hirst, 1915

Neotrombicula autumnalis (Shaw, 1790) (N, S)

Trombicula Berlese, 1910

Trombicula canestrinii (Buffa, 1899) (N, S)

Trombicula patrizii Valle, 1952 (N, S)

Trombicula pectinigera Lombardini, 1962 (N)

Trombicula spinosa Lombardini, 1952 (N)

Hydrovolziidae

Acherontacarus (Acherontacarellus) Lundblad, 1962

Acherontacarus (Acherontacarellus) cicolanii Bader, 1983 (Sa)

Hydrovolzia Thor, 1905

Hydrovolzia cancellata Walter, 1906 (N, Si)

Hydrovolzia placophora (Monti, 1905) (N, S, Si, Sa)

Hydrachnidae

Hydrachna (Anohydrachna) Thor, 1916

Hydrachna (Anohydrachna) inermis Piersig, 1895 (N)

Hydrachna (Diplohydrachna) Thor, 1916

Hydrachna (Diplohydrachna) globosa (de Geer, 1778) (N, Si, Sa)

Hydrachna (Diplohydrachna) uniscutata Thor, 1897 (N)

Hydrachna (Hydrachna) O.F. Müller, 1776

Hydrachna (Hydrachna) cruenta O.F. Müller, 1776 (N)

Hydrachna (Hydrachna) impressa C.L. Koch, 1837 (N) (*)

Hydrachna (Hydrachna) skorikowi Piersig, 1900

Hydrachna (Hydrachna) skorikowi integra Viets, 1930 (Si)

Hydrachna (Rhabdohydrachna) Viets, 1931

Hydrachna (Rhabdohydrachna) geographica O.F. Müller, 1776 (N)

Hydrachna (Rhabdohydrachna) maculifera Piersig, 1897 (N)

Hydrachna (Rhabdohydrachna) processifera Koenike, 1903 (Si, Sa)

Hydrachna (Scutohydrachna) Viets, 1933

Hydrachna (Scutohydrachna) miliaria Berlese, 1888 (N) (*)

Note

Hydrachna (Hydrachna) impressa: Specie incerta.

Hydrachna (Scutohydrachna) miliaria: La specie è segnalata da Fusacchia per Padova sulla base di una citazione di Berlese; molto probabilmente si tratta di un errore, in quanto la specie è riportata nei principali cataloghi come specie americana.

Limnocharidae

Limnochares Latreille, 1796

Limnochares aquatica (Linnaeus, 1758) (N)

Eylaidae

Eylais Latreille, 1796

Eylais clitellata Georgevitsch, 1906 (N)

Eylais degenerata Koenike, 1897 (Si)

Eylais extendens (O.F. Müller, 1776) (N, S, Si, Sa)

Eylais hamata Koenike, 1897 (S, Si)

Eylais sp. (S) (*)

Note

Eylais sp.: Specie indeterminata reperita nella palude torbiera di Colfiorito (Appennino Umbro-Marchigiano).

Hydryphantidae

Diplodontus Dugès, 1834

Diplodontus scapularis Dugès, 1834 (S, Si)

Diplodontus semiperforatus (Walter, 1925) (Si)

Hydryphantes (Georgella) Koenike, 1907

Hydryphantes (Georgella) berlesei Piersig, 1901 (N)

Hydryphantes (Georgella) helveticus (Haller, 1882) (N)

Hydryphantes (Georgella) imperfectus (Walter in Stammer, 1932) (N) (*)

Hydryphantes (Georgella) koenikei Maglio, 1906 (N)

Hydryphantes (Hydryphantes) C.L. Koch, 1841

Hydryphantes (Hydryphantes) dispar (Schaub, 1888) (N)

Hydryphantes (Hydryphantes) handschini Walter, 1924 (Si)

Hydryphantes (Hydryphantes) parmulatus Koenike, 1912 (Si)

Hydryphantes (Hydryphantes) ruber (de Geer, 1778) (N, S)

Hydryphantes (Polyhydryphantes) Viets, 1926

Hydryphantes (Polyhydryphantes) flexuosus (Koenike, 1885) (Si)
Hydryphantes (Polyhydryphantes) octoporus Koenike, 1896 (N)

Panisus Koenike, 1896

Panisus clypeolatus (Maglio, 1909) (N)
Panisus michaeli Koenike, 1896 (N)
Panisus torrenticolus Piersig, 1898
 Panisus torrenticolus torrenticolus Piersig, 1898 (S)
 Panisus torrenticolus bazettae Monti, 1908 (N)

Partnunia Piersig, 1896

Partnunia angusta (Koenike, 1893) (N)
Partnunia aprutina Gerecke, 1992 (S)
Partnunia regalis Gerecke, 1991 (S, Si)
Partnunia steinmanni Walter, 1906 (N)

Protzia (Calonyx) Walter, 1907

Protzia (Calonyx) brevipalpis Maglio, 1909 (N)
Protzia (Calonyx) rotunda Walter, 1908 (N, S, Si)
Protzia (Calonyx) squamosa Walter, 1908 (S)

Protzia (Protzia) Piersig, 1896

Protzia (Protzia) eximia (Protz, 1896) (N, S)
Protzia (Protzia) invalvaris Piersig, 1898 (N, S, Si)
Protzia (Protzia) rugosa Walter, 1918 (N)

Pseudohydryphantes Viets, 1907

Pseudohydryphantes parvulus Viets, 1907 (Sa)

Thyopsis Piersig, 1899

Thyopsis cancellata (Protz, 1896) (S)
Thyopsis sp. (S) (*)

Wandesia (Pseudowandesia) Habeeb, 1958

Wandesia (Pseudowandesia) cavecerberum Gerecke, 1991 (Si)
Wandesia (Pseudowandesia) lychnobia Gerecke, 1991 (Si)
Wandesia (Pseudowandesia) saginata Gerecke, 1991 (Si)

Wandesia (Wandesia) Schechtel, 1912

Wandesia (Wandesia) cf. thori Schechtel, 1912 (Si)

Note

Hydryphantes (Georgella) imperfectus: La specie viene citata in Stammer (1932) per il fiume Timavo; è in realtà un nome nudo.

Thyopsis sp.: Specie indeterminata segnalata per il fiume Vomano.

Hydrodromidae

Hydrodroma C.L. Koch, 1837

Hydrodroma despiciens (O.F. Müller, 1776) (N, S, Si, Sa)

Hydrodroma pilosa Besseling, 1940 (Si, Sa)

Hydrodroma torrenticola (Walter, 1908) (N, S, Si, Sa)

Sperchonidae

Sperchon (Hispidosperchon) Thor, 1901

Sperchon (Hispidosperchon) clupeifer Piersig, 1896 (N, S, Si, Sa)

Sperchon (Hispidosperchon) denticulatus Koenike, 1895 (N, S, Si, Sa)

Sperchon (Hispidosperchon) hispidus Koenike, 1895 (N, S, Si, Sa)

Sperchon (Hispidosperchon) monstruosus Bader, 1957 (N)

Sperchon (Hispidosperchon) violaceus Walter, 1944 (N)

Sperchon (Mixosperchon) Viets, 1926

Sperchon (Mixosperchon) algeriensis Lundblad, 1942 (S, Si)

Sperchon (Mixosperchon) papillosus Thor, 1901 (S, Si)

Sperchon (Mixosperchon) setiger Thor, 1898 (S, Si, Sa)

Sperchon (Porosperchon) Walter, 1944

Sperchon (Porosperchon) brevirostris Koenike, 1895 (N)

Sperchon (Porosperchon) glandulosus Koenike, 1886 (N)

Sperchon (Porosperchon) longirostris Koenike, 1895 (N)

Sperchon (Sperchon) Kramer, 1877

Sperchon (Sperchon) montanus Thon, 1901 (N)

Sperchon (Sperchon) mutilus Koenike, 1895 (N, S, Si, Sa)

Sperchon (Sperchon) resupinus Viets, 1922 (Si, Sa)

Sperchon (Sperchon) squamosus Kramer, 1879 (N, S, Si)

Sperchon (Sperchon) thienemanni Koenike, 1907 (N, S, Si, Sa)

Sperchonopsis Piersig, 1896

Sperchonopsis verrucosa (Protz, 1896) (N, S, Si, Sa)

Teutoniidae

Limnolegeria Motas, 1928

Limnolegeria longiseta Motas, 1928 (Si)

Teutonia Koenike, 1889

Teutonia cometes (C.L. Koch, 1837) (N, S, Si, Sa)

Anisitsiellidae

Bandakia Thor, 1913

Bandakia corsica E. Angelier, 1951 (Sa)

Bandakia norma Gerecke, 1991 (Si)

***Utaxatax* (*Rospatax*)** Gerecke, 1990

Utaxatax (*Rospatax*) *ventriplax* Gerecke, 1990 (S, Si, Sa)

Nilotoniidae

Manotonia Viets, 1935

Manotonia tegulata Viets, 1951 (S, Si, Sa)

Nilotonia Thor, 1905

Nilotonia longipora (Walter, 1925) (Si)

Nilotonia pontifica Gerecke, 1992 (S)

Nilotonia cf. *pyrenaica* Lundblad, 1956 (Si)

Lebertiidae

***Lebertia* (*Hexalebertia*)** Thor, 1906

Lebertia (*Hexalebertia*) *dubia* Thor, 1899 (N)

Lebertia (*Hexalebertia*) *giardinai* Maglio, 1908 (N)

Lebertia (*Hexalebertia*) *incognita* Viets, 1922 (N)

Lebertia (*Hexalebertia*) *stigmatifera* Thor, 1900 (S)

***Lebertia (Lebertia)* Neuman, 1880**

Lebertia (Lebertia) cognata Koenike, 1902 (N)
Lebertia (Lebertia) fimbriata Thor, 1899 (S)
Lebertia (Lebertia) maglioi Thor, 1907 (N, S, Si?)
Lebertia (Lebertia) papillosa Piersig, 1898 (N) (*)
Lebertia (Lebertia) rivulorum Viets, 1933 (N, S)
Lebertia (Lebertia) rufipes Koenike, 1902 (N)
Lebertia (Lebertia) sparsicapillata Thor, 1905 (N, S, Si)
Lebertia (Lebertia) tauinsignita (Lebert, 1879) (N)

***Lebertia (Mixolebertia)* Thor, 1906**

Lebertia (Mixolebertia) densa Koenike, 1902 (N)
Lebertia (Mixolebertia) longipes Monti, 1904 (N)
Lebertia (Mixolebertia) sigthori Maglio, 1908 (N)

***Lebertia (Pilolebertia)* Thor, 1900**

Lebertia (Pilolebertia) circularis Viets, 1908 (N)
Lebertia (Pilolebertia) inaequalis (C.L. Koch, 1837) (N, S, Si)
Lebertia (Pilolebertia) insignis Neuman, 1880 (N)
Lebertia (Pilolebertia) pilosa (Maglio, 1924) (N)
Lebertia (Pilolebertia) porosa Thor, 1900 (N, S, Si)
Lebertia (Pilolebertia) saxonica Thor, 1911 (N, S)
Lebertia (Pilolebertia) sp. (N) (*)

***Lebertia (subg.Pseudolebertia)* Thor, 1897**

Lebertia (subg.Pseudolebertia) glabra Thor, 1897 (N, Si)
Lebertia (subg.Pseudolebertia) multicincta Thor, 1914 (N)
Lebertia (subg.Pseudolebertia) tuberosa Thor, 1914 (N)
Lebertia (subg.Pseudolebertia) zschokkei Koenike, 1902 (N)
Lebertia (subg.Pseudolebertia) sp. (N) (*)

Note

Lebertia (Lebertia) papillosa: Specie di dubbia validità.
Lebertia (Pilolebertia) sp.: Specie indeterminata segnalata per il Lago Maggiore.
Lebertia (subg.Pseudolebertia) sp.: Specie indeterminata raccolta in un ruscello del Pian di Bedole (Val di Genova, Trento).

Oxidae

***Frontipoda* Koenike, 1891**

Frontipoda carpenteri Halbert, 1911 (N?)
Frontipoda musculus (O.F. Müller, 1776) (N, S)

***Oxus (Oxus)* Kramer, 1877**

Oxus (Oxus) angustipositus Viets, 1908 (N, S)
Oxus (Oxus) longisetus (Berlese, 1885) (N, S)
Oxus (Oxus) strigatus (O.F. Müller, 1776) (N, S)
Oxus (Oxus) sp. (N) (*)
Oxus (Oxus) sp. (S) (*)

***Oxus (Gnaphiscus)* Koenike, 1898**

Oxus (Gnaphiscus) setosus (Koenike, 1898) (N)

Note

Oxus (Oxus) sp.: Specie indeterminata segnalata per il Lago del Piano.
Oxus (Oxus) sp.: Specie probabilmente nuova reperita nel Lago di Giulianello.

Torrenticolidae

***Pseudotorrenticola* Walter, 1906**

Pseudotorrenticola rhynchota Walter, 1906 (Si)

***Torrenticola (Monatractides)* Viets, 1926**

Torrenticola (Monatractides) algeriensis (Lundblad, 1941) (S, Si)
Torrenticola (Monatractides) cf. lusitanica (Lundblad, 1941) (Si)
Torrenticola (Monatractides) madritensis (Viets, 1930) (N)
Torrenticola (Monatractides) stadleri (Walter, 1924) (S, Si)

***Torrenticola (Rusetria)* Thor, 1897**

Torrenticola (Rusetria) amplexa (Koenike, 1908) (S)
Torrenticola (Rusetria) ungeri (Szalay, 1927) (N, S, Si)

***Torrenticola (Torrenticola)* Piersig, 1896**

Torrenticola (Torrenticola) andrei (E. Angelier, 1950) (Si)
Torrenticola (Torrenticola) anomala (C.L. Koch, 1837) (N, S, Si)
Torrenticola (Torrenticola) barsica (Szalay, 1933) (S, Si)
Torrenticola (Torrenticola) brevirostris (Halbert, 1911) (N, Si)
Torrenticola (Torrenticola) crenobia Di Sabatino & Cicolani, 1989 (S, Si)
Torrenticola (Torrenticola) elliptica Maglio, 1909 (N, S, Si)
Torrenticola (Torrenticola) hyporheica Di Sabatino & Cicolani, 1991 (Si)

Torrenticola (Torrenticola) lativalvata Viets, 1952 (N, Si)
Torrenticola (Torrenticola) maglioi (Koenike, 1908) (N, S)
Torrenticola (Torrenticola) meridionalis Di Sabatino & Cicolani, 1990 (S, Si)
Torrenticola (Torrenticola) mucronata Viets, 1955 (S)
Torrenticola (Torrenticola) similis (Viets, 1939) (N)
Torrenticola (Torrenticola) trinacriae Di Sabatino & Cicolani, 1992 (Si)
Torrenticola (Torrenticola) sp. (S) (*)
Torrenticola (Torrenticola) sp. (N) (*)

Note

Torrenticola (Torrenticola) sp.: Specie indeterminata reperita nel fiume Esino.
Torrenticola (Torrenticola) sp.: Specie indeterminata reperita nel Lago Maggiore.

Pontarachnidae

Litarachna Walter, 1925

Litarachna communis Walter, 1925 (3, 4)
Litarachna divergens Walter, 1925 (4) (*)
Litarachna duboscqi Walter, 1925 (3, 4)
Litarachna incerta Walter, 1925 (3) (*)

Pontarachna Philippi, 1840

Pontarachna adriatica Morselli, 1980 (4)
Pontarachna aenariensis Mari & Morselli, 1983 (3)
Pontarachna punctulum Philippi, 1840 (3)
Pontarachna tergestina Schaub, 1889 (4) (*)

Note

Litarachna divergens: Specie di dubbia validità.
Litarachna incerta: Specie di dubbia validità.
Pontarachna tergestina: Specie di dubbia validità.

Limnesiidae

Kawamuracarus Uchida, 1937

Kawamuracarus vardaricolus Viets, 1942 (N)

Limnesia C.L. Koch, 1836

Limnesia acuminata Walter, 1925 (Si, Sa)
Limnesia arevaloi Viets, 1918

Limnesia arevaloi arevaloi Viets, 1918 (Si)
Limnesia arevaloi ambulatoria Gerecke, 1991 (Sa)
Limnesia connata Koenike, 1895 (N)
Limnesia fulgida C.L. Koch, 1836 (N, S)
Limnesia koenikei Piersig, 1894 (N, S)
Limnesia maculata (O.F. Müller, 1776) (N, S, Sa)
Limnesia manubriata Walter, 1928 (Si)
Limnesia undulata (O.F. Müller, 1776) (N, S)
Limnesia walteri Migot, 1926 (S, Si, Sa)

Hygrobatidae

Atractides C.L. Koch, 1837

Atractides acutirostris Motas & C. Angelier, 1927 (S, Si)
Atractides distans (Viets, 1914) (N)
Atractides cf. fonticolus (Viets, 1920) (Si)
Atractides gibberipalpis Piersig, 1898 (N)
Atractides inflatus (Walter, 1925) (Si)
Atractides latipes (Szalay, 1935) (N)
Atractides legeri (Motas, 1927) (N, S)
Atractides nodipalpis (Thor, 1899)
 Atractides nodipalpis nodipalpis (Thor, 1899) (N, S, Si)
 Atractides nodipalpis longitibialis (Walter, 1927) (S)
 Atractides nodipalpis pennatus (Viets, 1920) (N, S)
Atractides ovalis Koenike, 1883 (S)
Atractides panniculatus (Viets, 1925) (Si)
Atractides pavesii Maglio, 1905 (N, S)
Atractides robustus (Sokolow, 1940) (N, S)
Atractides spinipes C.L. Koch, 1837 (N, S)
Atractides subasper Koenike, 1902 (Si)
Atractides tener (Thor, 1899) (N)
Atractides walteri (Viets, 1925) (N)

Hygrobates (Hygrobates) C.L. Koch, 1837

Hygrobates (Hygrobates) calliger Piersig, 1896 (N, S, Si, Sa)
Hygrobates (Hygrobates) fluviatilis (Ström, 1768) (N, S, Si, Sa)
Hygrobates (Hygrobates) foreli (Lebert, 1874) (N, S)
Hygrobates (Hygrobates) longipalpis (Hermann, 1804) (N, S, Si, Sa)
Hygrobates (Hygrobates) longiporus Thor, 1898 (N, S, Si, Sa)
Hygrobates (Hygrobates) nigromaculatus Lebert, 1879 (N)
Hygrobates (Hygrobates) trigonicus Koenike, 1895 (N)
Hygrobates (Hygrobates) sp. (N) (*)

Hygrobates (Rivobates) Thor, 1897

Hygrobates (Rivobates) norvegicus (Thor, 1897) (N, S, Si)

Note

Hygrobates (Hygrobates) sp.: Specie indeterminata reperita nel Lago di Cavazzo.

Unionicolidae

Neumania Lebert, 1879

Neumania deltoides (Piersig, 1894) (N, S)

Neumania imitata Koenike, 1908 (N)

Neumania limosa (C.L. Koch, 1836) (N, S)

Neumania papillosa (Soar, 1902) (N)

Neumania vernalis (O.F. Müller, 1776) (N)

Unionicola (Parasitatax) Viets, 1949

Unionicola (Parasitatax) ypsilophora (Bonz, 1783) (N)

Unionicola (Pentatax) Thor, 1922

Unionicola (Pentatax) aculeata (Koenike, 1890) (N, Sa)

Unionicola (Pentatax) bonzi (Claparède, 1869) (N)

Unionicola (Pentatax) figuralis (C.L. Koch, 1836) (N)

Unionicola (Pentatax) finisbelli Ramazzotti, 1947 (N)

Unionicola (Pentatax) hankoi Szalay, 1927 (N)

Unionicola (Pentatax) intermedia (Koenike, 1882)

Unionicola (Pentatax) intermedia intermedia (Koenike, 1882) (N, S)

Unionicola (Pentatax) intermedia lavaronsensis (Largaiolli, 1906) (N)

Unionicola (Pentatax) tricuspis (Koenike, 1895) (N)

Unionicola (Unionicola) Haldeman, 1842

Unionicola (Unionicola) crassipes (O.F. Müller, 1776) (N, S, Sa)

Unionicola (Unionicola) gracilipalpis (Viets, 1908) (N, Sa)

Unionicola (Unionicola) minor (Soar, 1900) (N, S, Sa)

Unionicola (Unionicola) parvipora Lundblad, 1920 (S)

Feltriidae

Feltria (Feltria) Koenike, 1892

Feltria (Feltria) armata Koenike, 1902 (N)

Feltria (Feltria) minuta Koenike, 1892 (N)

Feltria (Feltria) setigera Koenike, 1896 (N)

Feltria (Feltria) zschokkei Koenike, 1896 (N)

Feltria (Feltriella) Viets, 1930

Feltria (Feltriella) rubra Piersig, 1898 (N)

Pionidae

Forelia Haller, 1882

Forelia brevipes (Neuman, 1880)

Forelia brevipes brevipes (Neuman, 1880) (N)

Forelia brevipes spatulifera (Marucci, 1907) (S)

Forelia cetrata (Koenike, 1895) (N)

Forelia curvipalpis Viets, 1930

Forelia curvipalpis curvipalpis Viets, 1930 (N, S)

Forelia curvipalpis dentipalpis Lundblad, 1956 (N)

Forelia gibberipes (Protz, 1900) (N)

Forelia liliacea (O.F. Müller, 1776) (N, S)

Forelia longipalpis Maglio, 1924 (N, S)

Forelia variegator (C.L. Koch, 1837) (N, S)

Forelia sp. (N) (*)

Forelia sp. (N) (*)

Hydrochoreutes C.L. Koch, 1837

Hydrochoreutes krameri Piersig, 1896 (N, S)

Hydrochoreutes unguatus (C.L. Koch, 1836) (N)

Piona C.L. Koch, 1842

Piona alpicola (Neuman, 1880) (N, S)

Piona carnea (C.L. Koch, 1836) (N)

Piona coccinea (C.L. Koch, 1836)

Piona coccinea coccinea (C.L. Koch, 1836) (N, S, Si)

Piona coccinea occulta Koenike, 1914 (N)

Piona conglobata (C.L. Koch, 1836) (N, Si)

Piona discrepans (Koenike, 1895) (N, S)

Piona disparilis (Koenike, 1895) (N)

Piona longipalpis (Krendowskij, 1878) (N)

Piona neumani (Koenike, 1883) (N)

Piona nodata (O.F. Müller, 1776) (N, Si)

Piona obturbans (Piersig, 1896) (N)

Piona pusilla (Neuman, 1875)

Piona pusilla pusilla (Neuman, 1875) (N, S)

Piona pusilla rotundoides (Thor, 1897) (N)

Piona stjordalensis (Thor, 1897) (N)

Piona variabilis (C.L. Koch, 1836) (N, S)

Piona sp. (N) (*)

Piona sp. (S) (*)

Pionopsis Piersig, 1894

Pionopsis lutescens (Hermann, 1804) (N, S, Si)

Tiphys C.L. Koch, 1836

Tiphys latipes (O.F. Müller, 1776) (N)

Tiphys ornatus C.L. Koch, 1836 (N, S)

Tiphys torris (O.F. Müller, 1776) (N, S)

Wettina Piersig, 1892

Wettina podagrica (C.L. Koch, 1837) (N, S)

Note

Forelia sp.: Ninfa indeterminata reperita nel fiume Strona a Somma Lombardo.

Forelia sp.: Ninfa indeterminata reperita nel Lago di Mergozzo.

Piona sp.: Specie indeterminata reperita nel Lago di Mergozzo.

Piona sp.: Specie indeterminata reperita nel fiume Ninfa.

Aturidae

Albia Thon, 1899

Albia stationis Thon, 1899 (N)

Aturus Kramer, 1875

Aturus barbatulus Viets, 1936 (Si)

Aturus crinitus Thor, 1902 (N, S)

Aturus natangensis Protz, 1900 (Si)

Aturus scaber Kramer, 1875 (N, S)

Aturus spatulifer Piersig, 1904 (Si)

***Axonopsis* (*Axonopsis*)** Piersig, 1893

Axonopsis (*Axonopsis*) *complanata* (O.F. Müller, 1776) (N)

Axonopsis (*Axonopsis*) *gracilis* (Piersig, 1903) (S)

***Axonopsis* (*Hexapsonopsis*)** Viets, 1926

Axonopsis (*Hexapsonopsis*) *serrata* Walter, 1928 (S)

Axonopsis (Paraxonopsis) Motas & Tanasachi, 1947

Axonopsis (Paraxonopsis) dantei Di Sabatino, 1994 (S)

Barbaxonella Lundblad, 1954

Barbaxonella reverendissima Gerecke, 1994 (Sa)

Barbaxonella spectabilis Gerecke & Meyer, 1989 (Si)

Brachypoda (Brachypoda) Lebert, 1879

Brachypoda (Brachypoda) versicolor (O.F. Müller, 1776) (N)

Brachypoda (Hemibrachypoda) Viets, 1937

Brachypoda (Hemibrachypoda) baderi Di Sabatino & Cicolani, 1990 (S)

Brachypoda (Parabrachypoda) Viets, 1929

Brachypoda (Parabrachypoda) montii Maglio, 1924 (N)

Javalbia Viets, 1935

Javalbia eremita Gerecke, 1991 (Si)

Kongsbergia Thor, 1899

Kongsbergia largaiollii (Maglio, 1909) (N)

Lethaxona Viets, 1932

Lethaxona cf. pygmaea Viets, 1932 (Si, Sa)

Ljania Thor, 1898

Ljania bipapillata Thor, 1898 (S, Si)

Prymnopsella Gerecke, 1991

Prymnopsella bucculata Gerecke, 1991 (Sa)

Woolastookia Habeeb, 1954

Woolastookia rotundifrons (Viets, 1922) (N, Si)

Momoniidae

Momon*ia* Halbert, 1906

*Momon**ia falcipalpis* Halbert, 1906 (N, Si)

Momon*ides* Lundblad, 1941

*Momon**ides lundbladi* E. Angelier, 1951 (Sa)

Stygomomon*ia* Szalay, 1943

*Stygomomon**ia latipes* Szalay, 1943 (S, Si, Sa)

Mideopsidae

Mideopsis Neuman, 1880

Mideopsis crassipes Soar, 1904 (S)

Mideopsis orbicularis (O.F. Müller, 1776) (N, S)

Neoacaridae

Neoacarus Halbert, 1944

Neoacarus hibernicus Halbert, 1944 (Si, Sa)

Bogatiidae

Bogatia Motas & Tanasachi, 1948

Bogatia maxillaris Motas & Tanasachi, 1948 (Si)

Krendowskiidae

Krendowskia Piersig, 1895

Krendowskia latissima Piersig, 1895 (S)

Athienemanniidae

Stygohydracarus Viets, 1932

Stygohydracarus cf. subterraneus Walter, 1947 (Si)

Hungarohydracaridae

Hungarohydracarus Szalay, 1943

Hungarohydracarus subterraneus Szalay, 1943

Hungarohydracarus subterraneus subterraneus Szalay, 1943 (Si)

Hungarohydracarus subterraneus italicus Schwoerbel, 1961 (N)

Arrenuridae

***Arrenurus* (*Arrenurus*)** Dugès, 1834

Arrenurus (*Arrenurus*) *abbreviator* Berlese, 1888 (N, S)

Arrenurus (*Arrenurus*) *albator* (O.F. Müller, 1776) (N)

Arrenurus (*Arrenurus*) *bicuspidator* Berlese, 1885 (N, S)

Arrenurus (*Arrenurus*) *bruzelii* Koenike, 1885 (N, Si)

Arrenurus (*Arrenurus*) *claviger* Koenike, 1885 (N, S)

Arrenurus (*Arrenurus*) *crassicaudatus* Kramer, 1875 (N, S)

Arrenurus (*Arrenurus*) *cuspidator* (O.F. Müller, 1776) (N, Si)

Arrenurus (*Arrenurus*) *cuspidifer* Piersig, 1894 (N, S, Si)

Arrenurus (*Arrenurus*) *denticulatus* Motas, 1927 (S)

Arrenurus (*Arrenurus*) *edentator* Berlese, 1889 (N)

Arrenurus (*Arrenurus*) *emarginator* (O.F. Müller, 1776) (N) (*)

Arrenurus (*Arrenurus*) *latus* Barrois & Moniez, 1887 (N, Si)

Arrenurus (*Arrenurus*) *maculator* (O.F. Müller, 1776) (N)

Arrenurus (*Arrenurus*) *neumani* Piersig, 1895 (N)

Arrenurus (*Arrenurus*) *nielsenii* Münchberg, 1935 (N)

Arrenurus (*Arrenurus*) *nobilis* Neuman, 1880 (N)

Arrenurus (*Arrenurus*) *ornatus* George, 1900 (S)

Arrenurus (*Arrenurus*) *papillator* (O.F. Müller, 1776) (N, Si)

Arrenurus (*Arrenurus*) *radiatus* Piersig, 1894 (N, Si)

Arrenurus (*Arrenurus*) *robustus* Koenike, 1894 (N)

Arrenurus (*Arrenurus*) *rodrigensis* Lundblad, 1954 (Si)

Arrenurus (*Arrenurus*) *tricuspidator* (O.F. Müller, 1776) (N, S)

***Arrenurus* (*Megaluracarus*)** Viets, 1911

Arrenurus (*Megaluracarus*) *adnatus* Koenike, 1902 (N)

Arrenurus (*Megaluracarus*) *buccinator* (O.F. Müller, 1776) (N)

Arrenurus (*Megaluracarus*) *cylindratus* Piersig, 1896

Arrenurus (*Megaluracarus*) *cylindratus cylindratus* Piersig, 1896 (N, S, Si)

Arrenurus (*Megaluracarus*) *cylindratus latigenitalis* Lundblad, 1956 (N)

Arrenurus (*Megaluracarus*) *globator* (O.F. Müller, 1776)

Arrenurus (*Megaluracarus*) *globator globator* (O.F. Müller, 1776) (N, S)

Arrenurus (Megaluracarus) globator tubulator (O.F. Müller, 1776) (S)
Arrenurus (Megaluracarus) maggii Maglio, 1906 (N)
Arrenurus (Megaluracarus) muelleri Koenike, 1901 (N)

Arrenurus (Micruracarus) Viets, 1911

Arrenurus (Micruracarus) bipapillosus Halbert, 1911 (N)
Arrenurus (Micruracarus) biscissus Lebert, 1878 (N)
Arrenurus (Micruracarus) forpicatus Neuman, 1880 (N)
Arrenurus (Micruracarus) novus George, 1884 (Si)
Arrenurus (Micruracarus) sinuator (O.F. Müller, 1776) (N, S)

Arrenurus (Truncaturus) Thor, 1901

Arrenurus (Truncaturus) stecki Koenike, 1894 (N, S)

Note

Arrenurus (Arrenurus) emarginator: Specie di dubbia validità.

Barbutiidae

Barbutia Oudemans, 1927

Barbutia anguinea (Berlese, 1910) (S)

Caligonellidae

Caligonella Berlese, 1910

Caligonella humilis (C.L. Koch, 1838) (N, S, Si, Sa)

Molothrognathus Summers & Schlinger, 1955

Molothrognathus fulgidus Summers & Schlinger, 1955 (Si)

Camerobiidae

Neophyllobius Berlese, 1886

Neophyllobius communis Gerson, 1968 (Si)
Neophyllobius elegans Berlese, 1887 (N, S)
Neophyllobius marginatus De Leon, 1958 (Si)

Tycherobius Bolland, 1986

Tycherobius superbus (R. Canestrini, 1889) (N)

Cryptognathidae

Cryptognathus Kramer, 1879

Cryptognathus cucurbita Berlese, 1916 (Sa)

Cryptognathus lagenae Kramer, 1879 (N, S)

Eupalopsellidae

Eupalopsis G. Canestrini, 1886

Eupalopsis maseriensis (G. Canestrini & Fanzago, 1876) (N, S)

Homocaligidae

Homocaligus Berlese, 1910

Homocaligus scapularis (C.L. Koch, 1838) (N)

Raphignathidae

Raphignathus Dugès, 1834

Raphignathus curtipilus Berlese, 1888 (S)

Raphignathus gracilis (Rack, 1962) (S, Si)

Raphignathus hispidus Dugès, 1834 (Si)

Raphignathus impressus (C.L. Koch, 1838) (N)

Raphignathus longimanus (C.L. Koch, 1838) (N, S)

Raphignathus patrius Berlese, 1885 (N) (*)

Raphignathus ruberrimus Dugès, 1834 (N, S)

Note

Raphignathus patrius: Attribuzione generica incerta; parte del materiale così etichettato nella Collezione Berlese è riferibile a *Eustigmaeus rhodomela* (C.L. Koch, 1841).

Stigmaeidae

Agistemus Summers, 1960

Agistemus collyerae Gonzales, 1963 (S, Si)

Eryngiopus Summers, 1964

Eryngiopus bifidus Wood, 1967 (N)

Eryngiopus sculus Vacante & Gerson, 1987 (Si)

Eryngiopus summeri Vacante & Gerson, 1987 (Si)

Eustigmaeus Berlese, 1910

Eustigmaeus anauniensis (R. Canestrini, 1886) (N, S)

Eustigmaeus clavatus (G. Canestrini & Fanzago, 1876) (N, S, Si)

Eustigmaeus etruscus (Berlese, 1910) (N, S)

Eustigmaeus kermesinus (C.L. Koch, 1841) (N, S)

Eustigmaeus microsegni (Chaudri, 1965) (S)

Eustigmaeus ottavii (Berlese, 1910) (N)

Eustigmaeus rhodomela (C.L. Koch, 1841) (N)

Eustigmaeus segnis (C.L. Koch, 1836) (N, S, Si)

Ledermuelleriopsis Willmann, 1951

Ledermuelleriopsis plumosus Willmann, 1951 (Si)

Macrostigmaeus Berlese, 1910

Macrostigmaeus serpentinus Berlese, 1910 (S)

Mediolata G. Canestrini, 1889

Mediolata acus (Summers, 1960) (N, S, Sa)

Mediolata longirostris (Berlese, 1887) (N, S)

Mediolata pini R. Canestrini, 1890 (N, S)

Stigmaeus C.L. Koch, 1836

Stigmaeus bicolor G. Canestrini & Fanzago, 1876 (N) (*)

Stigmaeus elongatus Berlese, 1886 (S)

Stigmaeus longipilis (G. Canestrini, 1889) (N, S)

Stigmaeus rhodomelas Berlese, 1910 (S, Si)

Stigmaeus sculus (Berlese, 1882) (N, S, Si)

Stigmaeus simrothi Mola, 1907 (Sa) (*)

Storchia Oudemans, 1923

Storchia robusta (Berlese, 1885) (N, S)

Zetzellia Oudemans, 1927

Zetzellia crassirostris (Leonardi, 1899) (S)
Zetzellia graeciana Gonzales, 1965 (S, Si, Sa)
Zetzellia mali (Ewing, 1917) (N, S, Si, Sa)

Note

Stigmaeus bicolor: Specie inquirenda.
Stigmaeus simrothi: Specie inquirenda.

Cheyletidae

Agropsellina Summers, 1977

Agropsellina docta (Berlese, 1886) (S)

Bakericheyla Volgin, 1966

Bakericheyla chanayi (Berlese & Trouessart, 1889) (S)
Bakericheyla heteropalpa (Méglin, 1878) (N, S)

Chelacheles Baker, 1958

Chelacheles sp. (Sa) (*)

Cheletogenes Oudemans, 1905

Cheletogenes ornatus (G. Canestrini & Fanzago, 1876) (N, S, Si, Sa)

Cheletophanes Oudemans, 1904

Cheletophanes peregrinus Berlese, 1920 (S)

Cheletomimus Oudemans, 1904

Cheletomimus berlesei (Oudemans, 1904) (N, S, Si)
Cheletomimus minutus Soliman, 1977 (Si)

Cheletomorpha Oudemans, 1904

Cheletomorpha lepidopterorum (Shaw, 1794) (N, S, Si, Sa)

Cheyletia Haller, 1884

Cheyletia laureata (Haller, 1884) (S)

Cheyletiella G. Canestrini, 1886

Cheyletiella blakei Smiley, 1970 (Si)
Cheyletiella parasitivorax (Méglin, 1878) (N, S)
Cheyletiella yasguri Smiley, 1965 (N, S)

Cheyletus Latreille, 1796

Cheyletus eruditus (Schrank, 1781) (N, S, Si, Sa)
Cheyletus malaccensis Oudemans, 1913 (*)
Cheyletus nigripes Mola, 1927 (Sa)
Cheyletus schneideri Oudemans, 1902 (N)
Cheyletus tenuipilis Fain, Feldman-Muhsam & Mumcuoglu, 1980 (S, Sa)
Cheyletus trouessarti Oudemans, 1903 (S)

Eucheyletia Baker, 1949

Eucheyletia flabellifera (Michael, 1878) (S)

Eutogenes Baker, 1949

Eutogenes citri Gerson, 1967 (Si)

Hemicheyletia Volgin, 1969

Hemicheyletia wellsi (Baker, 1949) (Sa)

Neochyletiella Baker, 1949

Neochyletiella microrhyncha (Berlese & Trouessart, 1889) (*)

Neoeucheyla Radford, 1950

Neoeucheyla loricata (Berlese, 1913) (Si)

Ornithocheyletia Volgin, 1964

Ornithocheyletia pinguis (Berlese, 1889) (S)

Paracheyletia Volgin, 1955

Paracheyletia pyriformis (Banks, 1904) (N, S, Sa)

Prosocheyla Volgin, 1969

Prosocheyla sp. (N, S, Sa) (*)

Note

Chelacheles sp.: Specie indeterminata, probabilmente nuova, reperita sui cancri corticali del

castagno.

Cheyletus malaccensis: Segnalata per l'Italia senza indicazione di località.

Neocheyletiella microrhyncha: Su rondine europea in Italia.

Prosocheyla sp.: Specie indeterminata, probabilmente nuova, reperita sui cancri corticali del castagno in diverse località.

Demodicidae

Demodex Owen, 1843

Demodex arvicolae Zschokke, 1888 (*)

Demodex arvicolae musculi Oudemans, 1898

Demodex bovis Stiles, 1892 (N)

Demodex canis Leydig, 1859 (*)

Demodex canis canis Leydig, 1859 (N, S)

Demodex canis ovis Railliet, 1895

Demodex caprae Railliet, 1895 (*)

Demodex equi Railliet, 1895 (*)

Demodex folliculorum (Simon, 1843) (N, S, Si, Sa)

Demodex phylloides Csokor, 1879 (*)

Note

Demodex arvicolae: Segnalata per l'Italia senza indicazione di località.

Demodex canis: Segnalata per l'Italia senza indicazione di località.

Demodex caprae: Segnalata per l'Italia senza indicazione di località.

Demodex equi: Segnalata per l'Italia senza indicazione di località.

Demodex phylloides: Segnalata per l'Italia senza indicazione di località.

Harpirhynchidae

Harpirhynchus Mégnin, 1877

Harpirhynchus nidulans (Nitzsch, 1818) (N, S)

Psorergates Tyrrel, 1883

Psorergates etruscus De Cock, Lukoschus & Ariani, 1969 (S)

Psorergates simplex Tyrrel, 1883 (*)

Note

Psorergates simplex: Segnalata per l'Italia senza indicazione di località.

Myobiidae

Calcarmyobia Radford, 1940

Calcarmyobia parenzani Lombardini, 1956 (S) (*)

Myobia von Heyden, 1826

Myobia murismusculi (Schränk, 1781) (N, S, Si, Sa)

Pteracarus Jameson & Chow, 1952

Pteracarus pipistrellius (Radford, 1938)

Pteracarus pipistrellius maximis Uchikawa, 1989 (S)

Radfordia Ewing, 1938

Radfordia affinis (Poppe, 1896) (*)

Radfordia eliomys Fain & Lukoschus, 1973 (*)

Radfordia ensifera (Poppe, 1896) (*)

Radfordia lemnina (C.L. Koch, 1835) (*)

Radfordia sicula Willmann, 1955 (Si)

Note

Calcarmyobia parenzani: Attribuzione generica incerta, specie inquirenda.

Radfordia affinis: Segnalata per l'Italia senza indicazione di località.

Radfordia eliomys: Segnalata per l'Italia senza indicazione di località.

Radfordia ensifera: Segnalata per l'Italia senza indicazione di località.

Radfordia lemnina: Segnalata per l'Italia senza indicazione di località.

Linotetranidae

Linotetrans Berlese, 1910

Linotetrans cylindricus Berlese, 1910 (Si)

Tenuipalpidae

Brevipalpus Donnadieu, 1875

Brevipalpus californicus (Banks, 1904) (S, Si)

Brevipalpus cuneatus (G. Canestrini & Fanzago, 1876) (N, S, Si)

Brevipalpus lewisi McGregor, 1949 (S)

Brevipalpus obovatus Donnadieu, 1875 (N, S, Si, Sa)

Brevipalpus oleae Baker, 1949 (S, Si, Sa)

Brevipalpus olearius Sayed, 1950 (S)
Brevipalpus olivicola Pegazzano & Castagnoli, 1972 (N, S, Si, Sa)
Brevipalpus phoenicis (Geijskes, 1939) (N, S, Si)
Brevipalpus rotai (Castagnoli & Pegazzano, 1979) (S)

Cenopalpus Pritchard & Baker, 1958

Cenopalpus halperini Castagnoli, 1987 (Sa)
Cenopalpus lineola (G. Canestrini & Fanzago, 1876) (N, S, Sa)
Cenopalpus pegazzanoae Castagnoli, 1987 (S)
Cenopalpus pulcher (G. Canestrini & Fanzago, 1876) (N, S, Si)
Cenopalpus spinosus (Donnadieu, 1875) (N, S)
Cenopalpus wainsteini (Livshits & Mitrofanov, 1967) (N, S, Sa)

Pentamerismus McGregor, 1949

Pentamerismus coronatus (G. Canestrini & Fanzago, 1876) (N, S)

Raoiella Hirst, 1924

Raoiella mori (Rondani, 1870) (N)

Tauripalpoides Pegazzano, 1975

Tauripalpoides mitrofanovi Pegazzano, 1975 (S)

Tauripalpus Mitrofanov, 1973

Tauripalpus recki (Livshits & Mitrofanov, 1967) (S)

Tenuipalpus Donnadieu, 1875

Tenuipalpus caudatus (Dugès, 1834) (N, S, Sa)
Tenuipalpus granati (Sayed, 1946) (Si)
Tenuipalpus pacificus Baker, 1945 (N, S)

Tetranychidae

Aplonobia Womersley, 1940

Aplonobia histricina (Berlese, 1910) (Si)

Bryobia C.L. Koch, 1836

Bryobia aetnensis Vacante, 1985 (Si)
Bryobia artemisiae Bagdasarian, 1951 (Sa)
Bryobia berlesei van Eynhoven, 1957 (S)

Bryobia borealis Oudemans, 1930 (N)
Bryobia cavallaroi Vacante & van Eindhoven, 1986 (Sa)
Bryobia cristata (Dugès, 1834) (N)
Bryobia glacialis Berlese, 1913 (N)
Bryobia kissophila van Eindhoven, 1955 (N, Si)
Bryobia parietariae Reck, 1947 (Si)
Bryobia praetiosa C.L. Koch, 1836 (N, S, Si)
Bryobia rubrioculus (Scheuten, 1857) (N, S, Si)
Bryobia stromboli Vacante, 1985 (Si)
Bryobia urticae Sayed, 1946 (Si)
Bryobia vandaelei Vacante, 1985 (Si)
Bryobia vaneyndhoveni Vacante, 1985 (Si)
Bryobia vasiljevi Reck, 1953 (Si)
Bryobia watersi Manson, 1967 (Si)

Eotetranychus Oudemans, 1931

Eotetranychus aurantii (Targioni Tozzetti, 1878) (S)
Eotetranychus carpini (Oudemans, 1905) (N, S, Si)
Eotetranychus coryli (Reck, 1950) (S)
Eotetranychus fagi (Zacher, 1922) (N)
Eotetranychus gibbosus (R. Canestrini, 1889) (N)
Eotetranychus pomi Sepasgosarian, 1956 (N, S)
Eotetranychus pruni (Oudemans, 1931) (N, Si)
Eotetranychus rubiphilus (Reck, 1948) (Si)
Eotetranychus tiliarum (Hermann, 1804) (N, S)

Eurytetranychus Oudemans, 1931

Eurytetranychus latus (G. Canestrini & Fanzago, 1876) (N, S)

Nuciforella Vacante, 1984

Nuciforella nikitensis (Livshits & Mitrofanov, 1969) (Si)

Oligonychus Berlese, 1886

Oligonychus bicolor (Banks, 1894) (N, S, Si)
Oligonychus ilicis (McGregor, 1917) (N)
Oligonychus piceae (R. Canestrini, 1889) (N)
Oligonychus ununguis (Jacobi, 1905) (N, S)

Panonychus Jokoyama, 1929

Panonychus citri (McGregor, 1916) (S, Si, Sa)
Panonychus ulmi (C.L. Koch, 1836) (N, S, Si)

Petrobia Murray, 1877

Petrobia latens (O.F. Müller, 1776) (N, Si)
Petrobia tunisiae Manson, 1964 (Si)

Tetranychina Banks, 1917

Tetranychina donnalucatensis Vacante, 1983 (Si)
Tetranychina harti (Ewing, 1909) (S, Si)

Tetranychus Dufour, 1832

Tetranychus anauniensis R. Canestrini, 1890 (N)
Tetranychus urticae C.L. Koch, 1836 (N, S, Si, Sa)
Tetranychus viennensis Zacher, 1920 (N, Si)

Tetranychopsis G. Canestrini, 1889

Tetranychopsis horrida (G. Canestrini & Fanzago, 1876) (N, S, Si)

Phytoptidae

Phytoptus Dujardin, 1851

Phytoptus avellanae Nalepa, 1889 (N, S, Si)
Phytoptus tetratrichus (Nalepa, 1891) (N)

Setoptus Keifer, 1944

Setoptus multigranulatus Castagnoli, 1973 (S)

Trisetacus Keifer, 1952

Trisetacus cembrae (Tubeuf, 1910) (N)
Trisetacus dorsospinosus Castagnoli, 1973 (S)
Trisetacus ehmanni Keifer, 1963 (S)
Trisetacus etruscus Castagnoli, 1973 (S)
Trisetacus halepensis Castagnoli, 1973 (N, S)
Trisetacus juniperinus (Nalepa, 1911) (S)
Trisetacus pinastri Nuzzaci, 1975 (S)
Trisetacus pini (Nalepa, 1887)
 Trisetacus pini pini (Nalepa, 1887) (N)
 Trisetacus pini floricola (Trotter, 1902) (S)
Trisetacus quadrisetus (Thomas, 1889) (N, S)
Trisetacus silvestris Castagnoli, 1973 (N, S)

Eriophyidae

Abacarus Keifer, 1944

Abacarus stadelbacheri Petanovic, 1993 (S)

Acalitus Keifer, 1965

Acalitus brevitarsus (Fockeu, 1890) (N, S)

Acalitus phloeocoptis (Nalepa, 1890) (N, S)

Acalitus rudis (G. Canestrini, 1891) (N, S)

Acalitus stenaspis (Nalepa, 1891) (N, S)

Aceria Keifer, 1944

Aceria achilleae (Corti, 1903) (N)

Aceria affinis (Nalepa, 1900) (Si)

Aceria ajugae (Nalepa, 1892) (S)

Aceria alpestris (Nalepa, 1892) (N)

Aceria anthocoptes (Nalepa, 1892) (N)

Aceria anthonomus (Nalepa, 1892) (N)

Aceria artemisiae (G. Canestrini, 1891) (N, Si)

Aceria barroisi Fockeu, 1892 (Si, Sa)

Aceria bartschiae Nalepa, 1907 (N)

Aceria bezzii (Corti, 1903) (N, S)

Aceria bonarotae (G. Canestrini & Massalongo, 1895) (N)

Aceria breviceps (G. Canestrini, 1892) (N, Sa)

Aceria brevipes (Nalepa, 1899) (Si, Sa)

Aceria campestricola (Frauenfeld, 1865) (N, S)

Aceria carlinae (Nalepa, 1905) (Si)

Aceria caulobius (Nalepa, 1900) (S, Sa)

Aceria centaureae (Nalepa, 1891) (N, Si)

Aceria cerreus (Nalepa, 1898) (S)

Aceria chondrillae (G. Canestrini, 1891) (N, Si)

Aceria convolvuli (Nalepa, 1898) (S)

Aceria crassipunctatus (Nalepa, 1909) (S)

Aceria cynarae (Corti, 1905) (N)

Aceria destructor (Nalepa, 1891) (N)

Aceria dispar (Nalepa, 1891) (N, S)

Aceria dolichosoma (G. Canestrini, 1891) (N, S)

Aceria echii (G. Canestrini, 1891) (N)

Aceria effusus (G. Canestrini, 1892) (S)

Aceria erineus (Nalepa, 1891) (N, S, Si)

Aceria eryngii (G. Canestrini, 1892) (N)

Aceria euaspis (Nalepa, 1892) (N)

Aceria eucricotes (Nalepa, 1892) (Si, Sa)

Aceria euphrasiae (Nalepa, 1891) (N)

Aceria ficus (Cotte, 1920) (S, Si, Sa)

Aceria filiformis (Nalepa, 1891) (S)
Aceria fraxinovorans (Nalepa, 1909) (N, S, Si)
Aceria galiobius (G. Canestrini, 1891) (N, S, Si)
Aceria genistae (Nalepa, 1892) (N, S)
Aceria georghioui Keifer, 1959 (N, S)
Aceria geranii (G. Canestrini, 1891) (N, S)
Aceria granati (G. Canestrini & Massalongo, 1893) (S)
Aceria grandis (Nalepa, 1900) (S)
Aceria heimi (Nalepa, 1899) (Si)
Aceria heteronyx (Nalepa, 1891) (N)
Aceria hippophaenus (Nalepa, 1898) (N)
Aceria kernerii (Nalepa, 1894) (S)
Aceria ilicis (G. Canestrini, 1891) (N, S, Si, Sa)
Aceria lateannulatus (Schulze, 1918) (*)
Aceria laticinctus (Nalepa, 1892) (N, S)
Aceria longisetus (Nalepa, 1891) (N, S)
Aceria lycopersici (Wolffenstein, 1879) (N)
Aceria macrochelus (Nalepa, 1891) (N, S)
Aceria macrorhynchus (Nalepa, 1889) (N, S)
Aceria macrotrichus (Nalepa, 1889) (N, S)
Aceria malherbae Nuzzaci, 1985 (S)
Aceria marginemvolvans (Corti, 1910) (N, S)
Aceria massalongoi (G. Canestrini, 1891) (S, Si)
Aceria megacerus (G. Canestrini & Masalongo, 1893) (N)
Aceria medicaginis (Keifer, 1941) (S)
Aceria mentharius (G. Canestrini, 1891) (N)
Aceria monspessulani (Cecconi, 1903) (S, Sa)
Aceria mori (Keifer, 1939) (N)
Aceria nalepai (Fockeu, 1890) (N, S)
Aceria neocynarae (Keifer, 1939) (Si)
Aceria nervisequus (G. Canestrini, 1891) (N, S)
Aceria oleae (Nalepa, 1890) (S, Sa)
Aceria ononidis (G. Canestrini, 1891) (N, S)
Aceria origani (Nalepa, 1891) (S)
Aceria oxalidis (Trotter, 1902) (N, S)
Aceria pampaninii (Nalepa & Cecconi, 1903) (S)
Aceria paradianthi Keifer, 1952 (N)
Aceria peucedani (G. Canestrini, 1891) (N)
Aceria picridis (G. Canestrini & Massalongo, 1893) (N)
Aceria pistaciae (Nalepa, 1899) (Si)
Aceria plicator (Nalepa, 1890) (N, S)
Aceria pseudoplatani (Corti, 1905) (N)
Aceria pyracanthi (G. Canestrini, 1891) (S) (*)
Aceria quercinus (G. Canestrini, 1891) (N, S)
Aceria rhodiolae (G. Canestrini, 1892) (N)
Aceria rosalia (Nalepa, 1891) (N, S)
Aceria rubiae (G. Canestrini, 1897) (S, Si, Sa)
Aceria salicis (Murray, 1877) (Si)

Aceria salicinus (Nalepa, 1911) (S)
Aceria salviae (Nalepa, 1891) (N, S, Si)
Aceria sanguisorbae (G. Canestrini, 1891) (N, S)
Aceria saturejae Boczek & Nuzzaci, 1988 (S)
Aceria sheldoni (Ewing, 1937) (S, Si)
Aceria silvicola (G. Canestrini, 1892) (N)
Aceria solidus (Nalepa, 1892) (N, S)
Aceria sonchi (Nalepa, 1902) (S, Si)
Aceria spartii (G. Canestrini, 1893) (N, S, Si, Sa)
Aceria stefanii (Nalepa, 1898) (S, Si, Sa)
Aceria suberinus (Nalepa, 1899) (S, Si)
Aceria tenellus (Nalepa, 1892) (N)
Aceria tenuis (Nalepa, 1891) (N)
Aceria thomasi (Nalepa, 1889) (N, S)
Aceria tristriatus (Nalepa, 1890) (N, S, Si)
Aceria tulipae (Keifer, 1938) (N)
Aceria unguiculatus (G. Canestrini, 1891) (N)
Aceria varius (Nalepa, 1892) (N)
Aceria vitalbae (G. Canestrini, 1892) (N)

Aculops Keifer, 1966

Aculops aceris (Nalepa, 1894) (N, S)
Aculops allotrichus (Nalepa, 1894) (N)
Aculops gleditsiae (Keifer, 1959) (S)
Aculops lycopersici (Tryon, 1917) (S, Si)
Aculops magnolivora (Keifer, 1939) (S)
Aculops massalongoi (Nalepa, 1925) (N)
Aculops pelekassi (Keifer, 1959) (S, Si)
Aculops rhodendis (Keifer, 1957) (S)
Aculops thymi (Nalepa, 1889) (N)

Aculus Keifer, 1959

Aculus anthobius (Nalepa, 1892) (N, S)
Aculus coronillae (G. Canestrini & Massalongo, 1893) (N)
Aculus epiphyllus (Nalepa, 1892) (N, S)
Aculus eurynotus (Nalepa, 1894) (N)
Aculus fockeui (Nalepa & Trouessart, 1891) (N, S)
Aculus fraxini (Nalepa, 1894) (N, S)
Aculus gemmarum (Nalepa, 1892) (N)
Aculus hippocastani (Fockeu, 1890) (N)
Aculus kochi (Nalepa & Thomas, 1894) (N)
Aculus lactucae (G. Canestrini, 1893) (N) (*)
Aculus leionotus (Nalepa, 1891) (N)
Aculus longifilis (G. Canestrini, 1891) (N)
Aculus minutus (Nalepa, 1890) (S, Si)
Aculus olearius Castagnoli, 1977 (S)

Aculus reticulatus (Nalepa, 1890) (N)
Aculus retiolatus (Nalepa, 1892) (N, S)
Aculus schlechtendali (Nalepa, 1890) (N, S, Si)
Aculus schmardae (Nalepa, 1889) (N, S)
Aculus scutellariae (G. Canestrini & Massalongo, 1895) (N) (*)
Aculus staphyleae (Pantanelli, 1912) (S, Si)
Aculus tetanothrix (Nalepa, 1889) (N, Si)
Aculus teucarii (Nalepa, 1892) (N, S)
Aculus triflorae (Di Stefano, 1966) (S)
Aculus truncatus (Nalepa, 1892) (N, S, Si)
Aculus xylostei (G. Canestrini, 1892) (N)

Anthocoptes Nalepa, 1892

Anthocoptes bakeri Keifer, 1959 (S)
Anthocoptes octocinctus (Nalepa, 1894) (N)
Anthocoptes punctidorsa Keifer, 1943 (N)
Anthocoptes salicis Nalepa, 1894 (S)

Bariella de Lillo, 1988

Bariella farnei de Lillo, 1988 (S)

Calacarus Keifer, 1940

Calacarus trotteri (Scalia, 1911) (S, Si) (*)

Calepitrimerus Keifer, 1938

Calepitrimerus armatus (G. Canestrini, 1891) (N)
Calepitrimerus cerosus Nuzzaci & Vovlas, 1977 (S)
Calepitrimerus epimedi de Lillo, 1994 (S)
Calepitrimerus russoi Di Stefano, 1966 (S)
Calepitrimerus vitis (Nalepa, 1905) (N, S, Si)

Cecidophyes Nalepa, 1889

Cecidophyes galii (Karpelles, 1884) (N, S)
Cecidophyes lauri Nuzzaci & Vovlas, 1977 (S)
Cecidophyes nudus Nalepa, 1891 (N)
Cecidophyes tristernalis (Nalepa, 1898) (S)
Cecidophyes violae (Nalepa, 1902) (N)

Cecidophyopsis Keifer, 1959

Cecidophyopsis atrichus (Nalepa, 1892) (N)
Cecidophyopsis malpighianus (G. Canestrini & Massalongo, 1893) (N, S, Si)
Cecidophyopsis psilapsis (Nalepa, 1893) (N)

Cecidophyopsis vermiformis (Nalepa, 1889) (N, Si)

Colomerus Newkirk & Keifer, 1971

Colomerus vitis (Pagenstecher, 1857) (N, S, Si, Sa)

Coptophylla Keifer, 1944

Coptophylla lamimani (Keifer, 1939) (S)

Coptophylla psilocranus (Nalepa, 1895) (S)

Ditrymacus Keifer, 1960

Ditrymacus athiasella Keifer, 1960 (N, S)

Epitrimerus Nalepa, 1898

Epitrimerus gibbosus (Nalepa, 1892) (N)

Epitrimerus heterogaster (Nalepa, 1891) (N, S, Sa)

Epitrimerus rotai Boczek, 1966 (N)

Epitrimerus trilobus (Nalepa, 1891) (N, S)

Eriophyes Siebold, 1851

Eriophyes arianus (G. Canestrini, 1891) (N) (*)

Eriophyes aroniae (G. Canestrini, 1891) (N) (*)

Eriophyes buxi (G. Canestrini, 1891) (N, S)

Eriophyes canestrinii (Nalepa, 1891) (N, S)

Eriophyes carueli (G. Canestrini, 1892) (N)

Eriophyes cotoneastri (G. Canestrini, 1891) (N)

Eriophyes crataegi (G. Canestrini, 1891) (N)

Eriophyes crinites Nalepa, 1930 (S)

Eriophyes cytisi (G. Canestrini, 1891) (N)

Eriophyes grandipennis (G. Canestrini, 1891) (N)

Eriophyes diversipunctatus (Nalepa, 1890) (N)

Eriophyes laevis (Nalepa, 1889) (N, S)

Eriophyes lauricolus (Nuzzaci & Vovlas, 1977) (S)

Eriophyes leiosoma (Nalepa, 1892) (N, S)

Eriophyes pseudoinsidiosus Wilson, 1965 (S)

Eriophyes pyri (Pagenstecher, 1857) (N, S, Si)

Eriophyes rubicolens (G. Canestrini, 1891) (N)

Eriophyes similis (Nalepa, 1890) (N, S, Si)

Eriophyes sorbi (G. Canestrini, 1891) (N)

Eriophyes tiliae (Pagenstecher, 1857) (N, S)

Eriophyes tingens (Nalepa, 1917) (N)

Eriophyes tricheutes Nalepa, 1930 (S)

Eriophyes viburni (Nalepa, 1889) (N)

Leipothrix Keifer, 1966

Leipothrix moraceus Castagnoli, 1980 (N)

Oxycenus Keifer, 1961

Oxycenus maxwelli (Keifer, 1939) (N, S, Si, Sa)

Paraphytoptus Nalepa, 1896

Paraphytoptus septemscutatus Nalepa, 1900 (Si)

Phyllocoptes Nalepa, 1889

Phyllocoptes abaenus Keifer, 1940 (S)

Phyllocoptes azaleae Nalepa, 1904 (N)

Phyllocoptes carpini Nalepa, 1889 (N)

Phyllocoptes cytisicola (G. Canestrini, 1892) (N) (*)

Phyllocoptes eupadi (Newkirk, 1984) (N, S, Si) (*)

Phyllocoptes genistae G. Canestrini, 1893 (N, S, Si) (*)

Phyllocoptes goniothorax (Nalepa, 1889) (N)

Phyllocoptes graniti Keifer, 1959 (S)

Phyllocoptes malinus (Nalepa, 1892) (S)

Phyllocoptes parvulus (Nalepa, 1892) (N)

Phyllocoptes phytoptoides (Nalepa, 1892) (Si)

Phyllocoptes populi (Nalepa, 1890) (N, S, Si)

Phyllocoptruta Keifer, 1938

Phyllocoptruta oleivora (Ashmead, 1879) (Si)

Platyphytoptus Keifer, 1938

Platyphytoptus pineae Castagnoli, 1973 (S)

Platyphytoptus sabinianae Keifer, 1938 (N, S)

Stenacis Keifer, 1970

Stenacis euonymi (Frauenfeld, 1865) (N, S)

Stenacis palomaris Keifer, 1970 (S)

Stenacis triradiatus (Nalepa, 1892) (N, Si)

Tegolophus Keifer, 1961

Tegolophus califraxini (Keifer, 1938) (N, S)

Tegolophus hassani (Keifer, 1959) (N, S, Sa)

Tegonotus Nalepa, 1891

Tegonotus heptacanthus (Nalepa, 1889) (S)

Note

Aceria lateannulatus: Segnalata per l'Italia senza indicazione di località.

Aceria pyracanthi: Secondo alcuni Autori è probabile sinonimo di *P. goniathorax* (Nalepa, 1889).

Aculus lactucae: Attribuzione generica incerta.

Aculus scutellariae: Attribuzione generica incerta.

Calacarus trotteri: Attribuzione generica incerta.

Eriophyes arianus: Specie valida o sinonimo di *E. pyri* (Pagenstecher, 1857).

Eriophyes aroniae: Specie valida o sinonimo di *E. pyri* (Pagenstecher, 1857).

Phyllocoptes cytisicola: Attribuzione generica incerta.

Phyllocoptes eupadi: Nome nuovo per *Phyllocoptes padi* Nalepa, 1890 nec Schiechtendal, 1882.

Phyllocoptes genistae: Attribuzione generica incerta.

Diptilomiopidae

Diptacus Keifer, 1951

Diptacus camarai Carmona, 1972 (S)

Diptacus gigantorhynchus (Nalepa, 1892) (S, Si)

Diptacus hederiphagus Nuzzaci, 1975 (S)

Diptacus sacramentae (Keifer, 1939) (S)

Quadracus Keifer, 1944

Quadracus urticarius (G. Canestrini & Massalongo, 1893) (N, S)

Rhinophytoptus Liro, 1943

Rhinophytoptus massalongianus (Nalepa, 1893) (N, S)

Rhyncaphytoptus Keifer, 1939

Rhyncaphytoptus ficifoliae Keifer, 1939 (S)

Rhyncaphytoptus gracilipes (Nalepa, 1892) (S)

Tarsocheylidae

Hoplocheylus Atyeo & Baker, 1964

Hoplocheylus atomarius (Berlese, 1913) (S)

Tarsocheylus Berlese, 1904

Tarsocheylus paradoxus Berlese, 1904 (S)

Dolichocybidae

Pavania Lombardini, 1949

Pavania fusiformis Lombardini, 1949 (N)

Pyemotidae

Pegreffia Lombardini, 1953

Pegreffia pegreffii Lombardini, 1953 (Sa) (*)

Pyemotes Amerling, 1861

Pyemotes herfsi (Oudemans, 1936) (S)

Pyemotes scolyti Oudemans, 1936 (S)

Pyemotes ventricosus (Newport, 1850) (N, S, Si, Sa)

Note

Pegreffia: Indicato dall'Autore come appartenente alla famiglia Pyemotidae; non sufficientemente definito.

Pegreffia pegreffii: Specie inquirenda.

Pygmephoridae

Bakerdania Sasa, 1961

Bakerdania cultrata (Berlese, 1904) (N, S)

Bakerdania exigua (Mahunka, 1969) (N, S)

Bakerdania minor (Berlese, 1910) (N)

Bakerdania morrisii (Hill, 1921) (N)

Bakerdania quadrata (Ewing, 1917) (N, S)

Pediculaster Vitzthum, 1931

Pediculaster graminisugus (Hardy, 1851) (S)

Pediculaster manicatus (Berlese, 1904) (S)

Pediculaster mesembrinae (R. Canestrini, 1881) (N, S)

Petalomium Cross, 1965

Petalomium formicarum (Berlese, 1903) (S)

Pseudopygmephorus Cross, 1965

Pseudopygmephorus abdominalis (Berlese, 1904) (N)

Pseudopygmephorus inconpicuus (Berlese, 1904) (N, S)

Pseudopygmephorus stercoricola (Berlese, 1911) (N)

Pygmephorus Kramer, 1877

Pygmephorus romandiolus Sellnick, 1943 (N) (*)

Pygmephorus spinosus Kramer, 1877 (S)

Strephocheir Mahunka, 1983

Strephocheir paolettii Mahunka, 1983 (N)

Note

Pygmephorus romandiolus: Attribuzione generica incerta.

Microdispidae

Brennandania Sasa, 1961

Brennandania silvestre (Jacot, 1936) (N, S)

Cesarodispus Mahunka, 1977

Cesarodispus modestus (Berlese, 1903) (S)

Microdispus Paoli, 1911

Microdispus obovatus (Paoli, 1911) (N, S)

Scutacaridae

Diversipes Berlese, 1903

Diversipes exhamulatus (Michael, 1886) (N, S)

Heterodispus Paoli, 1911

Heterodispus elongatus (Trägårdh, 1904) (N, S)

Heterodispus paolii Mahunka, 1977 (S)

***Imparipes* Berlese, 1903**

Imparipes circinnatus Paoli, 1911 (S)
Imparipes degenerans Berlese, 1904 (N, S, Si)
Imparipes dilatatus Mahunka & Zaki, 1982 (S)
Imparipes haarloevi Karafiat, 1959 (N)
Imparipes histricinus Berlese, 1903 (N, S)
Imparipes intermedius Paoli, 1911 (S)
Imparipes radiatus Paoli, 1911 (S)

***Pygmodispus (Allodispus)* Paoli, 1911**

Pygmodispus (Allodispus) latisternus Paoli, 1911 (N)
Pygmodispus (Allodispus) stefaninii Paoli, 1911 (S)

***Pygmodispus (Pygmodispus)* Paoli, 1911**

Pygmodispus (Pygmodispus) equestris Paoli, 1911 (S)

***Scutacarus* Gros, 1845**

Scutacarus acarorum (Goeze, 1780) (N)
Scutacarus bursula (Berlese, 1903) (S)
Scutacarus carinthiacus Ebermann, 1979 (N, S)
Scutacarus circularis (Berlese, 1903) (S)
Scutacarus claviger (Paoli, 1911) (N, S)
Scutacarus crassisetus (Paoli, 1911) (N, S)
Scutacarus echidna (Berlese, 1905) (N, S)
Scutacarus eucomus (Berlese, 1908) (N, S)
Scutacarus gigliolii (Paoli, 1911) (N, S, Si)
Scutacarus hystrix (Paoli, 1911) (S)
Scutacarus longitarsus (Berlese, 1905) (N, S)
Scutacarus macrochirus (Paoli, 1911) (N)
Scutacarus major (Paoli, 1911) (N)
Scutacarus meszarosi Mahunka, 1977 (N)
Scutacarus montanus (Paoli, 1911) (N, S)
Scutacarus nudus (Berlese, 1886) (N, S)
Scutacarus pannonicus (Willmann, 1951) (N)
Scutacarus parvus (Michael, 1886) (N, S, Si)
Scutacarus pegazzanoae Ebermann, 1986 (S)
Scutacarus plumatus Rack, 1964 (N)
Scutacarus plumosus (Paoli, 1911) (Si)
Scutacarus plurisetus (Paoli, 1911) (N)
Scutacarus pugillator (Paoli, 1911) (N, S)
Scutacarus quadrangularis (Paoli, 1911) (N, S, Si)
Scutacarus rotundus (Berlese, 1903) (S)
Scutacarus silvestri (Berlese, 1903) (S)

Scutacarus spathuliger (Berlese, 1904) (N, S)
Scutacarus spengleri Mahunka, 1974 (Si)
Scutacarus tridentinus (Paoli, 1911) (N)
Scutacarus tyrrhenicus Ebermann, 1986 (S)

Podapolipodidae

Eutarsopolipus Berlese, 1913

Eutarsopolipus lagenaeformis (Berlese, 1911) (S)

Podapolipoides Regenfuss, 1968

Podapolipoides grassii (Berlese, 1887) (S)

Podapolipus Rovelli & Grassi, 1888

Podapolipus reconditus Rovelli & Grassi, 1888 (S, Sa)

Stigmacarus Feldman-Muhsam & Havivi, 1977

Stigmacarus lukoschusi Feldman-Muhsam & Havivi, 1977 (S)

Tarsopolipus Berlese, 1911

Tarsopolipus corrugatus Berlese, 1911 (S)

Tarsopolipus massai Husband, 1989 (Si)

Tarsonemidae

Acarapis Hirst, 1921

Acarapis externus Morgenthaler in Morison, 1931 (*)

Acarapis woodi (Rennie, White & Harwey, 1921) (N, S, Si, Sa)

Daidalotarsonemus De Leon, 1956

Daidalotarsonemus vandeuvriei Suski, 1967 (Si)

Dendroptus Kramer, 1876

Dendroptus buxi (G. Canestrini & Berlese, 1884) (N, S)

Dendroptus kirchneri Kramer, 1876 (N)

Fungitarsonemus Comroy, 1958

Fungitarsonemus monasterii (Lombardini, 1959) (Si)

Hemitarsonemus Ewing, 1939

Hemitarsonemus tepidariorum (Warburton, 1904) (N, S, Si, Sa)

Phytonemus Lindquist, 1986

Phytonemus pallidus (Banks, 1899) (N, S, Si, Sa)

Polyphagotarsonemus Beer & Nucifora, 1965

Polyphagotarsonemus latus (Banks, 1904) (N, S, Si)

Steneotarsonemus Beer, 1954

Steneotarsonemus canestrinii (Massalongo, 1897) (N)

Steneotarsonemus oryzae (Targioni Tozzetti, 1878) (N, S)

Steneotarsonemus spinosus Schaarschmidt, 1959 (Si)

Tarsonemus G. Canestrini & Fanzago, 1876

Tarsonemus aurantii Oudemans, 1927 (S, Si)

Tarsonemus bakeri Ewing, 1939 (Si)

Tarsonemus bilobatus Suski, 1965 (N, Si)

Tarsonemus brevipes Schicher & Leonardi, 1894 (*)

Tarsonemus confusus Ewing, 1939 (N, S)

Tarsonemus crassus (Schaarschmidt, 1959) (S)

Tarsonemus floricolus (G. Canestrini & Fanzago, 1876) (N, S)

Tarsonemus fusarii Cooreman, 1941 (S)

Tarsonemus granarius Lindquist, 1972 (N, S)

Tarsonemus macronychus Schicher & Leonardi, 1894 (*)

Tarsonemus minusculus (G. Canestrini & Fanzago, 1876) (N)

Tarsonemus schlechtendali Suski, 1966 (Si)

Tarsonemus smithi Ewing, 1939 (N, Si)

Tarsonemus stammeri Schaarschmidt, 1959 (Si)

Tarsonemus supinoi Schicher & Leonardi, 1894 (*)

Tarsonemus unguis Ewing, 1939 (Si)

Tarsonemus waitei Banks, 1912 (S, Si)

Note

Acarapis externus: Segnalato per l'Italia senza indicazione di località.

Tarsonemus brevipes: Segnalato per l'Italia senza indicazione di località.

Tarsonemus macronychus: Segnalato per l'Italia senza indicazione di località; non riportato in Lindquist (1986).

Tarsonemus supinoi: Segnalato per l'Italia senza indicazione di località; non riportato in Lindquist (1986).

Oribatida

Acaronychidae

Acaronychus Grandjean, 1932

Acaronychus traegardhi Grandjean, 1932 (S)

Ctenacaridae

Ctenacarus Grandjean, 1939

Ctenacarus araneola (Grandjean, 1932) (S, Si, Sa)

Aphelacaridae

Aphelacarus Grandjean, 1932

Aphelacarus acarinus (Berlese, 1910) (S, Si, Sa)

Hypochthoniidae

***Eohypochthonius* (*Eohypochthonius*)** Jacot, 1938

Eohypochthonius (*Eohypochthonius*) *cf. parvus* (Aoki, 1977) (N)

Hypochthonius C.L. Koch, 1835

Hypochthonius luteus Oudemans, 1917 (N, S, Si)

Hypochthonius rufulus C.L. Koch, 1835 (N, S, Si)

Eniochthoniidae

Eniochthonius Grandjean, 1933

Eniochthonius minutissimus (Berlese, 1903) (N, S, Si)

Mesoplophoridae

Mesoplophora Berlese, 1904

Mesoplophora michaeliana Berlese, 1904 (S)
Mesoplophora pulchra Sellnick, 1928 (*)

Note

Mesoplophora pulchra: Non è specificata l'esatta località di raccolta.

Cosmochthoniidae

Cosmochthonius Berlese, 1910

Cosmochthonius lanatus (Michael, 1885) (S, Si, Sa)
Cosmochthonius plumatus Berlese, 1910 (S, Si)
Cosmochthonius reticulatus Grandjean, 1947 (S, Si, Sa)

Heterochthonius Berlese, 1910

Heterochthonius gibbus (Berlese, 1910) (N, S)

Phyllozetes Gordeeva, 1978

Phyllozetes emmae (Berlese, 1910) (N, S, Si, Sa)

Haplochthoniidae

Haplochthonius Willmann, 1930

Haplochthonius sanctaeluciae Bernini, 1973 (S, Si, Sa)
Haplochthonius simplex Willmann, 1930 (S, Si)

Sphaerochthoniidae

Sphaerochthonius Berlese, 1910

Sphaerochthonius splendidus (Berlese, 1904) (N, S, Si, Sa)

Protoplophoridae

Bursoplophora Subias & Pérez-Iñigo, 1978

Bursoplophora meridionalis Bernini, 1983 (Si) (E)
Bursoplophora tyrrhenica Bernini, 1983 (S, Si, Sa)

Protoplophora Berlese, 1910

Protoplophora oglasticola Bernini, 1983 (S) (E)

Protoplophora palpalis Berlese, 1910 (Si, Sa)

Prototritia (Siciliophora) Bernini, 1983

Prototritia (Siciliophora) sicula Bernini, 1983 (Si) (E)

Pediculochelidae

Paralycus Womersley, 1944

Paralycus pyrigerus (Berlese, 1905) (S)

Brachychthoniidae

Brachychthonius Berlese, 1910

Brachychthonius berlesei Willmann, 1928 (N, S)

Brachychthonius bimaculatus Willmann, 1936 (N, S)

Brachychthonius impressus Moritz, 1976 (S, Si)

Brachychthonius pius Moritz, 1976 (S, Si)

Brachychthonius sp. (S) (*)

Eobrachychthonius Jacot, 1936

Eobrachychthonius borealis Forsslund, 1942 (Si)

Eobrachychthonius latior (Berlese, 1910) (N, S, Sa)

Eobrachychthonius oudemansi Van der Hammen, 1952 (N)

Liochthonius Van der Hammen, 1959

Liochthonius brevis (Michael, 1888) (N, S, Si, Sa)

Liochthonius expolitus (Berlese, 1910) (Si) (*)

Liochthonius horridus (Sellnick, 1928) (S)

Liochthonius hystricinus (Forsslund, 1942) (S)

Liochthonius lapponicus (Trägårdh, 1910) (S)

Liochthonius laetepictus (Berlese, 1910) (S)

Liochthonius leptaleus Moritz, 1976 (S)

Liochthonius muscorum Forsslund, 1964 (S)

Liochthonius neglectus Moritz, 1976 (Si)

Liochthonius sellnicki (Thor, 1930) (N, S)

Liochthonius strenzkei Forsslund, 1963 (N, S?, Si?)

Liochthonius tyrrhenicus Bernini, 1985 (S, Si)

Neobrachychthonius Moritz, 1976

Neobrachychthonius marginatus (Forsslund, 1942)

Neobrachychthonius marginatus magnus Moritz, 1976 (S)

Poecilochthonius Balogh, 1943

Poecilochthonius italicus (Berlese, 1910) (N, S, Si, Sa)

Poecilochthonius spiciger (Berlese, 1910) (N, S)

Sellnickochthonius Krivolutsky, 1964

Sellnickochthonius cricoides (Weis-Fogh, 1948) (N, S)

Sellnickochthonius hungaricus (Balogh, 1943) (N, S, Sa)

Sellnickochthonius immaculatus (Forsslund, 1942) (N, S, Si, Sa)

Sellnickochthonius meridionalis (Bernini, 1973) (N, S, Si, Sa)

Sellnickochthonius rostratus (Jacot, 1936) (N, S)

Sellnickochthonius suecicus (Forsslund, 1942) (N, S)

Sellnickochthonius zelawaiensis (Sellnick, 1928) (S)

Synchthonius Van der Hammen, 1952

Synchthonius crenulatus (Jacot, 1938) (N, S)

Synchthonius elegans Forsslund, 1957 (S, Sa)

Note

Brachychthonius sp.: Specie inedita nota per il Massiccio del Pollino.

Eobrachychthonius: Vedi anche introduzione, pag. 6.

Liochthonius expolitus: Specie inquirenda.

Atopochthoniidae

Atopochthonius Grandjean, 1948

Atopochthonius artiodactylus Grandjean, 1948 (S)

Pterochthoniidae

Pterochthonius Berlese, 1913

Pterochthonius angelus (Berlese, 1910) (S)

Parhypochthoniidae

Parhypochthonius Berlese, 1904

Parhypochthonius aphidinus Berlese, 1904 (N, S)

Phthiracaridae

Phthiracarus Perty, 1841

Phthiracarus cf. affinis (Hull, 1914) (N, S)
Phthiracarus anonymus Grandjean, 1933 (N, S)
Phthiracarus baloghi Feider & Suciu, 1957 (N)
Phthiracarus clavatus Parry, 1979 (S, Si)
Phthiracarus crenophilus Willmann, 1951 (N) (*)
Phthiracarus crinitus (C.L. Koch, 1841) (N)
Phthiracarus curtulus Berlese, 1923 (S)
Phthiracarus ferrugineus (C.L. Koch, 1841) (N)
Phthiracarus globosus (C.L. Koch, 1841) (N, S, Si, Sa)
Phthiracarus italicus (Oudemans, 1900) (N, S)
Phthiracarus laevigatus (C.L. Koch, 1844) (N, S, Si)
Phthiracarus lentulus (C.L. Koch, 1841) (N, Si)
Phthiracarus membranifer Parry, 1979 (S)
Phthiracarus nitens (Nicolet, 1855) (N, S)
Phthiracarus peristomaticus Willmann, 1948 (N, Si)
Phthiracarus piger (Scopoli, 1763) (N)
Phthiracarus rotundus Berlese, 1923 (N, S)
Phthiracarus testudineus (C.L. Koch, 1841) (N)
Phthiracarus tristis Mahunka & Paoletti, 1984 (N)

Note

Phthiracarus crenophilus: Raccolta una prima volta in una grotta del Savonese e una seconda in ambiente epigeo.

Steganacaridae

Atropacarus (Atropacarus) Ewing, 1917

Atropacarus (Atropacarus) clavigerus (Berlese, 1904) (N, S, Si)
Atropacarus (Atropacarus) phyllophorus (Berlese, 1904) (N, S)
Atropacarus (Atropacarus) cf. serratus (Feider & Suciu, 1957) (S) (*)
Atropacarus (Atropacarus) striculus (C.L. Koch, 1835) (N, S)
Atropacarus (Atropacarus) sp. (S) (*)

Austrophthiracarus Balogh & Mahunka, 1978

Austrophthiracarus pavidus (Berlese, 1913) (N, S, Si)

Austrophthiracarus sp. (S, Sa) (*)

Helvetacarus Mahunka, 1993

Helvetacarus mirabilis (Mahunka, 1979) (Si)

Steganacarus (Rhacaplacarus) Niedbala, 1986

Steganacarus (Rhacaplacarus) ortizi Pérez-Iñigo, 1969 (N, S)

Steganacarus (Steganacarus) Ewing, 1917

Steganacarus (Steganacarus) applicatus (Sellnick, 1920) (N, S)

Steganacarus (Steganacarus) carusoi Bernini & Avanzati, 1989 (S, Si, Sa) (*)

Steganacarus (Steganacarus) donatoi Avanzati, Baratti & Bernini, 1994 (N, S)

Steganacarus (Steganacarus) hirsutus Pérez-Iñigo, 1974 (S)

Steganacarus (Steganacarus) magnus (Nicolet, 1855) (N, S, Si, Sa)

Steganacarus (Steganacarus) manganellii Avanzati, Baratti & Bernini, 1994 (N, S)

Steganacarus (Steganacarus) michaeli Bernini & Avanzati, 1987 (Sa)

Steganacarus (Steganacarus) simonettae Bernini & Avanzati, 1987 (S, Si) (E)

Steganacarus (Steganacarus) travei Lions, 1968 (S)

Steganacarus (Tropacarus) Ewing, 1917

Steganacarus (Tropacarus) brevipilus (Berlese, 1923) (N, S, Si, Sa)

Steganacarus (Tropacarus) carinatus (C.L. Koch, 1841) (N, S, Si)

Steganacarus (Tropacarus) malatestai Avanzati, Baratti & Bernini, 1994 (S) (E) (*)

Steganacarus (Tropacarus) pseudocarinatus Bernini & Avanzati, 1989 (N, S, Sa)

Note

Atropacarus (Atropacarus) cf. serratus: Nel Catalogo Berlese (Castagnoli & Pegazzano, 1985) è data per "specie in pectore"; tuttavia, questo nome compare nella Fauna cavernicola del Savonese (M.E. Franciscolo, 1955. Ann. civ. Mus. St. nat., Genova, 68:1-223) per una specie determinata dal Lombardini, che aveva avuto modo di esaminare i materiali della Collezione Berlese. L'esame recente degli esemplari di Berlese (W. Niedbala, 1994. Bull. Soc. Amis Sci. Lettr. Poznan, ser. D., sc. biol., 30: 37-62) ha permesso di formulare la sinonimia proposta e di eliminare il nome nudo introdotto da Lombardini.

Atropacarus (Atropacarus) sp.: Specie inedita nota per il massiccio del Pollino.

Austrophthiracarus sp.: Nuova specie raccolta a Montecristo e sulle piccole isole a nord-est della Sardegna, la cui descrizione è attualmente in stampa.

Steganacarus (Steganacarus) carusoi: Distribuita prevalentemente nel Mediterraneo occidentale, in Italia risulta presente in Sardegna, in alcune isole dell'Arcipelago Toscano e a Pantelleria.

Steganacarus (Tropacarus) malatestai: Raccolta finora solo nella tenuta del Presidente della Repubblica a Castelporziano.

Oribotritiidae

Indotritia Jacot, 1929

Indotritia zangherii Mahunka & Paoletti, 1984 (N)

Mesotritia Forsslund, 1963

Mesotritia nuda (Berlese, 1887) (N, S)

Oribotritia Jacot, 1924

Oribotritia berlesei (Michael, 1898) (N, S, Si)

Oribotritia hermanni Grandjean, 1967 (N, S)

Oribotritia storkani Feider & Suciu, 1957 (S)

Paratritia Moritz, 1966

Paratritia baloghi Moritz, 1966 (S)

Euphthiracaridae

Euphthiracarus Ewing, 1917

Euphthiracarus cribrarius (Berlese, 1904) (N, S)

Euphthiracarus monodactylus (Willmann, 1919) (N, S)

Euphthiracarus reticulatus (Berlese, 1913) (N)

Microtritia Märkel, 1964

Microtritia minima (Berlese, 1904) (N, S)

Rhysotritia Märkel & Meyer, 1959

Rhysotritia ardua (C.L. Koch, 1841) (N, S, Si, Sa) (*)

Rhysotritia duplicata (Grandjean, 1953) (N, S, Si)

Note

Rhysotritia ardua: Una recente revisione rivaluta questo sinonimo a sottospecie.

Lohmanniidae

Cryptacarus Grandjean, 1950

Cryptacarus promecus Grandjean, 1950 (Si)

Lohmannia Michael, 1898

Lohmannia cf. hungarorum Mahunka, 1980 (S, Si) (*)

Lohmannia sp. (Sa) (*)

Mixacarus Balogh, 1958

Mixacarus murcioides (Berlese, 1896) (S)

Papillacarus Kunst, 1959

Papillacarus aciculatus (Berlese, 1904) (S, Si, Sa)

Thamnacarus Grandjean, 1950

Thamnacarus sp. (S) (*)

Note

Lohmannia cf. hungarorum: Nuova specie, raccolta nell'Arcipelago Toscano e a Lampedusa, il cui studio apparirà nell'ambito di un lavoro di revisione delle specie della famiglia, attualmente in preparazione.

Lohmannia sp.: Specie probabilmente nuova, raccolta a Tavolara, che sarà descritta in un lavoro di revisione delle specie italiane della famiglia.

Thamnacarus sp.: Nuova specie la cui descrizione verrà pubblicata in un lavoro di revisione della famiglia, attualmente in fase di avanzata preparazione.

Eulohmanniidae

Eulohmannia Berlese, 1910

Eulohmannia ribagai (Berlese, 1910) (N, S)

Perlohmanniidae

Perlohmannia Berlese, 1916

Perlohmannia nasuta Schuster, 1960 (N, S)

Epilohmanniidae

Epilohmannia (Epilohmannia) Berlese, 1910

Epilohmannia (Epilohmannia) cylindrica (Berlese, 1904)
Epilohmannia (Epilohmannia) cylindrica cylindrica (Berlese, 1904) (N, S, Si, Sa)
Epilohmannia (Epilohmannia) cylindrica minima Schuster, 1960 (S, Si)
Epilohmannia (Epilohmannia) heterotricha Mahunka, 1966 (N)
Epilohmannia (Epilohmannia) styriaca Schuster, 1960 (N)

Epilohmannia (Sinolohmannia) Balogh & Mahunka, 1979

Epilohmannia (Sinolohmannia) gigantea Berlese, 1906 (S)

Nothridae

Nothrus C.L. Koch, 1835

Nothrus anauniensis G. Canestrini & Fanzago, 1876 (N, S, Si, Sa)
Nothrus biciliatus C.L. Koch, 1841 (N)
Nothrus borussicus Sellnick, 1928 (N, S)
Nothrus longipilus (Berlese, 1910) (S)
Nothrus palustris C.L. Koch, 1839 (N, S)
Nothrus pratensis Sellnick, 1928 (N)
Nothrus pulchellus (Berlese, 1910) (S, Si?)
Nothrus silvestris Nicolet, 1855 (N, S)

Camisiidae

Camisia von Heyden, 1826

Camisia biurus (C.L. Koch, 1839) (N, S)
Camisia biverrucata (C.L. Koch, 1839) (N, S, Si)
Camisia horrida (Hermann, 1804) (N, S, Si, Sa)
Camisia invenusta (Michael, 1888) (S)
Camisia segnis (Hermann, 1804) (N, S)
Camisia solhoeyi Colloff, 1993 (S)
Camisia spinifer (C.L. Koch, 1835) (N, S, Si)
Camisia superba (Berlese, 1910) (Si) (*)

Heminothrus (Capillonothis) Kunst, 1971

Heminothrus (Capillonothis) capillatus (Berlese, 1914) (N, S)
Heminothrus (Capillonothis) thori (Berlese, 1904) (N, S)

Heminothrus (Heminothrus) Berlese, 1913

Heminothrus (Heminothrus) paolitanus (Berlese, 1913) (N)
Heminothrus (Heminothrus) targionii (Berlese, 1885) (N, S)

Heminothrus (Platynothrus) Berlese, 1913

Heminothrus (Platynothrus) peltifer (C.L. Koch, 1839) (N, S, Si)

Note

Camisia: Vedi anche introduzione, pag. 6.

Camisia superba: Specie inquirenda.

Trhypochthoniidae

Trhypochthoniellus Willmann, 1928

Trhypochthoniellus badius (Berlese, 1905) (N, S)

Trhypochthoniellus longisetus (Berlese, 1904) (N, S) (*)

Trhypochthonius Berlese, 1904

Trhypochthonius tectorum (Berlese, 1896) (N, S, Sa)

Trhypochthonius sp. (Si) (*)

Note

Trhypochthoniellus longisetus: Specie probabilmente introdotta attraverso l'importazione di piante esotiche.

Trhypochthonius sp.: Specie indeterminata raccolta a Pantelleria.

Malaconothridae

Malaconothrus Berlese, 1904

Malaconothrus egregius Berlese, 1904 (N, S, Si, Sa)

Malaconothrus monodactylus (Michael, 1888) (N)

Malaconothrus processus Van der Hammen, 1952 (N)

Trimalaconothrus Berlese, 1916

Trimalaconothrus buresi Kunst, 1959 (S)

Trimalaconothrus indusiatus Berlese, 1916 (S)

Trimalaconothrus optatus (Berlese, 1908) (S)

Trimalaconothrus tardus (Michael, 1888) (N, S, Sa?)

Nanhermanniidae

Nanhermannia Berlese, 1913

Nanhermannia areolata Strenzke, 1953 sensu Mahunka, 1966 (N)
Nanhermannia comitalis Berlese, 1916 (*)
Nanhermannia elegantula Berlese, 1913 (N)
Nanhermannia nana (Nicolet, 1855) (N, S, Si)
Nanhermannia pectinata Strenzke, 1953 (N)

***Masthermannia* Berlese, 1913**

Masthermannia mammillaris (Berlese, 1904) (S)

Note

Nanhermannia comitalis: Questa specie descritta per la Francia fu citata per il territorio italiano senza precisare la località; questa citazione pertanto attende conferma.

Hermanniidae

***Hermannia* Nicolet, 1855**

Hermannia convexa (C.L. Koch, 1839) (*)
Hermannia gibba (C.L. Koch, 1839) (N, S)
Hermannia grandis Berlese, 1910 (S) (*)
Hermannia scabra (L. Koch, 1879) (N)
Hermannia sp. (S) (*)

Note

Hermannia convexa: Non è specificata l'esatta località di raccolta e la stessa citazione abbastanza vecchia attende una conferma.

Hermannia grandis: Specie inquirenda. Infatti, sotto il nome di *Hermannia grandis* Berlese, 1910, nella Collezione Berlese è presente una ninfa molto danneggiata e non studiabile, che Van der Hammen (1959, Zool. Verh., 40: 1-93) giudica vicina a *H. convexa*. Tuttavia, fino al momento in cui non verrà effettuata una completa revisione del genere non è possibile pronunciarsi definitivamente sull'identità di questa specie.

Hermannia sp.: Specie inedita raccolta su molti rilievi appenninici centro-settentrionali.

Hermanniellidae

***Hermanniella* Berlese, 1908**

Hermanniella dolosa Grandjean, 1931 (N, S, Si, Sa)
Hermanniella granulata (Nicolet, 1855) (N, S)
Hermanniella picea (C.L. Koch, 1839) (N, S, Si)
Hermanniella septentrionalis Berlese, 1910 (N)
Hermanniella sp. (S) (*)

Note

Hermanniella sp.: Specie inedita nota per il Massiccio del Pollino.

Liodidae

Liodes von Heyden, 1826

Liodes ionicus (Sellnick, 1931) (Sa)

Liodes theleproctus (Hermann, 1804) (N, S, Si)

Poroliodes Grandjean, 1934

Poroliodes farinosus (C.L. Koch, 1839) (N, S, Si)

Platyliones Berlese, 1917

Platyliones doderleini (Berlese, 1883) (N, S, Si)

Platyliones scaliger (C.L. Koch, 1839) (N, S, Si, Sa)

Platyliones sp. (S) (*)

Note

Platyliones sp.: Specie inedita nota per il Massiccio del Pollino.

Gymnodamaeidae

Arthrodamaeus Grandjean, 1954

Arthrodamaeus femoratus (C.L. Koch, 1839) (N, S, Si, Sa)

Arthrodamaeus italicus (Berlese, 1916) (S)

Arthrodamaeus pusillus (Berlese, 1910) (N)

Arthrodamaeus reticulatus (Berlese, 1910) (N, S, Si, Sa)

Arthrodamaeus sculus (Berlese, 1910) (Si)

Gymnodamaeus Kulczynski, 1902

Gymnodamaeus bicostatus (C.L. Koch, 1835) (N, S, Si)

Gymnodamaeus cf. *quadrisseta* Ruiz, Kahwash & Subias, 1990 (Si)

Gymnodamaeus sp. (S) (*)

Plesiodamaeus Grandjean, 1954

Plesiodamaeus craterifer (Haller, 1884) (N, S)

Note

Gymnodamaeus sp.: Specie inedita nota per il massiccio del Pollino. È incerta anche l'attribuzione generica.

Aleurodamaeidae

Aleurodamaeus Grandjean, 1954

Aleurodamaeus setosus (Berlese, 1882) (S, Si, Sa)

Plateremaeidae

Lopheremaeus Paschoal, 1988

Lopheremaeus laminipes (Berlese, 1916) (N, S, Si)

Pheroliodidae

Licnoliodes Grandjean, 1931

Licnoliodes cf. *adminensis* Grandjean, 1933 (Si, Sa)

Licnoliodes andrei Grandjean, 1931 (S, Sa?)

Licnodamaeidae

Licnodamaeus Grandjean, 1931

Licnodamaeus baccettii Bernini, 1972 (S, Sa)

Licnodamaeus costula Grandjean, 1931 (Si, Sa)

Licnodamaeus pulcherrimus (Paoli, 1908) (N, S, Si, Sa)

Licnodamaeus tuberculatus (Paoli, 1908) (S) (*)

Licnodamaeus undulatus (Paoli, 1908) (N, S, Si, Sa)

Note

Licnodamaeus tuberculatus: Specie inquirenda.

Licnobelbidae

Licnobelba Grandjean, 1931

Licnobelba caesarea (Berlese, 1910) (N, S, Si, Sa)

Licnobelba latiflabellata (Paoli, 1908) (N, S, Si, Sa)

Damaeidae

Belba von Heyden, 1826

Belba bartosi Winkler, 1955 (N, S)
Belba compta (Kulczynski, 1902) (N)
Belba globipes G. Canestrini & Berlese, 1884 (N)
Belba cf. meridionalis Bulanova-Zachvatkina, 1962 (Si)
Belba patelloides (Michael, 1890) (S, Si, Sa)
Belba cf. sculpta Mihelcic, 1957 (S)
Belba sp. (N, S, Si) (*)
Belba sp. (Si) (*)

***Damaeus* (*Adamaeus*)** Norton, 1977

Damaeus (*Adamaeus*) *onustus* (C.L. Koch, 1841) (N, S, Si)

***Damaeus* (*Damaeus*)** C.L. Koch, 1835

Damaeus (*Damaeus*) *auritus* C.L. Koch, 1835 (N, S)
Damaeus (*Damaeus*) *crispatus* (Kulczynski, 1902) (N, S)
Damaeus (*Damaeus*) *flagellifer* Michael, 1890 (S, Si, Sa)
Damaeus (*Damaeus*) *gracilipes* (Kulczynski, 1902) (N, S)
Damaeus (*Damaeus*) *cf. recasensi* Capilla, 1971 (S)
Damaeus (*Damaeus*) *riparius* Nicolet, 1855 (N, S)
Damaeus (*Damaeus*) *sp.* (S) (*)

***Damaeus* (*Paradamaeus*)** Bulanova-Zachvatkina, 1967

Damaeus (*Paradamaeus*) *clavipes* (Hermann, 1804) (N, S, Si)

***Damaeus* (*Spatiodamaeus*)** Bulanova-Zachvatkina, 1967

Damaeus (*Spatiodamaeus*) *tecticola* (Michael, 1888) (N, S)
Damaeus (*Spatiodamaeus*) *verticillipes* (Nicolet, 1855) (N)

Epidamaeus Bulanova-Zachvatkina, 1957

Epidamaeus berlesei (Michael, 1898) (N, S)

Hungarobelba Balogh, 1943

Hungarobelba visnyai (Balogh, 1938) (S)

Metabelba Grandjean, 1936

Metabelba italica (Sellnick, 1931) (N)
Metabelba papillipes (Nicolet, 1855) (N)
Metabelba parapulverosa Moritz, 1966 (S)
Metabelba platynota Grandjean, 1954 (S)
Metabelba propexa (Kulczynski, 1902) (N)
Metabelba propinqua (Sellnick, 1943) (N)
Metabelba pulverulenta (C.L. Koch, 1839) (N, S)
Metabelba romandiola (Sellnick, 1943) (N, S, Si)
Metabelba sp. (S) (*)

Metabelbella Bulanova-Zachvatkina, 1957

Metabelbella interlamellaris Pérez-Iñigo, 1987 (S, Si, Sa)

Neobelba Bulanova-Zachvatkina, 1967

Neobelba cf. *pseudopapillipes* Bulanova-Zachvatkina, 1967 (N)

Nortonbelba Bernini, 1980

Nortonbelba italica Bernini, 1980 (N, S)

Porobelba Grandjean, 1936

Porobelba spinosa (Sellnick, 1920) (N, S, Si, Sa)

Subbelba Bulanova-Zachvatkina, 1967

Subbelba sp. (Si) (*)

Note

Belba: Vedi anche introduzione, pag. 6.

Belba sp.: Nuova specie in corso di descrizione nell'ambito di una revisione del gruppo di specie in Italia; è diffusa su tutta la dorsale appenninica dalla Liguria alle estreme regioni meridionali.

Belba sp.: Nuova specie che, come la precedente, è in corso di descrizione nell'ambito della revisione delle specie del gruppo corynopus; risulta endemica delle catene settentrionali della Sicilia.

Damaeus (*Adamaeus*): Vedi anche introduzione, pag. 6.

Damaeus (*Damaeus*) sp.: Specie inedita nota per il massiccio del Pollino.

Metabelba sp.: Specie inedita nota per il massiccio del Pollino.

Subbelba sp.: Specie indeterminata raccolta sui rilievi settentrionali della Sicilia.

Polypterozetidae

Polypterozetes Berlese, 1916

Polypterozetes cherubin Berlese, 1916 (N, S)

Niphocephidae

Niphocephus Balogh, 1943

Niphocephus nivalis (Schweizer, 1922)

Niphocephus nivalis cf. *baloghi* Travé, 1959 (S)

Cepheidae

Cepheus C.L. Koch, 1835

Cepheus cepheiformis (Nicolet, 1855) (N, S)

Cepheus dentatus (Michael, 1888) (N, S)

Cepheus latus C.L. Koch, 1835 (N, S)

Cepheus pegazzanoae Bernini & Nannelli, 1982 (N, S, Si, Sa)

Cepheus tuberculosus Strenzke, 1951 (S, Sa)

Cepheus verrucosus Bernini, 1971 (N, S)

Conoppia Berlese, 1908

Conoppia palmicincta (Michael, 1880) (N, S)

Eupterotegaeus Berlese, 1916

Eupterotegaeus ornatissimus (Berlese, 1908) (N, S, Si, Sa)

Ommatocephus Berlese, 1913

Ommatocephus ocellatus (Michael, 1882) (S, Si)

Ommatocephus pulcherrimus Berlese, 1913 (N, S)

Protocephus Jacot, 1928

Protocephus hericius (Michael, 1887) (N)

Tritegeus Berlese, 1913

Tritegeus bisulcatus Grandjean, 1953 (N, S)

Tritegeus sculptus S. Bernini & F. Bernini, 1991 (Si, Sa)

Microzetidae

Berlesezetes Mahunka, 1980

Berlesezetes auxiliaris (Grandjean, 1936) (Sa)
Berlesezetes ornatissimus (Berlese, 1913) (N) (*)

Microzetes Berlese, 1913

Microzetes adansoni (Lions, 1966) (Sa)
Microzetes castrii (Mahunka, 1966) (N)
Microzetes mirandus (Berlese, 1908) (N)
Microzetes cf. petrocoriensis (Grandjean, 1936) (S)
Microzetes cf. pyrenaicus (Travé, 1956) (Sa)

Miracarus Kunst, 1959

Miracarus discrepans Mahunka, 1966 (N, Si)
Miracarus senensis Bernini, 1975 (S, Sa) (*)

Note

Berlesezetes ornatissimus: Specie esotica raccolta nei nidi di *Arvicola arvalis* vicino a Ferrara; si tratta, quindi, di un caso di introduzione passiva oppure di un lapsus calami dell'Autore nella scrittura dell'etichetta. È anche possibile, tuttavia, che lo studio dell'esemplare in Coll. Berlese consenta la sua attribuzione all'altra specie del genere nota in Italia.

Miracarus senensis: Specie localizzata nella Toscana meridionale e nell'arcipelago di Tavolara.

Amerobelbidae

Amerobelba Berlese, 1908

Amerobelba decedens Berlese, 1908 (N, S, Sa)

Berndamerus Mahunka, 1977

Berndamerus bicostatus (Berlese, 1910) (S)

Hellenamerus Mahunka, 1974

Hellenamerus ionicus Mahunka, 1974 (S, Si)

Mongaillardia Grandjean, 1961

Mongaillardia aeoliana (Bernini, 1979) (Si, Sa)

Rastellobata Grandjean, 1961

Rastellobata rastelligera (Berlese, 1908) (N, S, Sa)

Ctenobelbidae

Ctenobelba Balogh, 1943

Ctenobelba bicarinata (Berlese, 1910) (S) (*)

Ctenobelba eremuloides (Berlese, 1910) (S) (*)

Ctenobelba foliata Hammer, 1961 (S)

Ctenobelba cf. manherti Mahunka, 1974 (S)

Ctenobelba marcuzzii Mahunka, 1974 (N)

Ctenobelba pectinigera (Berlese, 1910) (N, S, Si)

Ctenobelba serrata Mahunka, 1964 (N, Si?, Sa?)

Note

Ctenobelba bicarinata: Specie la cui identità è da accertare, anche se recentemente è stata posta in sinonimia con *Ctenobelba pectinigera* Berlese, 1910. Il genere, in Italia, è ancora da rivedere sistematicamente.

Ctenobelba eremuloides: Specie di cui è stato perduto l'holotypus. Una recentissima ridescrizione della specie, che ha portato al suo trasferimento nel genere *Berndamerus*, è stata effettuata sulla base di alcuni esemplari, erroneamente supposti topotipici, raccolti nel Giardino di Boboli (Firenze). In realtà, il locus typicus è Filettino (M.ti Simbruini). Per questo motivo, l'identità di questa specie, così come la sua posizione generica, sono da ritenere ancora incerte.

Eremulidae

Eremulus Berlese, 1908

Eremulus flagellifer Berlese, 1908 (N, S, Si)

Eremulus modestus Berlese, 1908 (S) (*)

Eremulus sp. (S) (*)

Note

Eremulus: Vedi anche introduzione, pag. 6.

Eremulus modestus: Specie mai più ricordata dal momento della sua descrizione per l'Italia e il Nordamerica. È, comunque, una buona specie; rimangono da chiarire la sua esatta identità e la distribuzione geografica.

Eremulus sp.: Nella Collezione Berlese esiste un esemplare attribuito ad *Eremaeus modestus* Banks, 1904 (= *Eporibatula modesta*) e proveniente dal terriccio sotterraneo del Giardino del Giappone come annesso alla Stazione di Entomologia Agraria di Firenze. Esso in realtà contiene una specie di *Eremulus*, la cui identità rimane da chiarire, ma che sembra,

comunque, diversa da quella delle specie precedenti.

Damaeolidae

Damaeolus Paoli, 1908

Damaeolus asperatus (Berlese, 1904) (N, S, Si, Sa)

Damaeolus bregetovae Csiszár, 1962 (N, S, Si, Sa)

Damaeolus ornatissimus Csiszár, 1962 (N)

Fosseremus Grandjean, 1954

Fosseremus laciniatus (Berlese, 1905) (N, S, Si, Sa)

Eremobelbidae

Eremobelba Berlese, 1908

Eremobelba geographica Berlese, 1908 (N, S)

Ameridae

Amerus Berlese, 1896

Amerus laticephalus Berlese, 1914 (N) (E) (*)

Amerus troisi (Berlese, 1883) (N, S)

Amerus sp. (N, S, Si) (*)

Note

Amerus laticephalus: Specie estremamente rara e localizzata nel versante meridionale delle Alpi Centrali.

Amerus sp.: Nuova specie in corso di descrizione nell'ambito della revisione del genere in Italia; presenta una distribuzione geografica molto vasta, estesa al Mediterraneo occidentale e alla Macaronesia.

Eremaeidae

Eremaeus C.L. Koch, 1835

Eremaeus cordiformis Grandjean, 1943 (N, S)

Eremaeus hepaticus C.L. Koch, 1835 (N, S, Si)

Eueremaeus Mihelcic, 1963

Eueremaeus cf. areolatus (Kunst, 1959) (N)
Eueremaeus fossulatus (Kunst, 1959) (Si)
Eueremaeus cf. granulatus (Mihelcic, 1955) (Sa)
Eueremaeus oblongus (C.L. Koch, 1835) (N, S, Si, Sa) (*)
Eueremaeus silvestris (Forsslund, 1957) (N, S)
Eueremaeus valkanovi (Kunst, 1957) (N, Si?)

***Tricheremaeus* Berlese, 1908**

Tricheremaeus conspicuus Berlese, 1916 (S)
Tricheremaeus grandjeani Bernini, 1970 (S)
Tricheremaeus serratus (Michael, 1885) (N)

Note

Eremaeus: Vedi anche introduzione, pag. 6.

Eueremaeus oblongus: Nella Collezione Berlese, oltre ai preparati etichettati correttamente come *oblongus* C.L. Koch, ne compaiono anche sotto il nome di *obtusus* C.L. Koch. Questo nome, mai usato in letteratura, è evidentemente da attribuire ad un lapsus calami.

Zetorchestidae

***Microzetorchestes* Balogh, 1943**

Microzetorchestes emeryi (Coggi, 1898) (N, S, Si, Sa)

***Zetorchestes* Berlese, 1888**

Zetorchestes falzonii Coggi, 1898 (N, S, Sa)
Zetorchestes flabrarius Grandjean, 1951 (N)
Zetorchestes grandjeani Krisper, 1987 (S, Si, Sa)
Zetorchestes micronychus (Berlese, 1883) (N, S, Sa) (*)

Note

Zetorchestes: Vedi anche introduzione, pag. 6.

Zetorchestes micronychus: Specie classica assai citata, ma la cui identità è da accertare.

Tenuialidae

***Hafenrefferia* Oudemans, 1906**

Hafenrefferia gilvipes (C.L. Koch, 1839) (N, S)

***Hafenferrefia* Jacot, 1939**

Hafenferrefia cf. hyrcanica (Krivolutsky, 1967) (S, Si)

Liacaridae

Adoristes Hull, 1916

Adoristes ovatus (C.L. Koch, 1839) (N, S)

Adoristes poppei (Oudemans, 1906) (N, S)

Dorycranosus Woolley, 1969

Dorycranosus acutus (Pschorn-Walcher, 1951) (S)

Dorycranosus splendens (Coggi, 1898) (N, S, Si)

Liacarus Michael, 1898

Liacarus cf. brevilamellatus Mihelcic, 1955 (Si, Sa)

Liacarus coracinus (C.L. Koch, 1841) (N, S, Si, Sa) (*)

Liacarus cf. cuspidatus Mihelcic, 1954 (S)

Liacarus nitens (Gervais, 1844) (N, S, Si)

Liacarus cf. perezinigo Capilla, 1972 (S, Si)

Liacarus reticulatus Mahunka, 1966 (N)

Liacarus robustus Mihelcic, 1954 (S)

Liacarus subterraneus (C.L. Koch, 1844) (N, S)

Liacarus tremellae (Linnaeus, 1761) (N)

Liacarus xylariae (Schrank, 1803) (N, S)

Liacarus sp. (S, Si) (*)

Liacarus sp. (S) (*)

Note

Liacarus coracinus: In Collezione Berlese esistono esemplari di questa specie sotto il nome di *Leiosoma corvinum* C.L. Koch, nome mai utilizzato e dovuto evidentemente ad un lapsus calami.

Liacarus sp.: Specie probabilmente nuova, il cui studio è in corso.

Liacarus sp.: Specie inedita nota per il Massiccio del Pollino e che nel frattempo è stata rinvenuta anche sull'isola di Montecristo (Arcipelago Toscano).

Xenillidae

Xenillus Robineau-Desvoidy, 1839

Xenillus clypeator Robineau-Desvoidy, 1839 (N, S, Si)

Xenillus discrepans Grandjean, 1936 (S)

Xenillus cf. fernandoi Morell, 1989 (Si)

Xenillus cf. selgae Morell, 1987 (Sa)
Xenillus tegeocranus (Hermann, 1804) (N, S, Si)
Xenillus sp. (Sa) (*)

Note

Xenillus sp.: Specie indeterminata raccolta sull'isola di Molara al nord-est della Sardegna.

Astegistidae

Cultroribula Berlese, 1908

Cultroribula bicultrata (Berlese, 1905) (N, S, Si)
Cultroribula juncta (Michael, 1885) (N)

Metrioppiidae

Ceratoppia Berlese, 1908

Ceratoppia bipilis (Hermann, 1804) (N, S, Si)
Ceratoppia quadridentata (Haller, 1882) (N, S, Si)

Parapyroppia Pérez-Iñigo & Subias, 1979

Parapyroppia cornuta (Berlese, 1910) (S, Si)

Gustaviidae

Gustavia Kramer, 1879

Gustavia bicornis (Berlese, 1885) (S) (*)
Gustavia fusifer (C.L. Koch, 1841) (N, S, Si, Sa)
Gustavia longicornis (Berlese, 1903) (S)
Gustavia microcephala (Nicolet, 1855) (N, S)

Note

Gustavia bicornis: Specie inquirenda. Addirittura, essa viene ritenuta da qualcuno un sinonimo di *microcephala* Nicolet, 1855. Tuttavia Van der Hammen (Zool.Verh., 17: 79, 1952) nega questa sinonimia sulla base dell'esame di un esemplare di Berlese depositato nell'Acaroteca italiana della Collezione Oudemans.

Kodiakellidae

Kodiakella Hammer, 1967

Kodiakella dimorpha Pérez-Iñigo & Subias, 1978 (Si)

Carabodidae

Austrocarabodes Hammer, 1966

Austrocarabodes ensifer (Sellnick, 1931) (S, Si, Sa)

Carabodes C.L. Koch, 1835

Carabodes affinis Berlese, 1913 (S, Si, Sa)
Carabodes apuanicus Bernini, 1979 (S) (E)
Carabodes arduinii Valle, 1955 (N, S, Si, Sa)
Carabodes areolatus Berlese, 1916 (N, S)
Carabodes chirstlus Mahunka, 1987 (Si)
Carabodes coriaceus C.L. Koch, 1835 (N)
Carabodes dissimilis Bernini, 1976 (S, Sa) (E) (*)
Carabodes femoralis (Nicolet, 1855) (N, S, Si)
Carabodes grandjeani Bernini, 1977 (S) (E)
Carabodes intermedius Willmann, 1951 (N) (E)
Carabodes labyrinthicus (Michael, 1879) (S)
Carabodes manganoi Bernini, 1976 (S) (E)
Carabodes marginatus (Michael, 1884) (N, S, Si?, Sa) (*)
Carabodes minusculus Berlese, 1923 (N, S, Sa)
Carabodes montanus Bernini, 1979 (N, S)
Carabodes ornatus Storkán, 1925 (S)
Carabodes palmifer Berlese, 1904 (N, S, Sa)
Carabodes poggii Bernini, 1976 (N, S)
Carabodes pontiger Berlese, 1913 (S) (*)
Carabodes pulcher Bernini, 1976 (N)
Carabodes quadrangulus Bernini, 1979 (N, S, Si, Sa)
Carabodes reticulatus Berlese, 1916 (N, S)
Carabodes rugosior Berlese, 1916 (N, S)
Carabodes schatzi Bernini, 1976 (N) (E)
Carabodes tenuis Forsslund, 1953 (S)
Carabodes willmanni Bernini, 1975 (S, Si, Sa)
Carabodes sp. (S, Si, Sa) (*)

Odontocepheus Berlese, 1913

Odontocepheus elongatus (Michael, 1879) (N, S, Si)
Odontocepheus cf. *hungaricus* Mahunka, 1991 (Si)
Odontocepheus oglasae Baratti & Bernini, 1994 (S) (E)
Odontocepheus pyramidalis Mahunka, 1987 (Sa)

Note

Carabodes dissimilis: È presente in Corsica, Sardegna e a Montecristo (Arcipelago Toscano).

Carabodes marginatus: La segnalazione di questa entità nella Collezione Berlese per la Sicilia è dubbia; è probabile che essa sia relativa a *C. chirstlus* Mahunka, 1987. Anche gli esemplari di Sardegna, costituendo l'oggetto di una revisione in preparazione, potrebbero essere attribuiti ad altra entità.

Carabodes pontiger: Specie inquirenda. La revisione in preparazione ha lo scopo di chiarire anche l'identità di questo taxon.

Carabodes sp.: Specie nuova la cui descrizione apparirà in un lavoro attualmente in corso di preparazione.

Tegeocranellidae

Tegeocranellus Berlese, 1913

Tegeocranellus laevis (Berlese, 1905) (N, S)

Tectocephidae

Lamellocephus Balogh, 1961

Lamellocephus personatus (Berlese, 1910) (N, S)

Tectocephus Berlese, 1896

Tectocephus alatus Berlese, 1913 (N, S, Si?)

Tectocephus cuspidentatus Knülle, 1954 (N)

Tectocephus minor Berlese, 1903 (N, S, Si, Sa)

Tectocephus sarekensis Trägårdh, 1910 (N, S, Si, Sa)

Tectocephus velatus (Michael, 1880) (N, S, Si, Sa)

Autognetidae

Autogneta Hull, 1916

Autogneta longilamellata (Michael, 1888) (S)

Autogneta parva Forsslund, 1947 (S, Si)

Conchogneta Grandjean, 1963

Conchogneta sp. (S) (*)

Cosmogneta Grandjean, 1960

Cosmogneta cassolai Bernini, Baratti & Avanzati, 1991 (S) (E)

Rhaphigneta Grandjean, 1960

Rhaphigneta numidiana Grandjean, 1960 (S, Si)

Note

Conchogneta sp.: Specie inedita nota per il massiccio del Pollino.

Caleremaeidae

Caleremaeus Berlese, 1910

Caleremaeus monilipes (Michael, 1882) (N, S, Sa)

Machuellidae

Machuella Hammer, 1961

Machuella draconis Hammer, 1961 (N, S, Si)

Machuella expansa (Paoli, 1908) (S) (*)

Note

Machuella expansa: Specie inquirenda.

Oppiidae

Anomaloppia Subias, 1978

Anomaloppia sp. (S) (*)

Berniniella Balogh, 1983

Berniniella aeoliana (Bernini, 1973) (S, Si)

Berniniella bicarinata (Paoli, 1908) (N, S, Si, Sa)

Berniniella coronata Mahunka & Paoletti, 1984 (N)

Berniniella hauseri (Mahunka, 1974) (Sa)

Corynoppia Balogh, 1983

Corynoppia kosarovi (Jeleva, 1962) (N, S)

Dissorhina Hull, 1916

Dissorhina ornata (Oudemans, 1900)
Dissorhina ornata corniculata (Paoli, 1908) (S)
Dissorhina ornata globosa (Paoli, 1908) (N)
Dissorhina ornata longipilosa (Kunst, 1958) (N)
Dissorhina ornata ornata (Oudemans, 1900) (N, S, Si)

Graptoppia (Apograptoppia) Subias & Rodriguez, 1985

Graptoppia (Apograptoppia) foveolata (Paoli, 1908) (N)

Graptoppia (Graptoppia) Balogh, 1983

Graptoppia (Graptoppia) paraanalis Subias & Rodriguez, 1985 (Si)

Graptoppia (Stenoppia) Balogh, 1983

Graptoppia (Stenoppia) italica (Bernini, 1973) (N)

Hypogeoppia Subias, 1981

Hypogeoppia hypogea (Paoli, 1908) (N, S)

Lauroppia Subias & Minguez, 1986

Lauroppia acuminata (Strenzke, 1951) (S)
Lauroppia falcata (Paoli, 1908) (N)
Lauroppia fallax (Paoli, 1908) (N, S, Si)

Medioppia Subias & Minguez, 1985

Medioppia media (Mihelcic, 1956) (S, Sa)
Medioppia melisi (Valle, 1949) (N) (E) (*)
Medioppia obsoleta (Paoli, 1908) (N, S, Sa)
Medioppia subpectinata (Oudemans, 1900) (N, S)
Medioppia sp. (Si) (*)

Microppia Balogh, 1983

Microppia minus (Paoli, 1908) (N, S, Si, Sa)

Moritzoppia Subias & Rodriguez, 1988

Moritzoppia lignivora (Jacot, 1939) (N, S)
Moritzoppia unicarinata (Paoli, 1908) (N, S, Si, Sa)

Multioppia (Multioppia) Hammer, 1961

Multioppia (Multioppia) wilsoni Aoki, 1964 (Si)

Multioppia (Furculoppia) Balogh, 1983

Multioppia (Furculoppia) cf. ramulifera (Kunst, 1959) (S)

Mystroppia Balogh, 1959

Mystroppia dallaii Bernini, 1973 (Si) (E)

Neotrichoppia (Ancestroppia) Subias & Rodriguez, 1986

Neotrichoppia (Ancestroppia) berninii Subias & Rodriguez, 1986 (Si)

Neotrichoppia (Confinoppia) Subias & Rodriguez, 1986

Neotrichoppia (Confinoppia) confinis (Paoli, 1908)

Neotrichoppia (Confinoppia) confinis confinis (Paoli, 1908) (N, S, Si)

Neotrichoppia (Confinoppia) confinis tenuiseta Subias & Rodriguez, 1986 (Si)

Oppia C.L. Koch, 1835

Oppia arcidiaconoae Bernini, 1973 (S, Si, Sa)

Oppia denticulata (G. Canestrini & R. Canestrini, 1882) (N, S, Si, Sa)

Oppia elongata (Paoli, 1908) (N, S, Sa)

Oppia nitens C.L. Koch, 1835 (N)

Oppiella (Oppiella) Jacot, 1937

Oppiella (Oppiella) nova (Oudemans, 1902) (N, S, Si, Sa)

Oppiella (Oppiella) splendens (C.L. Koch, 1841) (N)

Oxyoppioides Subias & Minguez, 1985

Oxyoppioides decipiens (Paoli, 1908) (N, S, Sa)

Ramusella (Insculptoppia) Subias, 1980

Ramusella (Insculptoppia) cf. anuncata Subias & Rodriguez, 1986 (Si)

Ramusella (Insculptoppia) berninii (Pérez-Iñigo, 1975) (S) (*)

Ramusella (Insculptoppia) caporiacci (Valle, 1955) (N) (*)

Ramusella (Insculptoppia) clavipectinata (Michael, 1885) (N, S)

Ramusella (Insculptoppia) elliptica (Berlese, 1908) (S, Si?)

Ramusella (Insculptoppia) furcata (Willmann, 1928) (N)

Ramusella (Insculptoppia) insculpta (Paoli, 1908) (N, S, Si, Sa)

Ramusella (Insculptoppiella) Subias & Rodriguez, 1986

Ramusella (Insculptoppiella) alfonsii (Bernini, 1980) (S) (E) (*)

***Ramusella (Ramusella)* Hammer, 1962**

Ramusella (Ramusella) assimilis (Mihelcic, 1956) (N, S, Si)

Ramusella (Ramusella) gyrata (Mahunka & Paoletti, 1984) (N)

Ramusella (Ramusella) puertomonttensis Hammer, 1962 (N) (*)

***Ramusella (Rectoppia)* Subias, 1980**

Ramusella (Rectoppia) fasciata (Paoli, 1908) (S)

Ramusella (Rectoppia) sahariensis (Hammer, 1975) (Si)

Ramusella (Rectoppia) strinatii (Mahunka, 1980) (Si?, Sa)

***Serratoppia* Subias & Minguez, 1985**

Serratoppia serrata (Mihelcic, 1956) (S)

Note

Anomaloppia sp.: Specie inedita nota per il Massiccio del Pollino.

Medioppia melisi: Specie finora raccolta esclusivamente in alcune grotte dell'Emilia-Romagna.

Medioppia sp.: Specie probabilmente nuova il cui studio è in corso.

Oppia: Vedi anche introduzione, pag. 6.

Ramusella (Insculptoppia) berninii: Raccolta in alcune piccole grotte del Senese e in grotte spagnole.

Ramusella (Insculptoppia) caporiacci: Specie raccolta una sola volta nella grotta di Re Tiberio in Romagna e di cui è incerta l'identità e la stessa collocazione generica.

Ramusella (Insculptoppiella) alfonsii: Nota solo da una piccola grotta del Senese e a Montecristo (Arcipelago Toscano).

Ramusella (Ramusella) puertomonttensis: Specie a vastissima distribuzione, probabilmente introdotta in Italia.

Quadroppiidae

***Quadroppia* Jacot, 1939**

Quadroppia michaeli Mahunka, 1977 (N, Si)

Quadroppia monstrosa Hammer, 1979 (N) (*)

Quadroppia omodeoi Mahunka & Paoletti, 1984 (N)

Quadroppia pseudocircumita Minguez, Ruiz & Subias, 1985 (Sa)

Quadroppia quadricarinata (Michael, 1885) (N, S, Si, Sa) (*)

Quadroppia cf. ritza Gordeeva & Tarba, 1990 (N, S, Si)

Quadroppia sp. (Si) (*)

Note

Quadroppia monstrosa: La presenza di questa specie a vasta distribuzione in Italia deve essere considerata con dubbio, poiché la determinazione è stata effettuata solo sulla base di illustrazioni e non con il confronto di esemplari.

Quadroppia quadricarinata: E' stata fino a poco tempo fa una specie omnicomprensiva, l'unica del genere. Il recente studio ha prodotto una grande frammentazione, almeno una ventina di specie a geonemia più limitata. È, quindi, probabile che, man mano le diverse citazioni saranno riviste, la distribuzione di quadricarinata sarà ridimensionata.

Quadroppia sp.: Specie probabilmente nuova, il cui studio è attualmente in corso.

Suctobelbidae

Allosuctobelba Moritz, 1970

Allosuctobelba grandis (Paoli, 1908) (S, Si)

Suctobelba Paoli, 1908

Suctobelba cf. aliena Moritz, 1970 (Si)

Suctobelba lapidaria Moritz, 1970 (S)

Suctobelba cf. regia Moritz, 1970 (Si)

Suctobelba sorrentensis Hammer, 1961 (S)

Suctobelba trigona (Michael, 1888) (N, S, Si)

Suctobelbella Jacot, 1937

Suctobelbella acutidens (Forsslund, 1941) (N, S, Si)

Suctobelbella arcana Moritz, 1970 (N)

Suctobelbella bella (Berlese, 1904) (S, Si)

Suctobelbella cornigera (Berlese, 1902) (N, S, Si)

Suctobelbella forsslundi (Strenzke, 1950) (N)

Suctobelbella italica (Mahunka, 1966) (N)

Suctobelbella nasalis (Forsslund, 1941) (N)

Suctobelbella perforata (Strenzke, 1950) (N)

Suctobelbella perpendiculata (Forsslund, 1958) (S)

Suctobelbella sarekensis (Forsslund, 1941) (N, S)

Suctobelbella similis (Forsslund, 1941) (N, Sa)

Suctobelbella subcornigera (Forsslund, 1941) (N)

Suctobelbella subtrigona (Oudemans, 1900) (N)

Banksinomidae

Banksinoma Oudemans, 1930

Banksinoma lanceolata (Michael, 1888)

Banksinoma lanceolata lanceolata (Michael, 1888) (S)

Banksinoma lanceolata islandica Fujikawa, 1979 (N, Si)

Gemmazetes Fujikawa, 1979

Gemmazetes etruscus Bernini, 1980 (S) (*)

Gemmazetes sp. (S) (*)

Oribella Berlese, 1908

Oribella pectinata (Michael, 1885) (N, S)

Pantelozetes Grandjean, 1953

Pantelozetes berlesei Fujikawa, 1979 (N, S)

Pantelozetes paolii (Oudemans, 1913) (N, S, Si)

Note

Gemmazetes etruscus: Specie legata ad ambienti di grotta; è stata raccolta una sola volta nei dintorni di Siena.

Gemmazetes sp.: Specie indeterminata segnalata per il Massiccio del Pollino.

Trizetidae

Trizetes Berlese, 1904

Trizetes pyramidalis Berlese, 1904 (S)

Hydrozetidae

Hydrozetes (Hydrozetes) Berlese, 1902

Hydrozetes (Hydrozetes) confervae (Schrank, 1781) (N, S, Si)

Hydrozetes (Hydrozetes) lemnae (Coggi, 1899) (N, S, Si)

Cymbaeremaeidae

Cymbaeremaeus Berlese, 1896

Cymbaeremaeus cymba (Nicolet, 1855) (N, S, Si)

Scapheremaeus Berlese, 1910

Scapheremaeus corniger (Berlese, 1908) (S, Si)

Scapheremaeus patella (Berlese, 1886) (N, S, Si)

Scapheremaeus reticulatus (Berlese, 1910) (N)

Micreremidae

Micreremus Berlese, 1908

Micreremus brevipes (Michael, 1888) (N, S, Si, Sa) (*)

Micreremus gracilior Willmann, 1931 (S, Si)

Micreremus minutipes (Berlese, 1902) (S) (*)

Note

Micreremus brevipes: Anche *E. minutus* Berlese, 1897, lapsus calami per *E. minimus* Berlese, 1891.

Micreremus minutipes: Specie la cui identità è da accertare, anche se l'opinione più recente è quella di porla in sinonimia con *M. brevipes* (Michael, 1888).

Licneremaeidae

Licneremaeus Paoli, 1908

Licneremaeus giustii Bernini, 1973 (Si)

Licneremaeus lichophorus (Michael, 1882) (S, Si, Sa)

Licneremaeus sp. (Sa) (*)

Note

Licneremaeus sp.: Nuova specie la cui descrizione apparirà in un prossimo lavoro.

Passalozetidae

Bipassalozetes Mihelcic, 1956

Bipassalozetes bidactylus (Coggi, 1900) (N, S, Si, Sa)

Bipassalozetes intermedius (Mihelcic, 1954) (N, S)

Bipassalozetes perforatus (Berlese, 1910) (S, Si)

Passalozetes Grandjean, 1932

Passalozetes africanus Grandjean, 1932 (S, Si, Sa)

Passalozetes paucesculptus Bernini, 1972 (Si) (E) (*)

Passalozetes sp. (Sa) (*)

Note

Passalozetes paucesculptus: Per ora nota solo dall'isolotto di Basiluzzo (Isole Eolie).

Passalozetes sp.: Nuova specie la cui descrizione apparirà in un prossimo lavoro.

Scutoverticidae

Lamellovertex Bernini, 1976

Lamellovertex caelatus (Berlese, 1894) (N, S) (E)

Provertex Mihelcic, 1959

Provertex delamarei Travé, 1963 (S)

Provertex kuehnelti Mihelcic, 1959 (N) (*)

Scutovertex Michael, 1879

Scutovertex minutus (C.L. Koch, 1835) (N, S, Sa)

Scutovertex sculptus Michael, 1879 (N, S, Si, Sa)

Scutovertex siculus (Berlese, 1887) (N) (*)

Note

Provertex kuehnelti: Segnalata solo nel Carso triestino.

Scutovertex siculus: È da notare l'incongruità fra il nome della specie (*siculus*) e la località (l'unica) nella quale è stata raccolta da Berlese, Tiarno (Trentino).

Zetomotrichidae

Ghilarovus Krivolutsky, 1966

Ghilarovus hispanicus Subias & Pérez-Iñigo, 1977

Ghilarovus hispanicus gadarramicus Subias, 1977 (Si)

Oglasacarus Bernini, 1978

Oglasacarus oglasae Bernini, 1978 (S) (E) (*)

Note

Oglasacarus oglasae: Specie e genere sono per il momento endemici dell'isola di Montecristo (Arcipelago Toscano).

Parakalummidae

Neoribates Berlese, 1914

Neoribates aurantiacus (Oudemans, 1914) (N, Si)
Neoribates roubali (Berlese, 1910) (S)

Mochlozetidae

Podoribates Berlese, 1908

Podoribates longipes (Berlese, 1887) (N, S)

Protoribatidae

Liebstadia Oudemans, 1906

Liebstadia badensis (Sellnick, 1929) (S)
Liebstadia humerata Sellnick, 1928 (N, S, Si, Sa)
Liebstadia similis (Michael, 1888) (N, S)

Protoribates Berlese, 1908

Protoribates austriacus Willmann, 1953 (N)
Protoribates capucinus Berlese, 1908 (N, S, Si, Sa)
Protoribates dentatus (Berlese, 1883) (N, S)
Protoribates cf. elongatus Mihelcic, 1953 (Si)
Protoribates lagenula (Berlese, 1904) (N, S)
Protoribates longior Berlese, 1908 (S)
Protoribates lophotrichus (Berlese, 1904) (N, S) (*)
Protoribates pupula Berlese, 1910 (S)
Protoribates sp. (S) (*)

Note

Protoribates lophotrichus: Questa classica specie di Berlese è stata chiarita recentissimamente. Nella Collezione Berlese, oltre agli esemplari etichettati correttamente, ce ne sono alcuni provenienti dal Giardino di Boboli a Firenze, che portano il nome di *Oribata monodactyla* Haller, 1884, una specie nordamericana di identità ignota; poiché essi sono stati raccolti nel locus typicus di *lophotrichus* è possibile che si tratti della stessa specie. È sperabile che un futuro lavoro di revisione di questi esemplari chiarisca a fondo il problema.

Protoribates sp.: Specie inedita segnalata sul Massiccio del Pollino.

Oribatulidae

Domitorina Grandjean, 1951

Domitorina plantivaga (Berlese, 1895) (N, S, Si)

Eporibatula Sellnick, 1928

Eporibatula rauschenensis (Sellnick, 1908) (S, Sa)

Lucoppia Berlese, 1908

Lucoppia burrowsi (Michael, 1890) (S, Si)

Oribatula Berlese, 1896

Oribatula amblyptera Berlese, 1916 (N, S)

Oribatula caliptera Berlese, 1902 (N, S)

Oribatula parisi Travé, 1961 (N)

Oribatula tibialis (Nicolet, 1855) (N, S, Si, Sa) (*)

Oribatula travei Bernini, 1969 (N, Sa) (*)

Paraleius Travé, 1960

Paraleius leontonycha (Berlese, 1910) (S)

Phauloppia Berlese, 1908

Phauloppia asperula (Berlese, 1916) (N, S)

Phauloppia lucorum (C.L. Koch, 1841) (N, S, Si, Sa)

Phauloppia nemoralis (Berlese, 1916) (S, Si)

Phauloppia pilosa (C.L. Koch, 1841) sensu Michael, 1888 (S)

Phauloppia vallei Bernini, 1973 (Si) (E)

Pseudoppia Pérez-Iñigo, 1966

Pseudoppia mediocris (Mihelcic, 1957) (S, Si, Sa) (*)

Siculobata Grandjean, 1953

Siculobata sricula (Berlese, 1892) (Si)

Zygoribatula Berlese, 1916

Zygoribatula arcuatissima (Berlese, 1916) (S)

Zygoribatula bisignata (Coggi, 1898) (N) (*)

Zygoribatula cognata (Oudemans, 1902) (N, S)

Zygoribatula connexa (Berlese, 1904) (N, S)

Zygoribatula exarata (Berlese, 1916) (N, S, Si, Sa)

Zygoribatula excavata (Berlese, 1916) (N, S, Si)

Zygoribatula exilis (Nicolet, 1855) (N, S, Si)

Zygoribatula frisiae Oudemans, 1900 (S) (*)

Zygoribatula glabra (Michael, 1890) (S, Si, Sa)

Zygoribatula intermedia Mihelcic, 1969 (N)

Zygoribatula laubieri Travé, 1961
Zygoribatula laubieri meridionalis Travé, 1961 (N, S)
Zygoribatula propinqua (Oudemans, 1900) (N, Si, Sa)
Zygoribatula socia (Berlese, 1916) (N, S)
Zygoribatula undulata (Berlese, 1916) (S)
Zygoribatula sp. (Sa) (*)

Note

Oribatula tibialis: Specie comunissima e citatissima in tutto l'oloartico, ma la cui identità è incerta, così come incerta è la sistematica del genere. In particolare, per quanto riguarda il nome coggii, esso è stato istituito, per l'esemplare illustrato da Berlese nel suo AMS. It. (1895) sotto il nome di *Oribatula tibialis* Nicolet, 1855, da Jacot (1929) (Trans. Amer. Microsc. Soc., 48: 416-430), secondo il quale detto esemplare differisce da quello descritto e illustrato da Nicolet. È chiaro che il dubbio rimarrà fino al momento in cui non sarà stata effettuata la revisione del genere.

Oribatula travei: Specie localizzata in ambienti alofili, raccolta finora solo nella Pineta di S. Vitale (RA) vicino al mare e sulle spiagge dell'isola di Tavolara nel nord-est della Sardegna.

Pseudoppia mediocris: Nella regione italiana questa specie è presente nell'Arcipelago Toscano, Corsica, Sardegna e Sicilia.

Zygoribatula bisignata: Questa specie, come molte altre del genere, non ha un'identità sicura e richiede uno studio particolare per la sua conferma.

Zygoribatula frisiae: Questa specie a larga distribuzione è stata per il momento citata per il territorio italiano solo sull'isola del Giglio (Arcipelago Toscano).

Zygoribatula sp.: Specie nuova raccolta nell'isola di Molarra (Sardegna nord-orientale), la cui descrizione è contenuta in un lavoro attualmente in stampa.

Haplozetidae

Haplozetes Willmann, 1935

Haplozetes tenuifusus (Berlese, 1916) (S) (*)
Haplozetes vindobonensis Willmann, 1935 (N, S)

Peloribates Berlese, 1908

Peloribates europaeus Willmann, 1935 (S)
Peloribates glaber Mihelcic, 1956 (S)
Peloribates longipilosus Csiszar, 1962 (N)
Peloribates tunisiensis Mahunka, 1980 (Si)
Peloribates sp. (Sa) (*)

Pilobatella Balogh & Mahunka, 1967

Pilobatella sp. (Si) (*)

Note

Haplozetes tenuifusus: Questa specie è stata recentemente spostata nel genere *Lauritzenia* Hammer, 1958, genere che non aveva finora rappresentanti in Italia.

Peloribates sp.: Nuova specie la cui descrizione sarà pubblicata in un prossimo lavoro.

Pilobatella sp.: Specie inedita, appartenente ad un genere tropicale, segnalata sull'isola di Pantelleria.

Scheloribatidae

Hemileius Berlese, 1916

Hemileius initialis (Berlese, 1908) (N, S, Si, Sa)

Hemileius scrobina (Berlese, 1916) (N, S) (*)

Hemileius sternalis (Berlese, 1916) (S)

Scheloribates Berlese, 1908

Scheloribates artifex (Berlese, 1916) (Sa)

Scheloribates caprai Bernini, 1973 (S, Si, Sa)

Scheloribates exilior (Berlese, 1916) (Sa) (*)

Scheloribates frigidus (Berlese, 1908) (S, Si)

Scheloribates laevigatus (C.L. Koch, 1835) (N, S, Si, Sa)

Scheloribates lanceoliger (Berlese, 1908) (N, S, Si, Sa) (*)

Scheloribates latipes (C.L. Koch, 1844) (N, S, Si)

Scheloribates cf. *minifimbriatus* Minguez, Subias & Ruiz, 1986 (Si)

Scheloribates pallidulus (C.L. Koch, 1841) (N, S, Si, Sa)

Scheloribates pilosus Sellnick, 1943 (N) (*)

Note

Hemileius scrobina: La citazione per il massiccio del Pollino è data per confronto.

Scheloribates exilior: Una recente revisione ha suggerito di includere questa specie nel genere *Semischeloribates* Hammer, 1973, genere non ancora conosciuto in Italia.

Scheloribates lanceoliger: Specie "collettiva", nella quale Berlese aveva incluso diverse entità; sarebbe necessaria una revisione sistematica del materiale custodito nella sua Collezione per comprendere l'identità reale di questo taxon.

Scheloribates pilosus: L'esatta identità di questa specie descritta per l'Appennino Tosco-Romagnolo e mai più segnalata rimane da accertare.

Chamobatidae

Chamobates Hull, 1916

Chamobates borealis (Trägårdh, 1902) (N, S, Si, Sa) (*)

Chamobates cuspidatus (Michael, 1884) (N, S)

Chamobates depauperatus (Berlese, 1886) (N, S, Si) (*)

Chamobates fusifer (Berlese, 1908) (S) (*)
Chamobates nigerrimus (Berlese, 1908) (S)
Chamobates paolii (Berlese, 1908) (S)
Chamobates cf. perezinigoii Subias, 1977 (S)
Chamobates pusillus (Berlese, 1895) (N, S)
Chamobates subglobulus (Oudemans, 1900) (S, Si, Sa)

Xiphobates Pavlitschenko, 1993

Xiphobates cf. kieviensis (Shaldybina, 1980) (S, Sa)
Xiphobates voigtsi (Oudemans, 1902) (N)
Xiphobates sp. (S) (*)
Xiphobates sp. (N, S) (*)
Xiphobates sp. (S, Si) (*)

Note

Chamobates borealis: Una recente revisione, basata sui materiali di Berlese a Firenze, ha proposto che questa specie sia un sinonimo oggettivo di *Chamobates pusillus* Berlese. Questo è probabile, ma non è stato dimostrato attraverso la comparazione dei materiali tipici di *C. borealis* e, perciò, in un genere molto confuso com'è *Ch. hamobates*, non sembra opportuno accettare per il momento una simile conclusione.

Chamobates depauperatus: Specie inquirenda. Infatti, nonostante una recente revisione abbia provveduto ad una ridescrizione di un esemplare scelto come lectotypus, il problema tassonomico non è stato chiarito. Sotto il nome *depauperatus* sono conservati diversi esemplari appartenenti a specie differenti di varia provenienza e non è affatto sicuro che l'esemplare scelto come lectotypus appartenga alla serie dei syntypi. Pertanto, la definitiva soluzione del problema deve essere rimandata a studi ulteriori.

Chamobates fusifer: L'identità e la stessa posizione generica di questa specie sono state recentemente chiarite; questo taxon si trova inserito nel genere *Lauritzenia* Hammer, 1958.

Xiphobates sp.: Specie inedita la cui descrizione è in corso di pubblicazione. È nota per la Toscana continentale ed insulare.

Xiphobates sp.: Specie inedita nota per le Alpi Apuane, il Monte Capanne (isola d'Elba) e l'Appennino Reggiano.

Xiphobates sp.: Specie inedita segnalata per il Massiccio del Pollino sotto il nome generico *Chamobates*. È stata raccolta anche sui M.ti Nebrodi.

Euzetidae

Euzetes Berlese, 1908

Euzetes globulus (Nicolet, 1855) (N, S, Si)

Zetomimidae

Zetomimus Hull, 1916

Zetomimus furcatus (Warburton & Pearce, 1905) (N, S)
Zetomimus magnificus (Berlese, 1910) (S, Si)

Ceratozetidae

Ceratozetella Shaldybina, 1966

Ceratozetella cf. cuspidodenticulatus (Kulijew, 1962) (N)
Ceratozetella magnificus (Berlese, 1910) (S, Si)

Ceratozetes Berlese, 1908

Ceratozetes conjunctus Mihelcic, 1956 (N?, S)
Ceratozetes elongatissimus (Berlese, 1908) (S)
Ceratozetes gracilis (Michael, 1884) (N, S)
Ceratozetes lagrecai Bernini, 1973 (N, S, Si, Sa)
Ceratozetes cf. laticuspidatus Menke, 1964 (Sa)
Ceratozetes maximus Berlese, 1908 (S)
Ceratozetes mediocris Berlese, 1908 (N, S)
Ceratozetes myrmobates (Berlese, 1903) (S)
Ceratozetes redemptus Caroli & Maffia, 1934 (N)

Ceratozetoides Shaldybina, 1966

Ceratozetoides cisalpinus (Berlese, 1908) (N)
Ceratozetoides subsemilunum (Oudemans, 1903) (N) (*)

Diapterobates Grandjean, 1936

Diapterobates humeralis (Hermann, 1804) (N, S)

Edwardzetes Berlese, 1914

Edwardzetes edwardsi (Nicolet, 1855) (N, S)

Fuscozetes Sellnick, 1928

Fuscozetes fuscipes (C.L. Koch, 1844) (N)
Fuscozetes intermedius Caroli & Maffia, 1934 (N)
Fuscozetes setosus (C.L. Koch, 1839) (N, S, Si) (*)

Globozetes Sellnick, 1928

Globozetes longipilus Sellnick, 1928 (N, S)

Hypozetes Balogh, 1959

Hypozetes bulgaricus Jeleva, 1962 (S)

Latilamellobates Shaldybina, 1971

Latilamellobates incisellus (Kramer, 1897) (N, S, Si, Sa)

Latilamellobates latilamellatus (Mihelcic, 1956) (Sa)

Latilamellobates meridionalis (Berlese, 1910) (S, Si)

Latilamellobates oxypterus (Berlese, 1910) (N, S)

Latilamellobates sp. (S, Sa) (*)

Melanozetes Hull, 1916

Melanozetes mollicomus (C.L. Koch, 1839) (N, S)

Sphaerozetes Berlese, 1885

Sphaerozetes orbicularis (C.L. Koch, 1835) (N, S, Si, Sa) (*)

Sphaerozetes pedemontanus Berlese, 1910 (N) (*)

Sphaerozetes piriformis (Nicolet, 1855) (N, S)

Trichoribates Berlese, 1910

Trichoribates angustatus Mihelcic, 1957 (S, Si)

Trichoribates apenninicus Berlese, 1923 (S) (*)

Trichoribates cribelliger (Berlese, 1904) (N) (*)

Trichoribates distinguendus Berlese, 1923 (S) (*)

Trichoribates novus (Sellnick, 1919) (N, S)

Trichoribates principalis (Berlese, 1914) (N)

Trichoribates prudens (Berlese, 1913) (S, Sa)

Trichoribates trimaculatus C.L. Koch, 1835 (N, S, Si) (*)

Note

Ceratozetoides subsemilunum: L'identità e la collocazione generica di questa specie citata una sola volta da Sanremo sono da chiarire.

Fuscozetes setosus: La presenza in Italia di questa specie è basata solo su antiche segnalazioni, che sarebbe necessario rivedere.

Latilamellobates sp.: Specie inedita segnalata per il Massiccio del Pollino.

Sphaerozetes: Vedi anche introduzione, pag. 6.

Sphaerozetes orbicularis: Il nome *italianensis* è stato istituito, per l'esemplare illustrato da Berlese nel suo AMS. It. (1883) sotto il nome *Oribates setosus* C.L. Koch, 1835, da Jacot (1929 - Trans. Amer. Microsc. Soc., 48: 416-430), secondo il quale detto esemplare differisce da quello descritto e illustrato da C.L. Koch. Il dubbio se questo nome sia o no giustificato sarà sciolto, allorché i materiali di Berlese saranno riveduti.

Sphaerozetes pedemontanus: Specie inquirenda della quale sono andati perduti anche gli esemplari tipici.

Trichoribates apenninicus: Specie inquirenda della quale purtroppo sono andati perduti gli

esemplari tipici.

Trichoribates cribelliger: Specie inquirenda della quale non è sicura neanche la collocazione generica, tanto che una recente revisione la pone con dubbio nel genere *Mycobates* Hull, 1916.

Trichoribates distinguendus: Specie inquirenda.

Trichoribates trimaculatus: Il nome *berlesei* è stato istituito, per l'esemplare illustrato da Berlese nel suo AMS. It. (1887) sotto il nome *Oribates setosus* C.L. Koch, 1839 (= *Murcia trimaculata* C.L. Koch, 1835), da Jacot (1929 - Trans. Amer. Microsc. Soc., 48: 416-430), secondo il quale detto esemplare differisce da quello descritto e illustrato da C.L. Koch. In questo caso, oltre allo studio del materiale originale di Berlese, la soluzione del problema dovrà essere sottoposta alla Commissione Internazionale per la Nomenclatura Zoologica (ICZN), poiché la specie tipo di *Trichoribates* Berlese, 1910 è proprio l'esemplare descritto da Berlese.

Mycobatidae

***Ellipsozetes* Bernini, 1980**

Ellipsozetes sphaerulus Bernini, 1980 (S) (*)

***Feiderzetes* Subias, 1977**

Feiderzetes latus (Schweizer, 1956) (S)

***Minguezetes* Subias, Kahwash & Ruiz, 1990**

Minguezetes hexagonus (Berlese, 1908) (N, S)

Minguezetes insignis (Berlese, 1910) (Si)

***Minunthozetes* Hull, 1916**

Minunthozetes atomus (Berlese, 1908) (N, S)

Minunthozetes pseudofusiger (Schweizer, 1922) (N, S, Si)

Minunthozetes semirufus (C.L. Koch, 1841) (N, S, Si)

***Mycobates* Hull, 1916**

Mycobates cf. alpinus (Willmann, 1951) (S)

Mycobates lenicomus (Berlese, 1910) (S)

Mycobates parmeliae (Michael, 1884) (S)

Mycobates sp. (S) (*)

Mycobates sp. (S) (*)

***Punctoribates* Berlese, 1908**

Punctoribates bicornis Berlese, 1908 (N, S) (*)

Punctoribates perlongus Balogh, 1959 (N)

Punctoribates punctum (C.L. Koch, 1839) (N, S, Si, Sa)

Note

Ellipsozetes sphaerulus: Specie legata all'ambiente di grotta, raccolta finora vicino a Siena e nell'isola d'Elba.

Mycobates sp.: Specie inedita nota per il Massiccio del Pollino.

Mycobates sp.: Specie inedita nota per il Massiccio del Pollino.

Punctoribates bicornis: Questa specie non è ancora sistematicamente definita, malgrado la recente ridescrizione, tanto che in due pubblicazioni degli anni '90 viene posta in due generi diversi della stessa famiglia, *Mycobates* Hull, 1916 e *Minunthozetes* Hull, 1916.

Humerobatidae

Humerobates Sellnick, 1928

Humerobates rostromellatus Grandjean, 1936 (N, S, Si, Sa)

Phenopelopidae

Eupelops Ewing, 1917

Eupelops acromios (Hermann, 1804) (N, S, Si, Sa)

Eupelops auritus (C.L. Koch, 1839) (N)

Eupelops affinis (Berlese, 1916) (S)

Eupelops claviger (Berlese, 1916) (N)

Eupelops curtipilus (Berlese, 1916) (N, S, Si, Sa)

Eupelops geminus (Berlese, 1916) (S)

Eupelops glaber (G. Canestrini & R. Canestrini, 1882) (S)

Eupelops hirtus (Berlese, 1916) (N, S)

Eupelops nepotulus (Berlese, 1916) (N, S)

Eupelops occultus (C.L. Koch, 1835) (N, S)

Eupelops plicatus (C.L. Koch, 1835) (N, S)

Eupelops sículus (Berlese, 1916) (Si)

Eupelops similis (Berlese, 1916) (S)

Eupelops simplex (Berlese, 1916) (S)

Eupelops subexutus (Berlese, 1916) (S, Si, Sa)

Eupelops subuliger (Berlese, 1916) (N, S?)

Eupelops tardus (C.L. Koch, 1835) (N, S)

Eupelops torulosus (C.L. Koch, 1839)

Eupelops torulosus torulosus (C.L. Koch, 1839) (N, S, Si)

Eupelops torulosus meridionalis Pérez-Iñigo, 1969 (S, Si)

Eupelops uraceus (C.L. Koch, 1839) (N)

Eupelops cf. variatus (Mihelcic, 1957) (S)

Peloptulus Berlese, 1908

Peloptulus phaeonotus (C.L. Koch, 1844) (N, S, Si, Sa)

Peloptulus trinacriae Arcidiacono, 1975 (S, Si, Sa)

Peloptulus sp. (Si) (*)

Note

Peloptulus sp.: Specie inedita raccolta sull'isola di Pantelleria.

Unduloribatidae

Unduloribates Balogh, 1943

Unduloribates undulatus (Berlese, 1914) (N)

Oribatellidae

Cavernella Bernini, 1975

Cavernella helenae Bernini, 1975 (S) (E) (*)

Joelia Oudemans, 1906

Joelia fiorii (Coggi, 1898) (N, S, Si, Sa)

Ophidiotrichus Grandjean, 1953

Ophidiotrichus connexus (Berlese, 1904) (N, S, Si)

Ophidiotrichus oglasae Bernini, 1976 (S) (E) (*)

Ophidiotrichus vindobonensis Piffel, 1961 (N, Si?)

Oribatella Banks, 1895

Oribatella berlesei (Michael, 1898) (S, Si)

Oribatella brevicuspidis Bernini, 1972 (N, S)

Oribatella brevipila Bernini, 1977 (N, S)

Oribatella calcarata (C.L. Koch, 1835) (N, S)

Oribatella crassipilosa Bernini, 1975 (S, Sa) (*)

Oribatella euthricha Berlese, 1908 (N, S, Si, Sa)

Oribatella exilicornis Berlese, 1910 (N, S)

Oribatella hungarica Balogh, 1943 (N, S)

Oribatella ichnusae Bernini & Avanzati, 1983 (Sa) (E)

Oribatella kunsti Bernini, 1972 (S) (*)

Oribatella longispina Berlese, 1914 (N) (E)

Oribatella luisae Bernini, 1978 (S, Si, Sa)

Oribatella nuragica Bernini & Avanzati, 1983 (Sa) (E)

Oribatella ornata (Coggi, 1900) (N, S, Si, Sa)
Oribatella parvula Bernini, 1974 (N)
Oribatella pulchra Bernini, 1974 (N, S, Si)
Oribatella quadricornuta (Michael, 1880) (N, S, Si)
Oribatella sardoa Bernini, 1978 (Si?, Sa) (E)
Oribatella sexdentata Berlese, 1916 (S)
Oribatella superbula (Berlese, 1904) (N, S, Si, Sa)
Oribatella tyrrhenica Bernini, 1975 (S, Sa) (*)

Paralamellobates Bhaduri & Raychaudhuri, 1968

Paralamellobates misella (Berlese, 1910) (S) (*)

Pseudotectoribates Subias, 1977

Pseudotectoribates minidentatus Ruiz, Subias & Kahwash, 1991 (S, Si, Sa)

Siciliotrichus Bernini, 1983

Siciliotrichus siculus Bernini, 1983 (Si)

Tectoribates Berlese, 1910

Tectoribates ornatus (Schuster, 1958) (N, S)
Tectoribates proximus (Berlese, 1910) (N, S)

Note

Cavernella helenae: Specie e genere endemici dell'Arcipelago Toscano e della Corsica.

Ophidiotrichus oglasae: Per quanto è noto ad oggi, la specie è endemica dell'isola di Montecristo (Arcipelago Toscano).

Oribatella crassipilosa: Specie diffusa su alcune isole dell'Arcipelago Toscano e in Corsardegna.

Oribatella kunsti: Specie endemica delle Alpi Apuane e della Corsica.

Oribatella tyrrhenica: Specie endemica della Corsica, Sardegna e di alcune isole dell'Arcipelago Toscano.

Paralamellobates misella: Specie esotica (di genere esotico) raccolta nelle serre delle Cascine da Berlese.

Tegoribatidae

Lepidozetes Berlese, 1910

Lepidozetes singularis Berlese, 1910 (N, S, Si)

Tegoribates Ewing, 1917

Tegoribates latirostris (C.L. Koch, 1844) (N)

Achipteriidae

Achipteria Berlese, 1885

Achipteria acuta Berlese, 1908 (N, S) (*)
Achipteria coleoptrata (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
Achipteria imperialis Berlese, 1910 (Si) (*)
Achipteria italica (Oudemans, 1914) (N)
Achipteria moderatior Berlese, 1923 (N) (*)
Achipteria nitens (Nicolet, 1855) (N, S, Si)
Achipteria oudemansi Van der Hammen, 1952 (N, S)
Achipteria regalis Berlese, 1908 (N) (*)
Achipteria sellnicki Van der Hammen, 1952 (N)

Anachipteria Grandjean, 1932

Anachipteria deficiens Grandjean, 1932 (N)

Cerachipteria Grandjean, 1935

Cerachipteria digita Grandjean, 1935 (S)
Cerachipteria minuscula (Berlese, 1902) (N, S)

Parachipteria Van der Hammen, 1952

Parachipteria fanzagoi (Jacot, 1929) (N, S, Si) (*)
Parachipteria patavina (Oudemans, 1914) (N, S)
Parachipteria cf. perproxima (Sellnick, 1931) (Si)
Parachipteria petiti Travé, 1960 (S, Si, Sa)
Parachipteria punctata (Nicolet, 1855) (N, S)

Pseudoachipteria Travé, 1960

Pseudoachipteria magna (Sellnick, 1928) (N, S)

Note

Achipteria: Il genere *Achipteria*, le cui specie sono molto comuni, non è mai stato studiato criticamente e conta diverse entità mai rivedute in tempi moderni. Fra queste ultime, quelle di Berlese sono state indicate come specie inquirende; un'altra, *Oribates languidus* Nicolet, 1855, pur essendo citata per l'Italia settentrionale (Bassano del Grappa) da G. Canestrini (1885), è completamente sparita dalla letteratura dal 1898. Non ho ritenuto opportuno, quindi, caricare la lista di un altro nome, al quale non corrisponde oggi alcuna entità precisa.
Achipteria acuta: Species inquirenda, anche se recentemente è stata suggerita la sua sinonimia con *A. nitens* (Nicolet, 1855).

Achipteria imperialis: Specie inquirenda.

Achipteria moderator: Specie inquirenda.

Achipteria regalis: Specie inquirenda.

Parachipteria fanzagoi: Nel 1883 Berlese nella sua descrizione degli Acari italiani (AMS. It.) ribattezzò nicoletii l'*Oribates ovalis* Nicolet, 1855, perché il nome era preoccupato da *O. ovalis* C.L. Koch, 1835. Tuttavia, come rilevato da André, (1925 - Bull. Mus. Nat. Hist. Natur., Paris, 2e sér., 31: 243-247) prima e da Jacot, (1929 - Trans. Amer. Microsc. Soc., 48: 416-430) poi, Berlese rappresentò nicoletii con una figura relativa ad una specie appartenente addirittura ad un altro genere (*Parachipteria*). Jacot chiamò la specie raffigurata da Berlese, fanzagoi. Il lavoro di Jacot è evidentemente sfuggito al recentissimo revisore del materiale della Collezione Berlese, che ha erroneamente rivalutato il nome nicoletii, andato nel frattempo in sinonimia con *Achipteria coleoptrata* di Linneo. Con tali premesse, quindi, per l'art. 72e del Codice di Nomenclatura Zoologica, il nome valido per la specie che aveva fornito il soggetto dell'illustrazione di Berlese è fanzagoi Jacot, 1929.

Galumnidae

Acrogalumna Grandjean, 1956

Acrogalumna longipluma (Berlese, 1904) (N, S, Si, Sa)

Allogalumna Grandjean, 1936

Allogalumna alamellae (Jacot, 1935) (N, S)

Allogalumna integer (Berlese, 1904) (N, S)

Allogalumna italica (Jacot, 1935) (N)

Allogalumna parva (Berlese, 1916) (N)

Allogalumna cf. subaequalis Mihelcic, 1956 (S, Sa)

Centroribates Berlese, 1914

Centroribates mucronatus (G. Canestrini & R. Canestrini, 1882) (N, S)

Cryptogalumna Grandjean, 1957

Cryptogalumna cryptodonta Grandjean, 1957 (Si, Sa)

Galumna von Heyden, 1826

Galumna alata (Hermann, 1804) (N, S, Si)

Galumna elimata (C.L. Koch, 1841) (N, S, Si, Sa)

Galumna europaea (Berlese, 1914) (N, S)

Galumna flagellata Willmann, 1923 (N)

Galumna lanceata (Oudemans, 1900) (N, S, Si)

Galumna obvia (Berlese, 1914) (N, S, Sa)

Galumna tarsipennata Oudemans, 1913 (N, S, Si, Sa)

Pergalumna Grandjean, 1936

- Pergalumna altera* (Oudemans, 1915) (N, S, Si?)
- Pergalumna dorsalis* (C.L. Koch, 1841) (N, Sa)
- Pergalumna formicaria* (Berlese, 1914) (N, S)
- Pergalumna myrmophila* (Berlese, 1914) (N, S, Si)
- Pergalumna nervosa* (Berlese, 1914) (N, S, Sa)

Pilogalumna Grandjean, 1956

- Pilogalumna crassiclava* (Berlese, 1914) (N, S, Si, Sa)
- Pilogalumna ornatula* Grandjean, 1956 (Si)
- Pilogalumna tenuiclava* (Berlese, 1908) (N, S)

Vaghia Oudemans, 1919

- Vaghia simplex* Travé, 1957 (Si)
- Vaghia stupenda* (Berlese, 1916) (N) (E)

Acaridida

Histiostomatidae

Anoetus Dujardin, 1842

- Anoetus curtipes* (Berlese, 1910) (Si)
- Anoetus privorai* Samsinak, 1962 (Si)

Glyphanoetus Oudemans, 1929

- Glyphanoetus phyllotrichus* (Berlese, 1883) (N)
- Glyphanoetus venustissimus* (Berlese, 1918) (S)

Histiostoma Kramer, 1876

- Histiostoma feroniarum* (Dufour, 1839) (N, S)
- Histiostoma flagellifer* Leonardi, 1897 (S)
- Histiostoma julorum* (C.L. Koch, 1843) (N)
- Histiostoma pyriforme* Michael, 1901 (S)
- Histiostoma sapromyzarum* (Dufour, 1839) (N)

Myianoetus Oudemans, 1929

- Myianoetus muscarum* (Linnaeus, 1758) (N, S)

Rhopalanoetus Scheucher, 1957

Rhopalanoetus fimetarius (G. Canestrini & Berlese, 1881) (N, S)

Canestriniidae

Canestrinia Berlese, 1881

Canestrinia carabicola Berlese, 1882 (Si, Sa)

Canestrinia dorcicola Berlese, 1881 (N, S)

Canestrinia orientalis Samsinak, 1971 (N)

Canestrinia pentodontis Berlese, 1898 (N, S)

Canestrinia roberti Haitlinger, 1989 (N)

Coleopterophagus Berlese, 1882

Coleopterophagus donaldi Haitlinger, 1990 (N)

Coleopterophagus megninii (Berlese, 1881) (N, S, Si)

Dicanestrinia Berlese, 1911

Dicanestrinia cerambicis (G. Canestrini, 1878) (N)

***Percanestrinia* (*Percanestrinia*)** Berlese, 1911

Percanestrinia (*Percanestrinia*) *blaptis* (G. Canestrini & Berlese, 1881) (N, S, Si, Sa)

Percanestrinia (*Percanestrinia*) *maroccana* Cooreman, 1953 (*)

***Percanestrinia* (*Lombardiniella*)** Cooreman, 1950

Percanestrinia (*Lombardiniella*) *gentilis* Lombardini, 1944 (N) (*)

Photia Oudemans, 1904

Photia procera (Berlese, 1911) (N)

Photia procustae (Berlese, 1881) (N, S)

Procericola Cooreman, 1950

Procericola ichthyoides Cooreman, 1950 (N)

Pseudamansia Cooreman, 1950

Pseudamansia chrysomelina (C.L. Koch, 1841) (N)

Note

Percanestrinia (*Percanestrinia*) *maroccana*: Non è specificata l'esatta località di raccolta.

Percanestrinia (Lombardiniella) gentilis: La letteratura più recente esclude che questa specie faccia parte del genere *Percanestrinia*, senza, peraltro, indicare la collocazione sistematica di questa entità, la cui identità è forse tutta da precisare.

Chaetodactylidae

Chaetodactylus (Chaetodactylus) Rondani, 1866

Chaetodactylus (Chaetodactylus) osmiae (Dufour, 1839) (S)

Chaetodactylus (Spinodactylus) Fain, 1981

Chaetodactylus (Spinodactylus) claviger Oudemans, 1928 (*)

Sennertia (Sennertia) Oudemans, 1905

Sennertia (Sennertia) cerambycina (Scopoli, 1763) (N, S)

Note

Chaetodactylus (Spinodactylus) claviger: Non è specificata l'esatta località di raccolta.

Carpoglyphidae

Carpoglyphus Robin, 1869

Carpoglyphus lactis (Linnaeus, 1758) (N, S)

Carpoglyphus vagabundus Berlese, 1910 (S)

Algophagidae

Hericia G. Canestrini, 1888

Hericia hericia (Robin, 1868) (*)

Note

Hericia hericia: Specie la cui presenza in Italia è ambigualmente documentata, ma estremamente probabile.

Hemisarcoptidae

Hemisarcoptes Lignières, 1893

Hemisarcoptes malus (Shimer, 1868) (S, Si)

Linobia Berlese, 1884

Linobia coccinellae (Scopoli, 1763) (N, S)

Winterschmidtidae

Saproglyphus Berlese, 1889

Saproglyphus neglectus Berlese, 1889 (N)

Ensliniella Vitzthum, 1925

Ensliniella parasitica Vitzthum, 1925 (*)

Calvolia Oudemans, 1911

Calvolia hebeclinii (Sicher, 1899) (N, Si, Sa)

Calvolia striata Vitzthum, 1922 (*)

Calvolia transversostriata (Oudemans, 1931) (*)

Vidia Oudemans, 1905

Vidia lineata Oudemans, 1917 (N)

Vidia undulata Oudemans, 1905 (N)

Winterschmidtia Oudemans, 1923

Winterschmidtia crassisetosa Willmann, 1939 (S)

Note

Ensliniella parasitica: Non è specificata l'esatta località di raccolta.

Calvolia striata: Non è specificata l'esatta località di raccolta.

Calvolia transversostriata: Non è specificata l'esatta località di raccolta.

Chortoglyphidae

Chortoglyphus Berlese, 1884

Chortoglyphus arcuatus (Troupeau, 1879) (N, S)

Echimyopodidae

Blomia Oudemans, 1928

Blomia thori Zachvatkin, 1936 (N)

Aeroglyphidae

Aeroglyphus Zachvatkin, 1941

Aeroglyphus peregrinans (Berlese, 1892) (N, S)

Rosensteiniidae

Nycteriglyphus Zachvatkin, 1941

Nycteriglyphus pterophorus (Berlese, 1891) (N)

Glycyphagidae

Glycyphagus Hering, 1838

Glycyphagus domesticus (De Geer, 1778) (N, S, Si, Sa)

Glycyphagus ornatus Kramer, 1881 (N, S)

Glycyphagus privatus Oudemans, 1903 (N, S, Sa)

Ctenoglyphus Berlese, 1884

Ctenoglyphus canestrinii (Armanelli, 1887) (N, S)

Ctenoglyphus multifolius Zachvatkin, 1941 (N)

Ctenoglyphus palmifer (Fumouze & Robin, 1868) (N, S)

Ctenoglyphus plumiger (C.L. Koch, 1835) (N, S)

Dermacarus Haller, 1880

Dermacarus fuliginosus (Berlese, 1920) (S)

Dermacarus sciurinus (C.L. Koch, 1841) (N, S)

Diamesoglyphus Zachvatkin, 1941

Diamesoglyphus intermedius (G. Canestrini, 1888) (N, S)

Gohieria Oudemans, 1939

Gohieria fusca (Oudemans, 1902) (N, S, Si)

Labidophorus Kramer, 1877

Labidophorus talpae (Kramer, 1877) (N, Sa)

Lepidoglyphus Zachvatkin, 1936

Lepidoglyphus destructor (Schränk, 1781) (N, S, Si)

Orycteroxenus Zachvatkin, 1941

Orycteroxenus dispar (Michael, 1886) (S)

Xenoryctes Zachvatkin, 1941

Xenoryctes krameri (Michael, 1886) (N, S)

Suidasiidae

Suidasia Oudemans, 1905

Suidasia nesbitti Hughes, 1948 (*)

Tortonia (Donnadieuia) Zachvatkin, 1941

Tortonia (Donnadieuia) dogressa Zachvatkin, 1941 (N)

Note

Suidasia nesbitti: Non è specificata l'esatta località di raccolta. Comunque, si tratta di una specie circumtropicale, probabilmente pervenuta in Italia attraverso l'importazione di derrate alimentari.

Acaridae

Acarus Linnaeus, 1758

Acarus calcarabellus (Griffiths, 1965) (N)

Acarus chaetoxysilos Griffiths, 1970 (N)

Acarus farris (Oudemans, 1905) (N, S)

Acarus gracilis Hughes, 1957 (N)

Acarus immobilis Griffiths, 1964 (N)

Acarus nidicolus Griffiths, 1970 (N, S)

Acarus siro (Linnaeus, 1758) (N, S)

Acotyledon Oudemans, 1903

Acotyledon agilis (G. Canestrini, 1888) (N, S)

Acotyledon krameri (Berlese, 1881) (N, S)

Aleuroglyphus Zachvatkin, 1935

Aleuroglyphus ovatus (Troupeau, 1878) (S)

Aleuroglyphus siculus (Fumouze & Robin, 1867) (Si)

Histiogaster Berlese, 1883

Histiogaster carpio (Kramer, 1881) (S)

Histiogaster silenus Zachvatkin, 1941 (N)

Rhizoglyphus Claparède, 1869

Rhizoglyphus algidus Berlese, 1920 (N) (*)

Rhizoglyphus echinopus (Fumouze & Robin, 1868) (N, S, Si)

Rhizoglyphus eutarsus Berlese, 1920 (Si) (*)

Rhizoglyphus globosus Berlese, 1920 (S) (*)

Rhizoglyphus occurrens Berlese, 1920 (S) (*)

Rhizoglyphus robini Claparède, 1869 (N)

Rhizoglyphus sportilionis Lombardini, 1947 (N, S) (*)

Rhizoglyphus trouessarti Berlese, 1897 (*)

Sancassania Oudemans, 1916

Sancassania berlesei (Michael, 1903) (S)

Sancassania mycophaga (Ménin, 1874) (N, S)

Sancassania oudemansi (Zachvatkin, 1937) (*)

Sancassania regleri (E. Türk & F. Türk, 1957) (N)

Scatoglyphus Berlese, 1913

Scatoglyphus polytrematus Berlese, 1913 (S)

***Schwiebea* (*Schwiebea*)** Oudemans, 1916

Schwiebea (*Schwiebea*) *cavernicola* Vitzthum, 1932 (N)

Schwiebea (*Schwiebea*) *eury nymphae* (Oudemans, 1911) (N)

***Schwiebea* (*Jacotietta*)** Fain, 1977

Schwiebea (*Jacotietta*) *codognoensis* Fain & Pagani, 1989 (N)

Schwiebea (*Jacotietta*) *italica* Oudemans, 1924 (Si) (*)

Sennertionyx Zachvatkin, 1941

Sennertionyx manicati (Giard, 1900) (S)

Tyrophagus Oudemans, 1924

Tyrophagus longior (Gervais, 1844) (N, S)
Tyrophagus neiswanderi Johnson & Bruce, 1965 (N, Si)
Tyrophagus palmarum Oudemans, 1924 (N, Si)
Tyrophagus putrescentiae (Schrank, 1781) (N, S, Si)
Tyrophagus similis Volgin, 1949 (N)
Tyrophagus tropicus Robertson, 1959 (Si)

Thyreophagus Rondani, 1874

Thyreophagus aleurophagus (Sicher, 1894) (Si)
Thyreophagus berlesianus Zachvatkin, 1941 (Si)
Thyreophagus cooremani Fain, 1982 (Si)
Thyreophagus corticalis (Michael, 1885) (N, S, Si, Sa)
Thyreophagus entomophagus (Laboulbène, 1852)
Thyreophagus entomophagus italicus Vacante, 1989 (N, S, Si)
Thyreophagus gallegoi (Portus & Gomez, 1979) (Si)
Thyreophagus magnus Berlese, 1910 (Si)

Tyrolichus Oudemans, 1924

Tyrolichus casei (Oudemans, 1910) (N)

Note

Acarus: Genere la cui sistematica non è molto chiara e conta numerose entità senza una precisa identità. Due di queste, descritte per l'Italia, *caudatus* G. Canestrini & Fanzago, 1877 e *concianus* Lombardini, 1953 non vengono qui trattati.

Rhizoglyphus algidus: Species inquirenda.

Rhizoglyphus eutarsus: Species inquirenda.

Rhizoglyphus globosus: Species inquirenda.

Rhizoglyphus occurs: Species inquirenda.

Rhizoglyphus sportilionis: Species inquirenda.

Rhizoglyphus trouessarti: Species inquirenda, la cui presenza in Italia è, peraltro, ambiguamente documentata.

Sancassania: Al momento della istituzione del genere *Caloglyphus*, Berlese nel 1923 vi incluse una specie, *robustipes*, mai descritta; questo deve essere, dunque, ritenuto un nomen nudum.

Sancassania oudemansi: Non è specificata l'esatta località di raccolta.

Schwiebea (*Jacotietta*) *italica*: Specie tropicale (Giava), raccolta nel porto di Palermo, e descritta con un nome, forse, non molto appropriato.

Hypoderatidae

Hypodectes (*Hypodectes*) Filippi, 1861

Hypodectes (Hypodectes) nycticoracis Filippi, 1861 (N)

Hypodectes (Hypodectoides) Fain & Bafort, 1966

Hypodectes (Hypodectoides) propus (Nitzsch, 1861) (N)

Tytodectes (Tytodectes) Fain, 1966

Tytodectes (Tytodectes) strigis (Gené, 1848) (N)

Tytodectes (Ispidectes) Fain, 1967

Tytodectes (Ispidectes) alcedinis (Filippi, 1861) (N)

Eustathiidae

Chauliacia Oudemans, 1905

Chauliacia securigera (Robin, 1877) (N)

Eustathia Oudemans, 1905

Eustathia cultrifera (Robin, 1877) (N, S)

Neochauiacia Gaud & Atyeo, 1967

Neochauiacia miniscula Gaud & Atyeo, 1967 (*)

Neochauiacia varians (Trouessart in Berlese, 1898) (*)

Note

Neochauiacia miniscula: Non è specificata l'esatta località di raccolta.

Neochauiacia varians: Non è specificata l'esatta località di raccolta.

Falculiferidae

Falculifer Railliet, 1896

Falculifer rostratus (Buchholz, 1869) (N, S, Sa)

Pterophagus Robin & Mégnin, 1877

Pterophagus strictus Mégnin, 1877 (N, S)

Gabuciniidae

Coraciacarus Dubinin, 1956

Coraciacarus cuculi (Méglin & Trouessart, 1884) (*)
Coraciacarus meropsi Dubinin, 1956 (S)

Gabucinia Oudemans, 1905

Gabucinia delibata (Robin, 1877) (S)
Gabucinia eventrata (Méglin & Trouessart, 1884) (*)
Gabucinia otidis (Méglin & Trouessart, 1884) (*)
Gabucinia urogalli (Nörner, 1883) (*)

Hieracolicus Gaud & Atyeo, 1974

Hieracolicus nisi (G. Canestrini, 1878) (N)

Note

Coraciacarus cuculi: Non è specificata l'esatta località di raccolta.

Gabucinia eventrata: Specie la cui presenza in Italia è ambiguamente documentata, ma estremamente probabile.

Gabucinia otidis: Non è specificata l'esatta località di raccolta.

Gabucinia urogalli: Specie la cui presenza in Italia è ambiguamente documentata, ma estremamente probabile.

Kramerellidae

Dermonoton Gaud & Mouchet, 1959

Dermonoton parallelus (Méglin & Trouessart, 1884) (*)

Freyanopterolichus Dubinin, 1953

Freyanopterolichus pelargicus (Trouessart & Méglin, 1884) (*)

Kramerella Trouessart, 1915

Kramerella bubonis (Lonnfors, 1937) (S)
Kramerella lunulata (Haller, 1878) (N)
Kramerella lyra (G. Canestrini, 1878) (N)
Kramerella major (Haller, 1878) (*)

Neopetitota Gaud, 1983

Neopetitota aluconis (Buchholz, 1869) (*)

***Pseudogabucinia* Cerny, 1961**

Pseudogabucinia ciconiae (G. Canestrini & Berlese, 1881) (S)

Pseudogabucinia intermedia (Méglin & Trouessart, 1884) (*)

Note

Dermonoton parallelus: Specie la cui presenza in Italia è ambiguamente documentata, ma estremamente probabile.

Freyanopterolichus pelargicus: Specie la cui presenza in Italia è ambiguamente documentata, ma estremamente probabile.

Kramerella major: Specie la cui presenza in Italia è ambiguamente documentata, ma estremamente probabile.

Neopetiotota aluconis: Specie la cui presenza in Italia è ambiguamente documentata, ma estremamente probabile.

Pseudogabucinia intermedia: Specie la cui presenza in Italia è ambiguamente documentata, ma estremamente probabile.

Pterolichidae

***Ardeacarus* Dubinin, 1951**

Ardeacarus ardeae (G. Canestrini, 1878) (N, S)

***Cynthiura* Hull, 1934**

Cynthiura aquilina (Trouessart, 1885) (*)

***Geranolichus* Gaud, 1968**

Geranolichus gruis (Méglin & Trouessart, 1884) (*)

***Grallobia* Hull, 1934**

Grallobia fulicae Trouessart, 1885 (*)

Grallobia porzanae (G. Canestrini, 1878) (N)

Grallobia rallorum (Robin, 1877) (*)

***Grallolichus* Gaud, 1960**

Grallolichus proctogamus (Trouessart, 1885) (N)

***Laronyssus* Dubinin, 1951**

Laronyssus marinus (Trouessart, 1886) (*)

Laronyssus martini (Trouessart, 1885) (*)

Montchadskiana Dubinin, 1951

Montchadskiana buchholzi (G. Canestrini, 1878) (*)
Montchadskiana fascigera (Méglin & Trouessart, 1884) (*)
Montchadskiana hastigera (Méglin & Trouessart, 1884) (*)
Montchadskiana securicata (Méglin & Trouessart, 1884) (*)

Pelargolichus Gaud, 1982

Pelargolichus didactylus (Trouessart, 1885) (*)

Pseudalloptes Trouessart & Méglin, 1884

Pseudalloptes bimucronatus Trouessart, 1884 (*)
Pseudalloptes bisubulatus (Robin, 1877) (*)

Pseudalloptinus Dubinin, 1956

Pseudalloptinus milvulinus (Trouessart, 1884) (*)

Pseudolichus Atyeo & Gaud, 1992

Pseudolichus solutocurtus (Dubinin, 1956) (N)

Pterolichus Robin, 1868

Pterolichus minor Méglin & Trouessart, 1884 (*)
Pterolichus obtusus Robin, 1877 (*)

Pterygocrusolichus Dubinin, 1955

Pterygocrusolichus chanayi (Trouessart, 1885) (*)

Tryphyllochaeta Dubinin, 1956

Tryphyllochaeta vanelli (G. Canestrini, 1878) (N)

Xoloptes G. Canestrini, 1879

Xoloptes claudicans (Robin, 1877) (N, S)

Note

Cynthiura aquilina: Specie la cui presenza in Italia è ambiguamente documentata, ma estremamente probabile.

Geranolichus gruis: Specie la cui presenza in Italia è ambiguamente documentata, ma estremamente probabile.

Grallobia fulicae: Non è specificata l'esatta località di raccolta.

Grallobia rallorum: Specie la cui presenza in Italia è ambiguamente documentata, ma estremamente probabile.

Laronyssus marinus: Specie la cui presenza in Italia è ambiguamente documentata, ma estremamente probabile.

Laronyssus martini: Specie la cui presenza in Italia è ambiguamente documentata, ma estremamente probabile.

Montchadskiana buchholzi: Non è specificata l'esatta località di raccolta.

Montchadskiana fascigera: Non è specificata l'esatta località di raccolta.

Montchadskiana hastigera: Non è specificata l'esatta località di raccolta.

Montchadskiana securicata: Non è specificata l'esatta località di raccolta.

Pelargolichus didactylus: Specie, la cui presenza in Italia è ambiguamente documentata, ma estremamente probabile.

Pseudalloptes bimucronatus: Specie la cui presenza in Italia è ambiguamente documentata, ma estremamente probabile.

Pseudalloptes bisubulatus: Specie la cui presenza in Italia è ambiguamente documentata, ma estremamente probabile.

Pseudalloptinus milvulinus: Non è specificata l'esatta località di raccolta.

Pterolichus minor: Non è specificata l'esatta località di raccolta.

Pterolichus obtusus: Non è specificata l'esatta località di raccolta.

Pterygocrusolichus chanayi: Specie la cui presenza in Italia è ambiguamente documentata, ma estremamente probabile.

Ptiloxenidae

Ptiloxenus Hull, 1934

Ptiloxenus colymbi (G. Canestrini, 1878) (*)

Ptiloxenus major (Méglin & Trouessart, 1884) (*)

Ptiloxenus phoenicopteri (Méglin & Trouessart, 1884) (*)

Sokoloviana Dubinin, 1951

Sokoloviana rehbergi (G. Canestrini & Berlese, 1881) (Sa)

Sokoloviana gracilis (Méglin & Trouessart, 1884) (*)

Note

Ptiloxenus colymbi: Non è specificata l'esatta località di raccolta.

Ptiloxenus major: Non è specificata l'esatta località di raccolta.

Ptiloxenus phoenicopteri: Non è specificata l'esatta località di raccolta.

Sokoloviana gracilis: Non è specificata l'esatta località di raccolta.

Syringobiidae

Inermodorsus Gaud & Mouchet, 1959

Inermodorsus semaphorus (Trouessart, 1886) (*)

Leptosyringobia Vasyukova & Mironov, 1991

Leptosyringobia longitarsa (Méglin & Trouessart, 1884) (*)

Phyllochaeta Dubinin, 1956

Phyllochaeta bouveti (Méglin & Trouessart, 1884) (*)

Phyllochaeta interifolia (Méglin & Trouessart, 1884) (*)

Phyllochaeta setigera (Méglin & Trouessart, 1884) (*)

Phyllochaeta trouessarti (Berlese, 1897) (*)

Plutarchusia Oudemans, 1904

Plutarchusia chelopus Oudemans, 1904 (*)

Sikyonemus Gaud, 1966

Sikyonemus diplectron (Trouessart in Berlese, 1896) (*)

Syringobia Trouessart & Neumann, 1888

Syringobia chelopus Trouessart & Neumann, 1888 (*)

Syringobia tricalcarata Trouessart & Neumann, 1888 (*)

Thecarthra (Thecarthra) Trouessart, 1896

Thecarthra (Thecarthra) theca (Méglin & Trouessart, 1884) (*)

Thecarthra (Plutarchia) Oudemans, 1904

Thecarthra (Plutarchia) simplex (Trouessart, 1886) (*)

Thecarthra (Plutarchia) simplex simplex (Trouessart, 1886)

Thecarthra (Plutarchia) simplex tyroglyphina (Trouessart & Neumann, 1888)

Xiphiurus Gaud & Mouchet, 1959

Xiphiurus xiphiurus (Trouessart, 1885) (*)

Note

Inermodorsus semaphorus: Specie la cui presenza in Italia è ambiguamente documentata, ma estremamente probabile.

Leptosyringobia longitarsa: Non è specificata l'esatta località di raccolta.

Phyllochaeta bouveti: Specie la cui presenza in Italia è ambiguamente documentata, ma estremamente probabile.

Phyllochaeta interifolia: Specie la cui presenza in Italia è ambiguamente documentata, ma estremamente probabile.

Phyllochaeta setigera: Specie la cui presenza in Italia è ambiguamente documentata, ma estremamente probabile.

Phyllochaeta trouessarti: Specie la cui presenza in Italia è ambiguamente documentata, ma estremamente probabile.

Plutarchusia chelopus: Non è specificata l'esatta località di raccolta.

Sikyonemus diplectron: Non è specificata l'esatta località di raccolta.

Syringobia chelopus: Specie la cui presenza in Italia è ambiguamente documentata, ma estremamente probabile.

Syringobia tricalcarata: Specie la cui presenza in Italia è ambiguamente documentata, ma estremamente probabile.

Thecarthra (Thecarthra) theca: Specie la cui presenza in Italia è ambiguamente documentata, ma estremamente probabile.

Thecarthra (Plutarchia) simplex: La presenza e la diffusione in Italia delle due sottospecie, simplex e tyroglyphina, per quanto ambiguamente documentate, sono estremamente probabili.

Xiphiurus xiphiurus: Specie la cui presenza in Italia è ambiguamente documentata, ma estremamente probabile.

Freyanidae

Burhinacarus Dubinin, 1955

Burhinacarus pallidus (Méglin & Trouessart, 1884) (*)

Freyana Haller, 1877

Freyana anatina (C.L. Koch, 1844) (N, S)

Freyana anserina Trouessart & Méglin, 1884 (*)

Freyana armata Trouessart & Méglin, 1884 (*)

Freyana largifolia Trouessart & Méglin, 1884 (*)

Freyana simplex Trouessart & Méglin, 1884 (*)

Halleria Trouessart & Méglin, 1885

Halleria hirsutirostris Trouessart & Méglin, 1885 (*)

Michaelia Trouessart, 1884

Michaelia heteropus (Michael, 1881) (*)

Sulanyssus Dubinin, 1953

Sulanyssus caputmedusae (Trouessart, 1886) (*)

Note

Burhinacarus pallidus: Specie la cui presenza in Italia è ambigualmente documentata, ma estremamente probabile.

Freyana anserina: Specie la cui presenza in Italia è ambigualmente documentata, ma estremamente probabile.

Freyana armata: Non è specificata l'esatta località di raccolta.

Freyana largifolia: Non è specificata l'esatta località di raccolta.

Freyana simplex: Non è specificata l'esatta località di raccolta. Anche l'identità della specie lascia alcuni dubbi.

Halleria hirsutirostris: Specie la cui presenza in Italia è ambigualmente documentata, ma estremamente probabile.

Michaelia heteropus: Specie la cui presenza in Italia è ambigualmente documentata, ma estremamente probabile.

Sulanyssus caputmedusae: Non è specificata l'esatta località di raccolta.

Pyroglyphidae

Dermatophagoides Bogdanov, 1864

Dermatophagoides farinae Hughes, 1961 (N, S)

Dermatophagoides microceras Griffiths & Cunnington, 1971 (Si) (*)

Dermatophagoides pteronyssinus (Trouessart, 1898) (N, S, Sa)

Dermatophagoides scheremetewskyi Bogdanov, 1864 (N)

Euroglyphus (Euroglyphus) Fain, 1965

Euroglyphus (Euroglyphus) maynei (Cooreman, 1950) (N, S, Si, Sa)

Hirstia Hull, 1931

Hirstia chelidonis Hull, 1931 (S)

Note

Dermatophagoides microceras: Non è specificata l'esatta località di raccolta, tuttavia Castagnoli e Nannelli (dato inedito) hanno raccolto questa specie in Sicilia.

Alloptidae

Alloptes G. Canestrini, 1879

Alloptes conurus Trouessart, 1885 (*)

Alloptes crassipes (G. Canestrini, 1878) (N, S)

Alloptes curtipes Trouessart, 1886 (*)

Alloptes minor Trouessart, 1885 (*)

Brephosceles Hull, 1934

Brephosceles forficiger (Méglin & Trouessart, 1884) (*)

Brephosceles haematopi Peterson, 1971 (Sa)

Dichobrephosceles Peterson & Atyeo, 1968

Dichobrephosceles actitidis (G. Canestrini, 1878) (*)

Dolichodectes Park & Atyeo, 1971

Dolichodectes edwardsii (Trouessart, 1885) (*)

Microspalax Méglin & Trouessart, 1884

Microspalax brevipes Méglin & Trouessart, 1884 (*)

Microspalax manicata Méglin & Trouessart, 1884 (*)

Pseudalges Robin, 1868

Pseudalges analgoides (Trouessart, 1885) (*)

Psilobrephosceles Peterson & Atyeo, 1968

Psilobrephosceles ortygometrae (G. Canestrini, 1878) (N)

Note

Alloptes conurus: Non è specificata l'esatta località di raccolta.

Alloptes curtipes: Non è specificata l'esatta località di raccolta.

Alloptes minor: Non è specificata l'esatta località di raccolta.

Brephosceles forficiger: Non è specificata l'esatta località di raccolta.

Dichobrephosceles actitidis: Non è specificata l'esatta località di raccolta.

Dolichodectes edwardsii: Non è specificata l'esatta località di raccolta.

Microspalax brevipes: Non è specificata l'esatta località di raccolta.

Microspalax manicata: Non è specificata l'esatta località di raccolta.

Pseudalges analgoides: Specie la cui presenza in Italia è ambigualmente documentata, ma estremamente probabile.

Analgidae

Analg Nitzsch, 1818

Analg accentorinus Jucci, 1926 (*)

Analg anthi Mironov, 1985 (S)

Analg bidentatus Giebel, 1871 (N, Sa)

Analg chelopus (Hermann, 1804) (N, S)

Analges corvinus Mégnin, 1877 (S)
Analges mucronatus (Buchholz, 1869) (N, S)
Analges pachynemis (Giebel, 1871) (S)
Analges passerinus (Linnaeus, 1758) (N, S)
Analges spiniger Giebel, 1871 (S, Sa)
Analges sturninus Gaud, 1973 (*)
Analges tridentulatus Haller, 1882 (S)
Analges unidentatus Berlese, 1886 (*)

Anhemialges Gaud & Mouchet, 1959

Anhemialges subintegra (Berlese, 1886) (*)

Cypselalges Gaud & Atyeo, 1991

Cypselalges aestivalis (Berlese, 1886) (*)

Diplaegidia Hull, 1934

Diplaegidia columbae (Buchholz, 1869) (*)
Diplaegidia microdiscus (Trouessart, 1886) (*)

Megninia Berlese, 1883

Megninia cubitalis (Mégnin, 1877) (N, S)
Megninia ginglymura (Mégnin, 1877) (S)

Megniniella Gaud & Mouchet, 1959

Megniniella gallinulae (Buchholz, 1869) (N)
Megniniella major (Berlese, 1886) (*)
Megniniella obesa Gaud, 1968 (Sa)

Metanalges Trouessart, 1919

Metanalges appendiculata (Haller, 1882) (*)
Metanalges grossa (Berlese, 1898) (S)
Metanalges rallorum (Trouessart, 1885) (S)

Note

Analges accentorinus: Non è specificata l'esatta località di raccolta.
Analges sturninus: Non è specificata l'esatta località di raccolta.
Analges unidentatus: Non è specificata l'esatta località di raccolta.
Anhemialges subintegra: Non è specificata l'esatta località di raccolta.
Cypselalges aestivalis: Non è specificata l'esatta località di raccolta.
Diplaegidia columbae: Non è specificata l'esatta località di raccolta.
Diplaegidia microdiscus: Specie la cui presenza in Italia è ambigualmente documentata, ma

estremamente probabile.

Megniniella major: Non è specificata l'esatta località di raccolta.

Metanalges appendiculata: Non è specificata l'esatta località di raccolta.

Apionacaridae

Spaerogastra Trouessart in Berlese, 1897

Spaerogastra thylacodes Trouessart, 1897 (*)

Note

Spaerogastra thylacodes: Non è specificata l'esatta località di raccolta.

Avenzoariidae

Avenzoaria Oudemans, 1905

Avenzoaria totani (G. Canestrini, 1878) (N)

Bdellorhyncus Trouessart, 1885

Bdellorhyncus polymorphus Trouessart, 1885 (N)

Bonnetella Trouessart, 1924

Bonnetella fusca (Nitzsch, 1818) (N)

Bregetovia Dubinin, 1951

Bregetovia limosae (Buchholz, 1869) (*)

Bregetovia mucronata (Méglin & Trouessart, 1884) (*)

Bregetovia selenura (Méglin & Trouessart, 1884) (*)

Bychovskiata Dubinin, 1951

Bychovskiata charadrii (G. Canestrini, 1878) (N)

Bychovskiata squatarolae (G. Canestrini, 1878) (N)

Bychovskiata subcharadrii Dubinin, 1951 (Sa)

Parapteronyssus Faccini & Atyeo, 1981

Parapteronyssus brevipes (Berlese, 1885) (S)

Pomeranzevia Dubinin, 1951

Pomeranzevia ninnii (G. Canestrini, 1878) (N)
Pomeranzevia numenii (G. Canestrini, 1878) (N)

Pteroherpus Gaud, 1981

Pteroherpus pallens (Berlese, 1886) (S)

Pteronyssoides Hull, 1931

Pteronyssoides nuntiaeveris (Berlese, 1886) (N, S)
Pteronyssoides obscurus (Berlese, 1885) (N)
Pteronyssoides ottuki Chirov & Mironov, 1983 (S)
Pteronyssoides parinus (C.L. Koch, 1840) (N, S, Sa)
Pteronyssoides striatus (Robin, 1877) (N, S)

Pteronyssus Robin, 1868

Pteronyssus integer Trouessart & Neumann, 1888 (*)
Pteronyssus pici (Scopoli, 1763) (S)
Pteronyssus picinus (C.L. Koch, 1841) (S)
Pteronyssus robinii Berlese, 1886 (*)

***Scutomegninia* (*Scutomegninia*)** Dubinin, 1951

Scutomegninia (*Scutomegninia*) *serrulata* (Berlese, 1898) (*)

***Scutomegninia* (*Ibidomegninia*)** Mironov, 1990

Scutomegninia (*Ibidomegninia*) *ibidis* (Trouessart, 1885) (*)

Scutulanyssus Mironov, 1985

Scutulanyssus truncatus (Trouessart, 1885) (S)

Zachvatkinia Dubinin, 1949

Zachvatkinia puffini (Buchholz, 1869) (N, S)

Zygochelifer Atyeo, 1984

Zygochelifer flammeus Atyeo, 1984 (Sa)

Note

Bregetovia limosae: Non è specificata l'esatta località di raccolta.
Bregetovia mucronata: Non è specificata l'esatta località di raccolta.
Bregetovia selenura: Non è specificata l'esatta località di raccolta.
Pteronyssus integer: Specie la cui presenza in Italia è ambigualmente documentata, ma

estremamente probabile.

Pteronyssus robinii: Specie la cui presenza in Italia è ambiguamente documentata, ma estremamente probabile.

Scutomegninia (Scutomegninia) serrulata: Non è specificata l'esatta località di raccolta.

Scutomegninia (Ibidomegninia) ibidis: Specie la cui presenza in Italia è ambiguamente documentata, ma estremamente probabile.

Dermoglyphidae

Dermoglyphus Mégnin, 1877

Dermoglyphus columbae (Sugimoto, 1940) (S)

Dermoglyphus elongatus Mégnin, 1877 (*)

Dermoglyphus varians (Trouessart, 1886) (*)

Gaudoglyphus Bruce & Johnston, 1976

Gaudoglyphus minor (Nörner, 1882) (*)

Note

Dermoglyphus elongatus: Specie la cui presenza in Italia è ambiguamente documentata, ma estremamente probabile.

Dermoglyphus varians: Specie la cui presenza in Italia è ambiguamente documentata, ma estremamente probabile.

Gaudoglyphus minor: Specie la cui presenza in Italia è ambiguamente documentata, ma estremamente probabile.

Epidermoptidae

Dermation Trouessart & Neumann, 1888

Dermation bihamatum (Trouessart & Neumann, 1888) (*)

Epidermoptes (Epidermoptes) Rivolta, 1876

Epidermoptes (Epidermoptes) bilobatus Rivolta, 1876 (S)

Microlichus Trouessart & Neumann, 1888

Microlichus avus (Trouessart, 1887) (N)

Microlichus perdicis G. Canestrini, 1894 (N)

Passeroptes (Passeroptes) Fain, 1964

Passeroptes (Passeroptes) dermicola (Trouessart, 1886) (*)

Passeroptes (Passeroptes) latior (G. Canestrini, 1894) (N)

Rivoltasia G. Canestrini, 1894

Rivoltasia bifurcata (Rivolta, 1876) (N)

Rivoltasia major Berlese, 1897 (*)

Strelkoviacarus Dubinin, 1953

Strelkoviacarus quadratus (Haller, 1882) (*)

Note

Dermation bihamatum: Specie la cui presenza in Italia è ambigualmente documentata, ma estremamente probabile.

Passeroptes (Passeroptes) dermicola: Non è specificata l'esatta località di raccolta.

Rivoltasia major: Non è specificata l'esatta località di raccolta, l'identità di questa specie è incerta.

Strelkoviacarus quadratus: Non è specificata l'esatta località di raccolta.

Proctophyllodidae

Joubertophyllodes Atyeo & Gaud, 1971

Joubertophyllodes modularis (Berlese, 1895) (S, Sa)

Monojoubertia Radford, 1950

Monojoubertia aphyllus (Trouessart, 1885) (*)

Monojoubertia flagellicaulus (Trouessart & Neumann, 1888) (*)

Monojoubertia hemiphyllus (Robin, 1877) (*)

Monojoubertia microphyllus (Robin, 1877) (N, S, Sa)

Montesauria Oudemans, 1905

Montesauria bilobata (Robin, 1868) (N, S, Sa)

Montesauria cylindrica (Robin, 1868) (N, S)

Montesauria cf. rosickji (Cerný, 1963) (Sa)

Proctophyllodes Robin, 1868

Proctophyllodes acanthicaulus Gaud & Mouchet, 1957 (S)

Proctophyllodes ampelidis (Buchholz, 1869) (S)

Proctophyllodes anthi (Vitzthum, 1922) (N, S)

Proctophyllodes arcticus Dubinin, 1952 (S, Sa)

Proctophyllodes arcuaticaulis Trouessart, 1886 (*)

Proctophyllodes clavatus Fritsch, 1961 (S)

Proctophyllodes cotyledon Trouessart, 1899 (S)
Proctophyllodes doleophyes Gaud, 1957 (N, S)
Proctophyllodes glandarinus (C.L. Koch, 1840) (N, S)
Proctophyllodes hipposideros Gaud, 1953 (N, S, Sa)
Proctophyllodes icterinus Zullo & Manilla, 1992 (S)
Proctophyllodes leptocaulus Gaud, 1957 (S, Sa)
Proctophyllodes miliariae Gaud, 1957 (S, Sa)
Proctophyllodes motacillae Gaud, 1953 (S)
Proctophyllodes musicus Vitzthum, 1922 (S)
Proctophyllodes picae (C.L. Koch, 1844) (N, S)
Proctophyllodes pinnatus (Nitzsch, 1818) (S)
Proctophyllodes reguli Gaud, 1957 (S)
Proctophyllodes rubeculinus (C.L. Koch, 1841) (S)
Proctophyllodes serini Atyeo & Braasch, 1966 (N, S)
Proctophyllodes sylviae Gaud, 1957 (S)
Proctophyllodes stylifer (Buchholz, 1869) (S, Sa)
Proctophyllodes truncatus Robin, 1877 (S)

***Pterodectes* Robin, 1868**

Pterodectes rutilus Robin, 1877 (N, S)
Pterodectes trouessarti Berlese, 1897 (*)

Note

Monojoubertia aphyllus: Specie la cui presenza in Italia è ambiguamente documentata, ma estremamente probabile.

Monojoubertia flagellicaulus: Specie la cui presenza in Italia è ambiguamente documentata, ma estremamente probabile.

Monojoubertia hemiphyllus: Non è specificata l'esatta località di raccolta.

Proctophyllodes arcuaticaulis: Specie la cui presenza in Italia è ambiguamente documentata, ma estremamente probabile.

Pterodectes trouessarti: Specie la cui presenza in Italia è ambiguamente documentata, ma estremamente probabile.

Psoroptoididae

***Mesalges* Trouessart & Neumann, 1888**

Mesalges picimajoris (Buchholz, 1869) (*)

***Mesalgoides* Gaud & Atyeo, 1967**

Mesalgoides glandarii (Buchholz, 1869) (Sa)

Mesalgoides oscinum (C.L. Koch, 1840) (S)

***Pandalura* Hull, 1934**

Pandalura strigisoti (Buchholz, 1869) (*)

Temnalges Gaud & Atyeo, 1967

Temnalges mesalgoides Gaud & Atyeo, 1967 (Sa)

Note

Mesalges picimajoris: Non è specificata l'esatta località di raccolta.

Pandalura strigisoti: Non è specificata l'esatta località di raccolta.

Thysanocercidae

Thysanocercus Gaud & Mouchet, 1957

Thysanocercus cypseli (G. Canestrini & Berlese, 1881) (N)

Trouessartiidae

Bicentralges Orwig, 1968

Bicentralges gracilipes (Trouessart, 1885) (*)

Trouessartia G. Canestrini, 1899

Trouessartia appendiculata (Berlese, 1886) (*)

Trouessartia bifurcata (Trouessart, 1885) (S)

Trouessartia corvina (C.L. Koch, 1841) (*)

Trouessartia crucifera Gaud, 1957 (S)

Trouessartia inexpectata Gaud, 1957 (Sa)

Trouessartia minutipes (Berlese, 1886) (*)

Trouessartia rosterii (Berlese, 1886) (S)

Trouessartia rubecula Jablonska, 1968 (S)

Trouessartia simillima Gaud, 1957 (S)

Trouessartia trouessarti Oudemans, 1904 (S)

Note

Bicentralges gracilipes: Specie la cui presenza in Italia è ambigualmente documentata, ma estremamente probabile.

Trouessartia appendiculata: Non è specificata l'esatta località di raccolta.

Trouessartia corvina: Non è specificata l'esatta località di raccolta.

Trouessartia minutipes: Non è specificata l'esatta località di raccolta.

Xolalgidae

Analloptes Trouessart, 1885

Analloptes falcinelli Trouessart, 1885 (*)

Analloptes megninii Trouessart, 1885 (*)

Dubininia Vassilev, 1958

Dubininia accipitrina (Trouessart, 1885) (*)

Glaucalgas Gaud, 1980

Glaucalgas attenuatus (Buchholz, 1869) (S)

GymnalLOPTES Gaud, 1968

GymnalLOPTES pallens (Trouessart & Neumann, 1888) (*)

GymnalLOPTES quadrisetatus (Berlese, 1886) (*)

Ingrassia Oudemans, 1905

Ingrassia forcipata (Haller, 1882) (*)

Ingrassia strictior (Berlese, 1898) (*)

Ingrassia velata (Méglin, 1877) (S)

Leptosphyra Hull, 1934

Leptosphyra centropodos (Méglin, 1877) (*)

PteralLOPTES Trouessart, 1885

PteralLOPTES stellaris (Buchholz, 1869) (*)

Tectingrassia Gaud, 1972

Tectingrassia gracilipes (Trouessart & Neumann, 1888) (*)

Xolalgas Trouessart, 1885

Xolalgas scaurus Trouessart, 1885 (*)

Note

Analloptes falcinelli: Non è specificata l'esatta località di raccolta.

Analloptes megninii: Specie la cui presenza in Italia è ambigualmente documentata, ma estremamente probabile.

Dubininia accipitrina: Specie la cui presenza in Italia è ambiguamente documentata, ma estremamente probabile.

Gymnalloptes pallens: Non è specificata l'esatta località di raccolta.

Gymnalloptes quadrisetatus: Specie la cui presenza in Italia è ambiguamente documentata, ma estremamente probabile.

Ingrassia forcipata: Non è specificata l'esatta località di raccolta.

Ingrassia strictior: Non è specificata l'esatta località di raccolta.

Leptosphyra centropodos: Non è specificata l'esatta località di raccolta.

Pteralloptes stellaris: Non è specificata l'esatta località di raccolta.

Tectingrassia gracilipes: Specie la cui presenza in Italia è ambiguamente documentata, ma estremamente probabile.

Xolalges scaurus: Specie la cui presenza in Italia è ambiguamente documentata, ma estremamente probabile.

Heteropsoridae

Heteropsorus Trouessart & Neumann, 1888

Heteropsorus pteroptopus Trouessart & Neumann, 1888 (N)

Psoroptidae

Caparinia G. Canestrini, 1894

Caparinia tripilis (Michael, 1881) (*)

Caparinia vulpis (Méglin, 1880) (*)

Chorioptes Gervais & van Beneden, 1859

Chorioptes bovis (Hering, 1845) (*)

Otodectes G. Canestrini, 1894

Otodectes cynotis (Hering, 1838) (S)

Psoroptes Gervais, 1841

Psoroptes cuniculi (Delafond, 1859) (N, S)

Psoroptes equi (Hering, 1838) (*)

Psoroptes ovis (Gerlach, 1857) (*)

Note

Caparinia tripilis: Specie la cui presenza in Italia è ambiguamente documentata, ma estremamente probabile.

Caparinia vulpis: Non è specificata l'esatta località di raccolta.

Chorioptes bovis: Non è specificata l'esatta località di raccolta.

Psoroptes equi: Non è specificata l'esatta località di raccolta.

Psoroptes ovis: Non è specificata l'esatta località di raccolta.

Chirodiscidae

Alabidocarpus Ewing, 1929

Alabidocarpus megalonyx (Trouessart, 1895) (*)

Labidocarpus Trouessart, 1895

Labidocarpus rollinati Trouessart, 1895 (*)

Note

Alabidocarpus megalonyx: Specie la cui presenza in Italia è ambigualmente documentata, ma estremamente probabile.

Labidocarpus rollinati: Specie la cui presenza in Italia è ambigualmente documentata, ma estremamente probabile.

Atopomelidae

Atopomelus Trouessart, 1917

Atopomelus talpae Fain, Lukoschus & Cauwenberge, 1973 (S)

Listrophoridae

Leporacarus Fain, 1970

Leporacarus gibbus (Pagenstecher, 1861) (N)

Listrophorus Pagenstecher, 1861

Listrophorus leuckarti Pagenstecher, 1861 (*)

Listrophorus mustelae Mégnin, 1885 (*)

Metalistrophorus Fain, 1970

Metalistrophorus pagenstecheri (Haller, 1880) (*)

Olistrophorus McDaniel & Whitaker, 1972

Olistrophorus platacanthomys (Fain, 1970) (N)

Note

Listrophorus leuckarti: Non è specificata l'esatta località di raccolta.

Listrophorus mustelae: Specie la cui presenza in Italia è ambiguamente documentata, ma estremamente probabile.

Metalistrophorus pagenstecheri: Non è specificata l'esatta località di raccolta.

Myocoptidae

Criniscansor Poppe, 1889

Criniscansor criceti Poppe, 1889 (*)

Gliricoptes Lawrence, 1956

Gliricoptes glirinus (G. Canestrini, 1895) (N)

Myocoptes Claparède, 1869

Myocoptes musculus (C.L. Koch, 1844) (*)

Trichoecius G. Canestrini, 1899

Trichoecius tenax (Michael, 1889) (*)

Note

Criniscansor criceti: Specie la cui presenza in Italia è ambiguamente documentata, ma estremamente probabile.

Myocoptes musculus: Non è specificata l'esatta località di raccolta.

Trichoecius tenax: Non è specificata l'esatta località di raccolta, che deve, peraltro, essere confermata.

Cytoditidae

Cytodites Mégnin, 1877

Cytodites nudus (Vizioli, 1870) (S)

Laminosioptidae

Laminosioptes Mégnin, 1880

Laminosioptes cysticola (Vizioli, 1870) (S)

Knemidokoptidae

Knemidokoptes Fürstenberg, 1870

Knemidokoptes fossor Ehlers, 1873 (*)

Knemidokoptes glaberrimus Sicher, 1893 (N)

Knemidokoptes mutans (Robin & Lanquetin, 1859) (N, S)

Knemidokoptes philomelae Sicher, 1893 (N)

Neoknemidocoptes Fain, 1966

Neoknemidocoptes gallinae (Railliet, 1888) (*)

Picicnemidocoptes Pence, 1972

Picicnemidocoptes laevis (Railliet, 1885) (*)

Note

Knemidokoptes fossor: Non è specificata l'esatta località di raccolta.

Neoknemidocoptes gallinae: Specie la cui presenza in Italia è ambiguamente documentata come var. *columbae* (Railliet, 1887), ma estremamente probabile.

Picicnemidocoptes laevis: Specie la cui presenza in Italia è ambiguamente documentata, ma estremamente probabile.

Sarcoptidae

Sarcoptes Latreille, 1806

Sarcoptes scabiei (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa) (*)

Nycteridocoptes Oudemans, 1897

Nycteridocoptes eyndhoveni Fain, 1959 (S)

Nycteridocoptes miniopteri Fain, 1959 (S)

Notoedres (Notoedres) Railliet, 1893

Notoedres (Notoedres) cati (Hering, 1838) (S)

Notoedres (Notoedres) chiropteralis (Trouessart, 1896) (*)

Notoedres (Notoedres) miniopteri Fain, 1959 (S)

Notoedres (Notoedres) muris (Mégnin, 1877) (*)

Note

Sarcoptes scabiei: Esiste un generale accordo sul fatto che vi sia una sola specie molto polimorfica, *Sarcoptes scabiei* (Linnaeus, 1758), a distribuzione cosmopolita, capace di causare la scabbia in molti mammiferi. Nonostante l'esistenza di dati epidemiologici che mettono in dubbio questa conclusione, noi ci atteniamo all'opinione prevalente e, quindi, tutte le vecchie specie e razze vengono riportate di seguito come varietà: *scabiei* (Linnaeus, 1758) var. *canis* (Gerlach, 1857) *Sscabiei* (Linnaeus, 1758) var. *caprae* (Fürstenberg, 1861) *Italiascabiei* (Linnaeus, 1758) var. *crustosae* Fürstenberg, 1861 *Italiascabiei* (Linnaeus, 1758) var. *dromedari* (Gervais, 1841) *Italia?scabiei* (Linnaeus, 1758) var. *equi* (Gerlach 1857) *Italiascabiei* (Linnaeus, 1758) var. *furonis* Railliet, 1893 *Italiascabiei* (Linnaeus, 1758) var. *hominis* (Hering, 1838) N S Si *Sascabiei* (Linnaeus, 1758) var. *hydrochoeri* Mégnin, 1880 *Italia?scabiei* (Linnaeus, 1758) var. *leonis* Railliet, 1893 *Italia?scabiei* (Linnaeus, 1758) var. *leporis* (Oudemans, 1937) *Italia?scabiei* (Linnaeus, 1758) var. *lupi* Mégnin, 1880 *Italiascabiei* (Linnaeus, 1758) var. *ovis* Mégnin, 1880 *Italiascabiei* (Linnaeus, 1758) var. *parvulus* (Canestrini, 1894) *Italia?scabiei* (Linnaeus, 1758) var. *praecox* (Canestrini, 1894) *Italiascabiei* (Linnaeus, 1758) var. *rupicaprae* (Hering, 1838) *Italiascabiei* (Linnaeus, 1758) var. *suis* (Gerlach, 1857) *Italiascabiei* (Linnaeus, 1758) var. *vulpis* (Fürstenberg, 1861) *Italia*
Notoedres (Notoedres) chiropteralis: Specie la cui presenza in Italia è ambiguamente documentata, ma estremamente probabile.
Notoedres (Notoedres) muris: Non è specificata l'esatta località di raccolta.

Pycnogonida

Ammonotheidae

Achelia Hodge, 1864

Achelia echinata Hodge, 1864 (3, 4, 5)
Achelia langi (Dohrn, 1881) (3, 5)
Achelia simplex Giltay, 1934 (4)
Achelia vulgaris (A. Costa, 1861) (3, 5)

Ammonothea Leach, 1814

Ammonothea hilgendorfi (Böhm, 1879) (4) (*)

Ammonothella Verrill, 1900

Ammonothella appendiculata (Dohrn, 1881) (3, 4)
Ammonothella biunguiculata (Dohrn, 1881) (3, 4, 5)
Ammonothella longiocolata (Faraggiana, 1940) (3, 4, 5)
Ammonothella longipes (Hodge, 1864) (3, 4, 5)
Ammonothella uniunguiculata (Dohrn, 1881) (3, 5)

Ascorhynchus G.O. Sars, 1877

Ascorhynchus arenicola (Dohrn, 1881) (3)

Ascorhynchus castelli (Dohrn, 1881) (3)
Ascorhynchus pudicum Stock, 1970 (3)
Ascorhynchus simile Fage, 1942 (3, 5)

Paranymphon Caullery, 1896

Paranymphon spinosum Caullery, 1896 (3, 4)

Tanystylum Miers, 1879

Tanystylum conirostre (Dohrn, 1891) (3, 4, 5)
Tanystylum orbiculare Wilson, 1878 (3, 4, 5)

Trygaeus Dohrn, 1881

Trygaeus communis Dohrn, 1881 (3, 4, 5)

Note

Ammothea hilgendorfi: Secondo Krapp & Sconfietti (1983) si tratta di specie introdotta.

Phoxichilidiidae

Anoplodactylus Wilson, 1878

Anoplodactylus angulatus (Dohrn, 1881) (3, 4, 5)
Anoplodactylus compositus Chimenz, Cottarelli & Tosti, 1991 (5) (E)
Anoplodactylus massiliensis Bouvier, 1916 (3)
Anoplodactylus petiolatus (Krøyer, 1844) (3, 4, 5)
Anoplodactylus portus Calman, 1927 (3) (*)
Anoplodactylus pygmaeus (Hodge, 1864) (3, 4, 5)
Anoplodactylus robustus (Dohrn, 1881) (3, 4)
Anoplodactylus virescens (Hodge, 1864) (3, 4, 5)

Note

Anoplodactylus portus: Secondo Krapp & Sconfietti (1983) si tratta di specie introdotta.

Rhynchothoracidae

Rhynchothorax A. Costa, 1861

Rhynchothorax alcornis Krapp, 1973 (3, 5)
Rhynchothorax mediterraneus A. Costa, 1861 (3, 5)

Callipallenidae

Callipallene Flynn, 1929

- Callipallene acribica* Krapp, 1975 (3)
- Callipallene brevirostris* (Johnston, 1837) (3, 4)
- Callipallene emaciata* (Dohrn, 1881) (3, 4)
- Callipallene phantoma* (Dohrn, 1881) (3, 4, 5)
- Callipallene producta* (G.O. Sars, 1888) (4)
- Callipallene spectrum* (Dohrn, 1881) (3, 4, 5)
- Callipallene tiberi* (Dohrn, 1881) (3, 4, 5)

Neopallene Dohrn, 1881

- Neopallene campanellae* Dohrn, 1881 (3) (E)

Pycnogonidae

Pycnogonum Brünnich, 1764

- Pycnogonum nodulosum* Dohrn, 1881 (3)
- Pycnogonum plumipes* Stock, 1960 (3, 5)
- Pycnogonum pusillum* Dohrn, 1881 (3, 4, 5)

Endeidae

Endeis Philippi, 1843

- Endeis charybdaea* (Dohrn, 1881) (3, 4, 5)
- Endeis spinosa* (Montagu, 1808) (3, 4)

Nymphonidae

Nymphon Fabricius, 1794

- Nymphon gracile* Leach, 1814 (3)
- Nymphon parasiticum* Merton, 1906 (3) (E)
- Nymphon puellula* Krapp, 1974 (5) (E)

Branchiopoda

Anostraca

Thamnocephalidae

Branchinella Sayce, 1903

Branchinella spinosa (Milne-Edwards, 1840) (Sa)

Artemiidae

Artemia Leach, 1819

Artemia salina (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Branchipodidae

Branchipus Schaeffer, 1766

Branchipus alpinus Colosi, 1922 (N) (E)

Branchipus pasai Cottarelli, 1968 (Si)

Branchipus schaefferi Fischer, 1834 (S, Si, Sa)

Branchipus visnyai Kertész, 1956 (S, Sa?)

Tanymastix (Simon, 1886)

Tanymastix stagnalis (Linnaeus, 1758) (S, Sa)

Tanymastix stellae Cottarelli, 1967 (Sa) (E, M)

Chirocephalidae

Chirocephalus Prévost, 1803

Chirocephalus diaphanus Prévost, 1803 (N, S, Si, Sa)

Chirocephalus kerkyrensis Pesta, 1936 (S)

Chirocephalus marchesonii Ruffo & Vesentini, 1957 (S) (E)

Chirocephalus ruffoi Cottarelli & Mura, 1984 (S) (E)

Chirocephalus salinus Daday, 1910 (Sa)

Chirocephalus sibyllae Cottarelli & Mura, 1975 (S) (E)

Streptocephalidae

Streptocephalus Baird, 1852

Streptocephalus torvicornis Waga, 1842 (S) (*)

Note

Streptocephalus torvicornis: Presente in S nell'isola di S. Nicola, Tremiti.

Notostraca

Triopsidae

Triops Shrank, 1803

Triops cancriformis (Bosc, 1801)

Triops cancriformis cancriformis Bosc, 1801 (N, S, Si, Sa)

Triops granarius (Lucas, 1864) (S)

Lepidurus Leach, 1819

Lepidurus apus (Linnaeus, 1758)

Lepidurus apus lubbocki (Brauer, 1877) (N, S, Si, Sa)

Spinicaudata

Cyzicidae

Cyzicus Audouin, 1837

Cyzicus tetracerus (Krynicky, 1830) (Si, Sa)

Leptestheriidae

Leptestheria G.O. Sars, 1898

Leptestheria dahalacensis (Rüppell, 1837) (N, Si)

Eoleptestheria Daday, 1910

Eoleptestheria ticinensis (Balsamo-Crivelli, 1859) (N)

Limnadiidae

Limnadia Brongniart, 1840

Limnadia lenticularis (Linnaeus, 1761) (N, Sa)

Cladocera

Sididae

Penilia Dana, 1849

Penilia avirostris Dana, 1849 (3, 4, 5)

Sida Straus, 1820

Sida crystallina (O.F. Müller, 1776)

Sida crystallina crystallina (O.F. Müller, 1776) (N)

Sida crystallina limnetica (Burckhardt, 1899) (N, S)

Latona Straus, 1820

Latona setifera (O.F. Müller, 1785) (N)

Latonopsis G.O. Sars, 1888

Latonopsis australis G.O. Sars, 1888 (N)

Diaphanosoma Fischer, 1850

Diaphanosoma brachyurum (Liévin, 1848) (N, S, Si, Sa)

Diaphanosoma lacustris Korínek, 1981 (N, S)

Holopediidae

Holopedium Zaddach, 1855

Holopedium gibberum Zaddach, 1855 (N)

Bosminidae

***Bosmina* (*Bosmina*)** Baird, 1845

Bosmina (*Bosmina*) *longirostris* (O.F. Müller, 1785) (N, S, Si, Sa)

***Bosmina* (*Eubosmina*)** Seligo, 1900

Bosmina (*Eubosmina*) *coregoni* (Baird, 1857) (N)

Bosmina (Eubosmina) longispina (Leydig, 1860) (N, Sa)
Bosmina (Eubosmina) mixta Lilljeborg, 1900
Bosmina (Eubosmina) mixta longicornis Schoedler, 1865 (N)

Daphniidae

Daphnia (Ctenodaphnia) Dybowski & Grochowski, 1895

Daphnia (Ctenodaphnia) atkinsoni Baird, 1859 (S, Sa)
Daphnia (Ctenodaphnia) chevreuxi Richard, 1896 (S, Sa)
Daphnia (Ctenodaphnia) magna Straus, 1820 (N, S, Si, Sa)
Daphnia (Ctenodaphnia) mediterranea Alonso, 1985 (Sa)

Daphnia (Daphnia) O.F. Müller, 1785

Daphnia (Daphnia) ambigua Scourfield, 1947 (N, Si)
Daphnia (Daphnia) cucullata G.O. Sars, 1862 (N, S, Si)
Daphnia (Daphnia) curvirostris Eylmann, 1887 (N, S, Sa)
Daphnia (Daphnia) galeata G.O. Sars, 1864 (N, S)
Daphnia (Daphnia) galeata x cucullata sensu Flössner & Kraus, 1986 (S)
Daphnia (Daphnia) hyalina Leydig, 1860 (N, S, Si)
Daphnia (Daphnia) longispina O.F. Müller, 1785
Daphnia (Daphnia) longispina frigidolimnetica Ekman, 1904 (N)
Daphnia (Daphnia) longispina littoralis G.O. Sars, 1890 (N, S)
Daphnia (Daphnia) longispina longispina O.F. Müller, 1785 (N, S, Si, Sa)
Daphnia (Daphnia) longispina rectifrons Stingelin, 1895 (N)
Daphnia (Daphnia) middendorffiana Fischer, 1851 (N)
Daphnia (Daphnia) obtusa Kurz, 1874 (N, S, Si, Sa)
Daphnia (Daphnia) pulex (Leydig, 1860) (N, S)
Daphnia (Daphnia) rosea G.O. Sars, 1862 (N, S, Si)
Daphnia (Daphnia) zschokkei Stingelin, 1894 (N)

Ceriodaphnia Dana, 1853

Ceriodaphnia dubia Richard, 1894 (N, S, Si)
Ceriodaphnia laticaudata P.E. Müller, 1867 (N, S, Si, Sa)
Ceriodaphnia megops G.O. Sars, 1862 (N, S)
Ceriodaphnia pulchella G.O. Sars, 1862 (N, S, Si)
Ceriodaphnia quadrangula (O.F. Müller, 1785) (N, S, Si, Sa)
Ceriodaphnia quadrangula hamata G.O. Sars, 1890 (S)
Ceriodaphnia reticulata (Jurine, 1820) (N, S, Si, Sa)
Ceriodaphnia reticulata kurzii Stingelin, 1895 (N)
Ceriodaphnia reticulata serrata Stingelin, 1895 (S)
Ceriodaphnia setosa Matile, 1890 (N)

Simocephalus Schoedler, 1858

Simocephalus exspinosus (Koch, 1841)

Simocephalus exspinosus exspinosus (Koch, 1841) (N, S, Si, Sa)

Simocephalus exspinosus congener (Schoedler, 1858) (N, S, Sa)

Simocephalus serrulatus (Koch, 1841) (S, Sa)

Simocephalus vetulus (O.F. Müller, 1776) (N, S, Si, Sa)

Scapholeberis Schoedler, 1858

Scapholeberis kingi G.O. Sars, 1888 (N)

Scapholeberis mucronata (O.F. Müller, 1785) (N, S, Sa)

Scapholeberis rammneri Dumont & Pensaert, 1983 (S, Sa)

Megafenestra Dumont & Pensaert, 1983

Megafenestra aurita (Fischer, 1849) (N, Sa)

Moinidae

Moina Baird, 1850

Moina affinis Birge, 1893 (N)

Moina brachiata (Jurine, 1820) (N, S, Si, Sa)

Moina macrocopa (Straus, 1820) (N, S)

Moina micrura Kurz, 1874 (N, S)

Moina salina Daday, 1888 (Sa)

Moina weismanni Ishikawa, 1896 (N)

Macrothricidae

Ilyocryptus G.O. Sars, 1862

Ilyocryptus acutifrons G.O. Sars, 1862 (N)

Ilyocryptus agilis Kurz, 1878 (N, S)

Ilyocryptus sordidus (Liévin, 1848) (N, S)

Lathonura Lilljeborg, 1853

Lathonura rectirostris (O.F. Müller, 1785) (N, S)

Drepanothrix G.O. Sars, 1882

Drepanothrix dentata (Eurén, 1861) (N)

Streblocerus G.O. Sars, 1862

Streblocerus serricaudatus (Fischer, 1849) (N, S)

Macrothrix Baird, 1843

Macrothrix hirsuticornis Norman & Brady, 1867 (N, S, Si, Sa)
Macrothrix laticornis (Jurine, 1820) (N, S)

Echinisca Liévin, 1848

Echinisca rosea (Liévin, 1848) (N, S, Sa)

Chydoridae

Eurycercus Baird, 1843

Eurycercus lamellatus (O.F. Müller, 1785) (N, S)

Pleuroxus Baird, 1843

Pleuroxus aduncus (Jurine, 1820) (N, S, Si, Sa)
Pleuroxus denticulatus Birge, 1878 (N, S)
Pleuroxus laevis G.O. Sars, 1862 (N, S, Si)
Pleuroxus letourneuxi (Richard, 1888) (Si, Sa)
Pleuroxus striatus Schoedler, 1863 (N, S)
Pleuroxus trigonellus (O.F. Müller, 1785) (N, S)
Pleuroxus truncatus (O.F. Müller, 1785) (N, S)
Pleuroxus uncinatus Baird, 1850 (N, S)

Alonella G.O. Sars, 1862

Alonella excisa G.O. Sars, 1862 (N, S, Sa)
Alonella exigua Kurz, 1874 (N, S, Si)
Alonella nana (Baird, 1843) (N, S, Si)

Disparalona Freyer, 1968

Disparalona rostrata (Koch, 1841) (N, S, Si)

Anchistropus G.O. Sars, 1862

Anchistropus emarginatus G.O. Sars, 1862 (N?)

Pseudochydorus Freyer, 1968

Pseudochydorus globosus (Baird, 1843) (S)

Dunhevedia King, 1853

Dunhevedia crassa King, 1853 (N, S, Si, Sa)

Chydorus Leach, 1816

Chydorus gibbus G.O. Sars, 1890 (S, Sa)

Chydorus latus G.O. Sars, 1862 (N, S, Sa)

Chydorus ovalis Kurz, 1874 (N, S)

Chydorus piger G.O. Sars, 1862 (S)

Chydorus sphaericus O.F. Müller, 1785 (N, S, Si, Sa)

Ephemeroporus Frey, 1982

Ephemeroporus phintonicus (Margaritora, 1969) (Sa)

Monospilus G.O. Sars, 1862

Monospilus dispar G.O. Sars, 1862 (N)

Leydigia Kurz, 1874

Leydigia acanthocercoides (Fischer, 1854) (N, S, Sa)

Leydigia leydigi (Schoedler, 1858) (N, S, Si)

Acroperus Baird, 1843

Acroperus angustatus G.O. Sars, 1864 (N, Sa)

Acroperus harpae (Baird, 1835) (N, S, Sa)

Alonopsis G.O. Sars, 1862

Alonopsis elongata (G.O. Sars, 1862) (N, S)

Kurzia Dybowski & Grochowski, 1894

Kurzia latissima (Kurz, 1874) (N, Si?)

Camptocercus Baird, 1843

Camptocercus australis G.O. Sars, 1896 (N?)

Camptocercus lilljeborgi (Schoedler, 1853) (N?)

Camptocercus rectirostris Schoedler, 1862 (N, S)

Graptoleberis G.O. Sars, 1862

Graptoleberis testudinaria (Fischer, 1848) (N, S, Si, Sa)

Alona Baird, 1843

Alona azorica Frenzel & Alonso, 1988 (S, Sa)
Alona costata G.O. Sars, 1862 (N, S, Sa)
Alona diaphana King, 1853 (N)
Alona elegans Kurz, 1875
 Alona elegans arcuata Herbts, 1964 (N, S, Si, Sa)
Alona guttata G.O. Sars, 1862
 Alona guttata guttata G.O. Sars, 1862 (N, S)
 Alona guttata tuberculata Kurz, 1875 (S)
Alona karelica Stenroos, 1897 (N?)
Alona nuragica Margaritora, 1971 (S, Sa)
Alona quadrangularis (O.F. Müller, 1785) (N, S, Sa)
Alona rectangula G.O. Sars, 1862
 Alona rectangula pulchra Behning, 1941 (N, Sa)
 Alona rectangula rectangula G.O. Sars, 1862 (N, S, Si, Sa)
 Alona rectangula richardi Stingelin, 1895 (N?)

Oxyurella Dybowski & Grokowschi, 1894

Oxyurella tenuicaudis (G.O. Sars, 1862) (N, S, Si, Sa)

Biapertura Smirnov, 1971

Biapertura affinis (Leydig, 1860)
 Biapertura affinis affinis (Leydig, 1860) (N, S)
 Biapertura affinis ornata (Stingelin, 1895) (N, S)
Biapertura intermedia (G.O. Sars, 1862) (S, Sa?)

Tretocephala Frey, 1965

Tretocephala ambigua (Lilljeborg, 1900) (S, Si, Sa)

Rhynchotalona Norman, 1903

Rhynchotalona falcata (G.O. Sars, 1862) (N?)

Polyphemidae

Polyphemus O.F. Müller, 1785

Polyphemus pediculus (Linnaeus, 1761) (N)

Cercopagidae

Bythotrephes Leydig, 1860

Bythotrephes longimanus Leydig, 1860 (N, S)

Podonidae

Podon Lilljeborg, 1853

Podon intermedius Lilljeborg, 1853 (3, 4, 5)

Podon polyphemoides Leuckart, 1859 (3, 4, 5)

Evadne Lovén, 1836

Evadne spinifera P.E. Müller, 1867 (3, 4, 5)

Evadne tergestina Claus, 1862 (3, 4, 5)

Leptodoridae

Leptodora Lilljeborg, 1861

Leptodora kindtii (Focke, 1844) (N, S)

Ostracoda

Cypridinidae

Euphilomedes Poulsen, 1962

Euphilomedes asper (G.W. Müller, 1894) (3)

Euphilomedes sinister Kornicker, 1974 (3)

Philomedes Lilljeborg, 1853

Philomedes levis G.W. Müller, 1894 (3) (E)

Pseudophilomedes G.W.Müller, 1894

Pseudophilomedes angulata G.W. Müller, 1894 (3) (E)

Pseudophilomedes foveolatus G.W. Müller, 1894 (3) (E)

Skogsbergia Poulsen, 1962

Skogsbergia costai Kornicker, 1974 (3)

Skogsbergia squamosa (G.W. Müller, 1894) (3)

Cylindroleberididae

Cycloleberis Skogsberg, 1920

Cycloleberis lobiancoi (G.W. Müller, 1894) (3) (E, M)

Cylindroleberis Brady, 1867

Cylindroleberis oblonga (Baird, 1840) (3)

Parasterope Poulsen, 1965

Parasterope muelleri (Skogberg, 1920) (3)

Polyleberis Korniker, 1974

Polyleberis mackenziei Kornicker, 1974 (3) (E, M)

Prionotoleberis Kornicker, 1974

Prionotoleberis gyion Kornicker, 1974 (3) (E, M)

Sarsiellidae

Sarsiella Norman, 1869

Sarsiella capsula Norman, 1869 (3)

Sarsiella neapolis Kornicker, 1974 (3)

Halocyprididae

Archiconchoecia G.W. Müller, 1894

Archiconchoecia striata G.W. Müller, 1894 (3) (E, M)

Conchoecia Dana, 1849

Conchoecia clausii (G.O. Sars, 1890) (3, 4, 5)

Conchoecia magna Claus, 1874 (3)

Conchoecia procera G.W. Müller, 1894 (3)

Conchoecia rotundata G.W. Müller, 1890 (3)

Conchoecia spinirostris Claus, 1874 (3)

Polycopidae

Metapolycope Kornicker, 1976

Metapolycope compressa (Brady & Robertson, 1869) (3, 4)

Polycope G.O. Sars, 1866

Polycope coralligena Bonaduce, Ciliberto, Masoli, Minichelli & Pugliese, 1982 (3)

Polycope demulderi Sissingh, 1972 (3, 4, 5)

Polycope dentata Brady, 1868 (3)

Polycope dispar G.W. Müller, 1894 (3)

Polycope fragilis G.W. Müller, 1894 (3)

Polycope frequens G.W. Müller, 1894 (3, 4, 5)

Polycope inflata Bonaduce, Ciliberto, Masoli, Minichelli & Pugliese, 1982 (3, 5)

Polycope maculata G.W. Müller, 1894 (3)

Polycope orbulinaeformis Breman, 1976 (4, 5)

Polycope ovalis Bonaduce, Ciliberto, Masoli, Minichelli & Pugliese, 1982 (3, 5)

Polycope parareticulata Bonaduce, Ciampo & Masoli, 1976 (3, 4, 5)

Polycope reticulata G.W. Müller, 1894 (3, 4, 5)

Polycope rostrata G.W. Müller, 1894 (3, 4)

Polycope striata G.W. Müller, 1894 (3, 4, 5)

Polycope tholiformis Bonaduce, Ciampo & Masoli, 1976 (3, 4, 5)

Polycope truncatula Bonaduce, Ciampo & Masoli, 1976 (3, 4)

Polycope tuberosa G.W. Müller, 1894 (3, 4, 5)

Polycope vasfiensis Sissingh, 1972 (3, 4, 5)

Polycopsis G.W. Müller, 1894

Polycopsis quadridentata Bonaduce, Ciampo & Masoli, 1976 (3, 4, 5)

Polycopsis serrata G.W. Müller, 1894 (3)

Cytherellidae

Cytherella Jones, 1849

Cytherella alvearium Bonaduce, Ciampo & Masoli, 1976 (3, 4) (E)

Cytherella bathyalis Bonaduce, Ciliberto, Masoli, Minichelli & Pugliese, 1982 (3, 5)

Cytherella vandenboldi Sissingh, 1972 (4)

Cytherella vulgata Ruggieri, 1962 (3, 4, 5)

Cytherelloidea Alexander, 1929

Cytherelloidea beckmanni Barbeito-Gonzalez, 1971 (5)

Cytherelloidea sordida (G.W. Müller, 1894) (3, 4, 5)

Bairdiidae

***Bairdia* Mc Coy, 1844**

- Bairdia conformis* (Terquem, 1878) (3, 4, 5)
- Bairdia corpulenta* G.W. Müller, 1894 (3, 4, 5)
- Bairdia decipiens* G.W. Müller, 1894 (3)
- Bairdia formosa* Brady, 1868 (3, 4, 5)
- Bairdia frequens* G.W. Müller, 1894 (3, 4)
- Bairdia longevaginata* G.W. Müller, 1894 (3, 4, 5)
- Bairdia mediterranea* G.W. Müller, 1894 (3, 4, 5)
- Bairdia minor* G.W. Müller, 1894 (3)
- Bairdia obscura* G.W. Müller, 1894 (3)
- Bairdia reticulata* G.W. Müller, 1894 (3)
- Bairdia supradentata* Terquem, 1878 (4)

***Triebelina* van den Bold, 1946**

- Triebelina raripila* (G.W. Müller, 1894) (3, 4)

Bythocyprididae

***Bythocypris* Brady, 1880**

- Bythocypris bosquetiana* (Brady, 1866) (3, 4)
- Bythocypris producta* Seguenza, 1880 (3, 4, 5)
- Bythocypris reflexa* Breman, 1975 (5)
- Bythocypris tenera* Breman, 1975 (3, 4, 5)

Cytheridae

***Microcytherura* G.W. Müller, 1894**

- Microcytherura fulva* (Brady & Robertson, 1874) (4, 5)
- Microcytherura nigrescens* G.W. Müller, 1894 (3, 4) (E, M)

***Tetracytherura* Ruggieri, 1952**

- Tetracytherura angulosa* (Seguenza, 1880) (3, 4, 5)

Leptocytheridae

***Leptocythere* G.O. Sars, 1925**

- Leptocythere bacescoi* (Rome, 1942) (3, 4)
- Leptocythere bituberculata* Bonaduce, Ciampo & Masoli, 1976 (4) (E, M)
- Leptocythere crepidula* Ruggieri, 1950 (4) (M)

Leptocythere lagunae Hartmann, 1958 (4)
Leptocythere levis (G.W. Müller, 1894) (3, 4)
Leptocythere macella Ruggieri, 1975 (3, 4)
Leptocythere muellerfabaeformis Puri, 1963 (3)
Leptocythere multipunctata (Seguenza, 1884) (4)
Leptocythere punctatella Bonaduce, Masoli & Pugliese, 1977 (3) (E)
Leptocythere ramosa (Rome, 1942) (3, 4)
Leptocythere rara G.W. Müller, 1894 (3, 4) (E)
Leptocythere tenera (Brady, 1868) (4)

***Callistocythere* Ruggieri, 1953**

Callistocythere adriatica Masoli, 1968 (3, 4, 5) (E)
Callistocythere diffusa (G.W. Müller, 1894) (3, 4, 5)
Callistocythere discrepans (G.W. Müller, 1894) (3)
Callistocythere flavidofusca Ruggieri, 1950 (3, 4, 5)
Callistocythere folliculosa Bonaduce, Ciampo & Masoli, 1976 (3, 4, 5)
Callistocythere gilva Bonaduce, Ciampo & Masoli, 1976 (4, 5) (E, M)
Callistocythere intricatoides (Ruggieri, 1953) (4)
Callistocythere littoralis (G.W. Müller, 1894) (3, 4, 5)
Callistocythere lobiancoi (G.W. Müller, 1912) (3, 4, 5)
Callistocythere mediterranea (G.W. Müller, 1894) (3, 4, 5) (E, M)
Callistocythere pallida (G.W. Müller, 1894) (3, 4, 5)
Callistocythere rastrifera (Ruggieri, 1953) (4, 5)
Callistocythere vexata Bonaduce, Ciampo & Masoli, 1976 (4)

***Cluthia* Neale, 1973**

Cluthia keiji Neale, 1975 (3, 4, 5)

Limnocytheridae

***Limnocythere* Brady, 1867**

Limnocythere inopinata (Baird, 1843) (N, S, Sa)

***Metacypris* Brady & Robertson, 1870**

Metacypris cordata Brady & Robertson, 1870 (N)

Pseudolimnocytheridae

***Pseudolimnocythere* Klie, 1938**

Pseudolimnocythere hypogea Klie, 1938 (S)

Cytheromatidae

Cytheroma G.W. Müller, 1894

Cytheroma variabilis G.W. Müller, 1894 (3, 4, 5)

Eucytheridae

Eucythere Brady, 1868

Eucythere curta Ruggieri, 1975 (4, 5)

Eucythere declivis (Norman, 1865) (3)

Eucythere pubera Bonaduce, Ciampo & Masoli, 1976 (3, 4, 5)

Cytherideidae

Cuneocythere Lienenklaus, 1894

Cuneocythere semipunctata (Brady, 1868) (3, 4)

Cyprideis Jones, 1857

Cyprideis torosa (Jones, 1850) (3, 4, 5)

Cytheridea Bosquet, 1852

Cytheridea neapolitana Kolmann, 1958 (3, 4, 5)

Cytherissa G.O. Sars, 1925

Cytherissa lacustris (G.O. Sars, 1863) (S)

Cushmanideidae

Pontocythere Dubowsky, 1939

Pontocythere rubra (G.W. Müller, 1894) (3)

Pontocythere turbida (G.W. Müller, 1894) (3, 4, 5)

Krithidae

Krithe Brady, Crosskey & Robertson, 1874

Krithe keyi Breman, 1978 (4, 5)
Krithe praetexta (G.O. Sars, 1866) (3, 4)

Parakrithe van den Bold, 1958

Parakrithe ambigua Ciampo, 1980 (3)
Parakrithe dimorpha Bonaduce, Ciampo & Masoli, 1976 (3, 4, 5)

Pseudopsammocythere Carbonnel, 1966

Pseudopsammocythere reniformis (Brady, 1868) (3, 4)
Pseudopsammocythere similis (G.W. Müller, 1894) (3, 4)

Neocytherideidae

Neocytherideis Puri, 1952

Neocytherideis fasciata (Brady & Robertson, 1874) (3, 4)
Neocytherideis senescens (Ruggieri, 1952) (4)

Procytherideis Ruggieri, 1978

Procytherideis complicata (Ruggieri, 1953) (3, 4, 5)
Procytherideis subspiralis (Brady, Crosskey & Robertson, 1874) (4)

Sahnia Puri, 1952

Sahnia subulata (Brady, 1868) (3, 4)

Trachyleberididae

Acanthocythereis Howe, 1963

Acanthocythereis ascolii Puri, 1963 (3, 4)
Acanthocythereis histrix (Reuss, 1850) (4, 5)

Basslerites Howe in Coryell & Fields, 1937

Basslerites berchoni (Brady, 1869) (3, 4)

Bosquetina Keij, 1857

Bosquetina dentata (G.W. Müller, 1894) (3, 4, 5)

Buntonia Howe, 1935

Buntonia dertonensis Ruggieri, 1954 (3)
Buntonia geisbrechtii (G.W. Müller, 1894) (3, 4)
Buntonia sublatissima (Neviani, 1906) (3, 4, 5)
Buntonia subulata Ruggieri, 1954 (3)
Buntonia textilis Bonaduce, Ciampo & Masoli, 1976 (3, 4, 5)

Carinocythereis Ruggieri, 1956

Carinocythereis antiquata (Baird, 1850) (3, 4, 5)
Carinocythereis whitei (Baird, 1850) (3, 4)

Costa Neviani, 1928

Costa batei (Brady, 1866) (3, 4, 5)
Costa edwardsi (Roemer, 1838) (3, 4, 5)

Echinocythereis Puri, 1954

Echinocythereis laticarina (Brady, 1868) (3, 4)

Falsocythere Ruggieri, 1972

Falsocythere maccagnoii (Ciampo, 1971) (3, 4, 5)

Henryhowella Puri, 1957

Henryhowella sarsi (G.W. Müller, 1894) (3, 4, 5)

Hiltermannicythere Bassiouni, 1970

Hiltermannicythere rubra (G.W. Müller, 1894) (3)
Hiltermannicythere turbida (G.W. Müller, 1894) (3, 4, 5)

Occultocythereis Howe, 1951

Occultocythereis dohrni Puri, 1963 (3, 4, 5)

Pterygocythereis Blake, 1933

Pterygocythereis jonesi (Baird, 1850) (3, 4, 5)
Pterygocythereis siveteri Athersuch, 1978 (3, 4, 5)

Rectobuntonia Sissingh, 1972

Rectobuntonia miranda Bonaduce, Ciampo & Masoli, 1976 (3, 4, 5)

Verrucocythereis Ruggieri, 1962

Verrucocythereis bulbospinata (Uliczny, 1969) (4, 5)

Hemicytheridae

Aurila Pokorny, 1955

Aurila convexa (Baird, 1850) (3, 4, 5)

Aurila glyptica Barbeito-Gonzalez, 1971 (4)

Aurila interpretis Uliczny, 1969 (4, 5)

Aurila prasina Barbeito-Gonzalez, 1971 (4)

Aurila punctata (Munster, 1830) (4)

Aurila speyeri (Brady, 1868) (3, 4, 5)

Aurila woodwardi (Brady, 1868) (4)

Caudites Coryell & Fields, 1937

Caudites calceolatus (O.G. Costa, 1853) (4)

Heterocythereis Elofson, 1941

Heterocythereis albomaculata (Baird, 1838) (4)

Tenedocythere Sissingh, 1972

Tenedocythere prava (Baird, 1850) (3, 4, 5)

Urocythereis Ruggieri, 1950

Urocythereis flexicauda Bonaduce, Ciampo & Masoli, 1976 (4) (E, M)

Urocythereis margaritifera (G.W. Müller, 1894) (3, 4, 5)

Urocythereis neapolitana Athersuch, 1977 (5)

Cytherettidae

Cytheretta G.W. Müller, 1894

Cytheretta adriatica Ruggieri, 1952 (3, 4, 5)

Cytheretta subradiosa (Roemer, 1838) (3, 4)

Microcytheridae

Microcythere G.W. Müller, 1894

Microcythere dentata G.W. Müller, 1894 (3, 4) (E)

Microcythere depressa G.W. Müller, 1894 (3, 4) (E)
Microcythere gibba G.W. Müller, 1894 (3) (E)
Microcythere hians G.W. Müller, 1894 (3, 4) (E)
Microcythere inflexa G.W. Müller, 1894 (3, 4, 5)
Microcythere levis G.W. Müller, 1894 (3, 4) (E)
Microcythere nana G.W. Müller, 1894 (3, 4) (E)
Microcythere obliqua G.W. Müller, 1894 (3, 4, 5) (E)
Microcythere rara G.W. Müller, 1894 (3, 4) (E)
Microcythere vitrea Bonaduce, Ciampo & Masoli, 1976 (3, 4) (E)

Loxoconchidae

Cytheromorpha Hirschmann, 1909

Cytheromorpha fuscata (Brady, 1869) (4)
Cytheromorpha nana Bonaduce, Ciampo & Masoli, 1976 (4) (E)

Hirschmannia Elofson, 1941

Hirschmannia viridis (O.F. Müller, 1785) (4)

Loxocauda Schornikov, 1969

Loxocauda decipiens (G.W. Müller, 1894) (3, 4, 5)

Loxoconcha G.O. Sars, 1866

Loxoconcha alata Brady, 1868 (4)
Loxoconcha bairdi G.W. Müller, 1912 (3, 4, 5)
Loxoconcha concentrica Bonaduce, Ciampo & Masoli, 1976 (3, 4) (E)
Loxoconcha dorsoinflata McKenzie, 1963 (S)
Loxoconcha elliptica Brady, 1868 (4)
Loxoconcha exagona Bonaduce, Ciampo & Masoli, 1976 (4)
Loxoconcha geometrica Bonaduce, Ciampo & Masoli, 1976 (4) (E, M)
Loxoconcha gibberosa Terquem, 1878 (4)
Loxoconcha minima G.W. Müller, 1894 (3, 4, 5)
Loxoconcha ovulata (O.G. Costa, 1853) (3, 4, 5)
Loxoconcha parallela G.W. Müller, 1894 (3, 4, 5) (E)
Loxoconcha rhomboidea (Fischer, 1855) (3, 4, 5)
Loxoconcha rubritincta Ruggieri, 1964 (4)
Loxoconcha stellifera G.W. Müller, 1894 (3, 4, 5)
Loxoconcha subrugosa Ruggieri, 1967 (3)
Loxoconcha turbida G.W. Müller, 1912 (3, 4)

Loxoconchidea Bonaduce, Ciampo & Masoli, 1976

Loxoconchidea minima Bonaduce, Ciampo & Masoli, 1976 (3, 4) (E)

***Phlyctocythere* Keij, 1958**

Phlyctocythere pellucida (G.W. Müller, 1894) (3, 4, 5)

***Pseudoloxoconcha* G.W. Müller, 1894**

Pseudoloxoconcha minima G.W. Müller, 1894 (3) (E)

***Sagmatocythere* Athersuch, 1976**

Sagmatocythere caelata (Ciampo, 1976) (3)

Sagmatocythere littoralis (G.W. Müller, 1894) (3, 4) (E)

Sagmatocythere napoliana (Puri, 1963) (3, 4, 5)

Sagmatocythere versicolor (G.W. Müller, 1894) (3, 4, 5)

Paracytherideidae

***Paracytheridea* G.W. Müller, 1894**

Paracytheridea depressa G.W. Müller, 1894 (3, 4, 5) (M)

Cytheruridae

***Cytheropteron* G.O. Sars, 1866**

Cytheropteron alatum G.O. Sars, 1866 (3, 4, 5)

Cytheropteron garganicum Bonaduce, Ciampo & Masoli, 1976 (4) (E)

Cytheropteron hadriaticum Bonaduce, Ciampo & Masoli, 1976 (4) (E)

Cytheropteron latum G.W. Müller, 1894 (3, 4, 5)

Cytheropteron monoceros Bonaduce, Ciampo & Masoli, 1976 (3, 4, 5) (E)

Cytheropteron rarum G.W. Müller, 1894 (3) (E)

Cytheropteron rotundatum G.W. Müller, 1894 (3, 4)

Cytheropteron ruggieri Pucci, 1955 (3, 4)

Cytheropteron sulcatum Bonaduce, Ciampo & Masoli, 1976 (3, 4, 5) (E)

Cytheropteron venustum Bonaduce, Ciampo & Masoli, 1976 (4, 5)

Cytheropteron vespertilio (Reuss, 1850) (4)

Cytheropteron zinzulusae Bonaduce, Ciampo & Masoli, 1976 (4, 5) (E)

***Eucytherura* G.W. Müller, 1894**

Eucytherura alata G.W. Müller, 1894 (3, 4)

Eucytherura angulata G.W. Müller, 1894 (3, 4) (E, M)

Eucytherura complexa (Brady, 1866) (3, 4, 5)

Eucytherura gibbera G.W. Müller, 1894 (3, 5)

Eucytherura mistrettai Sissingh, 1972 (3, 4)

Hemicytherura Elofson, 1941

- Hemicytherura defiorei* Ruggieri, 1953 (3, 4, 5)
- Hemicytherura gracilicosta* Ruggieri, 1953 (4, 5)
- Hemicytherura videns* (G.W. Müller, 1894) (3, 4, 5)

Kangarina Coryell & Fields, 1937

- Kangarina abyssicola* (G.W. Müller, 1894) (4, 5)

Pedicythere Egger, 1965

- Pedicythere mirabilis* Sissingh, 1975 (4)
- Pedicythere phryne* Bonaduce, Ciampo & Masoli, 1976 (3, 4) (E)
- Pedicythere tessellata* Bonaduce, Ciampo & Masoli, 1976 (4, 5) (E)

Pseudocytherura Dubowsky, 1939

- Pseudocytherura strangulata* Ruggieri, 1991 (3, 4, 5)

Semicytherura Wagner, 1957

- Semicytherura abdita* Bonaduce, Ciampo & Masoli, 1976 (3, 4, 5) (E, M)
- Semicytherura acuminata* (G.W. Müller, 1894) (3, 4)
- Semicytherura acuta* (G.W. Müller, 1912) (3, 4) (E)
- Semicytherura acuticostata* (G.O. Sars, 1866) (3, 4, 5)
- Semicytherura aenariensis* Bonaduce, Ciampo & Masoli, 1976 (3, 4) (E, M)
- Semicytherura alifera* Ruggieri, 1959 (3, 4)
- Semicytherura amorphia* Bonaduce, Ciampo & Masoli, 1976 (4) (E, M)
- Semicytherura biciemmei* Ruggieri, 1991 (4)
- Semicytherura brachyptera* (Ruggieri, 1952) (3, 4)
- Semicytherura calabra* Ruggieri, 1976 (3) (M)
- Semicytherura costata* (G.W. Müller, 1894) (3, 4)
- Semicytherura cribriformis* (G.W. Müller, 1894) (3, 5)
- Semicytherura diafora* Barbeito-Gonzalez, 1971 (4, 5)
- Semicytherura dispar* (G.W. Müller, 1894) (3, 4, 5)
- Semicytherura heinzei* Puri, 1963 (3, 4)
- Semicytherura incongruens* (G.W. Müller, 1894) (3, 4, 5)
- Semicytherura inversa* (Seguenza, 1880) (3, 4)
- Semicytherura kaloderma* Bonaduce & Pugliese, 1975 (4)
- Semicytherura mediterranea* (G.W. Müller, 1894) (3, 4, 5)
- Semicytherura muelleri* Puri, 1963 (3)
- Semicytherura occulta* Bonaduce, Ciampo & Masoli, 1976 (4) (E, M)
- Semicytherura paradoxa* (G.W. Müller, 1894) (3, 4, 5)
- Semicytherura psila* Barbeito-Gonzalez, 1971 (4)
- Semicytherura punctata* (G.W. Müller, 1894) (3, 4)
- Semicytherura quadridentata* (Hartmann, 1953) (4)

Semicytherura rara (G.W. Müller, 1894) (3, 4)
Semicytherura rarecostata Bonaduce, Ciampo & Masoli, 1976 (4) (E)
Semicytherura reticulata (G.W. Müller, 1894) (3, 4) (M)
Semicytherura robusta Bonaduce, Ciampo & Masoli, 1976 (3, 4)
Semicytherura ruggierii (Pucci, 1955) (3, 4)
Semicytherura sella (G.O. Sars, 1866) (4)
Semicytherura simplex (Brady & Norman, 1889) (3, 4, 5)
Semicytherura stilifera Bonaduce, Ciampo & Masoli, 1976 (4) (E)
Semicytherura sulcata (G.W. Müller, 1894) (3, 4)
Semicytherura tergestina Masoli, 1968 (3, 4) (E)
Semicytherura trachina Bonaduce, Ciampo & Masoli, 1976 (4) (E, M)
Semicytherura ventricosa (G.W. Müller, 1894) (3, 4)

Tuberculocythere Colalongo & Pasini, 1980

Tuberculocythere infelix (Bonaduce, Ciampo & Masoli, 1976) (4, 5) (E)
Tuberculocythere tetrapterion (Bonaduce, Ciampo & Masoli, 1976) (3, 4, 5)

Typhlocythere Bonaduce, Ciampo & Masoli, 1976

Typhlocythere ruggierii Bonaduce, Ciampo & Masoli, 1976 (4) (E)

Xestoleberididae

Microxestoleberis G.W. Müller, 1894

Microxestoleberis nana G.W. Müller, 1894 (3, 4, 5)
Microxestoleberis xenomys (Barbeito-Gonzalez, 1971) (3, 5)

Platyleberis Bonaduce & Danielopol, 1988

Platyleberis profunda (Breman, 1975) (4)

Xestoleberis G.O. Sars, 1866

Xestoleberis aurantia (Baird, 1838) (S, Sa)
Xestoleberis communis G.W. Müller, 1894 (3, 4, 5)
Xestoleberis costata Hartmann, 1953 (3)
Xestoleberis decipiens G.W. Müller, 1894 (3, 4)
Xestoleberis delamarei Hartmann, 1953 (3)
Xestoleberis dispar G.W. Müller, 1894 (3, 4, 5)
Xestoleberis fuscomaculata G.W. Müller, 1894 (3)
Xestoleberis margaritea (Brady, 1866) (3)
Xestoleberis parva G.W. Müller, 1894 (3, 4, 5)
Xestoleberis plana G.W. Müller, 1894 (3, 4, 5)
Xestoleberis pellucida G.W. Müller, 1894 (3, 4, 5)
Xestoleberis rara G.W. Müller, 1894 (3, 4)

Xestoleberis ventricosa G.W. Müller, 1894 (3, 4) (E)

Bythocytheridae

Bythoceratina Hornibrook, 1952

Bythoceratina reticulata Bonaduce, Ciampo & Masoli, 1976 (3, 4) (E)

Bythocythere G.O. Sars, 1866

Bythocythere minima Bonaduce, Ciampo & Masoli, 1976 (3, 4, 5) (E, M)

Bythocythere turgida G.O. Sars, 1866 (4)

Monoceratina Roth, 1928

Monoceratina amfibola Barbeito-Gonzalez, 1971 (3, 4)

Monoceratina mediterranea Sissingh, 1972 (3, 4)

Monoceratina oblita Bonaduce, Ciampo & Masoli, 1976 (3, 4, 5)

Pseudocythere G.O. Sars, 1866

Pseudocythere armata Bonaduce, Masoli, Pugliese & Mc Kenzie, 1980 (3, 4, 5)

Pseudocythere caudata G.O. Sars, 1866 (3, 4)

Paradoxostomatidae

Cytherois G.W. Müller, 1884

Cytherois frequens G.W. Müller, 1894 (3, 4, 5)

Cytherois incongruens G.W. Müller, 1894 (3) (E, M)

Cytherois succinea G.W. Müller, 1894 (3, 4, 5) (M)

Cytherois triangularis Bonaduce, Masoli, Minichelli & Pugliese, 1979 (3)

Cytherois uffenordei Ruggieri, 1974 (3, 4)

Machaerina Brady & Norman, 1889

Machaerina tenuissima (Norman, 1869) (3, 4)

Paracythere G.W. Müller, 1894

Paracythere minima G.W. Müller, 1894 (3, 4) (E)

Paracytherois G.W. Müller, 1894

Paracytherois acuminata G.W. Müller, 1894 (3, 4) (E)

Paracytherois flexuosa (Brady, 1867) (3, 4)

Paracytherois mediterranea Bonaduce, Ciampo & Masoli, 1976 (3, 4, 5)
Paracytherois oblonga G.W. Müller, 1894 (3) (E)
Paracytherois rara G.W. Müller, 1894 (3, 4) (E)
Paracytherois striata G.W. Müller, 1894 (3, 4)
Paracytherois sulcata G.W. Müller, 1894 (3)

Paradoxostoma Fischer, 1855

Paradoxostoma acuminatum G.W. Müller, 1894 (3, 4, 5) (E, M)
Paradoxostoma angustum G.W. Müller, 1894 (3, 4)
Paradoxostoma atrum G.W. Müller, 1894 (3, 4, 5)
Paradoxostoma breve G.W. Müller, 1894 (3, 5)
Paradoxostoma caecum G.W. Müller, 1894 (3, 4, 5)
Paradoxostoma cylindricum G.W. Müller, 1894 (3)
Paradoxostoma fuscum G.W. Müller, 1894 (3, 4, 5)
Paradoxostoma incongruens G.W. Müller, 1894 (3, 5)
Paradoxostoma intermedium G.W. Müller, 1894 (3, 4, 5)
Paradoxostoma maculatum G.W. Müller, 1894 (3) (E, M)
Paradoxostoma mediterraneum G.W. Müller, 1894 (3) (M)
Paradoxostoma parallelum G.W. Müller, 1894 (3)
Paradoxostoma planum G.W. Müller, 1894 (3)
Paradoxostoma rarum G.W. Müller, 1894 (3, 5)
Paradoxostoma rotundatum G.W. Müller, 1894 (3, 4) (M)
Paradoxostoma rubrum G.W. Müller, 1894 (3) (E)
Paradoxostoma simile G.W. Müller, 1894 (3, 4)
Paradoxostoma striatum G.W. Müller, 1894 (3)
Paradoxostoma taeniatum G.W. Müller, 1894 (3, 5) (M)
Paradoxostoma triste G.W. Müller, 1894 (3, 5) (E, M)
Paradoxostoma versicolor G.W. Müller, 1894 (3, 5)

Sclerochilus G.O. Sars, 1866

Sclerochilus aequus G.W. Müller, 1894 (3)
Sclerochilus contortus (Norman, 1861) (3, 4, 5)
Sclerochilus levis G.W. Müller, 1894 (3)
Sclerochilus similis G.W. Müller, 1894 (3, 5)

Entocytheridae

Sphaeromicola Paris, 1916

Sphaeromicola stammeri Klie, 1938 (N)

Darwinulidae

Darwinula Brady & Robertson, 1885

Darwinula stevensoni (Brady & Robertson, 1870) (N)
Darwinula variabilis Tagliasacchi, 1968 (Sa) (E)

Macrocyprididae

Macrocypris Brady, 1868

Macrocypris succinea G.W. Müller, 1894 (3, 5)

Macromckenziea Maddocks, 1990

Macromckenziea ligustica (Bonaduce, Masoli & Pugliese, 1977) (3)

Ilyocyprididae

Ilyocyprella Daday, 1900

Ilyocyprella bradyi (G.O. Sars, 1890) (N, S, Sa)

Ilyocyprella inermis (Kaufmann, 1900) (N)

Ilyocypris Brady & Norman, 1889

Ilyocypris australiensis G.O. Sars, 1890 (N, S)

Ilyocypris decipiens Masi, 1905 (N, S)

Ilyocypris gibba (Ramdohr, 1808) (N, S, Sa)

Pontocyprididae

Argilloecia G.O. Sars, 1866

Argilloecia acuminata G.W. Müller, 1894 (3, 4, 5)

Argilloecia bulbifera G.W. Müller, 1894 (3, 4, 5)

Argilloecia caudata G.W. Müller, 1894 (3, 4, 5)

Argilloecia gonzalezi Barra, Aiello & Bonaduce, 1994 (4)

Argilloecia levis G.W. Müller, 1894 (3, 4, 5) (E)

Argilloecia micra Bonaduce, Ciampo & Masoli, 1976 (3, 4, 5)

Argilloecia minor G.W. Müller, 1894 (3, 4, 5)

Argilloecia robusta Bonaduce, Ciampo & Masoli, 1976 (4, 5)

Pontocypria G.W. Müller, 1894

Pontocypria spinosa G.W. Müller, 1894 (3, 4, 5)

Pontocypris G.O. Sars, 1866

Pontocypris acuminata (G.W. Müller, 1894) (3, 4, 5)
Pontocypris acuta Bonaduce, Ciampo & Masoli, 1976 (3, 4) (E)
Pontocypris declivis G.W. Müller, 1894 (3) (E)
Pontocypris dispar G.W. Müller, 1894 (3)
Pontocypris levis G.W. Müller, 1894 (3) (E, M)
Pontocypris maculosa G.W. Müller, 1894 (3) (E, M)
Pontocypris mediterranea G.W. Müller, 1894 (3) (E, M)
Pontocypris obtusa (G.W. Müller, 1894) (3, 4, 5) (E)
Pontocypris pellucida G.W. Müller, 1894 (3) (E, M)

***Propontocypris* Sylvester-Bradley, 1947**

Propontocypris intermedia (Brady, 1868) (3, 4, 5)
Propontocypris monstrosa (G.W. Müller, 1894) (3)
Propontocypris pirifera (G.W. Müller, 1894) (3, 4, 5)
Propontocypris setosa (G.W. Müller, 1894) (3, 4) (E)
Propontocypris subfusca (G.W. Müller, 1894) (3)
Propontocypris succinea (G.W. Müller, 1894) (3, 5) (E)

Candonidae

***Aglaiocypris* Sylvester-Bradley, 1947**

Aglaiocypris complanata Brady & Robertson, 1869 (3, 4, 5)
Aglaiocypris rara (G.W. Müller, 1894) (3, 5)

***Candona* Baird, 1845**

Candona angulata G.W. Müller, 1900 (N, S)
Candona balatonica Daday, 1894 (N)
Candona brevicornis Klie, 1925 (N)
Candona candida (O.F. Müller, 1776) (N, S)
Candona caudata Kaufmann, 1900 (N)
Candona fabaeformis Fischer, 1854 (N, S)
Candona fragilis Hartwig, 1898 (N)
Candona hartwigi G.W. Müller, 1900 (N)
Candona lactea Baird, 1850 (S)
Candona lobipes Hartwig, 1900 (N)
Candona marchica Hartwig, 1899 (N, S)
Candona neglecta G.O. Sars, 1887 (N, S)
Candona paionica Petkovski, 1958 (N, S)
Candona parallela G.W. Müller, 1900 (N)
Candona pratensis Hartwig, 1901 (N)
Candona protzi Hartwig, 1898 (N)
Candona rostrata Brady & Norman, 1889 (N)
Candona sarsi Hartwig, 1899 (N)

Candona stammeri Klie, 1938 (S)
Candona sucki Hartwig, 1901 (N)
Candona trigonella Klie, 1938 (N)
Candona vavrai Kaufmann, 1900 (N)
Candona zschokkei Wolf, 1919 (N)

Candonopsis Vavra, 1891

Candonopsis kingsleyi (Brady & Roberston, 1870) (N)

Cyclocypris Brady & Norman, 1889

Cyclocypris levis (O.F. Müller, 1785) (N)
Cyclocypris ovum (Jurine, 1820) (N, S)
Cyclocypris serena (Koch, 1837) (N)

Cypria Zenker, 1854

Cypria lacustris G.O. Sars, 1891 (N)
Cypria ophtalmica Jurine, 1820 (N, S)

Lineocypris Zalanyi, 1929

Lineocypris bucesi Masoli & Minichelli, 1974 (N) (E)
Lineocypris gradensis Masoli & Minichelli, 1974 (N) (E)
Lineocypris maranensis Masoli & Minichelli, 1974 (N) (E)

Paracandona Hartwig, 1899

Paracandona euplectella (Brady & Norman, 1889) (N)

Physocypris Vavra, 1897

Physocypris armata G.W. Müller, 1898 (N)

Cyprididae

Chlamydotheca Saussure, 1858

Chlamydotheca incisa (Claus, 1892) (N)

Cypretta Vavra, 1895

Cypretta dubia (Daday, 1901) (N, S)
Cypretta globulus (G.O. Sars, 1890) (N, Sa)
Cypretta minna (King, 1855) (N)
Cypretta seurati Gauthier, 1929 (N)

Cypretta turgida (G.O. Sars, 1895) (N, Sa)

Cypricercus G.O. Sars, 1895

Cypricercus affinis (Fischer, 1851) (S)

Cypricercus fuscatus (Jurine, 1820) (N, S)

Cyprinotus Brady, 1886

Cyprinotus salinus (Brady, 1868) (N, S, Sa)

Cypris O.F. Müller, 1776

Cypris bispinosa Lucas, 1846 (S, Sa)

Cypris onusta Masi, 1905 (S)

Cypris pubera O.F. Müller, 1776 (N, S)

Dolerocypris Kaufmann, 1900

Dolerocypris fasciata (O.F. Müller, 1776) (N, S)

Dolerocypris sinensis G.O. Sars, 1903 (N, S)

Eucypris Vavra, 1891

Eucypris accipitrina Anichini, 1968 (Sa) (E)

Eucypris caralitana Tagliasacchi, 1969 (Sa) (E)

Eucypris clavata (Baird, 1838) (N)

Eucypris crassa (O.F. Müller, 1785) (Sa)

Eucypris elliptica (Baird, 1850) (N)

Eucypris hieracina Anichini, 1968 (Sa) (E)

Eucypris lilljeborgi G.W. Müller, 1900 (S, Sa)

Eucypris longisetosa Anichini, 1968 (Sa) (E)

Eucypris lutaria (Koch, 1838) (N, S, Sa)

Eucypris molybdena Anichini, 1968 (Sa) (E)

Eucypris ornata (O.F. Müller, 1776) (Sa)

Eucypris pigra (Fischer, 1851) (N)

Eucypris reptans (Kaufmann, 1900) (N, S)

Eucypris reticulata Zaddach, 1844 (N, S, Sa)

Eucypris stagnalis Tagliasacchi, 1969 (Sa) (E)

Eucypris sulcitana Anichini, 1968 (Sa) (E)

Eucypris tarentina Anichini, 1963 (S) (E)

Eucypris virens (Jurine, 1820) (N, S, Sa)

Herpetocypris Brady & Norman, 1889

Herpetocypris chevreuxi (G.O. Sars, 1896) (N, S, Sa)

Herpetocypris flumendosae Anichini, 1970 (Sa) (E)

Herpetocypris intermedia Kaufmann, 1900 (N, S)

Herpetocypris puteolina Anichini, 1968 (Sa) (E)
Herpetocypris reptans (Baird, 1835) (N, S, Sa)
Herpetocypris romei Anichini, 1970 (Sa) (E)
Herpetocypris scoininosa Anichini, 1968 (Sa) (E)

Heterocypris Claus, 1893

Heterocypris aurea (G.O. Sars, 1895) (S)
Heterocypris dentatmarginata (G.O. Sars, 1890) (S)
Heterocypris dextrodepressa (Moroni, 1967) (N, S, Sa)
Heterocypris ichnusae (Anichini, 1970) (Sa) (E)
Heterocypris incongruens (Ramdohr, 1808) (N, S, Sa)
Heterocypris nurrensis Tagliasacchi, 1968 (Sa) (E)

Ilyodromus G.O. Sars, 1894

Ilyodromus viridulus (Brady, 1886) (N)

Isocypris G.W. Müller, 1908

Isocypris beuchampi (Paris, 1919) (N)
Isocypris nocentiniae Fox, 1963 (N)

Notodromas Lilljeborg, 1853

Notodromas monacha (O.F. Müller, 1776) (N, Sa)
Notodromas persica Gurney, 1920 (N, S)

Prionocypris Brady & Norman, 1896

Prionocypris muelleri Danielopol & Mc Kenzie, 1977 (S)
Prionocypris zenkeri (Chyzer & Toth, 1858) (N)

Psychrodromus Danielopol & Mc Kenzie, 1977

Psychrodromus fontinalis (Wolf, 1919) (N)
Psychrodromus olivaceus (Brady & Norman, 1889) (S, Sa)

Stenocypris G.W. Müller, 1901

Stenocypris fischeri (Lilljeborg, 1883) (S, Sa)

Stenocypris G.O. Sars, 1899

Stenocypris fontinalis (Vavra, 1895) (N, S, Sa)
Stenocypris major (Baird, 1859) (N, S, Sa)

Strandesia Stuhlmann, 1888

Strandesia caudata Klie, 1939 (N)
Strandesia clorocelis Anichini, 1970 (Sa) (E)
Strandesia mulargiae Anichini, 1970 (Sa) (E)
Strandesia reticulata (Daday, 1898) (N, Sa)
Strandesia spinulosa Bronstein, 1958 (N)
Strandesia tonolli Moroni, 1961 (N)
Strandesia vinciguerrae (Masi, 1905) (S)

Tanycypris Triebel, 1959

Tanycypris pellucida (Klie, 1933) (N, S)

Cypridopsidae

Cypridopsis Brady, 1868

Cypridopsis elongata Kaufmann, 1900 (N)
Cypridopsis hartwigi G.W. Müller, 1900 (S, Sa)
Cypridopsis helvetica Kaufmann, 1900 (N)
Cypridopsis obesa Brady & Robertson, 1869 (N, S, Sa)
Cypridopsis parva G.W. Müller, 1900 (N, Sa)
Cypridopsis sanctipetri Anichini, 1968 (Sa) (E)
Cypridopsis variegata Brady & Norman, 1899 (S)
Cypridopsis vidua (O.F. Müller, 1776) (N, S)

Cyprilla G.O. Sars, 1924

Cyprilla arcuata (G.O. Sars, 1903) (Sa)

Plesiocypridopsis Rome, 1965

Plesiocypridopsis newtoni (Brady & Robertson, 1870) (S, Sa)
Plesiocypridopsis pilosa (Anichini, 1970) (Sa) (E)
Plesiocypridopsis thermarum (Tagliasacchi, 1970) (Sa) (E)

Potamocypris Brady, 1870

Potamocypris crassipes (Masi, 1905) (N, S)
Potamocypris fulva (Brady, 1868) (N)
Potamocypris maculata Alm, 1914 (N)
Potamocypris pallida Alm, 1914 (N)
Potamocypris rullieri Anichini, 1967 (Sa) (E)
Potamocypris similis G.W. Müller, 1912 (N)
Potamocypris smaragdina (Vavra, 1891) (N, S, Sa)
Potamocypris tetrateniata Anichini, 1970 (Sa) (E)
Potamocypris villosa (Jurine, 1820) (N, S)

Potamocypris wolfi Brehm, 1920 (N)

Sarscypridopsis McKenzie, 1977

Sarscypridopsis aculeata (O.G. Costa, 1852) (S, Sa)

Copepoda

Calanoida

Calanidae

Calanus Leach, 1819

Calanus helgolandicus (Claus, 1863) (3, 4, 5)

Neocalanus G.O. Sars, 1925

Neocalanus gracilis (Dana, 1849) (3, 4, 5)

Mesocalanus Bradford & Jillett, 1974

Mesocalanus tenuicornis (Dana, 1849) (3, 4, 5)

Nannocalanus Sars, 1925

Nannocalanus minor (Claus, 1863) (3, 4, 5)

Megacalanidae

Megacalanus Wolfenden, 1904

Megacalanus longicornis (G.O. Sars, 1905) (3)

Eucalanidae

Eucalanus Dana, 1853

Eucalanus attenuatus (Dana, 1849) (3, 4, 5)

Eucalanus crassus Giesbrecht, 1888 (3, 4, 5)

Eucalanus elongatus (Dana, 1849) (3, 4, 5)

Eucalanus monachus Giesbrecht, 1888 (3, 4, 5)

Rhincalanus Dana, 1853

Rhincalanus cornutus (Dana, 1849) (3, 5)

Rhincalanus nasutus Giesbrecht, 1888 (3, 5)

Mecynoceridae

Mecynocera Thompson, 1888

Mecynocera clausi Thompson, 1888 (3, 4, 5)

Paracalanidae

Paracalanus Boeck, 1864

Paracalanus aculeatus Giesbrecht, 1888 (3, 4)

Paracalanus denudatus Sewell, 1929 (3, 4, 5)

Paracalanus nanus G.O. Sars, 1907 (3, 4, 5)

Paracalanus parvus (Claus, 1863) (3, 4, 5)

Calocalanidae

Calocalanus Giesbrecht, 1888

Calocalanus adriaticus Shmeleva, 1965 (3, 4, 5)

Calocalanus contractus Farran, 1926 (3, 4, 5)

Calocalanus elegans Shmeleva, 1965 (4, 5)

Calocalanus longisetosus Shmeleva, 1965 (5)

Calocalanus neptunus Shmeleva, 1965 (3, 4, 5)

Calocalanus ovalis Shmeleva, 1965 (4, 5)

Calocalanus pavo (Dana, 1849) (3, 4, 5)

Calocalanus pavoninus Farran, 1936 (5)

Calocalanus plumatus Shmeleva, 1965 (4, 5)

Calocalanus styliremis Giesbrecht, 1888 (3, 4, 5)

Ischnocalanus Bernard, 1863

Ischnocalanus plumulosus (Claus, 1863) (3, 4, 5)

Ischnocalanus tenuis (Farran, 1926) (3, 4, 5)

Clausocalanidae

Clausocalanus Giesbrecht, 1888

Clausocalanus arcuicornis (Dana, 1849) (3, 4, 5)
Clausocalanus furcatus (Brady, 1883) (3, 4, 5)
Clausocalanus jobei Frost & Fleminger, 1968 (3, 4, 5)
Clausocalanus lividus Frost & Fleminger, 1968 (3, 4, 5)
Clausocalanus mastigophorus (Claus, 1863) (3, 4, 5)
Clausocalanus parapergens Frost & Fleminger, 1968 (3, 4, 5)
Clausocalanus paululus Farran, 1926 (3, 4, 5)
Clausocalanus pergens Farran, 1926 (3, 4, 5)

Ctenocalanus Giesbrecht, 1888

Ctenocalanus vanus Giesbrecht, 1888 (3, 4, 5)

Pseudocalanus Boeck, 1872

Pseudocalanus elongatus (Boeck, 1864) (3, 4, 5)

Microcalanus G.O. Sars, 1902

Microcalanus pygmaeus (G.O. Sars, 1900) (3, 5)

Spinocalanidae

Spinocalanus Giesbrecht, 1888

Spinocalanus abyssalis Giesbrecht, 1888 (4, 5)
Spinocalanus longicornis G.O. Sars, 1900 (3, 5)
Spinocalanus magnus Wolfenden, 1904 (3, 4, 5)
Spinocalanus oligospinosus Park, 1970 (3, 5)

Mimocalanus Farran, 1908

Mimocalanus cultrifer Farran, 1908 (3, 5)
Mimocalanus heronae Damkaer, 1975 (3, 4, 5)

Monacilla G.O. Sars, 1905

Monacilla typica G.O. Sars, 1905 (3, 5)

Aetideidae

Aetideus Brady, 1883

Aetideus armatus (Boeck, 1872) (3, 4, 5)

Aetideopsis G.O. Sars, 1903

Aetideopsis rostrata G.O. Sars, 1903 (4, 5)

Chiridius Giesbrecht, 1892

Chiridius poppei Giesbrecht, 1892 (3, 4, 5)

Pseudaetideus Wolfenden, 1904

Pseudaetideus armatus (Boeck, 1872) (3, 4, 5)

Gaidius Giesbrecht, 1895

Gaidius tenuispinus (G.O. Sars, 1900) (5)

Gaetanus Giesbrecht, 1888

Gaetanus kruppi Giesbrecht, 1903 (3, 5)

Euaetideus G.O. Sars, 1925

Euaetideus giesbrechti (Cleve, 1904) (3, 4, 5)

Euchirella Giesbrecht, 1888

Euchirella bitumida With, 1915 (3)

Euchirella messinensis (Claus, 1863) (3, 4, 5)

Euchirella rostrata (Claus, 1866) (3, 4, 5)

Pseudochirella G.O. Sars, 1920

Pseudochirella obtusa (G.O. Sars, 1905) (3)

Euchaetidae

Euchaeta Philippi, 1843

Euchaeta marina (Prestandrea, 1833) (3, 4, 5)

Paraeuchaeta T. Scott, 1909

Paraeuchaeta acuta (Giesbrecht, 1892) (3, 4, 5)

Paraeuchaeta bisinuata (G.O. Sars, 1907) (3)

Paraeuchaeta hansenii (With, 1915) (3)

Paraeuchaeta hebes (Giesbrecht, 1888) (3, 4, 5)

Paraeuchaeta sarsi (Farran, 1908) (3)

Paraeuchaeta spinosa (Giesbrecht, 1892) (3, 4, 5)

Phaennidae

Onchocalanus G.O. Sars, 1905

Onchocalanus trigoniceps G.O. Sars, 1905 (3, 4, 5)

Phaenna Claus, 1863

Phaenna spinifera Claus, 1863 (3, 4, 5)

Xanthocalanus Giesbrecht, 1892

Xanthocalanus agilis Giesbrecht, 1892 (3, 4, 5)

Xanthocalanus minor Giesbrecht, 1892 (3)

Scolecithricidae

Amallothrix G.O. Sars, 1925

Amallothrix auropecten Giesbrecht, 1892 (3, 5)

Amallothrix lobata (G.O. Sars, 1920) (3)

Scaphocalanus G.O. Sars, 1900

Scaphocalanus curtus (Farran, 1926) (3, 4, 5)

Scaphocalanus invalidus Hure & Scotto di Carlo, 1968 (3, 4, 5)

Scaphocalanus similis Hure & Scotto di Carlo, 1968 (3, 4, 5)

Scolecithricella G.O. Sars, 1902

Scolecithricella abyssalis (Giesbrecht, 1888) (3, 4, 5)

Scolecithricella dentata (Giesbrecht, 1892) (3, 4, 5)

Scolecithricella ovata (Farran, 1905) (4, 5)

Scolecithricella tenuiserrata (Giesbrecht, 1892) (3, 4, 5)

Scolecithricella vittata (Giesbrecht, 1892) (3, 4, 5)

Scolecithrix Brady, 1883

Scolecithrix bradyi Giesbrecht, 1888 (3, 4, 5)

Scolecithrix danae (Lubbock, 1856) (3, 4, 5)

Diaixidae

Diaixis G.O. Sars, 1902

Diaixis pygmaea (T. Scott, 1899) (3, 4, 5)

Tharybidae

Undinella G.O. Sars, 1900

Undinella stirni Grice, 1971 (3)

Temoridae

Temora Baird, 1850

Temora longicornis (O.F. Müller, 1792) (3, 4, 5)

Temora stylifera (Dana, 1849) (3, 4, 5)

Temoropia T. Scott, 1894

Temoropia mayumbaensis T. Scott, 1894 (3, 4, 5)

Hetercope G.O. Sars, 1862

Hetercope saliens (Lilljeborg, 1862) (N)

Metridinidae

Metridina Boeck, 1864

Metridina princeps Giesbrecht, 1889 (3)

Pleuromamma Giesbrecht, 1898

Pleuromamma abdominalis (Lubbock, 1856) (3, 4, 5)

Pleuromamma borealis (F. Dahl, 1893) (3)

Pleuromamma gracilis (Claus, 1863) (3, 4, 5)

Pleuromamma piseki Farran, 1929 (3, 4, 5)

Pleuromamma robusta (F. Dahl, 1893) (3, 4, 5)

Pleuromamma xiphias (Giesbrecht, 1889) (3, 4, 5)

Centropagidae

Centropages Krøyer, 1849

Centropages bradyi Wheeler, 1901 (5)

Centropages chierchiae Giesbrecht, 1889 (3, 5)
Centropages hamatus (Lilljeborg, 1853) (3)
Centropages kroeyeri Giesbrecht, 1892 (3, 4, 5)
Centropages ponticus Karavaev, 1894 (3, 4, 5)
Centropages typicus Krøyer, 1849 (3, 4, 5)
Centropages violaceus (Claus, 1863) (3, 4, 5)

Isias Boeck, 1864

Isias clavipes Boeck, 1864 (3, 4, 5)

Boeckella de Guerne & Richard, 1889

Boeckella triarticulata (Thompson, 1883) (N)

Lucicutiidae

Lucicutia Giesbrecht, 1898

Lucicutia clausi (Giesbrecht, 1889) (3, 4, 5)
Lucicutia curta Farran, 1905 (3)
Lucicutia flavicornis (Claus, 1863) (3, 4, 5)
Lucicutia gaussae Grice, 1963 (5)
Lucicutia gemina Farran, 1926 (3, 4, 5)
Lucicutia grandis (Giesbrecht, 1895) (3)
Lucicutia longiserrata (Giesbrecht, 1889) (3, 5)
Lucicutia ovalis (Giesbrecht, 1889) (4, 5)
Lucicutia pera A. Scott, 1909 (3, 4, 5)

Heterorhabdidae

Heterorhabdus Giesbrecht, 1898

Heterorhabdus abyssalis (Giesbrecht, 1889) (3, 4, 5)
Heterorhabdus papilliger (Claus, 1863) (3, 4, 5)
Heterorhabdus spinifrons (Claus, 1863) (3, 4, 5)

Augaptilidae

Haloptilus Giesbrecht, 1898

Haloptilus acutifrons (Giesbrecht, 1892) (3, 4, 5)
Haloptilus angusticeps G.O. Sars, 1907 (3)
Haloptilus fertilis (Giesbrecht, 1892) (3, 4, 5)
Haloptilus longicornis (Claus, 1863) (3, 4, 5)

Haloptilus mucronatus (Claus, 1863) (3, 5)
Haloptilus ornatus (Giesbrecht, 1892) (3, 4, 5)
Haloptilus oxycephalus (Giesbrecht, 1889) (3, 5)
Haloptilus plumosus (Claus, 1863) (3, 5)
Haloptilus spiniceps (Giesbrecht, 1892) (3)
Haloptilus tenuis Farran, 1908 (3)
Haloptilus validus G.O. Sars, 1920 (3, 5)

Augaptilus Giesbrecht, 1889

Augaptilus longicaudatus (Claus, 1863) (3, 4, 5)
Augaptilus spinifrons G.O. Sars, 1907 (3, 5)

Euaugaptilus G.O. Sars, 1920

Euaugaptilus filiger (Claus, 1863) (3, 4, 5)
Euaugaptilus hecticus (Giesbrecht, 1889) (3, 4, 5)
Euaugaptilus truncatus (G.O. Sars, 1905) (3)

Discoidae

Disco Grice & Hulsemann, 1965

Disco minutus Grice & Hulsemann, 1965 (3, 4, 5)

Arietellidae

Arietellus Giesbrecht, 1892

Arietellus setosus Giesbrecht, 1892 (3, 4, 5)

Candaciidae

Candacia Dana, 1846

Candacia aethiopica (Dana, 1849) (3, 4, 5)
Candacia armata (Boeck, 1872) (3, 4, 5)
Candacia bipinnata (Giesbrecht, 1889) (3, 4, 5)
Candacia elongata (Boeck, 1872) (3, 4, 5)
Candacia giesbrechti Grice & Lawson, 1977 (3, 4, 5)
Candacia longimana (Claus, 1863) (3, 4, 5)
Candacia tenuimana (Giesbrecht, 1889) (3, 4, 5)
Candacia varicans (Giesbrecht, 1892) (3, 4, 5)

Paracandacia Grice, 1963

Paracandacia bispinosa (Claus, 1863) (3, 4, 5)
Paracandacia simplex (Giesbrecht, 1889) (3, 4, 5)

Pontellidae

Labidocera Lubbock, 1853

Labidocera brunescens (Czerniavsky, 1868) (3, 4, 5)
Labidocera wollastoni (Lubbock, 1857) (3, 4, 5)

Pontella Dana, 1846

Pontella atlantica (Milne Edwards, 1840) (3)
Pontella lobiancoi (Canu, 1888) (3, 4)
Pontella mediterranea (Claus, 1863) (3, 4, 5)

Pontellopsis Brady, 1883

Pontellopsis regalis (Dana, 1849) (3, 4, 5)
Pontellopsis villosa Brady, 1883 (3)

Anomalocera Templeton, 1837

Anomalocera patersoni Templeton, 1837 (3, 4, 5)

Pontellina Dana, 1853

Pontellina plumata (Dana, 1849) (3, 4, 5)

Parapontellidae

Parapontella Brady, 1878

Parapontella brevicornis (Lubbock, 1857) (3)

Bathypontiidae

Temorites G.O. Sars, 1900

Temorites brevis G.O. Sars, 1900 (3, 4, 5)

Acartiidae

***Acartia* Dana, 1846**

Acartia adriatica Steuer, 1910 (4, 5)
Acartia bifilosa (Giesbrecht, 1881) (3, 4, 5)
Acartia clausi Giesbrecht, 1889 (3, 4, 5)
Acartia danae Giesbrecht, 1889 (3, 5)
Acartia discaudata (Giesbrecht, 1881) (3) (*)
Acartia enzoï Crisafi, 1974 (3)
Acartia grani Sars, 1904 (3)
Acartia italica Steuer, 1910 (3, 4, 5)
Acartia josephinae Crisafi, 1974 (3, 4, 5)
Acartia latisetosa (Krichagin, 1873) (3, 4, 5)
Acartia longiremis (Lilljeborg, 1853) (3, 4, 5)
Acartia margalefi Alcaraz, 1976 (3, 4, 5)
Acartia negligens Dana, 1894 (3, 4, 5)
Acartia teclae Bradford, 1976 (3, 4)
Acartia tonsa Dana, 1849 (3, 4, 5)

Note

Acartia discaudata: Le segnalazioni per le acque italiane (bacino 3) si riferiscono sia ad *A. discaudata* (Giesbrecht, 1881), senza ulteriori specificazioni, sia alla sottospecie *A. d. mediterranea* Steuer, 1929.

Pseudodiaptomidae

***Calanipeda* Kritshagin, 1873**

Calanipeda aquaedulcis Kritshagin, 1873 (S, Si, Sa)

Diaptomidae

***Diaptomus (Chaetodiaptomus)* Kiefer, 1978**

Diaptomus (Chaetodiaptomus) cyaneus Gurney, 1909 (N, S, Sa)
Diaptomus (Chaetodiaptomus) serbicus Gjorgewic, 1907 (S)

***Hemidiaptomus (Hemidiaptomus)* G.O. Sars, 1903**

Hemidiaptomus (Hemidiaptomus) gurneyi (Roy, 1907) (S)

***Hemidiaptomus (Gigantodiaptomus)* Kiefer, 1932**

Hemidiaptomus (Gigantodiaptomus) roubaui (Richard, 1888) (Sa)

***Acanthodiaptomus* Kiefer, 1932**

Acanthodiaptomus denticornis (Wierzejski, 1887) (N)

Eudiaptomus Kiefer, 1932

Eudiaptomus intermedius (Steuer, 1897) (N)

Eudiaptomus padanus (Burckhardt, 1900)

Eudiaptomus padanus padanus (Burckhardt, 1900) (N)

Eudiaptomus padanus etruscus (Losito, 1901) (S)

Eudiaptomus padanus etruscosexsetosus Kiefer, 1978 (S)

Eudiaptomus vulgaris (Schmeil, 1898) (N, S)

Eudiaptomus zachariasii (Poppe, 1886) (N, S)

Copidodiaptomus Kiefer, 1968

Copidodiaptomus numidicus (Gurney, 1909) (Si, Sa)

Copidodiaptomus steueri (Brehm, 1904) (N, S)

Arctodiaptomus (Arctodiaptomus) Kiefer, 1932

Arctodiaptomus (Arctodiaptomus) stephanidesi (Pesta, 1935) (Si)

Arctodiaptomus (Arctodiaptomus) wierzejskii (Richard, 1888) (Sa)

Arctodiaptomus (Rhabdodiaptomus) Kiefer, 1971

Arctodiaptomus (Rhabdodiaptomus) alpinus (Imhof, 1885) (N)

Arctodiaptomus (Rhabdodiaptomus) salinus (Daday, 1885) (Si, Sa)

Mixodiaptomus Kiefer, 1932

Mixodiaptomus incrassatus (G.O. Sars, 1903) (Sa)

Mixodiaptomus laciniatus (Lilljeborg, 1889) (N)

Mixodiaptomus lilljeborgi (de Guerne & Richard, 1888) (S, Sa)

Mixodiaptomus kupelwieseri (Brehm, 1907) (N, S, Si, Sa)

Mixodiaptomus tatricus (Wierzejski, 1883) (N)

Troglodiaptomus Petkovski, 1978

Troglodiaptomus sketi Petkowski, 1978 (N)

Cyclopoida

Oithonidae

Oithona Baird, 1849

Oithona atlantica Farran, 1908 (3, 5)
Oithona brevicornis Giesbrecht, 1891 (3, 5)
Oithona decipiens Farran, 1913 (3, 5)
Oithona hebes Giesbrecht, 1891 (3)
Oithona linearis Giesbrecht, 1891 (3, 5)
Oithona longispina Nishida, 1977 (3, 5)
Oithona nana Giesbrecht, 1892 (3, 4, 5)
Oithona plumifera Baird, 1843 (3, 4, 5)
Oithona setigera (Dana, 1849) (3, 4, 5)
Oithona similis Claus, 1866 (3, 4, 5) (*)
Oithona tenuis Rosendorn, 1917 (5)
Oithona vivida Farran, 1913 (5)

Paroithona Farran, 1908

Paroithona parvula Farran, 1908 (5)

Note

Oithona similis: Vi è una notevole confusione sul nome da utilizzare per questa specie. Nishida et al., (1977) hanno ampiamente discusso sulle relazioni tra *O. similis* Klaus, 1866 e *O. helgolandica* Klaus, 1863 e sono dell'opinione che quest'ultima debba essere rigettata.

Cyclopidae

Acanthocyclops Kiefer, 1927

Acanthocyclops agamus Kiefer, 1938 (S) (E)
Acanthocyclops gordani Petkovski, 1971 (N)
Acanthocyclops hispanicus Kiefer, 1937 (N)
Acanthocyclops kieferi (Chappuis, 1925) (S)
Acanthocyclops orientalis Borutzki, 1966 (S)
Acanthocyclops robustus (G.O. Sars, 1863) (N, S, Si, Sa)
Acanthocyclops sambugarae Kiefer, 1981 (N) (E)
Acanthocyclops troglophilus Kiefer, 1932 (N)
Acanthocyclops venustus (Norman & Scott, 1906)
 Acanthocyclops venustus venustus (Norman & Scott, 1906) (S, Sa)
 Acanthocyclops venustus italicus Pesce & Maggi, 1979 (S) (E)
 Acanthocyclops venustus stammeri (Kiefer, 1930) (N)
Acanthocyclops vernalis (Fischer, 1853) (N, S, Sa)

Cryptocyclops G.O. Sars, 1927

Cryptocyclops bicolor (G.O. Sars, 1863) (N, S)

Cyclops O.F. Müller, 1776

Cyclops abyssorum G.O. Sars, 1863

- Cyclops abyssorum abyssorum* G.O. Sars, 1863 (S, Si)
- Cyclops abyssorum apenninae* Lindberg, 1957 (S) (E)
- Cyclops abyssorum divergens* (Lindberg, 1936) (Si)
- Cyclops abyssorum divulsus* (Lindberg, 1936) (S)
- Cyclops abyssorum laevis* (Losito, 1902) (S) (E)
- Cyclops abyssorum larianus* (Stella, 1934) (N) (E)
- Cyclops abyssorum maiorus* Lindberg, 1957 (N) (E)
- Cyclops abyssorum novarensis* Einsle, 1968 (N) (E)
- Cyclops abyssorum paternonis* (Lindberg, 1956) (S, Sa) (E)
- Cyclops abyssorum prealpinus* Kiefer, 1938 (N, S)
- Cyclops abyssorum tatricus* (Kozminski, 1927) (N)
- Cyclops abyssorum tovelanus* (Baldi, 1941) (N)

Cyclops aurantius Fischer, 1860 (Si) (E)

Cyclops bohater Kozminski, 1933 (N)

Cyclops furcifer (Claus, 1857) (S, Si, Sa)

Cyclops insignis Claus, 1857 (N)

Cyclops kolensis Lilljeborg, 1901 (Sa)

Cyclops strenuus Fischer, 1851 (N, S, Si)

Cyclops vicinus Ulianine, 1875 (N)

Diacyclops Kiefer, 1927

Diacyclops antricola Kiefer, 1967 (N, S)

Diacyclops belgicus (Kiefer, 1936) (N, S)

Diacyclops bicuspidatus (Claus, 1857)

Diacyclops bicuspidatus bicuspidatus (Claus, 1857) (N, S, Si, Sa)

Diacyclops bicuspidatus lubbocki (Brady, 1869) (N, S, Si, Sa)

Diacyclops bicuspidatus lucanus Pesce & Galassi, 1985 (S)

Diacyclops bisetosus (Rehberg, 1880) (N, S, Si, Sa)

Diacyclops charon Kiefer, 1931 (N)

Diacyclops clandestinus (Kiefer, 1926) (N, S, Si, Sa)

Diacyclops crassicaudis (G.O. Sars, 1863)

Diacyclops crassicaudis crassicaudis (G.O. Sars, 1863) (S)

Diacyclops crassicaudis lagrecai Pesce & Galassi, 1987 (Si) (E)

Diacyclops crassicaudis trinacriae Pesce & Galassi, 1987 (Si)

Diacyclops cristinae Pesce & Galassi, 1987 (S) (E)

Diacyclops hypnicola (Gurney, 1927) (S)

Diacyclops ichnusae Pesce & Galassi, 1985 (Sa)

Diacyclops languidoides (Lilljeborg, 1901)

Diacyclops languidoides languidoides (Lilljeborg, 1901) (N)

Diacyclops languidoides aprutinus Pesce & Fabrizi, 1979 (S) (E)

Diacyclops languidoides italianus (Kiefer, 1931) (N)

Diacyclops languidoides nagysalloensis Kiefer, 1927 (S)

Diacyclops languidus (G.O. Sars, 1863) (N, S) (E)

Diacyclops lindae Pesce, 1986 (S) (E)

Diacyclops maggii Pesce & Galassi, 1987 (S, Sa) (E)

Diacyclops nanus (G.O. Sars, 1863) (N)

Diacyclops nuragicus Pesce & Galassi, 1985 (Sa) (E)
Diacyclops paolae Pesce & Galassi, 1987 (N, S) (E)
Diacyclops paralanguidoides Pesce & Galassi, 1987 (N, S) (E)
Diacyclops ruffoi Kiefer, 1981 (N) (E)
Diacyclops sardous Pesce & Galassi, 1987 (Sa) (E)
Diacyclops tantalus (Kiefer, 1937) (N)
Diacyclops zschokkei (Graeter, 1910) (N, S, Sa)

***Ectocyclops* Brady, 1904**

Ectocyclops phaleratus (Koch, 1838) (N, S)

***Eucyclops (Eucyclops)* Kiefer, 1957**

Eucyclops (Eucyclops) denticulatus (Graeter, 1903) (N)
Eucyclops (Eucyclops) graeteri Kiefer, 1929
 Eucyclops (Eucyclops) graeteri damianae (Petkovski, 1971) (S)
 Eucyclops (Eucyclops) graeteri intermedius (Damian, 1955) (S)
Eucyclops (Eucyclops) ibleicus Pesce & Galassi, 1987 (Si) (E)
Eucyclops (Eucyclops) longispinosus Pesce & Galassi, 1987 (Si) (E)
Eucyclops (Eucyclops) macruroides (Lilljeborg, 1901) (N, S, Si)
Eucyclops (Eucyclops) macrurus (G.O. Sars, 1863) (N, S)
Eucyclops (Eucyclops) serrulatus (Fischer, 1851)
 Eucyclops (Eucyclops) serrulatus serrulatus (Fischer, 1851) (N, S, Si, Sa)
 Eucyclops (Eucyclops) serrulatus tovelanus Baldi, 1941 (N) (E)
Eucyclops (Eucyclops) speratus (Lilljeborg, 1901) (S)
Eucyclops (Eucyclops) subterraneus (Graeter, 1908) (S, Sa)

***Graeteriella (Graeteriella)* Brehm, 1926**

Graeteriella (Graeteriella) unisetigera (Graeter, 1908) (N, S)

***Halicyclops* Norman, 1903**

Halicyclops dalmatinus Petkovski, 1955 (S)
Halicyclops rotundipes Kiefer, 1935 (S)
Halicyclops troglodytes Kiefer, 1954 (S, Si, Sa)

***Macrocyclus* Claus, 1893**

Macrocyclus albidus (Jurine, 1820) (N, S, Si, Sa)
Macrocyclus distinctus (Richard, 1887) (N?, S)
Macrocyclus fuscus (Jurine, 1820) (N, S, Sa)

***Megacyclops* Kiefer, 1927**

Megacyclops brachypus Kiefer, 1954 (Sa)
Megacyclops gigas (Claus, 1857) (S, Sa)

Megacyclops latipes (Lowndes, 1927) (S, Sa)
Megacyclops viridis (Jurine, 1820) (N, S, Si, Sa)

Mesocyclops G.O. Sars, 1914

Mesocyclops leuckarti (Claus, 1857) (N, S, Sa)

Metacyclops Kiefer, 1927

Metacyclops gasparoi Stoch, 1987 (N) (E)
Metacyclops gracilis (Lilljeborg, 1857) (S, Sa)
Metacyclops minutus (Claus, 1863) (S, Sa)
Metacyclops planus (Gurney, 1909) (Si)
Metacyclops stammeri Kiefer, 1938 (S, Si, Sa)
Metacyclops subdolosus Kiefer, 1938 (S, Si, Sa)
Metacyclops trisetosus Herbst, 1957 (N)

Microcyclops Claus, 1893

Microcyclops sanfilippo Brian, 1951 (N, S?) (E)
Microcyclops rubellus (Lilljeborg, 1901) (Sa)
Microcyclops varicans (G.O. Sars, 1863) (N, S, Si)

Neocyclops (Protoneocyclops) Petkovski, 1986

Neocyclops (Protoneocyclops) mediterraneus (Kiefer, 1960) (S)

Paracyclops Claus, 1893

Paracyclops affinis (G.O. Sars, 1863) (N)
Paracyclops chiltoni (Thomson, 1882) (N)
Paracyclops fimbriatus (Fischer, 1853) (N, S, Si, Sa)

Speocyclops Kiefer, 1937

Speocyclops demetiensis (Scourfield, 1932) (N)
Speocyclops franciscoloi (Brian, 1951) (N) (E)
Speocyclops infernus (Kiefer, 1930) (N)
Speocyclops italicus Kiefer, 1938 (S) (E)
Speocyclops sardous Lindberg, 1956 (Sa) (E)

Thermocyclops Kiefer, 1937

Thermocyclops crassus (Fischer, 1853) (N, S)
Thermocyclops dybowskii (Landé, 1890) (N, S, Si, Sa)
Thermocyclops oblongatus (G.O. Sars, 1927) (S, Si)
Thermocyclops oithonides (G.O. Sars, 1863) (S?)

Tropocyclops Kiefer, 1927

Tropocyclops prasinus (Fischer, 1866) (N, S, Si, Sa)

Lernaeidae

Lernaea Linnaeus, 1758

Lernaea cyprinacea Linnaeus, 1758 (N) (O)

Ascidicolidae

Ascidicola Thorell, 1859

Ascidicola rosea Thorell, 1859 (TU (1) (*))

Enterocola van Beneden, 1860

Enterocola clavelinae Chatton & Harant, 1929 (TU (n) (*))

Enterocola fulgens van Beneden, 1860 (TU (n) (*))

Enterocola pterophora Chatton & Brément, 1909 (TU (n) (*))

Mychophilus Hesse, 1865

Mychophilus roseus Hesse, 1865 (TU (n) (*))

Enteropsis Aurivillius, 1885

Enteropsis chattoni Monniot, 1961 (TU (1) (*))

Enteropsis roscoffensis Chatton & Brément, 1909 (TU (1) (*))

Haplostoma (Canu, 1886)

Haplostoma banyulensis Brément, 1909 (TU (n) (*))

Haplostoma mizoulei Monniot, 1962 (TU (n) (*))

Enterognathus Giesbrecht, 1900

Enterognathus comatulae Giesbrecht, 1900 (3) (ED Cd)

Note

Ascidicola rosea: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.
Enterocola clavelinae: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Enterocola fulgens: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque

italiane.

Enterocola pterophora: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Mychophilus roseus: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Enteropsis chattoni: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Enteropsis roscoffensis: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Haplostoma banyulensis: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Haplostoma mizoulei: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Notodelphyidae

Anoplodelphys Lafargue & Laubier, 1978

Anoplodelphys corneci Lafargue & Laubier, 1978 (3) (TU (n))

Anoplodelphys galli Lafargue & Laubier, 1978 (3) (TU (n))

Anoplodelphys incerta Lafargue & Laubier, 1978 (3) (TU (n))

Bonnierilla Canu, 1891

Bonnierilla altera Stock, 1967 (4) (TU (1))

Bonnierilla arcuata Brement, 1909 (3) (TU (n) (*))

Bonnierilla filipes Stock, 1967 (TU (1) (*))

Bonnierilla similis Illg & Dudley, 1961 (TU (1) (*))

Botachus Thorell, 1859

Botachus cylindratus Thorell, 1859 (3, 4) (TU (1))

Brementia Chatton & Brément, 1915

Brementia balneolensis Chatton & Brément, 1915 (3, 4, 5) (TU (n))

Brementia illgi Laubier & Lafargue, 1974 (TU (n) (*))

Doroixys Kerschner, 1879

Doroixys uncinata Kerschner, 1879 (3, 4) (TU (n))

Doropygella G.O. Sars, 1921

Doropygella normani (Brady, 1878) (TU (1) (*))

Doropygella porcicauda (Brady, 1878) (TU (1) (*))

Doropygella psyllus (Thorell, 1859) (3, 4) (TU (1))

Doropygus Thorell, 1859

Doropygus pulex Thorell, 1859 (3, 4) (TU (1))

Goniodelphys Buchholz, 1869

Goniodelphys trigona Buchholz, 1869 (3) (TU (1))

Gunenotophorus Buchholz, 1869

Gunenotophorus globularis Buchholz, 1869 (3) (TU (1))

Mesoixys Illg & Dudley, 1965

Mesoixys otaria Illg & Dudley, 1965 (3) (TU (n))

Notodelphys Allman, 1847

Notodelphys allmani Thorell, 1859 (3, 5) (TU (1))

Notodelphys elegans Thorell, 1859 (TU (1) (*))

Notodelphys prasina Thorell, 1859 (3, 5) (TU (1))

Notodelphys reducta Illg & Dudley, 1961 (3) (TU (1))

Notodelphys rufescens Thorell, 1859 (TU (1) (*))

Notodelphys tenera Thorell, 1859 (TU (1) (*))

Notodelphys sp. (3) (MO Pb)

Notopterophorus Leuckart, 1859

Notopterophorus elatus Giesbrecht, 1892 (3) (TU (1))

Notopterophorus elongatus Buchholz, 1869 (3) (TU (1))

Notopterophorus papilio Hesse, 1864 (3) (TU (1))

Pachypygus G.O. Sars, 1921

Pachypygus gibber (Thorell, 1859) (3) (TU (1))

Scolecimorpha G.O. Sars, 1926

Scolecimorpha joubini (Chatton, 1909) (3) (TU (1))

Oooneides Chatton & Brément, 1915

Oooneides amela Chatton & Brément, 1915 (TU (n) (*))

Cochlodelphys Lafargue & Laubier, 1968

Cochlodelphys delamarei Lafargue & Laubier, 1968 (TU (n) (*))

***Sicyodelphys* Lafargue & Laubier, 1968**

Sicyodelphys bocqueti Lafargue & Laubier, 1968 (TU (n) (*))

Note

Bonnierilla arcuata: Specie di incerto status sistematico.

Bonnierilla filipes: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Bonnierilla similis: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Brementia illgi: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Doropygella normani: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Doropygella porcicauda: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Notodelphys elegans: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Notodelphys rufescens: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Notodelphys tenera: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Oooneides amela: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Cochlodelphys delamarei: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Sicyodelphys bocqueti: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Mormonilloida

Mormonillidae

Mormonilla Giesbrecht, 1891

Mormonilla minor Giesbrecht, 1891 (3, 4, 5)

Harpacticoida

Longipediidae

Longipedia Claus, 1863

Longipedia coronata Claus, 1863 (3, 4)

Longipedia rosea G.O. Sars, 1903 (4, 5) (*)
Longipedia weberi A. Scott, 1909 (4)

Note

Longipedia rosea: Nomen dubium secondo Wells (1980).

Canuellidae

Canuella T. Scott & A. Scott, 1893

Canuella furcigera G.O. Sars, 1903 (4)
Canuella perplexa T. Scott & A. Scott, 1893 (3, 4)

Brianola Monard, 1926

Brianola stebleri Monard, 1926 (3)

Sunaristes Hesse, 1867

Sunaristes paguri Hesse, 1867 (CT Dp) (*)

Note

Sunaristes paguri: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Ectinosomatidae

Ectinosoma Boeck, 1864

Ectinosoma dentatum Steuer, 1940 (3, 4)
Ectinosoma melaniceps Boeck, 1864 (3, 4)
Ectinosoma normani T. Scott & A. Scott, 1894 (3, 4)

Halectinosoma Lang, 1948

Halectinosoma herdmani (T. Scott & A. Scott, 1894) (4)
Halectinosoma littorale (Nicholls, 1940) (4)

Microsetella Brady & Robertson, 1873

Microsetella norvegica (Boeck, 1864) (3, 4, 5)
Microsetella rosea (Dana, 1948) (3, 4, 5)

Pseudobradya G.O. Sars, 1904

Pseudobradya pygmaea G.O. Sars, 1920 (4)

Halophytophilus Brian, 1917

Halophytophilus fusiformis Brian, 1917 (3)

Arenosetella Wilson, 1932

Arenosetella germanica Kunz, 1937 (3)

Phyllognathopodidae

Phyllognathopus (Mrázek, 1893)

Phyllognathopus viguieri (Maupas, 1892) (N, S, Si, Sa)

Darcythompsoniidae

Leptocaris T. Scott, 1899

Leptocaris biscayensis (Noodt, 1955) (3)

Leptocaris igneus Cottarelli & Baldari, 1982 (3) (E)

Darcythompsonia T. Scott, 1906

Darcythompsonia fairliensis (T. Scott, 1899) (4)

Tachidiidae

Euterpina Norman, 1903

Euterpina acutifrons (Dana, 1848) (3, 4, 5)

Tachidius (Tachidius) Shen & Tai, 1963

Tachidius (Tachidius) discipes Giesbrecht, 1881 (4)

Microarthridion Lang, 1948

Microarthridion fallax Perkins, 1956 (3, 4)

Harpacticidae

Harpacticus Milne-Edwards, 1840

Harpacticus compsonix Monard, 1926 (3)
Harpacticus flexulosus Ceccherelli, 1988 (4) (E)
Harpacticus flexus Brady & Robertson, 1873 (3, 4)
Harpacticus gracilis Claus, 1863 (3, 4)
Harpacticus littoralis G.O. Sars, 1910 (3, 4)
Harpacticus nicaeensis Claus, 1866 (3)
Harpacticus uniremis Krøyer, 1842 (3, 4)

Tigriopus Norman, 1868

Tigriopus brevicornis (O. F. Müller, 1776) (3)
Tigriopus fulvus (Fischer, 1860) (3) (*)

Note

Tigriopus fulvus: Specie rivalutata da Bozic (1960).

Tisbidae

Tisbe Lilljeborg, 1853

Tisbe aragoi Battaglia & Volkmann-Rocco, 1969 (3) (*)
Tisbe battagliai Volkman-Rocco, 1972 (3, 4) (*)
Tisbe bulbisetosa Volkman-Rocco, 1972 (4)
Tisbe clodiensis Battaglia & Fava, 1968 (3, 4)
Tisbe cucumariae Humes, 1957 (3, 4) (ED OI)
Tisbe dobzhanskii Volkman-Rocco & Battaglia, 1972 (3, 4) (*)
Tisbe ensifer Fischer, 1860 (3, 4)
Tisbe furcata (Baird, 1837) (3, 4) (*)
Tisbe gracilis (T. Scott, 1895) (3)
Tisbe histriana Marcus & Por, 1961 (4)
Tisbe holothuriae Humes, 1957 (3, 4) (ED OI)
Tisbe inflatiseta Volkmann, 1979 (4) (E) (*)
Tisbe longicornis (T. Scott & A. Scott, 1895) (4)
Tisbe marmorata Volkmann-Rocco, 1973 (3, 4) (*)
Tisbe perplexa Volkmann, 1979 (4)
Tisbe pontina Volkmann-Rocco, 1969 (3) (E) (*)
Tisbe reluctans Volkmann-Rocco, 1968 (4) (E)
Tisbe reticulata Bocquet, 1951 (3, 4)
Tisbe tenera (G.O. Sars, 1905) (3)

Scutellidium Claus, 1866

Scutellidium ligusticum (Brian, 1920) (3, 4)
Scutellidium longicauda (Philippi, 1840) (3, 4)

Note

Tisbe aragoi: Specie gemella di *T. reticulata*.

Tisbe battagliai: Specie gemella di *T. holothuriae*.

Tisbe dobzhanskii: Specie gemella di *T. clodiensis*.

Tisbe furcata: Secondo Volkmann-Rocco (1971) molte segnalazioni di questa specie potrebbero in realtà corrispondere a *T. holothuriae*. La presenza di *T. furcata* nelle acque italiane richiede, pertanto, conferma.

Tisbe inflatiseta: Specie gemella di *T. bulbisetosa*.

Tisbe marmorata: Specie gemella di *T. reticulata*.

Tisbe pontina: Specie gemella di *T. holothuriae*.

Porcellidiidae

Porcellidium Claus, 1860

Porcellidium fimbriatum Claus, 1863 (3, 4) (*)

Porcellidium ovatum Haller, 1879 (3, 4)

Porcellidium tenuicauda Claus, 1860 (4)

Porcellidium viride (Philippi, 1840) (3, 4)

Note

Porcellidium fimbriatum: Specie rivalutata da Tiemann (1978) e quindi non più sinonimo di *P. viride*.

Peltidiidae

Peltidium Philippi, 1839

Peltidium gracile (Claus, 1889) (4)

Peltidium purpureum Philippi, 1839 (3, 4)

Peltidium robustum (Claus, 1889) (4)

Alteutha Baird, 1845

Alteutha depressa (Baird, 1837) (3)

Alteutha interrupta (Goodsir, 1845) (3, 4)

Eupelte Claus, 1860

Eupelte gracilis Claus, 1860 (3, 4)

Clytemnestridae

Clytemnestra Dana, 1848

Clytemnestra rostrata (Brady, 1883) (3, 4)

Tegastidae

Tegastes Norman, 1903

Tegastes areolatus Monard, 1935 (3)

Tegastes calcaratus G.O. Sars, 1910 (3)

Tegastes falcatus (Norman, 1868) (3)

Tegastes longimanus (Claus, 1863) (3)

Tegastes riedli Pesta, 1959 (3)

Parategastes G.O. Sars, 1904

Parategastes sphaericus (Claus, 1863) (3, 4)

Syngastes Monard, 1924

Syngastes cornalinus Monard, 1924 (3)

Thalestridae

Thalestris Claus, 1863

Thalestris longimana Claus, 1863 (3, 4)

Parathalestris Brady & Robertson, 1873

Parathalestris clausi (Norman, 1868) (4)

Parathalestris harpactoides (Claus, 1863) (3, 4)

Phyllothalestris G.O. Sars, 1905

Phyllothalestris mysis (Claus, 1863) (3, 4)

Rhynchothalestris G.O. Sars, 1905

Rhynchothalestris rufocincta (Brady, 1880) (3)

Diarthrodes Thomson, 1882

Diarthrodes aegideus (Brian, 1927) (3, 4)

Diarthrodes minutus (Claus, 1863) (3)
Diarthrodes nobilis (Baird, 1845) (3, 4)
Diarthrodes ponticus (Kritschagin, 1873) (3, 4)

Dactylopusia Norman, 1903

Dactylopusia tisboides (Claus, 1863) (3, 4)
Dactylopusia vulgaris G.O. Sars, 1905
Dactylopusia vulgaris dissimilis Brian, 1921 (3) (E)

Paradactylopodia Lang, 1948

Paradactylopodia brevicornis (Claus, 1866) (3)

Eudactylopus A. Scott, 1909

Eudactylopus spectabilis (Brian, 1923) (3)

Dactylopodella G.O. Sars, 1905

Dactylopodella flava (Claus, 1866) (3)

Parastenheliidae

Parastenhelia Thompson & A. Scott, 1903

Parastenhelia spinosa (Fisher, 1860) (3, 4)

Diosaccidae

***Stenhelia* (*Delavalia*)** Brady, 1868

Stenhelia (*Delavalia*) *elisabethae* Por, 1960 (4)
Stenhelia (*Delavalia*) *normani* T. Scott, 1905 (3, 4)

Diosaccus Boeck, 1872

Diosaccus tenuicornis (Claus, 1863) (3, 4)
Diosaccus varicolor (Farran, 1913)
Diosaccus varicolor biarticulatus (Monard, 1924) (3)

Robertsonia Brady, 1880

Robertsonia angolensis (Monard, 1934) (3)
Robertsonia monardi (Klie, 1937) (3)

Amphiascus G.O. Sars, 1905

- Amphiascus cf. caudaespinosus* Brian, 1927 (S)
- Amphiascus minutus* (Claus, 1863) (3)
- Amphiascus parvus* G.O. Sars, 1906 (3, 4)
- Amphiascus propinquus* G.O. Sars, 1906 (3, 4)
- Amphiascus varians* (Norman & T. Scott, 1905) (4)

Amphiascopsis Gurney, 1927

- Amphiascopsis cinctus* (Claus, 1866) (3, 4)
- Amphiascopsis thalestroides* (G.O. Sars, 1911) (3, 4)

Amonardia Lang, 1948

- Amonardia phyllopus* (G.O. Sars, 1906) (3, 4)
- Amonardia similis* (Claus, 1866) (3, 4)

Metamphiascopsis Lang, 1948

- Metamphiascopsis hirsutus* (Thompson & A. Scott, 1903) (3)

Bulbamphiascus Lang, 1948

- Bulbamphiascus imus* (Brady, 1872) (4)
- Bulbamphiascus inermis* (Sewell, 1940) (3)

Robertgurneya Lang, 1948

- Robertgurneya similis* (A. Scott, 1896) (3, 4)

Amphiascoides Nicholls, 1941

- Amphiascoides brevifurca* (Czerniavski, 1868) (3, 4)
- Amphiascoides neglecta* (Norman & T. Scott, 1905) (4)
- Amphiascoides sterilis* (Monard, 1926) (3)

Paramphiascella Lang, 1948

- Paramphiascella mediterranea* Lang, 1948 (3) (*)
- Paramphiascella vararensis* (T. Scott, 1903) (3, 4)

Diosaccopsis Brian, 1925

- Diosaccopsis rubeus* Brian, 1925 (3, 4)

Schizopera Sars, 1905

Schizopera cicolanii Galassi & Pesce, 1988 (S) (E)
Schizopera clandestina (Klie, 1924) (N)
Schizopera compacta Lint, 1922 (4)
Schizopera lagrecai Pesce, 1987 (Si) (E)
Schizopera lindae Apostolov & Pesce, 1987 (S) (E)
Schizopera subterranea Lang, 1948 (S) (E)

Note

Paramphiascella mediterranea: Ritrovamento dato per insicuro da Lang (1948).

Miracidae

Macrosetella A. Scott, 1909

Macrosetella gracilis (Dana, 1848) (3, 4, 5)

Metidae

Metis Philippi, 1843

Metis ignea Philippi, 1843 (3, 4)

Ameiridae

Ameira Boeck, 1864

Ameira longipes Boeck, 1864 (3, 4)

Ameira parvula (Claus, 1866) (3, 4)

Nitocra Boeck, 1864

Nitocra affinis Gurney, 1927 (S)

Nitocra cf. divaricata Pesce, 1983 (S)

Nitocra hibernica (Brady, 1880) (N, S)

Nitocra intermedia Pesce, 1983 (S) (E)

Nitocra lacustris (Schmankevitch, 1875) (N, S)

Nitocra phlegraea Brehm, 1909 (S) (E) (*)

Nitocra cf. psammophila Pesce, 1983 (S)

Nitocra reducta (Schäfer, 1936) (S) (*)

Nitocra spinipes Boeck, 1864 (3, 4)

Nitocra typica Boeck, 1864 (3, 4)

Nitocra wolterecki Brehm, 1909 (N)

Psyllocamptus T. Scott, 1899

Psyllocamptus eridani Ceccherelli, 1988 (4) (E)
Psyllocamptus minutus G.O. Sars, 1911 (S)
Psyllocamptus monachus Chappuis, 1938 (5) (*)

Nitocrella Chappuis, 1923

Nitocrella achaiae Pesce, 1980 (S)
Nitocrella beatricis Cottarelli & Bruno, 1994 (Sa) (E)
Nitocrella fedelitae Pesce, 1985 (S) (E)
Nitocrella juturna Cottarelli, 1975 (S) (E)
Nitocrella morettii Pesce, 1984 (N, S) (E)
Nitocrella psammophila Chappuis, 1955 (N, S)
Nitocrella stammeri Chappuis, 1923 (S, Si, Sa)
Nitocrella stochi Pesce & Galassi, 1986 (N) (E)

Parapseudoleptomesochra Lang, 1965

Parapseudoleptomesochra italica Pesce & Petrovski, 1980 (S)
Parapseudoleptomesochra minoricae (Chappuis & Rouch, 1959) (Sa)
Parapseudoleptomesochra subterranea (Chappuis, 1928) (Sa)

Note

Nitocra phlegraea: L'esistenza della specie è dubbia.
Nitocra reducta: Per Dussart (1990) è un taxon intermedio fra *Nitocra* e *Nitocrella*.
Psyllocamptus monachus: L'unico esemplare descritto di questa specie è un maschio rinvenuto nella grotta marina de "La Zinzulusa" nell'Adriatico meridionale.

Paramesochridae

Paramesochra T. Scott, 1892

Paramesochra brevifurca Galhano, 1970
Paramesochra brevifurca mediterranea Huys, 1987 (3)
Paramesochra coelebs (Monard, 1935) (3)

Apodopsyllus Kunz, 1962

Apodopsyllus lynceorum Cottarelli, 1971 (3) (E)

Kliopsyllus Kunz, 1962

Kliopsyllus masryi Bodin, 1979 (3)

Tetragonicipitidae

Phyllopodopsyllus T. Scott, 1906

Phyllopodopsyllus berrieri Monard, 1936 (3)

Phyllopodopsyllus longipalpatus (Chappuis, 1954) (3)

Phyllopodopsyllus pauli Crisafi, 1959 (3)

Canthocamptidae

Mesochra Boeck, 1864

Mesochra aestuarii Gurney, 1921 (4)

Mesochra heldti Monard, 1935 (4)

Mesochra lilljeborgi Boeck, 1864 (4)

Mesochra pontica Marcus, 1965 (4)

Mesochra pygmaea (Claus, 1863) (3, 4)

Orthopsyllus Brady & Robertson, 1873

Orthopsyllus linearis (Claus, 1866) (3)

Nannomesochra Gurney, 1932

Nannomesochra arupinensis (Brian, 1925) (4)

Canthocamptus Westwood, 1836

Canthocamptus staphylinus (Jurine, 1820) (N, S, Si, Sa)

Paracamptus Chappuis, 1929

Paracamptus schmeili (Mrázek, 1893) (N, S)

***Attheyella* (*Attheyella*)** Chappuis, 1928

Attheyella (*Attheyella*) *crassa* (G.O. Sars, 1862) (N, S)

Attheyella (*Attheyella*) *wierzejskii* (Mrázek, 1893) (N)

***Attheyella* (*Mrazekiella*)** Brehm, 1949

Attheyella (*Mrazekiella*) *dentata* (Poggenpol, 1864) (S)

Attheyella (*Mrazekiella*) *paranaphtalica* Pesce & Galassi, 1988 (S, Si) (E)

Attheyella (*Mrazekiella*) *trispinosa* (Brady, 1880) (N, Sa)

Attheyella (*Mrazekiella*) *wulmeri* (De Kerherv, 1914) (S)

Maraenobiotus Mrázek, 1893

Maraenobiotus insignipes (Lilljeborg, 1902) (N)
Maraenobiotus vej dovskyi Mrázek, 1893 (N, S)

Epactophanes Mrázek, 1893

Epactophanes richardi Mrázek, 1893 (N, S)

Moraria (Moraria) T. Scott & A. Scott, 1893

Moraria (Moraria) brevipes (G.O. Sars, 1863) (N, S, Sa)
Moraria (Moraria) denticulata Chappuis, 1938 (S) (E)
Moraria (Moraria) frondicola Klie, 1943 (N) (E)
Moraria (Moraria) michelettoae Brian, 1955 (N) (E)
Moraria (Moraria) mrazeki T. Scott, 1903 (N)
Moraria (Moraria) poppei (Mrázek, 1893) (N, S)
Moraria (Moraria) varica (Graeter, 1911) (N)

Morariopsis Borutzky, 1934

Morariopsis insoletus (Chappuis, 1928) (N) (E)
Morariopsis scotenophila (Kiefer, 1930) (N) (*)

Itunella Brady, 1896

Itunella muelleri (Gagern, 1923) (S) (*)

Ceuthonectes Chappuis, 1923

Ceuthonectes pescei Cottarelli, 1985 (Sa) (E)
Ceuthonectes serbicus Chappuis, 1924 (N)

Bryocamptus (Bryocamptus) Chappuis, 1928

Bryocamptus (Bryocamptus) minutus (Claus, 1863) (N, S, Si, Sa)
Bryocamptus (Bryocamptus) pygmaeus (G.O. Sars, 1863) (N, S, Si, Sa)
Bryocamptus (Bryocamptus) vej dovskyi (Mrázek, 1893) (N)

Bryocamptus (Rheocamptus) Borutzky, 1948

Bryocamptus (Rheocamptus) dentatus Chappuis, 1937 (S)
Bryocamptus (Rheocamptus) typhlops (Mrázek, 1893) (S)
Bryocamptus (Rheocamptus) unisaetosus Kiefer, 1930 (N) (*)
Bryocamptus (Rheocamptus) zschokkei (Schmeil, 1893) (N, Si)

Bryocamptus (Arcticocamptus) Chappuis, 1928

Bryocamptus (Arcticocamptus) cuspidatus (Schmeil, 1893) (N, S)

Bryocamptus (Arcticocamptus) rhaeticus (Schmeil, 1893) (N, S)

Bryocamptus (Limocamptus) Chappuis, 1928

Bryocamptus (Limocamptus) dacicus (Chappuis, 1923) (N)

Bryocamptus (Limocamptus) echinatus (Mrázek, 1893) (N, S, Si)

Echinocamptus Chappuis, 1928

Echinocamptus georgevitchi (Chappuis, 1927) (N) (*)

Echinocamptus pilosus (Van Douwe, 1911) (N)

Elaphoidella Chappuis, 1928

Elaphoidella aprutina Pesce, Galassi & Apostolov, 1987 (S) (E)

Elaphoidella cvetkae Petrovski, 1893 (N)

Elaphoidella bidens (Schmeil, 1894)

Elaphoidella bidens bidens (Schmeil, 1894) (N)

Elaphoidella bidens coronata (G.O. Sars, 1904) (N, S)

Elaphoidella dubia Kiefer, 1931 (N) (E)

Elaphoidella elaphoides (Chappuis, 1923) (S, Si)

Elaphoidella gracilis (G.O. Sars, 1862) (N, S, Sa)

Elaphoidella italica Pesce, Galassi & Apostolov, 1987 (S) (E)

Elaphoidella janas Cottarelli & Bruno, 1994 (Sa) (E)

Elaphoidella jeannelli (Chappuis, 1928) (N)

Elaphoidella mabelae Galassi & Pesce, 1991 (S) (E)

Elaphoidella nuragica Pesce & Galassi, 1986 (Sa) (E)

Elaphoidella oglasae Cottarelli & Torrisi, 1976 (S) (E)

Elaphoidella paraelaphoides Pesce, Galassi & Apostolov, 1987 (S) (E)

Elaphoidella phreatica (Chappuis, 1925) (N, S)

Elaphoidella pseudophreatica (Chappuis, 1928) (N) (E) (*)

Elaphoidella plutonis Chappuis, 1938 (S) (E) (*)

Elaphoidella rossellae Pesce, Galassi & Apostolov, 1987 (S) (E)

Elaphoidella ruffoi Chappuis, 1953 (N) (E)

Elaphoidella subplutonis Pesce, Galassi & Apostolov, 1987 (S) (E)

Elaphoidella tiberina Pesce & Galassi, 1983 (S) (E)

Hypocamptus Chappuis, 1929

Hypocamptus brehmi (Van Douwe, 1922) (S)

Note

Morariopsis scotenophila: Specie incertae sedis per Borutzky (1952).

Itunella muelleri: Nota di acque salmastre e salate; a Ischia (S) si rinviene anche in acqua dolce.

Bryocamptus (Rheocamptus) unisaetosus: Secondo Petkovski (1972) la specie è sinonimo di *B. (R.) typhlops*.

Echinocamptus georgevitchi: Secondo Lang (1948) la specie è molto affine ad *E. pilosus*.
Elaphoidella pseudophreatica: La specie è messa in sinonimia con *E. phreatica* da Pesce & Galassi, 1983; per Dussart (1990) si tratterebbe di una sottospecie di tale specie.
Elaphoidella plutonis: È stata descritta, per l'Italia meridionale, anche una sottospecie *E. p. quadrispinosa* Chappuis, 1938, di cui Pesce & Galassi (1983) mettono in dubbio la validità.

Cylindropsyllidae

Stenocaris G.O. Sars, 1909

Stenocaris minor (T. Scott, 1892) (4)

Leptastacus T. Scott, 1906

Leptastacus macronyx (T. Scott, 1892) (3)

Leptastacus uncinatus Cottarelli & Venanzetti, 1989 (3) (E)

Paraleptastacus Wilson, 1932

Paraleptastacus spinicauda (T. Scott & A. Scott, 1895) (3)

***Arenopontia* (*Arenopontia*)** Kunz, 1937

Arenopontia (*Arenopontia*) *nesaie* Cottarelli, 1975 (3) (E)

Arenopontia (*Arenopontia*) *subterranea* Kunz, 1937 (3)

***Arenopontia* (*Neoleptastacus*)** Wells, 1967

Arenopontia (*Neoleptastacus*) *acantha* Chappuis, 1954 (3)

Arenopontia (*Neoleptastacus*) *phreatica* Cottarelli, Bruno & Venanzetti, 1994 (Sa) (E) (*)

Arenopontia (*Neoleptastacus*) *speluncae* Cottarelli, Bruno & Venanzetti, 1994 (S) (E) (*)

Psammopsyllus Nicholls, 1945

Psammopsyllus maricae Cottarelli, Saporito & Puccetti, 1983 (3, 4)

Cylinula Coull, 1971

Cylinula arganoi Cottarelli & Venanzetti, 1989 (3) (E)

Ichnusella Cottarelli, 1971

Ichnusella eione Cottarelli, 1971 (Sa) (E)

Ichnusella pasquini (Cottarelli, 1969) (S) (E)

Stenocaropsis Apostolov, 1982

Stenocaropsis similis Cottarelli & Venanzetti, 1989 (3) (E)

Minervella Cottarelli & Venanzetti, 1989

Minervella baccettii Cottarelli & Venanzetti, 1989 (3) (E)

Psamathea Cottarelli & Venanzetti, 1989

Psamathea nautarum Cottarelli & Venanzetti, 1989 (3) (E)

Note

Arenopontia (Neoleptastacus) phreatica: Con la seguente è l'unica *Arenopontia* finora nota in acque dolci sotterranee.

Arenopontia (Neoleptastacus) speluncae: Con la precedente è l'unica *Arenopontia* finora nota in acque dolci sotterranee.

Louriniidae

Lourinia Wilson, 1924

Lourinia armata (Claus, 1866) (3)

Parastenocarididae

Parastenocaris Kessler, 1913

Parastenocaris acherusia Noodt, 1953 (N) (E)

Parastenocaris admete Cottarelli, 1980 (Sa) (E)

Parastenocaris amatheia Cottarelli, 1970 (Sa) (E)

Parastenocaris amyclaea Cottarelli, 1969 (S) (E)

Parastenocaris calliroe Cottarelli, 1969 (Sa) (E)

Parastenocaris etrusca Cottarelli, Bruno & Venanzetti, 1995 (S) (E)

Parastenocaris hera Cottarelli, 1969 (S) (E)

Parastenocaris gertrudae Kiefer, 1968 (N) (E)

Parastenocaris glacialis Noodt, 1952 (S)

Parastenocaris ima Cottarelli, 1989 (Sa) (E)

Parastenocaris italica Chappuis, 1953 (N, S) (E)

Parastenocaris kalypso Pesce, Galassi & Cottarelli, 1988 (Si) (E)

Parastenocaris lorenzae Pesce, Galassi & Cottarelli, 1995 (S) (E)

Parastenocaris oligalina Cottarelli, Bruno & Venanzetti, 1994 (Sa) (E)

Parastenocaris orcina Chappuis, 1938 (S) (E)

Parastenocaris pasquinii Cottarelli, 1972 (S) (E)

Parastenocaris proserpina Chappuis, 1938 (S) (E)

Parastenocaris cf. proserpina Chappuis, 1938 (S) (E)

Parastenocaris rivi Cottarelli & Bruno, 1994 (Sa) (E)

Parastenocaris ruffoi Chappuis, 1954 (N)
Parastenocaris sardoa Cottarelli & Torrisi, 1977 (Sa) (E)
Parastenocaris stellae Cottarelli Saporito & Puccetti, 1981 (Sa) (E)
Parastenocaris triphyda Cottarelli & Bruno, 1994 (Sa) (E)
Parastenocaris tyrrhenidis Cottarelli, 1969 (Sa) (E)
Parastenocaris trinacriae Pesce, Galassi & Cottarelli, 1988 (Si) (E)
Parastenocaris veneris Cottarelli & Maiolini, 1980 (S) (E)

Cletodidae

Cletocamptus Schmankevitch, 1875

Cletocamptus confluens (Schmeil, 1894) (4)
Cletocamptus retrogressus Schmankevitch, 1875 (Si)

Enhydrosoma Boeck, 1872

Enhydrosoma caeni Raibaut, 1965 (3, 4)
Enhydrosoma gariene Gurney, 1930 (3, 4)
Enhydrosoma propinquum (Brady, 1880) (3, 4)

Enhydrosomella Monard, 1935

Enhydrosomella staufferi Monard, 1935 (4)

Argestidae

Eurycletodes (Oligocletodes) Lang, 1948

Eurycletodes (Oligocletodes) similis (T. Scott, 1895) (3)

Latiremidae

Delamarella Chappuis, 1954

Delamarella galataeae Cottarelli, 1971 (S, Sa) (E)

Laophontidae

Harrietella T. Scott, 1906

Harrietella simulans T. Scott, 1894 (CT Is) (*)

Laophonte Philippi, 1840

Laophonte commensalis Raibaut, 1961 (CT Dp) (*)
Laophonte cornuta Philippi, 1840 (3)
Laophonte elongata Boeck, 1872 (3, 4)
Laophonte setosa Boeck, 1864 (4)
Laophonte thoracica Boeck, 1864 (3, 4)

Pseudonychocamptus Lang, 1948

Pseudonychocamptus colomboi Ceccherelli, 1988 (4) (E)
Pseudonychocamptus koreni (Boeck, 1872) (3)

Heterolaophonte Lang, 1948

Heterolaophonte stroemi (Baird, 1834)
Heterolaophonte stroemi paraminuta Noodt, 1955 (4)

Paronychocamptus Lang, 1948

Paronychocamptus nanus (G.O. Sars, 1908) (4)

Paralaophonte Lang, 1948

Paralaophonte brevirostris (Claus, 1863) (3, 4)
Paralaophonte congenera (G.O. Sars, 1908) (3, 4)
Paralaophonte quaterspinata (Brian, 1917) (3)
Paralaophonte zimmeri (Douwe, 1929) (3)

Asellopsis Brady & Robertson, 1873

Asellopsis hispida Brady & Robertson, 1873 (4)
Asellopsis sarmatica Jakubisiak, 1938 (4)

Esola Edwards, 1891

Esola rosei (Monard, 1926) (3)
Esola spelaea (Chappuis, 1938) (S) (E)

Onychocamptus Daday, 1903

Onychocamptus mohammed (Blanchard & Richard, 1891) (N, S, Sa)

Laophontina Norman & T. Scott, 1905

Laophontina paradubia Cottarelli, 1983 (3) (E)

Echinolaophonte Nicholls, 1941

Echinolaophonte armiger (Gurney, 1927) (3)
Echinolaophonte horrida (Norman, 1876) (3)
Echinolaophonte minuta Cottarelli & Forniz, 1991 (3) (E)
Echinolaophonte veniliae Cottarelli, Forniz & Bascherini, 1992 (3) (E)

Afroloaophonte Chappuis, 1960

Afroloaophonte pori Masry, 1970 (3)

Note

Harrietella simulans: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Laophonte commensalis: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Ancorabolidae

Laophontodes T. Scott, 1894

Laophontodes bicornis A. Scott, 1896 (3)

Poecilostomatoida

Oncaeidae

Oncaea Philippi, 1843

Oncaea conifera Giesbrecht, 1891 (3, 4, 5)
Oncaea curta G.O. Sars, 1916 (3, 5)
Oncaea dentipes Giesbrecht, 1891 (3, 5)
Oncaea media Giesbrecht, 1891 (3, 4, 5)
Oncaea mediterranea (Claus, 1863) (3, 4, 5)
Oncaea minuta Giesbrecht, 1892 (3, 4, 5)
Oncaea notopus Giesbrecht, 1891 (3)
Oncaea ornata Giesbrecht, 1891 (3, 5)
Oncaea scottodicarloi Heron & Bradford-Grieve, 1995 (3)
Oncaea similis G.O. Sars, 1918 (5)
Oncaea subtilis Giesbrecht, 1892 (3, 4, 5)
Oncaea venusta Philippi, 1843 (3, 4, 5)

Conaea Giesbrecht, 1891

Conaea rapax Giesbrecht, 1891 (3, 5)

Lubbockia Claus, 1863

Lubbockia aculeata Giesbrecht, 1891 (3, 4, 5)

Lubbockia squillimana Claus, 1863 (3, 4, 5)

Pachos Stebbing, 1910

Pachos punctatum (Claus, 1863) (3, 5)

Corycaeidae

Corycaeus Dana, 1845

Corycaeus anglicus Lubbock, 1857 (5)

Corycaeus brehmi Steuer, 1910 (3, 4, 5)

Corycaeus clausi F. Dahl, 1894 (3, 4, 5)

Corycaeus flaccus Giesbrecht, 1891 (3, 4, 5)

Corycaeus furcifer Claus, 1863 (3, 4, 5)

Corycaeus giesbrechti F. Dahl, 1894 (3, 4, 5)

Corycaeus latus Dana, 1849 (3, 4, 5)

Corycaeus limbatus Brady, 1883 (3, 5)

Corycaeus ovalis Claus, 1863 (3, 4, 5)

Corycaeus typicus (Krøyer, 1849) (3, 4, 5)

Farranula Wilson, 1932

Farranula rostrata (Claus, 1863) (3, 4, 5)

Sapphirinidae

Sapphirina Thompson, 1829

Sapphirina angusta Dana, 1849 (3, 4, 5)

Sapphirina auronitens Claus, 1863 (3, 5)

Sapphirina bicuspidata Giesbrecht, 1891 (3, 5)

Sapphirina darwini Haeckel, 1864 (3, 5)

Sapphirina gemma Dana, 1849 (3, 5)

Sapphirina intestinata Giesbrecht, 1891 (3, 5)

Sapphirina iris Dana, 1849 (3)

Sapphirina lactens Giesbrecht, 1892 (3, 5)

Sapphirina maculosa Giesbrecht, 1892 (3, 4, 5)

Sapphirina metallina Dana, 1849 (3, 4, 5)

Sapphirina nigromaculata Claus, 1863 (3, 4, 5) (MO Op)

Sapphirina opalina Dana, 1849 (3, 5)

Sapphirina ovatolanceolata Dana, 1849 (3, 5)

Sapphirina pyrosomatis Giesbrecht, 1892 (3, 5)

Sapphirina sali Farran, 1929 (3, 5)
Sapphirina scarlata Giesbrecht, 1891 (3)
Sapphirina sinuicauda Brady, 1883 (5)
Sapphirina vorax Giesbrecht, 1891 (3, 5)

Vettoria Wilson, 1924

Vettoria granulosa (Giesbrecht, 1891) (3, 4, 5)
Vettoria longifurca (Rose & Vaissière, 1952) (3, 4, 5)
Vettoria parva (Farran, 1936) (3, 4, 5)

Copilia Dana, 1849

Copilia denticulata Claus, 1863 (3, 5)
Copilia mediterranea (Claus, 1863) (3, 4, 5)
Copilia quadrata Dana, 1849 (3, 4, 5)
Copilia vitrea (Haeckel, 1864) (3, 4, 5)

Bomolochidae

Anchistrotos Brian, 1906

Anchistrotos gobii Brian, 1906 (3) (O)

Bomolochus von Nordmann, 1832

Bomolochus bellones Burmeister, 1835 (3, 4) (O)
Bomolochus muraenae Richiardi, 1880 (3) (O)
Bomolochus soleae (Claus, 1864) (5) (O)
Bomolochus unicirrus Richiardi, 1902 (3) (O)

Pseudoeucanthus Brian, 1905

Pseudoeucanthus alosae (Brian, 1902) (3) (O)

Taeniacanthidae

Phagus Wilson, 1911

Phagus muraenae (Richiardi, 1880) (3, 4, 5) (O)

Taeniacanthus Sumpf, 1871

Taeniacanthus balistae (Claus, 1864) (3, 5) (O)
Taeniacanthus laqueus (Leigh-Sharpe, 1935) (4, 5) (O)

Ergasilidae

Ergasilus von Nordmann, 1832

- Ergasilus gibbus* von Nordmann, 1832 (5) (O)
- Ergasilus lizae* Krøyer, 1863 (4, 5) (O)
- Ergasilus sieboldi* von Nordmann, 1832 (N, S) (O)

Nipergasilus Yin, 1956

- Nipergasilus bora* (Yamaguti, 1939) (5) (O)

Chondracanthidae

Acanthochondria Oakley, 1927

- Acanthochondria cornuta* (O.F. Müller, 1776) (3) (O)
- Acanthochondria soleae* (Krøyer, 1838) (O) (*)

Acanthochondrites Oakley, 1930

- Acanthochondrites annulatus* (Olsson, 1869) (4) (C)

Chondracanthus Delaroche, 1811

- Chondracanthus horridus* Heller, 1865 (3, 5) (O)
- Chondracanthus lophii* Johnston, 1836 (4) (O)
- Chondracanthus merluccii* (Holten, 1802) (3, 4, 5) (O)
- Chondracanthus ninnii* Richiardi, 1882 (4, 5) (O)
- Chondracanthus ornatus* Scott, 1900 (3) (O)
- Chondracanthus zeii* Delaroche, 1811 (4, 5) (O)

Lernentoma de Blainville, 1822

- Lernentoma asellina* (Linnaeus, 1761) (3, 4, 5) (O)

Protochondracanthoides Yamaguti, 1963

- Protochondracanthoides angustatus* (Heller, 1868) (3, 4, 5?) (O)

Strabax von Nordmann, 1864

- Strabax monstrosus* von Nordmann, 1864 (3, 4) (O)

Note

Acanthochondria soleae: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Philichthyidae

Colobomatus Hesse, 1873

- Colobomatus agassizi* (Richiardi, 1877) (3, 4, 5) (O)
- Colobomatus baraldii* (Richiardi, 1877) (O) (*)
- Colobomatus benazzii* Delamare-Deboutteville & Nunes-Ruivo, 1952 (3) (O)
- Colobomatus canthari* (Richiardi) Delamare-Deboutteville & Nunes-Ruivo, 1952 (3) (O)
- Colobomatus denticis* (Richiardi, 1877) (O) (*)
- Colobomatus doderleini* (Richiardi, 1883) (3) (O)
- Colobomatus edwardsii* (Richiardi, 1876) (O) (*)
- Colobomatus fiatolae* (Richiardi, 1880) Delamare-Deboutteville & Nunes-Ruivo, 1952 (3, 4, 5) (O)
- Colobomatus grubei* (Richiardi, 1877) (O) (*)
- Colobomatus haeckeli* (Richiardi, 1877) (O) (*)
- Colobomatus labracis* Delamare-Deboutteville & Nunes-Ruivo, 1952 (3) (O)
- Colobomatus lichiae* (Richiardi, 1877) (4, 5) (O)
- Colobomatus minimus* (Richiardi, 1877) (O) (*)
- Colobomatus mugilis* Raibaut, Caillet & Ben Hassine, 1978 (5) (O)
- Colobomatus mulli* Essafi, Raibaut & Boudaoud-Krissat, 1983 (5) (O)
- Colobomatus muraenae* (Richiardi, 1877) (O) (*)
- Colobomatus oblatae* (Richiardi, 1876) Delamare-Deboutteville & Nunes-Ruivo, 1952 (3) (O)
- Colobomatus pagelli* (Richiardi, 1877) (5) (O)
- Colobomatus pagri* (Richiardi, 1877) (O) (*)
- Colobomatus richiardii* (Valle, 1880) (4, 5) (O)
- Colobomatus sciaenae* (Richiardi, 1876) (O) (*)
- Colobomatus sieboldi* (Richiardi, 1877) (O) (*)
- Colobomatus steenstrupi* (Richiardi, 1876) (3, 4, 5) (O)

Leposphilus Hesse, 1866

- Leposphilus labrei* Hesse, 1866 (3) (O)

Lernaeascus Claus, 1886

- Lernaeascus nematoxys* Claus, 1886 (3, 4, 5) (O)

Philichthys Steenstrup, 1862

- Philichthys xiphiae* Steenstrup, 1862 (3, 4, 5) (O)

Sphaerifer Richiardi, 1876

Sphaerifer corvinae (Leydig, 1851) (3, 4, 5) (O)
Sphaerifer leydigii Richiardi, 1877 (4, 5) (O)

Note

Colobomatus baraldii: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Colobomatus denticis: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Colobomatus edwardsii: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Colobomatus grubei: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Colobomatus haeckeli: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Colobomatus minimus: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Colobomatus muraenae: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Colobomatus pagri: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Colobomatus sciaenae: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Colobomatus sieboldi: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Lamippidae

Enalcyonium Olsson, 1869

Enalcyonium affinis (de Zulueta, 1908) (CN Oc) (*)

Enalcyonium albidum (de Zulueta, 1908) (CN Oc) (*)

Enalcyonium chattoni (de Zulueta, 1908) (CN Oc) (*)

Enalcyonium duthiersi (Joliet, 1882) (CN Oc) (*)

Enalcyonium pallidum (de Zulueta, 1908) (CN Oc) (*)

Enalcyonium parvum (de Zulueta, 1908) (CN Oc) (*)

Enalcyonium pusillum (de Zulueta, 1908) (CN Oc) (*)

Enalcyonium rubicundum Olsson, 1869 (CN Oc) (*)

Enalcyonium setigerum (de Zulueta, 1908) (CN Oc) (*)

Enalcyonium sympodii (de Zulueta, 1908) (CN Oc) (*)

Lamippe Bruzelius, 1858

Lamippe rubra Bruzelius, 1858 (CN Oc) (*)

Lamippella Bouligand & Delamare Deboutteville, 1959

Lamippella faurei Bouligand & Delamare Deboutteville, 1959 (CN Oc) (*)

Lamippina Bouligand, 1960

Lamippina aciculifera (de Zulueta, 1908) (CN Oc) (*)

Linaresia de Zulueta, 1908

Linaresia mamillifera de Zulueta, 1908 (CN Oc) (*)

Note

Enalcyonium affinis: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Enalcyonium albidum: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Enalcyonium chattoni: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Enalcyonium duthiersi: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Enalcyonium pallidum: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Enalcyonium parvum: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Enalcyonium pusillum: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Enalcyonium rubicundum: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Enalcyonium setigerum: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Enalcyonium sympodii: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Lamippe rubra: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Lamippella faurei: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Lamippina aciculifera: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Linaresia mamillifera: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Mytilicolidae

Mytilicola Steuer, 1902

Mytilicola intestinalis Steuer, 1902 (3, 4, 5) (MO Bi)

Trochicola Dollfus, 1914

Trochicola entericus Dollfus, 1914 (3) (MO Pb)
Trochicola vermiformis (Stock, 1959) (3) (MO Pb)
Trochicola sp. (3) (MO Pb)

Pseudanthessidae

Katanthessius Stock, 1960

Katanthessius delamarei Stock, 1960 (3) (MO Op)

Pseudanthessius Claus, 1889

Pseudanthessius gracilis Claus, 1889 (MO Bi) (*)
Pseudanthessius sauvagei Canu, 1891 (ED Ec) (*)
Pseudanthessius thorelli (Brady, 1880) (CN Oc) (*)

Heteranthessius T. Scott, 1904

Heteranthessius furcatus Stock, 1971 (TU (1) (*)

Note

Pseudanthessius gracilis: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Pseudanthessius sauvagei: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Pseudanthessius thorelli: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Heteranthessius furcatus: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Sabelliphilidae

Herrmannella Canu, 1891

Herrmannella parva Normann & T. Scott, 1908 (CN Oc) (*)
Herrmannella pecteni (Sowinski, 1884) (MO Bi) (*)
Herrmannella rostrata Canu, 1891 (MO Bi) (*)

Sabelliphilus M. Sars, 1862

Sabelliphilus elongatus M. Sars, 1862 (3) (PL)
Sabelliphilus sarsi Claparède, 1870 (PL) (*)

Note

Herrmannella parva: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Herrmannella pecteni: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Herrmannella rostrata: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Sabelliphilus sarsi: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Splanchnotrophidae

Splanchnotrophus Hancock & Norman, 1863

Splanchnotrophus angulatus Hecht, 1893 (3, 4, 5) (MO Op)

Splanchnotrophus gracilis Hancock & Norman, 1863 (MO Op) (*)

Splanchnotrophus insolens T. Scott & A. Scott, 1895 (3) (MO Op)

Note

Splanchnotrophus gracilis: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Clausidiidae

Hemicyclops Boeck, 1872

Hemicyclops bacescui (Serban, 1956) (3) (CT Dp)

Hersiliodes Canu, 1888

Hersiliodes cylindracea (Pelseneer, 1929) (3) (MO Bi)

Hersiliodes latericia (Grube, 1869) (PL) (*)

Leptinogaster Pelseneer, 1928

Leptinogaster pholadis Pelseneer, 1928 (3) (MO Bi)

Note

Hersiliodes latericia: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Clausiidae

Pseudoclasia Bocquet & Stock, 1960

Pseudoclasia longiseta Bocquet & Stock, 1963 (SP) (*)

Note

Pseudoclasia longiseta: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Nereicolidae

Nereicola Keferstein, 1863

Nereicola ovatus Keferstein, 1863 (PL) (*)

Note

Nereicola ovatus: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Gastrodelphyidae

Gastrodelphys Graeffe, 1883

Gastrodelphys clausii Graeffe, 1883 (PL) (*)

Note

Gastrodelphys clausii: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Anthessiidae

Anthessius Della Valle, 1880

Anthessius minor (Stock, 1959) (3) (MO Bi)

Anthessius pleurobranchae Della Valle, 1880 (3, 4) (MO Op)

Anthessius solenocurti Della Valle, 1880 (3) (MO Bi)

Anthessius spinosus (Raffaele & Monticelli, 1885) (3) (MO Bi)

Lichomolgidae

Lichomolagus Thorell, 1859

Lichomolagus actiniae Della Valle, 1880 (3, 4, 5) (CN At)

Lichomolgus agilis (Leydig, 1853) (3) (MO Op)
Lichomolgus canui G.O. Sars, 1917 (3) (TU (1))
Lichomolgus elegantulus Stock, 1960 (3) (MO Bi)
Lichomolgus forficula Thorell, 1859 (TU (1) (*)
Lichomolgus furcillatus Thorell, 1859 (TU (1) (*)
Lichomolgus longicauda (Claus, 1860) (4) (MO Cf)
Lichomolgus protulae Stock, 1960 (3) (PL)
Lichomolgus pteroidis Della Valle, 1880 (3) (MO Bi)
Lichomolgus serpulae Stock, 1960 (3) (PL)
Lichomolgus trispinosus Stock, 1959 (3) (CN Oc)
Lichomolgus trochi Canu, 1899 (3) (MO Pb)

Modiolicola Aurivillius, 1882

Modiolicola inermis Canu, 1892 (MO Bi) (*)
Modiolicola insignis Aurivillius, 1882 (3) (MO Bi)
Modiolicola maximus (Thompson, 1893) (MO Bi) (*)

Octopicola Humes, 1957

Octopicola superbus Humes, 1957 (MO Cf) (*)

Paranthesius Claus, 1889

Paranthesius anemoniae Claus, 1889 (CN At) (*)
Paranthesius inermis (Canu, 1891) (3) (MO Bi)
Paranthesius pectinis (Pesta, 1909) (4) (MO Bi)
Paranthesius rostratus (Canu, 1891) (3) (MO Bi)

Pseudomyicola (Raffaele & Monticelli, 1885)

Pseudomyicola spinosus (Raffaele & Monticelli, 1885) (3, 4, 5) (MO Bi)
Pseudomyicola sp. (3) (MO Bi)

Acaenomolgus Humes & Stock, 1972

Acaenomolgus protulae (Stock, 1959) (PL) (*)

Astericola Rosoll, 1889

Astericola clausi Rosoll, 1889 (ED Ad) (*)

Doridicola Leydig, 1853

Doridicola agilis Leydig, 1853 (MO Op) (*)
Doridicola logicauda (Claus, 1860) (MO Cf) (*)

Critomolgus Humes & Stock, 1983

Critomolgus actinae (Della Valle, 1880) (CN At) (*)

Epimolgus Bocquet & Stock, 1956

Epimolgus trochi (Canu, 1899) (MO Pb) (*)

Macrochiron Brady, 1872

Macrochiron fucicolum Brady, 1872 (X) (*)

Note

Lichomolgus forficula: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Lichomolgus furcillatus: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Modiolicola inermis: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Modiolicola maximus: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Octopicola superbus: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Paranthesius anemoniae: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Acaenomolgus protulae: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Astericola clausi: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Doridicola agilis: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Doridicola logicauda: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Critomolgus actinae: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Epimolgus trochi: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Macrochiron fucicolum: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Synaptiphilidae

Synaptiphilus Canu & Cuénot, 1892

Synaptiphilus cantacuzenei Bocquet & Stock, 1957 (3) (ED OI)

Siphonostomatoida

Rataniidae

Ratania Giesbrecht, 1892

Ratania flava Giesbrecht, 1892 (3, 4, 5)

Pontoeciellidae

Pontoeciella Giesbrecht, 1895

Pontoeciella abyssicola (T. Scott, 1894) (3, 4, 5)

Caligidae

Caligodes Heller, 1868

Caligodes laciniatus (Kollar in Krøyer, 1863) Heller, 1868 (3) (O)

Caligus O.F. Müller, 1785

Caligus affinis Heller, 1866 (3, 4, 5) (O)

Caligus apodus (Brian, 1924) (4, 5) (O)

Caligus bonito Wilson, 1905 (3) (O)

Caligus brevicaudatus A. Scott, 1901 (3) (O)

Caligus coryphaenae Streenstrup & Lütken, 1861 (3, 4, 5) (O)

Caligus curtus O.F. Müller, 1785 (3, 4, 5) (O)

Caligus diaphanus von Nordmann, 1832 (3, 4, 5) (O)

Caligus elongatus von Nordmann, 1832 (3) (O)

Caligus lichiae Brian, 1906 (3) (O)

Caligus ligusticus Brian, 1906 (3) (O)

Caligus mauritanicus Brian, 1924 (3, 5) (O)

Caligus minimus Otto, 1821 (3, 4, 5) (O)

Caligus mugilis Brian, 1935 (3, 5) (O)

Caligus pagelli Delamare-Deboutteville & Nunes-Ruivo, 1958 (3?) (O)

Caligus pelamydis Krøyer, 1863 (3, 4) (O)

Caligus productus Dana, 1852 (3) (O)

Caligus vexator Heller, 1865 (3, 4, 5) (O)

Diphyllogaster Brian, 1899

Diphyllogaster thompsoni Brian, 1899 (3) (C)

Lepeophtheirus von Nordmann, 1832

Lepeophtheirus europaensis Zeddam, Berrebi, Renaud, Raibaut & Gabrion, 1988 (3) (O)

Lepeophtheirus grohmanni Krøyer, 1863 (3) (O)
Lepeophtheirus nordmannii (Edwards, 1840) (3, 4, 5) (O)
Lepeophtheirus pectoralis (O.F. Müller, 1777) (4) (O)
Lepeophtheirus thompsoni Baird, 1850 (3, 4) (O)

Sciaenophilus van Beneden, 1852

Sciaenophilus tenuis van Beneden, 1852 (O) (*)

Note

Sciaenophilus tenuis: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Euryphoridae

Euryphorus Edwards, 1905

Euryphorus brachypterus (Gerstaecker, 1853) (O) (*)

Note

Euryphorus brachypterus: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Trebiidae

Trebius Krøyer, 1838

Trebius caudatus Krøyer, 1838 (3, 4, 5) (C)

Pandaridae

Demoleus Heller, 1865

Demoleus heptatus (Otto, 1821) (3?) (C)

Dinemoura Latreille, 1829

Dinemoura latifolia (Steenstrup & Lütken, 1861) (3, 4) (C)
Dinemoura producta (O.F. Müller, 1785) (3) (C)

Echthrogaleus Steenstrup & Lütken, 1861

Echthrogaleus coleoptratus (Guerin-Ménéville, 1837) (3) (C)

Pandarus Leach, 1816

Pandarus bicolor Leach, 1816 (3) (C)
Pandarus lugubris Heller, 1868 (3) (C)

Perissopus Steenstrup & Lütken, 1861

Perissopus dentatus Steenstrup & Lütken, 1861 (3, 4, 5) (C)

Cecropidae

Cecrops Leach, 1816

Cecrops latreilli Leach, 1816 (3, 4) (O)

Luetkenia Claus, 1864

Luetkenia asterodermi Claus, 1864 (3, 4) (O)

Orthagoriscicola Poche, 1902

Orthagoriscicola muricatus (Krøyer, 1837) (4, 5) (O)

Philorthagoriscus Horst, 1897

Philorthagoriscus serratus (Krøyer, 1863) (3) (C) (*)

Note

Philorthagoriscus serratus: Anche O 3.

Dichelesthidae

Anthosoma Leach, 1816

Anthosoma crassum (Albidgaard, 1794) (3, 4) (C) (*)

Dichelesthium Herrmann, 1804

Dichelesthium oblongum (Abildgaard, 1794) (4) (O)

Note

Anthosoma crassum: Anche O 3 4.

Eudactylinidae

Eudactylina van Beneden, 1853

Eudactylina acuta van Beneden, 1853 (3, 4) (C)

Eudactylina similis T. Scott, 1902 (C) (*)

Eudactylinella Wilson, 1932

Eudactylinella alba Wilson, 1932 (3) (C)

Lamproglena von Nordmann, 1832

Lamproglena pulchella von Nordmann, 1832 (N, S) (O)

Nemesis Risso, 1826

Nemesis lamna Risso, 1826 (3, 4) (C)

Nemesis mediterranea Heller, 1868 (3, 4, 5) (C)

Nemesis robusta (van Beneden, 1851) (3, 4) (C)

Note

Eudactylina similis: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Kroyeriidae

Kroyeria van Beneden, 1853

Kroyeria lineata van Beneden, 1853 (3, 4) (C)

Pseudocycnidae

Pseudocycnus Heller, 1865

Pseudocycnus appendiculatus Heller, 1865 (3) (O)

Hatscheikiidae

Congericola van Beneden, 1854

Congericola gracilis (Milne-Edwards, 1840) (4, 5) (O)

Congericola pallidus van Beneden, 1854 (3, 4, 5) (O)

***Hatschekia* Poche, 1902**

Hatschekia cernae (Goggio, 1905) (3) (O)

Hatschekia damianii Brian, 1906 (3) (O)

Hatschekia gerro Leigh-Sharpe, 1936 (3) (O)

Hatschekia ischnon Leigh-Sharpe, 1936 (3) (O)

Hatschekia mulli (van Beneden, 1851) (3, 4) (O)

Hatschekia obesa Richiardi, 1880 (O) (*)

Hatschekia pagellibogneravei (Hesse, 1879) (3, 4, 5) (O)

Hatschekia pygmaea Scott & Scott, 1913 (3, 4, 5) (O)

Hatschekia richiardi Goggio, 1905 (3) (O)

Note

Hatschekia obesa: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Lernanthropidae

***Lernanthropus* de Blainville, 1822**

Lernanthropus brevis Richiardi, 1879 (3, 4, 5) (O)

Lernanthropus gisleri van Beneden, 1852 (3, 4, 5) (O)

Lernanthropus kroyeri van Beneden, 1851 (3, 4, 5) (O)

Lernanthropus micropterygis Richiardi, 1885 (3) (O)

Lernanthropus mugilis Brian, 1898 (4, 5) (O)

Lernanthropus scribae Krøyer, 1863 (3, 4, 5) (O)

Lernanthropus trachuri Brian, 1903 (3) (O)

Lernanthropus vorax Richiardi, 1880 (3, 4, 5) (O)

Lernanthropus sp. Radujkovic & Rabaut, 1989 (5) (O)

Pennellidae

***Haemobaphes* Steenstrup & Lütken, 1961**

Haemobaphes ambiguus Scott, 1900 (3) (O)

***Lernaeenicus* Le Suer, 1824**

Lernaeenicus encrasicoli (Turton, 1807) (3) (O)

Lernaeenicus gracilis Heller, 1868 (4, 5) (O)

Lernaeenicus neglectus Richiardi, 1877 (4, 5) (O)

Lernaeenicus sprattae (Sowerby, 1806) (3) (O)

Lernaeenicus vorax Richiardi, 1877 (4, 5) (O)

Lernaeocera de Blainville, 1822

Lernaeocera branchialis (Linnaeus, 1767) (3) (O)
Lernaeocera sp. Radujkovic & Raibaut, 1989 (5) (O)

Lernaeolophus Heller, 1868

Lernaeolophus sultanus (von Nordmann, 1839) (3, 4) (O)

Peniculus von Nordmann, 1832

Peniculus fistula von Nordmann, 1832 (3) (O)

Pennella Oken, 1816

Pennella crassicornis Steenstrup & Lütken, 1861 (3, 4, 5) (ED Cd)
Pennella filosa (Linnaeus, 1758) (3, 4) (O)
Pennella remorae Murray, 1856 (O) (*)
Pennella varians Steenstrup & Lütken, 1861 (3, 4, 5) (ED Cd) (*)

Peroderma Heller, 1868

Peroderma bellotti Richiardi, 1882 (3) (O)
Peroderma cylindricum Heller, 1865 (3, 5) (O)

Note

Pennella remorae: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Pennella varians: Anche O 3 4 5.

Sphyriidae

Lophoura Kölliker, 1853

Lophoura edwardsi Kölliker, 1853 (3) (O)

Tripaphylus Richiardi, 1878

Tripaphylus musteli (van Beneden, 1851) (4) (C)

Lernaeopodidae

Achtheres von Nordmann, 1832

Achtheres percarum von Nordmann, 1832 (N, S) (O)

Advena Kabata, 1979

Advena paradoxa (van Beneden, 1851) (O) (*)

Alella Leigh-Sharpe, 1925

Alella berecynthia Leigh-Harpe, 1828 (3) (O)

Alella pagelli (Krøyer, 1863) (3, 4) (O)

Brachiella Cuvier, 1830

Brachiella elegans Richiardi, 1880 (3?) (O)

Brachiella oblonga Valle, 1880 (4, 5) (O)

Brachiella thynni Cuvier, 1830 (3, 4) (O)

Charopinus Krøyer, 1863

Charopinus dalmanni (Retzius, 1829) (3, 4) (C)

Clavella Oken, 1816

Clavella adunca (Strom, 1762) (3, 4) (O)

Clavella alata Brian, 1906 (3) (O)

Clavella denticis (Krøyer, 1864) (3) (O)

Clavella pagri (Krøyer, 1864) (3?) (O)

Clavellisa Wilson, 1915

Clavellisa emarginata (Krøyer, 1837) (3, 4) (O)

Clavellisa scombri (Kurz, 1877) (3, 4) (O)

Clavellodes Wilson, 1915

Clavellodes macrotrachelus (Brian, 1906) (3) (O)

Clavelloopsis Wilson, 1915

Clavelloopsis characis (Richiardi, 1880) (3, 5) (O)

Clavelloopsis fallax (Heller, 1865) (3, 4, 5) (O)

Clavelloopsis sargi (Kurz, 1877) (3, 5) (O)

Eubrachiella Wilson, 1915

Eubrachiella exigua (Brian, 1906) (3, 5) (O)

Eubrachiella mugilis Kabata, Raibaut & Ben Hassine, 1971 (4, 5) (O)

Lernaeopoda de Blainville, 1822

Lernaeopoda bidiscalis Kane, 1892 (C) (*)

Lernaeopoda galei Krøyer, 1837 (3, 4, 5) (C)

Neobrachiella Kabata, 1979

Neobrachiella bispinosa (von Nordmann, 1832) (5) (O)

Neobrachiella chevreuxi (van Beneden, 1891) (3) (O)

Neobrachiella impudica (von Nordmann, 1832) (3, 4) (O)

Neobrachiella insidiosa (Heller, 1865) (3, 4, 5) (O)

Neobrachiella merluccii (Bassett-Smith, 1896) (3, 5) (O)

Neobrachiella richiardi (Ben Hassine & Raibaut, 1978) (4, 5) (O)

Neobrachiella triglae (Claus, 1860) (4) (O)

Pseudocharopinus Kabata, 1964

Pseudocharopinus malleus (Rudolphi in von Nordmann, 1832) (3, 4) (C)

Note

Advena paradoxa: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Lernaeopoda bidiscalis: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Naobranchiidae

Naobranchia Hesse, 1863

Naobranchia amplexans (Kurz, 1877) (4, 5) (O)

Naobranchia cygniformis Hesse, 1863 (3, 4, 5) (O)

Asterocheridae

Asterocheres Boeck, 1859

Asterocheres echinicola (Norman, 1868) (3) (SP)

Asterocheres latus (Brady, 1872) (SP) (*)

Asterocheres parvus Giesbrecht, 1897 (3) (SP)

Asterocheres stimulans Giesbrecht, 1897 (X) (*)

Asterocheres suberitis Giesbrecht, 1897 (SP) (*)

Asterocheres violaceus (Claus, 1889) (3) (ED Ec)

Asterocheres sp. (3) (SP)

Collocheres Canu, 1893

Collocheres gracilicauda (Brady, 1880) (3) (ED Of)

Scottocheres Giesbrecht, 1899

Scottocheres elongatus (T. Scott & A. Scott, 1894) (3) (SP)

Scottocheres laubieri Stock, 1967 (SP) (*)

Dermatomyzon Claus, 1889

Dermatomyzon nigripes (Brady & Robertson, 1876) (X) (*)

Acontiophorus Brady, 1880

Acontiophorus armatus Brady, 1880 (X) (*)

Acontiophorus scutatus Brady & Robertson, 1873 (SP) (*)

Rhynchomyzon Giesbrecht, 1895

Rhynchomyzon purpurocinctum (T. Scott, 1893) (SP) (*)

Note

Asterocheres latus: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Asterocheres stimulans: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Asterocheres suberitis: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Scottocheres laubieri: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Dermatomyzon nigripes: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Acontiophorus armatus: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Acontiophorus scutatus: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Rhynchomyzon purpurocinctum: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Artotrogidae

Dyspontius Thorell, 1859

Dyspontius striatus Thorell, 1859 (TU (1) (*)

Cryptopontius Giesbrecht, 1895

Cryptopontius brevifurcatus (Giesbrecht, 1895) (ED Ec) (*)

Bradypontius Giesbrecht, 1895

Bradypontius papillatus (T. Scott, 1888) (SP) (*)

Note

Dyspontius striatus: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Cryptopontius brevifurcatus: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Bradypontius papillatus: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Cancerillidae

Cancerilla Dalyell, 1851

Cancerilla tubulata Dalyell, 1851 (ED Of) (*)

Parartotrogus T. Scott & A. Scott, 1893

Parartotrogus richardi T. Scott & A. Scott, 1893 (ED Of) (*)

Note

Cancerilla tubulata: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Parartotrogus richardi: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Micro Pontiidae

Micro pontius Gooding, 1957

Micro pontius ovoides Gooding, 1957 (ED Ec) (*)

Note

Micro pontius ovoides: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Dino Pontiidae

Dinopontius Stock, 1960

Dinopontius acuticauda Stock, 1960 (3) (CN At)

Nicothoidae

Nicothoe Audouin & Edwards, 1826

Nicothoe astaci Audouin & Edwards, 1826 (CT Dp) (*)

Homoescelis Hansen, 1897

Homoescelis mediterranea Hansen, 1897 (CT Cu) (*)

Sphaeronella Salensky, 1868

Sphaeronella leuckartii Salensky, 1868 (CT Am) (*)

Note

Nicothoe astaci: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.
Homoescelis mediterranea: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Sphaeronella leuckartii: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Melinnacheridae

Melinnacheres M. Sars, 1870

Melinnacheres steenstrupi (Bresciani & Lützen, 1961) (PL) (*)

Note

Melinnacheres steenstrupi: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Phyllodicolidae

Phyllodicola Delamare-Deboutteville & Laubier, 1960

Phyllodicola petiti Delamare-Deboutteville & Laubier, 1960 (PL) (*)

Note

Phyllodicola petiti: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Herpyllobiidae

Herpyllobius Steenstrup & Lützen, 1861

Herpyllobius arcticus Steenstrup & Lützen, 1861 (PL) (*)

Note

Herpyllobius arcticus: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Nanaspididae

Allantogynus Changeux, 1958

Allantogynus delamarei Changeux, 1958 (ED OI) (*)

Calyspina Changeux, 1961

Calyspina changeuxi Changeux, 1961 (3) (ED OI)

Note

Allantogynus delamarei: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Stellicomitidae

Stellicola (Bocquet, 1952)

Stellicola asterinae (Bocquet, 1952) (3) (ED Ad)

Monstrilloida

Monstrillidae

Monstrilla (Dana, 1853)

Monstrilla helgolandica Claus, 1863 (*)

Note

Monstrilla helgolandica: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Copepoda famiglie i.s.

Antheacheridae

Staurosoma Will, 1844

Staurosoma parasiticum Will, 1844 (CN At) (*)

Note

Staurosoma parasiticum: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Mesoglicolidae

Mesoglicola Quidor, 1906

Mesoglicola delagei Quidor, 1906 (CN Cm) (*)

Note

Mesoglicola delagei: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Copepoda generi i.s.

Ameristocheres Pelseneer, 1928

Ameristocheres inermis Pelseneer, 1928 (3) (MO Pb)

Amphiurophilus (Hérouard, 1906)

Amphiurophilus amphiurae (Hérouard, 1906) (3, 4, 5) (ED Of)

Flabellicola Gravier, 1918

Flabellicola neapolitana Gravier, 1918 (3) (PL)

Gonophysema Bresciani & Lützen, 1960

Gonophysema gullmarensis Bresciani & Lützen, 1960 (TU (1) (*))

Ive Majer, 1879

Ive balanoglossi Majer, 1879 (EN) (*)

Parachordemium Le Calvez, 1938

Parachordemium tetracerus Le Calvez, 1938 (ED Of) (*)

Sacodiscus Stock, 1960

Sacodiscus humesi Stock, 1960 (3) (ED Ol)

Sponginticola Topsent, 1928

Sponginticola uncifer Topsent, 1928 (SP) (*)

Tereidoika Stock, 1959

Tereidoika serpentina Stock, 1959 (3) (MO Bi)

Note

Gonophysema gullmarensis: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Ive balanoglossi: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Parachordemium tetracerus: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Sponginticola uncifer: Specie segnalata per il Mediterraneo senza dati precisi per le acque italiane.

Mystacocarida

Mystacocaridida

Derocheilocarididae

Derocheilocaris Pennak & Zinn, 1943

Derocheilocaris remanei Delamare & Chappuis, 1951 (3, 4, 5)

Branchiura

Arguloida

Argulidae

Argulus O.F. Müller, 1785

Argulus coregoni Thorell, 1865 (N, S) (O)

Argulus foliaceus (Linnaeus, 1785) (N, S) (O)

Argulus giordanii Brian, 1959 (N, S) (O)

Argulus japonicus Thiele, 1900 (N, S) (O)

Cirripedia

Ascothoracica

Lauridae

Laura Lacaze-Duthiers, 1883

Laura gerardiae Lacaze-Duthiers, 1883 (3)

Synagogidae

Synagoga Norman, 1888

Synagoga mira Norman, 1888 (3)

Rhizocephala

Peltogastridae

Septosaccus Duboscq, 1912

Septosaccus cuenoti Duboscq, 1912 (4) (*)

Peltogaster Rathke, 1842

Peltogaster curvatus Kussmann, 1873 (3)

Peltogaster sulcatus Lilljeborg, 1859 (3)

Parthenopea Kossmann, 1874

Parthenopea subterranea Kossmann, 1874 (3)

Note

Septosaccus cuenoti: È stato segnalato sulla costa albanese, di fronte ad Otranto.

Sacculinidae

Sacculina Thompson, 1836

Sacculina carcini Thompson, 1836 (3, 4)

Sacculina eriphiae Smith, 1906 (3)

Sacculina gerbei Bonnier, 1887 (4) (*)

Sacculina gibbsi (Hesse, 1867) (3, 4)

Sacculina gonoplaxae Guérin-Gavinet, 1911 (3)

Drepanorchis Boschma, 1927

Drepanorchis neglecta (Fraisie, 1877) (3)

Note

Sacculina gerbei: È stato segnalato sulla costa adriatica intorno a Spalato.

Lernaeodiscidae

Lernaeodiscus Müller, 1862

Lernaeodiscus galathea Smith, 1906 (3)

Lernaeodiscus strigosae Smith, 1906 (3)

Thoracica

Lepadidae

Lepas Linnaeus, 1758

Lepas anatifera Linnaeus, 1767 (3, 4, 5)

Lepas anserifera Linnaeus, 1767 (3, 4, 5)

Lepas hilli (Leach, 1818) (3, 4, 5)

Lepas pectinata Spengler, 1851 (3, 4, 5)

Octolasmis Gray, 1825

Octolasmis darwini (Filippi, 1861) (3) (*)

Octolasmis lowei (Darwin, 1851) (3, 4)

Heteralepas Pilsbry, 1907

Heteralepas minuta (Philippi, 1836) (5)

Conchoderma Olfers, 1814

Conchoderma auritum (Linnaeus, 1767) (3, 4, 5)

Conchoderma virgatum (Spengler, 1790) (3, 4, 5)

Note

Octolasmis darwini: La validità della specie e la sua presenza in Italia devono essere verificate.

Scalpellidae

Scalpellum Leach, 1817

Scalpellum scalpellum (Linnaeus, 1767) (3, 4, 5)

Verrucidae

Verruca Schumacher, 1817

Verruca stroemia (O.F. Müller, 1776) (3, 4, 5)

Chthamalidae

Pachylasma Darwin, 1854

Pachylasma giganteum (Philippi, 1836) (3)

Euraphia Conrad, 1837

Euraphia depressa (Poli, 1791) (3, 4, 5)

Chthamalus Ranzani, 1818

Chthamalus montagui Southward, 1976 (3, 4, 5)

Chthamalus stellatus (Poli, 1791) (3, 4, 5)

Coronulidae

Chelonibia Leach, 1817

Chelonibia caretta (Spengler, 1790) (3, 4, 5)

Chelonibia patula (Ranzani, 1818) (3, 4, 5)

Chelonibia testudinaria (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Platylepas Gray, 1825

Platylepas hexastylus (Fabricius, 1798) (3, 4, 5)

Balanidae

Stomatolepas Pilsbry, 1910

Stomatolepas elegans (O.G. Costa, 1838) (3, 4, 5)

Xenobalanus Steenstrup, 1851

Xenobalanus globicipitis Steenstrup, 1851 (3, 4, 5)

***Solidobalanus* (*Hesperibalanus*)** Pilsbry, 1916

Solidobalanus (*Hesperibalanus*) *fallax* (Broch, 1927) (5?) (*)

Acasta Leach, 1817

Acasta spongites (Poli, 1791) (3, 4, 5)

Conopea Say, 1822

Conopea calceola (Ellis, 1758) (3)

Megatrema Leach, 1825

Megatrema anglicum (Sowerby, 1823) (3)

Balanus Da Costa, 1778

Balanus amphitrite Darwin, 1854

Balanus amphitrite amphitrite Darwin, 1854 (3, 4, 5)

Balanus eburneus Gould, 1841 (3, 4, 5)

Balanus improvisus Darwin, 1854 (3, 4)

Balanus perforatus Bruguière, 1789 (3, 4, 5)

Balanus spongicola Brown, 1844 (3)

Balanus trigonus Darwin, 1854 (3, 4, 5)

Megabalanus Hoek, 1913

Megabalanus tintinnabulum (Linnaeus, 1758) (*)

Megabalanus tintinnabulum tintinnabulum (Linnaeus, 1758) (3)

Megabalanus tulipiformis (Ellis, 1758) (3)

Note

Solidobalanus (Hesperibalanus) fallax: È probabile la presenza nel canale di Sicilia, essendo stata segnalata nelle acque algerine.

Megabalanus: Prima della revisione sistematica di Newmann & Ross (1976), *Megabalanus* occupava il rango di sottogenere di *Balanus*.

Megabalanus tintinnabulum: La specie, finora, è stata rinvenuta con certezza solo nelle condotte di scarico delle acque calde della centrale termoelettrica di Vado Ligure. Non hanno significato le vecchie segnalazioni che si riferivano a scafi di navi.

Acrothoracica

Trypetesidae

Trypetesa Norman, 1903

Trypetesa lampas (Hancock, 1849) (3?)

Lithoglyptidae

Kochlorine Noll, 1872

Kochlorine hamata Noll, 1872 (3?)

Pentastomida

Porocephalida

Porocephalidae

Armillifer L.W. Sambon, 1922

Armillifer armillatus Wyman, 1847 (*)

Note

Armillifer armillatus: Un reperto dall'Umbria, in pitone, importato.

Linguatulidae

Linguatula Frölich, 1789

Linguatula serrata Frölich, 1789 (S, Si, Sa)

Malacostraca

Leptostraca

Nebaliidae

Nebalia Leach, 1814

Nebalia clausi Dahl, 1985 (4)

Nebalia stausi Risso, 1826 (3, 4, 5)

Sarsinebalia Dahl, 1985

Sarsinebalia typhlops (G.O. Sars, 1870) (3, 5)

Stomatopoda

Nannosquillidae

Allosquilla Manning, 1977

Allosquilla africana (Manning, 1970) (4, 5)

Nannosquilloides Manning, 1977

Nannosquilloides occultus (Giesbrecht, 1910) (3, 4)

Platysquilla Manning, 1967

Platysquilla eusebia (Risso, 1816) (3, 5)

Pseudosquillidae

Parasquilla Manning, 1961

Parasquilla ferussaci (Roux, 1830) (3)

Pseudosquillopsis Serène, 1962

Pseudosquillopsis cerisii (Roux, 1828) (3, 5)

Squillidae

Rissoides Manning & Lewinsohn, 1982

Rissoides desmaresti (Risso, 1816) (3, 4, 5)

Rissoides pallidus (Giesbrecht, 1910) (3, 4, 5)

Squilla Fabricius, 1787

Squilla mantis (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Bathynellacea

Bathynellidae

Anthrobathynella Serban, 1966

Anthrobathynella stammeri (Jakobi, 1954)

Anthrobathynella stammeri stammeri (Jakobi, 1954) (N)

Bathynella Vejdovský, 1882

Bathynella lombardica Serban, 1973 (N) (E)

Bathynella ruffoi Serban, 1973 (N) (E)

Meridiobathynella Serban, Coineau & Delamare Deboutteville, 1971

Meridiobathynella cf. rouchi Serban, Coineau & Delamare Deboutteville, 1971 (S)

Sardobathynella Serban, 1973

Sardobathynella cottarellii Serban, 1973 (Sa) (E)

Thermosbaenacea

Halosbaenidae

Limnosbaena Stock, 1976

Limnosbaena finki (Mestrov & Lattinger-Penko, 1969) (N)

Monodellidae

Monodella Ruffo, 1949

Monodella stygicola Ruffo, 1949 (S) (E)

Tethysbaena Wagner, 1994

Tethysbaena argentarii (Stella, 1951) (S) (E)

Tethysbaena siracusae Wagner, 1994 (Si) (E)

Mysidacea

Lophogastridae

Lophogaster M. Sars, 1857

Lophogaster typicus M. Sars, 1857 (3, 4, 5)

Eucopiidae

Eucopia Dana, 1852

Eucopia grimaldii Nouvel, 1942 (3)

Eucopia hansenii Nouvel, 1942 (3, 4)

Mysidae

Boreomysis G.O. Sars, 1869

Boreomysis arctica (Krøyer, 1861) (3)

Boreomysis megalops G.O. Sars, 1872 (3, 4)

Siriella Dana, 1850

Siriella adriatica Hoenigman, 1960 (4) (*)
Siriella armata (Milne-Edwards, 1837) (3, 4, 5)
Siriella castellabatensis Ariani & Spagnuolo, 1976 (3) (E)
Siriella clausii G.O. Sars, 1877 (3, 4, 5)
Siriella jaltensis Czerniavsky, 1868 (3, 4, 5)
Siriella norvegica G.O. Sars, 1869 (3, 4, 5)
Siriella thompsoni (Milne-Edwards, 1837) (3, 4, 5)

Anchialina Norman & Scott, 1906

Anchialina agilis (G.O. Sars, 1877) (3, 4, 5)
Anchialina oculata Hoenigman, 1960 (3, 4, 5)

Gastrosaccus Norman, 1968

Gastrosaccus mediterraneus Bacescu, 1970 (3, 4, 5)
Gastrosaccus sanctus (van Beneden, 1861) (3, 4, 5)
Gastrosaccus spinifer (Goës, 1864) (3, 5)

Haplostylus Kossmann, 1880

Haplostylus bacescui Hatzakis, 1977 (3)
Haplostylus lobatus (Nouvel, 1951) (3, 4, 5)
Haplostylus magnilobatus (Bacescu & Schiecke, 1974) (3)
Haplostylus normani (G.O. Sars, 1877) (3, 4, 5)

Arachnomysis Chun, 1887

Arachnomysis leuckartii Chun, 1887 (3, 4, 5)

Erythrops G.O. Sars, 1869

Erythrops elegans (G.O. Sars, 1863) (3, 5)
Erythrops erythrophthalma (Goës, 1864) (3)
Erythrops neapolitana Colosi, 1929 (3)
Erythrops peterdohrni Bacescu & Schiecke, 1974 (3)

Euchaetomera G.O. Sars, 1883

Euchaetomera richardi Nouvel, 1945 (3)
Euchaetomera tenuis G.O. Sars, 1883 (3, 5)

Euchaetomeropsis W. Tattersall, 1909

Euchaetomeropsis merolepis (Illig, 1908) (3)

Hypererythrops Holt & Tattersall, 1905

Hypererythrops richardi Bacescu, 1941 (3)

Paramblyops Holt & Tattersall, 1905

Paramblyops rostrata Holt & Tattersall, 1905 (3)

Parapseudomma Nouvel & Lagardère, 1976

Parapseudomma calloplura (Holt & Tattersall, 1905) (3)

Parerythrops G.O. Sars, 1869

Parerythrops lobiancoi W. Tattersall, 1909 (3)

Parerythrops obesa (G.O. Sars, 1864) (3)

Pseudomma G.O. Sars, 1870

Pseudomma chattoni Bacescu, 1941 (3)

Pseudomma kruppi W. Tattersall, 1909 (3)

Calyptomma W. Tattersall, 1909

Calyptomma puritani W. Tattersall, 1909 (3)

Paraleptomysis Liu & Wang, 1983

Paraleptomysis apiops (G.O. Sars, 1877) (3, 4, 5)

Paraleptomysis banyulensis (Bacescu, 1966) (3, 4, 5)

Pyroleptomysis Wittmann, 1985

Pyroleptomysis peresi (Bacescu, 1966) (3)

Pyroleptomysis rubra Wittmann, 1985 (3, 4)

Leptomysis G.O. Sars, 1869

Leptomysis buergii Bacescu, 1966 (3, 4, 5)

Leptomysis gracilis (G.O. Sars, 1864) (3, 4, 5)

Leptomysis heterophila Wittmann, 1985 (3, 4)

Leptomysis lingvura (G.O. Sars, 1868) (3, 4, 5)

Leptomysis mediterranea G.O. Sars, 1877 (3, 4, 5)

Leptomysis megalops Zimmer, 1915 (3, 4, 5)

Leptomysis posidoniae Wittmann, 1985 (3, 4)

Leptomysis truncata (Heller, 1863) (3, 4, 5)

Mysideis G.O. Sars, 1869

Mysideis parva Zimmer, 1915 (3)

Mysidetes Holt & Tattersall, 1906

Mysidetes farrani (Holt & Tattersall, 1905) (3)

Mysidopsis G.O. Sars, 1864

Mysidopsis angusta G.O. Sars, 1864 (3, 4)

Mysidopsis didelphys (Norman, 1863) (3)

Mysidopsis gibbosa G.O. Sars, 1864 (3, 4, 5)

Acanthomysis Czerniavsky, 1882

Acanthomysis longicornis (Milne-Edwards, 1837) (3, 4, 5)

Diamysis Czerniavsky, 1882

Diamysis bahirensis (G.O. Sars, 1877) (3, 4, 5)

Hemimysis G.O. Sars, 1869

Hemimysis abyssicola G.O. Sars, 1869 (3)

Hemimysis lamornae (Couch, 1856) (3, 4)

Mesopodopsis Czerniavsky, 1882

Mesopodopsis aegyptia Wittmann, 1992 (3, 4)

Mesopodopsis slabberi (van Beneden, 1861) (3, 4, 5)

Paramysis Czerniavsky, 1882

Paramysis arenosa (G.O. Sars, 1877) (3, 4, 5)

Paramysis helleri (G.O. Sars, 1877) (3, 4, 5)

Schistomysis Norman, 1892

Schistomysis assimilis (G.O. Sars, 1877) (3, 4)

Heteromysis S.I. Smith, 1874

Heteromysis eideri Bacescu, 1941 (3)

Heteromysis formosa S.I. Smith, 1874 (3)

Mysidella G.O. Sars, 1872

Mysidella typica G.O. Sars, 1872 (3)

Note

Siriella adriatica: Considerata da Wittmann solo quale forma invernale di *S. jaltensis*.

Lepidomysidae

Spelaeomysis Caroli, 1924

Spelaeomysis bottazzii Caroli, 1924 (S) (E)

Stygiomysidae

Stygiomysis Caroli, 1937

Stygiomysis hydruntina Caroli, 1937 (S) (E)

Stygiomysis sp. Pesce, 1975 (S)

Cumacea

Lampropidae

Hemilamprops G.O. Sars, 1883

Hemilamprops normani Bonnier, 1896 (3)

Platysympus Stebbing, 1912

Platysympus typicus (G.O. Sars, 1870)

Platysympus typicus typicus (G.O. Sars, 1870) (3)

Platysympus typicus mediterraneus (Bacescu, 1961) (3)

Bodotriidae

Bodotria Goodsir, 1843

Bodotria arenosa Goodsir, 1843

Bodotria arenosa arenosa Goodsir, 1843 (3)

Bodotria gibba (G.O. Sars, 1878) (3, 5)

Bodotria pulchella (G.O. Sars, 1878) (3)

Bodotria scorpioides (Montagu, 1804) (3, 4, 5)

Cyclaspis G.O. Sars, 1865

Cyclaspis longicaudata G.O. Sars, 1865 (3, 5)

Eocuma Marcusen, 1894

Eocuma ferox (Fischer, 1872) (3, 5)
Eocuma sarsii (Kossman, 1880) (3)

Iphinoe Bate, 1856

Iphinoe acutirostris Ledoyer, 1965 (3, 5)
Iphinoe adriatica Bacescu, 1988 (4)
Iphinoe armata Ledoyer, 1965 (3, 5)
Iphinoe douniae Ledoyer, 1965 (3)
Iphinoe elisae Bacescu, 1950 (3, 5)
Iphinoe inermis G.O. Sars, 1879 (3, 5)
Iphinoe maculata Ledoyer, 1965 (3)
Iphinoe maeotica (Sowinsky, 1894) (3, 5)
Iphinoe rhodaniensis Ledoyer, 1965 (3)
Iphinoe serrata Norman, 1867 (3, 4)
Iphinoe tenella G.O. Sars, 1878 (3, 5)
Iphinoe trispinosa (Goodsir, 1843) (3, 5)

Bathycuma Hansen, 1895

Bathycuma brevirostre (Norman, 1879) (3, 5)
Bathycuma longicaudatum Calman, 1912 (3)

Cumopsis G.O. Sars, 1878

Cumopsis longipes (Dohrn, 1869) (3, 5)

Vaunthompsonia Bate, 1858

Vaunthompsonia cristata Bate, 1858 (3, 5)
Vaunthompsonia minor Zimmer, 1944 (3?)

Leuconidae

Eudorella Norman, 1867

Eudorella nana G.O. Sars, 1879 (3)
Eudorella truncatula (Bate, 1856) (3)

Leucon (Leucon) Krøyer, 1846

Leucon (Leucon) affinis Fage, 1951 (3)
Leucon (Leucon) macrorhinus Fage, 1951 (3)
Leucon (Leucon) mediterraneus G.O. Sars, 1879

Leucon (Leucon) mediterraneus mediterraneus G.O. Sars, 1879 (3)
Leucon (Leucon) siphonatus Calman, 1905 (3)

Leucon (Epileucon) Jones, 1956

Leucon (Epileucon) longirostris Sars, 1871 (3, 5)

Nannastacidae

Campylaspis Sars, 1865

Campylaspis glabra G.O. Sars, 1879 (3, 5)
Campylaspis horridoides Stephensen, 1915 (3)
Campylaspis legendrei Fage, 1951
 Campylaspis legendrei legendrei Fage, 1951 (3)
Campylaspis macrophthalma G.O. Sars, 1879 (3)
Campylaspis rostrata Calman, 1905 (3)
Campylaspis spinosa Calman, 1906 (3)
Campylaspis sulcata G.O. Sars, 1870 (3)
Campylaspis verrucosa G.O. Sars, 1866 (3)
Campylaspis vitrea Calman, 1906 (3)

Cumella G.O. Sars, 1865

Cumella limicola G.O. Sars, 1879 (3, 4, 5)
Cumella pygmaea G.O. Sars, 1865
 Cumella pygmaea italica Bacescu, 1950 (3, 5)

Cumellopsis Calman, 1905

Cumellopsis puritani Calman, 1906 (3)

Nannastacus Bate, 1865

Nannastacus brevicaudatus Calman, 1905 (3?)
Nannastacus longirostris G.O. Sars, 1879 (3, 5)
Nannastacus unguiculatus Bate, 1859 (3, 5)

Procampylaspis Bonnier, 1896

Procampylaspis armata Bonnier, 1896 (3, 5)
Procampylaspis bacescoi Reyss & Soyer, 1966 (3, 5)
Procampylaspis bonnierii Calman, 1906 (3)
Procampylaspis mediterranea Ledoyer, 1987 (3)

Diastylidae

***Diastylis* Say, 1818**

- Diastylis cornuta* (Boeck, 1864) (3)
- Diastylis doryphora* Fage, 1940 (3)
- Diastylis jonesi* Reyss, 1972 (3)
- Diastylis neapolitana* G.O. Sars, 1879 (3)
- Diastylis rugosa* G.O. Sars, 1865 (3, 4, 5)

***Diastylodes* G.O. Sars, 1900**

- Diastylodes bacescoi* Fage, 1940 (3)
- Diastylodes biplicatus* (G.O. Sars, 1865) (3)
- Diastylodes carpinei* Bacescu, 1969 (3)
- Diastylodes serratus* (G.O. Sars, 1865) (3)

***Ekleptostylis* Stebbing, 1912**

- Ekleptostylis walkeri* (Calman, 1907) (3)

***Leptostylis* G.O. Sars, 1869**

- Leptostylis bacescoi* Reyss, 1972 (3)
- Leptostylis gamoi* Reyss, 1972 (3)
- Leptostylis macrura* G.O. Sars, 1870 (3)

***Makrokylindrus (Adiastylis)* Stebbing, 1912**

- Makrokylindrus (Adiastylis) insignis* (G.O. Sars, 1871) (3)
- Makrokylindrus (Adiastylis) longipes* (G.O. Sars, 1871) (3, 5)

***Vemakylindrus* Bacescu, 1961**

- Vemakylindrus charcoti* (Reyss, 1974) (5)

Pseudocumatidae

***Pseudocuma (Pseudocuma)* G.O. Sars, 1865**

- Pseudocuma (Pseudocuma) ciliatum* G.O. Sars, 1879 (3)
- Pseudocuma (Pseudocuma) longicorne* (Bate, 1858)
 - Pseudocuma (Pseudocuma) longicorne longicorne* (Bate, 1858) (3)
- Pseudocuma (Pseudocuma) simile* G.O. Sars, 1900 (3)

Tanaidacea

Apseudidae

Apseudes Leach, 1814

- Apseudes acutifrons* G.O. Sars, 1882 (3)
- Apseudes africanus* Tattersall, 1925 (5)
- Apseudes echinatus* G.O. Sars, 1882 (3)
- Apseudes elisae* Bacescu, 1961 (3)
- Apseudes graciloides* Stephensen, 1915 (3)
- Apseudes grossimanus* Norman & Stebbing, 1886 (3)
- Apseudes holthuisi* Bacescu, 1962 (3, 4)
- Apseudes intermedius* Hansen, 1895 (5)
- Apseudes latreillii* (Milne-Edwards, 1828) (3, 4, 5)
- Apseudes misarai* Bacescu, 1981 (3, 4, 5) (*)
- Apseudes ostroumovi* Bacescu & Carausu, 1947 (4)
- Apseudes robustus* G.O. Sars, 1882 (5)
- Apseudes sicilianus* Bacescu, 1981 (5)
- Apseudes spinosus* (M. Sars, 1858) (3)
- Apseudes talpa* (Montagu, 1808) (3, 4)
- Apseudes tenuimanus* G.O. Sars, 1882 (3, 5)

Fageapsudes (Bacescu & Gutu, 1971)

- Fageapsudes retusifrons* (Richardson, 1912) (3)

Parapseudes G.A. Sars, 1882

- Parapseudes latifrons* (Grube, 1864) (3, 4, 5)

Note

Apseudes: *A. echinatus* è riferibile al subg. *Tuberapseudes* Bacescu & Gutu, 1971; le altre specie sono riferibili al sottogenere nominale *Apseudes* Leach, 1814.

Apseudes misarai: Secondo Sieg (1983) va posto in sinonimia con *A. acutifrons* G.O. Sars, 1882.

Metapseudidae

Synapseudes Miller, 1840

- Synapseudes shiinoi* Riggio, 1973 (3, 5)

Tanaidae

Zeuxo (Zeuxo) Templeton, 1840

Zeuxo (Zeuxo) fresii Sieg, 1980 (5)

Zeuxo (Zeuxo) normani Richardson, 1905 (3)

Hexapleromera Dudich, 1931

Hexapleromera crassa Riggio, 1975 (3)

Hexapleromera robusta Moore, 1894 (3)

Tanaïs Latreille, 1831

Tanaïs dulongii (Audouin, 1826) (3, 4, 5)

Tanaïs grimaldii Dollfus, 1897 (3)

Anarthruridae

Anarthrura G.O. Sars, 1882

Anarthrura simplex G.O. Sars, 1882 (3)

Paranarthrura Hansen, 1913

Paranarthrura subtilis Hansen, 1913 (3)

Collettea Lang, 1973

Collettea cylindrata (G.O. Sars, 1882) (3)

Leptognathiidae

Leptognathia G.O. Sars, 1882

Leptognathia brevimana (Lilljeborg, 1864) (3)

Leptognathia filiiformis (Lilljeborg, 1864) (3)

Leptognathia longiremis (Lilljeborg, 1864) (3)

Leptognathia manca G.O. Sars, 1882 (3)

Leptognathia unguicillata (Norman & Stebbing, 1886) (3)

Pseudoparatanaïs Sieg, 1973

Pseudoparatanaïs batei G.O. Sars, 1882 (3, 4, 5)

Tanaopsis G.O. Sars, 1896

Tanaopsis graciloides (Lilljeborg, 1864) (3, 5)

Typhlotanais G.O. Sars, 1882

Typhlotanais messinensis G.O. Sars, 1882 (3, 5)

Paratanaidae

Heterotanais G.O. Sars, 1882

Heterotanais oerstedii (Krøyer, 1842) (4) (*)

Leptochelia Dana, 1849

Leptochelia savignyi (Krøyer, 1842) (3, 4, 5)

Pseudoleptochelia Lang, 1973

Pseudoleptochelia anomala G.O. Sars, 1882 (3, 5)

Pseudoleptochelia longidactylus (Bacescu, 1977) (3, 5) (*)

Pseudoleptochelia magna (Smith, 1906) (3) (*)

Pseudoleptochelia mercantilii (Smith, 1906) (3) (*)

Pseudoleptochelia mergellinae (Smith, 1906) (3)

Pseudoleptochelia provincialis (Dollfus, 1898) (3) (*)

Note

Heterotanais oerstedii: Forma prevalente in acque salmastre e deltizie. Alcuni esemplari del delta padano furono ascritti alla forma *gurneyi*.

Pseudoleptochelia longidactylus: Descritto per le acque libiche; segnalato per le isole Pelagie.

Pseudoleptochelia magna: Probabile sinonimo di *P. anomala* (G.O. Sars, 1882).

Pseudoleptochelia mercantilii: Probabile sinonimo di *P. anomala* (G.O. Sars, 1882).

Pseudoleptochelia provincialis: Locus typicus: Golfo di S. Tropez. Si tratta probabilmente di una forma di *P. anomala* (G.O. Sars, 1882).

Pseudotanaidae

Pseudotanaeis (Pseudotanaeis) G.O. Sars, 1882

Pseudotanaeis (Pseudotanaeis) macrocheles G.O. Sars, 1882 (3)

Pseudotanaeis (Pseudotanaeis) mediterraneus G.O. Sars, 1882 (3)

Pseudotanaeis (Pseudotanaeis) unicus Sieg, 1973 (3)

Isopoda

Asellidae

Asellus Geoffroy St. Hilaire, 1764

Asellus aquaticus (Linné, 1758) (N, S)

Proasellus Dudich, 1925

Proasellus acutianus Argano & Henry, 1972 (S) (E)
Proasellus adriaticus Argano & Pesce, 1979 (S) (E)
Proasellus amiterminus Argano & Pesce, 1979 (S) (E)
Proasellus banyulensis (Racovitza, 1919) (N, S, Si, Sa)
Proasellus cavaticus (Leydig, 1871) (N)
Proasellus coxalis (Dollfus, 1892) (N?, S?, Si?, Sa?)
Proasellus deminutus (Sket, 1959) (N)
Proasellus franciscoloi (Chappuis, 1955) (N) (E)
Proasellus gardinii (Arcangeli, 1942) (N) (E)
Proasellus istrianus (Stammer, 1932) (N)
Proasellus intermedius Sket, 1965 (N)
Proasellus ligusticus Bodon & Argano, 1982 (N) (E)
Proasellus micropectinatus Baratti & Messana, 1990 (S) (E)
Proasellus montalentii Stoch, Valentino & Volpi, 1995 (Si) (E)
Proasellus patrizii (Arcangeli, 1952) (Sa) (E)
Proasellus pavani (Arcangeli, 1942) (N) (E)
Proasellus slavus (Remy, 1948) (N)
Proasellus vignai Argano & Pesce, 1979 (S) (E)
Proasellus wolffi (Dudich, 1925) (Si)

Chthonasellus Argano & Messana, 1991

Chthonasellus bodoni Argano & Messana, 1991 (N)

Stenasellidae

Stenasellus Dollfus, 1897

Stenasellus assorgiai Argano, 1968 (Sa) (E)
Stenasellus nuragicus Argano, 1968 (Sa) (E)
Stenasellus racovitzae Razzauti, 1925 (S, Sa) (E)

Desmosomatidae

Desmosoma G.O. Sars, 1863

Desmosoma affine Fresi & Schiecke, 1969 (3)

Desmosoma angustum G.O. Sars, 1899 (3)
Desmosoma atypicum Fresi & Schiecke, 1969 (3)
Desmosoma chelatum Stephensen, 1915 (3)
Desmosoma elegans Fresi & Schiecke, 1969 (3)
Desmosoma filipes Hult, 1936 (3)
Desmosoma latipes Hansen, 1916 (3)
Desmosoma puritanum Fresi & Schiecke, 1969 (3)
Desmosoma serratum Fresi & Schiecke, 1969 (3)
Desmosoma thoracicum Fresi & Schiecke, 1969 (3)
Desmosoma tyrrhenicum Fresi & Schiecke, 1969 (3)

Echinopleura G.O. Sars, 1899

Echinopleura aculeata (G.O. Sars, 1864) (4, 5)

Gnathostenetroidae

Gnathostenetroides Amar, 1957

Gnathostenetroides laodicense Amar, 1957 (5)

Caecostenetroides Fresi & Schiecke, 1968

Caecostenetroides ischinatum Fresi & Schiecke, 1968 (3)

Ischnomesidae

Ischnomesus Richardson, 1908

Ischnomesus bispinosus (G.O. Sars, 1864) (3, 5)

Jaeropsidae

Jaeropsis Koehler, 1885

Jaeropsis brevicornis Koehler, 1885 (3, 5)

Jaeropsis dolfusi Norman, 1899 (3)

Jaeropsis montalentii Fresi, 1968 (3)

Janiridae

Bagatus Nobili, 1906

Bagatus stebbingi Monod, 1933 (3, 4, 5)

Jaera Leach, 1814

Jaera hopeana A. Costa, 1853 (3, 4, 5)
Jaera italica Kesselyak, 1938 (3, 4, 5)
Jaera massiliensis Lemercier, 1958 (5)
Jaera nordmanni (Rathke, 1837) (3, 5)
Jaera schellenbergi Kesselyak, 1938 (4)
Jaera sorrentina Verhoeff, 1943 (3)

Janira Leach, 1814

Janira maculosa Leach, 1814 (3, 4)

Microjanira Schiecke & Fresi, 1970

Microjanira dentifrons Schiecke & Fresi, 1970 (3, 4)

Janirella Bonnier, 1896

Janirella bonnieri Stephensen, 1915 (3)

Microjaera Bocquet & Levi, 1953

Microjaera anisopoda Bocquet & Levi, 1953 (3)

Microparasellidae

Microcharon Karaman, 1934

Microcharon angelicae Pesce & Galassi, 1988 (S) (E)
Microcharon arganoi Pesce & Teté, 1978 (S) (E)
Microcharon marinus Chappuis & Delamare, 1954 (3, 5)
Microcharon nuragicus Pesce & Galassi, 1988 (Sa) (E)
Microcharon silverii Pesce & Galassi, 1988 (S) (E)

Angeliara Chappuis & Delamare, 1954

Angeliara phreaticola Chappuis & Delamare, 1954 (3)

Munnidae

Austrosignum Hodgson, 1910

Austrosignum maltinii Schiecke & Fresi, 1972 (3)

Munna Krøyer, 1839

Munna mediterranea Pierantoni, 1916 (3)

Munna similis Fresi & Mazzella, 1971 (3)

Munna wolffi Fresi & Mazzella, 1971 (3)

Uromunna Menzies, 1962

Uromunna petiti Amar, 1948 (3, 4)

Pleurocopidae

Pleurocope Walker, 1901

Pleurocope dasyura Walker, 1901 (3)

Paramunnidae

Pleurogonium G.O. Sars, 1872

Pleurogonium variabile Schiecke & Modigh-Tota, 1976 (3)

Stenetriidae

Stenetrium Haswell, 1881

Stenetrium longicorne (Lucas, 1849) (4)

Stenetrium mediterraneum Hansen, 1904 (3, 5)

Nannoniscidae

Austroniscus Vanhoffen, 1914

Austroniscus coronatus Schiecke & Modigh-Tota, 1976 (3)

Eurycopidae

Disconectes Wilson & Hessler, 1981

Disconectes picardi (Amar, 1957) (3)

Ilyarachnidae

Ilyarachna Sars, 1870

Ilyarachna calidus George & Menzies, 1968 (5)

Microcerberidae

Microcerberus Karaman, 1933

Microcerberus arenicola Chappuis & Delamare, 1954 (3)

Microcerberus remanei Chappuis & Delamare, 1952 (3, 4)

Microcerberus ruffoi Chappuis, 1953 (N) (E)

Tylidae

Tylos Latreille, 1826

Tylos europaeus Arcangeli, 1938 (N, S, Si, Sa)

Tylos ponticus Budde Lund, 1885 (N, S, Si, Sa)

Helleria Ebner, 1868

Helleria brevicornis Ebner, 1868 (N?, S, Sa)

Ligiidae

Ligia Fabricius, 1798

Ligia italica Fabricius, 1798 (N, S, Si, Sa)

Ligidium Brandt, 1833

Ligidium germanicum Verhoeff, 1901 (N, S)

Ligidium hypnorum (Cuvier, 1792) (N)

Mesoniscidae

Mesoniscus Carl, 1906

Mesoniscus alpicola (Heller, 1858) (N)

Trichoniscidae

Aegonethes Frankenberger, 1938

Aegonethes cervinus (Verhoeff, 1931) (S) (E)

Alpioniscus (Alpioniscus) Racovitza, 1908

Alpioniscus (Alpioniscus) feneriensis (Parona, 1880) (N)

Alpioniscus (Illyrionethes) Verhoeff, 1927

Alpioniscus (Illyrionethes) fragilis Budde-Lund, 1909 (Sa) (E)

Alpioniscus (Illyrionethes) strasseri (Verhoeff, 1927) (N)

Androniscus (Dentigeroniscus) Arcangeli, 1938

Androniscus (Dentigeroniscus) brentanus Verhoeff, 1932 (N) (E)

Androniscus (Dentigeroniscus) calcivagus Verhoeff, 1908 (N) (E)

Androniscus (Dentigeroniscus) degener Brian, 1926 (N) (E)

Androniscus (Dentigeroniscus) dentiger Verhoeff, 1908 (N, S, Si)

Androniscus (Dentigeroniscus) noduliger Verhoeff, 1928 (N) (E)

Androniscus (Dentigeroniscus) paolettii Caruso, 1972 (N) (E)

Androniscus (Dentigeroniscus) spelaeorum Verhoeff, 1908 (N) (E)

Androniscus (Dentigeroniscus) subterraneus Carl, 1906 (N)

Androniscus (Roseoniscus) Arcangeli, 1938

Androniscus (Roseoniscus) roseus (C.L. Koch, 1837) (N, S)

Androniscus (Roseoniscus) stygius (Joseph, 1882) (N)

Bergamoniscus Brian & Vandel, 1949

Bergamoniscus boesii (Brian, 1926) (N) (E)

Beroniscus Vandel, 1969

Beroniscus marcelli Vandel, 1969 (Si) (E)

Catalauniscus Vandel, 1953

Catalauniscus hirundinella Argano, 1973 (Sa) (E)

Catalauniscus puddui Argano, 1973 (Sa) (E)

Finaloniscus Brian, 1951

Finaloniscus franciscocoli (Brian, 1951) (N, S, Si) (E)

Hyloniscus Verhoeff, 1908

Hyloniscus adonis Verhoeff, 1927 (N)
Hyloniscus refugiorum Verhoeff, 1933 (S) (E)

Katascaphius Verhoeff, 1936

Katascaphius sturanus Verhoeff, 1936 (N) (E)

Lapilloniscus Brian, 1938

Lapilloniscus patrizii Brian, 1938 (S) (E)

Miktoniscus Kesselyak, 1930

Miktoniscus melitensis Caruso & Lombardo, 1982 (Si) (E)
Miktoniscus patrizii Brian, 1950 (S) (E)

Nesiotoniscus Racovitza, 1908

Nesiotoniscus affinis (Argano & Manicasteri, 1990) (Sa) (E)
Nesiotoniscus ferrarai (Argano & Manicasteri, 1990) (Sa) (E)
Nesiotoniscus grafittii (Argano & Manicasteri, 1990) (Sa) (E)
Nesiotoniscus harpagonifer Taiti & Ferrara, 1995 (S) (E)
Nesiotoniscus helenae Brisolese & Caruso, 1974 (Si) (E)
Nesiotoniscus nodulosus Verhoeff, 1943 (S) (E)
Nesiotoniscus patrizii Brian, 1953 (Sa) (E)
Nesiotoniscus sebaouensis Vandel, 1955 (S)

Oritoniscus Racovitza, 1908

Oritoniscus beroni Ferrara & Taiti, 1984 (Sa) (E)
Oritoniscus condei Brian, 1956 (Sa) (E)
Oritoniscus cf. paganus Racovitza, 1908 (S)

Scotoniscus Racovitza, 1908

Scotoniscus baccettii Manicasteri & Argano, 1989 (Sa) (E)
Scotoniscus janas Argano, 1973 (Sa) (E)

Siciloniscus Caruso, 1982

Siciloniscus tulliae Caruso, 1982 (Si) (E)

Spelaeonethes Verhoeff, 1932

Spelaeonethes brixensis (Brian, 1938) (N) (E)
Spelaeonethes mancinii (Brian, 1913) (N, S) (E)

Spelaeonethes nodulosus Verhoeff, 1932 (N) (E)

Titanethes Schiödte, 1849

Titanethes albus (C.L. Koch, 1841) (N)

Titanethes dahli Verhoeff, 1926 (N)

Trichoniscus Brandt, 1833

Trichoniscus aenariensis Verhoeff, 1941 (S) (E)

Trichoniscus alemannicus Verhoeff, 1917 (N, S)

Trichoniscus alexandrae Caruso, 1978 (Si) (E)

Trichoniscus austriacus Verhoeff, 1908 (N)

Trichoniscus baschierii Brian, 1953 (S) (E)

Trichoniscus callorii Brian, 1954 (S) (E)

Trichoniscus castanearum Verhoeff, 1952 (S) (E)

Trichoniscus circuliger Verhoeff, 1931 (N)

Trichoniscus craterium Verhoeff, 1941 (S) (E)

Trichoniscus epomeanus Verhoeff, 1941 (S) (E)

Trichoniscus foveolatus Vandel, 1951 (N) (E)

Trichoniscus fragilis Racovitza, 1908 (S, Sa)

Trichoniscus ghidinii Brian, 1931 (N) (E)

Trichoniscus halophilus Vandel, 1951 (S, Si, Sa)

Trichoniscus heroldi Verhoeff, 1931 (N) (E)

Trichoniscus illyricus Verhoeff, 1931 (N)

Trichoniscus jeanneli Vandel, 1955 (S)

Trichoniscus lazzaronius Verhoeff, 1952 (S) (E)

Trichoniscus litorivagus Verhoeff, 1944 (S) (E)

Trichoniscus matulici Verhoeff, 1901 (S, Si)

Trichoniscus neapolitanus Verhoeff, 1952 (S) (E)

Trichoniscus provisorius Racovitza, 1908 (N, S, Si, Sa)

Trichoniscus pygmaeus G.O. Sars, 1899 (N, S, Si)

Trichoniscus riparianus Verhoeff, 1936 (N) (E)

Trichoniscus simplicifrons Verhoeff, 1901 (N, S)

Trichoniscus stammeri Verhoeff, 1932 (N)

Trichoniscus sujensis Brian, 1963 (N) (E)

Trichoniscus sulcatus Verhoeff, 1932 (N, S)

Trichoniscus verhoeffi Dahl, 1919 (N) (E)

Trichoniscus voltai Arcangeli, 1948 (N) (E)

Trichoniscus vulcanius Verhoeff, 1951 (S) (E)

Trichoniscus zangherii Arcangeli, 1952 (N, S) (E)

***Calconiscellus* (*Cypholambrana*)** Verhoeff, 1938

Calconiscellus (*Cypholambrana*) *castelmartius* Verhoeff, 1938 (N) (E)

Calconiscellus (*Cypholambrana*) *malanchinii* Arcangeli, 1948 (N) (E)

Calconiscellus (*Cypholambrana*) *zanerae* Brian, 1954 (S) (E)

Castellanethes Brian, 1952

Castellanethes sanfilippoi Brian, 1952 (S) (E)

Cyphobrembana Verhoeff, 1931

Cyphobrembana pellegrinensis Verhoeff, 1931 (N) (E)

Cyphotendana Verhoeff, 1935

Cyphotendana ligurina Verhoeff, 1936 (N, S)

Haplophthalmus Schoebl, 1860

Haplophthalmus abbreviatus Verhoeff, 1928 (S)
Haplophthalmus apuanus Verhoeff, 1908 (S)
Haplophthalmus aternanus Verhoeff, 1931 (S) (E)
Haplophthalmus avolensis Vandel, 1969 (Si) (E)
Haplophthalmus bonadonai Legrand & Vandel, 1950 (N)
Haplophthalmus claviger Verhoeff, 1944 (S) (E)
Haplophthalmus concordiae Verhoeff, 1952 (S) (E)
Haplophthalmus cottianus Verhoeff, 1936 (N) (E)
Haplophthalmus danicus Budde Lund, 1885 (N, S, Si)
Haplophthalmus delmontensis Verhoeff, 1936 (N) (E)
Haplophthalmus fiumaranus Verhoeff, 1908 (S)
Haplophthalmus ligurinus Verhoeff, 1930 (N, S) (E)
Haplophthalmus litoralis Verhoeff, 1952 (S) (E)
Haplophthalmus lombardicus Strouhal, 1948 (N) (E)
Haplophthalmus mengii (Zaddach, 1844) (N, S)
Haplophthalmus monticellii Arcangeli, 1923 (N, S) (E)
Haplophthalmus montivagus Verhoeff, 1941 (N, S)
Haplophthalmus portofinensis Verhoeff, 1908 (N) (E)
Haplophthalmus pumilio Verhoeff, 1944 (S) (E)
Haplophthalmus siculus Dollfus, 1896 (S, Si)

Italoniscus Schmoelzer, 1962

Italoniscus sorattinus (Verhoeff, 1951) (S) (E)

Leucocyphoniscus Verhoeff, 1900

Leucocyphoniscus solarii Brian, 1914 (N) (E)
Leucocyphoniscus torrii Arcangeli, 1948 (N) (E)
Leucocyphoniscus verruciger Verhoeff, 1900 (N)

Moserius Strouhal, 1940

Moserius percoi Strouhal, 1940 (N, S)

Murgeoniscus Arcangeli, 1938

Murgeoniscus anellii Arcangeli, 1938 (S) (E)

Paracyphoniscus Brian, 1958

Paracyphoniscus meggiolaroi Brian, 1958 (N) (E)

Sanfilippia Brian, 1948

Sanfilippia concii Brian, 1948 (N) (E)

Buddelundiellidae

Buddelundiella Silvestri, 1897

Buddelundiella armata Silvestri, 1897 (N) (E)

Buddelundiella biancheriae Brian, 1954 (N) (E)

Buddelundiella borgensis Verhoeff, 1936 (N) (E)

Buddelundiella caprai Brian, 1936 (N) (E)

Buddelundiella cataractae Verhoeff, 1930 (N, S, Si)

Buddelundiella franciscoliana Brian, 1953 (N) (E)

Buddelundiella insubrica Verhoeff, 1938 (N) (E)

Buddelundiella sanfilippoi Brian, 1951 (N, S) (E)

Buddelundiella voluta Verhoeff, 1930 (N, S) (E)

Buddelundiella zimmeri Verhoeff, 1930 (N)

Buchnerillo Verhoeff, 1943

Buchnerillo litoralis Verhoeff, 1943 (S, Si, Sa)

Scyphacidae

Armadilloniscus Uljanin, 1875

Armadilloniscus aestuarii Verhoeff, 1930 (S)

Armadilloniscus candidus Budde Lund, 1885 (S, Sa)

Armadilloniscus ellipticus (Harger, 1878) (N, S, Sa)

Spelaeoniscidae

Spelaeoniscus Racovitza, 1907

Spelaeoniscus costai Caruso & Lombardo, 1976 (Si) (E)

Spelaeoniscus lagrecai Caruso, 1973 (Si) (E)
Spelaeoniscus petraliai Caruso & Lombardo, 1977 (Si) (E)
Spelaeoniscus ragonesei Caruso & Lombardo, 1977 (Si) (E)
Spelaeoniscus vandeli Caruso, 1974 (Si) (E)

Stenoniscidae

Stenoniscus Aubert & Dollfus, 1890

Stenoniscus carinatus Silvestri, 1897 (S, Si, Sa)
Stenoniscus pleonalis Aubert & Dollfus, 1890 (N, S, Si, Sa)

Styloniscidae

Cordioniscus Graeve, 1914

Cordioniscus patrizii Brian, 1955 (Sa) (E)

Oniscidae

Oniscus Linné, 1758

Oniscus asellus Linné, 1758 (N)

Oroniscus Verhoeff, 1908

Oroniscus dolomiticus (Verhoeff, 1908) (N) (E)
Oroniscus festai (Arcangeli, 1939) (N) (E)
Oroniscus hessei Verhoeff, 1936 (N) (E)
Oroniscus pavani Arcangeli, 1939 (N) (E)

Sardoniscus Arcangeli, 1939

Sardoniscus pygmaeus (Budde Lund, 1885) (S, Sa)
Sardoniscus verhoeffi (Ferrara & Taiti, 1978) (S) (E)

Philosciidae

Anaphiloscia Racovitza, 1907

Anaphiloscia sicula Arcangeli, 1934 (S, Si)

Chaetophiloscia Verhoeff, 1908

Chaetophiloscia cellaria (Dollfus, 1884) (N, S, Si, Sa)
Chaetophiloscia elongata (Dollfus, 1884) (N, S, Si, Sa)
Chaetophiloscia glandulifera Verhoeff, 1908 (S) (E)
Chaetophiloscia hastata Verhoeff, 1929 (N, S)
Chaetophiloscia sicala Verhoeff, 1908 (S)

Ctenoscia Verhoeff, 1928

Ctenoscia dorsalis Verhoeff, 1928 (N, S, Si, Sa)

Lepidoniscus Verhoeff, 1908

Lepidoniscus minutus (C.L. Koch, 1838) (N)
Lepidoniscus pruinosus Carl, 1908 (N)

Philoscia Latreille, 1804

Philoscia affinis Verhoeff, 1908 (N, S, Si, Sa)
Philoscia anienana Verhoeff, 1933 (S) (E)
Philoscia dalmatica Verhoeff, 1908 (S, Si)
Philoscia heroldi Verhoeff, 1936 (N) (E)
Philoscia molisia Verhoeff, 1933 (S) (E)
Philoscia muscorum (Scopoli, 1763) (N, S)
Philoscia univittata Strouhal, 1937 (S)

Tiroloscia Verhoeff, 1926

Tiroloscia apenninorum Verhoeff, 1908 (S) (E)
Tiroloscia corsica (Dollfus, 1888) (S, Sa)
Tiroloscia exigua Budde Lund, 1885 (N)
Tiroloscia macchiaie Verhoeff, 1931 (S)

Trichophiloscia Arcangeli, 1950

Trichophiloscia murisieri (Arcangeli, 1925) (Sa) (E)

Halophilosciidae

Halophiloscia Verhoeff, 1908

Halophiloscia couchii (Kinahan, 1858) (N, S, Si, Sa)
Halophiloscia hirsuta Verhoeff, 1928 (N, S, Si, Sa)
Halophiloscia ischiana Verhoeff, 1933 (S, Sa)
Halophiloscia tyrrhena Verhoeff, 1928 (N, S, Sa)

Stenophiloscia Verhoeff, 1908

Stenophiloscia glarearum Verhoeff, 1908 (S, Si) (E)
Stenophiloscia posidoniarum Verhoeff, 1952 (S) (E)
Stenophiloscia zosterae Verhoeff, 1928 (N, S, Si, Sa)

Bathytropidae

Bathytropa Budde Lund, 1885

Bathytropa dollfusi Strouhal, 1936 (Si)
Bathytropa graevei (Verhoeff, 1940) (S) (E)
Bathytropa granulata Aubert & Dollfus, 1890 (Si)
Bathytropa patanei Caruso, 1973 (Si) (E)
Bathytropa ruffoi Caruso, 1973 (Si) (E)

Platyarthridae

Platyarthrus Brandt, 1833

Platyarthrus aiasensis Legrand, 1953 (S, Si, Sa)
Platyarthrus briani Verhoeff, 1931 (S, Si) (E)
Platyarthrus caudatus Aubert & Dollfus, 1890 (N, S, Si, Sa)
Platyarthrus costulatus Verhoeff, 1908 (N, S, Si, Sa)
Platyarthrus haplophthalmoides Arcangeli, 1932 (S) (E)
Platyarthrus hoffmannseggii Brandt, 1833 (N, S, Si)
Platyarthrus lerinensis Vandel, 1957 (S, Si)
Platyarthrus schoebli Budde Lund, 1885 (N, S, Si, Sa)
Platyarthrus sorrentinus Verhoeff, 1931 (S) (E)

Trichorhina Budde Lund, 1908

Trichorhina buchnerorum (Verhoeff, 1942) (S)
Trichorhina paolae Caruso, 1978 (Si) (E)
Trichorhina sricula Vandel, 1969 (Si) (E)

Tendosphaeridae

Tendosphaera Verhoeff, 1930

Tendosphaera biellensis Verhoeff, 1936 (N) (E)
Tendosphaera brembana Verhoeff, 1931 (N) (E)
Tendosphaera verrucosa Verhoeff, 1930 (N, S)

Trachelipodidae

Orthometopon Verhoeff, 1917

Orthometopon dalmatinum (Verhoeff, 1901) (N, S)

Orthometopon planum (Budde Lund, 1885) (N, S)

Protracheoniscus Verhoeff, 1917

Protracheoniscus babori Frankenberger, 1938 (S, Si)

Protracheoniscus politus (C.L. Koch, 1841) (N)

Protracheoniscus venetus Verhoeff, 1927 (N) (E)

Trachelipus Budde Lund, 1908

Trachelipus arcuatus (Budde Lund, 1885) (N, S, Si)

Trachelipus camerani (Tua, 1900) (S)

Trachelipus pierantonii Arcangeli, 1932 (N) (E)

Trachelipus planarius (Budde Lund, 1885) (Si) (E)

Trachelipus rathkii (Brandt, 1833) (N)

Trachelipus ratzeburgii (Brandt, 1833) (N)

Trachelipus razzautii (Arcangeli, 1913) (N)

Trachelipus schwangarti Verhoeff, 1928 (N) (E)

Trachelipus simrothi Verhoeff, 1936 (N) (E)

Porcellium Dahl, 1916

Porcellium fiumanum (Verhoeff, 1901) (N)

Tritracheoniscus Taiti & Manicastri, 1985

Tritracheoniscus cerrutii (Vandel, 1958) (Sa) (E)

Porcellionidae

Acaeroplastes Verhoeff, 1918

Acaeroplastes delattini Verhoeff, 1951 (S) (E)

Acaeroplastes ischianus Verhoeff, 1941 (S) (E)

Acaeroplastes melanurus (Budde Lund, 1885) (N, S, Si, Sa)

Agabiformius Verhoeff, 1908

Agabiformius lentus (Budde Lund, 1885) (N, S, Si, Sa)

Agabiformius obtusus (Budde Lund, 1908) (S, Si)

Caeroplastes Verhoeff, 1918

Caeroplastes buchneri (Verhoeff, 1933) (S) (E)

Caeroplastes porphyrivagus Verhoeff, 1918 (Sa)
Caeroplastes sorrentinus Verhoeff, 1918 (S) (E)

Leptotrichus Budde Lund, 1885

Leptotrichus dohrni Verhoeff, 1952 (S) (E)
Leptotrichus ischianus Verhoeff, 1941 (S) (E)
Leptotrichus naupliensis (Verhoeff, 1901) (S, Si)
Leptotrichus panzerii (Audouin, 1826) (N, S, Si, Sa)

Lucasius Kinahan, 1859

Lucasius pallidus (Budde Lund, 1885) (Sa)

Porcellionides Miers, 1877

Porcellionides apulicus (Arcangeli, 1932) (S) (E)
Porcellionides aternanus (Verhoeff, 1931) (S) (E)
Porcellionides myrmecophilus (Stein, 1859) (S, Si, Sa)
Porcellionides olivarum (Verhoeff, 1928) (N) (E)
Porcellionides pruinosis (Brandt, 1833) (N, S, Si, Sa)
Porcellionides sexfasciatus (Budde Lund, 1885) (N, S, Si, Sa)

Mica Budde Lund, 1908

Mica tardus (Budde Lund, 1885) (Si)

Porcellio Latreille, 1804

Porcellio albicornis (Dollfus, 1896) (Si)
Porcellio andreinii Arcangeli, 1913 (S) (E)
Porcellio baidensis Viglianisi, Lombardo & Caruso, 1992 (Si) (E)
Porcellio buddelundi Simon, 1885 (Si)
Porcellio dilatatus Brandt, 1833 (N, S, Si, Sa)
Porcellio festai Arcangeli, 1932 (N) (E)
Porcellio glaberrimus Verhoeff, 1951 (S) (E)
Porcellio hyblaeus Viglianisi, Lombardo & Caruso, 1992 (Si) (E)
Porcellio imbutus Budde Lund, 1885 (Si) (E)
Porcellio laevis Latreille, 1804 (N, S, Si, Sa)
Porcellio marginalis Budde Lund, 1885 (N)
Porcellio montanus Budde Lund, 1885 (N)
Porcellio obsoletus Budde Lund, 1885 (N, S, Si)
Porcellio parvus Budde Lund, 1885 (Si)
Porcellio peninsulae Verhoeff, 1944 (S) (E)
Porcellio pumicatus Budde Lund, 1885 (N, S, Sa) (E)
Porcellio quercuum Verhoeff, 1952 (S) (E)
Porcellio scaber Latreille, 1804 (N, S)
Porcellio siculooccidentalis Viglianisi, Lombardo & Caruso, 1992 (Si) (E)

Porcellio spatulatus Costa, 1882 (Sa)
Porcellio spinicornis Say, 1818 (N)
Porcellio spinipennis Budde Lund, 1885 (S)
Porcellio tortonesei Arcangeli, 1931 (N) (E)

Proporcellio Verhoeff, 1907

Proporcellio antiochius Arcangeli, 1950 (Sa) (E)
Proporcellio grandorii (Arcangeli, 1932) (N) (E)
Proporcellio lamellatus (Uljanin, 1875) (S, Si, Sa)
Proporcellio quadriseriatus Verhoeff, 1917 (S, Si)

Cylisticidae

Cylisticus Schnitzler, 1853

Cylisticus annulicornis Verhoeff, 1907 (N) (E)
Cylisticus anophthalmus Silvestri, 1897 (S) (E)
Cylisticus aprutianus Taiti & Manicasteri, 1980 (S) (E)
Cylisticus bergomatius Verhoeff, 1928 (N, S) (E)
Cylisticus biellensis Verhoeff, 1930 (N) (E)
Cylisticus caprariae Ferrara & Taiti, 1978 (S) (E)
Cylisticus convexus (De Geer, 1778) (N, S)
Cylisticus estest Verhoeff, 1931 (S) (E)
Cylisticus gracilipennis Budde Lund, 1885 (N, S) (E)
Cylisticus igiliensis Ferrara & Taiti, 1980 (S) (E)
Cylisticus inferus Verhoeff, 1917 (S) (E)
Cylisticus ligurinus Verhoeff, 1936 (N) (E)
Cylisticus littoralis Ferrara & Taiti, 1978 (S) (E)
Cylisticus lobatus Ferrata & Taiti, 1985 (N) (E)
Cylisticus nasutus Verhoeff, 1931 (S) (E)
Cylisticus ormeanus Verhoeff, 1930 (N) (E)
Cylisticus pallidus Verhoeff, 1928 (N) (E)
Cylisticus pierantonii Arcangeli, 1923 (Sa) (E)
Cylisticus pontremolensis Verhoeff, 1936 (S) (E)
Cylisticus suberorum Verhoeff, 1931 (S) (E)
Cylisticus urgonis Taiti & Ferrara, 1980 (S) (E)

Lepinisticus Manicasteri & Taiti, 1983

Lepinisticus vignai Manicasteri & Taiti, 1983 (S) (E)

Armadillidiidae

Alloschizidium Verhoeff, 1919

Alloschizidium cottarellii (Argano & Pesce, 1974) (Sa) (E)
Alloschizidium igiliense (Ferrara & Taiti, 1978) (S) (E)
Alloschizidium buchnerorum (Verhoeff, 1941) (S) (E)
Alloschizidium eeae (Argano & Utzeri, 1973) (S) (E)
Alloschizidium sardoum (Arcangeli, 1933) (Sa) (E)

Paraschizidium Verhoeff, 1919

Paraschizidium coeculum Silvestri, 1897 (N, S)
Paraschizidium olearum Verhoeff, 1919 sensu Vandel, 1962 (S)

Typhlarmadillidium Verhoeff, 1900

Typhlarmadillidium ruffoi Ferrara & Taiti, 1995 (N) (E)

Armadillidium Brandt, 1833

Armadillidium alassiense Verhoeff, 1910 (N)
Armadillidium albifrons L. Koch, 1901 (N) (E)
Armadillidium albigauni Arcangeli, 1935 (N) (E)
Armadillidium album Dollfus, 1887 (N, S, Si, Sa)
Armadillidium anconanum Verhoeff, 1928 (N, S)
Armadillidium apenninorum Verhoeff, 1928 (N, S)
Armadillidium arcangelii Strouhal, 1929 (N, S)
Armadillidium argentarium Verhoeff, 1931 (S) (E)
Armadillidium assimile Budde Lund, 1885 (N, S, Sa)
Armadillidium badium Budde Lund, 1885 (S, Si, Sa)
Armadillidium baldense Verhoeff, 1902 (N) (E)
Armadillidium brambillae Balsamo Crivelli, 1859 (N) (E)
Armadillidium brentanum Verhoeff, 1931 (N) (E)
Armadillidium canaliferum Verhoeff, 1908 (S) (E)
Armadillidium carniolense Verhoeff, 1901 (N)
Armadillidium cavannai Arcangeli, 1960 (S) (E)
Armadillidium clavigerum Verhoeff, 1928 (S) (E)
Armadillidium decorum Brandt, 1833 (S, Si)
Armadillidium depressum Brandt, 1833 (N, S, Sa)
Armadillidium dollfusi Verhoeff, 1902 (N, S) (E)
Armadillidium etrusciae Ferrara & Taiti, 1978 (S) (E)
Armadillidium ficalbii Arcangeli, 1911 (S) (E)
Armadillidium furcatum Budde Lund, 1885 (S) (E)
Armadillidium germanicum Verhoeff, 1901 (N) (E)
Armadillidium gestroi Tua, 1900 (N) (E)
Armadillidium granulatum Budde Lund, 1885 (N, S, Si, Sa)
Armadillidium gridellii Arcangeli, 1950 (N) (E)
Armadillidium hirtum Budde Lund, 1885 (Si) (E)
Armadillidium kossuthi Arcangeli, 1929 (S) (E)
Armadillidium lagrecai Vandel, 1969 (Si) (E)
Armadillidium maccagnoii Arcangeli, 1960 (S) (E)

Armadillidium maculatum Risso, 1816 (N)
Armadillidium marinense Verhoeff, 1902 (S) (E)
Armadillidium marinenzium Verhoeff, 1928 (S) (E)
Armadillidium marmorivagum Verhoeff, 1934 (N) (E)
Armadillidium nasatum Budde Lund, 1885 (N, S, Si, Sa)
Armadillidium nigrum Arcangeli, 1956 (S) (E)
Armadillidium oglasae Ferrara & Taiti, 1978 (S) (E)
Armadillidium opacum C.L. Koch, 1844 (N)
Armadillidium ormeanum Verhoeff, 1931 (N) (E)
Armadillidium paeninsulae Ferrara & Taiti, 1978 (S) (E)
Armadillidium pallasii Brandt, 1833 (N, S)
Armadillidium panningi Strouhal, 1937 (S) (E)
Armadillidium peraccae Tua, 1900 (S) (E)
Armadillidium portofinense Verhoeff, 1908 (N) (E)
Armadillidium pseudoassimile Taiti & Ferrara, 1980 (S) (E)
Armadillidium riparium L. Koch, 1901 (N) (E)
Armadillidium rosai Arcangeli, 1913 (N) (E)
Armadillidium ruffoi Arcangeli, 1940 (N) (E)
Armadillidium savonense Verhoeff, 1931 (N) (E)
Armadillidium siculorum Verhoeff, 1908 (Si) (E)
Armadillidium silvestrii Verhoeff, 1931 (S) (E)
Armadillidium sordidum Dollfus, 1887 (N, S, Sa)
Armadillidium teramense Verhoeff, 1933 (S) (E)
Armadillidium testudinatum C.L. Koch, 1844 (N) (E)
Armadillidium tirolense Verhoeff, 1931 (N) (E)
Armadillidium tyrrhenum Taiti & Ferrara, 1980 (S) (E)
Armadillidium vallombrosae Verhoeff, 1907 (S) (E)
Armadillidium vulgare (Latreille, 1804) (N, S, Si, Sa)
Armadillidium zangherii Arcangeli, 1924 (N) (E)

Armadillidae

Armadillo Duméril, 1816

Armadillo officinalis Duméril, 1816 (N, S, Si, Sa)

Idoteidae

Idotea Fabricius, 1798

Idotea baltica (Pallas, 1772) (3, 4, 5)
Idotea chelipes (Pallas, 1766) (3)
Idotea granulosa Rathke, 1843 (3)
Idotea hectica (Pallas, 1772) (3, 4)
Idotea linearis Linné, 1767 (3)
Idotea metallica Bosc, 1802 (3, 4, 5)

Zenobiana Stebbing, 1895

Zenobiana prismatica (Risso, 1826) (3, 4, 5)

Synisoma Collinge, 1917

Synisoma acuminatum (Leach, 1815) (4, 5)

Synisoma appendiculatum (Risso, 1816) (3, 5)

Synisoma capito (Rathke, 1837) (3, 4, 5)

Synisoma lancifer (Miers, 1881) (3, 4)

Arcturidae

Astacilla Cordiner, 1793

Astacilla deshaysi (Lucas, 1849) (3, 4)

Astacilla mediterranea Koeler, 1911 (3)

Arcturella G.O. Sars, 1899

Arcturella dilatata (G.O. Sars, 1883) (3, 5)

Bopyridae

Bopyrella Bonnier, 1900

Bopyrella nitescens (Giard & Bonnier, 1890) (4)

Bopyrella palaemonis (Risso, 1816) (3)

Bopyrina Kossman, 1881

Bopyrina ocellata (Czerniavsky, 1868) (3, 4)

Bopyrus Latreille, 1802

Bopyrus squillarum Latreille, 1802 (3, 4)

Ergyne Risso, 1816

Ergyne cervicornis Risso, 1816 (3)

Gyge Cornalia & Panceri, 1858

Gyge branchialis Cornalia & Panceri, 1858 (3, 4, 5)

Ione Latreille, 1818

Ione thoracica (Muntagu, 1808) (3)

Ione vicina Bonnier, 1900 (3)

Pleurocrypta Hesse, 1865

Pleurocrypta galathea Hesse, 1865 (3?)

Pleurocrypta longibranchiata (Bate & Westwood, 1868) (3?)

Pleurocrypta strigosa Bourdon, 1968 (3)

Progebiophilus R. Codreanu & M. Codreanu, 1963

Progebiophilus euxinicus (Popov, 1929) (3, 4)

Pseudione Kossmann, 1881

Pseudione crenulata G.O. Sars, 1899 (3)

Pseudione hyndmanni (Bate & Westwood, 1868) (3?)

Urocryptella R. Codreanu & M. Codreanu, 1963

Urocryptella fraissei (Carayon, 1943) (3?)

Hemiarthrus Giard & Bonnier, 1887

Hemiarthrus enchophyllus (Caroli, 1930) (3)

Hemiarthrus laevimanus (Caroli, 1930) (3)

Hemiarthrus lysmata (Caroli, 1930) (3)

Hemiarthrus philonika Giard & Bonnier, 1890 (3)

Hemiarthrus typtonis Giard & Bonnier, 1890 (3)

Athelges Gerstaecker, 1862

Athelges cladophorus Gerstaecker, 1862 (3)

Athelges pelagosae Babic, 1912 (4)

Athelges prideauxii Giard & Bonnier, 1890 (3)

Parathelges Bonnier, 1900

Parathelges racovitzai Codreanu, 1940 (3)

Dajidae

Prodajus Bonnier, 1903

Prodajus lobiancoi Bonnier, 1903 (3)

Branchyophryxus Caullery, 1897

Branchyophryxus nyctiphanae Caullery, 1897 (3)

Heterophryxus G.O. Sars, 1885

Heterophryxus appendiculatus G.O. Sars, 1885 (3)

Entoniscidae

Grapsion Giard & Bonnier, 1887

Grapsion cavolinii (Giard, 1887) (3)

Portunion Giard & Bonnier, 1887

Portunion maenadis (Giard, 1886) (3)

Portunion salvatoris (Kossmann, 1881) (3)

Cryptoniscidae

Liriopsis Schultze, 1859

Liriopsis monophtalma Fraise, 1878 (3)

Liriopsis pygmaea Rathke, 1843 (3?)

Danalia Giard, 1887

Danalia curvata Fraise, 1877 (3)

Danalia dohrni Giard, 1887 (3)

Danalia gregaria Caullery, 1908 (3)

Danalia lobiancoi Giard & Bonnier, 1890 (3)

Danalia ypsilon Smith, 1906 (3)

Podascon Giard & Bonnier, 1889

Podascon dellavallei Giard & Bonnier, 1890 (3)

Paracabirops Caroli, 1953

Paracabirops marsupialis Caroli, 1953 (3)

Gnathiidae

Gnathia Leach, 1814

Gnathia illepida Monod, 1925 (3, 4, 5)
Gnathia inopinata Monod, 1925 (3)
Gnathia maxillaris (Montagu, 1804) (3, 5)
Gnathia oxyuraea (Lilljeborg, 1855) (3, 4, 5)
Gnathia phallonajopsis Monod, 1925 (3, 4)
Gnathia venusta Monod, 1925 (4)
Gnathia vorax (Lucas, 1849) (3, 4, 5)

Paragnathia J. Omer-Cooper & W. Omer-Cooper, 1916

Paragnathia formica (Hesse, 1864) (3)

Anthuridae

Anthelura Norman & Stebbing, 1886

Anthelura fresii Wägele, 1980 (3)
Anthelura ovalis (Barnard, 1925) (5)

Anthura Leach, 1814

Anthura gracilis (Montagu, 1808) (3, 4, 5)

Apanthura Stebbing, 1900

Apanthura corsica Amar, 1953 (3, 5)
Apanthura tyrrhenica Wägele, 1980 (3)

Apanthuroides Menzies & Glynn, 1968

Apanthuroides spathulicauda (Wägele, 1981) (3)

Eisothistos Haswell, 1884

Eisothistos macrurus Wägele, 1979 (3)
Eisothistos pumilus Wägele, 1979 (3)

Cyathura Norman & Stebbing, 1886

Cyathura carinata (Krøyer, 1847) (4, 5)

Haliophasma Haswell, 1880

Haliophasma alaticauda Amar, 1966 (3?)
Haliophasma caprii Wägele, 1981 (3)

Malacanthura Barnard, 1925

Malacanthura fresii (Wägele, 1980) (3)

Stellanthura Wägele, 1979

Stellanthura cryptobia Wägele, 1979 (3, 5)

Hyssuridae

Hyssura Norman & Stebbing, 1886

Hyssura ligurica Wägele, 1981 (3)

Hyssura profunda Barnard, 1925 (3?)

Kupellonura Barnard, 1925

Kupellonura mediterranea Barnard, 1925 (3, 5)

Kupellonura serritelson Wägele, 1981 (3)

Neohyssura Amar, 1952

Neohyssura spinicauda (Walker, 1901) (3)

Paranthuridae

Leptanthura G.O. Sars, 1897

Leptanthura apalpata Wägele, 1981 (3)

Leptanthura sculpta Pasternak, 1982 (3)

Paranthura Bate & Westwood, 1866

Paranthura costana Bate & Westwood, 1868 (3)

Paranthura nigropunctata (Lucas, 1849) (3, 4, 5)

Aegidae

Syscenus Harger, 1880

Syscenus infelix Harger, 1880 (3)

Aega (Aega) Leach, 1815

Aega (Aega) deshaysiana (Milne-Edwards, 1840) (3, 4, 5)
Aega (Aega) hirsuta Schiödte & Meinert, 1879 (3)
Aega (Aega) rosacea (Risso, 1816) (3, 5)

Aega (Rhamphion) Brusca, 1983

Aega (Rhamphion) incisa Schiödte & Meinert, 1879 (3, 5)
Aega (Rhamphion) ophtalmica (Milne Edwards, 1840) (3, 4)
Aega (Rhamphion) stroemii Lütken, 1859 (3, 4)

Rocinela Leach, 1818

Rocinela dumerilii (Lucas, 1849) (3, 4)

Cirolanidae

Cirolana Leach, 1818

Cirolana borealis Lilljeborg, 1852 (3, 4, 5)
Cirolana cranchii Leach, 1818 (3, 5)
Cirolana neglecta Hansen, 1890 (3, 4, 5)

Eurydice Leach, 1815

Eurydice affinis Hansen, 1905 (3, 4, 5)
Eurydice dollfusi Monod, 1930 (3, 5)
Eurydice grimaldi Dollfus, 1888 (3)
Eurydice inermis Hansen, 1890 (3, 5)
Eurydice pontica (Czerniavsky, 1868) (3?)
Eurydice spinigera Hansen, 1890 (3, 4, 5)
Eurydice truncata Norman, 1868 (3, 5)

Conilera Leach, 1818

Conilera cylindracea (Montagu, 1803) (3, 4)

Sphaeromides Dollfus, 1897

Sphaeromides virei Brian, 1923 (N)

Typhlocirolana Racovitza, 1905

Typhlocirolana cf. moraguesi Racovitza, 1905 (Si) (E)

Cymothoidae

Anilocra Leach, 1818

Anilocra frontalis (Milne Edwards, 1840) (3, 4, 5)

Anilocra physodes (Linné, 1758) (3, 4, 5)

Ceratothoa Dana, 1852

Ceratothoa capri (Trilles, 1964) (3?, 4?, 5?)

Ceratothoa collaris Schiödte & Meinert, 1883 (3?, 4?, 5?)

Ceratothoa italica (Schiödte & Meinert, 1883) (3, 4, 5)

Ceratothoa oestroides (Risso, 1826) (3, 4, 5)

Ceratothoa oxyrrhynchaena Koelbel, 1878 (3, 4, 5)

Ceratothoa parallela (Otto, 1928) (3, 4, 5)

Ceratothoa steindachneri Koelbel, 1878 (3, 4, 5)

Emetha Schiödte & Meinert, 1878

Emetha audouini (Milne Edwards, 1840) (3, 4, 5)

Livoneca Leach, 1818

Livoneca pomatomi Gaillat Airoldi, 1942 (3)

Livoneca sinuata Koelbel, 1878 (3, 4, 5)

Mothocya Costa, 1851

Mothocya epimerica Costa, 1851 (3, 4)

Nerocila Leach, 1818

Nerocila bivittata (Risso, 1816) (3, 4, 5)

Nerocila maculata Milne Edwards, 1840 (3, 4, 5)

Nerocila orbignyi (Guérin-Méneville, 1829) (3, 4, 5)

Nerocila rhabdota Koelbel, 1878 (4)

Irona Schiödte & Meinert, 1884

Irona nana Schiödte & Meinert, 1884 (4?)

Idusa Schiödte & Meinert, 1881

Idusa dieuzeidei Dollfus, 1950 (4?)

Limnoriidae

Limnoria Leach, 1814

Limnoria lignorum (Rathke, 1799) (3, 4, 5)

Sphaeromatidae

Sphaeroma Bosc, 1802

Sphaeroma serratum Fabricius, 1787 (3, 4, 5)

Lekanesphaera Verhoeff, 1943

Lekanesphaera ephippium (Costa, 1882) (3, 5)

Lekanesphaera hookeri (Leach, 1814) (3, 4, 5)

Lekanesphaera levii (Argano & Ponticelli, 1981) (3)

Lekanesphaera marginata (Milne-Edwards, 1840) (3, 4)

Lekanesphaera monodi (Arcangeli, 1934) (3, 4, 5)

Lekanesphaera weilli (Elkaim, 1966) (3)

Dynamene Leach, 1814

Dynamene bicolor (Rathke, 1837) (3, 4)

Dynamene bidentata (Adams, 1800) (3)

Dynamene bifida Torelli, 1930 (3)

Dynamene edwardsi (Lucas, 1849) (3)

Dynamene toriellae Holdich, 1968 (3, 4)

Dynamene tubicauda Holdich, 1968 (3, 5)

Cymodoce Leach, 1814

Cymodoce hansenii Dumay, 1972 (3)

Cymodoce pilosa Milne-Edwards, 1840 (3, 4)

Cymodoce rubropunctata (Grube, 1864) (3, 4)

Cymodoce spinosa (Risso, 1816) (3, 4, 5)

Cymodoce tattersalli Torelli, 1928 (3, 4)

Cymodoce truncata Leach, 1814 (3, 4, 5)

Cymodoce tuberculata A. Costa, 1851 (3)

Campecopea Leach, 1814

Campecopea hirsuta (Montagu, 1804) (3)

Paracerceis Hansen, 1905

Paracerceis sculpta (Holmes, 1904) (3, 4, 5)

Paradella Harrison & Holdich, 1982

Paradella diana (Menzies, 1962) (3)

Ischyromene Racovitza, 1908

Ischyromene lacazei Racovitza, 1908 (3)

***Monolistra* (*Monolistra*)** Gerstaecker, 1856

Monolistra (*Monolistra*) *caeca* Gerstaecker, 1856 (N) (E)

***Monolistra* (*Microlistra*)** Racovitza, 1929

Monolistra (*Microlistra*) *schottlaenderi* Stammer, 1930 (N) (E)

***Monolistra* (*Typhlosphaeroma*)** Racovitza, 1910

Monolistra (*Typhlosphaeroma*) *bericum* (Fabiani, 1901) (N) (E)

Monolistra (*Typhlosphaeroma*) *boldorii* Brian, 1931 (N) (E)

Monolistra (*Typhlosphaeroma*) *lavalensis* Stoch, 1984 (N) (E)

Monolistra (*Typhlosphaeroma*) *pavani* Arcangeli, 1941 (N) (E)

Monolistra (*Typhlosphaeroma*) *racovitzai* Strouhal, 1928 (N) (E)

Amphipoda

Ampeliscidae

Ampelisca Krøyer, 1842

Ampelisca brevicornis (A. Costa, 1853) (3, 4)

Ampelisca dalmatina G. Karaman, 1975 (3)

Ampelisca diadema (A. Costa, 1853) (3, 4, 5)

Ampelisca gibba G.O. Sars, 1882 (3)

Ampelisca intermedia Bellan-Santini & Diviacco, 1990 (4) (E)

Ampelisca ledoyeri Bellan-Santini & Kaim Malka, 1977 (3)

Ampelisca multispinosa Bellan-Santini & Kaim Malka, 1977 (3, 5)

Ampelisca pseudospinimana Bellan-Santini & Kaim Malka, 1977 (4)

Ampelisca rubella A. Costa, 1864 (3, 4)

Ampelisca ruffoi Bellan-Santini & Kaim Malka, 1977 (3, 5)

Ampelisca sarsi Chevreux, 1888 (4)

Ampelisca serraticaudata Chevreux, 1888 (4, 5)

Ampelisca spinifer Reid, 1951 (3)

Ampelisca spinipes Boeck, 1861 (3, 5)

Ampelisca tenuicornis Liljeborg, 1855 (3)

Ampelisca truncata Bellan-Santini & Kaim Malka, 1977 (3, 5)

Ampelisca typica (Bate, 1856) (3, 4)

Ampelisca unidentata Schellenberg, 1936 (5)

Ampelisca vervecei Bellan-Santini & Kaim Malka, 1977 (3)

Byblis Boeck, 1871

Byblis guernei Chevreux, 1900 (3, 4)

Haploops Liljeborg, 1855

Haploops dellavallei Chevreux, 1900 (3)

Haploops nirae Kaim Malka, 1976 (3)

Haploops proxima Chevreux, 1919 (3, 5)

Amphilochidae

Amphilochoides G.O. Sars, 1892

Amphilochoides boeckii G.O. Sars, 1892 (3)

Amphilochoides serratipes Norman, 1869 (3)

Amphilochus Bate, 1862

Amphilochus brunneus Della Valle, 1893 (3)

Amphilochus manudens Bate, 1862 (3)

Amphilochus neapolitanus Della Valle, 1893 (3, 4, 5)

Amphilochus picadurus J.L. Barnard, 1962 (3, 5)

Amphilochus spencebatei (Stebbing, 1876) (3, 5)

Gitana Boeck, 1871

Gitana sarsi Boeck, 1871 (3, 5)

Peltocoxa Catta, 1875

Peltocoxa gibbosa (Schiecke, 1977) (3)

Peltocoxa marioni Catta, 1875 (3, 4, 5)

Peltocoxa mediterranea Schiecke, 1977 (3, 5)

Ampithoidae

Ampithoe Leach, 1814

Ampithoe ferox (Chevreux, 1902) (3, 5)

Ampithoe helleri G. Karaman, 1975 (3, 4, 5)

Ampithoe ramondi Audouin, 1826 (3, 4, 5)

Ampithoe riedli Schickel, 1968 (3, 4, 5)

Ampithoe spuria Krapp-Schickel, 1978 (4)

Cymadusa Savigny, 1816

Cymadusa crassicornis (A. Costa, 1857) (3, 4, 5)

Cymadusa filosa Savigny, 1816 (3)

Sunamphithoe Bate, 1857

Sunamphithoe pelagica (Milne Edwards, 1830) (3, 4, 5)

Aoridae

Aora Krøyer, 1845

Aora gracilis (Bate, 1857) (3)

Aora spinicornis Afonso, 1976 (3, 4, 5)

Autonoe Bruzelius, 1859

Autonoe angularis (Ledoyer, 1970) (3)

Autonoe karamani (Myers, 1976) (3)

Autonoe rubromaculatus (Ledoyer, 1973) (3, 5)

Autonoe spiniventris (Della Valle, 1893) (3)

Autonoe viduarum (Myers, 1974) (3) (E)

Lembos Bate, 1856

Lembos websteri Bate, 1857 (3, 4, 5)

Leptocheirus Zaddach, 1844

Leptocheirus bispinosus Norman, 1908 (3, 4, 5)

Leptocheirus guttatus (Grube, 1864) (3, 4, 5)

Leptocheirus hirsutimanus (Bate, 1862)

Leptocheirus longimanus Ledoyer, 1973 (3)

Leptocheirus mariae G. Karaman, 1973 (3)

Leptocheirus pectinatus (Norman, 1869) (3, 4, 5)

Leptocheirus pilosus Zaddach, 1844 (4, 5)

Microdeutopus A. Costa, 1853

Microdeutopus algicola Della Valle, 1893 (3, 4, 5)

Microdeutopus anomalus (Rathke, 1843) (3, 4)

Microdeutopus armatus Chevreux, 1887 (3)

Microdeutopus bifidus Myers, 1977 (5)

Microdeutopus chelifer (Bate, 1862) (3, 4)

Microdeutopus gryllotalpa A. Costa, 1853 (3, 4, 5)

Microdeutopus obtusatus Myers, 1973 (3, 5)

Microdeutopus similis Myers, 1977 (5)
Microdeutopus stationis Della Valle, 1893 (3, 4)
Microdeutopus versiculatus (Bate, 1856) (3, 4, 5)

Tethylembos Myers, 1988

Tethylembos viguieri (Chevreux, 1911) (3, 4, 5)

Argissidae

Argissa Boeck, 1871

Argissa stebbingi Bonnier, 1896 (3)

Biancolinidae

Biancolina Della Valle, 1893

Biancolina algalicola Della Valle, 1893 (3, 4, 5)

Bogidiellidae

Aurobogidiella G. Karaman, 1988

Aurobogidiella italica (G. Karaman, 1979) (3) (E)

Bogidiella Hertzog, 1933

Bogidiella albertimagni Hertzog, 1933 (N)
Bogidiella aprutina Pesce, 1980 (S) (E)
Bogidiella calicali G. Karaman, 1988 (Sa) (E)
Bogidiella chappuisi Ruffo, 1952
 Bogidiella chappuisi chappuisi Ruffo, 1952 (3, 5)
 Bogidiella chappuisi pescei G. Karaman, 1989 (Sa) (E)
Bogidiella ichnusae Ruffo & Vigna Taglianti, 1975 (Sa) (E)
Bogidiella paraichnusae G. Karaman, 1979 (3) (E)
Bogidiella silverii Pesce, 1981 (Sa) (E)
Bogidiella vandeli Coineau, 1968 (Sa) (E)

Marinobogidiella G. Karaman, 1981

Marinobogidiella tyrrhenica (Schiecke, 1979) (3) (E)

Carangoliopsidae

Carangoliopsis Ledoyer, 1970

Carangoliopsis spinulosa Ledoyer, 1970 (3)

Cheluridae

Chelura Philippi, 1839

Chelura terebrans Philippi, 1839 (3, 4)

Colomastigidae

Colomastix Grube, 1861

Colomastix pusilla Grube, 1861 (3, 4, 5)

Corophiidae

Corophium Latreille, 1806

Corophium acherusicum A. Costa, 1851 (3, 4)

Corophium acutum Chevreux, 1908 (3, 4, 5)

Corophium insidiosum Crawford, 1937 (3, 4, 5)

Corophium minimum Schiecke, 1979 (3) (E)

Corophium orientale Schellenberg, 1928 (3, 5)

Corophium rotundirostre Stephensen, 1915 (3) (E)

Corophium runcicorne Della Valle, 1893 (3, 4, 5)

Corophium sextonae Crawford, 1937 (3, 4)

Siphonoecetes Krøyer, 1845

Siphonoecetes dellavallei Stebbing, 1899 (3, 4, 5)

Siphonoecetes neapolitanus Schiecke, 1979 (3)

Siphonoecetes sabatieri de Rouville, 1894 (3) (*)

Note

Siphonoecetes sabatieri: Presenza sulle coste tirreniche da confermare.

Crangonyctidae

Synurella Wrzesniowski, 1877

Synurella ambulans (F. Müller, 1846) (N, S)

Cressidae

Cressa Boeck, 1871

Cressa cristata Myers, 1969 (3, 4, 5)

Cressa mediterranea Ruffo, 1979 (3, 5)

Dexaminidae

Atylus Leach, 1815

Atylus guttatus (A. Costa, 1851) (3, 4)

Atylus massiliensis Bellan-Santini, 1975 (3)

Atylus swammerdami (Milne Edwards, 1830) (3)

Atylus vedlomensis (Bate & Westwood, 1862) (3, 4)

Dexamine Leach, 1814

Dexamine spiniventris (A. Costa, 1853) (3, 4, 5)

Dexamine spinosa (Montagu, 1813) (3, 4, 5)

Dexamine thea Boeck, 1861 (3, 4)

Guernea Chevreux, 1887

Guernea coalita (Norman, 1868) (3)

Tritaeta Boeck, 1876

Tritaeta gibbosa (Bate, 1862) (3, 4)

Epimeriidae

Epimeria A. Costa, 1851

Epimeria cornigera (Fabricius, 1779) (3)

Eusiridae

Amphithopsis Boeck, 1861

Amphithopsis depressa Schiecke, 1976 (3) (E)

Apherusa Walker, 1891

- Apherusa alacris* Krapp-Schickel, 1969 (3, 4)
- Apherusa bispinosa* (Bate, 1857) (4)
- Apherusa chiereghinii* Giordani Soika, 1950 (3, 4, 5)
- Apherusa mediterranea* Chevreux, 1911
- Apherusa ruffoi* Krapp-Schickel, 1969 (4) (E)
- Apherusa vexatrix* Krapp-Schickel, 1979 (3, 4, 5)

Dautzenbergia Chevreux, 1900

- Dautzenbergia megacheir* (Walker, 1897) (3)

Eusiroides Stebbing, 1888

- Eusiroides dellavallei* Chevreux, 1899 (3, 4)

Eusirus Krøyer, 1845

- Eusirus longipes* Boeck, 1861 (3)

Leptamphopus G.O. Sars, 1893

- Leptamphopus massiliensis* Ledoyer, 1977 (3)

Rhachotropis Smith, 1883

- Rhachotropis integricauda* Carausu, 1948 (3)
- Rhachotropis rostrata* Bonnier, 1896 (3, 4)

Gammarellidae

Gammarellus Herbst, 1793

- Gammarellus angulosus* (Rathke, 1843) (3, 4)

Gammaridae

Echinogammarus Stebbing, 1899

- Echinogammarus adipatus* G. Karaman & Tibaldi, 1973 (Si, Sa) (E)
- Echinogammarus dahli* (Stock, 1968) (3)
- Echinogammarus foxi* (Schellenberg, 1968) (3, 4, 5)
- Echinogammarus olivii* (Milne Edwards, 1830) (3, 4)
- Echinogammarus pinksteri* Van Maren, 1973 (S) (E)

Echinogammarus pungens (Milne Edwards, 1840) (3, 4, 5)
Echinogammarus ruffoi Pinkster & Stock, 1970 (N, S) (E)
Echinogammarus sardus Pinkster, 1993 (Sa) (E)
Echinogammarus sicilianus G. Karaman & Tibaldi, 1973 (S, Si, Sa) (E)
Echinogammarus stammeri (S. Karaman, 1931)
 Echinogammarus stammeri stammeri (S. Karaman, 1931) (N, S)
 Echinogammarus stammeri visualis G. Karaman, 1974 (S) (E)
Echinogammarus stocki G. Karaman, 1970 (3, 4)
Echinogammarus tabu G. Karaman, 1972
 Echinogammarus tabu mutus G. Karaman & Tibaldi, 1973 (S) (E)
Echinogammarus tibaldii Pinkster & Stock, 1970 (S, Si, Sa) (E)
Echinogammarus veneris (Heller, 1865) (3, 4, 5)

Gammarus Fabricius, 1775

Gammarus aequicauda (Martynov, 1931) (3, 4, 5)
Gammarus balcanicus Schäferna, 1922 (N, S) (*)
Gammarus crinicornis Stock, 1966 (3, 4)
Gammarus fossarum C.L. Koch, 1836 (N)
Gammarus insensibilis Stock, 1966 (3, 4, 5)
Gammarus italicus Goedmakers & Pinkster, 1977 (S, Sa) (E)
Gammarus lacustris G.O. Sars, 1863 (N, S)
Gammarus pulex (Linnaeus, 1758) (*)
 Gammarus pulex pulex (Linnaeus, 1758) (N)
Gammarus roeselii Gervais, 1835 (N) (*)
Gammarus subtypicus Stock, 1966 (3)

Ilvanella Vigna Taglianti, 1972

Ilvanella inexpectata Vigna Taglianti, 1972 (S) (E) (*)

Neogammarus Ruffo, 1937

Neogammarus adriaticus G. Karaman, 1973 (4)
Neogammarus festai Ruffo, 1937 (3) (E)
Neogammarus nudus Stock, 1971 (3)

Rhipidogammarus Stock, 1971

Rhipidogammarus karamani Stock, 1971 (3, 4)
Rhipidogammarus rhipidiophorus (Catta, 1878) (3, 5)

Tyrrhenogammarus G. Karaman & Ruffo, 1989

Tyrrhenogammarus catacumbae (G. Karaman & Ruffo, 1977) (Si) (E)
Tyrrhenogammarus sardous G. Karaman & Ruffo, 1989 (Sa) (E)

Note

Gammarus balcanicus: Presenza in S solo nelle Marche.

Gammarus pulex: Presenza soltanto nella Liguria occidentale.

Gammarus roeselii: Specie europeo-orientale e medioeuropea, introdotta casualmente e nota soltanto per i dintorni di Padova.

Ilvanella inexpectata: Solo nell'Isola d'Elba e in Toscana presso Firenze.

Hadziidae

Hadzia S. Karaman, 1932

Hadzia adriatica (Pesce, 1979) (S) (E)

Hadzia fragilis S. Karaman, 1932 (*)

Hadzia fragilis stochi G. Karaman, 1989 (N) (E)

Hadzia minuta Ruffo, 1947 (S) (E)

Note

Hadzia fragilis: Solo in una grotta della Venezia Giulia.

Hyalidae

Hyale Rathke, 1837

Hyale camptonyx (Heller, 1866) (3, 4, 5)

Hyale crassipes (Heller, 1866) (3, 4, 5)

Hyale grimaldii Chevreux, 1891 (4, 5)

Hyale perieri (Lucas, 1849) (3, 4)

Hyale pontica Rathke, 1837 (3)

Hyale schmidtii (Heller, 1866) (3, 4, 5)

Hyale stebbingi Chevreux, 1888 (3, 4)

Micropythia Krapp-Schickel, 1976

Micropythia carinata (Bate, 1862) (3, 4)

Parhyale Stebbing, 1897

Parhyale aquilina (A. Costa, 1857) (3, 5)

Parhyale eburnea Krapp-Schickel, 1974 (3, 4) (E)

Parhyale plumicornis (Heller, 1866) (3, 4)

Parhyalella Kunkel, 1910

Parhyalella richardi (Chevreux, 1902) (3, 4)

Iphimediidae

Coboldus Krapp-Schickel, 1974

Coboldus nitior Krapp-Schickel, 1974 (3, 5)

Iphimedia Rathke, 1843

Iphimedia brachygnatha Ruffo & Schiecke, 1979 (3)

Iphimedia carinata Heller, 1866 (3, 4, 5)

Iphimedia eblanae Bate, 1857 (3, 4, 5)

Iphimedia gibbula Ruffo & Schiecke, 1979 (3) (E)

Iphimedia jugoslavica G. Karaman, 1975 (3, 5)

Iphimedia minuta G.O. Sars, 1882 (3, 4, 5)

Iphimedia obesa Rathke, 1843 (4)

Iphimedia quasimodus Ruffo & Schiecke, 1979 (3)

Iphimedia serratipes Ruffo & Schiecke, 1979 (3, 5)

Iphimedia vicina Ruffo & Schiecke, 1979 (3, 5) (E)

Isaeidae

Gammaropsis Liljeborg, 1855

Gammaropsis crenulata Krapp-Schickel & Myers, 1979 (3, 5)

Gammaropsis dentata Chevreux, 1900 (3, 5)

Gammaropsis emancipata Krapp-Schickel & Myers, 1979 (3) (E)

Gammaropsis maculata (Johnston, 1827) (3, 4)

Gammaropsis ostroumowi (Sowinsky, 1898) (3, 4, 5)

Gammaropsis palmata Stebbing & Robertson, 1891 (3)

Gammaropsis sophiae (Boeck, 1861) (3)

Isaea Milne Edwards, 1830

Isaea montagui Milne Edwards, 1830 (3, 4)

Megamphopus Norman, 1869

Megamphopus brevidactylus Myers, 1976 (3) (E)

Megamphopus cornutus Norman, 1869 (3)

Microprotopus Norman, 1867

Microprotopus maculatus Norman, 1867 (3, 4)

Photis Krøyer, 1842

Photis longicaudata (Bate & Westwood, 1862) (3, 4)
Photis longipes (Della Valle, 1893) (3, 5)

Ischyroceridae

Erichthonius Milne Edwards, 1830

Erichthonius brasiliensis (Dana, 1855) (3, 4, 5)
Erichthonius difformis Milne Edwards, 1830 (3) (*)
Erichthonius punctatus (Bate, 1857) (3, 4, 5)

Ischyrocerus Krøyer, 1838

Ischyrocerus inexpectatus Ruffo, 1959 (3, 4)

Jassa Leach, 1814

Jassa marmorata Holmes, 1903 (3, 4)
Jassa ocia (Bate, 1862) (4)

Microjassa Stebbing, 1899

Microjassa cumbrensis (Stebbing & Robertson, 1891) (3)

Note

Erichthonius difformis: Distribuzione da precisare.

Lafystiidae

Lafystius Krøyer, 1842

Lafystius sturionis Krøyer, 1842 (3)

Lepechinellidae

Lepechinella Stebbing, 1908

Lepechinella manco J.L. Barnard, 1973 (4)

Leucothoidae

Leucothoe Leach, 1814

Leucothoe euryonyx Walker, 1901 (3, 4, 5)
Leucothoe incisa Robertson, 1892 (3)
Leucothoe liljeborgi Boeck, 1861 (3)
Leucothoe oboa G. Karaman, 1971 (3, 4)
Leucothoe occulta Krapp-Schickel, 1973 (3)
Leucothoe pachycera Della Valle, 1893 (3, 4, 5)
Leucothoe richiardi Lessona, 1865 (3, 4, 5)
Leucothoe serraticarpa Della Valle, 1893 (3, 4) (E)
Leucothoe spinicarpa (Abildgaard, 1789) (3, 4, 5)
Leucothoe venetiarum Giordani Soika, 1950 (3, 4, 5)

Liljeborgiidae

Idunella G.O. Sars, 1894

Idunella excavata (Schiecke, 1973) (3) (E)
Idunella nana (Schiecke, 1973) (3) (E)
Idunella pirata Krapp-Schickel, 1975 (3)

Liljeborgia Bate, 1862

Liljeborgia dellavallei Stebbing, 1906 (3, 4, 5)

Lysianassidae

Acidostoma Liljeborg, 1865

Acidostoma nodiferum Stephensen, 1923 (3, 4, 5)
Acidostoma obesum (Bate & Westwood, 1861) (3, 4)

Aristias Boeck, 1871

Aristias neglectus Hansen, 1867 (3, 4, 5)

Aroui Chevreux, 1911

Aroui setosus Chevreux, 1911 (3)

Ensayara J.L. Barnard, 1964

Ensayara carpinei Bellan-Santini, 1974 (3)

Hippomedon Boeck, 1871

Hippomedon ambiguus Ruffo, 1946 (3, 4)

Hippomedon bidentatus Chevreux, 1903 (3, 4, 5)
Hippomedon massiliensis Bellan-Santini, 1965 (3, 4)
Hippomedon oculatus Chevreux & Fage, 1925 (3)

Ichnopus A. Costa, 1853

Ichnopus spinicornis Boeck, 1861 (3, 4)
Ichnopus taurus A. Costa, 1853 (3, 4)

Lepidepecreum Bate & Westwood, 1868

Lepidepecreum crypticum Ruffo & Schiecke, 1977 (3, 5) (E)
Lepidepecreum longicorne (Bate & Westwood, 1861) (3, 4)
Lepidepecreum subclypeatum Ruffo & Schiecke, 1977 (4)

Lysianassa Milne Edwards, 1830

Lysianassa costae Milne Edwards, 1830 (3, 4, 5)
Lysianassa longicornis Lucas, 1849 (3, 4, 5)
Lysianassa pilicornis Heller, 1866 (3, 4, 5)
Lysianassa plumosa Boeck, 1871 (3)

Lysianella G.O. Sars, 1882

Lysianella dellavallei Stebbing, 1906 (3, 5)

Nannonyx G.O. Sars, 1891

Nannonyx propinquus Chevreux, 1911 (3, 4)

Normanion Bonnier, 1893

Normanion abyssi Chevreux, 1903 (3)
Normanion chevreuxi Diviacco & Vader, 1988 (3)
Normanion ruffoi Diviacco & Vader, 1988 (3)

Onesimoides Stebbing, 1888

Onesimoides mediterraneus Bellan-Santini, 1974 (3)

Orchomene Boeck, 1871

Orchomene grimaldii Chevreux, 1890 (3, 4)
Orchomene humilis (A. Costa, 1853) (3, 4, 5)
Orchomene similis Chevreux, 1912 (3)

Orchomenella G.O. Sars, 1890

Orchomenella nana (Krøyer, 1846) (3, 4, 5)

Paracentromedon Chevreux & Fage, 1925

Paracentromedon crenulatum (Chevreux, 1900) (3)

Pardia Ruffo, 1987

Pardia punctata (A. Costa, 1851) (3, 5)

Perrierella Chevreux & Bouvier, 1892

Perrierella audouiniana (Bate, 1857) (3, 4)

Prachynella J.L. Barnard, 1964

Prachynella mediterranea (Ruffo, 1975) (4) (E)

Rhinolabia Ruffo, 1971

Rhinolabia parthenopeia Ruffo, 1971 (3) (*)

Scopelocheirus Bate, 1857

Scopelocheirus hopei (A. Costa, 1851) (3, 4)

Socarnes Boeck, 1871

Socarnes filicornis (Heller, 1866) (3, 5)

Sophrrosyne Stebbing, 1888

Sophrrosyne hispana (Chevreux, 1888) (3)

Tmetonyx Stebbing, 1906

Tmetonyx nardonis (Heller, 1866) (3)

Tmetonyx similis (G.O. Sars, 1891) (3, 4)

Trischizostoma Boeck, 1861

Trischizostoma nicaeense (A. Costa, 1853) (3)

Trischizostoma raschi Esmark & Boeck, 1861 (5) (*)

Tryphosella Bonnier, 1893

Tryphosella caecula (G.O. Sars, 1891) (3)

Tryphosella dilatata (Chevreux, 1903) (3)

Tryphosella longidactyla Ruffo, 1985 (3, 4)
Tryphosella minima (Chevreux, 1911) (3, 5)
Tryphosella simillima Ruffo, 1985 (3, 5) (E)

Tryphosites G.O. Sars, 1891

Tryphosites longipes (Bate & Westwood, 1861) (3)

Note

Rhinolabia parthenopeia: Presente forse anche in Adriatico, essendo stata rinvenuta sulle coste della Croazia.

Trischizostoma raschi: Un solo reperto a Sud del Gargano.

Megaluropidae

Megaluropus Hoek, 1889

Megaluropus massiliensis Ledoyer, 1976 (3)
Megaluropus monasteriensis Ledoyer, 1976 (3, 4, 5)

Melitidae

Ceradocus A. Costa, 1853

Ceradocus orchestipes A. Costa, 1853 (3, 4, 5)
Ceradocus semiserratus (Bate, 1862) (3)

Cheirocratus Norman, 1867

Cheirocratus assimilis (Liljeborg, 1861) (3)
Cheirocratus monodontus G. Karaman, 1977 (3) (E)
Cheirocratus sundevalli (Rathke, 1843) (3, 4, 5)

Elasmopus A. Costa, 1853

Elasmopus affinis Della Valle, 1893 (3, 5)
Elasmopus brasiliensis (Dana, 1855) (3, 5)
Elasmopus pecteniscus (Bate, 1862) (4)
Elasmopus pocillimanus (Bate, 1862) (3, 4, 5)
Elasmopus rapax A. Costa, 1853 (3, 4, 5)

Eriopisa Stebbing, 1890

Eriopisa elongata (Bruzellius, 1859) (3, 5)

Gammarella Bate, 1857

Gammarella fucicola (Leach, 1814) (3, 4, 5)

Maera Leach, 1814

Maera grossimana (Montagu, 1808) (3, 4, 5)
Maera hirondellei Chevreux, 1900 (3, 4)
Maera inaequipēs (A. Costa, 1857) (3, 4, 5)
Maera schieckei G. Karaman & Ruffo, 1971 (3) (E)
Maera schmidtii Stephensen, 1915 (3, 4, 5)
Maera sodalis G. Karaman & Ruffo, 1971 (3, 4)

Melita Leach, 1814

Melita aculeata Chevreux, 1911 (3) (*)
Melita bulla G. Karaman, 1978 (3)
Melita coroninii Heller, 1866 (3)
Melita gladiosa Bate, 1862 (3, 4) (*)
Melita hergensis Reid, 1939 (3, 4, 5)
Melita obtusata (Montagu, 1813) (3) (*)
Melita palmata (Montagu, 1804) (3, 4, 5)
Melita valesi S. Karaman, 1955 (3)

Psammogammarus S. Karaman, 1955

Psammogammarus coecus S. Karaman, 1955 (3)
Psammogammarus gracilis (Ruffo & Schiecke, 1976) (5) (E)

Pseudoniphargus Chevreux, 1901

Pseudoniphargus adriaticus S. Karaman, 1955 (3)
Pseudoniphargus africanus Chevreux, 1901
Pseudoniphargus africanus italicus G. Karaman & Ruffo, 1989 (Si) (E)
Pseudoniphargus inconditus G. Karaman & Ruffo, 1989 (Si) (E)
Pseudoniphargus sodalis G. Karaman & Ruffo, 1989 (Si) (E)

Note

Melita aculeata: Secondo G. Karaman attribuibile al genere Abludomelita G. Karaman, 1981.
Melita gladiosa: Secondo G. Karaman attribuibile al genere Abludomelita G. Karaman, 1981.
Melita obtusata: Secondo G. Karaman attribuibile al genere Abludomelita G. Karaman, 1981.

Melphidippidae

Melphidippella G.O. Sars, 1894

Melphidippella macra (Norman, 1869) (3)

Niphargidae

Carinurella Sket, 1971

Carinurella paradoxa (Sket, 1964) (N) (*)

Niphargus Schiödte, 1849

Niphargus ambulator G. Karaman, 1975 (N) (E)

Niphargus aquilex Schiödte, 1855 (N, S)

Niphargus arbiter G. Karaman, 1984 (N)

Niphargus armatus G. Karaman, 1985 (N) (E)

Niphargus bajuvaricus Schellenberg, 1932

Niphargus bajuvaricus grandii Ruffo, 1937 (N)

Niphargus bihorensis Schellenberg, 1940 (N)

Niphargus bodoni G. Karaman, 1985 (N) (E)

Niphargus canui G. Karaman, 1975 (N) (E)

Niphargus danconai Benedetti, 1942 (N)

Niphargus duplus G. Karaman, 1976 (N) (E)

Niphargus elegans Garbini, 1894 (N, S)

Niphargus forellii Humbert, 1876 (N)

Niphargus galvagnii Ruffo, 1953

Niphargus galvagnii galvagnii Ruffo, 1953 (N) (E)

Niphargus galvagnii similis G. Karaman & Ruffo, 1989 (N) (E)

Niphargus ictus G. Karaman, 1985 (S) (E)

Niphargus italicus G. Karaman, 1976 (N) (E)

Niphargus krameri Schellenberg, 1935 (N)

Niphargus longicaudatus (A. Costa, 1851) (N, S, Si, Sa)

Niphargus longidactylus Ruffo, 1937 (N)

Niphargus messanai G. Karaman, 1989 (S) (E)

Niphargus microcerberus Sket, 1972 (N)

Niphargus orcinus Joseph, 1869 (N)

Niphargus parenzani Ruffo & Vigna Taglianti, 1968 (S) (E)

Niphargus pasquinii Vigna Taglianti, 1966

Niphargus pasquinii pasquinii Vigna Taglianti, 1966 (S) (E)

Niphargus pasquinii sodalis G. Karaman, 1984 (S) (E)

Niphargus patrizii Ruffo & Vigna Taglianti, 1968 (S) (E)

Niphargus pescei G. Karaman, 1984 (N) (E)

Niphargus poianoi G. Karaman, 1988 (N) (E)

Niphargus pupetta Sket, 1962 (N)

Niphargus puteanus (C.L. Koch, 1836) (N, S)

Niphargus rhenorhodanensis Schellenberg, 1937 (N)

Niphargus ruffoi G. Karaman, 1976 (N) (E)

Niphargus spinulifemur S. Karaman, 1954 (N)

Niphargus spoeckeri Schellenberg, 1933

Niphargus spoeckeri sibillinianus G. Karaman, 1984 (S) (E)
Niphargus stefanellii Ruffo & Vigna Taglianti, 1967 (S) (E)
Niphargus steueri Schellenberg, 1935
 Niphargus steueri liburnicus G. Karaman & Sket, 1989 (N)
Niphargus strouhali Schellenberg, 1933
 Niphargus strouhali alpinus G. Karaman & S. Ruffo, 1989 (N) (E)
Niphargus stygius (Schiödte, 1847) (N, S) (*)
Niphargus tamaninii Ruffo, 1953
 Niphargus tamaninii tamaninii Ruffo, 1953 (N) (E)
 Niphargus tamaninii barbatus G. Karaman, 1985 (N) (E)
Niphargus timavi S. Karaman, 1954 (N)
Niphargus transitivus Sket, 1971
 Niphargus transitivus transitivus Sket, 1971 (N) (E)
 Niphargus transitivus dissonus G. Karaman, 1984 (N) (E)
Niphargus wolfi Schellenberg, 1933 (N)

Note

Carinurella paradoxa: Solo nel fiume Isonzo presso Gorizia.
Niphargus stygius: Complesso di specie ancora non chiaramente definite.

Oedicerotidae

Arrhis Stebbing, 1906

Arrhis mediterraneus Ledoyer, 1983 (3)

Bathymedon G.O. Sars, 1892

Bathymedon acutifrons Bonnier, 1896 (3)
Bathymedon monoculodiformis Ledoyer, 1983 (3)

Halicreion Boeck, 1871

Halicreion aequicornis (Norman, 1869) (3)

Monoculodes Stimpson, 1853

Monoculodes acutipes Ledoyer, 1983 (3)
Monoculodes carinatus (Bate, 1857) (3, 4, 5)
Monoculodes gibbosus Chevreux, 1888 (3, 4)
Monoculodes griseus (Della Valle, 1893) (3)
Monoculodes latissimanus Stephensen, 1931 (3)
Monoculodes packardi Boeck, 1871 (3)
Monoculodes subnudus Norman, 1889 (3, 4)

Oediceroides Stebbing, 1888

Oediceroides pilosus Ledoyer, 1983 (3)

Oediceropsis Lilljeborg, 1865

Oediceropsis brevicornis Lilljeborg, 1865 (3)

Periiculodes G.O. Sars, 1892

Periiculodes aequimanus (Kossmann, 1880) (3, 5)

Periiculodes longimanus (Bate & Westwood, 1868)

Periiculodes longimanus longimanus (Bate & Westwood, 1868) (3, 4, 5)

Pontocrates Boeck, 1871

Pontocrates altamarinus (Bate & Westwood, 1862) (3, 5)

Pontocrates arenarius (Bate, 1858) (3, 4, 5)

Synchelidium G.O. Sars, 1892

Synchelidium haplocheles (Grube, 1864) (3)

Synchelidium longidigitatum Ruffo, 1947 (3, 4, 5)

Synchelidium maculatum Stebbing, 1906 (3, 5)

Westwoodilla Bate, 1862

Westwoodilla caecula (Bate, 1857) (3)

Westwoodilla rectirostris (Della Valle, 1893) (3, 4)

Pardaliscidae

Halice Boeck, 1871

Halice abyssi Boeck, 1871 (3)

Halice walkeri (Ledoyer, 1973) (3)

Nicippe Bruzelius, 1859

Nicippe tumida Bruzelius, 1859 (3)

Pardalisca Krøyer, 1842

Pardalisca brachydactyla Bellan-Santini, 1985 (3)

Pardalisca mediterranea Bellan-Santini, 1985 (3)

Pardaliscella G.O. Sars, 1893

Pardaliscella boeckii (Malm, 1870) (3)

Pardaliscoides Stebbing, 1888

Pardaliscoides stebbingi Ledoyer, 1970 (3)

Phliantidae

Pereionotus Bate & Westwood, 1862

Pereionotus testudo (Montagu, 1808) (3, 4, 5)

Phoxocephalidae

Harpinia Boeck, 1876

Harpinia agna G. Karaman, 1987 (3) (E)

Harpinia ala G. Karaman, 1987 (3, 5) (E)

Harpinia antennaria Meinert, 1890 (3)

Harpinia crenulata (Boeck, 1871) (3, 4)

Harpinia dellavallei Chevreux, 1910 (3, 4, 5)

Harpinia pectinata G.O. Sars, 1891 (3)

Harpinia truncata G.O. Sars, 1891 (3)

Harpinia zavodniki G. Karaman, 1987 (3) (E)

Metaphoxus Bonnier, 1896

Metaphoxus fultoni (Scott, 1890) (3, 4)

Metaphoxus gruneri G. Karaman, 1986 (5)

Metaphoxus simplex (Bate, 1857) (3, 4)

Paraphoxus G.O. Sars, 1891

Paraphoxus oculatus (G.O. Sars, 1879) (3)

Phoxocephalus Stebbing, 1888

Phoxocephalus aquosus G. Karaman, 1935 (3) (E)

Pleustidae

Stenopleustes G.O. Sars, 1893

Stenopleustes nodifer G.O. Sars, 1893 (3)

Podoceridae

Laetmatophilus Bruzelius, 1859

Laetmatophilus ledoyeri Ruffo, 1987 (4)

Parunciola Chevreux, 1911

Parunciola seurati Chevreux, 1911 (3)

Podocerus Leach, 1814

Podocerus schieckei Ruffo, 1987 (3) (E)

Podocerus variegatus Leach, 1814 (3, 4, 5)

Pontoporeiidae

Bathyporeia Lindström, 1855

Bathyporeia guilliamsoniana (Bate, 1857) (3, 4)

Bathyporeia leucophthalma Bellan-Santini, 1973 (3)

Bathyporeia lindstromi Stebbing, 1906 (3)

Bathyporeia megalops Chevreux, 1911 (3, 5)

Bathyporeia nana Toulmond, 1966 (3)

Bathyporeia phaiophthalma Bellan-Santini, 1973 (3, 5)

Bathyporeia sardoa Bellan-Santini & Vader, 1988 (3) (E)

Bathyporeia sunnivae Bellan-Santini & Vader, 1988 (3) (E)

Salentinellidae

Salentinella Ruffo, 1947

Salentinella angelieri Delamare Deboutteville & Ruffo, 1952 (N, S, Sa)

Salentinella gracillima Ruffo, 1947 (S) (E) (*)

Note

Salentinella gracillima: Solamente nel Salento (Puglie).

Stegocephalidae

Andaniexis Stebbing, 1906

Andaniexis mimonectes Ruffo, 1975 (3, 4)

Stegocephaloides G.O. Sars, 1891

Stegocephaloides christianiensis (Boeck, 1871) (3)

Stenothoidae

Stenothoe Dana, 1852

Stenothoe antennulariae Della Valle, 1893 (3) (E)

Stenothoe cavimana Chevreux, 1908 (3)

Stenothoe dollfusi Chevreux, 1887 (3, 4, 5)

Stenothoe eduardi Krapp-Schickel, 1976 (3)

Stenothoe elachista Krapp-Schickel, 1976 (3) (E)

Stenothoe gallensis Walker, 1904 (5)

Stenothoe monoculoides (Montagu, 1813) (3, 4, 5)

Stenothoe tergestina (Nebeski, 1880) (3, 4, 5)

Stenothoe valida Dana, 1855 (3, 4)

Synopiidae

Bruzelia Boeck, 1871

Bruzelia typica Boeck, 1871 (4)

Pseudotiron Chevreux, 1895

Pseudotiron bouvieri Chevreux, 1895 (3)

Syrrhoe Goes, 1866

Syrrhoe affinis Chevreux, 1908 (4)

Syrrhoites G.O. Sars, 1893

Syrrhoites barnardi G. Karaman, 1986 (3) (E)

Syrrhoites capricornia Bellan-Santini, 1985 (3) (E)

Talitridae

Macarorchestia Stock, 1989

Macarorchestia remyi (Schellenberg, 1950) (3)

***Orchestia* Leach, 1814**

Orchestia cavimana Heller, 1865 (3, 4)
Orchestia gammarella (Pallas, 1766) (3, 4, 5)
Orchestia mediterranea A. Costa, 1853 (3, 4, 5)
Orchestia montagui Audouin, 1826 (3, 4, 5)
Orchestia platensis Krøyer, 1845 (3, 4)
Orchestia stephenseni Cecchini, 1928 (3, 5)

***Talitrus* Latreille, 1802**

Talitrus saltator (Montagu, 1808) (3, 4, 5)

***Talorchestia* Dana, 1852**

Talorchestia deshayesii (Audouin, 1826) (3, 4, 5)
Talorchestia pelecyaniformis Bellan-Santini & Ruffo, 1986 (3) (E) (*)

Note

Talorchestia pelecyaniformis: Solo sulle coste della Sardegna.

Urothoidae

***Urothoe* Dana, 1852**

Urothoe corsica Bellan-Santini, 1965 (3)
Urothoe elegans Bate, 1857 (3, 4, 5)
Urothoe grimaldii Chevreux, 1895 (3, 5)
Urothoe pulchella (A. Costa, 1853) (3, 5)

Ingolfiellidae

***Ingolfiella* (*Tyrrhenidiella*) Ruffo & Vigna Taglianti, 1989**

Ingolfiella (*Tyrrhenidiella*) *cottarellii* Ruffo & Vigna Taglianti, 1989 (Sa) (*)

***Ingolfiella* (*Hansenliella*) Stock, 1981**

Ingolfiella (*Hansenliella*) *ischitana* Schiecke, 1973 (3) (*)

Note

Ingolfiella (*Tyrrhenidiella*) *cottarellii*: Solo in una grotta dell'Isola Tavolara.
Ingolfiella (*Hansenliella*) *ischitana*: Solo nel Golfo di Napoli.

Metaingolfiellidae

Metaingolfiella Ruffo, 1969

Metaingolfiella mirabilis Ruffo, 1969 (S) (*)

Note

Metaingolfiella mirabilis: Unico reperto in un pozzo del Salento (Puglie).

Caprellidae

Caprella Lamarck, 1801

Caprella acanthifera Leach, 1814 (3, 4, 5)
Caprella andreae Mayer, 1890 (3, 4)
Caprella danilewskii Czerniavski, 1868 (3, 4, 5)
Caprella dilatata Krøyer, 1843 (3)
Caprella equilibra Say, 1818 (3, 4)
Caprella grandimana Mayer, 1882 (3, 5)
Caprella hirsuta Mayer, 1890 (3, 5)
Caprella lilliput Krapp-Schickel & Ruffo, 1987 (3)
Caprella liparotensis Haller, 1879 (3, 4, 5)
Caprella mitis Mayer, 1890 (3, 5)
Caprella penantis Leach, 1814 (3, 4)
Caprella rapax Mayer, 1890 (3)
Caprella telarpax Mayer, 1890 (3) (E)

Parvipalpus Mayer, 1890

Parvipalpus linea Mayer, 1890 (3, 4)

Pseudolirius Mayer, 1890

Pseudolirius kroyerii (Haller, 1879) (3, 4, 5)

Cyamidae

Isocyamus Gervais & Van Beneden, 1859

Isocyamus delphinii (Guérin Méneville, 1837) (3)

Syncyamus Bowman, 1955

Syncyamus chelipes (A. Costa, 1866) (3)

Pariambidae

Deutella Mayer, 1890

Deutella schieckei Cavedini, 1982 (3)

Liropus Mayer, 1890

Liropus elongatus Mayer, 1890 (3) (E)

Liropus minimus Mayer, 1890 (3) (E)

Pariambus Stebbing, 1888

Pariambus typicus (Krøyer, 1844) (3, 5)

Pseudoprotella Mayer, 1890

Pseudoprotella phasma (Montagu, 1804) (3, 4, 5)

Phtisicidae

Phtisica Slabber, 1769

Phtisica marina Slabber, 1769 (3, 4, 5)

Brachyscelidae

Brachyscelus Bate, 1861

Brachyscelus cruscolum Bate, 1861 (3, 4, 5)

Brachyscelus globiceps Claus, 1879 (3)

Brachyscelus macrocephalus Stephensen, 1925 (3, 4, 5)

Brachyscelus rapax (Claus, 1879) (5)

Euthamneus Bovallius, 1890

Euthamneus rostratus (Bovallius, 1887) (4, 5)

Dairellidae

Dairella Bovallius, 1887

Dairella latissima Bovallius, 1887 (3)

Hyperiidæ

Hyperietta Bowman, 1973

Hyperietta luzoni (Stebbing, 1888) (3, 5)

Hyperioides Chevreux, 1900

Hyperioides longipes Chevreux, 1900 (3, 4, 5)

Hyperionyx Bowman, 1973

Hyperionyx macrodactylus (Stephensen, 1924) (3, 5)

Hyperoche Bovallius, 1887

Hyperoche mediterranea Senna, 1908 (3, 4)

Hyperoche picta Bovallius, 1889 (3)

Iulopis Bovallius, 1887

Iulopis loveni Bovallius, 1887 (3, 5)

Lestrigonus Milne Edwards, 1830

Lestrigonus bengalensis Giles, 1887 (4)

Lestrigonus latissimus (Bovallius, 1889) (3, 4, 5)

Lestrigonus macrophthalmus (Vosseler, 1901) (5)

Lestrigonus schizogeneios (Stebbing, 1888) (3, 4, 5)

Parathemisto Boeck, 1870

Parathemisto gaudichaudi (Guérin Méneville, 1825) (3, 4, 5)

Phronimopsis Claus, 1879

Phronimopsis spinifera Claus, 1879 (3, 4, 5)

Lycaeidae

Lycaea Dana, 1852

Lycaea pachypoda (Claus, 1879) (3, 4, 5)

Lycaea pulex Marion, 1874 (3, 4, 5)

Lycaea serrata Claus, 1879 (3, 5)

Simorhynchotus Stebbing, 1888

Simorhynchotus antennarius (Claus, 1871) (3, 4, 5)

Lycaeopsidae

Lycaeopsis Claus, 1879

Lycaeopsis themistoides Claus, 1879 (3, 4, 5)

Oxycephalidae

Calamorhynchus Streets, 1878

Calamorhynchus pellucidus Streets, 1878 (3, 4, 5)

Cranocephalus Bovallius, 1890

Cranocephalus scleroticus (Streets, 1878) (3, 5)

Glossocephalus Bovallius, 1887

Glossocephalus milneedwardsi Bovallius, 1887 (3, 4)

Oxycephalus Milne Edwards, 1830

Oxycephalus clausii Bovallius, 1887 (4)

Oxycephalus piscator Milne Edwards, 1830 (3, 4, 5)

Rhabdosoma White, 1847

Rhabdosoma brevicaudatum Stebbing, 1888 (3, 4, 5)

Rhabdosoma whitei Bate, 1862 (5)

Streetsia Stebbing, 1888

Streetsia challenger Stebbing, 1888 (3, 5)

Streetsia porcella (Claus, 1879) (3, 5)

Paraphronimidae

Paraphronima Claus, 1879

Paraphronima crassipes Claus, 1879 (3, 4, 5)
Paraphronima gracilis Claus, 1879 (3, 4, 5)

Parascelidae

Euscelus Claus, 1879

Euscelus steueri Spandl, 1924 (4) (E)

Parascelus Claus, 1879

Parascelus edwardsi Claus, 1879 (3, 5)
Parascelus typhoides Claus, 1879 (3, 4, 5)

Phronimidae

Phronima Latreille, 1802

Phronima atlantica Guérin Méneville, 1836 (3, 4, 5)
Phronima colletti Bovallius, 1887 (3)
Phronima curvipes Vosseler, 1901 (3)
Phronima pacifica Streets, 1877 (3)
Phronima sedentaria (Forsskål, 1775) (3, 4, 5)
Phronima stebbingi Vosseler, 1901 (3)

Phronimella Claus, 1872

Phronimella elongata (Claus, 1862) (3, 4, 5)

Phrosinidae

Anchylomera Milne Edwards, 1830

Anchylomera blossevillei Milne Edwards, 1930 (3, 4, 5)

Phrosina Risso, 1822

Phrosina semilunata Risso, 1822 (3, 4, 5)

Primno Guérin Méneville, 1836

Primno macropa Guérin Méneville, 1836 (3, 4, 5) (*)

Note

Primno macropa: Stato sistematico delle popolazioni mediterranee da precisare.

Platyscelidae

Amphithyrus Claus, 1879

Amphithyrus bispinosus Claus, 1879 (3, 4, 5)

Amphithyrus sculpturatus Claus, 1879 (4)

Amphithyrus similis Claus, 1879 (3, 5)

Hemityphis Claus, 1879

Hemityphis tenuimanus Claus, 1879 (3, 5)

Paratyphis Claus, 1879

Paratyphis spinosus Spandl, 1924 (3, 5)

Platyscelus Bate, 1861

Platyscelus ovoides (Risso, 1816) (3, 4, 5)

Platyscelus serratulus Stebbing, 1888 (3, 4, 5)

Tetrathyrus Claus, 1879

Tetrathyrus forcipatus Claus, 1879 (3, 4, 5)

Pronoidae

Eupronoe Claus, 1879

Eupronoe maculata Claus, 1879 (3, 4, 5)

Eupronoe minuta Claus, 1879 (3, 4, 5)

Paralycaea Claus, 1879

Paralycaea gracilis Claus, 1879 (3)

Parapronoe Claus, 1879

Parapronoe parva Claus, 1879 (3, 5)

Scinidae

Scina Prestandrea, 1833

Scina borealis (G.O. Sars, 1882) (3)
Scina crassicornis (Fabricius, 1775) (3, 4, 5)
Scina marginata (Bovallius, 1885) (3, 4, 5)
Scina rattrayi Stebbing, 1895 (3, 4)
Scina tullbergi (Bovallius, 1885) (4)

Vibiliidae

Vibilia Milne Edwards, 1830

Vibilia armata Bovallius, 1887 (3, 4, 5)
Vibilia cultripes Vosseler, 1901 (3, 4, 5)
Vibilia jeangerardi Lucas, 1845 (3, 4, 5)
Vibilia propinqua Stebbing, 1888 (3, 5)
Vibilia stebbingi Behning & Woltereck, 1912 (5)
Vibilia viatrix Bovallius, 1887 (3, 4, 5)

Euphausiacea

Euphausiidae

Thysanopoda Milne-Edwards, 1830

Thysanopoda aequalis Hansen, 1905 (3, 5)

Meganyctiphanes Holt & Tattersall, 1905

Meganyctiphanes norvegica (M. Sars, 1857) (3, 5)

Nyctiphanes G.O. Sars, 1883

Nyctiphanes couchii (Bell, 1853) (3, 5)

Euphausia Dana, 1852

Euphausia brevis Hansen, 1905 (3, 5)
Euphausia hemigibba Hansen, 1910 (3, 5)
Euphausia krohnii (Brandt, 1851) (3, 5)

Thysanoessa Brandt, 1851

Thysanoessa gregaria G.O. Sars, 1883 (3, 5)

Nematoscelis G.O. Sars, 1883

Nematoscelis atlantica Hansen, 1910 (3, 5)
Nematoscelis megalops G.O. Sars, 1883 (3, 5)

Stylocheiron G.O. Sars, 1883

Stylocheiron abbreviatum G.O. Sars, 1883 (3, 5)
Stylocheiron longicorne G.O. Sars, 1883 (3, 5)
Stylocheiron maximum Hansen, 1908 (3, 5)
Stylocheiron suhmii G.O. Sars, 1883 (3, 5)

Decapoda

Aristeidae

Aristaeomorpha Wood Mason, 1891

Aristaeomorpha foliacea (Risso, 1827) (3, 4, 5)

Aristeus Duvernoy, 1840

Aristeus antennatus (Risso, 1816) (3, 4, 5)

Gennadas Bate, 1881

Gennadas elegans (S.I. Smith, 1882) (3, 4, 5)

Penaeidae

Funchalia Johnson, 1868

Funchalia villosa (Bouvier, 1905) (3, 5)
Funchalia woodwardi Johnson, 1868 (3, 5)

Parapenaeus S.I. Smith, 1885

Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846) (3, 4, 5)

Penaeus Fabricius, 1798

Penaeus japonicus Bate, 1888 (4) (*)
Penaeus kerathurus (Forsskål, 1775) (3, 4, 5)

Note

Penaeus japonicus: Originaria dell'area indo-pacifica, importata per acquacoltura; comune nel Mediterraneo orientale, una segnalazione per il Medio Adriatico.

Sicyoniidae

Sicyonia H. Milne Edwards, 1830

Sicyonia carinata (Brünnich, 1768) (3, 4, 5)

Solenoceridae

Solenocera Lucas, 1849

Solenocera membranacea (Risso, 1816) (3, 4, 5)

Sergestidae

Sergestes H. Milne Edwards, 1830

Sergestes arcticus Krøyer, 1855 (3, 4, 5)

Sergestes archnipodus (Cocco, 1832) (3, 4, 5)

Sergestes sargassi Ortmann, 1893 (3, 4, 5)

Sergestes vigilax Stimpson, 1860 (3, 4, 5)

Sergia Stimpson, 1860

Sergia robustus (S.I. Smith, 1882) (3, 4, 5)

Luciferidae

Lucifer Thompson, 1830

Lucifer typus H. Milne Edwards, 1837 (3, 4, 5)

Stenopodidae

Richardina A. Milne Edwards, 1881

Richardina fredericii Lo Bianco, 1903 (3)

Stenopus Latreille, 1819

Stenopus spinosus Risso, 1827 (3, 4, 5)

Nematocarcinidae

Nematocarcinus A. Milne Edwards, 1881

Nematocarcinus ensifer (S.I. Smith, 1882) (3)

Atyidae

Atyaephyra De Brito Capello, 1866

Atyaephyra desmaresti (Millet, 1831)

Atyaephyra desmaresti desmaresti (Millet, 1831) (N, S, Si, Sa)

Troglocaris Dormitzer, 1853

Troglocaris anophthalmus (Kollar, 1848)

Troglocaris anophthalmus anophthalmus (Kollar, 1848) (N)

Oplophoridae

AcanthePHYra A. Milne Edwards, 1881

AcanthePHYra eximia S.I. Smith, 1884 (3, 5)

AcanthePHYra pelagica (Risso, 1816) (3, 4, 5)

Pasiphaeidae

Pasiphaea Savigny, 1861

Pasiphaea multidentata Esmark, 1866 (3, 4, 5)

Pasiphaea sivado (Risso, 1816) (3, 4, 5)

Bresiliidae

Bresilia Calman, 1896

Bresilia corsicana Forest & Cals, 1977 (3)

Gnathophyllidae

Gnathophyllum Latreille, 1819

Gnathophyllum elegans (Risso, 1816) (3, 4, 5)

Palaemonidae

Balssia Kemp, 1922

Balssia gastii (Balss, 1921) (3, 4)

Brachycarpus Bate, 1888

Brachycarpus biunguiculatus (Lucas, 1846) (3, 5)

Macrobrachium Bate, 1868

Macrobrachium rosenbergii (De Man, 1879) (N, S) (*)

Palaemon Weber, 1795

Palaemon adspersus Rathke, 1837 (3, 4, 5)

Palaemon elegans Rathke, 1837 (3, 4, 5)

Palaemon longirostris H. Milne Edwards, 1837 (3, 5)

Palaemon serratus (Pennant, 1777) (3, 4, 5)

Palaemon xiphias Risso, 1816 (3, 4, 5)

Palaemonetes Heller, 1869

Palaemonetes antennarius (H. Milne Edwards, 1837) (N, S, Sa)

Periclimenes O.G. Costa, 1844

Periclimenes amethysteus (Risso, 1827) (3, 4)

Periclimenes kornii (Lo Bianco, 1903) (3)

Periclimenes sagittifer (Norman, 1861) (3, 4)

Periclimenes scriptus (Risso, 1822) (3, 4)

Pontonia Latreille, 1829

Pontonia flavomaculata Heller, 1864 (3, 4)

Pontonia pinnophylax (Otto, 1821) (3, 4, 5)

Typton O.G. Costa, 1844

Typton spongicola O.G. Costa, 1844 (3, 4)

Typhlocaris Calman, 1909

Typhlocaris salentina Caroli, 1924 (S) (E)

Note

Macrobrachium rosenbergii: Originaria dell'area indo-pacifica importata in Italia per acquacoltura; non esistono popolazioni naturali.

Alpheidae

Alpheus Fabricius, 1798

Alpheus dentipes Guérin-Méneville, 1832 (3, 4, 5)

Alpheus glaber (Olivi, 1792) (3, 4, 5)

Alpheus macrocheles (Hailstone, 1835) (3, 4, 5)

Athanas Leach, 1814

Athanas amazone Holthuis, 1951 (3, 4)

Athanas nitescens (Leach, 1814) (3, 4, 5)

Automate De Man, 1888

Automate branchialis Holthuis & Gottlieb, 1958 (4, 5)

Salmoneus Holthuis, 1955

Salmoneus sketi Fransen, 1991 (4) (*)

Synalpheus Bate, 1888

Synalpheus gamberelloides (Nardo, 1847) (3, 4, 5)

Note

Salmoneus sketi: Presente in 4 solo al largo della Dalmazia.

Hippolytidae

Eualus Thallwitz, 1892

Eualus drachi Noel, 1978 (3)

Eualus occultus (Lebour, 1936) (3, 4, 5)

Hippolyte Leach, 1814

Hippolyte holthuisi Zariquiey Alvarez, 1953 (3, 4)

Hippolyte huntii (Gosse, 1877) (3, 5) (*)
Hippolyte inermis Leach, 1815 (3, 4, 5)
Hippolyte leptocerus (Heller, 1863) (3, 4, 5)
Hippolyte longirostris (Czerniavsky, 1868) (3, 4, 5)
Hippolyte sapphica D'Udekem d'Acoz, 1993 (4)

Ligur Sarato, 1885

Ligur ensiferus (Risso, 1816) (3, 4, 5)

Lysmata Risso, 1816

Lysmata nilita Dohrn & Holthuis, 1950 (3, 4)
Lysmata seticaudata (Risso, 1816) (3, 4, 5)

Thoralus Holthuis, 1947

Thoralus cranchii (Leach, 1817) (3, 4, 5)
Thoralus sollaudi Zariquiey Cenarro, 1935 (3)

Note

Hippolyte huntii: Presenza dubbia, potrebbe trattarsi di *H. leptometrae* Ledoyer, 1969.

Processidae

Processa Leach, 1815

Processa acutirostris Nouvel & Holthuis, 1957 (3, 4, 5)
Processa canaliculata Leach, 1815 (3, 4, 5)
Processa edulis (Risso, 1816)
 Processa edulis edulis (Risso, 1816) (3, 4, 5)
Processa elegantula Nouvel & Holthuis, 1957 (3)
Processa macrophthalma Nouvel & Holthuis, 1957 (3, 4, 5)
Processa modica Williamson, 1979
 Processa modica carolii Williamson, 1979 (3, 4, 5)
Processa nouveli Al-Adhub & Williamson, 1975
 Processa nouveli nouveli Al-Adhub & Williamson, 1975 (3, 4, 5)
Processa robusta Nouvel & Holthuis, 1957 (3, 4, 5)

Pandalidae

Chlorotocus A. Milne Edwards, 1882

Chlorotocus crassicornis (A. Costa, 1871) (3, 4, 5)

Pandalina Calman, 1899

Pandalina brevirostris (Rathke, 1843) (3, 4, 5)

Pandalina profunda Holthuis, 1946 (3, 4, 5)

Plesionika Bate, 1888

Plesionika acanthonotus (S.I. Smith, 1882) (3, 4, 5)

Plesionika antigai Zariquiey Alvarez, 1955 (3, 4, 5)

Plesionika edwardsii (Brandt, 1851) (3, 4, 5)

Plesionika gigliolii (Senna, 1903) (3, 5)

Plesionika heterocarpus (A. Costa, 1871) (3, 4, 5)

Plesionika martia (A. Milne Edwards, 1883) (3, 4, 5)

Plesionika narval (Fabricius, 1787) (3, 4, 5)

Crangonidae

Aegaeon Agassiz, 1846

Aegaeon cataphractus (Olivi, 1792) (3, 4, 5)

Aegaeon lacazei (Gourret, 1887) (3, 4, 5)

Crangon Fabricius, 1798

Crangon crangon (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Philocheras Stebbing, 1900

Philocheras bispinosus (Hailstone, 1835) (3, 4, 5)

Philocheras echinulatus (Sars, 1861) (3, 4, 5)

Philocheras fasciatus (Risso, 1816) (3, 4, 5)

Philocheras monacanthus (Holthuis, 1961) (3, 4)

Philocheras neglectus (G.O. Sars, 1882) (3, 4)

Philocheras sculptus (Bell, 1847) (3, 4)

Philocheras trispinosus (Hailstone, 1835) (3, 4, 5)

Pontophilus Leach, 1817

Pontophilus norvegicus (M. Sars, 1861) (3, 4)

Pontophilus spinosus (Leach, 1815) (3, 4, 5)

Nephropidae

Homarus Weber, 1795

Homarus gammarus (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Nephrops Leach, 1814

Nephrops norvegicus (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Astacidae

Astacus Fabricius, 1775

Astacus astacus (Linnaeus, 1758) (N) (*)

Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823 (S) (*)

Austropotamobius Skorikov, 1908

Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)

Austropotamobius pallipes fulcisianus (Ninni, 1886) (N, S)

Note

Astacus astacus: Presenza marginale sul confine orientale.

Astacus leptodactylus: Originaria dell'Europa orientale, importata in Italia; non esistono popolazioni naturali.

Cambaridae

Orconectes Cope, 1872

Orconectes limosus (Rafinesque, 1817) (N) (*)

Procambarus Ortmann, 1905

Procambarus clarkii (Girard, 1852) (N) (*)

Note

Orconectes limosus: Originaria degli Stati Uniti orientali, importata in Italia; presente in N nel Lago d'Iseo.

Procambarus clarkii: Originaria degli Stati Uniti sud-orientali, importata in Italia per acquacoltura; presente in Piemonte ed in Versilia.

Axiidae

Axius Leach, 1815

Axius stirhynchus Leach, 1815 (3, 4)

Calocarididae

Calocaris Bell, 1846

Calocaris macandreae Bell, 1846 (3, 4, 5)

Callianassidae

Callianassa Leach, 1814

Callianassa acanthura Caroli, 1946 (3)

Callianassa candida (Olivi, 1792) (3, 4, 5)

Callianassa subterranea (Montagu, 1898) (3, 4, 5)

Callianassa truncata Giard & Bonnier, 1890 (3)

Callianassa tyrrhena (Petagna, 1792) (3, 4, 5)

Ctenochelidae

Calliax De Saint Laurent, 1974

Calliax lobata (Gaillande & Lagardere, 1966) (4)

Calliax punica De Saint Laurent & Manning, 1982 (3, 5)

Gourretia De Saint Laurent, 1974

Gourretia denticulata (Lutze, 1937) (3, 4, 5)

Laomediidae

Jaxea Nardo, 1847

Jaxea nocturna Nardo, 1847 (3, 4)

Upogebiidae

Upogebia Leach, 1814

Upogebia deltaura (Leach, 1815) (3, 4, 5)

Upogebia mediterranea Noel, 1992 (3, 4, 5)

Upogebia pusilla (Petagna, 1792) (3, 4, 5)

Upogebia stellata (Montagu, 1808) (4)

Upogebia tipica (Nardo, 1869) (3, 4)

Gebiacantha Ngoc-Ho, 1989

Gebiacantha talismani (Bouvier, 1915) (5)

Polychelidae

Polycheles Heller, 1862

Polycheles typhlops Heller, 1862 (3, 4, 5)

Stereomastis Bate, 1888

Stereomastis sculpta (S.I. Smith, 1880) (3)

Palinuridae

Palinurus Weber, 1795

Palinurus elephas (Fabricius, 1787) (3, 4, 5)

Palinurus mauritanicus Gruvel, 1911 (3, 5)

Scyllaridae

Scyllarides Gill, 1898

Scyllarides latus (Latreille, 1803) (3, 4, 5)

Scyllarus Fabricius, 1775

Scyllarus arctus (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Scyllarus caparti Holthuis, 1952 (4) (*)

Scyllarus pygmaeus (Bate, 1888) (3, 4, 5)

Note

Scyllarus caparti: Originaria dell'Atlantico orientale tropicale; una sola segnalazione per il Medio Adriatico.

Diogenidae

Calcinus Dana, 1851

Calcinus tubularis (Linnaeus, 1767) (3, 4, 5)

Clibanarius Dana, 1851

Clibanarius erythropus (Latreille, 1818) (3, 4, 5)

Dardanus Paulson, 1875

Dardanus arrosor (Herbst, 1796) (3, 4, 5)

Dardanus calidus (Risso, 1827) (3, 4, 5)

Diogenes Dana, 1851

Diogenes pugilator (Roux, 1829) (3, 4, 5)

Paguristes Dana, 1851

Paguristes eremita (Linnaeus, 1767) (3, 4, 5)

Paguristes streagensis Pastore, 1984 (5) (E)

Paguristes syrtensis De Saint Laurent, 1971 (5)

Paguridae

Anapagurus Henderson, 1887

Anapagurus breviaculeatus Fenizia, 1937 (3, 4, 5)

Anapagurus longispina A. Milne Edwards & Bouvier, 1900 (3, 4, 5)

Anapagurus chiroacanthus (Lilljeborg, 1856) (3, 4, 5)

Anapagurus curvidactylus Chevreux & Bouvier, 1892 (3)

Anapagurus laevis (Bell, 1845) (3, 4, 5)

Anapagurus smithi Ingle, 1993 (5)

Anapagurus petiti Dechancé & Forest, 1962 (3, 4, 5)

Anapagurus serripes (Hope, 1851) (3, 4, 5)

Cestopagurus Bouvier, 1897

Cestopagurus timidus (Roux, 1830) (3, 4, 5)

Nematopagurus A. Milne Edwards & Bouvier, 1892

Nematopagurus longicornis A. Milne Edwards & Bouvier, 1892 (3)

Pagurus Fabricius, 1775

Pagurus alatus Fabricius, 1775 (3, 4, 5)

Pagurus anachoretus Risso, 1827 (3, 4, 5)

Pagurus chevreuxi (Bouvier, 1896) (3, 5)

Pagurus cuanensis Bell, 1845 (3, 4, 5)

Pagurus excavatus (Herbst, 1791) (3, 4, 5)
Pagurus forbesii Bell, 1845 (3, 4)
Pagurus prideaux Leach, 1815 (3, 4, 5)
Pagurus pubescentulus A. Milne Edwards & Bouvier, 1892 (5)

Galatheidae

Galathea Fabricius, 1793

Galathea bolivari Zariquiey Alvarez, 1950 (3, 4, 5)
Galathea cenarroi Zariquiey Alvarez, 1968 (3, 4, 5)
Galathea dispersa Bate, 1859 (3, 4, 5)
Galathea intermedia Lilljeborg, 1851 (3, 4, 5)
Galathea nexa Embleton, 1835 (3, 4, 5)
Galathea squamifera Leach, 1814 (3, 4, 5)
Galathea strigosa (Linnaeus, 1761) (3, 4, 5)

Munida Leach, 1820

Munida curvimana A. Milne Edwards & Bouvier, 1894 (5)
Munida intermedia A. Milne Edwards & Bouvier, 1899 (3, 4, 5)
Munida rugosa (Fabricius, 1775) (3, 4, 5)
Munida tenuimana G.O. Sars, 1872 (3, 4, 5)

Munidopsis Whiteaves, 1874

Munidopsis marionis (A. Milne Edwards, 1882) (3)

Porcellanidae

Pisidia Leach, 1820

Pisidia bluteli (Risso, 1816) (3, 4, 5)
Pisidia longicornis (Linnaeus, 1767) (3, 4, 5) (*)
Pisidia longimana (Risso, 1816) (3, 4, 5)

Porcellana Lamarck, 1801

Porcellana platycheles (Pennant, 1777) (3, 4, 5)

Note

Pisidia longicornis: Numerose segnalazioni di *P. longicornis* nei mari italiani riguardano in realtà *P. longimana*.

Albuneidae

Albunea Weber, 1795

Albunea carabus (Linnaeus, 1758) (3, 5)

Dromiidae

Dromia Weber, 1795

Dromia personata (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Sternodromia Forest, 1974

Sternodromia spinirostris (Miers, 1881) (5) (*)

Note

Sternodromia spinirostris: Originaria dell'Atlantico orientale tropicale; una sola segnalazione per il Golfo di Taranto.

Cymonomidae

Cymonomus A. Milne Edwards, 1880

Cymonomus granulatus (Wyville Thomson, 1873) (3)

Homolidae

Homola Leach, 1815

Homola barbata (Fabricius, 1793) (3, 4, 5)

Paromola Wood-Mason & Alcock, 1891

Paromola cuvieri (Risso, 1816) (3, 5)

Latreilliidae

Latreillia Roux, 1830

Latreillia elegans Roux, 1830 (3, 4, 5)

Dorippidae

Ethusa Roux, 1830

Ethusa mascarone (Herbst, 1785) (3, 4, 5)

Medorippe Manning & Holthuis, 1981

Medorippe lanata (Linnaeus, 1767) (3, 4, 5)

Calappidae

Calappa Weber, 1795

Calappa granulata (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Leucosiidae

Ebalia Leach, 1817

Ebalia cranchii Leach, 1817 (3, 4)

Ebalia deshayesi Lucas, 1845 (3, 4)

Ebalia edwardsii O.G. Costa, 1838 (3, 4, 5)

Ebalia granulosa H. Milne Edwards, 1837 (4, 5)

Ebalia nux A. Milne Edwards, 1883 (3, 4, 5)

Ebalia tuberosa (Pennant, 1777) (3, 4, 5)

Ilia Leach, 1817

Ilia nucleus (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Merocryptus A. Milne Edwards, 1873

Merocryptus boletifer A. Milne Edwards & Bouvier, 1894 (4)

Majidae

Achaeus Leach, 1817

Achaeus cranchii Leach, 1817 (3, 4, 5)

Achaeus gracilis (O.G. Costa, 1839) (3, 4, 5)

Acanthonyx Latreille, 1838

Acanthonyx lunulatus (Risso, 1816) (3, 4, 5)

Anamathia S.I. Smith, 1885

Anamathia rissoana (Roux, 1828) (3, 4, 5)

Dorhynchus Wyville Thomson, 1873

Dorhynchus thomsoni Wyville Thomson, 1873 (3, 5)

Ergasticus Studer, 1883

Ergasticus clouei Studer, 1883 (3, 4, 5)

Eurynome Leach, 1814

Eurynome aspera (Pennant, 1777) (3, 4, 5)

Herbstia H. Milne Edwards, 1834

Herbstia condyliata (Fabricius, 1787) (3, 4, 5)

Inachus Weber, 1795

Inachus comunissimus Rizza, 1839 (3, 4, 5)

Inachus dorsettensis (Pennant, 1777) (3, 4, 5)

Inachus leptochirus Leach, 1817 (3, 4, 5)

Inachus parvirostris (Risso, 1816) (3, 4, 5)

Inachus phalangium (Fabricius, 1775) (3, 4, 5)

Inachus thoracicus Roux, 1830 (3, 4, 5)

Lissa Leach, 1815

Lissa chiragra (Fabricius, 1775) (3, 4, 5)

Macropodia Leach, 1814

Macropodia czerniavskii Brandt, 1880 (3, 4, 5)

Macropodia linaresi Forest & Zariquiey Alvarez, 1964 (3, 4, 5)

Macropodia longipes (A. Milne Edwards & Bouvier, 1899) (3, 4, 5)

Macropodia longirostris (Fabricius, 1775) (3, 4, 5)

Macropodia rostrata (Linnaeus, 1761) (3, 4, 5)

Maja Lamarck, 1801

Maja crispata (Risso, 1827) (3, 4, 5)

Maja goltziana d'Oliveira, 1888 (5)

Maja squinado (Herbst, 1788) (3, 4, 5)

Pisa Leach, 1814

- Pisa armata* (Latreille, 1803) (3, 4, 5)
- Pisa corallina* (Risso, 1816) (3, 4, 5)
- Pisa muscosa* (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)
- Pisa nodipes* (Leach, 1815) (3, 4, 5)
- Pisa tetraodon* (Pennant, 1777) (3, 4, 5)

Parthenopidae

Heterocripta Stimpson, 1871

- Heterocripta maltzami* Miers, 1881 (3, 4, 5)

Parthenope Weber, 1795

- Parthenope angulifrons* Latreille, 1825 (3, 4, 5)
- Parthenope expansa* (Miers, 1879) (5)
- Parthenope macrochelos* (Herbst, 1790) (3, 4, 5)
- Parthenope massena* (Roux, 1830) (3, 4, 5)

Atelecyclidae

Atelecyclus Leach, 1814

- Atelecyclus rotundatus* (Olivi, 1792) (3, 4, 5)
- Atelecyclus undecimdentatus* (Herbst, 1783) (3, 4, 5)

Cancridae

Cancer Linnaeus, 1758

- Cancer pagurus* Linnaeus, 1758 (3, 4)

Corystidae

Corystes Bosc, 1802

- Corystes cassivelaunus* (Pennant, 1777) (3, 4, 5)

Pirimelidae

Pirimela Leach, 1816

Pirimela denticulata (Montagu, 1808) (3, 4, 5)

Sirpus Gordon, 1953

Sirpus zariquieyi Gordon, 1953 (3, 4, 5)

Thiidae

Thia Leach, 1815

Thia scutellata (Fabricius, 1793) (3, 4, 5)

Geryonidae

Chaceon Manning & Holthuis, 1989

Chaceon mediterraneus Manning & Holthuis, 1989 (3)

Geryon Krøyer, 1837

Geryon longipes A. Milne Edwards, 1882 (3, 4, 5)

Paragalene Kossmann, 1878

Paragalene longicrura (Nardo, 1869) (3, 4, 5)

Zariquieyon Manning & Holthuis, 1989

Zariquieyon inflatus Manning & Holthuis, 1989 (3)

Portunidae

Bathynectes Stimpson, 1871

Bathynectes longipes (Risso, 1816) (3, 4, 5)

Bathynectes maravigna (Prestandrea, 1839) (3, 4, 5)

Callinectes Stimpson, 1860

Callinectes danae S.I. Smith, 1869 (4) (*)

Callinectes sapidus Rathbun, 1896 (3, 4, 5) (*)

Carcinus Leach, 1814

Carcinus aestuarii Nardo, 1847 (3, 4, 5)

Liocarcinus Stimpson, 1871

Liocarcinus arcuatus (Leach, 1814) (3, 4, 5)

Liocarcinus bolivari (Zariquiey Alvarez, 1948) (3, 4, 5)

Liocarcinus corrugatus (Pennant, 1777) (3, 4, 5)

Liocarcinus depurator (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Liocarcinus maculatus (Risso, 1827) (3, 4, 5)

Liocarcinus vernalis (Risso, 1827) (3, 4, 5)

Liocarcinus zariquieyi (Gordon, 1968) (3, 4, 5)

Macropipus Prestandrea, 1833

Macropipus tuberculatus (Roux, 1830) (3, 4, 5)

Polybius Leach, 1820

Polybius henslowii Leach, 1820 (3, 5)

Portumnus Leach, 1814

Portumnus latipes (Pennant, 1777) (3, 4, 5)

Portumnus pestai Forest, 1967 (4, 5)

Portunus Weber, 1793

Portunus hastatus (Linnaeus, 1767) (3, 4, 5)

Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758) (5) (*)

Thalamita Latreille, 1829

Thalamita gloriensis Crosnier, 1962 (3) (*)

Xaiva MacLeay, 1838

Xaiva biguttata (Risso, 1816) (3, 5)

Note

Callinectes danae: Originaria dell'Atlantico occidentale temperato; una sola segnalazione per la Laguna di Venezia.

Callinectes sapidus: Originaria dell'Atlantico occidentale temperato.

Portunus pelagicus: Presente in 5 solo presso Siracusa.

Thalamita gloriensis: Originaria dell'area indo-pacifica.

Goneplacidae

Goneplax Leach, 1814

Goneplax rhomboides (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Xanthidae

Eriphia Latreille, 1817

Eriphia verrucosa (Forsskål, 1775) (3, 4, 5)

Dyspanopeus Martin & Abele, 1986

Dyspanopeus sayi (S.I. Smith, 1869) (4) (*)

Monodaeus Guinot, 1967

Monodaeus couchii (Chouch, 1851) (3, 4, 5)

Monodaeus guinotae Forest, 1976 (3, 4, 5)

Paractaea Guinot, 1969

Paractaea monodi Guinot, 1969 (3, 5)

Pilumnus Leach, 1815

Pilumnus aestuarii Nardo, 1869 (4, 5)

Pilumnus hirtellus (Linnaeus, 1761) (3, 4, 5)

Pilumnus inermis A. Milne Edwards & Bouvier, 1894 (5)

Pilumnus spinifer H. Milne Edwards, 1834 (3, 4, 5)

Pilumnus villosissimus (Rafinesque, 1814) (3, 4, 5)

Xantho Leach, 1814

Xantho granulicarpus Forest, 1953 (3, 4, 5)

Xantho pilipes A. Milne Edwards, 1867 (3, 4, 5)

Xantho poressa (Olivi, 1792) (3, 4, 5)

Note

Dyspanopeus sayi: Originaria dell'Atlantico occidentale temperato; una sola segnalazione per la Laguna di Venezia.

Grapsidae

Brachynotus De Haan, 1833

Brachynotus foresti Zariquiey Alvarez, 1968 (4, 5)

Brachynotus gemmellari (Rizza, 1839) (3, 4, 5)

Brachynotus sexdentatus (Risso, 1827) (3, 4, 5)

Euchirograpsus H. Milne Edwards, 1853

Euchirograpsus liguricus H. Milne Edwards, 1853 (3)

Pachygrapsus Randall, 1840

Pachygrapsus marmoratus (Fabricius, 1787) (3, 4, 5)

Pachygrapsus maurus (Lucas, 1846) (3, 5)

Planes Bowdich, 1825

Planes minutus (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Planes testudinum (Roux, 1828) (3, 4)

Pinnotheridae

Nepinnotheres Manning, 1993

Nepinnotheres pinnotheres (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Pinnotheres Bosc, 1802

Pinnotheres marioni Gourret, 1887 (3, 4)

Pinnotheres pisum (Linnaeus, 1767) (3, 4, 5)

Potamidae

Potamon Savigny, 1816

Potamon fluviatile (Herbst, 1785)

Potamon fluviatile fluviatile (Herbst, 1785) (N, S, Si)

Ocypodidae

Ocypode Weber, 1795

Ocypode cursor (Linnaeus, 1758) (5) (*)

Note

Ocypode cursor: Presente in 5 solo a Lampedusa.

Palicidae

Palicus Philippi, 1838

Palicus caronii (Roux, 1830) (3, 4, 5)

Chilopoda

Scutigeromorpha

Scutigeridae

Scutigera Lamarck, 1801

Scutigera coleoptrata (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Lithobiomorpha

Henicopidae

Lamyctes Meinert, 1868

Lamyctes coeculus (Brölemann, 1889) (N) (*)

Lamyctes fulvicornis Meinert, 1868 (N, S) (*)

Note

Lamyctes coeculus: Specie introdotta, talora riferita al genere *Lamyctinus* Silvestri, 1909.

Lamyctes fulvicornis: Specie introdotta.

Lithobiidae

Eupolybothrus Verhoeff, 1907

Eupolybothrus excellens (Silvestri, 1894) (N) (E)

Eupolybothrus fasciatus (Newport, 1845) (N, S, Si, Sa) (E) (*)

Eupolybothrus grossipes (C.L. Koch, 1847) (N, S)

Eupolybothrus imperialis (Meinert, 1872) (S) (E)
Eupolybothrus longicornis (Risso, 1826) (N)
Eupolybothrus nudicornis (Gervais, 1837) (N, S, Si, Sa)
Eupolybothrus obrovensis (Verhoeff, 1930) (N)
Eupolybothrus tridentinus (Fanzago, 1874) (N)

Lithobius Leach, 1814

Lithobius acuminatus Brölemann, 1892 (N, S)
Lithobius aeruginosus L. Koch, 1862 (N)
Lithobius agilis C.L. Koch, 1847
 Lithobius agilis agilis C.L. Koch, 1847 (N)
 Lithobius agilis sardus Manfredi, 1956 (Sa) (E)
Lithobius alpicosiensis Matic, 1973 (N) (E)
Lithobius aostanus Verhoeff, 1934 (N) (E) (*)
Lithobius biporus Silvestri, 1894 (S) (E) (*)
Lithobius borealis Meinert, 1872 (N, Si)
Lithobius cf. burzenlandicus Verhoeff, 1931 (N, S) (*)
Lithobius calcaratus C.L. Koch, 1844 (N, S, Sa)
Lithobius cassinensis Verhoeff, 1925 (S, Si) (E)
Lithobius castaneus Newport, 1844 (N, S, Si, Sa)
Lithobius catascaphius (Verhoeff, 1937) (N) (E) (*)
Lithobius cerberulus Verhoeff, 1942 (S) (E) (*)
Lithobius cerii Verhoeff, 1937 (S, Sa) (E) (*)
Lithobius crassipes L. Koch, 1862 (N, S, Si, Sa)
Lithobius croaticus Matic & Teodoreanu, 1967 (N) (*)
Lithobius cryptobius Silvestri, 1897 (Si) (E) (*)
Lithobius dahlii Verhoeff, 1925 (N, S, Si, Sa) (E) (*)
Lithobius dentatus C.L. Koch, 1844 (N)
Lithobius doderoi Silvestri, 1908 (E)
 Lithobius doderoi aligherus Manfredi, 1953 (Sa)
 Lithobius doderoi doderoi Silvestri, 1908 (Sa)
Lithobius elbanus Verhoeff, 1931 (S) (E)
Lithobius electrinus (Verhoeff, 1937) (N) (E)
Lithobius erythrocephalus C.L. Koch, 1847 (N, S, Si, Sa) (*)
Lithobius forficatus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa) (*)
Lithobius inermis L. Koch, 1856 (Sa)
Lithobius infossus Silvestri, 1894 (S) (E) (*)
Lithobius lagrecai Matic, 1962 (Si) (E)
Lithobius lapidicola Meinert, 1872 (N, S, Si, Sa) (*)
Lithobius latro Meinert, 1872 (N)
Lithobius lucifugus L. Koch, 1862 (N)
Lithobius lusitanus Verhoeff, 1925
 Lithobius lusitanus valesiacus Verhoeff, 1935 (N)
Lithobius macilentus L. Koch, 1862 (N, S)
Lithobius melanops Newport, 1845 (N, S) (*)
Lithobius micropodus Matic, 1980 (N, S, Si, Sa)
Lithobius microps Meinert, 1868 (N, S, Sa)

Lithobius minellii Matic & Darabantu, 1971 (S) (E)
Lithobius mutabilis L. Koch, 1862 (N, S)
Lithobius muticus C.L. Koch, 1847 (N, S, Sa)
Lithobius nocellensis Verhoeff, 1943 (S) (E)
Lithobius nodulipes Latzel, 1880 (N, S)
Lithobius oligoporus Latzel, 1885 (Sa) (E)
Lithobius palmarum Verhoeff, 1934 (N) (E)
Lithobius pasquinii Matic, 1967 (S) (E)
Lithobius pelidnus Haase, 1880 (N)
Lithobius peregrinus Latzel, 1880 (N, S) (*)
Lithobius piceus L. Koch, 1862 (*)
 Lithobius piceus verhoeffi Demange, 1958 (N, S?, Sa)
Lithobius pilicornis Newport, 1844 (N, Sa)
Lithobius postspoliatus Verhoeff, 1942 (S) (E) (*)
Lithobius punctulatus C.L. Koch, 1847 (N, S)
Lithobius pygmaeus Latzel, 1880 (N)
Lithobius romanus Meinert, 1872 (S) (E)
Lithobius ruffoi Matic, 1966 (S) (E) (*)
Lithobius salicis Verhoeff, 1937 (N) (E) (*)
Lithobius sardous Silvestri, 1897 (Sa) (E)
Lithobius sbordonii Matic, 1967 (Sa) (E)
Lithobius schuleri Verhoeff, 1925 (N)
Lithobius scotophilus Latzel, 1887 (N) (E)
Lithobius separatus Verhoeff, 1943 (S) (E)
Lithobius simrothi Verhoeff, 1937 (N) (E) (*)
Lithobius sphinx (Verhoeff, 1942) (N, S) (E)
Lithobius stammeri Verhoeff, 1939 (S) (E)
Lithobius stygius Latzel, 1880 (N)
Lithobius tenebrosus Meinert, 1872 (N, S)
Lithobius tenuicornis Verhoeff, 1937 (N, S) (E)
Lithobius tricuspis Meinert, 1872 (N, S, Si, Sa)
Lithobius trinacrius Verhoeff, 1925 (Si) (E)
Lithobius troglodytes Latzel, 1886 (N?) (*)
Lithobius tylopus Latzel, 1882 (N, S)
Lithobius variegatus Leach, 1814
 Lithobius variegatus rubriceps Newport, 1845 (S, Si)
Lithobius viriatus Sselivanoff, 1878 (S)

Harpolithobius Verhoeff, 1904

Harpolithobius anodus (Latzel, 1880) (N, S)

Pleuroolithobius Verhoeff, 1899

Pleuroolithobius patriarchalis Berlese, 1894 (S, Si) (*)

Note

Eupolybothrus: Si prescinde in questa sede dalla suddivisione del genere *Eupolybothrus* in sottogeneri.

Eupolybothrus fasciatus: Per la Sicilia solo alle Isole Eolie, dov'è stato verosimilmente introdotto, così come in Sardegna.

Lithobius: Il genere *Lithobius* è qui inteso in senso lato, ad includere anche i taxa italiani che, nel corso del tempo, sono stati attribuiti ai generi (o sottogeneri) *Monotarsobius*, *Sigibius*, *Troglolithobius*. A parte alcuni vecchi taxa nominali mai riveduti criticamente né più citati nella letteratura più recente, se non come 'puri nomi', irriconoscibili sono anche *Monotarsobius grafittii* Restivo de Miranda, 1976 e *L. microps calcaribus* Verhoeff, 1943.

Lithobius aostanus: Specie di identità incerta. Probabilmente identica a *L. nodulipes* Latzel, 1880.

Lithobius biporus: Taxon nominale di incerta identità, che richiederebbe una revisione. Probabilmente descritto su esemplari immaturi di *L. lapidicola*.

Lithobius cf. burzenlandicus: Probabilmente conspecifici con *L. burzenlandicus*, specie mai esplicitamente citata sotto questo nome per la fauna italiana, sono i due taxa nominali *L. gridellii* Manfredi, 1957 e *L. veronensis* Matic & Darabantzu, 1971 (cfr. Zapparoli, 1989 - I Chilopodi delle Alpi sud-orientali. *Biogeographia*, n.s., 13 (1987): 553-585).

Lithobius catascaphius: Taxon nominale di incerta identità, che richiederebbe una revisione.

Lithobius cerberulus: Taxon nominale di incerta identità, che richiederebbe una revisione. Noto solo dall'isola d'Ischia.

Lithobius cerii: Taxon nominale di incerta identità, che richiederebbe una revisione. In S, solo a Capri.

Lithobius croaticus: Taxon nominale molto simile a *L. tenebrosus* Meinert, 1872. È necessario un approfondimento per accertarne la validità.

Lithobius cryptobius: Forse identico a *L. dahlii* Verhoeff, 1925, su cui avrebbe priorità.

Lithobius dahlii: Forse sinonimo di *L. infossus* Silvestri, 1894 e anche di *L. cryptobius* Silvestri, 1897, due taxa nominali che avrebbero entrambi priorità sulla specie di Verhoeff. A N è noto solo da Veggiano (Padova), dove con ogni probabilità è stato introdotto.

Lithobius erythrocephalus: Per la Sicilia, solo alle Egadi.

Lithobius forficatus: Per la Sicilia, solo a Vulcano, Lipari e Lampedusa.

Lithobius infossus: Forse identico a *L. dahlii* Verhoeff, 1925, su cui avrebbe priorità.

Lithobius lapidicola: A questa specie vanno forse attribuiti i reperti italiani riportati in letteratura sotto il nome di *L. pusillus* Latzel, 1880.

Lithobius melanops: Incerti sono l'identità e lo status del taxon nominale *L. melanops domusnovae* Restivo de Miranda, 1976 (Sardegna).

Lithobius peregrinus: Tutti i reperti dall'Italia settentrionale si riferiscono con ogni probabilità a popolazioni introdotte.

Lithobius piceus: I reperti dal S (Toscana) potrebbero in realtà riferirsi a *L. romanus* Meinert, 1872. La sottospecie nominale *L. p. piceus* L. Koch, 1862(=*L. p. gracilitarsis* Brölemann, 1898) è probabilmente estranea alla fauna italiana; unica eccezione sarebbero alcuni esemplari del Naturhistorisches Museum Wien (coll. Attems), esaminati da uno di noi (MZ) e cartellinati "S. Stefano" (di Cadore?).

Lithobius postspoliatus: Taxon nominale di incerta identità, che richiederebbe una revisione. La specie è stata apparentemente descritta sulla base di una sola femmina, forse con spinulazione aberrante. Potrebbe forse essere un *L. tylopus* Latzel, 1882, ma l'ipotesi va verificata.

Lithobius ruffoi: La specie non sembra ben differenziata rispetto a *L. tylopus* Latzel, 1882.

Lithobius salicis: Specie di valore incerto.

Lithobius simrothi: Taxon molto prossimo a *L. tenebrosus* Meinert, 1872 e, forse, da questo non distinto a livello specifico.

Lithobius troglodytes: I reperti italiani riferiti finora a questa specie meritano conferma.

Pleurolithobius patriarchalis: Per la Sicilia, solo alle Egadi, forse introdotto.

Scolopendromorpha

Scolopendridae

Scolopendra Linnaeus, 1758

Scolopendra canidens Newport, 1844 (Si) (*)

Scolopendra cingulata Latreille, 1829 (N, S, Si)

Scolopendra oraniensis Lucas, 1846 (S, Si, Sa)

Note

Scolopendra canidens: Solo alle Pelagie e, probabilmente, solo a Lampedusa.

Cryptopidae

Plutonium Cavanna, 1881

Plutonium zwierleinii Cavanna, 1881 (S, Si, Sa)

Theatops Newport, 1844

Theatops erythrocephala (C.L. Koch, 1847) (N?)

Cryptops Leach, 1814

Cryptops anomalans Newport, 1844 (N, S, Si)

Cryptops croaticus Verhoeff, 1931 (N, S)

Cryptops garganensis Verhoeff, 1934 (S) (E)

Cryptops hortensis Leach, 1815 (N, S, Si, Sa)

Cryptops illyricus Verhoeff, 1933 (N, S)

Cryptops lobatus Verhoeff, 1931 (N)

Cryptops parisi Brölemann, 1920 (N, S)

Cryptops punicus (Silvestri, 1896) (S, Si, Sa) (*)

Cryptops trisulcatus Brölemann, 1902 (S, Si, Sa)

Cryptops umbricus Verhoeff, 1931 (N, S)

Note

Theatops: La presenza di questo genere entro i confini italiani richiede conferma.

Cryptops: Per l'Italia sono state citate altre due specie di questo genere, ma riteniamo opportuno escluderle da questa lista: *C. rucneri* Matic, 1967 potrebbe essere un sinonimo di *C. parisi* ed alla stessa specie potrebbe essere riferito il reperto dal Lazio di *C. sublitoralis* Verhoeff, 1931.

Cryptops punicus: Per il S, solo a Montecristo.

Geophilomorpha

Mecistocephalidae

Dicellogophilus Cook, 1896

Dicellogophilus carniolensis (C.L. Koch, 1847) (N)

Himantariidae

Himantarium C.L. Koch, 1847

Himantarium gabrielis (Linnaeus, 1767) (N, S, Si, Sa)

Himantarium mediterraneum (Meinert, 1870) (Si, Sa)

Stigmatogaster Latzel, 1880

Stigmatogaster dimidiatus (Meinert, 1870)

Stigmatogaster dimidiatus dimidiatus (Meinert, 1870) (N, S, Si)

Stigmatogaster dimidiatus sardous Verhoeff, 1901 (Sa) (E)

Stigmatogaster gracilis (Meinert, 1870) (N, S, Si, Sa)

Stigmatogaster superbus (Meinert, 1870) (Si, Sa)

Dignathodontidae

Dignathodon Meinert, 1870

Dignathodon microcephalus (Lucas, 1846) (N, S, Si, Sa)

Henia (Henia) C.L. Koch, 1847

Henia (Henia) attemsi Verhoeff, 1928 (N) (*)

Henia (Henia) illyrica (Meinert, 1870) (N)

Henia (Henia) pulchella (Meinert, 1870) (Si)

Henia (Scotophilus) Meinert, 1870

Henia (Scotophilus) bicarinata (Meinert, 1870) (N, S, Si, Sa)

Henia (Pseudochaetechelyne) Minelli, 1982

Henia (Pseudochaetechelyne) brevis (Silvestri, 1896) (N, S, Si, Sa) (*)

Henia (Chaetechelyne) Meinert, 1870

Henia (Chaetechelyne) montana Meinert, 1870 (N, S)

Henia (Chaetechelyne) vesuviana (Newport, 1845) (N, S, Si, Sa)

Note

Henia (Henia) attemsi: Specie di incerta validità.

Henia (Pseudochaetechelyne) brevis: Per la Sicilia, solo a Pantelleria. Potrebbe risultare endemica, se le popolazioni francesi e britanniche di questo gruppo (relativamente polipode, rispetto a quelle italiane) fossero da riferire ad un'entità distinta, come sospettiamo.

Henia (Chaetechelyne): Altri tre taxa nominali riferibili a questo sottogenere (vittata Verhoeff, 1943; grisea Verhoeff, 1942; sorattina Verhoeff, 1951) sono molto probabilmente sinonimi dell'una o dell'altra delle due specie accettate come valide in questa lista.

Schendylidae

Hydroschendyla Brölemann & Ribaut, 1911

Hydroschendyla submarina (Grube, 1872) (S, Si, Sa) (*)

Haploschendyla Verhoeff, 1900

Haploschendyla barbarica (Meinert, 1870) (Si?)

Nannophilus Cook, 1896

Nannophilus eximius (Meinert, 1870) (S, Si)

Schendyla Bergsoe & Meinert, 1866

Schendyla apenninorum Brölemann & Ribaut, 1911 (S) (E)

Schendyla armata (Brölemann, 1901) (N, Sa)

Schendyla carniolensis Verhoeff, 1902 (N, S)

Schendyla mediterranea Silvestri, 1897 (S, Si, Sa)

Schendyla monoeci Brölemann, 1904 (N?)

Schendyla montana (Attems, 1895) (N, S, Si)

Schendyla nemorensis (C.L. Koch, 1836) (N, S, Si, Sa)

Note

Hydroschendyla submarina: Per la Sicilia, solo a Lipari.

Schendyla: La distribuzione in generi delle specie europee finora attribuite a *Schendyla* Bergsoe & Meinert, 1866 (con i sottogeneri *Schendyla* Bergsoe & Meinert, 1866 ed *Echinoschendyla* Brölemann & Ribaut, 1912) oppure a *Brachyschendyla* Brölemann & Ribaut, 1911 (con i sottogeneri *Schizoschendyla* Brölemann & Ribaut, 1912, *Astenoschendyla* Brölemann, 1930, *Brachyschendyla* Brölemann & Ribaut, 1911 e *Microschendyla* Brölemann & Ribaut, 1912) richiede revisione. Taxa di dubbia validità sono *S. aternana* Verhoeff, 1934, *S. gracillima* Verhoeff, 1934 (nota solo dalle isole di Zannone e Ischia, S) *S. tessellata* Verhoeff, 1943 (nota solo dall'isola di Capri, S) e *S. viridis* Verhoeff, 1951.

Geophilidae

Pachymerium C.L. Koch, 1847

Pachymerium ferrugineum (C.L. Koch, 1835) (N, S, Si, Sa)

Gnathoribautia Brölemann, 1909

Gnathoribautia bonensis (Meinert, 1870) (Si)

Clinopodes C.L. Koch, 1847

Clinopodes flavidus C.L. Koch, 1847 (N, S, Si)

Clinopodes trebevicensis (Verhoeff, 1898) (N, S)

Geophilus Leach, 1814

Geophilus abbreviatus Verhoeff, 1925 (N, S, Si, Sa)

Geophilus aragonicus Daday, 1890 (S) (*)

Geophilus carpophagus Leach, 1815 (N, S, Si, Sa)

Geophilus electricus (Linnaeus, 1758) (N)

Geophilus flavus (DeGeer, 1778) (N, S?, Si?, Sa)

Geophilus fucorum Brölemann, 1909 (N, Sa)

Geophilus guanophilus Verhoeff, 1939 (S) (E) (*)

Geophilus insculptus Attems, 1895 (N, S, Si, Sa) (*)

Geophilus linearis C.L. Koch, 1835 (N, S, Sa)

Geophilus minimus Verhoeff, 1928 (N, S, Sa) (E) (*)

Geophilus oligopus Attems, 1895 (N)

Geophilus osquidatum Brölemann, 1909 (N, S, Si, Sa) (*)

Geophilus piae Minelli, 1983 (S, Sa) (E) (*)

Geophilus pygmaeus Latzel, 1880 (N)

Geophilus poseidonis Verhoeff, 1901 (N, S, Si, Sa)

Geophilus richardi (Brölemann, 1904) (N, S, Si, Sa)

Geophilus romanus Silvestri, 1896 (N, S, Sa) (E)

Geophilus ruinarum Verhoeff, 1931 (S) (E) (*)

Geophilus sinonius Manfredi, 1953 (S) (E) (*)

Geophilus sorrentinus Attems, 1903 (S) (E)

Geophilus truncorum Bergsoe & Meinert, 1866 (S, Si)

Chalandea Brölemann, 1909

Chalandea pinguis (Brölemann, 1898) (N)

Pleurogeophilus Verhoeff, 1901

Pleurogeophilus mediterraneus (Meinert, 1870) (N)

Acanthogeophilus Minelli, 1983

Acanthogeophilus dentifer Minelli, 1983 (N, S) (E)

Note

Pachymerium: Riteniamo inattendibile la presenza in Italia di *P. tristanicum* Attems, 1928; la citazione potrebbe in realtà riferirsi a *Geophilus flavus* (Degeer, 1778). In ogni caso, la stessa validità del taxon di Attems richiede una verifica.

Geophilus: Taxa di incerta identità sono *G. aenariensis* Verhoeff, 1943, *G. aragonicus* Daday, 1890, *G. cispadanus* Silvestri, 1896, *G. orae* Verhoeff, 1943, *G. taorminensis* Verhoeff, 1928.

Geophilus aragonicus: Specie (e segnalazione) da verificare.

Geophilus guanophilus: La separazione di questa specie da *G. truncorum* richiede una riconferma.

Geophilus insculptus: Rientrano probabilmente in *G. insculptus* (cf. Minelli, 1978) anche i taxa seguenti: *aetnensis* Verhoeff, 1928, *bluncki* Verhoeff, 1928, *glacialis* Verhoeff, 1928, *gavoyi* Chalande, 1910, *henroti* Manfredi, 1956, *vinciguerrae* Silvestri, 1895.

Geophilus minimus: In S, solo a Giannutri.

Geophilus osquidatum: *G. frigidanus* Verhoeff, 1928 e, forse, anche *G. joyeuxi* Brölemann, 1903 (che avrebbe priorità su *G. osquidatum* Brölemann, 1909) sono forse sinonimi di questa specie.

Geophilus piae: Per il S, solo a Giannutri.

Geophilus ruinarum: L'identità di questa specie richiede verifiche.

Geophilus sinonius: Specie endemica dell'Isola di Zannone. I suoi rapporti con *G. truncorum* Bergsøe & Meinert, 1866 sono da rivedere.

Chalandea: La sinonimia di *Mesogeophilus baldensis* Verhoeff, 1901, specie tipo del genere *Mesogeophilus* Verhoeff, 1901, con *Geophilus pinguis* Brölemann, 1898, specie tipo del genere *Chalandea* Brölemann, 1909, comporterebbe naturalmente la sinonimia dei due generi nominali, con priorità di *Mesogeophilus* su *Chalandea*. Tuttavia, mentre quest'ultimo nome generico ha sempre goduto di un'interpretazione non ambigua ed ha per *typus generis* una specie nominale ben conosciuta, altrettanto non può dirsi per *Mesogeophilus*. Della specie su cui questo nome generico fu fondata da Verhoeff, 1901, infatti, non si conoscerebbe che il tipo da tempo perduto; e le altre specie successivamente attribuite a *Mesogeophilus* non sono certo congeneriche con esso (cioè con *Geophilus pinguis*, specie tipo di *Chalandea*). Pare quindi opportuno conservare l'uso corrente, attraverso la fissazione di un nuovo e opportuno *typus generis* per *Mesogeophilus*. Un'applicazione in tal senso viene sottoposta all'International Commission on Zoological Nomenclature.

Pleurogeophilus: Attems (1949) citava da Gorizia *Pleurogeophilus gorizensis* (Latzel, 1880), ma probabilmente si tratta di una semplice imprecisa citazione della località tipica (Slovenia:

Selva di Tarnova). L'identità della specie, peraltro, è dubbia. Si tratta probabilmente di un Clinopodes.

Linotaeniidae

Strigamia Gray, 1843

Strigamia acuminata (Leach, 1815) (N, S, Si)

Strigamia cottiana (Verhoeff, 1935) (N) (E)

Strigamia crassipes (C.L. Koch, 1835) (N, S)

Strigamia engadina (Verhoeff, 1935) (N, S)

Strigamia transsilvanica (Verhoeff, 1928) (N)

Diplopoda

Polyxenida

Polyxenidae

Polyxenus Latreille, 1803

Polyxenus lagurus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)

Polyxenus lapidicola Silvestri, 1903 (S) (*)

Note

Polyxenus lapidicola: Restano da chiarire i rapporti fra questa specie e *P. macedonicus* Verhoeff, 1952.

Lophoproctidae

Lophoproctus Pocock, 1894

Lophoproctus coecus Pocok, 1894 (S, Sa)

Lophoproctus jeanneli (Brölemann, 1910) (S) (*)

Lophoproctus lucidus (Chalande, 1888) (N, S, Si)

Lophoproctinus Silvestri, 1948

Lophoproctinus inferus (Silvestri, 1903) (S)

Note

Lophoproctus jeanneli: Il materiale italiano è stato in parte riferito a *L. litoralis* Verhoeff, 1952. Questa specie nominale, però, è scarsamente caratterizzata rispetto a *L. jeanneli*, meritando tutt'al più un riconoscimento a livello di sottospecie. Il gruppo, in ogni caso, richiede un'attenta revisione.

Glomerida

Glomeridellidae

Glomeridella Brölemann, 1895

Glomeridella friulana Strasser, 1937 (N) (E)

Glomeridella larii Verhoeff, 1912 (N) (E)

Glomeridella minima (Latzel, 1884) (N)

Glomeridae

Glomerellina Silvestri, 1908

Glomerellina laurae Silvestri, 1908 (S, Si) (E)

Eupeyerimhoffia Brölemann, 1913

Eupeyerimhoffia archimedis (Strasser, 1965) (Si) (E)

Glomeris Latreille, 1803

Glomeris albidonigra Strasser, 1977 (S) (E)

Glomeris aurita C.L. Koch, 1847 (N)

Glomeris cingulata C.L. Koch, 1847 (N)

Glomeris connexa C.L. Koch, 1847 (N, S)

Glomeris conspersa C.L. Koch, 1847 (N, S)

Glomeris dionysii Strasser, 1961 (Si) (E) (*)

Glomeris distichella Berlese, 1887 (Si) (*)

Glomeris dorsosanguine Verhoeff, 1906 (N) (E)

Glomeris euganeorum Verhoeff, 1926 (N) (E)

Glomeris genuensis Latzel, 1886 (N) (E)

Glomeris helvetica Verhoeff, 1894 (N)

Glomeris hexasticha Brandt, 1833 (N)

Glomeris inferorum Latzel, 1889 (N) (E)

Glomeris iudicaria Verhoeff, 1936 (N) (E)

Glomeris larii Verhoeff, 1921 (N) (E)

Glomeris ligurica Latzel, 1886 (N, S) (E)

Glomeris longaronensis Verhoeff, 1930 (N) (E)

Glomeris lunatosignata A. Costa, 1884 (Sa) (E)

Glomeris marginata (Villers, 1789) (N)
Glomeris ornata C.L. Koch, 1847 (N)
Glomeris oropensis Verhoeff, 1936 (N) (E)
Glomeris primordialis Verhoeff, 1930 (N) (E)
Glomeris pulchra C.L. Koch, 1847 (N, S)
Glomeris pustulata Fabricius, 1781 (N)
Glomeris quadrifasciata C.L. Koch, 1847 (N)
Glomeris romana Verhoeff, 1900 (N, S) (E)
Glomeris sanguicolor Verhoeff, 1909 (N) (E)
Glomeris schubarti Verhoeff, 1931 (N) (E)
Glomeris solis Verhoeff, 1934 (N) (E)
Glomeris stammeri Verhoeff, 1939 (S) (E)
Glomeris strasseri Verhoeff, 1929 (N) (E)
Glomeris transalpina C.L. Koch, 1836 (N)
Glomeris undulata C.L. Koch, 1844 (N)
Glomeris verhoeffi Brölemann, 1924 (N, S)

Spelaeoglomeris Silvestri, 1908

Spelaeoglomeris andreinii Silvestri, 1922 (N) (*)

Strasseria Verhoeff, 1929

Strasseria mirabilis Verhoeff, 1929 (N) (*)

Geoglomeris Verhoeff, 1908

Geoglomeris duboscqui Brölemann, 1913 (Sa)
Geoglomeris etrusca Mauriès, 1984 (S) (E)
Geoglomeris pertosae Manfredi, 1953 (S) (E)

Haploglomeris Verhoeff, 1906

Haploglomeris multistriata (C.L. Koch, 1844) (N)

Onychoglomeris Verhoeff, 1906

Onychoglomeris castanea (Risso, 1826) (N)
Onychoglomeris fagi Verhoeff, 1930 (N) (E)
Onychoglomeris ferraniensis Verhoeff, 1909 (N) (E)
Onychoglomeris tyrolensis (Latzel, 1884) (N)

Note

Glomeris: Prescindo qui dalla tradizionale suddivisione in sottogeneri: *Eurypleuromeris* Verhoeff, 1909 e *Stenopleuromeris* Verhoeff, 1909 vengono qui considerati sinonimi di *Glomeris* Latreille, 1802/3.
Glomeris dionysii: Tradizionalmente ascritta al genere *Sicilomeris* Strasser, 1961.

Glomeris distichella: Oltre che in Si, è presente solo a Malta.

Spelaeoglomeris andreinii: Stando alla letteratura, la specie sarebbe endemica italiana, ma probabilmente (Mauriès, 1966) ne è sinonimo *S. alpina* Brölemann, 1913) delle Alpi Marittime francesi.

Strasseria mirabilis: Nota esclusivamente da due grotte sul confine italo-sloveno.

Trachysphaeridae

Doderia Silvestri, 1904

Doderia elbana Verhoeff, 1930 (S) (E)

Doderia genuensis Silvestri, 1904 (N)

Doderia lanzai Ceuca, 1974 (S) (E)

Doderia tyrrhena Verhoeff, 1943 (S) (E)

Trachysphaera Heller, 1858

Trachysphaera apenninorum (Verhoeff, 1908) (N, S, Si) (E)

Trachysphaera cultrifera (Verhoeff, 1906) (N?, S) (E)

Trachysphaera fabbrii (Verhoeff, 1929) (N) (E)

Trachysphaera gasparoi Strasser, 1981 (N) (E)

Trachysphaera ligurina (Manfredi, 1953) (N) (E) (*)

Trachysphaera ormeana (Verhoeff, 1930) (N) (E)

Trachysphaera schmidtii Heller, 1858 (N)

Trachysphaera varallensis (Verhoeff, 1936) (N) (E)

Note

Trachysphaera ligurina: Specie di incerta validità.

Platydesmida

Andrognathidae

Dolistenus Fanzago, 1874

Dolistenus humicola (Verhoeff, 1926) (N) (E)

Dolistenus savii Fanzago, 1874 (S, Si)

Fioria Silvestri, 1898

Fioria tuberculata Silvestri, 1898 (N)

Polyzoniida

Polyzoniidae

Polyzonium Brandt, 1837

Polyzonium eburneum Verhoeff, 1907

Polyzonium eburneum cadoricum Verhoeff, 1930 (N)

Polyzonium germanicum Brandt, 1837 (N, S)

Hirudisomatidae

Hirudisoma Fanzago, 1881

Hirudisoma equiseti Verhoeff, 1930 (N) (E)

Hirudisoma pallidum (Fanzago, 1874) (N, S) (E)

Hirudisoma trivittatum Verhoeff, 1930 (N, S) (E)

Callipodida

Callipodidae

Callipus Risso, 1826

Callipus foetidissimus (Savi, 1819) (*)

Callipus foetidissimus foetidissimus (Savi, 1819) (N, S?)

Callipus foetidissimus sorrentinus Verhoeff, 1910 (S, Si?, Sa)

Callipus hamuliger Verhoeff, 1901 (Sa) (E)

Callipus piroddai Strasser, 1974 (Sa) (E)

Sardopus Strasser, 1974

Sardopus malleiger Strasser, 1974 (Sa) (E)

Note

Callipus foetidissimus: Questo complesso gruppo di forme, in cui in particolare non è ancora chiaro se a foetidissimus e sorrentinus debba essere riconosciuto rango di specie o di sottospecie, è attualmente in corso di revisione da parte di M. Di Giovanni.

Schizopetalidae

Callipodella Verhoeff, 1900

Callipodella vinciguerrae (Silvestri, 1894) (S) (E)

Dischizopetalum Verhoeff, 1900

Dischizopetalum illyricum (Latzel, 1884) (N)

Prolysiopetalum Verhoeff, 1909

Prolysiopetalum apulicum (Verhoeff, 1905) (S) (E)

Acanthopetalum Verhoeff, 1900

Acanthopetalum sicanum (Berlese, 1883) (N, S, Si) (*)

Note

Acanthopetalum sicanum: A N solo presso Trieste.

Chordeumatida

Neoatractosomatidae

***Neoatractosoma* (*Neoatractosoma*)** Silvestri, 1898

Neoatractosoma (*Neoatractosoma*) *kleinenbergi* Silvestri, 1898 (Si) (E)

Neoatractosoma (*Neoatractosoma*) *strandi* Attems, 1927 (S) (E)

Pseudocraspedosoma Silvestri, 1898

Pseudocraspedosoma alpivagum (Verhoeff, 1901) (N) (E)

Pseudocraspedosoma bensai (Manfredi, 1935) (N) (E)

Pseudocraspedosoma brentanum (Verhoeff, 1930) (N) (E)

Pseudocraspedosoma falteronense (Manfredi, 1951) (N) (E)

Pseudocraspedosoma grypischium (Rothenbühler, 1900) (N, S?)

Pseudocraspedosoma nemorense Silvestri, 1898 (S) (E)

Pseudocraspedosoma peniculorum (Verhoeff, 1910) (N) (E)

Pseudocraspedosoma vestonense (Verhoeff, 1934) (N) (E)

Trimerophorella Verhoeff, 1902

Trimerophorella paradisica Meyer, 1983 (N) (E)

Trimerophorella rhaetica (Rothenbühler, 1901) (N)

Osellasoma Mauriès, 1984

Osellasoma caoduroi Mauriès, 1984 (N) (E)

Mastigophorophyllidae

***Mastigona* (*Mastigona*)** Cook, 1895

Mastigona (*Mastigona*) *mutabilis* (Latzel, 1884) (N)

***Mastigona* (*Xiphochaetoporatia*)** Verhoeff, 1897

Mastigona (*Xiphochaetoporatia*) *bosniensis* (Verhoeff, 1897) (N)

Haploporatia Verhoeff, 1897

Haploporatia *carniolensis* (Verhoeff, 1897) (N)

Haploporatia *similis* (Attems, 1898) (N)

***Thaumaporatia* (*Thaumaporatia*)** Verhoeff, 1900

Thaumaporatia (*Thaumaporatia*) *apenninorum* Verhoeff, 1909 (N) (E)

Thaumaporatia (*Thaumaporatia*) *apuana* Verhoeff, 1909 (S) (E)

Thaumaporatia (*Thaumaporatia*) *plumigera* (Verhoeff, 1900) (S) (E)

Thaumaporatia (*Thaumaporatia*) *sorattina* Verhoeff, 1951 (S) (E)

***Thaumaporatia* (*Cervosoma*)** Verhoeff, 1936

Thaumaporatia (*Cervosoma*) *oropensis* Verhoeff, 1936 (N) (E)

Tessinosoma Verhoeff, 1911

Tessinosoma *caelebs* Verhoeff, 1911 (N)

Taurinosoma Verhoeff, 1932

Taurinosoma *graniticola* Verhoeff, 1932 (N) (E)

Haaseidae

Haasea Verhoeff, 1895

Haasea *flavescens* (Latzel, 1884) (N)

Haasea *fonticulorum* (Verhoeff, 1910) (N)

Haasea *musimontium* Strasser, 1937 (N) (E)

Verhoeffiidae

Haplogona Cook, 1895

- Haplogona gestroi* (Silvestri, 1898) (N) (E)
- Haplogona oculodistincta* (Verhoeff, 1893) (N)
- Haplogona rothenbuehleri* (Verhoeff, 1900) (N)

Attemsiidae

Attemsia Verhoeff, 1895

- Attemsia dolinensis* Verhoeff, 1910 (N)

Schubartia Verhoeff, 1927

- Schubartia lohmanderi* Verhoeff, 1927 (N?)

Craspedosomatidae

Craspedosoma Leach, 1814

- Craspedosoma brentanum* Verhoeff, 1926 (N) (E)
- Craspedosoma doranum* Verhoeff, 1932 (N) (E)
- Craspedosoma fontanellum* Attems, 1927 (N) (E)
- Craspedosoma furculigerum* Verhoeff, 1936 (N) (E)
- Craspedosoma grassii* Silvestri, 1898 (N, S) (E)
- Craspedosoma italicum* Silvestri, 1901 (N) (E)
- Craspedosoma oropense* Verhoeff, 1936 (N) (E)
- Craspedosoma rawlinsii* Leach, 1814 (N) (*)
- Craspedosoma ruborum* Verhoeff, 1930 (N) (E)
- Craspedosoma slavum* Attems, 1929 (N)
- Craspedosoma taurinorum* Silvestri, 1898 (N)
- Craspedosoma vallicola* Silvestri, 1898 (N) (E)

Bergamosoma Hoffman, 1979

- Bergamosoma bergomatium* (Verhoeff, 1925) (N) (E) (*)
- Bergamosoma canestrinii* (Fedrizzi, 1877) (N) (*)
- Bergamosoma grottoloi* (Strasser, 1973) (N) (E)
- Bergamosoma hessei* (Verhoeff, 1931) (N) (E)

Pterygophorosoma Verhoeff, 1897

- Pterygophorosoma alticola* (Verhoeff, 1894) (N)
- Pterygophorosoma cornuigerum* Verhoeff, 1900 (N) (E)

Pyrgocyphosoma Verhoeff, 1910

Pyrgocyphosoma apenninorum Verhoeff, 1921 (N) (E)
Pyrgocyphosoma armigerum Verhoeff, 1925 (N) (E)
Pyrgocyphosoma brunatense (Verhoeff, 1900) (N) (E)
Pyrgocyphosoma centrale (Silvestri, 1898) (N) (E)
Pyrgocyphosoma dalmazzense Verhoeff, 1930 (N)
Pyrgocyphosoma dentatum (Brölemann, 1892) (N) (E) (*)
Pyrgocyphosoma doriae (Silvestri, 1898) (N)
Pyrgocyphosoma florentinum (Silvestri, 1903) (S) (E)
Pyrgocyphosoma fonticuli Verhoeff, 1936 (N) (E)
Pyrgocyphosoma levicanum (Fedrizzi, 1878) (N) (E)
Pyrgocyphosoma ligusticum (Silvestri, 1898) (N) (E)
Pyrgocyphosoma mevaniense (Silvestri, 1898) (S) (E)
Pyrgocyphosoma oppidicola (Silvestri, 1898) (S) (E) (*)
Pyrgocyphosoma picenum Manfredi, 1953 (S) (E)
Pyrgocyphosoma pontremolense Verhoeff, 1936 (S) (E)
Pyrgocyphosoma pracchiense Verhoeff, 1932 (S) (E)
Pyrgocyphosoma renanum Verhoeff, 1932 (S) (E)
Pyrgocyphosoma roccavionense Verhoeff, 1937 (N) (E)
Pyrgocyphosoma savonense Verhoeff, 1910 (N) (E)
Pyrgocyphosoma serpentinum Verhoeff, 1932 (N) (E)
Pyrgocyphosoma serravallense Verhoeff, 1936 (N) (E)
Pyrgocyphosoma tridentinum (Silvestri, 1898) (N) (E)
Pyrgocyphosoma trilobum (Silvestri, 1903) (N) (E)
Pyrgocyphosoma vallombrosae (Silvestri, 1898) (S) (E)
Pyrgocyphosoma vittigerum (Verhoeff, 1900) (S) (E)
Pyrgocyphosoma zangherii Manfredi, 1951 (N) (E)

***Julogona* Cook, 1896**

Julogona apenninorum (Verhoeff, 1913) (N, S?)
Julogona hamuligera (Verhoeff, 1913) (N) (E)
Julogona ligurina (Verhoeff, 1910) (N) (E)
Julogona tirolensis (Verhoeff, 1894) (N)

***Aspromontia* Strasser, 1970**

Aspromontia ruffoi Strasser, 1970 (S) (E)

***Atractosoma* (*Atractosoma*) Fanzago, 1876**

Atractosoma (*Atractosoma*) *meridionale* Fanzago, 1876 (N)

***Atractosoma* (*Calatractosoma*) Verhoeff, 1900**

Atractosoma (*Calatractosoma*) *gibberosum* Verhoeff, 1900 (N)

***Atractosoma* (*Lessinosoma*) Strasser, 1977**

Atractosoma (Lessinosoma) ghidinii (Manfredi, 1935) (E)
Atractosoma (Lessinosoma) ghidinii ghidinii (Manfredi, 1935) (N)
Atractosoma (Lessinosoma) ghidinii manivae (Strasser, 1973) (N)
Atractosoma (Lessinosoma) paolettii Strasser, 1977 (N) (E)

Atractosoma (subgg.?)

Atractosoma (subgg.?) abnorme Verhoeff, 1900 (S) (E)
Atractosoma (subgg.?) blechnorum Verhoeff, 1936 (N) (E)
Atractosoma (subgg.?) cavannae Silvestri, 1898 (S) (E)
Atractosoma (subgg.?) cecconii Silvestri, 1898 (N, S) (E)
Atractosoma (subgg.?) confine Berlese, 1895 (N, S) (E)
Atractosoma (subgg.?) divaricatum Strasser, 1981 (E)
Atractosoma (subgg.?) divaricatum divaricatum Strasser, 1981 (S)
Atractosoma (subgg.?) divaricatum lethes Strasser, 1981 (S)
Atractosoma (subgg.?) marinense Verhoeff, 1932 (N) (E)
Atractosoma (subgg.?) ruffoi Manfredi, 1940 (N) (E)
Atractosoma (subgg.?) troglobium Manfredi, 1930 (N) (E)

***Bomogona (Bomogona)* Cook, 1895**

Bomogona (Bomogona) lombardica (Brölemann, 1892)
Bomogona (Bomogona) lombardica lombardica (Brölemann, 1892) (N)
Bomogona (Bomogona) lombardica larii (Verhoeff, 1921) (N) (E)

***Bomogona (Ornithogona)* Cook, 1896**

Bomogona (Ornithogona) helvetica (Verhoeff, 1894) (N)

***Brentosoma* Verhoeff, 1932**

Brentosoma nivale Verhoeff, 1932 (N) (E)

***Carniosoma* Verhoeff, 1927**

Carniosoma verhoeffi (Attems, 1927) (N)

***Autaretia* Strasser, 1978**

Autaretia osellai Strasser, 1978 (N) (E)

***Crossosoma* Ribaut, 1913**

Crossosoma casalei Strasser, 1979 (N) (E)
Crossosoma cavernicola (Manfredi, 1951) (N) (E)
Crossosoma falciferum Strasser, 1975 (E)
Crossosoma falciferum falciferum Strasser, 1975 (N)

Crossosoma falciferum uncinatum Strasser, 1979 (N)
Crossosoma fossum Strasser, 1979 (N) (E)
Crossosoma mauriesi Strasser, 1970 (N) (E)
Crossosoma parvum Strasser, 1979 (N) (E)
Crossosoma phantasma Strasser, 1970 (N) (E)
Crossosoma semipes (Strasser, 1958) (E)
Crossosoma semipes semipes (Strasser, 1958) (N)
Crossosoma semipes globosum Strasser, 1970 (N)

Dactylophorosoma Verhoeff, 1900

Dactylophorosoma albocarinatum Manfredi, 1940 (N) (E)
Dactylophorosoma nivisatelles Verhoeff, 1900 (N)

Nanogona Cook, 1895

Nanogona polydesmoides (Leach, 1814)
Nanogona polydesmoides italica (Manfredi, 1931) (N) (E)

Janetschekella Schubart, 1954

Janetschekella valesiaca (Faës, 1902) (N)

Litogona Silvestri, 1897

Litogona hyalops (Latzel, 1889) (N) (E)
Litogona mirabilis (Manfredi, 1948) (N) (E)

Manfredia Verhoeff, 1940

Manfredia aemiliana (Manfredi, 1932) (N) (E)
Manfredia apuana Strasser, 1971 (S) (E)
Manfredia concii Manfredi, 1953 (S) (E)
Manfredia guareschii Manfredi, 1950 (N) (E)
Manfredia lanzai Manfredi, 1948 (S) (E)

Ochogona Cook, 1895

Ochogona brentana (Verhoeff, 1927) (N)
Ochogona euganeorum (Verhoeff, 1927) (N) (E)
Ochogona friulana (Strasser, 1937) (N)
Ochogona gallitarum (Brölemann, 1900) (N)

Oroposoma Verhoeff, 1936

Oroposoma catascaphium Verhoeff, 1936 (N) (E)
Oroposoma emiliae Manfredi, 1953 (N) (E)
Oroposoma fagorum Verhoeff, 1936 (N) (E)

Oroposoma granitivagum Verhoeff, 1936 (N)
Oroposoma varallense Verhoeff, 1936 (N) (E)

Paradactylophorosoma Attems, 1908

Paradactylophorosoma insulanum Attems, 1908 (S) (E)

Plectogona (Plectogona) Silvestri, 1897

Plectogona (Plectogona) angusta (Latzel, 1887) (N) (E)
Plectogona (Plectogona) bonzanoi (Strasser, 1975) (N) (E)
Plectogona (Plectogona) morisii (Strasser, 1975) (N) (E)
Plectogona (Plectogona) sanfilippoi (Manfredi, 1956) (E)
 Plectogona (Plectogona) sanfilippoi bosseae (Strasser, 1975) (N)
 Plectogona (Plectogona) sanfilippoi digheae (Strasser, 1979) (N)
 Plectogona (Plectogona) sanfilippoi dronerae (Strasser, 1975) (N)
 Plectogona (Plectogona) sanfilippoi sanfilippoi (Manfredi, 1956) (N)
Plectogona (Plectogona) vignai (Strasser, 1970) (E)
 Plectogona (Plectogona) vignai draco (Strasser, 1975) (N)
 Plectogona (Plectogona) vignai elegans (Strasser, 1970) (N)
 Plectogona (Plectogona) vignai inermis (Strasser, 1970) (N)
 Plectogona (Plectogona) vignai vignai (Strasser, 1970) (N)

Plectogona (Antromanfredia) Strasser, 1975

Plectogona (Antromanfredia) franciscoloi (Manfredi, 1953) (N) (E)

Sardosoma Manfredi, 1956

Sardosoma franchettii Manfredi, 1956 (Sa) (E)

Semiosoma Ribaut, 1913

Semiosoma minutum (Berlese, 1895) (N, S) (E) (*)

Synischiosoma Verhoeff, 1910

Synischiosoma argentarium Attems, 1927 (S) (E)
Synischiosoma murorum (Silvestri, 1902) (S) (E)

Rothenbuehleria Verhoeff, 1900

Rothenbuehleria minima (Rothenbühler, 1899) (N)
Rothenbuehleria tirolensis Verhoeff, 1900 (N) (E)

Basigona Cook, 1895

Basigona athesina (Fedrizzi, 1877) (N) (E)

Note

Craspedosoma rawlinsii: Il 'complesso rawlinsi' richiede approfondimento.

Bergamosoma bergomatium: Strasser (1973 - Ueber die Gattung Prionosoma und andere Diplopoden aus Höhlen der Provinz Brescia (Lombardei). *Natura Bresciana*, 10: 91-103) distingueva le sottospecie b. *bergomatium* (Verhoeff, 1925) e b. *sevini* (Verhoeff, 1931), salvo però rilevare il carattere intermedio, fra queste due ipotetiche sottospecie, del taxon nominale *pavani* Manfredi, 1948.

Bergamosoma canestrinii: Strasser (1969 - *Miscellanea Diplopodologica. Opuscula Zoologica*, München, 105:1-10; 1973 - Ueber die Gattung Prionosoma und andere Diplopoden aus Höhlen der Provinz Brescia (Lombardei). *Natura Bresciana*, 10: 91-103) riconosceva cinque sottospecie che, trasferite nel genere nominale *Bergamosoma*, si chiamerebbero B. c. *canestrinii* (Fedrizzi, 1877), B. c. *toscolanense* (Verhoeff, 1934), B. c. *baldense* (Verhoeff, 1934), B. c. *borgense* (Strasser, 1969) e B. c. *plavis* (Strasser, 1960). Esse sarebbero tutte endemiche, ad eccezione della sottospecie nominale.

Pyrgocyphosoma dentatum: Fuori dai confini politici italiani, è noto solo dai dintorni di Lugano (Svizzera) e da S. Dalmazzo di Tenda (Alpes Maritimes), località da cui è stato anche descritto *P. tendanum* Verhoeff, 1930.

Pyrgocyphosoma oppidicola: In questa specie dovrebbe rientrare, forse con valore di sottospecie distinta, la specie nominale *Craspedosoma gattii* Silvestri, 1898, descritta da Atri in provincia di Teramo (S).

Aspromontia: Un genere prossimo ad *Aspromontia*, con una nuova specie endemica del Piemonte, è in corso di descrizione da parte di J.-P. Mauriès.

Atractosoma (*subgg.?*): Non è attualmente possibile una serena assegnazione sottogenerica delle singole specie qui elencate.

Semiosoma minutum: Species inquirenda.

Chordeumatidae

Chordeuma C.L. Koch, 1847

Chordeuma sylvestre C.L. Koch, 1847 (N, S)

***Melogona* (*Melogona*)** Cook, 1895

Melogona (*Melogona*) *scutellaris* Ribaut, 1913 (N)

Anthroleucosomatidae

Anamastigona Silvestri, 1898

Anamastigona aspromontis (Strasser, 1970) (S) (E)

Anamastigona hispidula (Silvestri, 1895) (S) (E)

Anamastigona meridionalis Silvestri, 1898 (Si) (E)

Anamastigona pulchella (Silvestri, 1894) (N, S)

Verhoeffeuma Strasser, 1937

Verhoeffeuma minellii Mauriès, 1990 (N) (E)

Chordeumatida i.s.

Brachytropisoma Silvestri, 1898

Brachytropisoma giardinae Silvestri, 1898 (Si) (E)

Polydesmida

Xystodesmidae

Devillea Brölemann, 1902

Devillea cerrutii Manfredi, 1956 (Sa) (E)

Devillea doderoi Silvestri, 1903 (Sa) (*)

Devillea patrizii Manfredi, 1956 (Sa) (E)

Devillea subterranea Verhoeff, 1943 (S) (E)

Note

Devillea doderoi: Nota anche dalle Alpes Maritimes.

Paradoxosomatidae

Eroonsoma Manfredi, 1943

Eroonsoma pominii Manfredi, 1943 (S) (E)

Metonomastus Attems, 1937

Metonomastus capreae (Verhoeff, 1942) (S) (E)

Metonomastus hirtellus (Silvestri, 1903) (S) (E)

Metonomastus mariae (Strasser, 1965) (S) (E)

Metonomastus patrizii Manfredi, 1950 (S) (E)

Metonomastus romanus (Verhoeff, 1951) (S) (E)

Microdesminus Strasser, 1960

Microdesminus saetosus Strasser, 1960 (N)

Oxidus Cook, 1911

Oxidus gracilis (C.L. Koch, 1847) (N, S) (*)

Stosatea Gray, 1843

Stosatea granulata (Daday, 1889) (S, Si)
Stosatea italica (Latzel, 1886) (N, S, Si, Sa)
Stosatea lagrecai (Strasser, 1961) (Si) (E)
Stosatea nebrodia (Strasser, 1961) (Si) (E)
Stosatea simonii (Daday, 1889) (N)

Strongylosoma Brandt, 1833

Strongylosoma stigmatosum (Eichwald, 1830) (N)

Note

Metonomastus: È possibile che i cinque taxa nominali qui elencati siano tutti, in realtà, conspecifici.

Oxidus gracilis: Specie tropicale introdotta.

Polydesmidae

Mastigonodesmus Silvestri, 1898

Mastigonodesmus destefanii Silvestri, 1898
Mastigonodesmus destefanii destefanii Silvestri, 1898 (Si)
Mastigonodesmus destefanii vignai Strasser, 1974 (Sa) (E)
Mastigonodesmus occultus Verhoeff, 1928 (N) (E)
Mastigonodesmus undeviginti Strasser, 1980 (Sa) (E)
Mastigonodesmus verbani Verhoeff, 1930 (N) (E)
Mastigonodesmus viduus Silvestri, 1903 (S) (E)

Brachydesmus Heller, 1858

Brachydesmus camerani (Silvestri, 1896) (N) (E)
Brachydesmus carniolensis (Verhoeff, 1895) (N)
Brachydesmus chyzeri (Daday, 1889) (N)
Brachydesmus dolinensis (Attems, 1898) (N) (E)
Brachydesmus exiguus (Brölemann, 1894) (N)
Brachydesmus margaritatus (Brölemann, 1894) (N) (E)
Brachydesmus mitis (Berlese, 1891) (S) (E)
Brachydesmus perfidus (Attems, 1927) (S) (E)
Brachydesmus proximus (Latzel, 1889) (N, S, Si, Sa)
Brachydesmus silvanus (Brölemann, 1894) (N) (E)
Brachydesmus subterraneus Heller, 1858 (N)

Brachydesmus superus (Latzel, 1884) (N, S, Si, Sa)

Brembosoma Verhoeff, 1931

Brembosoma aspidiorum (Verhoeff, 1936) (N) (E)

Brembosoma castagnolense Verhoeff, 1925 (N)

Polydesmus Latreille, 1803

Polydesmus angustus Latzel, 1884 (N, S)

Polydesmus asthenestatus Pocock, 1894 (N, S, Sa)

Polydesmus barberii Latzel, 1889 (N)

Polydesmus brevimanus Brölemann, 1892 (N)

Polydesmus clavator Verhoeff, 1925 (N)

Polydesmus complanatus (Linnaeus, 1761) (N, S)

Polydesmus collaris C.L. Koch, 1847 (N, S)

Polydesmus denticulatus C.L. Koch, 1847 (N)

Polydesmus dismilus Berlese, 1891 (N)

Polydesmus edentulus C.L. Koch, 1847 (N)

Polydesmus falcifer Latzel, 1884 (N)

Polydesmus fanzagoi Fedrizzi, 1876 (*)

Polydesmus fanzagoi fanzagoi Fedrizzi, 1876 (N)

Polydesmus fanzagoi bigeniculatus Brölemann, 1892 (N)

Polydesmus fanzagoi hessei Verhoeff, 1931 (N)

Polydesmus fissilobus Brölemann, 1892 (N) (E)

Polydesmus genuensis Pocock, 1894 (N) (E)

Polydesmus inconstans Latzel, 1884 (N)

Polydesmus lambranus Verhoeff, 1936 (N) (E)

Polydesmus mistrei Brölemann, 1902 (N)

Polydesmus monticola Latzel, 1884 (N)

Polydesmus polygamiae Verhoeff, 1932 (N) (E)

Polydesmus pulcher Silvestri, 1895 (S) (E)

Polydesmus raffardi Brölemann, 1905 (N)

Polydesmus rangifer Latzel, 1884 (N)

Polydesmus robiniarum Verhoeff, 1926 (N) (E)

Polydesmus rupicursor Verhoeff, 1907 (N) (E)

Polydesmus stiphropus Attems, 1927 (N) (E)

Polydesmus subulifer Brölemann, 1892 (N)

Polydesmus taranus Verhoeff, 1926 (N)

Polydesmus testaceus C.L. Koch, 1847 (N)

Polydesmus troglobius Latzel, 1889 (N)

Sardodesmus Strasser, 1980

Sardodesmus irregularis Strasser, 1980 (Sa) (E)

Schedoleiodesmus Silvestri, 1898

Schedoleiodesmus lobatus Strasser, 1974 (Sa) (E)
Schedoleiodesmus solarii Silvestri, 1898 (Sa) (E)

Serradium Verhoeff, 1941

Serradium hirsutipes Verhoeff, 1941 (N) (E)
Serradium longicorne (Silvestri, 1894) (N) (E)

Note

Brachydesmus: In *Polydesmus* sec. Hoffman (1979).

Brembosoma: In *Polydesmus* sec. Hoffman (1979).

Polydesmus fanzagoi: La sinonimia indicata, con la riabilitazione della specie di Fedrizzi, è suggerita da R.L. Hoffman (i.l.) (M. Di Giovanni, com. pers.).

Serradium: Un'ulteriore specie di *Serradium* (provincia di Verona) è attualmente in corso di descrizione da parte di H. Enghoff.

Trichopolydesmidae

Ingurtidorgius Strasser, 1974

Ingurtidorgius caprinus Strasser, 1974 (Sa) (E)

Cottodesmus Verhoeff, 1936

Cottodesmus crissolensis Verhoeff, 1936 (N) (E)

Julida

Blaniulidae

Blaniulus Gervais, 1836

Blaniulus eulophus Silvestri, 1903 (Sa) (E)
Blaniulus guttulatus (Bosc, 1792) (N, S, Si)

Monacobates Verhoeff, 1911

Monacobates monoecensis (Brölemann, 1905)
Monacobates monoecensis ormeanus Verhoeff, 1930 (N)

Sardoblaniulus Manfredi, 1956

Sardoblaniulus annae Manfredi, 1956 (Sa) (E)

Proteroiulus Silvestri, 1897

Proteroiulus fuscus (Am Stein, 1857) (N)

Alpiobates Verhoeff, 1911

Alpiobates peyerimhoffi (Brölemann, 1900) (N)

Choneiulus Brölemann, 1921

Choneiulus lacinifer Strasser, 1980 (Sa) (E)

Choneiulus palmatus (Nêmec, 1895) (N)

Choneiulus subterraneus (Silvestri, 1903) (S)

Nopoiulus Menge, 1851

Nopoiulus kochi (Gervais, 1847) (N, S, Si)

Orphanoiulus (Orphanoiulus) Silvestri, 1903

Orphanoiulus (Orphanoiulus) religiosus (Silvestri, 1903) (N, S) (E)

Orphanoiulus (Trinacrius) Strasser, 1960

Orphanoiulus (Trinacrius) dinapolii Strasser, 1960 (Si) (E)

Nemasomatidae

Nemasoma C.L. Koch, 1847

Nemasoma varicorne C.L. Koch, 1847 (N, Si)

Thalassisobates Verhoeff, 1908

Thalassisobates litoralis (Silvestri, 1903) (N, S, Si, Sa)

Trichoblaniulidae

Trichoblaniulus Verhoeff, 1898

Trichoblaniulus hirsutus (Brölemann, 1889) (N, Sa)

Rhopaloiulidae

Rhopaloiulus Attems, 1926

Rhopaloiulus cameratanus Attems, 1927 (S) (E) (*)

Note

Rhopaloiulus cameratanus: A questa specie va probabilmente riferito anche il taxon nominale delattini Verhoeff, 1951.

Julidae

Hypsoiulus Verhoeff, 1913

Hypsoiulus alpivagus (Verhoeff, 1897) (N)

Ophiulus Berlese, 1884

Ophiulus barbatus Verhoeff, 1908 (S) (E)
Ophiulus castanearum Verhoeff, 1930 (N) (E)
Ophiulus cerii Verhoeff, 1942 (S) (E)
Ophiulus chilopogon (Latzel, 1884) (N, S)
Ophiulus collaris Verhoeff, 1930 (N) (E)
Ophiulus curvipes (Verhoeff, 1898) (N)
Ophiulus germanicus Verhoeff, 1896 (N, S)
Ophiulus italianus Attems, 1926 (S) (E)
Ophiulus jeekeli Strasser, 1974 (Sa) (E) (*)
Ophiulus lostiae Silvestri, 1898 (Sa) (E)
Ophiulus macchiaae Verhoeff, 1930 (S) (E)
Ophiulus major Bigler, 1920 (N, S)
Ophiulus minimus Strasser, 1958 (S) (E)
Ophiulus muelleri Strasser, 1937 (N) (E)
Ophiulus napolitanus (Attems, 1903) (S)
Ophiulus nigrofuscus (Verhoeff, 1894) (N)
Ophiulus osellai Strasser, 1970 (S) (E)
Ophiulus pilosus (Newport, 1842) (N, S)
Ophiulus rubrodorsalis (Verhoeff, 1901) (N)
Ophiulus sardus Attems, 1926 (Sa) (E)
Ophiulus spezianus Verhoeff, 1936 (N) (E)
Ophiulus targionii Silvestri, 1898 (S, Si) (E) (*)
Ophiulus verruculiger Verhoeff, 1910 (S) (E) (*)

Leptoiulus (Leptoiulus) Verhoeff, 1894

Leptoiulus (Leptoiulus) alemannicus (Verhoeff, 1894) (N)
Leptoiulus (Leptoiulus) braueri Verhoeff, 1895 sensu Strasser, 1959 (N, S) (*)
Leptoiulus (Leptoiulus) brentanus Verhoeff, 1926 (N)
Leptoiulus (Leptoiulus) broelemanni (Verhoeff, 1895) (N)
Leptoiulus (Leptoiulus) chiesensis Verhoeff, 1934 (N)

Leptoiulus (Leptoiulus) frigidarius Verhoeff, 1913 (N) (E)
Leptoiulus (Leptoiulus) montivagus (Latzel, 1884) (N, S)
Leptoiulus (Leptoiulus) oribates Latzel, 1884 (N) (*)
Leptoiulus (Leptoiulus) riparius Verhoeff, 1895 (N)
Leptoiulus (Leptoiulus) saltuvagus (Verhoeff, 1898) (N)
Leptoiulus (Leptoiulus) simplex (Verhoeff, 1894) (N)

Leptoiulus (Proleptoiulus) Verhoeff, 1929

Leptoiulus (Proleptoiulus) hospitelli (Brölemann, 1901) (N) (*)
Leptoiulus (Proleptoiulus) trilineatus (C.L. Koch, 1847) (N)

Leptoiulus (Acrovelatus) Attems, 1927

Leptoiulus (Acrovelatus) belgicus (Latzel, 1884) (N)
Leptoiulus (Acrovelatus) gilvicollis Verhoeff, 1932 (N) (E)

Leptoiulus (Kolpophylacum) Attems, 1927

Leptoiulus (Kolpophylacum) arelatus Bigler, 1919 (N)
Leptoiulus (Kolpophylacum) brevivelatus Bigler, 1919 (N)
Leptoiulus (Kolpophylacum) helveticus Verhoeff, 1894 (N)
Leptoiulus (Kolpophylacum) magnus Bigler, 1919 (N)
Leptoiulus (Kolpophylacum) odieri Brölemann, 1896
 Leptoiulus (Kolpophylacum) odieri odieri Brölemann, 1896 (N)
 Leptoiulus (Kolpophylacum) odieri aceris Verhoeff, 1932 (N)
 Leptoiulus (Kolpophylacum) odieri minor Strasser, 1978 (N)
Leptoiulus (Kolpophylacum) tendanus Verhoeff, 1930 (N) (*)

Xestoiulus (Xestoiulus) Verhoeff, 1893

Xestoiulus (Xestoiulus) imbecillus (Latzel, 1884) (N)

Allajulus C.L. Koch, 1847

Allajulus dicentrus (Latzel, 1884) (N)
Allajulus groedensis (Attems, 1899) (N)
Allajulus infossus (Verhoeff, 1930) (N) (E)
Allajulus marguareisi (Strasser, 1970) (N) (E)

Cylindroiulus Verhoeff, 1894

Cylindroiulus aetnensis (Verhoeff, 1910) (N, Si) (E)
Cylindroiulus aostanus (Verhoeff, 1932) (N) (E)
Cylindroiulus apenninorum (Brölemann, 1897) (S) (E) (*)
Cylindroiulus aternanus (Verhoeff, 1930) (S) (E)
Cylindroiulus boleti C.L. Koch, 1847 (N)
Cylindroiulus broti (Humbert, 1893) (N, S)

Cylindroiulus caeruleocinctus (Wood, 1864) (N)
Cylindroiulus cantonii (Brölemann, 1892) (N) (E)
Cylindroiulus decipiens (Berlese, 1885) (N, S) (E)
Cylindroiulus dubius (Verhoeff, 1930) (N) (E)
Cylindroiulus festai Manfredi, 1939 (N) (E)
Cylindroiulus fulviceps (Attems, 1900) (N)
Cylindroiulus generosensis (Verhoeff, 1901) (N)
Cylindroiulus gestroi Silvestri, 1898 (Sa) (E)
Cylindroiulus gigas (Verhoeff, 1932) (N) (E)
Cylindroiulus italicus (Latzel, 1884) (N)
Cylindroiulus lagrecai (Manfredi, 1957) (S) (E)
Cylindroiulus latro (Attems, 1927) (S) (E)
Cylindroiulus latzeli (Berlese, 1884) (N, S)
Cylindroiulus luridus (C.L. Koch, 1847) (N)
Cylindroiulus meinerti (Verhoeff, 1891) (N)
Cylindroiulus molisius (Verhoeff, 1932) (S) (E)
Cylindroiulus parisiorum (Brölemann & Verhoeff, 1896) (N, S)
Cylindroiulus partenkirchianus (Verhoeff, 1901) (N)
Cylindroiulus pelatensis (Verhoeff, 1930) (S) (E)
Cylindroiulus rubidicollis (Verhoeff, 1930) (N) (E)
Cylindroiulus rufifrons (C.L. Koch, 1847) (N, S)
Cylindroiulus salicivorus (Verhoeff, 1908) (N) (E)
Cylindroiulus sangranus Verhoeff, 1932 (S) (E)
Cylindroiulus sardous Silvestri, 1898 (Sa) (E)
Cylindroiulus sculus Silvestri, 1897 (Si) (E)
Cylindroiulus solarius (Verhoeff, 1942) (S) (E)
Cylindroiulus solis (Verhoeff, 1908) (N) (E)
Cylindroiulus sorrentinus (Verhoeff, 1912) (S) (E)
Cylindroiulus strasseri (Verhoeff, 1930) (S) (E)
Cylindroiulus tirolensis (Verhoeff, 1895) (N)
Cylindroiulus tricuspis (Verhoeff, 1932) (N) (E)
Cylindroiulus turinensis (Brölemann, 1897) (N) (E)
Cylindroiulus uncinatus (Strasser, 1969) (Si) (E)
Cylindroiulus verhoeffi (Brölemann, 1896) (N)
Cylindroiulus vulnerarius (Berlese, 1888) (N, S)
Cylindroiulus zinalensis (Faës, 1902) (N)

Enantiulus (Enantiulus) Attems, 1894

Enantiulus (Enantiulus) austriacus (Verhoeff, 1896) (N)
Enantiulus (Enantiulus) dentigerus (Verhoeff, 1901) (N)
Enantiulus (Enantiulus) karawankianus (Verhoeff, 1908) (N)
Enantiulus (Enantiulus) nanus (Latzel, 1884) (N)

Styrioiulus Verhoeff, 1928

Styrioiulus pelidnus (Latzel, 1884) (N)

***Buchneria* Verhoeff, 1941**

Buchneria cornuta Verhoeff, 1941 (S) (E)

Buchneria sicula Strasser, 1959 (Si) (E)

***Trogloiulus* Manfredi, 1931**

Trogloiulus binii Enghoff, 1985 (N) (E)

Trogloiulus boldorii Manfredi, 1940 (N) (E)

Trogloiulus comensis Strasser, 1977 (N) (E)

Trogloiulus concii Manfredi, 1948 (N) (E)

Trogloiulus minimus Manfredi, 1935 (N) (E)

Trogloiulus mirus Manfredi, 1931 (N) (E)

Trogloiulus osellai Strasser, 1977 (N) (E)

Trogloiulus vailatii Strasser, 1978 (N) (E)

***Typhloiulus* Latzel, 1884**

Typhloiulus ausugi Manfredi, 1953 (E)

Typhloiulus ausugi ausugi Manfredi, 1953 (N)

Typhloiulus ausugi fimbriatus Strasser, 1971 (N)

Typhloiulus ausugi gentianae Strasser, 1971 (N)

Typhloiulus ganglbaueri (Verhoeff, 1898) (N)

Typhloiulus longinquus Strasser, 1965 (S) (E)

Typhloiulus maximus (Verhoeff, 1929) (N) (E)

Typhloiulus montellensis Verhoeff, 1930 (E)

Typhloiulus montellensis montellensis Verhoeff, 1930 (N)

Typhloiulus montellensis rotundatus Strasser, 1962 (N)

Typhloiulus tobias Berlese, 1886 (N) (E)

***Chersoiulus* Strasser, 1938**

Chersoiulus sphinx Strasser, 1940 (N)

***Afropachyiulus* Schubart, 1960**

Afropachyiulus maritimus (Strasser, 1970) (Si) (E)

***Dolichoiulus* Verhoeff, 1900**

Dolichoiulus tongiorgii (Strasser, 1973) (S)

***Elbaiulus* Verhoeff, 1930**

Elbaiulus carpinatorum Verhoeff, 1930 (S) (E)

Elbaiulus chrysopygus (Berlese, 1888) (S) (E)

***Hylopachyiulus* Attems, 1904**

Hylopachyiulus pygmaeus (Attems, 1904) (N)

Mesoiulus Berlese, 1886

Mesoiulus berlessei (Silvestri, 1898) (N) (E)

Mesoiulus gridellii Strasser, 1934 (N) (E)

Mesoiulus paradoxus Berlese, 1886 (N) (E)

Mesoiulus siculus Silvestri, 1902 (Si)

Pachyiulus Berlese, 1883

Pachyiulus cassinensis Verhoeff, 1910 (S) (E)

Pachyiulus flavipes (C.L. Koch, 1847) (S, Si, Sa)

Pachyiulus fuscipes (C.L. Koch, 1847) (N)

Pachyiulus humicola Verhoeff, 1910 (Si) (E)

Pachyiulus oenologus Berlese, 1886 (S, Si) (E)

Pachyiulus silvestrii Verhoeff, 1923 (S) (E)

Pachyiulus varius (Fabricius, 1781) (N)

Pachyiulus venetus Verhoeff, 1926 (N) (E)

Unciger Brandt, 1841

Unciger foetidus (C.L. Koch, 1838) (N)

Syniulus Strasser, 1974

Syniulus puddui Strasser, 1974 (Sa) (E)

Brachyiulus Berlese, 1884

Brachyiulus apfelbecki Verhoeff, 1898 (N) (*)

Brachyiulus gilvicollis (Verhoeff, 1941) (S) (E)

Brachyiulus lusitanus (Verhoeff, 1898) (N, S, Sa)

Brachyiulus pusillus (Leach, 1815) (N, S)

Brachyiulus stuxbergi (Fanzago, 1875) (S, Si) (E)

Heteroiulus Verhoeff, 1897

Heteroiulus intermedius (Brölemann, 1892) (N, S) (E)

Chromatoiulus Verhoeff, 1894

Chromatoiulus podabrus (Latzel, 1884) (N)

Megaphyllum Verhoeff, 1894

Megaphyllum austriacum (Latzel, 1884) (N)

Megaphyllum bosniense (Verhoeff, 1897) (N)
Megaphyllum margaritatum (Fanzago, 1875) (N, S, Si) (E)
Megaphyllum silvaticum (Verhoeff, 1898)
Megaphyllum silvaticum discolor (Verhoeff, 1907) (N)
Megaphyllum unilineatum (C.L. Koch, 1838) (N)

Ommatoiulus Latzel, 1884

Ommatoiulus aurozonatus (Berlese, 1886) (S) (E)
Ommatoiulus buchneri (Verhoeff, 1940) (S, Si) (E)
Ommatoiulus oxypygus (Brandt, 1841) (S, Si) (E) (*)
Ommatoiulus parallelus (C.L. Koch, 1847) (N, S)
Ommatoiulus rutilans (C.L. Koch, 1847) (N, S)
Ommatoiulus sabulosus (Linnaeus, 1758) (N, S)
Ommatoiulus variolosus (Silvestri, 1898) (Sa) (E)

Note

Ophiulus jeekeli: Forse conspecifico con *O. lostiae* Silvestri, 1898.

Ophiulus targionii: Oltre che in S e Si, è presente solo a Malta.

Ophiulus verruculiger: Secondo Schubart (1962), la specie è stata accidentalmente introdotta in Nuova Zelanda.

Leptoiulus (Leptoiulus) braueri: Di questa specie sono state descritte molte entità infraspecifiche, alcune delle quali interessanti la fauna italiana. Sono necessari approfondimenti, tuttavia, per decidere sul loro effettivo status.

Leptoiulus (Leptoiulus) oribates: Attribuzione sottogenerica incerta.

Leptoiulus (Proleptoiulus): - 139.0. Secondo Enghoff (in litteris) i due sottogeneri debbono con molta probabilità venire fusi tra loro.

Leptoiulus (Proleptoiulus) hospitelli: Oltre il confine italiano, è noto da S. Dalmazzo di Tenda (Alpes Maritimes).

Leptoiulus (Kolpophylacum) tendanus: Oltre il confine italiano, è noto da S. Dalmazzo di Tenda (Alpes Maritimes).

Cylindroiulus apenninorum: In apparenza, lo status di specie endemica potrebbe essere messo in discussione. Strasser (1970) ne elencava infatti quattro sottospecie italiane (*apenninorum* Verhoeff, 1901, *montirepens* Verhoeff, 1901, *carraranus* Verhoeff, 1907 e *titanensis* Verhoeff, 1932: le prime tre dalla Toscana e la quarta da S. Marino) oltre ad una sottospecie (*batavus* Schubart, 1929), proveniente dall'Olanda. In questi termini, naturalmente, il quadro è del tutto improbabile da un punto di vista zoogeografico!

Brachyiulus apfelbecki: Nuovo per l'Italia (prov. di Venezia) (Enghoff, com. pers.).

Ommatoiulus: Ometto dalla lista due specie di status molto incerto, cioè *O. irregularis* (Attems, 1927) e *O. olivarum* (Verhoeff, 1921).

Ommatoiulus oxypygus: Oltre che in S e Si, è presente solo a Malta.

Pauropoda

Pauropodidae

***Allopaupopus (Allopaupopus)* Silvestri, 1902**

- Allopaupopus (Allopaupopus) brevisetus* Silvestri, 1902 (N, S, Sa)
- Allopaupopus (Allopaupopus) danicus* (Hansen, 1902) (N, S, Sa)
- Allopaupopus (Allopaupopus) gravieri* Remy, 1935 (S)
- Allopaupopus (Allopaupopus) juberthieorum* Remy, 1960 (S) (E)

***Allopaupopus (Decapauropus)* Remy, 1957**

- Allopaupopus (Decapauropus) aristatus* Remy, 1936 (N)
- Allopaupopus (Decapauropus) barcinonensis* Remy, 1933 (Sa)
- Allopaupopus (Decapauropus) corsicus* Remy, 1940 (Sa)
- Allopaupopus (Decapauropus) denisi* Remy, 1936 (Sa)
- Allopaupopus (Decapauropus) distinctus* Bagnall, 1936 (S, Si, Sa)
- Allopaupopus (Decapauropus) fagei* Remy, 1941 (Sa)
- Allopaupopus (Decapauropus) furcula* Silvestri, 1902 (S, Sa)
- Allopaupopus (Decapauropus) fuscifer* Remy, 1936 (N)
- Allopaupopus (Decapauropus) gracilis* (Hansen, 1902) (N, S, Sa)
- Allopaupopus (Decapauropus) helveticus* (Hansen, 1902) (N, S)
- Allopaupopus (Decapauropus) hessei* Remy, 1935 (N)
- Allopaupopus (Decapauropus) insulanus* Remy, 1945 (S)
- Allopaupopus (Decapauropus) milloti* Remy, 1945 (N)
- Allopaupopus (Decapauropus) multiplex* Remy, 1936 (Sa)
- Allopaupopus (Decapauropus) pectinatus* (Hansen, 1902) (S)
- Allopaupopus (Decapauropus) productus* Silvestri, 1902 (S, Sa)
- Allopaupopus (Decapauropus) ruffoi* Remy, 1959 (N) (E)
- Allopaupopus (Decapauropus) vulgaris* (Hansen, 1902) (N, S)
- Allopaupopus (Decapauropus) zaianus* Remy, 1952 (N)

***Paupopus* Lubbock, 1867**

- Paupopus furcifer* Silvestri, 1902 (N, S)
- Paupopus huxleyi* Lubbock, 1867 (S, Si?)
- Paupopus lanceolatus* Remy, 1956 (N)

***Stylopaupopus (Stylopaupopus)* Cook, 1896**

- Stylopaupopus (Stylopaupopus) neglectus* Remy, 1962 (N, S)
- Stylopaupopus (Stylopaupopus) pedunculatus* (Lubbock, 1867) (N, S, Si)
- Stylopaupopus (Stylopaupopus) pubescens* (Hansen, 1902) (S?)

***Stylopaupopus (Donzelotauropus)* Remy, 1957**

- Stylopaupopus (Donzelotauropus) limitaneus* Remy, 1962 (N, S)

***Rabaudauropus* Remy, 1939**

Rabaudauropus cuspidatus (Remy, 1939) (S)

Hemipauropus (Hemipauropus) Silvestri, 1902

Hemipauropus (Hemipauropus) leptoproctus Silvestri, 1902 (S) (E)

Hemipauropus (Hemipauropus) venetorum Remy, 1962 (N) (E)

Scleropauropus (Scleropauropus) Silvestri, 1902

Scleropauropus (Scleropauropus) florentini Remy, 1952 (Sa)

Scleropauropus (Scleropauropus) lyrifer Remy, 1936 (Sa)

Scleropauropus Silvestri, ? 1902

Scleropauropus hastifer Silvestri, 1902 (S?) (*)

Polypauropus (Polypauropus) Remy, 1932

Polypauropus (Polypauropus) duboscqi Remy, 1932 (N)

Note

Scleropauropus: Attribuzione sottogenerica da definire.

Scleropauropus hastifer: Forse endemica.

Brachypauropodidae

Brachypauropus Latzel, 1902

Brachypauropus superbus Hansen, 1902 (S, Sa)

Eurypauropodidae

Acopauropus Cook, 1896

Acopauropus consobrinus (Remy, 1937) (N)

Acopauropus hastatus (Attems, 1895) (N)

Trachypauropus Tömösváry, 1882

Trachypauropus cordatus Scheller, 1974 (S)

Trachypauropus glomerioides Tömösváry, 1882 (N, S)

Trachypauropus latzeli (Cook, 1896) (N, S)

Symphyla

Scutigerellidae

Scutigerella Ryder, 1882

- Scutigerella alpina* Rochaix, 1955 (N)
- Scutigerella causeyae* Michelbacher, 1942 (N, S)
- Scutigerella echinostylus* Scheller, 1968 (N) (E)
- Scutigerella immaculata* (Newport, 1845) (N, S, Sa)
- Scutigerella linsleyi* Michelbacher, 1942 (N)
- Scutigerella palmonii* Michelbacher, 1942 (N, Si)
- Scutigerella remyi* Juberthie-Jupeau, 1963 (N)
- Scutigerella sbordonii* Juberthie-Jupeau, 1975 (S) (E)
- Scutigerella seposita* Scheller, 1966 (N) (E)
- Scutigerella silvestrii* Michelbacher, 1942 (S)
- Scutigerella tusca* Juberthie-Jupeau, 1962 (N, S)

Hanseniella Bagnall, 1913

- Hanseniella nivea* (Scopoli, 1763) (N, S, Si?)

Scolopendrellidae

Scolopendrellopsis (**Scolopendrellopsis**) Bagnall, 1913

- Scolopendrellopsis* (*Scolopendrellopsis*) *microcolpa* (Muhr, 1881) (N, S)

Scolopendrellopsis (**Symphylellopsis**) Ribaut, 1931

- Scolopendrellopsis* (*Symphylellopsis*) *arvernorum* Ribaut, 1931 (S)
- Scolopendrellopsis* (*Symphylellopsis*) *subnuda* (Hansen, 1903) (N, S, Si)

Scolopendrella Gervais, 1839

- Scolopendrella notacantha* Gervais, 1839 (N, S)

Symphylella Silvestri, 1902

- Symphylella isabellae* (Grassi, 1886) (S, Si?)
- Symphylella vulgaris* (Hansen, 1903) (N, S, Si?)

Geophilella Ribaut, 1913

- Geophilella pyrenaica* Ribaut, 1913 (N)

Hexapoda

Collembola

Poduridae

Podura Linné, 1758

Podura aquatica Linné, 1758 (N)

Hypogastruridae

Orogastrura Deharveng & Gers, 1979

Orogastrura parva (Gisin, 1949) (N, S)

Hypogastrura Bourlet, 1839

Hypogastrura crassaegranulata (Stach, 1949) (N)

Hypogastrura exigua Gisin, 1958 (N)

Hypogastrura gennargentui Dallai, 1970 (Sa) (E)

Hypogastrura manubrialis (Tullberg, 1869) (N, S)

Hypogastrura meridionalis Steiner, 1955 (N, S)

Hypogastrura purpurescens (Lubbock, 1868) (N)

Hypogastrura socialis (Uzel, 1891) (N, S)

Hypogastrura tullbergi (Schaeffer, 1900) (N, Si)

Hypogastrura vernalis (Carl, 1901) (N, S)

Hypogastrura viatica (Tullberg, 1872) (N)

Mesogastrura Bonet, 1930

Mesogastrura boneti (Tarsia in Curia, 1941) (N, S)

Mesogastrura libyca (Caroli, 1914) (N, S)

Mesogastrura ojcoviensis (Stach, 1919) (N, S, Sa)

Mesachorutes Absolon, 1900

Mesachorutes cionii Denis, 1935 (N, S, Sa)

Ceratophysella Börner, 1932

Ceratophysella acuminata (Cassagnau, 1959) (N, S, Si)

Ceratophysella armata (Nicolet, 1841) (N, S)

Ceratophysella armatissima Gisin, 1958 (N) (E) (*)
Ceratophysella bengtssoni (Agren, 1904) (N, S)
Ceratophysella denticulata (Bagnall, 1941) (N, S)
Ceratophysella lawrencei Gisin, 1963 (N, S)
Ceratophysella luteospina Stach, 1920 (N)
Ceratophysella quinquesetosa Gisin, 1958 (N) (E) (*)
Ceratophysella sextensis (Cassagnau, 1968) (N) (E) (*)
Ceratophysella sigillata (Uzel, 1890) (N, S)
Ceratophysella silvatica Rusek, 1964 (S)
Ceratophysella succinea Gisin, 1949 (S)
Ceratophysella varians Stach, 1967 (Si) (*)

Schoettella Schäffer, 1896

Schoettella inermis (Tullberg, 1871) (N)
Schoettella ununguiculata (Tullberg, 1869) (N, S)

Bonetogastrura Thibaud, 1974

Bonetogastrura cavicola (Börner, 1901) (S) (*)
Bonetogastrura subterranea (Carl, 1906) (N)

Schaefferia Absolon, 1900

Schaefferia emucronata Absolon, 1900 (N, S)
Schaefferia scossirolii Dallai & Sabatini, 1981 (S) (E) (*)

Xenylla Tullberg, 1869

Xenylla börneri Axelson, 1905 (N, Sa)
Xenylla brevicauda Tullberg, 1869 (N) (*)
Xenylla brevisimilis Stach, 1930
 Xenylla brevisimilis mediterranea Gama, 1964 (S, Si)
Xenylla grisea Axelson, 1900 (N, S)
Xenylla humicola (Fabricius, 1780) (N) (*)
Xenylla maritima (Tullberg, 1869) (N, S, Si)
Xenylla microchaeta Cassagnau, 1968 (N) (E) (*)
Xenylla schillei Börner, 1903 (N, S)
Xenylla welchi Folsom, 1916 (S) (*)

Paraxenylla Murphy, 1965

Paraxenylla affiniformis (Stach, 1929) (N)

Acherontiella Absolon, 1913

Acherontiella bougisi Cassagnau & Delamare, 1955 (S, Si)
Acherontiella carusoii Dallai, 1978 (Si) (E)

Acherontiella cavernicola (Tarsia in Curia, 1941) (N) (E) (*)

Willemia Börner, 1901

Willemia anophthalma Börner, 1901 (N, S)

Willemia aspinata Stach, 1949 (N)

Willemia intermedia Mills, 1934 (S, Si)

Triacanthella Schaeffer, 1897

Triacanthella biroi Stach, 1924 (N, S, Si)

Triacanthella nivalis Cassagnau & Deharveng, 1974 (N) (E) (*)

Triacanthella perfecta Denis, 1926 (N, S)

Microgastrura Stach, 1922

Microgastrura duodecimoculata Stach, 1922 (N, S, Si)

Note

Ceratophysella armatissima: Presente in N solo nelle Dolomiti italiane.

Ceratophysella quinquesetosa: Presente in N solo nelle Dolomiti italiane.

Ceratophysella sextensis: Presente in N solo nelle Dolomiti italiane.

Ceratophysella varians: Presente in Si solo nelle Isole Eolie.

Bonetogastrura cavicola: Presente in S solo nelle Puglie.

Schaefferia scossirolii: Presente in S solo a Vitulazio (Caserta).

Xenylla brevicauda: Presente in S solo in Romagna come f. atypica.

Xenylla humicola: Presente in N solo in Romagna.

Xenylla microchaeta: Presente in N solo nel M.te Spitz (Recoaro).

Xenylla welchi: Presente in S solo a Tor Sapienza (Roma).

Acherontiella cavernicola: Presente in N solo nella grotta Buco del Quai (Brescia).

Triacanthella nivalis: Presente in N solo nelle Alpi Occidentali del Sud.

Odontellidae

Odontella Schaeffer, 1897

Odontella empodialis Stach, 1934 (N, S)

Odontella lamellifera (Axelson, 1903) (N, S, Si)

Xenyllodes Axelson, 1903

Xenyllodes armatus Axelson, 1903 (N, S, Si)

Axenyllodes Stach, 1949

Axenyllodes caecus Deharveng, 1981 (S) (*)

Axenyllodes minitaurus (Ellis, 1976) (S) (*)

Pseudostachia Arlé, 1968

Pseudostachia populosa (Selga, 1963) (N)

Note

Axenyllodes caecus: Presente in S solo nelle Alpi Apuane.

Axenyllodes minitaurus: Presente in S solo in grotta, area senese.

Neanuridae

Brachystomella Agren, 1903

Brachystomella curvula Gisin, 1948 (S)

Brachystomella parvula (Schaeffer, 1896) (N, S)

Friesea Dalla Torre, 1895

Friesea acuminata (Denis, 1925) (N)

Friesea afurcata (Denis, 1926) (S) (*)

Friesea albida Stach, 1949 (N, S, Si)

Friesea claviseta Axelson, 1900 (N, S)

Friesea decemoculata Börner, 1903 (Si) (*)

Friesea decipiens Steiner, 1958 (N, S, Si)

Friesea duodecimoculata Denis, 1926 (N, S)

Friesea fagei Denis, 1932 (S)

Friesea lagrecai Dallai, 1973 (Si) (E) (*)

Friesea mirabilis (Tullberg, 1871) (N, S)

Friesea oligorhopala Caroli, 1914 (S, Si)

Friesea subterranea Cassagnau, 1958 (S)

Friesea truncata Cassagnau, 1958 (S)

Pseudachorutes Tullberg, 1871

Pseudachorutes dubius Krausbauer, 1898 (N, Si)

Pseudachorutes parvulus Börner, 1901 (N, S, Si, Sa)

Pseudachorutes rhaeticus (Carl, 1899) (N) (*)

Pseudachorutes subcrassus Tullberg, 1871 (S, Si)

Pseudachorudina Stach, 1949

Pseudachorudina alpina Stach, 1949 (N)

Pseudachorudina berninii (Dallai, 1970) (S) (*)

Pseudachorudina falteronensis (Denis, 1926) (N, S)

Pseudachorudina palmiensis (Börner, 1903) (S)

Pseudachorutella Stach, 1949

Pseudachorutella asigillata (Börner, 1901) (N, S, Si)

Anurida Laboulbène, 1865

Anurida callainii Dallai & Martinozzi, 1980 (S) (E) (*)

Anurida caprariensis Dallai, 1969 (S) (E) (*)

Anurida granaria (Nicolet, 1847) (N) (*)

Anurida granulata Agrell, 1943 (N)

Anurida maritima (Guérin, 1838) (N, S, Si, Sa)

Anurida tullbergi (Schött, 1891) (N)

Micranurida Börner, 1901

Micranurida forsslundi Gisin, 1949 (N) (*)

Micranurida hasai Kseneman, 1936 (N) (*)

Micranurida intermedia Dallai, 1973 (N) (E) (*)

Micranurida pygmaea Börner, 1901 (N, S, Si)

Neanura MacGillivray, 1893

Neanura muscorum (Templeton, 1835) (N, S, Si, Sa)

Stachorutes Dallai, 1973

Stachorutes dematteisi Dallai, 1973 (N) (E) (*)

Protanura Börner, 1906

Protanura monticellii Caroli, 1910 (S) (E) (*)

Protanura pseudomuscorum (Börner, 1903) (N, S, Si)

Protanura quadrioculata Börner, 1901 (Si?) (*)

Bilobella Caroli, 1912

Bilobella aurantiaca (Caroli, 1910) (N, S, Si, Sa)

Bilobella braunerae Deharveng, 1981 (N) (*)

Bilobella ligurica Deharveng, 1981 (N) (E) (*)

Bilobella massoudi Cassagnau, 1968 (N)

Lathriopyga Caroli, 1910

Lathriopyga longiseta (Caroli, 1910) (N, S, Sa)

Endonura Cassagnau, 1979

Endonura dalensi (Deharveng, 1979)
Endonura dalensi sardoa Dallai, 1983 (Sa) (E)
Endonura ichnusae Dallai, 1983 (Sa) (E)
Endonura tyrrhenica Dallai, 1983 (Sa) (E)

Deutonura Cassagnau, 1979

Deutonura betica (Deharveng, 1979) (S)
Deutonura caprai Dallai, 1983 (Sa) (E)
Deutonura conjuncta (Stach, 1926) (N) (*)
Deutonura deficiens (Deharveng, 1979)
Deutonura deficiens sylvatica Deharveng, 1982 (Sa)
Deutonura gisini Deharveng, 1982 (Sa)
Deutonura igilica Dallai, 1983 (S) (E) (*)
Deutonura ilvatica Dallai, 1983 (S) (E) (*)
Deutonura oglasicola Dallai, 1983 (S) (E) (*)
Deutonura phlegraea (Caroli, 1910) (N, S)
Deutonura sinistra (Denis, 1935) (N)
Deutonura stachi (Gisin, 1952) (S, Si)
Deutonura sylviae Dallai, 1983 (S) (E) (*)

Cansilianura Dallai & Fanciulli, 1983

Cansilianura malatestai Dallai & Fanciulli, 1983 (N) (E) (*)

Thaumanura Börner, 1932

Thaumanura ruffoi Dallai, 1969 (N, S)

Note

Friesea afurcata: Presente in S solo nella Pineta di Ravenna.
Friesea decemocolata: Presente in Si solo a Palermo.
Friesea lagrecai: Presente in Si solo alle Isole Eolie.
Pseudachorutes rhaeticus: Specie dubbia, presente in N solo a Trento.
Pseudachorudina berninii: Presente in S solo nelle Alpi Apuane.
Anurida callainii: Presente in S solo nella Val di Farma (Siena).
Anurida caprariensis: presente in S solo nell'isola di Capraia.
Anurida granaria: Presente in N solo nelle Dolomiti italiane.
Micranurida forsslundi: Presente in N solo nell'area bellunese.
Micranurida hasai: Presente in N solo nel Bosco del Cansiglio (Prealpi Venete).
Micranurida intermedia: Presente in N solo a Canzo (Como).
Stachorutes dematteisi: Presente in N solo a Canzo (Como).
Protanura monticellii: Presente in S solo nei dintorni di Napoli.
Protanura quadrioculata: Specie dubbia, presente in Si solo dei dintorni di Catania.
Bilobella braunerae: Presente in N solo nel Bosco del Cansiglio (Prealpi Venete).
Bilobella ligurica: Presente in N solo nel Col di Nava (Alpi Liguri).
Deutonura conjuncta: Presente in N solo nel Bosco del Cansiglio (Prealpi Venete).

Deutonura igilica: Presente in S solo all'isola del Giglio.

Deutonura ilvatica: Presente in S solo all'isola d'Elba.

Deutonura oglasicola: Presente in S solo alle isole di Capraia e Montecristo.

Deutonura sylviae: Presente in S solo all'isola d'Elba.

Cansilianura malatestai: Presente in N solo nel Bosco del Cansiglio (Prealpi Venete).

Onychiuridae

Tetrodontophora Reuter, 1882

Tetrodontophora bielanensis (Waga, 1842) (N)

Onychiurus Gervais, 1841

Onychiurus ambulans (Linné, 1758) (N)

Onychiurus apuanicus Dallai, 1970 (S) (E) (*)

Onychiurus bergamarius Gisin, 1956 (N) (E) (*)

Onychiurus boldorii Denis, 1937 (N)

Onychiurus bosnarius Gisin, 1964 (N)

Onychiurus canzianus Stach, 1934 (N)

Onychiurus capraiae Dallai, 1969 (S) (E) (*)

Onychiurus cebennarius Gisin, 1956 (S) (*)

Onychiurus defensarius Gisin, 1964 (S) (E) (*)

Onychiurus difficilis Dallai, 1969 (S)

Onychiurus dunarius Gisin, 1956 (S) (*)

Onychiurus eduardi Denis, 1937 (N) (*)

Onychiurus fimetarius (Linné, 1758) (N, S)

Onychiurus ghidinii Denis, 1937 (N, S, Si)

Onychiurus gridellii Denis, 1937 (N) (E) (*)

Onychiurus hauseri Dallai, 1975 (N)

Onychiurus imperfectus Denis, 1937 (N)

Onychiurus insubrarius Gisin, 1952 (S)

Onychiurus lenticularis Gisin, 1962 (N) (E) (*)

Onychiurus ossarius Gisin, 1964 (S) (*)

Onychiurus paoletti Dallai, 1975 (N) (E) (*)

Onychiurus papillaeferus Stach, 1946 (N)

Onychiurus postumicus Bonet, 1931 (N) (*)

Onychiurus pseudobosnarius Dallai, 1970 (S) (*)

Onychiurus pseudoghidinii Dallai, 1969 (S)

Onychiurus pseudogranulosus Gisin, 1951 (N, S)

Onychiurus pseudoinsubrarius Dallai, 1970 (S)

Onychiurus pseudostachianus Gisin, 1956 (N, S)

Onychiurus rectospinatus Stach, 1922 (N, S)

Onychiurus scotarius Gisin, 1954 (N)

Onychiurus silvarius Gisin, 1952 (S)

Onychiurus sinensis Stach, 1954 (N) (*)

Onychiurus spipolae Massera, 1949 (N) (E) (*)

Onychiurus stachianus Bagnall, 1939 (N)
Onychiurus stillicidii (Schiödte, 1849) (N) (*)
Onychiurus subcirculans Gisin, 1962 (S) (*)
Onychiurus subgranulosus Gama, 1964 (S)

Oligaphorura Bagnall, 1949

Oligaphorura absoloni (Börner, 1901) (N, S)
Oligaphorura dallaii Nosek & Paoletti, 1981 (N)
Oligaphorura marcuzzii Cassagnau, 1968 (N)

Protaphorura Absolon, 1901

Protaphorura alticola Bagnall, 1935 (N, S)
Protaphorura armata (Tullberg, 1869) (N, S, Si)
Protaphorura caerulea (Börner, 1901) (Si) (E) (*)
Protaphorura dallaii Nosek & Paoletti, 1981 (N) (E) (*)
Protaphorura dudichi Loksa & Rubio, 1966 (S) (*)
Protaphorura fimata Gisin, 1952 (S) (E) (*)
Protaphorura furcifer (Börner, 1901) (N)
Protaphorura glebata Gisin, 1952 (N)
Protaphorura lata Gisin, 1956 (N)
Protaphorura nemorata Gisin, 1952 (S) (*)
Protaphorura octopunctata (Tullberg, 1876) (N)
Protaphorura procampata Gisin, 1956 (N) (*)
Protaphorura prolata Gisin, 1956 (N) (*)
Protaphorura quadriocellata Gisin, 1947 (N) (*)
Protaphorura sibirica (Tullberg, 1876) (N, S)
Protaphorura strasseri Stach, 1934 (N)
Protaphorura sublata Gisin, 1957 (S, Si)
Protaphorura submontana Denis, 1926 (N?) (E) (*)
Protaphorura subuliginata Gisin, 1956 (N)
Protaphorura tuberculata (Moniez, 1861) (N, S, Si)
Protaphorura uliginata Gisin, 1952 (N)
Protaphorura variotuberculata Stach, 1934 (N, S)
Protaphorura zschokkei Handschin, 1919 (N, S)

Marcuzziella Rusek, 1975

Marcuzziella tripartita Rusek, 1975 (S)

Note

Onychiurus apuanicus: Presente in S solo nelle Alpi Apuane.
Onychiurus bergamarius: Presente in N solo nel bergamasco.
Onychiurus caprariae: Presente in S solo nell'isola di Capraia.
Onychiurus cebennarius: Presente in S solo in Abruzzo.
Onychiurus defensarius: Presente in S solo in Abruzzo.

Onychiurus dunarius: Presente in S solo all'isola di Pianosa.
Onychiurus eduardi: Presente in N solo nelle Alpi friulane.
Onychiurus gridellii: Presente in N solo nell'area bresciana.
Onychiurus lenticularis: Presente in N solo nella Grotta del Monte Fenera (Piemonte).
Onychiurus ossarius: Presente in S solo in una grotta dell'aquilano.
Onychiurus paolettii: Presente in N solo in grotta del bellunese.
Onychiurus postumicus: Presente in N solo nel bresciano.
Onychiurus pseudobosnarius: Presente in S solo nelle Alpi Apuane.
Onychiurus sinensis: Presente in N solo a Milano.
Onychiurus spipolae: Presente in N solo in una grotta dell'area bolognese.
Onychiurus stillicidii: Presente in N solo nella Grotta della Spipola (Bologna).
Onychiurus subcirculans: Presente in S solo in grotta del salernitano.
Protaphorura caerulea: Presente in Si solo a Catania.
Protaphorura dallaii: Presente in N solo nella Grotta Cesare Battisti (Prealpi Venete).
Protaphorura dudichi: Presente in S solo nelle Alpi Apuane.
Protaphorura fimata: Presente in S solo nelle Alpi Apuane.
Protaphorura nemorata: Presente in S solo nelle Alpi Apuane.
Protaphorura procampata: Presente in N solo sulla Marmolada.
Protaphorura prolata: Presente in N solo nelle Dolomiti italiane.
Protaphorura quadriocellata: Presente in N solo nell'area padovana.
Protaphorura submontana: Specie dubbia, presente in N solo al M.te Fumaiolo (Appennino Tosco-Emiliano).

Tullbergiidae

Mesaphorura Börner, 1901

Mesaphorura critica Ellis, 1976 (S) (*)
Mesaphorura italica Rusek, 1971 (N, S, Sa)
Mesaphorura krausbaueri Börner, 1901 (N, S, Si)
Mesaphorura macrochaeta Rusek, 1976 (N)
Mesaphorura sensibilis Rusek, 1973 (N) (*)
Mesaphorura sylvatica Rusek, 1971 (N, Sa)

Paratullbergia Womersley, 1930

Paratullbergia callipygos (Börner, 1903) (S, Si)
Paratullbergia simplex (Gisin, 1958) (N) (E) (*)

Metaphorura Bagnall, 1936

Metaphorura affinis (Börner, 1903) (N, S, Si)
Metaphorura triacantha (Börner, 1901) (Si) (E) (*)

Neotullbergia Bagnall, 1935

Neotullbergia ramicuspis Gisin, 1953 (S)

Neotullbergia tricuspis (Börner, 1903) (N, S)

Stenaphorura Absolon, 1900

Stenaphorura quadrispina Börner, 1901 (N, S)

Neonaphorura Bagnall, 1935

Neonaphorura duboscqi Denis, 1932 (Si) (*)

Scaphaphorura Petersen, 1965

Scaphaphorura arenaria (Petersen, 1965) (N, Sa)

Note

Mesaphorura critica: Presente in S solo nell'Abruzzo sud-orientale.

Mesaphorura sensibilis: Presente in N solo nel Bosco del Cansiglio (Prealpi Venete).

Paratullbergia simplex: Presente in N solo nelle Dolomiti (Marmolada).

Metaphorura triacantha: Presente in Si solo a Catania.

Neonaphorura duboscqi: Presente in Si solo alle Isole Eolie.

Isotomidae

Tetracanthella Schött, 1841

Tetracanthella afurcata Handschin, 1919 (N)

Tetracanthella dallai Deharveng, 1987 (N) (E) (*)

Tetracanthella emucronata Deharveng, 1987 (N) (*)

Tetracanthella hygropetrica Cassagnau, 1954 (S)

Tetracanthella montana Stach, 1947 (N) (*)

Tetracanthella pilosa Schött, 1891 (N, S)

Tetracanthella stachi Cassagnau, 1959 (N)

Tetracanthella tuberculata Cassagnau, 1954 (S, Si)

Astephanus Denis, 1926

Astephanus linnaniemii (Denis, 1926) (N, S)

Coloburella Latzel, 1918

Coloburella zangherii (Denis, 1924) (N, S, Si)

Anurophorus Nicolet, 1842

Anurophorus isotoma Börner, 1903 (S, Si)

Anurophorus konseli Kseneman, 1936 (N)

Anurophorus laricis Nicolet, 1842 (N, S)
Anurophorus rugosus Dallai & Martinozzi, 1980 (S) (E) (*)
Anurophorus spinosus Dallai, 1971 (S) (E) (*)

Pseudanurophorus Stach, 1922

Pseudanurophorus binoculatus Kseneman, 1934 (N)

Isotomodes Linnaniemi, 1912

Isotomodes productus (Axelson, 1906) (N) (*)
Isotomodes sexsetosus da Gama, 1963
Isotomodes sexsetosus provincialis Poinsot, 1966 (S, Si)

Micranurophorus Bernard, 1977

Micranurophorus schalleri Christian, 1986 (N)

Folsomides Stach, 1922

Folsomides angularis (Axelson, 1905) (S, Si, Sa)
Folsomides meridionalis Dallai, 1973 (Si) (E) (*)
Folsomides navacerradensis Selga, 1962 (S)
Folsomides parvulus Stach, 1922 (N, S, Si, Sa)
Folsomides pusillus (Schäffer, 1900) (N, S)
Folsomides variabilis (Gisin, 1949) (N) (*)

Proisotoma Börner, 1901

Proisotoma caucasica Stach, 1947 (S)
Proisotoma curva Gisin, 1949 (S) (*)
Proisotoma minima (Absolon, 1901) (N) (*)
Proisotoma minuta (Tullberg, 1871) (S, Si)
Proisotoma ripicola Linnaniemi, 1912 (S) (*)
Proisotoma tenella (Reuter, 1895) (N) (*)

Cryptopygus Willem, 1901

Cryptopygus agreni (Börner, 1903) (N)
Cryptopygus bipunctatus (Axelson, 1903) (N, S, Si)
Cryptopygus orientalis (Stach, 1947) (S) (*)
Cryptopygus ponticus (Stach, 1947) (S, Si)
Cryptopygus thermophilus (Axelson, 1900) (N, S, Si, Sa)

Archisotoma Linnaniemi, 1912

Archisotoma interstitialis Delamare, 1954 (Sa)

Folsomia Willem, 1902

Folsomia alpina Kseneman, 1936 (S) (*)
Folsomia candida (Willem, 1902) (N, S, Si)
Folsomia decemoculata Stach, 1946 (Si)
Folsomia diplophthalma (Axelson, 1902) (N) (*)
Folsomia fimetaria (Linné, 1758) (N)
Folsomia giustii Dallai, 1970 (S) (E) (*)
Folsomia ksenemani Stach, 1947 (S)
Folsomia multiseta Stach, 1947 (N, S, Si)
Folsomia nana Gisin, 1957 (N)
Folsomia quadrioculata (Tullberg, 1871) (N, S)
Folsomia sensibilis Kseneman, 1936 (N) (*)
Folsomia sexoculata Tullberg, 1871 (N) (*)
Folsomia spinosa Kseneman, 1936 (N)

Proctostephanus Börner, 1902

Proctostephanus cidi Selga, 1958 (Sa)
Proctostephanus stuckeni Börner, 1902 (N, S, Si)

Isotomurus Börner, 1903

Isotomurus alticola (Carl, 1899) (N)
Isotomurus lateclavus Kos, 1937 (N)
Isotomurus palustris (O.F. Müller, 1776) (N, S, Si, Sa)
Isotomurus subterraneus Stach, 1946 (N) (*)

Hydroisotoma Stach, 1947

Hydroisotoma schaefferi (Krausbauer, 1898) (N, S)

Isotoma Bourlet, 1839

Isotoma duodecimoculata Denis, 1927 (N)
Isotoma elegans Carl, 1899 (N) (*)
Isotoma kosiana Bagnall, 1949 (N)
Isotoma maritima Tullberg, 1871 (N, S)
Isotoma nivalis Carl, 1910 (N)
Isotoma notabilis Schäffer, 1896 (N, S, Si)
Isotoma olivacea (Tullberg, 1871) (N, S, Si)
Isotoma saltans (Nicolet, 1841) (N)
Isotoma violacea Tullberg, 1876 (N, S)
Isotoma viridis Bourlet, 1839 (N, S, Si)

Pseudisotoma Handschin, 1924

Pseudisotoma monochaeta (Kos, 1942) (S)

Pseudisotoma sensibilis (Tullberg, 1876) (N, S)

Vertagopus Börner, 1906

Vertagopus arborea (Linné, 1758) (N, S, Sa)

Vertagopus cinerea (Nicolet, 1842) (N)

Vertagopus westerlundi (Reuter, 1897) (S)

Isotomiella Bagnall, 1939

Isotomiella minor (Schäffer, 1976) (N, S, Si)

Agrenia Börner, 1906

Agrenia bidenticulata (Tullberg, 1876) (N) (*)

Axelsonia Börner, 1906

Axelsonia littoralis (Moniez, 1890) (N, S)

Note

Tetracanthella dallaii: Presente in N solo a Col de Pourriac, Cuneo.

Tetracanthella emucronata: Presente in N solo nel M.te Nebius, Cuneo.

Tetracanthella montana: Presente in N solo nelle Dolomiti italiane.

Anurophorus rugosus: Presente in S solo nel Gran Sasso d'Italia.

Anurophorus spinosus: Presente in S solo nella Val di Farma (Siena).

Isotomodes productus: Presente in N solo in Val Pusteria (Trentino-Alto Adige).

Folsomides meridionalis: Presente in Si solo nelle Isole Eolie.

Folsomides variabilis: Presente in N solo al Parco Nazionale dello Stelvio.

Proisotoma curva: Presente in S solo nelle Alpi Apuane.

Proisotoma minima: Presente in N solo nella grotta Arma della Pollera (Finale Ligure).

Proisotoma ripicola: Presente in S solo all'isola di Capraia.

Proisotoma tenella: Presente in N solo nel Trentino.

Cryptopygus orientalis: Presente in S solo nell'Abruzzo sud-orientale.

Folsomia alpina: Presente in S solo nelle Alpi Apuane.

Folsomia diplophthalma: Presente in N solo nelle Prealpi Venete.

Folsomia giustii: Presente in S solo nelle Alpi Apuane.

Folsomia sensibilis: Presente in N solo nel Bosco del Cansiglio (Prealpi Venete).

Folsomia sexoculata: Presente in N solo nelle Prealpi Venete.

Isotomurus subterraneus: Presente in N solo nel Trentino.

Isotoma elegans: Presente in N solo nelle Alpi Orobiche.

Agrenia bidenticulata: Presente in N solo nelle Alpi Orobiche.

Entomobryidae

Orchesella Templeton, 1835

Orchesella alticola Uzel, 1890 (N)
Orchesella arcuata Lindenmann, 1950 (N) (*)
Orchesella bifasciata Nicolet, 1842 (N)
Orchesella capreanea Denis, 1931 (S) (E) (*)
Orchesella chiantica Frati & Szeptycki, 1990 (S) (E) (*)
Orchesella cincta (Linné, 1758) (N, S, Sa)
Orchesella dallaii Frati & Szeptycki, 1990 (S) (E) (*)
Orchesella diversicincta Kos, 1936 (N)
Orchesella eolia Altner, 1961 (S, Si)
Orchesella flavescens (Bourlet, 1839) (N, S)
Orchesella jonescoi Denis, 1926 (N)
Orchesella maledicta Denis, 1931 (N) (E) (*)
Orchesella quinquefasciata (Bourlet, 1841) (N)
Orchesella ranzii Parisi, 1960 (S, Sa)
Orchesella triglavensis Kos, 1936 (N)
Orchesella villosa (Geoffroy, 1762) (N, S, Sa)

Heteromurus Wankel, 1860

Heteromurus dallaii Nosek & Paoletti, 1981 (N) (E) (*)
Heteromurus major (Moniez, 1889) (N, S, Si, Sa)
Heteromurus nitidus (Templeton, 1835) (N, S, Si, Sa)
Heteromurus tetrophthalmus Börner, 1903 (N, S, Si)

Entomobrya Rondani, 1861

Entomobrya corticalis (Nicolet, 1842) (N, Sa)
Entomobrya handschini Stach, 1922 (S)
Entomobrya italica Tarsia, 1941 (N?) (E) (*)
Entomobrya lanuginosa (Nicolet, 1842) (N, Sa)
Entomobrya marginata (Tullberg, 1871) (N, Si)
Entomobrya multifasciata (Tullberg, 1871) (N, S, Sa)
Entomobrya muscorum (Nicolet, 1842) (N, S, Sa)
Entomobrya nicoleti (Lubbock, 1867) (N, S)
Entomobrya nivalis (Linné, 1758) (N, S, Si)
Entomobrya schoetti Stach, 1922 (N) (*)
Entomobrya unostrigata Stach, 1930 (N) (*)

Sinella Brook, 1882

Sinella coeca (Schött, 1896) (Si)

Willowsia Schoebotham, 1917

Willowsia buski (Lubbock, 1870) (N)
Willowsia platani (Nicolet, 1842) (N)

Seira Lubbock, 1869

Seira dagamae Dallai, 1973 (Si) (E) (*)
Seira dollfusi (Carl, 1899) (N, Sa)
Seira domestica (Nicolet, 1842) (N, S, Si)
Seira ferrarii Parona, 1888 (N, S, Si)
Seira italica (Cassagnau & Delamare, 1953) (S) (E) (*)
Seira sacchii Parisi, 1969 (S, Si, Sa)
Seira squamoornata (Stscherbakow, 1898) (Si) (*)

Lepidocyrtus Bourlet, 1839

Lepidocyrtus curvicollis Bourlet, 1839 (N, S, Si, Sa)
Lepidocyrtus cyaneus Tullberg, 1871 (N, S)
Lepidocyrtus instratus Handshin, 1924 (N, S)
Lepidocyrtus lanuginosus (Gmelin, 1788) (N, S)
Lepidocyrtus lignorum (Fabricius, 1793) (N, S, Si, Sa)
Lepidocyrtus nigrescens Szeptycki, 1967 (N) (*)
Lepidocyrtus paradoxus Uzel, 1890 (N, S)
Lepidocyrtus ruber Schött, 1902 (N, S)
Lepidocyrtus violaceus Lubbock, 1873 (S) (*)

Pseudosinella Schäffer, 1897

Pseudosinella aeolica Dallai, 1973 (Si) (E) (*)
Pseudosinella alba (Packard, 1873) (S)
Pseudosinella albida Stach, 1930 (N, S)
Pseudosinella alfonsii Dallai & Malatesta, 1982 (S) (E) (*)
Pseudosinella alpina Gisin & Gama, 1970 (N)
Pseudosinella apuanica Dallai, 1970 (S)
Pseudosinella concii Gisin, 1950 (N)
Pseudosinella difficilis Denis, 1926 (N)
Pseudosinella duodecimoculata Bonet, 1931 (N)
Pseudosinella edax Gisin, 1967 (N)
Pseudosinella fallax (Börner, 1903) (N, S, Si)
Pseudosinella feneriensis Gisin, 1962 (N)
Pseudosinella hermanni Dallai, 1976 (N) (E) (*)
Pseudosinella illiciens Gisin, 1967 (S)
Pseudosinella insubrica Gisin & Gama, 1969 (N, S) (*)
Pseudosinella insularum Dallai, 1969 (S)
Pseudosinella marcuzzii Rusek, 1985 (N) (E) (*)
Pseudosinella octopunctata Börner, 1901 (N, Si)
Pseudosinella picta (Börner, 1903) (N, Si)
Pseudosinella sexoculata Schött, 1902 (N, S, Si)

Tritomurus Frauenfeld, 1854

Tritomurus scutellatus Frauenfeld, 1854 (N)

Note

Orchesella arcuata: Presente in N solo nelle Alpi Orobie.
Orchesella capreanea: Presente in S solo all'isola di Capri.
Orchesella chiantica: Presente in S solo al Castello di Brolio (Siena).
Orchesella dallaii: Presente in S solo al Castello di Brolio (Siena).
Orchesella maledicta: Presente in N solo nella Grotta Bùs Tuel (Brescia).
Heteromurus dallaii: Presente in N solo nella Grotta della Fous (Prealpi Venete).
Entomobrya italica: Specie dubbia, presente in N solo a Mattarello - Alveo d'Acquaviva (Trentino).
Entomobrya schoetti: Presente in N solo nel Trentino.
Entomobrya unostrigata: Presente in N solo a Bordighera.
Seira dagamae: Presente in Si solo nelle Isole Eolie.
Seira italica: Presente in S solo ad Acilia (Roma).
Seira squamoornata: Presente in Si solo all'isola di Stromboli.
Lepidocyrtus nigrescens: Presente in N solo nel Bosco del Cansiglio (Prealpi Venete).
Lepidocyrtus violaceus: Presente in S solo nei Monti Reatini.
Pseudosinella aeolica: Presente in Si solo alle Isole Eolie.
Pseudosinella alfonsii: Presente in S solo in grotte del senese.
Pseudosinella hermanni: Presente in N solo a S. Brigida, Moncalieri (Piemonte).
Pseudosinella insubrica: Di vandelii longicornis non esistono più i tipi descritti dall'autore.
Pseudosinella marcuzzii: Presente in N solo nel Bosco del Cansiglio (Prealpi Venete).

Cyphoderidae

Cyphoderus Nicolet, 1941

Cyphoderus albinus Nicolet, 1842 (N, S)
Cyphoderus bidenticulatus (Parona, 1888) (N, S, Si)
Cyphoderus silvestrii Denis, 1924 (Si) (*)

Note

Cyphoderus silvestrii: Presente in Si solo nelle Isole Eolie.

Oncopoduridae

Oncopodura Carl & Lebedinski, 1905

Oncopodura crassicornis Schoebotham, 1911 (N, S, Si)

Tomoceridae

Tomocerus Nicolet, 1841

Tomocerus lamelliger (Börner, 1903) (S) (*)
Tomocerus minor (Lubbock, 1862) (N, S)
Tomocerus minutus Tullberg, 1876 (N)
Tomocerus mixtus Gisin, 1961 (N) (*)
Tomocerus vulgaris (Tullberg, 1871) (N, S)

Pogonognathellus Paclt, 1944

Pogonognathellus flavescens (Tullberg, 1871) (N, S)
Pogonognathellus longicornis (O.F. Müller, 1776) (N, S)

Troglopedetes Absolon, 1907

Troglopedetes ruffoi Delamare, 1951 (S)

Note

Tomocerus lamelliger: Presente in S solo a Palmi (Calabria).
Tomocerus mixtus: Presente in N solo nella Venezia Tridentina.

Sminthurididae

Sphaeridia Linnaniemi, 1912

Sphaeridia pumilis (Krausbauer, 1898) (N, S, Si)

Sminthurides Börner, 1900

Sminthurides aquaticus (Bourlet, 1843) (N)
Sminthurides assimilis (Krausbauer, 1898) (S) (*)
Sminthurides inaequalis Börner, 1903 (Si)
Sminthurides malmgreni (Tullberg, 1876) (N)
Sminthurides schoetti Axelson, 1903 (S, Si)

Stenacidia Börner, 1906

Stenacidia hystrix (Börner, 1903) (S, Si)

Note

Sminthurides assimilis: Presente in S solo nell'isola di Giannutri.

Arrhopalitidae

Arrhopalites Börner, 1906

Arrhopalites baccettii Dallai, 1969 (Si)
Arrhopalites caecus (Tullberg, 1871) (N, S, Si)
Arrhopalites cochlearifer Gisin, 1947 (S)
Arrhopalites delamarei Nosek & Paoletti, 1984 (N) (E) (*)
Arrhopalites furcatus Stach, 1945 (S, Si)
Arrhopalites giovannensis Cassagnau & Delamare, 1953 (Sa) (E) (*)
Arrhopalites ornatus Stach, 1945 (S, Si)
Arrhopalites pygmaeus (Wankel, 1860) (N, S)
Arrhopalites secundarius Gisin, 1958 (N, S)
Arrhopalites sericus Gisin, 1947 (S, Sa)
Arrhopalites terricola Gisin, 1958 (S)

Note

Arrhopalites delamarei: Presente in N solo nella Grotta della Fous, Friuli.
Arrhopalites giovannensis: Presente in Sa solo nella Grotta di S. Giovanni.

Katiannidae

Sminthurinus Börner, 1901

Sminthurinus aureus (Lubbock, 1862) (N, S, Si)
Sminthurinus bimaculatus (Axelson, 1902) (N) (*)
Sminthurinus concolor (Meinert, 1896) (Si) (E) (*)
Sminthurinus elegans (Fitsch, 1863) (N, S, Si)
Sminthurinus niger (Lubbock, 1868) (N, Si, Sa)
Sminthurinus planasiensis Dallai, 1969 (S) (E) (*)
Sminthurinus trinotatus (Axelson, 1905) (N) (*)

Stenognathellus Cassagnau, 1953

Stenognathellus denisi Cassagnau, 1953 (S)

Betschurinus Dallai & Martinozzi, 1980

Betschurinus farmae Dallai & Martinozzi, 1980 (S) (E) (*)

Note

Sminthurinus bimaculatus: Presente in N solo nel Bosco del Cansiglio (Prealpi Venete).
Sminthurinus concolor: Presente in Si solo alle isole Eolie.
Sminthurinus planasiensis: Presente in S solo nell'isola di Pianosa.
Sminthurinus trinotatus: Presente in N solo nel Bosco del Cansiglio (Prealpi Venete).
Betschurinus farmae: Presente in S solo nella Val di Farma (Siena).

Dicyrtomidae

Dicyrtoma Bourlet, 1843

Dicyrtoma fusca (Lucas, 1842) (N, S, Sa)

Dicyrtoma melitensis Stach, 1957 (S, Sa)

Dicyrtomina Börner, 1903

Dicyrtomina minuta (O. Fabricius, 1783) (N, Si, Sa)

Dicyrtomina ornata (Nicolet, 1842) (N, S, Sa)

Ptenothrix Börner, 1906

Ptenothrix atra (Linné, 1758) (N, S)

Ptenothrix italica Dallai, 1973 (S, Si)

Sminthuridae

Lipothrix Börner, 1906

Lipothrix italica (Cassagnau, 1968) (N, S)

Lipothrix lubbocki (Tullberg, 1872) (N, S)

Spatulosminthurus Betsch & Betsch-Pinot, 1984

Spatulosminthurus gattoi (Stach, 1967) (S) (*)

Spatulosminthurus lesnei (Carl, 1925) (S) (*)

Sminthurus Latreille, 1804 sensu Börner, 1906

Sminthurus erinaceus Börner, 1903 (Si?) (*)

Sminthurus multipunctatus (Schäffer, 1896) (N) (*)

Sminthurus nigromaculatus Tullberg, 1872 (N) (*)

Sminthurus viridis (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)

Allacma Börner, 1906

Allacma fusca (Linné, 1758) (N, S, Sa)

Allacma gallica (Carl, 1899) (N, S, Si)

Capraïnea Dallai, 1970

Capraïnea echinata (Stach, 1930) (N, S, Si, Sa)

Capraïnea marginata (Schött, 1893) (N, S, Si)

***Disparrhopalites* Stach, 1956**

Disparrhopalites patrizii (Cassagnau & Delamare, 1953) (N, S, Si)

***Gisinurus* Dallai, 1970**

Gisinurus malatestai Dallai, 1970 (S)

Note

Spatulosminthurus gattoi: Presente in S solo nei dintorni di Siena.

Spatulosminthurus lesnei: Presente in S solo a Castellaccio (Livorno).

Sminthurus erinaceus: Specie dubbia, presente in Si solo a Palermo.

Sminthurus multipunctatus: Presente in N solo a Genova.

Sminthurus nigromaculatus: Presente in N solo nel Parco Nazionale dello Stelvio.

Bourletiellidae

***Bourletiella* Banks, 1899**

Bourletiella lutea (Lubbock, 1868) (N, S, Sa)

Bourletiella pistillum Gisin, 1946 (S) (*)

***Deuterosminthurus* Börner, 1901**

Deuterosminthurus repandus (Agren, 1903) (N, Si)

***Heterosminthurus* Stach, 1955**

Heterosminthurus bilineatus (Bourlet, 1842) (N, S, Sa)

Heterosminthurus claviger (Gisin, 1958) (N)

***Prorastriopes* Delamare, 1947**

Prorastriopes melanocephalus (Dallai, 1966) (S) (E) (*)

Prorastriopes virgulatus (Skorikow, 1899) (S, Si)

Note

Bourletiella pistillum: Presente in S solo nelle Alpi Apuane.

Prorastriopes melanocephalus: Presente in S solo a S. Rossore (Pisa).

Neelidae

***Neelus* Folsom, 1896**

Neelus minutus Folsom, 1901 (N) (*)
Neelus murinus Folsom, 1896 (N, S, Si)

Neelides Caroli, 1912

Neelides folsomi Caroli, 1912 (S)

Megalothorax Willem, 1900

Megalothorax incertus (Börner, 1903) (S, Si)
Megalothorax minimus Willem, 1900 (N, S, Si)

Note

Neelus minutus: Presente in N solo nel Bosco del Cansiglio (Prealpi Venete).

Protura

Eosentomidae

Eosentomon Berlese, 1909

Eosentomon delicatum Gisin, 1945 (N)
Eosentomon foroiuliense Torti & Nosek, 1984 (N) (E) (*)
Eosentomon germanicum Prell, 1912 (N, S)
Eosentomon romanum Nosek, 1969 (N, S)
Eosentomon transitorium Berlese, 1909 (N, S)

Note

Eosentomon foroiuliense: Presente in N solo nel Friuli.

Protentomidae

Proturentomon Silvestri, 1909

Proturentomon minimum Berlese, 1908 (S)

Protentomon Ewing, 1921

Protentomon berlesei Nosek, 1969 (N)
Protentomon perpusillum (Berlese, 1909) (S) (*)

Note

Protentomon perpusillum: Presente in S solo a S. Vincenzo (Livorno).

Hesperentomidae

Ionescuellum Tuxen, 1960

Ionescuellum condei (Nosek, 1965) (N)

Acerentomidae

Acerentulus Berlese, 1908

Acerentulus alpinus Gisin, 1945 (N)
Acerentulus apuliacus Rusek & Stumpp, 1988 (S)
Acerentulus condei Nosek, 1983 (Sa)
Acerentulus confinis (Berlese, 1908) (N, S)
Acerentulus cunhai Condé, 1950 (N)
Acerentulus exiguus Condé, 1944 (Sa)
Acerentulus gisini Condé, 1952 (N)
Acerentulus traegardhi Ionescu, 1937 (S)

Acerentomon Silvestri, 1907

Acerentomon affine Bagnall, 1912 (N)
Acerentomon balcanicum Ionescu, 1933 (S, Sa)
Acerentomon baldense Torti, 1986 (N) (E) (*)
Acerentomon condei Nosek & Dallai, 1982 (Sa) (E)
Acerentomon doderoi Silvestri, 1907 (N) (*)
Acerentomon italicum Nosek, 1969 (N) (*)
Acerentomon maius Berlese, 1908 (S)
Acerentomon meridionale Nosek, 1960 (N, S)
Acerentomon microrhinus Berlese, 1909 (N)
Acerentomon noseki Torti, 1981 (N)

Note

Acerentomon baldense: Presente in N solo al Monte Baldo (Prealpi venete).
Acerentomon doderoi: Presente in N solo a Genova.
Acerentomon italicum: Presente in N solo a Tiarno (TR).

Berberentomidae

Gracilentulus Tuxen, 1963

Gracilentulus gracilis (Berlese, 1908) (S)

Gracilentulus sardinianus Nosek, 1979 (Sa)

Acerellidae

Acerella Berlese, 1909

Acerella muscorum (Ionescu, 1930) (N)

Acerella tiarnea (Berlese, 1908) (N, S)

Microcoryphia

Machilidae

Charimachilis Wigodzensky, 1939

Charimachilis orientalis (Silvestri, 1908) (S, Si)

Charimachilis relictata Janetschek, 1954 (*)

Charimachilis relictata egatensis Bach, 1983 (Si) (E)

Charimachilis relictata relictata Janetschek, 1957 (S)

Dilta (Strand, 1911)

Dilta concolor Bach, 1983 (S)

Dilta italica (Grassi, 1887) (S, Si)

Lepismachilis Verhoeff, 1910

Lepismachilis campusminus Bach, 1983 (S) (E)

Lepismachilis cisalpina Wygodzensky, 1940 (S)

Lepismachilis hansenii Wygodzensky, 1941 (S)

Lepismachilis janetscheki Stach, 1958 (S) (*)

Lepismachilis kahmannii Bitsch, 1964 (Sa)

Lepismachilis osellai Bach, 1983 (S)

Lepismachilis philippi Wygodzensky, 1953 (S)

Lepismachilis rozsypali Kratochvil, 1945 (N)

Lepismachilis targionii (Grassi, 1887) (N, S, Si, Sa)

Lepismachilis transalpina Wygodzensky, 1940 (N)

Lepismachilis veronensis Bach, 1983 (N) (E)

Lepismachilis ysignata Kratochvil, 1945 (N, S)

Machilis Latreille, 1904 sensu Wygodzensky, 1941

Machilis albifrons Bach, 1983 (S) (E)

Machilis chisonensis Bach, 1983 (N) (E)

Machilis cottianus Bach, 1983 (N) (E)

Machilis engiadina Wygodzinsky, 1941 (N)
Machilis gardinii Mendes, 1980 (N) (E)
Machilis germanica Janetschek, 1953 (N)
Machilis longipalpus Bach, 1983 (N) (E)
Machilis maculata Bach, 1983 (N) (E)
Machilis noveli Bitsch, 1955 (N)
Machilis oblitterata Janetschek, 1970 (N)
Machilis obscura Bach, 1983 (N) (E)
Machilis pallida Janetschek, 1949 (N)
Machilis pasubiensis Bach, 1983 (N) (E)
Machilis pedemontanus Mendes, 1980 (N) (E)
Machilis sardous Bach, 1983 (Sa) (E)
Machilis steinbocki Riezler, 1939 (N)
Machilis tirolensis Verhoeff, 1910 (N)
Machilis zangherii Janetschek, 1949 (N)

Petrobius Leach, 1809

Petrobius artemisiae Mendes, 1980 (S) (E)
Petrobius maritimus (Leach, 1809) (N)

Praemachilis Silvestri, 1904

Praemachilis excelsior Silvestri, 1904 (S, Si)

Trigoniomachilis Stach, 1937

Trigoniomachilis soavensis Bach, 1983 (N) (E)

Praetrigoniophthalmus Janetschek, 1954

Praetrigoniophthalmus aetnensis (Verhoeff, 1910) (Si)
Praetrigoniophthalmus kuhnelti Janetschek, 1954 (N, S)
Praetrigoniophthalmus meticolosa (Silvestri, 1904) (S)

Trigoniophthalmus Verhoeff, 1910 sensu Wygodzinsky, 1941

Trigoniophthalmus alternatus (Silvestri, 1904) (N, S)
Trigoniophthalmus hussoni Wygodzinsky, 1958 (S)
Trigoniophthalmus remyi Stach, 1939 (N, S)

Wygodzinskylis Janetschek, 1954

Wygodzinskylis klinocellata Janetschek, 1954 (N, S)

Note

Charimachilis relictata: Presente in S solo nel Gargano.

Lepismachilis janetscheki: Presente in S solo in Aspromonte.

Meinertellidae

Machilinus (Silvestri, 1904)

Machilinus kleinenbergi (Giardina, 1900) (S)

Machilinus rupestris (Lucas, 1846)

Machilinus rupestris gallicus Bitsch, 1968 (N, S, Si, Sa)

Zygentoma

Lepismatidae

Neoasterolepisma Mendes, 1988

Neoasterolepisma balcanica (Stach, 1922) (Si)

Neoasterolepisma crassipes (Escherich, 1905) (Si)

Neoasterolepisma wasmannii (Moniez, 1894) (S)

Ctenolepisma Escherich, 1905

Ctenolepisma ciliata (Dufour, 1831) (S, Si, Sa)

Ctenolepisma lineata (Fabricius, 1775) (Si, Sa)

Ctenolepisma lineata pilifera (Lucas, 1840) (N, S, Sa)

Ctenolepisma longicaudata Escherich, 1905 (N, Si)

Ctenolepisma targionii (Grassi & Rovelli, 1889) (N, S, Si, Sa)

Lepisma Linnaeus, 1758

Lepisma chlorosoma Lucas, 1848 (N, S, Si, Sa)

Lepisma saccharina Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)

Tricholepisma Paclt, 1967

Tricholepisma aurea (Dufour, 1831) (N, S, Si, Sa)

Tricholepisma gyriniformis (Lucas, 1846) (Si)

Thermobia Bergroth, 1890

Thermobia domestica (Packard, 1873) (N)

Ateluridae

Atelura Heyden, 1855

Atelura formicaria Heyden, 1855 (N)

Proatelurina Paclt, 1963

Proatelurina pseudolepisma Grassi & Rovelli, 1890 (N, S, Si, Sa)

Nicoletiidae

Coletinia Wygodzinsky, 1980

Coletinia maggii (Grassi, 1887) (S, Si)

Coletinia setusola Wygodzinsky, 1980 (Si)

Coletinia subterranea (Silvestri, 1902) (S, Si)

Nicoletia Gervais, 1844

Nicoletia lucasi Grassi & Rovelli, 1889 (N, S, Si, Sa)

Lepidospora Escherich, 1905

Lepidospora grassii (Grassi & Rovelli, 1890) (N, Si)

Diplura

Campodeidae

Campodea (**Campodea**) Westwood, 1842

Campodea (*Campodea*) *blandinae* Condé, 1948

Campodea (*Campodea*) *blandinae ichnusa* Condé, 1957 (Sa) (E)

Campodea (*Campodea*) *fragilis* Meinert, 1865 (N, S, Sa)

Campodea (*Campodea*) *galilaea* Wygodzinsky, 1942 (Sa) (*)

Campodea (*Campodea*) *grassii* Silvestri, 1912 (S, Si, Sa)

Campodea (*Campodea*) *lubbocki* Silvestri, 1912 (S)

Campodea (*Campodea*) *majorica* Condé, 1955

Campodea (*Campodea*) *majorica sicula* Condé, 1957 (Si) (E)

Campodea (*Campodea*) *patrizii* Condé, 1953 (Sa) (E)

Campodea (*Campodea*) *pempturochaeta* Silvestri, 1912 (S)

Campodea (*Campodea*) *plusiochaeta* Silvestri, 1912 (N, S)

Campodea (*Campodea*) *redii* Silvestri, 1912 (S)

Campodea (*Campodea*) *sardiniensis* Bareth, 1980 (S, Sa) (E)

Campodea (*Campodea*) *silvestrii* Bagnall, 1918 (S)

Campodea (*Campodea*) *wallacei* Bagnall, 1918 (N) (*)

Campodea (Campodea) zuluetai Silvestri, 1932 (Sa)

Campodea (Dicampa) Silvestri, 1932

Campodea (Dicampa) apula Silvestri, 1912 (S)

Campodea (Dicampa) codinai Silvestri, 1932 (S)

Campodea (Dicampa) gestroi Silvestri, 1912 (S) (E)

Campodea (Dicampa) jolyi Condé, 1948 (N)

Campodea (Dicampa) malpighii Silvestri, 1912 (S, Si)

Campodea (Monocampa) Silvestri, 1932

Campodea (Monocampa) aurunca Ramellini, 1989 (S) (E)

Campodea (Monocampa) denisi Wygodzinsky, 1940 (*)

Campodea (Monocampa) denisi aequalis Condé, 1947 (S)

Campodea (Monocampa) denisi denisi Wygodzinsky, 1940 (Sa)

Campodea (Monocampa) emeryi Silvestri, 1912

Campodea (Monocampa) emeryi emeryi Silvestri, 1912 (S, Sa) (E)

Campodea (Monocampa) emeryi spelaea Condé, 1978 (Sa) (E)

Campodea (Monocampa) quillisi Silvestri, 1932 (S, Sa)

Campodea (Paurocampa) Silvestri, 1932

Campodea (Paurocampa) pachychaeta Condé, 1946 (S) (*)

Campodea (Paurocampa) pretneri Condé, 1974 (N)

Campodea (Paurocampa) suensoni Tuxen, 1930 (N, S)

Cestocampa Condé, 1956

Cestocampa balcanica Condé, 1956 (S)

Cestocampa gasparoi Bareth, 1988 (S) (E)

Cestocampa italica (Silvestri, 1912) (S) (E)

Eutrichocampa Silvestri, 1912

Eutrichocampa thamugadensis Condé, 1948 (S)

Oncinocampa Condé, 1982

Oncinocampa paciti (Condé, 1981) (Sa) (E)

Patrizicampa Condé, 1956

Patrizicampa sardoa Condé, 1956 (Sa) (E)

Plusiocampa Silvestri, 1912

Plusiocampa bonadonai Condé, 1948

Plusiocampa bonadonai lanzai Condé, 1961 (N, S)
Plusiocampa bonadonai pavani Condé & Poivre, 1982 (N) (E)
Plusiocampa caprai Condé, 1950 (N)
Plusiocampa corcyraea Silvestri, 1912 (*)
Plusiocampa corcyraea corcyraea Silvestri, 1912
Plusiocampa dallai Bareth & Condé, 1984 (S) (E)
Plusiocampa dalmatica Condé, 1959 (N)
Plusiocampa dolichopoda Bareth & Condé, 1984 (S) (E)
Plusiocampa exsulans Condé, 1947 (N)
Plusiocampa friulensis Bareth & Condé, 1984 (N) (E)
Plusiocampa grandii Silvestri, 1933 (N) (E)
Plusiocampa hystricula Bareth & Condé, 1984 (N) (E)
Plusiocampa nivea (Joseph, 1882) (N)
Plusiocampa notabilis Silvestri, 1912 (S)
Plusiocampa paolettii Bareth & Condé, 1984 (N) (E)
Plusiocampa romana Condé, 1954 (S) (E)
Plusiocampa sardiniana Condé, 1981 (Sa) (E)
Plusiocampa socia Condé, 1956 (Sa) (E)
Plusiocampa strouhali Silvestri, 1933 (N)
Plusiocampa suspiciosa Condé & Mathieu, 1958 (Si) (E)

Podocampa Silvestri, 1932

Podocampa cerrutii Condé, 1975
Podocampa cerrutii cerrutii Condé, 1975 (Sa) (E)
Podocampa cerrutii kahmanni Condé, 1975 (Sa) (E)

Note

Campodea (Campodea) galilaea: Citata da Bareth (1980) come cfr. galilea Wygodzinsky, 1942.

Campodea (Campodea) wallacei: Citata da Bareth & Condé (1985) come complesso wallacei Bagnall, 1918 - simulatrix Wygodzinsky, 1941.

Campodea (Monocampa) denisi: Citata anche come cfr. denisi Wygodzinsky, 1940 per la Sardegna (Condé, 1956).

Campodea (Paurocampa) pachychaeta: Citata da Ramellini (1989) come gruppo pachychaeta Condé, 1946 - corsica Condé, 1947.

Plusiocampa corcyraea: Citata da Silvestri per l'Italia, senza ulteriori specificazioni.

Procampodeidae

Procampodea Silvestri, 1905

Procampodea brevicauda Silvestri, 1905 (S, Si, Sa) (E)

Anajapygidae

Anajapyx Silvestri, 1903

Anajapyx vesiculosus Silvestri, 1903

Anajapyx vesiculosus vesiculosus Silvestri, 1903 (S)

Japygidae

Catajapyx Silvestri, 1933

Catajapyx aquilonaris (Silvestri, 1931) (N)

Catajapyx propinquus Silvestri, 1948 (S) (E)

Dipljapyx Silvestri, 1948

Dipljapyx hirpinus Silvestri, 1948 (S) (E)

Dipljapyx italicus (Silvestri, 1908) (N, S) (E)

Dipljapyx limbarae Silvestri, 1948 (Sa) (E)

Dipljapyx nexus Silvestri, 1948 (N) (E)

Dipljapyx sardous Silvestri, 1948 (Sa) (E)

Dipljapyx silanus Silvestri, 1948

Dipljapyx silanus silanus Silvestri, 1948 (S) (E)

Dipljapyx silanus meiocerus Silvestri, 1948 (S) (E)

Japyx Haliday, 1864

Japyx meridionalis Silvestri, 1948 (S) (E)

Japyx minutus Silvestri, 1948 (Sa) (E)

Japyx solifugus Haliday, 1864 (N, S, Si, Sa)

Metajapyx Silvestri, 1933

Metajapyx braueri (Verhoeff, 1904) (N)

Metajapyx firmus (Silvestri, 1931) (N, S) (E)

Metajapyx garganicus Silvestri, 1948 (S) (E)

Metajapyx moroderi (Silvestri, 1929)

Metajapyx moroderi patrizianus Pagés, 1953 (Sa) (E)

Metajapyx parvidens Silvestri, 1948 (S) (E)

Metajapyx peanoi Pagés, 1980 (N) (E)

Metajapyx siculus (Verhoeff, 1923) (Si, Sa) (E)

Monojapyx Paclt, 1957

Monojapyx simplex (Verhoeff, 1923) (Si)

Parindjapyx Silvestri, 1933

Parindjapyx apulus (Silvestri, 1908) (S) (E)

Protjapyx Silvestri, 1948

Protjapyx maior (Grassi, 1886)

Protjapyx maior maior (Grassi, 1886) (N, S)

Protjapyx maior sardous Silvestri, 1948 (Sa) (E)

Protjapyx maior trinachrius Silvestri, 1948 (Si) (E)

Unjapyx Silvestri, 1948

Unjapyx simplicior (Silvestri, 1929) (N, S, Sa)

Parajapygidae

Parajapyx Silvestri, 1903

Parajapyx isabellae (Grassi, 1886)

Parajapyx isabellae isabellae (Grassi, 1886) (S, Si)

Ephemeroptera

Baetidae

Acentrella Bengtsson, 1912

Acentrella sinaica Bogoescu, 1931 (N, S, Si)

Baetis Leach, 1815

Baetis alpinus (Pictet, 1843) (N, S)

Baetis buceratus Eaton, 1870 (N, S, Si, Sa)

Baetis cyrneus Thomas & Gazagnes, 1984 (Sa)

Baetis digitatus Bengtsson, 1912 (S)

Baetis fuscatus (Linné, 1761) (N, S, Si, Sa)

Baetis liebenauae Keffermüller, 1974 (N)

Baetis lutheri Müller-Liebenau, 1967 (N, S, Si)

Baetis melanonyx (Pictet, 1843) (N, S, Si)

Baetis muticus (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)

Baetis niger (Linné, 1761) (N)

Baetis pavidus Grandi, 1949 (N, S, Si)

Baetis rhodani (Pictet, 1843) (N, S, Si, Sa)

Baetis vardarensis Ikononov, 1962 (N, S)

Baetis vernus Curtis, 1834 (N, S)

Centroptilum Eaton, 1869

Centroptilum luteolum (Müller, 1776) (N, S, Si, Sa)

Cloeon Leach, 1815

Cloeon dipterum (Linné, 1761) (N, S, Si, Sa)

Cloeon simile Eaton, 1870 (N, S, Si, Sa)

Procloeon Bengtsson, 1915

Procloeon bifidum (Bengtsson, 1912) (N, S, Sa)

Pseudocentroptilum Bogoescu, 1947

Pseudocentroptilum calabrum Belfiore & D'Antonio, 1990 (S) (E)

Pseudocentroptilum lacustre (Eaton, 1885) (N) (E)

Pseudocentroptilum nemorale (Eaton, 1885) (S) (E)

Pseudocentroptilum pennulatum (Eaton, 1870) (N, S)

Pseudocentroptilum pulchrum (Eaton, 1885) (N, S, Si)

Caenidae

Brachycercus Curtis, 1834

Brachycercus harrisella Curtis, 1834 (N, S)

Caenis Stephens, 1835

Caenis beskidensis Sowa, 1973 (N, S)

Caenis horaria (Linné, 1758) (N, S)

Caenis lactea (Burmeister, 1839) (N)

Caenis luctuosa (Burmeister, 1839) (N, S, Si, Sa)

Caenis martae Belfiore, 1984 (N, S, Si, Sa) (E)

Caenis pseudorivulorum Keffermüller, 1960 (S)

Caenis pusilla Navas, 1913 (N, S, Si)

Caenis robusta Eaton, 1884 (N, Sa)

Caenis valentinae Grandi, 1951 (N) (E)

Ephemerellidae

Ephemerella Walsh, 1862

Ephemerella ignita (Poda, 1761) (N, S, Si, Sa)

Ephemerella ikonomovi Puthz, 1971 (S, Si)

Ephemerella mucronata (Bengtsson, 1909) (N)

Torleya Lestage, 1917

Torleya major (Klapálek, 1905) (N, S)

Ephemeridae

Ephemera Linné, 1746

Ephemera danica Müller, 1764 (N, S)

Ephemera glaucops Pictet, 1843 (N, S)

Ephemera vulgata Linné, 1746 (N)

Ephemera paulae Grandi, 1955 (N)

Heptageniidae

Ecdyonurus Eaton, 1865

Ecdyonurus alpinus Hefti, Tomka & Zurwerra, 1987 (N)

Ecdyonurus aurantiacus (Burmeister, 1839) (N, S, Si)

Ecdyonurus bellieri (Hagen, 1860) (Si) (E)

Ecdyonurus corsicus Esben-Petersen, 1912 (Sa)

Ecdyonurus forcipula (Pictet, 1845) (S)

Ecdyonurus helveticus Eaton, 1885 (N, S, Si)

Ecdyonurus macani Thomas & Sowa, 1970 (N)

Ecdyonurus picteti (Meyer-Dür, 1864) (N)

Ecdyonurus ruffoi Grandi, 1953 (N) (E)

Ecdyonurus venosus (Fabricius, 1775) (N, S, Si)

Ecdyonurus zelleri Eaton, 1885 (N)

Electrogena Zurwerra & Tomka, 1985

Electrogena fallax (Hagen, 1864) (Sa)

Electrogena grandiae (Belfiore, 1981) (N, S) (E)

Electrogena gridellii (Grandi, 1953) (N) (E)

Electrogena lateralis (Curtis, 1834) (N, S, Si)

Electrogena zebrata (Hagen, 1864) (Sa)

Epeorus Eaton, 1881

Epeorus alpicola (Eaton, 1871) (N)

Epeorus sylvicola (Pictet, 1865) (N, S, Si, Sa)

Epeorus yougoslavicus (Samal, 1935) (S, Si)

Heptagenia Walsh, 1862

Heptagenia coerulans Rostock, 1877 (N, S)
Heptagenia sulphurea (Müller, 1776) (N, S)

Rhithrogena Eaton, 1881

Rhithrogena adrianae Belfiore, 1983 (S) (E)
Rhithrogena alpestris Eaton, 1885 (N)
Rhithrogena degrangei Sowa, 1969 (N)
Rhithrogena diaphana Navás, 1916 (S)
Rhithrogena doriei Sowa, 1971 (N)
Rhithrogena fiorii Grandi, 1953 (N, S) (E)
Rhithrogena hybrida Eaton, 1885 (N)
Rhithrogena johannis Belfiore, 1990 (S, Si) (E)
Rhithrogena loyolaea Navás, 1922 (N)
Rhithrogena nuragica Belfiore, 1987 (Sa) (E)
Rhithrogena reatina Sowa & Belfiore, 1984 (S) (E, M)
Rhithrogena semicolorata (Curtis, 1834) (N, S, Si)
Rhithrogena sibillina Metzler, Tomka & Zurwerra, 1985 (S) (E)

Leptophlebiidae

Choroterpes Eaton, 1881

Choroterpes borbonica Belfiore, 1988 (S, Si) (E)
Choroterpes picteti (Eaton, 1871) (N, S)

Habroleptoides Schoenemund, 1929

Habroleptoides pauliana (Grandi, 1959) (N, S, Si) (E)
Habroleptoides auberti (Biancheri, 1954) (N)
Habroleptoides confusa Sartori & Jacob, 1986 (N, S)
Habroleptoides modesta (Hagen, 1864) (Sa)
Habroleptoides umbratilis (Eaton, 1884) (N, S) (E)

Habrophlebia Eaton, 1881

Habrophlebia consiglio Biancheri, 1959 (Sa) (E)
Habrophlebia eldae Jacob & Sartori, 1984 (N, S, Si, Sa)
Habrophlebia fusca (Curtis, 1834) (N)
Habrophlebia lauta Eaton, 1884 (N)

Paraleptophlebia Lestage, 1917

Paraleptophlebia ruffoi Biancheri, 1956 (S) (E)
Paraleptophlebia submarginata (Stephens, 1835) (N, S)

Thraulus Eaton, 1881

Thraulus bellus Eaton, 1881 (N)

Oligoneuriidae

Oligoneuriella Ulmer, 1924

Oligoneuriella rhenana (Imhoff, 1852) (N, S)

Polymitarcidae

Ephoron Williamson, 1802

Ephoron virgo (Oliver, 1791) (N, S)

Potamanthidae

Potamanthus Pictet, 1843

Potamanthus luteus (Linné, 1767) (N)

Siphonuridae

Siphonurus Eaton, 1868

Siphonurus lacustris Eaton, 1870 (N, S, Sa)

Odonata

Calopterygidae

Calopteryx Leach, 1815

Calopteryx haemorrhoidalis (Van der Linden, 1825) (*)

Calopteryx haemorrhoidalis haemorrhoidalis (Van der Linden, 1825) (N, S, Si, Sa)

Calopteryx haemorrhoidalis occasi Capra, 1945 (N)

Calopteryx haemorrhoidalis papyreti Zeller in Sélys & Hagen, 1854 (Si)

Calopteryx splendens (Harris, 1782) (*)

Calopteryx splendens caprai Conci, 1956 (N, S)

Calopteryx splendens xanthostoma (Charpentier, 1825) (N, S, Si) (M)

Calopteryx splendens subsp. (Sa)

Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758) (*)
Calopteryx virgo padana Conci, 1956 (N) (M)
Calopteryx virgo meridionalis Sélys, 1873 (N, S, Si, Sa)

Note

Calopteryx: Agrion è sinonimo senior sia di *Calopteryx* che di *Coenagrion* (010.0.); la confusione ingenerata trova concorde la maggior parte degli odonatologi per trascurare Agrion. Analogamente prevale l'uso di *Calopterygidae* e *Coenagrionidae* per i rispettivi nomi familiari.

Calopteryx haemorrhoidalis: Subsp. *papyreti* non più ritrovata. Su base biochimica non è possibile distinguere razze geografiche tra le popolazioni europee di questa specie.

Calopteryx splendens: Subsp. *caprai* recentemente posta in sinonimia con *ancilla* Sélys, 1853. Subsp. *xanthostoma*, al N solo in Liguria e al S solo in Toscana, talvolta considerata una sp. distinta, ma dati biochimici e la possibilità di incrocio con la subsp. tipica nei luoghi di contatto permettono di riconoscerla al più come semispecie. Popolazioni sarde rare e ancora da definire tassonomicamente.

Calopteryx virgo: Subsp. *padana* probabilmente sinonimo di *festiva* (Brullé, 1832).

Lestidae

Sympecma Burmeister, 1839

Sympecma fusca (Van der Linden, 1820) (N, S, Si, Sa)
Sympecma paedisca (Brauer, 1882) (N) (M)

Chalcolestes Kennedy, 1920

Chalcolestes viridis (Van der Linden, 1825) (*)
Chalcolestes viridis viridis (Van der Linden, 1825) (N, S, Si, Sa)
Chalcolestes viridis parvidens (Artobolevski, 1929) (N, S, Si?)

Lestes Leach, 1815

Lestes barbarus (Fabricius, 1798) (N, S, Si, Sa)
Lestes dryas Kirby, 1890 (N, S, Si)
Lestes macrostigma (Eversmann, 1836) (N, S, Si, Sa)
Lestes sponsa (Hansemann, 1823) (N)
Lestes virens (Charpentier, 1825)
Lestes virens virens (Charpentier, 1825) (Si, Sa)
Lestes virens vestalis Rambur, 1842 (N, S)

Note

Chalcolestes viridis: Inclusa talvolta nel gen. *Lestes* Leach, 1815. In base a dati biochimici, la subsp. *C. viridis parvidens* è probabilmente una buona specie.

Platycnemididae

Platycnemis Burmeister, 1839

Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) (N, S, Si, Sa)

Coenagrionidae

Pyrrhosoma Charpentier, 1840

Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) (N, S, Si)

Ischnura Charpentier, 1840

Ischnura elegans (Van der Linden, 1820) (N, S, Sa?)

Ischnura fountainei Morton, 1905 (Si?)

Ischnura genei (Rambur, 1842) (S?, Si, Sa) (*)

Ischnura graellsii (Rambur, 1842) (Sa?)

Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) (N, S, Si, Sa)

Enallagma Charpentier, 1840

Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) (N, S, Si)

Cercion Navas, 1907

Cercion lindenii (Sélys, 1840) (N, S, Si, Sa) (*)

Coenagrion Kirby, 1890

Coenagrion caerulescens (Fonscolombe, 1838)

Coenagrion caerulescens caerulescens (Fonscolombe, 1838) (Sa)

Coenagrion caerulescens caesarum Schmidt, 1959 (N, S, Si)

Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825) (N)

Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)

Coenagrion mercuriale castellani Roberts, 1948 (N, S, Si) (E, M)

Coenagrion ornatum (Sélys, 1850) (N, S) (M) (*)

Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Coenagrion pulchellum (Van der Linden, 1825) (N, S, Sa)

Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) (N, S, Si, Sa)

Erythromma Charpentier, 1840

Erythromma najas (Hansemann, 1823) (N, S) (*)

Erythromma viridulum (Charpentier, 1840) (N, S, Si, Sa)

Ceriagrion Sélys, 1876

Ceriagrion tenellum (Villers, 1789) (*)

Ceriagrion tenellum tenellum (Villers, 1789) (N, S, Sa)

Ceriagrion tenellum nielsenii Schmidt, 1953 (N, Si)

Nehalennia Sélys in Sélys & Hagen, 1850

Nehalennia speciosa (Charpentier, 1840) (N) (M) (*)

Note

Ischnura genei: In base a dati biochimici, subsp. di *I. elegans*.

Cercion lindeni: Specie inclusa alternativamente nel gen. *Coenagrion*.

Coenagrion: Cf. 001.0.

Coenagrion ornatum: Solo vecchie segnalazioni per Friuli e Puglia. Forse estinta in Italia.

Erythromma najas: Al Sud solo tre segnalazioni (Basilicata, Campania e Lazio).

Ceriagrion tenellum: Subsp. *nielsenii* al Nord segnalata per il Piemonte, dove è pure presente la subsp. nominale.

Nehalennia speciosa: Solo in due località lombarde e una friulana.

Aeshnidae

Boyeria McLachlan, 1896

Boyeria irene (Fonscolombe, 1838) (N, S, Si, Sa) (M)

Brachytron Sélys in Sélys & Hagen, 1850

Brachytron pratense (Müller, 1764) (N, S, Sa)

Aeshna Fabricius, 1775

Aeshna affinis (Van der Linden, 1820) (N, S, Si, Sa)

Aeshna caerulea (Strom, 1783) (N)

Aeshna cyanea (Müller, 1764) (N, S, Si, Sa)

Aeshna grandis (Linnaeus, 1758) (N)

Aeshna isosceles (Müller, 1767) (N, S, Si, Sa) (*)

Aeshna juncea (Linnaeus, 1758) (N)

Aeshna mixta (Latreille, 1805) (N, S, Si, Sa)

Anax Leach, 1815

Anax imperator Leach, 1815 (N, S, Si, Sa)

Anax parthenope (Sélys, 1839) (N, S, Si, Sa)

***Hemianax* Sélys, 1883**

Hemianax ephippiger (Burmeister, 1839) (N, S, Si, Sa) (*)

Note

Aeshna isosceles: Alternativamente inclusa nel gen. *Anaciaeschna* Sélys, 1878.

Hemianax ephippiger: Afroasiatica, emigra irregolarmente fino alle regioni europee settentrionali; in Italia può riprodursi ma non ha originato popolazioni stabili.

Gomphidae

***Gomphus* Leach, 1815**

Gomphus flavipes (Charpentier, 1825) (N, S) (M) (*)

Gomphus pulchellus (Sélys, 1840) (N?) (*)

Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758) (N, S)

***Paragomphus* Cowley, 1934**

Paragomphus genei (Sélys, 1841) (S, Si, Sa) (*)

***Ophiogomphus* Sélys, 1854**

Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1785) (N, S) (M) (*)

***Onychogomphus* Sélys, 1854**

Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758) (*)

Onychogomphus forcipatus forcipatus (Linnaeus, 1758) (N?, S?, Si)

Onychogomphus forcipatus unguiculatus (Van der Linden, 1820) (N, S)

Onychogomphus uncatus (Charpentier, 1840) (N, S, Si)

***Lindenia* De Haan, 1826**

Lindenia tetraphylla (Van der Linden, 1825) (S, Sa) (M) (*)

Note

Gomphus flavipes: Recentemente proposta per l'inclusione nel gen. *Stylurus* Needham, 1897.

Gomphus pulchellus: Un individuo del Piemonte in coll. Ghiliani, Torino.

Paragomphus genei: Al Sud esclusivamente in Calabria.

Ophiogomphus cecilia: Al Sud un'unica segnalazione per la Toscana.

Onychogomphus forcipatus: Subsp. *siculus* Sélys in Sélys & Hagen, 1850, di Sicilia e Calabria, recentemente messa in sinonimia con la subsp. nominale.

Lindenia tetraphylla: Rara, nella penisola segnalata per Toscana, Lazio e Campania, ma non confermata recentemente nelle due ultime regioni.

Cordulegastridae

Cordulegaster Leach, 1815

- Cordulegaster bidentata* Sélys, 1843 (*)
- Cordulegaster bidentata bidentata* Sélys, 1843 (N, S)
- Cordulegaster bidentata sicilica* Fraser, 1929 (S?, Si) (E, M)
- Cordulegaster boltoni* (Donovan, 1807)
- Cordulegaster boltoni boltoni* (Donovan, 1807) (N, S)
- Cordulegaster boltoni immaculifrons* Sélys & Hagen, 1850 (N)
- Cordulegaster picta* Sélys, 1854
- Cordulegaster picta intermedia* Sélys & Hagen, 1858 (S)
- Cordulegaster trinacriae* Waterston, 1976 (S, Si) (E, M)

Note

Cordulegaster bidentata: Recentemente proposta per l'inclusione nel gen. *Thecagaster* Sélys, 1854.

Corduliidae

Cordulia Leach, 1815

- Cordulia aenea* (Linnaeus, 1758) (N, S) (*)

Somatochlora Sélys, 1871

- Somatochlora alpestris* (Sélys, 1840) (N)
- Somatochlora arctica* (Zetterstedt, 1840) (N)
- Somatochlora flavomaculata* (Van der Linden, 1825) (N, S) (M) (*)
- Somatochlora meridionalis* Nielsen, 1935 (N, S) (*)
- Somatochlora metallica* (Van der Linden, 1825) (N)

Epitheca Charpentier, 1840

- Epitheca bimaculata* (Charpentier, 1825) (N) (M) (*)

Oxygastra Sélys, 1871

- Oxygastra curtisi* (Dale, 1834) (N, S) (M)

Note

Cordulia aenea: Al Sud solo due popolazioni (Basilicata e Lazio).

Somatochlora flavomaculata: Al Sud pochissime popolazioni (Toscana, Puglia e Basilicata).

Somatochlora meridionalis: Accettata da alcuni autori come subsp. di *S. metallica*.
Epithea bimaculata: Nota all'inizio del secolo di Veneto e Trentino, probabilmente estinta sul territorio italiano.

Libellulidae

Libellula Linnaeus, 1758

Libellula depressa Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa) (*)

Libellula fulva Müller, 1764 (N, S, Si, Sa) (*)

Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 (N, S, Si)

Orthetrum Newman, 1833

Orthetrum albistylum (Sélys, 1848) (N)

Orthetrum anceps (Schneider, 1845) (Si, Sa)

Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837) (*)

Orthetrum brunneum brunneum (Fonscolombe, 1837) (N, S, Si)

Orthetrum brunneum cynos (Sélys, 1848) (Sa)

Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798) (N, S, Si)

Orthetrum nitidinerve (Sélys, 1841) (S?, Si, Sa) (M)

Orthetrum trinacria (Sélys, 1841) (Si, Sa)

Crocothemis Brauer, 1868

Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) (N, S, Si, Sa)

Sympetrum Newman, 1833

Sympetrum danae (Sulzer, 1776) (N)

Sympetrum depressiusculum (Sélys, 1841) (N, S, Sa?) (M)

Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758) (N, S)

Sympetrum fonscolombei (Sélys, 1840) (N, S, Si, Sa) (*)

Sympetrum meridionale (Sélys, 1841) (N, S, Si, Sa)

Sympetrum pedemontanum (Allioni, 1766) (N)

Sympetrum sanguineum (Müller, 1764) (N, S, Si, Sa)

Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) (N, S, Si, Sa)

Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) (N, S) (*)

Leucorrhinia Brittinger, 1850

Leucorrhinia dubia (Van der Linden, 1825) (N)

Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) (N) (M)

Trithemis Brauer, 1868

Trithemis annulata (Palisot de Beauvais, 1805) (S, Si, Sa)

Selysiothemis Ris, 1897

Selysiothemis nigra (Van der Linden, 1825) (N, S, Si, Sa) (*)

Brachythemis Brauer, 1868

Brachythemis leucosticta (Burmeister, 1839) (Si, Sa) (*)

Note

Libellula depressa: Recentemente proposta per l'inclusione nel gen. *Platetrum* Newman, 1833.

Libellula fulva: Recentemente proposta per l'inclusione nel gen. *Ladona* Needham, 1901.

Orthetrum brunneum: Subsp. *cynos*, di Sardegna e Corsica, non da tutti riconosciuta.

Sympetrum fonscolombei: Recentemente proposta per l'inclusione nel gen. *Tarnetrum* Needham & Fisher, 1936.

Sympetrum vulgatum: Al Sud solo una popolazione conosciuta (Abruzzo).

Selysiothemis nigra: Al nord solo in Emilia.

Brachythemis leucosticta: Africana, ha colonizzato l'Italia solo recentemente.

Blattaria

Polyphagidae

Polyphaga Brullé, 1835

Polyphaga aegyptiaca (Linnaeus, 1758) (S, Si, Sa)

Blattidae

Blatta Linnaeus, 1758

Blatta orientalis Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)

Periplaneta Burmeister, 1838

Periplaneta americana (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Blattellidae

Blattella Caudel, 1903

Blattella germanica (Linnaeus, 1767) (N, S, Si, Sa)

Loboptera Brunner, 1865

Loboptera decipiens (Germar, 1817) (N, S, Si, Sa)

Supella Shelford, 1911

Supella longipalpa (Fabricius, 1798) (N, S, Si, Sa)

Ectobiidae

Capraiellus Harz, 1976

Capraiellus tamaninii Galvagni, 1972 (N, S, Si) (M)

Ectobius Stephens, 1835

Ectobius aeoliensis Failla & Messina, 1974 (Si) (E)

Ectobius aetnaeus Ramme, 1927 (Si) (E)

Ectobius albicinctus (Brunner, 1861) (N) (M)

Ectobius baccettii Failla & Messina, 1978 (Sa) (E)

Ectobius erythronotus (Burr, 1913) (N, S)

Ectobius filicensis Failla & Messina, 1974 (Si) (E, M)

Ectobius ichnusae Failla & Messina, 1980 (Sa) (E)

Ectobius intermedius Failla & Messina, 1981 (Sa) (E)

Ectobius kraussianus Ramme, 1923 (Si)

Ectobius lagrecai Failla & Messina, 1981 (Si) (E)

Ectobius lapponicus (Linnaeus, 1758) (N?)

Ectobius minutus Failla & Messina, 1977 (S) (E)

Ectobius montanus (A. Costa, 1866) (N, S)

Ectobius nadigi (Harz, 1976) (S) (E)

Ectobius pallidus (Olivier, 1789) (N, S)

Ectobius parvosacculatus Failla & Messina, 1974 (Si)

Ectobius punctatissimus (Ramme, 1923) (N?)

Ectobius sardous Baccetti, 1991 (Sa) (E)

Ectobius scabriculus Failla & Messina, 1976 (S) (E)

Ectobius sculus Ramme, 1949 (S, Si) (E)

Ectobius sylvestris (Poda, 1761) (N, S)

Ectobius tuscus Galvagni, 1978 (S) (E, M)

Ectobius tyrrhenicus Failla, 1973 (S) (E, M)

Ectobius usticaensis Failla & Messina, 1974 (Si) (E, M)

Ectobius vittiventris (A. Costa, 1847) (N, S, Si)

Lobolampra Houlbert, 1927

Lobolampra subaptera (Rambur, 1838) (N, S, Si) (M)

Luridiblatta Fernandes, 1965

Luridiblatta trivittata (Serville, 1839) (S, Si)

Phyllodromica Fieber, 1853

Phyllodromica clavata Failla & Messina, 1979 (S) (E)

Phyllodromica marginata (Schreber, 1781) (N?, S, Si, Sa)

Phyllodromica nuragica Failla & Messina, 1980 (Sa) (E, M)

Phyllodromica pavani Failla & Messina, 1978 (E, M)

Phyllodromica sardea (Serville, 1839) (Sa) (E)

Phyllodromica tyrrhenica (Ramme, 1927) (Si) (E)

Mantodea

Mantidae

Ameles Burmeister, 1838

Ameles decolor (Charpentier, 1825) (N, S, Si, Sa)

Ameles fasciipennis Kaltenbach, 1963 (S)

Ameles africana Bolivar, 1914 (Si, Sa)

Ameles spallanzania (Rossi, 1792) (N, S, Si, Sa)

Ameles picteti (Saussure, 1869) (Si)

Pseudoyersinia Kirby, 1904

Pseudoyersinia lagrecai Lombardo, 1984 (Si)

Geomantis Pantel, 1896

Geomantis larvoides Pantel, 1896 (N, S, Si, Sa)

Rivetina Berland & Chopard, 1922

Rivetina baetica (Rambur, 1839)

Rivetina baetica tenuidentata La Greca & Lombardo, 1982 (Si)

Iris Saussure, 1869

Iris oratoria (Linnè, 1758) (N, S, Si, Sa)

Mantis Linnaeus, 1758

Mantis religiosa Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)

Empusidae

Empusa Illiger, 1798

Empusa pennata (Thunberg, 1815) (N, S, Si, Sa)

Empusa fasciata (Brullé, 1836) (N)

Isoptera

Calotermitidae

Calotermes Hagen, 1853

Calotermes flavicollis (Fabricius, 1793) (N, S, Si, Sa)

Rhinotermitidae

Reticulitermes Holmgren, 1913

Reticulitermes lucifugus (Rossi, 1792) (N, S, Si, Sa)

Orthoptera

Tettigoniidae

Phaneroptera Serville, 1831

Phaneroptera falcata (Poda, 1761) (N, S)

Phaneroptera nana Fieber, 1853

Phaneroptera nana nana Fieber, 1853 (N, S, Si, Sa)

Tylopsis Fieber, 1853

Tylopsis liliifolia (Fabricius, 1793) (N, S, Si, Sa)

Acrometopa Fieber, 1853

Acrometopa italica Ramme, 1927 (N, S, Si, Sa)

Acrometopa macropoda (Burmeister, 1838) (N, S)

Isophya Brunner, 1878

Isophya pyrenaea (Serville, 1839) (N) (M)

Isophya modestior Brunner, 1882 (N) (M)

Barbitistes Charpentier, 1825

Barbitistes fischeri (Yersin, 1854) (N) (M)

Barbitistes kaltenbachii Harz, 1965 (N) (M)

Barbitistes obtusus Targioni-Tozzetti, 1881 (N, S, Sa)

Barbitistes ocskayi (Charpentier, 1850) (N)

Barbitistes serricauda (Fabricius, 1798) (N, S)

Barbitistes vicetinus Galvagni & Fontana, 1993 (N) (E)

Barbitistes yersini Brunner, 1878 (N, S) (M)

Metaplastes Ramme, 1939

Metaplastes ippolitoi La Greca, 1948 (S) (E)

Metaplastes pulchripennis (A. Costa, 1863) (N, S, Sa)

Andreiniimon Capra, 1937

Andreiniimon nuptialis (Karny, 1918) (S) (M)

Leptophyes Fieber, 1853

Leptophyes albovittata (Kollar, 1833) (N) (M)

Leptophyes bosci Brunner, 1878 (N, S)

Leptophyes discoidalis (Frivaldsky, 1867) (N, S)

Leptophyes laticauda (Frivaldsky, 1867) (N, S)

Leptophyes punctatissima (Bosc, 1792) (N, S, Si, Sa)

Odontura Rambur, 1839

Odontura arcuata Messina, 1981 (Si) (E)

Odontura borrei Bolivar, 1878 (Si) (M)

Odontura calaritana A. Costa, 1883 (Sa) (E)

Odontura festai Baccetti, 1991 (Sa) (E, M)

Odontura stenoxipha Fieber, 1853 (Si, Sa?)

Poecilimon Fischer, 1854

Poecilimon elegans Brunner, 1878 (N)

Poecilimon laevissimus (Fischer, 1854) (Si) (M)

Poecilimon ornatus (Schmidt, 1850) (N)

Poecilimon superbus (Fischer, 1854) (N, S) (E)

Poecilimon thoracicus (Fieber, 1853) (N)

Polysarcus Fieber, 1853

Polysarcus denticauda (Charpentier, 1825) (N, S)

Polysarcus scutatus Brunner, 1882 (N) (M)

Meconema Serville, 1831

Meconema meridionale A. Costa, 1860 (N, S, Si)

Meconema thalassinum (De Geer, 1773) (N, S)

Cyrtaspis Fischer, 1854

Cyrtaspis scutata (Charpentier, 1825) (N, S, Si, Sa)

Conocephalus Thunberg, 1815

Conocephalus conocephalus (Linnaeus, 1767) (N, S, Si, Sa) (M)

Xiphidion Serville, 1831

Xiphidion dilatatus Ramme, 1951 (S)

Xiphidion discolor (Thunberg, 1815) (N, S, Si, Sa)

Xiphidion dorsalis (Latreille, 1804) (N)

Ruspolia Schultess-Schindler, 1898

Ruspolia nitidula (Scopoli, 1786) (N, S, Si, Sa)

Tettigonia Linnaeus, 1758

Tettigonia cantans (Fuessly, 1775) (N, S, Sa)

Tettigonia caudata (Charpentier, 1854) (N)

Tettigonia hispanica (Bolivar, 1893) (Sa)

Tettigonia silana Capra, 1936 (S) (E)

Tettigonia viridissima Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)

Decticus Serville, 1831

Decticus albifrons (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa)

Decticus aprutianus Capra, 1936 (S) (E)

Decticus loudoni Ramme, 1933 (S) (E, M)

Decticus verrucivorus (Linnaeus, 1758)

Decticus verrucivorus verrucivorus (Linnaeus, 1758) (N, S)

Decticus verrucivorus insularis Baccetti, 1963 (Sa) (E)

Platycleis Fieber, 1852

Platycleis affinis Fieber, 1853

Platycleis affinis affinis Fieber, 1853 (S, Si)

Platycleis concii Galvagni, 1959 (Si) (E)

Platycleis escalerae Bolivar, 1899

Platycleis escalerae escalerae Bolivar, 1899 (S)
Platycleis falx (Fabricius, 1775)
Platycleis falx laticauda Brunner, 1892 (S, Si, Sa) (M)
Platycleis grisea (Fabricius, 1781)
Platycleis grisea grisea (Fabricius, 1781) (N, S, Si, Sa)
Platycleis intermedia (Serville, 1839)
Platycleis intermedia intermedia (Serville, 1839) (N, S, Si)
Platycleis intermedia umbilicata (A. Costa, 1855) (Sa) (E)
Platycleis ragusai Ramme, 1927 (Si) (E, M)
Platycleis romana Ramme, 1927 (N, S) (E)
Platycleis sabulosa Azam, 1901 (S, Si) (M)

Montana Zeuner, 1941

Montana montana (Kollar, 1833)
Montana montana montana (Kollar, 1833) (N)
Montana stricta (Zeller, 1849) (N, S, Sa)

Tessellana Zeuner, 1941

Tessellana lagrecai Messina, 1978 (Si) (E, M)
Tessellana nigrosignata (A. Costa, 1863) (S) (M)
Tessellana tessellata (Charpentier, 1825) (N, S, Si, Sa)

Metrioptera Wesmael, 1838

Metrioptera brachyptera (Linnaeus, 1761) (N, S?)
Metrioptera caprai Baccetti, 1956 (E, M)
Metrioptera caprai caprai Baccetti, 1956 (S)
Metrioptera caprai baccettii Galvagni, 1958 (S)
Metrioptera caprai galvagnii Baccetti, 1963 (N)
Metrioptera caprai lagrecai Baccetti, 1958 (S)
Metrioptera saussuriana (Frey-Gessner, 1872)
Metrioptera saussuriana saussuriana (Frey-Gessner, 1872) (N)

Bicolorana Zeuner, 1941

Bicolorana bicolor (Philippi, 1830) (N, S, Sa)
Bicolorana kuntzeni (Ramme, 1931) (N)

Roeseliana Zeuner, 1941

Roeseliana brunneri Ramme, 1951 (N) (E)
Roeseliana fedtschenkoi (Saussure, 1874)
Roeseliana fedtschenkoi azami (Finot, 1892) (N)
Roeseliana fedtschenkoi minor Nadig, 1961 (N) (E)
Roeseliana roeseli (Hagenbach, 1822) (N)

Zeuneriana Ramme, 1951

Zeuneriana marmorata (Fieber, 1853) (N) (E, M)

Zeuneriana abbreviata (Serville, 1839) (N) (M)

Sepiana Zeuner, 1941

Sepiana sepium (Yersin, 1854) (N, S, Si, Sa)

Modestana Beier, 1955

Modestana modesta (Fieber, 1853) (N)

Pholidoptera Wesmael, 1838

Pholidoptera aptera (Fabricius, 1793)

Pholidoptera aptera aptera (Fabricius, 1793) (N, S)

Pholidoptera aptera goidanichi Baccetti, 1963 (S, Sa) (E)

Pholidoptera fallax (Fischer, 1854) (N, S, Si, Sa)

Pholidoptera femorata (Fieber, 1853) (N, S, Si, Sa)

Pholidoptera griseoptera (De Geer, 1773) (N, S, Sa)

Pholidoptera littoralis (Fieber, 1853)

Pholidoptera littoralis littoralis (Fieber, 1853) (N)

Pholidoptera littoralis insubrica Nadig, 1961 (N)

Eupholidoptera Ramme, 1951

Eupholidoptera chabrieri (Charpentier, 1825)

Eupholidoptera chabrieri chabrieri (Charpentier, 1825) (N, S)

Eupholidoptera chabrieri bimucronata (Ramme, 1927) (Si) (E)

Eupholidoptera chabrieri magnifica (A. Costa, 1863) (S, Sa) (E)

Eupholidoptera chabrieri schmidtii (Fieber, 1861) (N, S)

Eupholidoptera danconai La Greca, 1959 (S) (E, M)

Eupholidoptera garganica La Greca, 1959 (S)

Eupholidoptera hesperica La Greca, 1959 (S) (E)

Anonconotus Camerano, 1878

Anonconotus alpinus (Yersin, 1858)

Anonconotus alpinus alpinus (Yersin, 1858) (N, S)

Anonconotus alpinus italoaustriacus Nadig, 1987 (N)

Anonconotus baracunensis Nadig, 1987 (N) (E, M)

Yersinella Ramme, 1923

Yersinella beybienkoi La Greca, 1974 (N, S) (E, M)

Yersinella raymondi (Yersin, 1860) (N, S, Si, Sa)

Pachytrachis Uvarov, 1940

Pachytrachis gracilis (Brunner, 1861) (N)

Pachytrachis striolatus (Fieber, 1853) (N)

Pterolepis Rambur, 1839

Pterolepis pedata A. Costa, 1882 (Sa) (E, M)

Pterolepis sicula La Greca, 1979 (Si) (E, M)

Rhacocleis Fieber, 1853

Rhacocleis annulata Fieber, 1853 (S, Si) (E)

Rhacocleis baccettii Galvagni, 1976 (S) (E)

Rhacocleis corsicana Bonfils, 1960 (Sa)

Rhacocleis germanica (Herrich-Schaeffer, 1840) (N, S, Si)

Rhacocleis grisea Baccetti, 1991 (Sa) (E, M)

Rhacocleis japigia La Greca, 1959 (S) (E, M) (*)

Rhacocleis neglecta (A. Costa, 1863)

Rhacocleis neglecta neglecta (A. Costa, 1863) (N, S, Si)

Rhacocleis parvula A. Costa, 1884 (Sa) (E)

Rhacocleis minerva Baccetti, 1991 (Sa) (E, M)

Rhacocleis tyrrhenica La Greca, 1952 (S) (E, M)

Ctenodecticus Bolivar, 1876

Ctenodecticus bolivari Targioni-Tozzetti, 1881 (Sa)

Ctenodecticus siculus Ramme, 1927 (Si) (E)

Antaxius Brunner, 1882

Antaxius difformis (Brunner, 1861) (N)

Chopardius Harz, 1969

Chopardius pedestris (Fabricius, 1787)

Chopardius pedestris pedestris (Fabricius, 1787) (N)

Chopardius pedestris apuanus Nadig, 1958 (S) (E, M)

Chopardius maculipedes Ingrisch, 1983 (Sa) (E, M)

Saga Charpentier, 1825

Saga hellenica Kaltenbach, 1967 (S) (M) (*)

Saga pedo (Pallas, 1771) (N, S, Si, Sa) (M)

Ephippiger Berthold, 1827

Ephippiger apulus (Ramme, 1933) (E)

Ephippiger apulus apulus (Ramme, 1933) (S)
Ephippiger apulus italicus La Greca, 1959 (S)
Ephippiger cavannai (Targioni-Tozzetti, 1881) (S) (E)
Ephippiger discoidalis (Fieber, 1853) (N)
Ephippiger melisi Baccetti, 1958 (S) (E)
Ephippiger perforatus Rossi, 1790 (N, S)
Ephippiger ruffoi Galvagni, 1955 (S) (E)
Ephippiger terrestris (Yersin, 1854)
Ephippiger terrestris bormansi Brunner, 1882 (N)
Ephippiger terrestris caprai Nadig, 1980 (N) (E)
Ephippiger terrestris terrestris (Yersin, 1854) (N)
Ephippiger vicheti Harz, 1966 (N)
Ephippiger zelleri (Fischer, 1854) (S) (E)

Ephippigerida Bolivar, 1903

Ephippigerida nigromarginata (Lucas, 1839) (Si)

Steropleurus Bolivar, 1878

Steropleurus annae (Targioni-Tozzetti, 1881) (Sa) (E, M)

Bolivarius Harz, 1969

Bolivarius bonneti (Bolivar, 1907) (Si) (M)
Bolivarius brevicollis (Fischer, 1854)
Bolivarius brevicollis insularis (Chopard, 1923) (Sa)
Bolivarius brevicollis trinacriae (La Greca, 1964) (Si) (E)
Bolivarius elegans (Fischer, 1854) (S, Si)

Uromenus Bolivar, 1878

Uromenus riggioi La Greca, 1964 (Si) (E, M)

Praephippigera Bolivar, 1903

Praephippigera pachygaster (Lucas, 1849) (Sa) (M)

Note

Xiphidion: Talvolta considerato sottogenere di *Conocephalus*.
Rhacocleis japgia: Specie dubbia, descritta su una ninfa.
Chopardius: Talvolta considerato sottogenere di *Antaxius*.
Saga hellenica: La sua presenza in Italia richiede conferma.
Bolivarius: Talvolta considerato sottogenere di *Steropleurus*.

Rhaphidophoridae

Dolichopoda Bolivar, 1880

- Dolichopoda azami* Saulcy, 1893 (N)
- Dolichopoda capreensis* Capra, 1968 (S) (E)
- Dolichopoda cyrnensis* Baccetti, 1982 (Sa) (E)
- Dolichopoda geniculata* (A. Costa, 1860) (E)
 - Dolichopoda geniculata geniculata* (A. Costa, 1860) (S)
 - Dolichopoda geniculata etrusca* Baccetti & Capra, 1959 (S)
 - Dolichopoda geniculata pontiana* Capra, 1967 (S)
- Dolichopoda ligustica* Baccetti & Capra, 1958 (E)
 - Dolichopoda ligustica ligustica* Baccetti & Capra, 1958 (N)
 - Dolichopoda ligustica septentrionalis* Baccetti & Capra, 1959 (N)
- Dolichopoda laetitiae* Menozzi, 1920 (S) (E)
- Dolichopoda palpata* (Sulzer, 1776) (S, Si) (E)

Chopardina Uvarov, 1921

- Chopardina schiavazzii* Capra, 1934 (E)
 - Chopardina schiavazzii caprai* Lanza, 1954 (S)
 - Chopardina schiavazzii schiavazzii* Capra, 1934 (S)

Capraiacris Baccetti, 1975

- Capraiacris aegilion* Baccetti, 1975 (S) (E)
- Capraiacris baccettii* (Capra, 1957) (S) (E)

Troglophilus Krauss, 1879

- Troglophilus andreinii* Capra, 1927 (E)
 - Troglophilus andreinii andreinii* Capra, 1927 (S)
 - Troglophilus andreinii hydruntinus* La Greca, 1961 (S)
- Troglophilus cavicola* (Kollar, 1833) (N)
- Troglophilus neglectus* Krauss, 1879
 - Troglophilus neglectus neglectus* Krauss, 1879 (N)

Tachycines Adelung, 1902

- Tachycines asynamorus* Adelung, 1902 (N)

Gryllidae

Gryllus Linnaeus, 1758

- Gryllus campestris* Linnaeus, 1758 (N, S, Si)
- Gryllus bimaculatus* De Geer, 1773 (S, Si, Sa)

Acheta Linnaeus, 1758

Acheta domesticus Linnaeus, 1758 (N, S, Si) (*)

Acheta gossypii O.G. Costa, 1855 (N, S) (*)

Acheta hispanicus Rambur, 1839 (Si) (M)

Melanogryllus Chopard, 1961

Melanogryllus desertus (Pallas, 1771) (N, S, Si, Sa)

Modicogryllus Chopard, 1961

Modicogryllus algerius (Saussure, 1877) (Si)

Modicogryllus burdigalensis (Latreille, 1804) (N, S, Si, Sa) (*)

Modicogryllus palmetorum (Krauss, 1902) (Si) (M)

Brachytrupes Serville, 1839

Brachytrupes megacephalus (Lefèvre, 1827) (Si, Sa) (M)

Eugryllodes Chopard, 1927

Eugryllodes brunneri (Riggio, 1888) (Si) (E, M)

Gryllomorpha Fieber, 1853

Gryllomorpha dalmatina (Ocskay, 1832) (N, S, Si, Sa)

Gryllomorphella Gorokhov, 1984

Gryllomorphella uclensis (Pantel, 1890) (S)

Discoptila Pantel, 1890

Discoptila clauseri Schmidt, 1991 (N) (E, M)

Petaloptila Pantel, 1890

Petaloptila andreinii Capra, 1937 (N, S) (E)

Acroneuroptila Baccetti, 1960

Acroneuroptila sardoa Baccetti, 1960 (Sa) (E, M)

Acroneuroptila puddui Cadeddu, 1970 (Sa) (E, M)

Nemobius Serville, 1839

Nemobius sylvestris (Bosc, 1792) (N, S)

Pteronemobius Jacobson & Bianchi, 1904

Pteronemobius concolor (Walker, 1871) (N, S, Si, Sa)

Pteronemobius lineolatus (Brullé, 1835) (N) (M)

Stenonemobius Gorokhov, 1981

Stenonemobius gracilis (Jakovleff, 1871) (Si) (M)

Arachnocephalus A. Costa, 1855

Arachnocephalus vestitus A. Costa, 1855 (N, S, Si, Sa)

Mogoplistes Serville, 1839

Mogoplistes brunneus Serville, 1839 (S, Si, Sa)

Mogoplistes novaki Krauss, 1888 (Sa) (M)

Pseudomogoplistes Gorokhov, 1984

Pseudomogoplistes squamiger (Krauss, 1888) (S, Si, Sa)

Myrmecophilus Berthold, 1827

Myrmecophilus acervorum (Panzer, 1799) (N)

Myrmecophilus aequispina Chopard, 1923 (N)

Myrmecophilus myrmecophilus (Savi, 1819) (N, S, Sa)

Myrmophilina Silvestri, 1912

Myrmophilina ochracea (Fischer, 1854) (S, Si)

Trigonidium Rambur, 1839

Trigonidium cicindeloides Rambur, 1839 (S, Si, Sa)

Anaxipha Saussure, 1874

Anaxipha averni (A. Costa, 1855) (S) (M) (*)

Note

Acheta domesticus: Specie antropofila.

Acheta gossypii: Specie tropicale introdotta e rinvenuta in Italia una prima volta nel 1855 & successivamente nel 1989.

Modicogryllus burdigalensis: Specie talora attribuita al genere *Tartarogryllus* Tarbiuskii, 1940.

Acroneuroptila: Genere endemico della Sardegna.

Myrmophilina: Talvolta considerato sottogenere di *Myrmecophilus*.

Anaxipha averni: Specie mai più rinvenuta in Italia dopo la sua descrizione.

Oecanthidae

Oecanthus Serville, 1831

Oecanthus pellucens (Scopoli, 1763) (N, S, Si, Sa)

Gryllotalpidae

Gryllotalpa Latreille, 1802

Gryllotalpa cossyriensis Baccetti & Capra, 1978 (Si) (E)

Gryllotalpa gryllotalpa (Linnaeus, 1758) (N, S, Sa)

Gryllotalpa octodecim Baccetti & Capra, 1978 (N, Sa) (E)

Gryllotalpa quindecim Baccetti & Capra, 1978 (S, Si) (E)

Gryllotalpa sedecim Baccetti & Capra, 1978 (N, Sa)

Gryllotalpa septemdecimchromosomica Ortiz, 1958 (N, S)

Gryllotalpa viginti Baccetti & Capra, 1978 (N) (E)

Gryllotalpa vigintiunum Baccetti, 1991 (Sa) (E)

Tetrigidae

Paratettix Bolivar, 1887

Paratettix meridionalis (Rambur, 1838) (N, S, Si, Sa)

Tetrix Latreille, 1802

Tetrix bolivari (Saulcy, 1901) (N, S)

Tetrix ceperoi (Bolivar, 1887) (N, S, Si, Sa)

Tetrix subulata (Linnaeus, 1758) (N, S)

Depressotetrix Karaman, 1960

Depressotetrix depressa (Brisout, 1848) (N, S)

Tetratetrix Karaman, 1965

Tetratetrix bipunctata (Linnaeus, 1758)

Tetratetrix bipunctata bipunctata (Linnaeus, 1758) (N)

Tetratetrix bipunctata kraussi (Saulcy, 1888) (N)

Tetratetrix nutans (Hagenbach, 1822)

Tetratetrix nutans nutans (Hagenbach, 1822) (N, S)
Tetratetrix nutans tenuicornis (Sahlberg, 1893) (N)

Tridactylidae

Xya Latreille, 1809

Xya variegata (Latreille, 1809) (N, S) (M)

Pamphagidae

Pamphagus Thunberg, 1815

Pamphagus marmoratus Burmeister, 1838 (Si) (E, M)
Pamphagus ortolanii Cusimano & Massa, 1977 (Si) (E, M)
Pamphagus sardeus (Herrich-Schaeffer, 1840) (Sa) (E, M)

Acinipe Rambur, 1838

Acinipe calabra (O.G. Costa, 1828) (S, Si)
Acinipe hesperica Rambur, 1838
Acinipe hesperica galvagnii Cusimano & Massa, 1977 (Si) (E, M)

Ocneridia Bolivar, 1912

Ocneridia nigropunctata (Lucas, 1849) (Si)

Prionotropis Fieber, 1853

Prionotropis appula (O.G. Costa, 1836) (S)
Prionotropis hystrix (Germar, 1817)
Prionotropis hystrix hystrix (Germar, 1817) (N)

Pyrgomorphidae

Pyrgomorpha Audinet-Serville, 1838

Pyrgomorpha conica (Olivier, 1791) (N, S, Si) (M)

Catantopidae

Podisma Berthold, 1827

Podisma dechambrei Leproux, 1951 (N)

Podisma eitschbergeri Harz, 1973 (N) (M)
Podisma emiliae Ramme, 1926 (N)
Podisma goidanichi Baccetti, 1958 (S)
Podisma magdalenae Galvagni, 1971 (S) (M)
Podisma pedestris (Linnaeus, 1758)
 Podisma pedestris caprai Salfi, 1935 (N) (E, M)
 Podisma pedestris melisi Baccetti, 1954 (S) (E, M)
 Podisma pedestris nadigi Harz, 1975 (N) (E, M)
 Podisma pedestris pedestris (Linnaeus, 1758) (N)
Podisma ruffoi Baccetti, 1971 (S) (E, M)
Podisma silvestrii Salfi, 1935 (S) (E, M)

***Melanoplus* Stål, 1873**

Melanoplus frigidus (Boheman, 1846) (N)

***Italopodisma* Harz, 1973**

Italopodisma acuminata (La Greca, 1969) (E)
 Italopodisma acuminata acuminata (La Greca, 1969) (S)
 Italopodisma acuminata marsicana (La Greca, 1969) (S)
Italopodisma baccettii (La Greca, 1969) (S) (E, M)
Italopodisma costai (Targioni-Tozzetti, 1881) (S) (E)
Italopodisma ebneri (La Greca, 1954) (S) (E)
Italopodisma fiscellana (La Greca, 1954) (S) (E)
Italopodisma lagrecai (Galvagni, 1973) (S) (E, M)
Italopodisma lucianae (Baccetti, 1959) (S) (E, M)
Italopodisma samnitica (La Greca, 1954) (S) (E)
Italopodisma trapezoidalis (La Greca, 1966) (E)
 Italopodisma trapezoidalis aprutiana (La Greca, 1969) (S) (M)
 Italopodisma trapezoidalis curvula (La Greca, 1969) (S)
 Italopodisma trapezoidalis trapezoidalis (La Greca, 1966) (S)

***Epipodisma* Ramme, 1951**

Epipodisma pedemontana (Brunner, 1882) (N) (E)
Epipodisma walthery Harz, 1973 (N) (E, M)

***Kisella* Harz, 1973**

Kisella alpina (Kollar, 1833)
 Kisella alpina alpina (Kollar, 1833) (N)
Kisella carinthiaca (Puschnig, 1910)
 Kisella carinthiaca carinthiaca (Puschnig, 1910) (N)
 Kisella carinthiaca irena (Fruhstorfer, 1921) (N)
Kisella subalpina (Fischer, 1850) (N)

***Nadigella* Galvagni, 1986**

Nadigella formosanta (Fruhstorfer, 1921)
Nadigella formosanta bessae Nadig, 1989 (N)
Nadigella formosanta formosanta (Fruhstorfer, 1921) (N)

Pseudoprumna Dovnar-Zapolski, 1932

Pseudoprumna baldensis (Krauss, 1883) (N) (E)

Micropodisma Dovnar-Zapolski, 1932

Micropodisma salamandra (Fischer, 1854) (N)

Chorthopodisma Ramme, 1951

Chorthopodisma cobellii (Krauss, 1883) (N) (E)

Pseudopodisma Mishtshenko, 1947

Pseudopodisma fieberi (Scudder, 1898) (N) (M)

Odontopodisma Dovnar-Zapolski, 1932

Odontopodisma decipiens Ramme, 1951 (M)
Odontopodisma decipiens insubrica Nadig, 1980 (N)
Odontopodisma fallax Ramme, 1951 (N)
Odontopodisma rammei Harz, 1973 (N)
Odontopodisma schmidtii (Fieber, 1853) (N, S)

Pezotettix Burmeister, 1840

Pezotettix giornai (Rossi, 1794) (N, S, Si, Sa)

Calliptamus Serville, 1831

Calliptamus barbarus (O.G. Costa, 1836)
Calliptamus barbarus barbarus (O.G. Costa, 1836) (N, S, Si, Sa)
Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758)
Calliptamus italicus italicus (Linnaeus, 1758) (N, S, Sa)
Calliptamus italicus grandis Ramme, 1927 (S, Si) (E)
Calliptamus siciliae Ramme, 1927 (N, S, Si)

Eyprepocnemis Fieber, 1853

Eyprepocnemis plorans (Charpentier, 1825)
Eyprepocnemis plorans plorans (Charpentier, 1825) (Si, Sa)

Heteracris Walker, 1870

Heteracris adspersa (Redtenbacher, 1899)
Heteracris adspersa adpersa (Redtenbacher, 1899) (Si)
Heteracris adspersa massai Galvagni, 1978 (Sa) (E)
Heteracris annulosus (Walker, 1870) (Si) (M)

Anacridium Uvarov, 1923

Anacridium aegyptium (Linnaeus, 1764) (N, S, Si, Sa)

Schistocerca Stål, 1873

Schistocerca gregaria (Forskål, 1775) (S, Si, Sa) (*)

Tropidopola Stål, 1873

Tropidopola cylindrica (Marshall, 1836)
Tropidopola cylindrica cylindrica (Marshall, 1836) (S, Si, Sa)
Tropidopola graeca Uvarov, 1926
Tropidopola graeca transjonica La Greca, 1964 (S) (E, M)

Note

Italopodisma: Genere endemico appenninico.
Kisella: Talvolta considerato sottogenere di *Miramella* Dovnar-Zapolskji, 1932.
Nadigella: Talvolta considerato sottogenere di *Miramella*.
Schistocerca gregaria: Specie migratoria estranea alla nostra fauna, ma che saltuariamente perviene sulle nostre coste.

Acrididae

Acrida Linnaeus, 1758

Acrida turrita Linnaeus, 1758 (Si, Sa)
Acrida ungarica (Herbst, 1786)
Acrida ungarica mediterranea Dirsh, 1949 (N, S, Si, Sa)

Truxalis Fabricius, 1775

Truxalis nasuta (Linnaeus, 1758) (S, Si, Sa) (M)

Psophus Fieber, 1853

Psophus stridulus Linnaeus, 1758 (N, S)

Celes Saussure, 1884

Celes variabilis (Pallas, 1771) (N)

Locusta Linnaeus, 1758

Locusta migratoria Linnaeus, 1758

Locusta migratoria cinerascens Fabricius, 1781 (N, S, Si, Sa)

Oedaleus Fieber, 1853

Oedaleus decorus (Germar, 1826) (N, S, Si, Sa)

Oedipoda Serville, 1831

Oedipoda caerulea (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Oedipoda charpentieri Fieber, 1853 (S) (M)

Oedipoda fuscocincta Lucas, 1849

Oedipoda fuscocincta coerulea Saussure, 1884 (Sa)

Oedipoda fuscocincta sicula Fieber, 1853 (Si) (E)

Oedipoda germanica (Latreille, 1804) (N, S)

Oedipoda miniata (Pallas, 1771)

Oedipoda miniata miniata (Pallas, 1771) (Si, Sa)

Sphingonotus Fieber, 1852

Sphingonotus azurea (Rambur, 1838) (Si)

Sphingonotus caerulea (Linnaeus, 1767)

Sphingonotus caerulea caerulea (Linnaeus, 1767) (N, S, Sa)

Sphingonotus caerulea corsicus Chopard, 1923 (Sa)

Sphingonotus caerulea exornatus Nedelkov, 1907 (S, Si)

Sphingonotus candidus A. Costa, 1888 (Sa)

Sphingonotus eurasius Mishtshenko, 1936 (Si) (M)

Sphingonotus personatus Zanon, 1926 (N, S, Si)

Sphingonotus rubescens (Walker, 1870) (S, Sa)

Sphingonotus uvarovi Chopard, 1923 (Sa)

Acrotylus Fieber, 1853

Acrotylus fischeri Azam, 1901 (N)

Acrotylus insubricus (Scopoli, 1786) (*)

Acrotylus insubricus insubricus (Scopoli, 1786) (N, S, Si, Sa)

Acrotylus longipes (Charpentier, 1845) (S, Si)

Acrotylus patruelis (Herrich-Schaeffer, 1838) (N, S, Si) (*)

Aiolopus Fieber, 1853

Aiolopus simulatrix (Walker, 1879) (Sa) (M)

Aiolopus strepens (Latreille, 1804) (N, S, Si, Sa)

Aiolopus thalassinus (Fabricius, 1781) (N, S, Si, Sa)

Epacromius Uvarov, 1942

Epacromius coerulipes (Ivanov, 1887) (N) (M)

Epacromius tergestinus (Charpentier, 1825) (N, S) (M)

Platypygius Uvarov, 1942

Platypygius platypygius (Pantel, 1886) (Si, Sa)

Parapleurus Fischer, 1854

Parapleurus alliaceus (Germar, 1817) (N, S)

Stethophyma Fischer, 1853

Stethophyma grossum (Linnaeus, 1758) (N)

Paracinema Fischer, 1854

Paracinema tricolor (Thunberg, 1815)

Paracinema tricolor bisignata (Charpentier, 1825) (N, S, Si, Sa)

Duroniella Bolivar, 1908

Duroniella lucasi (Bolivar, 1881) (Sa) (M)

Brachycrotaphus Krauss, 1877

Brachycrotaphus trixalicerus (Fischer, 1854) (Si)

Ochrilidia Stål, 1873

Ochrilidia sicula Salfi, 1931 (Si) (E, M)

Arcyptera Serville, 1839

Arcyptera fusca (Pallas, 1773) (N, Si?)

Pararcyptera Tarbinskij, 1930

Pararcyptera alzonai Capra, 1938 (N) (E, M)

Pararcyptera microptera (Fischer Waldheim, 1833) (N)

Ramburiella Bolivar, 1905

Ramburiella turcomana (Fischer Waldheim, 1833) (S) (M)

Chrysochraon Fischer, 1854

- Chrysochraon beybienkoi* Galvagni, 1968 (S) (M)
- Chrysochraon dispar* (Germar, 1835)
 - Chrysochraon dispar dispar* (Germar, 1835) (N)
 - Chrysochraon dispar giganteus* Harz, 1975 (N)

Euthystira Fieber, 1853

- Euthystira brachyptera* (Ocskay, 1826) (N)

Dociostaurus Fieber, 1853

- Dociostaurus brevicollis* (Eversmann, 1848) (N)
- Dociostaurus genei* (Ocskay, 1832) (N, S, Sa)
- Dociostaurus jagoi* Soltani, 1978
 - Dociostaurus jagoi occidentalis* Soltani, 1978 (Sa)
- Dociostaurus maroccanus* (Thunberg, 1815) (S, Si, Sa)
- Dociostaurus minutus* La Greca, 1967 (Si) (E, M)

Omocestus Bolivar, 1878

- Omocestus ventralis* (Zetterstedt, 1821) (N, S, Si, Sa)
- Omocestus viridulus* (Linnaeus, 1758) (N)

Dirshius Harz, 1975

- Dirshius haemorrhoidalis* (Charpentier, 1825) (N, S)
- Dirshius lopadusae* La Greca, 1973 (Si) (E, M)
- Dirshius petraeus* (Brisout, 1855) (N, S, Sa)
- Dirshius raymondi* (Yersin, 1863)
 - Dirshius raymondi africanus* Harz, 1970 (Si) (M)
 - Dirshius raymondi raymondi* (Yersin, 1863) (N, S) (M)
- Dirshius uvarovi* Zanon, 1926 (S) (E, M)

Stenobothrus Fischer, 1854

- Stenobothrus apenninus* Ebner, 1915 (N, S) (E)
- Stenobothrus fischeri* (Eversmann, 1848) (S)
- Stenobothrus lineatus* (Panzer, 1796) (N, S)
- Stenobothrus nigromaculatus* (Herrich-Schaeffer, 1840) (N)
- Stenobothrus ursulae* Nadig, 1978 (N) (E, M)

Stenobothrodes Tarbinskij, 1948

- Stenobothrodes cotticus* Kruseman & Jeekel, 1967 (N) (M)
- Stenobothrodes rubicundulus* Kruseman & Jeekel, 1967 (N, S)

Aeropus Gistel, 1848

Aeropus sibiricus (Linnaeus, 1767)

Aeropus sibiricus sibiricus (Linnaeus, 1767) (N, S)

Gomphocerus Thunberg, 1815

Gomphocerus rufus (Linnaeus, 1758) (N, S, Sa)

Aeropedellus Hebbard, 1935

Aeropedellus variegatus Fischer Waldheim, 1846

Aeropedellus variegatus variegatus Fischer Waldheim, 1846 (N)

Myrmeleotettix Bolivar, 1914

Myrmeleotettix maculatus (Thunberg, 1815)

Myrmeleotettix maculatus maculatus (Thunberg, 1815) (N, S)

Staurodeus Bolivar, 1898

Staurodeus scalaris (Fischer Waldheim, 1846) (N, S)

Chorthippus Fieber, 1852

Chorthippus albomarginatus (De Geer, 1773) (N, S)

Chorthippus caffer Ramme, 1923 (N)

Chorthippus dichrous (Eversmann, 1859) (S)

Chorthippus dorsatus (Zetterstedt, 1821)

Chorthippus dorsatus dorsatus (Zetterstedt, 1821) (N, S, Sa)

Chorthippus dorsatus garganicus Jannone, 1937 (N, S)

Chorthippus montanus (Charpentier, 1825) (N, S) (*)

Chorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821)

Chorthippus parallelus parallelus (Zetterstedt, 1821) (N, S, Si, Sa)

Glyptobothrus Chopard, 1951

Glyptobothrus albicornis (La Greca, 1948) (S) (E)

Glyptobothrus alticola (Ramme, 1921) (N) (E)

Glyptobothrus apicalis (Herrich-Schaeffer, 1840) (Sa)

Glyptobothrus apricarius (Linnaeus, 1758) (N, S)

Glyptobothrus biguttulus (Linnaeus, 1758)

Glyptobothrus biguttulus biguttulus (Linnaeus, 1758) (N)

Glyptobothrus brunneus (Thunberg, 1815)

Glyptobothrus brunneus brunneus (Thunberg, 1815) (N, S, Si, Sa)

Glyptobothrus cialacensis Nadig, 1986 (N) (E, M)

Glyptobothrus eisentrauti (Ramme, 1931) (N, S)

Glyptobothrus modestus (Ebner, 1915) (S) (E)

Glyptobothrus mollis (Charpentier, 1825)
 Glyptobothrus mollis ignifer (Ramme, 1923) (N)
 Glyptobothrus mollis mollis (Charpentier, 1825) (N)
Glyptobothrus monticola Ebner, 1915 (S) (E)
Glyptobothrus pullus (Philippi, 1830) (N)
Glyptobothrus rammei (Ebner, 1915)
Glyptobothrus rubratibialis Schmidt, 1978 (N, S) (E)
Glyptobothrus sampeyrensis Nadig, 1986 (N) (E, M)
Glyptobothrus vagans (Eversmann, 1848) (N, S)
Glyptobothrus yersini Harz, 1975 (Si)

***Euchorthippus* Tarbinskij, 1925**

Euchorthippus albolineatus (Lucas, 1849)
 Euchorthippus albolineatus sículus Ramme, 1927 (Si) (E)
Euchorthippus declivus (Brisout, 1848) (N, S, Sa)
Euchorthippus sardous Nadig, 1934 (Sa) (E)

Note

Acrotylus insubricus: Baccetti & Capra (1988) ritengono che sotto questo nome vadano indicate tutte le citazioni riferite finora dagli AA. come *A. patruelis*.
Acrotylus patruelis: Baccetti & Capra (1988) ritengono che questo nome vada abolito e sostituito con *A. maculatus* (Olivier, 1791), non più usato da oltre 50 anni, e che ad esso vadano attribuite tutte le citazioni riferite dagli AA. come *A. insubricus*.
Dirshius: Talvolta considerato sottogenere di *Omocestus*.
Stenobothrodes: Talvolta considerato sottogenere di *Stenobothrus*.
Chorthippus montanus: La sua presenza in Italia richiede conferma.
Glyptobothrus: Talvolta considerato sottogenere di *Chorthippus*.

Phasmatodea

Bacillidae

***Bacillus* Audinet-Serville, 1831**

Bacillus atticus Brunner, 1882 (S, Si, Sa)
Bacillus grandii Nascetti & Bullini, 1982 (Si) (E, M)
 Bacillus grandii benazzii Scali, 1991
 Bacillus grandii grandii Scali, 1991
 Bacillus grandii maretimi Scali & Mantovani, 1990
Bacillus lynceorum Bullini, Nascetti & Bianchi Bullini, 1983 (Si)
Bacillus rossius (Rossi, 1788) (N, S, Si, Sa)
Bacillus whitei Nascetti & Bullini, 1982 (Si)
Bacillus rossius-grandii benazzii Scali, 1989 (Si) (*)
Bacillus rossius-grandii grandii Scali, Mantovani & Tinti, 1991 (Si) (*)

***Clonopsis* Pantel, 1915**

Clonopsis gallica (Charpentier, 1825) (N, S, Si, Sa)

Note

Bacillus rossius-grandii benazzii: Sono forme ibridogenetiche ed androgenetiche, non ritenute specie da alcuni ed indicate da altri come *Bacillus klepton rossius-grandii*: morfologicamente molto simili a *B. whitei*.

Bacillus rossius-grandii grandii: Sono forme ibridogenetiche ed androgenetiche, non ritenute specie da alcuni ed indicate da altri come *Bacillus klepton rossius-grandii*: morfologicamente molto simili a *B. whitei*.

Dermaptera

Anisolabididae

***Anisolabis* Fieber, 1853**

Anisolabis maritima (Bonelli in Gené, 1832) (N, S, Si, Sa)

***Euborellia* Burr, 1910**

Euborellia annulipes (Lucas, 1847) (N, S, Si, Sa)

Euborellia moesta (Gené, 1837) (N, S, Sa)

Labiduridae

***Nala* Zacher, 1910**

Nala lividipes (Dufour, 1828) (S, Si, Sa)

***Labidura* Leach, 1815**

Labidura riparia (Pallas, 1773) (N, S, Si, Sa)

Labiidae

***Labia* Leach, 1815**

Labia minor (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)

Forficulidae

Anechura Scudder, 1876

Anechura bipunctata (Fabricius, 1781) (N)

Chelidura Latreille, 1825

Chelidura aptera (Charpentier, 1825) (N)

Chelidurella Verhoeff, 1902

Chelidurella acanthopygia (Gené, 1832) (N) (E)

Chelidurella caprai Vigna Taglianti, 1993 (S) (E)

Chelidurella mutica (Krauss, 1886) (N) (E)

Chelidurella poggii Capra, 1982 (N) (E)

Chelidurella thaleri Harz, 1980 (N)

Chelidurella xanthopygia (Schmidt, 1866) (N)

Pseudochelidura Verhoeff, 1902

Pseudochelidura orsinii (Gené, 1833) (N, S) (E)

Apterygida Westwood, 1840

Apterygida albipennis (Megerle in Charpentier, 1825) (N, S)

Forficula Linnaeus, 1758

Forficula apennina Costa, 1881 (S) (E)

Forficula auricularia Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)

Forficula decipiens Gené, 1832 (N, S, Si, Sa)

Forficula obtusangula Krauss, 1904 (N, S, Si)

Forficula pubescens Gené, 1837 (N, S, Si, Sa)

Forficula silana Costa, 1881 (S, Si) (E)

Embioptera

Embiidae

Embia Latreille, 1825

Embia ramburi Rimsky-Korsakow, 1905 (N, S, Si)

Embia nuragica Stefani, 1953 (Sa) (E)

Embia tyrrhenica Stefani, 1953 (S, Sa)

Cleomia Stefani, 1953

Cleomia guareschii Stefani, 1953 (Sa) (E)

Oligotomidae

Haploembia Verhoeff, 1904

Haploembia solieri Rambur, 1842 (N, S, Si, Sa)

Plecoptera

Perlodidae

Dictyogenus Klapálek, 1904

Dictyogenus alpinus (Pictet, 1842) (N)

Dictyogenus fontium (Ris, 1896) (N)

Dictyogenus ventralis (Pictet, 1841) (N) (M)

Isogenus Newman, 1833

Isogenus nubecula Newman, 1833 (N) (M)

Perlodes Banks, 1903

Perlodes intricatus (Pictet, 1841) (N, S)

Perlodes jurassicus Aubert, 1946 (N, S)

Perlodes microcephalus (Pictet, 1833) (N, S)

Isoperla Banks, 1906

Isoperla andreinii (Festa, 1938) (N, S) (E)

Isoperla carbonaria Aubert, 1953 (N, S, Si)

Isoperla grammatica (Poda, 1761) (N, S, Si)

Isoperla hyblaea Consiglio, 1961 (Si) (E, M)

Isoperla illyrica Tabacaru, 1971 (N)

Isoperla ilvana Consiglio, 1958 (S) (E, M)

Isoperla insularis (Morton, 1930) (Sa)

Isoperla lugens (Klapálek, 1923) (N)

Isoperla obscura (Zetterstedt, 1840) (N) (M)

Isoperla oenotriae Consiglio, 1967 (S) (E, M)

Isoperla orobica Ravizza, 1975 (N)

Isoperla oxylepis (Despax, 1936) (N)

Isoperla rivulorum (Pictet, 1842) (N, S)
Isoperla saccai (Festa, 1939) (N, S) (E)

Perlidae

Dinocras Klapálek, 1907

Dinocras cephalotes (Curtis, 1827) (N, S, Si)
Dinocras ferrerii (Pictet, 1841) (N, S)
Dinocras megacephala (Klapálek, 1907) (N)

Perla Geoffroy, 1762

Perla bipunctata (Pictet, 1833) (N, S) (M)
Perla burmeisteriana Claassen, 1936 (N) (M)
Perla grandis (Rambur, 1841) (N, S, Si)
Perla illiesi Braasch & Joost, 1971 (N)
Perla marginata (Panzer, 1799) (N, S, Si)

Chloroperlidae

Chloroperla Newman, 1836

Chloroperla susemicheli Zwick, 1967 (N, S)
Chloroperla tripunctata (Scopoli, 1763) (N, S) (M)

Siphonoperla Zwick, 1967

Siphonoperla montana (Pictet, 1841) (N, S)
Siphonoperla torrentium (Pictet, 1841) (N, S, Si)

Xanthoperla Zwick, 1967

Xanthoperla apicalis (Newman, 1836) (N, S) (M)
Xanthoperla apicalis hamulata (Morton, 1930) (Sa)

Taeniopterygidae

Taeniopteryx Pictet, 1841

Taeniopteryx kuehtreiberi Aubert, 1950 (N, S)
Taeniopteryx nebulosa (Linnaeus, 1758) (N)
Taeniopteryx schoenemundi (Mertens, 1923) (N) (M)
Taeniopteryx stankovitchi Ikononov, 1978 (S) (M)

Brachyptera Newport, 1849

Brachyptera auberti Consiglio, 1957 (Sa)
Brachyptera calabrica Aubert, 1953 (S, Si) (E)
Brachyptera monilicornis (Pictet, 1841) (N, S) (M)
Brachyptera risi (Morton, 1836) (N, S, Si)
Brachyptera seticornis (Klapálek, 1902) (N) (M)
Brachyptera trifasciata (Pictet, 1832) (N) (M)

Rhabdiopteryx Klapálek, 1902

Rhabdiopteryx alpina Kuehtreiber, 1934 (N)
Rhabdiopteryx neglecta (Albarda, 1889)
Rhabdiopteryx neglecta neglecta (Albarda, 1889) (N)
Rhabdiopteryx neglecta italica Aubert, 1953 (N, S, Si)

Nemouridae

Amphinemura Ris, 1902

Amphinemura standfussi (Ris, 1836) (N)
Amphinemura sulcicollis (Stephens, 1836) (N, S, Si)
Amphinemura triangularis (Ris, 1902) (N, S, Si)

Nemoura Latreille, 1796

Nemoura cinerea (Retzius, 1783)
Nemoura cinerea selenae Consiglio, 1959 (N, S, Si)
Nemoura flexuosa Aubert, 1949 (N, S)
Nemoura fulviceps Klapálek, 1902 (Si)
Nemoura hesperiae Consiglio, 1960 (N, S, Si) (E)
Nemoura illiesi Mendl, 1968 (N)
Nemoura lucana Nicolai & Fochetti, 1991 (S) (E, M)
Nemoura marginata (Pictet, 1835) (N, S)
Nemoura minima Aubert, 1946 (N)
Nemoura mortoni (Ris, 1902) (N)
Nemoura obtusa (Ris, 1902) (N, S)
Nemoura oropensis Ravizza & Ravizza Dematteis, 1980 (N) (E)
Nemoura palliventris Aubert, 1953 (N, S, Si)
Nemoura pesarinii Ravizza & Ravizza Dematteis, 1979 (N) (E)
Nemoura pesarinii sinuata (Ris, 1902) (N)
Nemoura pesarinii uncinata Despax, 1934 (N)
Nemoura pesarinii undulata (Ris, 1902) (N)

Nemurella Kempny, 1898

Nemurella pictetii Klapálek, 1900 (N)

***Protonemura* Kempny, 1898**

- Protonemura algovia* Mendl, 1968 (N)
- Protonemura auberti* Illies, 1954 (N)
- Protonemura ausonia* (Consiglio, 1955) (N, S) (E)
- Protonemura austriaca* Theischinger, 1976 (N)
- Protonemura beatensis* (Despax, 1929) (N)
- Protonemura bipartita* Consiglio, 1962 (N) (E)
- Protonemura brevistyla* (Ris, 1902) (N)
- Protonemura caprai* (Aubert, 1954) (N, S) (E)
- Protonemura consighioi* (Aubert, 1953) (S, Si) (E)
- Protonemura costai* (Aubert, 1953) (N, S) (E)
- Protonemura elisabethae* Ravizza, 1976 (N) (E)
- Protonemura helenae* Nicolai, 1985 (Si) (E, M)
- Protonemura hirpina* (Consiglio, 1958) (S) (E)
- Protonemura ichnusae* (Consiglio, 1957) (Sa) (E)
- Protonemura intricata* (Ris, 1902)
 - Protonemura intricata intricata* (Ris, 1902) (N, S, Si)
- Protonemura italica* (Aubert, 1954) (S) (E)
- Protonemura julia* Nicolai, 1983 (N) (E)
- Protonemura lagrecai* (Aubert, 1954) (S, Si) (E)
- Protonemura lateralis* (Pictet, 1836) (N)
- Protonemura macrura* (Aubert, 1953) (S) (E)
- Protonemura meyeri* (Pictet, 1841) (S)
- Protonemura nimborella* (Mosely, 1930) (N)
- Protonemura nimborum* (Ris, 1902) (N)
- Protonemura nitida* (Pictet, 1836) (N)
- Protonemura praecox* (Morton, 1894) (N, S, Si)
- Protonemura ruffoi* Consiglio, 1961 (S, Si)
- Protonemura salfii* (Aubert, 1954) (N, S) (E)
- Protonemura sicala* Consiglio, 1961 (Si) (E)
- Protonemura tyrrhena* (Festa, 1938) (N, S, Si) (E)

Capniidae

***Capnia* Pictet, 1841**

- Capnia bifrons* (Newman, 1839) (N, S)
- Capnia nigra* (Pictet, 1833) (N, S, Si)
- Capnia vidua* Klapálek, 1904
 - Capnia vidua vidua* (Klapálek, 1904) (N, S)

***Capnioneura* Ris, 1905**

- Capnioneura nemuroides* Ris, 1905 (N, S, Si)

Capnopsis Morton, 1896

Capnopsis schilleri (Rostock, 1892) (N, S)

Leuctridae

Leuctra Stephens, 1836

Leuctra albida Kempny, 1899 (N)
Leuctra alpina Kuehtreiber, 1934 (N, S)
Leuctra annae Consiglio, 1975 (Sa) (E)
Leuctra apenninicola Ravizza, 1988 (N, S) (E)
Leuctra archimedis Consiglio, 1968 (Si) (E)
Leuctra armata Kempny, 1899 (N)
Leuctra auberti Ravizza & Ravizza Dematteis, 1985 (N) (E)
Leuctra autumnalis Aubert, 1948 (N)
Leuctra boreoni Aubert, 1962 (N)
Leuctra braueri Kempny, 1898 (N)
Leuctra brevipennis Ravizza, 1978 (N) (E)
Leuctra budtzi Esben Petersen, 1912 (Sa)
Leuctra caprai Festa, 1939 (N) (E)
Leuctra cingulata Kempny, 1899 (N)
Leuctra concii Consiglio, 1958 (N, S) (E)
Leuctra costai Aubert, 1953 (S, Si) (E)
Leuctra dolasilla Consiglio, 1955 (N)
Leuctra elisabethae Ravizza, 1985 (N, S) (E)
Leuctra festai Aubert, 1954 (N) (E)
Leuctra fusca (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)
Leuctra geniculata (Stephens, 1836) (Sa) (M)
Leuctra handlirschi Kempny, 1898 (N, S)
Leuctra hexacantha Despax, 1940 (N, S)
Leuctra helvetica Aubert, 1956 (N)
Leuctra hippopus Kempny, 1899 (N, S)
Leuctra inermis Kempny, 1899 (N, S, Si)
Leuctra insubrica Aubert, 1949 (N, S)
Leuctra leptogaster Aubert, 1949 (N, S, Si)
Leuctra ligurica Aubert, 1962 (N) (E)
Leuctra major Brinck, 1949 (N, S)
Leuctra meridionalis Aubert, 1951 (N) (E)
Leuctra mortoni Kempny, 1899 (N, S)
Leuctra moselyi Morton, 1929 (N)
Leuctra nigra (Olivier, 1811) (N)
Leuctra niveola Schmid, 1947 (N)
Leuctra pasquinii Consiglio, 1958 (N, S) (E)
Leuctra rauscheri Aubert, 1957 (N, S)
Leuctra rosinae Kempny, 1900 (N, S)
Leuctra schmidi Aubert, 1946 (N)

Leuctra sesvenna Aubert, 1953 (N)
Leuctra silana Aubert, 1953 (S) (E)
Leuctra teriolensis Kempny, 1900 (N)
Leuctra vesulensis Ravizza & Ravizza Dematteis, 1984 (N) (E)

Tyrrhenoleuctra Klapálek, 1901

Tyrrhenoleuctra zavattarii (Consiglio, 1956) (Sa) (M)

Psocoptera

Trogiidae

Cerobasis Kolbe, 1882

Cerobasis annulata (Hagen, 1865) (S)
Cerobasis guestfalica (Kolbe, 1880) (N, S, Sa)

Lepinotus Heyden, 1850

Lepinotus inquilinus Heyden, 1850 (N, S, Sa)
Lepinotus patruelis Pearman, 1931 (N, S)
Lepinotus reticulatus Enderlein, 1905 (N, S)

Trogium Illiger, 1798

Trogium pulsatorium (Linnaeus, 1758) (N, S)

Psyllipsocidae

Dorypteryx Aaron, 1883

Dorypteryx domestica (Smithers, 1958) (N, S)
Dorypteryx pallida Aaron, 1884 (S)

Psocathropos Ribaga, 1899

Psocathropos lachlani Ribaga, 1899 (S)

Psyllipsocus Sélys-Longchamps, 1872

Psyllipsocus ramburii Sélys-Longchamps, 1872 (N, S, Si, Sa)

Troctopsocidae

Chelyopsocus Lienhard, 1980

Chelyopsocus garganicus Lienhard, 1980 (S)

Liposcelididae

Embidopsocus Hagen, 1866

Embidopsocus enderleini (Ribaga, 1905) (N, S)

Liposcelis Motschulsky, 1852

Liposcelis bostrychophila Badonnel, 1931 (N, S, Si)

Liposcelis brunnea Motschulsky, 1852 (S)

Liposcelis corrodens (Heymons, 1909) (N)

Liposcelis decolor (Pearman, 1925) (N, S, Si, Sa)

Liposcelis keleri Günther, 1974 (N)

Liposcelis kyrosensis Badonnel, 1971 (S)

Liposcelis mendax Pearman, 1946 (N)

Liposcelis meridionalis (von Rosen, 1911) (S)

Liposcelis orghidani Badonnel, 1973 (S)

Liposcelis paeta Pearman, 1942 (N)

Liposcelis paetula Broadhead, 1950 (S)

Liposcelis pearmani Lienhard, 1990 (N)

Liposcelis priesneri Enderlein, 1925 (Si)

Liposcelis pubescens Broadhead, 1947 (S)

Liposcelis rufa Broadhead (S)

Liposcelis silvarum (Kolbe, 1888) (N, S)

Epipsocidae

Epipsocus Hagen, 1866

Epipsocus lucifugus (Rambur, 1842) (N, S, Si, Sa)

Caeciliidae

Caecilius Curtis, 1837

Caecilius atricornis Mc Lachlan, 1869 (N)

Caecilius burmeisteri Brauer, 1876 (N, S, Sa)

Caecilius dahli Badonnel, 1963 (N)

Caecilius flavidus (Stephens, 1836) (N, S)

Caecilius fuscopterus (Latreille, 1799) (N, S)
Caecilius piceus Kolbe, 1882 (N)
Caecilius rhenanus Tetens, 1891 (N, Sa)

Enderleinella Badonnel, 1932

Enderleinella obsoleta (Stephens, 1836) (N, S)

Stenopsocidae

Graphopsocus Kolbe, 1880

Graphopsocus cruciatus (Linnaeus, 1768) (N, S, Si, Sa)

Stenopsocus Hagen, 1886

Stenopsocus immaculatus (Stephens, 1836) (N, S)
Stenopsocus lachlani Kolbe, 1880 (N)
Stenopsocus stigmaticus (Imhoff & Labram, 1846) (N)

Amphipsocidae

Brachypsocus Lienhard, 1979

Brachypsocus badonneli Lienhard, 1979 (Si)

Lachesillidae

Lachesilla Westwood, 1840

Lachesilla bernardi Badonnel, 1938 (N, Sa)
Lachesilla dimorpha Lienhard, 1981 (S)
Lachesilla gridellii (Navás, 1927) (N)
Lachesilla pedicularia (Linnaeus, 1758) (N, S, Sa)
Lachesilla quercus (Kolbe, 1880) (N)
Lachesilla tanaidana Roesler, 1953 (Sa)

Ectopsocidae

Ectopsocoides Badonnel, 1955

Ectopsocoides cryptomeriae (Enderlein, 1907) (N)
Ectopsocoides xerophylla Vishnyakova, 1970 (N)

Ectopsocus Mc Lachlan, 1899

- Ectopsocus berlesii* Ribaga, 1900 (S)
- Ectopsocus briggsi* Mc Lachlan, 1899 (N, S, Sa)
- Ectopsocus maindroni* Badonnel, 1935 (N)
- Ectopsocus meridionalis* Ribaga, 1904 (N, S, Sa)
- Ectopsocus strauchi* Enderlein, 1906 (N)
- Ectopsocus vachoni* Badonnel, 1945 (S, Si)

Peripsocidae

Peripsocus Hagen, 1866

- Peripsocus alboguttatus* (Dalman, 1823) (N, Sa)
- Peripsocus phaeopterus* (Stephens, 1836) (N, S)
- Peripsocus reductus* Badonnel, 1943 (N)

Pseudocaeciliidae

Trimerocaecilius Meinander, 1978

- Trimerocaecilius becheti* Meinander, 1978 (S, Sa)

Trichopsocidae

Trichopsocus Kolbe, 1882

- Trichopsocus acuminatus* Badonnel, 1943 (S)
- Trichopsocus dalii* (Mc Lachlan, 1867) (S, Sa)

Elipsocidae

Cuneopalpus Badonnel, 1943

- Cuneopalpus cyanops* (Rostock, 1876) (S)

Elipsocus Hagen, 1866

- Elipsocus abdominalis* Reuter, 1904 (N, Sa)
- Elipsocus annulatus* Roesler, 1954 (S)
- Elipsocus hyalinus* (Stephens, 1836) (N, S)
- Elipsocus moebiusi* Tetens, 1891 (N)
- Elipsocus westwoodii* Mc Lachlan, 1867 (N, S, Sa)

Hemineura Tetens, 1891

Hemineura dispar Tetens, 1891 (N)

Pseudopsocus Kolbe, 1882

Pseudopsocus lichenophilus (Ribaga, 1910) (S)

Pseudopsocus meridionalis Badonnel, 1936 (N)

Reuterella Enderlein, 1903

Reuterella helvimacula (Enderlein, 1901) (N)

Philotarsidae

Aaroniella Mockford, 1951

Aaroniella badonneli (Danks, 1950) (N)

Philotarsus Kolbe, 1880

Philotarsus parviceps Roesler, 1954 (N, S)

Philotarsus picicornis (Fabricius, 1793) (N, S)

Mesopsocidae

Cyrtopsochus A. Costa, 1885

Cyrtopsochus irroratus A. Costa, 1885 (Sa)

Mesopsocus Kolbe, 1880

Mesopsocus dubosqui Badonnel, 1938 (S)

Mesopsocus fuscifrons Meinander, 1966 (S)

Mesopsocus laticeps (Kolbe, 1880) (N, S, Sa)

Mesopsocus unipunctatus (Müller, 1764) (N, S, Sa)

Psoculus Roesler, 1954

Psoculus neglectus (Roesler, 1935) (S)

Psocidae

Amphigerontia Kolbe, 1880

Amphigerontia bifasciata (Latreille, 1799) (N, S, Sa)
Amphigerontia contaminata (Stephens, 1836) (N, S, Sa)

Neopsocopsis Badonnel, 1936

Neopsocopsis hirticornis (Reuter, 1894) (N)

Blaste Kolbe, 1883

Blaste conspurcata (Rambur, 1842) (N, S, Sa)
Blaste quadrimaculata (Latreille, 1794) (S)
Blaste sarda Lienhard, 1986 (Sa)

Neopsocus Kolbe, 1882

Neopsocus rhenanus Kolbe, 1882 (N, S)
Neopsocus tunesicus (Enderlein, 1923) (Si)

Psococerastis Pearman, 1932

Psococerastis gibbosa (Sulzer, 1776) (N, S)

Metylophorus Pearman, 1932

Metylophorus nebulosus (Stephens, 1836) (N, S)

Atlantopsocus Badonnel, 1944

Atlantopsocus personatus (Hagen, 1965) (S)

Hyalopsocus Roesler, 1954

Hyalopsocus gardinii (Lienhard, 1983) (Si)
Hyalopsocus morio (Latreille, 1794) (S)

Loensia Enderlein, 1924

Loensia fasciata (Fabricius, 1787) (N)
Loensia variegata (Latreille, 1799) (N, S)

Oreopsocus Roesler, 1939

Oreopsocus montanus (Kolbe, 1884) (N, S)

Psocus Latreille, 1794

Psocus bipunctatus (Linnaeus, 1761) (N, S)

Trichadenotecnum Enderlein, 1909

Trichadenotecnum innuptum Betz, 1983 (N)

Trichadenotecnum majus (Kolbe, 1880) (N)

Trichadenotecnum sexpunctatum (Linnaeus, 1758) (N, S, Sa)

Myopsocidae

Myopsocus Hagen, 1866

Myopsocus eatoni Mc Lachlan, 1880 (S)

Mallophaga

Menoponidae

Actornithophilus Ferris, 1916

Actornithophilus gracilis (Piaget, 1880) (S)

Actornithophilus piceus (Denny, 1842) (N)

Amyrsidea Ewing, 1927

Amyrsidea megalosoma (Overgaard, 1943) (S)

Amyrsidea perdicis (Denny, 1842) (S)

Amyrsidea phaestoma (Nitzsch, 1866) (N)

Austromenopon Bedford, 1939

Austromenopon durisetosum (Blagoveshtchensky, 1948) (S)

Austromenopon echinatum Edwards, 1960 (Sa)

Austromenopon ridibundus (Denny, 1842) (N)

Austromenopon transversum (Denny, 1842) (Sa)

Bonomiella Conci, 1942

Bonomiella columbae Emerson, 1957 (S, Sa)

Bonomiella insolitunguicolata Conci, 1942 (N)

Ciconiphilus Bedford, 1939

Ciconiphilus importunus (Denny, 1842) (N)

Ciconiphilus nyctardis (Denny, 1842) (N)

Ciconiphilus quadripustulatus (Burmeister, 1838) (N)

Colpocephalum Nitzsch, 1818

Colpocephalum elongatum Piaget, 1880 (N)
Colpocephalum flavescens (Haan, 1829) (N)
Colpocephalum milvi Tendeiro, 1979 (Sa)
Colpocephalum mutabile Tendeiro, 1979 (Sa)
Colpocephalum nanum Piaget, 1880 (Sa)
Colpocephalum occipitale Nitzsch, 1866 (N)
Colpocephalum quadriseriatum Picaglia, 1855 (N)
Colpocephalum turbinatum Denny, 1842 (S)
Colpocephalum zerafae Ansari, 1955 (Sa)

Cuculifilus Uchida, 1926

Cuculifilus fasciatus (Scopoli, 1763) (S)

Dennyus Neumann, 1906

Dennyus burmeisteri (Denny, 1842) (N)
Dennyus hirundinis (Linnaeus, 1761) (N, Sa)

Hohorstiella Eichler, 1940

Hohorstiella gigantea (Denny, 1842) (N)

Holomenopon Eichler, 1941

Holomenopon albofasciatum (Piaget, 1880) (N)

Kurodaia Uchida, 1926

Kurodaia fulvofasciata (Piaget, 1880) (N)
Kurodaia haliaeti (Denny, 1842) (N)
Kurodaia subpachygaster (Piaget, 1880) (N, Sa)

Menacanthus Neumann, 1912

Menacanthus abdominalis (Piaget, 1880) (N)
Menacanthus alaudae (Schränk, 1776) (S)
Menacanthus cornicis (Blagoveshtchensky, 1948) (N)
Menacanthus curuccae (Schränk, 1776) (N, S, Sa)
Menacanthus eury sternum (Burmeister, 1838) (S)
Menacanthus gonophaeus (Burmeister, 1838) (S)
Menacanthus inaequalis (Piaget, 1880) (N)
Menacanthus minutus (Giebel, 1874) (N)
Menacanthus pici (Denny, 1842) (N, S)
Menacanthus pius Eichler & Zlotorzyska, 1963 (N)
Menacanthus pusillus (Nitzsch, 1866) (N)

Menacanthus stramineus (Nitzsch, 1818) (S)

Menopon Nitzsch, 1818

Menopon gallinae (Linnaeus, 1758) (N, S)

Menopon pallens Clay, 1949 (N, S, Sa)

Meromenopon Clay & Meinertzhagen, 1941

Meromenopon meropis Clay & Meinertzhagen, 1941 (N, S, Sa)

Myrsidea Waterston, 1915

Myrsidea anathorax (Nitzsch, 1866) (N)

Myrsidea cornicis (De Geer, 1778) (N, S, Sa)

Myrsidea cucullaris (Nitzsch, 1818) (N, S)

Myrsidea franciscoloi Conci, 1942 (N)

Myrsidea isostoma (Nitzsch, 1866) (S)

Myrsidea picae (Linnaeus, 1758) (N)

Myrsidea quadrifasciata (Piaget, 1880) (S)

Myrsidea rustica (Giebel, 1874) (N)

Myrsidea thoracica (Giebel, 1874) (N)

Myrsidea troglodyti (Denny, 1842) (N)

Neocolpocephalum Ewing, 1933

Neocolpocephalum gypsi Eichler & Zlotorzyska, 1971 (Sa)

Nosopon Hopkins, 1949

Nosopon lucidum (Rudow, 1869) (N, S)

Piagetiella Neumann, 1906

Piagetiella titan (Piaget, 1880) (N)

Pseudomenopon Mjöberg, 1910

Pseudomenopon concretum (Piaget, 1880) (Sa)

Pseudomenopon pilosum (Scopoli, 1763) (N, S)

Pseudomenopon scopulacorne (Denny, 1842) (Sa)

Trinoton Nitzsch, 1818

Trinoton cygni Eichler, 1943 (Sa)

Trinoton luridum Burmeister, 1838 (N, Sa)

Trinoton querquedulae (Linnaeus, 1758) (N, S)

Laemobothriidae

Laemobothrion Nitzsch, 1818

Laemobothrion atrum (Nitzsch, 1818) (Sa)

Laemobothrion maximum (Scopoli, 1763) (N, Sa)

Laemobothrion tinnunculi (Linnaeus, 1758) (S, Sa)

Ricinidae

Ricinus De Geer, 1778

Ricinus elongatus (Olfers, 1816) (S, Sa)

Gyropidae

Gliricola Mjöberg, 1910

Gliricola porcelli (Schrank, 1781) (N)

Gyropus Nitzsch, 1818

Gyropus ovalis Burmeister, 1838 (N)

Trichodectidae

Damalinia Mjöberg, 1910

Damalinia bovis (Linnaeus, 1758) (N, S)

Damalinia caprae (Gurlt, 1843) (N)

Damalinia ovis (Schrank, 1781) (N)

Lutridia Kéler, 1938

Lutridia exilis (Nitzsch, 1861) (N)

Trichodectes Nitzsch, 1818

Trichodectes canis (De Geer, 1778) (N)

Trichodectes melis (J.C. Fabricius, 1805) (N, S)

Trichodectes mustelae (Schrank, 1803) (N, S)

Trichodectes retusus Burmeister, 1838 (N, S)

Philopteridae

Aeypoecus Clay & Meinertzhagen, 1939

Aeypoecus brevicollis (Burmeister, 1838) (N)

Alcedoffula Clay & Meinertzhagen, 1939

Alcedoffula alcedinis (Denny, 1842) (N)

Anaticola Clay, 1936

Anaticola anatis (J.C. Fabricius, 1794) (N)

Anaticola anseris (Linnaeus, 1758) (N)

Anaticola crassicornis (Scopoli, 1763) (N, S)

Anaticola tadornae (Denny, 1842) (N)

Anatoecus Cummings, 1916

Anatoecus dentatus (Scopoli, 1763) (N, S)

Anatoecus keleri Clay, 1962 (S)

Ardeicola Clay, 1936

Ardeicola maculatus (Nitzsch, 1866) (N)

Ardeicola raphidius (Nitzsch, 1866) (N)

Ardeicola signatus (Piaget, 1880) (N)

Ardeicola stellaris (Denny, 1842) (N)

Bruelia Kéler, 1936

Bruelia amsel (Eichler, 1951) (S)

Bruelia apiastri (Denny, 1842) (N, S, Sa)

Bruelia argula (Burmeister, 1838) (Sa)

Bruelia cyclothorax (Burmeister, 1838) (N)

Bruelia delicata (Nitzsch, 1866) (N)

Bruelia exigua (Nitzsch, 1866) (Sa)

Bruelia glandarii (Denny, 1842) (N)

Bruelia gracilis (Burmeister, 1838) (N, S, Sa)

Bruelia iliaci (Denny, 1842) (N)

Bruelia intermedia (Nitzsch, 1866) (N)

Bruelia lais (Giebel, 1874) (N)

Bruelia merulensis (Denny, 1842) (S)

Bruelia munda (Nitzsch, 1866) (S)

Bruelia nebulosa (Burmeister, 1838) (N)

Bruelia obligata Eichler, 1954 (Sa)

Bruelia subtilis (Nitzsch, 1874) (S)
Bruelia tenuis (Burmeister, 1838) (N)
Bruelia turdinulae Ansari, 1956 (S)
Bruelia uncinosa (Burmeister, 1838) (N, S)

Campanulotes Kéler, 1939

Campanulotes bidentatus (Scopoli, 1763) (N, S, Sa)

Capraiella Conci, 1941

Capraiella subcuspidata (Burmeister, 1838) (N)

Carduiceps Clay & Meinertzhagen, 1939

Carduiceps cingulatus (Denny, 1842) (N)

Chelopistes Kéler, 1939

Chelopistes meleagridis (Linnaeus, 1758) (N)

Coloceras Taschenberg, 1882

Coloceras damicornis (Nitzsch, 1866) (N)

Columbicola Ewing, 1929

Columbicola claviformis (Denny, 1842) (N)
Columbicola columbae (Linnaeus, 1758) (N, S, Sa)

Craspedonirmus Thompson, 1940

Craspedonirmus colymbinus (Denny, 1842) (N)

Craspedorrhynchus Kéler, 1938

Craspedorrhynchus aquilinus (Denny, 1842) (N)
Craspedorrhynchus asturinus (Mjöberg, 1910) (N)
Craspedorrhynchus haematopus (Scopoli, 1763) (N, S, Sa)
Craspedorrhynchus intermedius (Piaget, 1880) (N)
Craspedorrhynchus macrocephalus (Nitzsch, 1874) (N)
Craspedorrhynchus naevius (Giebel, 1861) (N)
Craspedorrhynchus nisi (Denny, 1842) (N, Sa)
Craspedorrhynchus platystomus (Burmeister, 1838) (N, S, Sa)
Craspedorrhynchus spathulatus (Giebel, 1874) (S)

Cuclotogaster Carriker, 1936

Cuclotogaster barbara Clay, 1938 (Sa)
Cuclotogaster cinereus (Nitzsch, 1866) (N)
Cuclotogaster heterogrammicus (Nitzsch, 1866) (S)
Cuclotogaster heterographus (Nitzsch, 1866) (N)
Cuclotogaster obscurior Hopkins, 1950 (S)

Cuculicola Clay & Meinertzhagen, 1939

Cuculicola latirostris (Burmeister, 1838) (N, S)

Cuculoecus Ewing, 1926

Cuculoecus latifrons (Denny, 1842) (N)

Cummingsiella Ewing, 1930

Cummingsiella aurea Hopkins, 1949 (N, S)

Degeeriella Neumann, 1906

Degeeriella discocephalus (Burmeister, 1838) (N)
Degeeriella fulva (Giebel, 1874) (S, Sa)
Degeeriella fusca (Denny, 1842) (N, S)
Degeeriella leucopleura (Nitzsch, 1874) (N)
Degeeriella nisus (Giebel, 1866)
Degeeriella nisus vagans (Giebel, 1874) (Sa)
Degeeriella regalis (Giebel, 1874) (S, Sa)
Degeeriella rufa (Burmeister, 1838) (N, S, Sa)

Docophorolus Eichler, 1944

Docophorolus modularis (Denny, 1842) (S)
Docophorolus turdi (Denny, 1842) (N, Sa)

Falcolipeurus Bedford, 1931

Falcolipeurus perspicillatus (Nitzsch, 1861) (Sa)
Falcolipeurus quadripustulatus (Burmeister, 1838) (N)

Fulicoffula Clay & Meinertzhagen, 1938

Fulicoffula lurida (Nitzsch, 1818) (Sa)

Goniocotes Burmeister, 1838

Goniocotes chrysocephalus Giebel, 1874 (N)
Goniocotes maculatus Taschenberg, 1882 (S)
Goniocotes microthorax (Stephens, 1829) (S)

Goniodes Nitzsch, 1818

Goniodes astrocephalus (Burmeister, 1838) (S)
Goniodes chelicornis Denny, 1842 (N)
Goniodes colchici Denny, 1842 (N, S)
Goniodes dispar Burmeister, 1838 (N, S)
Goniodes gigas (Taschenberg, 1879) (N)
Goniodes heterocerus Nitzsch, 1867 (N)
Goniodes lagopi (Linnaeus, 1758) (N)
Goniodes pavonis (Linnaeus, 1758) (N)
Goniodes securiger Nitzsch, 1866 (Sa)
Goniodes tetraonis (Linnaeus, 1761) (N)

Halipeurus Thompson, 1936

Halipeurus abnormis (Piaget, 1885) (Sa)
Halipeurus angusticeps (Piaget, 1880) (N)

Ibidoecus Cummings, 1916

Ibidoecus plataleae (Denny, 1842) (N, S)

Incidifrons Ewing, 1929

Incidifrons fulicae (Linnaeus, 1758) (S, Sa)

Koeniginirmus Eichler, 1940

Koeniginirmus punctatus (Burmeister, 1838) (Sa)

Lagopoecus Waterston, 1922

Lagopoecus lyrurus Clay, 1938 (N)
Lagopoecus quadrulatus (Nitzsch, 1866) (N)

Lipeurus Nitzsch, 1818

Lipeurus caponis (Linnaeus, 1758) (N)
Lipeurus maculosus Clay, 1938 (S)

Lunaceps Clay & Meinertzhagen, 1939

Lunaceps bicolor (Piaget, 1880) (N)
Lunaceps holophaeus (Burmeister, 1838) (N)
Lunaceps inaequalis (Piaget, 1880) (N)
Lunaceps phaeopi (Denny, 1842) (N)

Meropoecus Eichler, 1940

Meropoecus meropis (Denny, 1842) (N, S, Sa)

Neophiloaterus Cummings, 1916

Neophiloaterus incompletus (Denny, 1842) (N)

Neophiloaterus tricolor (Burmeister, 1838) (N)

Oedicnemiceps Eichler, 1943

Oedicnemiceps annulatus (Denny, 1842) (Sa)

Oxylipeurus Mjöberg, 1910

Oxylipeurus polytrapezius (Burmeister, 1838) (N)

Oxylipeurus tetraonis (Grube, 1851) (N)

Paragoniocotes Cummings, 1916

Paragoniocotes fulvofasciatus (Picaglia, 1885) (N)

Pectinopygus Mjöberg, 1910

Pectinopygus bassani (O. Fabricius, 1780) (Sa)

Pectinopygus bifasciatus (Piaget, 1880) (N)

Pectinopygus gyricornis (Denny, 1842) (Sa)

Pectinopygus setosus (Piaget, 1880) (N)

Penenirmus Clay & Meinertzhagen, 1938

Penenirmus auritus (Scopoli, 1763) (N)

Penenirmus gulosus (Nitzsch, 1866) (N)

Penenirmus pari (Denny, 1842) (S)

Penenirmus serrilimbus (Burmeister, 1838) (N)

Philoaterus Nitzsch, 1818

Philoaterus atratus Nitzsch, 1818 (N, S)

Philoaterus corvi (Linnaeus, 1763) (N, S, Sa)

Philoaterus crassipes (Burmeister, 1838) (N, S)

Philoaterus excisus Nitzsch, 1818 (N)

Philoaterus fulvus (Burmeister, 1838) (N)

Philoaterus fuscicollis (Burmeister, 1838) (N)

Philoaterus garruli Boisduval, 1835 (S)

Philoaterus guttatus (Denny, 1842) (N)

Philoaterus laticeps (Giebel, 1874) (N)

Philoaterus merulae (Denny, 1842) (S)

Philopterus ocellatus (Scopoli, 1763) (N, S)
Philopterus picae (Denny, 1842) (N)

Picicola Clay & Meinertzhagen, 1938

Picicola candidus (Nitzsch, 1866) (N, S)

Quadriceps Clay & Meinertzhagen, 1939

Quadriceps bicuspis (Nitzsch, 1874) (N)
Quadriceps furvus (Burmeister, 1838) (N)
Quadriceps hemichrous (Nitzsch, 1866) (N)
Quadriceps junceus (Scopoli, 1763) (N, S)
Quadriceps lineolatus (Nitzsch, 1866) (N)
Quadriceps lotus (Nitzsch, 1866) (N)
Quadriceps normifer (Grube, 1851) (N)
Quadriceps ochropygos (Nitzsch, 1866) (N)
Quadriceps ornatus (Grube, 1851) (N)
Quadriceps phaenotus (Nitzsch, 1866) (N)
Quadriceps sellatus (Burmeister, 1838) (N)
Quadriceps seminfissus (Nitzsch, 1866) (N)
Quadriceps signatus (Piaget, 1880) (N)
Quadriceps subcingulatus (Nitzsch, 1866) (N)
Quadriceps testudinarius (Children, 1836) (N, S)

Rallicola Johnston & Harrison, 1911

Rallicola cuspidatus (Scopoli, 1763) (N, S, Sa)
Rallicola fulicae (Denny, 1842) (Sa)
Rallicola minutus (Nitzsch, 1866) (S)

Rhynonirmus Thompson, 1935

Rhynonirmus helvolus (Burmeister, 1838) (S)
Rhynonirmus scolopacis (Denny, 1842) (S)

Saemundssonina Timmermann, 1935

Saemundssonina aurata (Piaget, 1880) (N)
Saemundssonina cephalus (Denny, 1842) (N)
Saemundssonina celidoxa (Burmeister, 1838) (N, S)
Saemundssonina conica (Denny, 1842) (N)
Saemundssonina cordiceps (Giebel, 1874) (N, S)
Saemundssonina gonothorax (Giebel, 1874) (N)
Saemundssonina humeralis (Denny, 1842) (N)
Saemundssonina lari (O. Fabricius, 1780) (N, S, Sa)
Saemundssonina laricola (Nitzsch, 1874) (N)
Saemundssonina limosae (Denny, 1842) (N)

Saemundssonina melanocephalus (Burmeister, 1838) (N)
Saemundssonina peusi (Eichler, 1949) (Sa)
Saemundssonina pustulosa (Nitzsch, 1866) (N)
Saemundssonina semivittata (Giebel, 1874) (N)
Saemundssonina temporalis (Giebel, 1874) (N)

Strigiphilus Mjöberg, 1910

Strigiphilus ceblebrachys (Denny, 1842) (N)
Strigiphilus cursitans (Nitzsch, 1861) (N)
Strigiphilus cursor (Burmeister, 1838) (N)

Sturnidoecus Eichler, 1944

Sturnidoecus ostralegi (Denny, 1842) (N)
Sturnidoecus ruficeps (Nitzsch, 1866) (S)
Sturnidoecus sturni (Schränk, 1776) (N, S)

Tytoniella Eichler, 1949

Tytoniella rostrata Eichler, 1949 (N, S, Sa)

Anoplura

Pediculidae

Pediculus Linnaeus, 1758

Pediculus humanus Linnaeus, 1758
Pediculus humanus humanus Linnaeus, 1758 (N, S, Sa)
Pediculus humanus corporis Linnaeus, 1758 (N, S)

Phthirus (Linnaeus, 1758)

Phthirus pubis (Linnaeus, 1758) (N, S, Sa)

Haematopinidae

Enderleinellus Fahrenholz, 1912

Enderleinellus nitzschi Fahrenholz, 1915 (N)

Haematopinus Enderlein, 1904

Haematopinus aperis Ferris, 1933 (N)

Haematopinus asini (Linnaeus, 1758) (N, S)
Haematopinus eurytarnus Denny, 1804 (N)
Haematopinus suis (Linnaeus, 1758) (N, S)

Haemodispus Enderlein, 1904

Haemodispus lyriocephalus (Burmeister, 1839) (N)
Haemodispus ventricosus (Denny, 1842) (N)

Hoplopleura Enderlein, 1904

Hoplopleura acanthopus (Burmeister, 1838) (N, S)
Hoplopleura affinis (Burmeister, 1838) (N)
Hoplopleura edentula Fahrenholz, 1916 (N)

Linognathus Enderlein, 1904

Linognathus forficulus (Rudow, 1869) (N)
Linognathus setosus (Olfers, 1816) (N)
Linognathus stenopsis (Burmeister, 1838) (N)

Neohaematopinus Mjöberg, 1910

Neohaematopinus sciuri Jancke, 1931 (N, S)

Polyplax Enderlein, 1904

Polyplax gracilis Fahrenholz, 1910 (N)
Polyplax reclinata (Nitzsch, 1864) (N)
Polyplax serrata (Burmeister, 1838) (N, S)
Polyplax spinigera (Burmeister, 1838) (N)

Schizophthirus Ferris, 1922

Schizophthirus pleurophaeus (Burmeister, 1838) (N)

Solenopotes Enderlein, 1904

Solenopotes burmeisteri (Fahrenholz, 1919) (N, S)
Solenopotes capillatus Enderlein, 1904 (N)
Solenopotes capreoli Freund, 1935 (N)

Thysanoptera

Aeolothripidae

Aeolothrips Haliday, 1836

Aeolothrips albicinctus Haliday, 1836 (N, S)
Aeolothrips collaris Priesner, 1919 (N, S, Si, Sa)
Aeolothrips cursor Priesner, 1939 (Si, Sa)
Aeolothrips ericae Bagnall, 1920 (N, S, Si, Sa)
Aeolothrips fasciatus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
Aeolothrips gloriosus Bagnall, 1914 (S, Sa)
Aeolothrips intermedius Bagnall, 1934 (N, S)
Aeolothrips melaleucus Haliday, 1852 (N, S)
Aeolothrips melisi Priesner, 1936 (S, Si, Sa)
Aeolothrips propinquus Bagnall, 1924 (S, Si)
Aeolothrips tenuicornis Bagnall, 1926 (N, S, Si)
Aeolothrips versicolor Uzel, 1895 (N, S, Si)

Melanthrips Haliday, 1836

Melanthrips ficalbii Buffa, 1907 (S)
Melanthrips fuscus (Sulzer, 1776) (N, S, Si, Sa)
Melanthrips libycus Priesner, 1936 (Si)
Melanthrips nigricornis Bagnall, 1913 (Si)
Melanthrips pallidior Priesner, 1919 (N, Si)
Melanthrips rivnayi Priesner, 1936 (S, Si)

Orothrips Moulton, 1907

Orothrips priesneri (Titschack, 1958) (S, Si)

Rhipidothrips Uzel, 1895

Rhipidothrips brunneus Williams, 1913 (S, Si)
Rhipidothrips gratiosus Uzel, 1895 (N, S, Si)
Rhipidothrips unicolor zur Strassen, 1965 (Si)

Adiheterothripidae

Holarthrothrips Bagnall, 1927

Holarthrothrips tenuicornis Bagnall, 1927 (Si)

Thripidae

Agrostothrips Hood, 1954

Agrostothrips meridionalis (Bagnall, 1927) (Si)

Anaphothrips Uzel, 1895

Anaphothrips gracillimus Priesner, 1923 (N)
Anaphothrips obscurus (Müller, 1776) (N, S, Si, Sa)

Apterothrips Bagnall, 1908

Apterothrips secticornis (Trybom, 1896) (N)

Aptinothrips Haliday, 1836

Aptinothrips elegans Priesner, 1924 (S)
Aptinothrips karnyi (John, 1927) (S)
Aptinothrips mediterraneus Priesner, 1926 (S, Si)
Aptinothrips rufus Haliday, 1836 (N, S, Si, Sa)
Aptinothrips stylifer Trybom, 1894 (N, S)

Bregmatothrips Hood, 1912

Bregmatothrips dimorphus (Priesner, 1919) (S, Si)

Ceratothripoides Bagnall, 1918

Ceratothripoides dianthi (Priesner, 1921) (S)

Ceratothrips O.M. Reuter, 1899

Ceratothrips croceicollis (Karny, 1914) (S, Si, Sa)
Ceratothrips ericae (Haliday, 1836) (N, S)

Cestrothrips Priesner, 1964

Cestrothrips karnyi (Bagnall, 1927) (S)

Chirothrips Haliday, 1836

Chirothrips aculeatus Bagnall, 1927 (N, S, Si)
Chirothrips manicatus Haliday, 1836 (N, S, Si)
Chirothrips pallidicornis Priesner, 1938 (S, Si)
Chirothrips ruptipennis Priesner, 1938 (Si)

Dendrothrips Uzel, 1895

Dendrothrips degeeri Uzel, 1895 (N, S, Si)
Dendrothrips ornatus (Jablonowski, 1894) (N)
Dendrothrips saltator Uzel, 1895 (N, S, Si)

Dictyothrips Uzel, 1895

Dictyothrips betae Uzel, 1895 (N)

Drepanothrips Uzel, 1895

Drepanothrips reuteri Uzel, 1895 (N, S, Si)

Eryngyothrips Bhatti, 1979

Eryngyothrips ferulae (Priesner, 1933) (Si)

Frankliniella Karny, 1910

Frankliniella intonsa (Trybom, 1895) (N, S, Si, Sa)

Frankliniella occidentalis (Pergande, 1895) (N, S, Si)

Frankliniella pallida (Uzel, 1895) (N, S)

Frankliniella tenuicornis (Uzel, 1895) (N, S)

Heliothrips Haliday, 1836

Heliothrips haemorrhoidalis (Bouché, 1833) (N, S, Si, Sa)

Hercinothrips Bagnall, 1932

Hercinothrips femoralis (O.M. Reuter, 1891) (S)

Isoneurothrips Bagnall, 1915

Isoneurothrips australis Bagnall, 1915 (S, Si)

Kakothrips Williams, 1914

Kakothrips acanthus Berzosa, 1914 (Si)

Kakothrips firmoides Priesner, 1932 (Sa)

Kakothrips robustus (Uzel, 1895) (N, S, Si)

Limothrips Haliday, 1836

Limothrips angulicornis Jablonowski, 1894 (S, Si)

Limothrips cerealium Haliday, 1836 (N, S, Si, Sa)

Limothrips consimilis Priesner, 1926 (N, S, Si)

Limothrips denticornis Haliday, 1836 (N, S, Si)

Limothrips schmutzi Priesner, 1919 (N)

Mycterothrips Trybom, 1910

Mycterothrips albidicornis (Knechtel, 1923) (N, S, Si)

Mycterothrips annulicornis (Uzel, 1895) (N)

Mycterothrips consociatus (Targioni-Tozzetti, 1886) (N, Si)

Neohydatothrips John, 1929

Neohydatothrips abnormis (Karny, 1910) (N)

Neohydatothrips gracilicornis (Williams, 1916) (N, S, Sa)

Odontothrips Amyot & Serville, 1843

Odontothrips aemulans Priesner, 1924 (S)

Odontothrips confusus Priesner, 1926 (S)

Odontothrips cytisi Morison, 1928 (S)

Odontothrips ignobilis Bagnall, 1919 (S)

Odontothrips karnyi Priesner, 1924 (S, Si)

Odontothrips loti (Haliday, 1852) (N, S)

Odontothrips meliloti Priesner, 1951 (S)

Odontothrips meridionalis Priesner, 1919 (N, S)

Odontothrips phaleratus (Haliday, 1836) (N, S)

Oxythrips Uzel, 1895

Oxythrips ajugae Uzel, 1895 (N, S, Si)

Oxythrips bicolor (O.M. Reuter, 1879) (N)

Oxythrips nobilis Bagnall, 1927 (N, S)

Oxythrips quercicola Bagnall, 1926 (Si)

Oxythrips tristis Bagnall, 1927 (S)

Oxythrips ulmifoliorum (Haliday, 1836) (N, Si)

Parafrankliniella Priesner, 1920

Parafrankliniella verbasci Priesner, 1920 (S)

Parthenothrips Uzel, 1895

Parthenothrips dracaenae (Heeger, 1854) (N)

Pezothrips Karny, 1907

Pezothrips pilosus (Uzel, 1895) (N)

Phibalothrips Hood, 1918

Phibalothrips peringueyi (Faure, 1925) (N, Si)

Physothrips Karny, 1912

Physothrips salicis (O.M. Reuter, 1879) (S, Si)

Physothrips ulmifoliorum (Uzel, 1895) (S)

Platythrips Uzel, 1895

Platythrips tunicatus (Haliday, 1852) (N)

Prosopothrips Uzel, 1895

Prosopothrips nigriceps Bagnall, 1927 (Si)

Prosopothrips vej dovskyi Uzel, 1895 (N)

Pseudodendrothrips Schmutz, 1913

Pseudodendrothrips mori (Niwa, 1908) (N)

Rubiothrips Schliephake, 1975

Rubiothrips silvarum (Priesner, 1920) (N)

Rubiothrips sordidus (Uzel, 1895) (N)

Rubiothrips vitalbae (Bagnall, 1926) (N, S, Si)

Scirtothrips Shull, 1909

Scirtothrips inermis Priesner, 1933 (Si)

Scirtothrips longipennis (Bagnall, 1902) (S)

Scolothrips Hinds, 1902

Scolothrips longicornis Priesner, 1926 (S)

Sericothrips Haliday, 1836

Sericothrips bicornis (Karny, 1910) (N, S)

Sitothrips Priesner, 1931

Sitothrips arabicus Priesner, 1931 (Si)

Stenchaetothrips Bagnall, 1926

Stenchaetothrips biformis (Bagnall, 1913) (N)

Stenothrips Uzel, 1895

Stenothrips graminum Uzel, 1895 (N, S, Si)

Taeniothrips Amyot & Serville, 1843

Taeniothrips inconsequens (Uzel, 1895) (N, S, Si, Sa)

Taeniothrips picipes (Zetterstedt, 1828) (N, S)

Tenothrips Bhatti, 1990

Tenothrips discolor (Karny, 1907) (N, S, Si)

Tenothrips frici (Uzel, 1895) (N, S, Si)

Tenothrips hilarus (zur Strassen, 1977) (S)

Tenothrips hispanicus (Bagnall, 1921) (N, S)

Tenothrips pallidivestis (Priesner, 1926) (N, S, Si, Sa)

Thrips Linnaetls, 1758

Thrips alni Uzel, 1895 (N)

Thrips angusticeps Uzel, 1895 (N, S, Si, Sa)

Thrips annulatus (Karny, 1908) (N, S, Si)

Thrips atratus Haliday, 1836 (N, S, Si)

Thrips brevicornis Priesner, 1920 (N, S)

Thrips calcaratus Uzel, 1895 (S)

Thrips conferticornis Priesner, 1922 (N)

Thrips difficilis Priesner, 1920 (S)

Thrips dilatatus Uzel, 1895 (N)

Thrips ebneri Karny, 1914 (Si)

Thrips euphorbiicola Bagnall, 1924 (Si)

Thrips flavus Schrank, 1776 (N, S, Si, Sa)

Thrips fuscipennis Haliday, 1836 (N, S, Si, Sa)

Thrips klapaleki Uzel, 1895 (N, S)

Thrips linarius Uzel, 1895 (N)

Thrips major Uzel, 1895 (N, S, Si, Sa)

Thrips mancosetosus Priesner, 1964 (N)

Thrips mareoticus (Priesner, 1932) (Si)

Thrips mediterraneus Priesner, 1934 (Si)

Thrips meridionalis (Priesner, 1926) (N, S, Sa)

Thrips minutissimus Linnaeus, 1758 (N, S, Si)

Thrips nigropilosus Uzel, 1895 (N, S)

Thrips physapus Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)

Thrips pini (Uzel, 1895) (N, S)

Thrips robustus Priesner, 1920 (N)

Thrips sambuci Heeger, 1854 (N, S, Sa)

Thrips simplex (Morison, 1930) (S)

Thrips tabaci Lindeman, 1888 (N, S, Si, Sa)

Thrips trehernei Priesner, 1927 (N, S, Si)

Thrips trybomi (Karny, 1908) (N)

Thrips urticae Fabricius, 1781 (N)

Thrips validus Uzel, 1895 (N)

Thrips viminalis Uzel, 1895 (N)

Thrips vUILleti (Bagnall, 1933) (S)

Thrips vulgatissimus Haliday, 1836 (N, S)

Phlaeothripidae

Acanthothrips Uzel, 1895

Acanthothrips nodicornis (O.M. Reuter, 1880) (N, S)

Allothrips Hood, 1908

Allothrips pillichellus (Priesner, 1925) (S)

Apterygothrips Priesner, 1933

Apterygothrips priesneri zur Strassen, 1966 (S, Si)

Bacillothrips Buffa, 1908

Bacillothrips longiceps (O.M. Reuter, 1901) (S, Si, Sa)

Bactothrips Karny, 1912

Bactothrips buffai (Karny, 1921) (S)

Bagnalliella Karny, 1920

Bagnalliella yuccae (Hinds, 1902) (N)

Bolothrips Priesner, 1926

Bolothrips bicolor (Heeger, 1852) (N)

Bolothrips dentipes (O.M. Reuter, 1880) (N, S, Sa)

Bolothrips icarus (Uzel, 1895) (N, S)

Bolothrips insularis (Bagnall, 1914) (S, Si)

Bolothrips italicus Mound, 1974 (S, Si) (E)

Cephalothrips Uzel, 1895

Cephalothrips coxalis Bagnall, 1926 (S, Si)

Cephalothrips monilicornis (O.M. Reuter, 1880) (S, Si)

Chiraplothrips Priesner, 1931

Chiraplothrips graminellus Priesner, 1939 (Si)

Compsothrips O.M. Reuter, 1901

Compsothrips albosignatus (O.M. Reuter, 1884) (Sa)

Compsothrips maroccanus Priesner, 1964 (Si)
Compsothrips uzeli (Hood, 1952) (N)

Cryptothrips Uzel, 1895

Cryptothrips nigripes (O.M. Reuter, 1880) (N, S, Si)

Gynaikothrips Zimmermann, 1900

Gynaikothrips ficorum (Marchal, 1908) (S, Si)

Haplothrips Amyot & Serville, 1843

Haplothrips acanthoscelis (Karny, 1910) (N, S)
Haplothrips aculeatus (Fabricius, 1803) (N, S, Si, Sa)
Haplothrips alpester Priesner, 1914 (N)
Haplothrips andresi Priesner, 1931 (S, Si, Sa)
Haplothrips cerealis Priesner, 1939 (Si)
Haplothrips cottei (Vuillet, 1913) (N)
Haplothrips dianthinus Priesner, 1924 (S)
Haplothrips distinguendus (Uzel, 1895) (N, S, Si)
Haplothrips eryngii Bagnall, 1934 (S)
Haplothrips flavicinctus (Karny, 1910) (N)
Haplothrips hispanicus Priesner, 1924 (N, S)
Haplothrips juncorum Bagnall, 1913 (S, Si)
Haplothrips knechteli Priesner, 1923 (S)
Haplothrips kurdjumovi Karny, 1913 (N, Sa)
Haplothrips leucanthemi (Schrank, 1781) (N)
Haplothrips limoniastris Priesner, 1931 (N)
Haplothrips niger (Osborn, 1883) (N, S)
Haplothrips setiger Priesner, 1921 (N, S, Si, Sa)
Haplothrips simplex (Buffa, 1909) (Si)
Haplothrips subtilissimus (Haliday, 1852) (N, S)
Haplothrips tritici (Kurdjumov, 1912) (N, S, Si)
Haplothrips vuilleti Priesner, 1920 (N, S, Si)

Hindsiothrips Stannard, 1958

Hindsiothrips bonessi (Titschack, 1955) (N)

Hoplandrothrips Hood, 1912

Hoplandrothrips ellisi Bagnall, 1914 (S)

Hoplothrips Amyot & Serville, 1843

Hoplothrips caespitis (Uzel, 1895) (N)
Hoplothrips corticis (de Geer, 1773) (N, S)

Hoplothrips fungi (Zetterstedt, 1828) (S)
Hoplothrips germanae Bournier, 1961 (S)
Hoplothrips pedicularius (Haliday, 1836) (S)

Karnyothrips Watson, 1923

Karnyothrips flavipes (Jones, 1912) (Sa)

Liothrips Uzel, 1895

Liothrips austriacus (Karny, 1910) (Si)
Liothrips oleae (Costa, 1857) (N, S)
Liothrips pragensis Uzel, 1895 (N, S)
Liothrips vaneeckeii Priesner, 1920 (S)

Lispthrips O.M. Reuter, 1899

Lispthrips crassipes (Jablonowski, 1894) (N)

Megalothrips Uzel, 1895

Megalothrips bonannii Uzel, 1895 (N, S)
Megalothrips delmasi Bournier, 1956 (S)

Megathrips Targioni-Tozzetti, 1881

Megathrips inermis Priesner, 1937 (Sa)
Megathrips lativentris (Heeger, 1852) (N, S, Si)

Neoheegeria Schmutz, 1909

Neoheegeria biroii Priesner, 1928 (S)
Neoheegeria dalmatica Schmutz, 1909 (S, Si)
Neoheegeria verbasci (Osborn, 1896) (Si)

Plaeothrips Haliday, 1836

Plaeothrips coriaceus Haliday, 1836 (N, S)
Plaeothrips pillichianus Priesner, 1924 (S)

Poecillothrips Uzel, 1895

Poecillothrips albopictus Uzel, 1895 (S)

Pseudocryptothrips Priesner, 1919

Pseudocryptothrips meridionalis Priesner, 1919 (N, S)

Siphonothrips Buffa, 1908

Siphonothrips elegans Buffa, 1908 (S, Sa) (E)

Sophiothrips Hood, 1933

Sophiothrips terminalis (Bagnall, 1927) (S)

Treherniella Watson, 1923

Treherniella inferna (Priesner, 1922) (S)

Urothripidae

Amphibolothrips Buffa, 1909

Amphibolothrips grassii Buffa, 1909 (S, Si)

Bebelothrips Buffa, 1909

Bebelothrips latus Buffa, 1909 (Si)

Heteroptera

Ceratocombidae

***Ceratocombus* (*Ceratocombus*)** Signoret, 1852

Ceratocombus (*Ceratocombus*) *coleopratus* (Zetterstedt, 1819) (N, S, Si)

Dipsocoridae

***Cryptostemma* (*Cryptostemma*)** Herrich-Schäffer, 1835

Cryptostemma (*Cryptostemma*) *alienum* Herrich-Schäffer, 1835 (N, S)

Cryptostemma (*Cryptostemma*) *remanei* Josifov, 1964 (N)

***Cryptostemma* (*Pachycoleus*)** Fieber, 1860

Cryptostemma (*Pachycoleus*) *pusillimum* (J. Sahlberg, 1870) (N)

Cryptostemma (*Pachycoleus*) *waltli* (Fieber, 1860) (N)

Corixidae

Arctocorisa Wallengren, 1894

Arctocorisa carinata (C. Sahlberg, 1819)

Arctocorisa carinata carinata (C. Sahlberg, 1819) (N)

Arctocorisa germari (Fieber, 1848) (N?)

Callicorixa Buchanan White, 1873

Callicorixa praeusta (Fieber, 1848)

Callicorixa praeusta praeusta (Fieber, 1848) (N?)

Corixa Geoffroy, 1762

Corixa affinis Leach, 1817 (N, S, Si, Sa)

Corixa dentipes (Thomson, 1869) (N)

Corixa panzeri (Fieber, 1848) (N, S, Si, Sa)

Corixa punctata (Illiger, 1807) (N, S, Si, Sa)

Heliocorisa Lundblad, 1928

Heliocorisa vermiculata (Puton, 1874) (Si)

Hesperocorixa Kirkaldy, 1908

Hesperocorixa linnaei (Fieber, 1848) (N, S, Si, Sa)

Hesperocorixa moesta (Fieber, 1848) (N, S, Si, Sa)

Hesperocorixa parallela (Fieber, 1860) (N)

Hesperocorixa sahlbergi (Fieber, 1848) (N, S)

Paracorixa Poisson, 1957

Paracorixa concinna (Fieber, 1848)

Paracorixa concinna concinna (Fieber, 1848) (N?)

Parasigara Poisson, 1957

Parasigara favieri (Poisson, 1939) (Si)

Parasigara perdubia (Rey, 1894) (N, S, Sa)

Parasigara transversa (Fieber, 1848) (Sa?)

Sigara (Halicorixa) Walton in Hutchinson, 1940

Sigara (Halicorixa) mayri (Fieber, 1860) (N, S)

Sigara (Halicorixa) selecta (Fieber, 1848) (Si, Sa)

Sigara (Halicorixa) stagnalis (Leach, 1817)

Sigara (Halicorixa) stagnalis stagnalis (Leach, 1817) (N, Si, Sa)

***Sigara (Microsigara)* Poisson, 1957**

Sigara (Microsigara) hellensii (C. Sahlberg, 1819) (N)

***Sigara (Pseudovermicorixa)* Jaczewski, 1962**

Sigara (Pseudovermicorixa) nigrolineata (Fieber, 1848)

Sigara (Pseudovermicorixa) nigrolineata nigrolineata (Fieber, 1848) (N, S, Si, Sa)

***Sigara (Retrocorixa)* Walton in Hutchinson, 1940**

Sigara (Retrocorixa) limitata (Fieber, 1848) (*)

Sigara (Retrocorixa) limitata limitata (Fieber, 1848) (N)

Sigara (Retrocorixa) limitata remyi Poisson, 1953 (Sa)

***Sigara (Sigara)* Fabricius, 1775**

Sigara (Sigara) dorsalis (Leach, 1817) (N, S)

Sigara (Sigara) servadeii Tamanini, 1965 (Sa) (*)

Sigara (Sigara) striata (Linnaeus, 1758) (N, S)

***Sigara (Subsigara)* Stichel, 1935**

Sigara (Subsigara) distincta (Fieber, 1848) (N?)

Sigara (Subsigara) falleni (Fieber, 1848) (N, Si?)

Sigara (Subsigara) fossarum (Leach, 1817) (N, S)

Sigara (Subsigara) italica Jaczewski, 1933 (N, S) (E)

***Sigara (Vermicorixa)* Walton in Hutchinson, 1940**

Sigara (Vermicorixa) lateralis (Leach, 1817) (N, S, Si, Sa)

Sigara (Vermicorixa) scripta (Rambur, 1840) (S, Si, Sa)

***Cymatia* Flor, 1860**

Cymatia bonzdorffii (C. Sahlberg, 1819) (N?)

Cymatia coleoptrata (Fabricius, 1777) (N)

Cymatia rogenhoferi (Fieber, 1864) (Si) (*)

***Micronecta (Dichaetonecta)* Hutchinson, 1940**

Micronecta (Dichaetonecta) scholtzi (Fieber, 1860) (N, S, Si, Sa)

***Micronecta (Micronecta)* Kirkaldy, 1897**

Micronecta (Micronecta) griseola Horváth, 1899 (N, S)

Micronecta (Micronecta) leucocephala (Spinola, 1837) (Sa)

Micronecta (Micronecta) minuscula Poisson, 1929 (S)
Micronecta (Micronecta) poweri (Douglas & Scott, 1869)
Micronecta (Micronecta) poweri poweri (Douglas & Scott, 1869) (N, S)

Note

Sigara (Retrocorixa) limitata: La sottospecie remyi è un endemita sardo-corso.
Sigara (Sigara) servadeii: Endemita sardo-corso.
Cymatia rogenhoferi: Presente in Si solo a Pantelleria.

Aphelocheiridae

Aphelocheirus (Aphelocheirus) Westwood, 1833

Aphelocheirus (Aphelocheirus) aestivalis (Fabricius, 1794) (N, S)

Naucoridae

Ilyocoris Stål, 1861

Ilyocoris cimicoides (Linnaeus, 1758)
Ilyocoris cimicoides cimicoides (Linnaeus, 1758) (N, S)

Naucoris Geoffroy, 1762

Naucoris maculatus Fabricius, 1798
Naucoris maculatus conspersus Stål, 1876 (S, Si, Sa)
Naucoris maculatus maculatus Fabricius, 1798 (N, S)

Nepidae

Nepa Linnaeus, 1758

Nepa cinerea Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)
Nepa sardiniensis Hungerford, 1928 (Sa) (*)

Ranatra (Ranatra) Fabricius, 1790

Ranatra (Ranatra) linearis (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Note

Nepa sardiniensis: Endemita sardo-corso.

Notonectidae

Anisops Spinola, 1837

Anisops debilis Gerstäcker, 1873

Anisops debilis perplexus Poisson, 1929 (Si)

Anisops sardeus Herrich-Schäffer, 1849

Anisops sardeus sardeus Herrich-Schäffer, 1849 (N, S, Si, Sa)

Notonecta (**Notonecta**) Linnaeus, 1758

Notonecta (*Notonecta*) *glauca* Linnaeus, 1758

Notonecta (*Notonecta*) *glauca glauca* Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)

Notonecta (*Notonecta*) *lutea* O.F. Müller, 1776 (N)

Notonecta (*Notonecta*) *maculata* Fabricius, 1794 (N, S, Si, Sa)

Notonecta (*Notonecta*) *meridionalis* Poisson, 1926 (N, S, Si, Sa)

Notonecta (*Notonecta*) *obliqua* Gallén in Thunberg, 1787 (S)

Notonecta (*Notonecta*) *pallidula* Poisson, 1926 (Sa)

Notonecta (*Notonecta*) *viridis* Delcourt, 1909 (N, S, Sa)

Ochteridae

Ochterus (**Ochterus**) Latreille, 1807

Ochterus (*Ochterus*) *marginatus* (Latreille, 1804)

Ochterus (*Ochterus*) *marginatus marginatus* (Latreille, 1804) (N, S, Si, Sa?)

Pleidae

Plea Leach, 1817

Plea minutissima Leach, 1817

Plea minutissima minutissima Leach, 1817 (N, S, Si, Sa)

Gerridae

Aquarius Schellenberg, 1800

Aquarius cinereus (Puton, 1869) (Si)

Aquarius najas (De Geer, 1773) (N, S, Si, Sa)

Aquarius paludum (Fabricius, 1794)

Aquarius paludum paludum (Fabricius, 1794) (N, S, Si, Sa)

Gerris (**Gerris**) Fabricius, 1794

Gerris (Gerris) argentatus Schummel, 1832 (N, S, Si, Sa)
Gerris (Gerris) costae (Herrich-Schäffer, 1850)
 Gerris (Gerris) costae costae (Herrich-Schäffer, 1850) (N, S, Sa)
 Gerris (Gerris) costae fieberi Stichel, 1938 (S, Si)
Gerris (Gerris) gibbifer Schummel, 1832 (N, S)
Gerris (Gerris) lacustris (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
Gerris (Gerris) maculatus Tamanini, 1946 (N, S, Si)
Gerris (Gerris) odontogaster (Zetterstedt, 1828) (N)
Gerris (Gerris) thoracicus Schummel, 1832 (N, S, Si, Sa)

***Gerris (Gerriselloides)* Hungerford & Matsuda, 1958**

Gerris (Gerriselloides) asper (Fieber, 1860) (N, S)
Gerris (Gerriselloides) lateralis Schummel, 1832 (N, S)

***Limnopus* Stål, 1868**

Limnopus rufoscutellatus (Latreille, 1807) (N, S)

Veliidae

***Microvelia (Microvelia)* Westwood, 1834**

Microvelia (Microvelia) pygmaea (Dufour, 1833) (N, S, Si, Sa)
Microvelia (Microvelia) reticulata (Burmeister, 1835) (N, S, Si)

***Velia (Plesiovelia)* Tamanini, 1955**

Velia (Plesiovelia) affinis Kolenati, 1856
 Velia (Plesiovelia) affinis filippii Tamanini, 1947 (N, S)
Velia (Plesiovelia) caprai Tamanini, 1947
 Velia (Plesiovelia) caprai caprai Tamanini, 1947 (N)
Velia (Plesiovelia) concii Tamanini, 1947 (Si)
Velia (Plesiovelia) currens (Fabricius, 1794) (N, S)
Velia (Plesiovelia) gridellii Tamanini, 1947 (N, S)
Velia (Plesiovelia) muelleri Tamanini, 1947 (N, S, Si)
Velia (Plesiovelia) sarda Tamanini, 1947 (Sa) (*)
Velia (Plesiovelia) saulii Tamanini, 1947 (N)

***Velia (Velia)* Latreille, 1804**

Velia (Velia) rivulorum (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa)

Note

Velia (Plesiovelia) sarda: Endemita sardo-corso.

Hebridae

Hebrus (Hebrus) Curtis, 1833

Hebrus (Hebrus) eckerleini (Jordan, 1954) (S) (*)

Hebrus (Hebrus) pusillus (Fallén, 1807)

Hebrus (Hebrus) pusillus pusillus (Fallén, 1807) (N, S, Si, Sa)

Hebrus (Hebrusella) Poisson, 1944

Hebrus (Hebrusella) franzi (Wagner, 1957) (S) (E) (*)

Hebrus (Hebrusella) ruficeps Thomson, 1871 (N, S, Si)

Note

Hebrus (Hebrus) eckerleini: Specie di dubbia validità.

Hebrus (Hebrusella) franzi: Specie di dubbia validità.

Hydrometridae

Hydrometra Latreille, 1796

Hydrometra gracilenta Horváth, 1899 (N)

Hydrometra stagnorum (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Mesoveliidae

Mesovelia Mulsant & Rey, 1852

Mesovelia furcata Mulsant & Rey, 1852 (N)

Mesovelia vittigera Horváth, 1895 (N, S, Si, Sa)

Leptopodidae

Erianotus Fieber, 1860

Erianotus lanosus (Dufour, 1834) (S, Si)

Leptopus Latreille, 1809

Leptopus hispanus Rambur, 1840 (N, S, Si, Sa)

Leptopus marmoratus (Goeze, 1778) (N, S, Si)

Patapius Horváth, 1912

Patapius spinosus (Rossi, 1790) (N, S, Si, Sa)

Saldidae

Pentacora Reuter, 1912

Pentacora sphacelata (Uhler, 1877) (Sa)

Chartoscirta Stål, 1868

Chartoscirta cincta (Herrich-Schäffer, 1841) (N, S, Si, Sa)

Chartoscirta cocksii (Curtis, 1835) (N, S)

Chartoscirta elegantula (Fallén, 1807) (N)

Chartoscirta geminata (A. Costa, 1853) (N, S, Sa)

Halosalda Reuter, 1912

Halosalda concolor (Puton, 1880) (S?, Si?, Sa)

Halosalda lateralis (Fallén, 1807) (N, S, Si, Sa)

Macrosaldula Leston & Southwood, 1964

Macrosaldula madonica (Seidenstücker, 1961) (Si) (E)

Macrosaldula scotica (Curtis, 1835) (N, S)

Macrosaldula variabilis (Herrich-Schäffer, 1835) (N, S, Si, Sa)

Salda Fabricius, 1803

Salda adriatica Horváth, 1887 (N, S)

Salda littoralis (Linnaeus, 1758) (N)

Salda muelleri (Gmelin, 1790) (N)

Saldula Van Duzee, 1914

Saldula amplicollis (Reuter, 1891) (N, S, Si)

Saldula arenicola (Scholz, 1847)

Saldula arenicola arenicola (Scholz, 1847) (N, S, Si, Sa)

Saldula c-album (Fieber, 1859) (N, S)

Saldula melanoscela (Fieber, 1859) (N, S, Si)

Saldula nitidula (Puton, 1880) (N, S)

Saldula opacula (Zetterstedt, 1838) (N, S, Si, Sa)

Saldula orthochila (Fieber, 1859) (N, S)

Saldula pallipes (Fabricius, 1794) (N, S, Si, Sa)

Saldula palustris (Douglas, 1874) (N, S, Si, Sa)

Saldula pilosella (Thomson, 1871) (N, S, Sa)

Saldula saltatoria (Linnaeus, 1758) (N, S)
Saldula sardoa Filippi, 1957 (Sa) (E, M)
Saldula xanthochila (Fieber, 1859) (N, S)

Teloleuca Reuter, 1912

Teloleuca pellucens (Fabricius, 1779) (N)

Anthocoridae

Acompocoris Reuter, 1875

Acompocoris alpinus Reuter, 1875 (N)
Acompocoris montanus Wagner, 1955 (N)
Acompocoris pygmaeus (Fallén, 1807) (N)

Anthocoris Fallén, 1814

Anthocoris amplicollis Horváth, 1893 (N)
Anthocoris confusus Reuter, 1884 (N, S)
Anthocoris gallarumulmi (De Geer, 1773) (N, S, Si)
Anthocoris limbatus Fieber, 1836 (N)
Anthocoris minki Dohrn, 1860
 Anthocoris minki minki Dohrn, 1860 (N, S, Si, Sa?)
Anthocoris nemoralis (Fabricius, 1794) (N, S, Si, Sa)
Anthocoris nemorum (Linnaeus, 1761) (N, S, Si)
Anthocoris sarothamni Douglas & Scott, 1865 (N, S, Si, Sa)
Anthocoris sibiricus Reuter, 1875 (N, S, Si?)
Anthocoris simulans Reuter, 1884 (N)

Elatophilus (Elatophilus) Reuter, 1884

Elatophilus (Elatophilus) nigricornis (Zetterstedt, 1838) (N, S, Si)
Elatophilus (Elatophilus) stigmatellus (Zetterstedt, 1838) (N?)

Elatophilus (Euhadrocerus) Reuter, 1884

Elatophilus (Euhadrocerus) crassicornis (Reuter, 1875) (N, Si)

Montandoniola Poppius, 1909

Montandoniola moraguesi (Puton, 1896) (S?, Si)

Orius (Heterorius) Wagner, 1952

Orius (Heterorius) horvathi (Reuter, 1884) (N, S, Si)
Orius (Heterorius) laticollis (Reuter, 1884)

Orius (Heterorius) laticollis laticollis (Reuter, 1884) (N, S, Si)
Orius (Heterorius) majusculus (Reuter, 1879) (N, S, Sa)
Orius (Heterorius) minutus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa?)
Orius (Heterorius) vicinus (Ribaut, 1923) (N, S, Si)

Orius (Orius) Wolff, 1811

Orius (Orius) laevigatus (Fieber, 1860)
Orius (Orius) laevigatus laevigatus (Fieber, 1860) (N, S, Si, Sa)
Orius (Orius) lindbergi Wagner, 1952 (Si)
Orius (Orius) niger Wolff, 1811 (N, S, Si, Sa)
Orius (Orius) pallidicornis (Reuter, 1884) (N, S, Si, Sa)

Temnostethus (Ectemnus) Fieber, 1860

Temnostethus (Ectemnus) reduvinus (Herrich-Schäffer, 1850)
Temnostethus (Ectemnus) reduvinus reduvinus (Herrich-Schäffer, 1850) (N)

Temnostethus (Temnostethus) Fieber, 1860

Temnostethus (Temnostethus) gracilis Horváth, 1907 (N, S)
Temnostethus (Temnostethus) longirostris (Horváth, 1907) (N)
Temnostethus (Temnostethus) pusillus (Herrich-Schäffer, 1835) (N, S, Si)

Tetraphleps Fieber, 1860

Tetraphleps bicuspis (Herrich-Schäffer, 1835) (N)

Brachysteles Mulsant & Rey, 1852

Brachysteles parvicornis (A. Costa, 1847) (N, S, Si, Sa)

Buchananiella Reuter, 1884

Buchananiella continua (Buchanan White, 1880) (N, S)

Cardiastethus Fieber, 1860

Cardiastethus fasciventris (Garbiglietti, 1869) (N, S, Si, Sa)
Cardiastethus nazareus Reuter, 1884 (N, S, Si, Sa?)

Dufouriellus Kirkaldy, 1906

Dufouriellus ater (Dufour, 1833) (N, S, Si)

Dysepicritus Reuter, 1884

Dysepicritus rufescens (A. Costa, 1847) (N, S, Si, Sa?)

Lyctocoris (Lyctocoris) Hahn, 1836

Lyctocoris (Lyctocoris) campestris (Fabricius, 1794) (N, S, Si, Sa)

Lyctocoris (Lyctocoris) dimidiatus (Spinola, 1837) (N, S, Si)

Scoloposcelis Fieber, 1864

Scoloposcelis obscurella (Zetterstedt, 1838) (N?)

Scoloposcelis pulchella (Zetterstedt, 1838)

Scoloposcelis pulchella angusta Reuter, 1876 (N?, S)

Scoloposcelis pulchella pulchella (Zetterstedt, 1838) (N?, S?)

Xylocoridea Reuter, 1876

Xylocoridea brevipennis Reuter, 1876 (N, S)

Xylocoris (Arrostelus) Kirkaldy, 1906

Xylocoris (Arrostelus) flavipes (Reuter, 1875) (N, Sa?)

Xylocoris (Proxylocoris) Carayon, 1972

Xylocoris (Proxylocoris) galactinus (Fieber, 1836) (N, S, Si)

Xylocoris (Stictosynechia) Reuter, 1884

Xylocoris (Stictosynechia) lativentris (J. Sahlberg, 1871) (Si)

Xylocoris (Stictosynechia) maculipennis Bärensprung, 1858 (N?, Sa)

Xylocoris (Xylocoris) Dufour, 1831

Xylocoris (Xylocoris) cursitans (Fallén, 1807) (N, S, Si)

Xylocoris (Xylocoris) formicetorum (Boheman, 1844) (N)

Xylocoris (Xylocoris) obliquus A. Costa, 1853 (N, S, Si, Sa)

Xyloecocoris Reuter, 1879

Xyloecocoris ovatulus Reuter, 1879 (S)

Cimicidae

Cimex Linnaeus, 1758

Cimex columbarius Jenyns, 1839 (N)

Cimex lectularius Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)

Cimex pipistrelli Jenyns, 1839 (N?)

Oeciacus Stål, 1873

Oeciacus hirundinis (Lamarck, 1816) (N, S)

Nabidae

Anaptus Kerzhner, 1968

Anaptus major (A. Costa, 1842) (S, Si, Sa)

Aptus Hahn, 1831

Aptus mirmicoides (O.G. Costa, 1834) (N, S, Si, Sa)

Halonabis Reuter, 1890

Halonabis sareptanus (Dohrn, 1862)

Halonabis sareptanus occidentalis Kerzhner, 1963 (Si, Sa)

Himacerus Wolff, 1811

Himacerus apterus (Fabricius, 1798) (N, S, Si)

Nabacula (Limnonabis) Kerzhner, 1968

Nabacula (Limnonabis) lineata (Dahlbom, 1851) (N)

Nabacula (Nabacula) Kirby, 1837

Nabacula (Nabacula) flavomarginata (Scholz, 1847) (N, S)

Nabis (Aspilaspis) Stål, 1873

Nabis (Aspilaspis) viridulus Spinola, 1837 (N, S, Si, Sa)

Nabis (Nabis) Latreille, 1802

Nabis (Nabis) brevis Scholz, 1847

Nabis (Nabis) brevis brevis Scholz, 1847 (N)

Nabis (Nabis) ferus (Linnaeus, 1758) (N, S)

Nabis (Nabis) occidentalis Rieger, 1973 (N, S, Si, Sa)

Nabis (Nabis) provencalis Remane, 1953 (S, Sa)

Nabis (Nabis) pseudoferus Remane, 1949

Nabis (Nabis) pseudoferus ibericus Remane, 1962 (Si, Sa)

Nabis (Nabis) pseudoferus pseudoferus Remane, 1949 (N, S)

Nabis (Nabis) punctatus A. Costa, 1847

Nabis (Nabis) punctatus punctatus A. Costa, 1847 (N, S, Si)
Nabis (Nabis) reuterianus Puton, 1880 (Si)
Nabis (Nabis) rugosus (Linnaeus, 1758) (N)

***Nabis (Tropiconabis)* Kerzhner, 1968**

Nabis (Tropiconabis) capsiformis Germar, 1838 (N, S, Si, Sa)

***Alloeorhynchus* Fieber, 1860**

Alloeorhynchus flavipes (Fieber, 1836) (N, S)
Alloeorhynchus putoni Kirkaldy, 1901 (Si, Sa)

***Prostemma (Prostemma)* Laporte, 1832**

Prostemma (Prostemma) aeneicolle Stein, 1857 (N, S)
Prostemma (Prostemma) bicolor Rambur, 1839 (Si, Sa)
Prostemma (Prostemma) guttula (Fabricius, 1787)
Prostemma (Prostemma) guttula guttula (Fabricius, 1787) (N, S, Si, Sa)
Prostemma (Prostemma) sanguineum (Rossi, 1790) (N, S, Si, Sa)

Microphysidae

***Loricula* Curtis, 1833**

Loricula bedeli (Montandon, 1887) (S, Sa?)
Loricula bipunctata (Perris, 1857) (N, S, Si)
Loricula elegantula (Bärensprung, 1858) (N, S?)
Loricula freyi (Lindberg, 1932) (S, Si)
Loricula pselaphiformis Curtis, 1833 (N, S)
Loricula ruficeps (Reuter, 1884) (S?)
Loricula rufoscutellata (Bärensprung, 1857) (N)

***Myrmedobia* Bärensprung, 1857**

Myrmedobia coleoptrata (Fallén, 1807) (Sa)
Myrmedobia distinguenda Reuter, 1884 (N)
Myrmedobia exilis (Fallén, 1807) (N, S)
Myrmedobia inconspicua (Douglas & Scott, 1871) (N)

Miridae

***Bryocoris* Fallén, 1829**

Bryocoris pteridis (Fallén, 1807) (N, S)

Monalocoris Dahlbom, 1851

Monalocoris filicis (Linnaeus, 1758)

Monalocoris filicis filicis (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa?)

Fulvius Stål, 1862

Fulvius punctumalbum (Rossi, 1790) (N, S)

Alloeotomus Fieber, 1858

Alloeotomus aetneus (A. Costa, 1841) (Si)

Alloeotomus germanicus Wagner, 1939 (N)

Alloeotomus gothicus (Fallén, 1807) (N, S, Si?)

Alloeotomus rubripennis Ippolito & Lombardo, 1982 (S) (E)

Bothynotus Fieber, 1864

Bothynotus pilosus (Boheman, 1852) (N, Si)

Deraeocoris (Camptobrochis) Fieber, 1858

Deraeocoris (Camptobrochis) pallens Reuter, 1904 (Si?, Sa?) (*)

Deraeocoris (Camptobrochis) punctulatus (Fallén, 1807) (N, S, Si?, Sa?)

Deraeocoris (Camptobrochis) serenus Douglas & Scott, 1868 (N, S, Si, Sa)

Deraeocoris (Deraeocoris) Kirschbaum, 1856

Deraeocoris (Deraeocoris) annulipes (Herrich-Schäffer, 1842) (N)

Deraeocoris (Deraeocoris) cardinalis (Fieber, 1858) (N) (*)

Deraeocoris (Deraeocoris) cordiger (Hahn, 1834) (N?)

Deraeocoris (Deraeocoris) flavilinea (A. Costa, 1862) (N, S, Si, Sa)

Deraeocoris (Deraeocoris) morio (Boheman, 1852) (N)

Deraeocoris (Deraeocoris) olivaceus (Fabricius, 1777) (N, S, Si)

Deraeocoris (Deraeocoris) punctum (Rambur, 1839) (N, Si, Sa)

Deraeocoris (Deraeocoris) ribauti Wagner, 1943 (N)

Deraeocoris (Deraeocoris) ruber (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Deraeocoris (Deraeocoris) rutilus (Herrich-Schäffer, 1839) (N?) (*)

Deraeocoris (Deraeocoris) schach (Fabricius, 1781) (N, S, Si)

Deraeocoris (Deraeocoris) trifasciatus (Linnaeus, 1767) (N, S, Si)

Deraeocoris (Knightocapsus) Wagner, 1963

Deraeocoris (Knightocapsus) lutescens (Schilling, 1836) (N, S, Si, Sa)

Deraeocoris (Phaeocapsus) Wagner, 1963

Deraeocoris (Phaeocapsus) martini (Puton, 1887)

Deraeocoris (Phaeocapsus) martini martini (Puton, 1887) (Si)

Campyloneura Fieber, 1861

Campyloneura virgula (Herrich-Schäffer, 1835)

Campyloneura virgula virgula (Herrich-Schäffer, 1835) (N, S, Si, Sa)

Cyrtopeltis (Cyrtopeltis) Fieber, 1861

Cyrtopeltis (Cyrtopeltis) geniculata Fieber, 1861 (N, Si)

Cyrtopeltis (Nesidiocoris) Kirkaldy, 1902

Cyrtopeltis (Nesidiocoris) tenuis (Reuter, 1895) (S, Si)

Dicyphus (Brachyceroea) Fieber, 1858

Dicyphus (Brachyceroea) albonasutus Wagner, 1951 (N, S, Si)

Dicyphus (Brachyceroea) annulatus (Wolff, 1804) (N?, S?) (*)

Dicyphus (Brachyceroea) ceruttii Wagner, 1946 (N)

Dicyphus (Brachyceroea) geniculatus Fieber, 1858 (N, S, Si, Sa?)

Dicyphus (Brachyceroea) globulifer (Fallén, 1829) (N, S, Si, Sa)

Dicyphus (Brachyceroea) ononidis Wagner, 1951 (N, S)

Dicyphus (Dicyphus) Fieber, 1858

Dicyphus (Dicyphus) constrictus (Boheman, 1852) (N?) (*)

Dicyphus (Dicyphus) epilobii Reuter, 1883 (N, S)

Dicyphus (Dicyphus) errans (Wolff, 1804) (N, S, Si, Sa?)

Dicyphus (Dicyphus) escalerae Lindberg, 1934 (N)

Dicyphus (Dicyphus) flavoviridis Tamanini, 1949 (N, S, Si, Sa)

Dicyphus (Dicyphus) hyalinipennis (Burmeister, 1835) (N, S, Si) (*)

Dicyphus (Dicyphus) pallidus (Herrich-Schäffer, 1852) (N, S, Si)

Dicyphus (Dicyphus) stachydis Reuter, 1883

Dicyphus (Dicyphus) stachydis wagneri Tamanini, 1956 (N, S)

Dicyphus (Dicyphus) tamaninii Wagner, 1951 (N, S, Si)

Dicyphus (Idolocoris) Douglas & Scott, 1865

Dicyphus (Idolocoris) pallicornis (Fieber, 1861) (N)

Macrolophus Fieber, 1858

Macrolophus caliginosus Wagner, 1951 (N, S, Si)

Macrolophus costalis Fieber, 1858 (S, Si)

Macrolophus glaucescens Fieber, 1858 (N?) (*)

Macrolophus pygmaeus (Herrich-Schäffer, 1835) (N, S, Si, Sa)

Stethoconus Flor, 1861

Stethoconus pyri (Mella, 1869) (N)

Alloeomimus Reuter, 1910

Alloeomimus unifasciatus (Reuter, 1879) (S, Si)

Cremnocephalus Fieber, 1861

Cremnocephalus albolineatus Reuter, 1875 (N)

Cremnocephalus alpestris Wagner, 1941 (N, S)

Hallodapus Fieber, 1858

Hallodapus montandoni Reuter, 1895 (N, S, Si)

Hallodapus rufescens (Burmeister, 1835) (N, S)

Mimocoris Scott, 1872

Mimocoris coarctatus (Mulsant & Rey, 1852) (N?, S?, Si?, Sa?) (*)

Mimocoris rugicollis (A. Costa, 1853) (N, S, Si)

Myrmicomimus Reuter, 1881

Myrmicomimus variegatus (A. Costa, 1843) (S, Si)

Omphalonotus Reuter, 1876

Omphalonotus quadriguttatus (Kirschbaum, 1856) (N)

Plagiorhamma Fieber, 1870

Plagiorhamma suturalis (Herrich-Schäffer, 1837) (N, S)

Systellonotus Fieber, 1858

Systellonotus alpinus (Frey-Gessner, 1873) (N, S?)

Systellonotus insularis Wagner, 1948 (Sa)

Systellonotus triguttatus (Linnaeus, 1767) (N, S, Si)

Dasyscytus Fieber, 1864

Dasyscytus sordidus Fieber, 1864 (N?)

Dimorphocoris Reuter, 1891

Dimorphocoris concii Tamanini, 1972 (N)

Dimorphocoris debilis (Reuter, 1880)

Dimorphocoris debilis debilis (Reuter, 1880) (Si)

Dimorphocoris debilis italicus Tamanini, 1981 (S)

Dimorphocoris mutatus Seidenstücker, 1964 (S, Si)

Dimorphocoris osellai Tamanini, 1976 (N)

Dimorphocoris ruffoi Tamanini, 1971 (N)

Dimorphocoris saulii Wagner, 1965 (N) (*)

Dimorphocoris servadeii Tamanini, 1982 (S)

Dimorphocoris tomasii Tamanini, 1971 (N)

Euryopicoris Reuter, 1875

Euryopicoris nitidus (Meyer-Dür, 1843) (N, S)

Halticus Hahn, 1832

Halticus apterus (Linnaeus, 1761) (N, S, Si?, Sa)

Halticus hensci Reuter, 1888 (N?)

Halticus luteicollis (Panzer, 1805) (N, S, Si, Sa)

Halticus macrocephalus Fieber, 1858 (N, S, Si, Sa)

Halticus major Wagner, 1951 (N, S)

Halticus puncticollis Fieber, 1870 (N?) (*)

Halticus pusillus (Herrich-Schäffer, 1835) (N, S)

Halticus saltator (Geoffroy, 1785) (N, S)

Orthocephalus Fieber, 1858

Orthocephalus brevis (Panzer, 1798) (N, S, Si, Sa)

Orthocephalus coriaceus (Fabricius, 1777) (N?, Si?)

Orthocephalus proserpinae (Mulsant & Rey, 1852) (N?, S, Si, Sa)

Orthocephalus saltator (Hahn, 1835) (N, S, Si, Sa)

Orthocephalus tenuicornis (Mulsant & Rey, 1852) (N, S)

Orthocephalus vittipennis (Herrich-Schäffer, 1835) (N, S)

Pachytomella Reuter, 1891

Pachytomella parallela (Meyer-Dür, 1843) (N)

Pachytomella passerinii (A. Costa, 1841) (N, S, Si, Sa)

Piezocranum Horváth, 1877

Piezocranum simulans Horváth, 1877 (N, S)

Plagiotylus Scott, 1874

Plagiotylus ruffoi Tamanini, 1960 (Si) (E)

Plagiotylus zorzii Tamanini, 1955 (S) (E)

Schoenocoris Reuter, 1891

Schoenocoris flavomarginatus (A. Costa, 1841) (S, Si?)

Strongylocoris Blanchard, 1840

Strongylocoris atrocoeruleus (Fieber, 1864) (N, Si, Sa)

Strongylocoris cicadifrons A. Costa, 1853 (N, S)

Strongylocoris erythroleptus A. Costa, 1852 (N, S)

Strongylocoris leucocephalus (Linnaeus, 1758) (N, S)

Strongylocoris luridus (Fallén, 1807) (N)

Strongylocoris obscurus (Rambur, 1839) (S, Si?, Sa?)

Strongylocoris raimondoi Carapezza, 1991 (Si) (E)

Isometopus Fieber, 1860

Isometopus intrusus (Herrich-Schäffer, 1842) (N, Si?)

Isometopus mirificus Rey, 1878 (N)

Acetropis (Acetropis) Fieber, 1858

Acetropis (Acetropis) carinata (Herrich-Schäffer, 1841) (S)

Acetropis (Acetropis) gimmerthali (Flor, 1860) (S, Si, Sa)

Actinotus Reuter, 1896

Actinotus pulcher (Herrich-Schäffer, 1835) (N)

Adelphocoris Reuter, 1896

Adelphocoris annulicornis (F. Sahlberg, 1848)

Adelphocoris annulicornis innotatus Reuter, 1906 (N, S?)

Adelphocoris detritus (Fieber, 1861) (N, Si)

Adelphocoris lineolatus (Goeze, 1778) (N, S, Si, Sa)

Adelphocoris reicheli (Fieber, 1836) (N)

Adelphocoris seticornis (Fabricius, 1775) (N, S, Si?, Sa?)

Adelphocoris ticinensis (Meyer-Dür, 1843) (N, S)

Adelphocoris vandalicus (Rossi, 1790) (N, S, Si, Sa)

Agnocoris Reuter, 1875

Agnocoris reclairei Wagner, 1949 (N, S, Si)

Agnocoris rubicundus (Fallén, 1807) (N, S)

Alloeonotus Fieber, 1858

Alloeonotus egregius Fieber, 1864 (N)

Alloeonotus fulvipes (Scopoli, 1763) (N, S)

Aphanosoma A. Costa, 1841

Aphanosoma italicum A. Costa, 1841 (N, S, Si)

Brachycoleus Fieber, 1858

Brachycoleus decolor Reuter, 1887 (N, S, Si, Sa)

Brachycoleus sexvittatus Reuter, 1877 (N, Sa)

Brachycoleus steini Reuter, 1877 (S, Si)

Brachycoleus triangularis (Goeze, 1778) (*)

Calocoris (Calocoris) Fieber, 1858

Calocoris (Calocoris) affinis (Herrich-Schäffer, 1835) (N, S)

Calocoris (Calocoris) alpestris (Meyer-Dür, 1843) (N, S)

Calocoris (Calocoris) angularis (Fieber, 1864) (N)

Calocoris (Calocoris) instabilis Fieber, 1861 (Sa?)

Calocoris (Calocoris) norvegicus (Gmelin, 1790) (*)

Calocoris (Calocoris) norvegicus norvegicus (Gmelin, 1790) (N)

Calocoris (Calocoris) norvegicus vittiger Reuter, 1896 (N, S, Si, Sa)

Calocoris (Calocoris) roseomaculatus (De Geer, 1773) (N, S, Si)

Calocoris (Calocoris) sulphureus Reuter, 1870 (*)

Calocoris (Closterotomus) Fieber, 1858

Calocoris (Closterotomus) annulus (Brullé, 1832) (N, S, Sa)

Calocoris (Closterotomus) biclavatus (Herrich-Schäffer, 1835)

Calocoris (Closterotomus) biclavatus b.biclavatus (Herrich-Schäffer, 1835) (N, S)

Calocoris (Closterotomus) cinctipes (A. Costa, 1853) (N, S)

Calocoris (Closterotomus) fulvomaculatus (De Geer, 1773) (N, S)

Calocoris (Closterotomus) trivialis (A. Costa, 1853) (N, S, Si, Sa)

Calocoris (Closterotomus) ventralis Reuter, 1879 (N, S, Si)

Calocoris (Closterotomus) vicinus Horváth, 1876 (N?) (*)

Calocoris (Lophyromiris) Wagner, 1958

Calocoris (Lophyromiris) sexguttatus (Fabricius, 1777) (N, S)

Calocoris (Macrocalocoris) Wagner, 1968

Calocoris (Macrocalocoris) nemoralis (Fabricius, 1787) (N, S, Si, Sa)

Calocoris (Rhabdomiris) Wagner, 1968

Calocoris (Rhabdomiris) quadripunctatus Villers, 1789 (N, S, Si, Sa)

Calocoris (Trichocalocoris) Wagner, 1952

Calocoris (Trichocalocoris) lineolatus (A. Costa, 1852) (N, S, Sa)

Calocoris (Trichocalocoris) pilicornis (Panzer, 1806) (N?) (*)

Calocoris (Trichocalocoris) schmidtii (Fieber, 1836) (N, S)

Camponotidea Reuter, 1879

Camponotidea saundersi (Puton, 1874) (N, S, Si)

Camptozygum Reuter, 1896

Camptozygum aequale (Villers, 1789) (N)

Camptozygum pumilio Reuter, 1902 (N)

Capsodes (Capsodes) Dahlbom, 1850

Capsodes (Capsodes) flavomarginatus (Donovan, 1798) (N, S, Si)

Capsodes (Capsodes) gothicus (Linnaeus, 1758) (N, S, Sa)

Capsodes (Capsodes) mat (Rossi, 1790) (N, S, Si, Sa)

Capsodes (Capsodes) sulcatus (Fieber, 1861) (N?, S, Sa) (E)

Capsodes (Capsodes) vittiventris (Puton, 1883) (Si)

Capsodes (Horistus) Fieber, 1861

Capsodes (Horistus) cingulatus (Fabricius, 1787) (N, S, Si)

Capsodes (Horistus) elongatus Wagner, 1951 (S, Si, Sa)

Capsodes (Horistus) lineolatus (Brullé, 1832) (N, S, Si, Sa)

Capsus Fabricius, 1803

Capsus ater (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa?)

Charagochilus Fieber, 1858

Charagochilus gyllenhalii (Fallén, 1807) (N, S, Si)

Charagochilus weberi Wagner, 1953 (N, S, Si)

Creontiades Distant, 1883

Creontiades pallidus (Rambur, 1839)

Creontiades pallidus pallidus (Rambur, 1839) (S, Si)

Cyphodema Fieber, 1858

Cyphodema instabile (Lucas, 1849) (N, S, Si, Sa)

Dichrooscytus Fieber, 1858

Dichrooscytus gustavi Josifov, 1981 (S?) (*)
Dichrooscytus intermedius Reuter, 1885 (N)
Dichrooscytus rufipennis (Fallén, 1807) (N)
Dichrooscytus valesianus Fieber, 1861 (N?)

Dionconotus Reuter, 1894

Dionconotus cruentatus (Brullé, 1832)
Dionconotus cruentatus cruentatus (Brullé, 1832) (N, S)
Dionconotus neglectus (Fabricius, 1798) (N?)

Dolichomiris Reuter, 1882

Dolichomiris linearis Reuter, 1882 (N?, S?) (*)

Eurystylus Stål, 1870

Eurystylus bellevoeyi Reuter, 1879 (Si)

Hadrodemus Fieber, 1858

Hadrodemus m-flavum (Goeze, 1778) (N, S, Si)

Leptopterna Fieber, 1858

Leptopterna dolobrata (Linnaeus, 1758) (N, S)
Leptopterna ferrugata (Fallén, 1807) (N, S, Si)
Leptopterna griesheimae Wagner, 1952 (Si)

Liocoris Fieber, 1858

Liocoris tripustulatus (Fabricius, 1781) (N, S, Si, Sa)

***Lygocoris* (*Apolygus*)** China, 1941

Lygocoris (*Apolygus*) *limbatus* (Fallén, 1807) (N, Sa)
Lygocoris (*Apolygus*) *lucorum* (Meyer-Dür, 1843) (N, S)
Lygocoris (*Apolygus*) *spinolae* (Meyer-Dür, 1841) (N, S, Sa)

***Lygocoris* (*Lygocoris*)** Reuter, 1875

Lygocoris (*Lygocoris*) *pabulinus* (Linnaeus, 1761) (N, S, Sa)
Lygocoris (*Lygocoris*) *rugicollis* (Fallén, 1807) (N)

***Lygocoris* (*Neolygus*)** Knight, 1917

Lygocoris (*Neolygus*) *contaminatus* (Fallén, 1807) (N, S?, Si?)
Lygocoris (*Neolygus*) *viridis* (Fallén, 1807) (N)

Lygus Hahn, 1833

Lygus gemellatus (Herrich-Schäffer, 1835) (N, S, Sa)
Lygus italicus Wagner, 1951 (N, S, Si, Sa)
Lygus pratensis (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
Lygus punctatus (Zetterstedt, 1839) (N)
Lygus rugulipennis Poppius, 1911 (N, S)
Lygus wagneri Remane, 1955 (N, S, Sa)

Megacoelum Fieber, 1858

Megacoelum beckeri (Fieber, 1870) (N, S, Si, Sa)
Megacoelum infusum (Herrich-Schäffer, 1837) (N, S, Si)
Megacoelum quercicola Linnavuori, 1965 (Si)

Megaloceroea Fieber, 1858

Megaloceroea recticornis (Geoffroy, 1785) (N, S, Si, Sa)

Miridius Fieber, 1858

Miridius pallidus Horváth, 1887 (N?) (*)
Miridius quadrivirgatus (A. Costa, 1853) (N, S, Si, Sa)

Miris Fabricius, 1794

Miris nebrodensis Carapezza, 1991 (Si) (E)
Miris striatus (Linnaeus, 1758) (N, S)

Myrmecoris Gorski, 1852

Myrmecoris gracilis (J. Sahlberg, 1848) (N)

Notostira Fieber, 1878

Notostira elongata (Geoffroy, 1785) (N, S, Si?, Sa?)
Notostira erratica (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa?)

Orthops Fieber, 1858

Orthops basalis (A. Costa, 1853) (N, S, Si?, Sa)
Orthops campestris (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
Orthops kalmi (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
Orthops montanus (Schilling, 1836) (N, S)
Orthops oleae Wagner, 1967 (Si)

Pachypterna Fieber, 1858

Pachypterna fieberi Fieber, 1858 (N)

Pantilius Curtis, 1833

Pantilius tunicatus (Fabricius, 1781) (N, S)

***Phytocoris* (*Compsocerochoris*)** Reuter, 1876

Phytocoris (*Compsocerochoris*) *calabricus* Tamanini, 1975 (S)

Phytocoris (*Compsocerochoris*) *femoralis* Fieber, 1861 (Si, Sa)

Phytocoris (*Compsocerochoris*) *juniperi* Frey-Gessner, 1865 (N)

***Phytocoris* (*Eckerleinius*)** Wagner, 1968

Phytocoris (*Eckerleinius*) *obliquus* A. Costa, 1853 (N, S, Sa)

Phytocoris (*Eckerleinius*) *salsolae* (Puton, 1875) (S, Si)

Phytocoris (*Eckerleinius*) *sanctipetri* Carapezza, 1985 (Si) (E)

Phytocoris (*Eckerleinius*) *thymelaeae* Tamanini, 1980 (Sa) (E)

***Phytocoris* (*Ktenocoris*)** Wagner, 1954

Phytocoris (*Ktenocoris*) *austriacus* Wagner, 1954 (N, S)

Phytocoris (*Ktenocoris*) *exoletus* A. Costa, 1852 (N, S, Si, Sa)

Phytocoris (*Ktenocoris*) *flammula* Reuter, 1875 (N, S, Si)

Phytocoris (*Ktenocoris*) *insignis* Reuter, 1876 (N, S)

Phytocoris (*Ktenocoris*) *italicus* Wagner, 1954 (N, S, Si) (E)

Phytocoris (*Ktenocoris*) *sardus* Wagner, 1976 (Sa) (E)

Phytocoris (*Ktenocoris*) *ulmi* (Linnaeus, 1758) (N, S)

Phytocoris (*Ktenocoris*) *varipes* Boheman, 1852 (N, S, Si, Sa)

Phytocoris (*Ktenocoris*) *vittiger* Reuter, 1896 (N, S)

Phytocoris (*Ktenocoris*) *weidneri* Wagner, 1975 (S, Si)

***Phytocoris* (*Leptophytocoris*)** Wagner, 1961

Phytocoris (*Leptophytocoris*) *miridioides* Lethierry, 1877 (Si)

Phytocoris (*Leptophytocoris*) *ustulatus* Herrich-Schäffer, 1835 (N, S)

***Phytocoris* (*Phytocoris*)** Fallén, 1814

Phytocoris (*Phytocoris*) *confusus* Reuter, 1896 (N)

Phytocoris (*Phytocoris*) *dimidiatus* Kirschbaum, 1856 (N, S, Si)

Phytocoris (*Phytocoris*) *laciniatus* Tamanini, 1975 (Si, Sa)

Phytocoris (*Phytocoris*) *longipennis* Flor, 1860 (N)

Phytocoris (*Phytocoris*) *obscurus* Reuter, 1875 (N)

Phytocoris (*Phytocoris*) *pini* Kirschbaum, 1856 (N, S)

Phytocoris (*Phytocoris*) *populi* (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Phytocoris (*Phytocoris*) *reuteri* Saunders, 1875 (N, S, Si, Sa) (*)

Phytocoris (Phytocoris) setiger Reuter, 1896 (N?) (*)
Phytocoris (Phytocoris) tiliae (Fabricius, 1777) (N, S, Si)

Phytocoris (Ribautomiris) Wagner & Weber, 1964

Phytocoris (Ribautomiris) minor Kirschbaum, 1856 (N)
Phytocoris (Ribautomiris) parvulus Reuter, 1880 (N, S, Si)

Phytocoris (Soosocapsus) Wagner, 1968

Phytocoris (Soosocapsus) hartigi Wagner, 1974 (Sa) (E)

Phytocoris (Stictophytocoris) Stichel, 1957

Phytocoris (Stictophytocoris) meridionalis Herrich-Schäffer, 1835 (N, S)

Pinalitus Kelton, 1955

Pinalitus atomarius (Meyer-Dür, 1843) (N, S)
Pinalitus cervinus (Herrich-Schäffer, 1841) (N, S, Si, Sa)
Pinalitus rubricatus (Fallén, 1807) (N)

Pithanus Fieber, 1858

Pithanus maerkelii (Herrich-Schäffer, 1838) (N, S, Si, Sa)
Pithanus marshalli Douglas & Scott, 1868 (Si, Sa)

Polymerus (Poeciloscytus) Fieber, 1858

Polymerus (Poeciloscytus) asperulae (Fieber, 1861) (N, S, Sa)
Polymerus (Poeciloscytus) brevicornis Reuter, 1878 (N?)
Polymerus (Poeciloscytus) cognatus (Fieber, 1858) (N, S, Si, Sa)
Polymerus (Poeciloscytus) microphthalmus Wagner, 1951 (N, S)
Polymerus (Poeciloscytus) palustris Reuter, 1905 (N, S, Sa)
Polymerus (Poeciloscytus) unifasciatus (Fabricius, 1794) (N, S, Si, Sa)
Polymerus (Poeciloscytus) vulneratus (Panzer, 1806) (N, S, Si)

Polymerus (Polymerus) Westwood, 1839

Polymerus (Polymerus) carpathicus Horváth, 1882 (N, S)
Polymerus (Polymerus) holosericeus Hahn, 1831 (N, S)
Polymerus (Polymerus) nigritus (Fallén, 1807) (N, S)

Rhabdoscytus Horváth, 1923

Rhabdoscytus costai (Reuter, 1902) (N, S, Si) (E)

Stenodema (Brachystira) Fieber, 1858

Stenodema (Brachystira) calcaratum (Fallén, 1807) (N, S, Si, Sa)

Stenodema (Stenodema) Laporte, 1833

Stenodema (Stenodema) algoviense Schmidt, 1934 (N)

Stenodema (Stenodema) curticolis (A. Costa, 1852) (S) (*)

Stenodema (Stenodema) holsatum (Fabricius, 1787) (N, S, Si, Sa)

Stenodema (Stenodema) laevigatum (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Stenodema (Stenodema) sericans (Fieber, 1861) (N, S, Si)

Stenodema (Stenodema) virens (Linnaeus, 1767) (N, S, Si?, Sa)

Stenotus Jakovlev, 1877

Stenotus binotatus (Fabricius, 1794) (N, S, Si)

Taylorilygus Leston, 1952

Taylorilygus pallidulus (Blanchard, 1852) (N, S, Si, Sa)

Teratocoris Fieber, 1878

Teratocoris antennatus (Boheman, 1852) (N, S, Si, Sa) (*)

Trigonotylus Fieber, 1858

Trigonotylus caelestialium (Kirkaldy, 1902) (N, S)

Trigonotylus pallidicornis Reuter, 1899 (Si)

Trigonotylus elymi Thomson, 1871 (Sa?) (*)

Trigonotylus pulchellus (Hahn, 1834) (N, S, Si, Sa)

Trigonotylus ruficornis (Geoffroy, 1785) (N, S, Si, Sa)

Blepharidopterus Kolenati, 1845

Blepharidopterus angulatus (Fallén, 1807) (N, S, Si, Sa)

Blepharidopterus diaphanus (Kirschbaum, 1856) (S?)

Brachynotocoris Reuter, 1880

Brachynotocoris puncticornis Reuter, 1880 (N, Si)

Cyllecoris Hahn, 1834

Cyllecoris histrionius (Linnaeus, 1767) (N, S, Si, Sa)

Cyrtorhinus Fieber, 1858

Cyrtorhinus caricis (Fallén, 1807) (N?) (*)

Dryophilocoris Reuter, 1875

Dryophilocoris flavoquadrimaculatus (De Geer, 1773) (N, S, Si)

Excentricus Reuter, 1878

Excentricus planicornis (Herrich-Schäffer, 1836) (S)

Globiceps (Globiceps) Le Peletier & Serville, 1825

Globiceps (Globiceps) novaki Wagner, 1950 (N?) (*)

Globiceps (Globiceps) sphegiformis (Rossi, 1790) (N, S, Si, Sa)

Globiceps (Paraglobiceps) Wagner, 1957

Globiceps (Paraglobiceps) cruciatus Reuter, 1879 (N, S)

Globiceps (Paraglobiceps) flavomaculatus (Fabricius, 1794) (N)

Globiceps (Paraglobiceps) horvathi (Reuter, 1912) (N, S, Si)

Globiceps (Paraglobiceps) juniperi (Reuter, 1902) (N)

Heterocordylus (Bothrocranium) Reuter, 1876

Heterocordylus (Bothrocranium) erythropthalmus (Hahn, 1833) (*)

Heterocordylus (Bothrocranium) erythropthalmus erythropthalmus (Hahn, 1831) (N?)

Heterocordylus (Heterocordylus) Fieber, 1858

Heterocordylus (Heterocordylus) farinosus Horváth, 1887 (N?) (*)

Heterocordylus (Heterocordylus) flavipes Wagner, 1952 (N, S) (E)

Heterocordylus (Heterocordylus) genistae (Scopoli, 1763) (N, S, Sa)

Heterocordylus (Heterocordylus) leptocerus (Kirschbaum, 1856) (N, S, Sa?)

Heterocordylus (Heterocordylus) parvulus Reuter, 1881 (Sa)

Heterocordylus (Heterocordylus) tibialis (Hahn, 1833)

Heterocordylus (Heterocordylus) tibialis tibialis (Hahn, 1831) (N, S, Sa)

Heterocordylus (Heterocordylus) tumidicornis (Herrich-Schäffer, 1835) (N, S)

Heterotoma Le Peletier & Serville, 1825

Heterotoma diversipes Puton, 1876 (S, Si, Sa) (*)

Heterotoma meriopterum (Scopoli, 1763) (N)

Heterotoma planicornis (Pallas, 1772) (N, S, Si, Sa?)

Malacocoris Fieber, 1858

Malacocoris chlorizans (Panzer, 1794) (N, S, Si, Sa)

Mecomma (Globicellus) Kiritshenko, 1951

Mecomma (Globicellus) dispar (Boheman, 1852) (N)

Mecomma (Mecomma) Fieber, 1858

Mecomma (Mecomma) ambulans (Fallén, 1807) (N)

Orthotylus (Litocoris) Fieber, 1861

Orthotylus (Litocoris) ericetorum (Fallén, 1807)

Orthotylus (Litocoris) ericetorum corsicensis Wagner, 1956 (Sa)

Orthotylus (Litocoris) ericetorum ericetorum (Fallén, 1807) (N)

Orthotylus (Litocoris) stysi Koziskova, 1967 (S)

Orthotylus (Melanotrichus) Reuter, 1865

Orthotylus (Melanotrichus) calichi Tamanini, 1980 (Sa)

Orthotylus (Melanotrichus) curvipennis Reuter, 1875 (Si)

Orthotylus (Melanotrichus) divisus Linnavuori, 1961 (Si, Sa)

Orthotylus (Melanotrichus) flavosparsus (C. Sahlberg, 1842) (N, S, Si, Sa)

Orthotylus (Melanotrichus) minutus Jakovlev, 1877 (S, Si)

Orthotylus (Melanotrichus) moncreaffi (Douglas & Scott, 1874) (N, S, Si, Sa)

Orthotylus (Melanotrichus) palustris Reuter, 1888 (N, S, Si, Sa)

Orthotylus (Melanotrichus) parvulus Reuter, 1879 (S)

Orthotylus (Melanotrichus) roseiceps Wagner, 1968 (Si)

Orthotylus (Melanotrichus) rubidus (Puton, 1874) (*)

Orthotylus (Melanotrichus) salsolae Reuter, 1875 (Si)

Orthotylus (Melanotrichus) schoberiae Reuter, 1876 (S)

Orthotylus (Neomecomma) Southwood, 1953

Orthotylus (Neomecomma) bilineatus (Fallén, 1807) (N, S)

Orthotylus (Neopachylops) Wagner, 1956

Orthotylus (Neopachylops) adenocarpi (Perris, 1857) (*)

Orthotylus (Neopachylops) adenocarpi adenocarpi (Perris, 1857) (N?)

Orthotylus (Neopachylops) beieri (Wagner, 1942) (N, S?)

Orthotylus (Neopachylops) concolor (Kirschbaum, 1856) (N, S)

Orthotylus (Neopachylops) virescens (Douglas & Scott, 1865) (N, S, Si, Sa)

Orthotylus (Orthotylus) Fieber, 1858

Orthotylus (Orthotylus) caprai Wagner, 1955 (Sa) (E)

Orthotylus (Orthotylus) flavinervis (Kirschbaum, 1856) (N, S)

Orthotylus (Orthotylus) interpositus Schmidt, 1938 (N)

Orthotylus (Orthotylus) marginalis Reuter, 1884 (N, S, Si)

Orthotylus (Orthotylus) nassatus (Fabricius, 1787) (Si)

Orthotylus (Orthotylus) obscurus Reuter, 1875 (S)
Orthotylus (Orthotylus) prasinus (Fallén, 1829) (N, S)
Orthotylus (Orthotylus) sicilianus Wagner, 1954 (Si) (E)
Orthotylus (Orthotylus) tenellus (Fallén, 1807) (N, S, Si)
Orthotylus (Orthotylus) viridinervis (Kirschbaum, 1856) (N, S)

Orthotylus (Pinocapsus) Southwood, 1953

Orthotylus (Pinocapsus) fuscescens (Kirschbaum, 1856) (N)

Pachylops Fieber, 1858

Pachylops bicolor (Douglas & Scott, 1877) (N?, S)
Pachylops prasinus (Fieber, 1861) (N, S, Si)

Platycranus (Genistocapsus) Wagner, 1957

Platycranus (Genistocapsus) concii Tamanini, 1987 (N) (E?)
Platycranus (Genistocapsus) metriorrhynchus Reuter, 1883 (N)
Platycranus (Genistocapsus) pictus Wagner, 1963 (Si, Sa)

Platycranus (Platycranus) Fieber, 1870

Platycranus (Platycranus) erberi Fieber, 1870 (N, S, Si, Sa)
Platycranus (Platycranus) hartigi Wagner, 1951 (S, Si) (E)
Platycranus (Platycranus) putoni Reuter, 1879 (Si)

Pseudoloxops Kirkaldy, 1905

Pseudoloxops coccineus (Meyer-Dür, 1843) (N, S, Si)

Reuteria Puton, 1875

Reuteria marqueti Puton, 1875 (N, S, Si)

Pilophorus Hahn, 1825

Pilophorus cinnamopterus (Kirschbaum, 1856) (N, S, Si, Sa)
Pilophorus clavatus (Linnaeus, 1767) (N, S, Si, Sa)
Pilophorus confusus (Kirschbaum, 1856) (N, S)
Pilophorus perplexus Douglas & Scott, 1875 (N, S, Si, Sa)

Amblytylus Fieber, 1858

Amblytylus brevicollis Fieber, 1858 (N, S, Si, Sa)
Amblytylus jani Fieber, 1858 (S, Sa)
Amblytylus nasutus (Kirschbaum, 1856) (N, S)
Amblytylus scutellaris Horváth, 1905 (Si)

Amblytylus tarsalis Reuter, 1894 (N, S, Si, Sa)

Asciodema Reuter, 1878

Asciodema obsoletum (Fieber, 1864) (S, Si)

Asthenarius Kerzhner, 1962

Asthenarius nigripilis Reuter, 1882 (N?)

Asthenarius ocularis (Mulsant & Rey, 1852) (N, S)

Atomoscelis Reuter, 1875

Atomoscelis atriplicis Wagner, 1965 (Si) (*)

Atomoscelis galvagnii Tamanini, 1978 (Si, Sa) (E)

Atomoscelis onustus (Fieber, 1861) (N)

Atractotomus Fieber, 1858

Atractotomus brunomassai Carapezza, 1982 (S)

Atractotomus kolenatii (Flor, 1860) (N?) (*)

Atractotomus magnicornis (Fallén, 1807) (N, S)

Atractotomus mali (Meyer-Dür, 1843) (N, S)

Atractotomus marcoi Carapezza, 1982 (Si) (E)

Atractotomus rhodani Fieber, 1861 (N)

Auchenocrepis Fieber, 1858

Auchenocrepis alboscutellata Puton, 1874 (Si) (*)

Auchenocrepis minutissima (Rambur, 1842) (S, Si, Sa)

Camptotylus Fieber, 1861

Camptotylus yersini (Mulsant & Rey, 1856) (N) (*)

Campylomma Reuter, 1878

Campylomma annulicornis (Signoret, 1865) (N, S, Sa)

Campylomma diversicornis Reuter, 1878 (S?)

Campylomma nicolasi Reuter, 1883 (N, S, Si)

Campylomma novaki Wagner, 1952 (Si, Sa)

Campylomma oertzeni Reuter, 1888 (Sa)

Campylomma vendicarina Carapezza, 1991 (Si) (E)

Campylomma verbasci (Meyer-Dür, 1843) (N, S, Si, Sa)

Campylomma viticis Lindberg, 1948 (S, Si)

Chlamydatus (Attus) Hahn, 1832

Chlamydatius (Attus) pulicarius (Fallén, 1807) (N, S)
Chlamydatius (Attus) pullus Reuter, 1870 (N, S)

Chlamydatius (Chlamydatius) Curtis, 1833

Chlamydatius (Chlamydatius) saltitans (Fallén, 1807) (N?)

Chlamydatius (Eurymerocoris) Kirschbaum, 1856

Chlamydatius (Eurymerocoris) evanescens (Boheman, 1852) (N, S)

Chlorillus Kerzhner, 1962

Chlorillus alpinus (Reuter, 1875) (N, S)

Chrysochnoodes Reuter, 1901

Chrysochnoodes bolognai Carapezza, 1994 (S)

Compsilodon (Apsinthophylus) Wagner, 1965

Compsilodon (Apsinthophylus) absinthii (Scott, 1870) (N, Si?)
Compsilodon (Apsinthophylus) atomosum (Reuter, 1878) (N) (*)

Compsilodon (Chamaeliops) Wagner, 1967

Compsilodon (Chamaeliops) crotchii (Scott, 1870) (*)

Compsilodon (Coniortodes) Wagner, 1952

Compsilodon (Coniortodes) salicellum (Herrich-Schäffer, 1841) (N, S)

Conostethus Fieber, 1858

Conostethus roseus (Fallén, 1807) (Si)
Conostethus venustus (Fieber, 1859)
Conostethus venustus venustus (Fieber, 1859) (S, Si, Sa)

Criocoris Fieber, 1858

Criocoris crassicornis (Hahn, 1834) (N, S, Si)
Criocoris nigripes Fieber, 1861 (N, S)
Criocoris piceicornis Wagner, 1950 (N)
Criocoris sulcicornis (Kirschbaum, 1856) (N, S)

Hadrophyes Puton, 1874

Hadrophyes sulphurella Puton, 1874 (Si, Sa)

Harpocera Curtis, 1838

Harpocera thoracica (Fallén, 1807) (N, S, Si)

Heterocapillus Wagner, 1960

Heterocapillus nitidus (Horváth, 1905) (Si)

Heterocapillus perpusillus Wagner, 1960 (S, Sa)

Heterocapillus tigripes (Mulsant, 1852) (N, S)

Hoplomachus Fieber, 1858

Hoplomachus thunbergii (Fallén, 1807) (N, S)

Icodema Reuter, 1875

Icodema infuscatum (Fieber, 1861) (N)

Liviopsallus Carapezza, 1982

Liviopsallus tamaninii Carapezza, 1982 (Si) (E)

Lopus Hahn, 1833

Lopus decolor (Fallén, 1807)

Lopus decolor palliatus Perris, 1857 (N, S)

Macrotylus (Alloeonycha) Reuter, 1904

Macrotylus (Alloeonycha) atricapillus (Scott, 1872) (N, S, Si, Sa)

Macrotylus (Alloeonycha) horvathi Reuter, 1876 (N, S, Si, Sa)

Macrotylus (Alloeonycha) interpositus Wagner, 1951 (N, S, Si, Sa)

Macrotylus (Alloeonycha) mayri (Reuter, 1904) (S?)

Macrotylus (Alloeonycha) nigricornis Fieber, 1864 (S, Si)

Macrotylus (Alloeonycha) paykullii (Fallén, 1807) (N, S, Si, Sa)

Macrotylus (Alloeonycha) solitarius (Meyer-Dür, 1843) (N?)

Macrotylus (Macrotylus) Fieber, 1858

Macrotylus (Macrotylus) herrichi (Reuter, 1873) (N, S)

Macrotylus (Macrotylus) quadrilineatus (Schrank, 1785) (N, S)

Malacotes Reuter, 1878

Malacotes abeillei Ribaut, 1932 (Si)

Malacotes mulsanti Reuter, 1878 (Si)

Megalocoleus Reuter, 1890

Megalocoleus aurantiacus (Fieber, 1858) (S, Si, Sa)
Megalocoleus dissimilis (Reuter, 1876) (N)
Megalocoleus hungaricus Wagner, 1944 (Sa?)
Megalocoleus longirostris (Fieber, 1861) (Sa?)
Megalocoleus lunula (Fieber, 1861) (S, Si, Sa)
Megalocoleus mellai (Reuter, 1879) (N)
Megalocoleus molliculus (Fallén, 1807) (N, S, Si)
Megalocoleus naso (Reuter, 1879) (S, Sa)
Megalocoleus ocrensis Wagner, 1973 (S)
Megalocoleus pericarti Linnavuori, 1970 (S)
Megalocoleus pilosus (Schrank, 1801) (N, S, Sa)
Megalocoleus ragusai (Reuter, 1890) (Si) (E)
Megalocoleus servadeii Wagner, 1953 (Sa) (E)
Megalocoleus signoreti (Reuter, 1879) (Si, Sa)

Megalodactylus Fieber, 1858

Megalodactylus macularubra (Mulsant & Rey, 1852) (N, S, Si, Sa)

Moissonia Reuter, 1894

Moissonia punctata (Fieber, 1861) (Si)

Monosynamma Scott, 1864

Monosynamma bohemanni (Fallén, 1829) (N, S)

Nasocoris Reuter, 1879

Nasocoris platycranoides Montandon, 1890 (Sa)
Nasocoris psyche Linnavuori, 1968 (Sa) (E)

Nigrocapillocoris Stichel, 1956

Nigrocapillocoris ochraceus (Scott, 1872) (S, Si)

Oncotylus (Cylindromelus) Fieber, 1861

Oncotylus (Cylindromelus) setulosus (Herrich-Schäffer, 1837) (N)

Oncotylus (Oncotylus) Fieber, 1858

Oncotylus (Oncotylus) nigricornis Saunders, 1876 (S, Si, Sa)
Oncotylus (Oncotylus) viridiflavus (Goeze, 1778)
Oncotylus (Oncotylus) viridiflavus viridiflavus (Goeze, 1778) (N, S)

Orthonotus Stephens, 1829

Orthonotus cylindricollis (A. Costa, 1853) (N, S)

Orthonotus rufifrons (Fallén, 1807) (N)

Pachyxyphus Fieber, 1858

Pachyxyphus lineellus (Mulsant, 1852) (N, S, Si, Sa)

Parachlorillus Wagner, 1964

Parachlorillus spilotus (Fieber, 1858) (Si, Sa)

Parapsallus Wagner, 1952

Parapsallus vitellinus (Scholtz, 1846) (N)

Pastocoris Reuter, 1879

Pastocoris putoni (Reuter, 1875) (Si)

Phoenicocoris Reuter, 1875

Phoenicocoris modestus (Meyer-Dür, 1843) (N?) (*)

Phoenicocoris obscurellus (Fallén, 1829) (N)

Phylus (Gnostus) Fieber, 1858

Phylus (Gnostus) plagiatus (Herrich-Schäffer, 1835) (N)

Phylus (Phylus) Hahn, 1831

Phylus (Phylus) coryli (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)

Phylus (Phylus) melanocephalus (Linnaeus, 1767) (N, S)

Placochilus Fieber, 1858

Placochilus seladonicus (Fallén, 1807)

Placochilus seladonicus seladonicus (Fallén, 1807) (N, S, Si, Sa)

Plagiognathus (Plagiognathus) Fieber, 1858

Plagiognathus (Plagiognathus) arbustorum (Fabricius, 1794) (N, S, Si, Sa)

Plagiognathus (Plagiognathus) bipunctatus Reuter, 1883 (N, S, Si)

Plagiognathus (Plagiognathus) chrysanthemi (Wolff, 1864) (N, S, Si)

Plagiognathus (Plagiognathus) fulvipennis (Kirschbaum, 1856) (N, S, Si, Sa)

Plagiognathus (Plagiognathus) plagiatus (Reuter, 1876) (N?)

***Plagiognathus (Poliopterus)* Wagner, 1949**

Plagiognathus (Poliopterus) albipennis (Fallén, 1829) (N, S, Sa)
Plagiognathus (Poliopterus) arenicola Wagner, 1941 (N)
Plagiognathus (Poliopterus) collinus Wagner, 1941 (N?)
Plagiognathus (Poliopterus) flavipes Reuter, 1875 (N?, Si, Sa)
Plagiognathus (Poliopterus) gracilis Wagner, 1956 (N)
Plagiognathus (Poliopterus) ovatulus Wagner, 1952 (S) (*)
Plagiognathus (Poliopterus) servadeii Wagner, 1974 (N) (E) (*)
Plagiognathus (Poliopterus) tomentosus Reuter, 1888 (S, Si)

***Plesiodema* Reuter, 1875**

Plesiodema pinetellum (Zetterstedt, 1859) (N)

***Psallus (Apocremnus)* Fieber, 1858**

Psallus (Apocremnus) ancorifer Fieber, 1858
Psallus (Apocremnus) ancorifer ancorifer Fieber, 1858 (N, S, Si, Sa)
Psallus (Apocremnus) betuleti (Fallén, 1829)
Psallus (Apocremnus) betuleti montanus Josifov, 1973 (N, Si)
Psallus (Apocremnus) hartigi Wagner, 1970 (S, Si) (E)
Psallus (Apocremnus) sículus Reuter, 1875 (Si)

***Psallus (Hylopsallus)* Wagner, 1952**

Psallus (Hylopsallus) assimilis Stichel, 1956 (N)
Psallus (Hylopsallus) variabilis (Fallén, 1807) (N?, S?, Si?) (*)
Psallus (Hylopsallus) wagneri Ossiannilsson, 1953 (N, S)

***Psallus (Illops)* Stichel, 1958**

Psallus (Illops) puncticollis (Fieber, 1870) (N?)

***Psallus (Mesopsallus)* Wagner, 1970**

Psallus (Mesopsallus) ambiguus (Fallén, 1807) (N, Si)
Psallus (Mesopsallus) pseudambiguus Wagner, 1970 (S) (E)

***Psallus (Phylidea)* Reuter, 1899**

Psallus (Phylidea) henschi Reuter, 1888 (N, S, Si)
Psallus (Phylidea) quercus (Kirschbaum, 1856) (N, S)

***Psallus (Pityopsallus)* Wagner, 1951**

Psallus (Pityopsallus) lapponicus Reuter, 1874 (N?) (*)
Psallus (Pityopsallus) luridus Reuter, 1878 (N)

Psallus (Pityopsallus) piceae (Reuter, 1878) (N)
Psallus (Pityopsallus) pinicola Reuter, 1875 (N)
Psallus (Pityopsallus) vittatus Fieber, 1861 (N)

Psallus (Psallus) Fieber, 1858

Psallus (Psallus) aetnicola Wagner, 1954 (S, Si)
Psallus (Psallus) albicinctus (Kirschbaum, 1856) (N?) (*)
Psallus (Psallus) anaemicus Seidenstücker, 1966 (N, S, Si)
Psallus (Psallus) aurora (Mulsant, 1852) (S?) (*)
Psallus (Psallus) confusus Rieger, 1981 (N)
Psallus (Psallus) cruentatus (Mulsant, 1852) (N)
Psallus (Psallus) falleni Reuter, 1883 (N)
Psallus (Psallus) flavellus Stichel, 1933 (*)
Psallus (Psallus) haematodes (Gmelin, 1788) (N, S, Sa)
Psallus (Psallus) helenae Josifov, 1969 (N, S, Si)
Psallus (Psallus) lepidus Fieber, 1858 (N)
Psallus (Psallus) lucanicus Wagner, 1968 (N, S, Si)
Psallus (Psallus) mollis (Mulsant, 1852) (N, Si)
Psallus (Psallus) pardalis Seidenstücker, 1966 (N, S, Si)
Psallus (Psallus) punctulatus Puton, 1874 (S, Si)
Psallus (Psallus) varians (Herrich-Schäffer, 1841) (*)
Psallus (Psallus) varians cornutus Wagner, 1943 (Si)
Psallus (Psallus) varians varians (Herrich-Schäffer, 1841) (N, S, Si, Sa)

Salicarius Kerzhner, 1962

Salicarius atlanticus (Wagner, 1963) (Sa)
Salicarius pusillus (Reuter, 1887) (N, S, Si, Sa) (E)
Salicarius roseri (Herrich-Schäffer, 1838) (N, S)

Stenoparia Fieber, 1870

Stenoparia putoni Fieber, 1870 (Si, Sa)

Sthenarus Fieber, 1858

Sthenarus rotermundi (Scholtz, 1846) (N, S)

Thermocoris Puton, 1875

Thermocoris munieri Puton, 1875 (S, Si)

Tinicephalus Fieber, 1858

Tinicephalus discrepans Fieber, 1858 (Si) (*)
Tinicephalus flavopilosus Reuter, 1879 (S, Sa)
Tinicephalus hortulanus (Meyer-Dür, 1843) (N, S, Sa)

Tinicephalus rubiginosus Fieber, 1861 (N?)

Tragiscocoris Fieber, 1861

Tragiscocoris fieberi (Fieber, 1858) (S, Si, Sa)

Tuponia (Chlorotuponia) Wagner & Weber, 1964

Tuponia (Chlorotuponia) brevirostris Reuter, 1883 (N, S, Si, Sa)

Tuponia (Chlorotuponia) dalmatina Wagner, 1955 (S?)

Tuponia (Chlorotuponia) hartigi Wagner, 1955 (Si)

Tuponia (Chlorotuponia) hippophaes (Fieber, 1861) (*)

Tuponia (Chlorotuponia) hippophaes hippophaes (Fieber, 1861) (N, S, Si, Sa)

Tuponia (Chlorotuponia) hippophaes pradassiensis Tamanini, 1964 (N)

Tuponia (Chlorotuponia) hippophaes liparensis Tamanini, 1973 (Si)

Tuponia (Chlorotuponia) mimeuri Wagner, 1958 (Si) (*)

Tuponia (Chlorotuponia) unicolor (Scott, 1872) (N, S, Si, Sa)

Tuponia (Tuponia) Reuter, 1875

Tuponia (Tuponia) arcufera Reuter, 1879 (N)

Tuponia (Tuponia) carayoni Wagner, 1955 (S?)

Tuponia (Tuponia) lethierryi (Reuter, 1875) (N, Si)

Tuponia (Tuponia) mixticolor (A. Costa, 1862) (N, S)

Tuponia (Tuponia) tamaricis (Perris, 1857) (N, S, Si)

Tytthus Fieber, 1864

Tytthus parviceps (Reuter, 1890) (S)

Note

Deraeocoris (Camptobrochis) pallens: Presenza dubbia in Italia.

Deraeocoris (Deraeocoris) cardinalis: Specie di incerta validità.

Deraeocoris (Deraeocoris) rutilus: Presenza dubbia, marginale sul confine orientale.

Dicyphus (Brachyceroea) annulatus: Presenza dubbia in Italia.

Dicyphus (Dicyphus) constrictus: Presenza dubbia in Italia.

Dicyphus (Dicyphus) hyalinipennis: Presente in Si solo nelle Isole Egadi.

Macrolophus glaucescens: Presenza dubbia in Italia.

Mimocoris coarctatus: Presenza dubbia in Italia.

Dimorphocoris saulii: Presenza dubbia, marginale sul confine orientale.

Halticus puncticollis: Presenza dubbia, marginale sul confine orientale.

Brachycoleus triangularis: Presenza dubbia in Italia.

Calocoris (Calocoris) norvegicus: La ssp. vittiger presente in N solo nell'Emilia.

Calocoris (Calocoris) sulphureus: Presenza dubbia in Italia.

Calocoris (Closterotomus) vicinus: Presenza dubbia, marginale sul confine orientale.

Calocoris (Trichocalocoris) pilicornis: Presenza dubbia in Italia.

Dichrooscytus gustavi: In S probabilmente nell'Appennino Toscano.

Dolichomiris linearis: Presenza dubbia in Italia.
Miridius pallidus: Presenza dubbia, marginale sul confine orientale.
Phytocoris (Phytocoris) reuteri: Presente in N solo nella Liguria.
Phytocoris (Phytocoris) setiger: Presenza dubbia, marginale sul confine orientale.
Stenodema (Stenodema) curticollis: Specie di incerta validità.
Teratocoris antennatus: In S presente solo nell'Isola del Giglio.
Trigonotylus elymi: Presenza dubbia in Italia.
Cyrtorhinus caricis: Presenza dubbia in Italia.
Globiceps (Globiceps) novaki: Presenza dubbia, marginale sul confine orientale.
Heterocordylus (Bothrocranium) erythrophthalmus: Presenza dubbia, marginale sul confine orientale.
Heterocordylus (Heterocordylus) farinosus: Presenza dubbia, marginale sul confine orientale.
Heterotoma diversipes: In S presente solo nell'Isola di Capraia.
Orthotylus (Melanotrichus) rubidus: Presenza dubbia in Italia.
Orthotylus (Neopachylops) adenocarpis: Presenza dubbia in Italia.
Atomoscelis atriplicis: In Si presente solo nell'Isola di Pantelleria.
Atractotomus kolenatii: Presenza dubbia, marginale sul confine orientale.
Auchenocrepis alboscuteolata: In Si presente solo nell'Isola di Pantelleria.
Camptotylus yersini: In N presente solo nel litorale emiliano.
Compsilodon (Apsinthophylus) atomosum: In N presente solo in alta Val Venosta.
Compsilodon (Chamaeliops) crotchi: Presenza dubbia in Italia.
Phoenicocoris modestus: Presenza dubbia in Italia.
Plagiognathus (Poliopterus) ovatulus: Specie di incerta validità.
Plagiognathus (Poliopterus) servadeii: Specie di incerta validità.
Psallus (Hypopsallus) variabilis: Presenza dubbia in Italia.
Psallus (Pityopsallus) lapponicus: Presenza dubbia in Italia.
Psallus (Psallus) albicinctus: Presenza dubbia in Italia.
Psallus (Psallus) aurora: Presenza dubbia in Italia.
Psallus (Psallus) flavellus: Presenza dubbia in Italia.
Psallus (Psallus) varians: La ssp. *cornutus* presente in Si solo nell'Isola di Pantelleria.
Tinicephalus discrepans: In Si presente solo nelle Isole Lipari.
Tuponia (Chlorotuponia) hippophaes: La ssp. *pradassiensis* presente solo nelle Alpi Orientali; la ssp. *liparensis* in Si presente solo nelle Isole Lipari.
Tuponia (Chlorotuponia) mimeuri: In Si presente solo nell'Isola di Pantelleria.

Phymatidae

Phymata (Phymata) Latreille, 1802

Phymata (Phymata) crassipes (Fabricius, 1775) (N, S, Si)

Reduviidae

Empicoris Wolff, 1811

Empicoris baerensprungi (Dohrn, 1863) (S)

Empicoris brevispinus (Puton, 1889) (S, Si, Sa)
Empicoris culiciformis (De Geer, 1773) (N, S, Si)
Empicoris rubromaculatus (Blackburn, 1889) (N)
Empicoris vagabunda (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
Empicoris xambeui (Montandon, 1885) (N)

Gardena Dohrn, 1860

Gardena insignis Horváth, 1887 (N, S)

Ischnonyctes Stål, 1874

Ischnonyctes barbarus (Lucas, 1849) (S, Si, Sa)

Metapterus A. Costa, 1862

Metapterus caspicus (Dohrn, 1863) (N, S)
Metapterus linearis A. Costa, 1862 (N, S)

Ploiaria Scopoli, 1786

Ploiaria chilensis (Philippi, 1862) (N?) (*)
Ploiaria domestica Scopoli, 1786 (N, S, Si, Sa)

Schidium Bergroth, 1916

Schidium palinuri Dioli, 1989 (S)

Stenolemus Signoret, 1858

Stenolemus novaki Horváth, 1888 (N, S, Si)

Tinna Dohrn, 1859

Tinna grassator (Puton, 1874) (*)

Coranus Curtis, 1833

Coranus griseus (Rossi, 1790) (N, S, Si, Sa)
Coranus kerzhneri P.V. Putshkov, 1982 (N, S, Si, Sa)
Coranus niger (Rambur, 1840) (Si, Sa)
Coranus subapterus (De Geer, 1773) (N, S, Si, Sa)
Coranus tuberculifer Reuter, 1881 (N, S)

Rhynocoris Hahn, 1833

Rhynocoris annulatus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si?)
Rhynocoris erythropus (Linnaeus, 1767)

Rhynocoris erythropus erythropus (Linnaeus, 1767) (N, S, Si, Sa)
Rhynocoris iracundus (Poda, 1761) (N, S, Si, Sa?)
Rhynocoris niger (Herrich-Schäffer, 1842) (N?)
Rhynocoris rubricus (Germar, 1814) (N, S, Si)

***Sphedanolestes* Stål, 1866**

Sphedanolestes argenteolineatus (A. Costa, 1883) (N, S, Si, Sa)
Sphedanolestes cingulatus (Fieber, 1864) (N, S, Si)
Sphedanolestes lividigaster (Mulsant & Rey, 1852) (N, Si?, Sa)
Sphedanolestes sanguineus (Fabricius, 1794) (N, Si, Sa)

***Ectomocoris* Mayr, 1865**

Ectomocoris chiragra (Fabricius, 1803) (N)
Ectomocoris melanogaster (Fieber, 1861) (Si)
Ectomocoris ululans (Rossi, 1790) (N, S, Si, Sa)

***Peirates (Cleptocoris)* Stål, 1866**

Peirates (Cleptocoris) strepitans Rambur, 1839 (N, S, Si, Sa)

***Peirates (Peirates)* Serville, 1831**

Peirates (Peirates) hybridus (Scopoli, 1763) (N, S, Si, Sa)
Peirates (Peirates) stridulus (Fabricius, 1787) (N?, S?, Si?, Sa)

***Holotrichius* Burmeister, 1835**

Holotrichius denudatus A. Costa, 1841 (N, S, Si)

***Pasira* Stål, 1859**

Pasira basiptera Stål, 1859 (N, S, Sa)

***Reduvius* Fabricius, 1775**

Reduvius minutus (Reuter, 1881) (Si)
Reduvius pallipes (Klug, 1830) (Si)
Reduvius personatus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
Reduvius tabidus (Klug, 1830) (Si)
Reduvius villosus Fabricius, 1794 (Si?)

***Polytoxus* Spinola, 1837**

Polytoxus sanguineus (A. Costa, 1842) (S, Si, Sa)
Polytoxus siculus (A. Costa, 1841) (S, Si, Sa)

Oncocephalus Klug, 1830

Oncocephalus notatus (Klug, 1830) (N?, S?, Si?, Sa)

Oncocephalus pilicornis (Reuter, 1882) (N, S, Si, Sa)

Oncocephalus squalidus (Rossi, 1790) (N, S, Si, Sa)

Pygolampis Germar, 1817

Pygolampis bidentata (Goeze, 1778) (N, S, Si, Sa?)

Sastrapada Amyot & Serville, 1843

Sastrapada baerensprungi (Stål, 1859) (N, S, Si, Sa)

Sastrapada subaptera (Garbiglietti, 1869) (N) (E)

Note

Ploiaria chilensis: Presenza attuale da confermare.

Tinna grassator: Citazione generica per l'Italia, da confermare.

Tingidae

Cantacader Amyot & Serville, 1843

Cantacader quadricornis (Le Peletier & Serville, 1828) (N, S)

Acalypta Westwood, 1840

Acalypta carinata (Panzer, 1806) (N)

Acalypta finitima (Puton, 1884) (N, S)

Acalypta gracilis (Fieber, 1844) (N, S, Si)

Acalypta hellenica Reuter, 1888 (N, S, Si, Sa)

Acalypta marginata (Wolff, 1804) (N, S)

Acalypta musci (Schrank, 1781) (N, S)

Acalypta nigrina (Fallén, 1807) (N)

Acalypta parvula (Fallén, 1807) (N, S, Sa?)

Acalypta visolensis Péricart, 1976 (*)

Acalypta visolensis visolensis Péricart, 1976 (N)

Acalypta visolensis marina Seriani, 1989 (N)

Agramma Stephens, 1829

Agramma atricapillum (Spinola, 1837) (N, S, Si, Sa)

Agramma laetum (Fallén, 1807) (N, S, Sa?)

Agramma minutum Horváth, 1874 (N)

Agramma nigrum Fieber, 1844 (Si, Sa)

Agramma ruficorne (Germar, 1835) (N?)

Campylosteira Fieber, 1844

Campylosteira bosnica Horváth, 1892 (S)
Campylosteira orientalis Horváth, 1881 (N, S)
Campylosteira serena Horváth, 1902 (Sa?)
Campylosteira verna (Fallén, 1826) (N, S)

Catoplatus Spinola, 1837

Catoplatus carthusianus (Goeze, 1778) (N, S, Si, Sa)
Catoplatus fabricii (Stål, 1868) (N, S)
Catoplatus horvathi (Puton, 1879) (N, S)
Catoplatus nigriceps Horváth, 1905 (N)
Catoplatus olivieri (Puton, 1873) (S, Sa)

Copium Thunberg, 1822

Copium clavicorne (Linnaeus, 1758)
 Copium clavicorne clavicorne (Linnaeus, 1758) (N, S, Sa?)
 Copium clavicorne siculum Tamanini, 1974 (Si)
Copium teucarii (Host, 1788) (*)
 Copium teucarii intermedium (Rey, 1888) (S, Sa)
 Copium teucarii teucarii (Host, 1788) (N, S)

Corythucha Stål, 1873

Corythucha ciliata (Say, 1832) (N, S, Si) (*)

Derephysia (Derephysia) Spinola, 1837

Derephysia (Derephysia) foliacea (Fallén, 1807) (N, S, Si, Sa)
Derephysia (Derephysia) sinuaticollis Puton, 1879 (N, S)

Dictyla Stål, 1874

Dictyla convergens (Herrich-Schäffer, 1835) (N, S)
Dictyla echii (Schrank, 1782) (N, S, Si, Sa)
Dictyla humuli (Fabricius, 1794) (N, S, Si)
Dictyla lupuli (Herrich-Schäffer, 1837) (N)
Dictyla nassata (Puton, 1874) (N, S, Si, Sa)
Dictyla rotundata (Herrich-Schäffer, 1835) (N?)

Dictyonota Curtis, 1827

Dictyonota albipennis Bärensprung, 1858 (N?, Si, Sa)
Dictyonota fuliginosa A. Costa, 1853 (S) (*)
Dictyonota marmorea Bärensprung, 1858 (N, S, Si)

Dictyonota phoenicea Seidenstücker, 1963 (S, Si)
Dictyonota strichnocera Fieber, 1844 (N, S, Si)

Galeatus Curtis, 1833

Galeatus affinis (Herrich-Schäffer, 1835) (N)
Galeatus maculatus (Herrich-Schäffer, 1838) (N)
Galeatus major Puton, 1886 (S, Si)
Galeatus spinifrons (Fallén, 1807) (N)

Kalama Puton in Lethierry & Puton, 1876

Kalama aethiops (Horváth, 1905) (N, Sa)
Kalama henschi (Puton, 1892) (N)
Kalama tricornis (Schrank, 1801) (N, S, Si, Sa)

Lasiacantha Stål, 1873

Lasiacantha capucina (Germar, 1836)
Lasiacantha capucina piligera (Garbiglietti, 1869) (N, S)
Lasiacantha gracilis (Herrich-Schäffer, 1830) (N)

Monosteira A. Costa, 1862

Monosteira unicastata (Mulsant & Rey, 1852) (N, S, Si, Sa)

Oncochila Stål, 1873

Oncochila scapularis (Fieber, 1844) (N)
Oncochila simplex (Herrich-Schäffer, 1830) (N)

Phaenotropis Horváth, 1906

Phaenotropis parvula (Signoret, 1865) (N, Sa)

Physatocheila Fieber, 1844

Physatocheila confinis Horváth, 1905 (N, S, Sa)
Physatocheila costata (Fabricius, 1794) (N, S)
Physatocheila dumetorum (Herrich-Schäffer, 1838) (N, S)
Physatocheila harwoodi China, 1936 (N, Si)
Physatocheila smreczynskii China, 1952 (N)

Stephanitis (Stephanitis) Stål, 1873

Stephanitis (Stephanitis) pyri (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa)

Tingis (Neolasiotropis) Wagner, 1961

Tingis (Neolasiotropis) marrubii Vallot, 1829 (N?, S, Sa)
Tingis (Neolasiotropis) pauperata (Puton, 1879) (S, Si)
Tingis (Neolasiotropis) pilosa Hummel, 1825 (N, S)

***Tingis (Tingis)* Fabricius, 1803**

Tingis (Tingis) ampliata (Herrich-Schäffer, 1838) (N)
Tingis (Tingis) angustata (Herrich-Schäffer, 1838) (S, Si, Sa)
Tingis (Tingis) auriculata (A. Costa, 1847) (N, S, Si, Sa)
Tingis (Tingis) cardui (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
Tingis (Tingis) crispata (Herrich-Schäffer, 1838) (N, S)
Tingis (Tingis) denudata Horváth, 1906 (Si)
Tingis (Tingis) grisea Germar, 1835 (S, Si)

***Tingis (Tropidocheila)* Fieber, 1844**

Tingis (Tropidocheila) ajugarum (Frey-Gessner, 1872) (N, S, Si)
Tingis (Tropidocheila) geniculata (Fieber, 1844) (N, S, Si, Sa)
Tingis (Tropidocheila) griseola (Puton, 1879) (N, S, Si, Sa)
Tingis (Tropidocheila) hellenica (Puton, 1877)
Tingis (Tropidocheila) hellenica hellenica (Puton, 1877) (S)
Tingis (Tropidocheila) liturata (Fieber, 1844) (Si)
Tingis (Tropidocheila) maculata (Herrich-Schäffer, 1838) (N, S?, Si?)
Tingis (Tropidocheila) ragusana (Fieber, 1861) (N, S, Si)
Tingis (Tropidocheila) reticulata Herrich-Schäffer, 1835 (N, S)
Tingis (Tropidocheila) trichonota (Puton, 1874) (S, Si?)

Note

Acalypta visolensis: Validità delle sottospecie da confermare.
Copium teucarii: Presenza in S solo a Capraia e Montecristo.
Corythucha ciliata: Specie nearctica introdotta recentemente in Italia.
Dictyonota fuliginosa: Mancano ritrovamenti certi posteriori alla descrizione.

Aradidae

***Aneurus* Curtis, 1825**

Aneurus avenius (Dufour, 1833)
Aneurus avenius avenius (Dufour, 1833) (N, S)
Aneurus laevis (Fabricius, 1775)
Aneurus laevis laevis (Fabricius, 1775) (N, S, Sa)

***Aradus* Fabricius, 1803**

Aradus aterrimus Fieber, 1864

Aradus aterrimus aterrimus Fieber, 1864 (N, S)
Aradus betulae (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
Aradus betulinus Fallén, 1829 (N)
Aradus brenskei Reuter, 1884 (S, Si, Sa)
Aradus cinnamomeus Panzer, 1806 (N, S)
Aradus conspicuus Herrich-Schäffer, 1835 (N, S, Si)
Aradus corticalis (Linnaeus, 1758) (N, S)
Aradus crenaticollis F. Sahlberg, 1848 (N)
Aradus depressus (Fabricius, 1794)
Aradus depressus depressus (Fabricius, 1794) (N, S, Si)
Aradus dissimilis A. Costa, 1847
Aradus dissimilis dissimilis A. Costa, 1847 (S, Si)
Aradus erosus Fallén, 1807 (N)
Aradus flavicornis Dalman, 1823 (S, Si, Sa)
Aradus frigidus Kiritshenko, 1913 (N, S)
Aradus krueperi Reuter, 1884 (N, S)
Aradus lugubris Fallén, 1807
Aradus lugubris lugubris Fallén, 1807 (N, Si)
Aradus pallescens Herrich-Schäffer, 1840 (N)
Aradus pictus Bärensprung, 1859 (N, S)
Aradus reuterianus Puton, 1875 (N)
Aradus ribauti Wagner, 1956 (N)
Aradus somcheticus Kiritshenko, 1913 (N, S)
Aradus versicolor Herrich-Schäffer, 1835 (N)

Quilnus Stål, 1873

Quilnus mediterraneus Heiss, 1989 (S) (E) (*)

Calisius Stål, 1860

Calisius ghilianii (A. Costa, 1864) (N, S, Sa)

Mezira Amyot & Serville, 1843

Mezira tremulae (Büttner in Germar, 1822) (S)

Note

Quilnus mediterraneus: Presenza in S solo a Montecristo.

Alydidae

Alydus Fabricius, 1803

Alydus calcaratus (Linnaeus, 1758) (*)
Alydus calcaratus calcaratus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)

Alydus calcaratus hirsutus Kolenati, 1845 (N)
Alydus rupestris Fieber, 1861 (N)

Camptopus Amyot & Serville, 1843

Camptopus lateralis (Germar, 1817) (N, S, Si, Sa)

Megalotomus Fieber, 1860

Megalotomus junceus (Scopoli, 1763) (N)

Sjostedtina Schouteden, 1912

Sjostedtina tangirica (Saunders, 1877) (S, Si)

Micrelytra Laporte, 1833

Micrelytra fossularum (Rossi, 1790) (N, S, Si, Sa)

Note

Alydus calcaratus: Validità delle sottospecie da confermare.

Coreidae

Centrocoris Kolenati, 1845

Centrocoris spiniger (Fabricius, 1781) (N, S, Si, Sa)

Centrocoris variegatus Kolenati, 1845 (N, S, Si, Sa)

Coreus Fabricius, 1794

Coreus marginatus (Linnaeus, 1758) (*)

Coreus marginatus marginatus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Enoplops Amyot & Serville, 1843

Enoplops scapha (Fabricius, 1794) (N, S, Si)

Gonocerus Berthold, 1827

Gonocerus acuteangulatus (Goeze, 1778) (N, S, Si, Sa)

Gonocerus imitator Reuter, 1891 (S, Sa)

Gonocerus insidiator (Fabricius, 1787) (N, S, Si, Sa)

Gonocerus juniperi Herrich-Schäffer, 1839 (N, S, Si, Sa)

Haploprocta Stål, 1872

Haploprocta sulcicornis (Fabricius, 1794)

Haploprocta sulcicornis sulcicornis (Fabricius, 1794) (N, S, Si, Sa)

Phyllomorpha Laporte, 1833

Phyllomorpha lacerata Herrich-Schäffer, 1835 (Si, Sa)

Phyllomorpha laciniata (Villers, 1789) (N, S, Si, Sa)

Prionotylus Fieber, 1860

Prionotylus brevicornis (Mulsant & Rey, 1852) (S, Si, Sa)

Spathocera Stein, 1860

Spathocera dalmanii (Schilling, 1829) (N, S)

Spathocera laticornis (Schilling, 1829) (N)

Spathocera lobata (Herrich-Schäffer, 1840) (N, S, Si, Sa)

Spathocera obscura (Germar, 1842) (Si)

Syromastus Berthold, 1827

Syromastus rhombeus (Linnaeus, 1767) (N, S, Si, Sa)

Anoplocerus Kiritshenko, 1926

Anoplocerus elevatus (Fieber, 1861) (S)

Anoplocerus lucasi (Puton, 1886) (S, Si)

Anoplocerus luteus (Fieber, 1861) (Si, Sa)

Arenocoris Hahn, 1834

Arenocoris fallenii (Schilling, 1829) (N, S, Si, Sa)

Arenocoris intermedius (Jakovlev, 1883) (Si)

Arenocoris waltlii (Herrich-Schäffer, 1834) (N, S, Si, Sa)

Bathysolen Fieber, 1860

Bathysolen nubilus (Fallén, 1807) (N, S)

Bothrostethus Fieber, 1860

Bothrostethus annulipes (A. Costa, 1847) (N, S, Si)

Ceraleptus A. Costa, 1847

Ceraleptus gracilicornis (Herrich-Schäffer, 1835) (N, S, Si, Sa)

Ceraleptus lividus Stein, 1858 (N, S, Si)

Ceraleptus obtusus (Brullé, 1839) (N, S, Si, Sa)

Coriomeris Westwood, 1842

Coriomeris affinis (Herrich-Schäffer, 1839) (N, S, Si, Sa)

Coriomeris alpinus (Horváth, 1895) (N, S, Si)

Coriomeris denticulatus (Scopoli, 1763) (N, S, Si, Sa)

Coriomeris hirticornis (Fabricius, 1794) (N, S, Si, Sa)

Coriomeris scabricornis (Panzer, 1809)

Coriomeris scabricornis scabricornis (Panzer, 1809) (N, S, Si)

Loxocnemis Fieber, 1860

Loxocnemis dentator (Fabricius, 1794) (N, S, Si, Sa)

Nemocoris F. Sahlberg, 1848

Nemocoris falleni F. Sahlberg, 1848 (N, Si)

Strobilotoma Fieber, 1860

Strobilotoma typhaecornis (Fabricius, 1803) (N, S, Si, Sa)

Ulmicola Kirkaldy, 1909

Ulmicola spinipes (Fallén, 1807) (N, S)

Note

Coreus marginatus: Validità della sottospecie da confermare.

Rhopalidae

Agraphopus Stål, 1872

Agraphopus lethierryi Stål, 1872 (N, S, Si, Sa)

Brachycarenum Fieber, 1860

Brachycarenum tigrinus (Schilling, 1829) (N, S, Si, Sa)

Chorosoma Curtis, 1830

Chorosoma schillingii (Schilling, 1829) (N, S, Si, Sa)

Corizus Fallén, 1814

Corizus hyoscyami (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
Corizus nigradorsum (Puton, 1874) (S, Si, Sa)

Liorhyssus Stål, 1870

Liorhyssus hyalinus (Fabricius, 1794) (N, S, Si, Sa)

Maccevethus Dallas, 1852

Maccevethus corsicus Signoret, 1862 (N, S, Si, Sa) (*)
Maccevethus errans (Fabricius, 1794)

Myrmus Hahn, 1832

Myrmus miriformis (Fallén, 1807)
Myrmus miriformis miriformis (Fallén, 1807) (N, S)

Rhopalus (Aeschyntelus) Stål, 1872

Rhopalus (Aeschyntelus) maculatus (Fieber, 1837) (*)
Rhopalus (Aeschyntelus) maculatus maculatus (Fieber, 1837) (N, S, Si)

Rhopalus (Rhopalus) Schilling, 1827

Rhopalus (Rhopalus) conspersus (Fieber, 1837) (N, S, Si?)
Rhopalus (Rhopalus) distinctus (Signoret, 1859) (N, S)
Rhopalus (Rhopalus) lepidus Fieber, 1861 (S, Si, Sa)
Rhopalus (Rhopalus) parumpunctatus Schilling, 1829 (N, S, Si, Sa)
Rhopalus (Rhopalus) rufus Schilling, 1829 (S, Si, Sa)
Rhopalus (Rhopalus) subrufus (Gmelin, 1790) (N, S, Si, Sa)

Stictopleurus Stål, 1872

Stictopleurus abutilon (Rossi, 1790) (N, S, Si, Sa)
Stictopleurus crassicornis (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
Stictopleurus pictus (Fieber, 1861) (N, S, Si, Sa)
Stictopleurus punctatonevrosus (Goeze, 1778) (N, S, Si, Sa)
Stictopleurus subtomentosus (Rey, 1888) (S, Si)

Note

Maccevethus corsicus: Presenza da confermare, genere rivisto recentemente.
Rhopalus (Aeschyntelus) maculatus: Validità della sottospecie da confermare.

Stenocephalidae

Dicranocephalus Hahn, 1826

Dicranocephalus agilis (Scopoli, 1763) (N, S, Si, Sa)
Dicranocephalus albipes (Fabricius, 1781) (N, S, Si, Sa)
Dicranocephalus marginicollis (Puton, 1881) (N, S, Si, Sa)
Dicranocephalus medius (Mulsant & Rey, 1871) (N, S)
Dicranocephalus setulosus (Ferrari, 1874) (N, S, Si, Sa)

Berytidae

Apoplymus Fieber, 1859

Apoplymus pectoralis Fieber, 1859 (N, S, Si, Sa)

***Berytinus* (*Berytinus*)** Kirkaldy, 1900

Berytinus (*Berytinus*) *clavipes* (Fabricius, 1775) (N, S, Si)
Berytinus (*Berytinus*) *hirticornis* (Brullé, 1835)
 Berytinus (*Berytinus*) *hirticornis hirticornis* (Brullé, 1835) (N, S)
 Berytinus (*Berytinus*) *hirticornis nigrolineatus* (Jakovlev, 1903) (S, Si)
 Berytinus (*Berytinus*) *hirticornis pilipes* (Puton, 1875) (S)
Berytinus (*Berytinus*) *minor* (Herrich-Schäffer, 1835) (N, S, Sa)

***Berytinus* (*Lizinus*)** Mulsant & Rey, 1870

Berytinus (*Lizinus*) *consimilis* (Horváth, 1885) (N, S)
Berytinus (*Lizinus*) *crassipes* (Herrich-Schäffer, 1835) (N, S?)
Berytinus (*Lizinus*) *distinguendus* (Ferrari, 1874) (N, S)
Berytinus (*Lizinus*) *geniculatus* (Horváth, 1885) (N, S, Si)
Berytinus (*Lizinus*) *montivagus* (Meyer-Dür, 1841) (N, S, Si, Sa)
Berytinus (*Lizinus*) *setipennis* (Saunders, 1876) (S, Si, Sa)
Berytinus (*Lizinus*) *signoreti* (Fieber, 1859) (N, S, Sa?)
Berytinus (*Lizinus*) *striola* (Ferrari, 1874) (N, S, Si, Sa)

Neides Latreille, 1802

Neides aduncus Fieber, 1859 (N, S, Si, Sa)
Neides tipularius (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Gampsocoris Fuss, 1852

Gampsocoris culicinus Seidenstücker, 1948
 Gampsocoris culicinus culicinus Seidenstücker, 1948 (N, S, Si)
Gampsocoris panorminus Seidenstücker, 1965 (Si)
Gampsocoris punctipes (Germar, 1822)
 Gampsocoris punctipes punctipes (Germar, 1822) (N, S, Si, Sa)

***Metacanthus* (*Cardopostethus*)** Fieber, 1859

Metacanthus (Cardopostethus) annulosus (Fieber, 1859) (S, Si, Sa)

Metacanthus (Metacanthus) A. Costa, 1847

Metacanthus (Metacanthus) meridionalis (A. Costa, 1843) (N, S, Si, Sa)

Metatropis Fieber, 1859

Metatropis rufescens (Herrich-Schäffer, 1835) (N, S)

Lygaeidae

Artheneis Spinola, 1837

Artheneis alutacea Fieber, 1861 (Si)

Artheneis foveolata Spinola, 1837 (S, Si, Sa)

Chilacis Fieber, 1864

Chilacis typhae (Perris, 1857) (N)

Holcocranum Fieber, 1860

Holcocranum saturejae (Kolenati, 1845) (S, Si, Sa)

Blissus Burmeister, 1835

Blissus hirtulus Burmeister, 1835 (Si?)

Dimorphopterus Stål, 1872

Dimorphopterus blissoides (Bärensprung, 1859) (N, S)

Dimorphopterus brachypterus (Rambur, 1839) (Si)

Dimorphopterus doriae (Ferrari, 1874) (N)

Dimorphopterus spinolae (Signoret, 1857) (N, S)

Ischnodemus Fieber, 1837

Ischnodemus genei (Spinola, 1837) (N, S, Si, Sa)

Ischnodemus quadratus Fieber, 1837 (N, S, Si, Sa)

Ischnodemus sabuleti (Fallén, 1826) (S?)

Cymodema Spinola, 1837

Cymodema tabida Spinola, 1837 (N?, S, Si, Sa)

Cymus Hahn, 1832

- Cymus aurescens* Distant, 1883 (N)
- Cymus claviculus* (Fallén, 1807) (N, S, Si, Sa)
- Cymus glandicolor* Hahn, 1832 (N, S, Si?, Sa?)
- Cymus melanocephalus* Fieber, 1861 (N, S, Si, Sa)

Geocoris (Geocoris) Fallén, 1814

- Geocoris (Geocoris) ater* (Fabricius, 1787) (N, S, Si, Sa)
- Geocoris (Geocoris) erytrops* (Dufour, 1857) (S)
- Geocoris (Geocoris) grylloides* (Linnaeus, 1761) (N, S)
- Geocoris (Geocoris) lapponicus* Zetterstedt, 1838 (N)
- Geocoris (Geocoris) lineola* (Rambur, 1839)
- Geocoris (Geocoris) lineola lineola* (Rambur, 1839) (N, S, Si, Sa)
- Geocoris (Geocoris) megacephalus* (Rossi, 1790) (N, S, Si, Sa)
- Geocoris (Geocoris) pallidipennis* (A. Costa, 1843) (N, S, Si)

Geocoris (Piocoris) Stål, 1872

- Geocoris (Piocoris) erythrocephala* (Le Peletier & Serville, 1825) (N, S, Si)

Stenophthalmicus A. Costa, 1875

- Stenophthalmicus fajoumensis* A. Costa, 1875 (Si)

Engistus Fieber, 1864

- Engistus boops* (Dufour, 1857)
- Engistus boops boops* (Dufour, 1857) (Si, Sa)

Henestaris Spinola, 1837

- Henestaris halophilus* (Burmeister, 1835) (N, S)
- Henestaris laticeps* (Curtis, 1836)
- Henestaris laticeps laticeps* (Curtis, 1836) (N, S, Si, Sa)

Heterogaster Schilling, 1829

- Heterogaster affinis* Herrich-Schäffer, 1835 (N, S, Si)
- Heterogaster artemisiae* Schilling, 1829 (N, S, Si)
- Heterogaster cathariae* (Geoffroy in Fourcroy, 1785)
- Heterogaster cathariae cathariae* (Geoffroy in Fourcroy, 1785) (N)
- Heterogaster urticae* (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa)

Platyplax Fieber, 1860

- Platyplax inermis* (Rambur, 1839) (N, S, Si, Sa)

Platyplax salviae (Schilling, 1829) (N, S)

Kleidocerys Stephens, 1829

Kleidocerys ericae (Horváth, 1909) (N, S, Si, Sa)

Kleidocerys resedae (Panzer, 1797) (N, S)

Kleidocerys truncatulus (Walker, 1872) (S)

Apterola (Apterola) Mulsant & Rey, 1866

Apterola (Apterola) kunckeli Mulsant & Rey, 1866 (S, Si, Sa)

Arocatus Spinola, 1837

Arocatus longiceps Stål, 1872 (N, S, Si)

Arocatus melanocephalus (Fabricius, 1798) (N, S, Si, Sa)

Arocatus roeselii (Schilling, 1829) (N, S, Sa?)

Caenocoris (Caenocoris) Fieber, 1860

Caenocoris (Caenocoris) nerii (Germar, 1847) (S, Si)

Graptostethus Stål, 1868

Graptostethus servus (Fabricius, 1787) (S, Si, Sa)

Horvathiolus Josifov, 1965

Horvathiolus gibbicollis (A. Costa, 1882) (S, Si, Sa)

Horvathiolus superbus (Pollich, 1781) (N, S, Si, Sa)

Horvathiolus syriacus (Reuter, 1885) (Sa)

Lygaeosoma Spinola, 1837

Lygaeosoma sardeum Spinola, 1837 (*)

Lygaeosoma sardeum sardeum Spinola, 1837 (N, S, Si, Sa)

Lygaeus Fabricius, 1794

Lygaeus creticus Lucas, 1854 (N?, S, Si, Sa)

Lygaeus equestris (Linnaeus, 1758) (*)

Lygaeus equestris equestris (Linnaeus, 1758) (N, S, Sa)

Lygaeus equestris sicilianus (Wagner, 1955) (S?, Si) (E)

Lygaeus simulans Deckert, 1985 (N, S)

Melanocoryphus Stål, 1872

Melanocoryphus albomaculatus (Goeze, 1778) (N, S, Si, Sa)

Paranysius Horváth, 1895

Paranysius australis Linnavuori, 1978 (Si)

Spilostethus Stål, 1868

Spilostethus pandurus (Scopoli, 1763) (*)

Spilostethus pandurus pandurus (Scopoli, 1763) (N, S, Si, Sa)

Spilostethus saxatilis (Scopoli, 1763) (N, S, Si, Sa)

Tropidothorax Bergroth, 1894

Tropidothorax leucopterus (Goeze, 1778) (N, S, Si)

Tropidothorax sternalis (Dallas, 1852) (S)

Camptocoris Puton, 1886

Camptocoris longicornis (Puton, 1874) (Si?)

Nithecus Horváth, 1890

Nithecus jacobaeae (Schilling, 1829) (N, S)

Nysius Dallas, 1852

Nysius cymoides (Spinola, 1837) (N, S, Si, Sa)

Nysius ericae (Schilling, 1829)

Nysius ericae ericae (Schilling, 1829) (N, S)

Nysius graminicola (Kolenati, 1845) (*)

Nysius graminicola graminicola (Kolenati, 1845) (N, S, Si, Sa)

Nysius graminicola karaganus Hoberlandt, 1949 (Sa?)

Nysius helveticus (Herrich-Schäffer, 1850) (N, S, Si, Sa)

Nysius immunis (Walker, 1872) (N, S, Si, Sa)

Nysius senecionis (Schilling, 1829) (N, S, Si, Sa)

Nysius thymi (Wolff, 1804)

Nysius thymi thymi (Wolff, 1804) (N, S)

Orsillus Dallas, 1852

Orsillus depressus Dallas, 1852 (N, S, Si)

Orsillus maculatus (Fieber, 1861) (N, S, Si, Sa)

Orsillus reyi Puton, 1871 (N, S, Si)

Ortholomus Stål, 1872

Ortholomus punctipennis (Herrich-Schäffer, 1838) (N, S, Si)

Anomaloptera Amyot & Serville, 1843

Anomaloptera helianthemis Amyot & Serville, 1843 (S?, Sa?)

Brachyplax Fieber, 1860

Brachyplax tenuis (Mulsant & Rey, 1852) (N, S, Si, Sa)

Camptotelus Fieber, 1860

Camptotelus lineolatus (Schilling, 1829)

Camptotelus lineolatus lineolatus (Schilling, 1829) (N)

Macroplax Fieber, 1860

Macroplax fasciata (Herrich-Schäffer, 1835)

Macroplax fasciata fasciata (Herrich-Schäffer, 1835) (N, S, Si, Sa)

Macroplax preyssleri (Fieber, 1837) (N, S, Si)

Macroplax vicina Puton, 1869 (S)

Macropternella Slater, 1957

Macropternella bicolor (Scott, 1872)

Macropternella bicolor bicolor (Scott, 1872) (Sa)

Macropternella bicolor conica (Rey, 1888) (S, Si)

Macropternella convexa (Fieber, 1837) (N, S, Si, Sa)

Macropternella marginalis (Fieber, 1861) (Si)

Metopoplax Fieber, 1860

Metopoplax ditomoides (A. Costa, 1847) (N, S, Si, Sa)

Metopoplax fuscinervis Stål, 1872 (N, S, Si, Sa) (*)

Metopoplax origani (Kolenati, 1845) (N, Si, Sa)

Microplax Fieber, 1860

Microplax albofasciata (A. Costa, 1847) (N, S, Si, Sa)

Microplax interrupta (Fieber, 1837) (N, S, Si, Sa)

Microplax plagiata (Fieber, 1837) (Si, Sa)

Oxycareus (Euoxycareus) Samy, 1969

Oxycareus (Euoxycareus) pallens (Herrich-Schäffer, 1850) (N, S, Si, Sa)

Oxycareus (Oxycareus) Fieber, 1837

Oxycareus (Oxycareus) hyalinipennis (A. Costa, 1843) (N, S, Si, Sa)

Oxycareus (Oxycareus) lavaterae (Fabricius, 1787) (N, S, Si, Sa)

Oxycarenum (Oxycarenum) longiceps Wagner, 1955 (Si) (E)
Oxycarenum (Oxycarenum) modestus (Fallén, 1829) (N, S)

Tropidophlebia Kerzhner, 1964

Tropidophlebia costalis (Herrich-Schäffer, 1850) (Si)

Acompus Fieber, 1860

Acompus laticeps Ribaut, 1929 (S, Si, Sa)
Acompus pallipes (Herrich-Schäffer, 1834) (N, S)
Acompus rufipes (Wolff, 1804) (N, S)

Aellopus Wolff, 1811

Aellopus atratus (Goeze, 1778) (N, S, Si, Sa)

Aoploscelis Fieber, 1860

Aoploscelis bivirgatus (A. Costa, 1853) (S, Si, Sa)

Aphanus Laporte, 1833

Aphanus rolandri (Linnaeus, 1758) (*)
Aphanus rolandri aethiops (Douglas & Scott, 1868) (N, S, Sa)
Aphanus rolandri rolandri (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Beosus Amyot & Serville, 1843

Beosus maritimus (Scopoli, 1763) (N, S, Si, Sa)
Beosus quadripunctatus (O.F. Müller, 1766) (N, S, Si)

Camptocera Jakovlev, 1877

Camptocera glaberrima (Walker, 1872) (Si, Sa)

Dieuches Dohrn, 1860

Dieuches armatipes (Walker, 1872) (Si, Sa)

Drymus (Drymus) Fieber, 1860

Drymus (Drymus) latus Douglas & Scott, 1871
Drymus (Drymus) latus latus Douglas & Scott, 1871 (N, S)
Drymus (Drymus) pilicornis (Mulsant & Rey, 1852) (N, S)
Drymus (Drymus) pilipes Fieber, 1861 (N, S)
Drymus (Drymus) scambus Stål, 1872 (S?)

Drymus (Sylvadrymus) Le Quesne, 1956

- Drymus (Sylvadrymus) brunneus* (F. Sahlberg, 1848) (N, S, Si, Sa)
- Drymus (Sylvadrymus) major* Wagner, 1953 (S, Si)
- Drymus (Sylvadrymus) ryeii* Douglas & Scott, 1865 (N, Si?)
- Drymus (Sylvadrymus) sylvaticus* (Fabricius, 1775) (N, S?, Si)

Emblethis Fieber, 1860

- Emblethis angustus* Montandon, 1890 (N?, S, Si, Sa)
- Emblethis brachynotus* Horváth, 1897 (N)
- Emblethis denticollis* Horváth, 1878 (N, S, Si, Sa)
- Emblethis duplicatus* Seidenstücker, 1963 (S, Si, Sa)
- Emblethis griseus* (Wolff, 1802) (N, S, Si)
- Emblethis major* Montandon, 1890 (S)
- Emblethis verbasci* (Fabricius, 1803) (N, S, Si, Sa)

Eremocoris Fieber, 1860

- Eremocoris abietis* (Linnaeus, 1758) (N)
- Eremocoris fenestratus* (Herrich-Schäffer, 1839) (N, S, Si, Sa)
- Eremocoris plebejus* (Fallén, 1807)
- Eremocoris plebejus plebejus* (Fallén, 1807) (N, S, Si)
- Eremocoris podagricus* (Fabricius, 1775) (N, S, Si)

Gastrodes Westwood, 1840

- Gastrodes abietum* Bergroth, 1914 (N)
- Gastrodes grossipes* (De Geer, 1773)
- Gastrodes grossipes grossipes* (De Geer, 1773) (N, S, Si)

Gonianotus Fieber, 1860

- Gonianotus galactodermus* Fieber, 1861 (Si)
- Gonianotus marginepunctatus* (Wolff, 1804) (N, S, Si, Sa)

Graptopeltus Stål, 1872

- Graptopeltus lynceus* (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa)
- Graptopeltus validus* (Horváth, 1875) (Si?)

Hyalochilus Fieber, 1860

- Hyalochilus dolosus* Horváth, 1897 (N)
- Hyalochilus ovatulus* (A. Costa, 1853) (N?, S, Si, Sa)

Icus Fieber, 1860

Icus angularis Fieber, 1861 (N, S, Si)

Ischnocoris Fieber, 1860

Ischnocoris angustulus (Boheman, 1852) (Si, Sa)

Ischnocoris flavipes Signoret, 1865 (S, Si, Sa)

Ischnocoris hemipterus (Schilling, 1829) (N, S, Si?)

Ischnocoris punctulatus Fieber, 1861 (N, S, Si, Sa)

Ischnopeza Fieber, 1860

Ischnopeza hirticornis (Herrich-Schäffer, 1850) (N, S, Si)

Lamprodema Fieber, 1860

Lamprodema maura (Fabricius, 1803) (N, S, Si, Sa)

Lamprodema weyersi Puton, 1887 (Sa)

Lamproplax Douglas & Scott, 1868

Lamproplax picea (Flor, 1860) (N)

Lasiocoris Fieber, 1860

Lasiocoris anomalus (Kolenati, 1845) (*)

Lasiocoris anomalus aeneiceps (Bärensprung, 1859) (S, Sa)

Lasiocoris anomalus anomalus (Kolenati, 1845) (N, S, Si, Sa)

Lasiocoris crassicornis (Lucas, 1849) (Sa)

Lasiosomus Fieber, 1860

Lasiosomus enervis (Herrich-Schäffer, 1835) (N, S)

Lethaeus Dallas, 1852

Lethaeus lethierryi (Puton, 1869) (Si) (*)

Ligyrocoris Stål, 1872

Ligyrocoris sylvestris (Linnaeus, 1758) (N, S)

Macrodema Fieber, 1860

Macrodema microptera (Curtis, 1836) (N)

Megalonotus Fieber, 1860

Megalonotus antennatus (Schilling, 1829) (N, S)

Megalonotus chiragra (Fabricius, 1794) (N, S, Si, Sa)
Megalonotus dilatatus (Herrich-Schäffer, 1840) (N, S, Si, Sa)
Megalonotus emarginatus (Rey, 1888)
 Megalonotus emarginatus emarginatus (Rey, 1888) (N, S)
Megalonotus hirsutus Fieber, 1861 (N, S)
Megalonotus nitidicollis Puton, 1874 (Sa) (*)
Megalonotus parallelus (Horváth, 1911) (S, Si)
Megalonotus praetextatus (Herrich-Schäffer, 1835)
 Megalonotus praetextatus praetextatus (Herrich-Schäffer, 1835) (N, S, Si, Sa)
Megalonotus puncticollis (Lucas, 1849) (N, S, Si, Sa)
Megalonotus sabulicola (Thomson, 1870) (N, S, Si)

Neurocladus Fieber, 1860

Neurocladus brachiidens (Dufour, 1851) (S, Si, Sa)

Notochilus Fieber, 1864

Notochilus damryi Puton, 1871 (S, Si, Sa)
 Notochilus ferrugineus (Mulsant & Rey, 1852) (N, S, Sa)

Pachybrachius Hahn, 1826

Pachybrachius fasciatus (Fieber, 1861) (Si) (E)
 Pachybrachius fracticollis (Schilling, 1829)
 Pachybrachius fracticollis fracticollis (Schilling, 1829) (N, S)
 Pachybrachius luridus Hahn, 1826 (N, S)

Paromius Fieber, 1860

Paromius gracilis (Rambur, 1839) (N, S, Si)
 Paromius leptopoides (Bärensprung, 1859) (N, S, Sa)

Peritrechus Fieber, 1860

Peritrechus angusticollis (F. Sahlberg, 1848) (Si, Sa)
 Peritrechus geniculatus (Hahn, 1832) (N, S, Sa)
 Peritrechus gracilicornis Puton, 1877 (N, S, Si?, Sa?)
 Peritrechus lundii (Gmelin, 1790) (N, S, Si, Sa)
 Peritrechus meridionalis Puton, 1877 (N, S, Si, Sa)
 Peritrechus nubilus (Fallén, 1807) (N, S, Si, Sa)

Pezocoris Jakovlev, 1875

Pezocoris apicimacula (A. Costa, 1853)
 Pezocoris apicimacula apicimacula (A. Costa, 1853) (S, Sa)

Piezoscelis Fieber, 1870

Piezoscelis staphylinus (Rambur, 1839) (N?, S, Si, Sa)

Pionosomus Fieber, 1860

Pionosomus opacellus Horváth, 1895 (N)

Pionosomus varius (Wolff, 1804) (N, S, Sa)

Plinthisus (Isioscytus) Horváth, 1876

Plinthisus (Isioscytus) minutissimus (Fieber, 1864) (N, S, Si, Sa)

Plinthisus (Isioscytus) ptilioides Puton, 1874 (Si, Sa)

Plinthisus (Plinthisomus) Fieber, 1864

Plinthisus (Plinthisomus) pusillus (Scholz, 1847) (N)

Plinthisus (Plinthisus) Stephens, 1829

Plinthisus (Plinthisus) brevicollis Ferrari, 1874 (N, S, Si, Sa)

Plinthisus (Plinthisus) brevipennis (Latreille, 1807) (N, S, Si, Sa)

Plinthisus (Plinthisus) coracinus Horváth, 1876 (Si)

Plinthisus (Plinthisus) flavipes Fieber, 1861 (N, S, Si)

Plinthisus (Plinthisus) longicollis Fieber, 1861 (N, S, Si, Sa)

Plinthisus (Plinthisus) major Horváth, 1876 (Si, Sa)

Plinthisus (Plinthisus) pseudoconvexus Wagner, 1963 (Si, Sa) (E)

Plinthisus (Plinthisus) putoni Horváth, 1876 (N, Si)

Proderus Fieber, 1860

Proderus suberythropus (A. Costa, 1841) (S, Si, Sa)

Pterotmetus Amyot & Serville, 1843

Pterotmetus dimidiatus Fieber, 1861 (N?)

Pterotmetus staphyliniformis (Schilling, 1829) (N, S)

Remaudiereana Hoberlandt, 1954

Remaudiereana annulipes (Bärensprung, 1859) (S, Si, Sa)

Rhyparochromus (Callistonotus) Horváth, 1906

Rhyparochromus (Callistonotus) nigroruber Stål, 1858 (Sa)

Rhyparochromus (Liolobus) Reuter, 1885

Rhyparochromus (Liolobus) walkeri (Saunders, 1876) (Si)

***Rhyparochromus (Microtomideus)* Reuter, 1885**

Rhyparochromus (Microtomideus) carbonarius (Rambur, 1839) (N?, Si, Sa)
Rhyparochromus (Microtomideus) leucodermus Fieber, 1861 (S?, Si, Sa)

***Rhyparochromus (Panaorus)* Kiritshenko, 1951**

Rhyparochromus (Panaorus) adpersus (Mulsant & Rey, 1852) (N)

***Rhyparochromus (Raglius)* Stål, 1872**

Rhyparochromus (Raglius) alboacuminatus (Goeze, 1778) (N, S, Si, Sa)
Rhyparochromus (Raglius) confusus (Reuter, 1886) (N, S, Si, Sa)
Rhyparochromus (Raglius) pineti (Herrich-Schäffer, 1835) (N?, S, Si, Sa)
Rhyparochromus (Raglius) tristis Fieber, 1861 (N, S, Si, Sa)

***Rhyparochromus (Rhyparochromus)* Hahn, 1826**

Rhyparochromus (Rhyparochromus) phoeniceus (Rossi, 1794)
Rhyparochromus (Rhyparochromus) phoeniceus phoeniceus (Rossi, 1794) (N, S, Si)
Rhyparochromus (Rhyparochromus) pini (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)
Rhyparochromus (Rhyparochromus) sanguineus (Douglas & Scott, 1868) (N, S, Si)
Rhyparochromus (Rhyparochromus) taleus Lucas, 1846 (Si)
Rhyparochromus (Rhyparochromus) vulgaris (Schilling, 1829) (N, S, Si, Sa)

***Rhyparochromus (Xanthochilus)* Stål, 1872**

Rhyparochromus (Xanthochilus) douglasi (Fieber, 1864) (S, Sa)
Rhyparochromus (Xanthochilus) minusculus (Reuter, 1885) (N, S, Si, Sa)
Rhyparochromus (Xanthochilus) quadratus (Fabricius, 1798) (N, S, Si, Sa)
Rhyparochromus (Xanthochilus) saturnius (Rossi, 1790) (N, S, Si, Sa)

***Scolopostethus* Fieber, 1860**

Scolopostethus affinis (Schilling, 1829) (N, S)
Scolopostethus cognatus Fieber, 1861 (N, S, Si?, Sa)
Scolopostethus decoratus (Hahn, 1833) (N, S, Si, Sa)
Scolopostethus grandis Horváth, 1880 (N, S, Si)
Scolopostethus pictus (Schilling, 1829) (N, S)
Scolopostethus pilosus Reuter, 1874
Scolopostethus pilosus pilosus Reuter, 1874 (N, S, Sa)
Scolopostethus pseudograndis Wagner, 1949 (N)
Scolopostethus puberulus Horváth, 1887 (N, S)
Scolopostethus thomsoni Reuter, 1874 (N, S, Sa)

***Sphragisticus* Stål, 1872**

Sphragisticus nebulosus (Fallén, 1807) (N)

Stygnocoris Douglas & Scott, 1865

Stygnocoris faustus Horváth, 1888 (N, S, Si)

Stygnocoris fuligineus (Geoffroy in Fourcroy, 1785)

Stygnocoris fuligineus breviceps Wagner, 1953 (Si)

Stygnocoris fuligineus fuligineus (Geoffroy in Fourcroy, 1785) (N, S, Si, Sa)

Stygnocoris matocqi Péricart, 1993 (N, S)

Stygnocoris pygmaeus (F. Sahlberg, 1848) (N)

Stygnocoris rusticus (Fallén, 1807) (N, S, Si)

Stygnocoris sabulosus (Schilling, 1829) (N, S, Si)

Stygnocoris similis Wagner, 1953 (N)

Taphropeltus Stål, 1872

Taphropeltus andrei (Puton, 1877) (S)

Taphropeltus contractus (Herrich-Schäffer, 1835) (N, S, Si, Sa)

Taphropeltus hamulatus (Thomson, 1870) (N)

Taphropeltus nervosus (Fieber, 1861) (N, S, Si, Sa)

Thaumastopus Fieber, 1870

Thaumastopus marginicollis (Lucas, 1849) (N, S, Si)

Trapezonotus (Trapezonotus) Fieber, 1860

Trapezonotus (Trapezonotus) arenarius (Linnaeus, 1758)

Trapezonotus (Trapezonotus) arenarius arenarius (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)

Trapezonotus (Trapezonotus) desertus Seidenstücker, 1951 (N, S)

Trapezonotus (Trapezonotus) dispar Stål, 1872 (N, S, Si)

Trapezonotus (Trapezonotus) ullrichii (Fieber, 1837) (N, S, Si, Sa)

Tropistethus Fieber, 1860

Tropistethus fasciatus Ferrari, 1874 (N, S, Si)

Tropistethus holosericus (Scholz, 1846) (N, S, Si, Sa)

Tropistethus subfasciatus Ferrari, 1874 (N, S, Si, Sa)

Note

Lygaeosoma sardeum: Validità della sottospecie da confermare.

Lygaeus equestris: Validità delle sottospecie da confermare.

Spilostethus pandurus: Validità della sottospecie da confermare.

Nysius graminicola: Validità delle sottospecie da confermare.

Metopoplax fuscinervis: Specie di dubbia validità.

Aphanus rolandri: Validità delle sottospecie da confermare.

Lasiocoris anomalus: Validità delle sottospecie da confermare.

Lethaeus lethierryi: Presente in Si solo a Pantelleria.
Megalonotus nitidicollis: Endemita sardo-corso.

Acanthosomatidae

Acanthosoma Curtis, 1824

Acanthosoma haemorrhoidale (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)

Cyphostethus Fieber, 1860

Cyphostethus tristriatus (Fabricius, 1787) (N, S, Si)

Elasmostethus Fieber, 1860

Elasmostethus interstinctus (Linnaeus, 1758) (N, S)

Elasmostethus minor Horváth, 1899 (N, S)

Elasmucha Stål, 1864

Elasmucha ferrugata (Fabricius, 1787) (N, S)

Elasmucha fieberi (Jakovlev, 1864) (N, S?)

Elasmucha grisea (Linnaeus, 1758)

Elasmucha grisea grisea (Linnaeus, 1758) (N, S)

Cydnidae

Aethus Dallas, 1851

Aethus pilosus (Herrich-Schäffer, 1834) (N, S, Si, Sa)

Byrsinus Fieber, 1860

Byrsinus albipennis (A. Costa, 1853) (S, Si, Sa)

Byrsinus flavicornis (Fabricius, 1794) (N, S, Si, Sa)

Byrsinus laticollis (Wagner, 1954) (Si)

Byrsinus pilosulus (Klug, 1845) (S, Si)

***Cydnus* (*Cydnus*)** Fabricius, 1803

Cydnus (*Cydnus*) *aterrimus* (Forster, 1771) (N, S, Si, Sa)

***Geotomus* (*Geotomus*)** Mulsant & Rey, 1866

Geotomus (*Geotomus*) *brunnipennis* Wagner, 1953 (N, S, Si?)

Geotomus (*Geotomus*) *elongatus* (Herrich-Schäffer, 1840)

Geotomus (Geotomus) elongatus elongatus (Herrich-Schäffer, 1840) (N, S, Si, Sa)
Geotomus (Geotomus) punctulatus (A. Costa, 1847) (N, S, Si, Sa)

Macroscytus Fieber, 1860

Macroscytus brunneus (Fabricius, 1803)
Macroscytus brunneus brunneus (Fabricius, 1803) (N, S, Si, Sa)

Microporus Uhler, 1872

Microporus nigritus (Fabricius, 1794) (N, S, Si, Sa)

Adomerus Mulsant & Rey, 1866

Adomerus biguttatus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si?)

Canthophorus Mulsant & Rey, 1866

Canthophorus dubius (Scopoli, 1763) (N, S)
Canthophorus fuscipennis (Horváth, 1899) (S, Si)
Canthophorus impressus (Horváth, 1881) (N, S)
Canthophorus maculipes (Mulsant, 1852) (N, S?, Sa)
Canthophorus melanopterus (Herrich-Schäffer, 1835) (*)
Canthophorus melanopterus melanopterus (Herrich-Schäffer, 1835) (N, S, Si, Sa)

Crocistethus Fieber, 1860

Crocistethus basalis Fieber, 1861 (Si)
Crocistethus waltlianus (Fieber, 1836) (N, S, Si, Sa)

Legnotus Schioedte, 1848

Legnotus fumigatus (A. Costa, 1853) (N, S, Si, Sa)
Legnotus limbosus (Geoffroy, 1785) (N, S, Si, Sa)
Legnotus picipes (Fallén, 1807) (N, S, Si, Sa)

Ochetostethus Fieber, 1860

Ochetostethus balcanicus Wagner, 1940 (N, S, Si, Sa?)
Ochetostethus pygmaeus (Rambur, 1839) (S, Si)
Ochetostethus tarsalis (Mulsant & Rey, 1852) (S?, Sa)

Sehirus Amyot & Serville, 1843

Sehirus luctuosus Mulsant & Rey, 1866 (N, S)
Sehirus morio (Linnaeus, 1761) (N, S, Si, Sa)
Sehirus ovatus (Herrich-Schäffer, 1840) (N, Si) (*)

Tritomegas Amyot & Serville, 1843

Tritomegas bicolor (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Tritomegas rotundipennis (Dohrn, 1862) (N, S, Si)

Tritomegas sexmaculatus (Rambur, 1839) (N, S, Si, Sa)

Note

Canthophorus melanopterus: Validità della sottospecie da confermare.

Sehirus ovatus: Specie di dubbia validità.

Pentatomidae

Arma Hahn, 1832

Arma custos (Fabricius, 1794) (N, S)

Jalla Hahn, 1832

Jalla dumosa (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)

Picromerus Amyot & Serville, 1843

Picromerus bidens (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)

Picromerus nigridens (Fabricius, 1803) (N, S, Si, Sa)

Pinthaeus Stål, 1867

Pinthaeus sanguinipes (Fabricius, 1781) (N, S)

Rhacognathus Fieber, 1860

Rhacognathus punctatus (Linnaeus, 1758) (N)

Troilus Stål, 1867

Troilus luridus (Fabricius, 1775) (N, S, Si)

Zicrona Amyot & Serville, 1843

Zicrona caerulea (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Acrosternum (Acrosternum) Fieber, 1860

Acrosternum (Acrosternum) heegeri Fieber, 1861 (N, S, Si, Sa)

Acrosternum (Acrosternum) millierei (Mulsant & Rey, 1866) (N, S, Si, Sa)

***Aelia* Fabricius, 1803**

Aelia acuminata (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
Aelia cognata Fieber, 1868 (N, Si, Sa)
Aelia germari Küster, 1852 (N, S, Si, Sa)
Aelia klugii Hahn, 1833
 Aelia klugii klugii Hahn, 1833 (N, S, Si?, Sa)
Aelia rostrata Boheman, 1852 (N, S, Si, Sa)
Aelia sibirica Reuter, 1886 (N, Si)

***Antheminia* Mulsant & Rey, 1866**

Antheminia lunulata (Goeze, 1778) (N, S, Si, Sa)
Antheminia varicornis (Jakovlev, 1876) (N)

***Apodiphus* Spinola, 1837**

Apodiphus amygdali (Germar, 1817) (N) (*)

***Bagrada* (*Bagrada*) Stål, 1862**

Bagrada (*Bagrada*) *hilaris* (Burmeister, 1835) (Si)

***Bagrada* (*Nitilia*) Horváth, 1936**

Bagrada (*Nitilia*) *stolata* Horváth, 1936 (Si)

***Brachynema* Mulsant & Rey, 1852**

Brachynema cinctum (Fabricius, 1775) (S, Si, Sa)
Brachynema germarii (Kolenati, 1846) (Si, Sa)

***Carpocoris* (*Carpocoris*) Kolenati, 1846**

Carpocoris (*Carpocoris*) *fuscispinus* (Boheman, 1851) (N, S)
Carpocoris (*Carpocoris*) *mediterraneus* Tamanini, 1958
 Carpocoris (*Carpocoris*) *mediterraneus atlanticus* Tamanini, 1958 (N, Si, Sa)
 Carpocoris (*Carpocoris*) *mediterraneus mediterraneus* Tamanini, 1958 (N, S, Si, Sa)
Carpocoris (*Carpocoris*) *melanocerus* (Mulsant & Rey, 1852) (N)
Carpocoris (*Carpocoris*) *pudicus* (Poda, 1761) (N, S, Si)
Carpocoris (*Carpocoris*) *purpureipennis* (De Geer, 1773) (N, S)

***Chlorochroa* (*Rhytidolomia*) Stål, 1872**

Chlorochroa (*Rhytidolomia*) *juniperina* (Linnaeus, 1758) (N, S, Sa)
Chlorochroa (*Rhytidolomia*) *pinicola* (Mulsant & Rey, 1852) (N, S)

***Chroantha* Stål, 1872**

Chroantha ornatula (Herrich-Schäffer, 1842) (N, Si)

Codophila Mulsant & Rey, 1866

Codophila varia (Fabricius, 1787) (N, S, Si, Sa)

Dolycoris Mulsant & Rey, 1866

Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Dryadocoris Kirkaldy, 1909

Dryadocoris analis (A. Costa, 1847) (N, S, Si, Sa?)

Dyroderes Spinola, 1837

Dyroderes umbraculatus (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa)

Eurydema (Eurydema) Laporte, 1833

Eurydema (Eurydema) oleraceum (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)

Eurydema (Eurydema) ornatum (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Eurydema (Horvatheurydema) Dupuis, 1951

Eurydema (Horvatheurydema) fieberi Schummel in Fieber, 1837 (N, S, Sa)

Eurydema (Horvatheurydema) rotundicollis Dohrn, 1860 (N, S, Sa) (*)

Eurydema (Rubrodorsalium) Stichel, 1944

Eurydema (Rubrodorsalium) dominulum (Scopoli, 1763)

Eurydema (Rubrodorsalium) dominulum dominulum (Scopoli, 1763) (N, Si?)

Eurydema (Rubrodorsalium) ventrale Kolenati, 1846 (N, S, Si)

Eysarcoris Hahn, 1834

Eysarcoris aeneus (Scopoli, 1763) (N, S, Si, Sa)

Eysarcoris fabricii Kirkaldy, 1904 (N, S, Si, Sa)

Eysarcoris ventralis (Westwood, 1837) (N, S, Si, Sa)

Holcogaster Fieber, 1860

Holcogaster exilis Horváth, 1903 (Si)

Holcogaster fibulata (Germar, 1831) (N, Sa)

Holcostethus (Dryocoris) Mulsant & Rey, 1866

Holcostethus (Dryocoris) albipes (Fabricius, 1781) (N, S, Si, Sa)
Holcostethus (Dryocoris) sphacelatus (Fabricius, 1794) (N, S, Si?, Sa?)

Holcostethus (Holcostethus) Fieber, 1860

Holcostethus (Holcostethus) strictus (Fabricius, 1803) (N, S, Si, Sa)
Holcostethus (Holcostethus) vernalis (Wolff, 1804) (N, S, Si, Sa)

Mecidea Dallas, 1851

Mecidea lindbergi Wagner, 1954 (S, Si)

Menaccarus Amyot & Serville, 1843

Menaccarus arenicola (Scholz, 1847) (Si)
Menaccarus dohrnianus (Mulsant & Rey, 1866) (Si, Sa)

Neottiglossa (Neottiglossa) Kirby, 1837

Neottiglossa (Neottiglossa) bifida (A. Costa, 1847) (N, S, Si, Sa)
Neottiglossa (Neottiglossa) flavomarginata (Lucas, 1849) (N, S)
Neottiglossa (Neottiglossa) leporina (Herrich-Schäffer, 1830) (N, S, Si, Sa)
Neottiglossa (Neottiglossa) pusilla (Gmelin, 1790) (N, S, Si)

Nezara Amyot & Serville, 1843

Nezara viridula (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Palomena Mulsant & Rey, 1866

Palomena prasina (Linnaeus, 1761) (N, S, Si, Sa)
Palomena viridissima (Poda, 1761) (N, S?, Si?)

Pentatoma Olivier, 1789

Pentatoma rufipes (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)

Piezodorus Fieber, 1860

Piezodorus lituratus (Fabricius, 1794) (N, S, Si, Sa)

Rhaphigaster Laporte, 1833

Rhaphigaster nebulosa (Poda, 1761) (N, S, Si, Sa)

Rubiconia Dohrn, 1860

Rubiconia intermedia (Wolff, 1811) (N, S?)

Sciocoris (Aposciocoris) Wagner, 1965

Sciocoris (Aposciocoris) cerrutii Wagner, 1959 (N, S)
Sciocoris (Aposciocoris) homalonotus Fieber, 1851 (N, Sa)
Sciocoris (Aposciocoris) luteolus Fieber, 1861 (N, Si)
Sciocoris (Aposciocoris) macrocephalus Fieber, 1851 (N, S, Si, Sa)
Sciocoris (Aposciocoris) microphthalmus Flor, 1860 (N, S, Si?)
Sciocoris (Aposciocoris) umbrinus (Wolff, 1804) (N, S, Si)

Sciocoris (Neosciocoris) Wagner, 1965

Sciocoris (Neosciocoris) conspurcatus Klug, 1845 (*)
Sciocoris (Neosciocoris) fissus Mulsant & Rey, 1866 (S)
Sciocoris (Neosciocoris) fumipennis Puton, 1881 (N, Si)
Sciocoris (Neosciocoris) maculatus Fieber, 1851 (N?, S, Si, Sa)
Sciocoris (Neosciocoris) sideritidis Wollaston, 1858 (S, Si, Sa)

Sciocoris (Sciocoris) Fallén, 1829

Sciocoris (Sciocoris) cursitans (Fabricius, 1794)
Sciocoris (Sciocoris) cursitans cursitans (Fabricius, 1794) (N, S, Si, Sa)
Sciocoris (Sciocoris) cursitans pallidicornis Wagner, 1955 (Si) (E)
Sciocoris (Sciocoris) distinctus Fieber, 1851 (N)
Sciocoris (Sciocoris) galiberti Ribaut, 1926 (N, S)
Sciocoris (Sciocoris) helferii Fieber, 1851 (N, S, Si, Sa)
Sciocoris (Sciocoris) ribauti Wagner, 1953 (N, S, Si, Sa)
Sciocoris (Sciocoris) sulcatus Fieber, 1851 (N, S, Si, Sa)

Stagonomus (Dalleria) Mulsant & Rey, 1866

Stagonomus (Dalleria) bipunctatus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
Stagonomus (Dalleria) grenieri Signoret, 1865 (N)
Stagonomus (Dalleria) pusillus (Herrich-Schäffer, 1830) (N, S, Si?, Sa?)

Stagonomus (Stagonomus) Gorski, 1852

Stagonomus (Stagonomus) amoenus (Brullé, 1832) (N, S, Si?)

Staria Dohrn, 1860

Staria lunata (Hahn, 1835) (N, S, Si)

Trochiscocoris Reuter, 1890

Trochiscocoris rotundatus Horváth, 1895
Trochiscocoris rotundatus rotundatus Horváth, 1895 (S)

Ancyrosoma Amyot & Serville, 1843

Ancyrosoma leucogrammes (Gmelin, 1790) (N, S, Si, Sa)

Crypsinus Dohrn, 1860

Crypsinus angustatus (Bärensprung, 1859) (Sa)

Derula Mulsant & Rey, 1856

Derula flavoguttata Mulsant & Rey, 1856 (N, S, Si)

Graphosoma Laporte, 1833

Graphosoma lineatum (Linnaeus, 1758) (*)

Graphosoma lineatum italicum (O.F. Müller, 1766) (N, S, Si)

Graphosoma lineatum lineatum (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Graphosoma semipunctatum (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa)

Podops (Opocrates) Horváth, 1883

Podops (Opocrates) curvidens A. Costa, 1843 (N, S, Si)

Podops (Petalodera) Horváth, 1883

Podops (Petalodera) dilatata Fieber in Puton, 1873 (N?, Si?)

Podops (Podops) Laporte, 1833

Podops (Podops) calligera Horváth, 1887 (N?)

Podops (Podops) inuncta (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa)

Scotinophara Stål, 1867

Scotinophara sricula (A. Costa, 1841) (S?, Si, Sa?)

Scotinophara subalpina Bergroth, 1893 (N) (E)

Sternodontus Mulsant & Rey, 1856

Sternodontus obtusus Mulsant & Rey, 1856 (N, S)

Tholagmus Stål, 1860

Tholagmus flavolineatus (Fabricius, 1798) (N, S, Si, Sa)

Tholagmus strigatus (Herrich-Schäffer, 1835) (N, Si, Sa)

Ventocoris (Selenodera) Horváth, 1889

Ventocoris (Selenodera) falcatus (Cyrillus, 1787) (N, S, Si)

Ventocoris (Ventocoris) Hahn, 1834

Ventocoris (Ventocoris) rusticus (Fabricius, 1781) (N, S, Si, Sa)

Vilpianus Stål, 1860

Vilpianus galii (Wolff, 1802) (N, S)

Note

Apodiphus amygdali: Presenza dubbia, marginale sul confine orientale.

Eurydema (Horvatheurydema) rotundicollis: Specie di dubbia validità.

Sciocoris (Neosciocoris) conspurcatus: Citazione generica per l'Italia, da confermare.

Graphosoma lineatum: Validità delle sottospecie da confermare.

Plataspidae

Coptosoma Laporte, 1833

Coptosoma sandahli Reuter, 1881 (Si?) (*)

Coptosoma scutellatum (Geoffroy, 1785) (N, S, Si)

Note

Coptosoma sandahli: Unica citazione certa, riferita ad esemplari del XIX secolo, quasi certamente la specie non è più presente in Italia.

Scutelleridae

Eurygaster Laporte, 1833

Eurygaster austriaca (Schrank, 1776) (*)

Eurygaster austriaca austriaca (Schrank, 1776) (N, S, Si, Sa)

Eurygaster dilaticollis Dohrn, 1860 (N, S)

Eurygaster hottentotta (Fabricius, 1775) (N, Si, Sa)

Eurygaster integriceps Puton, 1881 (S)

Eurygaster maura (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Eurygaster schreiberi Montandon, 1885 (N)

Eurygaster testudinaria (Geoffroy, 1785) (N, S, Si)

Irochrotus Amyot & Serville, 1843

Irochrotus lanatus (Pallas, 1773) (S, Si)

Irochrotus maculiventris (Germar, 1839) (Si)

Odontoscelis (Odontoscelis) Laporte, 1833

Odontoscelis (Odontoscelis) dorsalis (Fabricius, 1798) (Si, Sa)
Odontoscelis (Odontoscelis) fuliginosa (Linnaeus, 1761) (N, S, Si, Sa)
Odontoscelis (Odontoscelis) lineola Rambur, 1839 (N, S, Si?, Sa?)
Odontoscelis (Odontoscelis) minuta Jakovlev, 1881 (N?, S, Si, Sa)
Odontoscelis (Odontoscelis) signata Fieber, 1861 (Si)

Odontotarsus Laporte, 1833

Odontotarsus caudatus (Burmeister, 1835) (N, S, Si, Sa)
Odontotarsus purpureolineatus (Rossi, 1790) (N, S, Si)
Odontotarsus robustus Jakovlev, 1883 (N, S, Si)

Phimodera Germar, 1839

Phimodera flori Fieber, 1863 (N)
Phimodera galgulina (Herrich-Schäffer, 1837) (N)

Psacasta (Cryptodontus) Mulsant & Rey, 1866

Psacasta (Cryptodontus) tuberculata (Fabricius, 1781) (N, S, Si, Sa)

Psacasta (Psacasta) Germar, 1839

Psacasta (Psacasta) conspersa Germar, 1839 (N, S, Si)
Psacasta (Psacasta) exanthematica (Scopoli, 1763) (N, S, Si, Sa)
Psacasta (Psacasta) herculeana Horváth, 1891 (*)

Solenosthedium Spinola, 1837

Solenosthedium bilunatum (Lefebvre, 1827) (S, Si, Sa)

Note

Eurygaster austriaca: Validità della sottospecie da confermare.
Psacasta (Psacasta) herculeana: Citazione generica per l'Italia, da confermare.

Thyreocoridae

Thyreocoris Schrank, 1801

Thyreocoris fulvipennis (Dallas, 1851) (N, S)
Thyreocoris scarabaeoides (Linnaeus, 1758) (N, S)

Piesmatidae

***Piesma* (*Parapiesma*)** Péricart, 1974

Piesma (*Parapiesma*) *kolenatii* (Fieber, 1861)

Piesma (*Parapiesma*) *kolenatii rotundatum* (Horváth, 1906) (Si)

Piesma (*Parapiesma*) *pupula* Puton, 1879 (Sa)

Piesma (*Parapiesma*) *quadratum* (Fieber, 1844) (N, S, Sa)

Piesma (*Parapiesma*) *salsolae* (Becker, 1867) (N, S, Si)

Piesma (*Parapiesma*) *silenes* (Horváth, 1888) (N)

***Piesma* (*Piesma*)** Le Peletier & Serville, 1828

Piesma (*Piesma*) *capitatum* (Wolff, 1804) (N, S)

Piesma (*Piesma*) *maculatum* (Laporte, 1833) (N, S, Si, Sa)

Pyrrhocoridae

Pyrrhocoris Fallén, 1814

Pyrrhocoris *apterus* (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Pyrrhocoris *marginatus* (Kolenati, 1845) (N, S)

Scantius Stål, 1866

Scantius *aegyptius* (Linnaeus, 1758)

Scantius aegyptius aegyptius (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Scantius forsteri (Fabricius, 1781) (Si?) (*)

Note

Scantius forsteri: Recente citazione generica per la Sicilia, da confermare.

Homoptera

Cixiidae

Trirhacus Fieber, 1875

Trirhacus *discrepans* (Fieber, 1876) (S)

Trirhacus formosissimus A. Costa, 1883 (N, Sa) (E)

Trirhacus setulosus Fieber, 1876 (N)

Cixius Latreille, 1804

Cixius alpestris Wagner, 1939 (N)
Cixius beieri Wagner, 1939 (N)
Cixius cambricus China, 1935 (N, S)
Cixius carniolicus Wagner, 1939 (N, S)
Cixius cunicularius (Linnaeus, 1767) (N, S)
Cixius distinguendus Kirschbaum, 1868 (N, Si?)
Cixius dubius Wagner, 1939 (N, S)
Cixius haupti Dlabola, 1949 (N, S)
Cixius heydenii Kirschbaum, 1868 (N, S)
Cixius nervosus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
Cixius pallipes Fieber, 1876 (N, Si, Sa)
Cixius sanctangeli O.G. Costa, 1834 (S?) (E) (*)
Cixius similis Kirschbaum, 1868 (S)
Cixius simplex (Herrich-Schäffer, 1835) (N, S)
Cixius stigmaticus (Germar, 1818) (N?, S?) (*)
Cixius wagneri China, 1942 (N, S)

Tachycixius Wagner, 1939

Tachycixius desertorum (Fieber, 1876) (N, S, Si)
Tachycixius ligustinus Wagner, 1959 (N) (E)
Tachycixius pilosus (Olivier, 1791) (N, S, Si)
Tachycixius venustulus (Germar, 1830) (N, S)

Myndus Stål, 1862

Myndus musivus (Germar, 1825) (N, S)

Hemitropis Fieber, 1866

Hemitropis bipunctata Fieber, 1866 (Si)
Hemitropis seticulosa (Lethierry, 1874) (Si, Sa)
Hemitropis viridula Horváth, 1895 (S, Si)

Siculus Dlabola, 1980

Siculus osellai Dlabola, 1980 (Si) (E)

Oliarus Stål, 1862

Oliarus hyalinus Fieber, 1876 (N) (*)
Oliarus limbatus Fieber, 1876 (S) (*)
Oliarus splendidulus Fieber, 1876 (N) (*)

Pentastira Kirschbaum, 1868

Pentastira major Kirschbaum, 1868 (S)

Pentastiridius Kirschbaum, 1868

Pentastiridius beieri (Wagner, 1970) (N)
Pentastiridius leporinus (Linnaeus, 1761) (N, S, Si, Sa)
Pentastiridius obscurus (Signoret, 1865) (Sa)
Pentastiridius spinicoronatus Dlabola, 1987 (N) (E) (*)
Pentastiridius suezensis (Matsumura, 1910) (*)

Reptalus Emeljanov, 1971

Reptalus concolor Fieber, 1876 (N) (*)
Reptalus melanochaetus (Fieber, 1876) (N, S)
Reptalus panzeri (Löw, 1883) (N, S, Si, Sa)
Reptalus quinquecostatus (Dufour, 1833) (N, S)

Setapius Dlabola, 1987

Setapius perminutus (Dlabola, 1959) (S) (E)
Setapius cuspidatus (Fieber, 1876) (N, S, Si)

Hyalesthes Signoret, 1865

Hyalesthes luteipes Fieber, 1876 (N, S, Si, Sa)
Hyalesthes obsoletus Signoret, 1865 (N, S, Si)
Hyalesthes scotti Ferrari, 1882 (N, S, Si, Sa)

Note

Cixius sanctangeli: Specie di dubbia validità.

Cixius stigmaticus: La diagnosi relativa a questa specie potrebbe essere errata e quindi essa potrebbe essere assente in Italia.

Siculus: Genere di dubbia validità.

Oliarus: In senso lato è un taxon polifiletico e cosmopolita.

Oliarus hyalinus: Specie di incerta collocazione generica il cui valore specifico è da verificare; segnalata solo per Friuli Venezia Giulia.

Oliarus limbatus: Specie di incerta collocazione generica il cui valore specifico è da verificare; segnalata solo per l'isola di Capraia.

Oliarus splendidulus: Specie di incerta collocazione generica il cui valore specifico è da verificare; segnalata solo per Friuli Venezia Giulia.

Pentastira: Specie tradizionalmente attribuite a *Oliarus* Stål, 1862.

Pentastiridius: Specie tradizionalmente attribuite a *Oliarus* Stål, 1862.

Pentastiridius spinicoronatus: Endemica dell'Emilia.

Pentastiridius suezensis: Specie di dubbia presenza in Italia; ad essa potrebbero riferirsi alcune delle segnalazioni di *Pentastiridius leporinus* (Linnaeus) come *Oliarus pallens* (Germar).

Reptalus: Specie tradizionalmente attribuite a *Oliarus* Stål, 1862.

Reptalus concolor: Valore specifico da verificare; segnalata solo per il Piemonte.

Setapius: Specie tradizionalmente attribuite a *Oliarus* Stål, 1862.

Delphacidae

Asiraca Latreille, 1796

Asiraca clavicornis (Fabricius, 1794) (N, S, Si, Sa)

Kelisia Fieber, 1866

Kelisia brucki Fieber, 1878 (N, S, Sa)

Kelisia confusa Linnavuori, 1957 (N)

Kelisia gargano Remane & Asche, 1982 (S, Si)

Kelisia guttula (Germar, 1818) (N, S, Si, Sa)

Kelisia guttulifera (Kirschbaum, 1868) (N)

Kelisia haupti Wagner, 1939 (N)

Kelisia melanops Fieber, 1878 (N, S)

Kelisia monoceros Ribaut, 1934 (N)

Kelisia perrieri Ribaut, 1934 (S)

Kelisia ribauti Wagner, 1938 (Si)

Kelisia sulcata Ribaut, 1934 (Sa?) (*)

Kelisia vittipennis (J. Sahlberg, 1868) (N)

Anakelisia Wagner, 1963

Anakelisia perspicillata (Boheman, 1845) (N)

Stenocranus Fieber, 1866

Stenocranus fuscovittatus (Stål, 1858) (N, S)

Stenocranus major (Kirschbaum, 1868) (N)

Stenocranus minutus (Fabricius, 1787) (N, S)

Jassidaeus Fieber, 1866

Jassidaeus lugubris (Signoret, 1865) (S)

Delphacinus Fieber, 1866

Delphacinus mesomelas (Boheman, 1850) (N)

Delphacellus Haupt, 1929

Delphacellus putoni (Scott, 1874) (Sa)

Ditropis Kirschbaum, 1868

Ditropis pteridis (Spinola, 1839) (N, S, Si, Sa)

Eurya Fieber, 1866

Eurya etnicola Asche, 1994 (Si) (E)

Eurya flavobrunnea (Dlabola, 1956) (N)

Eurya forficula (Horváth, 1908) (Si)

Eurya forsicula Asche, Drosopoulos & Hoch, 1983 (Si) (E)

Eurya immunda Horváth, 1916 (S)

Eurya lineata (Perris, 1857) (N, S, Si) (*)

Eurya meridiana Asche, 1994 (S, Si) (E) (*)

Eurya rubripes (Matsumura, 1910) (S, Si) (*)

Eurysula Vilbaste, 1968

Eurysula lurida (Fieber, 1866) (S) (*)

Eurybregma Scott, 1875

Eurybregma nigrolineata Scott, 1875 (S)

Stiroma Fieber, 1866

Stiroma affinis Fieber, 1866 (N)

Stiroma bicarinata (Herrich-Shäffer, 1835) (N)

Metropis Fieber, 1866

Metropis inermis Wagner, 1939 (N)

Metropis latifrons (Kirschbaum, 1868) (N?, S?) (*)

Metropis latinus Linnavuori, 1959 (N, S) (E)

Metropis mayri Fieber, 1866 (N, S)

Metropis nebrodensis D'Urso & Asche, 1984 (Si) (E)

Iubsoda Nast, 1975

Iubsoda stigmatica (Melichar, 1897) (Si)

Iubsoda duffelsi (Dlabola, 1974) (Si)

Tropidocephala Stål, 1853

Tropidocephala tuberipennis (Mulsant & Rey, 1855) (S, Si, Sa)

Achorotile Fieber, 1866

Achorotile albosignata (Dahlbom, 1850) (N)

Euconomelus Haupt, 1929

Euconomelus lepidus (Boheman, 1847) (N, S) (*)

Conomelus Fieber, 1866

Conomelus anceps (Germar, 1821) (N, Sa?)

Conomelus lorifer Ribaut, 1948 (*)

Conomelus lorifer calabricus Dlabola, 1979 (S) (E)

Conomelus lorifer dehnelli Nast, 1966 (N, S)

Conomelus lorifer lorifer Ribaut, 1966 (S) (E)

Conomelus sagittifer Remane & Asche, 1979 (S, Si)

Delphax Fabricius, 1798

Delphax crassicornis (Panzer, 1796) (Si)

Delphax inermis (Ribaut, 1934) (S, Si)

Delphax pulchellus (Curtis, 1833) (N, Sa)

Delphax ribautianus Asche & Drosopoulos, 1982 (N, S) (*)

Delphax macropterus O.G. Costa, 1834 (S) (E) (*)

Delphax radiatus O.G. Costa, 1834 (S) (E) (*)

Delphax tapinus Fieber, 1866 (Sa) (*)

Euides Fieber, 1866

Euides basilinea (Germar, 1821) (N)

Chloriona Fieber, 1866

Chloriona glaucescens Fieber, 1866 (N)

Chloriona sicula Matsumura, 1910 (Si)

Chloriona smaragdula (Stål, 1853) (N)

Chloriona unicolor (Herrich-Schäffer, 1835) (N, Sa)

Chloriona vasconica Ribaut, 1934 (S)

Megamelus Fieber, 1866

Megamelus discrepans Haupt, 1930 (N) (E)

Megamelus leptus (Fieber, 1878) (N?) (*)

Megamelus notula (Germar, 1830) (N)

Megadelphax Wagner, 1963

Megadelphax sordidulus (Stål, 1853) (N)

Laodelphax Fennah, 1963

Laodelphax striatellus (Fallén, 1826) (N, S, Si, Sa)

Leptodelphax Haupt, 1927

Leptodelphax cyclops Haupt, 1927 (Si)

Sogatella Fennah, 1956

Sogatella furcifera (Horváth, 1899) (Si)

Sogatella vibix (Haupt, 1927) (Si)

Ditropsis Wagner, 1963

Ditropsis flavipes (Signoret, 1865) (N)

Hyledelphax Vilbaste, 1968

Hyledelphax elegantulus (Boheman, 1847) (N, S)

Megamelodes Le Quesne, 1960

Megamelodes quadrimaculatus (Signoret, 1865) (S)

Calligypona J. Sahlberg, 1871

Calligypona reyi (Fieber, 1866) (N, S)

Delphacodes Fieber, 1866

Delphacodes audrasi (Ribaut, 1954) (N?, S?) (*)

Delphacodes linnavuorii Le Quesne, 1960 (N?, S?) (*)

Delphacodes mulsanti (Fieber, 1866) (S, Sa)

Delphacodes nastasi Asche & Remane, 1983 (Si)

Delphacodes venosus (Germar, 1830) (N)

Muellerianella Wagner, 1963

Muellerianella brevipennis (Boheman, 1847) (N, Sa)

Muellerianella fairmairei (Perris, 1857) (N, S)

Chlorionidea Löw, 1885

Chlorionidea flava (Löw, 1885) (N)

Muirodelphax Wagner, 1963

Muirodelphax aubei (Perris, 1857) (N, S, Sa)

Acantodelphax Le Quesne, 1964

Acantodelphax spinosus (Fieber, 1866) (N)

Dicranotropis Fieber, 1866

Dicranotropis divergens Kirschbaum, 1868 (N, S)

Dicranotropis hamata (Boheman, 1847) (N, S)

Nycheuma Fennah, 1964

Nycheuma dimorpha (Matsumura, 1910) (Si)

Florodelphax Vilbaste, 1968

Florodelphax leptosoma (Flor, 1861) (N, S)

Kosswigianella Wagner, 1963

Kosswigianella exigua (Boheman, 1847) (N, S) (*)

Struebingianella Wagner, 1963

Struebingianella lugubrina (Boheman, 1847) (N)

Scottianella Anufriev, 1980

Scottianella dalei (Scott, 1870) (S) (*)

Horvathianella Anufriev, 1980

Horvathianella palliceps (Horváth, 1897) (N)

Agrisicula Asche, 1980

Agrisicula ankistrofer Asche, 1980 (Si) (E)

Xanthodelphax Wagner, 1963

Xanthodelphax flaveolus (Flor, 1861) (N, S) (*)

Xanthodelphax stramineus (Stål, 1858) (N)

Paradelphacodes Wagner, 1963

Paradelphacodes paludosus (Flor, 1861) (N, S)

Toya Distant, 1906

Toya obtusangula (Linnavuori, 1957) (S)

Toya propinqua (Fieber, 1866) (N, S, Si)

Toya turbeculosa (Distant, 1916) (Si)

Falcotoya Fennah, 1969

Falcotoya minuscula (Horváth, 1897) (N)

Javesella Fennah, 1963

Javesella discolor (Boheman, 1847) (N, Si)

Javesella dubia (Kirschbaum, 1868) (N, S)

Javesella forcipata (Boheman, 1847) (N)

Javesella obscurella (Boheman, 1847) (N, S, Sa)

Javesella pellucida (Fabricius, 1794) (N, S)

Javesella stali (Metcalf, 1943) (N?) (*)

Ribautodelphax Wagner, 1963

Ribautodelphax albostriatus (Fieber, 1866) (N, S)

Ribautodelphax collinus (Boheman, 1847) (N, S)

Ribautodelphax imitans (Ribaut, 1953) (N)

Ribautodelphax ochreatus Vilbaste, 1965 (N)

Ribautodelphax pallens (Stål, 1854) (N)

Ribautodelphax pungens (Ribaut, 1953) (S)

Pseudaraeopus Kirkaldy, 1904

Pseudaraeopus lethierryi (Mulsant & Rey, 1879) (S, Si) (*)

Euidopsis Ribaut, 1948

Euidopsis truncata Ribaut, 1948 (S)

Flastena Nast, 1975

Flastena fumipennis (Fieber, 1866) (N, Si, Sa)

Liburnia Stål, 1866

Liburnia latifrons Fieber, 1879 (Si) (*)

Matutinus Distant, 1917

Matutinus putoni (A. Costa, 1888) (Si, Sa)

Note

Kelisia sulcata: Presenza dubbia.

Eurya lineata: Si: solo Isole Eolie.

Eurysa meridiana: S: solo Calabria.

Eurysa rubripes: S: solo Puglia.

Eurysula lurida: Segnalata solo in Umbria.

Metropis latifrons: Presenza dubbia.

Euconomelus lepidus: S: solo Calabria.

Conomelus lorifer: La sottospecie *l. calabricus* è endemica di Calabria.

Delphax ribautianus: A questa specie si riferiscono le segnalazioni in Italia di *D. meridionalis* (Haupt, 1924) che è un endemita greco.

Delphax macropterus: Specie dubbia di incerta collocazione generica.

Delphax radiatus: Specie di incerta collocazione generica.

Delphax tapinus: Specie di collocazione generica incerta.

Megamelus leptus: Specie di dubbio valore la cui segnalazione in Italia non è credibile.

Delphacodes audrasi: Specie dubbia di incerta presenza in Italia.

Delphacodes linnavuorii: Specie di interpretazione e distribuzione incerta. È probabile che ad essa possano riferirsi le segnalazioni in Italia di *D. audrasi*.

Kosswigianella exigua: S: solo isola del Giglio.

Scottianella dalei: Segnalata solo per l'isola del Giglio.

Xanthodelphax flaveolus: S: solo Campania.

Javesella stali: Presenza dubbia.

Pseudaraeopus lethierryi: S: solo Calabria; Si: solo isole Eolie.

Liburnia latifrons: Specie di posizione generica incerta.

Meenoplidae

Meenoplus Fieber, 1866

Meenoplus albosignatus Fieber, 1866 (S)

Derbidae

Malenia Haupt, 1924

Malenia sicula Haupt, 1924 (S, Si) (E) (*)

Malenia dlabolai D'Urso, 1985 (S) (E)

Note

Malenia sicula: A questa specie sono da riferire le segnalazioni in Sicilia di *M. bosnica* (Horváth), che è specie assente in Italia.

Achilidae

Cixidia Fieber, 1866

Cixidia advena (Spinola, 1839) (N, S, Si, Sa)

Cixidia genei (Spinola, 1839) (N) (*)
Cixidia marginicollis (Spinola, 1839) (S?, Si)
Cixidia pilatoi D'Urso & Guglielmino, 1995 (N, S) (E)
Cixidia sikaniae D'Urso & Guglielmino, 1995 (Si) (E)

Note

Cixidia genei: Specie di dubbia validità.

Dictyopharidae

Dictyophara Germar, 1833

Dictyophara cyrnea Spinola, 1839 (Sa)
Dictyophara europaea (Linnaeus, 1767) (N, S, Si, Sa)
Dictyophara multireticulata Mulsant & Rey, 1855 (N, S, Si)
Dictyophara pannonica (Germar, 1830) (*)

Ranissus Fieber, 1866

Ranissus discrepans Fieber, 1866 (*)

Bursinia A. Costa, 1862

Bursinia elongatula Linnavuori, 1965 (Si)
Bursinia genei (Dufour, 1849) (N, S, Sa)
Bursinia hemiptera (O.G. Costa, 1840) (N, S, Si, Sa)
Bursinia sicala Emeljanov, 1972 (Si) (E)

Iphicara Emeljanov, 1978

Iphicara globiceps (Linnavuori, 1961) (Sa) (E)

Note

Dictyophara pannonica: Vecchie segnalazioni generiche, senza località precisata.
Ranissus discrepans: Vecchie segnalazioni senza località precisata.

Tropiduchidae

Trypetimorpha A. Costa, 1862

Trypetimorpha fenestrata A. Costa, 1862 (N, S)
Trypetimorpha pilosa Horváth, 1907 (S)

Ommatissus Fieber, 1875

Ommatissus binotatus Fieber, 1876 (Si)

Tettigometridae

Tettigometra Latreille, 1804

Tettigometra atra Hagenbach, 1822 (N, S, Si, Sa)
Tettigometra atrata Fieber, 1872 (N)
Tettigometra atrovirens O.G. Costa, 1834 (S) (E)
Tettigometra costulata Fieber, 1865 (S, Si)
Tettigometra depressa Fieber, 1865 (N, Si)
Tettigometra distincta (Lucas, 1849) (Si)
Tettigometra fusca Fieber, 1865 (N, S)
Tettigometra griseola Fieber, 1865 (N, S)
Tettigometra impressifrons Mulsant & Rey, 1855 (N, S, Si, Sa)
Tettigometra impressopunctata Dufour, 1846 (N, S, Si, Sa)
Tettigometra obliqua (Panzer, 1799) (N, S, Si, Sa)
Tettigometra peliotaenia Fieber, 1865 (N)
Tettigometra picea Kirschbaum, 1868 (S, Si)
Tettigometra picta Fieber, 1865 (S, Si, Sa)
Tettigometra psittacina O.G. Costa, 1834 (S) (E)
Tettigometra sororcula Horváth, 1897 (N, S)
Tettigometra sulphurea Mulsant & Rey, 1855 (N, S)
Tettigometra ventralis Signoret, 1866 (S)
Tettigometra virescens (Panzer, 1799) (N, S, Si, Sa)

Histrigonia Emeljanov, 1980

Histrigonia hexaspina (Kolenati, 1857) (N?) (*)

Micrometrina Lindberg, 1948

Micrometrina baranii (Signoret, 1866) (N, S, Si)
Micrometrina longicornis (Signoret, 1866) (S, Si)

Brachyceph Kirkaldy, 1906

Brachyceph brachycephalus (Fieber, 1865) (N, S, Si)
Brachyceph damryi (Lethierry, 1876) (Sa)
Brachyceph laetus (Herrich-Schäffer, 1835) (N, S, Si)
Brachyceph sanguineus (Lethierry, 1876) (S, Si)

Eurychila Signoret, 1866

Eurychila brunnea (Signoret, 1866) (N, S, Si)

Note

Histrigonia hexaspina: Unica e vecchia segnalazione per il Piemonte che andrebbe verificata.

Issidae

Caliscelis Laporte, 1833

Caliscelis affinis (Fieber, 1876) (*)
Caliscelis bolivari Horváth, 1904 (Si)
Caliscelis bonellii (Latreille, 1807) (N, S, Si, Sa)
Caliscelis dimidiata A. Costa, 1863 (S, Si) (*)
Caliscelis tricolor (O.G. Costa, 1834) (E) (*)
Caliscelis unicolor (O.G. Costa, 1834) (E) (*)
Caliscelis wallengreni (Stål, 1863) (N)

Homocnemia A. Costa, 1857

Homocnemia albovittata A. Costa, 1857 (S) (E)

Aphelonema Uhler, 1876

Aphelonema melichari (Horváth, 1897) (N)
Aphelonema quadrivittata (Fieber, 1876) (N, S)
Aphelonema raniformis (Mulsant & Rey, 1855) (S) (*)

Ommatidiotus Spinola, 1839

Ommatidiotus dissimilis (Fallén, 1806) (N, S)
Ommatidiotus longiceps Puton, 1896 (S) (*)

Mycterodus Spinola, 1839

Mycterodus etruscus Dlabola, 1980 (N) (E) (*)
Mycterodus immaculatus (Fabricius, 1794) (N, S?, Si, Sa?) (*)
Mycterodus nasutus (Herrich-Schäffer, 1835) (N, S, Si?, Sa) (*)
Mycterodus orthocephalus Ferrari, 1885 (N, S)
Mycterodus sulcatus Fieber, 1876 (N, Si) (E)

Conosimus Mulsant & Rey, 1855

Conosimus coelatus Mulsant & Rey, 1855 (Sa)
Conosimus malfanus Dlabola, 1987 (Si) (E) (*)

Falcidius Stål, 1866

Falcidius abruzicus Dlabola, 1983 (S) (E)

Falcidius apterus (Fabricius, 1794) (N, S, Si, Sa)
Falcidius oculatus (Linnavuori, 1965) (S) (E) (*)

Hysteropterum Amyot & Serville, 1843

Hysteropterum maculifrons Mulsant & Rey, 1855 (S, Sa)
Hysteropterum melanophleps Fieber, 1877 (N, S, Si, Sa)
Hysteropterum nervosum Fieber, 1877 (N, Si)
Hysteropterum phaeophleps Fieber, 1877 (*)
Hysteropterum reticulatum (Herrich-Schäffer, 1835) (N, S, Si)
Hysteropterum schaefferi Metcalf, 1958 (N, S, Si)

Agalmatium Emeljanov, 1971

Agalmatium bilobum (Fieber, 1877) (S, Sa) (*)
Agalmatium distinguendum (Kirschbaum, 1868) (Si)
Agalmatium flavescens (Olivier, 1791) (N, S, Si, Sa)

Bubastia Emeljanov, 1975

Bubastia obsoleta (Fieber, 1877) (N, S)

Fieberium Dlabola, 1980

Fieberium angulare (Fieber, 1877) (N) (*)

Kovaciana Synave, 1956

Kovaciana maculipes (Melichar, 1906) (N, S, Si)

Scorlupella Emeljanov, 1971

Scorlupella discolor (Germar, 1821) (*)

Tshurtshurnella Kusnezov, 1927

Tshurtshurnella armatissima (Linnavuori, 1962) (S) (*)
Tshurtshurnella despecta (Linnavuori, 1965) (*)
Tshurtshurnella zelleri (Kirschbaum, 1868) (S, Si) (E)

Issus Fabricius, 1803

Issus coleoptratus (Fabricius, 1781) (N, S, Si, Sa)
Issus lauri Ahrens, 1818 (N, S, Si)
Issus muscaeformis (Schrank, 1781) (N)

Latissus Dlabola, 1974

Latissus dilatatus (Fourcroy, 1785) (N, S, Si, Sa)

Latilica Emeljanov, 1971

Latilica tendinosa (Spinola, 1839) (S) (*)

Note

Caliscelis affinis: Una sola vecchia segnalazione senza località precisata; da verificare.

Caliscelis dimidiata: Specie di dubbio valore.

Caliscelis tricolor: Specie dubbia, segnalata genericamente per l'Italia.

Caliscelis unicolor: Specie dubbia, segnalata genericamente per l'Italia.

Aphelonema raniformis: Solo vecchie segnalazioni per la Campania.

Ommatidiotus longiceps: Segnalata solo per il Lazio.

Mycterodus etruscus: Endemica della Liguria.

Mycterodus immaculatus: Alcune segnalazioni riferibili a *M. nasutus* con la quale talvolta è stata confusa.

Mycterodus nasutus: Tradizionalmente considerata sinonimo di *M. immaculatus* alla quale potrebbero riferirsi alcune citazioni.

Conosimus malfanus: Endemica delle isole Eolie e di Marettimo.

Falcidius oculatus: Endemica dell'isola d'Elba.

Hysteropterum phaeophleps: Vecchie segnalazioni generiche.

Agalmatium bilobum: S: solo Puglia.

Fieberium angulare: Nota solo di Liguria.

Scorlupella discolor: Vecchie segnalazioni senza località precisata; da verificare.

Tshurtshurnella armatissima: Nota solo di Puglia.

Tshurtshurnella despecta: Segnalazione generica.

Latilica tendinosa: Nota solo di Puglia.

Flatidae

Phantia Fieber, 1866

Phantia subquadrata (Herrich-Schäffer, 1838) (N, Si)

Cyphopterum Melichar, 1839

Cyphopterum difforme (Spinola, 1839) (S, Sa) (*)

Metcalfa Caldwell & Martorell, 1951

Metcalfa pruinosa (Say, 1830) (N, S) (*)

Note

Cyphopterum difforme: A questa specie sono da attribuire le segnalazioni di *C. adscendens* (Herrich-Schäffer, 1835) in Italia.

Metcalfa pruinosa: Specie nearctica introdotta.

Cicadidae

Lyristes Horváth, 1926

Lyristes plebejus (Scopoli, 1763) (N, S, Si, Sa)

Cicadatra Kolenati, 1857

Cicadatra alhageos (Kolenati, 1857) (S?) (*)

Cicadatra atra (Olivier, 1790) (N, S, Si)

Cicadatra persica Kirkaldy, 1909 (Si?) (*)

Cicada Linnaeus, 1758

Cicada barbara (Stål, 1866) (Si?, Sa?) (*)

Cicada orni Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)

Tibicina Kolenati, 1857

Tibicina baetica (Rambur, 1840) (Sa)

Tibicina cisticola (Hagen, 1855) (Sa)

Tibicina corsica (Rambur, 1840) (Sa)

Tibicina haematodes (Scopoli, 1763) (N, S, Si)

Tibicina luctuosa (A. Costa, 1883) (Sa) (E)

Tibicina nigronevosa Fieber, 1876 (*)

Tibicina picta (Fabricius, 1794) (S, Sa)

Cicadetta Kolenati, 1857

Cicadetta albipennis Fieber, 1876 (Si)

Cicadetta brullei Fieber, 1876 (N, S)

Cicadetta dimissa (Hagen, 1856) (N, Si)

Cicadetta flaveola (Brullé, 1832) (Si)

Cicadetta mediterranea Fieber, 1876 (N, S, Si)

Cicadetta montana (Scopoli, 1772) (N, S, Si)

Cicadetta pygmaea (Olivier, 1790) (Si?) (*)

Cicadetta transylvanica Fieber, 1876 (N) (*)

Cicadivetta Boulard, 1982

Cicadivetta tibialis (Panzer, 1788) (N, S, Si)

Hilaphura Webb, 1979

Hilaphura varipes (Walth, 1837) (Si)

***Tettigetta* Kolenati, 1857**

Tettigetta argentata (Olivier, 1790) (N, S, Si)

***Tympanistalna* Boulard, 1982**

Tympanistalna gastrica (Stål, 1854) (Si)

Note

Cicadatra alhageos: Unica vecchia segnalazione poco credibile per il Lazio.

Cicadatra persica: Unica e vecchia segnalazione da verificare.

Cicada barbara: Vecchie segnalazioni non credibili.

Tibicina nigranervosa: Specie di dubbia presenza in Italia, citata genericamente nel catalogo di Nast (1987).

Cicadetta pygmea: Vecchia segnalazione poco credibile; in passato considerata sinonimo di *C. montana*.

Cicadetta transylvanica: Nota solo dell'Emilia.

Cercopidae

***Cercopis* Fabricius, 1775**

Cercopis arcuata Fieber, 1884 (N, S, Si)

Cercopis intermedia Kirschbaum, 1868 (N)

Cercopis sabaudiana Lallemand, 1949 (N) (E) (*)

Cercopis sanguinolenta (Scopoli, 1763) (N, S, Si)

Cercopis vulnerata Rossi, 1807 (N, S)

***Haematoloma* Haupt, 1919**

Haematoloma dorsatum (Ahrens, 1812) (N, S, Si)

***Lepyronia* Amyot & Serville, 1843**

Lepyronia coleoptrata (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

***Neophilaenus* Haupt, 1935**

Neophilaenus albipennis (Fabricius, 1758) (N, S, Si, Sa)

Neophilaenus campestris (Fallén, 1805) (N, S, Si, Sa)

Neophilaenus exclamationis (Thunberg, 1784) (N, S)

Neophilaenus infumatus (Haupt, 1917) (N, S, Si)

Neophilaenus limpidus (Wagner, 1935) (N)

Neophilaenus lineatus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Neophilaenus minor (Kirschbaum, 1868) (N)

Aphrophora Germar, 1821

Aphrophora alni (Fallén, 1805) (N, S, Si, Sa)

Aphrophora alpina Melichar, 1900 (N)

Aphrophora corticea Germar, 1821 (N)

Aphrophora costalis Matsumura, 1903 (N, S)

Aphrophora salicina (Goeze, 1778) (N, S, Sa)

Philaenus Stål, 1864

Philaenus signatus Melichar, 1896 (S, Si)

Philaenus spumarius (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Note

Cercopis sabaudiana: Specie di dubbio valore, nota solo dalla Valle di Susa.

Membracidae

Oxyrhachis Germar, 1833

Oxyrhachis capeneri Izzard, 1953 (Si)

Centrotus Fabricius, 1803

Centrotus cornutus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)

Gargara Amyot & Serville, 1843

Gargara genistae (Fabricius, 1775) (N, S, Si)

Stictocephala Stål, 1869

Stictocephala bisonia Kopp & Yonke, 1977 (N, S, Si, Sa) (*)

Note

Stictocephala bisonia: Specie nearctica introdotta in Europa agli inizi del ventesimo secolo.

Cicadellidae

Ulopa Fallén, 1814

Ulopa reticulata (Fabricius, 1794) (N, S)

Ulopa trivialis Germar, 1821 (N, S)

Megophthalmus Curtis, 1833

Megophthalmus scabripennis Edwards, 1915 (N, S, Si)
Megophthalmus scanicus (Fallén, 1806) (N, S, Si)

Ledra Fabricius, 1803

Ledra aurita (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Oncopsis Burmeister, 1838

Oncopsis alni (Schrank, 1801) (N, S, Si, Sa)
Oncopsis carpini (J. Sahlberg, 1871) (N, S)
Oncopsis flavicollis (Linnaeus, 1761) (N, S, Si, Sa)
Oncopsis subangulata (J. Sahlberg, 1871) (N, Si)
Oncopsis tristis (Zetterstedt, 1840) (N, Si)

Pediopsis Burmeister, 1838

Pediopsis tiliae (Germar, 1831) (S) (*)

Macropsis Lewis, 1834

Macropsis cerea (Germar, 1837) (N, S, Sa)
Macropsis fuscinervis (Boheman, 1845) (S, Si) (*)
Macropsis fuscula (Zetterstedt, 1828) (N, S, Si, Sa)
Macropsis glandacea (Fieber, 1868) (N, S)
Macropsis graminea (Fabricius, 1798) (N, S, Si, Sa)
Macropsis haupti Wagner, 1941 (*)
Macropsis impura (Boheman, 1847) (N)
Macropsis infuscata (J. Sahlberg, 1874) (N, S)
Macropsis marginata (Herrich-Schäffer, 1836) (N, S)
Macropsis megerlei (Fieber, 1868) (*)
Macropsis mendax (Fieber, 1868) (N, S, Sa)
Macropsis mulsanti (Fieber, 1868) (Si)
Macropsis notata (Prohaska, 1923) (*)
Macropsis ocellata Provancher, 1872 (N) (*)
Macropsis prasina (Boheman, 1852) (N, S, Si, Sa)
Macropsis scutellata (Boheman, 1845) (N, S, Si)
Macropsis vestita Ribaut, 1952 (N) (*)
Macropsis viridinervis Wagner, 1950 (N, S)

Macropsidius Ribaut, 1952

Macropsidius calaber Dlabola, 1963 (S) (E) (*)
Macropsidius dispar (Fieber, 1868) (S)
Macropsidius sahlbergi (Flor, 1861) (S)

Hephathus Ribaut, 1952

Hephathus freyi (Fieber, 1868) (N, S, Si)

Hephathus nanus (Herrich-Schäffer, 1835) (N, S, Si, Sa)

Agallia Curtis, 1833

Agallia albovenosa Fieber, 1868 (Si)

Agallia aliena Fieber, 1868 (N) (*)

Agallia brachyptera (Boheman, 1847) (S) (*)

Agallia consobrina Curtis, 1833 (N, S, Si, Sa)

Agallia limbata Kirschbaum, 1868 (N) (*)

Anaceratagallia Zachvatkin, 1943

Anaceratagallia austriaca Wagner, 1955 (N) (*)

Anaceratagallia harrarensis (Melichar, 1911) (S)

Anaceratagallia laevis (Ribaut, 1935)

Anaceratagallia laevis acutangulata Zachvatkin, 1946 (S)

Anaceratagallia laevis laevis (Ribaut, 1935) (N, S, Si, Sa)

Anaceratagallia ribauti (Ossiannilsson, 1938) (N, S, Si)

Anaceratagallia venosa (Fourcroy, 1785) (N, S, Si, Sa)

Austroagallia Evans, 1935

Austroagallia avicula (Ribaut, 1935) (Si, Sa)

Austroagallia sinuata (Mulsant & Rey, 1855) (N, S, Si, Sa)

Dryodurgades Zachvatkin, 1946

Dryodurgades dlabolai Wagner, 1963 (N)

Dryodurgades reticulatus (Herrich-Schäffer, 1834) (N, S, Si)

Dryodurgades similis Wagner, 1963 (N, S) (E)

Rhytidodus Fieber, 1868

Rhytidodus decimusquartus (Schrank, 1776) (N, S, Si)

Rhytidodus wagneri Dlabola, 1965 (N)

Idiocerus Lewis, 1834

Idiocerus herrichii (Kirschbaum, 1868) (N, S, Si)

Idiocerus lituratus (Fallén, 1806) (N, S, Sa)

Idiocerus similis Kirschbaum, 1868 (N, S)

Idiocerus stigmatalis Lewis, 1834 (N, S, Sa)

Idiocerus vicinus Melichar, 1898 (S)

Acericerus Dlabola, 1974

Acericerus heydenii (Kirschbaum, 1868) (N, S, Si)
Acericerus rotundifrons (Kirschbaum, 1868) (N, S)
Acericerus vittifrons (Kirschbaum, 1868) (N, S, Si)

Balcanocerus Maldonado-Capriles, 1971

Balcanocerus brusinae (Horváth, 1891) (N) (*)
Balcanocerus larvatus (Herrich-Schäffer, 1837) (N, S, Si)
Balcanocerus pruni (Ribaut, 1952) (N, S)

Bugraia Kocak, 1981

Bugraia ocularis (Mulsant & Rey, 1855) (N, S, Si, Sa)

Metidiocerus Ossiannilsson, 1981

Metidiocerus elegans (Flor, 1861) (N)

Populicerus Dlabola, 1974

Populicerus albicans (Kirschbaum, 1868) (N, S)
Populicerus confusus (Flor, 1861) (N, S)
Populicerus fulgidus (Fabricius, 1775) (N, S)
Populicerus laminatus (Flor, 1861) (N, Si)
Populicerus nitidissimus (Herrich-Schäffer, 1835) (*)
Populicerus populi (Linnaeus, 1761) (N, S)

Stenidiocerus Ossiannilsson, 1981

Stenidiocerus poecilus (Herrich-Schäffer, 1835) (N, S, Si)

Tremulicerus Dlabola, 1974

Tremulicerus dimidiatus (Ribaut, 1952) (Sa)
Tremulicerus distinguendus (Kirschbaum, 1868) (N, S, Sa)
Tremulicerus impressifrons (Kirschbaum, 1868) (N, S)
Tremulicerus mesopyrrhus (Kirschbaum, 1868) (N, S)
Tremulicerus rutilans (Kirschbaum, 1868) (N) (*)
Tremulicerus tremulae (Estlund, 1786) (N, S, Si, Sa)
Tremulicerus vitreus (Fabricius, 1803) (S, Si, Sa)

Viridicerus Dlabola, 1974

Viridicerus ustulatus (Mulsant & Rey, 1855) (N, S, Si, Sa)

Batracomorphus Lewis, 1834

Batracomorphus allionii (Turton, 1802) (N, Si)
Batracomorphus irroratus Lewis, 1834 (N, S)

Iassus Fabricius, 1803

Iassus Ianio (Linnaeus, 1761) (N, S, Si)
Iassus scutellaris (Fieber, 1868) (N, S, Si, Sa)
Iassus vaginatus (Kirschbaum, 1868) (Si) (E) (*)

Penthimia Germar, 1821

Penthimia nigra (Goeze, 1778) (N, S)

Paradorydium Kirkaldy, 1901

Paradorydium lanceolatum (Burmeister, 1838) (N?, S, Si) (*)

Eupelix Germar, 1821

Eupelix cuspidata (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa)

Cephalius Fieber, 1875

Cephalius frontalis Signoret, 1879 (S) (*)

Hecalus Stål, 1864

Hecalus eximius (Kirschbaum, 1868) (Si)
Hecalus glaucescens (Fieber, 1866) (N, S, Si)
Hecalus storai (Lindberg, 1957) (Si)

Aphrodes Curtis, 1833

Aphrodes aestuarina (Edwards, 1908) (N)
Aphrodes bicincta (Schrank, 1776) (N, S, Si?, Sa) (*)
Aphrodes carinata (Stål, 1864) (N, S, Si, Sa)
Aphrodes makarovi Zachvatkin, 1948 (N, Si)
Aphrodes siracusae (Matsumura, 1908) (Si) (E)

Anoscopus Kirschbaum, 1858

Anoscopus albifrons (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
Anoscopus assimilis (Signoret, 1879) (N, Si, Sa)
Anoscopus flavostriatus (Donovan, 1799) (N, S)
Anoscopus histrionicus (Fabricius, 1794) (N, S, Si)
Anoscopus limicola (Edwards, 1908) (S?) (*)
Anoscopus serratulae (Fabricius, 1775) (N, S)

Planaphrodes Hamilton, 1975

Planaphrodes bifasciata (Linnaeus, 1758) (N, S)
Planaphrodes elongata (Lethierry, 1876) (S) (*)
Planaphrodes laeva (Rey, 1891) (N, S)
Planaphrodes nigrita (Kirschbaum, 1868) (N, S)

Stroggylocephalus Flor, 1861

Stroggylocephalus agrestis (Fallén, 1806) (N, Si)
Stroggylocephalus livens (Zetterstedt, 1840) (N) (*)

Coelidia Germar, 1821

Coelidia fuscata (Gmelin, 1789) (N?) (*)
Coelidia puerpera (O.G. Costa, 1834) (E) (*)
Coelidia quadriverrucata (Fabricius, 1794) (N?) (E) (*)
Coelidia sexpunctata (O.G. Costa, 1834) (E) (*)

Stegelytra Mulsant & Rey, 1855

Stegelytra erythroneura Haupt, 1924 (N, Si) (*)

Evacanthus Le Peletier & Serville, 1825

Evacanthus acuminatus (Fabricius, 1794) (N, S, Si)
Evacanthus interruptus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)
Evacanthus rostagnoi (Picco, 1921) (S) (E) (*)

Errhomenus Fieber, 1866

Errhomenus brachypterus Fieber, 1866 (N)

Anoterostemma Löw, 1855

Anoterostemma ivanoffi (Lethierry, 1876) (N) (*)

Cicadella Latreille, 1817

Cicadella longivittata (O.G. Costa, 1834) (E) (*)
Cicadella lunulata (O.G. Costa, 1834) (E) (*)
Cicadella transversa (O.G. Costa, 1834) (E) (*)
Cicadella viridis (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Graphocephala Van Duzee, 1916

Graphocephala fennahi Young, 1977 (N) (*)

Alebra Fieber, 1872

Alebra albostriella (Fallén, 1826) (N, S, Si, Sa)
Alebra coryli Le Quesne, 1977 (N, S)
Alebra neglecta Wagner, 1940 (N)
Alebra wahlbergi (Boheman, 1845) (N, S, Si)

Erythria Fieber, 1866

Erythria alpina (Vidano, 1959) (N) (E)
Erythria aureola (Fallén, 1806) (N) (*)
Erythria cisalpina Dworakowska, 1976 (N) (E) (*)
Erythria ferrarii (Puton, 1877) (N, S)
Erythria manderstjernii (Kirschbaum, 1868) (N)
Erythria montandoni (Puton, 1880) (N)
Erythria pedemontana Vidano, 1959 (N) (*)
Erythria seclusa Horváth, 1803 (S, Sa)

Liguropia Haupt, 1930

Liguropia juniperi (Lethierry, 1876) (N, S, Si, Sa)

Emelyanoviana Anufriev, 1970

Emelyanoviana contraria (Ribaut, 1936) (N)
Emelyanoviana mollicula (Boheman, 1845) (N, S, Si)

Dikraneura Hardy, 1850

Dikraneura aridella (J. Sahlberg, 1871) (N) (*)
Dikraneura variata Hardy, 1850 (N, S, Si)

Micantulina Anufriev, 1970

Micantulina micantula (Zetterstedt, 1840) (N, Si)
Micantulina stigmatipennis (Mulsant & Rey, 1855) (N, S, Si, Sa)
Micantulina teucarii (Cerutti, 1938) (N, S)

Wagneriala Anufriev, 1970

Wagneriala incisa (Then, 1897) (N)
Wagneriala minima (J. Sahlberg, 1871) (S) (*)
Wagneriala sinuata (Then, 1897) (N)

Forcipata De Long & Caldwell, 1936

Forcipata citrinella (Zetterstedt, 1828) (N?) (*)

Forcipata flava Vidano, 1965 (N) (E) (*)
Forcipata forcipata (Flor, 1861) (N?) (*)
Forcipata major (Wagner, 1947) (N)
Forcipata obtusa Vidano, 1965 (N)

Notus Fieber, 1866

Notus flavipennis (Zetterstedt, 1828) (N?, S?) (*)
Notus italicus Wagner, 1954 (N, S) (E)

Kybos Fieber, 1866

Kybos aetnicola Wagner, 1959 (Si) (E)
Kybos betulicola (Wagner, 1955) (N) (*)
Kybos butleri (Edwards, 1908) (*)
Kybos populi (Edwards, 1908) (N, Si)
Kybos rufescens Melichar, 1896 (N, S, Si, Sa)
Kybos smaragdulus (Fallén, 1806) (N, S)
Kybos strobli (Wagner, 1949) (N) (*)
Kybos virgator (Ribaut, 1933) (N, Sa)

Empoasca Walsh, 1862

Empoasca affinis Nast, 1937 (N?) (*)
Empoasca alsiosa Ribaut, 1933 (N, S, Si, Sa)
Empoasca decipiens Paoli, 1930 (N, S, Si, Sa)
Empoasca solani (Curtis, 1846) (N, S, Sa)
Empoasca vitis (Göthe, 1875) (N, S, Si, Sa)

Asymmetrasca Dlabola, 1958

Asymmetrasca decedens Paoli, 1932 (N, S, Si, Sa)

Austroasca Lower, 1952

Austroasca vittata (Lethierry, 1884) (N, Si)

Jacobiasca Dworakowska, 1972

Jacobiasca lybica (Bergevin & Zanon, 1922) (Si, Sa)

Kyboasca Zachvatkin, 1953

Kyboasca bipunctata (Oshanin, 1871) (N)

Chlorita Fieber, 1872

Chlorita antoniae Dlabola, 1959 (S) (E)

Chlorita beieri Dlabola, 1959 (N) (*)
Chlorita dumosa (Ribaut, 1933) (*)
Chlorita helichrysi Vidano, 1964 (Sa)
Chlorita mendax (Ribaut, 1933) (N)
Chlorita multinervia Vidano, 1964 (Sa) (*)
Chlorita paolii (Ossiannilsson, 1939) (S)
Chlorita tamaninii Wagner, 1959 (N) (*)
Chlorita tessellata Lethierry, 1884 (N) (*)
Chlorita viridula (Fallén, 1806) (N)

Eremochlorita Zachvatkin, 1946

Eremochlorita hungarica (Ribaut, 1933) (N)

Fagocyba Dlabola, 1958

Fagocyba alnisuga Arzone, 1976 (N) (E) (*)
Fagocyba cruenta (Herrich-Schäffer, 1838) (N, S, Si)
Fagocyba douglasi (Edwards, 1878) (N, S)

Dryocyba Vilbaste, 1982

Dryocyba carri (Edwards, 1914) (N)

Ossiannilssonola Christian, 1953

Ossiannilssonola callosa (Then, 1886) (N) (*)

Edwardsiana Zachvatkin, 1929

Edwardsiana alnicola (Edwards, 1924) (N)
Edwardsiana avellanae (Edwards, 1888) (N, S, Si)
Edwardsiana bergmani (Tullgren, 1916) (N)
Edwardsiana candidula (Kirschbaum, 1868) (N)
Edwardsiana diversa (Edwards, 1914) (N, Si)
Edwardsiana flavescens (Fabricius, 1794) (N, S, Si, Sa) (*)
Edwardsiana frustrator (Edwards, 1980) (N, S)
Edwardsiana geometrica (Schränk, 1801) (N)
Edwardsiana gratiosa (Boheman, 1852) (N)
Edwardsiana helva Arzone, 1975 (N) (E) (*)
Edwardsiana hippocastani (Edwards, 1888) (N, S)
Edwardsiana lamellaris (Ribaut, 1931) (N)
Edwardsiana lethierryi (Edwards, 1881) (N)
Edwardsiana platanicola (Vidano, 1961) (N, S, Si, Sa)
Edwardsiana prunicola (Edwards, 1914) (N)
Edwardsiana rhodophila (Cerutti, 1937) (N)
Edwardsiana rosae (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)
Edwardsiana rosaesugans (Cerutti, 1939) (N?) (*)

Edwardsiana sardoa Arzone, 1975 (N, Sa) (E)
Edwardsiana soror (Linnavuori, 1950) (N)
Edwardsiana spinigera (Edwards, 1924) (N, S)
Edwardsiana staminata (Ribaut, 1931) (N, S)

Eupterycyba Dlabola, 1958

Eupterycyba jucunda (Herrich-Schäffer, 1837) (N, S, Sa)

Linnavuoriana Dlabola, 1958

Linnavuoriana decempunctata (Fallén, 1806) (N)
Linnavuoriana sexmaculata (Hardy, 1850) (N, Si, Sa)

Ficocyba Vidano, 1960

Ficocyba ficaria (Horváth, 1897) (N, S, Sa)

Lindbergina Dlabola, 1958

Lindbergina aurovittata (Douglas, 1875) (N, S, Si, Sa)
Lindbergina loewi (Lethierry, 1884) (N?) (*)
Lindbergina spoliata (Horváth, 1907) (N, S, Si, Sa)

Ribautiana Zachvatkin, 1947

Ribautiana alces (Ribaut, 1931) (N, S, Si, Sa)
Ribautiana cruciata (Ribaut, 1931) (S, Sa)
Ribautiana debilis (Douglas, 1876) (N, S, Sa)
Ribautiana scalaris (Ribaut, 1931) (N, Si)
Ribautiana tenerrima (Herrich-Schäffer, 1834) (N, S, Si, Sa)
Ribautiana ulmi (Linnaeus, 1758) (N, S)

Typhlocyba Germar, 1833

Typhlocyba chobauti Ribaut, 1952 (N, S, Si?) (*)
Typhlocyba margineguttata Lethierry, 1884 (N) (E) (*)
Typhlocyba quercus (Fabricius, 1777) (N, S, Si)

Zonocyba Vilbaste, 1982

Zonocyba bifasciata (Boheman, 1851) (N, S)

Eurhadina Haupt, 1929

Eurhadina concinna (Germar, 1831) (N, S, Si)
Eurhadina kirschbaumi Wagner, 1937 (N, Si)
Eurhadina pulchella (Fallén, 1806) (N)

***Eupteryx* Curtis, 1833**

Eupteryx adspersa (Herrich-Schäffer, 1838) (Si)
Eupteryx andalusiaca Ferrari, 1882 (N, S, Si, Sa)
Eupteryx atropunctata (Goeze, 1778) (N, S)
Eupteryx aurata (Linnaeus, 1758) (N, S)
Eupteryx binotata (Lethierry, 1874) (N) (*)
Eupteryx calcarata Ossiannillsson, 1936 (Si)
Eupteryx castelvechius Dlabola, 1967 (Si)
Eupteryx collina (Flor, 1861) (N, S, Sa)
Eupteryx corsica Lethierry, 1876 (Sa)
Eupteryx cyclops Matsumura, 1906 (N, S)
Eupteryx decemnotata Rey, 1891 (N, S, Si, Sa)
Eupteryx filicum (Newman, 1853) (S, Si, Sa) (*)
Eupteryx heydenii (Kirschbaum, 1868) (N, S)
Eupteryx genestieri Meusnier, 1982 (N) (*)
Eupteryx immaculatifrons (Kirschbaum, 1868) (N) (*)
Eupteryx melissae Curtis, 1837 (N, S, Si, Sa)
Eupteryx notata Curtis, 1837 (N, S?) (*)
Eupteryx rostrata Ribaut, 1936 (S, Si, Sa)
Eupteryx salviae Arzone & Vidano, 1994 (N)
Eupteryx schuleri Ribaut, 1952 (Sa)
Eupteryx signatipennis (Bohemann, 1847) (N)
Eupteryx stachydearum (Hardy, 1850) (N, S, Si, Sa)
Eupteryx tenella (Fallén, 1806) (N, S)
Eupteryx thoulessi Edwards, 1926 (N, S, Si)
Eupteryx urticae (Fabricius, 1803) (N, S, Si, Sa)
Eupteryx vittata (Linnaeus, 1758) (N)
Eupteryx zelleri (Kirschbaum, 1868) (N, S, Si, Sa)

***Aguriahana* Distant, 1918**

Aguriahana stellulata (Burmeister, 1841) (N)

***Wagneripteryx* Dlabola, 1958**

Wagneripteryx germari (Zetterstedt, 1840) (N, S, Si)

***Zyginella* Löw, 1885**

Zyginella pulchra Löw, 1885 (N, Si, Sa)

***Alnetoidia* Dlabola, 1958**

Alnetoidia alneti (Dahlbom, 1850) (N, S, Si, Sa)

***Hauptidia* Dworakowska, 1970**

Hauptidia distinguenda (Kirschbaum, 1868) (N, Si)
Hauptidia incospicua (Vidano, 1964) (Sa) (E)
Hauptidia lapidicola (Vidano, 1964) (N, Si, Sa)
Hauptidia provincialis (Ribaut, 1931) (N, S, Si, Sa)

Kropka Dworakowska, 1970

Kropka unipunctata (Dlabola, 1957) (Si)

Zyginidia Haupt, 1929

Zyginidia adamczewskii Dworakowska, 1970 (S) (*)
Zyginidia italica (Ribaut, 1947) (N) (E) (*)
Zyginidia lineata (Lindberg, 1954) (Si, Sa)
Zyginidia longicornis Vidano, 1982 (N) (E)
Zyginidia mocsaryi (Horváth, 1910) (N)
Zyginidia pullula (Boheman, 1845) (N)
Zyginidia ribauti Dworakowska, 1970 (N, S, Si)
Zyginidia scutellaris (Herrich-Schäffer, 1838) (N, S?, Sa)
Zyginidia serpentina (Matsumura, 1908) (N?, Si)
Zyginidia servadeii Vidano, 1982 (N, S, Si)
Zyginidia viaduensis (Wagner, 1949) (N) (*)

Zygina Fieber, 1866

Zygina angusta Lethierry, 1874 (N)
Zygina discolor Horváth, 1897 (N, S, Si, Sa)
Zygina eburnea Fieber, 1884 (*)
Zygina flammigera (Fourcroy, 1785) (N, S, Si)
Zygina frauenfeldi Lethierry, 1880 (S) (*)
Zygina griseombra Remane, 1994 (S)
Zygina hyperici (Herrich-Schäffer, 1836) (N, Si, Sa)
Zygina luteipennis Rey, 1894 (*)
Zygina nivea (Mulsant & Rey, 1855) (N, S, Sa)
Zygina ordinaria (Ribaut, 1936) (*)
Zygina rhamni Ferrari, 1882 (N, S, Si, Sa)
Zygina rorida (Mulsant et Rey, 1855) (N, S, Si, Sa)
Zygina roseipennis (Tollin, 1851) (N?, S?) (*)
Zygina rubrovittata (Lethierry, 1869) (N, Sa)
Zygina schneideri (Günthart, 1974) (Si?) (*)
Zygina suavis Rey, 1891 (N, S, Si?)
Zygina tiliae (Fallén, 1806) (N, S)
Zygina tithide Ferrari, 1882 (N, S)

Arboridia Zachvatkin, 1946

Arboridia erecta (Ribaut, 1931) (N) (*)

Arboridia parvula (Boheman, 1845) (N, S, Si, Sa)
Arboridia ribauti (Ossiannilsson, 1937) (N)
Arboridia velata (Ribaut, 1952) (N)
Arboridia versuta (Melichar, 1897) (N, S, Si)

Frutioidia Zachvatkin, 1946

Frutioidia bisignata (Mulsant & Rey, 1855) (N, S, Sa)
Frutioidia sanguinosa (Rey, 1891) (N, Si) (*)

Tamaricella Zachvatkin, 1946

Tamaricella tamaricis (Puton, 1872) (S, Si, Sa)

Grypotes Fieber, 1866

Grypotes puncticollis (Herrich-Schäffer, 1834) (S, Si)
Grypotes staurus Ivanoff, 1885 (S, Si, Sa)

Goniagnathus Fieber, 1866

Goniagnathus brevis (Herrich-Schäffer, 1835) (N, S, Si)
Goniagnathus guttulinervis (Kirschbaum, 1868) (S, Si, Sa)

Opsius Fieber, 1866

Opsius lethierryi Wagner, 1942 (N, S, Si, Sa)
Opsius stactogalus Fieber, 1866 (N, S, Si, Sa)

Neoaliturus Distant, 1918

Neoaliturus alboguttatus (Lethierry, 1874) (N, Si)
Neoaliturus dubiosus (Matsumura, 1908) (Si, Sa) (*)
Neoaliturus fenestratus (Herrich-Schäffer, 1834) (N, S, Si, Sa)
Neoaliturus haematoceps (Mulsant & Rey, 1855) (N, S, Si, Sa) (*)
Neoaliturus tenellus (Baker, 1896) (Si) (*)

Jubrinia Linnavuori, 1962

Jubrinia distincta Linnavuori, 1962 (S, Si) (*)

Nesoclutha Evans, 1947

Nesoclutha erythrocephala (Ferrari, 1882) (N)

Cicadulina China, 1926

Cicadulina bipunctata (Melichar, 1904) (Si)

Balclutha Kirkaldy, 1900

Balclutha frontalis (Ferrari, 1882) (N, S, Si)
Balclutha punctata (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa)
Balclutha saltuella (Kirschbaum, 1868) (N, S, Si)
Balclutha tricolor (Gmelin, 1790) (*)

Macrosteles Fieber, 1866

Macrosteles alpinus (Zetterstedt, 1828) (N)
Macrosteles cristatus (Ribaut, 1927) (N, S?)
Macrosteles forficula (Ribaut, 1927) (N, S)
Macrosteles frontalis (Scott, 1875) (N, S)
Macrosteles halophilus (Horváth, 1903) (Si, Sa)
Macrosteles horvathi (Wagner, 1935) (N)
Macrosteles laevis (Ribaut, 1927) (N, S)
Macrosteles maculosus (Then, 1897) (N) (*)
Macrosteles ossiannilssoni Lindberg, 1954 (Si)
Macrosteles quadripunctulatus (Kirschbaum, 1868) (N, S, Si)
Macrosteles ramosus Ribaut, 1952 (Si)
Macrosteles salsolae (Puton, 1872) (N, Si, Sa)
Macrosteles sardus Ribaut, 1948 (S, Sa)
Macrosteles septemnotatus (Fallén, 1806) (S) (*)
Macrosteles sexnotatus (Fallén, 1806) (N, S, Si, Sa)
Macrosteles variatus (Fallén, 1806) (N, S)
Macrosteles viridigriseus (Edwards, 1922) (N, S, Si)

Sonronius Dorst, 1937

Sonronius dahlbomi (Zetterstedt, 1840) (N) (*)

Sagatus Ribaut, 1948

Sagatus punctifrons (Fallén, 1826) (N, S)

Deltocephalus Burmeister, 1838

Deltocephalus pulicaris (Fallén, 1806) (N, S, Si)
Deltocephalus amyoti Vismara, 1878 (S) (E) (*)
Deltocephalus ecchellii Ferrari, 1892 (N) (E) (*)
Deltocephalus hamatus Then, 1896 (N) (E) (*)
Deltocephalus ignoscus Fieber, 1869 (N) (*)
Deltocephalus mellae Ferrari, 1882 (N) (E) (*)

Nanosius Diabola, 1974

Nanosius chloroticus (Melichar, 1896) (N) (*)

Emeljanovianus Dlabola, 1965

Emeljanovianus medius (Mulsant & Rey, 1855) (N, S)

Recilia Edwards, 1922

Recilia coronifera (Marshall, 1866) (N, S, Si)

Recilia horvathi (Then, 1896) (N)

Recilia schmidtgeni (Wagner, 1939) (N, S, Si)

Japananus Ball, 1931

Japananus hyalinus (Osborn, 1900) (N) (*)

Stymphalus Stål, 1866

Stymphalus rubrolineatus (Stål, 1855) (S)

Chiasmus Mulsant & Rey, 1855

Chiasmus conspurcatus (Perris, 1857) (N, S, Si, Sa)

Chiasmus translucidus Mulsant & Rey, 1855 (N, Si, Sa)

Doratura J. Sahlberg, 1871

Doratura concors Horváth, 1903 (N) (*)

Doratura exilis Horváth, 1903 (*)

Doratura heterophyla Horváth, 1903 (S) (*)

Doratura homophyla (Flor, 1861) (N, S)

Doratura horvathi Wagner, 1939 (S)

Doratura iblea D'Urso, 1983 (Si) (E)

Doratura impudica Horváth, 1897 (N, S)

Doratura paludosa Melichar, 1897 (N, S, Si)

Doratura stylata (Boheman, 1847) (N, S)

Doratura veneta Dlabola, 1959 (N, S) (E)

Aconurella Ribaut, 1848

Aconurella prolixa (Lethierry, 1885) (N, S, Si)

Fieberiella Signoret, 1880

Fieberiella florii (Stål, 1864) (N, S, Si)

Fieberiella salacia Dlabola, 1965 (S, Si) (E) (*)

Synophropsis Haupt, 1926

Synophropsis lauri (Horváth, 1897) (N, S, Si)

Placotettix Ribaut, 1942

Placotettix taeniatifrons (Kirschbaum, 1868) (N, S, Si)

Cechenotettix Ribaut, 1942

Cechenotettix nemourensis (Matsumura, 1908) (Si)

Phlogotettix Ribaut, 1942

Phlogotettix cyclops (Mulsant & Rey, 1855) (N)

Doratulina Melichar, 1903

Doratulina instabilis (Ribaut, 1948) (S) (*)

Doratulina ragusai (Melichar, 1914) (S, Si) (E)

Exitianus Ball, 1929

Exitianus capicola (Stål, 1855) (N?, S?, Si, Sa?) (*)

Exitianus fasciolatus (Melichar, 1911) (N, Si)

Exitianus taeniiceps (Kirschbaum, 1868) (N, S, Si, Sa)

Exitianus transversalis (Matsumura, 1908) (Si) (E)

Tetartostylus Wagner, 1951

Tetartostylus illyricus (Kirschbaum, 1868) (N?) (*)

Scaphoideus Uhler, 1889

Scaphoideus titanus Ball, 1932 (N) (*)

Osbornellus Ball, 1932

Osbornellus horvathi (Matsumura, 1908) (Si)

Platymetopius Burmeister, 1838

Platymetopius ferrarii Haupt, 1927 (S, Si)

Platymetopius filigranus (Scott, 1876) (N, Si)

Platymetopius guttatus Fieber, 1869 (N, S)

Platymetopius henribauti Dlabola, 1961 (S)

Platymetopius major (Kirschbaum, 1868) (N, S)

Platymetopius obsoletus (Signoret, 1880) (N, S)

Platymetopius rostratus (Herrich-Schäffer, 1834) (N, S)

Platymetopius undatus (De Geer, 1773) (N, S, Si?)

Platymetopius verae Guglielmino, 1989 (Si) (E)

Proceps Mulsant & Rey, 1855

Proceps acicularis Mulsant & Rey, 1855 (N, S, Si, Sa)

Selachina Emeljanov, 1962

Selachina apicalis (Matsumura, 1908) (S, Si) (*)

Anoplotettix Ribaut, 1942

Anoplotettix etnensis Wagner, 1959 (Si) (E)

Anoplotettix fuscovenosus (Ferrari, 1882) (N, S, Sa)

Anoplotettix horvathi Metcalf, 1955 (N)

Anoplotettix putoni Ribaut, 1952 (S, Si)

Anoplotettix scalaris (Haupt, 1924) (Si) (E)

Idiodonus Ball, 1936

Idiodonus cruentataus (Panzer, 1799) (N, S) (*)

Colladonus Ball, 1936

Colladonus torneellus (Zetterstedt, 1828) (N) (*)

Lamprotettix Ribaut, 1942

Lamprotettix nitidulus (Fabricius, 1787) (N, S, Si)

Paramesodes Ishihara, 1953

Paramesodes lucaniae (Diabola, 1959) (S) (*)

Allygus Fieber, 1875

Allygus communis (Ferrari, 1882) (N)

Allygus maculatus Ribaut, 1948 (S, Si)

Allygus mixtus (Fabricius, 1794) (N, S, Si, Sa) (*)

Allygus modestus Scott, 1876 (N, S, Si, Sa)

Allygus provincialis (Ferrari, 1882) (N, S, Sa)

Allygus theryi (Horváth, 1907) (N, S, Sa)

Allygidius Ribaut, 1948

Allygidius abbreviatus (Lethierry, 1878) (N, S, Si)

Allygidius atomarius (Fabricius, 1794) (N, S)

Allygidius commutatus (Fieber, 1872) (N, Si)

Allygidius detectus Ribaut, 1952 (N, S)
Allygidius furcatus (Ferrari, 1882) (N, S)
Allygidius mayri (Kirschbaum, 1868) (N, Sa)

Mimallygus Ribaut, 1948

Mimallygus lacteinervis (Kirschbaum, 1868) (N) (*)

Phlepsius Fieber, 1866

Phlepsius intricatus (Herrich-Schäffer, 1838) (N, S, Si, Sa)
Phlepsius spinulosus Wagner, 1963 (N, S, Si, Sa)

Selenocephalus Germar, 1833

Selenocephalus conspersus (Herrich-Schäffer, 1834) (S) (*)
Selenocephalus lusitanicus Signoret, 1880 (S, Sa)
Selenocephalus obsoletus (Germar, 1817) (N, S, Si, Sa)
Selenocephalus pallidus Kirschbaum, 1868 (N, S)

Graphocraerus Thomson, 1869

Graphocraerus ventralis (Fallén, 1806) (N, S)

Rhytistylus Fieber, 1875

Rhytistylus proceps (Kirschbaum, 1868)
Rhytistylus proceps lavicus D'Urso, 1978 (Si) (E)
Rhytistylus proceps proceps (Kirschbaum, 1868) (N, S)

Hardya Edwards, 1822

Hardya anatolica Zachvatkin, 1946 (N)
Hardya melanopsis (Hardy, 1850) (N)
Hardya signifera (Then, 1897) (N) (*)
Hardya tenuis (Germar, 1821) (N, S, Sa)

Eohardya Zachvatkin, 1946

Eohardya fraudulenta (Horváth, 1903) (S, Si, Sa)

Sardius Ribaut, 1946

Sardius argus (Marshall, 1866) (N, Si)

Rhopalopyx Ribaut, 1939

Rhopalopyx elongatus Wagner, 1952 (N, S, Si, Sa)

Rhopalopyx vitripennis (Flor, 1861) (N, S, Sa)

Streptopyx Linnavuori, 1958

Streptopyx tamaninii Linnavuori, 1958 (N) (*)

Elymana De Long, 1936

Elymana sulphurella (Zetterstedt, 1828) (N, S, Si)

Cicadula Zetterstedt, 1840

Cicadula frontalis (Herrich-Schäffer, 1835) (N, S)

Cicadula lineatopunctata (Matsumura, 1908) (N, Si, Sa)

Cicadula persimilis (Edwards, 1920) (N, S)

Cicadula placida (Horváth, 1897) (N) (*)

Cicadula quadrinotata (Fabricius, 1794) (N, S, Sa)

Mocydia Edwards, 1922

Mocydia crocea (Herrich-Schäffer, 1837) (N, S, Si)

Mocydiopsis Ribaut, 1939

Mocydiopsis attenuata (Germar, 1821) (N, S, Si)

Mocydiopsis longicauda Remane, 1961 (S, Si)

Mocydiopsis monticola Remane, 1961 (Si)

Mocydiopsis oranensis (Matsumura, 1908) (S, Si)

Mocydiopsis parvicauda Ribaut, 1939 (S, Si)

Speudotettix Ribaut, 1942

Speudotettix subfuscus (Fallén, 1806) (N, S)

Hesium Ribaut, 1942

Hesium domino (Reuter, 1880) (N, S)

Thamnotettix Zetterstedt, 1840

Thamnotettix confinis Zetterstedt, 1828 (N, S, Si, Sa)

Thamnotettix dilutior (Kirschbaum, 1868) (N, S, Si, Sa)

Thamnotettix exemptus Melichar, 1896 (N, S) (*)

Thamnotettix ghiliani Ferrari, 1892 (N) (E) (*)

Thamnotettix zelleri (Kirschbaum, 1868) (N, S, Si, Sa)

Pithyotettix Ribaut, 1942

Pithyotettix abietinus (Fallén, 1806) (N)

Perotettix Ribaut, 1942

Perotettix pictus (Lethierry, 1880) (N)

Macustus Ribaut, 1942

Macustus grisescens (Zetterstedt, 1828) (S) (*)

Athysanus Burmeister, 1838

Athysanus argentarius Metcalf, 1955 (N, S)

Athysanus lugubris Melichar, 1896 (*)

Athysanus luridus Ferrari, 1882 (N) (*)

Handianus Ribaut, 1942

Handianus ignoscus (Melichar, 1896) (N, S, Sa)

Handianus mediterraneus Linnavuori, 1962 (S) (*)

Handianus modestus (Melichar, 1896) (N) (*)

Stictocoris Thomson, 1869

Stictocoris picturatus (C. Sahlberg, 1842) (N, S)

Ophiola Edwards, 1922

Ophiola cornicula (Marshall, 1866) (N, S)

Ophiola decumana (Kontkanen, 1949) (N)

Ophiola ocellaris (Lethierry, 1880) (N) (*)

Ophiola transversa (Fallén, 1826) (N)

Limotettix J. Sahlberg, 1871

Limotettix striola (Fallén, 1806) (N, S)

Laburrus Ribaut, 1942

Laburrus impictifrons (Boheman, 1852) (N, S)

Laburrus quadratus (Forel, 1864) (N, S, Sa)

Euscelidius Ribaut, 1942

Euscelidius schenckii (Kirschbaum, 1868) (Si)

Euscelidius variegatus (Kirschbaum, 1858) (N, S, Si, Sa)

Conosanus Osborn & Ball, 1902

Conosanus obsoletus (Kirschbaum, 1858) (N, S, Si)

Euscelis Brullé, 1832

Euscelis alsius Ribaut, 1952 (N, S, Si)

Euscelis distinguendus (Kirschbaum, 1858) (N, S, Si)

Euscelis galiberti Ribaut, 1952 (N) (*)

Euscelis incisus (Kirschbaum, 1858) (N, S, Si, Sa)

Euscelis lineolatus Brullé, 1832 (N, S, Si, Sa)

Euscelis remanei Strübing, 1980 (Si)

Euscelis punctinervis Haupt, 1924 (Si) (E) (*)

Euscelis venosus (Kirschbaum, 1868) (N) (*)

Sotanus Ribaut, 1942

Sotanus thenii (Löw, 1885) (N) (*)

Streptanus Ribaut, 1942

Streptanus josifovi Dlabola, 1957 (N, S, Si)

Streptanus marginatus (Kirschbaum, 1858) (Si) (*)

Streptanus sordidus (Zetterstedt, 1828) (N, S)

Artianus Ribaut, 1942

Artianus interstitialis (Germar, 1821) (S)

Artianus manderstjernii (Kirschbaum, 1868) (S, Si)

Phycotettix Haupt, 1929

Phycotettix truncatipennis (Rambur, 1840) (Si, Sa)

Melillaia Linnavuori, 1971

Melillaia matsumuri (Metcalf, 1955) (Si)

Oxytettigella Metcalf, 1952

Oxytettigella viridinervis (Kirschbaum, 1868) (S, Si, Sa)

Aglena Amyot & Serville, 1843

Aglena ornata (Herrich-Schäffer, 1838) (N, S, Si, Sa)

Paramesus Fieber, 1866

Paramesus obtusifrons (Stål, 1853) (N, S, Si, Sa)

Paramesus paludosus Ribaut, 1952 (N) (*)

Paralimnus Matsumura, 1902

Paralimnus phragmites (Boheman, 1847) (N, S, Si)

Paralimnus rotundiceps (Lethierry, 1885) (N) (*)

Metalimnus Ribaut, 1948

Metalimnus formosus (Boheman, 1845) (N)

Arocephalus Ribaut, 1946

Arocephalus grandii Servadei, 1972 (N)

Arocephalus languidus (Flor, 1861) (N, S)

Arocephalus longiceps (Kirschbaum, 1868) (N, S, Si)

Arocephalus punctum (Flor, 1861) (*)

Arocephalus punctum punctum (Flor, 1861) (N)

Arocephalus punctum siculus D'Urso, 1978 (Si) (E)

Metagoldeus Remane & Asche, 1980

Metagoldeus simplicipenis Remane & Asche, 1980 (Si)

Psammotettix Haupt, 1929

Psammotettix adriaticus Wagner, 1959 (N, S, Si)

Psammotettix alienus (Dahlbom, 1850) (N, S, Si)

Psammotettix angulatus (Then, 1899) (N) (*)

Psammotettix cephalotes (Herrich-Schäffer, 1834) (N, S)

Psammotettix confinis (Dahlbom, 1850) (N, S, Si, Sa)

Psammotettix erraticus Linnavuori, 1965 (N?, S)

Psammotettix helvolus (Kirschbaum, 1868) (N, S, Si, Sa)

Psammotettix jenjouristi (Zachvatkin, 1933) (S) (E) (*)

Psammotettix kolosvarensis (Matsumura, 1908) (N) (*)

Psammotettix nardeti Remane, 1965 (N)

Psammotettix nodosus (Ribaut, 1925) (N?) (*)

Psammotettix notatus (Melichar, 1896) (N, S, Sa)

Psammotettix provincialis (Ribaut, 1925) (N, S, Si, Sa)

Psammotettix putoni (Then, 1898) (N?) (*)

Psammotettix sabulicola (Curtis, 1837) (N) (*)

Psammotettix striatus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Ebarrius Ribaut, 1946

Ebarrius cognatus (Fieber, 1869) (N, S)

Ebarrius interstictus (Fieber, 1869) (N) (*)

Adarrus Ribaut, 1947

Adarrus aeolianus D'Urso, 1984 (Si) (E) (*)
Adarrus bellevoeyi (Puton, 1877) (N) (*)
Adarrus calabricus Dlabola, 1961 (S) (E) (*)
Adarrus exornatus Ribaut, 1952 (N, S)
Adarrus geniculatus Ribaut, 1952 (N, S)
Adarrus lesei Remane & D'Urso, 1987 (Si) (E)
Adarrus messinicus Dlabola, 1980 (Si) (E)
Adarrus multinotatus (Boheman, 1847) (N, S)
Adarrus pollinicola Remane & Asche, 1980 (S) (E) (*)
Adarrus reductus (Melichar, 1897) (S) (*)

Errastunus Ribaut, 1946

Errastunus ocellaris (Fallén, 1806) (N, S)

Turrutus Ribaut, 1946

Turrutus socialis (Flor, 1861) (N)

Mongolojassus Zachvatkin, 1953

Mongolojassus meritalicus D'Urso & Remane, 1988 (S) (E) (*)
Mongolojassus servadeinus (Dlabola, 1958) (N) (E) (*)

Pleargus Emeljanov, 1964

Pleargus pygmaeus (Horváth, 1897) (N)

Jassargus Zachvatkin, 1934

Jassargus allobrogicus (Ribaut, 1936) (N)
Jassargus alpinus (Then, 1896) (*)
Jassargus alpinus neglectus (Then, 1896) (N)
Jassargus avennicus Ribaut, 1952 (N) (*)
Jassargus boldensis Remane & Schulz, 1976 (N) (E) (*)
Jassargus bicorniger (Then, 1896) (N) (E) (*)
Jassargus bispinatus (Then, 1896) (N) (*)
Jassargus bisubulatus (Then, 1896) (N, S)
Jassargus bobbicola Remane & Schulz, 1976 (N) (*)
Jassargus dentatus D'Urso, 1980 (N) (E) (*)
Jassargus distinguendus (Flor, 1861) (N)
Jassargus flori (Fieber, 1869) (N, S)
Jassargus hartigi (Wagner, 1942) (N) (E) (*)
Jassargus lagrecai D'Urso, 1982 (Si) (E)
Jassargus latinus (Wagner, 1942) (N, S)
Jassargus obtusivalvis (Kirschbaum, 1868) (N, S)

Jassargus repletus (Fieber, 1869) (N, S)
Jassargus sursumflexus (Then, 1902) (N, S)

Mendraus Ribaut, 1946

Mendraus pauxillus (Fieber, 1869) (N)

Pinumius Ribaut, 1946

Pinumius areatus (Stål, 1858) (N) (*)

Diplocolenus Ribaut, 1946

Diplocolenus abdominalis (Fabricius, 1803) (N, S)
Diplocolenus bohemani (Zetterstedt, 1840) (N, S)
Diplocolenus frauenfeldi (Fieber, 1869) (N) (*)
Diplocolenus laetitia Servadei, 1960 (S) (E) (*)
Diplocolenus monticola (Linnavuori, 1959) (N, S) (E)
Diplocolenus nigricans (Kirschbaum, 1868) (N) (*)
Diplocolenus nigrifrons (Kirschbaum, 1868) (N, S)
Diplocolenus sudeticus (Kolenati, 1860) (N?) (*)

Arthaldeus Ribaut, 1946

Arthaldeus striifrons (Kirschbaum, 1868) (N, S, Si)

Rosenus Oman, 1949

Rosenus laciniatus (Then, 1896) (N?) (*)

Sorhoanus Ribaut, 1946

Sorhoanus assimilis (Fallén, 1806) (N)

Rhoananus Dlabola, 1949

Rhoananus hypochlorus (Fieber, 1869) (N)

Mocuellus Ribaut, 1946

Mocuellus collinus (Boheman, 1850) (N)

Metapocirtus O.G. Costa, 1834

Metapocirtus listatus O.G. Costa, 1834 (E) (*)

Note

Pediopsis tiliae: Segnalata solo di Toscana.

Macropsis fuscinervis: S: presente solo in Basilicata.

Macropsis haupti: Segnalazione generica e inaffidabile; questa specie potrebbe essere stata erroneamente segnalata come *M. planicollis*, oggi sinonimo di *M. cerea*.

Macropsis megerlei: Segnalazione generica da confermare.

Macropsis notata: Segnalazione generica da confermare.

Macropsis ocellata: Segnalata solo in Piemonte.

Macropsis vestita: Segnalata solo in Piemonte.

Macropsidius calaber: Specie endemica di Calabria.

Agallia aliena: Segnalata solo in Emilia.

Agallia brachyptera: Segnalata solo in Campania.

Agallia limbata: Segnalata solo in Friuli Venezia Giulia.

Anaceratagallia austriaca: Segnalata solo in Trentino Alto Adige.

Balcanocerus brusinae: Segnalata solo in Friuli Venezia Giulia.

Populicerus nitidissimus: Specie probabilmente assente in Italia la cui segnalazione generica sembra dovuta al fatto che in passato è stata considerata un sinonimo di *P. fulgidus*.

Tremulicerus rutilans: Segnalata solo in Trentino Alto Adige.

Iassus vaginatus: Specie di posizione generica non ancora definita.

Paradorydium lanceolatum: Le segnalazioni per N (Liguria) e Lazio potrebbero riferirsi a *P. paradoxum* (Herrich-Schäffer, 1837) con la quale *P. lanceolatum* è stata confusa e messa in sinonimia e la cui presenza in Italia va comunque accertata.

Cephalius frontalis: Unica vecchia segnalazione per il Lazio.

Aphrodes bicincta: Tutte le segnalazioni di Si sembra appartengano ad *A. makarovi* e probabilmente anche (tutte o in parte) quelle della penisola e di Sa.

Anoscopus limicola: Specie considerata per lungo tempo sinonimo di *A. albifrons*; la sua presenza in Italia è da verificare.

Planaphrodes elongata: Presente solo nell'isola del Giglio.

Stroggylocephalus livens: Segnalata solo in Trentino Alto Adige.

Coelidia: Genere di dubbia presenza in Italia.

Coelidia fuscata: Specie probabilmente assente in Italia: solo una vecchia segnalazione in Veneto.

Coelidia puerpera: Specie di dubbia validità segnalata genericamente solo dal descrittore.

Coelidia quadriverrucata: Specie di dubbia validità; solo una vecchia segnalazione in Veneto.

Coelidia sexpunctata: Specie di dubbia validità con l'unica segnalazione generica del descrittore.

Stegelytra erythroneura: Segnalata in Italia erroneamente come *S. putoni* Mulsant & Rey, 1875.

Evacanthus rostagnoi: Specie di dubbia validità segnalata solo per il Lazio.

Anoterostemma ivanoffi: Specie segnalata solo in Friuli Venezia Giulia.

Cicadella longivittata: Specie di dubbia validità, segnalata genericamente solo dal descrittore.

Cicadella lunulata: Specie di dubbia validità, segnalata genericamente solo dal descrittore.

Cicadella transversa: Specie di dubbia validità, segnalata genericamente solo dal descrittore.

Graphocephala fennahi: Specie introdotta in Europa dal Nord America.

Erythria aureola: Segnalata solo in Trentino Alto Adige.

Erythria cisalpina: Specie endemica del Trentino Alto Adige.

Erythria pedemontana: Specie nota solo del Piemonte e del territorio francese di confine (Col di Tenda).

Dikraneura aridella: Segnalata solo in Piemonte.

Wagneriala minima: Segnalata solo per Campo Imperatore.

Forcipata citrinella: Le segnalazioni di questa specie sono probabilmente da attribuire a *F. major*.

Forcipata flava: Endemica del Piemonte.

Forcipata forcipata: Le segnalazioni di questa specie sono probabilmente da riferire a *F. obtusa*.

Notus flavipennis: Solo vecchie segnalazioni di dubbia validità.

Kybos betulicola: Segnalata solo in Piemonte.

Kybos butleri: Segnalazione generica da verificare.

Kybos strobli: Segnalata solo per la Val Malenco.

Empoasca affinis: Segnalazione da confermare.

Chlorita beieri: Segnalata solo in Friuli Venezia Giulia.

Chlorita dumosa: Segnalazione generica da verificare.

Chlorita multinervia: Endemita sardo-corso.

Chlorita tamaninii: Segnalata solo in Trentino Alto Adige.

Chlorita tessellata: Segnalata solo in Piemonte.

Fagocyba alnisuga: Specie endemica del Piemonte.

Ossiannilssonola callosa: Segnalata solo in Piemonte.

Edwardsiana flavescens: Alcune segnalazioni sono da riferire ad *Empoasca vitis*.

Edwardsiana helva: Specie endemica del Piemonte.

Edwardsiana rosaesugans: Segnalazioni da confermare.

Lindbergina loewi: Specie di dubbia presenza in Italia: la segnalazione per il Friuli Venezia Giulia potrebbe coincidere con quella di *T. fiumensis* per Fiume, oggi in territorio della ex Jugoslavia.

Typhlocyba chobauti: Specie di posizione generica incerta.

Typhlocyba margineguttata: Specie di valore tassonomico dubbio; solo vecchie segnalazioni.

Eupteryx binotata: Segnalata solo in Piemonte.

Eupteryx filicum: S: solo Isola del Giglio e Montecristo.

Eupteryx genestieri: Segnalata solo in Piemonte.

Eupteryx immaculatifrons: Segnalata solo in Trentino Alto Adige.

Eupteryx notata: S: solo Calabria.

Zyginidia adamczewskii: Segnalata solo in Campania compresa l'isola di Capri.

Zyginidia italica: Specie endemica dell'Emilia.

Zyginidia viadensis: Segnalata solo in Valle d'Aosta.

Zygina eburnea: Vecchia segnalazione generica, non credibile.

Zygina frauenfeldi: Segnalata solo in Umbria.

Zygina luteipennis: Solo una segnalazione generica, da confermare.

Zygina ordinaria: Solo segnalazioni generiche, probabilmente riferite a *N.*

Zygina roseipennis: Tutte le segnalazioni di questa specie sono dubbie.

Zygina schneideri: Segnalazione come cfr. *schneideri*.

Arboridia erecta: Segnalata solo in il Veneto.

Frutoidia sanguinosa: N: solo Friuli Venezia Giulia.

Neoaliturus dubiosus: Secondo alcuni autori la specie appartiene al genere *Circulifer* (considerato dalla maggior parte degli autori o un sottogenere o un sinonimo di *Neoaliturus*).

Neoaliturus haematoceps: Secondo alcuni autori la specie appartiene al genere *Circulifer*.

Neoaliturus tenellus: Secondo alcuni autori la specie appartiene al genere *Circulifer*.

Jubrinia distincta: Nota solo di Puglia e delle Isole Eolie.

Balclutha tricolor: Specie in passato confusa con *B. punctata* (della quale era considerata un

sinonimo): alcune segnalazioni di quest'ultima dovrebbero invece probabilmente essere attribuite a *B. tricolor*.

Macrosteles maculosus: Segnalata solo in Friuli Venezia Giulia.

Macrosteles septemnotatus: Segnalata solo in Toscana.

Sonronius dahlbomi: Segnalata solo in Trentino Alto Adige.

Deltocephalus amyoti: Specie di dubbia validità, nota solo della Toscana, in passato considerata sinonimo di *Psammotettix striatus*.

Deltocephalus ecchellii: Specie di dubbia validità, nota solo del Trentino Alto Adige.

Deltocephalus hamatus: Specie di dubbia validità, nota solo in Friuli Venezia Giulia.

Deltocephalus ignoscus: Specie di dubbia validità, segnalata solo in Trentino Alto Adige.

Deltocephalus mellae: Specie di dubbia validità.

Nanosius chloroticus: Segnalata solo in Trentino Alto Adige.

Japananus hyalinus: Specie nearctica introdotta.

Doratura concors: Segnalata solo in Friuli Venezia Giulia.

Doratura exilis: Specie in passato confusa con *D. stylata* (della quale era considerata un sinonimo); ad essa potrebbero essere attribuite alcune segnalazioni di quest'ultima specie.

Doratura heterophyla: Segnalata solo in Calabria.

Fieberiella salacia: S: solo Puglia.

Doratulina instabilis: Segnalata solo in Basilicata.

Exitianus capicola: Molte segnalazioni di questa specie potrebbero invece riferirsi a *E. taeniaticeps* (quest'ultima considerata da alcuni autori suo sinonimo).

Tetartostylus illyricus: Presenza dubbia.

Scaphoideus titanus: Specie introdotta in Europa dal Nord America.

Selachina apicalis: S: solo Calabria.

Idiodonus cruentataus: S: solo Calabria.

Colladonus torneellus: Segnalata solo in Trentino Alto Adige.

Paramesodes lucaniae: Segnalata solo in Basilicata.

Allygus mixtus: Alcune segnalazioni di questa specie potrebbero riferirsi ad *A. communis* (in passato considerata un suo sinonimo).

Mimallygus lacteinervis: Segnalata solo in Trentino Alto Adige.

Selenocephalus conspersus: Segnalata solo in Lazio.

Hardya signifera: Segnalata solo in Trentino Alto Adige.

Streptopyx tamaninii: Segnalata solo in Trentino Alto Adige.

Cicadula placida: Segnalata solo in Piemonte.

Thamnotettix exemtus: Specie in passato segnalata erroneamente per Si.

Thamnotettix ghiliani: Specie di posizione generica incerta, endemica del Piemonte.

Macustus grisescens: Segnalata solo in Toscana.

Athysanus lugubris: Specie di posizione generica incerta, segnalata senza località precisata.

Athysanus luridus: Specie di posizione generica incerta, segnalata solo in Piemonte.

Handianus mediterraneus: Segnalata solo nelle Marche.

Handianus modestus: Segnalata solo in Friuli Venezia Giulia.

Ophiola ocellaris: N: solo Piemonte.

Euscelis galiberti: Alcune segnalazioni di *E. incisus* potrebbero invece riferirsi a questa specie (con la quale in passato è stata spesso confusa).

Euscelis punctinervis: Specie di posizione generica incerta.

Euscelis venosus: Segnalata solo in Trentino Alto Adige.

Sotanus thenii: Segnalata solo in Trentino Alto Adige.

Streptanus marginatus: Vecchia segnalazione da verificare.

Paramesus paludosus: Segnalata solo in Veneto.
Paralimnus rotundiceps: Segnalata solo in Emilia.
Arocephalus punctum: La sottospecie p. punctum è segnalata solo in Trentino Alto Adige.
Psammotettix angulatus: Segnalata solo in Friuli Venezia Giulia.
Psammotettix jenjouristi: Specie endemica del Lazio.
Psammotettix kolosvarensis: Segnalata solo in Lombardia.
Psammotettix nodosus: Presenza dubbia.
Psammotettix putoni: Presenza dubbia.
Psammotettix sabulicola: Segnalata solo in Piemonte.
Ebarrius interstictus: Segnalata solo in Trentino Alto Adige.
Adarrus aeolianus: Endemita delle Isole Eolie.
Adarrus bellevoeyi: Segnalata solo in Liguria.
Adarrus calabricus: Segnalata solo in Calabria.
Adarrus pollinicola: Specie endemica del massiccio del Pollino.
Adarrus reductus: Segnalata solo in Puglia.
Mongolojassus meritalicus: Specie endemica del massiccio del Pollino.
Mongolojassus servadeinus: Specie endemica della Valle d'Aosta.
Jassargus alpinus: La sottospecie a. neglectus è nota solo del Piemonte.
Jassargus avennicus: Segnalata solo in Liguria.
Jassargus boldensis: Specie endemica del Veneto.
Jassargus bicorniger: Specie endemica del Friuli Venezia Giulia.
Jassargus bispinatus: Segnalata solo in Friuli Venezia Giulia.
Jassargus bobbicola: Segnalata solo in Lombardia e nel territorio francese presso il confine (Col di Tenda).
Jassargus dentatus: Specie endemica del Piemonte.
Jassargus hartigi: Specie endemica del Veneto.
Pinumius areatus: Segnalata solo in Trentino Alto Adige.
Diplocolenus frauenfeldi: Segnalata solo in Piemonte.
Diplocolenus laetitia: Specie endemica di Calabria.
Diplocolenus nigricans: Segnalata solo in Trentino Alto Adige.
Diplocolenus sudeticus: Vecchia segnalazione per il Piemonte, da confermare.
Rosenus laciniatus: Presenza dubbia in Italia.
Metapocirtus: Genere di incerta collocazione sistematica.
Metapocirtus listatus: Unica segnalazione generica del descrittore.

Aphalaridae

Livia Latreille, 1804

Livia juncorum (Latreille, 1798) (N, S, Si, Sa)

Livia mediterranea Loginova, 1974 (S, Si, Sa)

Euphyllura Förster, 1848

Euphyllura olivina (O.G.Costa, 1839) (N, S, Si, Sa)

Euphyllura phillyreae Förster, 1848 (N, S, Si, Sa)

Crastina Loginova, 1964

Crastina loginovae Conci & Tamanini, 1983 (S, Si)

Stigmaphalara Enderlein, 1929

Stigmaphalara tamaricis (Puton, 1871) (Sa) (*)

Colposcenia Enderlein, 1929

Colposcenia aliena (Löw, 1881) (N, S, Si, Sa)

Aphalara Förster, 1848

Aphalara avicularis Ossiannilsson, 1981 (N)
Aphalara borealis Heslop-Harrison, 1949 (N)
Aphalara calthae (Linnaeus, 1761) (N) (*)
Aphalara exilis (Weber & Mohr, 1804) (N) (*)
Aphalara longicaudata Wagner & Franz, 1961 (N)
Aphalara maculipennis Löw, 1886 (N, S) (*)
Aphalara polygoni Förster, 1848 (N, S)
Aphalara rumicicola Klimaszewski, 1966 (N)
Aphalara sauteri Burckhardt, 1983 (N, S, Sa)

Craspedolepta Enderlein, 1921

Craspedolepta malachitica (Dahlbom, 1851) (N)

Xanioptera Enderlein, 1921

Xanioptera cf. alevtinae (Andrianova, 1948) (S) (*)
Xanioptera carinthica (Ossiannilsson, 1963) (N)
Xanioptera conspersa (Löw, 1888) (N, S) (*)

Magnaphalara Ramirez Gomez, 1960

Magnaphalara bulgarica (Klimaszewski, 1961) (N, S, Si, Sa)
Magnaphalara flavipennis (Förster, 1848) (N)
Magnaphalara nervosa (Förster, 1848) (N)
Magnaphalara cf. pontica (Dobreanu & Manolache, 1962) (S) (*)
Magnaphalara santolinae (Rapisarda, 1989) (Sa) (E)

Tetrafollicula Klimaszewski, 1974

Tetrafollicula omissa (Wagner, 1944) (N) (*)

Neocraspedolepta Conci & Tamanini, 1986

Neocraspedolepta subpunctata (Förster, 1848) (N) (*)

Paracraspedolepta Conci, 1993

Paracraspedolepta nebulosa (Zetterstedt, 1828) (N, S) (*)

Rhodochlanis Loginova, 1964

Rhodochlanis bicolor (Scott, 1880) (N) (*)

Rhodochlanis salsolae (Lethierry, 1874) (S, Si)

Camarotoscena Haupt, 1935

Camarotoscena speciosa (Flor, 1861) (N, Si)

Camarotoscena subrubescens (Flor, 1861) (N, S, Si)

Aphorma Hodkinson, 1974

Aphorma lichenoides (Puton, 1898) (S, Si, Sa)

Strophingia Enderlein, 1914

Strophingia cinereae Hodkinson, 1971 (N, S, Si, Sa)

Strophingia ericae (Curtis, 1835) (N, S)

Strophingia proxima Hodkinson, 1981 (S, Si, Sa)

Strophingia sp. sensu Rapisarda, 1991 (Sa) (*)

Agonoscena Enderlein, 1914

Agonoscena cisti (Puton, 1882) (N, S, Si, Sa)

Agonoscena succincta (Heeger, 1856) (N, S)

Agonoscena targionii (Lichtenstein, 1874) (N, S, Si, Sa)

Lisronia Loginova, 1976

Lisronia varicicosta (Hodkinson & Hollis, 1981) (N, S, Si, Sa)

Rhinocola Förster, 1848

Rhinocola aceris (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)

Rhinocola fusca Burckhardt, 1984 (S)

Diaphorina Löw, 1880

Diaphorina chobauti Puton, 1898 (N) (*)

Diaphorina continua Loginova, 1972 (Sa)

Diaphorina lycii Loginova, 1978 (N, S, Si, Sa) (*)

Diaphorina putonii Löw, 1879 (Si, Sa)

Pseudaphorma Conci & Tamanini, 1985

Pseudaphorma astigma Conci & Tamanini, 1985 (N) (E) (*)

Note

Stigmaphalara tamaricis: Specie tradizionalmente attribuita a Colposcena.

Aphalara calthae: Ricontrata solo sulle Alpi Giulie, a Tarvisio.

Aphalara exilis: Le specie del gruppo *Aphalara exilis* necessitano revisione.

Aphalara maculipennis: In S riscontrata solo sull'Appennino abruzzese.

Xanioptera: Le specie di questo genere sono tradizionalmente attribuite a *Craspedolepta*.

Xanioptera cf. alevtinae: Ricontrata solo sull'Appennino abruzzese.

Xanioptera conspersa: In S riscontrata solo fino all'Appennino marchigiano.

Magnaphalara: Le specie di questo genere sono tradizionalmente attribuite a *Craspedolepta*.

Magnaphalara cf. pontica: Ricontrata solo sull'Appennino marchigiano-abruzzese.

Tetrafollicula omissa: Specie tradizionalmente attribuita a *Craspedolepta*.

Neocraspedolepta subpunctata: Specie tradizionalmente attribuita a *Craspedolepta*.

Paracraspedolepta nebulosa: Specie tradizionalmente attribuita a *Craspedolepta*.

Rhodochlanis bicolor: Ricontrata solo in paludi salmastre presso Ravenna.

Strophingia sp.: Specie non denominata, di cui è stata trovata solo la ninfa.

Diaphorina chobauti: Ricontrata solo presso Genova.

Diaphorina lycii: In N riscontrata solo nel veronese.

Pseudaphorma astigma: Rinvenuto un solo maschio, presso Torino.

Psyllidae

Psylloopsis Löw, 1879

Psylloopsis discrepans (Flor, 1861) (S)

Psylloopsis fraxini (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)

Psylloopsis fraxinicola (Förster, 1848) (N, S, Si, Sa)

Psylloopsis meliphila (Löw, 1881) (N, S, Si)

Acizzia Heslop-Harrison, 1961

Acizzia acaciaebaileyanae (Froggatt, 1901) (S, Si) (*)

Acizzia hollisi Burckhardt, 1981 (Si) (*)

Acizzia uncatoides (Ferris & Klyver, 1932) (N, S, Si) (*)

Cyamophila Loginova, 1976

Cyamophila prohaskai (Priesner, 1927) (N)

Arytaina Förster, 1848

Arytaina adenocarpis (Löw, 1880) (Si)

Arytaina africana Heslop-Harrison, 1951 (S, Si, Sa)
Arytaina genistae (Latreille, 1804) (N, S, Si?, Sa?)
Arytaina maculata (Löw, 1886) (S)
Arytaina torifrons (Flor, 1861) (N) (*)

Arytainilla Loginova, 1972

Arytainilla barbagalloi Rapisarda, 1989 (Si) (E) (*)
Arytainilla cytisi (Puton, 1876) (N, S, Si, Sa)
Arytainilla hakani Loginova, 1976 (S, Si, Sa)
Arytainilla incuba Loginova, 1976 (Si) (*)
Arytainilla spartiicola (Sulc, 1907) (S) (*)
Arytainilla spartiophila (Förster, 1848) (N, S)

Livilla Curtis, 1836

Livilla bimaculata Hodkinson & Hollis, 1987 (N, Sa) (E) (*)
Livilla cognata (Löw, 1881) (N)
Livilla hollisi Rapisarda, 1990 (Sa) (E)
Livilla horvathi (Scott, 1879) (N, S)
Livilla magna Hodkinson & Hollis, 1987 (S, Si, Sa) (E) (*)
Livilla poggii (Conci & Tamanini, 1984) (Sa) (E)
Livilla pyrenaea (Mink, 1859) (N) (*)
Livilla radiata (Förster, 1848) (N, S)
Livilla retamae (Puton, 1878) (Si)
Livilla siciliensis Hodkinson & Hollis, 1987 (Si) (E)
Livilla spectabilis (Flor, 1861) (N, S, Si)
Livilla ulicis Curtis, 1836 (N, S)
Livilla variegata (Löw, 1881) (N, S)
Livilla vicina (Löw, 1886) (N)
Livilla vittipennella (Reuter, 1875) (N)

Psylla Geoffroy, 1762

Psylla alni (Linnaeus, 1758) (N, S, Sa)
Psylla alpina (Förster, 1848) (N)
Psylla betulae (Linnaeus, 1758) (N)
Psylla cordata Tamanini, 1977 (S) (E)
Psylla fusca (Zetterstedt, 1828) (N)

Asphagidella Enderlein, 1921

Asphagidella buxi (Linnaeus, 1758) (N, S) (*)

Baeopelma Enderlein, 1926

Baeopelma colorata (Löw, 1888) (N, S, Si, Sa)
Baeopelma foersteri (Flor, 1861) (N, S, Si, Sa)

Chamaepsylla Ossiannilsson, 1970

Chamaepsylla hartigii (Flor, 1861) (N) (*)

Cacopsylla Ossiannilsson, 1970

Cacopsylla abdominalis (Meyer-Dür, 1871) (N, S)
Cacopsylla affinis (Löw, 1880) (N, S)
Cacopsylla alaterni (Förster, 1848) (N, S, Si, Sa)
Cacopsylla albipes (Flor, 1861) (N, S)
Cacopsylla ambigua (Förster, 1848) (N, S)
Cacopsylla bidens (Sulc, 1907) (N, Si)
Cacopsylla brevantennata (Flor, 1861) (N, S)
Cacopsylla brunneipennis (Edwards, 1896) (N, S, Sa)
Cacopsylla costalis (Flor, 1861) (N) (*)
Cacopsylla crataegi (Schrank, 1801) (N, S, Si, Sa)
Cacopsylla elegantula (Zetterstedt, 1840) (N)
Cacopsylla hippophaes (Förster, 1848) (N)
Cacopsylla intermedia (Löw, 1888) (N) (*)
Cacopsylla iteophila (Löw, 1876) (N)
Cacopsylla limbata (Meyer-Dür, 1871) (N, S)
Cacopsylla mali (Schmidberger, 1836) (N, S)
Cacopsylla melanoneura (Förster, 1848) (N, S, Sa)
Cacopsylla myrthi (Puton, 1876) (N, S, Si)
Cacopsylla myrtilli (Wagner, 1947) (N)
Cacopsylla nigrita (Zetterstedt, 1828) (N)
Cacopsylla notata (Flor, 1861) (S, Si, Sa)
Cacopsylla parvipennis (Löw, 1877) (N?) (*)
Cacopsylla peregrina (Förster, 1848) (N, S, Si, Sa)
Cacopsylla propinqua (Schäfer, 1949) (N) (*)
Cacopsylla pruni (Scopoli, 1763) (N, S)
Cacopsylla pulchella (Löw, 1877) (N, S, Si)
Cacopsylla pulchra (Zetterstedt, 1840) (N, S, Si, Sa)
Cacopsylla pyri (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
Cacopsylla pyricola (Förster, 1848) (N, S)
Cacopsylla pyrisuga (Förster, 1848) (N, S, Si)
Cacopsylla rhamnicola (Scott, 1876) (N, S)
Cacopsylla rhododendri (Puton, 1871) (N)
Cacopsylla saliceti (Förster, 1848) (N, S, Si)
Cacopsylla sorbi (Linnaeus, 1761) (N, S)
Cacopsylla ulmi (Förster, 1848) (N)
Cacopsylla viburni (Löw, 1877) (N, S)
Cacopsylla visci (Curtis, 1835) (N, S)
Cacopsylla zetterstedti (Thomson, 1877) (N, S) (*)

Spanioneura Förster, 1848

Spanioneura fonscolombii Förster, 1848 (N, S)

Note

Acizzia acaciaebaileyanae: Di origine australiana; segnalata in Italia nel 1985.

Acizzia hollisi: Di probabile origine medio-orientale (Arabia Saudita, Israele) e di recente introduzione in Italia. Ricontrata solo a Lampedusa.

Acizzia uncatoides: Di origine australiana; introdotta in Italia poco prima del 1975.

Arytaina torifrons: Un solo esemplare trovato sulle Alpi Occidentali, a Vinadio.

Arytainilla barbagalloi: Ricontrata solo sull'Etna.

Arytainilla incuba: Ricontrata solo nell'Isola di Salina.

Arytainilla spartiicola: Ricontrata solo sul Gargano.

Livilla bimaculata: Ricontrata in N solo sull'Appennino ligure orientale.

Livilla magna: Ricontrata in S solo sul Vesuvio.

Livilla pyrenaea: Ricontrata solo sulle Alpi Marittime.

Asphagidella buxi: Specie tradizionalmente attribuita a Psylla.

Baeopelma: Le specie di questo genere sono tradizionalmente attribuite a Psylla.

Chamaepsylla hartigii: Specie tradizionalmente attribuita a Psylla.

Cacopsylla: Le specie di questo genere sono tradizionalmente attribuite a Psylla.

Cacopsylla costalis: Un solo esemplare sulle Prealpi Trentine, a Terragnolo.

Cacopsylla intermedia: Ricontrata solo sulle Alpi Giulie, a Gorizia.

Cacopsylla parvipennis: Dubbia presenza, al margine del confine nord-orientale italiano.

Cacopsylla propinqua: Ricontrata solo in Valle d'Aosta, a Cheneil.

Cacopsylla zetterstedti: Ricontrata in S solo sull'Appennino toscano.

Spondiliaspidae

Ctenarytaina Ferris & Klyver, 1932

Ctenarytaina eucalypti (Maskell, 1895) (N) (*)

Note

Ctenarytaina: Genere recentemente avvicinato alla sottofamiglia Euphyllurinae (famiglia Aphalaridae).

Ctenarytaina eucalypti: Di origine australiana; segnalata in Italia nel 1982.

Calophyidae

Calophya Löw, 1879

Calophya rhois (Löw, 1877) (N, S)

Homotomidae

Homotoma Guérin-Méneville, 1844

Homotoma ficus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Homotoma viridis Klimaszewski, 1961 (N, S, Si)

Triozidae

Trichohermes Kirkaldy, 1901

Trichohermes walkeri (Förster, 1848) (N, S)

Bactericera Puton, 1876

Bactericera albiventris (Förster, 1848) (N, S, Si, Sa)

Bactericera bohémica (Sulc, 1913) (N, S) (*)

Bactericera bucegica (Doboreanu & Manolache, 1962) (N)

Bactericera calcarata (Schäfer, 1949) (N)

Bactericera crithmi (Löw, 1880) (N, S, Si, Sa)

Bactericera curvatinervis (Förster, 1848) (N, S)

Bactericera femoralis (Förster, 1848) (N, S)

Bactericera harrisoni (Wagner, 1955) (N)

Bactericera kratochvili Vondracek, 1957 (N)

Bactericera modesta (Förster, 1848) (N, S) (*)

Bactericera nigricornis (Förster, 1848) (N, S, Si)

Bactericera parastriola Conci, Ossiannilsson & Tamanini, 1988 (N)

Bactericera perrisii Puton, 1876 (N, S)

Bactericera salicivora (Reuter, 1876) (Sa)

Bactericera cf. silvarnis (Hodkinson, 1974) (Si)

Bactericera striola (Flor, 1861) (N, S, Si)

Bactericera tremblayi (Wagner, 1961) (S) (*)

Bactericera trigonica (Hodkinson, 1981) (N, S, Si)

Bactericera versicolor (Löw, 1888) (N, S)

Phylloplecta Riley, 1883

Phylloplecta trisignata (Löw, 1886) (N, S, Si, Sa) (*)

Lauritrioza Conci & Tamanini, 1985

Lauritrioza alacris (Flor, 1861) (N, S, Si, Sa) (*)

Spanioza Enderlein, 1926

Spanioza galii (Förster, 1848) (N, S, Si, Sa)

Spanioza tamaninii Conci, 1993 (N)

Heterotrioza Doboreanu & Manolache, 1960

Heterotrioza chenopodii (Reuter, 1876) (N, S, Si, Sa)
Heterotrioza concii Rapisarda, 1990 (Si)
Heterotrioza portulacoides (Conci & Tamanini, 1984) (N, S) (E)
Heterotrioza sahlbergi (Sulc, 1913) (S, Sa)

Dyspersa Klimaszewski, 1968

Dyspersa apicalis (Förster, 1848) (N)
Dyspersa laserpitii (Burckhardt & Lauterer, 1982) (N)
Dyspersa lautereriella (Burckhardt, 1986) (S)
Dyspersa mesembrina (Burckhardt, 1986) (N) (*)
Dyspersa pallida (Haupt, 1935) (N, S) (*)

Hippophaetrioza Conci & Tamanini, 1984

Hippophaetrioza binotata (Löw, 1883) (N) (*)

Trioza Förster, 1848

Trioza abdominalis Flor, 1861 (N, S)
Trioza agrophila Löw, 1888 (N) (*)
Trioza apulica Rapisarda, 1994 (S) (E)
Trioza centranthi (Vallot, 1829) (N, S, Si, Sa)
Trioza cerastii (Linnaeus, 1758) (N, S)
Trioza chrysanthemi Löw, 1877 (N, S)
Trioza cf. cirsii Löw, 1881 (N)
Trioza dispar Löw, 1878 (N)
Trioza flavipennis Förster, 1848 (N)
Trioza foersteri Meyer-Dür, 1871 (N, S)
Trioza ilicina (De Stefani Perez, 1902) (N, S, Si, Sa)
Trioza kiefferi Giard, 1902 (Si)
Trioza marginepunctata Flor, 1861 (N)
Trioza megacerca Burckhardt, 1983 (N)
Trioza munda Förster, 1848 (N, S) (*)
Trioza proxima Flor, 1861 (N)
Trioza rapisardai Conci & Tamanini, 1984 (N) (E)
Trioza remota Förster, 1848 (N, S, Si)
Trioza ramni (Schrank, 1801) (N)
Trioza rotundata Flor, 1861 (N, S) (*)
Trioza rumicis Löw, 1880 (N, S)
Trioza saxifragae Löw, 1888 (N)
Trioza schrankii Flor, 1861 (N)
Trioza scottii Löw, 1880 (N)
Trioza senecionis (Scopoli, 1763) (N)
Trioza soniae Rapisarda, 1994 (S, Si) (E)
Trioza tatrensis Klimaszewski, 1965 (N)
Trioza thomasii Löw, 1888 (N) (*)

Trioza tripteridis Burckhardt, Conci, Lauterer & Tamanini, 1991 (N)
Trioza urticae (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Eutrioza Loginova, 1964

Eutrioza opima Loginova, 1964 (N) (*)

Note

Bactericera: Le specie di questo genere sono tradizionalmente attribuite a *Trioza*.
Bactericera bohémica: Riscontrata in S solo sull'Appennino toscano.
Bactericera modesta: Riscontrata in S solo sull'Appennino toscano.
Bactericera tremblayi: Riscontrata con sicurezza solo in Campania.
Phyllopecta trisignata: Specie tradizionalmente attribuita a *Trioza*.
Lauritrioza alacris: Specie tradizionalmente attribuita a *Trioza*.
Spanioza: Le specie di questo genere sono tradizionalmente attribuite a *Trioza*.
Heterotrioza: Le specie di questo genere sono tradizionalmente attribuite a *Trioza*.
Dyspersa: Le specie di questo genere sono tradizionalmente attribuite a *Trioza*.
Dyspersa mesembrina: Riscontrata solo in Valle d'Aosta.
Dyspersa pallida: Riscontrata in S solo sull'Appennino toscano.
Hippophaetrioza binotata: Specie tradizionalmente attribuita a *Trioza*.
Trioza: Molte specie oggi ascritte a *Trioza* andrebbero attribuite ad altri generi.
Trioza agrophila: Riscontrato un solo esemplare in Trentino; necessita conferma.
Trioza munda: Riscontrata in S solo sull'Appennino toscano.
Trioza rotundata: Riscontrata in S solo sull'Appennino toscano.
Trioza thomasi: Riscontrata solo nel secolo scorso, in Alto Adige.
Eutrioza opima: Riscontrata solo in una località delle Prealpi Venete, ad Arsé.

Aleyrodidae

Aleurochiton Tullgren, 1907

Aleurochiton acerinus Haupt, 1934 (N, S, Si, Sa)
Aleurochiton aceris (Modeer, 1778) (N, S) (*)
Aleurochiton pseudoplatani Visnya, 1936 (N, S, Si)

Aleurolobus Quaintance & Baker, 1914

Aleurolobus niloticus Priesner & Hosny, 1934 (Si)
Aleurolobus olivinus (Silvestri, 1911) (N, S, Si, Sa)
Aleurolobus wuenni (Ryberg, 1938) (S)

Aleurothrixus Quaintance & Baker, 1914

Aleurothrixus floccosus (Maskell, 1895) (N, S, Si, Sa) (*)

Aleurotrachelus Quaintance & Baker, 1914

Aleurotrachelus cf. espunae Gomez-Menor, 1945 (S, Si)

Aleurotuba Tremblay & Iaccarino, 1978

Aleurotuba jelinekii (Frauenfeld, 1867) (N, S, Si)

Aleuroviggiatus Iaccarino, 1982

Aleuroviggiatus adrianae Iaccarino, 1982 (N, S, Si, Sa)

Aleyrodes Latreille, 1796

Aleyrodes elevatus Silvestri, 1934 (S, Si)

Aleyrodes lonicerae Walker, 1852 (N, S, Si)

Aleyrodes proletella (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Asterobemisia Trehan, 1940

Asterobemisia carpini (Koch, 1857) (S)

Bemisia Quaintance & Baker, 1914

Bemisia afer (Priesner & Hosny, 1934) (S, Si)

Bemisia ovata (Goux, 1940) (S) (*)

Bemisia tabaci (Gennadius, 1889) (N, S, Si, Sa)

Bemisia sp. sensu Iaccarino & Viggiani, 1988 (S) (*)

Dialeurodes Cockerell, 1902

Dialeurodes chittendeni Laing, 1928 (N) (*)

Dialeurodes citri (Ashmead, 1885) (N, S, Si, Sa) (*)

Dialeurodes cf. formosensis Takahashi, 1933 (S) (*)

Parabemisia Takahashi, 1952

Parabemisia myricae (Kuwana, 1927) (S, Si, Sa) (*)

Pealius Quaintance & Baker, 1914

Pealius sp. sensu Viggiani & Laudonia, 1985 (S) (*)

Simplaleurodes Goux, 1945

Simplaleurodes hemisphaerica Goux, 1945 (S) (*)

Siphoninus Silvestri, 1915

Siphoninus immaculatus (Heeger, 1856) (S) (*)
Siphoninus phillyreae (Haliday, 1835) (N, S, Si, Sa)

Tetraleurodes Cockerell, 1902

Tetraleurodes hederæ Goux, 1939 (S, Si)

Tetralicia Harrison, 1917

Tetralicia ericæ Harrison, 1917 (S, Si)

Trialeurodes Cockerell, 1902

Trialeurodes ericæ Bink-Moenen, 1976 (S)
Trialeurodes lauri (Signoret, 1882) (Si)
Trialeurodes sardiniae Rapisarda, 1986 (Sa)
Trialeurodes vaporariorum (Westwood, 1856) (N, S, Si, Sa)

Note

Aleurochiton aceris: Riscontrata in S solo sull'Appennino abruzzese.
Aleurothrixus floccosus: Di origine sudamericana. Introdotta in Italia negli anni settanta.
Bemisia ovata: Probabile sinonimo di *Bemisia afer*. Riscontrata solo in Campania.
Bemisia sp.: Fino ad oggi non identificata. Riscontrata solo in Campania e Basilicata.
Dialeurodes chittendeni: Riscontrata solo in Piemonte, a Torino.
Dialeurodes citri: Di origine indiana. Introdotta in Italia all'inizio degli anni sessanta.
Dialeurodes cf. *formosensis*: Riscontrata solo in Campania.
Parabemisia myricæ: Di origine estremo-orientale. Introdotta in Italia verso il 1990.
Pealius sp.: Fino ad oggi non identificata. Riscontrata solo in Campania.
Simplaleurodes hemisphaerica: Riscontrata solo in Campania.
Siphoninus immaculatus: Riscontrata solo in Campania.

Adelgidae

Eopineus Steffan, 1968

Eopineus pineoides (Cholodkovsky, 1903) (N)
Eopineus strobilus (Hartig, 1837) (N, S) (*)

Pineus Shimer, 1869

Pineus cembrae (Cholodkovsky, 1888) (N)
Pineus orientalis (Dreyfus, 1889) (S) (*)
Pineus pini (Macquart, 1819) (N, S, Si, Sa) (*)

Dreyfusia Börner, 1908

Dreyfusia merkeri Eichhorn, 1957 (N, S) (*)
Dreyfusia nebrodensis Binazzi & Covassi, 1991 (Si) (E, M)
Dreyfusia nordmannianae (Eckstein, 1890) (N) (*)
Dreyfusia piceae (Ratzeburg, 1844) (N, S) (*)
Dreyfusia prelli Grosmann, 1935 (N, S) (*)

Cholodkovskya Börner, 1909

Cholodkovskya viridana (Cholodkovsky, 1896) (N)

Adelges Vallot, 1836

Adelges laricis Vallot, 1836 (N, S)
Adelges tardus (Dreyfus, 1888) (N)

Gilletteella Börner, 1930

Gilletteella cooleyi (Gillette, 1907) (N, S) (*)
Gilletteella coweni (Gillette, 1907) (N, S) (*)

Sacchiphantes Curtis, 1844

Sacchiphantes abietis (Linnaeus, 1758) (N, S)
Sacchiphantes segregis Steffan, 1961 (N) (*)
Sacchiphantes viridis (Ratzeburg, 1843) (N, S)

Note

Eopineus strobis: Introdotta in Europa dal Nord America negli anni '50.
Pineus orientalis: Introdotta in Europa dall'Asia Minore nella prima metà del '900.
Pineus pini: Probabile specie collettiva.
Dreyfusia merkeri: Introdotta in Europa dall'Asia Minore nella prima metà del '900.
Dreyfusia nordmannianae: Introdotta in Europa dalla Regione ponto-caucasica alla fine dell'800.
Dreyfusia piceae: Comprensiva della f. "balcanica" sensu Eichhorn, 1969.
Dreyfusia prelli: Introdotta in Europa dalla Regione ponto-caucasica alla fine dell'800.
Gilletteella cooleyi: Introdotta in Europa dal Nord America negli anni '30.
Gilletteella coweni: Introdotta in Europa dal Nord America (California) agli inizi del '900.
Sacchiphantes segregis: Presenza incerta nel territorio.

Phylloxeridae

Phylloxerina Börner, 1908

Phylloxerina capreae Börner, 1942 (N)
Phylloxerina populi (Del Guercio, 1900) (N, S)
Phylloxerina salicis (Lichtenstein, 1884) (N, S, Si, Sa)

Acanthohermes Kollar, 1848

Acanthohermes quercus Kollar, 1848 (N, S)

Phylloxera Boyer de Fonscolombe, 1834

Phylloxera coccinea (von Heyden, 1837) (N, S)

Phylloxera confusa (Grassi, 1912) (S) (E)

Phylloxera foaae Börner, 1909 (N, S)

Phylloxera glabra (von Heyden, 1837) (N, S)

Phylloxera ilicis (Grassi, 1912) (N, S)

Phylloxera italica (Grassi, 1912) (N, S) (E)

Phylloxera quercina (Ferrari, 1872) (N, S)

Phylloxera quercus Boyer de Fonscolombe, 1834 (N, S, Si, Sa)

Moritziella Börner, 1908

Moritziella corticalis (Kaltenbach, 1867) (N, S)

Foaiella Börner, 1909

Foaiella danesii (Grassi & Foà, 1908) (N, S)

Viteus Shimer, 1867

Viteus vitifoliae (Fitch, 1855) (N, S, Si, Sa)

Aphanostigma Börner, 1909

Aphanostigma piri (Cholodkovsky, 1903) (N, S, Si)

Aphididae

Eriosoma (Eriosoma) Leach, 1818

Eriosoma (Eriosoma) lanigerum (Hausmann, 1802) (N, S, Si, Sa)

Eriosoma (Schizoneura) Hartig, 1839

Eriosoma (Schizoneura) lanuginosum (Hartig, 1839) (N, S, Si, Sa)

Eriosoma (Schizoneura) patchiae (Börner & Blunck, 1916) (N, Si)

Eriosoma (Schizoneura) pyricola Baker & Davidson, 1916 (N, S, Si)

Eriosoma (Schizoneura) ulmi Linnaeus, 1758 (N, S, Si)

Colopha Monell, 1877

Colopha compressa (Koch, 1856) (N, S, Si)

Kaltenbachiella Schouteden, 1906

Kaltenbachiella pallida (Haliday, 1838) (N, S, Si)

***Tetraneura* (*Tetraneura*)** Hartig, 1841

Tetraneura (*Tetraneura*) *africana* van der Goot, 1912 (S, Si)

Tetraneura (*Tetraneura*) *agnesii* Del Guercio, 1920 (N, S) (*)

Tetraneura (*Tetraneura*) *caerulescens* (Passerini, 1856) (N, S, Si, Sa)

Tetraneura (*Tetraneura*) *reticulata* Del Guercio, 1920 (S) (*)

Tetraneura (*Tetraneura*) *ulmi* (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

***Tetraneura* (*Tetraneurella*)** Hille Ris Lambers, 1970

Tetraneura (*Tetraneurella*) *akinire* Sasaki, 1904 (N, S, Si)

Patchiella Tullgren, 1925

Patchiella reaumuri (Kaltenbach, 1843) (N, S)

Pachypappa Koch, 1856

Pachypappa marsupialis Koch, 1856 (N)

Pachypappa tremulae (Linnaeus, 1761) (N, Si)

Pachypappa vesicalis Koch, 1856 (S)

***Prociphilus* (*Prociphilus*)** Koch, 1857

Prociphilus (*Prociphilus*) *bumeliae* (Schrank, 1801) (N, S)

Prociphilus (*Prociphilus*) *fraxini* (Fabricius, 1777) (N, S)

Prociphilus (*Prociphilus*) *oleae* (Leach ex Risso, 1826) (S, Si?)

***Prociphilus* (*Stagona*)** Koch, 1856

Prociphilus (*Stagona*) *pini* (Burmeister, 1835) (S)

Prociphilus (*Stagona*) *xylostei* (DeGeer, 1773) (N)

Mimeuria Börner, 1952

Mimeuria ulmiphila (Del Guercio, 1917) (S?)

Thecabius Koch, 1857

Thecabius affinis (Kaltenbach, 1843) (N, S, Si, Sa)

***Pemphigus* (*Pemphigus*)** Hartig, 1839

Pemphigus (Pemphigus) bursarius (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
Pemphigus (Pemphigus) coluteae Passerini, 1863 (N) (*)
Pemphigus (Pemphigus) diani Ferrari, 1872 (N) (*)
Pemphigus (Pemphigus) immunis Buckton, 1896 (N, S, Si, Sa)
Pemphigus (Pemphigus) populinigrae (Schrank, 1801) (N, S, Sa)
Pemphigus (Pemphigus) protospirae Lichtenstein, 1885 (S, Si, Sa)
Pemphigus (Pemphigus) spyrothecae Passerini, 1856 (N, S, Si)

Pemphigus (Pemphiginus) Börner, 1930

Pemphigus (Pemphiginus) populi Courcey, 1879 (N, S)
Pemphigus (Pemphiginus) vesicarius Passerini, 1861 (N, S)

Aloeophagus Essig, 1950

Aloeophagus myersi Essig, 1950 (S, Si)

Aploneura Passerini, 1863

Aploneura ampelina (Mokrzecky, 1896) (S)
Aploneura lentisci (Passerini, 1856) (N, S, Si, Sa)

Baizongia Rondani, 1848

Baizongia pistaciae (Linnaeus, 1767) (N, S, Si)

Geoica Hart, 1894

Geoica carnosa (Buckton, 1883) (S)
Geoica flavescens (Del Guercio, 1920) (S) (*)
Geoica lucifuga (Zehntner, 1897) (Si)
Geoica magnifica (Del Guercio, 1913) (Si) (*)
Geoica pellucida (Buckton, 1883) (S, Si)
Geoica setulosa (Passerini, 1860) (N, S)
Geoica utricularia (Passerini, 1856) (N, S, Si, Sa)

Rectinasus Theobald, 1914

Rectinasus buxtoni Theobald, 1914 (Si)

Paracletus von Heyden, 1837

Paracletus cimiciformis von Heyden, 1837 (N, S, Si, Sa)
Paracletus donisthorpei Theobald, 1929 (S, Si)

Forda von Heyden, 1837

Forda formicaria von Heyden, 1837 (N, S, Si, Sa)

Forda marginata Koch, 1857 (N, S, Si, Sa)

Forda riccobonii De Stefani Perez, 1899 (Si)

Forda rotunda Theobald, 1914 (S, Si)

Smynthuodes Westwood, 1849

Smynthuodes betae Westwood, 1849 (N, S, Si, Sa)

Mindarus Koch, 1857

Mindarus abietinus Koch, 1857 (N, S, Si)

Cerataphis Lichtenstein, 1882

Cerataphis lataniae (Boisduval, 1867) (N, S)

Hamamelistes Shimer, 1867

Hamamelistes betulinus (Horvath, 1896) (N)

Hormaphis Osten-Sacken, 1861

Hormaphis betulae (Mordvilko, 1901) (N)

Neophyllaphis Takahashi, 1920

*Neophyllaphis podocarp*i Takahashi, 1920 (N) (*)

Phloeomyzus Horvath, 1896

Phloeomyzus passerinii (Signoret, 1875) (N, S, Si, Sa)

Anoecia Koch, 1857

Anoecia corni (Fabricius, 1775) (N, S)

Anoecia haupti Börner, 1950 (Si)

Anoecia major Börner, 1950 (Si)

Anoecia nemoralis Börner, 1950 (N) (*)

Anoecia vagans (Koch, 1856) (N)

Thelaxes Westwood, 1840

Thelaxes dryophila (Schrank, 1801) (N, S)

Thelaxes suberi (Del Guercio, 1911) (N, S, Si, Sa)

Glyphina Koch, 1856

Glyphina betulae (Linnaeus, 1758) (N)
Glyphina schrankiana Börner, 1950 (N)

Symydobius Mordvilko, 1894

Symydobius oblongus (von Heyden, 1837) (N)

Clethrobius Mordvilko, 1928

Clethrobius comes (Walker, 1848) (N)

Euceraphis Walker, 1870

Euceraphis betulae (Koch, 1855) (N, S, Si)
Euceraphis punctipennis (Zetterstedt, 1828) (N)

Phyllaphis Koch, 1857

Phyllaphis fagi (Linnaeus, 1767) (N, S, Si)

Diphyllaphis Takahashi, 1960

Diphyllaphis mordvilko (Aizenberg, 1932) (S, Si)

Callipterinella van der Goot, 1913

Callipterinella calliptera (Hartig, 1841) (N)
Callipterinella tuberculata (von Heyden, 1837) (N, S)

Calaphis Walsh, 1863

Calaphis betulicola (Kaltenbach, 1843) (N)
Calaphis flava Mordvilko, 1928 (N, S)

Betulaphis Glendenning, 1926

Betulaphis brevipilosa Börner, 1940 (N, S)
Betulaphis helvetica Hille Ris Lambers, 1947 (N)
Betulaphis quadrituberculata (Kaltenbach, 1843) (N, Si)

Monaphis Walker, 1870

Monaphis antennata (Kaltenbach, 1843) (N)

Boernerina Bramstedt, 1940

Boernerina depressa Bramstedt, 1940 (N)

Crypturaphis Silvestri, 1935

Crypturaphis grassii Silvestri, 1935 (S, Si) (E) (*)

Callaphis Walker, 1870

Callaphis juglandis (Goeze, 1778) (N, S, Si)

Chromaphis Walker, 1870

Chromaphis juglandicola (Kaltenbach, 1843) (N, S, Si, Sa)

Hoplochaetaphis Aizenberg, 1959

Hoplochaetaphis zachvatchini Aizenberg & Moravskaja, 1950 (Si, Sa)

Siculaphis Quednau & Barbagallo, 1991

Siculaphis vittoriensis Quednau & Barbagallo, 1991 (S, Si, Sa)

Myzocallis (Myzocallis) Passerini, 1860

Myzocallis (Myzocallis) boernerii Stroyan, 1957 (N, S, Si)

Myzocallis (Myzocallis) carpini (Koch, 1855) (N, S)

Myzocallis (Myzocallis) castanicola Baker, 1917 (N, S, Si, Sa)

Myzocallis (Myzocallis) cocciferina Quednau & Barbagallo, 1991 (S, Si)

Myzocallis (Myzocallis) coryli (Goeze, 1778) (N, S, Si, Sa)

Myzocallis (Myzocallis) komareki (Pasek, 1953) (N, S)

Myzocallis (Myzocallis) schreiberi Hille Ris Lambers & Stroyan, 1959 (N, S, Si, Sa)

Myzocallis (Lineomyzocallis) Richards, 1965

Myzocallis (Lineomyzocallis) walshii (Monell, 1879) (N, S) (*)

Hoplocallis Pintera, 1952

Hoplocallis microsiphon Quednau & Barbagallo, 1991 (S, Si)

Hoplocallis pictus (Ferrari, 1872) (N, S, Si, Sa)

Hoplocallis ruperti Pintera, 1952 (S, Si)

Apulicallis Barbagallo & Patti, 1991

Apulicallis trojanae Barbagallo & Patti, 1991 (S)

Tuberculatus (Tuberculatus) Mordvilko, 1894

Tuberculatus (Tuberculatus) querceus (Kaltenbach, 1843) (N)

Tuberculatus (Camelaphis) Hille Ris Lambers, 1974

Tuberculatus (Camelaphis) maculipennis Hille Ris Lambers, 1974 (Si)

Tuberculatus (Camelaphis) pallescens Hille Ris Lambers, 1974 (S, Si)

Tuberculatus (Tuberculoides) van der Goot, 1915

Tuberculatus (Tuberculoides) annulatus (Hartig, 1841) (N)

Tuberculatus (Tuberculoides) borealis (Krzywiec, 1971) (N, S)

Tuberculatus (Tuberculoides) eggleri Börner, 1950 (N, S, Si, Sa)

Tuberculatus (Tuberculoides) etruscus Barbagallo & Binazzi, 1991 (S)

Tuberculatus (Tuberculoides) inferus Barbagallo, 1990 (Si)

Tuberculatus (Tuberculoides) neglectus (Krzywiec, 1966) (S, Si)

Tinocallis Matsumura, 1919

Tinocallis kahawaluokalani (Kirkaldy, 1907) (N, S, Si) (*)

Tinocallis nevskyi Remaudière, Quednau & Heie, 1988 (N)

Tinocallis platani (Kaltenbach, 1843) (N, S, Sa)

Eucallipterus Schouteden, 1906

Eucallipterus tiliae (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Takecallis Matsumura, 1917

Takecallis arundicolens (Clarke, 1903) (N, S)

Takecallis arundinariae (Essig, 1917) (S, Si)

Takecallis taiwanus (Takahashi, 1926) (N, S, Si)

Pterocallis Passerini, 1860

Pterocallis albidus Börner, 1940 (N)

Pterocallis alni (DeGeer, 1773) (N, S, Si, Sa)

Pterocallis maculatus (von Heyden, 1837) (N)

Pterocallis ostryae Börner, 1949 (N, S, Si)

Appendiseta Richards, 1965

Appendiseta robiniae (Gillette, 1907) (N, S, Si) (*)

Monellia Oestlund, 1887

Monellia caryae Monell, 1879 (N) (*)

Ctenocallis Klodnitsky, 1924

Ctenocallis dobrovljanskyi Klodnitsky, 1924 (N)

Ctenocallis israelicus Hille Ris Lambers, 1954 (S, Si, Sa)
Ctenocallis setosus (Kaltenbach, 1846) (S, Si)

Therioaphis (Therioaphis) Walker, 1870

Therioaphis (Therioaphis) alatina Hille Ris Lambers & van den Bosch, 1964 (N, S)
Therioaphis (Therioaphis) litoralis Hille Ris Lambers & van den Bosch, 1964 (S, Si)
Therioaphis (Therioaphis) luteola (Börner, 1949) (N)
Therioaphis (Therioaphis) natricis Hille Ris Lambers & van den Bosch, 1964 (Si)
Therioaphis (Therioaphis) obscura Hille Ris Lambers & van den Bosch, 1964 (N)
Therioaphis (Therioaphis) ononidis (Kaltenbach, 1846) (N, S)
Therioaphis (Therioaphis) riehmii (Börner, 1949) (N, Si)
Therioaphis (Therioaphis) tenera (Aizenberg, 1956) (N)
Therioaphis (Therioaphis) trifolii (Monell, 1882)
 Therioaphis (Therioaphis) trifolii trifolii (Monell, 1882) (N, S, Si, Sa)
 Therioaphis (Therioaphis) trifolii brevipilosa Hille Ris Lambers & van den Bosch, 1964
(N, Si)

Therioaphis (Rhizoberlesia) Del Guercio, 1915

Therioaphis (Rhizoberlesia) brachytricha Hille Ris Lambers & van den Bosch, 1964 (N, S?)
(*)

Thripsaphis (Thripsaphis) Gillette, 1917

Thripsaphis (Thripsaphis) caricicola (Mordvilko, 1914) (N)

Thripsaphis (Trichocallis) Börner, 1930

Thripsaphis (Trichocallis) caricis (Mordvilko, 1921) (N)
Thripsaphis (Trichocallis) verrucosa (Gillette, 1917) (N)

Subsaltusaphis Quednau, 1953

Subsaltusaphis ornata (Theobald, 1927) (Si)
Subsaltusaphis pallida (Hille Ris Lambers, 1939) (N)
Subsaltusaphis paniceae (Quednau, 1954) (S)
Subsaltusaphis picta (Hille Ris Lambers, 1939) (Sa)

Saltusaphis Theobald, 1915

Saltusaphis scirpus Theobald, 1915 (Si)

Iziphya Nevsky, 1929

Iziphya austriaca Börner, 1950 (N)

Drepanosiphum Koch, 1855

Drepanosiphum acerinum (Walker, 1848) (N)
Drepanosiphum aceris Koch, 1855 (N, S)
Drepanosiphum dixonii Hille Ris Lambers, 1971 (N)
Drepanosiphum oregonensis Granovsky, 1939 (N)
Drepanosiphum platanoidis (Schrank, 1801) (N, S, Si, Sa)

Drepanosiphoniella Davatchi, Hille Ris Lambers & Remaudière, 1957

Drepanosiphoniella aceris Davatchi, Hille Ris Lambers & Remaudière, 1957
Drepanosiphoniella aceris fugans Remaudière & Leclant, 1972 (S)

Drepanaphis Del Guercio, 1909

Drepanaphis acerifoliae (Thomas, 1878) (N) (*)

Periphyllus van der Hoeven, 1863

Periphyllus acericola (Walker, 1848) (N, S, Si, Sa)
Periphyllus aceris (Linnaeus, 1761) (N)
Periphyllus coracinus (Koch, 1854) (N)
Periphyllus hirticornis (Walker, 1848) (N, S, Si)
Periphyllus lyropictus (Kessler, 1886) (N, S)
Periphyllus rhenanus (Börner, 1940) (S, Si)
Periphyllus testudinaceus (Ferne, 1852) (N, S, Si)
Periphyllus venetianus Hille Ris Lambers, 1966 (N, S, Si)

Chaitophorus Koch, 1854

Chaitophorus capreae (Mosley, 1841) (N, S, Si)
Chaitophorus diversisetosus Szelegiewicz & Czylok
Chaitophorus diversisetosus austriacus Pintera, 1987 (N)
Chaitophorus horii Takahashi, 1939
Chaitophorus horii beuthani (Börner, 1950) (S)
Chaitophorus leucomelas Koch, 1854 (N, S, Si, Sa)
Chaitophorus mordvilkoii Mamontova, 1961 (N, S)
Chaitophorus nassonowi Mordvilko, 1895 (S)
Chaitophorus populeti (Panzer, 1801) (N, S, Si)
Chaitophorus populialbae (Boyer de Fonscolombe, 1841) (N, S, Si, Sa)
Chaitophorus saliapteris Shinji, 1924 (*)
Chaitophorus saliapteris quinque maculatus Bozhko, 1976 (S)
Chaitophorus salicti (Schrank, 1801) (N, S)
Chaitophorus salijaponicus Essig & Kuwana, 1918
Chaitophorus salijaponicus niger Mordvilko, 1929 (N, S, Si, Sa)
Chaitophorus salijaponicus stroyani Pintera, 1987 (N)
Chaitophorus tremulae Koch, 1854 (N, S, Si)
Chaitophorus truncatus (Hausmann, 1802) (N, S)
Chaitophorus vitellinae (Schrank, 1801) (N, S)

Caricosipha Börner, 1939

Caricosipha paniculatae Börner, 1939 (N, Si)

Laingia Theobald, 1922

Laingia psammae Theobald, 1922 (Si)

Sipha (Sipha) Passerini, 1860

Sipha (Sipha) glyceriae (Kaltenbach, 1843) (N, S, Si, Sa)

Sipha (Rungsia) Mimeur, 1933

Sipha (Rungsia) elegans Del Guercio, 1905 (N, S, Si, Sa)

Sipha (Rungsia) maydis Passerini, 1860 (N, S, Si, Sa)

Chaetosiphella Hille Ris Lambers, 1939

Chaetosiphella berlesei (Del Guercio, 1905) (N)

Chaetosiphella stipae Hille Ris Lambers, 1947 (S)

Eulachnus Del Guercio, 1909

Eulachnus agilis (Kaltenbach, 1843) (N, S?)

Eulachnus alticola Börner, 1940 (N)

Eulachnus brevipilosus Börner, 1940 (N, S)

Eulachnus cembrae Börner, 1950 (N)

Eulachnus intermedius Binazzi, 1989 (N, S)

Eulachnus mediterraneus Binazzi, 1983 (N, S, Si)

Eulachnus nigricola Pasek, 1953 (N, S)

Eulachnus rileyi (Williams, 1911) (N, S, Si)

Eulachnus tauricus Bozhko, 1957 (N, S, Si) (*)

Eulachnus tuberculostemmatus (Theobald, 1915)

Eulachnus tuberculostemmatus tuberculostemmatus (Theobald, 1915) (N, S, Si)

Eulachnus tuberculostemmatus garganicus Binazzi, 1983 (S) (E)

Schizolachnus Mordvilko, 1909

Schizolachnus pineti (Fabricius, 1781) (N, S, Si)

Cedrobium Remaudière, 1954

Cedrobium laportei Remaudière, 1954 (N, S, Si, Sa) (*)

Cinara Curtis, 1835

Cinara acutirostris Hille Ris Lambers, 1956 (N, S, Si)
Cinara brauni Börner, 1940 (N, S)
Cinara cedri Mimeur, 1936 (N, S, Si, Sa) (*)
Cinara cembrae (Seitner, 1936) (N)
Cinara confinis (Koch, 1856) (N, S)
Cinara costata (Zetterstedt, 1828) (N, S)
Cinara covassii Binazzi, 1991 (N)
Cinara cuneomaculata (Del Guercio, 1909) (N, S)
Cinara cupressi (Buckton, 1881) (N, S, Si, Sa)
Cinara escherichi (Börner, 1950) (N)
Cinara fresai Blanchard, 1939 (S, Sa)
Cinara hyperophila (Koch, 1855) (S) (*)
Cinara juniperi (De Geer, 1773) (N, S, Si, Sa)
Cinara kochiana (Börner, 1939) (N)
Cinara laricionis Binazzi, 1980 (S, Si) (*)
Cinara laricis (Hartig, 1839) (N, S)
Cinara maghrebica Mimeur, 1934
 Cinara maghrebica maghrebica Mimeur, 1934 (N, S, Si)
 Cinara maghrebica garganica Binazzi, 1983 (S) (E)
Cinara maritimae (Dufour, 1833) (N, S, Si, Sa)
Cinara montanicola (Börner, 1939) (N, S)
Cinara neubergi (Arnhart, 1930) (N, S)
Cinara oblonga (Del Guercio, 1909) (S) (*)
Cinara palaestinensis Hille Ris Lambers, 1948
 Cinara palaestinensis palaestinensis Hille Ris Lambers, 1948 (S, Si)
 Cinara palaestinensis apulica Binazzi, 1983 (S) (E)
Cinara pectinatae (Nördlinger, 1880) (N, S)
Cinara piceae (Panzer, 1801) (N)
Cinara piceicola (Cholodkovsky, 1896) (N, S)
Cinara pilicornis (Hartig, 1841) (N, S, Si)
Cinara pilosa (Zetterstedt, 1838) (N)
Cinara pinea (Mordvilko, 1895) (N, S, Si)
Cinara pini (Linnaeus, 1758) (N)
Cinara pinicola (Kaltenbach, 1843) (N, S) (*)
Cinara pinihabitans (Mordvilko, 1895) (N, S)
Cinara piniphila (Ratzeburg, 1844) (S) (*)
Cinara pruinosa (Hartig, 1841) (N, S, Si)
Cinara schimitscheki Börner, 1940 (N, S, Si)
Cinara setosa (Börner, 1950) (N)
Cinara tujafilina (Del Guercio, 1909) (N, S, Si)

Tuberolachnus Mordvilko, 1909

Tuberolachnus salignus (Gmelin, 1790) (N, S, Si, Sa)

Maculolachnus Gaumont, 1920

Maculolachnus submacula (Walker, 1848) (N, S)

Lachnus (Lachnus) Burmeister, 1835

Lachnus (Lachnus) ilicophilus (Del Guercio, 1909) (N, S)
Lachnus (Lachnus) roboris (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Lachnus (Schizodryobius) van der Goot, 1913

Lachnus (Schizodryobius) longirostris (Mordvilko, 1909) (N, S)
Lachnus (Schizodryobius) pallipes (Hartig, 1841) (N, S)

Lachnus (Sublachnobius) Heinze, 1962

Lachnus (Sublachnobius) wichmanni Hille Ris Lambers, 1956 (N)

Pterochloroides Mordvilko, 1914

Pterochloroides persicae (Cholodkovsky, 1899) (S, Si)

Stomaphis Walker, 1870

Stomaphis graffii (Cholodkovsky, 1894) (N, S)
Stomaphis longirostris (Fabricius, 1787) (N, S, Si)
Stomaphis mordvilkoii Hille Ris Lambers, 1933 (N)
Stomaphis quercus (Linnaeus, 1758) (N, S)

Protrama Baker, 1920

Protrama baronii Hille Ris Lambers, 1969 (S) (*)
Protrama flavescens (Koch, 1856) (N) (*)
Protrama longitarsus (Ferrari, 1872) (N)
Protrama radialis (Kaltenbach, 1843) (N, S, Si)
Protrama ranunculi (Del Guercio, 1909) (N, S)

Neotrama Baker, 1920

Neotrama caudata (Del Guercio, 1909) (N)
Neotrama maritima Eastop, 1953 (Si)

Trama von Heyden, 1837

Trama troglodytes von Heyden, 1837 (N, S)

Pterocomma Buckton, 1879

Pterocomma italicum Barbagallo & Stroyan, 1978 (N, S)
Pterocomma jacksoni Theobald, 1921 (N) (*)
Pterocomma pilosum Buckton, 1879

Pterocomma pilosum pilosum Buckton, 1879 (N, S)
Pterocomma pilosum konoii Hori & Takahashi, 1939 (N, S, Sa)
Pterocomma populeum (Kaltenbach, 1843) (N, S, Si, Sa)
Pterocomma rufipes (Hartig, 1841) (N)
Pterocomma salicis (Linnaeus, 1758) (N)

Plocamaphis Oestlund, 1922

Plocamaphis flocculosa (Weed, 1891)
Plocamaphis flocculosa brachysiphon Ossiannilsson, 1959 (N)

Hyalopterus Koch, 1854

Hyalopterus amygdali (Blanchard, 1840) (N, S, Si, Sa)
Hyalopterus pruni (Geoffroy, 1762) (N, S, Si, Sa)

Rhopalosiphum Koch, 1854

Rhopalosiphum insertum (Walker, 1849) (N)
Rhopalosiphum luzulellum (Hille Ris Lambers, 1939) (N)
Rhopalosiphum maidis (Fitch, 1856) (N, S, Si, Sa)
Rhopalosiphum nymphaeae (Linnaeus, 1761) (N, S, Si, Sa)
Rhopalosiphum padi (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
Rhopalosiphum parvae (Hottes & Frison, 1931) (Si)
Rhopalosiphum rufiabdominalis (Sasaki, 1899) (N, S, Si)
Rhopalosiphum rufulum Richards, 1960 (S)

***Schizaphis* (*Schizaphis*)** Börner, 1931

Schizaphis (*Schizaphis*) *agrostis* Hille Ris Lambers, 1947 (N, S)
Schizaphis (*Schizaphis*) *graminum* (Rondani, 1852) (N, S, Si, Sa)
Schizaphis (*Schizaphis*) *holci* Hille Ris Lambers, 1947 (Si)
Schizaphis (*Schizaphis*) *minuta* (van der Goot, 1917) (Si)
Schizaphis (*Schizaphis*) *rotundiventris* (Signoret, 1860) (N, Si)
Schizaphis (*Schizaphis*) *rufula* (Walker, 1849) (Si)

***Schizaphis* (*Paraschizaphis*)** Hille Ris Lambers, 1947

Schizaphis (*Paraschizaphis*) *caricis* (Schouteden, 1906) (N)
Schizaphis (*Paraschizaphis*) *rosazevedoi* Ilharco, 1961 (Si)
Schizaphis (*Paraschizaphis*) *scirpi* (Passerini, 1874) (N, Si)

Melanaphis van der Goot, 1917

Melanaphis bambusae (Fullaway, 1910) (N, S, Si)
Melanaphis donacis (Passerini, 1862) (N, S, Si, Sa)
Melanaphis pyrarica (Passerini, 1861) (N, S, Si, Sa)

Toxoptera Koch, 1856

Toxoptera aurantii (Boyer de Fonscolombe, 1841) (N, S, Si, Sa)

Aphis (Aphis) Linnaeus, 1758

- Aphis (Aphis) acetosae* Linnaeus, 1761 (N)
- Aphis (Aphis) affinis* Del Guercio, 1911 (N, S, Si)
- Aphis (Aphis) aliena* Theobald, 1915 (Si)
- Aphis (Aphis) arbuti* Ferrari, 1872 (N, S, Si, Sa)
- Aphis (Aphis) armata* Hausmann, 1802 (N?) (*)
- Aphis (Aphis) avicularis* (Hille Ris Lambers, 1931) (N, S, Si)
- Aphis (Aphis) balloticola* Szelegiewicz, 1968 (S, Si)
- Aphis (Aphis) brunnea* Ferrari, 1872 (N, S, Si, Sa)
- Aphis (Aphis) bupleuri* (Börner, 1932) (S, Si)
- Aphis (Aphis) cacaliasteris* Hille Ris Lambers, 1947 (N)
- Aphis (Aphis) callunae* Theobald, 1915 (N)
- Aphis (Aphis) chloris* Koch, 1854 (N, S, Si, Sa)
- Aphis (Aphis) cisticola* Leclant & Remaudière, 1972 (S, Si, Sa)
- Aphis (Aphis) clematidis* Koch, 1854 (N, S, Sa)
- Aphis (Aphis) clinopodii* Passerini, 1861 (N, S, Si, Sa)
- Aphis (Aphis) commensalis* Stroyan, 1952 (N)
- Aphis (Aphis) comosa* (Börner, 1950) (N)
- Aphis (Aphis) confusa* Walker, 1849 (N, S, Si, Sa)
- Aphis (Aphis) coronillae* Ferrari, 1872 (N, S)
- Aphis (Aphis) craccae* Linnaeus, 1758 (N, S, Si)
- Aphis (Aphis) craccivora* Koch, 1854 (N, S, Si, Sa)
- Aphis (Aphis) crepidis* (Börner, 1940) (S, Si)
- Aphis (Aphis) cytisorum* Hartig, 1841
 - Aphis (Aphis) cytisorum cytisorum* Hartig, 1841 (N, S, Si, Sa)
 - Aphis (Aphis) cytisorum sarothamni* Franssen, 1928 (N, S, Si)
- Aphis (Aphis) epilobiaria* Theobald, 1927 (N, Si)
- Aphis (Aphis) epilobii* Kaltenbach, 1843 (N, Si)
- Aphis (Aphis) esulae* (Börner, 1940) (N)
- Aphis (Aphis) euonymi* (Fabricius, 1775) (N, S, Sa)
- Aphis (Aphis) eupatorii* Passerini, 1863 (N, Si)
- Aphis (Aphis) euphorbiae* Kaltenbach, 1843 (N, S, Si, Sa)
- Aphis (Aphis) fabae* Scopoli, 1763
 - Aphis (Aphis) fabae fabae* Scopoli, 1763 (N, S, Si, Sa)
 - Aphis (Aphis) fabae cirsiacanthoidis* Scopoli, 1763 (N, S)
 - Aphis (Aphis) fabae mordvilkoii* Börner & Janisch, 1922 (S)
 - Aphis (Aphis) fabae solanella* Theobald, 1914 (N, S, Si, Sa)
- Aphis (Aphis) farinosa* Gmelin, 1790 (N, S, Si)
- Aphis (Aphis) forbesi* Weed, 1889 (N)
- Aphis (Aphis) frangulae* Kaltenbach, 1845
 - Aphis (Aphis) frangulae frangulae* Kaltenbach, 1845 (N, S, Si, Sa)
 - Aphis (Aphis) frangulae beccabungae* Koch, 1855 (N)
 - Aphis (Aphis) frangulae capsellae* Kaltenbach, 1843 (N, Si, Sa)

Aphis (Aphis) frangulae gossypii Glover, 1877 (N, S, Si, Sa)
Aphis (Aphis) fumanae Remaudière & Leclant, 1972 (S)
Aphis (Aphis) galiiscabri Schrank, 1801 (N, S, Si, Sa)
Aphis (Aphis) genistae Scopoli, 1763 (N, S, Sa)
Aphis (Aphis) grossulariae Kaltenbach, 1843 (N)
Aphis (Aphis) hederæ Kaltenbach, 1843 (N, S, Si, Sa)
Aphis (Aphis) helianthemii Ferrari, 1872 (N, S)
Aphis (Aphis) hieracii Schrank, 1801 (S?) (*)
Aphis (Aphis) hillerislammersi Nieto Nafria & Mier, 1976 (S, Si)
Aphis (Aphis) hypochoeridis (Börner, 1940) (Si)
Aphis (Aphis) idaei van der Goot, 1912 (N, S)
Aphis (Aphis) intybi Koch, 1855 (N, S, Si, Sa)
Aphis (Aphis) jacobaeae Schrank, 1801 (N)
Aphis (Aphis) lambersi (Börner, 1940) (Si)
Aphis (Aphis) lamiorum (Börner, 1950) (N, Si)
Aphis (Aphis) lantanae Koch, 1854 (N)
Aphis (Aphis) lichtensteini Leclant & Remaudière, 1972 (S, Si, Sa)
Aphis (Aphis) longirostrata Hille Ris Lambers, 1966 (Si)
Aphis (Aphis) loti Kaltenbach, 1862 (N, S, Si)
Aphis (Aphis) lupoi Barbagallo & Stroyan, 1980 (S, Si)
Aphis (Aphis) magnoliae Macchiati, 1883 (S) (*)
Aphis (Aphis) maidiradicis Forbes, 1891 (N, S) (*)
Aphis (Aphis) mamontovae Davletshina, 1964 (S, Si)
Aphis (Aphis) medicaginis Koch, 1854 (N, S)
Aphis (Aphis) multiflorae Barbagallo & Stroyan, 1980 (Si)
Aphis (Aphis) nasturtii Kaltenbach, 1843 (N, S, Si, Sa)
Aphis (Aphis) nepetae Kaltenbach, 1843 (Si)
Aphis (Aphis) nerii Boyer de Fonscolombe, 1841 (N, S, Si, Sa)
Aphis (Aphis) oenotherae Oestlund, 1887 (Si)
Aphis (Aphis) origani Passerini, 1860 (N, S, Si, Sa)
Aphis (Aphis) parietariae Theobald, 1922 (S, Si, Sa)
Aphis (Aphis) passeriniana (Del Guercio, 1900) (N, S, Si)
Aphis (Aphis) plantaginis Goeze, 1778 (N, Sa)
Aphis (Aphis) podagrariae Schrank, 1801 (N)
Aphis (Aphis) pomi DeGeer, 1773 (N, S, Si, Sa)
Aphis (Aphis) praeterita Walker, 1849 (N, Si)
Aphis (Aphis) proffti (Börner, 1942) (Si)
Aphis (Aphis) pseudocytisorum Hille Ris Lambers, 1966 (N, S, Si)
Aphis (Aphis) pseudocomosa Stroyan, 1972 (N)
Aphis (Aphis) pulegii Del Guercio, 1911 (Si)
Aphis (Aphis) punicae Passerini, 1863 (N, S, Si, Sa)
Aphis (Aphis) roepkei (Hille Ris Lambers, 1931) (N)
Aphis (Aphis) ruborum (Börner, 1932) (N, S, Si, Sa)
Aphis (Aphis) rumicis Linnaeus, 1758 (N, S, Sa)
Aphis (Aphis) salicariae Koch, 1855 (N)
Aphis (Aphis) salviae Walker, 1852 (N, S, Si)
Aphis (Aphis) sambuci Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)
Aphis (Aphis) sanguisorbae Schrank, 1801 (N, S, Si, Sa)

Aphis (Aphis) schneideri (Börner, 1940) (N)
Aphis (Aphis) sedi Kaltenbach, 1843 (N, S, Si)
Aphis (Aphis) serpylli Koch, 1854 (N, S, Si)
Aphis (Aphis) spiraecola Patch, 1914 (N, S, Si, Sa)
Aphis (Aphis) spiraephaga F.P. Müller, 1961 (Si)
Aphis (Aphis) symphyti Schrank, 1801 (N)
Aphis (Aphis) taraxacicola (Börner, 1940) (Si)
Aphis (Aphis) teucriti Börner, 1942 (N, S, Si, Sa)
Aphis (Aphis) thermophila Börner, 1950 (S, Si)
Aphis (Aphis) tirucallis Hille Ris Lambers, 1954 (S, Si)
Aphis (Aphis) tormentillae Passerini, 1879 (N)
Aphis (Aphis) tripolii Laing, 1920 (N)
Aphis (Aphis) umbrella (Börner, 1950) (N, S, Si, Sa)
Aphis (Aphis) urticata Gmelin, 1790 (N, S, Si, Sa)
Aphis (Aphis) vallei Hille Ris Lambers & Stroyan, 1959 (N, S, Si, Sa)
Aphis (Aphis) verbasci Schrank, 1801 (N, S, Si, Sa)
Aphis (Aphis) verticillatae (Börner, 1940) (Si)
Aphis (Aphis) viburni Scopoli, 1763 (N, S)
Aphis (Aphis) viridescens (Del Guercio, 1930) (S?) (*)
Aphis (Aphis) vitalbae Ferrari, 1872 (N, S, Si)
Aphis (Aphis) viticis Ferrari, 1872 (N, S, Si, Sa)

***Aphis (Brachysiphum)* van der Goot, 1913**

Aphis (Brachysiphum) thalictri (Koch, 1854) (N)

***Aphis (Protaphis)* Börner, 1952**

Aphis (Protaphis) anthemidis (Börner, 1940) (Si)
Aphis (Protaphis) hartigi (Hille Ris Lambers, 1931) (N, Si)
Aphis (Protaphis) striata Hille Ris Lambers, 1966 (N)
Aphis (Protaphis) terricola Rondani, 1847 (N, Si, Sa)

***Aphis (Toxopterina)* Börner, 1940**

Aphis (Toxopterina) vandergooti Börner, 1939 (N)

***Aphis (Anthemidaphis)* Tashev, 1967**

Aphis (Anthemidaphis) ligusticae Barbagallo & Stroyan, 1980 (Si)
Aphis (Anthemidaphis) oligommata (Tashev, 1967) (Si)

***Chomaphis* Mordvilko, 1928**

Chomaphis mira Mordvilko, 1928 (N)

***Brachyunguis* Das, 1918**

Brachyunguis tamaricis (Lichtenstein, 1885) (N, S, Si, Sa)

Cryptosiphum Buckton, 1879

Cryptosiphum artemisiae Buckton, 1879 (N, S)

Acaudinum Börner, 1930

Acaudinum centaureae (Koch, 1854) (N, Sa)

Acaudinum longisetosum Holman, 1970 (N)

Macchiatiella Del Guercio, 1909

Macchiatiella rhamni (Boyer de Fonscolombe, 1841) (N, S, Si, Sa)

Roepkea Hille Ris Lambers, 1935

Roepkea phlomicola (Nevsky, 1929)

Roepkea phlomicola marchali (Börner, 1931) (N, S)

Ceruraphis Börner, 1926

Ceruraphis eriophori (Walker, 1848) (N, Si)

Nearctaphis Shaposhnikov, 1950

Nearctaphis bakeri (Cowen, 1895) (N, S, Si)

Anuraphis Del Guercio, 1907

Anuraphis cachryos Barbagallo & Stroyan, 1980 (S, Si)

Anuraphis catonii Hille Ris Lambers, 1935 (N, S, Si)

Anuraphis farfarae (Koch, 1854) (N, S, Si)

Anuraphis pyrilaseri Shaposhnikov, 1950 (S, Si, Sa)

Anuraphis subterranea (Walker, 1852) (*heraclei* Koch, 1857) (N, S)

Zinia Shaposhnikov, 1950

Zinia veronicae Shaposhnikov, 1950 (N)

***Dysaphis* (*Dysaphis*)** Börner, 1951

Dysaphis (*Dysaphis*) *angelicae* (Koch, 1854) (N)

Dysaphis (*Dysaphis*) *anthrisci* Börner, 1950 (N, Si)

Dysaphis (*Dysaphis*) *apiifolia* (Theobald, 1923) (S, Si, Sa)

Dysaphis (*Dysaphis*) *bonomii* (Hille Ris Lambers, 1935) (N)

Dysaphis (*Dysaphis*) *brancoi* (Börner, 1950) (N, Si)

Dysaphis (*Dysaphis*) *candicans* (Passerini, 1879) (N) (*)

Dysaphis (Dysaphis) crataegi (Kaltenbach, 1843)
Dysaphis (Dysaphis) crataegi crataegi (Kaltenbach, 1843) (N, S, Si, Sa)
Dysaphis (Dysaphis) crataegi kunzei (Börner, 1950) (N)
Dysaphis (Dysaphis) crataegi siciliensis (Theobald, 1927) (Si, Sa)
Dysaphis (Dysaphis) crathaegaria (Del Guercio, 1930) (S) (*)
Dysaphis (Dysaphis) crathaegiphila (Del Guercio, 1930) (S) (*)
Dysaphis (Dysaphis) crithmi (Buckton, 1886) (S, Si)
Dysaphis (Dysaphis) cynarae (Theobald, 1915) (S, Si)
Dysaphis (Dysaphis) devecta (Walker, 1849) (N)
Dysaphis (Dysaphis) emicis (Mimeur, 1935) (Si)
Dysaphis (Dysaphis) foeniculus (Theobald, 1923) (S, Si, Sa)
Dysaphis (Dysaphis) hirsutissima (Börner, 1940) (N)
Dysaphis (Dysaphis) lappae (Koch, 1854)
Dysaphis (Dysaphis) lappae lappae (Koch, 1854) (N)
Dysaphis (Dysaphis) lappae cirsii (Börner, 1950) (N)
Dysaphis (Dysaphis) lauberti (Börner, 1940) (N)
Dysaphis (Dysaphis) montemartinii (Del Guercio, 1913) (N) (*)
Dysaphis (Dysaphis) nevskyi (Börner, 1940) (N)
Dysaphis (Dysaphis) radicola (Mordvilko, 1897)
Dysaphis (Dysaphis) radicola radicola (Mordvilko, 1897) (N, S)
Dysaphis (Dysaphis) radicola meridialis Shaposhnikov, 1964 (Si)
Dysaphis (Dysaphis) ranunculi (Kaltenbach, 1843) (N, S, Si, Sa)
Dysaphis (Dysaphis) tulipae (Boyer de Fonscolombe, 1841) (S, Si)
Dysaphis (Dysaphis) vandenboschi Stroyan, 1972 (N)

***Dysaphis (Pomaphis)* Börner, 1939**

Dysaphis (Pomaphis) anisoidis Barbagallo & Stroyan, 1980 (Si)
Dysaphis (Pomaphis) ariae (Börner, 1950) (N)
Dysaphis (Pomaphis) aucupariae (Buckton, 1879) (N)
Dysaphis (Pomaphis) gallica (Hille Ris Lambers, 1955) (N, Si)
Dysaphis (Pomaphis) henrystroyani Barbagallo & Patti, 1994 (Si)
Dysaphis (Pomaphis) plantaginea (Passerini, 1860) (N, S, Si, Sa)
Dysaphis (Pomaphis) pyri (Boyer de Fonscolombe, 1841) (N, S, Si, Sa)
Dysaphis (Pomaphis) reaumuri (Mordvilko, 1928) (N, Si)
Dysaphis (Pomaphis) sorbi (Kaltenbach, 1843) (N)

***Allocotaphis* Börner, 1950**

Allocotaphis quaestionis (Börner, 1942) (N)

***Brachycaudus (Brachycaudus)* van der Goot, 1913**

Brachycaudus (Brachycaudus) helichrysi (Kaltenbach, 1843) (N, S, Si, Sa)

***Brachycaudus (Acaudus)* van der Goot, 1913**

Brachycaudus (Acaudus) ballotae (Passerini, 1860) (N)

Brachycaudus (Acaudus) cardui (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
Brachycaudus (Acaudus) jacobii Stroyan, 1957 (N)
Brachycaudus (Acaudus) klugkisti (Börner, 1942) (N)
Brachycaudus (Acaudus) lucifugus F.P. Müller, 1955 (N)
Brachycaudus (Acaudus) lychnidis (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
Brachycaudus (Acaudus) mimeuri Remaudière, 1952 (S, Si) (*)
Brachycaudus (Acaudus) mordvilkoii Hille Ris Lambers, 1931 (N)
Brachycaudus (Acaudus) persicae (Passerini, 1860) (N, S, Si, Sa)
Brachycaudus (Acaudus) populi (Del Guercio, 1911) (N, S, Si, Sa)

***Brachycaudus (Appelia)* Börner, 1930**

Brachycaudus (Appelia) prunicola (Kaltenbach, 1843) (N, S, Si)
Brachycaudus (Appelia) schwartzi (Börner, 1931) (N, S, Si, Sa)
Brachycaudus (Appelia) tragopogonis (Kaltenbach, 1843) (N, S, Si)

***Brachycaudus (Nevskyaphis)* Shaposhnikov, 1950**

Brachycaudus (Nevskyaphis) bicolor (Nevsky, 1929) (N)

***Brachycaudus (Thuleaphis)* Hille Ris Lambers, 1960**

Brachycaudus (Thuleaphis) amygdalinus (Schouteden, 1905) (N, S, Si)
Brachycaudus (Thuleaphis) rumexicolens (Patch, 1917) (N, S, Si, Sa)

***Brachycolus* Buckton, 1879**

Brachycolus cerastii (Kaltenbach, 1846) (N)
Brachycolus cucubali (Passerini, 1863) (N, S, Si, Sa)

***Brachycorinella* Aizenberg, 1956**

Brachycorinella asparagi Mordvilko, 1928 (N)

***Diuraphis (Diuraphis)* Aizenberg, 1935**

Diuraphis (Diuraphis) mühleii (Börner, 1950) (N)
Diuraphis (Diuraphis) noxius (Mordvilko, 1914) (Si)

***Diuraphis (Holcaphis)* Hille Ris Lambers, 1939**

Diuraphis (Holcaphis) holci (Hille Ris Lambers, 1939) (Si)

***Uhlmannia* Börner, 1952**

Uhlmannia singularis (Börner, 1950) (S)

***Aspidaphis* Gillette, 1917**

Aspidaphis adjuvans (Walker, 1848) (N, Si)

Hayhurstia Del Guercio, 1917

Hayhurstia atriplicis (Linnaeus, 1761) (N, S, Si, Sa)

Xerophilaphis Nevsky, 1928

Xerophilaphis suaedae (Mimeur, 1934) (Si)

Brevicoryne van der Goot, 1915

Brevicoryne brassicae (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Lipaphis Mordvilko, 1928

Lipaphis cochleariae Jacob, 1956 (Si)

Lipaphis erysimi (Kaltenbach, 1843) (N, S, Si)

Semiaphis van der Goot, 1913

Semiaphis dauci (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa)

Semiaphis pimpinellae (Kaltenbach, 1843) (N)

Hyadaphis Kirkaldy, 1904

Hyadaphis coriandri (Das, 1918) (Si)

Hyadaphis foeniculi (Passerini, 1806) (N, S, Si, Sa)

Hyadaphis passerinii (Del Guercio, 1911) (N)

Hydaphias Börner, 1930

Hydaphias helvetica Hille Ris Lambers, 1947 (N)

Hydaphias molluginis Börner, 1939 (N, S, Si)

Hydaphias mosana Hille Ris Lambers, 1956 (N)

Staegeriella Hille Ris Lambers, 1947

Staegeriella necopinata (Börner, 1939) (N, S, Si)

Ammiaphis Börner, 1944

Ammiaphis sii (Koch, 1855) (N)

Hyalopteroides Theobald, 1916

Hyalopteroides humilis (Walker, 1852) (N, Si)

Aphidura Hille Ris Lambers, 1956

- Aphidura delmasi* Remaudière & Leclant, 1965 (S, Si)
- Aphidura mingens* Pintera, 1970 (Si)
- Aphidura pujoli* (Gomez-Menor, 1950) (S, Si)

Volutaphis Börner, 1939

- Volutaphis schusteri* (Börner, 1939) (N, Si)

Coloradoa Wilson, 1910

- Coloradoa absinthiella* Ossiannilsson, 1962 (Si, Sa)
- Coloradoa achilleae* Hille Ris Lambers, 1939 (N, Sa)
- Coloradoa artemisiae* (Del Guercio, 1913) (N, S)
- Coloradoa bournieri* Remaudière & Leclant, 1969 (Si)
- Coloradoa palmerae* Börner, 1952 (N)
- Coloradoa rufomaculata* (Wilson, 1908) (S)
- Coloradoa tanacetina* (Walker, 1850) (Si)

Longicaudus van der Goot, 1913

- Longicaudus trirhodus* (Walker, 1849) (N, S, Si, Sa)

Myzaphis van der Goot, 1913

- Myzaphis bucktoni* Jacob, 1946 (S)
- Myzaphis rosarum* (Kaltenbach, 1843) (S)
- Myzaphis turanica* Nevsky, 1929 (Si)

Chaetosiphon (Pentatrachopus) Börner, 1930

- Chaetosiphon (Pentatrachopus) fragaefolii* (Cockerell, 1901) (N, S, Si)
- Chaetosiphon (Pentatrachopus) potentillae* (Walker, 1850) (N)
- Chaetosiphon (Pentatrachopus) tetraerhodum* (Walker, 1849) (N, S, Si, Sa)

Elatobium Mordvilko, 1914

- Elatobium abietinum* (Walker, 1849) (N, S)

Liosomaphis Walker, 1868

- Liosomaphis berberidis* (Kaltenbach, 1843) (N, Si)

Cavariella (Cavariella) Del Guercio, 1911

- Cavariella (Cavariella) aegopodii* (Scopoli, 1763) (N, S, Si, Sa)

Cavariella (Cavariella) archangelicae (Scopoli, 1763) (N, S, Si, Sa)
Cavariella (Cavariella) cicutae (Koch, 1854) (N, Si)
Cavariella (Cavariella) intermedia Hille Ris Lambers, 1969 (N)
Cavariella (Cavariella) pastinacae (Linnaeus, 1758) (N)
Cavariella (Cavariella) theobaldi (Gillette & Bragg, 1918) (N, Sa)

Cavariella (Cavariella) Heinze, 1960

Cavariella (Cavariella) aquatica (Gillette & Bragg, 1916) (N)

Decorosiphon Börner, 1939

Decorosiphon corynothryx Börner, 1939 (N)

Jacksonia Theobald, 1923

Jacksonia papillata Theobald, 1923 (N)

Ovatus (Ovatus) van der Goot, 1913

Ovatus (Ovatus) crataegarius (Walker, 1850) (N, S, Si, Sa)
Ovatus (Ovatus) insitus (Walker, 1849) (N, S, Si)
Ovatus (Ovatus) mentharius (van der Goot, 1913) (Si, Sa)

Ovatus (Ovatoides) Börner, 1939

Ovatus (Ovatoides) inulae (Walker, 1849) (S, Si)

Ovatomyzus Hille Ris Lambers, 1947

Ovatomyzus calaminthae (Macchiati, 1885) (N)
Ovatomyzus chamaedrys (Passerini, 1879) (N)

Phorodon (Phorodon) Passerini, 1860

Phorodon (Phorodon) humuli (Schrank, 1801) (N, S)

Phorodon (Paraphorodon) Tseng & Tao, 1938

Phorodon (Paraphorodon) cannabis Passerini, 1860 (N, S, Sa)

Rhopalomyzus (Rhopalomyzus) Mordvilko, 1921

Rhopalomyzus (Rhopalomyzus) poae (Gillette, 1908) (N, S, Si)

Rhopalomyzus (Judenkoa) Hille Ris Lambers, 1946

Rhopalomyzus (Judenkoa) Ionicerae (Siebold, 1839) (N)

Neotoxoptera Theobald, 1915

Neotoxoptera violae (Pergande, 1900) (S)

Myzus (Myzus) Passerini, 1860

Myzus (Myzus) cerasi (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa)

Myzus (Myzus) lythri (Schrank, 1801) (N, S, Si)

Myzus (Myzus) ornatus Laing, 1932 (N, S, Si, Sa)

Myzus (Myzus) varians Davidson, 1912 (N, S, Si)

Myzus (Galiobium) Börner, 1933

Myzus (Galiobium) langei (Börner, 1933) (N)

Myzus (Nectarosiphon) Schouteden, 1901

Myzus (Nectarosiphon) ajugae Schouteden, 1903 (Si)

Myzus (Nectarosiphon) antirrhinii (Macchiati, 1883) (S)

Myzus (Nectarosiphon) ascalonicus Doncaster, 1946 (N)

Myzus (Nectarosiphon) certus (Walker, 1849) (N, Si)

Myzus (Nectarosiphon) ligustri (Mosley, 1841) (N, S, Sa)

Myzus (Nectarosiphon) linariae Holman, 1965 (Si)

Myzus (Nectarosiphon) persicae (Sulzer, 1776) (N, S, Si, Sa)

Myzus (Sciomyzus) Stroyan, 1954

Myzus (Sciomyzus) cymbalariae Stroyan, 1954 (N)

Tubaphis Hille Ris Lambers, 1947

Tubaphis ranunculina (Walker, 1852) (N, S, Sa)

Vesiculaphis Del Guercio, 1911

Vesiculaphis theobaldi Takahashi, 1930 (Si)

Aspidaphium Börner, 1939

Aspidaphium escherichi Börner, 1939 (N)

Paramyzus Börner, 1933

Paramyzus heraclei Börner, 1933 (N)

Pentalonia Coquerel, 1859

Pentalonia nigronervosa Coquerel, 1859 (N, S)

Cryptomyzus Oestlund, 1922

Cryptomyzus ballotae Hille Ris Lambers, 1953 (Si)
Cryptomyzus galeopsidis (Kaltenbach, 1843) (N, Sa)
Cryptomyzus korschelti Börner, 1938 (N, S, Si)
Cryptomyzus ribis (Linnaeus, 1758) (N)

Idiopterus Davis, 1909

Idiopterus nephrolepidis Davis, 1909 (S, Si)

Capitophorus van der Goot, 1913

Capitophorus carduinus (Walker, 1850) (N, S, Si)
Capitophorus elaeagni (Del Guercio, 1894) (N, S, Si, Sa)
Capitophorus hippophaes (Walker, 1852) (N, S, Si)
Capitophorus horni Börner, 1931 (N, Si)
Capitophorus inulae (Passerini, 1860) (N, S, Si, Sa)
Capitophorus similis van der Goot, 1915 (N, S, Si)

Pleotrichophorus Börner, 1930

Pleotrichophorus duponti Hille Ris Lambers, 1935 (N)
Pleotrichophorus glandulosus (Kaltenbach, 1846) (N, S, Sa)
Pleotrichophorus persimilis Börner, 1950 (N)

Nasonovia Mordvilko, 1914

Nasonovia nigra (Hille Ris Lambers, 1931) (N)
Nasonovia pilosellae (Börner, 1933) (N)
Nasonovia ribisnigri (Mosley, 1841) (N, S, Si, Sa)

Hyperomyzus (Hyperomyzus) Börner, 1933

Hyperomyzus (Hyperomyzus) lactucae (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
Hyperomyzus (Hyperomyzus) lampsanae (Börner, 1932) (N, S)
Hyperomyzus (Hyperomyzus) pallidus Hille Ris Lambers, 1935 (N, S)

Hyperomyzus (Hyperomyzella) Hille Ris Lambers, 1949

Hyperomyzus (Hyperomyzella) rhinanthi (Schouteden, 1903) (N)

Hyperomyzus (Neonasonovia) Hille Ris Lambers, 1949

Hyperomyzus (Neonasonovia) picridis (Börner & Blunck, 1916) (N, S, Si, Sa)

***Rhopalosiphoninus (Rhopalosiphoninus)* Baker, 1920**

Rhopalosiphoninus (Rhopalosiphoninus) latysiphon Davidson, 1912 (N, S, Si)

Rhopalosiphoninus (Rhopalosiphoninus) maianthemi Stroyan, 1965 (N)

***Rhopalosiphoninus (Myzosiphon)* Hille Ris Lambers, 1946**

Rhopalosiphoninus (Myzosiphon) staphyleae (Koch, 1854) (*)

Rhopalosiphoninus (Myzosiphon) staphyleae staphyleae (Koch, 1854) (N)

Rhopalosiphoninus (Myzosiphon) staphyleae tulipaellus Theobald, 1916 (S?)

***Rhopalosiphoninus (Pseudorhopalosiphoninus)* Heinze, 1961**

Rhopalosiphoninus (Pseudorhopalosiphoninus) calthae (Koch, 1854) (S?)

***Rhopalosiphoninus (Submegoura)* Hille Ris Lambers, 1953**

Rhopalosiphoninus (Submegoura) heikinheimoi (Börner, 1952) (N)

***Eucarazzia* Del Guercio, 1921**

Eucarazzia elegans (Ferrari, 1872) (N, S, Si)

***Aulacorthum (Aulacorthum)* Mordvilko, 1914**

Aulacorthum (Aulacorthum) palustre Hille Ris Lambers, 1947 (N)

Aulacorthum (Aulacorthum) sedens F.P. Müller, 1966 (N)

Aulacorthum (Aulacorthum) solani (Kaltenbach, 1843) (N, S, Si, Sa)

Aulacorthum (Aulacorthum) speyeri Börner, 1939 (N)

***Aulacorthum (Neomyzus)* van der Goot, 1915**

Aulacorthum (Neomyzus) circumflexum (Buckton, 1876) (N, S, Si)

***Microlophium* Mordvilko, 1914**

Microlophium carnosum (Buckton, 1876) (N, S, Si, Sa)

***Acyrtosiphon (Acyrtosiphon)* Mordvilko, 1914**

Acyrtosiphon (Acyrtosiphon) caraganae (Cholodkovsky, 1907) (N, S, Si)

Acyrtosiphon (Acyrtosiphon) cyparissiae (Koch, 1855) (N, S)

Acyrtosiphon (Acyrtosiphon) euphorbiae Börner, 1940 (S, Si, Sa)

Acyrtosiphon (Acyrtosiphon) gossypii Mordvilko, 1914 (Si)

Acyrtosiphon (Acyrtosiphon) lactucae (Passerini, 1860) (N, S, Si, Sa)

Acyrtosiphon (Acyrtosiphon) loti (Theobald, 1913) (N, S)

Acyrtosiphon (Acyrtosiphon) malvae (Mosley, 1841)

Acyrtosiphon (Acyrtosiphon) malvae malvae (Mosley, 1841) (N, S, Si, Sa)

Acyrtosiphon (Acyrtosiphon) malvae potha (Börner, 1950) (N)
Acyrtosiphon (Acyrtosiphon) nigripes Hille Ris Lambers, 1935 (N)
Acyrtosiphon (Acyrtosiphon) parvus Börner, 1950 (N)
Acyrtosiphon (Acyrtosiphon) pisum (Harris, 1776)
Acyrtosiphon (Acyrtosiphon) pisum pisum (Harris, 1776) (N, S, Si, Sa)
Acyrtosiphon (Acyrtosiphon) pisum ononis (Koch, 1855) (N)
Acyrtosiphon (Acyrtosiphon) primulae (Theobald, 1913) (N, Si)

Acyrtosiphon (Xanthomyzus) Narzikulov, 1966

Acyrtosiphon (Xanthomyzus) lambersi Leclant & Remaudière, 1974 (S, Si)

Subacyrthosiphon Hille Ris Lambers, 1947

Subacyrthosiphon cryptobium Hille Ris Lambers, 1947 (N)

Metopolophium Mordvilko, 1914

Metopolophium albidum Hille Ris Lambers, 1947 (N)
Metopolophium alpinum Hille Ris Lambers, 1966 (N)
Metopolophium dirhodum (Walker, 1849) (N, S, Si, Sa)
Metopolophium festucae (Theobald, 1917)
Metopolophium festucae festucae (Theobald, 1917) (N)
Metopolophium festucae cerealium Stroyan, 1982 (Si)
Metopolophium montanum Hille Ris Lambers, 1966 (N)

Cryptaphis Hille Ris Lambers, 1947

Cryptaphis poae (Hardy, 1850) (N)

Rhodobium Hille Ris Lambers, 1947

Rhodobium porosum (Sanderson, 1900) (N, Si)

Corylobium Mordvilko, 1914

Corylobium avellanae (Schrank, 1801) (N, S, Si, Sa)

Delphiniobium Mordvilko, 1914

Delphiniobium junackianum (Karsch, 1887) (N)
Delphiniobium lycoctoni Börner, 1950 (N)

Sitobion Mordvilko, 1914

Sitobion avenae (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa)
Sitobion fragariae (Walker, 1848) (N, S, Si, Sa)
Sitobion luteum (Buckton, 1876) (S?)

Linosiphon Börner, 1944

Linosiphon galiophagus (Wimshurst, 1923) (N)

Macrosiphum Passerini, 1860

Macrosiphum albertinae Hille Ris Lambers, 1966 (N)
Macrosiphum cholodkovskyi (Mordvilko, 1909) (N, S)
Macrosiphum daphnidis Börner, 1940 (Si, Sa)
Macrosiphum euphorbiae (Thomas, 1878) (N, S, Si, Sa)
Macrosiphum funestum (Macchiat, 1885) (N, S, Si)
Macrosiphum gei (Koch, 1855) (N)
Macrosiphum hartigi Hille Ris Lambers, 1947 (N)
Macrosiphum hellebori Theobald & Walton, 1923 (N)
Macrosiphum rosae (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
Macrosiphum sileneum Theobald, 1913 (Si)
Macrosiphum stellariae Theobald, 1913 (N)
Macrosiphum weberi Börner, 1933 (N, S, Sa)

Staticobium Mordvilko, 1914

Staticobium latifoliae Bozhko, 1950 (S, Si)
Staticobium limonii (Contarini, 1847) (N)

Metopeurum Mordvilko, 1914

Metopeurum fuscoviride Stroyan, 1950 (N)

Microsiphon Cholodkovsky, 1902

Microsiphon millefolii Wahlgren, 1940 (N)

Titanosiphon Nevsky, 1928

Titanosiphon artemisiae (Koch, 1855) (N, S)

Uroleucon (Uroleucon) Mordvilko, 1914

Uroleucon (Uroleucon) achilleae (Koch, 1855) (N)
Uroleucon (Uroleucon) bielawskii (Szelegiewicz, 1962) (Si, Sa)
Uroleucon (Uroleucon) bifrontis (Passerini, 1879) (N)
Uroleucon (Uroleucon) chondrillae (Nevsky, 1929) (S, Si)
Uroleucon (Uroleucon) cichorii (Koch, 1855)
 Uroleucon (Uroleucon) cichorii cichorii (Koch, 1855) (N, S, Si, Sa)
 Uroleucon (Uroleucon) cichorii grossus (Hille Ris Lambers, 1939) (N, S, Si, Sa)
 Uroleucon (Uroleucon) cichorii leontodontis (Hille Ris Lambers, 1939) (N)
Uroleucon (Uroleucon) cirsii (Linnaeus, 1758) (N)

Uroleucon (Uroleucon) hypochoeridis (Fabricius, 1779) (S, Si, Sa)
Uroleucon (Uroleucon) inulicola (Hille Ris Lambers, 1939) (N)
Uroleucon (Uroleucon) jaceicola (Hille Ris Lambers, 1939)
 Uroleucon (Uroleucon) jaceicola jaceicola (Hille Ris Lambers, 1939) (N)
 Uroleucon (Uroleucon) jaceicola pasqualei (Hille Ris Lambers & Stroyan, 1959) (N)
Uroleucon (Uroleucon) muralis (Buckton, 1876) (N)
Uroleucon (Uroleucon) obscurum (Koch, 1855) (N)
Uroleucon (Uroleucon) ochropus (Hille Ris Lambers, 1939) (N)
Uroleucon (Uroleucon) picridis (Fabricius, 1775) (N, S, Si)
Uroleucon (Uroleucon) pilosellae (Börner, 1933) (N)
Uroleucon (Uroleucon) pseudobscurus (Hille Ris Lambers, 1966) (S)
Uroleucon (Uroleucon) pulicariae (Hille Ris Lambers, 1939) (S)
Uroleucon (Uroleucon) sonchi (Linnaeus, 1767) (N, S, Si, Sa)
Uroleucon (Uroleucon) tanacetii (Linnaeus, 1758) (N, Sa)
Uroleucon (Uroleucon) tussilaginis (Walker, 1850) (N, S, Si)

***Uroleucon (Belochilum)* Börner, 1932**

Uroleucon (Belochilum) inulae (Ferrari, 1872) (N, S, Si, Sa)

***Uroleucon (Lambersius)* Olive, 1965**

Uroleucon (Lambersius) erigeronensis (Thomas, 1878) (N, Si)

***Uroleucon (Uromelan)* Mordvilko, 1914**

Uroleucon (Uromelan) aeneus (Hille Ris Lambers, 1939) (N)
Uroleucon (Uromelan) campanulae (Kaltenbach, 1843) (N)
Uroleucon (Uromelan) carlinae (Börner, 1933) (N)
Uroleucon (Uromelan) carthami (Hille Ris Lambers, 1948) (S, Si)
Uroleucon (Uromelan) compositae (Theobald, 1915) (Si) (*)
Uroleucon (Uromelan) ensifoliae (Holman, 1965)
 Uroleucon (Uromelan) ensifoliae siculum Barbagallo & Stroyan, 1980 (Si)
Uroleucon (Uromelan) helenae (Hille Ris Lambers, 1950) (S, Si, Sa)
Uroleucon (Uromelan) jaceae (Linnaeus, 1758)
 Uroleucon (Uromelan) jaceae jaceae (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
 Uroleucon (Uromelan) jaceae macrosiphon (Hille Ris Lambers, 1939) (N)
 Uroleucon (Uromelan) jaceae reticulatus (Hille Ris Lambers, 1939) (N)
Uroleucon (Uromelan) minor (Börner, 1940) (N)
Uroleucon (Uromelan) minosmartellii Barbagallo & Patti, 1994 (N, S)
Uroleucon (Uromelan) nigrocampanulae (Theobald, 1928) (N)
Uroleucon (Uromelan) rapunculoidis (Börner, 1939) (N)
Uroleucon (Uromelan) similis (Hille Ris Lambers, 1935) (N)
Uroleucon (Uromelan) solidaginis (Fabricius, 1779) (N)
Uroleucon (Uromelan) taraxaci (Kaltenbach, 1843) (N)

***Macrosiphoniella (Macrosiphoniella)* Del Guercio, 1911**

Macrosiphoniella (Macrosiphoniella) absinthii (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
Macrosiphoniella (Macrosiphoniella) aetnensis Barbagallo, 1968 (Si)
Macrosiphoniella (Macrosiphoniella) artemisiae (Boyer de Fonscolombe, 1841)
Macrosiphoniella (Macrosiphoniella) artemisiae artemisiae (Boyer de Fonscolombe, 1841) (N, S, Sa)
Macrosiphoniella (Macrosiphoniella) artemisiae meridionalis Barbagallo, 1969 (S, Si)
Macrosiphoniella (Macrosiphoniella) atra (Ferrari, 1872) (N, S, Si)
Macrosiphoniella (Macrosiphoniella) dubia Ferrari, 1872 (N) (*)
Macrosiphoniella (Macrosiphoniella) fasciata Del Guercio, 1913 (S)
Macrosiphoniella (Macrosiphoniella) helichrysi Remaudière, 1952 (S, Si, Sa)
Macrosiphoniella (Macrosiphoniella) leucanthemi (Ferrari, 1872) (N)
Macrosiphoniella (Macrosiphoniella) millefolii (DeGeer, 1773) (N, S, Sa)
Macrosiphoniella (Macrosiphoniella) oblonga (Mordvilko, 1901) (N, S)
Macrosiphoniella (Macrosiphoniella) sanborni (Gillette, 1908) (N, S, Si)
Macrosiphoniella (Macrosiphoniella) sejuncta (Walker, 1848) (N)
Macrosiphoniella (Macrosiphoniella) silvestrii Roberti, 1954 (S, Si)
Macrosiphoniella (Macrosiphoniella) staegeri Hille Ris Lambers, 1947 (S, Si)
Macrosiphoniella (Macrosiphoniella) tanacetaria (Kaltenbach, 1843)
Macrosiphoniella (Macrosiphoniella) tanacetaria tanacetaria (Kaltenbach, 1843) (N, Si, Sa)
Macrosiphoniella (Macrosiphoniella) tanacetaria italica Hille Ris Lambers, 1966 (S)
Macrosiphoniella (Macrosiphoniella) tapuskae (Hottes & Frison, 1931) (N, Si, Sa)
Macrosiphoniella (Macrosiphoniella) teriolana Hille Ris Lambers, 1931 (N)
Macrosiphoniella (Macrosiphoniella) usquertensis Hille Ris Lambers, 1935 (N)

***Macrosiphoniella (Asterobium)* Hille Ris Lambers, 1938**

Macrosiphoniella (Asterobium) asteris (Walker, 1849) (N, S, Si)
Macrosiphoniella (Asterobium) linariae (Koch, 1855) (N, S)

***Illinoia* Wilson, 1910**

Illinoia azaleae (Mason, 1925) (N, S, Si)

***Amphorophora* Buckton, 1876**

Amphorophora gei (Börner, 1939) (N)
Amphorophora idaei (Börner, 1939) (N)
Amphorophora rubi (Kaltenbach, 1843) (N, S, Si, Sa)

***Wahlgreniella* Hille Ris Lambers, 1949**

Wahlgreniella nervata (Gillette, 1908)
Wahlgreniella nervata arbuti (Davidson, 1910) (N, S, Si, Sa)
Wahlgreniella ossiannilssoni Hille Ris Lambers, 1949 (N)

***Megoura* Buckton, 1876**

Megoura viciae Buckton, 1876 (N, S, Si)

Megourella Hille Ris Lambers, 1949

Megourella purpurea Hille Ris Lambers, 1949 (N)

Note

Tetraneura (Tetraneura) agnesii: Specie di dubbia validità.

Tetraneura (Tetraneura) reticulata: Specie di dubbia validità.

Pemphigus (Pemphigus) coluteae: Specie di dubbia validità.

Pemphigus (Pemphigus) diani: Specie di dubbia validità.

Geoica flavescens: Specie di dubbia validità.

Geoica magnifica: Specie di dubbia validità.

Neophyllaphis podocarpis: Segnalato nel 1990 in Lombardia su piante di bonsai di provenienza estera.

Anoecia nemoralis: Prima segnalazione per l'Italia.

Crypturaphis grassii: Endemismo tirrenico.

Myzocallis (Lineomyzocallis) walshii: Specie nearctica comparsa in Italia intorno al 1990.

Tinocallis kahawaluokalani: Originaria dell'Estremo Oriente, comparsa in Italia alla fine degli anni '70.

Appendiseta robiniae: Originaria dal Nord America, comparsa in Italia alla fine degli anni '70.

Monellia caryae: Originaria dal Nord America, comparsa in Italia intorno al 1990.

Therioaphis (Rhizoberlesia) brachytricha: La sinonimia indicata in letteratura con la specie di Del Guercio (la cui reale identità rimane sconosciuta) è con tutta probabilità infondata.

Drepanaphis acerifoliae: Originaria dal Nord America, comparsa in Italia intorno al 1990.

Chaitophorus saliapteris: Specie di incerta identificazione.

Eulachnus tauricus: Considerata valida come specie del 'gruppo rileyi'.

Cedrobium laportei: Introdotto in Europa dal Nord Africa alla fine degli anni '60.

Cinara cedri: Introdotta in Europa dal Nord Africa/Asia Minore agli inizi degli anni '70.

Cinara hyperophila: Presenza incerta nel territorio.

Cinara laricionis: Limitata all'areale del pino laricio.

Cinara oblonga: Specie di dubbia validità; probabile sinonimo di *C. pini* (L.).

Cinara pinicola: Specie di dubbia validità.

Cinara piniphila: Presenza incerta nel territorio.

Protrama baronii: Prima segnalazione per l'Italia.

Protrama flavescens: Presenza incerta nel territorio.

Pterocomma jacksoni: Prima segnalazione per l'Italia.

Aphis (Aphis) armata: Presenza incerta nel territorio.

Aphis (Aphis) hieracii: Presenza incerta nel territorio.

Aphis (Aphis) magnoliae: Specie di dubbia validità.

Aphis (Aphis) maidiradicis: Presenza improbabile in Italia; le segnalazioni (tutte precedenti al 1925) sono forse dovute a errori di identificazione.

Aphis (Aphis) viridescens: Specie di dubbia validità.

Dysaphis (Dysaphis) candicans: Specie di dubbia validità.

Dysaphis (Dysaphis) crathaegaria: Specie di dubbia validità.

Dysaphis (Dysaphis) crathaegiphila: Specie di dubbia validità.

Dysaphis (Dysaphis) montemartinii: Specie di dubbia validità.

Brachycaudus (Acaudus) mimeuri: Ritenuto da alcuni Autori probabile sinonimo di *B. (A.) persicae*.

Rhopalosiphoninus (Myzosiphon) staphyleae: Per la ssp. *tulipaellus* presenza incerta nel territorio.

Uroleucon (Uromelan) compositae: Presente in Si solo a Lampedusa.

Macrosiphoniella (Macrosiphoniella) dubia: Specie di dubbia validità.

Ortheziidae

Arctorthesia Cockerell, 1902

Arctorthesia cataphracta (Olafsen, 1772) (N)

Newsteadia Green, 1902

Newsteadia floccosa (De Geer, 1778) (N, S)

Orthezia Bosc d'Antic, 1784

Orthezia insignis Douglas, 1887 (N)

Orthezia urticae (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)

Ortheziola Sulc, 1895

Ortheziola vej dovskyi Sulc, 1895 (N, S)

Margarodidae

Dimargarodes Silvestri, 1938

Dimargarodes mediterraneus (Silvestri, 1906) (S)

Guerriniella Fernald, 1903

Guerriniella serratulae (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa)

Icerya Signoret, 1875

Icerya purchasi Maskell, 1879 (N, S, Si, Sa) (*)

Kuwania Cockerell, 1903

Kuwania rubra Goux, 1938 (N, S)

Marchalina Vayssière, 1923

Marchalina hellenica (Gennadius, 1883) (S) (*)

Matsucoccus Cockerell, 1909

Matsucoccus feytaudi Ducasse, 1938 (N)

Matsucoccus pini (Green, 1925) (N, S, Si)

Neomargarodes Green, 1914

Neomargarodes europaeus Goidanich, 1969 (Si)

Porphyrophora Brandt, 1833

Porphyrophora italica Goidanich, 1963 (S, Si)

Xylococcus Löw, 1883

Xylococcus filiferus Löw, 1883 (S)

Note

Icerya purchasi: Di origine australiana, introdotta alla fine dell'800.

Marchalina hellenica: Introdotta dall'Egeo negli anni '60; presente solo nell'isola di Ischia.

Pseudococcidae

Antonina Signoret, 1875

Antonina graminis (Maskell, 1897) (S)

Antonina purpurea Signoret, 1875 (N, S)

Antoninella Kiritchenko, 1938

Antoninella inaudita Kiritchenko, 1938 (N)

Asphodelococcus Morrison, 1945

Asphodelococcus asphodeli (Bodenheimer, 1927) (Si)

Atrococcus Goux, 1941

Atrococcus achilleae (Kiritchenko, 1936) (N)

Atrococcus cracens Williams, 1962 (S)

Atrococcus luffi (Newstead, 1901) (N)

Atrococcus paludinus (Green, 1921) (N, S)

Atrococcus salviae (Tranfaglia, 1981) (S)

Balanococcus Williams, 1962

- Balanococcus boratynskii* Williams, 1962 (N, S)
- Balanococcus diminutus* (Leonardi, 1918) (N)
- Balanococcus orientalis* Danzig & Ivanova, 1976 (S, Sa)

Chaetococcus Maskell, 1898

- Chaetococcus bambusae* (Maskell, 1892)
- Chaetococcus phragmitis* (Marchal, 1909) (N, S, Si)

Chnaurococcus Ferris, 1950

- Chnaurococcus danzigae* Kozar & Kosztarab, 1976 (N)
- Chnaurococcus subterraneus* (Newstead, 1893) (S)

Chorizococcus McKenzie, 1960

- Chorizococcus rostellum* (Lobdell, 1930) (S, Sa)

Coccidohystrix Lindinger, 1943

- Coccidohystrix splendens* Goux, 1943 (S)
- Coccidohystrix zangherii* Kozar & Pellizzari Scaltriti, 1989 (S)

Coccura Sulc, 1908

- Coccura comari* (Künnow, 1880) (N, S)

Delottococcus Cox & Ben-Dov, 1986

- Delottococcus euphorbiae* (Ezzat & McConnell, 1956) (N, S, Si) (*)

Dysmicoccus Ferris, 1950

- Dysmicoccus brevipes* (Cockerell, 1893)
- Dysmicoccus grassii* (Leonardi, 1913)
- Dysmicoccus mackenziei* Beardsley, 1965
- Dysmicoccus multivorus* (Kiritchenko, 1936) (N, S)
- Dysmicoccus neobrevipes* Beardsley, 1959
- Dysmicoccus patulae* (Rau, 1938) (N)
- Dysmicoccus pietroi* Marotta, 1992 (S)
- Dysmicoccus walkeri* (Newstead, 1891) (N, S)

Euripersia Borchsenius, 1948

- Euripersia cribrata* (Menozzi, 1933) (N)
- Euripersia europaea* (Newstead, 1897) (N, S)

Euripersia inquilina (Leonardi, 1908) (Sa)
Euripersia libera (Leonardi, 1898) (S)
Euripersia montana (Newstead, 1898) (N)
Euripersia sardiniae (Leonardi, 1908) (Sa)
Euripersia silvestrii (Leonardi, 1918) (S)
Euripersia tomlini (Newstead, 1892) (S, Si)

Helicococcus Sulc, 1912

Helicococcus bohemicus Sulc, 1912 (N, S)
Helicococcus cydoniae Borchsenius, 1949 (S)
Helicococcus danzigae Bazarov, 1974 (S)
Helicococcus glacialis (Newstead, 1900) (N)
Helicococcus radicolica Goux, 1931 (N, S)
Helicococcus sulcii Goux, 1934 (N, S)

Heterococcus Ferris, 1918

Heterococcus nudus (Green, 1926) (N)

Hypogeococcus Rau, 1938

Hypogeococcus pungens Granara de Willink, 1981 (*)

Longicoccus Danzig, 1975

Longicoccus psammophilus (Koteja, 1971) (S)

Metadenopus Sulc, 1933

Metadenopus festucae Sulc, 1933 (N)

Mirococcopsis Borchsenius, 1948

Mirococcopsis nagyii Kozar, 1981 (N)

Mirococcus Borchsenius, 1947

Mirococcus inermis (Hall, 1925) (S)

Neotrionymus Borchsenius, 1948

Neotrionymus monstatus Borchsenius, 1948 (N)

Nipaecoccus Sulc, 1945

Nipaecoccus delassusi (Balachowsky, 1925) (S, Sa)
Nipaecoccus nipae (Maskell, 1893) (Si)

Peliococcopsis Borchsenius, 1948

Peliococcopsis caucasicus (Borchsenius, 1939) (N)
Peliococcopsis parviceraria (Goux, 1937) (N)

Peliococcus Borchsenius, 1948

Peliococcus armeniacus Borchsenius, 1949 (S)
Peliococcus cycliger (Leonardi, 1908) (S, Si)
Peliococcus manifestus Borchsenius, 1949 (S)
Peliococcus serratus (Ferris, 1925) (S)
Peliococcus terrestris Borchsenius, 1949 (S)
Peliococcus tritubulatus (Kiritchenko, 1940) (N)
Peliococcus vivarensis Tranfaglia, 1981 (S)

Pellizzaricoccus Kozar, 1991

Pellizzaricoccus gabrielis Kozar, 1991 (N, S)

Phenacoccus Cockerell, 1893

Phenacoccus aceris (Signoret, 1875) (N, S, Si)
Phenacoccus avenae Borchsenius, 1949 (N, S)
Phenacoccus eschscholtziae McKenzie, 1961 (S)
Phenacoccus evelinae (Tereznikova, 1968) (N)
Phenacoccus ferulae Borchsenius, 1949 (N)
Phenacoccus formicarum Leonardi, 1908 (S)
Phenacoccus graminicola Leonardi, 1908 (N, S, Si)
Phenacoccus hordei (Lindeman, 1886) (N)
Phenacoccus incertus (Kiritchenko, 1940) (Sa)
Phenacoccus interruptus Green, 1923 (N)
Phenacoccus madeirensis Green, 1923 (S, Si)
Phenacoccus mespili (Signoret, 1875) (S, Si)
Phenacoccus mutinensis Menozzi, 1933 (N)
Phenacoccus neohordei Marotta, 1992 (S, Si)
Phenacoccus piceae (Low, 1883) (N)
Phenacoccus silvanae Longo & Russo, 1989 (Si)
Phenacoccus yerushalmi Ben-Dov, 1985 (Si)

Planococcus Ferris, 1950

Planococcus citri (Risso, 1813) (N, S, Si, Sa)
Planococcus ficus (Signoret, 1875) (N, S, Si, Sa)
Planococcus halli Ezzat & McConnell, 1956 (S) (*)
Planococcus vovae (Nassonov, 1908) (S)

Pseudococcus Westwood, 1840

Pseudococcus affinis (Maskell, 1894) (N, S, Si, Sa)
Pseudococcus calceolariae (Maskell, 1878) (N, S, Sa)
Pseudococcus farnesiana (Targioni Tozzetti, 1888) (S)
Pseudococcus longipes Leonardi, 1908 (S)
Pseudococcus longispinus (Targioni Tozzetti, 1867) (N, S, Si, Sa)
Pseudococcus microcirculus McKenzie, 1960
Pseudococcus notabilis Leonardi, 1908 (N)

Puto Signoret, 1875

Puto antennatus Signoret, 1875 (N)
Puto marsicanus Marotta & Tranfaglia, 1993 (S)
Puto palinuri Marotta & Tranfaglia, 1993 (S)
Puto pilosellae (Sulc, 1898) (N, S)
Puto superbus (Leonardi, 1907) (N, S, Si, Sa)
Puto tauricus (Borchsenius, 1948) (S, Si)

Rhizoecus Kunckel d'Herculais, 1878

Rhizoecus albidus Goux, 1936 (N, S)
Rhizoecus americanus (Hambleton, 1946)
Rhizoecus cacticans (Hambleton, 1946)
Rhizoecus falcifer Kunckel d'Herculais, 1878 (S, Si)
Rhizoecus gentianae Panis, 1968 (S)
Rhizoecus poltavae Laing, 1929 (N)
Rhizoecus targionii (Cockerell, 1884) (S)

Rhodania Goux, 1935

Rhodania hypogea (Leonardi, 1908) (S)

Ripersiella Tinsley, 1899

Ripersiella periolana Goux, 1985 (N)

Spilococcus Ferris, 1950

Spilococcus mammillariae (Bouché, 1844)

Spinococcus Borchsenius, 1948

Spinococcus multispinus (Siraiwa, 1939) (S)

Trabutina Marchal, 1904

Trabutina leonardii Silvestri, 1920 (S, Sa)

Trionymus Berg, 1899

Trionymus hamberdi (Borchsenius, 1949) (N)
Trionymus myrmecarius (Leonardi, 1908) (Sa)
Trionymus newsteadi (Green, 1917) (S)
Trionymus perrisii (Signoret, 1875) (N, S)

Vryburgia De Lotto, 1967

Vryburgia amaryllidis (Bouché, 1837)
Vryburgia rimariae Tranfaglia, 1981 (S, Si)

Note

Delottococcus euphorbiae: Di probabile origine sudafricana, segnalata nel 1981.

Hypogeococcus pungens: In Italia è stata segnalata come *Hypogeococcus festerianus* (Lyzer y Trelles, 1942).

Planococcus halli: Segnalata nel 1992, solo per la Campania.

Eriococcidae

Acanthococcus Signoret, 1875

Acanthococcus aceris Signoret, 1875 (N, S)
Acanthococcus agropyri (Borchsenius, 1949) (N, S)
Acanthococcus araucariae (Maskell, 1879) (N, S, Si, Sa)
Acanthococcus bezzii (Leonardi, 1907) (N)
Acanthococcus cactearum (Leonardi, 1908)
Acanthococcus coccineus (Cockerell, 1894) (*)
Acanthococcus cynodontis (Kiritchenko, 1940) (N, Si)
Acanthococcus devoniensis (Green, 1896) (N, Sa)
Acanthococcus glyceriae (Green, 1921) (N)
Acanthococcus greeni Newstead, 1898 (N, S)
Acanthococcus insignis (Newstead, 1891) (N)
Acanthococcus latialis (Leonardi, 1907) (S)
Acanthococcus micracanthus Danzig, 1975 (N, S)
Acanthococcus munroi Boratynski, 1962 (N, S)
Acanthococcus pseudinsignis (Green, 1921) (N)
Acanthococcus roboris Goux, 1931 (S)
Acanthococcus rosannae (Tranfaglia & Esposito, 1985) (S, Si)

Eriococcus Targioni Tozzetti, 1868

Eriococcus buxi (Fonscolombe, 1834) (S)

Gossyparia Signoret, 1875

Gossyparia spuria (Modeer, 1778) (N, S, Sa)

Greenisca Borchsenius, 1948

Greenisca brachypodii Borchsenius & Danzig, 1966 (S)

Greenisca gouxi (Balachowsky, 1954) (N, S)

Gregoporia Danzig, 1969

Gregoporia rosacea (Balachowsky, 1932) (N, S)

Ovaticoccus Kloet, 1944

Ovaticoccus agavium (Douglas, 1888) (N, S, Si)

Note

Acanthococcus coccineus: Specie di origine messicana segnalata nel 1992.

Cryptococcidae

Cryptococcus Douglas, 1890

Cryptococcus fagisuga Lindinger, 1936 (N, S, Si)

Pseudohermes Nitsche, 1895

Pseudohermes fraxini (Kaltenbach, 1860) (N, S)

Micrococcidae

Micrococcus Leonardi, 1907

Micrococcus silvestrii Leonardi, 1907 (S, Sa)

Micrococcus similis Leonardi, 1907 (Sa)

Kermesidae

Kermes Boitard, 1828

Kermes bacciformis Leonardi, 1908 (N, S, Si)

Kermes corticalis (Nassonov, 1908) (N)

Kermes gibbosus Signoret, 1875 (S, Si)

Kermes ilicis (Linnaeus, 1758) (S)

Kermes roboris (Fourcroy, 1785) (N, S, Si)

Kermes vermilio Planchon, 1864 (N, S, Si, Sa)

Nidularia Targioni Tozzetti, 1868

Nidularia pulvinata (Planchon, 1864) (N, S, Si)

Cerococcidae

Cerococcus Comstock, 1882

Cerococcus cycliger Goux, 1932 (N)

Pollinia Targioni Tozzetti, 1868

Pollinia pollini (Costa, 1857) (N, S, Si, Sa)

Coccidae

Ceroplastes Gray, 1828

Ceroplastes cirripediformis Comstock, 1881 (N?)

Ceroplastes floridensis Comstock, 1881 (N) (*)

Ceroplastes japonicus Green, 1921 (N, S)

Ceroplastes rusci (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Ceroplastes sinensis Del Guercio, 1900 (N, S, Si, Sa)

Chlamydolecanium Goux, 1933

Chlamydolecanium conchioides Goux, 1933 (N?)

Chloropulvinaria Borchsenius, 1952

Chloropulvinaria floccifera (Westwood, 1870) (N, S, Si, Sa)

Coccus Linnaeus, 1758

Coccus hesperidum Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)

Coccus pseudomagnoliarum (Kuwana, 1914) (S, Si)

Eriopeltis Signoret, 1872

Eriopeltis festucae (Fonscolombe, 1834) (N, S)

Eucalymnatus Cockerell, 1901

Eucalymnatus tessellatus (Signoret, 1873) (N, S, Si)

Eulecanium Cockerell, 1893

Eulecanium douglasi (Sulc, 1895) (N)
Eulecanium franconicum (Lindinger, 1912) (N)
Eulecanium sericeum (Lindinger, 1906) (N, S)
Eulecanium tiliae (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Eupulvinaria Bochsensius, 1953

Eupulvinaria hydrangeae (Steinweden, 1946) (N, S)

Filippia Targioni Tozzetti, 1868

Filippia follicularis (Targioni Tozzetti, 1867) (N, S, Si)

Inglisia Maskell, 1896

Inglisia lounsburyi (Cockerell, 1900) (S) (*)

Lecanopsis Targioni Tozzetti, 1868

Lecanopsis festucae Borchsenius, 1952 (N)
Lecanopsis formicarum Newstead, 1893 (S)
Lecanopsis myrmecophila Leonardi, 1908 (Sa)
Lecanopsis rhizophila Targioni Tozzetti, 1868 (S?)

Lichtensia Signoret, 1873

Lichtensia viburni Signoret, 1873 (N, S, Si)

Luzulaspis Cockerell, 1902

Luzulaspis dactylis Green, 1928 (N)
Luzulaspis luzulae (Dufour, 1864) (N, S)

Nemolecanium Borchsenius, 1955

Nemolecanium graniforme (Wünn, 1921) (N, S, Si)

Neopulvinaria Hadzibejli, 1955

Neopulvinaria innumerabilis (Rathvon, 1854) (N) (*)

Palaeolecanium Sulc, 1908

Palaeolecanium bituberculatum (Targioni Tozzetti, 1868) (N, S)

Parafairmairia Cockerell, 1899

Parafairmairia bipartita (Signoret, 1874) (N?)

Parafairmairia gracilis Green, 1916 (N)

Parasaissetia Takahashi, 1955

Parasaissetia nigra (Nietner, 1861) (*)

Parthenolecanium Sulc, 1908

Parthenolecanium corni (Bouché, 1844) (N, S, Si)

Parthenolecanium persicae (Fabricius, 1776) (N, S, Si, Sa)

Parthenolecanium pomeranicum (Kawecki, 1954) (N, S)

Parthenolecanium rufulum (Cockerell, 1903) (N, S, Si)

Phyllostroma Sulc, 1942

Phyllostroma myrtilli (Kaltenbach, 1874) (N, S)

Physokermes Targioni Tozzetti, 1869

Physokermes hemicyphus (Dalman, 1825) (N, S)

Physokermes piceae (Schrank, 1801) (N, S)

Protopulvinaria Cockerell, 1894

Protopulvinaria pyriformis (Cockerell, 1894) (S) (*)

Pulvinaria Targioni Tozzetti, 1866

Pulvinaria vitis (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Pulvinariella Borchsenius, 1953

Pulvinariella mesembryanthemi (Vallot, 1830) (N, S, Si, Sa)

Rhizopulvinaria Borchsenius, 1952

Rhizopulvinaria artemisiae (Signoret, 1873) (N)

Rhizopulvinaria dianthi (Bodenheimer, 1943) (N)

Rhizopulvinaria grassei (Balachowsky, 1936) (N, Si)

Rhodococcus Borchsenius, 1953

Rhodococcus perornatum (Cockerell & Parrot, 1899) (N)

Saissetia Déplanche, 1859

Saissetia coffeae (Walker, 1852) (N, S, Si, Sa) (*)

Saissetia ficinum (Paoli, 1915) (Sa)

Saissetia oleae (Olivier, 1791) (N, S, Si, Sa)

Scythia Kiritchenko, 1938

Scythia aetnensis Russo & Longo, 1990 (Si)

Sphaerolecanium Leonardi, 1908

Sphaerolecanium prunastri (Fonscolombe, 1834) (S, Sa)

Note

Ceroplastes floridensis: Presente in N solo in Liguria.

Inglisia lounsburyi: Specie di origine sudafricana, reperita nel 1982 solo in Campania.

Neopulvinaria innumerabilis: Di origine nordamericana, segnalata nel 1977.

Parasaissetia nigra: Presenza incerta e solo in Toscana.

Protopulvinaria pyriformis: Specie americana, segnalata nel 1993.

Saissetia coffeae: Presente in N solo in serra.

Lecanodiaspididae

Lecanodiaspis Targioni Tozzetti, 1869

Lecanodiaspis sardoa Targioni Tozzetti, 1869 (N, S, Sa)

Acleridae

Aclerda Signoret, 1874

Aclerda berlesei Buffa, 1897 (S, Si)

Aclerda subterranea Signoret, 1874 (N?, S?)

Asterolecaniidae

Asterodiaspis Signoret, 1877

Asterodiaspis bella (Russell, 1941) (S, Si)

Asterodiaspis illicicola (Targioni Tozzetti, 1888) (S, Si)

Asterodiaspis repugnans (Russell, 1941) (N, S)

Asterodiaspis roboris (Russell, 1941) (N, S, Si)

Asterodiaspis variolosa (Ratzeburg, 1870) (N, S)

Asterolecanium Targioni Tozzetti, 1868

Asterolecanium epidendri (Bouchè, 1844)

Bambusaspis Cockerell, 1902

Bambusaspis bambusae (Boisduval, 1869) (Si) (*)

Planchonia Signoret, 1870

Planchonia arabidis Signoret, 1876 (N, S)

Planchonia zanthenes (Russell, 1941) (S, Si, Sa)

Note

Bambusaspis bambusae: Presente solo nell'Orto Botanico di Catania.

Phoenicococcidae

Limacoccus Bondar, 1929

Limacoccus brasiliensis (Hempel, 1934) (*)

Phoenicococcus Cockerell, 1899

Phoenicococcus marlatti Cockerell, 1899 (S, Si)

Note

Limacoccus brasiliensis: Reperita nel 1991 in Toscana su palme importate dal Brasile.

Diaspididae

Abgrallaspis Balachowsky, 1948

Abgrallaspis cyanophylli (Signoret, 1869) (N, S, Si, Sa) (*)

Abgrallaspis degeneratus (Leonardi, 1896) (S)

Acanthomytilus Borchsenius, 1947

Acanthomytilus intermittens (Hall, 1924) (S, Si)

Acanthomytilus jablonowskii Kozar & Matile Ferrero, 1975 (N)

Acanthomytilus sacchari (Hall, 1923) (N, S, Si)

Acutaspis Ferris, 1941

Acutaspis perseae (Comstock, 1881)

Adiscodiaspis Marchal, 1909

Adiscodiaspis ericicola (Marchal, 1909) (Sa)

Aonidia Targioni Tozzetti, 1868

Aonidia lauri (Bouché, 1833) (N, S, Si, Sa)

Aonidiella Berlese & Leonardi, 1896

Aonidiella aurantii (Maskell, 1879) (S, Si, Sa) (*)

Aonidiella taxus Leonardi, 1906 (N, S, Si)

Aspidiotus Bouché, 1833

Aspidiotus destructor (Signoret, 1869)

Aspidiotus hedericola Leonardi, 1920 (N, S, Si)

Aspidiotus nerii Bouché, 1933 (N, S, Si, Sa)

Aspidiotus spinosus Comstock, 1883 (N, S, Si) (*)

Aulacaspis Cockerell, 1893

Aulacaspis rosae (Bouché, 1833) (N, S, Si, Sa)

Aulacaspis tubercularis (Newstead, 1906) (S) (*)

Carulaspis MacGillivray, 1921

Carulaspis carueli (Signoret, 1869) (N, S, Si, Sa)

Carulaspis juniperi (Bouché, 1851) (N, S, Si)

Carulaspis silvestrii Lupo, 1966 (Si)

Carulaspis visci (Schrank, 1781) (N, S, Si, Sa)

Chionaspis Signoret, 1869

Chionaspis etrusca Leonardi, 1908 (S)

Chionaspis lepiney Balachowsky, 1928 (N, S?)

Chionaspis salicis (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)

Chortinaspis Ferris, 1938

Chortinaspis subterranea (Lindinger, 1912) (N, S)

Chrysomphalus Ashmead, 1880

Chrysomphalus aonidum (Linnaeus, 1758)

Chrysomphalus dictyospermi (Morgan, 1889) (N, S, Si, Sa) (*)

Diaspidiotus Berlese & Leonardi, 1896

Diaspidiotus alni (Marchal, 1909) (N, S)
Diaspidiotus bavaricus (Lindinger, 1912) (N, S)
Diaspidiotus distinctus (Leonardi, 1900) (N, S, Si)
Diaspidiotus osborni (Newell & Cockerell, 1898) (N, S, Si) (*)
Diaspidiotus viticola (Leonardi, 1913) (S, Si)

Diaspis Costa, 1835

Diaspis boisduvalii Signoret, 1869 (N, S, Si) (*)
Diaspis bromeliae (Kerner, 1778) (N, S, Si)
Diaspis coccois Lichtenstein, 1882 (S, Si)
Diaspis echinocacti (Bouché, 1833) (N, S, Si, Sa) (*)

Duplachionaspis MacGillivray, 1921

Duplachionaspis berleseii (Leonardi, 1898) (N, S, Si, Sa)
Duplachionaspis sicula (Lupo, 1938) (Si)

Dynaspidiotus Thiem & Gerneck, 1934

Dynaspidiotus britannicus (Newstead, 1898) (N, S, Si)

Ephedraspis Borchsenius, 1949

Ephedraspis ephedrarum (Lindinger, 1912) (S, Sa)

Epidiaspis Cockerell, 1899

Epidiaspis gennadii (Leonardi, 1898) (S, Si)
Epidiaspis leperii (Signoret, 1869) (N, S, Si, Sa)

Evallaspis Lupo, 1939

Evallaspis ampelodesmae (Newstead, 1897) (S, Si)

Fiorinia Targioni Tozzetti, 1868

Fiorinia fioriniae (Targioni Tozzetti, 1867) (S, Si) (*)

Furchadaspis MacGillivray, 1921

Furchadaspis zamiae (Morgan, 1890) (S, Si, Sa)

Genaparlatoria MacGillivray, 1921

Genaparlatoria pseudaspidiotus (Lindinger, 1905)

Gonaspidotus MacGillivray, 1921

Gonaspidotus minimus (Leonardi, 1896) (S, Si)

Greeniella Cockerell, 1897

Greeniella fimbriata (Ferris, 1955)

Gymnaspis Newstead, 1898

Gymnaspis aechmeae Newstead, 1898

Hemiberlesia Cockerell, 1897

Hemiberlesia lataniae (Signoret, 1869) (N, S, Si) (*)

Hemiberlesia rapax (Comstock, 1881) (N, S, Si, Sa) (*)

Howardia Berlese & Leonardi, 1896

Howardia biclavis (Comstock, 1883)

Ischnaspis Douglas, 1887

Ischnaspis longirostris (Signoret, 1882)

Kuwanaspis MacGillivray, 1921

Kuwanaspis bambusae (Kuwana, 1902) (N, S) (*)

Lepidosaphes Shimer, 1868

Lepidosaphes beckii (Newmann, 1869) (S, Si, Sa) (*)

Lepidosaphes conchiformis (Gmelin, 1789) (N, S, Si, Sa)

Lepidosaphes destefanii Leonardi, 1907 (N, S, Si)

Lepidosaphes gloverii (Packard, 1869) (S, Si, Sa) (*)

Lepidosaphes granati Koronéos, 1934 (S, Si)

Lepidosaphes juniperi Lindinger, 1912 (N, S)

Lepidosaphes newsteadi (Sulc, 1895) (N, S, Si)

Lepidosaphes pinnaeformis (Bouché, 1851)

Lepidosaphes serrifrons (Leonardi, 1898)

Lepidosaphes ulmi (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Leucaspis Signoret, 1870

Leucaspis loewi Colvée, 1882 (N, S, Si)

Leucaspis pini (Hartig, 1839) (N, S, Si)

Leucaspis pusilla Loew, 1883 (N, S, Si, Sa)
Leucaspis riccae Targioni Tozzetti, 1881 (S, Si)
Leucaspis signoreti Targioni Tozzetti, 1868 (Sa)

Lindingaspis MacGillivray, 1921

Lindingaspis rossi (Maskell, 1891) (Si) (*)

Lineaspis MacGillivray, 1921

Lineaspis striata (Newstead, 1897) (S?, Sa)

Melanaspis Cockerell, 1897

Melanaspis bromiliae (Leonardi, 1899)
Melanaspis inopinata (Leonardi, 1913) (S, Si)

Mercetaspis Gomez Menor, 1927

Mercetaspis sphaerocarpae Gomez Menor, 1927 (Si)

Nuculaspis Ferris, 1938

Nuculaspis abietis (Schrank, 1776) (N, S, Si)

Odonaspis Leonardi, 1897

Odonaspis greeni Cockerell, 1902 (S) (*)

Pallulaspis Ferris, 1937

Pallulaspis retamae (Hall, 1926) (Si)

Parlatoria Targioni Tozzetti, 1868

Parlatoria blanchardi (Targioni Tozzetti, 1892) (N, S) (*)
Parlatoria camelliae Comstock, 1883 (S, Si)
Parlatoria oleae (Colvée, 1880) (N, S, Si, Sa)
Parlatoria pergandii Comstock, 1881 (N, S, Si, Sa)
Parlatoria proteus (Curtis, 1843) (S, Sa) (*)
Parlatoria ziziphi (Lucas, 1853) (S, Si, Sa) (*)

Pinnaspis Cockerell, 1892

Pinnaspis aspidistrae (Signoret, 1869) (N, S, Si) (*)
Pinnaspis buxi (Bouché, 1851) (N, S) (*)
Pinnaspis strachani (Cooley, 1899)

Pseudaonidia Cockerell, 1897

Pseudaonidia paeoniae (Cockerell, 1899) (N, S) (*)

Pseudaulacaspis MacGillivray, 1921

Pseudaulacaspis cockerelli (Cooley, 1897) (Si) (*)

Pseudaulacaspis pentagona (Targioni Tozzetti, 1886) (N, S, Si, Sa) (*)

Pseudoparlatoria Cockerell, 1893

Pseudoparlatoria parlatorioides (Comstock, 1883)

Quadraspidotus MacGillivray, 1921

Quadraspidotus cecconii (Leonardi, 1908) (Si, Sa)

Quadraspidotus gigas (Thiem & Gerneck, 1934) (N, S)

Quadraspidotus jaapi (Leonardi, 1920) (N)

Quadraspidotus labiatarum (Marchal, 1909) (N, S)

Quadraspidotus lenticularis (Lindinger, 1912) (N, S, Si)

Quadraspidotus marani Zahradnik, 1952 (N, S)

Quadraspidotus ostraiformis (Curtis, 1843) (N, S, Si, Sa)

Quadraspidotus perniciosus (Comstock, 1881) (N, S, Si, Sa) (*)

Quadraspidotus pyri (Lichtenstein, 1881) (N, S)

Quadraspidotus salicis (Lupo, 1953) (S)

Quadraspidotus sulci Balachowsky, 1950 (S)

Quadraspidotus thymbrae Koronéos, 1934 (S)

Quadraspidotus zonatus (Frauenfeld, 1868) (N, S, Si)

Rhizaspidotus MacGillivray, 1921

Rhizaspidotus canariensis (Lindinger, 1911) (N, S)

Rhizaspidotus donacis (Leonardi, 1920) (S)

Rungaspis Balachowsky, 1949

Rungaspis capparidis (Bodenheimer, 1929) (Si)

Saharaspis Balachowsky, 1951

Saharaspis ceardi (Balachowsky, 1928) (S, Si)

Selenaspidus Cockerell, 1897

Selenaspidus albus McKenzie, 1953

Suturaspis Lindinger, 1906

Suturaspis archangelskyae (Lindinger, 1929) (S, Si)

Syngenaspis Sulc, 1895

Syngenaspis parlatoriae Sulc, 1895 (N)

Targionia Signoret, 1870

Targionia nigra Signoret, 1870 (N, S?, Si)

Targionia vitis (Signoret, 1876) (N, S, Si, Sa)

Umbaspis MacGillivray, 1921

Umbaspis regularis (Newstead, 1911) (S) (*)

Unaspis MacGillivray, 1921

Unaspis euonymi (Comstock, 1881) (N, S, Si, Sa) (*)

Unaspis yanonensis (Kuwana, 1923) (N) (*)

Note

Abgrallaspis cyanophylli: Presente in N solo in serra.

Aonidiella aurantii: Introdotta all'inizio del '900. Originaria della Cina meridionale.

Aspidiotus spinosus: Introdotta alla fine dell'800. Di origine tropicale, presente in N solo in serra.

Aulacaspis tubercularis: Segnalata nel 1980. Di origine tropicale.

Chrysomphalus dictyospermi: Introdotta verso la fine dell'800. Originaria della Cina meridionale.

Diaspidiotus osborni: Segnalata nel 1981. Originaria dell'America del Nord.

Diaspis boisduvalii: Presente in N solo in serra.

Diaspis echinocacti: Presente in N solo in serra.

Fiorinia fioriniae: Introdotta nella seconda metà dell'800. Originaria dell'Asia orientale.

Hemiberlesia lataniae: Presente in N solo in serra.

Hemiberlesia rapax: Presente in N solo in Liguria.

Kuwanaspis bambusae: Segnalata nel 1938. Originaria del Giappone e della Cina.

Lepidosaphes beckii: Introdotta nella seconda metà dell'800. Originaria dell'Asia orientale.

Lepidosaphes gloverii: Introdotta tra il 1920 e il 1944. Originaria dell'Asia orientale.

Lindingaspis rossi: Introdotta nella prima metà del '900. Originaria dell'Australia.

Odonaspis greeni: Segnalata nel 1990. Di origine asiatica.

Parlatoria blanchardi: Presente in N solo in Liguria.

Parlatoria proteus: Presente in S solo in serra.

Parlatoria ziziphi: Introdotta verso la metà dell'800. Originaria della Cina.

Pinnaspis aspidistrae: Introdotta all'inizio del '900. Originaria dell'Asia orientale. Presente in N solo in serra.

Pinnaspis buxi: Introdotta alla fine dell'800. Originaria dell'Asia orientale. Presente in N solo in serra.

Pseudaonidia paeoniae: Introdotta verso la metà del '900. Originaria del Giappone.

Pseudaulacaspis cockerelli: Segnalata nel 1992. Di origine orientale.

Pseudaulacaspis pentagona: Segnalata nel 1885. Di origine giapponese.

Quadraspidotus perniciosus: Introdotta nella prima metà del '900. Originaria della Cina settentrionale.

Umbaspis regularis: Segnalata nel 1993. Di origine africana.

Unaspis euonymi: Introdotta nella seconda metà dell'800. Originaria dell'Asia orientale.

Unaspis yanonensis: Segnalata nel 1986. Di origine cinese. Presente in N solo in Liguria.

Coleoptera

Acanthocnemidae

Acanthocnemus Perris, 1866

Acanthocnemus nigricans (Hope, 1845) (S) (*)

Note

Acanthocnemus nigricans: Specie cosmopolita. Un ritrovamento in Umbria.

Aderidae

Phytobaenus R.F. Sahlberg, 1834

Phytobaenus amabilis R.F. Sahlberg, 1834 (N, S)

Aderus Stephens, 1829

Aderus populneus (Creutzer in Panzer, 1796) (N, S, Si, Sa)

Anidorus Mulsant & Rey, 1866

Anidorus lateralis (Gredler, 1866) (N)

Anidorus nigrinus (Germar, 1831) (N, S, Sa?)

Anidorus patricius (Abeille de Perrin, 1872) (N?, S) (*)

Anidorus sanguinolentus (Kiesenwetter, 1861) (N, S, Si)

Cobososia Báguena, 1962

Cobososia angulithorax (Desbrochers, 1881) (Sa)

Cobososia pallescens (Wollaston, 1854) (S, Si, Sa) (*)

Euglenes Westwood, 1830

Euglenes oculatus (Paykull, 1798) (S) (*)

Eugenes pygmaeus (Degeer, 1774) (N)

Otolelus Mroczkowski in Burakowski et al., 1987

Otolelus atomus (A. Costa, 1884) (Sa) (E) (*)

Otolelus flaveolus (Mulsant & Rey, 1866) (N, S, Si, Sa)

Otolelus minor (Baudi, 1877) (N, S) (E) (*)

Otolelus neglectus (Jacquelin du Val & Aubé, 1862) (N, S?, Si)

Otolelus ruficollis (Rossi, 1794) (N, S)

Vanonus Casey, 1895

Vanonus brevicornis (Perris, 1869) (*)

Vanonus brevicornis brevicornis (Perris, 1869) (N)

Vanonus pruinus (Kiesenwetter, 1861)

Vanonus pruinus pruinus (Kiesenwetter, 1861) (N, S, Si, Sa)

Note

Anidorus patricius: Specie segnalata delle Alpi Marittime e del Lazio.

Cobosolia pallescens: In S segnalata solo della Calabria.

Eugenes oculatus: Specie segnalata solo del Lazio; in passato ritenuta aberrazione di *Eugenes pygmaeus*.

Otolelus atomus: Secondo Pic probabile sinonimo di *Otolelus flaveolus* (cfr. Porta, 1934).

Otolelus minor: Specie segnalata solo di Piemonte e Lazio; potrebbe appartenere al genere *Vanonus* essendo stata paragonata da Baudi a *V. brevicornis*.

Vanonus brevicornis: Specie segnalata solo della Lombardia.

Agyrtidae

Agyrtes Frölich, 1799

Agyrtes bicolor Laporte de Castelnau, 1840 (N, S)

Agyrtes castaneus (Fabricius, 1792) (N, S)

Necrophilus Latreille, 1829

Necrophilus subterraneus (Dahl, 1807) (N)

Pteroloma Gyllenhal, 1829

Pteroloma forstroemii (Gyllenhal, 1810) (N?) (*)

Note

Pteroloma forstroemii: Presenza dubbia in Alto Adige.

Alexiidae

Sphaerosoma Stephens, 1832

Sphaerosoma apuanum Reitter, 1909 (S) (E)
Sphaerosoma aspromontanum Reitter, 1909 (S) (E) (*)
Sphaerosoma fiorii Ganglbauer, 1899 (N, S) (E)
Sphaerosoma globosum (Sturm, 1807) (N, S, Si)
Sphaerosoma laevicolle Reitter, 1883 (N?) (*)
Sphaerosoma maritimum Reitter, 1904 (N)
Sphaerosoma paganettii Obenberger, 1913 (S) (E)
Sphaerosoma piliferum (P.J.W. Müller, 1821) (N)
Sphaerosoma pilosum (Panzer, 1793) (N, S)
Sphaerosoma punctatum Reitter, 1897 (N) (*)
Sphaerosoma reitteri Ormay, 1888 (N?, S?) (*)
Sphaerosoma seidlitzii Reitter, 1889 (N, S)
Sphaerosoma sparsum Reitter, 1909 (S) (E)
Sphaerosoma solarii Reitter, 1904 (S) (E)
Sphaerosoma vallombrosae Reitter, 1885 (S) (E)

Note

Sphaerosoma aspromontanum: Forse si tratta solo di una razza distinta di *S. reitteri* Ormay.
Sphaerosoma laevicolle: Presenza dubbia.
Sphaerosoma punctatum: Presenza dubbia lungo le Alpi Orientali.
Sphaerosoma reitteri: Presenza dubbia; vedi anche 016.0.002.0.

Alleculidae

***Allecula* (*Upinella*)** Mulsant, 1856

Allecula (*Upinella*) *aterrima* Rosenhauer, 1847 (N)

***Allecula* (*Allecula*)** Fabricius, 1801

Allecula (*Allecula*) *morio* (Fabricius, 1787) (N, S)
Allecula (*Allecula*) *rhenana* Bach, 1856 (N)

Hymenophorus Mulsant, 1852

Hymenophorus *doublieri* (Mulsant, 1851) (N, Si)

Prionychus Solier, 1835

Prionychus *ater* (Fabricius, 1775) (N, S, Si)

Prionychus fairmairei (Reiche, 1860) (N, S)
Prionychus lugens Küster, 1850 (Si)
Prionychus melanarius (Germar, 1813) (N)

Hymenalia Mulsant, 1856

Hymenalia rufipes (Fabricius, 1792) (N, S, Sa)

Gonodera Mulsant, 1856

Gonodera bicolor Reitter, 1884 (S?)
Gonodera luperus (Herbst, 1783) (N, S, Si, Sa)
Gonodera metallica (Küster, 1850) (N, S, Si)

Gerandryus Rottenberg, 1873

Gerandryus aetnensis (Rottenberg, 1870) (N?, Si) (E)

Pseudocistela Crotch, 1873

Pseudocistela ceramboides (Linné, 1761) (N, S)

Isomira (Isomira) Mulsant, 1856

Isomira (Isomira) anaspiformis Weise, 1974 (S) (E)
Isomira (Isomira) ferruginea (Küster, 1850) (S, Si, Sa)
Isomira (Isomira) genistae (Rottenberg, 1870) (S, Si) (E)
Isomira (Isomira) hypocrita (Mulsant, 1856) (N)
Isomira (Isomira) icteropa (Küster, 1852) (N, S, Si)
Isomira (Isomira) marcida (Kiesenwetter, 1863) (N, S) (E)
Isomira (Isomira) murina (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)
Isomira (Isomira) ochropus (Küster, 1850) (S?)
Isomira (Isomira) parvula (Rottenberg, 1870) (S) (E)
Isomira (Isomira) parvuloides Weise, 1974 (S) (E)
Isomira (Isomira) paupercula (Baudi, 1883) (Si) (E)
Isomira (Isomira) semiflava (Küster, 1852) (N, S)
Isomira (Isomira) testacea Seidlitz, 1896 (N, S)
Isomira (Isomira) umbellatarum (Kiesenwetter, 1863) (N, S)

Isomira (Heteromira) Hölzel, 1958

Isomira (Heteromira) costessii (Bertolini, 1866) (N) (E)

Isomira (Danielomira) Weise, 1974

Isomira (Danielomira) scutellaris (Baudi, 1877) (N) (E)

Mycetochara (Mycetochara) Berthold, 1827

Mycetochara (Mycetochara) axillaris (Paykull, 1799) (N)
Mycetochara (Mycetochara) flavipes (Fabricius, 1792) (N)

Mycetochara (Ernocharis) Thomson, 1859

Mycetochara (Ernocharis) flavipennis Reitter, 1911 (N) (E)
Mycetochara (Ernocharis) humeralis (Fabricius, 1787) (N, Si)
Mycetochara (Ernocharis) linearis Illiger, 1891 (N, S, Si)
Mycetochara (Ernocharis) pygmaea Redtenbacher, 1874 (N)
Mycetochara (Ernocharis) quadrimaculata (Latreille, 1804) (N, S)
Mycetochara (Ernocharis) thoracica Gredler, 1854 (N)

Podonta Mulsant, 1856

Podonta brevicornis Seidlitz, 1896 (S?)
Podonta italica Baudi, 1877 (N, S, Si) (E)
Podonta nigrita (Fabricius, 1794) (N)

Proctenius Reitter, 1890

Proctenius luteus (Küster, 1848) (Si?)

Cteniopus (Cteniopus) Solier, 1835

Cteniopus (Cteniopus) neapolitanus Baudi, 1877 (S) (E)
Cteniopus (Cteniopus) sulphureus (Linné, 1767) (N, S, Si)

Cteniopus (Rhinobarus) Reitter, 1906

Cteniopus (Rhinobarus) sulphuripes (Germar, 1824) (N)

Heliotaurus Mulsant, 1856

Heliotaurus seidlitzii Reitter, 1906 (Si)

Omophlus (Odontomophlus) Seidlitz, 1896

Omophlus (Odontomophlus) dispar A. Costa, 1847 (N, S, Si) (E)
Omophlus (Odontomophlus) fallaciosus Rottenberg, 1870 (Si) (E)
Omophlus (Odontomophlus) flavipennis Küster, 1850 (S)
Omophlus (Odontomophlus) infirmus Kirsch, 1869 (S)
Omophlus (Odontomophlus) lepturoides (Fabricius, 1787) (N, S, Si, Sa)

Omophlus (Omophlus) Solier, 1835

Omophlus (Omophlus) hirtus Seidlitz, 1896 (Si)
Omophlus (Omophlus) lividipes Mulsant, 1856 (N)

Omophlus (Omophlus) longicornis Bertolini, 1868 (N, S)
Omophlus (Omophlus) picipes (Fabricius, 1792) (N, S, Si)
Omophlus (Omophlus) proteus Kirsch, 1869 (N, S)
Omophlus (Omophlus) rufitarsis (Leske, 1785) (N, S, Si, Sa)
Omophlus (Omophlus) rugosicollis (Brullé, 1832) (N, S)

Megischina Reitter, 1906

Megischina armillata (Brullé, 1832) (S, Si)

Megischia Solier, 1835

Megischia curvipes (Brullé, 1832) (N?, S, Si, Sa)

Anobiidae

Hedobia Dejean, 1821

Hedobia pubescens (Olivier, 1790) (N, S, Sa)

Ptinomorphus Mulsant & Rey, 1868

Ptinomorphus angustatus (C. Brisout de Barneville, 1862) (S)
Ptinomorphus imperialis (Linné, 1767) (N, S, Si, Sa?)
Ptinomorphus magnificus (Reitter, 1879) (S?) (*)
Ptinomorphus regalis (Duftschmid, 1825) (N, S, Si?, Sa?)

Grynobius C.G. Thomson, 1859

Grynobius planus (Fabricius, 1787) (N, S) (*)

Dryophilus Chevrolat, 1832

Dryophilus anobioides Chevrolat, 1832 (N, Si, Sa)
Dryophilus densipilis Abeille de Perrin, 1872 (S, Si, Sa)
Dryophilus forticornis Abeille de Perrin, 1875 (Si)
Dryophilus longicollis (Mulsant & Rey, 1853) (N, S, Si, Sa)
Dryophilus luigionii Pic, 1921 (S) (E)
Dryophilus pusillus (Gyllenhal, 1808) (N, S, Sa)
Dryophilus sculus Ragusa, 1896 (S, Si) (E) (*)

Pseudodryophilus L. von Heyden, 1891

Pseudodryophilus paradoxus (Rosenhauer, 1856) (S)

Homophthalmus Abeille de Perrin, 1875

Homophthalmus rugicollis (Mulsant & Rey, 1853) (N, S)

Episernus C.G. Thomson, 1863

Episernus angulicollis C.G. Thomson, 1863 (N) (*)

Episernus gentilis (Rosenhauer, 1847) (N, S, Sa)

Episernus granulatus J. Weise, 1887 (N) (*)

Episernus striatellus (C. Brisout de Barneville, 1863) (N)

Ernobius C.G. Thomson, 1859

Ernobius abietinus (Gyllenhal, 1808) (N, S)

Ernobius abietis (Fabricius, 1792) (N, S)

Ernobius angelinii Lohse, 1991 (S) (E)

Ernobius angusticollis (Ratzeburg, 1847) (N)

Ernobius freudei Lohse, 1970 (N)

Ernobius fulvus Johnson, 1975 (Si)

Ernobius juniperi Chobaut, 1899 (Sa)

Ernobius kiesenwetteri Schilsky, 1898 (N, Sa)

Ernobius laticollis Pic, 1927 (N, Si)

Ernobius longicornis (Sturm, 1837) (N, S)

Ernobius lucidus (Mulsant & Rey, 1863) (N?) (*)

Ernobius mollis (Linné, 1758)

Ernobius mollis mollis (Linné, 1758) (N, S, Si)

Ernobius mulsanti Kiesenwetter, 1877

Ernobius mulsanti mulsanti Kiesenwetter, 1877 (N)

Ernobius nigrinus (Sturm, 1837) (N, S)

Ernobius oertzeni Schilsky, 1900 (S)

Ernobius parens (Mulsant & Rey, 1863) (N, S?, Si?, Sa) (*)

Ernobius pini (Sturm, 1837) (N, S, Si, Sa) (*)

Ernobius pruinosis (Mulsant & Rey, 1863) (N)

Ernobius reflexus (Mulsant & Rey, 1863) (N?) (*)

Ernobius rufus (Illiger, 1807) (Sa)

Ochina Dejean, 1821

Ochina ferruginea Schilsky, 1899 (S) (*)

Ochina hirsuta Seidlitz, 1889 (N, S, Sa)

Ochina latreillii (Bonelli, 1809) (N, S, Sa)

Ochina ptinoides (Marsham, 1802) (N, S, Si, Sa)

***Xestobium* (*Xestobium*)** Motschulsky, 1845

Xestobium (*Xestobium*) *rufovillosum* (Degeer, 1774) (N, S, Si, Sa)

Xestobium (*Xestobium*) *subincanum* (Reitter, 1878) (S)

***Xestobium* (*Hyperisus*)** Mulsant & Rey, 1863

Xestobium (Hyperisus) declive (Dufour, 1843) (N)
Xestobium (Hyperisus) plumbeum (Illiger, 1801) (N, S) (*)

Stegobium Motschulsky, 1860

Stegobium paniceum (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)

Gastrallus Jacquelin du Val, 1860

Gastrallus corsicus Schilsky, 1898 (N, S, Si) (*)
Gastrallus immarginatus (P.W.J. Müller, 1821) (N, S, Si, Sa)
Gastrallus laevigatus (Olivier, 1790) (N, S, Si, Sa)

Falsogastrallus Pic, 1914

Falsogastrallus unistriatus (Zoufal, 1897) (N)

Oligomerus L. Redtenbacher, 1849

Oligomerus brunneus (Olivier, 1790) (N, S, Si, Sa)
Oligomerus disruptus Baudi, 1873 (Sa)
Oligomerus ptilinoides (Wollaston, 1854) (N, S, Si, Sa)

Anobium Fabricius, 1775

Anobium hederæ Ihssen, 1949 (N, S)
Anobium inexpectatum Lohse, 1954 (N)
Anobium punctatum (Degeer, 1774) (N, S, Si, Sa)

Hemicoelus J.L. Leconte, 1861

Hemicoelus costatus (Aragona, 1830) (N, S, Si, Sa) (*)
Hemicoelus fulvicornis (Sturm, 1837) (N, S, Sa) (*)
Hemicoelus nitidus (Fabricius, 1792) (N, Sa)
Hemicoelus rufipennis (Duftschmid, 1825) (N, S) (*)

Cacotemnus J.L. Leconte, 1861

Cacotemnus rufipes (Fabricius, 1792) (N)
Cacotemnus thomsoni (Kraatz, 1881) (N)

Microbregma Seidlitz, 1889

Microbregma emarginatum (Duftschmid, 1825)
Microbregma emarginatum emarginatum (Duftschmid, 1825) (N, S)

Priobium Motschulsky, 1845

Priobium carpini (Herbst, 1793) (N)

Hadrobregmus C.G. Thomson, 1859

Hadrobregmus denticollis (Creutzer, 1796) (N, S)

Hadrobregmus pertinax (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)

Nicobium J.L. Leconte, 1861

Nicobium castaneum (Olivier, 1790) (N, S, Si, Sa)

Nicobium hirtum (Illiger, 1807) (N, S, Si, Sa) (*)

Priartobium Reitter, 1901

Priartobium leonhardi Roubal, 1922 (Sa) (E)

Ptilinus Geoffroy, 1762

Ptilinus fuscus Geoffroy, 1785 (N, S, Si, Sa)

Ptilinus pectinicornis (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)

Xyletinus (Pseudocalypterus) Gottwald, 1977

Xyletinus (Pseudocalypterus) pectiniferus Fairmaire, 1879 (S)

Xyletinus (Calypterus) Mulsant & Godart, 1859

Xyletinus (Calypterus) bucephalus (Illiger, 1807)

Xyletinus (Calypterus) bucephalus bucephalus (Illiger, 1807) (S, Si, Sa)

Xyletinus (Xyletinus) Latreille, 1809

Xyletinus (Xyletinus) ater (Creutzer, 1796) (N, S)

Xyletinus (Xyletinus) fibyensis O. Lundblad, 1949 (N)

Xyletinus (Xyletinus) flavipes Laporte de Castelnau, 1840 (N, S, Si)

Xyletinus (Xyletinus) laticollis (Duftschmid, 1825) (N, S)

Xyletinus (Xyletinus) longitarsis Jansson, 1942

Xyletinus (Xyletinus) longitarsis longitarsis Jansson, 1942 (S)

Xyletinus (Xyletinus) moraviensis Gottwald, 1977 (N?) (*)

Xyletinus (Xyletinus) pectinatus (Fabricius, 1792) (*)

Xyletinus (Xyletinus) pectinatus pectinatus (Fabricius, 1792) (N, S, Si, Sa)

Xyletinus (Xyletinus) ruficollis Gebler, 1833 (N)

Xyletinus (Xyletinus) sareptanus Kiesenwetter, 1877 (S?) (*)

Xyletinus (Xyletinus) subrotundatus Lareynie, 1852 (N, S, Si)

Metholcus Jacquelin du Val, 1860

Metholcus cylindricus (Germar, 1817) (N, S, Si, Sa)

Lasioderma Stephens, 1835

Lasioderma baudii Schilsky, 1899 (S, Si, Sa)
Lasioderma bubalus (Fairmaire, 1860) (N, S, Si, Sa)
Lasioderma haemorrhoidale (Illiger, 1807) (N, S, Si, Sa) (*)
Lasioderma kiesenwetteri Schilsky, 1899 (S, Si, Sa)
Lasioderma laeve (Illiger, 1807) (N?, S?, Si?, Sa?) (*)
Lasioderma melanocephalum Schilsky, 1899 (S, Si, Sa)
Lasioderma obscurum (Solsky, 1867) (S, Si)
Lasioderma redtenbacheri (Bach, 1852) (N, S, Si, Sa)
Lasioderma semirufulum Reitter, 1897 (Sa)
Lasioderma serricorne (Fabricius, 1792) (N, S, Si, Sa) (*)
Lasioderma striola (Rey, 1892) (Si) (E)
Lasioderma torquatum Chevrolat, 1859 (Si?, Sa?) (*)

Mesocoelopus Jacquelin du Val, 1860

Mesocoelopus collaris Mulsant & Rey, 1864 (S, Si, Sa)
Mesocoelopus niger (P.W.J. Müller, 1821) (N, S, Si, Sa)

Mesothus Mulsant & Rey, 1864

Mesothus ferrugineus (Mulsant & Rey, 1860) (N, S, Si, Sa)

Tricorynus Guérin-Méneville, 1850

Tricorynus tabaci (Guérin-Méneville, 1850) (N?, S?) (*)

Stagetus Wollaston, 1861

Stagetus andalusiacus (Aubé, 1861)
Stagetus andalusiacus cribricollis (Aubé, 1861) (S, Si)
Stagetus byrrhoides (Mulsant & Rey, 1861) (S, Si)
Stagetus elongatus (Mulsant & Rey, 1861) (N, Si, Sa)
Stagetus italicus (Reitter, 1885) (N, S)
Stagetus pilula (Aubé, 1861) (N, S, Si, Sa?)
Stagetus sardous (Reitter, 1915) (Sa) (E)

***Calymmaderus* (*Calymmaderus*)** Solier, 1849

Calymmaderus (*Calymmaderus*) *solidus* (Kiesenwetter, 1877) (N?) (*)

Dorcatoma Herbst, 1792

Dorcatoma chrysomelina Sturm, 1837 (N, S, Si, Sa) (*)
Dorcatoma dresdensis Herbst, 1792 (N, S)
Dorcatoma flavicornis (Fabricius, 1792) (N, S, Si)

Dorcatoma lanuginosa Baudi, 1873 (N?, S?, Sa) (E) (*)
Dorcatoma punctulata Mulsant & Rey, 1864 (S)
Dorcatoma setosella Mulsant & Rey, 1864
Dorcatoma setosella setosella Mulsant & Rey, 1864 (N, S, Si)
Dorcatoma substriata Hummel, 1829 (N, S)

Mizodorcatoma Hayashi, 1955

Mizodorcatoma dommeri (Rosenhauer, 1856) (N, S, Si, Sa)

Anitya C.G. Thomson, 1863

Anitya rubens (Hoffmann, 1803) (N)

Caenocara C.G. Thomson, 1859

Caenocara affine (Sturm, 1837) (N, S)
Caenocara bovistae (Hoffmann, 1803) (N)
Caenocara subglobosum (Mulsant & Rey, 1864) (N, S)

Note

Ptinomorphus magnificus: Specie nota di parte dei territori dell'ex U.R.S.S., di Grecia e Turchia (cfr. Logvinovskij, 1985); segnalata con dubbio del Lazio (cfr. Luigioni, 1929).
Grynobius planus: Specie interpretata secondo Loshe (1969) ed Español (1992); Logvinovskij (1985) considera *Grynobius excavatus* (Kugelann, 1792) specie valida.
Dryophilus siculus: Secondo alcuni autori probabile sinonimo di *Dryophilus pusillus* (cfr. Porta, 1929).
Episernus: Due nuove specie in litteris sono state segnalate dell'Alto Adige.
Episernus angulicollis: In Italia attualmente segnalata solo dall'Alto Adige; secondo Lohse (1969) le popolazioni del Tirolo appartengono a una spp. inedita.
Episernus granulatus: Per stabilire lo status della var. *pallidior*, descritta delle Alpi, sarà necessario esaminare la serie tipica.
Ernobius lucidus: Generiche e vecchie segnalazioni per "Italia" (cfr. Luigioni, 1929; Porta, 1929); la specie è presente anche in località francesi presso il confine italiano (cfr. Johnson, 1975).
Ernobius parens: In passato ritenuta ab. di *Ernobius pini*.
Ernobius pini: Specie scarsa nell'area mediterranea (cfr. Johnson, 1975); in passato è stata confusa con *Ernobius parens* cui probabilmente si riferiscono parte delle segnalazioni per il nostro Paese. Esistono dei problemi nomenclatoriali (cfr. Español, 1992:188).
Ernobius reflexus: Specie Ovest-mediterranea (Johnson, 1975; Español, 1992) segnalata genericamente delle Alpi Marittime (cfr. Luigioni, 1929).
Ochina ferruginea: In Italia segnalata solo del Lazio come *Ochina ferruginea* var. *italica* e O. f. var. *pallidicolor* (cfr. Luigioni, 1929; Porta, 1929) ma l'attribuzione specifica di tali taxa non è certa.
Xestobium (Hyperisus) plumbeum: Esistono dei problemi nomenclatoriali (cfr. Español, 1992:188).
Gastrallus corsicus: Specie in passato ritenuta ab. di *Gastrallus immarginatus*; è probabile che

parte delle segnalazioni per quest'ultima specie si riferiscano in realtà a *G. corsicus*.

Hemicoelus costatus: Secondo alcuni autori la specie è stata descritta da Gené nel 1830 (cfr. Logvinovskij, 1985).

Hemicoelus fulvicornis: Esistono dei problemi nomenclatoriali (cfr. Español, 1992:188).

Hemicoelus rufipennis: Le segnalazioni per l'Italia si riferiscono a *Hemicoelus fulvicornis* ab. *rufipennis*.

Nicobium hirtum: Taxon di incerto valore sistematico forse sinonimo di *Nicobium castaneum* (cfr. Español, 1992: 103) del quale era considerato una varietà.

Priartobium: La sottofamiglia cui appartiene questo genere è discussa (cfr. Logvinovskij, 1985).

Xyletinus (Pseudocalypterus): Una presunta nuova specie, "*Xyletinus* ? n.sp.", è stata recentemente segnalata della Sicilia.

Xyletinus (Xyletinus) moraviensis: Specie molto probabilmente estranea alla fauna italiana, segnalata dell'Alto-Adige.

Xyletinus (Xyletinus) pectinatus: Per stabilire lo status della var. *gagliardii*, descritta di Toscana, sarà necessario esaminare la serie tipica.

Xyletinus (Xyletinus) sareptanus: Specie ampiamente distribuita nei territori dell'ex U.R.S.S. (cfr. Logvinovskij, 1985) e segnalata con dubbio del Lazio (cfr. Luigioni, 1929); in passato è stata confusa con *Xyletinus (Xyletinus) balcanicus* Gottwald, 1977.

Lasioderma haemorrhoidale: Secondo alcuni autori bicolor e unicolor sono specie valide (cfr. Porta, 1929).

Lasioderma laeve: Presenza dubbia (cfr. Porta, 1929); la specie è stata in passato male interpretata (cfr. Español, 1992:132).

Lasioderma serricorne: Specie cosmopolita probabilmente di origine neotropica.

Lasioderma torquatum: Specie descritta dell'Algeria; presenza dubbia (cfr. Luigioni, 1929; Porta, 1929).

Tricorynus tabaci: Specie originaria dell'America centrale e dei Caraibi importata in diversi stati europei con il tabacco (cfr. Lucht, 1987); segnalata genericamente di "Italia" alla fine del secolo scorso.

Stagetus: "*Theca venusta* Reitt." segnalata di Calabria e Sicilia (cfr. Luigioni 1929; Porta, 1929) è quasi sicuramente un nomen nudum.

Calymmaderus (Calymmaderus) solidus: Specie antropofila di origine americana (cfr. Español, 1992). In Italia segnalata solo dell'Alto Adige (cfr. Luigioni, 1929) forse sulla base di una vecchia segnalazione per il Tirolo; quest'ultima non è stata più confermata (cfr. Lohse, 1969; Lucht, 1987; Español, 1992).

Dorcatoma: L'ortografia originale *Dorkatoma* Herbst, 1792 è stata emendata in *Dorcatoma* da Paykull, 1798; una proposta di conservazione di *Dorcatoma* Herbst, 1792 è stata sottoposta alla Commissione Internazionale per la Nomenclatura Zoologica.

Dorcatoma chrysomelina: Esistono dei problemi nomenclatoriali (cfr. Español, 1992:188).

Dorcatoma lanuginosa: Specie endemica; le indicazioni per il Nord Africa si riferiscono ad altre specie.

Anthicidae

Notoxus Geoffroy, 1762

Notoxus brachycerus (Faldermann, 1837) (N, S, Si, Sa)

Notoxus cavifrons La Ferté-Sénéctère, 1848
 Notoxus cavifrons appendicinus Desbrochers, 1875 (N, S, Si, Sa)
Notoxus lobicornis Reiche, 1864 (Si)
Notoxus lonai Bucciarelli, 1973 (N, S, Si) (*)
Notoxus miles W.L.E. Schmidt, 1842 (*)
 Notoxus miles italicus Bucciarelli, 1978 (S)
Notoxus monoceros (Linné, 1761)
 Notoxus monoceros monocerus (Linné, 1761) (N, S, Sa?)
Notoxus siculus La Ferté-Sénéctère, 1848 (Si) (E)
Notoxus trifasciatus Rossi, 1792 (N, S, Si, Sa)

Mecynotarsus La Ferté-Sénéctère, 1848

Mecynotarsus fausti Seidlitz, 1891 (N, S, Si, Sa)
Mecynotarsus serricornis (Panzer, 1796) (N, S, Si, Sa)

Pseudonotoxus Pic, 1900

Pseudonotoxus testaceus (La Ferté-Sénéctère, 1848) (*)
 Pseudonotoxus testaceus testaceus (La Ferté-Sénéctère, 1848) (Sa)

Endomia Laporte de Castelnau, 1840

Endomia occipitalis (L. Dufour, 1843) (N, S, Si, Sa)
Endomia tenuicollis (Rossi, 1792)
 Endomia tenuicollis tenuicollis (Rossi, 1792) (N, S, Si, Sa)
Endomia unifasciata (Bonelli, 1807)
 Endomia unifasciata unifasciata (Bonelli, 1807) (N, S, Si, Sa)

Amblyderus La Ferté-Sénéctère, 1848

Amblyderus brunneus Pic, 1893 (S, Si) (E) (*)
Amblyderus scabricollis (La Ferté-Sénéctère, 1847) (S, Si, Sa) (*)

Anthicus Paykull, 1798

Anthicus antherinus (Linné, 1761) (N, S, Si, Sa) (*)
Anthicus ater (Panzer, 1796) (N) (*)
Anthicus axillaris W.L.E. Schmidt, 1842 (N, Sa?)
Anthicus biguttatus La Ferté-Sénéctère, 1848 (N?, S, Sa)
Anthicus bimaculatus (Illiger, 1802) (N, Sa?)
Anthicus brunneus La Ferté-Sénéctère, 1842 (N?, S?) (*)
Anthicus brunnipennis Pic, 1896 (Sa) (*)
Anthicus cribripennis Desbrochers, 1875 (S) (*)
Anthicus czernohorskyi Pic, 1912 (N) (*)
Anthicus fenestratus W.L.E. Schmidt, 1842 (N, S, Si, Sa)
Anthicus flavipes (Panzer, 1797) (*)
 Anthicus flavipes flavipes (Panzer, 1797) (N, Si)

Anthicus fumosus Lucas, 1843 (Si, Sa)
Anthicus fuscicornis La Ferté-Sénectère, 1848 (Sa?) (*)
Anthicus genei La Ferté-Sénectère, 1848 (S, Si, Sa)
Anthicus hamicornis Marseul, 1880 (Sa)
Anthicus invreai Koch, 1933 (N, S, Si)
Anthicus laeviceps Baudi, 1877 (N, S, Si, Sa)
Anthicus luteicornis W.L.E. Schmidt, 1842 (N, S, Si)
Anthicus niger (Olivier, 1811) (N, S, Si, Sa)
Anthicus ophthalmicus Rottenberg, 1870 (Si)
Anthicus proximus Marseul, 1879 (S, Sa)
Anthicus quadridecoratus Abeille de Perrin, 1885 (Sa) (*)
Anthicus quadrioculatus La Ferté-Sénectère, 1848 (N, S)
Anthicus rufivestis Marseul, 1879 (Sa)
Anthicus schmidtii Rosenhauer, 1847 (N, S, Sa)
Anthicus sellatus (Panzer, 1797) (N, S)
Anthicus theryi Pic, 1892 (Sa)
Anthicus tristis W.L.E. Schmidt, 1842 (*)
Anthicus tristis tristis W.L.E. Schmidt, 1842 (N, S, Si, Sa)

Hirticomus Pic, 1894

Hirticomus hispidus (Rossi, 1792) (N, S, Si, Sa)
Hirticomus quadriguttatus (Rossi, 1792) (N, S, Si, Sa)

Omonadus Mulsant & Rey, 1866

Omonadus bifasciatus (Rossi, 1792) (N, S, Si, Sa) (*)
Omonadus floralis (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)
Omonadus formicarius (Goeze, 1777) (N, S, Si, Sa)

Cordicomus Pic, 1894

Cordicomus gracilior (Abeille de Perrin, 1885) (S)
Cordicomus gracilis (Panzer, 1797) (N, S)
Cordicomus instabilis (W.L.E. Schmidt, 1842)
Cordicomus instabilis instabilis (W.L.E. Schmidt, 1842) (N, S, Si, Sa)

Cyclodinus Mulsant & Rey, 1866

Cyclodinus blandulus (Baudi, 1877)
Cyclodinus blandulus blandulus (Baudi, 1877) (Si, Sa)
Cyclodinus bremeri (La Ferté-Sénectère, 1842)
Cyclodinus bremeri bremeri (La Ferté-Sénectère, 1842) (N, S, Si, Sa)
Cyclodinus brivioi Bucciarelli, 1962 (Sa) (E) (*)
Cyclodinus coniceps (Marseul, 1879) (N, S, Si, Sa) (*)
Cyclodinus constrictus (Curtis, 1838) (N, S, Si, Sa) (*)
Cyclodinus croissandeau (Pic, 1893)
Cyclodinus croissandeau croissandeau (Pic, 1893) (Sa)

Cyclodinus debilis (La Ferté-Sénectère, 1848) (Si) (*)
Cyclodinus humilis (Germar, 1824) (N, S, Si, Sa)
Cyclodinus italicus (Pic, 1901) (S) (E) (*)
Cyclodinus larvipennis (Marseul, 1879) (N, S, Si, Sa?)
Cyclodinus longipilis (C. Brisout de Barneville, 1863) (N?, Sa?) (*)
Cyclodinus lucidicollis (Marseul, 1879) (Sa)
Cyclodinus minutus (La Ferté-Sénectère, 1842)
 Cyclodinus minutus minutus (La Ferté-Sénectère, 1842) (N, S, Si, Sa)
Cyclodinus salinus (Crotch, 1866)
 Cyclodinus salinus carthageniensis (Pic, 1893) (Sa)
Cyclodinus ustulatus (La Ferté-Sénectère, 1848) (N?, Si?, Sa?) (*)

Stricticomus Pic, 1894

Stricticomus longicollis (W.L.E. Schmidt, 1842) (N, S, Si, Sa)
Stricticomus tobias (Marseul, 1879) (N, S, Si, Sa) (*)
Stricticomus transversalis (A. Villa & G.B. Villa, 1833)
 Stricticomus transversalis transversalis (A. Villa & G.B. Villa, 1833) (N, S, Si, Sa)

Leptaleus La Ferté-Sénectère, 1848

Leptaleus rodriguesi (Latreille, 1802) (N, S, Si, Sa)

Formicomus La Ferté-Sénectère, 1848

Formicomus canaliculatus La Ferté-Sénectère, 1848 (S?, Si) (*)
Formicomus ionicus La Ferté-Sénectère, 1848 (Si?) (*)
Formicomus latro La Ferté-Sénectère, 1848
 Formicomus latro latro La Ferté-Sénectère, 1848 (Si, Sa)
Formicomus pedestris (Rossi, 1790) (N, S, Si, Sa)

Stenidius La Ferté-Sénectère, 1848

Stenidius vittatus (Lucas, 1843) (*)
 Stenidius vittatus vittatus (Lucas, 1843) (Si)

Clavicomus Pic, 1894

Clavicomus dichrous (La Ferté-Sénectère, 1848) (S, Si, Sa)
Clavicomus doderoi (Pic, 1902) (Sa) (E)
Clavicomus longiceps (La Ferté-Sénectère, 1848) (Si)
Clavicomus paganettii (Pic, 1909) (S, Si) (E)
Clavicomus ragusae (Pic, 1898) (Si) (E)
Clavicomus versicolor (Kiesenwetter, 1865) (S?, Si?) (*)

Tenuicomus Pic, 1894

Tenuicomus ocreatus (La Ferté-Sénectère, 1847) (*)

Tenuicomus ocreatus ocreatus (La Ferté-Sénectère, 1847) (Si?)
Tenuicomus olivaceus (La Ferté-Sénectère, 1848) (Si) (*)
Tenuicomus pumilus (Baudi, 1877) (Si)
Tenuicomus subsericeus (Pic, 1898) (Si) (E)
Tenuicomus velox (La Ferté-Sénectère, 1848) (*)
Tenuicomus velox bucciarellii Nardi, 1995 (N)
Tenuicomus velox velox (La Ferté-Sénectère, 1848) (S, Si)

***Microhoria (Immicrohoria)* Pic, 1894**

Microhoria (Immicrohoria) caprai Bucciarelli, 1977 (N) (E) (*)
Microhoria (Immicrohoria) chobauti (Pic, 1892) (Si) (*)
Microhoria (Immicrohoria) dejeanii (La Ferté-Sénectère, 1848) (*)
Microhoria (Immicrohoria) dejeanii dejeanii (La Ferté-Sénectère, 1848) (S, Sa)
Microhoria (Immicrohoria) fasciata (Chevrolat, 1838) (*)
Microhoria (Immicrohoria) fasciata fasciata (Chevrolat, 1838) (N, S, Si?, Sa?)
Microhoria (Immicrohoria) helenae (Koch, 1933) (S) (E) (*)
Microhoria (Immicrohoria) leonhardi (Krekich-Strassoldo, 1913) (S) (E) (*)
Microhoria (Immicrohoria) mylabrina (Gené, 1839) (Sa) (*)
Microhoria (Immicrohoria) plumbea (La Ferté-Sénectère, 1842)
Microhoria (Immicrohoria) plumbea plumbea (La Ferté-Sénectère, 1842) (N, S)
Microhoria (Immicrohoria) venusta (A. Villa & G.B. Villa, 1833) (N, S?) (*)
Microhoria (Immicrohoria) zonata (La Ferté-Sénectère, 1848) (Sa) (E)

***Microhoria (Platyhoria)* Bonadona, 1952**

Microhoria (Platyhoria) caliginosa (La Ferté-Sénectère, 1848) (*)
Microhoria (Platyhoria) caliginosa caliginosa (La Ferté-Sénectère, 1848) (N, Si?)
Microhoria (Platyhoria) funeraria (Marseul, 1879) (N) (*)
Microhoria (Platyhoria) oertzeni (Pic, 1901) (*)
Microhoria (Platyhoria) oertzeni sricula Bucciarelli, 1978 (Si)
Microhoria (Platyhoria) raveli (Pic, 1899) (S)
Microhoria (Platyhoria) terminata (W.L.E. Schmidt, 1842) (N, S, Si, Sa) (*)
Microhoria (Platyhoria) unicolor (W.L.E. Schmidt, 1842) (*)
Microhoria (Platyhoria) unicolor unicolor (W.L.E. Schmidt, 1842) (N?)

***Aulacoderus* La Ferté-Sénectère, 1848**

Aulacoderus funebris (Reitter, 1884) (S?) (*)

***Tomoderus* La Ferté-Sénectère, 1848**

Tomoderus italicus Marseul, 1879 (S, Si) (E)

***Pseudotomoderus* Pic, 1892**

Pseudotomoderus compressicollis (Motschulsky, 1839)
Pseudotomoderus compressicollis compressicollis (Motschulsky, 1839) (N, S, Si, Sa)

Note

Notoxus lonai: Specie subendemica italiana, presente anche nelle Alpi francesi sud-orientali.

Notoxus miles: La spp. *italicus* è endemica italiana (Marche, Campania, Basilicata, Calabria).

Pseudonotoxus testaceus: L'indicazione per la Basilicata (Bucciarelli, 1980 fig. 48) è quasi sicuramente dovuta ad un refuso di stampa.

Amblyderus brunneus: Presente in S solo in Calabria.

Amblyderus scabricollis: Presente in S solo in Calabria.

Anthicus antherinus: Bonadona (1991) distingue due spp: *Anthicus a. antherinus* e *A. a. syriacae* Pic, 1892; la cui distribuzione in Italia resta da accertare.

Anthicus ater: Solo in Piemonte. Secondo Burakowski et al. (1987) la specie è stata descritta da Thunberg (1787).

Anthicus brunneus: Indicata genericamente di Italia (Uhmann, 1992) solo sulla base di dati di letteratura (Uhmann, in litteris, 1994); una segnalazione per la Sicilia è stata successivamente riferita ad *Anthicus fenestratus*.

Anthicus brunnipennis: Endemismo sardo-còrso; Uhmann (1992) lo considera semplice varietà di *Anthicus genei*.

Anthicus cribripennis: Solo in Toscana e Lazio.

Anthicus czernohorskyi: Specie probabilmente introdotta dall'Asia, descritta di Trieste e mai più ripresa in Italia.

Anthicus flavipes: L'indicazione per la Sicilia è forse dovuta a un errore di etichettatura (Fancello, com. pers.).

Anthicus fuscicornis: Una recente segnalazione per "Italien" (Uhmann, 1992) è basata su materiale di Sardegna, senza altri dati (Uhmann, in litteris, 1994), che necessita di verifica.

Anthicus quadridecoratus: Endemita sardo-corso; vecchie segnalazioni per la Sicilia e per Hyères (France, Var) non sono state più confermate.

Anthicus tristis: Uhmann (1992) considera *discrepans* sottospecie valida. Per i problemi nomenclatoriali relativi ad *Anthicus elegans* Steven, 1806 vedi Bonadona (1991).

Omonadus bifasciatus: Secondo alcuni autori questa specie dovrebbe chiamarsi, a causa di una omonimia, *Omonadus kolenatii* (Kolenati, 1846).

Cyclodinus brivioi: Secondo Bucciarelli (1980) potrebbe anche essere una ssp. di *Cyclodinus coniceps* (Marseul, 1879) o di *C. schatzmayri* (Koch, 1931).

Cyclodinus coniceps: Uhmann (1992), diversamente da Bonadona (1991), riporta tra i sinonimi anche *Cyclodinus schatzmayri* (Koch, 1931) e *C. caroli* (Pic, 1915). In Italia sarebbe presente la ssp. *lagunarum* (Krekich-Strassoldo, 1919) (cfr. Bucciarelli, 1980).

Cyclodinus constrictus: Bonadona (1991) distingue quattro ssp. i cui areali si sovrappongono in alcune zone: *constrictus* (Curtis, 1838), *lameyi* (Marseul, 1889), *subconvexus* (Rey, 1892) e *marinus* (Krekich-Strassoldo, 1919) (= *ruffoi* Bucciarelli, 1959). In Italia sono presenti individui attribuibili a quest'ultima ssp., a *lameyi* e con caratteristiche intermedie tra *subconvexus* e *marinus*.

Cyclodinus debilis: In Italia nota solo per l'Isola di Pantelleria.

Cyclodinus italicus: Specie nota di Puglia, Basilicata e Calabria; le segnalazioni per la Dalmazia (cfr. Pic, 1934) si riferiscono a *Cyclodinus moltonii* Bucciarelli, 1961.

Cyclodinus longipilis: Presenza basata solo su vecchie segnalazioni (cfr. Bucciarelli, 1980; Bonadona, 1991).

Cyclodinus ustulatus: Presenza verosimile ma basata solo su dati di letteratura.

Stricticomus tobias: Specie attualmente cosmopolita di probabile origine medio-orientale,

raccolta per la prima volta in Italia nel 1944.

Formicomus canaliculatus: In S solo un vecchio esemplare cartellinato "Rom." (Uhmman, 1985).

Formicomus ionicus: Recente segnalazione basata su materiale senza precisa località di una vecchia collezione.

Stenidius vittatus: Antica segnalazione verosimile ma mai confermata.

Clavicomus versicolor: Presenza molto dubbia (cfr. Pic, 1934; Uhmman, 1992).

Tenuicomus ocreatus: Antiche segnalazioni non più confermate.

Tenuicomus olivaceus: Specie recentemente confermata per la fauna italiana (Uhmman, in litteris, 1994).

Tenuicomus velox: La ssp. bucciarellii è endemica della laguna veneta, la sottospecie nominale è presente anche a Malta.

Microhoria (Immicrohoria) caprai: Attualmente nota solo della Liguria.

Microhoria (Immicrohoria) chobauti: In Italia presente solo nell'isola di Lampedusa.

Microhoria (Immicrohoria) dejeanii: Presente in S solo in Toscana e nell'Isola d'Elba.

Microhoria (Immicrohoria) fasciata: Circa la presenza in Piemonte delle ssp. helvetica (Krekich-Strassoldo, 1929) e opaca (Rey, 1892) vedi Bucciarelli (1980) e Bonadona (1991).

Microhoria (Immicrohoria) helenae: Specie endemica del Gargano.

Microhoria (Immicrohoria) leonhardi: Specie endemica del Gargano.

Microhoria (Immicrohoria) mylabrina: Endemita sardo-corso.

Microhoria (Immicrohoria) venusta: In S solo una vecchia segnalazione per il Gran Sasso.

Microhoria (Platyhoria) caliginosa: Specie segnalata in N solo per la Venezia Giulia; l'indicazione per la Si (Uhmman, 1985) è meritevole di conferma. Per i problemi relativi alla ssp. sexualis (Koch, 1933) vedi Bucciarelli (1980: 215).

Microhoria (Platyhoria) funeraria: Attribuzione sottogenerica incerta; specie nuova per la fauna italiana: Lombardia (BG), Predore, Lago d'Iseo, 22.-24.V.1961, leg. Freude, det. Bonadona, 1 es., Staatssammlung München (Uhmman, in litteris, 1994).

Microhoria (Platyhoria) oertzeni: La ssp. sicula è endemica italiana.

Microhoria (Platyhoria) terminata: La distribuzione dovrà essere rivista poiché Bonadona (1991) considera specie valida *Microhoria (Platyhoria) ruficollis* (W.L.E. Schmidt, 1842), della Provenza, in passato ritenuta sinonimo di M. (P.) terminata.

Microhoria (Platyhoria) unicolor: La specie è intesa nel senso di Bucciarelli (1980); Bonadona (1991) sembra essere di opinione diversa. Solo vecchie segnalazioni (Liguria e Alpi Marittime) e una recente di vecchi esemplari cartellinati "Italia".

Aulacoderus funebris: Una recente segnalazione per "Italy: Lesina" probabilmente si riferisce all'Isola di Lesina in Dalmazia; esiste inoltre una vecchia segnalazione non più confermata per la Sicilia per l'enigmatico *Aulacoderus friwaldskyi* (La Ferté-Sénéctère, 1848) di cui A. funebris è probabilmente sinonimo.

Anthribidae

Phaenotherion Frivaldszky, 1878

Phaenotherion fasciculatum Reitter, 1891 (N, S)

Tropideres Schönherr, 1826

Tropideres albirostris (Herbst, 1783) (N)
Tropideres dorsalis (Thunberg, 1796) (N)

Ulorhinus Sharp, 1891

Ulorhinus bilineatus (Germar, 1818) (N, S)

Noxius Jordan, 1936

Noxius curtirostris (Mulsant, 1861) (N, S, Si, Sa)

Allandrus Leconte, 1876

Allandrus undulatus (Panzer, 1795) (N, Si)

Enedreutes Schönherr, 1839

Enedreutes hilaris Fåhræus, 1839 (N, S, Si)
Enedreutes sepicola (Fabricius, 1792) (N, S)

Phaeochrotes Pascoe, 1860

Phaeochrotes cinctus (Paykull, 1800) (N)

Platyrhinus Clairville & Schellenberg, 1798

Platyrhinus resinosus (Scopoli, 1763) (N, S, Si, Sa)

Rhaphitropis Reitter, 1916

Rhaphitropis marchicus (Herbst, 1797) (N, S)
Rhaphitropis oxyacanthae (C. Brisout, 1863) (N, S)

Dissoleucas Jordan, 1925

Dissoleucas niveirostris (Fabricius, 1798) (N, S, Si, Sa)

Anthribus Fabricius, 1792

Anthribus albinus (Linné, 1758) (N, S, Sa)

Pseudeuparius Jordan, 1914

Pseudeuparius centromaculatus (Gyllenhal, 1833) (S)

Opanthribus Schilsky, 1907

Opanthribus tessellatus (Boheman, 1829) (N, Sa?)

Brachytarsus Schönherr, 1826

- Brachytarsus areolatus* Boheman, 1845 (Si)
- Brachytarsus fasciatus* (Forster, 1771) (N, S, Si, Sa)
- Brachytarsus nebulosus* (Forster, 1771) (N, S, Si, Sa)
- Brachytarsus scapularis* (Gebler, 1833) (Si)

Araecerus Schönherr, 1826

- Araecerus fasciculatus* (De Geer, 1775) (N, S)

Choragus Kirby, 1818

- Choragus sheppardi* Kirby, 1818 (N, S, Sa)

Aphodiidae

Psammoporus Thomson, 1863

- Psammoporus sabuleti* (Panzer, 1797) (N)

Aphodius (Acanthobodilus) Dellacasa, 1983

- Aphodius (Acanthobodilus) immundus* Creutzer, 1799 (N, S, Si, Sa)

Aphodius (Acrossus) Mulsant, 1842

- Aphodius (Acrossus) depressus* (Kugelann, 1792) (N, S)
- Aphodius (Acrossus) laticollis* Baudi, 1870 (N, S)
- Aphodius (Acrossus) luridus* (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa?)
- Aphodius (Acrossus) rufipes* (Linné, 1758) (N, S, Sa?)
- Aphodius (Acrossus) sculus* Harold, 1862 (N)
- Aphodius (Acrossus) sculus sculus* Harold, 1862 (Si) (E)
- Aphodius (Acrossus) sculus buturensis* Dellacasa, 1983 (S) (E)

Aphodius (Agoliinus) A. Schmidt, 1913

- Aphodius (Agoliinus) piceus* Gyllenhal, 1808 (N)
- Aphodius (Agoliinus) ragusae* Reitter, 1892 (S, Si) (E)
- Aphodius (Agoliinus) satyrus* Reitter, 1892 (N, S)

Aphodius (Agolius) Mulsant & Rey, 1869

- Aphodius (Agolius) abdominalis* Bonelli, 1812
- Aphodius (Agolius) abdominalis abdominalis* Bonelli, 1812 (N)
- Aphodius (Agolius) abdominalis emilianus* Dellacasa, 1983 (N) (E)

Aphodius (Agrilinus) Mulsant & Rey, 1869

- Aphodius (Agrilinus) ater* (Degeer, 1774) (N)
- Aphodius (Agrilinus) constans* Duftschmid, 1805 (N, S, Si, Sa)
- Aphodius (Agrilinus) convexus* Erichson, 1848 (N, S, Si)
- Aphodius (Agrilinus) ibericus* Harold, 1874 (S, Si)
- Aphodius (Agrilinus) nemoralis* Erichson, 1848 (N?) (*)
- Aphodius (Agrilinus) rufus* (Moll, 1782) (N, S, Si, Sa?)
- Aphodius (Agrilinus) sordidus* (Fabricius, 1775) (N)

Aphodius (Alocoderus) A. Schmidt, 1913

- Aphodius (Alocoderus) hydrochaeris* (Fabricius, 1798) (S, Si, Sa)

Aphodius (Amidorus) (Mulsant & Rey, 1869)

- Aphodius (Amidorus) cribrarius* Brullé, 1832 (N?, Si?) (*)
- Aphodius (Amidorus) obscurus* (Fabricius, 1792)
 - Aphodius (Amidorus) obscurus obscurus* (Fabricius, 1792) (N, S)
 - Aphodius (Amidorus) obscurus latinus* Dellacasa, 1983 (S) (E)

Aphodius (Ammoecius) (Mulsant, 1842)

- Aphodius (Ammoecius) brevis* Erichson, 1848 (N, S)
- Aphodius (Ammoecius) elevatus* (Olivier, 1789) (N)
- Aphodius (Ammoecius) rugifrons* Aubé, 1850 (Si, Sa)

Aphodius (Anomius) (Mulsant & Rey, 1869)

- Aphodius (Anomius) castaneus* Illiger, 1803 (Si, Sa)
- Aphodius (Anomius) crovettii* Dellacasa, 1983 (Sa) (E) (*)

Aphodius (Aphodius) Illiger, 1798

- Aphodius (Aphodius) coniugatus* (Panzer, 1795) (S)
- Aphodius (Aphodius) fimetarius* (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)
- Aphodius (Aphodius) foetens* (Fabricius, 1787) (N)
- Aphodius (Aphodius) foetidus* (Herbst, 1783)
 - Aphodius (Aphodius) foetidus foetidus* (Herbst, 1783) (N, S, Si, Sa)

Aphodius (Biralus) Mulsant & Rey, 1869

- Aphodius (Biralus) satellitius* (Herbst, 1789) (N, S, Si, Sa)

Aphodius (Bodilus) Mulsant & Rey, 1869

- Aphodius (Bodilus) beduinus* Reitter, 1892 (S, Si, Sa)

Aphodius (Bodilus) ghardimaouensis Balthasar, 1929 (S, Si, Sa) (*)
Aphodius (Bodilus) ictericus (Laicharting, 1781) (N)
Aphodius (Bodilus) lugens Creutzer, 1799 (S, Si, Sa)

***Aphodius (Calamosternus)* Motschulsky, 1859**

Aphodius (Calamosternus) granarius (Linné, 1767) (N, S, Si, Sa)
Aphodius (Calamosternus) mayeri Pilleri, 1953 (S, Si, Sa)
Aphodius (Calamosternus) hyxos Petrovitz, 1962
Aphodius (Calamosternus) hyxos algericus Mariani & Pittino, 1983 (Si, Sa)

***Aphodius (Chilo thorax)* Motschulsky, 1859**

Aphodius (Chilo thorax) conspurcatus (Linné, 1758) (N, S)
Aphodius (Chilo thorax) distinctus (O.F. Müller, 1776) (N, S, Sa?)
Aphodius (Chilo thorax) lineolatus Illiger, 1803 (N, S, Si, Sa)
Aphodius (Chilo thorax) melanostictus W. Schmidt, 1840 (N?, S?) (*)
Aphodius (Chilo thorax) paykulli Bedel, 1907 (N, S, Si, Sa?)
Aphodius (Chilo thorax) pictus Sturm, 1805 (N?, S?, Si?) (*)
Aphodius (Chilo thorax) sticticus (Panzer, 1798) (N, S, Si, Sa?)

***Aphodius (Colobopterus)* Mulsant, 1842**

Aphodius (Colobopterus) erraticus (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)

***Aphodius (Coprimorphus)* Mulsant, 1842**

Aphodius (Coprimorphus) scrutator (Herbst, 1789) (N, S, Si?)

***Aphodius (Erytus)* Mulsant & Rey, 1869**

Aphodius (Erytus) aequalis A. Schmidt, 1907 (S, Sa)
Aphodius (Erytus) cognatus Fairmaire, 1860 (Si)

***Aphodius (Esymus)* Mulsant & Rey, 1869**

Aphodius (Esymus) merdarius (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa)
Aphodius (Esymus) pusillus (Herbst, 1789)
Aphodius (Esymus) pusillus pusillus (Herbst, 1789) (N, S, Si, Sa)

***Aphodius (Eudolus)* Mulsant & Rey, 1869**

Aphodius (Eudolus) quadriguttatus (Herbst, 1783) (N, S, Si, Sa)

***Aphodius (Euorodalus)* Dellacasa, 1983**

Aphodius (Euorodalus) paracoenosus Balthasar & Hrubant, 1960 (N, S, Si)
Aphodius (Euorodalus) tersus Erichson, 1848 (S, Si, Sa?)

Aphodius (Eupleurus) Mulsant, 1842

Aphodius (Eupleurus) subterraneus (Linné, 1758)

Aphodius (Eupleurus) subterraneus subterraneus (Linné, 1758) (N, S)

Aphodius (Labarrus) Mulsant & Rey, 1869

Aphodius (Labarrus) lividus (Olivier, 1789) (N, S, Si, Sa)

Aphodius (Limarus) Mulsant & Rey, 1869

Aphodius (Limarus) zenkeri Germar, 1813 (N, S, Si)

Aphodius (Liothorax) Motschulsky, 1859

Aphodius (Liothorax) niger Panzer, 1797 (N, S, Si, Sa)

Aphodius (Liothorax) plagiatus (Linné, 1767) (N?, S?) (*)

Aphodius (Loraphodius) Reitter, 1892

Aphodius (Loraphodius) suarius Faldermann, 1836 (N, S, Si, Sa)

Aphodius (Loraspis) Mulsant & Rey, 1869

Aphodius (Loraspis) frater Mulsant & Rey, 1870 (N?) (*)

Aphodius (Mecynodes) Mulsant & Rey, 1869

Aphodius (Mecynodes) striatulus Walzl, 1935 (N, S, Si)

Aphodius (Megatelus) Reitter, 1892

Aphodius (Megatelus) contractus Klug, 1845 (*)

Aphodius (Megatelus) contractus scolytoides Lucas, 1846 (Si)

Aphodius (Melinopterus) Mulsant, 1842

Aphodius (Melinopterus) consputus Creutzer, 1799 (N, S, Si, Sa)

Aphodius (Melinopterus) prodromus (Brahm, 1790) (N, S, Si, Sa)

Aphodius (Melinopterus) punctatosulcatus Sturm, 1805 (N)

Aphodius (Melinopterus) reyi Reitter, 1892 (N, S, Si)

Aphodius (Melinopterus) sphacelatus (Panzer, 1798) (N, S, Si)

Aphodius (Melinopterus) stolzi Reitter, 1906 (N, S)

Aphodius (Melinopterus) tingens Reitter, 1892 (Si, Sa)

Aphodius (Neagolius) W. Koshantschikov, 1912

Aphodius (Neagolius) amblyodon K. Daniel, 1900 (N)
Aphodius (Neagolius) liguricus J. Daniel, 1902 (N)
Aphodius (Neagolius) limbolarius Reitter, 1892
 Aphodius (Neagolius) limbolarius limbolarius Reitter, 1892 (N)
 Aphodius (Neagolius) limbolarius danielorum A. Semenov, 1902 (N)
Aphodius (Neagolius) montanus Erichson, 1848 (N)
Aphodius (Neagolius) penninus (J. Daniel, 1902) (N) (E)
Aphodius (Neagolius) pollicatus Erichson, 1848 (N)
Aphodius (Neagolius) praecox Erichson, 1848 (N?) (*)
Aphodius (Neagolius) schlumbergeri Seidlitz, 1888
 Aphodius (Neagolius) schlumbergeri consobrinus (K. Daniel, 1900) (N, S) (E)
 Aphodius (Neagolius) schlumbergeri samniticus J. Daniel, 1902 (S) (E)

Aphodius (Nialus) Mulsant & Rey, 1869

Aphodius (Nialus) varians Duftschmid, 1805 (N, S, Si, Sa?)

Aphodius (Nimbus) Mulsant & Rey, 1869

Aphodius (Nimbus) affinis Panzer, 1823 (N?) (*)
Aphodius (Nimbus) contaminatus (Herbst, 1783) (N, S, Si, Sa?)
Aphodius (Nimbus) franzinii Pittino, 1978 (Sa) (E)
Aphodius (Nimbus) johnsoni Baraud, 1976 (N, S)
Aphodius (Nimbus) obliteratedus Panzer, 1823 (N, S, Si, Sa?)

Aphodius (Nobius) Mulsant & Rey, 1869

Aphodius (Nobius) serotinus (Panzer, 1799) (N)

Aphodius (Oromus) Mulsant & Rey, 1869

Aphodius (Oromus) alpinus (Scopoli, 1763) (N)

Aphodius (Otophorus) Mulsant, 1842

Aphodius (Otophorus) haemorrhoidalis (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)

Aphodius (Parammoecius) Seidlitz, 1891

Aphodius (Parammoecius) corvinus Erichson, 1848 (N, S)
Aphodius (Parammoecius) gibbus Germar, 1817 (N)
Aphodius (Parammoecius) pyrenaeus (Duval, 1859) (N)

Aphodius (Phalacrothorus) Motschulsky, 1859

Aphodius (Phalacrothorus) biguttatus Germar, 1824 (N, S, Si, Sa?)
Aphodius (Phalacrothorus) quadrimaculatus (Linné, 1761)
 Aphodius (Phalacrothorus) quadrimaculatus quadrimaculatus (Linné, 1761) (N, S, Si,

Sa?)

Aphodius (Plagiogonus) Mulsant, 1842

Aphodius (Plagiogonus) putridus (Fourcroy, 1785) (N, S, Sa?)

Aphodius (Planolinus) Mulsant & Rey, 1869

Aphodius (Planolinus) borealis Gyllenhal, 1827 (N, S, Si, Sa)

Aphodius (Planolinus) uliginosus Hardy, 1847 (N, S)

Aphodius (Pseudacrossus) Reitter, 1892

Aphodius (Pseudacrossus) cribricollis Lucas, 1846 (Si?) (*)

Aphodius (Pseudacrossus) suffertus A. Schmidt, 1922

Aphodius (Pseudacrossus) suffertus ampliatus Reitter, 1892 (Si) (E)

Aphodius (Pseudacrossus) suffertus defiorei (Fiori, 1907) (S) (E)

Aphodius (Pseudacrossus) thermicola Sturm, 1800 (N, S)

Aphodius (Sigorus) Mulsant & Rey, 1869

Aphodius (Sigorus) porcus (Fabricius, 1792) (N, S, Si, Sa)

Aphodius (Subrinus) Mulsant & Rey, 1869

Aphodius (Subrinus) sturmi Harold, 1870 (N, S, Si, Sa)

Aphodius (Subrinus) vitellinus Klug, 1845 (Si, Sa?)

Aphodius (Teuchestes) Mulsant, 1842

Aphodius (Teuchestes) fossor (Linné, 1758) (N, S)

Aphodius (Trichonotulus) Bedel, 1842

Aphodius (Trichonotulus) scrofa (Fabricius, 1787) (N, S, Si, Sa)

Euheptaulacus Dellacasa, 1983

Euheptaulacus carinatus (Germar, 1824) (N)

Euheptaulacus carinatus brutius (Luigioni, 1920) (S) (E)

Euheptaulacus carinatus esuriens Dellacasa, 1983 (Si) (E)

Euheptaulacus porcellus (Frivaldsky, 1879) (N, S)

Euheptaulacus sus (Herbst, 1783) (N) (*)

Euheptaulacus villosus (Gyllenhal, 1806) (N)

Heptaulacus Mulsant, 1842

Heptaulacus rasettii Carpaneto, 1978 (S) (E)

Heptaulacus testudinarius (Fabricius, 1775) (N, S?)

Oxyomus Stephens, 1839

Oxyomus sylvestris (Scopoli, 1763) (N, S, Si, Sa)

Psammodius Fallén, 1807

Psammodius asper (Fabricius, 1775) (N)

Psammodius basalis (Mulsant & Rey, 1871) (N, S, Si, Sa)

Psammodius laevipennis A. Costa, 1844 (N, S, Si)

Psammodius nocturnus Reitter, 1892 (N, S, Si)

Psammodius pierottii Pittino, 1979 (N, S)

Psammodius plicicollis Erichson, 1848 (N, Sa)

Brindalus Landin, 1960

Brindalus porcicollis (Illiger, 1803) (N, S, Si, Sa)

Brindalus rotundipennis (Reitter, 1892) (Sa)

Diastictus Mulsant, 1842

Diastictus vulneratus (Sturm, 1805) (N, S, Si?, Sa?)

Platytomus Mulsant, 1842

Platytomus laevistriatus (Perris, 1870) (S?, Si, Sa)

Platytomus tibialis (Fabricius, 1798) (N, S, Si, Sa)

Pleurophorus Mulsant, 1842

Pleurophorus caesus (Creutzer, 1796) (N, S, Si, Sa)

Pleurophorus maghrebinicus Pittino & Mariani, 1986 (Si)

Pleurophorus mediterranicus Pittino & Mariani, 1986 (N, S, Si, Sa)

Pleurophorus opacus Reitter, 1893 (S, Si)

Pleurophorus pannonicus Petrovitz, 1961 (N)

Rhyssemus Mulsant, 1842

Rhyssemus annaedicatus Pierotti, 1980 (N, S)

Rhyssemus germanus (Linné, 1767) (N, S)

Rhyssemus limbolarius Petrovitz, 1963 (N)

Rhyssemus marqueti Reiche, 1863 (Sa)

Rhyssemus parallelus Reitter, 1893 (S, Si, Sa?)

Rhyssemus plicatus (Germar, 1817) (N, S, Si, Sa)

Rhyssemus sardous Pierotti, 1980 (Sa)

Rhyssemus sulcatus (Olivier, 1789) (N, S, Si, Sa)

Rhyssemus verrucosus Mulsant, 1842 (N, Si?)

***Trichiorhyssemus* Clouet, 1901**

Trichiorhyssemus dalmatinus Petrovitz, 1967 (N, S, Si)

Trichiorhyssemus setulosus (Reitter, 1892) (Si?)

Note

Aphodius (Agrilinus) nemoralis: Molto probabilmente non è presente in Italia.

Aphodius (Amidorus) cribrarius: Molto probabilmente non è presente in Italia.

Aphodius (Anomius) crovettii: Sembrerebbe endemica dell'isola S. Antioco.

Aphodius (Bodilus) ghardimaouensis: La separazione specifica fra *ghardimaouensis* e *ictericus* è critica.

Aphodius (Chilo thorax) melanostictus: Molto probabilmente non è presente in Italia.

Aphodius (Chilo thorax) pictus: Molto probabilmente non è presente in Italia.

Aphodius (Lio thorax) plagiatus: Specie citata più volte in letteratura, forse per confusione con *niger*. Non abbiamo visto esemplari italiani.

Aphodius (Loraspis) frater: Molto probabilmente non è presente in Italia.

Aphodius (Megatelus) contractus: Presente in Si solo a Pantelleria.

Aphodius (Neagolius) praecox: Molto probabilmente non è presente in Italia.

Aphodius (Nimbus) affinis: Specie citata più volte in letteratura, forse per confusione con altre specie. Non abbiamo visto esemplari italiani.

Aphodius (Pseudacrossus) cribricollis: Molto probabilmente non è presente in Italia.

Euheptaulacus sus: Molto probabilmente non è presente in Italia.

Apionidae

***Corimalia* Gozis, 1885**

Corimalia centromaculata (Costa, 1863) (S, Si, Sa)

Corimalia pallida (Olivier, 1807) (N, S, Si, Sa)

Corimalia postica (Gyllenhal, 1838) (S, Si, Sa)

Corimalia tamarisci (Gyllenhal, 1838) (S, Si, Sa)

Corimalia tetrastigma (Aubé, 1863) (S)

***Allomalialia* Alonso-Zarazaga, 1989**

Allomalialia quadrivirgata (Costa, 1863) (N, S, Si, Sa)

***Hypophyes* Reitter, 1916**

Hypophyes pallidulus (Gravenhorst, 1807) (N, S, Si, Sa)

***Nanodiscus* Kiesenwetter, 1864**

Nanodiscus transversus (Aubé, 1850) (N, S, Si, Sa)

Nanophyes Schönherr, 1838

- Nanophyes brevis* Boheman, 1845
 - Nanophyes brevis brevis* Boheman, 1845 (N, S)
 - Nanophyes brevis fallax* Rey, 1893 (N)
- Nanophyes globiformis* Kiesenwetter, 1864 (N, S, Si)
- Nanophyes globulus* (Germar, 1821) (N?, Si)
- Nanophyes marmoratus* (Goeze, 1777) (N, S, Si, Sa)
- Nanophyes rubricus* Rosenhauer, 1856 (N, S, Si, Sa)

Nanomimus Alonso-Zarazaga, 1989

- Nanomimus anulatus* (Aragona, 1830) (N, S, Si)
- Nanomimus hemisphaericus* (Olivier, 1807) (N, S, Si, Sa)

Microon Alonso-Zarazaga, 1989

- Microon sahlbergi* (Sahlberg, 1834) (Sa)

Dieckmanniellus Alonso-Zarazaga, 1989

- Dieckmanniellus gracilis* (Redtenbacher, 1849) (S, Si, Sa)
- Dieckmanniellus helveticus* (Tournier, 1867) (N, S)
- Dieckmanniellus nigratarsis* (Aubé, 1862) (Si, Sa)
- Dieckmanniellus nitidulus* (Gyllenhal, 1838) (N, S, Si, Sa)

Ctenomeropsis Alonso-Zarazaga, 1989

- Ctenomeropsis nigra* (Waltl, 1835) (N, S, Si, Sa)

Omphalapion Schilsky, 1901

- Omphalapion dispar* (Germar, 1817) (N, S, Si)
- Omphalapion hookeri* (Kirby, 1808) (N, S, Si)
- Omphalapion sorbi* (Fabricius, 1792) (N, S)

Ceratapion Schilsky, 1901

- Ceratapion armatum* (Gerstäcker, 1854) (N, S)
- Ceratapion basicorne* (Illiger, 1807) (N, S, Si, Sa)
- Ceratapion beckeri* (Desbrochers, 1875) (S)
- Ceratapion carduorum* (Kirby, 1808) (N, S, Si, Sa)
- Ceratapion curtii* (Wagner, 1920) (Si) (E)
- Ceratapion damryi* (Desbrochers, 1894) (N, S, Si, Sa)
- Ceratapion dalmatinum* (Györfy, 1923) (N)
- Ceratapion fallaciosum* (Desbrochers, 1892) (S)
- Ceratapion gibbirostre* (Gyllenhal, 1813) (N, S, Si, Sa)
- Ceratapion onopordi* (Kirby, 1808) (N, S, Si, Sa)

Ceratapion orientale (Gerstäcker, 1854) (N)
Ceratapion penetrans (Germar, 1817) (N, S, Si)
Ceratapion robusticorne (Desbrochers, 1866) (S, Si)
Ceratapion scalptum (Mulsant & Rey, 1858) (N, S, Si, Sa)

Diplapion Reitter, 1916

Diplapion confluens (Kirby, 1808) (N, S, Si, Sa)
Diplapion detritum (Mulsant & Rey, 1858) (N, S, Si)
Diplapion rumaniacum (Wagner, 1910) (N)
Diplapion stolidum (Germar, 1817) (N, S, Si, Sa)

Acentrotypus Alonso-Zarazaga, 1990

Acentrotypus brunnipes (Boheman, 1839) (S)

Aspidapion Schilsky, 1906

Aspidapion aeneum (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa)
Aspidapion caprai Giusto, 1993 (S) (E)
Aspidapion radiolus (Marsham, 1802) (N, S, Si, Sa)
Aspidapion soror (Rey, 1895) (N, S, Si, Sa)
Aspidapion validum (Germar, 1817) (N)

Melanapion Wagner, 1930

Melanapion minimum (Herbst, 1797) (N, S, Si, Sa)

Squamapion Bokor, 1923

Squamapion atomarium (Kirby, 1808) (N, S, Sa)
Squamapion cineraceum (Wencker, 1864) (N, S, Si)
Squamapion consors (Desbrochers, 1874) (Si, Sa)
Squamapion elongatum (Germar, 1817) (N, S, Si?)
Squamapion flavimanum (Gyllenhal, 1833) (N, S, Si, Sa)
Squamapion leucophaeatum (Wencker, 1864) (N, S, Si)
Squamapion minutissimum (Rosenhauer, 1856) (N, S)
Squamapion oblivium (Schilsky, 1902) (N)
Squamapion samarense (Faust, 1891) (N)
Squamapion venustulum (Wencker, 1864) (N, S)
Squamapion vicinum (Kirby, 1808) (N, S, Si)

Kalcapion Schilsky, 1906

Kalcapion pallipes (Kirby, 1808) (N)
Kalcapion semivittatum (Gyllenhal, 1833) (N, S, Si, Sa)

Taeniapion Schilsky, 1906

Taeniapion distinctirostre (Desbrochers, 1888) (Sa)
Taeniapion rufescens (Gyllenhal, 1833) (N, S, Si, Sa)
Taeniapion rufulum (Wencker, 1864) (S, Si)
Taeniapion urticarium (Herbst, 1784) (N, S, Si, Sa?)

Metapion Schilsky, 1906

Metapion candidum (Wencker, 1864) (N, Si?)

Pseudapion Schilsky, 1906

Pseudapion fulvirostre (Gyllenhal, 1833) (N, S, Si, Sa)
Pseudapion moschatae (Hoffmann, 1938) (N)
Pseudapion rufirostre (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa)

Malvapion Hoffmann, 1958

Malvapion malvae (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa)

Rhopalapion Schilsky, 1906

Rhopalapion longirostre (Olivier, 1807) (N, S)

Trichopterapion Wagner, 1926

Trichopterapion holosericeum (Gyllenhal, 1833) (N, S, Si)

Ixapion Roudier & Tempère, 1973

Ixapion variegatum (Wencker, 1864) (N)

Lepidapion Schilsky, 1906

Lepidapion argentatum (Gerstäcker, 1906) (S, Si, Sa)

Exapion Bedel, 1887

Exapion compactum (Desbrochers, 1888)
 Exapion compactum compactum (Desbrochers, 1888) (N)
 Exapion compactum circovichii (Schatzmayer, 1921) (N)
 Exapion compactum hilfi (Wagner, 1812) (N)
Exapion difficile (Herbst, 1797) (N, S)
Exapion elongatulum (Desbrochers, 1891) (N, S)
Exapion formaneki (Wagner, 1929) (N, S)
Exapion fulvum (Desbrochers, 1894) (Sa)
Exapion fuscirostre (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa)
Exapion inexpertum (Wagner, 1906) (N)

Exapion liguricum A. Solari & F. Solari, 1905 (N, S)
Exapion schatzmayri (Wagner, 1913) (N)
Exapion subparallelum (Desbrochers, 1888) (N, S, Si, Sa)
Exapion ulicis (Forster, 1771) (N, S)

Pseudoprotapion Ehret, 1990

Pseudoprotapion astragali (Paykull, 1800) (N, S, Si, Sa)
Pseudoprotapion elegantulum (Germar, 1818) (N, S, Si)
Pseudoprotapion ergenense (Becker, 1864) (S)

Protapion Schilsky, 1908

Protapion angusticolle (Gyllenhal, 1833) (N, S, Si, Sa)
Protapion apricans (Herbst, 1797) (N, S, Si, Sa)
Protapion assimile (Kirby, 1808) (N, S, Si, Sa)
Protapion burgodionum (Schubert, 1957) (N)
Protapion dentipes (Gerstäcker, 1854) (N, S, Si, Sa)
Protapion difforme (Germar, 1818) (N, S, Si, Sa)
Protapion dissimile (Germar, 1817) (N, S, Si, Sa)
Protapion filirostre (Kirby, 1808) (N, S)
Protapion fulvipes (Fourcroy, 1785) (N, S, Si, Sa)
Protapion interjectum (Desbrochers, 1895) (N, S, Si, Sa)
Protapion laevicolle (Kirby, 1811) (N, S, Si, Sa)
Protapion mediterraneum (Wagner, 1906) (S, Si, Sa)
Protapion nigrifemur (Kirby, 1808) (N, S, Si, Sa)
Protapion ononicola (Bach, 1854) (N, S, Si, Sa)
Protapion ruficroides (Schatzmayr, 1925) (N, S, Si)
Protapion schoenherri (Boheman, 1839) (N, S, Si, Sa)
Protapion trifolii (Linné, 1768) (N, S, Si, Sa)
Protapion varipes (Germar, 1817) (N, S, Si, Sa)

Phrissotrichum Schilsky, 1901

Phrissotrichum appennincola Osella, Zuppa & Altea, 1994 (S) (E)
Phrissotrichum delphinense (Hustache, 1912) (N)
Phrissotrichum grenieri (Desbrochers, 1874) (N)
Phrissotrichum osellai (Sacco & Colonnelli, 1983) (S) (E)
Phrissotrichum rugicolle (Germar, 1817) (N)
Phrissotrichum tubiferum (Gyllenhal, 1833) (N, S, Si, Sa)

Osellaeus Alonso-Zarazaga, 1991

Osellaeus bonvouloiri (C. Brisout, 1880)
Osellaeus bonvouloiri bonvouloiri (C. Brisout, 1880) (N)
Osellaeus bonvouloiri baldensis (Bellò, Meregalli & Osella, 1980) (N) (E)

Helianthemapion Wagner, 1930

Helianthemapion aciculare (Germar, 1817) (N, S)
Helianthemapion genuense (Osella, 1973) (N, S) (E)
Helianthemapion velatum (Gerstäcker, 1854) (N, S, Si)

Pseudoperapion Wagner, 1930

Pseudoperapion brevirostre (Herbst, 1797) (N, S, Si, Sa)

Pseudostenapion Wagner, 1930

Pseudostenapion simum (Germar, 1817) (N, S, Si)

Cistapion Wagner, 1924

Cistapion cyanescens (Gyllenhal, 1833) (N, S, Si, Sa)

Perapion Wagner, 1907

Perapion affine (Kirby, 1808) (N, S, Sa?)
Perapion curtirostre (Germar, 1817) (N, S, Si, Sa)
Perapion hydrolapathi (Marsham, 1802) (N, S, Si, Sa)
Perapion ilvense (Wagner, 1905) (S, Si, Sa)
Perapion lemoroi (C. Brisout, 1880) (S)
Perapion marchicum (Herbst, 1797) (N, S, Si?)
Perapion violaceum (Kirby, 1808) (N, S, Si, Sa)

Aizobius Alonso-Zarazaga, 1990

Aizobius sedi (Germar, 1818) (N, S, Si)

Onychapion Schilsky, 1901

Onychapion tamarisci (Gyllenhal, 1839) (Si, Sa)

Apion Herbst, 1797

Apion cruentatum Walton, 1844 (N, S, Si, Sa)
Apion dellabeffae Schatzmayr, 1924 (N)
Apion frumentarium (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa?)
Apion haematodes Kirby, 1808 (N, S, Si, Sa)
Apion longithorax Desbrochers, 1889 (S, Si)
Apion rubens Stephens, 1839 (N, S, Si?)
Apion rubiginosum Grill, 1893 (N, S)

Catapion Schilsky, 1906

Catapion burdigalense (Wencker, 1858) (N, S, Si, Sa)

Catapion calabricum (A. Solari & F. Solari, 1922) (S, Si) (E)
Catapion corsicum (Desbrochers, 1888) (N, S, Si, Sa)
Catapion curtulum (Desbrochers, 1870) (N, S, Si, Sa)
Catapion jaffense (Desbrochers, 1896) (N, S)
Catapion koestlini (Dieckmann, 1989) (N)
Catapion natricis (V. Planet, 1918) (N?, S)
Catapion pubescens (Kirby, 1811) (N, S, Si, Sa)
Catapion seniculus (Kirby, 1808) (N, S, Si, Sa)
Catapion seriatosetosulum (Wencker, 1864) (N, S, Si, Sa)

Trichapion Wagner, 1912

Trichapion simile (Kirby, 1811) (N)

Stenopterapion Bokor, 1923

Stenopterapion intermedium (Eppelsheim, 1875) (N, S)
Stenopterapion meliloti (Kirby, 1808) (N, S, Si)
Stenopterapion tenue (Kirby, 1808) (N, S, Si, Sa)

Ischnopterapion Bokor, 1923

Ischnopterapion aeneomicans (Wencker, 1864) (N, S, Si)
Ischnopterapion cognatum (Hochhut, 1851) (S, Si, Sa)
Ischnopterapion fallens (Marseul, 1888) (N, S, Sa)
Ischnopterapion loti (Kirby, 1808) (N, S, Si)
Ischnopterapion modestum (Germar, 1817) (N, S, Si, Sa)
Ischnopterapion plumbeomicans (Rosenhauer, 1856) (Sa)
Ischnopterapion virens (Herbst, 1797) (N, S, Si, Sa)

Synapion Schilsky, 1906

Synapion ebeninum (Kirby, 1808) (N, S)
Synapion falzonii (Schatzmayr, 1922) (S) (E)

Holotrichapion Györfy, 1956

Holotrichapion aethiops (Herbst, 1797) (N, S, Si, Sa)
Holotrichapion antennale (Desbrochers, 1896) (N, S, Si, Sa)
Holotrichapion gracilicollis (Gyllenhal, 1839) (N, S, Si, Sa)
Holotrichapion ononis (Kirby, 1808) (N, S, Si, Sa)
Holotrichapion pisi (Fabricius, 1801) (N, S, Si, Sa)

Hemitrichapion Voss, 1959

Hemitrichapion filicorne (Wencker, 1864) (N, S, Si, Sa)
Hemitrichapion gavoyi (Desbrochers, 1904) (S)
Hemitrichapion juniperi (Boheman, 1839) (N, S)

Hemitrichapion lanigerum (Gemminger, 1871) (N, S)
Hemitrichapion pavidum (Germar, 1817) (N, S, Si, Sa?)
Hemitrichapion rapulum (Wencker, 1864) (N, S)
Hemitrichapion reflexum (Gyllenhal, 1833) (N, S, Si)
Hemitrichapion waltoni (Stephens, 1829) (N, S, Si, Sa)

Protopirapion Alonso-Zarazaga, 1990

Protopirapion atratulum (Germar, 1817) (S, Si)
Protopirapion kraatzi (Wencker, 1859) (N, S, Si)

Pirapion Reitter, 1916

Pirapion immune (Kirby, 1808) (N, S)
Pirapion redemptum (Schatzmayr, 1919) (N)

Mesotrichapion Györfy, 1956

Mesotrichapion obtusum (Desbrochers, 1866) (N)
Mesotrichapion punctirostre (Gyllenhal, 1839) (N)

Cyanapion Bokor, 1923

Cyanapion afer (Gyllenhal, 1833) (N, S)
Cyanapion alcyoneum (Germar, 1817) (S, Si)
Cyanapion columbinum (Germar, 1817) (N, S)
Cyanapion gyllenhalii (Kirby, 1808) (N, S, Si)
Cyanapion platalea (Germar, 1817) (N, S, Si?)
Cyanapion spencii (Kirby, 1808) (N, S, Sa?)

Oxystoma Dumeril, 1806

Oxystoma cerdo (Gerstäcker, 1854) (N, S, Si, Sa)
Oxystoma cracca (Linné, 1767) (N, S, Si, Sa)
Oxystoma dimidiatum (Desbrochers, 1897) (N, S, Si)
Oxystoma ochropus (Germar, 1818) (N, S, Si, Sa)
Oxystoma opeticum (Bach, 1854) (N, S, Si)
Oxystoma pomonae (Fabricius, 1798) (N, S, Si, Sa)
Oxystoma subulatum (Kirby, 1808) (N, S, Si)

Oryxolaemus Alonso-Zarazaga, 1991

Oryxolaemus croceifemoratus (Gyllenhal, 1839) (S, Si, Sa)
Oryxolaemus flavifemoratus (Herbst, 1797) (N, S)
Oryxolaemus scabiosus (Weise, 1889) (N, S, Si, Sa)
Oryxolaemus viridimicans (Desbrochers, 1884) (Si)

Eutrichapion Reitter, 1916

Eutrichapion ervi (Kirby, 1808) (N, S, Si, Sa)
Eutrichapion facetum (Gyllenhal, 1839) (N, S, Si)
Eutrichapion gribodoi (Desbrochers, 1896) (N, S)
Eutrichapion hydropicum (Wencker, 1864) (N, S)
Eutrichapion melancholicum (Wencker, 1864) (N, S, Si)
Eutrichapion punctigerum (Paykull, 1792) (N, S, Si)
Eutrichapion rhomboidale (Desbrochers, 1870) (N)
Eutrichapion viciae (Paykull, 1800) (N, S, Si, Sa)
Eutrichapion vorax (Herbst, 1797) (N, S, Si, Sa)

Attelabidae

Auletobius Desbrochers, 1869

Auletobius maculipennis (Jacquelin du Val, 1854) (S, Si, Sa)
Auletobius politus (Serville, 1825) (N, S, Si, Sa)
Auletobius pubescens (Kiesenwetter, 1851) (N, S, Sa)
Auletobius sanguisorbae (Schrank, 1798) (N)

Auletes Schönherr, 1826

Auletes tubicen (Boheman, 1828) (N, S, Si)

Byctiscus Thomson, 1859

Byctiscus betulae (Linné, 1758) (N, S, Si)
Byctiscus populi (Linné, 1758) (N, S, Si)

Deporaus (Deporaus) Leach, 1819

Deporaus (Deporaus) betulae (Linné, 1758) (N, S)
Deporaus (Deporaus) mannerheimii (Hummel, 1823) (N)

Deporaus (Conostropheus) Prell, 1924

Deporaus (Conostropheus) seminiger Reitter, 1880 (N, S)
Deporaus (Conostropheus) tristis (Fabricius, 1794) (N)

Lasiorhynchites (Lasiorhynchites) Jekel, 1860

Lasiorhynchites (Lasiorhynchites) cavifrons (Gyllenhal, 1833) (N, S)
Lasiorhynchites (Lasiorhynchites) olivaceus (Gyllenhal, 1833) (N, S)
Lasiorhynchites (Lasiorhynchites) praeustus (Boheman, 1845) (N, S, Si)

Lasiorhynchites (Coccigorrhynchites) Prell, 1926

Lasiorhynchites (Coccigorhynchites) sericeus (Herbst, 1797) (N, S, Si)

***Lasiorhynchites (Stenorhynchites)* Voss, 1932**

Lasiorhynchites (Stenorhynchites) coeruleocephalus (Schaller, 1783) (N)

***Pselaphorhynchites* Schilsky, 1903**

Pselaphorhynchites longiceps (Thompson, 1888) (N)

Pselaphorhynchites nanus (Paykull, 1792) (N, S)

Pselaphorhynchites tomentosus (Gyllenhal, 1839) (N, S, Si)

***Neocoenorrhinus* Voss, 1951**

Neocoenorrhinus abeillei (Desbrochers, 1868) (S)

Neocoenorrhinus aeneovirens (Marsham, 1802) (N, S)

Neocoenorrhinus aequatus (Linné, 1767) (N, S)

Neocoenorrhinus cribrum (Desbrochers, 1875)

Neocoenorrhinus cribrum italicus Voss, 1929 (N) (E)

Neocoenorrhinus germanicus (Herbst, 1797) (N, S, Si)

Neocoenorrhinus interpunctatus (Stephens, 1831) (N, S, Si)

Neocoenorrhinus pauxillus (Germar, 1824) (N, S, Si, Sa)

Neocoenorrhinus ruber (Schilsky, 1903) (Si)

***Notocyrtus* Desbrochers, 1868**

Notocyrtus cribripennis Desbrochers, 1868 (N, S, Sa)

***Rhynchites* Schneider, 1791**

Rhynchites auratus (Scopoli, 1763) (N, S, Si, Sa)

Rhynchites bacchus (Linné, 1758) (N, S, Si)

Rhynchites cupreus (Linné, 1758) (N)

Rhynchites giganteus Krynicki, 1832 (N, S, Si)

***Involvolus* Schrank, 1798**

Involvolus aethiops Bach, 1854 (N, S, Si)

Involvolus caeruleus (De Geer, 1775) (N, S)

Involvolus pubescens (Fabricius, 1775) (N, S, Sa)

***Attelabus* Linné, 1758**

Attelabus nitens (Scopoli, 1763) (N, S, Si, Sa)

***Apoderus* Olivier, 1807**

Apoderus coryli (Linné, 1758) (N, S)

Apoderus erythropterus (Gmelin, 1790) (N)

Biphyllidae

Biphyllus Dejean, 1821

Biphyllus frater (Aubé, 1850) (S, Sa)

Biphyllus lunatus (Fabricius, 1787) (N, S, Si, Sa)

Diplocoelus Guérin-Ménéville, 1844

Diplocoelus fagi Guérin-Ménéville, 1844 (N, S, Si, Sa)

Bostrichidae

Polycaon Laporte de Castelnau, 1836

Polycaon stoutii (J.L. Leconte, 1835) (Si?) (*)

Psoa Herbst, 1797

Psoa dubia (Rossi, 1792) (N, S, Sa)

Psoa viennensis Herbst, 1797 (N)

Endecatomus Mellié, 1847

Endecatomus reticulatus (Herbst, 1793) (N, S)

Stephanopachys C.O. Waterhouse, 1888

Stephanopachys linearis (Kugelann, 1792) (N?) (*)

Stephanopachys quadricollis (Marseul, 1878) (N, S, Si)

Stephanopachys substriatus (Paykull, 1800) (N)

Rhyzopertha Stephens, 1830

Rhyzopertha dominica (Fabricius, 1792) (N, S, Si, Sa) (*)

***Dinoderus* (*Dinoderus*)** Stephens, 1830

Dinoderus (*Dinoderus*) *bifoveolatus* (Wollaston, 1858) (N?) (*)

Dinoderus (*Dinoderus*) *distinctus* Lesne, 1897 (N?, S?) (*)

Dinoderus (*Dinoderus*) *minutus* (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa?) (*)

Apate Fabricius, 1775

Apate monachus Fabricius, 1775 (N?, S, Si, Sa)

Bostrichus Geoffroy, 1762

Bostrichus capucinus (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)

Lichenophanes Lesne, 1899

Lichenophanes numida Lesne, 1899 (S, Sa)

Lichenophanes varius (Illiger, 1801) (N, S, Sa)

Schistoceros Lesne, 1899

Schistoceros bimaculatus (Olivier, 1790) (N, S, Si, Sa)

Heterobostrychus Lesne, 1899

Heterobostrychus brunneus (Murray, 1867) (N?, S?) (*)

Bostrychoplites Lesne, 1899

Bostrychoplites cornutus (Olivier, 1790) (N?, S?) (*)

Micrapate Casey, 1898

Micrapate puncticollis (Kiesenwetter, 1877) (Si?, Sa?) (*)

Micrapate xyloperthoides (Jacquelin du Val, 1859) (N, S, Si)

Sinoxylon Duftschmid, 1825

Sinoxylon perforans (Schrank, 1789) (N, S, Si, Sa)

Sinoxylon ruficorne Fåhræus, 1872 (N?, S?) (*)

Sinoxylon sexdentatum (Olivier, 1790) (N, S, Si, Sa)

Scobicia Lesne, 1901

Scobicia chevrieri (A. Villa & G.B. Villa, 1835) (N, S, Si, Sa)

Scobicia pustulata (Fabricius, 1801) (N, S, Si, Sa)

Enneadesmus Mulsant, 1851

Enneadesmus trispinosus (Olivier, 1795)

Enneadesmus trispinosus trispinosus (Olivier, 1795) (Si, Sa)

Xyloperthella Fisher, 1950

Xyloperthella picea (Olivier, 1790) (S, Si, Sa) (*)

Xylopertha Guérin-Ménéville, 1845

Xylopertha praeusta (Germar, 1817) (N, Si, Sa)

Xylopertha retusa (Olivier, 1790) (N, S, Si, Sa)

Xylothrips Lesne, 1901

Xylothrips flavipes (Illiger, 1801) (S?) (*)

Note

Polycaon stoutii: Specie nearctica; un esemplare è stato rinvenuto nel 1977 in natura in una località interna della Sicilia.

Endecatomus: Questo genere è stato in passato attribuito ai Ciidae (cfr. Luigioni, 1929; Porta, 1929).

Stephanopachys linearis: Solo una vecchia segnalazione per l'Alto Adige.

Rhyzopertha dominica: Specie attualmente cosmopolita, originaria probabilmente della regione orientale.

Dinoderus (*Dinoderus*): Nel porto di Venezia è stata intercettata una specie indeterminata (*Dinoderus* sp.) proveniente dall'Africa australe.

Dinoderus (*Dinoderus*) *bifoveolatus*: Specie ampiamente diffusa nelle aree tropicali, introdotta nelle zone temperate dove vive nei prodotti alimentari immagazzinati. Solo una generica e incerta segnalazione per il "Tyrol".

Dinoderus (*Dinoderus*) *distinctus*: Specie originaria probabilmente delle Filippine introdotta con la così detta "Radice di Colombo"; non si hanno dati su una eventuale acclimatazione.

Dinoderus (*Dinoderus*) *minutus*: Specie di origine tropicale, legata soprattutto ai bambù, attualmente pressoché cosmopolita; nelle aree temperate vive nei prodotti immagazzinati ricchi di amido.

Heterobostrychus: Alcuni autori lo considerano sottogenere di *Amphicerus* J.L. Leconte, 1861 (cfr. Lesne, 1938; Gerberg, 1957; Cymorek, 1969; Lucht, 1987).

Heterobostrychus brunneus: Specie etiopica spesso intercettata in aree temperate; in Italia è stata rinvenuta in depositi di legname; non si hanno dati su una eventuale acclimatazione.

Bostrychoplites cornutus: Specie etiopica spesso intercettata in aree temperate. In Italia è stata rinvenuta tra il 1969 ed il 1971 nel porto di Venezia (su rizomi di manioca provenienti dal Sudafrica) e in altre località in depositi di legname, non si hanno dati su una eventuale acclimatazione.

Micrapate puncticollis: Specie neotropica; presenza estremamente dubbia. Le vecchie segnalazioni per la regione paleartica sono dovute a errori di determinazione o a introduzioni accidentali (cfr. Lesne 1901; Luigioni, 1929; Porta, 1929).

Sinoxylon: Nel porto di Venezia è stata intercettata una specie indeterminata (*Sinoxylon* sp.) proveniente dall'Africa australe.

Sinoxylon ruficorne: Specie etiopica rinvenuta in depositi di legname. Nel suo areale primario è nota anche una presunta spp.; la segnalazione per il nostro Paese è relativa a "*Sinoxylon ruficorne*" e dovrebbe riferirsi alla ssp. nominale.

Xyloperthella picea: Le popolazioni mediterranee appartengono secondo Lesne (1938) alla ssp. *picea* mentre secondo Español (1955) alla ssp. *heydeni* (Schilsky, 1899).

Xylopertha: Nel porto di Venezia è stata intercettata, in un carico di manioca proveniente dall'Africa australe, una specie indeterminata del genere *Xylion* Lesne, 1901 non incluso nella

checklist.

Xylothrips flavipes: Specie diffusa in Madagascar, nella regione orientale e australiana settentrionale; importata ad Ancona nel 1966 e 1967 con legname proveniente dalle Filippine, non si hanno dati su una eventuale acclimatazione.

Bothrideridae

Bothrideres Dejean, 1835

Bothrideres bipunctatus (Gmelin in Linnaeus, 1790) (N, S)

Ogmoderes Ganglbauer, 1899

Ogmoderes angusticollis (Brisout de Barneville, 1861) (N, S)

Teredus Dejean, 1835

Teredus cylindricus (G.A. Olivier, 1790) (N, S, Si, Sa)

Oxylaemus Erichson, 1845

Oxylaemus cylindricus (Panzer, 1796) (N, S, Sa)

Oxylaemus variolosus (Dufour, 1843) (N, S, Si)

Anommatus Wesmael, 1835

Anommatus besucheti Dajoz, 1973 (N)

Anommatus beszedesi Reitter, 1915 (N)

Anommatus cansiglioensis Dajoz, 1973 (N) (E)

Anommatus convexus Breit, 1913 (N) (E)

Anommatus curtii Reitter, 1910 (N)

Anommatus dalmatinus Reitter, 1922 (N)

Anommatus dentatus Dajoz, 1973 (N)

Anommatus dictyoderus Doderò, 1900 (N)

Anommatus diecki Reitter, 1875 (N, S, Sa)

Anommatus distinctus Doderò, 1900 (N)

Anommatus doderoi Binaghi, 1941 (N) (E)

Anommatus duodecimstriatus (P.J.W. Müller, 1821) (N, S, Si, Sa)

Anommatus foveolatus Vsetecka, 1948 (N) (E)

Anommatus istrianus Reitter, 1910 (N)

Anommatus paradoxus Breit, 1913 (N)

Anommatus planicollis Fairmaire, 1869 (N)

Anommatus plicatus Reitter, 1894 (N?)

Anommatus politipennis Kaszab, 1947 (N)

Anommatus reitteri Ganglbauer, 1899 (N?)

Anommatus rugifer Reitter, 1894 (N?)

Anommatus scherleri Dajoz, 1973 (N)

Anommatus septemstriatus Reitter, 1922 (N)
Anommatus thoracicus Depoli, 1917 (N)
Anommatus ticinensis Dajoz, 1973 (N)
Anommatus vallombrosae Dieck, 1875 (N) (E)
Anommatus vesulanus Binaghi, 1941 (S) (E)

Brachyceridae

Brachycerus Olivier, 1790

Brachycerus albidentatus Gyllenhal, 1840 (S, Si, Sa)
Brachycerus barbarus (Linné, 1758) (S, Si, Sa)
Brachycerus callosus Gyllenhal, 1833 (Si)
Brachycerus junix Liechtenstein, 1896 (S, Si)
Brachycerus lutosus Gyllenhal, 1833 (N, S?)
Brachycerus muricatus (Fabricius, 1792) (N, S, Si)
Brachycerus plicatus Gyllenhal, 1833 (Si)
Brachycerus sinuatus Olivier, 1807 (Si)
Brachycerus undatus (Fabricius, 1798)
Brachycerus undatus undatus (Fabricius, 1798) (N, S, Si, Sa)
Brachycerus undatus schatzmayri Zumpt, 1937 (Si)

Brenthidae

Amorphocephala Damoiseau, 1966

Amorphocephala coronata (Germar, 1817) (N, S, Si, Sa)

Bruchidae

Bruchus Linné, 1767

Bruchus affinis Frölich, 1799 (N, S, Si)
Bruchus atomarius (Linné, 1761) (N, S)
Bruchus brachialis Fåhræus, 1839 (N, S, Si, Sa)
Bruchus brisouti Kraatz, 1868 (Sa)
Bruchus ecalcaratus K. Daniel, 1906 (N)
Bruchus emarginatus Allard, 1868 (Sa)
Bruchus ervi Frölich, 1799 (N, S, Si, Sa)
Bruchus griseomaculatus Gyllenhal, 1833 (N, S, Si, Sa)
Bruchus laticollis Boheman, 1833 (N, S, Si, Sa)
Bruchus lentis Frölich, 1799 (N, S, Si, Sa)
Bruchus loti Paykull, 1800 (N, S)
Bruchus luteicornis Illiger, 1794 (N, S, Si, Sa)
Bruchus perezii Kraatz, 1868 (Si)

Bruchus pisorum (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)
Bruchus rufimanus Boheman, 1833 (N, S, Si, Sa)
Bruchus rufipes Herbst, 1783 (N, S, Si, Sa)
Bruchus signaticornis Gyllenhal, 1833 (N, S, Si, Sa)
Bruchus tristiculus Fåhraeus, 1839 (N, S, Si, Sa)
Bruchus tristis Boheman, 1833 (N, S, Si, Sa)
Bruchus ulicis Mulsant & Rey, 1858 (N, S, Si, Sa)
Bruchus viciae Olivier, 1795 (N, S, Si, Sa)

Bruchidius Schilsky, 1905

Bruchidius albolineatus Blanchard, 1844 (S, Si, Sa)
Bruchidius ater Marsham, 1802 (N, S, Si, Sa)
Bruchidius biguttatus (Olivier, 1795) (N, S, Si, Sa)
Bruchidius bimaculatus (Olivier, 1795) (N, S, Si, Sa)
Bruchidius bituberculatus Schilsky, 1905 (S)
Bruchidius caninus (Kraatz, 1869) (N, S, Si, Sa)
Bruchidius canus (Germar, 1824) (N, S)
Bruchidius cinerascens (Gyllenhal, 1833) (N, S, Si, Sa)
Bruchidius cisti (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa)
Bruchidius dispar (Gyllenhal, 1833) (N, S, Si, Sa)
Bruchidius foveolatus (Gyllenhal, 1833) (N, S, Si, Sa)
Bruchidius holosericeus (Gyllenhal, 1833) (N, S)
Bruchidius imbricornis (Panzer, 1795) (N, S, Si, Sa)
Bruchidius jocosus (Gyllenhal, 1833) (S, Si, Sa)
Bruchidius lineatus (Allard, 1868) (S, Si, Sa)
Bruchidius lividimanus (Gyllenhal, 1833) (N, S, Si, Sa)
Bruchidius longus Pic, 1913 (S, Si)
Bruchidius lutescens (Blanchard, 1844) (S, Si, Sa)
Bruchidius marginalis (Fabricius, 1775) (N, S)
Bruchidius martinezi (Allard, 1868) (S, Si, Sa)
Bruchidius meleagrinus (Géné, 1839) (S, Si, Sa)
Bruchidius misellus (Boheman, 1833) (N, S)
Bruchidius mulsanti (Brisout, 1863) (N, S, Si, Sa)
Bruchidius murinus (Boheman, 1829) (N, S, Si, Sa)
Bruchidius nanus (Germar, 1824) (N, S, Si, Sa)
Bruchidius nudus (Allard, 1868) (S, Si, Sa)
Bruchidius obscuripes (Gyllenhal, 1839) (S, Si, Sa)
Bruchidius olivaceus (Germar, 1824) (N, S)
Bruchidius pauper (Boheman, 1829) (S, Si, Sa)
Bruchidius picipes (Germar, 1824) (N, S, Si, Sa)
Bruchidius poecilus (Germar, 1824) (S)
Bruchidius poupillieri (Allard, 1868) (S, Si)
Bruchidius pygmaeus (Boheman, 1833) (S, Si, Sa)
Bruchidius seminarius (Linné, 1767) (N, S, Si, Sa)
Bruchidius sericatus (Germar, 1824) (N, S, Si, Sa)
Bruchidius sp. (S) (*)
Bruchidius stylophorus (K. Daniel, 1904) (N, S, Si, Sa)

Bruchidius tibialis (Boheman, 1829) (N, S, Si, Sa)
Bruchidius trifolii (Motschulsky, 1873) (S, Si, Sa)
Bruchidius tuberculatus (Hochhut, 1847) (S, Si, Sa)
Bruchidius unicolor (Olivier, 1795) (N, S)
Bruchidius varius (Olivier, 1795) (N, S, Si, Sa)

Callosobruchus Pic, 1902

Callosobruchus chinensis (Linné, 1758) (N, S, Si)
Callosobruchus maculatus (Fabricius, 1775) (S)

Paleoacanthoscelides Borowiec, 1985

Paleoacanthoscelides gilvus (Gyllenhal, 1839) (S, Si)

Acanthoscelides Schilsky, 1905

Acanthoscelides obtectus (Say, 1831) (N, S, Si, Sa)
Acanthoscelides pallidipennis (Motschulsky, 1873) (N, S)

Megabruchidius Borowiec, 1984

Megabruchidius dorsalis (Fåhræus, 1839) (S)

Spermophagus Schöenerr, 1833

Spermophagus calystegiae (Luk'yanovic & Ter Minassian, 1957) (N, S)
Spermophagus kuesteri Schilsky, 1905 (N, S)
Spermophagus sericeus Geoffroy, 1785 (N, S, Si, Sa)

Note

Bruchidius sp.: Specie inedita che, al momento di scrivere, è in corso di stampa.

Buprestidae

Julodis Eschscholtz, 1829

Julodis onopordi (Fabricius, 1787) (E) (*)
Julodis onopordi lampedusanus Tassi, 1966 (Si)

Acmaeodera Eschscholtz, 1829

Acmaeodera bipunctata (Olivier, 1790) (*)
Acmaeodera bipunctata bipunctata (Olivier, 1790) (N, S, Si)
Acmaeodera bipunctata obenbergeriana Schaefer, 1949 (Sa?)
Acmaeodera bipunctata romanoi Sparacio, 1992 (Si)

Acmaeodera crinita Gory, 1840 (N, S) (*)
Acmaeodera cylindrica (Fabricius, 1775) (S, Si, Sa)
Acmaeodera degener (Scopoli, 1763)
 Acmaeodera degener degener (Scopoli, 1763) (N)
 Acmaeodera degener quatuordecimpunctata (Villers, 1789) (N, S, Si)
Acmaeodera octodecimguttata Gory, 1835 (Sa)
Acmaeodera pilosellae (Bonelli, 1812) (N, S, Si, Sa)
Acmaeodera prunneri Gené, 1839 (Sa)
Acmaeodera quadrifasciata (Rossi, 1790) (N, S) (*)
Acmaeodera revelierei Mulsant, 1859 (Sa) (*)
Acmaeodera tassii Schaefer, 1965 (S, Si) (E)

***Acmaeoderella* Cobos, 1955**

Acmaeoderella adspersula (Illiger, 1803) (S, Si, Sa)
Acmaeoderella discoidea (Fabricius, 1787) (S, Si)
Acmaeoderella flavofasciata (Piller, 1783) (N, S, Si, Sa)
Acmaeoderella lanuginosa (Gyllenhal, 1817)
 Acmaeoderella lanuginosa lanuginosa (Gyllenhal, 1817) (S, Si)
 Acmaeoderella lanuginosa reducta (Schaefer, 1938) (Sa)
Acmaeoderella perroti (Schaefer, 1951) (E) (*)
 Acmaeoderella perroti franzinii Curletti & Magnani, 1987 (S, Sa)
Acmaeoderella trinacriae (Obenberger, 1923) (S, Si) (E)
Acmaeoderella virgulata (Illiger, 1803) (S, Si, Sa)

***Ptosima* Solier, 1833**

Ptosima flavoguttata (Illiger, 1803) (N, S, Si, Sa)

***Sphenoptera* (*Sphenoptera*) Solier, 1833**

Sphenoptera (*Sphenoptera*) *antiqua* (Illiger, 1803) (N, S, Si, Sa)
Sphenoptera (*Sphenoptera*) *ardua* Castelnau & Gory, 1839 (N, S, Si)
Sphenoptera (*Sphenoptera*) *barbarica* (Gmelin, 1788) (N, S, Si, Sa) (*)
Sphenoptera (*Sphenoptera*) *circe* Obenberger, 1927 (Si) (E)
Sphenoptera (*Sphenoptera*) *porrecta* Jakovleff, 1907 (N) (*)
Sphenoptera (*Sphenoptera*) *sicula* Jakovleff, 1866 (Si) (E)

***Sphenoptera* (*Deudora*) Jakovleff, 1889**

Sphenoptera (*Deudora*) *gemmata* (Olivier, 1790)
 Sphenoptera (*Deudora*) *gemmata gemmata* (Olivier, 1790) (N, S, Sa)
 Sphenoptera (*Deudora*) *gemmata sicelidis* Obenberger, 1916 (Si) (E)
Sphenoptera (*Deudora*) *rauca* (Fabricius, 1787) (N, S, Si, Sa) (*)

***Sphenoptera* (*Chilostetha*) Jakovleff, 1889**

Sphenoptera (*Chilostetha*) *danubiana* Obenberger, 1949 (N) (*)

Sphenoptera (Chilostetha) excisa Jakovleff, 1887 (Sa) (E)
Sphenoptera (Chilostetha) jugoslavica Obenberger, 1926 (N) (*)
Sphenoptera (Chilostetha) laportei Saunders, 1871 (N, S, Si, Sa)
Sphenoptera (Chilostetha) parvula (Fabricius, 1787) (N, S, Si, Sa?)
Sphenoptera (Chilostetha) petriceki Obenberger, 1949 (N) (*)
Sphenoptera (Chilostetha) pirazzolii Obenberger, 1949 (S) (E)

Chalcophora Solier, 1833

Chalcophora detrita (Klug, 1829) (S) (*)
Chalcophora intermedia (Rey, 1890) (S, Sa?) (*)
Chalcophora mariana (Linné, 1758) (N, S) (*)
Chalcophora massiliensis (Villers, 1789) (S, Si)

Chalcophorella (Rossiella) Obenberger, 1942

Chalcophorella (Rossiella) fabricii (Rossi, 1794) (N, S, Si) (*)

Capnodis Eschscholtz, 1829

Capnodis cariosa (Pallas, 1776) (S, Si)
Capnodis miliaris (Klug, 1829) (S) (*)
Capnodis tenebrionis (Linné, 1761) (N, S, Si, Sa)
Capnodis tenebricosa (Olivier, 1790) (N, S, Si, Sa)

Perotis Spinola, 1837

Perotis lugubris (Fabricius, 1777) (S)
Perotis unicolor (Olivier, 1790) (N, Si) (*)

Cyphosoma Mannerheim, 1837

Cyphosoma euphraticum (Castelnau & Gory, 1839) (S) (*)
Cyphosoma lawsoniae (Chevrolat, 1838) (Si, Sa)

Latipalpis Solier, 1833

Latipalpis plana (Olivier, 1790) (N, S, Si, Sa)

Dicerca (Dicerca) Eschscholtz, 1829

Dicerca (Dicerca) acuminata (Pallas, 1781) (N)
Dicerca (Dicerca) aenea (Linné, 1761) (N, S, Si, Sa)
Dicerca (Dicerca) alni (Fischer, 1824) (N, S, Si, Sa)
Dicerca (Dicerca) berolinensis (Herbst, 1779) (N, S, Sa)

Dicerca (Argante) Gistel, 1834

Dicerca (Argante) herbsti (Kiesenwetter, 1857) (N) (*)
Dicerca (Argante) moesta (Fabricius, 1794) (N)

Poecilonota Eschscholtz, 1829

Poecilonota variolosa (Paykull, 1799) (N, S, Si, Sa)

Scintillatrix Obenberger, 1956

Scintillatrix dives (Guillebeau, 1889) (N, S, Si?, Sa)
Scintillatrix gloriosa (Marseul, 1865) (N) (*)
Scintillatrix mirifica (Mulsant, 1855) (N, S, Si, Sa?)
Scintillatrix rutilans (Fabricius, 1777) (N, S, Sa?)
Scintillatrix solieri (Castelnau & Gory, 1837) (S, Sa) (*)

Palmar Schaefer, 1949

Palmar festiva (Linné, 1767) (*)
Palmar festiva festiva (Linné, 1767) (N, S, Sa)
Palmar festiva bonnairei (Fairmaire, 1884) (S, Sa?)

Eurythyrea Lacordaire, 1835

Eurythyrea austriaca (Linné, 1767) (N, S)
Eurythyrea micans (Fabricius, 1794) (N, S, Si, Sa)
Eurythyrea quercus (Herbst, 1780) (N, S, Sa?)

Buprestis (Buprestis) Linné, 1758

Buprestis (Buprestis) cupressi Germar, 1817 (N, S) (*)
Buprestis (Buprestis) haemorrhoidalis Herbst, 1780
Buprestis (Buprestis) haemorrhoidalis haemorrhoidalis Herbst, 1780 (N)
Buprestis (Buprestis) haemorrhoidalis araratica Marseul, 1865 (S, Si)
Buprestis (Buprestis) novemmaculata Linné, 1767 (N, S, Si, Sa)
Buprestis (Buprestis) octoguttata Linné, 1758 (*)
Buprestis (Buprestis) octoguttata octoguttata Linné, 1758 (N, S)
Buprestis (Buprestis) octoguttata corsica Obenberger, 1938 (Sa?)
Buprestis (Buprestis) rustica Linné, 1758 (N, S) (*)

Buprestis (Pseudyamina) Richter, 1952

Buprestis (Pseudyamina) hilaris Klug, 1829 (Sa)

Buprestis (Cypriacis) Casey, 1909

Buprestis (Cypriacis) splendens Fabricius, 1774 (N, S) (*)

Melanophila Eschscholtz, 1829

Melanophila acuminata (De Geer, 1774) (N, S, Sa?)

Melanophila cuspidata (Klug, 1829) (S, Si, Sa)

Melanophila picta (Pallas, 1773) (N, S, Si, Sa)

Phaenops Lacordaire, 1857

Phaenops cyanea (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa?)

Phaenops formaneki (Jacobson, 1912) (*)

Phaenops formaneki formaneki (Jacobson, 1912) (N)

Phaenops formaneki lavagnei (Théry, 1942) (N)

Phaenops knoteki (Reitter, 1898) (*)

Phaenops knoteki knoteki (Reitter, 1898) (N)

Phaenops knoteki ochsi (Schaefer, 1947) (N, S)

Kisanthobia De Marseul, 1902

Kisanthobia ariasi (Robert, 1858) (N, S, Si, Sa?) (*)

Anthaxia (Cratomerus) Solier, 1833

Anthaxia (Cratomerus) hungarica (Scopoli, 1772) (N, S, Si, Sa)

Anthaxia (Haplanthaxia) Reitter, 1911

Anthaxia (Haplanthaxia) aprutiana Gerini, 1955 (S) (E)

Anthaxia (Haplanthaxia) cichorii (Olivier, 1790) (N, S, Si)

Anthaxia (Haplanthaxia) confusa Gory, 1841

Anthaxia (Haplanthaxia) confusa confusa Gory, 1841 (N, S)

Anthaxia (Haplanthaxia) confusa baudii Obenberger, 1914 (Sa)

Anthaxia (Haplanthaxia) ignipennis Abeille, 1882 (N) (*)

Anthaxia (Haplanthaxia) millefolii (Fabricius, 1801) (*)

Anthaxia (Haplanthaxia) millefolii millefolii (Fabricius, 1801) (N)

Anthaxia (Haplanthaxia) millefolii polychloros Abeille, 1894 (N, S, Si, Sa)

Anthaxia (Haplanthaxia) praeclara (Mannerheim, 1837) (S, Si)

Anthaxia (Haplanthaxia) scutellaris Gené, 1839

Anthaxia (Haplanthaxia) scutellaris scutellaris Gené, 1839 (N, S, Si)

Anthaxia (Haplanthaxia) scutellaris semireducta Pic, 1911 (Sa?)

Anthaxia (Haplanthaxia) umbellatarum (Fabricius, 1787) (N, S, Si, Sa)

Anthaxia (Anthaxia) Eschscholtz, 1829

Anthaxia (Anthaxia) anatolica Chevrolat, 1838

Anthaxia (Anthaxia) anatolica ferulae Gené, 1839 (N?, S, Si, Sa)

Anthaxia (Anthaxia) candens (Panzer, 1789) (N, S)

Anthaxia (Anthaxia) cyanescens Gory, 1841 (S, Si, Sa)

Anthaxia (Anthaxia) deaurata (Gmelin, 1788)

Anthaxia (Anthaxia) deaurata deaurata (Gmelin, 1788) (N, S, Si, Sa)

Anthaxia (Anthaxia) dimidiata (Thünberg, 1789) (N, S, Si, Sa)
Anthaxia (Anthaxia) fulgurans (Schrank, 1789) (N, S)
Anthaxia (Anthaxia) funerula (Illiger, 1803) (N, S, Si, Sa)
Anthaxia (Anthaxia) hackeri Friwaldsky, 1884 (N, S)
Anthaxia (Anthaxia) hypomelaena (Illiger, 1803) (N, S, Si)
Anthaxia (Anthaxia) impunctata Abeille, 1909 (N)
Anthaxia (Anthaxia) lucens Kuster, 1852 (S, Si)
Anthaxia (Anthaxia) manca (Linné, 1767) (N, S, Si, Sa)
Anthaxia (Anthaxia) mendizabali Cobos, 1965 (S, Si)
Anthaxia (Anthaxia) midas Kiesenwetter, 1857 (*)
 Anthaxia (Anthaxia) midas midas Kiesenwetter, 1857 (N, S)
 Anthaxia (Anthaxia) midas oberthueri Schaefer, 1937 (N, S, Si)
Anthaxia (Anthaxia) nereis Schaefer, 1938 (Sa) (*)
Anthaxia (Anthaxia) nitidula (Linné, 1758) (N, S)
Anthaxia (Anthaxia) passerinii Pecchioli, 1837 (N, S) (*)
Anthaxia (Anthaxia) podolica Mannerheim, 1837 (N)
Anthaxia (Anthaxia) salicis (Fabricius, 1777) (N, S, Si)
Anthaxia (Anthaxia) semicuprea Küster, 1851 (N, S, Si)
Anthaxia (Anthaxia) thalassophila Abeille, 1900 (N, S, Sa?)

***Anthaxia (Melanthaxia)* Richter, 1949**

Anthaxia (Melanthaxia) corsica Reiche, 1861 (*)
 Anthaxia (Melanthaxia) corsica corsica Reiche, 1861 (Sa)
 Anthaxia (Melanthaxia) corsica maremmana Tassi, 1966 (S) (E)
Anthaxia (Melanthaxia) godeti Castelnau & Gory, 1847 (N, S, Si)
Anthaxia (Melanthaxia) helvetica Stierlin, 1868
 Anthaxia (Melanthaxia) helvetica helvetica Stierlin, 1868 (N)
 Anthaxia (Melanthaxia) helvetica apennina Obenberger, 1938 (S) (E)
Anthaxia (Melanthaxia) istriana Rosenhauer, 1847 (N, S)
Anthaxia (Melanthaxia) kochi Obenberger, 1938 (S) (E) (*)
Anthaxia (Melanthaxia) nigritula Ratzeburg, 1837 (N, S, Sa?)
Anthaxia (Melanthaxia) nigrojubata Roubal, 1913
 Anthaxia (Melanthaxia) nigrojubata incognita Bily, 1974 (N)
 Anthaxia (Melanthaxia) nigrojubata liae Gobbi, 1983 (S, Si) (E)
Anthaxia (Melanthaxia) quadripunctata (Linné, 1758) (N, S?)
Anthaxia (Melanthaxia) sepulchralis (Fabricius, 1801) (N)
Anthaxia (Melanthaxia) similis Saunders, 1871 (N)

***Chrysobothris* Eschscholtz, 1829**

Chrysobothris affinis (Fabricius, 1794) (N, S, Si, Sa)
Chrysobothris chrysostigma (Linné, 1758) (N, S) (*)
Chrysobothris igniventris Reitter, 1895 (N)
Chrysobothris solieri Castelnau & Gory, 1893 (N, S, Si, Sa)

***Coroebus* Castelnau & Gory, 1839**

Coroebus elatus (Fabricius, 1787) (N, S, Si)
Coroebus florentinus (Herbst, 1801) (N, S, Sa)
Coroebus oertzeni Ganglbauer, 1866 (N) (*)
Coroebus rubi (Linné, 1767) (N, S, Si, Sa)
Coroebus undatus (Fabricius, 1787) (N, S, Si, Sa?)

Meliboeus (Meliboeoides) Théry, 1942

Meliboeus (Meliboeoides) amethystinus (Olivier, 1790)
Meliboeus (Meliboeoides) amethystinus amethystinus (Olivier, 1790) (N, S, Sa)
Meliboeus (Meliboeoides) amethystinus destefanii Sparacio, 1984 (Si) (E)
Meliboeus (Meliboeoides) violaceus (Kiesenwetter, 1857) (S, Si)

Meliboeus (Meliboeus) Deyrolle, 1864

Meliboeus (Meliboeus) cryptocerus (Kiesenwetter, 1858) (Si)
Meliboeus (Meliboeus) episcopalis (Mannerheim, 1837) (S, Si)
Meliboeus (Meliboeus) gibbicollis (Illiger, 1803) (*)
Meliboeus (Meliboeus) gibbicollis gibbicollis (Illiger, 1803) (N)
Meliboeus (Meliboeus) gibbicollis maddalenae Curletti & Magnani, 1987 (Sa) (E)
Meliboeus (Meliboeus) graminis (Panzer, 1789) (N, S, Si, Sa)

Meliboeus (Melixes) Schaefer, 1949

Meliboeus (Melixes) aeratus (Mulsant & Rey, 1863) (S, Sa)

Nalanda Théry, 1904

Nalanda fulgidicollis (Lucas, 1849) (N, S, Si)

Agrilus (Uragrilus) Semenov, 1935

Agrilus (Uragrilus) ater (Linné, 1767) (N, S)
Agrilus (Uragrilus) guerini Lacordaire, 1835 (N, Sa?)

Agrilus (Agrilus) Curtis, 1825

Agrilus (Agrilus) albogularis Gory, 1841
Agrilus (Agrilus) albogularis albogularis Gory, 1841 (N, S)
Agrilus (Agrilus) albogularis artemisiae Brisout, 1863 (N)
Agrilus (Agrilus) albogularis dalmatinus Obenberger, 1936 (N)
Agrilus (Agrilus) albomarginatus Fiori, 1906 (N, S, Si)
Agrilus (Agrilus) angustulus (Illiger, 1803) (N, S, Si, Sa)
Agrilus (Agrilus) antiquus Mulsant & Rey, 1863
Agrilus (Agrilus) antiquus antiquus Mulsant & Rey, 1863 (N, S, Si)
Agrilus (Agrilus) antiquus oxygonus Abeille, 1907 (S)
Agrilus (Agrilus) auricollis Kiesenwetter, 1857 (N, S, Si)
Agrilus (Agrilus) aurichalceus Redtenbacher, 1849 (N, S, Si, Sa?)

Agrilus (Agrilus) betuleti Ratzeburg, 1837 (N)
Agrilus (Agrilus) biguttatus (Fabricius, 1777) (N, S, Si, Sa)
Agrilus (Agrilus) convexicollis Redtenbacher, 1849 (N, S, Si, Sa?)
Agrilus (Agrilus) croaticus Abeille, 1897 (N, S, Si)
Agrilus (Agrilus) curtulus Mulsant & Rey, 1863 (N, S, Si, Sa?)
Agrilus (Agrilus) cyanescens Ratzeburg, 1837 (N, S)
Agrilus (Agrilus) cytisi Baudii, 1870 (N)
Agrilus (Agrilus) derasofasciatus Lacordaire, 1835 (N, S, Si, Sa)
Agrilus (Agrilus) dualis Alexeev & Bily, 1980 (S)
Agrilus (Agrilus) elegans Mulsant & Rey, 1863 (*)
Agrilus (Agrilus) elegans elegans Mulsant & Rey, 1863 (S, Si, Sa)
Agrilus (Agrilus) elegans teucarii Schaefer, 1949 (N?)
Agrilus (Agrilus) globulifrons Obenberger, 1920 (Si)
Agrilus (Agrilus) graminis Castelnau & Gory, 1837 (N, S, Si)
Agrilus (Agrilus) grandiceps Kiesenwetter, 1857
Agrilus (Agrilus) grandiceps hemiphanes Marseul, 1865 (N, Si, Sa?)
Agrilus (Agrilus) hastulifer Ratzeburg, 1839 (N, S, Si, Sa)
Agrilus (Agrilus) hyperici (Creutzer, 1799) (N, S, Si)
Agrilus (Agrilus) integerrimus Ratzeburg, 1839 (N, S, Si, Sa?)
Agrilus (Agrilus) italicus Obenberger, 1920 (S)
Agrilus (Agrilus) laticornis (Illiger, 1803) (N, S, Si, Sa?)
Agrilus (Agrilus) lineola Redtenbacher, 1849 (N, S, Sa)
Agrilus (Agrilus) litura Kiesenwetter, 1857 (N) (*)
Agrilus (Agrilus) macroderus Abeille, 1897 (N, S)
Agrilus (Agrilus) marozzinii Gobbi, 1974 (S, Si)
Agrilus (Agrilus) melonii Curletti, 1987 (Sa)
Agrilus (Agrilus) mendax Mannerheim, 1837 (N)
Agrilus (Agrilus) nemeobius Obenberger, 1922 (S)
Agrilus (Agrilus) obscuricollis Kiesenwetter, 1857 (N, S, Si, Sa?)
Agrilus (Agrilus) olivicolor Kiesenwetter, 1857 (N, S)
Agrilus (Agrilus) paganettii Obenberger, 1913 (S)
Agrilus (Agrilus) pisanus Curletti, 1980 (S)
Agrilus (Agrilus) pratensis Ratzeburg, 1839 (N, S, Si, Sa)
Agrilus (Agrilus) pseudocyaneus Kiesenwetter, 1857 (N)
Agrilus (Agrilus) ribesi Schaefer, 1946 (N)
Agrilus (Agrilus) roscidus Kiesenwetter, 1857 (*)
Agrilus (Agrilus) roscidus roscidus Kiesenwetter, 1857 (N, S, Si, Sa)
Agrilus (Agrilus) roscidus griseocupreus Schaefer, 1961 (N, S, Si, Sa?)
Agrilus (Agrilus) salicis Friwaldsky, 1877 (Sa?)
Agrilus (Agrilus) sinuatus (Olivier, 1790) (N, S, Si)
Agrilus (Agrilus) solieri Castelnau & Gory, 1837 (N, S, Si, Sa)
Agrilus (Agrilus) subauratus Gebler, 1833 (N)
Agrilus (Agrilus) sulcicollis Lacordaire, 1835 (N, S, Si)
Agrilus (Agrilus) suvorovi Obenberger, 1935
Agrilus (Agrilus) suvorovi populneus Schaefer, 1946 (N, S, Sa)
Agrilus (Agrilus) trinacriae Obenberger, 1924 (Si)
Agrilus (Agrilus) viridis (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)
Agrilus (Agrilus) viridicoerulans Marseul, 1868

Agrilus (Agrilus) viridicoerulans rubi Schaefer, 1937 (N, S, Si, Sa)

Paracylindromorphus Théry, 1928

Paracylindromorphus subuliformis (Mannerheim, 1837) (S)

Cylindromorphus Kiesenwetter, 1857

Cylindromorphus dalmatinus Csiki, 1915 (S)

Cylindromorphus filum (Gyllenhal, 1817) (N, S, Si)

Cylindromorphus gallicus (Mulsant & Rey, 1863) (*)

Cylindromorphus gallicus angelinii Curletti, 1990 (S) (E)

Cylindromorphus platiai Curletti, 1981 (Si) (E)

Aphanisticus Latreille, 1810

Aphanisticus aetnensis Abeille, 1897 (Si) (E)

Aphanisticus angustatus Lucas, 1849 (N, S, Si, Sa)

Aphanisticus distinctus Perris, 1864 (N)

Aphanisticus elongatus Villa, 1835 (N, S, Si, Sa)

Aphanisticus emarginatus (Olivier, 1790) (N, S, Si, Sa)

Aphanisticus pusillus (Olivier, 1790) (N, S, Si, Sa?)

Aphanisticus pygmaeus Lucas, 1849 (N, S, Si, Sa)

Habroloma Thomson, 1864

Habroloma triangularis (Lacordaire, 1835) (S, Si)

Habroloma geranii Silfverberg, 1977 (N, S?, Si?, Sa?)

Trachys Fabricius, 1801

Trachys coruscus Ponza, 1805 (N, S, Si, Sa)

Trachys dichrous Obenberger, 1916 (S, Si?)

Trachys fragariae Brisout, 1874 (N, S)

Trachys lichtensteini Du Buysson, 1918 (S) (*)

Trachys minutus (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)

Trachys puncticollis Abeille, 1900

Trachys puncticollis obscurella Obenberger, 1916 (N, S)

Trachys quercicolus Marseul, 1871 (N, S, Sa?)

Trachys reflexus Gené, 1836 (Sa) (E)

Trachys scrobiculatus Kiesenwetter, 1857 (N, S)

Trachys troglodytes Gyllenhal, 1817

Note

Julodis onopordi: Presente solo a Lampedusa (Pelagie).

Acmaeodera bipunctata: La ssp. *romanoi* nota solo di Pantelleria.

Acmaeodera crinita: In N solo in Venezia Giulia, in S solo in Basilicata e Calabria.

Acmaeodera quadrifasciata: In N solo nella Liguria orientale.
Acmaeodera revelierei: Endemita sardo-corso.
Acmaeoderella perroti: La ssp. *franzinii* in S solo in Calabria.
Sphenoptera (Sphenoptera) barbarica: In N solo nella Liguria occidentale, in S solo in Calabria.
Sphenoptera (Sphenoptera) porrecta: Presenza marginale al confine orientale (Carso triestino).
Sphenoptera (Deudora) rauca: Probabilmente scomparsa in N, in S solo nelle estreme regioni meridionali.
Sphenoptera (Chilostetha) danubiana: Presenza marginale al confine orientale (Trieste).
Sphenoptera (Chilostetha) jugoslavica: Presenza marginale al confine orientale (Pola).
Sphenoptera (Chilostetha) petriceki: Presenza marginale al confine orientale (Trieste).
Chalcophora detrita: In S soltanto sui litorali toscano e campano; specie introdotta dal Vicino Oriente, probabilmente nel Medioevo.
Chalcophora intermedia: In S soltanto in Calabria (Sila).
Chalcophora mariana: In S soltanto in Calabria (Sila).
Chalcophorella (Rossiella) fabricii: In N limitato alla Liguria.
Capnodis miliaris: In S solo sul litorale jonico.
Perotis unicolor: Presenza marginale al confine occidentale (Nizzardo), in Si solo a Marettimo (Egadi).
Cyphosoma euphraticum: In probabile imminente estinzione per la scomparsa delle zone umide in Puglia, Basilicata e Calabria.
Dicerca (Argante) herbsti: Solo una antica citazione da incerta località alpina.
Scintillatrix gloriosa: In N nota solo di Istria (Fiume).
Scintillatrix solieri: In S nota solo per il bosco di Policoro (Matera).
Palmar festiva: Da chiarire il valore sistematico della "forma" *bonnairei*.
Buprestis (Buprestis) cupressi: In N limitato alla Liguria orientale e alla Venezia Giulia orientale.
Buprestis (Buprestis) octoguttata: In S solo sul Pollino.
Buprestis (Buprestis) rustica: In S solo sull'Appennino tosco-emiliano.
Buprestis (Cypriacis) splendens: In N presenza marginale al confine orientale (Liburnia), in S solo sul Pollino.
Phaenops formaneki: La ssp. *lavagnei* in N solo sulle Alpi Marittime francesi.
Phaenops knoteki: La ssp. *ochsi* in N solo sulle Alpi Marittime.
Kisanthobia ariasi: In N solo sulle Alpi Marittime.
Anthaxia (Haplanthaxia) ignipennis: Presenza marginale al confine occidentale (Alpi Marittime).
Anthaxia (Haplanthaxia) millefolii: Presenza marginale al confine orientale (Trieste).
Anthaxia (Anthaxia) midas: La ssp. *midas* in S solo in Puglia (Gargano).
Anthaxia (Anthaxia) nereis: Endemita sardo-corso.
Anthaxia (Anthaxia) passerinii: In S solo in Toscana.
Anthaxia (Melanthaxia) corsica: La ssp. *corsica* è presente anche in Corsica; la ssp. *maremmana* in S solo sul litorale grossetano.
Anthaxia (Melanthaxia) kochi: Nota solo di Pollino ed Aspromonte.
Chrysobothris chrysostigma: In S solo sul Pollino.
Coroebus oertzeni: Presenza marginale al confine orientale (Carso triestino).
Meliboeus (Meliboeus) gibbicollis: La ssp. *gibbicollis* in N solo nella Liguria occidentale.
Agrilus (Agrilus) elegans: La "var." *teucii*, nota solo delle Alpi Marittime, potrebbe essere una

specie distinta.

Agrilus (Agrilus) litura: In N solo in Piemonte.

Agrilus (Agrilus) roscidus: La "var." *griseocupreus* probabilmente è una buona specie.

Cylindromorphus gallicus: La ssp. *angelinii* è nota soltanto della località tipica (Basilicata: Policoro).

Trachys lichtensteini: In S solo nei dintorni di Roma.

Byrrhidae

Simplocaria (Simplocaria) Stephens, 1830

Simplocaria (Simplocaria) acuminata Erichson, 1847 (N)

Simplocaria (Simplocaria) jugicola Baudi, 1889 (N) (E)

Simplocaria (Simplocaria) nivalis Ganglbauer, 1904 (N) (E)

Simplocaria (Simplocaria) semistriata (Fabricius, 1794) (N, S, Si)

Simplocaria (Trirania) Mroczkowski, 1983

Simplocaria (Trirania) carpathica Hampe, 1853 (N, S)

Morychus Erichson, 1847

Morychus aeneus (Fabricius, 1775) (N, S, Sa)

Pedilophorus Steffahny, 1842

Pedilophorus auratus (Duftschmid, 1825) (N)

Lamprobyrrhulus Ganglbauer, 1902

Lamprobyrrhulus nitidus (Schaller, 1783) (N, S)

Cytilus Erichson, 1847

Cytilus auricomus (Duftschmid, 1825) (N)

Cytilus sericeus (Forster, 1771) (N, S)

Byrrhus (Byrrhus) Linné, 1767

Byrrhus (Byrrhus) arietinus Steffahny, 1842

Byrrhus (Byrrhus) arietinus arietinus Steffahny, 1842 (N, S)

Byrrhus (Byrrhus) arietinus obscurus Fiori, 1948 (S)

Byrrhus (Byrrhus) fasciatus (Forster, 1771) (N, S, Si)

Byrrhus (Byrrhus) numidicus Normand, 1935 (S, Si)

Byrrhus (Byrrhus) pilula (Linné, 1758) (N, S)

Byrrhus (Byrrhus) pustulatus (Forster, 1771)

Byrrhus (Byrrhus) pustulatus pustulatus (Forster, 1771) (N, S)

Byrrhus (Byrrhus) pustulatus minor Fiori, 1948 (N)

Byrrhus (Pseudobyrrhus) Fiori, 1952

Byrrhus (Pseudobyrrhus) glabratus Heer, 1841 (N?) (*)

Byrrhus (Pseudobyrrhus) luniger Germar, 1817 (N)

Byrrhus (Pseudobyrrhus) picipes Duftschmid, 1825

Byrrhus (Pseudobyrrhus) picipes amphibolus Ganglbauer, 1902 (N)

Byrrhus (Pseudobyrrhus) picipes judicarius Ganglbauer, 1904 (N) (E)

Byrrhus (Pseudobyrrhus) picipes orobianus Fiori, 1952 (N) (E)

Byrrhus (Pseudobyrrhus) pilosellus (Villa & Villa, 1833)

Byrrhus (Pseudobyrrhus) pilosellus pilosellus (Villa & Villa, 1833) (N)

Byrrhus (Pseudobyrrhus) pilosellus doderoi (Fiori, 1952) (N) (E)

Byrrhus (Pseudobyrrhus) pilosellus similis (Fiori, 1952) (N) (E)

Byrrhus (Seminolus) Mulsant & Rey, 1869

Byrrhus (Seminolus) alpinus Gory, 1829 (N?) (*)

Byrrhus (Seminolus) gigas Fabricius, 1787 (N)

Byrrhus (Seminolus) signatus Panzer, 1809 (N)

Porcinolus Mulsant & Rey, 1869

Porcinolus murinus (Fabricius, 1794) (N, S)

Curimus Erichson, 1846

Curimus erinaceus (Duftschmid, 1825) (N, S)

Curimus lariensis (Villa & Villa, 1833) (N, S)

Curimus montenegrinus Reitter, 1881 (S?) (*)

Curimus petraeus Gredler, 1863 (N)

Chaetophora Kirby & Spence, 1823

Chaetophora spinosa (Rossi, 1794) (N, S, Sa)

Curimopsis Ganglbauer, 1902

Curimopsis austriaca (Franz, 1967) (N)

Curimopsis carniolica (Ganglbauer, 1902) (N)

Curimopsis franzi Paulus, 1973 (N) (E)

Curimopsis incisa (Obenberger, 1916) (S)

Curimopsis italica (Franz, 1967) (N)

Curimopsis maritima (Marsham, 1802) (N, S, Si, Sa)

Curimopsis monticola (Franz, 1967) (S)

Curimopsis nigrita (Palm, 1934) (N)

Curimopsis paleata (Erichson, 1846) (N, S)

Curimopsis palmi (Franz, 1967)

Curimopsis palmi palmi (Franz, 1967) (N)
Curimopsis palmi vicina (Franz, 1967) (N, S)
Curimopsis provencalis (Franz, 1967) (N)
Curimopsis setigera (Illiger, 1798) (N, S) (*)
Curimopsis setosa (Waltl, 1838) (N)
Curimopsis vicentina Paulus, 1973 (N) (E)

Note

Byrrhus (Pseudobyrrhus) glabratus: Presenza dubbia, marginale sul confine.
Byrrhus (Seminolus) alpinus: Presenza dubbia, le antiche citazioni meritano conferma.
Curimus montenegrinus: Presenza dubbia, segnalato con riserva degli Abruzzi.
Curimopsis setigera: Presenza dubbia, le antiche citazioni meritano conferma.

Byturidae

Byturus Latreille, 1796

Byturus ochraceus (Scriba, 1790) (N, S)
Byturus tomentosus (Degeer, 1774) (N, S)

Cantharidae

Podabrus (Podabrus) Westwood, 1838

Podabrus (Podabrus) alpinus (Paykull, 1798) (N)

Podabrus (Dichelotarsus) Motschulsky, 1860

Podabrus (Dichelotarsus) obscuripes Sahlberg, 1871 (N)
Podabrus (Dichelotarsus) procerulus Kiesenwetter, 1860 (N, S)

Cantharis (Ancistronycha) Märkel, 1852

Cantharis (Ancistronycha) abdominalis Fabricius, 1798 (N)
Cantharis (Ancistronycha) erichsoni Bach, 1852 (N)
Cantharis (Ancistronycha) rufidens Marseul, 1864 (Sa) (*)
Cantharis (Ancistronycha) violacea Paykull, 1798 (N, S)

Cantharis (Cantharis) Linnaeus, 1758

Cantharis (Cantharis) annularis Ménériés, 1836 (N)
Cantharis (Cantharis) bicolor Herbst, 1784 (N)
Cantharis (Cantharis) convexicollis Fairmaire, 1875 (Si?)
Cantharis (Cantharis) cornix Abeille, 1869 (N) (E)
Cantharis (Cantharis) corvina Moscardini, 1962 (S) (E) (*)

Cantharis (Cantharis) decipiens Baudi, 1871 (N, S, Si)
Cantharis (Cantharis) dissipata Gemminger, 1870 (Sa) (*)
Cantharis (Cantharis) europea Pic, 1921 (Si) (E)
Cantharis (Cantharis) falzonii Fiori, 1914 (S)
Cantharis (Cantharis) figurata Mannerheim, 1843 (N, S)
Cantharis (Cantharis) fulvicollis Fabricius, 1792 (N, S)
Cantharis (Cantharis) fusca Linnaeus, 1758 (N, S)
Cantharis (Cantharis) fuscipennis (Mulsant, 1862) (S, Si) (E)
Cantharis (Cantharis) gemina Dahlgren, 1974 (N)
Cantharis (Cantharis) ictaria Fiori, 1914 (S) (E) (*)
Cantharis (Cantharis) inculta Gené, 1839 (Sa) (*)
Cantharis (Cantharis) italica Fiori, 1914 (S) (E)
Cantharis (Cantharis) lateralis Linnaeus, 1767 (N, S)
Cantharis (Cantharis) livida Linnaeus, 1758
 Cantharis (Cantharis) livida livida Linnaeus, 1758 (N, S, Si)
 Cantharis (Cantharis) livida sicala Bourgeois, 1893 (S, Si)
Cantharis (Cantharis) liburnica Depoli, 1912 (N, S)
Cantharis (Cantharis) longicollis Kiesenwetter, 1859 (N?) (*)
Cantharis (Cantharis) lucens Moscardini, 1967 (E)
 Cantharis (Cantharis) lucens lucens Moscardini, 1967 (S)
 Cantharis (Cantharis) lucens fumoso thorax Moscardini, 1967 (Si)
Cantharis (Cantharis) merula Moscardini, 1962 (S) (E) (*)
Cantharis (Cantharis) monacha Moscardini, 1962 (S) (E) (*)
Cantharis (Cantharis) montana Stierlin, 1889 (N)
Cantharis (Cantharis) nigricans O.F. Müller, 1776 (N, S)
Cantharis (Cantharis) obscura Linnaeus, 1758 (N, S)
Cantharis (Cantharis) pagana Rosenhauer, 1847 (N)
Cantharis (Cantharis) paganettii (Flach, 1907) (S) (E) (*)
Cantharis (Cantharis) pallida Goeze, 1777 (N, S)
Cantharis (Cantharis) paludosa Fallén, 1807 (N, S)
Cantharis (Cantharis) pellucida Fabricius, 1792
 Cantharis (Cantharis) pellucida pellucida Fabricius, 1792 (N)
 Cantharis (Cantharis) pellucida rauterbergi Reitter, 1893 (S)
Cantharis (Cantharis) peninsularis Fiori, 1914 (S)
Cantharis (Cantharis) praecox Gené, 1836 (Si, Sa)
Cantharis (Cantharis) pulicaria Fabricius, 1781 (N)
Cantharis (Cantharis) puncticollis Levrat, 1857 (Si?)
Cantharis (Cantharis) quadripunctata O.F. Müller, 1776 (N)
Cantharis (Cantharis) rufa Linnaeus, 1758 (N)
Cantharis (Cantharis) rustica Fallén, 1807 (N, S)
Cantharis (Cantharis) sicala Pic, 1906 (Si) (E)
Cantharis (Cantharis) sudetica Letzner, 1846 (N)
Cantharis (Cantharis) torretassoi Wittmer, 1935 (S) (E) (*)
Cantharis (Cantharis) tristis Fabricius, 1798 (N, S, Si)
Cantharis (Cantharis) versicolor Baudi, 1871 (S) (E)

Cantharis (Metacantharis) Bourgeois, 1886

Cantharis (Metacantharis) discoidea Ahrens, 1812 (N)
Cantharis (Metacantharis) haemorrhoidalis Fabricius, 1792 (N, S, Si)

Cantharomorphus Fiori, 1914

Cantharomorphus longiceps Fiori, 1914 (Si) (E) (*)

Rhagonycha (Armidia) Mulsant, 1863

Rhagonycha (Armidia) signata Germar, 1814 (N)

Rhagonycha (Rhagonycha) Eschscholtz, 1830

Rhagonycha (Rhagonycha) angulatocollis Costa, 1858 (S) (E)
Rhagonycha (Rhagonycha) atra (Linnaeus, 1767) (N)
Rhagonycha (Rhagonycha) banatica (Rosenhauer, 1847) (N?)
Rhagonycha (Rhagonycha) chlorotica Gené, 1839 (Si, Sa)
Rhagonycha (Rhagonycha) elongata (Fallén, 1807) (N)
Rhagonycha (Rhagonycha) fugax Mannerheim, 1843 (N)
Rhagonycha (Rhagonycha) fulva (Scopoli, 1763) (N, S, Si, Sa)
Rhagonycha (Rhagonycha) improvisa Dahlgren, 1976 (N, S)
Rhagonycha (Rhagonycha) lignosa (O.F. Müller, 1764) (N, S)
Rhagonycha (Rhagonycha) limbata C.G. Thomson, 1864 (N?)
Rhagonycha (Rhagonycha) lutea (O.F. Müller, 1764) (N, S)
Rhagonycha (Rhagonycha) maculicollis Märkel, 1851
 Rhagonycha (Rhagonycha) maculicollis maculicollis Märkel, 1851 (N)
 Rhagonycha (Rhagonycha) maculicollis pedemontana Baudi, 1871 (N)
Rhagonycha (Rhagonycha) maritima Pic, 1902 (N)
Rhagonycha (Rhagonycha) milleri Kiesenwetter, 1860 (N)
Rhagonycha (Rhagonycha) nitida Baudi, 1859 (Sa)
Rhagonycha (Rhagonycha) nigriceps Walzl, 1838 (N, S)
Rhagonycha (Rhagonycha) nigricollis Motschulsky, 1849 (N?)
Rhagonycha (Rhagonycha) nigripes Redtenbacher, 1842 (N, S)
Rhagonycha (Rhagonycha) nigratarsis Brullé, 1832 (S, Si)
Rhagonycha (Rhagonycha) nigrosuta Fiori, 1899 (S) (E)
Rhagonycha (Rhagonycha) testacea (Linnaeus, 1758) (N)
Rhagonycha (Rhagonycha) translucida (Krynicky, 1832) (N)

Cratosilis Motschulsky, 1860

Cratosilis denticollis (Schummel, 1843) (N, S)
Cratosilis distinguenda (Baudi, 1859) (N)
Cratosilis laeta (Fabricius, 1792) (N, S)
Cratosilis sicala (Marseul, 1864) (S, Si) (E)

Podistra (Absidia) Mulsant, 1863

Podistra (Absidia) pilosa (Paykull, 1798) (N)

Podistra (Absidia) prolixa (Märkel, 1851) (N)
Podistra (Absidia) rufotestacea (Letzner, 1844) (N?)

Podistra (Hemipodistra) Ganglbauer, 1922

Podistra (Hemipodistra) birnbacheri Krauss, 1894 (N)

Podistra (Podistra) Motschulsky, 1839

Podistra (Podistra) rupicola Kiesenwetter, 1863 (N)

Silis Charpentier, 1825

Silis neapolitana Marseul, 1864 (S) (E) (*)
Silis nitidula (Fabricius, 1792) (N)
Silis ruficollis (Fabricius, 1775) (N)

Malthinus Latreille, 1806

Malthinus armipes Kiesenwetter, 1871 (Sa) (E)
Malthinus balteatus Suffrian, 1851 (N, S, Si, Sa)
Malthinus bigliani Fiori, 1915 (N) (*)
Malthinus biguttatus (Linnaeus, 1758) (N)
Malthinus bilineatus Kiesenwetter, 1852 (N)
Malthinus calaber Pic, 1909 (S) (E) (*)
Malthinus deceptor Baudi, 1893 (S, Si) (E)
Malthinus devillei Abeille, 1898 (N) (*)
Malthinus dryocoetes Rottenberg, 1870 (Si) (E)
Malthinus facialis C.G. Thomson, 1864 (N)
Malthinus fasciatus (G.A. Olivier, 1790) (N, S, Sa?)
Malthinus flaveolus (Herbst, 1786) (N)
Malthinus frontalis (Marsham, 1802) (N, S)
Malthinus garganicus Fiori, 1915 (S) (E) (*)
Malthinus geniculatus Kiesenwetter, 1859 (S, Si)
Malthinus glabellus Kiesenwetter, 1852 (N, S)
Malthinus inflavus Marseul, 1878 (Si) (*)
Malthinus insignipes Pic, 1907 (S) (E)
Malthinus lacteifrons Marseul, 1878 (Si?)
Malthinus marginicollis Ganglbauer, 1906 (Si) (E)
Malthinus neapolitanus Pic, 1905 (S)
Malthinus pallidipes Fairmaire, 1884 (Si) (*)
Malthinus pseudobiguttatus Constantin, 1975 (N) (*)
Malthinus raffrayi Pic, 1910 (S) (E) (*)
Malthinus reflexus Wittmer, 1974 (N, S) (E)
Malthinus rubricollis Baudi, 1859 (N, S)
Malthinus scapularis Marseul, 1877 (Si) (E)
Malthinus scriptus Kiesenwetter, 1851 (N, S, Si, Sa)
Malthinus seriepunctatus Kiesenwetter, 1851 (N, S, Si, Sa)

Malthinus sicanus Kiesenwetter, 1871 (Si) (E)
Malthinus sordidus Kiesenwetter, 1871 (S) (E)
Malthinus striatulus Mulsant, 1862 (S) (*)
Malthinus tibiellus Pic, 1918 (S) (E) (*)
Malthinus versatilis Delkeskamp, 1939 (Si) (E)
Malthinus verticalis Pic, 1930 (Si) (E)

Malchinus Kiesenwetter, 1863

Malchinus nigrinus Schaufuss, 1866 (N?) (*)
Malchinus sinuaticollis (Kiesenwetter, 1852) (N) (*)
Malchinus tunicatus Kiesenwetter, 1863 (N, S) (*)

Malachidius Motschulsky, 1859

Malachidius laticollis (Pic, 1900) (Si)

Malthodes Kiesenwetter, 1852

Malthodes aemulus Kiesenwetter, 1861 (N)
Malthodes alpicola Kiesenwetter, 1852 (N)
Malthodes atratus Baudi, 1859
 Malthodes atratus samniticus (Fiori, 1908) (S) (E)
Malthodes berberidis Kiesenwetter, 1866 (Sa?)
Malthodes bertolinii Fiori, 1905 (N)
Malthodes bifurcatus Kiesenwetter, 1852 (Si) (E)
Malthodes boicus Kiesenwetter, 1863 (N, S)
Malthodes brevicollis (Paykull, 1798) (N)
Malthodes brevicornis (Fiori, 1906) (N, S) (E)
Malthodes brevifurcatus Pic, 1912 (N) (*)
Malthodes brevistylus (Fiori, 1906) (S)
Malthodes caudatomimicus Wittmer, 1970 (N)
Malthodes chelifer (Kiesenwetter, 1851) (N)
Malthodes cognatus A. Costa, 1858 (S) (E)
Malthodes conicus Wittmer, 1970 (N) (E) (*)
Malthodes cordiger Kiesenwetter, 1863 (Sa) (*)
Malthodes cordigerioides Pic, 1915 (S) (E)
Malthodes corsicus Kiesenwetter, 1871 (Sa) (*)
Malthodes cruciatus Baudi, 1859 (S, Si?, Sa) (*)
Malthodes cyphonurus Kiesenwetter, 1861 (N)
Malthodes debilis Kiesenwetter, 1852 (N)
Malthodes discicollis Baudi, 1859 (N, Sa)
Malthodes dispar (Germar, 1824) (N, S)
Malthodes doderoi (Bourgeois, 1903) (Sa) (E)
Malthodes ensifer Kiesenwetter, 1871 (Sa) (*)
Malthodes facetus Kiesenwetter, 1863 (N)
Malthodes fiorii Ganglbauer, 1906 (N)
Malthodes flavoguttatus Kiesenwetter, 1852 (N)

Malthodes freyi Wittmer, 1939 (S) (E) (*)
Malthodes fuscus (Waltl, 1838) (N)
Malthodes ganglbaueri (Fiori, 1906) (N, S) (E)
Malthodes graciosus Ganglbauer, 1906 (S, Si) (E)
Malthodes guttifer Kiesenwetter, 1852 (N)
Malthodes hamatus (Kiesenwetter, 1851) (Sa) (*)
Malthodes hastulifer Kiesenwetter, 1871 (Si) (E)
Malthodes hexacanthus Kiesenwetter, 1852 (N, S)
Malthodes icaricus Wittmer, 1940 (N) (E) (*)
Malthodes ilvensis Holdhaus, 1923 (S) (E) (*)
Malthodes laciniatus Kiesenwetter, 1852 (Si, Sa)
Malthodes latialis (Fiori, 1906) (S) (E)
Malthodes lautus Kiesenwetter, 1852 (N)
Malthodes lobatus Kiesenwetter, 1852 (N, S)
Malthodes lokveanus Wittmer, 1970 (N)
Malthodes manubriatus Kiesenwetter, 1863 (N, S)
Malthodes marginatus (Latreille, 1806) (N, S)
Malthodes mendax Kiesenwetter, 1871 (Sa) (*)
Malthodes minimus (Linnaeus, 1758) (N)
Malthodes misellus Kiesenwetter, 1852 (N)
Malthodes montanus Kiesenwetter, 1863 (N)
Malthodes murgianus Pic, 1914 (S) (E) (*)
Malthodes mysticus Kiesenwetter, 1852 (N, S)
Malthodes paradoxus Hicker, 1915 (N) (E) (*)
Malthodes parthenias Kiesenwetter, 1871 (S, Si) (E) (*)
Malthodes partipygus Wittmer, 1939 (S) (E)
Malthodes penninus Baudi, 1871 (*)
 Malthodes penninus icaricus Wittmer, 1940 (N)
 Malthodes penninus penninus Baudi, 1871 (N)
Malthodes picticollis Kiesenwetter, 1871 (Si)
Malthodes pinnatus Kiesenwetter, 1871 (S, Si?) (E)
Malthodes pirazzolii (Pic, 1922) (N) (E) (*)
Malthodes procerulus Kiesenwetter, 1852 (N)
Malthodes pumilus (Brébisson, 1835) (N)
Malthodes rangonii Fiori, 1912 (N) (E) (*)
Malthodes raymondi Kiesenwetter, 1871 (Sa) (E)
Malthodes recurvus (Baudi, 1871) (N)
Malthodes ruralis Kiesenwetter, 1871 (Si) (E)
Malthodes sardous (Motschulsky, 1852) (Sa) (E)
Malthodes setifer Baudi, 1871 (N)
Malthodes sculus Kiesenwetter, 1852 (N, S, Si)
Malthodes simplex Kiesenwetter, 1872 (S) (E)
Malthodes solarii Pic, 1912 (S) (E) (*)
Malthodes spathiifer Kiesenwetter, 1852 (N, S)
Malthodes spectabilis Kiesenwetter, 1871 (S) (E)
Malthodes spretus Kiesenwetter, 1852 (N, S)
Malthodes stolzi Hicker, 1915 (N) (E) (*)
Malthodes subductus Kiesenwetter, 1863 (N)

Malthodes subsericeus Kiesenwetter, 1852 (N)
Malthodes tenax Kiesenwetter, 1871 (Sa) (*)
Malthodes tetraglyphis Hicker, 1953 (N) (E) (*)
Malthodes transeuropaeus Wittmer, 1970 (N)
Malthodes trifurcatus Kiesenwetter, 1852
 Malthodes trifurcatus atramentarius Kiesenwetter, 1852 (N)
 Malthodes trifurcatus peyerimhoffi (Bourgeois, 1900) (N)
 Malthodes trifurcatus trifurcatus Kiesenwetter, 1852 (N)
Malthodes umbrosus Kiesenwetter, 1871 (S) (E)
Malthodes vincens Gredler, 1870 (N) (E)
Malthodes zangherii Hicker, 1958 (S) (E) (*)

Note

Cantharis (Ancistronycha) rufidens: Endemica di Corsica e Sardegna.
Cantharis (Cantharis) corvina: Nota dei Monti Sibillini.
Cantharis (Cantharis) dissipata: Endemica di Corsica e Sardegna.
Cantharis (Cantharis) ictaria: Nota dalla Sila.
Cantharis (Cantharis) inculta: Endemica di Corsica e Sardegna.
Cantharis (Cantharis) longicollis: Dubitativamente in N al confine orientale.
Cantharis (Cantharis) merula: Nota dal Massiccio del Pollino.
Cantharis (Cantharis) monacha: Nota dall'Appennino Tosco-Emiliano.
Cantharis (Cantharis) paganettii: Nota dalla Calabria.
Cantharis (Cantharis) torretassoii: Nota dal Massiccio del Pollino.
Cantharomorphus longiceps: Nota dalle Madonie.
Silis neapolitana: Nota dalla regione di Napoli.
Malthinus bigliani: Nota dal Piemonte (Val Pesio).
Malthinus calaber: Nota dalla Calabria.
Malthinus devillei: Presente in N al confine occidentale.
Malthinus garganicus: Nota dalla Puglia (Gargano).
Malthinus inflavus: Presente in Si solo a Pantelleria.
Malthinus pallidipes: Presente in Si solo a Pantelleria.
Malthinus pseudobiguttatus: Presente in N al confine occidentale.
Malthinus raffrayi: Nota dal Lazio (Roma).
Malthinus striatulus: Specie di Francia meridionale, indicata dalla Basilicata (Pollino).
Malthinus tibiellus: Nota dalla Calabria.
Malchinus nigrinus: Dubitativamente in N al confine orientale.
Malchinus sinuaticollis: In N presso il confine orientale.
Malchinus tunicatus: Presente in N nel settore sud-occidentale e in S sull'Appennino Tosco Emiliano.
Malthodes brevifurcatus: Indicata in N del confine orientale.
Malthodes conicus: Nota dal Veneto (Colli Euganei).
Malthodes cordiger: Endemica di Corsica e Sardegna.
Malthodes corsicus: Endemica di Corsica e Sardegna.
Malthodes cruciatus: Presente in S solo in Toscana (Arcipelago Toscano).
Malthodes ensifer: Endemica di Corsica e Sardegna.
Malthodes freyi: Nota dalla Calabria.
Malthodes hamatus: Endemica di Corsica e Sardegna.

Malthodes icaricus: Nota dal Trentino Alto Adige.
Malthodes ilvensis: Endemica dell' Arcipelago Toscano (Isola d'Elba).
Malthodes mendax: Endemica di Corsica e Sardegna.
Malthodes murgianus: Nota dalla Puglia.
Malthodes paradoxus: Nota dal Friuli Venezia Giulia (Alpi Giulie).
Malthodes parthenias: In S solo Appennino Tosco Emiliano.
Malthodes penninus: La ssp. *icaricus* presente in N solo al confine con l'Austria.
Malthodes pirazzolii: Nota solo dall'Emilia.
Malthodes rangonii: Nota solo dall'Emilia (Appennino modenese).
Malthodes solarii: Nota dalla Calabria.
Malthodes stolzi: Nota dalla Lombardia (Prealpi Orobie).
Malthodes tenax: Endemica di Corsica e Sardegna.
Malthodes tetraglyphis: Nota dal Trentino Alto Adige.
Malthodes zangherii: Nota dalla Toscana (Appennino Tosco Emiliano).

Carabidae

Cicindela (Cicindela) Linné, 1758

Cicindela (Cicindela) campestris Linné, 1758
 Cicindela (Cicindela) campestris campestris Linné, 1758 (N, S)
 Cicindela (Cicindela) campestris corsicana Roeschke, 1891 (Sa)
 Cicindela (Cicindela) campestris saphyrina Gené, 1836 (Sa)
 Cicindela (Cicindela) campestris siciliana Luigioni, 1923 (Si)
Cicindela (Cicindela) gallica Brullé, 1834 (N)
Cicindela (Cicindela) hybrida Linné, 1758
 Cicindela (Cicindela) hybrida riparia Dejean, 1822 (N, S)
Cicindela (Cicindela) majalis Mandl, 1936 (N, S) (E)
Cicindela (Cicindela) maroccana Fabricius, 1801
 Cicindela (Cicindela) maroccana pseudomaroccana Roeschke, 1891 (N)
Cicindela (Cicindela) silvicola Dejean, 1822 (N, S)

Cylindera (Cylindera) Westwood, 1831

Cylindera (Cylindera) germanica (Linné, 1758)
 Cylindera (Cylindera) germanica germanica (Linné, 1758) (N, S)
 Cylindera (Cylindera) germanica muelleri Magistretti, 1965 (S, Si?)

Cylindera (Cicindina) Adam & Merkl, 1986

Cylindera (Cicindina) arenaria (Fuesslin, 1775)
Cylindera (Cicindina) trisignata (Dejean, 1822) (N, S, Si)
 Cylindera (Cicindina) trisignata trisignata (Dejean, 1822) (N, S, Sa)
 Cylindera (Cicindina) trisignata siciliensis (Horn, 1891) (Si)

Cassolaia Wiesner, 1985

Cassolaia maura (Linné, 1758) (S, Si)

Cephalota (Taenidia) Rivalier, 1950

Cephalota (Taenidia) circumdata (Dejean, 1822)

Cephalota (Taenidia) circumdata circumdata (Dejean, 1822) (S)

Cephalota (Taenidia) circumdata imperialis (Klug, 1834) (Si, Sa)

Cephalota (Taenidia) circumdata leonschaeferi (Cassola, 1970) (S)

Cephalota (Taenidia) litorea (Forsk., 1775)

Cephalota (Taenidia) litorea goudoti (Dejean, 1829) (Si, Sa)

Myriochile (Myriochile) Motschulsky, 1862

Myriochile (Myriochile) melancholica (Fabricius, 1798) (S, Si, Sa)

Lophyra (Lophyra) Motschulsky, 1862

Lophyra (Lophyra) flexuosa (Fabricius, 1787)

Lophyra (Lophyra) flexuosa circumflexa (Dejean, 1831) (Si)

Lophyra (Lophyra) flexuosa flexuosa (Fabricius, 1787) (N?, S?)

Lophyra (Lophyra) flexuosa sardea (Dejean, 1831) (Sa)

Lophyridia Jeannel, 1946

Lophyridia aphrodisia (Baudi, 1864)

Lophyridia aphrodisia panormitana (Ragusa, 1906) (Si)

Lophyridia littoralis (Fabricius, 1787)

Lophyridia littoralis fiorii (Grandi, 1906) (Sa)

Lophyridia littoralis nemoralis (Olivier, 1790) (N, S, Si)

Lophyridia lunulata (Fabricius, 1781) (Si) (*)

Paussus (Edaphopaussus) Kolbe, 1920

Paussus (Edaphopaussus) favieri Fairmaire, 1851 (Si, Sa?)

Calosoma Weber, 1801

Calosoma inquisitor (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)

Calosoma sycophanta (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)

Campalita Motschulsky, 1865

Campalita algerica (Géhin, 1885) (S, Si)

Campalita auropunctata (Herbst, 1782) (N)

Campalita maderae (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa)

Campalita olivieri (Dejean, 1831) (Si) (*)

Carabus (Limnocarabus) Géhin, 1876

Carabus (Limnocarabus) clathratus Linné, 1761
Carabus (Limnocarabus) clathratus antonellii Luigioni, 1921 (N, S)
Carabus (Limnocarabus) clathratus auraniensis Müller G., 1902 (N)

***Carabus (Carabus)* Linné, 1758**

Carabus (Carabus) granulatus Linné, 1758
Carabus (Carabus) granulatus interstitialis Duftschmid, 1812 (N, S)
Carabus (Carabus) arvensis Herbst, 1784
Carabus (Carabus) arvensis noricus Sokolar, 1910 (N)
Carabus (Carabus) arvensis sylvaticus Dejean, 1826 (N)
Carabus (Carabus) arvensis venetianus Bernau, 1914 (N)
Carabus (Carabus) catenulatus Scopoli, 1763
Carabus (Carabus) catenulatus catenulatus Scopoli, 1763 (N)
Carabus (Carabus) italicus Dejean, 1826 (*)
Carabus (Carabus) italicus italicus Dejean, 1826 (N, S)
Carabus (Carabus) italicus rostagnoi Luigioni, 1904 (S)

***Carabus (Eurycarabus)* Géhin, 1885**

Carabus (Eurycarabus) famini Dejean, 1826
Carabus (Eurycarabus) famini famini Dejean, 1826 (Si)
Carabus (Eurycarabus) genei Gené, 1839 (Sa)

***Carabus (Morphocarabus)* Géhin, 1885**

Carabus (Morphocarabus) monilis Fabricius, 1792 (N)

***Carabus (Archicarabus)* Seidlitz, 1887**

Carabus (Archicarabus) alysidotus Illiger, 1798 (N, S) (*)
Carabus (Archicarabus) rossii Dejean, 1826 (N, S, Si, Sa?) (E)
Carabus (Archicarabus) monticola Dejean, 1826 (N)
Carabus (Archicarabus) nemoralis Müller O.F., 1764 (N)
Carabus (Archicarabus) montivagus Palliardi, 1825 (*)
Carabus (Archicarabus) montivagus velebiticus Hampe, 1850 (N)

***Carabus (Autocarabus)* Seidlitz, 1887**

Carabus (Autocarabus) cancellatus Illiger, 1798 (*)
Carabus (Autocarabus) cancellatus emarginatus Duftschmid, 1812 (N, S)
Carabus (Autocarabus) vagans Olivier, 1795 (N)

***Carabus (Orinocarabus)* Kraatz, 1878**

Carabus (Orinocarabus) putzeysianus Géhin, 1876
Carabus (Orinocarabus) putzeysianus germanae Casale & Cavazzuti, 1976 (N)

Carabus (Orinocarabus) putzeysianus omensis Born, 1901 (N)
Carabus (Orinocarabus) putzeysianus pedemontanus Ganglbauer, 1892 (N)
Carabus (Orinocarabus) putzeysianus putzeysianus Géhin, 1876 (N)
Carabus (Orinocarabus) putzeysianus raynaudianus Deuve & 1977 (N)
Carabus (Orinocarabus) fairmairei Thomson, 1875
Carabus (Orinocarabus) fairmairei fairmairei Thomson, 1875 (N)
Carabus (Orinocarabus) fairmairei pelvicus Cavazzuti, 1973 (N)
Carabus (Orinocarabus) fairmairei stecki Born, 1902 (N)
Carabus (Orinocarabus) cenisius Kraatz, 1878
Carabus (Orinocarabus) cenisius cenisius Kraatz, 1878 (N)
Carabus (Orinocarabus) cenisius ceresiacus Born, 1896 (N)
Carabus (Orinocarabus) cenisius fenestrellanus Beuthin, 1899 (N)
Carabus (Orinocarabus) heteromorphus Daniel K., 1896 (N) (E)
Carabus (Orinocarabus) latreilleanus Csiki, 1927 (N)
Carabus (Orinocarabus) concolor Fabricius, 1792 (N)
Carabus (Orinocarabus) lepontinus Born, 1908 (N) (E)
Carabus (Orinocarabus) silvestris Panzer, 1793 (N)
Carabus (Orinocarabus) castanopterus Villa & Villa, 1833 (N)
Carabus (Orinocarabus) adamellicola Ganglbauer, 1904 (N) (E)
Carabus (Orinocarabus) bertolinii Kraatz, 1878 (N) (E)
Carabus (Orinocarabus) alpestris Sturm, 1815
Carabus (Orinocarabus) alpestris dolomitanus Mandl, 1956 (N)
Carabus (Orinocarabus) alpestris hoppei Germar, 1824 (N)
Carabus (Orinocarabus) carinthiacus Sturm, 1815 (N)
Carabus (Orinocarabus) linnei Panzer, 1812 (N)

***Carabus (Oreocarabus)* Géhin, 1876**

Carabus (Oreocarabus) hortensis Linné, 1758 (N)
Carabus (Oreocarabus) preslii Dejean, 1830
Carabus (Oreocarabus) preslii neumeyeri Schaum, 1856 (S)
Carabus (Oreocarabus) glabratus Paykull, 1790 (N, S) (*)

***Carabus (Pachystus)* Motschulsky, 1865**

Carabus (Pachystus) cavernosus Frivaldsky, 1837
Carabus (Pachystus) cavernosus variolatus Costa, 1839 (S)

***Carabus (Tomocarabus)* Reitter, 1896**

Carabus (Tomocarabus) convexus Fabricius, 1775
Carabus (Tomocarabus) convexus convexus Fabricius, 1775 (N, S, Si)
Carabus (Tomocarabus) convexus dilatatus Dejean, 1826 (N)

***Carabus (Mesocarabus)* Thomson, 1875**

Carabus (Mesocarabus) problematicus Herbst, 1786
Carabus (Mesocarabus) problematicus inflatus Kraatz, 1878 (N)

Carabus (Mesocarabus) problematicus problematicus Herbst, 1786 (N)

Carabus (Hygrocarabus) Thomson, 1875

Carabus (Hygrocarabus) nodulosus Creutzer, 1799 (N) (*)

Carabus (Platycarabus) Morawitz, 1886

Carabus (Platycarabus) bonellii Dejean, 1826

Carabus (Platycarabus) bonellii bonellii Dejean, 1826 (N)

Carabus (Platycarabus) bonellii lucens Schaum, 1856 (N)

Carabus (Platycarabus) cychroides Baudi, 1860 (N) (E)

Carabus (Platycarabus) fabricii Panzer, 1812 (N)

Carabus (Platycarabus) creutzeri Fabricius, 1801

Carabus (Platycarabus) creutzeri creutzeri Fabricius, 1801 (N)

Carabus (Platycarabus) creutzeri kircheri Germar, 1824 (N)

Carabus (Platycarabus) creutzeri baldensis Schaum, 1856 (N)

Carabus (Platycarabus) irregularis Fabricius, 1792

Carabus (Platycarabus) irregularis irregularis Fabricius, 1792 (N)

Carabus (Chaetocarabus) Thomson, 1875

Carabus (Chaetocarabus) intricatus Linné, 1761 (N)

Carabus (Chaetocarabus) lefebvrei Dejean, 1826 (E) (*)

Carabus (Chaetocarabus) lefebvrei bayardi Solier, 1835 (S) (E)

Carabus (Chaetocarabus) lefebvrei lefebvrei Dejean, 1826 (S, Si) (E)

Carabus (Procrustes) Bonelli, 1809

Carabus (Procrustes) coriaceus Linné, 1758

Carabus (Procrustes) coriaceus coriaceus Linné, 1758 (N, S, Si, Sa)

Carabus (Procrustes) coriaceus mediterraneus Born, 1906 (S)

Carabus (Megodontus) Solier, 1848

Carabus (Megodontus) violaceus Linné, 1758

Carabus (Megodontus) violaceus picens Villa, 1838 (N, S)

Carabus (Megodontus) germari Sturm, 1815

Carabus (Megodontus) germari fiorii Born, 1901 (N)

Carabus (Megodontus) germari germari Sturm, 1815 (N)

Carabus (Megodontus) germari neesi Hoppe & Hornschuch, 1825 (N)

Carabus (Megodontus) caelatus Fabricius, 1801

Carabus (Megodontus) caelatus caelatus Fabricius, 1801 (N)

Carabus (Megodontus) caelatus schreiberi Kraatz, 1877 (N)

Carabus (Procerus) Dejean, 1826

Carabus (Procerus) gigas Creutzer, 1799 (N)

Carabus (Macrothorax) Desmarest, 1850

- Carabus (Macrothorax) morbillosus* Fabricius, 1792 (*)
- Carabus (Macrothorax) morbillosus alternans* Palliardi, 1825 (S, Si)
- Carabus (Macrothorax) morbillosus morbillosus* Fabricius, 1792 (S, Si, Sa)
- Carabus (Macrothorax) planatus* Chaudoir, 1843 (Si) (E)

Carabus (Chrysocarabus) Thomson, 1875

- Carabus (Chrysocarabus) auronitens* Fabricius, 1792
- Carabus (Chrysocarabus) auronitens auronitens* Fabricius, 1792 (N)
- Carabus (Chrysocarabus) auronitens kraussi* Lapouge, 1898 (N)
- Carabus (Chrysocarabus) olympiae* Sella, 1855 (N) (E)
- Carabus (Chrysocarabus) solieri* Dejean, 1826
- Carabus (Chrysocarabus) solieri clairi* Géhin, 1885 (N)
- Carabus (Chrysocarabus) solieri liguranus* Breuning, 1936 (N)
- Carabus (Chrysocarabus) solieri solieri* Dejean, 1826 (N)

Cychrus Fabricius, 1794

- Cychrus angustatus* Hoppe, 1825 (N)
- Cychrus cylindricollis* Pini, 1871 (N) (E)
- Cychrus schmidtii* Chaudoir, 1837 (N)
- Cychrus caraboides* (Linné, 1758)
- Cychrus caraboides caraboides* (Linné, 1758) (N, S)
- Cychrus caraboides costai* Emery, 1872 (S)
- Cychrus italicus* Bonelli, 1809 (N, S)
- Cychrus attenuatus* (Fabricius, 1792) (*)
- Cychrus attenuatus attenuatus* (Fabricius, 1792) (N, S)
- Cychrus attenuatus latialis* Luigioni, 1922 (S)
- Cychrus cordicollis* Chaudoir, 1835 (N)
- Cychrus grajus* Daniel & Daniel, 1898 (N)
- Cychrus angulicollis* Sella, 1874 (N)

Leistus (Pogonophorus) Latreille, 1802

- Leistus (Pogonophorus) magnicollis* Motschulsky, 1865 (N?) (*)
- Leistus (Pogonophorus) montanus* Stephens, 1828
- Leistus (Pogonophorus) montanus rhaeticus* Heer, 1837 (N)
- Leistus (Pogonophorus) parvicollis* Chaudoir, 1869 (N, S)
- Leistus (Pogonophorus) spinibarbis* (Fabricius, 1775)
- Leistus (Pogonophorus) spinibarbis fiorii* Lutshnik, 1913 (S, Si)
- Leistus (Pogonophorus) spinibarbis rufipes* Chaudoir, 1843 (N)
- Leistus (Pogonophorus) spinibarbis spinibarbis* (Fabricius, 1775) (N, S, Sa)
- Leistus (Pogonophorus) glacialis* Fiori, 1899 (S) (E)
- Leistus (Pogonophorus) apfelbecki* Ganglbauer, 1892 (N)
- Leistus (Pogonophorus) apfelbecki imitator* Breit, 1914 (N)

Leistus (Pogonophorus) ovipennis Chaudoir, 1876 (N) (E)
Leistus (Pogonophorus) punctatissimus Bret, 1914 (N) (E)
Leistus (Pogonophorus) rufomarginatus (Duftschmid, 1812) (N, S, Si)

***Leistus (Sardoleistus)* Perrault, 1980**

Leistus (Sardoleistus) sardous Baudi, 1883 (N, S, Si, Sa)

***Leistus (Leistus)* Fröhlich, 1799**

Leistus (Leistus) ferrugineus (Linné, 1758) (N, S)
Leistus (Leistus) terminatus (Hellwig in Panzer, 1793) (N)
Leistus (Leistus) piceus Fröhlich, 1799 (N)
Leistus (Leistus) crenatus Fairmaire, 1855 (Si)
Leistus (Leistus) fulvibarbis Dejean, 1826
 Leistus (Leistus) fulvibarbis fulvibarbis Dejean, 1826 (N, S, Si)
 Leistus (Leistus) fulvibarbis danieli Reitter, 1905 (Sa)
Leistus (Leistus) nitidus (Duftschmid, 1812) (N, S) (*)

***Eurynebria* Ganglbauer, 1891**

Eurynebria complanata (Linné, 1767) (N, S, Si, Sa)

***Nebria (Eunebria)* Jeannel, 1941**

Nebria (Eunebria) jockischi Sturm, 1815 (N, S) (*)
Nebria (Eunebria) nigricornis Villa & Villa, 1833
 Nebria (Eunebria) nigricornis nigricornis Villa & Villa, 1833 (N)
 Nebria (Eunebria) nigricornis aterrima Fiori, 1896 (S)
Nebria (Eunebria) picicornis (Fabricius, 1801) (N)
Nebria (Eunebria) psammodes (Rossi, 1792) (N, S, Si)

***Nebria (Boreonebria)* Jeannel, 1937**

Nebria (Boreonebria) rufescens (Ström, 1768) (N, S) (*)

***Nebria (Nebria)* Latreille, 1802**

Nebria (Nebria) andalusia Rambur, 1837 (S, Si)
Nebria (Nebria) brevicollis (Fabricius, 1792) (N, S, Si, Sa)
Nebria (Nebria) dahli Sturm, 1815 (N) (*)
Nebria (Nebria) kratteri Dejean, 1831 (S, Si?)
Nebria (Nebria) posthuma Daniel & Daniel, 1891 (S) (E)
Nebria (Nebria) tibialis (Bonelli, 1809) (E) (*)
 Nebria (Nebria) tibialis doderoi Bänninger, 1924 (S)
 Nebria (Nebria) tibialis subcontracta Daniel & Daniel, 1891 (S)
 Nebria (Nebria) tibialis tibialis (Bonelli, 1809) (N, S)
Nebria (Nebria) orsinii Villa, 1838 (E)

Nebria (Nebria) orsinii orsinii Villa, 1838 (S)
Nebria (Nebria) orsinii aprutiana Bänninger, 1922 (S)
Nebria (Nebria) orsinii pennisii Magrini, 1987 (S)
Nebria (Nebria) orsinii apuana Busi & Rivalta, 1980 (S)
Nebria (Nebria) fulviventris Bassi, 1834 (N, S) (E)
Nebria (Nebria) genei Gené, 1839 (Sa) (E)
Nebria (Nebria) germari Heer, 1837 (N)
Nebria (Nebria) hellwigi (Panzer, 1797) (N)
Nebria (Nebria) crenatostriata Bassi, 1834 (N)
Nebria (Nebria) gagates (Bonelli, 1809) (N)

***Nebria (Nebriola)* Daniel K., 1903**

Nebria (Nebriola) cordicollis Chaudoir, 1837
Nebria (Nebriola) cordicollis cordicollis Chaudoir, 1837 (N)
Nebria (Nebriola) cordicollis escheri Heer, 1838 (N)
Nebria (Nebriola) cordicollis kochi Schatzmayr, 1939 (N)
Nebria (Nebriola) cordicollis winkleri Bari, 1971 (N)
Nebria (Nebriola) fontinalis Daniel & Daniel, 1890
Nebria (Nebriola) fontinalis fontinalis Daniel & Daniel, 1890 (N)
Nebria (Nebriola) fontinalis rhaetica Daniel & Daniel, 1890 (N)
Nebria (Nebriola) laticollis Dejean, 1826 (N)
Nebria (Nebriola) morula Daniel & Daniel, 1891 (N)
Nebria (Nebriola) pictiventris Fauvel, 1888 (N)

***Nebria (Oreonebria)* Daniel K., 1903**

Nebria (Oreonebria) angustata Dejean, 1831 (N)
Nebria (Oreonebria) austriaca Ganglbauer, 1889 (N)
Nebria (Oreonebria) diaphana Daniel & Daniel, 1890
Nebria (Oreonebria) diaphana diaphana Daniel & Daniel, 1890 (N)
Nebria (Oreonebria) diaphana venetiana Pomini, 1938 (N)
Nebria (Oreonebria) diaphana bohiniensis Müller G., 1926 (N)
Nebria (Oreonebria) lombarda Daniel & Daniel, 1890 (N) (E)
Nebria (Oreonebria) macrodera Daniel K., 1903 (N) (E)
Nebria (Oreonebria) ligurica Daniel K., 1903 (N)
Nebria (Oreonebria) picea Dejean, 1826 (*)
Nebria (Oreonebria) picea picea Dejean, 1826 (N, S)
Nebria (Oreonebria) picea prosternalis Ganglbauer, 1892 (N)
Nebria (Oreonebria) castanea (Bonelli, 1809)
Nebria (Oreonebria) castanea castanea (Bonelli, 1809) (N)
Nebria (Oreonebria) castanea brunnea (Duftschmid, 1812) (N)
Nebria (Oreonebria) angusticollis (Bonelli, 1809)
Nebria (Oreonebria) angusticollis angusticollis (Bonelli, 1809) (N)
Nebria (Oreonebria) angusticollis microcephala Daniel & Daniel, 1891 (N)

***Notiophilus* Duméril, 1806**

Notiophilus aquaticus (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa?)
Notiophilus aestuans Motschulsky, 1864 (N, S, Si, Sa)
Notiophilus germinyi Fauvel, 1863 (N, S)
Notiophilus palustris (Duftschmid, 1812) (N, S)
Notiophilus rufipes Curtis, 1829 (N, S, Si, Sa)
Notiophilus geminatus Dejean, 1831 (S, Si, Sa)
Notiophilus biguttatus (Fabricius, 1779) (N, S, Si, Sa)
Notiophilus quadripunctatus Dejean, 1826 (N, S, Si, Sa)
Notiophilus substriatus Waterhouse, 1833 (N, S, Si, Sa)
Notiophilus marginatus Gené, 1839 (Sa)

Omophron Latreille, 1802

Omophron limbatus (Fabricius, 1776) (N, S, Si)

Phrator Semenov, 1822

Phrator variegatus (Olivier, 1811)
Phrator variegatus sardoum Reitter, 1907 (Sa)

Blethisa Bonelli, 1810

Blethisa multipunctata (Linné, 1758) (N) (*)

Elaphrus (Elaphrus) Fabricius, 1775

Elaphrus (Elaphrus) riparius (Linné, 1758) (N?, S?) (*)

Elaphrus (Elaphroterus) Semenov, 1895

Elaphrus (Elaphroterus) aureus Müller P., 1821 (N, S)
Elaphrus (Elaphroterus) ulrichi Redtenbacher, 1842 (N)

Elaphrus (Neoelaphrus) Hatch, 1951

Elaphrus (Neoelaphrus) cupreus Duftschmid, 1812 (N)
Elaphrus (Neoelaphrus) uliginosus Fabricius, 1792 (N, S)

Loricera Latreille, 1802

Loricera pilicornis (Fabricius, 1775) (*)
Loricera pilicornis pilicornis (Fabricius, 1775) (N)
Loricera pilicornis apennina Binaghi, 1942 (N, S)

Siagona Latreille, 1804

Siagona europaea Dejean, 1826 (S, Si, Sa)

Distichus Motschulsky, 1857

Distichus planus (Bonelli, 1813) (S, Si, Sa)

Scarites Fabricius, 1775

Scarites buparius (Forster, 1771) (N, S, Si, Sa)

Scarites eurytus (Fischer, 1829) (Sa)

Scarites hespericus Dejean, 1831 (Sa?) (*)

Parallelomorphus Motschulsky, 1849

Parallelomorphus laevigatus (Fabricius, 1792) (N, S, Si, Sa)

Parallelomorphus terricola (Bonelli, 1813) (N, S, Si, Sa)

Clivina Latreille, 1802

Clivina fossor (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa?)

Clivina collaris (Herbst, 1784) (N, S)

Clivina ypsilon Dejean & Boisduval, 1829 (N) (*)

Clivina scripta Putzeys, 1846 (Si, Sa)

Clivina laevifrons (Chaudoir, 1824) (S)

Clivina sicula Baudi, 1864 (Si) (E)

Reicheia Saulcy, 1863

Reicheia corinna Holdhaus, 1924 (S) (E)

Reicheia italica Holdhaus, 1924 (S, Si) (E)

Alpiodytes Jeannel, 1957

Alpiodytes penninus (Binaghi, 1936) (N) (E)

Alpiodytes ravizzai Sciaky, 1985 (N) (E)

***Typhloreicheia* (*Typhloreicheia*)** Holdhaus, 1924

Typhloreicheia (*Typhloreicheia*) *usslaubi* (Saulcy, 1870) (S) (E)

Typhloreicheia (*Typhloreicheia*) *montisneronis* Binaghi, 1942 (S) (E)

Typhloreicheia (*Typhloreicheia*) *mingazzinii* Magrini & Vanni, 1990 (S) (E)

Typhloreicheia (*Typhloreicheia*) *ilvensis* Holdhaus, 1924 (S) (E)

Typhloreicheia (*Typhloreicheia*) *maginii* Magrini & Vanni, 1990 (S) (E)

Typhloreicheia (*Typhloreicheia*) *andreinii* Doderò, 1916 (S) (E)

Typhloreicheia (*Typhloreicheia*) *damone* Holdhaus, 1924 (S) (E)

Typhloreicheia (*Typhloreicheia*) *jucunda* (Holdhaus, 1924) (Sa) (E)

Typhloreicheia (*Typhloreicheia*) *occulta* Holdhaus, 1924 (Sa) (E)

Typhloreicheia (*Typhloreicheia*) *fausti* Fancello, 1988 (Sa) (E)

Typhloreicheia (*Typhloreicheia*) *praecox* (Schaum, 1857) (E)

Typhloreicheia (*Typhloreicheia*) *praecox praecox* (Schaum, 1857) (Si)

Typhloreicheia (Typhloreicheia) praecox baudii Ragusa, 1881 (Si)
Typhloreicheia (Typhloreicheia) praecox binaghii Casale, 1985 (Si)
Typhloreicheia (Typhloreicheia) praecox doderoana Casale, 1985 (Si)
Typhloreicheia (Typhloreicheia) praecox meridionalis Casale, 1985 (Si)

***Typhloreicheia (Sardoreicheia)* Jeannel, 1957**

Typhloreicheia (Sardoreicheia) minima Binaghi, 1936 (Sa) (E)
Typhloreicheia (Sardoreicheia) parallela Holdhaus, 1924 (Sa) (E)
Typhloreicheia (Sardoreicheia) denticulata Holdhaus, 1925 (E)
 Typhloreicheia (Sardoreicheia) denticulata denticulata Holdhaus, 1925 (Sa)
 Typhloreicheia (Sardoreicheia) denticulata dis Holdhaus, 1924 (Sa)
Typhloreicheia (Sardoreicheia) raymondi (Putzeys, 1869) (Sa) (E)
Typhloreicheia (Sardoreicheia) kraussei (Reitter, 1914) (Sa) (E)
Typhloreicheia (Sardoreicheia) sardoa (Baudi, 1891) (Sa) (E)
Typhloreicheia (Sardoreicheia) pandora Holdhaus, 1924 (Sa) (E)
Typhloreicheia (Sardoreicheia) doderoi Holdhaus, 1924 (Sa) (E)
Typhloreicheia (Sardoreicheia) monticola Holdhaus, 1924 (Sa) (E)
Typhloreicheia (Sardoreicheia) elegans (Dodero, 1916) (Sa) (E)
Typhloreicheia (Sardoreicheia) henroti Jeannel, 1957 (Sa) (E)
Typhloreicheia (Sardoreicheia) boffai Casale & Giachino, 1987 (Sa) (E)
Typhloreicheia (Sardoreicheia) valeriae Fancello, 1988 (Sa) (E)

***Italodytes* Müller G., 1938**

Italodytes stammeri Müller G., 1938 (E)
 Italodytes stammeri stammeri Müller G., 1938 (S)
 Italodytes stammeri antoniettae Magrini & Vanni, 1986 (S)

***Dyschirius (Dyschirius)* Bonelli, 1810**

Dyschirius (Dyschirius) rugicollis Fairmaire & Laboulbène, 1854 (N, S, Si, Sa)
Dyschirius (Dyschirius) angustatus (Ahrens, 1830) (N)
Dyschirius (Dyschirius) globosus (Herbst, 1783) (N, S, Si)
Dyschirius (Dyschirius) gracilis (Heer, 1837) (N, S, Si?)
Dyschirius (Dyschirius) similis Petri, 1891 (N)
Dyschirius (Dyschirius) importunus Schaum, 1857 (N, S, Si)
Dyschirius (Dyschirius) laeviusculus Putzeys, 1846 (N, S)
Dyschirius (Dyschirius) luticola Chaudoir, 1850 (N, S, Si)
Dyschirius (Dyschirius) punctatus (Dejean, 1825) (N, S, Si, Sa)
Dyschirius (Dyschirius) bacillus Schaum, 1857
 Dyschirius (Dyschirius) bacillus arbensis Müller G., 1911 (N)
 Dyschirius (Dyschirius) bacillus lucanus Focarile, 1959 (S)
 Dyschirius (Dyschirius) bacillus siculus Müller G., 1922 (Si)
Dyschirius (Dyschirius) clypeatus Putzeys, 1867 (Si)
Dyschirius (Dyschirius) cylindricus (Dejean, 1825) (S, Si)
Dyschirius (Dyschirius) longipennis Putzeys, 1866 (N, S, Si, Sa)
Dyschirius (Dyschirius) macroderus Chaudoir, 1850

Dyschirius (Dyschirius) macroderus protensus Putzeys, 1866 (S, Si, Sa)
Dyschirius (Dyschirius) pusillus (Dejean, 1825) (Si)
Dyschirius (Dyschirius) rufoaeneus Chaudoir, 1843 (Si)
Dyschirius (Dyschirius) tensicollis Marseul, 1880 (N, S, Si, Sa)
Dyschirius (Dyschirius) wagneri Müller G., 1922 (Sa) (E)
Dyschirius (Dyschirius) substriatus (Duftschmid, 1812) (N, S, Si)
Dyschirius (Dyschirius) ruficornis Putzeys, 1846 (N, S, Si?, Sa?)
Dyschirius (Dyschirius) salinus Schaum, 1843 (N, S, Si, Sa)
Dyschirius (Dyschirius) aeneus (Dejean, 1825) (N, S, Si, Sa)
Dyschirius (Dyschirius) apicalis Putzeys, 1846 (N, S, Si, Sa)
Dyschirius (Dyschirius) chalybaeus Putzeys, 1846 (N, S, Si, Sa)
Dyschirius (Dyschirius) gibbifrons Apfelbeck, 1899 (N, S)
Dyschirius (Dyschirius) hispanus Putzeys, 1866 (Sa)
Dyschirius (Dyschirius) intermedius Putzeys, 1846 (N, S)
Dyschirius (Dyschirius) tristis Stephens, 1827 (S)
Dyschirius (Dyschirius) strumosus (Dejean, 1825) (S, Si)
Dyschirius (Dyschirius) chalceus Erichson, 1837 (Sa?) (*)
Dyschirius (Dyschirius) lucidus Putzeys, 1846 (N, S, Si)
Dyschirius (Dyschirius) nitidus (Dejean, 1825) (N, S, Si)

***Dyschirius (Reicheiodes)* Bonelli, 1810**

Dyschirius (Reicheiodes) rotundipennis Ganglbauer, 1892
Dyschirius (Reicheiodes) rotundipennis rotundipennis Chaudoir, 1843 (N)
Dyschirius (Reicheiodes) rotundipennis macellus Daniel K., 1903 (N)
Dyschirius (Reicheiodes) schatzmayri Bari, 1950 (N) (E)
Dyschirius (Reicheiodes) fontanai Bari, 1950 (N) (E)

***Rhysodes* Germar, 1822**

Rhysodes americanus Castelnau, 1836 (S)
Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) (N, S)

***Clinidium* Kirby, 1835**

Clinidium canaliculatum (Costa, 1839) (S, Si)

***Apotomus* Illiger, 1807**

Apotomus clypeonitens Müller, 1943
Apotomus clypeonitens adanensis Jedlicka, 1961 (Si)
Apotomus rufithorax Pecchioli, 1838 (S, Si, Sa)
Apotomus rufus (Rossi, 1790) (N, S, Si, Sa)
Apotomus testaceus Dejean, 1825 (S)

***Broscus* Panzer, 1813**

Broscus cephalotes (Linné, 1758) (N, S)

Broscus politus Dejean, 1828 (Si)

Miscodera Eschscholtz, 1830

Miscodera arctica (Paykull, 1798) (N)

Broscosoma Putzeys, 1846

Broscosoma baldense Putzeys, 1846 (E)

Broscosoma baldense baldense Putzeys, 1846 (N)

Broscosoma baldense pasubianum Weissmandl, 1935 (N)

Broscosoma relictum Weissmandl, 1935 (N) (E)

Nomius Castelnau, 1834

Nomius pygmaeus (Dejean, 1831) (S, Sa)

Asaphidion Gozis, 1886

Asaphidion caraboides (Schränk, 1781)

Asaphidion caraboides caraboides (Schränk, 1781) (N)

Asaphidion caraboides nebulosum (Rossi, 1792) (N, S, Si)

Asaphidion pallipes (Duftschmid, 1812) (N, S)

Asaphidion rossii (Schaum, 1857) (N, S, Si, Sa)

Asaphidion cyanicorne Pandellé, 1867 (N, S)

Asaphidion festivum (Duval, 1851) (S, Sa)

Asaphidion austriacum Schweiger, 1975 (N)

Asaphidion curtum (Heyden, 1870) (S, Si, Sa)

Asaphidion flavipes (Linné, 1761) (N, S, Sa?)

Asaphidion stierlini (Heyden, 1880) (N, S, Si, Sa)

Odontium (Odontium) Leconte, 1848

Odontium (Odontium) foraminosum (Sturm, 1825) (N, S)

Odontium (Odontium) striatum (Fabricius, 1792) (N, S)

Odontium (Chrysobracheon) Netol

Odontium (Chrysobracheon) argenteolum (Ahrens, 1812) (N)

Odontium (Chrysobracheon) litorale (Olivier, 1791) (N?) (*)

Odontium (Chrysobracheon) velox (Linné, 1761) (N?) (*)

Hydrium Leconte, 1848

Hydrium laticolle (Duftschmid, 1812) (N, S)

Metallina (Chlorodium) Motschulsky, 1864

Metallina (Chlorodium) pygmaea (Fabricius, 1792) (N, S)
Metallina (Chlorodium) splendida (Sturm, 1825) (N)

***Metallina (Neja)* Motschulsky, 1864**

Metallina (Neja) ambigua (Dejean, 1831) (S, Si, Sa)
Metallina (Neja) palumboi (Ragusa, 1886) (Si) (E) (*)

***Metallina (Metallina)* Motschulsky, 1850**

Metallina (Metallina) lampros (Herbst, 1784) (N, S, Si, Sa?)
Metallina (Metallina) properans (Stephens, 1828) (N, S)

***Phyla* Motschulsky, 1844**

Phyla rectangula (Duval, 1851) (S, Sa)
Phyla tethys (Netolitzky, 1926) (N, S, Si, Sa)

***Notaphus (Notaphus)* Dejean, 1821**

Notaphus (Notaphus) obliquus (Sturm, 1825) (N?) (*)
Notaphus (Notaphus) semipunctatus (Donovan, 1806) (N, S)
Notaphus (Notaphus) varius (Olivier, 1795) (N, S, Si, Sa)

***Notaphus (Eupetedromus)* Netolitzky, 1911**

Notaphus (Eupetedromus) dentellus (Thunberg, 1787) (N, S)

***Notaphus (Notaphemphanes)* Netolitzky, 1920**

Notaphus (Notaphemphanes) ephippium (Marsham, 1802) (S, Si, Sa)

***Emphanes (Emphanes)* Motschulsky, 1850**

Emphanes (Emphanes) azurescens (Dalla Torre, 1877) (N, S, Si)
Emphanes (Emphanes) latiplaga (Chaudoir, 1850) (N, S)
Emphanes (Emphanes) minimus (Fabricius, 1792) (Sa?) (*)
Emphanes (Emphanes) normannus (Dejean, 1831) (S, Si, Sa)
Emphanes (Emphanes) rivularis (Dejean, 1831) (N, S, Si, Sa)
Emphanes (Emphanes) tenellus (Erichson, 1837) (N, S, Si, Sa)

***Emphanes (Talanes)* Motschulsky, 1864**

Emphanes (Talanes) aspericollis (Germar, 1812) (N, S)
Emphanes (Talanes) subfasciatus (Chaudoir, 1850) (S)

***Leja (Diplocampa)* Bedel, 1896**

Leja (Diplocampa) assimilis (Gyllenhal, 1810) (N, S, Si, Sa)
Leja (Diplocampa) clarkii (Dawson, 1849)
Leja (Diplocampa) clarkii magistrettii (De Monte, 1947) (S, Si?)
Leja (Diplocampa) fumigata (Duftschmid, 1812) (N, S)

***Leja (Leja)* Dejean, 1821**

Leja (Leja) articulata (Panzer, 1796) (N, S)
Leja (Leja) bedeliana (Netolitzky, 1918) (Si)
Leja (Leja) maculata (Dejean, 1831)
Leja (Leja) maculata maculata (Dejean, 1831) (N, S, Sa)
Leja (Leja) maculata atripennis (De Monte, 1947) (Si)
Leja (Leja) octomaculata (Goeze, 1777) (N, S, Si, Sa)

***Leja (Trepanedoris)* Netolitzky, 1918**

Leja (Trepanedoris) doris (Panzer, 1797) (N, S)

***Leja (Semicampa)* Netolitzky, 1910**

Leja (Semicampa) schuppelii (Dejean, 1831) (N)

***Philochthus* Stephens, 1828**

Philochthus biguttatus (Fabricius, 1779) (N)
Philochthus inoptatus (Schaum, 1857) (N, S, Si?)
Philochthus escherichi (Ganglbauer, 1897)
Philochthus escherichi paganettii (Netolitzky, 1914) (S)
Philochthus escherichi subatratus (De Monte, 1949) (Si)
Philochthus vicinus (Lucas, 1846) (S, Si, Sa)
Philochthus guttula (Fabricius, 1792) (S?, Si?) (*)
Philochthus luigionii (Müller G., 1931) (S) (E)
Philochthus mannerheimii (Sahlberg, 1827) (N)
Philochthus netolitzkyi (Krausse, 1910) (Si?, Sa) (E)
Philochthus lunulatus (Fourcroy, 1785) (N, S, Si, Sa)
Philochthus iricolor (Bedel, 1879) (N, S, Si, Sa)

***Bembidion* Latreille, 1802**

Bembidion humerale Sturm, 1825 (N)
Bembidion quadrimaculatum (Linné, 1761) (N, S, Si)
Bembidion quadripustulatum Serville, 1821 (N, S, Si, Sa)

***Pseudolimnaeum* Kraatz, 1888**

Pseudolimnaeum doderoi (Ganglbauer, 1892) (N, S)
Pseudolimnaeum inustum (Duval, 1857) (N, S)

Ocydromus (Bembidionetolitzkya) Strand, 1929

- Ocydromus (Bembidionetolitzkya) tibialis* (Duftschmid, 1812) (N, S)
- Ocydromus (Bembidionetolitzkya) geniculatus* (Heer, 1837) (N, S)
- Ocydromus (Bembidionetolitzkya) penninus* (Netolitzky, 1918) (N)
- Ocydromus (Bembidionetolitzkya) catharinae* (Netolitzky, 1942) (N) (E)
- Ocydromus (Bembidionetolitzkya) complanatus* (Heer, 1837) (N)
- Ocydromus (Bembidionetolitzkya) longipes* (Daniel K., 1902) (N)
- Ocydromus (Bembidionetolitzkya) atrocoeruleus* (Stephens, 1828) (N)
- Ocydromus (Bembidionetolitzkya) conformis* (Dejean, 1831) (N, S)
- Ocydromus (Bembidionetolitzkya) varicolor* (Fabricius, 1803) (N, S)
- Ocydromus (Bembidionetolitzkya) fasciolatus* (Duftschmid, 1812) (N)
- Ocydromus (Bembidionetolitzkya) ascendens* (Daniel K., 1902) (N, S)
- Ocydromus (Bembidionetolitzkya) bugnioni* (Daniel K., 1902) (N, S, Si)
- Ocydromus (Bembidionetolitzkya) cassolai* Bonavita & Vigna Taglianti, 1993 (Sa) (E)
- Ocydromus (Bembidionetolitzkya) eleonora* Bonavita & Vigna Taglianti, 1993 (Sa)
- Ocydromus (Bembidionetolitzkya) coeruleus* (Serville, 1826) (N, S)
- Ocydromus (Bembidionetolitzkya) concoeruleus* (Netolitzky, 1942) (N, S, Si)

Ocydromus (Peryphiolus) Jeannel, 1941

- Ocydromus (Peryphiolus) lucifugus* Neri & Pavesi, 1989 (S) (E)
- Ocydromus (Peryphiolus) monticola* (Sturm, 1825) (N, S)

Ocydromus (Euperyphus) Jeannel, 1941

- Ocydromus (Euperyphus) fulvipes* (Sturm, 1827) (N)
- Ocydromus (Euperyphus) eques* (Sturm, 1825) (N, S)
- Ocydromus (Euperyphus) nobilis* (Rottemberg, 1870) (S, Si) (E)

Ocydromus (Peryphanes) Jeannel, 1941

- Ocydromus (Peryphanes) deletus* (Serville, 1821) (N, S)
- Ocydromus (Peryphanes) incognitus* (Müller G., 1931) (N)
- Ocydromus (Peryphanes) pallidicornis* (Müller G., 1921) (N)
- Ocydromus (Peryphanes) stephensi* (Crotch, 1869)
 - Ocydromus (Peryphanes) stephensi stephensi* (Crotch, 1869) (N)
 - Ocydromus (Peryphanes) stephensi florentinus* (Daniel & Daniel, 1898) (N, S)
- Ocydromus (Peryphanes) fuliginosus* (Netolitzky, 1914) (N, S)
- Ocydromus (Peryphanes) gudenzii* Neri, 1982 (N, S) (E)
- Ocydromus (Peryphanes) italicus* (De Monte, 1943) (N, S, Si)
- Ocydromus (Peryphanes) latinus* (Netolitzky, 1911) (N, S, Si, Sa)
- Ocydromus (Peryphanes) milleri* (Duval, 1851) (N)
- Ocydromus (Peryphanes) gautieri* (Netolitzky, 1921) (Sa)
- Ocydromus (Peryphanes) lafertei* (Duval, 1851) (Sa)
- Ocydromus (Peryphanes) alticola* (Fiori, 1903) (S) (E)

Ocydromus (Ocyturanus) Müller-Motzfeld, 1986

Ocydromus (Ocyturanus) balcanicus (Apfelbeck, 1899) (*)
 Ocydromus (Ocyturanus) balcanicus balcanicus (Apfelbeck, 1899) (N)
 Ocydromus (Ocyturanus) balcanicus basirufus (Holdhaus, 1910) (N?)
Ocydromus (Ocyturanus) praeustus (Dejean, 1831) (N, S, Si)

Ocydromus (Asioperyphus) Vysoky, 1986

Ocydromus (Asioperyphus) lunatus (Duftschmid, 1812) (N)

Ocydromus (Peryphus) Dejean, 1821

Ocydromus (Peryphus) andreae (Fabricius, 1787) (N, S, Si)
Ocydromus (Peryphus) bruxellensis (Wesmael, 1835) (N)
Ocydromus (Peryphus) cruciatus (Schiödt, 1841) (N, S, Si, Sa)
Ocydromus (Peryphus) distinguendus (Duval, 1852) (N)
Ocydromus (Peryphus) femoratus (Sturm, 1825) (N, S, Si)
Ocydromus (Peryphus) fluviatilis (Dejean, 1831)
 Ocydromus (Peryphus) fluviatilis fluviatilis (Dejean, 1831) (N)
 Ocydromus (Peryphus) fluviatilis acragas (De Monte, 1956) (Si)
Ocydromus (Peryphus) ripicola (Dufour, 1820) (N?) (*)
Ocydromus (Peryphus) scapularis (Dejean, 1831)
 Ocydromus (Peryphus) scapularis scapularis (Dejean, 1831) (N, S, Si)
 Ocydromus (Peryphus) scapularis tergluensis (Netolitzky, 1918) (N)
Ocydromus (Peryphus) subcostatus Motschulsky, 1850
 Ocydromus (Peryphus) subcostatus javurkovae Fassati, 1944 (N)
Ocydromus (Peryphus) terminalis (Heer, 1841) (N)
Ocydromus (Peryphus) testaceus (Duftschmid, 1812) (N, S)
Ocydromus (Peryphus) tetracolus (Say, 1823) (N, S)

Ocydromus (Ocydromus) Clairville, 1806

Ocydromus (Ocydromus) decorus (Zenker, 1801) (N, S, Si, Sa)
Ocydromus (Ocydromus) modestus (Fabricius, 1801) (N, S)
Ocydromus (Ocydromus) saxatilis (Gyllenhal, 1827) (*)
 Ocydromus (Ocydromus) saxatilis devillei (Netolitzky, 1930) (N?)
Ocydromus (Ocydromus) sículus (Dejean, 1831) (Si)
Ocydromus (Ocydromus) rudis (De Monte, 1947) (S)

Ocydromus (Omoperyphus) Netolitzky, 1931

Ocydromus (Omoperyphus) hypocrita (Dejean, 1831) (N, S, Si, Sa)
Ocydromus (Omoperyphus) steinbuehleri (Ganglbauer, 1892) (N, S, Si)

Ocydromus (Testediolum) Ganglbauer, 1892

Ocydromus (Testediolum) glacialis (Heer, 1840) (N, S)
Ocydromus (Testediolum) jacqueti (Jeannel, 1940)

Ocydromus (Testediolum) jacqueti jacqueti (Jeannel, 1940) (N)
Ocydromus (Testediolum) jacqueti apenninus (De Monte, 1946) (S)
Ocydromus (Testediolum) pyrenaeus (Dejean, 1831) (N)
Ocydromus (Testediolum) rhaeticus (Heer, 1840) (N)
Ocydromus (Testediolum) julianus (De Monte, 1946) (N)
Ocydromus (Testediolum) corsicus (Csiki, 1928) (Sa)

Ocydromus (Nepha) Motschulsky, 1864

Ocydromus (Nepha) genei (Küster, 1847) (S, Si, Sa)
Ocydromus (Nepha) tetragrammus (Chaudoir, 1846)
Ocydromus (Nepha) tetragrammus illigeri (Netolitzky, 1914) (N, S)
Ocydromus (Nepha) tetragrammus dissimilis (Müller G., 1943) (Si)
Ocydromus (Nepha) callosus (Küster, 1847) (N, S, Si, Sa)
Ocydromus (Nepha) schmidtii (Wollaston, 1854)
Ocydromus (Nepha) schmidtii jeannelianus Casale & Vigna Taglianti 1992 (N, S?)

Synechostictus Motschulsky, 1864

Synechostictus cribrum (Duval, 1851)
Synechostictus cribrum cribrum (Duval, 1851) (N, Sa)
Synechostictus cribrum stenacrus (De Monte, 1947) (N, S, Si)
Synechostictus dahli (Dejean, 1831) (S, Si, Sa)
Synechostictus ruficornis (Sturm, 1825) (N)
Synechostictus solaris (Müller G., 1918) (S) (E)
Synechostictus atroviolaceus (Dufour, 1820) (N, S) (*)
Synechostictus stomoides (Dejean, 1831) (N)
Synechostictus decoratus (Duftschmid, 1812) (N, S)
Synechostictus elongatus (Dejean, 1831)
Synechostictus elongatus elongatus (Dejean, 1831) (S, Sa)
Synechostictus elongatus tarsicus (Peyron, 1858) (N)

Limnaeum Stephens, 1828

Limnaeum abeillei (Bedel, 1879) (N, S)
Limnaeum nigropiceum (Marsham, 1802) (N, S, Sa)

Plataphus Motschulsky, 1864

Plataphus prasinus (Duftschmid, 1812) (N)

Princidium (Princidium) Motschulsky, 1864

Princidium (Princidium) punctulatum (Drapiez, 1820) (N, S, Si, Sa)

Princidium (Testedium) Motschulsky, 1864

Princidium (Testedium) bipunctatum (Linné, 1761) (N, S)

Principidium (Testedium) quadrifossulatum (Schaum, 1862) (Sa)
Principidium (Testedium) idriae (Meschnigg, 1934) (N?) (*)

Principidium (Actedium) Motschulsky, 1864

Principidium (Actedium) kuesteri (Schaum, 1845) (Sa)

Ocys Stephens, 1828

Ocys harpaloides (Serville, 1821) (N, S, Si, Sa)
Ocys quinquestriatus (Gyllenhal, 1810) (N, S)
Ocys inguscioi Magrini & Vanni, 1992 (S) (E)
Ocys reticulatus (Netolitzky, 1917) (N, S, Si)
Ocys pennisii Magrini & Vanni, 1992 (S) (E)

Polyderis Motschulsky, 1862

Polyderis brevicornis (Chaudoir, 1846) (N, S, Si, Sa?)
Polyderis algiricus (Lucas, 1846) (N, S, Si, Sa)

Paratachys Casey, 1918

Paratachys bistratus (Duftschmid, 1812) (N, S, Si, Sa)
Paratachys micros (Fischer, 1828) (N, S, Si, Sa?)
Paratachys fulvicollis (Dejean, 1831) (N, S, Si, Sa)

Tachys Stephens, 1828

Tachys scutellaris Stephens, 1828 (N, S, Si, Sa)

Porotachys Netolitzky, 1914

Porotachys bisulcatus (Nicolai, 1822) (N, S, Si, Sa)

Elaphropus Motschulsky, 1839

Elaphropus globulus (Dejean, 1831) (Si)
Elaphropus parvulus (Dejean, 1831) (N)
Elaphropus thoracicus (Kolenati, 1845) (N, S, Si, Sa)
Elaphropus quadrisignatus (Duftschmid, 1812) (N, S, Si, Sa)
Elaphropus sexstriatus (Duftschmid, 1812) (N, S)
Elaphropus diabrachys (Kolenati, 1845) (S, Si, Sa)
Elaphropus pallidicornis Jeanne, 1990 (Sa)
Elaphropus bisbimaculatus Chevrolat, 1860 (Si)
Elaphropus haemorrhoidalis (Ponza, 1805) (N, S, Si, Sa)
Elaphropus lucasi (Duval, 1852) (Sa)

Tachyta Kirby, 1837

Tachyta nana (Gyllenhal, 1810) (N, S)

Limnastis Motschulsky, 1862

Limnastis niloticus Motschulsky, 1862 (Si)

Limnastis galilaeus La Brulerie, 1875 (N, S, Si, Sa)

Limnastis luigionii Doderò, 1899 (S) (E)

Binaghites Jeannel, 1937

Binaghites grajus (Jeannel, 1937) (N) (E)

Binaghites subalpinus (Baudi, 1871) (N)

Binaghites affinis (Baudi, 1871) (E)

Binaghites affinis affinis (Baudi, 1871) (N)

Binaghites affinis ovalipennis (Ganglbauer, 1900) (N)

Binaghites armellinae (Ganglbauer, 1900) (N) (E)

Rhegmatoebius Jeannel, 1937

Rhegmatoebius quadricollis (Ehlers, 1883) (S) (E)

Rhegmatoebius fiorii (Ganglbauer, 1900) (S) (E)

Rhegmatoebius strictus (Baudi, 1891) (Sa) (E)

Rhegmatoebius agostinii Jeannel, 1937 (Sa) (E)

Rhegmatoebius gigas (Krausse, 1911) (Sa) (E)

Hypotyphlus Jeannel, 1937

Hypotyphlus aubei (Saulcy, 1863) (N)

Hypotyphlus sardous (Jeannel, 1937) (Sa) (E)

Scotodipnus Schaum, 1860

Scotodipnus alpinus Baudi, 1871 (N) (E)

Scotodipnus hirtus Dieck, 1869 (N)

Scotodipnus glaber (Baudi, 1859) (*)

Scotodipnus glaber glaber (Baudi, 1859) (N)

Scotodipnus glaber saulcyi Dieck, 1869 (N, S)

Scotodipnus glaber hypocrita Binaghi, 1936 (N)

Anillus Duval, 1851

Anillus frater Aubé, 1863

Anillus frater genuensis Ganglbauer, 1900 (N)

Anillus frater sardonius Jeannel, 1937 (Sa)

Anillus florentinus Dieck, 1869 (N, S)

Anillus andreinii Jeannel, 1937 (S)

Anillus latialis Jeannel, 1937 (S) (E)

Anillus marii Magrini & Vanni, 1992 (S) (E)
Anillus virginiae Magrini & Vanni, 1993 (S)
Anillus pacei Magrini & Vanni, 1993 (S) (E)
Anillus bordonii Magrini & Vanni, 1993 (S) (E)
Anillus angelae Magrini & Vanni, 1992 (S) (E)
Anillus cirocchii Magrini & Vanni, 1992 (S) (E)

Thalassophilus Wollaston, 1854

Thalassophilus longicornis (Sturm, 1825) (N, S)

Perileptus Schaum, 1860

Perileptus areolatus (Creutzer, 1799) (N, S, Si, Sa)

Epaphius Stephens, 1827

Epaphius secalis (Paykull, 1790) (N)

Trechoblemus Ganglbauer, 1892

Trechoblemus micros (Herbst, 1784) (N)

Lasiotrechus Ganglbauer, 1892

Lasiotrechus discus (Fabricius, 1801) (N, S)

Trechus Clairville, 1806

Trechus rubens (Fabricius, 1792) (N)
Trechus quadristriatus (Schränk, 1781) (N, S, Si, Sa)
Trechus obtusus Erichson, 1837
 Trechus obtusus obtusus Erichson, 1837 (N)
 Trechus obtusus lucanus Focarile, 1949 (N, S, Si)
Trechus tyrrhenicus Jeannel, 1927 (Sa)
Trechus rufulus Dejean, 1831 (Si, Sa)
Trechus doderoi Jeannel, 1927 (E)
 Trechus doderoi doderoi Jeannel, 1927 (S)
 Trechus doderoi taitii Magrini, 1986 (S)
Trechus pallidulus Ganglbauer, 1891
 Trechus pallidulus pallidulus Ganglbauer, 1891 (N)
 Trechus pallidulus augusti Jeannel, 1931 (N)
Trechus meschniggi Jeannel, 1928 (N)
Trechus grouvellei Jeannel, 1913 (N?) (*)
Trechus sylvicola Daniel & Daniel, 1898 (N) (E)
Trechus aubei Pandellé, 1867 (N)
Trechus putzeysi Pandellé, 1867 (N)
Trechus liguricus Jeannel, 1921 (*)

Trechus liguricus liguricus Jeannel, 1921 (N)
Trechus liguricus nicolianus Moncoutier, 1990 (N)
Trechus liguricus mancinii Jeannel, 1921 (S)
Trechus strigipennis Kiesenwetter, 1861 (N)
Trechus montisrosae Jeannel, 1921 (N)
Trechus artemisiae Putzeys, 1872 (N) (E)
Trechus piazzolii Focarile, 1950 (N)
Trechus caprai Jeannel, 1927 (N) (E)
Trechus ceresai Binaghi, 1938 (N) (E)
Trechus goidanichi Focarile & Casale, 1978 (N) (E)
Trechus austriacus Dejean, 1831 (N, S)
Trechus elegans Putzeys, 1847 (*)
Trechus elegans carniolicus Ganglbauer, 1896 (N?)
Trechus gracilitarsis Daniel & Daniel, 1898 (N) (E)
Trechus lepontinus Ganglbauer, 1891 (N) (E)
Trechus consobrinus Daniel & Daniel, 1898 (N) (E)
Trechus subnotatus Dejean, 1831 (N, S)
Trechus cardioderus Putzeys, 1870 (N)
Trechus fairmairei Pandellé, 1867 (N, S)
Trechus schatzmayri Focarile, 1949 (S) (E)
Trechus italicus Daniel & Daniel, 1898 (S) (E)
Trechus controversus Binaghi, 1959 (S) (E)
Trechus schaumii Pandellé, 1867 (N)
Trechus longobardus Putzeys, 1870 (N) (E)
Trechus brembanus Focarile, 1949 (N) (E)
Trechus intrusus Focarile, 1950 (N) (E)
Trechus pygmaeus Daniel & Daniel, 1898 (N) (E)
Trechus marianii Focarile, 1949 (N) (E)
Trechus montisarerae Focarile, 1950 (N) (E)
Trechus magistretti Focarile, 1950 (N) (E)
Trechus pumilus Jeannel, 1927 (N) (E)
Trechus insubricus Daniel & Daniel, 1898 (N) (E)
Trechus barii Focarile, 1949 (N) (E)
Trechus longulus Daniel & Daniel, 1898
Trechus longulus longulus Daniel & Daniel, 1898 (N)
Trechus longulus montiscanini Jeannel, 1927 (N)
Trechus longulus cavallensis Jeannel, 1927 (N)
Trechus longulus danieli Holdhaus, 1902 (N)
Trechus perinii Holdhaus, 1950 (N) (E)
Trechus tenuilimbatus Daniel & Daniel, 1898
Trechus tenuilimbatus tenuilimbatus Daniel & Daniel, 1898 (N)
Trechus tenuilimbatus paolii Binaghi, 1940 (N)
Trechus tristiculus Daniel & Daniel, 1898 (N)
Trechus dolomitanus Jeannel, 1931
Trechus dolomitanus dolomitanus Jeannel, 1931 (N)
Trechus dolomitanus venetus Jeannel, 1931 (N)
Trechus dolomitanus jahni Schönherr, 1937 (N)
Trechus strasseri Ganglbauer, 1891 (N)

Trechus sinuatus Schaum, 1860 (N) (E)
Trechus stricticollis Jeannel, 1927 (N) (E)
Trechus montiscrystalli Casale, 1979 (N) (E)
Trechus laevipes Jeannel, 1927 (N)
Trechus sessitanus Monguzzi, 1985 (N) (E)
Trechus croaticus Dejean, 1831 (N)
Trechus priapus Daniel & Daniel, 1902 (N?) (*)
Trechus validipes Daniel & Daniel, 1902 (*)
 Trechus validipes illyricus Jeannel, 1921 (N?)
Trechus tristis (Duftschmid, 1812) (N)
Trechus rotundatus Dejean, 1831 (N?) (*)
Trechus modestus Putzeys, 1874 (N) (E)
Trechus bergamascus Jeannel, 1927 (N) (E)
Trechus salassus Jeannel, 1927 (E)
 Trechus salassus salassus Jeannel, 1927 (N)
 Trechus salassus montiszedae Binaghi, 1945 (N)
Trechus vallestris Daniel & Daniel, 1898 (N) (E)
Trechus delarouzei Pandellé, 1867 (N)
Trechus maritimus Deville, 1908 (N)
Trechus naldii Ghidini, 1932 (N) (E)
Trechus montispennae Jeannel, 1927 (N) (E)
Trechus montiscusnae Focarile, 1952 (N) (E)
Trechus bensai Jeannel, 1927 (N) (E)
Trechus zangherii Jeannel, 1927 (S) (E)
Trechus solarii Jeannel, 1921 (S) (E)
Trechus pennisii Magrini, 1984 (S) (E)
Trechus osellai Battoni & Vigna Taglianti, 1993 (S) (E)
Trechus hummleri Jeannel, 1927 (S) (E)
Trechus cerrutii Focarile, 1950 (S) (E)
Trechus straneo Jeannel, 1931 (S) (E)
Trechus montismaiellae Ghidini, 1932 (S) (E)
Trechus angelae Magrini, 1984 (S) (E)

Sardaphaenops Cerruti & Henrot, 1956

Sardaphaenops supramontanus Cerruti & Henrot, 1956 (E)
 Sardaphaenops supramontanus supramontanus Cerruti & Henrot, 1956 (Sa)
 Sardaphaenops supramontanus grafittii Casale & Giachino, 1988 (Sa)

Doderotrechus Vigna Taglianti, 1968

Doderotrechus casalei Vigna Taglianti, 1969 (N) (E)
Doderotrechus crissolensis (Dodero, 1924) (N) (E)
Doderotrechus ghiliani (Fairmaire, 1859) (E)
 Doderotrechus ghiliani ghiliani (Fairmaire, 1859) (N)
 Doderotrechus ghiliani sampoi Casale, 1980 (N)
 Doderotrechus ghiliani valpellicis Casale, 1980 (N)

Boldoriella (Boldoriella) Jeannel, 1928

- Boldoriella (Boldoriella) carminatii* (Doderò, 1917) (E)
- Boldoriella (Boldoriella) carminatii carminatii* (Doderò, 1917) (N)
- Boldoriella (Boldoriella) carminatii bucciarellii* Monguzzi, 1982 (N)
- Boldoriella (Boldoriella) concii* Monguzzi, 1982 (E)
- Boldoriella (Boldoriella) concii concii* Monguzzi, 1982 (N)
- Boldoriella (Boldoriella) concii folinii* Monguzzi, 1982 (N)
- Boldoriella (Boldoriella) concii culminicola* Monguzzi, 1982 (N)
- Boldoriella (Boldoriella) pozziae* (Bari, 1957) (N) (E)
- Boldoriella (Boldoriella) humeralis* (Doderò, 1924) (N) (E)
- Boldoriella (Boldoriella) monguzzii* Bucciarelli, 1978 (N) (E)
- Boldoriella (Boldoriella) gratiae* Bucciarelli, 1978 (N) (E)

Boldoriella (Insubrites) Monguzzi, 1982

- Boldoriella (Insubrites) knauthi* (Ganglbauer, 1904) (N) (E)
- Boldoriella (Insubrites) binaghii* Bucciarelli, 1978 (E)
- Boldoriella (Insubrites) binaghii binaghii* Bucciarelli, 1978 (N)
- Boldoriella (Insubrites) binaghii leonardii* Monguzzi, 1982 (N)
- Boldoriella (Insubrites) serianensis* (Breit, 1913) (E)
- Boldoriella (Insubrites) serianensis serianensis* (Breit, 1913) (N)
- Boldoriella (Insubrites) serianensis rosai* Bucciarelli, 1978 (N)
- Boldoriella (Insubrites) pesarinii* Sciaky, 1982 (E)
- Boldoriella (Insubrites) pesarinii pesarinii* Sciaky, 1982 (N)
- Boldoriella (Insubrites) pesarinii formici* Monguzzi, 1982 (N)
- Boldoriella (Insubrites) brembana* (Binaghi, 1937) (N) (E)
- Boldoriella (Insubrites) focarilei* (Rossi, 1965) (E)
- Boldoriella (Insubrites) focarilei focarilei* (Rossi, 1965) (N)
- Boldoriella (Insubrites) focarilei venturosae* Monguzzi, 1982 (N)
- Boldoriella (Insubrites) chiarae* Monguzzi, 1982 (N) (E)
- Boldoriella (Insubrites) tedeschi* (Sciaky, 1977)
- Boldoriella (Insubrites) tedeschi tedeschi* (Sciaky, 1977) (N)
- Boldoriella (Insubrites) tedeschi valassinae* Monguzzi, 1982 (N)
- Boldoriella (Insubrites) grignensis* Monzini, 1987 (N) (E)

Allegrettia Jeannel, 1928

- Allegrettia boldorii* Jeannel, 1928 (N) (E)
- Allegrettia zavattarii* Ghidini, 1934 (N) (E)
- Allegrettia pavani* Bari & Rossi, 1965 (N) (E)
- Allegrettia tacoensis* Comotti, 1991 (N) (E)

Italaphaenops Ghidini, 1964

- Italaphaenops dimaioi* Ghidini, 1964 (N) (E)

Lessinodytes Vigna Taglianti, 1982

Lessinodytes caoduroi Vigna Taglianti, 1982 (N) (E)
Lessinodytes pivai Vigna Taglianti & Sciaky, 1988 (N) (E)
Lessinodytes glacialis Vigna Taglianti & Sciaky, 1988 (N) (E)

Orotrechus Müller G., 1913

Orotrechus fiorii (Alzona, 1899) (N) (E)
Orotrechus cavallensis Jeannel, 1928 (N) (E)
Orotrechus pavionis Meggiolaro, 1961 (N) (E)
Orotrechus mandriolae (Ganglbauer, 1911) (N) (E)
Orotrechus ruffoi Tamanini, 1953 (N) (E)
Orotrechus targionii (Dalla Torre, 1879) (E)
 Orotrechus targionii targionii (Della Torre, 1879) (N)
 Orotrechus targionii pasubianus Jeannel, 1928 (N)
 Orotrechus targionii alticola Jeannel, 1928 (N)
 Orotrechus targionii ganglbaueri Jeannel, 1928 (N)
 Orotrechus targionii concii Tamanini, 1953 (N)
 Orotrechus targionii gestroi Tamanini, 1953 (N)
 Orotrechus targionii galvagnii Tamanini, 1953 (N)
 Orotrechus targionii slongoi Daffner, 1989 (N)
Orotrechus montellensis Agazzi, 1956 (N) (E)
Orotrechus giordanii Agazzi, 1957 (E)
 Orotrechus giordanii giordanii Agazzi, 1957 (N)
 Orotrechus giordanii antennarius Daffner, 1990 (N)
Orotrechus robustus Jeannel, 1928 (N) (E)
Orotrechus forojulensis Busulini, 1959 (N) (E)
Orotrechus springeri Müller G., 1928 (N) (E)
Orotrechus winkleri Meggiolaro, 1958 (E)
 Orotrechus winkleri winkleri Meggiolaro, 1958 (N)
 Orotrechus winkleri montisragognae Porro & Porro, 1971 (N)
Orotrechus holdhausi (Ganglbauer, 1904) (E)
 Orotrechus holdhausi holdhausi (Ganglbauer, 1904) (N)
 Orotrechus holdhausi bucciarellii Tamanini, 1954 (N)
 Orotrechus holdhausi marginalis Busulini, 1959 (N)
 Orotrechus holdhausi fortii Müller G., 1963 (N)
 Orotrechus holdhausi donazzoloi Daffner, 1988 (N)
Orotrechus longeantennatus Daffner, 1992 (N) (E)
Orotrechus muellerianus (Schatzmayr, 1907) (E)
 Orotrechus muellerianus muellerianus (Schatzmayr, 1907) (N)
 Orotrechus muellerianus primigenius Müller G., 1926 (N)
Orotrechus globulipennis (Schaum, 1860)
 Orotrechus globulipennis chendae Schatzmayr, 1922 (N)
 Orotrechus globulipennis kalisi Müller G., 1931 (N)
 Orotrechus globulipennis tarcentinus Meggiolaro, 1961 (N)
 Orotrechus globulipennis rudnicaensis Meggiolaro, 1961 (N)
 Orotrechus globulipennis inferior Meggiolaro, 1964 (N)
Orotrechus torretassoi Müller G., 1928 (N) (E)

Orotrechus fabianii (Gestro, 1900) (N) (E)
Orotrechus vicentinus (Gestro, 1907) (E)
 Orotrechus vicentinus vicentinus (Gestro, 1907) (N)
 Orotrechus vicentinus juccii Pomini, 1940 (N)
 Orotrechus vicentinus martinellii Daffner, 1987 (N)
Orotrechus euganeus Pace, 1974 (N) (E)
Orotrechus stephani (Müller G., 1913) (E)
 Orotrechus stephani stephani (Müller G., 1913) (N)
 Orotrechus stephani roboretanus Müller G., 1933 (N)
 Orotrechus stephani perinii Tamanini, 1953 (N)
 Orotrechus stephani prenottai Daffner, 1986 (N)
Orotrechus pominii Tamanini, 1953 (N) (E)
Orotrechus gracilis Meggiolaro, 1961 (N) (E)
Orotrechus venetianus (Winkler, 1911) (E)
 Orotrechus venetianus venetianus (Winkler, 1911) (N)
 Orotrechus venetianus cellinae Müller G., 1963 (N)
Orotrechus messai (Müller G., 1913) (E)
 Orotrechus messai messai (Müller G., 1913) (N)
 Orotrechus messai major Busulini, 1959 (N)
Orotrechus sebenelloi Daffner, 1983 (N) (E)
Orotrechus jamae Etonti & Etonti, 1979 (N) (E)
Orotrechus schwienbacheri Grottolo & Martinelli, 1991 (N) (E)
Orotrechus gigas Vigna Taglianti, 1981 (N) (E)
Orotrechus dallarmii Daffner, 1987 (N) (E)
Orotrechus theresiae Casale, Etonti & Giachino, 1992 (N) (E)

***Typhlotrechus* Müller G., 1913**

Typhlotrechus bilimeki (Sturm, 1847) (*)
 Typhlotrechus bilimeki tergestinus (Müller G., 1905) (N)
 Typhlotrechus bilimeki istrus Müller G., 1926 (N)

***Duvalius* Delarouzée, 1859**

Duvalius exaratus (Schaum, 1860) (*)
 Duvalius exaratus springeri Müller G., 1921 (N)
Duvalius wingelmuelleri (Ganglbauer, 1904) (N) (E)
Duvalius judicariae Jeannel, 1926 (N) (E)
Duvalius adamellensis Jeannel, 1926 (N) (E)
Duvalius nambinensis Boldori, 1935 (N) (E)
Duvalius boldorii Jeannel, 1926 (E)
 Duvalius boldorii boldorii Jeannel, 1926 (N)
 Duvalius boldorii vaghezza Ghidini, 1937 (N)
 Duvalius boldorii leonidae Ghidini, 1937 (N)
Duvalius winklerianus Jeannel, 1926 (E)
 Duvalius winklerianus winklerianus Jeannel, 1936 (N)
 Duvalius winklerianus brescianus Jeannel, 1926 (N)
 Duvalius winklerianus magistrettii Binaghi, 1939 (N)

Duvalius longhii (Comolli, 1837)
 Duvalius longhii longhii (Comolli, 1837) (N)
 Duvalius longhii larianus Bari, 1940 (N)
 Duvalius longhii binaghii Vigna Taglianti, 1982 (N)
Duvalius spaethi (Ganglbauer, 1904) (N) (E)
Duvalius breiti (Ganglbauer, 1899) (N) (E)
Duvalius baldensis (Putzeys, 1870) (E)
 Duvalius baldensis baldensis (Putzeys, 1870) (N)
 Duvalius baldensis pasubianus (Ganglbauer, 1904) (N)
 Duvalius baldensis cartolarii Pomini, 1936 (N)
 Duvalius baldensis tombeanus (Ganglbauer, 1904) (N)
Duvalius ghidinii (Gestro, 1909) (N) (E)
Duvalius gentilei (Gestro, 1885) (E)
 Duvalius gentilei gentilei (Gestro, 1885) (N)
 Duvalius gentilei spagnoloi (Gestro, 1885) (N)
 Duvalius gentilei vaccai (Gestro, 1885) (N)
Duvalius carantii (Sella, 1874) (N) (E)
Duvalius pecoudi Jeannel, 1937 (N) (E)
Duvalius iulianae Vigna Taglianti & Casale, 1973 (N) (E)
Duvalius morisii Vigna Taglianti & Casale, 1973 (N) (E)
Duvalius occitanus Casale & Vigna Taglianti, 1993 (N) (E)
Duvalius clairi (Abeille, 1880) (N)
Duvalius canevoi (Gestro, 1885) (N) (E)
Duvalius doriai (Fairmaire, 1859) (E) (*)
 Duvalius doriai doriai (Fairmaire, 1859) (N)
 Duvalius doriai liguricus (Dieck, 1869) (N)
 Duvalius doriai casellii (Gestro, 1898) (N)
 Duvalius doriai brianii (Mancini, 1912) (S)
 Duvalius doriai carrarae Jeannel, 1928 (S)
Duvalius vallombrosus Rasetti & Rasetti, 1920 (S) (E)
Duvalius degiovannii Magrini & Vanni, 1984 (E) (*)
 Duvalius degiovannii degiovannii Magrini & Vanni, 1984 (S)
 Duvalius degiovannii iolandae Magrini & Vanni, 1986 (N)
Duvalius annamariae Vanni & Magrini, 1989 (S) (E)
Duvalius bensai (Gestro, 1892) (E)
 Duvalius bensai bensai (Gestro, 1892) (S)
 Duvalius bensai lombardii Straneo, 1939 (S)
 Duvalius bensai faillai Magrini & Vanni, 1984 (S)
Duvalius andreuccii Magrini & Vanni, 1984 (S) (E)
Duvalius ruffoi Magistretti, 1956 (S) (E)
Duvalius straneoi Jeannel, 1931 (S) (E)
Duvalius magistrettianus Schatzmayr, 1940 (S) (E)
Duvalius pennisii Magrini & Vanni, 1984 (S) (E)
Duvalius cirocchii Magrini & Vanni, 1986 (S) (E)
Duvalius rossii Magrini & Vanni, 1991 (S) (E)
Duvalius franchettii (Luigioni, 1926) (S) (E)
Duvalius lepinensis Cerruti, 1950 (S) (E)
Duvalius cerrutii Sbordonio & Di Domenico, 1967 (S) (E)

Duvalius volscus Franzini & Franzini, 1984 (S) (E)
Duvalius oscus Franzini & Franzini, 1984 (S) (E)
Duvalius carchinii Vigna Taglianti, Magrini & Vanni 1993 (S) (E)
Duvalius caoduroi Pace, 1986 (S) (E)
Duvalius siculus (Baudi, 1882) (Si) (E)
Duvalius marii Vanni, Magrini & Pennisi, 1992 (Si) (E)
Duvalius silvestrii (Gestro, 1896) (Si) (E)
Duvalius sardous (Dodero, 1917) (Sa) (E)
Duvalius annae Briganti, 1976 (N) (E)
Duvalius ramorinii (Gestro, 1887) (N) (E)
Duvalius doderoi (Gestro, 1885) (N) (E)
Duvalius gestroi (Dodero, 1900) (N) (E)
Duvalius angelae Vanni & Magrini, 1984 (S) (E)
Duvalius apuanus (Dodero, 1917) (S) (E)
Duvalius andreinii (Gestro, 1907) (S) (E)
Duvalius brucki (Piccioli, 1870) (E)
 Duvalius brucki brucki (Piccioli, 1870) (S)
 Duvalius brucki maginii Magrini, 1976 (S)
Duvalius guareschii Moscardini, 1949 (E) (*)
 Duvalius guareschii guareschii Moscardini, 1949 (N, S)
 Duvalius guareschii montemurroi Vanni & Magrini, 1986 (S)
Duvalius bernii Vanni & Magrini, 1986 (S) (E)
Duvalius menozzii (Dodero, 1917) (N) (E)
Duvalius malavoltii Moscardini, 1956 (E)
 Duvalius malavoltii malavoltii Moscardini, 1956 (N)
 Duvalius malavoltii busii Magrini & Vanni, 1984 (N)
Duvalius aspettatii Magrini, 1982 (N) (E)
Duvalius mugellii Magrini, 1982 (S) (E)
Duvalius magrinii Vanni & Lanza, 1983 (S) (E)
Duvalius jureceki (Dodero, 1917) (E)
 Duvalius jureceki jureceki (Dodero, 1917) (S)
 Duvalius jureceki rasettii (Dodero, 1917) (S)
 Duvalius jureceki intermedius (Rasetti & Rasetti, 1921) (S)
 Duvalius jureceki lanzai Straneo, 1943 (S)
 Duvalius jureceki maginianus Magrini & Vanni, 1984 (S)
 Duvalius jureceki aemiliae Vanni & Magrini, 1986 (S)
Duvalius bianchii Jeannel, 1928 (E) (*)
 Duvalius bianchii bianchii Jeannel, 1928 (S)
 Duvalius bianchii bettii Magrini, 1982 (N)
 Duvalius bianchii pupulus Busi & Rocca, 1983 (N)
 Duvalius bianchii cycnus Busi & Rocca, 1983 (N)
 Duvalius bianchii mingazzinii Magrini & Vanni, 1985 (S)

Agostinia Jeannel, 1928

Agostinia launii (Gestro, 1892) (N)

Anophthalmus Sturm, 1844

Anophthalmus schmidti Sturm, 1844
 Anophthalmus schmidti trebicianus (Müller G., 1915) (N)
Anophthalmus scopolii Sturm, 1851
 Anophthalmus scopolii mataiurensis Müller G., 1935 (N)
 Anophthalmus scopolii tribilensis Meggiolaro, 1958 (N)
Anophthalmus bohiniensis (Ganglbauer, 1903)
 Anophthalmus bohiniensis stolfai Müller G., 1931 (N)
Anophthalmus baratellii Sciaky, 1985 (N) (E)
Anophthalmus fabbrii Müller G., 1931 (E)
 Anophthalmus fabbrii fabbrii Müller G., 1931 (N)
 Anophthalmus fabbrii linicola Sciaky, 1987 (N)
 Anophthalmus fabbrii chiappai Sciaky, 1987 (N)
Anophthalmus nivalis Müller G., 1922
 Anophthalmus nivalis montismatajuris Colla, 1987 (N)
Anophthalmus charon Meggiolaro, 1964 (N) (E)
Anophthalmus hirtus Sturm, 1853
 Anophthalmus hirtus mayeri (Müller G., 1909) (N)
 Anophthalmus hirtus terminalis Sciaky, 1987 (N)

Pogonus (Pogonus) Dejean, 1821

Pogonus (Pogonus) luridipennis (Germar, 1822) (N, S, Sa)
Pogonus (Pogonus) pallidipennis Dejean, 1828 (Sa)
Pogonus (Pogonus) gilvipes Dejean, 1828 (S, Si, Sa)
Pogonus (Pogonus) chalceus (Marsham, 1802) (S, Si, Sa)
Pogonus (Pogonus) littoralis (Duftschmid, 1812) (N, S, Si, Sa)
Pogonus (Pogonus) riparius Dejean, 1828 (N, S, Sa)

Pogonus (Pogonoidius) Carret, 1903

Pogonus (Pogonoidius) meridionalis Dejean, 1828 (S, Si?, Sa?)

Pogonistes Chaudoir, 1871

Pogonistes gracilis (Dejean, 1828) (N, S, Si, Sa)
Pogonistes rufoaeneus (Dejean, 1828) (S)

Syrdenus Chaudoir, 1871

Syrdenus filiformis (Dejean, 1828) (Si, Sa)
Syrdenus grayii (Wollaston, 1862) (Si)

Patrobus Dejean, 1821

Patrobus atrorufus (Ström, 1768) (N)
Patrobus septentrionis Dejean, 1828 (N)

Deltomerus Motschulsky, 1850

Deltomerus depressus Fiori, 1896 (E)

Deltomerus depressus depressus Fiori, 1896 (S)

Deltomerus depressus landii Battoni & Tombesi, 1989 (S)

Trechicus Leconte, 1853

Trechicus nigriceps (Dejean, 1831) (N, S) (*)

Atranus Leconte, 1848

Atranus collaris (Ménétriés, 1832) (N, S, Si, Sa)

Platynus (Platynus) Bonelli, 1810

Platynus (Platynus) assimilis (Paykull, 1790) (N, S)

Platynus (Platynus) krynickii (Sperk, 1835) (N, S)

Platynus (Platynus) longiventris (Mannerheim, 1825) (N)

Platynus (Batenus) Motschulsky, 1864

Platynus (Batenus) livens (Gyllenhal, 1810) (N, S?)

Platynus (Platynidius) Casey, 1920

Platynus (Platynidius) complanatus (Dejean, 1828) (N) (E)

Platynus (Platynidius) depressus (Dejean, 1832) (N)

Platynus (Platynidius) peirolerii (Bassi, 1834) (N)

Platynus (Platynidius) sexualis (Daniel & Daniel, 1898) (N)

Platynus (Platynidius) teriolensis (Daniel & Daniel, 1898) (N) (E)

Platynus (Platynidius) scrobiculatus (Fabricius, 1810) (N)

Cardiomeria Bassi, 1834

Cardiomeria genei Bassi, 1834 (Si)

Agelaea Gené, 1839

Agelaea fulva Gené, 1839 (Sa) (E)

Paranchus Lindroth, 1974

Paranchus albipes (Fabricius, 1796) (N, S, Si, Sa)

Oxypselaphus Chaudoir, 1843

Oxypselaphus obscurus (Herbst, 1784) (N, S)

Anchomenus (Anchomenus) Bonelli, 1810

Anchomenus (Anchomenus) dorsalis (Pontoppidan, 1763) (N, S, Si, Sa)

Anchomenus (Anchodemus) Motschulsky, 1864

Anchomenus (Anchodemus) cyaneus (Dejean, 1828) (N, S) (*)

Sericoda Kirby, 1837

Sericoda quadripunctatum (Degeer, 1774) (N)

Agonum Bonelli, 1810

Agonum marginatum (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)

Agonum viridicupreum (Goeze, 1777) (N, S)

Agonum ericeti (Panzer, 1809) (N)

Agonum impressum (Panzer, 1797) (N)

Agonum sexpunctatum (Linné, 1758) (N, S)

Agonum gracilipes (Duftschmid, 1812) (N)

Agonum muelleri (Herbst, 1784)

Agonum muelleri muelleri (Herbst, 1784) (N, S)

Agonum muelleri unicolor Leoni, 1907 (S, Si?, Sa)

Agonum numidicum Lucas, 1846 (S, Si, Sa)

Agonum atratum (Duftschmid, 1812) (N, S, Si)

Agonum extensum Ménétriés, 1849 (Sa)

Agonum dolens (Sahlberg, 1827) (N?) (*)

Agonum lugens (Duftschmid, 1812) (N, S, Si, Sa)

Agonum versutum Sturm, 1824 (N)

Agonum viduum (Panzer, 1797) (N, S, Sa)

Agonum moestum (Duftschmid, 1812) (N, S, Si, Sa)

Agonum alpestre Heer, 1838 (N)

Agonum nigrum Dejean, 1828 (N, S, Si, Sa)

Agonum longicorne Chaudoir, 1846 (N, S, Sa)

Agonum sordidum Dejean, 1828

Agonum sordidum gridellii Schatzmayr, 1912 (N, S, Si?)

Agonum antennarius (Duftschmid, 1812) (N)

Europhilus Chaudoir, 1859

Europhilus fuliginosus (Panzer, 1809) (N, S)

Europhilus gracilis (Sturm, 1824) (N, S)

Europhilus micans (Nicolai, 1822) (N)

Europhilus piceus (Linné, 1758) (N?, S)

Europhilus scitulus (Dejean, 1828) (N?) (*)

Europhilus thoreyi (Dejean, 1828) (N, S, Si, Sa)

Olisthopus Dejean, 1828

Olisthopus elongatus Wollaston, 1854 (Si, Sa)
Olisthopus fuscatus Dejean, 1828 (N, S, Si, Sa)
Olisthopus glabricollis (Germar, 1817) (N, S, Si, Sa)
Olisthopus rotundatus (Paykull, 1790) (N, S) (*)
Olisthopus sturmi (Duftschmid, 1812) (N, S)

Platyderus Stephens, 1828

Platyderus canaliculatus Chaudoir, 1843 (Si) (E)
Platyderus neapolitanus Reiche, 1855 (E)
 Platyderus neapolitanus neapolitanus Reiche, 1855 (N, S)
 Platyderus neapolitanus jannonei Binaghi in Magistretti, 1955 (S)
Platyderus dalmatinus Miller, 1880 (S)
Platyderus lombardii Straneo, 1959 (Si) (E)
Platyderus ruficollis (Marsham, 1802) (N, Si?)
Platyderus rufus (Duftschmid, 1812) (*)
 Platyderus rufus transalpinus Breit, 1914 (N, S)

Synuchus Gyllenhal, 1810

Synuchus vivalis (Illiger, 1798) (N, S, Si)

Calathus Bonelli, 1810

Calathus circumseptus Germar, 1824 (N, S, Si, Sa)
Calathus melanocephalus (Linné, 1758) (N, S, Si?, Sa?)
Calathus cinctus Motschulsky, 1850 (N, S, Si, Sa)
Calathus micropterus (Duftschmid, 1812) (N)
Calathus mollis Marsham, 1802 (N, S, Si, Sa)
Calathus piceus (Marsham, 1802) (S)
Calathus montivagus Dejean 1831 (S, Si) (E)
Calathus rubripes Dejean, 1831 (N, S) (E) (*)
Calathus ambiguus (Paykull, 1790) (N, S, Si, Sa?)
Calathus erratus (Sahlberg, 1827) (N, S)
Calathus glabricollis Dejean, 1828 (N) (*)
Calathus fracassii Heyden, 1908 (E) (*)
 Calathus fracassii fracassii Heyden, 1908 (S)
 Calathus fracassii luigionii Leoni, 1908 (N, S)
Calathus focarilei Schatzmayr, 1947 (S) (E)
Calathus pirazzolii Putzeys, 1873 (N, S) (E) (*)
Calathus tombesii Battoni, 1976 (S) (E)
Calathus sirentensis D'Amore, 1908 (S) (E)
Calathus fuscipes (Goeze, 1777)
 Calathus fuscipes latus Serville, 1821 (N, S, Si, Sa?)
Calathus solieri Bassi, 1834 (Si, Sa)

Dolichus Bonelli, 1810

Dolichus halensis (Schaller, 1783) (N, S) (*)

Sphodropsis Seidlitz, 1887

Sphodropsis ghilianii (Schaum, 1858)

Sphodropsis ghilianii ghilianii (Schaum, 1858) (N)

Sphodropsis ghilianii caprai Binaghi, 1939 (N)

Sphodrus Clairville, 1806

Sphodrus leucophthalmus (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)

Laemostenus (Laemostenus) Bonelli, 1810

Laemostenus (Laemostenus) complanatus (Dejean, 1828) (N, S, Si, Sa)

Laemostenus (Laemostenus) venustus (Dejean, 1828) (N, S, Sa?)

Laemostenus (Laemostenus) barbarus (Lucas, 1846) (S, Si) (*)

Laemostenus (Laemostenus) janthinus (Duftschmid, 1812)

Laemostenus (Laemostenus) janthinus janthinus (Duftschmid, 1812) (N)

Laemostenus (Laemostenus) janthinus coeruleus (Dejean, 1828) (N)

Laemostenus (Laemostenus) magellensis Leoni, 1907 (S) (E)

Laemostenus (Laemostenus) alpinus (Dejean, 1828) (N?) (*)

Laemostenus (Laemostenus) dalmatinus (Dejean, 1828) (N)

Laemostenus (Actenipus) Jeannel, 1937

Laemostenus (Actenipus) acutangulus (Schaufuss, 1862) (S) (E)

Laemostenus (Actenipus) carinatus (Chaudoir, 1859) (S, Sa) (*)

Laemostenus (Actenipus) obtusus (Chaudoir, 1861) (N)

Laemostenus (Actenipus) ginellae (Morisi, 1973) (N) (E)

Laemostenus (Actenipus) latialis Leoni, 1907 (S) (E)

Laemostenus (Actenipus) elegans (Dejean, 1828) (N)

Laemostenus (Actenipus) macropus (Chaudoir, 1861) (N)

Laemostenus (Actenipus) pippiai (Fiori, 1961) (Sa) (E)

Laemostenus (Actenipus) angustatus (Dejean, 1828) (N)

Laemostenus (Antisphodrus) Schaufuss, 1865

Laemostenus (Antisphodrus) schreibersi (Küster, 1846) (N)

Laemostenus (Antisphodrus) insubricus Ganglbauer, 1903 (N) (E)

Laemostenus (Antisphodrus) reissi Ganglbauer, 1911 (E)

Laemostenus (Antisphodrus) reissi reissi Ganglbauer, 1911 (N)

Laemostenus (Antisphodrus) reissi boldorii (Dodero, 1924) (N)

Laemostenus (Antisphodrus) monguzzii Casale, 1988 (N) (E)

Laemostenus (Antisphodrus) elongatus (Dejean, 1828)

Laemostenus (Antisphodrus) elongatus elongatus (Dejean, 1828) (N)

Laemostenus (Antisphodrus) cavicola (Schaum, 1858)
Laemostenus (Antisphodrus) cavicola cavicola (Schaum, 1858) (N)

***Laemostenus (Pristonychus)* Dejean, 1828**

Laemostenus (Pristonychus) terricola (Herbst, 1784) (*)
Laemostenus (Pristonychus) terricola terricola (Herbst, 1784) (N, S, Si)
Laemostenus (Pristonychus) cimmerius (Fischer-Waldheim, 1823)
Laemostenus (Pristonychus) cimmerius cimmerius (Fischer-Waldheim, 1823) (S)
Laemostenus (Pristonychus) algerinus (Gory, 1833)
Laemostenus (Pristonychus) algerinus algerinus (Gory, 1833) (N, S, Si, Sa)

***Laemostenus (Sphodroides)* Schaufuss, 1865**

Laemostenus (Sphodroides) picicornis (Dejean & Boisduval, 1830) (*)
Laemostenus (Sphodroides) picicornis picicornis (Dejean & Boisduval, 1830) (Si)

***Astigis* Rambur, 1838**

Astigis salzmanni (Germar, 1824) (N, Si, Sa)

***Platysma (Platysma)* Bonelli, 1810**

Platysma (Platysma) nigrum (Schaller, 1783) (N, S, Sa)

***Platysma (Morphnosoma)* Lutshnik, 1915**

Platysma (Morphnosoma) melanarium (Illiger, 1798) (N, S)

***Platysma (Melanius)* Bonelli, 1810**

Platysma (Melanius) nigrita (Paykull, 1790) (N, S, Si, Sa)
Platysma (Melanius) rhaeticum (Heer, 1837) (N, S)
Platysma (Melanius) anthracinum (Illiger, 1798) (*)
Platysma (Melanius) anthracinum hespericum Bucciarelli & Sopracordevole, 1958 (N, S)
Platysma (Melanius) anthracinum biimpressum (Küster, 1853) (N, S)
Platysma (Melanius) gracile (Dejean, 1828) (N, S, Sa)
Platysma (Melanius) oenotrium (Ravizza, 1975) (N, S)

***Platysma (Adelosia)* Stephens, 1835**

Platysma (Adelosia) macrum (Marsham, 1802) (N, S)

***Haptoderus (Haptoderus)* Chaudoir, 1838**

Haptoderus (Haptoderus) unctulatus (Duftschmid, 1812) (N)
Haptoderus (Haptoderus) apenninus (Dejean, 1831) (N, S) (E)

Haptoderus (Haptoderus) josephi (Csiki, 1928) (N) (E)
Haptoderus (Haptoderus) subsinuatus (Dejean, 1825) (N)
Haptoderus (Haptoderus) brevis (Duftschmid, 1812) (N) (*)

Haptoderus (Pseudorites) Ganglbauer, 1892

Haptoderus (Pseudorites) nicaeensis (Villa, 1835) (N)

Steropus (Steropus) Dejean, 1821

Steropus (Steropus) aethiops (Panzer, 1797) (N)

Steropus (Steropidius) Jeanne, 1989

Steropus (Steropidius) madidus (Fabricius, 1775) (N)

Steropus (Feronidius) Jeannel, 1942

Steropus (Feronidius) melas (Creutzer, 1799)
Steropus (Feronidius) melas depressus (Dejean, 1828) (N)
Steropus (Feronidius) melas italicus (Dejean, 1828) (N, S, Si)

Pseudosteropus Chaudoir, 1838

Pseudosteropus cognatus (Dejean, 1831) (N)

Pterostichus (Cheporus) Latreille, 1829

Pterostichus (Cheporus) burmeisteri Heer, 1841
Pterostichus (Cheporus) burmeisteri burmeisteri Heer, 1841 (N)
Pterostichus (Cheporus) burmeisteri baldensis Schaum, 1862 (N)
Pterostichus (Cheporus) dissimilis Villa & Villa, 1833 (N) (E)
Pterostichus (Cheporus) transversalis (Duftschmid, 1812) (N?) (*)

Pterostichus (Petrophilus) Chaudoir, 1838

Pterostichus (Petrophilus) kokeili Miller, 1850 (N)

Pterostichus (Platypterus) Chaudoir, 1838

Pterostichus (Platypterus) truncatus Dejean, 1828
Pterostichus (Platypterus) truncatus truncatus Dejean, 1828 (N)
Pterostichus (Platypterus) truncatus imitator Deville, 1902 (N)
Pterostichus (Platypterus) truncatus dilatatus Villa, 1835 (N)
Pterostichus (Platypterus) zieglerei (Duftschmid, 1812) (N)
Pterostichus (Platypterus) lombardus Daniel & Daniel, 1900 (N) (E)

Pterostichus (Pterostichus) Bonelli, 1810

Pterostichus (Pterostichus) fasciatopunctatus (Creutzer, 1799) (N)
Pterostichus (Pterostichus) schaschli Marseul, 1880 (N)
Pterostichus (Pterostichus) auratus Heer, 1838 (N)
Pterostichus (Pterostichus) rutilans Dejean, 1828 (N)
Pterostichus (Pterostichus) vagepunctatus Heer, 1838 (N)
Pterostichus (Pterostichus) impressicollis (Fairmaire & Laboulbène, 1854) (N, S)
Pterostichus (Pterostichus) focarilei Casale & Giachino, 1985 (S) (E)
Pterostichus (Pterostichus) honnorati Dejean, 1828
 Pterostichus (Pterostichus) honnorati honnorati Dejean, 1828 (N)
 Pterostichus (Pterostichus) honnorati sellai Stierlin, 1881 (N)
Pterostichus (Pterostichus) devillei Puel, 1924 (N?) (*)
Pterostichus (Pterostichus) funestes Csiki, 1930 (N)
Pterostichus (Pterostichus) phaeopus (De Marseul, 1882) (N)
Pterostichus (Pterostichus) pedemontanus Ganglbauer, 1892 (N) (E)
Pterostichus (Pterostichus) micans Heer, 1841 (N, S)
Pterostichus (Pterostichus) ruffoi Sciaky, 1986 (S) (E)
Pterostichus (Pterostichus) andreinii Doderò, 1922 (E)
 Pterostichus (Pterostichus) andreinii andreinii Doderò, 1922 (S)
 Pterostichus (Pterostichus) andreinii alzonae Binaghi, 1935 (S)
 Pterostichus (Pterostichus) andreinii battonii Straneo, 1959 (S)

***Pterostichus (Alecto)* Heyden, 1883**

Pterostichus (Alecto) grajus Dejean, 1828 (N) (E)

***Pterostichus (Oreophilus)* Chaudoir, 1838**

Pterostichus (Oreophilus) impressus (Fairmaire & Laboulbène, 1854) (N)
Pterostichus (Oreophilus) durazzoii Villa, 1835 (N)
Pterostichus (Oreophilus) planiusculus Chaudoir, 1859 (N)
Pterostichus (Oreophilus) parnassius Schaum, 1859 (N) (E)
Pterostichus (Oreophilus) bicolor Aragona, 1830
 Pterostichus (Oreophilus) bicolor bicolor Aragona, 1830 (N, S)
 Pterostichus (Oreophilus) bicolor amorei Ganglbauer, 1907 (S)
Pterostichus (Oreophilus) morio (Duftschmid, 1812)
 Pterostichus (Oreophilus) morio morio (Duftschmid, 1812) (N)
 Pterostichus (Oreophilus) morio baudii Chaudoir, 1868 (N)
 Pterostichus (Oreophilus) morio validiusculus Chaudoir, 1868 (N)
 Pterostichus (Oreophilus) morio maritimus Daniel J., 1903 (N)
 Pterostichus (Oreophilus) morio liguricus Daniel J., 1903 (N)
 Pterostichus (Oreophilus) morio samniticus Fiori, 1896 (S)
Pterostichus (Oreophilus) yvani Dejean, 1828 (N)
Pterostichus (Oreophilus) spinolae Dejean, 1828 (N)
Pterostichus (Oreophilus) multipunctatus Dejean, 1828 (N)
Pterostichus (Oreophilus) externepunctatus Dejean, 1828 (N)
Pterostichus (Oreophilus) jurinei (Panzer, 1805) (N)
Pterostichus (Oreophilus) cribratus Dejean, 1828 (N) (E)

Pterostichus (Oreophilus) flavofemoratus Dejean, 1828 (N)

Tapinopterus (Crisimus) Habelmann, 1885

Tapinopterus (Crisimus) placidus (Rosenhauer, 1847) (E)

Tapinopterus (Crisimus) placidus placidus (Rosenhauer, 1847) (N)

Tapinopterus (Crisimus) placidus besucheti Bucciarelli, 1958 (N)

Speluncarius Reitter, 1886

Speluncarius stefani (Jurecek, 1910) (N) (E)

Speluncarius pesarini Bucciarelli, 1979 (N) (E)

Speluncarius bericus Monguzzi, 1982 (N) (E)

Stomis Clairville, 1806

Stomis pumicatus (Panzer, 1796) (N, S, Si)

Stomis bucciarellii Pesarini, 1979 (N) (E)

Stomis rostratus (Sturm in Duftschmid, 1812)

Stomis rostratus rostratus (Sturm in Duftschmid, 1812) (N)

Stomis rostratus schatzmayri Monzini & Pesarini, 1986 (N)

Stomis rostratus ceresai Schatzmayr, 1925 (N)

Stomis roccai Schatzmayr, 1925 (E) (*)

Stomis roccai roccai Schatzmayr, 1925 (N)

Stomis roccai mancinii Schatzmayr, 1925 (N, S)

Stomis elegans Chaudoir, 1861 (N)

Pedius Motschulsky, 1850

Pedius inquinatus (Sturm, 1824) (S)

Pedius sculus (Levrat, 1857) (Si) (E)

Argutor Dejean, 1821

Argutor cursor (Dejean, 1828) (N, S, Si, Sa)

Argutor vernalis (Panzer, 1796) (N, S)

Phonias Gozis, 1886

Phonias diligens (Sturm, 1824) (N, S)

Phonias ovoideus (Sturm, 1824)

Phonias ovoideus ovoideus (Sturm, 1824) (N)

Phonias ovoideus mainardii (Straneo, 1934) (N, S)

Phonias strenuus (Panzer, 1797) (N, S)

Bothriopterus Chaudoir, 1838

Bothriopterus oblongopunctatus (Fabricius, 1787) (N, S)

Bothriopterus quadrioveolatus (Letzner, 1852) (N, S, Si)

Omaseus Dejean, 1821

Omaseus aterrimus (Herbst, 1784)

Omaseus aterrimus intermedius Bucciarelli & Perissinotto, 1959 (N)

Omaseus aterrimus ausonicus Bucciarelli & Perissinotto, 1959 (S)

Omaseus elongatus (Duftschmid, 1812) (N, S, Si, Sa)

Orthomus Chaudoir, 1838

Orthomus berytensis (Reiche & Saulcy, 1854) (Si, Sa)

Poecilus (Coelipus) Lutshnik, 1914

Poecilus (Coelipus) aerarius Coquerel, 1859 (Si)

Poecilus (Poecilus) Bonelli, 1810

Poecilus (Poecilus) cupreus (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)

Poecilus (Poecilus) cursorius (Dejean, 1828) (S)

Poecilus (Poecilus) quadricollis (Dejean, 1828) (Si?) (*)

Poecilus (Poecilus) versicolor (Sturm, 1824) (N, S)

Poecilus (Sogines) Stephens, 1828

Poecilus (Sogines) punctulatus (Schaller, 1763) (N) (*)

Poecilus (Macropoecilus) Lutshnik, 1914

Poecilus (Macropoecilus) koyi (Germar, 1824)

Poecilus (Macropoecilus) koyi viaticus (Dejean, 1828) (N)

Poecilus (Macropoecilus) koyi goricianus (Müller G., 1921) (N)

Poecilus (Macropoecilus) koyi brutius (Straneo, 1935) (S)

Poecilus (Macropoecilus) kugelanni (Panzer, 1797) (N)

Poecilus (Macropoecilus) lepidus (Leske, 1785)

Poecilus (Macropoecilus) lepidus gressorius (Dejean, 1828) (N, S)

Poecilus (Metapedius) Fiori, 1903

Poecilus (Metapedius) pantanellii Fiori, 1903 (N, S) (E)

Poecilus (Metapedius) striatopunctatus (Duftschmid, 1812) (N, S)

Angoleus Villa & Villa, 1833

Angoleus crenatus (Dejean, 1828) (S, Si, Sa)

Angoleus nitidus (Dejean, 1828) (S, Si, Sa)

Angoleus puncticollis (Dejean, 1828) (N, S)

Myas Dejean, 1828

Myas chalybaeus (Palliardi, 1825) (N)

Molops Bonelli, 1810

Molops striolatus (Fabricius, 1801)

Molops striolatus striolatus (Fabricius, 1801) (N)

Molops striolatus striatus Hänel, 1940 (N)

Molops elatus (Fabricius, 1801) (N)

Molops ovipennis Chaudoir, 1847 (N)

Molops medius Chaudoir, 1868 (N, S)

Molops piceus (Panzer, 1793) (*)

Molops piceus piceus (Panzer, 1793) (N?)

Molops piceus austriacus Ganglbauer, 1889 (N)

Molops tridentinus Müller G., 1918 (N) (E)

Tanythrix Schaum, 1858

Tanythrix edurus (Dejean, 1828) (N)

Tanythrix marginepunctatus (Dejean, 1831) (N) (E)

Tanythrix senilis Schaum, 1859 (N) (E)

Typhlochoromus Moczarski, 1913

Typhlochoromus stolzi Moczarski, 1913 (E)

Typhlochoromus stolzi stolzi Moczarski, 1913 (N)

Typhlochoromus stolzi corradoi Porro, 1968 (N)

Typhlochoromus marcelloi Busulini, 1956 (N) (E)

Speomolops Patrizi, 1955

Speomolops sardous Patrizi, 1955 (Sa) (E)

Percus Bonelli, 1810

Percus villai Kraatz, 1858 (N)

Percus passerinii (Dejean, 1828) (N, S) (E) (*)

Percus bilineatus (Dejean, 1828) (S) (E)

Percus dejeani (Dejean, 1931) (S) (E)

Percus paykulli (Rossi, 1790) (N, S) (E) (*)

Percus andreinii Mainardi, 1914 (S) (E)

Percus cylindricus Chaudoir, 1868 (Sa) (E)

Percus strictus (Dejean, 1828)

Percus strictus strictus (Dejean, 1828) (Sa)

Percus strictus oberleitneri Kraatz, 1858 (Sa)

Percus strictus folchinii Capra, 1926 (Sa)

Percus lacertosus (Dejean, 1828) (Si) (E)
Percus grandicollis Serville, 1821 (Sa)
Percus lineatus Solier, 1835 (Si)

Abax (Abax) Bonelli, 1810

Abax (Abax) ater (Villers, 1789)
 Abax (Abax) ater ater (Villers, 1789) (N)
 Abax (Abax) ater contractus Schaubерger, 1927 (N)
 Abax (Abax) ater lombardus Fiori, 1896 (N)
 Abax (Abax) ater inferior Seidlitz, 1891 (N)
 Abax (Abax) ater subpunctatus (Dejean, 1828) (N)
 Abax (Abax) ater curtulus Fairmaire, 1856 (S)
Abax (Abax) angustatus Fiori, 1896 (N)
Abax (Abax) oblongus (Dejean, 1831) (N)
Abax (Abax) arerae Schaubерger, 1927 (N) (E)
Abax (Abax) baenningeri Schaubерger, 1927 (N)
Abax (Abax) exaratus (Dejean, 1828) (N) (E)
Abax (Abax) parallelepipedus (Dejean, 1828) (N)
Abax (Abax) continuus Baudi, 1876 (N)
Abax (Abax) ovalis (Duftschmid, 1812) (N)
Abax (Abax) parallelus (Duftschmid, 1812) (N)
Abax (Abax) carinatus (Duftschmid, 1812)
 Abax (Abax) carinatus sulcatus Fiori, 1899 (N)

Abax (Pterostichoabax) Schaubерger, 1927

Abax (Pterostichoabax) beckenhaupti (Duftschmid, 1812)
 Abax (Pterostichoabax) beckenhaupti carnicus Ganglbauer, 1902 (N)
 Abax (Pterostichoabax) beckenhaupti schatzmayri Müller, 1926 (N)
Abax (Pterostichoabax) ecchellii Bertolini, 1887 (E)
 Abax (Pterostichoabax) ecchellii ecchellii Bertolini, 1887 (N)
 Abax (Pterostichoabax) ecchellii venetianus Müller, 1926 (N)
Abax (Pterostichoabax) springeri Müller, 1925 (N) (E)
Abax (Pterostichoabax) teriolensis Schaubерger, 1921 (N) (E)

Zabrus Clairville, 1806

Zabrus ignavus Csiki, 1907 (N, S, Si, Sa)
Zabrus tenebrioides (Goeze, 1777) (N, S, Si)
Zabrus costai Heyden, 1891 (S) (E)
Zabrus orsinii Dejean, 1831 (S) (E)

Amara (Zezea) Csiki, 1929

Amara (Zezea) concinna Zimmermann, 1832 (N, S, Sa)
Amara (Zezea) refulgens Reiche, 1875 (Si)
Amara (Zezea) floralis Gaubil, 1844 (S, Sa)

Amara (Zezea) fulvipes Serville, 1821 (N, S, Sa)
Amara (Zezea) kulti Fassati, 1947 (N, S)
Amara (Zezea) plebeja (Gyllenhal, 1810) (N, Sa?)
Amara (Zezea) rufipes Dejean, 1828 (S, Si, Sa)
Amara (Zezea) tricuspidata Dejean, 1831 (N, S)

***Amara (Amara)* Bonelli, 1810**

Amara (Amara) aenea (Degeer, 1774) (N, S, Si, Sa)
Amara (Amara) anthobia Villa & Villa, 1833 (N, S, Si, Sa?)
Amara (Amara) communis (Panzer, 1797) (N, S)
Amara (Amara) convexior Stephens, 1828 (N, S)
Amara (Amara) curta Dejean, 1828 (N, S)
Amara (Amara) eurynota (Panzer, 1797) (N, S, Si, Sa)
Amara (Amara) famelica Zimmermann, 1832 (N, S?)
Amara (Amara) familiaris (Duftschmid, 1812) (N, S)
Amara (Amara) lucida (Duftschmid, 1812) (N, S, Sa)
Amara (Amara) lunicollis Schiödte, 1837 (N, S)
Amara (Amara) montivaga Sturm, 1825 (N)
Amara (Amara) morio Ménétriés, 1832
Amara (Amara) morio nivium Tschitscherin, 1900 (N, S)
Amara (Amara) nigricornis Thomson, 1857 (N)
Amara (Amara) nitida Sturm, 1825 (N, S, Sa)
Amara (Amara) ovata (Fabricius, 1792) (N, S, Si, Sa)
Amara (Amara) proxima Putzeys, 1866 (N)
Amara (Amara) schimperi Wencker, 1866 (N)
Amara (Amara) similata (Gyllenhal, 1810) (N, S, Si, Sa)
Amara (Amara) sprete Dejean, 1831 (N)
Amara (Amara) subconvexa Putzeys, 1865 (Sa)
Amara (Amara) tibialis (Paykull, 1798) (N, S)

***Amara (Acrodon)* Zimmermann, 1832**

Amara (Acrodon) brunnea (Gyllenhal, 1810) (N)

***Amara (Celia)* Zimmermann, 1832**

Amara (Celia) bifrons (Gyllenhal, 1810) (N, S)
Amara (Celia) brevis (Dejean, 1828) (Sa?) (*)
Amara (Celia) arenaria Putzeys, 1865 (N) (*)
Amara (Celia) cottyi Coquerel, 1859 (Si)
Amara (Celia) cursitans (Zimmermann, 1832) (N, S)
Amara (Celia) dalmatina (Dejean, 1828) (N?, S?, Si?, Sa?) (*)
Amara (Celia) erratica (Duftschmid, 1812) (N)
Amara (Celia) eximia Dejean, 1828 (S)
Amara (Celia) fervida (Coquerel, 1858) (Si, Sa)
Amara (Celia) fusca Dejean, 1828 (N, S?)
Amara (Celia) infima (Duftschmid, 1812) (S)

Amara (Celia) ingenua (Duftschmid, 1812) (N, Sa)
Amara (Celia) montana Dejean, 1828 (N, S, Si, Sa)
Amara (Celia) municipalis (Duftschmid, 1812)
 Amara (Celia) municipalis bischoffi Jedlicka, 1946 (N, S)
Amara (Celia) pallens Sturm, 1825 (N, S)
Amara (Celia) quenseli (Schönherr, 1806) (N)
Amara (Celia) rufoaenea (Dejean, 1828) (Sa?) (*)
Amara (Celia) samnitica Fiori, 1898 (S) (E)
Amara (Celia) simplex Dejean, 1828 (S, Si, Sa)
Amara (Celia) solieri Putzeys, 1870 (N?) (*)

***Amara (Percosia)* Zimmermann, 1832**

Amara (Percosia) equestris (Duftschmid, 1812) (N, S)
Amara (Percosia) infusca Putzeys, 1866 (N)
Amara (Percosia) sicala Dejean, 1831 (S, Si) (E)

***Amara (Leiromorpha)* Ganglbauer, 1892**

Amara (Leiromorpha) boissyi Colas, 1950 (N?) (*)
Amara (Leiromorpha) frigida Putzeys, 1867 (N?) (*)
Amara (Leiromorpha) lantoscana Fauvel, 1888 (N)
Amara (Leiromorpha) doderoi Baliani, 1926 (N) (E)
Amara (Leiromorpha) constantini Binaghi, 1946 (N) (E)
Amara (Leiromorpha) uhligi Holdhaus, 1904 (N) (E)

***Amara (Bradytus)* Stephens, 1828**

Amara (Bradytus) apricaria (Paykull, 1790) (N, S, Si)
Amara (Bradytus) consularis (Duftschmid, 1812) (N, S)
Amara (Bradytus) crenata Dejean, 1828 (N)
Amara (Bradytus) fulva (Degeer, 1774) (N, S)

***Amara (Curtonotus)* Stephens, 1828**

Amara (Curtonotus) aulica (Panzer, 1797) (N, S)

***Amara (Leirides)* Putzeys, 1866**

Amara (Leirides) alpestris Villa & Villa, 1833 (N) (E)
Amara (Leirides) cardui Dejean, 1831
 Amara (Leirides) cardui cardui Dejean, 1831 (N)
 Amara (Leirides) cardui sybilla Holdhaus, 1942 (N)
 Amara (Leirides) cardui graja Daniel & Daniel, 1898 (N)
 Amara (Leirides) cardui psyllocephala Daniel & Daniel, 1898 (N)
Amara (Leirides) spectabilis Schaum, 1858 (N)

***Amara (Acorius)* Zimmermann, 1832**

Amara (Acorius) metallescens Zimmermann, 1832 (S, Si, Sa)

Scybalicus Schaum, 1862

Scybalicus oblongiusculus (Dejean, 1829) (N, S, Si, Sa)

Anisodactylus (Anisodactylus) Dejean, 1829

Anisodactylus (Anisodactylus) signatus (Panzer, 1797) (N)

Anisodactylus (Anisodactylus) nemorivagus (Duftschmid, 1812) (N, S)

Anisodactylus (Anisodactylus) binotatus (Fabricius, 1787) (N, S, Si, Sa)

Anisodactylus (Anisodactylus) pueli Schaubberger, 1933

Anisodactylus (Anisodactylus) pueli bucciarellii Sciaky, 1979 (S, Si)

Anisodactylus (Pseudhexatrachus) Puel, 1931

Anisodactylus (Pseudhexatrachus) heros (Fabricius, 1801) (Sa)

Anisodactylus (Hexatrachus) Tschitscherin, 1898

Anisodactylus (Hexatrachus) poeciloides (Stephens, 1828) (N, S)

Anisodactylus (Hexatrachus) virens Dejean, 1829

Anisodactylus (Hexatrachus) virens virens Dejean, 1829 (N, S, Sa)

Anisodactylus (Hexatrachus) virens winthemi Dejean, 1831 (Si)

Anisodactylus (Pseudodichirus) Lutshnik, 1921

Anisodactylus (Pseudodichirus) intermedius Dejean, 1829 (N, S)

Gynandromorphus Dejean, 1829

Gynandromorphus etruscus (Quensel, 1806) (N, S)

Diachromus Erichson, 1837

Diachromus germanus (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)

Carterus (Carterus) Dejean & Boisduval, 1829

Carterus (Carterus) gracilis Rambur, 1837 (Si?) (*)

Carterus (Carterus) dama (Rossi, 1792) (N, S, Si, Sa)

Carterus (Carterus) fulvipes (Latreille, 1817) (N, S, Si, Sa)

Carterus (Carterus) gilvipes (La Brulerie, 1873) (S, Si, Sa)

Carterus (Carterus) rotundicollis Rambur, 1837 (S, Si, Sa)

Carterus (Sabienus) Gozis, 1882

Carterus (Sabienus) calydonius (Rossi, 1790) (N, S, Si, Sa)
Carterus (Sabienus) tricuspidatus (Fabricius, 1792) (S, Si, Sa)

Carterus (Tschitscherinellus) Cziki, 1906

Carterus (Tschitscherinellus) cordatus (Dejean, 1825) (N, S, Si, Sa)

Ditomus Bonelli, 1810

Ditomus capito Serville, 1821 (S?, Si?) (*)
Ditomus clypeatus (Rossi, 1790) (N, S, Si, Sa)
Ditomus sphaerocephalus (Olivier, 1795) (Si, Sa)
Ditomus obscurus Dejean, 1825 (S)
Ditomus opacus (Erichson, 1841) (Si) (*)

Daptus Fischer, 1824

Daptus vittatus Fisher, 1824 (N, S, Si, Sa)

Acinopus (Osimus) Motschulsky, 1850

Acinopus (Osimus) ammophilus (Dejean, 1828) (N, S)

Acinopus (Acinopus) Latreille, 1829

Acinopus (Acinopus) ambiguus (Dejean, 1829) (Si)
Acinopus (Acinopus) baudii Fiori, 1913 (S, Si)
Acinopus (Acinopus) brevicollis Baudi, 1882 (Si) (E)
Acinopus (Acinopus) picipes (Olivier, 1795) (N, S, Si, Sa)
Acinopus (Acinopus) megacephalus (Rossi, 1794) (N, S, Si, Sa)

Oedesis Motschulsky, 1850

Oedesis caucasicus (Dejean, 1831) (S, Sa)
Oedesis villosulus (Reiche, 1859) (S, Si, Sa)

Graniger Motschulsky, 1864

Graniger cordicollis (Serville, 1821) (N, S, Si, Sa)
Graniger femoralis (Coquerel, 1858) (N, S, Si?, Sa)

Trichotichnus Morawitz, 1863

Trichotichnus laevicollis (Duftschmid, 1812) (N)
Trichotichnus rimanus Schauburger, 1936 (N) (E)
Trichotichnus knauthi Ganglbauer, 1900 (N)
Trichotichnus nitens (Heer, 1838) (N, S)

Parophonus Ganglbauer, 1892

Parophonus hirsutulus (Dejean, 1829) (N, S, Si, Sa)
Parophonus maculicornis (Duftschmid, 1812) (N, S, Si, Sa)
Parophonus hespericus Jeanne, 1985 (N, S, Si, Sa)
Parophonus hispanus (Rambur, 1838) (N, S, Si, Sa)
Parophonus mendax (Rossi, 1790) (N, S, Si, Sa)
Parophonus planicollis (Dejean, 1829) (N, S)

Ophonus (Cephalophonus) Ganglbauer, 1892

Ophonus (Cephalophonus) cephalotes (Fairmaire & Laboulbène, 1854) (N?) (*)

Ophonus (Ophonus) Dejean, 1821

Ophonus (Ophonus) stictus Stephens, 1828 (N, S)
Ophonus (Ophonus) sabulicola (Panzer, 1796)
Ophonus (Ophonus) sabulicola columbinus (Germar, 1817) (N, S, Si)
Ophonus (Ophonus) ardosiacus (Lutshnik, 1922) (N, S, Si, Sa)
Ophonus (Ophonus) franziniorum Sciaky, 1987 (S, Si, Sa)
Ophonus (Ophonus) opacus (Dejean, 1829) (Sa)
Ophonus (Ophonus) diffinis (Dejean, 1829) (N, S, Si, Sa)
Ophonus (Ophonus) quadricollis (Dejean, 1831) (Si)
Ophonus (Ophonus) similis (Dejean, 1829) (N, S, Si)
Ophonus (Ophonus) azureus (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa?)
Ophonus (Ophonus) pumilio (Dejean, 1829) (S, Si, Sa)
Ophonus (Ophonus) rotundatus (Dejean, 1829) (N, S, Si, Sa)
Ophonus (Ophonus) subquadratus (Dejean, 1829) (N, S, Si, Sa)
Ophonus (Ophonus) cribricollis (Dejean, 1829) (N, S, Si)

Ophonus (Metophonus) Bedel, 1897

Ophonus (Metophonus) nitidulus Stephens, 1828 (N, S?) (*)
Ophonus (Metophonus) gammeli (Schauberger, 1932) (S)
Ophonus (Metophonus) cordatus (Duftschmid, 1812) (N, S)
Ophonus (Metophonus) rupicola (Sturm, 1818) (N, S, Si?, Sa)
Ophonus (Metophonus) ferrugatus Reitter, 1902 (Si)
Ophonus (Metophonus) puncticollis (Paykull, 1798) (N, S, Si, Sa)
Ophonus (Metophonus) puncticeps Stephens, 1828 (N, S, Si, Sa)
Ophonus (Metophonus) schaubergerianus Puel, 1937 (N, S)
Ophonus (Metophonus) rufibarbis (Fabricius, 1792) (N, S, Sa)
Ophonus (Metophonus) jeanneli Sciaky, 1987 (N, S)
Ophonus (Metophonus) melleti (Heer, 1837) (N, S, Si)
Ophonus (Metophonus) brevicollis (Serville, 1821) (Sa)
Ophonus (Metophonus) subsinuatus Rey, 1886 (S, Sa)
Ophonus (Metophonus) xaxarsi (Schauberger, 1928) (N)
Ophonus (Metophonus) parallelus (Dejean, 1829) (N, S, Si)
Ophonus (Metophonus) nigripennis Sahlberg, 1903 (Si)

Ophonus (Incisophonus) Sciaky, 1987

Ophonus (Incisophonus) incisus (Dejean, 1829) (N, S, Si, Sa)

Cryptophonus Brandmayr & Zetto Brandmayr, 1982

Cryptophonus fulvus (Dejean, 1829) (Si, Sa)

Cryptophonus litigiosus (Dejean, 1829) (S, Si, Sa?)

Cryptophonus melancholicus (Dejean, 1829) (N, S, Si, Sa)

Cryptophonus tenebrosus (Dejean, 1829) (N, S, Si, Sa)

Semiophonus Schaubberger, 1933

Semiophonus signaticornis (Duftschmid, 1812) (N)

Pseudophonus (Pseudophonus) Motschulsky, 1844

Pseudophonus (Pseudophonus) griseus (Panzer, 1797) (N, S, Si, Sa?)

Pseudophonus (Pseudophonus) rufipes (Degeer, 1774) (N, S, Si, Sa)

Pseudophonus (Pardileus) Gozis, 1882

Pseudophonus (Pardileus) calceatus (Duftschmid, 1812) (N)

Harpalophonus Ganglbauer, 1892

Harpalophonus italus (Schaum, 1860) (N, S, Si, Sa?)

Harpalophonus steveni (Dejean, 1829) (S?) (*)

Harpalus (Harpalus) Latreille, 1802

Harpalus (Harpalus) affinis (Schrank, 1781) (N, S, Sa?)

Harpalus (Harpalus) punctipennis Mulsant, 1852 (N)

Harpalus (Harpalus) distinguendus (Duftschmid, 1812) (N, S, Si, Sa)

Harpalus (Harpalus) oblitus Dejean, 1829 (N, S, Si, Sa)

Harpalus (Harpalus) smaragdinus (Duftschmid, 1812) (N, S)

Harpalus (Harpalus) cupreus Dejean, 1829 (N, S, Si, Sa)

Harpalus (Harpalus) sculus Dejean, 1829 (S, Si, Sa)

Harpalus (Harpalus) pygmaeus Dejean, 1829 (N, S, Si?, Sa)

Harpalus (Harpalus) dimidiatus (Rossi, 1790) (N, S, Si, Sa)

Harpalus (Harpalus) rubripes (Duftschmid, 1812) (N, S, Si)

Harpalus (Harpalus) quadripunctatus Dejean, 1829 (N, S)

Harpalus (Harpalus) marginellus Dejean, 1829 (N)

Harpalus (Harpalus) atratus Latreille, 1804 (N, S, Si, Sa?)

Harpalus (Harpalus) luteicornis (Duftschmid, 1812) (N, S)

Harpalus (Harpalus) xanthopus Gemminger & Harold, 1868 (N)

Harpalus (Harpalus) solitaris Dejean, 1829 (N, S)

Harpalus (Harpalus) latus (Linné, 1758) (N)
Harpalus (Harpalus) progrediens Schaubberger, 1922 (N)
Harpalus (Harpalus) neglectus Serville, 1821 (S, Sa)
Harpalus (Harpalus) fuscipalpis Sturm, 1818 (N)
Harpalus (Harpalus) attenuatus Stephens, 1828 (N, S, Si, Sa)
Harpalus (Harpalus) sulphuripes Germar, 1824
 Harpalus (Harpalus) sulphuripes sulphuripes Germar, 1824 (N, S, Si)
 Harpalus (Harpalus) sulphuripes goudoti Dejean, 1829 (Sa)
Harpalus (Harpalus) honestus (Duftschmid, 1812) (N, S, Si?, Sa)
Harpalus (Harpalus) rufipalpis Sturm, 1818 (N, S, Si?)
Harpalus (Harpalus) decipiens Dejean, 1829 (S, Si)
Harpalus (Harpalus) bellieri Reiche, 1861 (Sa)
Harpalus (Harpalus) autumnalis (Duftschmid, 1812) (N?) (*)
Harpalus (Harpalus) serripes (Quensel, 1806) (N, S, Si, Sa?)
Harpalus (Harpalus) tardus (Panzer, 1797) (N, S, Si, Sa)
Harpalus (Harpalus) modestus Dejean, 1829 (N, S)
Harpalus (Harpalus) anxius (Duftschmid, 1812) (N, S, Sa)
Harpalus (Harpalus) flavicornis Dejean, 1829 (N, S)
Harpalus (Harpalus) taciturnus Dejean, 1829 (S)
Harpalus (Harpalus) froehlichii Sturm, 1818 (N)
Harpalus (Harpalus) hirtipes (Panzer, 1797) (N?) (*)

***Harpalus (Acardystus)* Reitter, 1908**

Harpalus (Acardystus) flavescens Piller & Mitterpacher, 1783 (N)

***Harpalus (Actephilus)* Stephens, 1839**

Harpalus (Actephilus) pumilus (Sturm, 1818) (N, S)
Harpalus (Actephilus) albanicus Reitter, 1900 (N)

***Artabas* Gozis, 1883**

Artabas dispar (Dejean, 1829) (S)
Artabas punctatostriatus (Dejean, 1829) (N, S, Si, Sa)
Artabas stierlini (Poncy, 1901) (S)

***Microderes* Faldermann, 1835**

Microderes scaritides Sturm, 1818 (N, S, Sa)

***Stenolophus* Dejean, 1821**

Stenolophus teutonus (Schränk, 1781) (N, S, Si, Sa)
Stenolophus abdominalis (Gené, 1836) (Si, Sa)
Stenolophus persicus Mannerheim, 1844 (S)
Stenolophus discophorus (Fischer, 1823) (N, S, Sa?)
Stenolophus skrimshiranus Stephens, 1828 (N, S, Si, Sa)

Stenolophus steveni Krynicki, 1832 (N)
Stenolophus mixtus (Herbst, 1784) (N, S, Si, Sa)
Stenolophus proximus Dejean, 1829 (N, S, Si, Sa)

Loxoncus Schmidt-Goebel, 1846

Loxoncus procerus (Schaum, 1858) (Sa)

Egadroma Motschulsky, 1855

Egadroma marginata (Dejean, 1829) (N, S, Si, Sa)

Dicheirotichus Duval, 1857

Dicheirotichus punicus Bedel, 1899 (Sa)
Dicheirotichus obsoletus (Dejean, 1829) (N, S, Si, Sa)
Dicheirotichus lacustris Redtenbacher, 1858 (N)
Dicheirotichus pallidus (Dejean, 1829) (S, Sa?)
Dicheirotichus chlorotichus (Dejean, 1829) (S, Si) (E)

Bradycellus (Bradycellus) Erichson, 1837

Bradycellus (Bradycellus) distinctus (Dejean, 1829) (N, S, Si, Sa)
Bradycellus (Bradycellus) verbasci (Duftschmid, 1812) (N, S, Si, Sa)
Bradycellus (Bradycellus) lusitanicus (Dejean, 1829) (S?, Si, Sa)
Bradycellus (Bradycellus) caucasicus (Chaudoir, 1846) (N, S)
Bradycellus (Bradycellus) harpalinus (Serville, 1821) (N, S, Si)

Bradycellus (Tetraplatypus) Tschitscherin, 1896

Bradycellus (Tetraplatypus) ganglbaueri Apfelbeck, 1904 (N)
Bradycellus (Tetraplatypus) ruficollis (Stephens, 1828) (N)

Trichocellus Ganglbauer, 1892

Trichocellus godarti (Jaquet, 1882) (N)
Trichocellus placidus (Gyllenhal, 1827) (N)

Acupalpus Dejean, 1829

Acupalpus interstitialis Reitter, 1884 (N, S)
Acupalpus puncticollis (Coquerel, 1858) (Si)
Acupalpus meridianus (Linné, 1761) (N, S, Si, Sa?)
Acupalpus elegans (Dejean, 1829) (N, S, Si, Sa)
Acupalpus lucasi Gaubil, 1849 (Si?) (*)
Acupalpus parvulus (Sturm, 1825) (N, S, Sa)
Acupalpus maculatus Schaum, 1860 (N, S, Si, Sa)
Acupalpus notatus Mulsant & Rey, 1861 (N, S, Si, Sa)

Acupalpus suturalis Dejean, 1829 (N, S, Si?, Sa?)
Acupalpus paludicola Reitter, 1884 (N, S)
Acupalpus dubius Schilsky, 1888 (N, S, Si)
Acupalpus exiguus Dejean, 1829 (N, S, Si, Sa?)
Acupalpus luteatus (Duftschmid, 1812) (N, S, Si, Sa)
Acupalpus flavicollis (Sturm, 1825) (N, S)
Acupalpus brunnipes (Sturm, 1825) (N, S, Sa)
Acupalpus piceus Rottenberger, 1870 (S, Si)

Anthracus Motschulsky, 1850

Anthracus consputus (Duftschmid, 1812) (N, S, Sa)
Anthracus flavipennis (Lucas, 1846) (Si, Sa)
Anthracus fonticola Normand, 1938 (Si)
Anthracus longicornis (Schaum, 1857) (N, S)
Anthracus quarnerensis (Reitter, 1884) (N, S)
Anthracus transversalis (Schaum, 1862) (N, S)

Amblystomus Erichson, 1837

Amblystomus mauritanicus (Dejean, 1829)
Amblystomus mauritanicus ruficornis Schaufuss, 1882 (S, Si, Sa)
Amblystomus cephalotes Reitter, 1896 (Si?) (*)
Amblystomus levantinus Reitter, 1883 (N, S, Si, Sa)
Amblystomus metallescens (Dejean, 1829) (N, S, Si, Sa)
Amblystomus niger Heer, 1838 (N, S, Si, Sa)
Amblystomus picinus Baudi, 1864 (S, Si?)
Amblystomus raymondi Gautier, 1861 (Sa)
Amblystomus rectangulus Reitter, 1883 (S)

Licinus Latreille, 1802

Licinus hoffmannseggii (Panzer, 1797) (N, S) (*)
Licinus oblongus Dejean, 1826 (N)
Licinus planicollis Fauvel, 1888 (N)
Licinus italicus Puel, 1925 (S) (E)
Licinus depressus (Paykull, 1790) (N)
Licinus cassideus (Fabricius, 1792) (N, S)
Licinus silphoides (Rossi, 1790) (N, S, Si, Sa?)
Licinus punctatulus (Fabricius, 1792) (S, Si, Sa)

Badister Clairville, 1806

Badister unipustulatus Bonelli, 1813 (N, S, Si)
Badister bullatus (Schrank, 1798) (N, S, Si, Sa)
Badister meridionalis Puel, 1925 (N, S)
Badister sodalis (Duftschmid, 1812) (N, S)

Baudia Ragusa, 1884

- Baudia anomala* (Perris, 1866) (N, Sa)
- Baudia bucciarellii* Monguzzi, 1976 (Sa) (E)
- Baudia dilatata* (Chaudoir, 1837) (N, S)
- Baudia peltata* (Panzer, 1797) (N, S, Si?, Sa?)

Panagaeus Latreille, 1802

- Panagaeus bipustulatus* (Fabricius, 1775) (N, S)
- Panagaeus cruxmajor* (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)

Epomis Bonelli, 1810

- Epomis circumscriptus* (Duftschmid, 1812) (N, S, Si, Sa)
- Epomis dejeani* (Dejean & Boisduval, 1830) (S)

Chlaenius (Chlaenites) Motschulsky, 1860

- Chlaenius (Chlaenites) spoliatus* (Rossi, 1790) (N, S, Si, Sa)

Chlaenius (Chlaenius) Bonelli, 1810

- Chlaenius (Chlaenius) festivus* (Panzer, 1796) (N, S)
- Chlaenius (Chlaenius) velutinus* (Duftschmid, 1812) (*)
- Chlaenius (Chlaenius) velutinus velutinus* (Duftschmid, 1812) (N, S)
- Chlaenius (Chlaenius) velutinus auricollis* Gené, 1839 (S, Si, Sa)
- Chlaenius (Chlaenius) borgiai* Dejean, 1828 (Si) (E)

Chlaenius (Trichochlaenius) Seidlitz, 1887

- Chlaenius (Trichochlaenius) chrysocephalus* (Rossi, 1790) (N, S, Si, Sa)

Dinodes Bonelli, 1810

- Dinodes decipiens* (Dufour, 1820) (N, S, Si, Sa)

Chlaeniellus Reitter, 1908

- Chlaeniellus vestitus* (Paykull, 1790) (N, S, Si, Sa)
- Chlaeniellus nigricornis* (Fabricius, 1787) (N, S)
- Chlaeniellus nitidulus* (Schrank, 1781) (N, S)
- Chlaeniellus olivieri* (Crotch, 1870) (N, S, Si, Sa)
- Chlaeniellus terminatus* (Dejean, 1826) (S)
- Chlaeniellus tristis* (Schaller, 1783) (N, S, Si, Sa)

Agostenus Steven, 1829

Agostenus sulcicollis (Paykull, 1798) (N, S)

Callistus Bonelli, 1810

Callistus lunatus (Fabricius, 1775) (N, S)

Oodes Bonelli, 1810

Oodes gracilis Villa & Villa, 1833 (N, S, Si, Sa)

Oodes helopioides (Fabricius, 1792) (N, S)

Odacantha Paykull, 1798

Odacantha melanura (Linné, 1766) (N, S, Si)

Masoreus Dejean, 1821

Masoreus wetterhallii (Gyllenhal, 1813)

Masoreus wetterhallii wetterhallii (Gyllenhal, 1813) (N, S, Si)

Masoreus wetterhallii axillaris Küster, 1852 (Sa)

Masoreus testaceus Lucas, 1846 (S, Sa?)

Masoreus aegyptiacus Dejean, 1828 (S, Si)

Somotrichus Seidlitz, 1887

Somotrichus elevatus (Fabricius, 1787) (N) (*)

Lamprias Bonelli, 1810

Lamprias fulvicollis (Fabricius, 1792) (N, S, Si, Sa)

Lamprias pubipennis (Dufour, 1820) (N)

Lamprias chlorocephala (Hoffmann, 1803) (N, S)

Lamprias cyanocephala (Linné, 1758) (N, S, Si)

Lebia Latreille, 1802

Lebia cruxminor (Linné, 1758) (N, S)

Lebia nigripes Dejean, 1825 (S, Si, Sa?)

Lebia nigricollis Gené, 1839 (Sa) (*)

Lebia trimaculata (Villers, 1789) (N, S, Si?, Sa?)

Lebia marginata (Fourcroy, 1785) (N, S)

Lebia scapularis (Fourcroy, 1785) (N, S, Si, Sa)

Lebia humeralis Dejean, 1825 (N, S)

Lebia lepida Brullé, 1834 (S, Si)

Demetrias (Aetophorus) Schmidt-Goebel, 1846

Demetrias (Aetophorus) imperialis (Germar, 1824) (N, S, Si, Sa)

Demetrias (Demetrias) Bonelli, 1810

Demetrias (Demetrias) atricapillus (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)

Demetrias (Demetrias) monostigma Samouelle, 1819 (N)

Pseudomasoreus Desbrochers, 1904

Pseudomasoreus canigoulensis (Fairmaire & Laboulbène, 1854) (S, Si)

Cymindis (Cymindis) Latreille, 1806

Cymindis (Cymindis) vaporariorum (Linné, 1758) (N, S)

Cymindis (Cymindis) humeralis (Fourcroy, 1785) (N, S)

Cymindis (Cymindis) laevistriata Lucas, 1846 (S, Si)

Cymindis (Cymindis) suturalis Dejean, 1825 (Si)

Cymindis (Cymindis) axillaris (Fabricius, 1794) (N, S, Si, Sa)

Cymindis (Cymindis) marmorai Gené, 1839 (Sa)

Cymindis (Cymindis) scapularis Schaum, 1857 (N)

Cymindis (Cymindis) etrusca Bassi, 1834 (S)

Cymindis (Cymindis) angularis Gyllenhal, 1810

Cymindis (Cymindis) angularis angularis Gyllenhal, 1810 (N)

Cymindis (Cymindis) angularis lonai Wagner, 1927 (S)

Cymindis (Cymindis) cingulata Dejean, 1825 (N, S) (*)

Cymindis (Cymindis) coadunata Dejean, 1825

Cymindis (Cymindis) coadunata coadunata Dejean, 1825 (N)

Cymindis (Cymindis) coadunata acutangula Chaudoir, 1873 (N)

Cymindis (Cymindis) coadunata strasseri Reitter, 1896 (N)

Cymindis (Cymindis) coadunata luigionii Müller, 1934 (S)

Cymindis (Cymindis) coadunata orientalis Schatzmayr, 1944 (N)

Cymindis (Cymindis) carnica Müller, 1924 (N) (E)

Cymindis (Menas) Motschulsky, 1864

Cymindis (Menas) variolosa (Fabricius, 1794) (N, S, Si)

Platyтарus Fairmaire, 1850

Platyтарus bufo (Fabricius, 1801) (Si, Sa)

Platyтарus famini (Dejean, 1826) (S, Si, Sa)

Paradromius Fowler, 1886

Paradromius linearis (Olivier, 1795) (N, S, Si, Sa)

Paradromius longiceps (Dejean, 1826) (N, S)

Dromius Bonelli, 1810

Dromius agilis (Fabricius, 1787) (N, S)
Dromius angustus Brullé, 1834 (N, S)
Dromius fenestratus (Fabricius, 1794) (N, S)
Dromius schneideri Crotch, 1871 (N?) (*)
Dromius meridionalis Dejean, 1825 (N, S, Si, Sa)
Dromius quadrimaculatus (Linné, 1758) (N, S, Sa?)

Calodromius Reitter, 1905

Calodromius spilotus (Illiger, 1798)
Calodromius spilotus spilotus (Illiger, 1798) (N, S)
Calodromius spilotus championi (Bedel, 1907) (Sa)
Calodromius bifasciatus (Dejean, 1825) (Si, Sa?)

Philorhizus Hope, 1838

Philorhizus quadrisignatus (Dejean, 1825) (N, S, Sa)
Philorhizus insignis (Lucas, 1846) (Si) (*)
Philorhizus sigma (Rossi, 1790) (S?) (*)
Philorhizus melanocephalus (Dejean, 1825) (N, S, Si, Sa)
Philorhizus notatus (Stephens, 1828) (N)
Philorhizus crucifer (Lucas, 1846)
Philorhizus crucifer crucifer (Lucas, 1846) (S, Si, Sa)
Philorhizus crucifer confusus Sciaky, 1991 (N, S)
Philorhizus brandmayri Sciaky, 1991 (Si) (E)
Philorhizus liguricus Sciaky, 1991 (N) (E)

Syntomus Hope, 1838

Syntomus foveatus (Fourcroy, 1785) (N, S, Si, Sa?)
Syntomus foveolatus (Dejean, 1831) (Si)
Syntomus fuscomaculatus (Motschulsky, 1844) (Si, Sa) (*)
Syntomus impressus (Dejean, 1825) (S, Si, Sa)
Syntomus obscuroguttatus (Duftschmid, 1812) (N, S, Si, Sa)
Syntomus pallipes (Dejean, 1825) (N?) (*)
Syntomus silensis (Fiori, 1899) (S, Si) (E)
Syntomus truncatellus (Linné, 1761) (N, S, Sa)

Metadromius Bedel, 1907

Metadromius nanus (Fiori, 1914) (N, S, Si) (E)

Lionychus Wissmann, 1846

Lionychus albonotatus (Dejean, 1825) (Si)
Lionychus maritimus Fairmaire, 1862 (N, S, Si)
Lionychus quadrillum (Duftschmid, 1812) (N, S, Si)
Lionychus sturmi (Gené, 1836) (Sa)

Lionychus fleischeri Reitter, 1908
Lionychus fleischeri focarilei Barajon, 1964 (Si)

Apristus Chaudoir, 1846

Apristus europaeus Mateu, 1981 (N, S, Si, Sa)

Plocionus Latreille & Dejean, 1824

Plocionus pallens (Fabricius, 1775) (N) (*)

Microlestes Schmidt-Goebel, 1846

Microlestes corticalis (Dufour, 1820) (N, S, Si, Sa)
Microlestes fulvibasis (Reitter, 1900) (S, Si?, Sa)
Microlestes plagiatus (Duftschmid, 1812) (N, S, Si)
Microlestes fissuralis (Reitter, 1900) (N, S)
Microlestes abeillei (Brisout, 1885)
 Microlestes abeillei abeillei (Brisout, 1885) (S)
 Microlestes abeillei sardous Holdhaus, 1912 (Sa)
 Microlestes abeillei brisouti Holdhaus, 1912 (Si)
Microlestes maurus (Sturm, 1827) (N, S, Sa?)
Microlestes minutulus (Goeze, 1777) (N, S, Si?, Sa?)
Microlestes seladon Holdhaus, 1912 (S)
Microlestes negrita (Wollaston, 1854) (N, S, Si, Sa)
Microlestes luctuosus Holdhaus, 1904 (N, S, Si, Sa)
Microlestes levipennis (Lucas, 1846)
 Microlestes levipennis longipennis Motschulsky, 1859 (S, Si)
Microlestes mauritanicus (Lucas, 1846) (S, Si)

Polistichus Bonelli, 1810

Polistichus connexus (Fourcroy, 1785) (N, S, Si, Sa)
Polistichus fasciolatus (Rossi, 1790) (S, Sa)

Zuphium Latreille, 1806

Zuphium olens (Rossi, 1790) (N, S, Si, Sa)
Zuphium numidicum Lucas, 1846 (Si, Sa)

Parazuphium Jeannel, 1942

Parazuphium baeticum (Daniel & Daniel, 1898) (S, Si, Sa)
Parazuphium chevrolati (Castelnau, 1833)
 Parazuphium chevrolati chevrolati (Castelnau, 1833) (N, S, Sa?)
 Parazuphium chevrolati unicolor (Germar, 1839) (Si)

Drypta Latreille, 1796

Drypta dentata (Rossi, 1790) (N, S, Si, Sa)

Desera Hope, 1838

Desera distincta (Rossi, 1792) (S, Si, Sa)

Brachinus (Brachinus) Weber, 1801

Brachinus (Brachinus) crepitans (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)

Brachinus (Brachinus) efflans Dejean, 1829 (Si)

Brachinus (Brachinus) ejaculans Fischer-Waldheim, 1828 (S?, Si?) (*)

Brachinus (Brachinus) ganglbaueri Apfelbeck, 1904 (N, S, Si, Sa)

Brachinus (Brachinus) plagiatus Reiche, 1868 (N, S, Si, Sa)

Brachinus (Brachinus) psophia Serville, 1821 (N, S, Si, Sa)

Brachinus (Brachynolomus) Reitter, 1919

Brachinus (Brachynolomus) immaculicornis Dejean, 1825 (N, S, Si, Sa)

Brachinus (Brachynidius) Reitter, 1919

Brachinus (Brachynidius) brevicollis Motschulsky, 1844 (S, Si)

Brachinus (Brachynidius) explodens (Duftschmid, 1812) (N, S, Si, Sa?)

Brachinus (Brachynidius) fulviventris Motschulsky, 1864 (S?) (*)

Brachinus (Brachynidius) glabratus Latreille & Dejean, 1824 (N)

Brachinus (Brachynidius) nigricornis Gebler, 1829 (S)

Brachinus (Brachynidius) sclopeta (Fabricius, 1792) (N, S, Si, Sa)

Brachinus (Brachynidius) variiventris Schaufuss, 1862 (N)

Brachinus (Cnecostolus) Reitter, 1919

Brachinus (Cnecostolus) bayardi Dejean, 1831 (S)

Brachinus (Cnecostolus) exhalans (Rossi, 1792) (S, Si, Sa)

Brachinus (Cnecostolus) humeralis Ahrens, 1812 (S, Si, Sa)

Brachinus (Brachynoptinus) Lutshnik, 1926

Brachinus (Brachynoptinus) italicus (Dejean, 1831) (S, Si) (E)

Aptinus Bonelli, 1810

Aptinus alpinus Dejean & Boisduval, 1829 (N)

Aptinus bombardia (Illiger, 1800) (N)

Note

Lophyridia lunulata: Presente in Si solo a Lampedusa.

Campalita olivieri: Presente in Si solo a Lampedusa.
Carabus (Carabus) italicus: La ssp. italicus in S solo nell'Appennino Toscano.
Carabus (Archicarabus) alysidotus: Presente in N solo nell'Appennino Emiliano.
Carabus (Archicarabus) montivagus: Presenza marginale sul confine orientale.
Carabus (Autocarabus) cancellatus: Presente in S solo nell'Appennino Toscano.
Carabus (Oreocarabus) glabratus: Presente in S solo nell'Appennino Toscano.
Carabus (Hygrocarabus) nodulosus: Presenza marginale sul confine orientale.
Carabus (Chaetocarabus) lefebvrei: La ssp. lefebvrei in S solo in Aspromonte.
Carabus (Macrothorax) morbillosus: La ssp. alternans in S solo in Aspromonte; la ssp. morbillosus in Si solo a Lampedusa ed in S in Toscana, con una popolazione di recente insediamento.
Cychrus attenuatus: La ssp. attenuatus in S solo nell'Appennino Toscano.
Leistus (Pogonophorus) magnicollis: Presenza dubbia, marginale sul confine orientale.
Leistus (Leistus) nitidus: Presente in S solo nell'Appennino Toscano.
Nebria (Eunebria) jockischi: Presente in S solo nell'Appennino Toscano.
Nebria (Boreonebria) rufescens: Presente in S solo nell'Appennino Toscano.
Nebria (Nebria) dahli: Presenza dubbia, marginale sul confine orientale.
Nebria (Nebria) tibialis: La ssp. tibialis in S solo nell'Appennino Toscano.
Nebria (Oreonebria) picea: Presente in S solo nell'Appennino Toscano.
Blethisa multipunctata: Presenza marginale, solo nel Carso di Monfalcone.
Elaphrus (Elaphrus) riparius: Presenza dubbia, solo su dati di letteratura.
Loricera pilicornis: La ssp. apennina in N solo nell'Appennino Emiliano.
Scarites hespericus: Presenza dubbia.
Clivina ypsilon: Presenza marginale nel Carso, ad Est di Monfalcone.
Dyschirius (Dyschirius) chalceus: Presenza dubbia.
Odontium (Chrysobracheon) litorale: Presenza dubbia.
Odontium (Chrysobracheon) velox: Presenza dubbia.
Metallina (Neja) palumboi: Specie di dubbia validità.
Notaphus (Notaphus) obliquus: Presenza dubbia.
Emphanes (Emphanes) minimus: Presenza dubbia.
Philochthus guttula: Presenza dubbia.
Ocydromus (Ocyturanus) balcanicus: Presenza dubbia della ssp. basirufus.
Ocydromus (Peryphus) ripicola: Presenza dubbia.
Ocydromus (Ocydromus) saxatilis: Presenza dubbia, marginale sul confine occidentale.
Synechostictus atroviolaceus: Presente in S solo nell'Appennino Toscano.
Princidium (Testedium) idriae: Presenza dubbia, di specie di dubbia validità.
Scotodipnus glaber: La ssp. saulcyi in S solo nell'Appennino Toscano.
Trechus grouvellei: Presenza dubbia, marginale sul confine occidentale.
Trechus liguricus: La ssp. mancinii in S solo nelle Alpi Apuane.
Trechus elegans: Presenza dubbia, marginale sul confine orientale.
Trechus priapus: Presenza dubbia, marginale sul confine orientale.
Trechus validipes: Presenza dubbia, marginale sul confine orientale.
Trechus rotundatus: Presenza dubbia, marginale sul confine orientale.
Typhlotrechus bilimeki: La ssp. istrus è presente solo marginalmente sul confine del Carso istriano.
Duvalius exaratus: Presenza dubbia, marginale sul confine orientale.
Duvalius doriai: Popolazioni in provincia di La Spezia (N) e di Massa Carrara e Lucca (S).
Duvalius degiovannii: Popolazioni in provincia di Firenze e Arezzo (S) e di Forlì (N).

Duvalius guareschii: Popolazioni in provincia di Reggio Emilia (N) e di Massa Carrara e Lucca (S).

Duvalius bianchii: Popolazioni in provincia di Firenze (S) e di Bologna (N).

Trechicus nigriceps: Specie cosmopolita, di origine afrotropicale ed orientale.

Anchomenus (Anchodemus) cyaneus: Presente in S solo nell'Appennino Toscano.

Agonum dolens: Presenza dubbia

Europhilus scitulus: Presenza dubbia.

Olisthopus rotundatus: Presente in S solo nell'Appennino Toscano.

Platyderus rufus: Presente in S solo nell'Appennino Toscano.

Calathus rubripes: Presente in S solo nell'Appennino Toscano.

Calathus glabricollis: Presenza marginale sul confine orientale.

Calathus fracassii: La ssp. *luigionii* in N solo nell'Appennino Emiliano.

Calathus pirazzolii: Presente in N solo nell'Appennino Emiliano.

Dolichus halensis: Presente in S solo in Toscana.

Laemostenus (Laemostenus) barbarus: Presente in S solo in Aspromonte.

Laemostenus (Laemostenus) alpinus: Presenza dubbia, marginale sul confine occidentale.

Laemostenus (Actenipus) carinatus: Presente in S solo all'Isola d'Elba.

Laemostenus (Pristonychus) terricola: Specie presumibilmente non autoctona, presente in Si solo a Pantelleria.

Laemostenus (Sphodroides) picicornis: Presente in Si solo a Lampedusa.

Platysma (Melaninus) anthracinum: La ssp. *biimpressum* in N marginale sul confine orientale, in S in Puglia e Lucania.

Haptoderus (Haptoderus) brevis: Presenza marginale sul confine orientale.

Pterostichus (Cheporus) transversalis: Presenza dubbia.

Pterostichus (Pterostichus) devillei: Presenza dubbia, marginale sul confine occidentale.

Stomis roccai: La ssp. *mancinii* in S solo nell'Appennino Toscano.

Poecilus (Poecilus) quadricollis: Presenza dubbia.

Poecilus (Sogines) punctulatus: Specie nota dell'Alto Adige, oggi quasi certamente estinta in Italia.

Molops piceus: Presenza dubbia della ssp. *piceus*.

Percus passerinii: Presente in N solo nell'Appennino Emiliano.

Percus paykulli: Presente in N solo nell'Appennino Emiliano.

Amara (Celia) brevis: Presenza dubbia.

Amara (Celia) arenaria: Presenza marginale sul confine orientale.

Amara (Celia) dalmatina: Presenza dubbia.

Amara (Celia) rufoaenea: Presenza dubbia.

Amara (Celia) solieri: Presenza dubbia.

Amara (Leiromorpha) boissyi: Presenza dubbia, marginale sul confine occidentale.

Amara (Leiromorpha) frigida: Presenza dubbia, marginale sul confine occidentale.

Carterus (Carterus) gracilis: Presenza dubbia.

Ditomus capito: Presenza dubbia.

Ditomus opacus: Presente in Si solo a Lampedusa.

Ophonus (Cephalophonus) cephalotes: Presenza dubbia.

Ophonus (Metophonus) nitidulus: I pochi esemplari appenninici esaminati sono da riferire alla specie seguente

Harpalophonus steveni: Presenza dubbia.

Harpalus (Harpalus) autumnalis: Presenza dubbia.

Harpalus (Harpalus) hirtipes: Presenza dubbia

Acupalpus lucasi: Presenza dubbia; specie citata di Malta.
Amblystomus cephalotes: Presenza dubbia; specie citata di Malta.
Licinus hoffmannseggii: Presente in S solo nell'Appennino Toscano.
Chlaenius (Chlaenius) velutinus: La ssp. *auricollis* in S solo a Capraia (Toscana).
Somotrichus elevatus: Specie cosmopolita, di origine afrotropicale.
Lebia nigricollis: Specie non più ritrovata dopo la descrizione.
Cymindis (Cymindis) cingulata: Presente in S solo nell'Appennino Toscano.
Dromius schneideri: Presenza dubbia.
Philorhizus insignis: Presente in Si con certezza solo a Lampedusa.
Philorhizus sigma: Presenza dubbia.
Syntomus fuscumaculatus: Presente in Si solo a Lampedusa e Linosa.
Syntomus pallipes: Presenza dubbia.
Plocionus pallens: Specie cosmopolita, rinvenuta soprattutto nei porti, di origine probabilmente neotropica.
Brachinus (Brachinus) ejaculans: Presenza dubbia.
Brachinus (Brachynidius) fulviventris: Presenza dubbia.

Cebrionidae

Cebrionidae Olivier, 1790

Cebrion benoitii Fairmaire, 1849 (Si)
Cebrion corsicus Duval, 1860 (Sa) (E)
Cebrion dubius Rossi, 1790 (S) (E)
Cebrion fabricii Leach, 1824 (Si, Sa?)
Cebrion fiorii Leoni, 1906 (S)
Cebrion fuscatus A. Costa, 1847 (S)
Cebrion gigas (Fabricius, 1787) (N)
Cebrion melanocephalus Germar, 1843 (Si)
Cebrion neapolitanus A. Costa, 1847 (S) (E)
Cebrion nigricornis Leoni, 1906 (S) (E)
Cebrion sardous Perris, 1870 (Sa) (E)
Cebrion strictus Gené, 1836 (Sa)

Cerambycidae

Cerambycidae Mulsant, 1842

Cerambycus myardi Mulsant, 1842 (S, Si, Sa)

Cerambycidae Serville, 1832

Cerambycus faber (Linné, 1761) (N, S, Si)

Cerambycidae Müller, 1764

Prionus coriarius (Linné, 1758) (N, S, Si)

Tragosoma Serville, 1832

Tragosoma depsarium (Linné, 1767) (N)

Aegosoma Serville, 1832

Aegosoma scabricorne (Scopoli, 1763) (N, S, Si, Sa)

Vesperus Latreille, 1829

Vesperus conicicollis Fairmaire, 1866 (Sa)

Vesperus luridus (Rossi, 1794) (N, S, Si, Sa)

Vesperus strepens (Fabricius, 1792) (N)

Rhagium Fabricius, 1775

Rhagium bifasciatum Fabricius, 1775 (N, S, Si)

Rhagium inquisitor (Linné, 1758) (N, S)

Rhagium mordax (De Geer, 1775) (N, S)

Rhagium sycophanta (Schrank, 1781) (N, S, Si?)

Rhamnusium Latreille, 1829

Rhamnusium bicolor (Schrank, 1781)

Rhamnusium bicolor bicolor (Schrank, 1781) (N, S, Si)

Rhamnusium bicolor demaggii Tippmann, 1956 (S) (E)

Rhamnusium graecum Schaufuss, 1862

Rhamnusium graecum italicum Müller, 1966 (S) (E)

Oxymirus Mulsant, 1863

Oxymirus cursor (Linné, 1758) (N, S)

Stenocorus Fabricius, 1775

Stenocorus meridianus (Linné, 1758) (N, S)

Anisorus Mulsant, 1863

Anisorus quercus (Goetz, 1783) (N, S)

Pachyta Dejean, 1821

Pachyta lamed (Linné, 1758) (N)

Pachyta quadrimaculata (Linné, 1758) (N)

Brachyta Fairmaire, 1864

Brachyta interrogationis (Linné, 1758) (N)

Evodinus Le Conte, 1850

Evodinus clathratus (Fabricius, 1792) (N, S)

Acmaeops Le Conte, 1850

Acmaeops marginatus (Fabricius, 1781) (N)

Acmaeops septentrionis (Thomson, 1866) (N)

Dinoptera Mulsant, 1863

Dinoptera collaris (Linné, 1758) (N, S, Si)

Carilia Mulsant, 1863

Carilia virginea (Linné, 1758) (N)

Pidonia Mulsant, 1863

Pidonia lurida (Fabricius, 1792) (N)

Cortodera Mulsant, 1863

Cortodera aspromontana Müller, 1948 (S) (E)

Cortodera femorata (Fabricius, 1787) (N)

Cortodera holosericea (Fabricius, 1801)

Cortodera holosericea velutina (Heyden, 1876) (N, S)

Cortodera humeralis (Schaller, 1783) (N, S)

Nivellia Mulsant, 1863

Nivellia sanguinosa (Gyllenhal, 1827) (N)

Cornumutilla Letzner, 1843

Cornumutilla quadrivittata (Gebler, 1830) (N)

Grammoptera Serville, 1835

Grammoptera abdominalis (Stephens, 1831) (N, S)

Grammoptera ruficornis (Fabricius, 1781) (N, S, Si)

Grammoptera ustulata (Schaller, 1783) (N, S, Si)

Grammoptera viridipennis Pic, 1893 (Si) (E)

Alosterna Mulsant, 1863

Alosterna tabacicolor (De Geer, 1775) (N, S)

Pseudalosterna (Pseudovadonia) (Lobanov, Danilevsky & Murzin, 1981)

Pseudalosterna (Pseudovadonia) livida (Fabricius, 1776) (N, S, Si)

Pedostrangalia (Pedostrangalia) Sokolov, 1896

Pedostrangalia (Pedostrangalia) revestita (Linné, 1767) (N, S, Si)

Pedostrangalia (Etorufus) Matsushita, 1933

Pedostrangalia (Etorufus) pubescens (Fabricius, 1787) (N)

Pedostrangalia (Sphenalia) Daniel, 1904

Pedostrangalia (Sphenalia) verticalis (Germar, 1822) (N)

Neopiciella Sama, 1988

Neopiciella sicula (Ganglbauer, 1885) (Si) (E)

Judolia Mulsant, 1863

Judolia sexmaculata (Linné, 1758) (N)

Pachytodes Pic, 1891

Pachytodes cerambyciformis (Schränk, 1781) (N)

Pachytodes erraticus (Dalman, 1817) (N, S, Si)

Anoplodera Mulsant, 1839

Anoplodera rufipes (Schaller, 1783) (N, S)

Anoplodera sexguttata (Fabricius, 1775) (N, S)

Vadonia Mulsant, 1839

Vadonia imitatrix J. & K. Daniel, 1891 (N)

Vadonia unipunctata (Fabricius, 1787) (N)

Lepturobosca Reitter, 1913

Lepturobosca virens (Linné, 1758) (N)

Anastrangalia Casey, 1924

Anastrangalia dubia (Scopoli, 1763) (N, S)
Anastrangalia reyi (Heyden, 1889) (N)
Anastrangalia sanguinolenta (Linné, 1758) (N, S)

Corymbia Des Gozis, 1886

Corymbia cordigera (Fuesslins, 1775) (N, S, Si, Sa)
Corymbia erythroptera (Hagenbach, 1822) (N)
Corymbia fulva (De Geer, 1775) (N, S, Si)
Corymbia hybrida (Rey, 1885) (N)
Corymbia maculicornis (De Geer, 1775) (N)
Corymbia oblongomaculata (Buquet, 1840) (Si, Sa)
Corymbia rubra (Linné, 1758) (N, S)
Corymbia rufa (Brullé, 1832) (S)
Corymbia scutellata (Fabricius, 1781)
Corymbia scutellata scutellata (Fabricius, 1781) (N, S, Sa)
Corymbia scutellata melas (Lucas, 1849) (Si)

Rutpela Nakane & Ohbayashi, 1959

Rutpela maculata (Poda, 1761) (N, S, Si, Sa)

Leptura Linné, 1758

Leptura aethiops Poda, 1761 (N)
Leptura annularis Fabricius, 1801 (N)
Leptura aurulenta Fabricius, 1792 (N, S)
Leptura quadrifasciata Linné, 1758 (N)

Stenurella Villiers, 1974

Stenurella bifasciata (Müller, 1776) (N, S, Si, Sa)
Stenurella melanura (Linné, 1758) (N, S)
Stenurella nigra (Linné, 1758) (N, S)
Stenurella septempunctata (Fabricius, 1792) (N)

Strangalia Serville, 1835

Strangalia attenuata (Linné, 1758) (N, S)

Necydalis Linné, 1758

Necydalis major Linné, 1758 (N)
Necydalis ulmi Chevrolat, 1838 (N, S)

Xylosteus Frivaldszky, 1838

Xylosteus spinolae Frivaldszky, 1838 (N)

Nothorhina Redtenbacher, 1845

Nothorhina punctata Fabricius, 1798 (N, S?)

Alocerus Mulsant, 1862

Alocerus moesiacus (Frivaldszky, 1838) (N)

Schurmannia Sama, 1979

Schurmannia sicala Sama, 1979 (Si) (E)

Anisarthron Dejean, 1835

Anisarthron barbipes (Schrank, 1781) (N)

Asemum Eschscholtz, 1830

Asemum striatum (Linné, 1758) (N, S)

Asemum tenuicorne Kraatz, 1879 (S)

Arhopalus Serville, 1834

Arhopalus ferus (Mulsant, 1839) (N, S, Si, Sa)

Arhopalus rusticus (Linné, 1758) (N, S, Si)

Arhopalus syriacus (Reitter, 1895) (N, S, Si, Sa?)

Tetropium Kirby, 1837

Tetropium castaneum (Linné, 1758) (N, S)

Tetropium fuscum (Fabricius, 1787) (N)

Tetropium gabrieli (Weise, 1905) (N)

Oxypleurus Mulsant, 1839

Oxypleurus nodieri Mulsant, 1839 (S, Si)

Saphanus Serville, 1834

Saphanus piceus (Laicharting, 1784) (N, S)

Drymochares Mulsant, 1847

Drymochares truquii Mulsant, 1847 (N)

Spondylis Fabricius, 1775

Spondylis buprestoides (Linné, 1758) (N, S, Si)

Icosium Lucas, 1854

Icosium tomentosum Lucas, 1854

Icosium tomentosum tomentosum Lucas, 1854 (S, Sa)

Icosium tomentosum atticum Ganglbauer, 1881 (S)

Hesperophanes Mulsant, 1839

Hesperophanes sericeus (Fabricius, 1787) (N, S, Si, Sa)

Trichoferus Wollaston, 1854

Trichoferus fasciculatus (Faldermann, 1837) (N, S, Si, Sa)

Trichoferus griseus (Fabricius, 1792) (N, S, Si, Sa)

Trichoferus holosericeum (Rossi, 1790) (N, S, Si, Sa)

Trichoferus spartii Müller, 1948 (N, S)

Stromatium Serville, 1834

Stromatium unicolor (Olivier, 1795) (N, S, Si, Sa)

Phoracantha Newman, 1840

Phoracantha semipunctata (Fabricius, 1775) (Si, Sa) (*)

Penichroa Stephens, 1839

Penichroa fasciata (Stephens, 1831) (N, S, Si, Sa)

Gracilia Serville, 1834

Gracilia minuta (Fabricius, 1781) (N, S, Si, Sa)

Axinopalpis Dejean, 1835

Axinopalpis gracilis (Krynicky, 1832) (N, S)

Nathrius Brethes, 1916

Nathrius brevipennis (Mulsant, 1839) (N, S, Si, Sa)

Molorchus Fabricius, 1792

Molorchus minor (Linné, 1758) (N, S)

Glaphyra Newman, 1840

Glaphyra kiesenwetteri (Mulsant & Rey, 1861) (N, S)

Glaphyra marmottani (Brisout, 1863) (N)

Glaphyra umbellatarum (Schreber, 1759) (N, S, Si)

Brachypteroma Heyden, 1863

Brachypteroma ottomanum Heyden, 1863 (N, S, Si)

Stenopterus Illiger, 1804

Stenopterus ater (Linné, 1767) (N, S, Si, Sa)

Stenopterus flavicornis Küster, 1846 (N, S)

Stenopterus rufus (Linné, 1767) (N, S, Si, Sa)

Callimellum Strand, 1928

Callimellum abdominale (Olivier, 1795) (N, S, Si, Sa)

Callimellum angulatum (Schränk, 1789) (N, S, Si)

Certallum Dejean, 1821

Certallum ebulinum (Linné, 1781) (S, Si)

Obrium Dejean, 1821

Obrium brunneum (Fabricius, 1792) (N, S)

Obrium cantharinum (Linné, 1767) (N, S)

Obriopsis Müller, 1948

Obriopsis bicolor (Kraatz, 1862) (N, S, Si)

Deilus Serville, 1834

Deilus fugax (Olivier, 1790) (Si, Sa)

Cerambyx Linné, 1758

Cerambyx cerdo Linné, 1758 (Si, Sa)

Cerambyx miles Bonelli, 1823 (Si)

Cerambyx nodulosus Germar, 1817 (N)

Cerambyx scopolii Fuesslins, 1775 (Si, Sa)

Cerambyx welensii Küster, 1846 (Si)

Purpuricen Dejean, 1821

Purpuricenus budensis (Goetze, 1783) (N)
Purpuricenus dalmatinus Sturm, 1843 (N)
Purpuricenus globulicollis Dejean, 1839 (N, S, Si?)
Purpuricenus kaehleri (Linné, 1758) (N, S, Si)

Aromia Serville, 1833

Aromia moschata (Linné, 1758)
Aromia moschata moschata (Linné, 1758) (N, S)
Aromia moschata ambrosiaca (Stevens, 1809) (S, Si)

Rosalia Serville, 1833

Rosalia alpina (Linné, 1758) (N, S, Si)

Hylotrupes Serville, 1834

Hylotrupes bajulus (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)

Semanotus Mulsant, 1839

Semanotus laurasi (Lucas, 1852)
Semanotus laurasi corsicus Croissandeau, 1890 (Sa)
Semanotus ruscicus (Fabricius, 1776) (N, S)
Semanotus undatus (Linné, 1758) (N)

Ropalopus Mulsant, 1839

Ropalopus clavipes (Fabricius, 1775) (N, S)
Ropalopus femoratus (Linné, 1758) (N, S)
Ropalopus insubricus (Germar, 1824) (N)
Ropalopus siculus (Stierlin, 1864) (Si)
Ropalopus ungaricus (Herbst, 1784) (N, S)
Ropalopus varini Bedel, 1870 (N, S)

Callidium Fabricius, 1775

Callidium aeneum (De Geer, 1775) (N, S)
Callidium coriaceum Paykull, 1800 (N)
Callidium violaceum (Linné, 1758) (N)

Callidiellum Linsley, 1940

Callidiellum rufipenne (Motschulsky, 1860) (N) (*)

Pyrrhidium Fairmaire, 1864

Pyrrhidium sanguineum (Linné, 1758) (N, S)

Pronocera Motschulsky, 1859

Pronocera angusta (Kriechbaum, 1844) (N)

Leioderus Redtenbacher, 1845

Leioderus kollari Redtenbacher, 1849 (N, S, Si)

Phymatodes Mulsant, 1839

Phymatodes testaceus (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)

Poecilium Fairmaire, 1864

Poecilium alni (Linné, 1767) (N, S, Si)

Poecilium fasciatum (Villers, 1789) (N, S)

Poecilium glabratum (Charpentier, 1825) (N, S, Sa)

Poecilium lividum (Rossi, 1794) (N, S, Si, Sa)

Poecilium pusillum (Fabricius, 1787) (N, S)

Poecilium rufipes (Fabricius, 1776) (N, S)

Xylotrechus Chevrolat, 1860

Xylotrechus antilope (Schönherr, 1817) (N, S)

Xylotrechus arvicola (Olivier, 1795) (N, S, Si, Sa)

Xylotrechus pantherinus (Savenius, 1825) (N)

Xylotrechus rusticus (Linné, 1758) (N, S, Sa)

Xylotrechus stebbingi Gahan, 1906 (N, S) (*)

Clytus Laicharting, 1784

Clytus arietis (Linné, 1758) (N, S)

Clytus clavicornis Reiche, 1860 (Si) (E)

Clytus lama Mulsant, 1847 (N, S)

Clytus rhamni Germar, 1817 (N, S, Si, Sa)

Pseudosphegesthes Reitter, 1912

Pseudosphegesthes cinereus (Castelnau & Gory, 1836) (N, S, Si, Sa)

Plagionotus Mulsant, 1842

Plagionotus arcuatus (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)

Plagionotus detritus (Linné, 1758) (N, S)

Plagionotus floralis (Pallas, 1773) (N, S)

Plagionotus scalaris (Brullé, 1832) (S, Si, Sa)

Chlorophorus Chevrolat, 1863

- Chlorophorus figuratus* (Scopoli, 1763) (N, S)
- Chlorophorus pilosus* (Forster, 1771)
- Chlorophorus pilosus glabromaculatus* (Goeze, 1777) (N, S, Si, Sa)
- Chlorophorus sartor* (Müller, 1766) (N, S, Si, Sa)
- Chlorophorus trifasciatus* (Fabricius, 1781) (N, S, Si)
- Chlorophorus varius* (Müller, 1766) (N, S, Si, Sa)

Cyrtoclytus Ganglbauer, 1882

- Cyrtoclytus capra* (Germar, 1824) (N)

Neoclytus Thomson, 1860

- Neoclytus acuminatus* (Fabricius, 1775) (N, S) (*)

Isotomus Mulsant, 1863

- Isotomus barbarae* Sama, 1977 (N, S) (E)
- Isotomus speciosus* (Schneider, 1787) (N)

Anaglyptus Mulsant, 1839

- Anaglyptus gibbosus* (Fabricius, 1787) (N, S, Si)
- Anaglyptus mysticus* (Linné, 1758) (N, S)

Neodorcadion Ganglbauer, 1884

- Neodorcadion bilineatum* (Germar, 1824) (S)
- Neodorcadion calabricum* (Reitter, 1889) (S) (E)

Dorcadion Dalman, 1817

- Dorcadion arenarium* (Scopoli, 1763) (N, S)
- Dorcadion etruscum* (Rossi, 1790) (N, S, Si)
- Dorcadion mediterraneum* Breuning, 1942 (S) (E)

Parmena Latreille, 1829

- Parmena algerica* Castelnau, 1840 (Si, Sa)
- Parmena balteus* (Linné, 1767) (N)
- Parmena pubescens* (Dalman, 1817) (N, S, Si)
- Parmena solieri* Mulsant, 1839
- Parmena solieri solieri* Mulsant, 1839 (N, Sa)
- Parmena solieri lanzai* Sama, 1985 (S, Sa)
- Parmena subpubescens* Hellrigl, 1971 (S, Si) (E)
- Parmena unifasciata* (Rossi, 1790) (N, S)

Mesosa Latreille, 1829

Mesosa curculionoides (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)

Mesosa nebulosa (Fabricius, 1781) (N, S, Si, Sa)

Niphona Mulsant, 1839

Niphona picticornis Mulsant, 1839 (N, S, Si, Sa)

Herophila Mulsant, 1863

Herophila tristis (Linné, 1767)

Herophila tristis tristis (Linné, 1767) (N, S, Si, Sa)

Herophila tristis martinasci (Contarini & Garagnani, 1983) (S) (E)

Morinus Brullé, 1832

Morinus asper (Sulzer, 1776)

Morinus asper asper (Sulzer, 1776) (N, S, Si, Sa)

Morinus asper ganglbaueri (Reitter, 1894) (N)

Morinus funereus (Mulsant, 1863) (N)

Lamia Fabricius, 1775

Lamia textor (Linné, 1758) (N, S, Si)

Monochamus Dejean, 1821

Monochamus galloprovincialis (Olivier, 1795)

Monochamus galloprovincialis galloprovincialis (Olivier, 1795) (N, S)

Monochamus galloprovincialis pistor (Germar, 1818) (N)

Monochamus saltuarius (Gebler, 1830) (N)

Monochamus sartor (Fabricius, 1787) (N)

Monochamus sutor (Linné, 1758) (N)

Pogonocherus Dejean, 1821

Pogonocherus decoratus Fairmaire, 1855 (N, S)

Pogonocherus eugeniae Ganglbauer, 1891

Pogonocherus eugeniae eugeniae Ganglbauer, 1891 (N, S)

Pogonocherus eugeniae taygetanus Pic, 1903 (S)

Pogonocherus fasciculatus (De Geer, 1775) (N, S)

Pogonocherus hispidus (Linné, 1758) (N, S, Si)

Pogonocherus hispidulus (Piller & Mitterpacher, 1783) (N, S, Si)

Pogonocherus marcoi Sama, 1993 (S) (E)

Pogonocherus neuhausi Müller, 1916 (N, S, Si)

Pogonocherus ovatus (Goeze, 1777) (N, S)

Pogonocherus perroudi Mulsant, 1839 (N, S, Si, Sa)

Deroplia Dejean, 1835

Deroplia genei (Aragona, 1830) (N, S)

Deroplia troberti (Mulsant, 1843) (N, S, Si, Sa)

Oplosia Mulsant, 1863

Oplosia cinerea Mulsant, 1839 (N)

Anaesthetis Mulsant, 1839

Anaesthetis testacea (Fabricius, 1781) (N, S, Si)

Acanthocinus Dejean, 1821

Acanthocinus aedilis (Linné, 1758) (N, S)

Acanthocinus griseus (Fabricius, 1792) (N, S)

Acanthocinus henschi Reitter, 1900 (N, Si)

Acanthocinus reticulatus (Razoumowsky, 1789) (N, S)

Acanthocinus xanthoneurus (Mulsant & Rey, 1852) (N, S, Si?) (E)

Leiopus Serville, 1835

Leiopus nebulosus (Linné, 1758) (N, S, Si)

Leiopus settei Sama, 1985 (N) (E)

Exocentrus Dejean, 1837

Exocentrus adpersus Mulsant, 1846 (N, S, Si)

Exocentrus lusitanus (Linné, 1767) (N)

Exocentrus punctipennis Mulsant & Guillebeau, 1856 (N, S, Sa)

Aegomorphus Haldeman, 1847

Aegomorphus clavipes (Schrank, 1781) (N, S, Si, Sa)

Saperda Fabricius, 1775

Saperda carcharias (Linné, 1758) (N, S)

Saperda octopunctata (Scopoli, 1772) (N, S)

Saperda populnea (Linné, 1758) (N, S, Si)

Saperda punctata (Linné, 1767) (N, S, Si, Sa)

Saperda scalaris (Linné, 1758) (N, S, Si?)

Saperda similis Laicharting, 1784 (N, S)

Menesia Mulsant, 1856

Menesia bipunctata (Zoubkoff, 1829) (N)

Stenostola Mulsant, 1839

Stenostola ferrea (Schrank, 1776) (N, S)

Stenostola dubia (Laicharting, 1784) (N, S)

Oberea Mulsant, 1839

Oberea erythrocephala (Schrank, 1776) (N, S)

Oberea euphorbiae (Germar, 1813) (N)

Oberea linearis (Linné, 1761) (N, S, Si)

Oberea oculata (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)

Oberea pedemontana Chevrolat, 1856 (N)

Oberea pupillata (Gyllenhal, 1817) (N)

Agapanthia Serville, 1835

Agapanthia asphodeli (Latreille, 1804) (N, S, Si, Sa)

Agapanthia cardui (Linné, 1767) (N, S, Si, Sa)

Agapanthia cynarae (Germar, 1817) (N, S)

Agapanthia dahli (Richter, 1821)

Agapanthia dahli malmerendii Sama, 1981 (N, S, Sa) (E)

Agapanthia dahli sicula Ganglbauer, 1884 (Si) (E)

Agapanthia irrorata (Fabricius, 1787) (S, Si, Sa)

Agapanthia kirbyi (Gyllenhal, 1817) (S)

Agapanthia maculicornis (Gyllenhal, 1817)

Agapanthia maculicornis davidi Slama, 1986 (S, Si) (E)

Agapanthia villosaviridescens (De Geer, 1775) (N, S, Si)

Agapanthia violacea (Fabricius, 1775) (N, S, Si)

Calamobius Guérin, 1849

Calamobius filum (Rossi, 1790) (N, S, Si, Sa)

Musaria Thomson, 1864

Musaria affinis (Harrer, 1784)

Musaria affinis nigrohirta (Müller, 1948) (N, S)

Musaria argus (Frölich, 1793) (N)

Musaria cephalotes (Küster, 1846) (N, S)

Musaria rubropunctata (Goeze, 1777) (N)

Musaria tirellii (Luigioni, 1913) (S) (E)

Opsilia Mulsant, 1863

Opsilia coerulescens (Scopoli, 1763) (N, S, Si, Sa)

Opsilia molybdaena (Dalman, 1817) (N, S)

Phytoecia Mulsant, 1839

Phytoecia coerulea (Scopoli, 1772) (S, Si)

Phytoecia cylindrica (Linné, 1758) (N, S)

Phytoecia icterica (Schaller, 1783) (N, S)

Phytoecia malachitica Lucas, 1849 (Si)

Phytoecia nigricornis (Fabricius, 1781) (N, S, Si)

Phytoecia pustulata (Schrank, 1776) (N, S)

Phytoecia rufipes (Olivier, 1795) (N, S, Si)

Phytoecia vulneris Aurivillius, 1923 (N, S, Si)

Phytoecia virgula (Charpentier, 1825) (N, S, Si)

Blepisanis Pascoe, 1866

Blepisanis melanocephala (Fabricius, 1787) (Si)

Tetrops Stephens, 1831

Tetrops praeusta (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)

Tetrops starki Chevrolat, 1859 (N, S)

Note

Phoracantha semipunctata: Specie introdotta in Italia attorno agli anni 50; patria: Australia.

Callidiellum rufipenne: Specie introdotta in Italia attorno alla fine degli anni 80; patria: Estremo Oriente.

Xylotrechus stebbingi: Specie introdotta in Italia verso la metà degli anni 80; patria: India settentrionale.

Neoclytus acuminatus: Specie introdotta in Italia all'inizio del 1900; patria: USA.

Cerophytidae

Cerophytum Latreille, 1809

Cerophytum elateroides Latreille, 1809 (N)

Cerylonidae

Cerylon Latreille, 1802

Cerylon deplanatum Gyllenhal, 1827 (N, S, Sa)

Cerylon fagi Brisout de Barneville, 1867 (N, S)

Cerylon ferrugineum Stephens, 1830 (N, S, Si, Sa)

Cerylon histeroides (Fabricius, 1792) (N, S, Si, Sa)

Cerylon impressum Erichson, 1845 (N, S, Sa)

Philothermus Aubé, 1843

Philothermus evanescens (Reitter, 1876) (N, S, Si)

Philothermus montandoni Aubé, 1843 (S) (*)

Philothermus semistriatus (Perris, 1865) (N, S)

Murmidi Leach, 1822

Murmidi *ovalis* (Beck, 1817) (N, S)

Note

Philothermus montandoni: Dato inedito per l'Orto Botanico di Napoli; specie probabilmente tropicale, di origine ignota.

Cetoniidae

Valgus Scriba, 1790

Valgus hemipterus (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)

Trichius Fabricius, 1775

Trichius fasciatus (Linné, 1758) (N, S)

Trichius rosaceus (Voet, 1769)

Trichius rosaceus rosaceus (Voet, 1769) (N, S, Si)

Trichius rosaceus zonatus Germar, 1794 (Sa)

Trichius sexualis Bedel, 1906 (N, S)

Gnorimus Serville, 1825

Gnorimus decempunctatus Helfer, 1833 (Si) (E)

Gnorimus nobilis (Linné, 1758)

Gnorimus nobilis nobilis (Linné, 1758) (N, S)

Gnorimus variabilis (Linné, 1758) (N, S)

Osmoderma Serville, 1828

Osmoderma cristinae Sparacio, 1994 (Si)

Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) (N, S, Si)

Oxythyrea Mulsant, 1842

Oxythyrea funesta (Poda, 1761)

Oxythyrea funesta funesta (Poda, 1761) (N, S, Si, Sa)

Tropinota Mulsant, 1842

Tropinota hirta (Poda, 1761)

Tropinota hirta hirta (Poda, 1761) (N, S, Si, Sa)

Tropinota squalida (Scopoli, 1783)

Tropinota squalida squalida (Scopoli, 1783) (N, S, Si, Sa)

Aethiessa Burmeister, 1842

Aethiessa floralis (Fabricius, 1787) (S, Si)

Cetonia Fabricius, 1775

Cetonia aurata (Linné, 1758)

Cetonia aurata pisana Heer, 1841 (N, S, Sa)

Cetonia aurata sicula Aliquò, 1983 (Si) (E)

Cetonia carthami Gory & Percheron, 1833

Cetonia carthami carthami Gory & Percheron, 1833 (N, Sa)

Liocola Thomson, 1859

Liocola lugubris (Herbst, 1786) (N, S)

Cetonischema Reitter, 1898

Cetonischema aeruginosa (Drury, 1770) (N, S, Si)

Eupotosia Miksic, 1954

Eupotosia affinis (Andersch, 1797)

Eupotosia affinis affinis (Andersch, 1797) (N, S, Si)

Eupotosia affinis tyrrhenica Miksic, 1957 (Sa)

Eupotosia mirifica (Mulsant, 1842)

Eupotosia mirifica mirifica (Mulsant, 1842) (S)

Potosia Mulsant & Rey, 1871

Potosia angustata (Germar, 1817) (N)

Potosia cuprea (Fabricius, 1775)

Potosia cuprea cuprea (Fabricius, 1775) (N, S, Sa)

Potosia cuprea incerta (A. Costa, 1852) (N, S, Si)

Potosia cuprea metallica (Herbst, 1782) (N)

Potosia cuprea obscura (Andersch, 1797) (N)

Potosia fieberi (Kraatz, 1880) (N, S)

Potosia opaca (Fabricius, 1787) (N, S, Si, Sa)

Netocia A. Costa, 1852

Netocia morio (Fabricius, 1781)
 Netocia morio morio (Fabricius, 1781) (N, S, Si, Sa)
Netocia oblonga (Gory & Percheron, 1833) (N, S, Si)
Netocia sardea (Gory & Percheron, 1833) (Sa)
Netocia squamosa (Lefebvre, 1827) (S, Si)

Chironidae

Chiron Macleay, 1819

Chiron cylindrus (Fabricius, 1798) (Si)

Cholevidae

Nemadus Thomson, 1867

Nemadus colonoides (Kraatz, 1851) (N)

Ptomaphagus (Ptomaphagus) Illiger, 1798

Ptomaphagus (Ptomaphagus) aritzensis Jeannel, 1934 (Sa) (E)
 Ptomaphagus (Ptomaphagus) clavalis Reitter, 1884 (Si, Sa)
 Ptomaphagus (Ptomaphagus) chendai J. Müller, 1921 (N)
 Ptomaphagus (Ptomaphagus) divaricatus Jeannel, 1934 (N, S)
 Ptomaphagus (Ptomaphagus) medius Rey, 1889 (N)
 Ptomaphagus (Ptomaphagus) pius Seidlitz, 1887 (N, S) (E)
 Ptomaphagus (Ptomaphagus) sardus Seidlitz, 1887 (Sa)
 Ptomaphagus (Ptomaphagus) sericatus (Chaudoir, 1845) (N)
 Ptomaphagus (Ptomaphagus) subvillosus (Goeze, 1777) (N)
 Ptomaphagus (Ptomaphagus) tenuicornis (Rosenhauer, 1856)
 Ptomaphagus (Ptomaphagus) tenuicornis mauritanicus Jeannel, 1934 (Si)
 Ptomaphagus (Ptomaphagus) vallombrosae Seidlitz, 1887 (S) (E)
 Ptomaphagus (Ptomaphagus) variicornis (Rosenhauer, 1847) (N)

Anemadus Reitter, 1884

Anemadus acicularis (Kraatz, 1852) (N, S, Si, Sa)
 Anemadus bianchii Reitter, 1906 (N)
 Anemadus italicus Zoia, 1990 (S) (E)
 Anemadus osellai Giachino & Vailati, 1993 (Si)
 Anemadus strigosus (Kraatz, 1852)
 Anemadus strigosus strigosus (Kraatz, 1852) (N, S)

Speonemadus Jeannel, 1922

Speonemadus orchesioides (Fairmaire, 1879) (S, Si)

Nargus (Nargus) Thomson, 1867

Nargus (Nargus) badius (Sturm, 1839)

Nargus (Nargus) badius badius (Sturm, 1839) (N, S, Si)

Nargus (Nargus) velox (Spence, 1815)

Nargus (Nargus) velox velox (Spence, 1815) (N, S, Si?)

Nargus (Demochrus) Thomson, 1867

Nargus (Demochrus) anisotomoides (Spence, 1815)

Nargus (Demochrus) anisotomoides anisotomoides (Spence, 1815) (N, S)

Nargus (Demochrus) brunneus (Sturm, 1839) (N, S)

Nargus (Demochrus) siculus Jeannel, 1936 (Si) (E)

Nargus (Demochrus) wilkini (Spence, 1815) (N, S)

Choleva (Cholevopsis) Jeannel, 1922

Choleva (Cholevopsis) convexipennis Zoia, 1986 (N, S) (E)

Choleva (Cholevopsis) garganona Reitter, 1913 (S) (E)

Choleva (Cholevopsis) spadicea (Sturm, 1839) (N)

Choleva (Choleva) Latreille, 1796

Choleva (Choleva) agilis (Illiger, 1789) (N)

Choleva (Choleva) breiti Jeannel, 1923 (N)

Choleva (Choleva) calabrica Bordoni, 1983 (S) (E)

Choleva (Choleva) cisteloides (Frölich, 1799)

Choleva (Choleva) cisteloides cisteloides (Frölich, 1799) (N, S, Si)

Choleva (Choleva) doderoi Breit, 1903 (Sa) (E)

Choleva (Choleva) fagniezi Jeannel, 1922

Choleva (Choleva) fagniezi fagniezi Jeannel, 1922 (N)

Choleva (Choleva) glauca Britten, 1918 (N)

Choleva (Choleva) impressithorax Pic, 1922 (N?)

Choleva (Choleva) leucophthalma Fiori, 1899 (S) (E)

Choleva (Choleva) oblonga Latreille, 1807

Choleva (Choleva) oblonga menozzii Jeannel, 1923 (N) (E)

Choleva (Choleva) oblonga oblonga Latreille, 1807 (N, S)

Choleva (Choleva) reitteri Petri, 1915

Choleva (Choleva) reitteri solarii Jeannel, 1923 (S)

Choleva (Choleva) sturmi Brisout, 1863 (N, S)

Attumbra Des Gozis, 1886

Attumbra lucida (Kraatz, 1852) (N, S)

Philomessor (Philomessor) Jeannel, 1936

Philomessor (Philomessor) brevicollis Kraatz, 1852
Philomessor (Philomessor) brevicollis brevicollis Kraatz, 1852 (S)

Catopomorphus (Weiratherella) Jeannel, 1929

Catopomorphus (Weiratherella) pesruchesi Jeannel, 1936 (S?, Si, Sa?)
Catopomorphus (Weiratherella) rougeti Saulcy, 1863 (N, Si)

Catopomorphus (Catopomorphus) Aubé, 1850

Catopomorphus (Catopomorphus) orientalis Aubé, 1850
Catopomorphus (Catopomorphus) orientalis orientalis Aubé, 1850 (S, Si, Sa)

Attaephilus Motschulsky, 1869

Attaephilus arenarius (Hampe, 1852) (N)

Dreposcia Jeannel, 1922

*Dreposcia relict*a Lohse, 1964 (N)
Dreposcia umbrina (Erichson, 1837) (N)

Sciodrepoides Hatch, 1933

Sciodrepoides alpestris Jeannel, 1934 (N)
Sciodrepoides fumatus (Spence, 1815)
Sciodrepoides fumatus fumatus (Spence, 1815) (N, S)
Sciodrepoides watsoni (Spence, 1815)
Sciodrepoides watsoni watsoni (Spence, 1815) (N, S, Si)

Catops Paykull, 1798

Catops andalusicus Heiden, 1870 (Si)
Catops chrysomeloides (Panzer, 1798) (N)
Catops coracinus Kellner, 1846
Catops coracinus coracinus Kellner, 1846 (N, S, Si)
Catops dorni Reitter, 1913 (N, S, Si)
Catops fuliginosus Erichson, 1837
Catops fuliginosus fuliginosus Erichson, 1837 (N, S)
Catops fuscus (Panzer, 1794)
Catops fuscus fuscoides Reitter, 1909 (S, Si, Sa)
Catops fuscus fuscus (Panzer, 1794) (N)
Catops grandicollis Erichson, 1837 (N, S)
Catops joffrei Sainte-Claire Deville, 1927 (N)
Catops kirbyi (Spence, 1815)
Catops kirbyi kirbyi (Spence, 1815) (N, S, Si)
Catops longulus Kellner, 1846 (N)

Catops marginicollis Lucas, 1846 (Si)
Catops morio (Fabricius, 1792) (N)
Catops nigricans (Spence, 1815) (N, S)
Catops nitidicollis Kraatz, 1856 (S)
Catops picipes (Fabricius, 1792) (N, S)
Catops solarii Jeannel, 1934 (N?, S)
Catops speluncarum Reitter, 1884 (Sa)
Catops subfuscus Kellner, 1846
 Catops subfuscus subfuscus Kellner, 1846 (N, S, Si)
Catops tristis (Panzer, 1794)
 Catops tristis tristis (Panzer, 1794) (N, S)
Catops ventricosus (Weise, 1877)
 Catops ventricosus rotundatus Szymczakowski, 1963 (N, S)

Apocatops Zwick, 1968

Apocatops monguzzii Giachino & Vailati, 1987 (N, S) (E)
Apocatops nigrita (Erichson, 1836) (N)

Fissocatops Zwick, 1968

Fissocatops westi (Krogerus, 1931) (N)

Chionocatops Ganglbauer, 1899

Chionocatops bugnioni (Tournier, 1873) (N)

Cholevinus Reitter, 1901

Cholevinus pallidus (Ménétriés, 1832)
 Cholevinus pallidus rufus (Kraatz, 1870) (S, Si)

Ovobathysciola Jeannel, 1924

Ovobathysciola gestroi (Fairmaire, 1878) (Sa) (E)
Ovobathysciola grafittii Rampini & Sbordoni, 1980 (Sa) (E)
Ovobathysciola majori (Reitter, 1885) (Sa) (E)

Patriziella Jeannel, 1956

Patriziella nuragica Rampini & Zoia, 1990 (Sa) (E)
Patriziella sardoa Jeannel, 1956 (Sa) (E)

Speonomus (Batinoscelis) Jeannel, 1924

Speonomus (Batinoscelis) aritzensis Jeannel, 1911 (Sa) (E)
Speonomus (Batinoscelis) diabolicus Jeannel, 1911 (Sa) (E)
Speonomus (Batinoscelis) lostiai (Dodero, 1904) (Sa) (E)

***Bathysciola* Jeannel, 1910**

- Bathysciola adelinae* Jeannel, 1934 (N) (E)
- Bathysciola agostini* Jeannel, 1924 (N) (E)
- Bathysciola angeli* Jeannel, 1924 (N) (E)
- Bathysciola anxanensis* Pace, 1977 (S) (E)
- Bathysciola aubei* (Kiesenwetter, 1850) (N)
- Bathysciola casalei* Giachino, 1988 (N) (E)
- Bathysciola clavicornis* Jeannel, 1924 (S) (E)
- Bathysciola damryi* (Abeille, 1881) (Sa) (E)
- Bathysciola delayi* Latella & Rampini, 1994 (S) (E)
- Bathysciola derosasi* Jeannel, 1914 (S) (E)
- Bathysciola destefanii* (Ragusa, 1881) (Si) (E)
- Bathysciola doderoi* Giachino, 1990 (Sa) (E)
- Bathysciola ferdinandi* Jeannel, 1924 (S) (E)
- Bathysciola fortesculpta* Jeannel, 1914 (Sa) (E)
- Bathysciola gardinii* Zoia & Rampini, 1985 (S) (E)
- Bathysciola georgii* Cerutti & Patrizi, 1952 (S) (E)
- Bathysciola guedeli* Jeannel, 1910 (N) (E)
- Bathysciola guerzoi* Giachino, 1988 (N) (E)
- Bathysciola hadriatica* Pace, 1977 (S) (E)
- Bathysciola kraussei* Melichar, 1912 (Sa) (E)
- Bathysciola monregalensis* Giachino, 1988 (N) (E)
- Bathysciola ovoidea* (Fairmaire, 1869) (N?) (E)
- Bathysciola partenii* Ruffo, 1947 (S) (E)
- Bathysciola picena* Pace, 1977 (S) (E)
- Bathysciola pumilio* (Reitter, 1885) (N, S) (E)
- Bathysciola raveli* (Dodero, 1904) (S) (E)
- Bathysciola ruffoi* Tamanini, 1955 (S)
- Bathysciola sarteanensis* (Bargagli, 1870)
 - Bathysciola sarteanensis paganettii* Jeannel, 1924 (S) (E)
 - Bathysciola sarteanensis sarteanensis* (Bargagli, 1870) (S) (E)
- Bathysciola sbordonii* Rampini & Latella, 1993 (S) (E)
- Bathysciola silvicola* Jeannel, 1910 (N) (E)
- Bathysciola simbruinica* Jeannel, 1911 (E)
 - Bathysciola simbruinica aretina* Jeannel, 1924 (S) (E)
 - Bathysciola simbruinica latia* Jeannel, 1924 (S) (E)
 - Bathysciola simbruinica simbruinica* Jeannel, 1911 (S) (E)
 - Bathysciola simbruinica trasimenica* Jeannel, 1924 (S) (E)
- Bathysciola sisernica* Cerruti & Patrizi, 1952 (S) (E)
- Bathysciola solarii* (Dodero, 1900)
 - Bathysciola solarii aemiliana* Jeannel, 1924 (N) (E)
 - Bathysciola solarii solarii* (Dodero, 1900) (N) (E)
- Bathysciola subterranea* (Krauss, 1900) (S) (E)
- Bathysciola tarsalis* (Kiesenwetter, 1861) (N) (E)
- Bathysciola vallarsae* (Halbherr, 1898) (N) (E)
- Bathysciola vignai* Sbordonii & Rampini, 1978 (S) (E)

Bathysciola volsiniensis Jeannel, 1924

Bathysciola volsiniensis sibyllina Pace, 1977 (S) (E)

Bathysciola volsiniensis volsiniensis Jeannel, 1924 (S) (E)

***Parabathyscia (Ligurobathyscia)* Zoia, 1986**

Parabathyscia (Ligurobathyscia) brigantii Zoia, 1980 (N) (E)

***Parabathyscia (Parabathyscia)* Jeannel, 1908**

Parabathyscia (Parabathyscia) andreinii Jeannel, 1914 (S) (E)

Parabathyscia (Parabathyscia) apuana Jeannel, 1924

Parabathyscia (Parabathyscia) apuana apuana Jeannel, 1924 (S) (E)

Parabathyscia (Parabathyscia) apuana lunensis Zoia, 1986 (S) (E)

Parabathyscia (Parabathyscia) avetonensis Jeannel, 1924 (N) (E)

Parabathyscia (Parabathyscia) calabra Pace, 1975 (S) (E)

Parabathyscia (Parabathyscia) caprai Zoia, 1978 (N) (E)

Parabathyscia (Parabathyscia) dematteisi Ronchetti & Pavan, 1953 (E)

Parabathyscia (Parabathyscia) dematteisi casalei Zoia, 1986 (N) (E)

Parabathyscia (Parabathyscia) dematteisi dematteisi Ronchetti & Pavan, 1953 (N)

(E)

Parabathyscia (Parabathyscia) doderoi (Fairmaire, 1882) (N) (E)

Parabathyscia (Parabathyscia) doriai (Fairmaire, 1872) (N) (E)

Parabathyscia (Parabathyscia) emeryi Jeannel, 1934 (S) (E)

Parabathyscia (Parabathyscia) finitima Zoia, 1986 (N) (E)

Parabathyscia (Parabathyscia) fiorii (Capra, 1920) (N, S) (E)

Parabathyscia (Parabathyscia) genuensis Zoia, 1986 (N) (E)

Parabathyscia (Parabathyscia) latialis Jeannel, 1911

Parabathyscia (Parabathyscia) latialis latialis Jeannel, 1911 (S) (E)

Parabathyscia (Parabathyscia) latialis straneoii Jeannel, 1934 (S) (E)

Parabathyscia (Parabathyscia) ligurica (Reitter, 1889) (N) (E)

Parabathyscia (Parabathyscia) luigionii Jeannel, 1911 (S) (E)

Parabathyscia (Parabathyscia) mancinii Jeannel, 1924 (N) (E)

Parabathyscia (Parabathyscia) obruta Zoia, 1986 (N) (E)

Parabathyscia (Parabathyscia) oodes (Jeannel, 1934) (N) (E)

Parabathyscia (Parabathyscia) paganoi Zoia, 1977 (N) (E)

Parabathyscia (Parabathyscia) peragalloi Jeannel, 1911 (N)

Parabathyscia (Parabathyscia) sanfilippoi Zoia, 1987 (N) (E)

Parabathyscia (Parabathyscia) sbordonii Zoia, 1986 (N) (E)

Parabathyscia (Parabathyscia) spagnoloi (Fairmaire, 1882)

Parabathyscia (Parabathyscia) spagnoloi brevipilis (Dodero, 1900) (N) (E)

Parabathyscia (Parabathyscia) spagnoloi propinqua Zoia, 1986 (N) (E)

Parabathyscia (Parabathyscia) spagnoloi spagnoloi (Fairmaire, 1882) (N) (E)

Parabathyscia (Parabathyscia) tigullina Binaghi, 1940 (N) (E)

Parabathyscia (Parabathyscia) viti Zoia, 1986 (N) (E)

Parabathyscia (Parabathyscia) wollastoni (Janson, 1857) (N)

***Dellabeffaella* Capra, 1924**

Dellabeffaella olmii Casale, 1980 (N) (E)
Dellabeffaella roccai (Capra, 1924) (N) (E)

Canavesiella Giachino, 1993

Canavesiella casalei Giachino, 1993 (N) (E)
Canavesiella lanai Giachino, 1993 (N) (E)

Archeoboldoria Ghidini, 1937

Archeoboldoria doderoana (Jeannel, 1924) (N) (E)

Pseudoboldoria Ghidini, 1937

Pseudoboldoria barii Focarile, 1950 (N) (E)
Pseudoboldoria belluccii Regalin, 1985 (N) (E)
Pseudoboldoria bergamasca (Jeannel, 1914)
 Pseudoboldoria bergamasca bergamasca (Jeannel, 1914) (N) (E)
 Pseudoboldoria bergamasca binaghii (Jeannel, 1931) (N) (E)
Pseudoboldoria bucciarellii Rossi, 1963 (N) (E)
Pseudoboldoria comottiana Vailati, 1988 (N) (E)
Pseudoboldoria focarilei Vailati, 1988 (N) (E)
Pseudoboldoria gratiae Monguzzi, 1984 (N) (E)
Pseudoboldoria intermedia Vailati, 1988 (N) (E)
Pseudoboldoria kruegeri (J. Müller, 1914)
 Pseudoboldoria kruegeri kruegeri (J. Müller, 1914) (N) (E)
 Pseudoboldoria kruegeri orobica Vailati, 1988 (N) (E)
Pseudoboldoria longobarda Vailati, 1988 (N) (E)
Pseudoboldoria malanchinii Pavan & Ronchetti, 1949 (N) (E)
Pseudoboldoria personata Vailati, 1988 (N) (E)
Pseudoboldoria robiatii (Reitter, 1889) (N) (E)
Pseudoboldoria schatzmayri Focarile, 1952 (N) (E)

Cryptobathyscia Vailati, 1980

Cryptobathyscia gavardensis Vailati, 1980 (N) (E)

Viallia Pavan, 1950

Viallia alfanoi Pavan, 1950 (N) (E)
Viallia cappai Vailati, 1988 (N) (E)
Viallia grottoloi Vailati, 1988 (N) (E)
Viallia mismae (Inzaghi & Regalin, 1982) (N) (E)

Boldoria Jeannel, 1924

Boldoria aculeata Jeannel, 1924 (N) (E)

Boldoria aguinensis (Vailati, 1974) (N) (E)
Boldoria allegettii Jeannel, 1930 (N) (E)
Boldoria antonellae Vailati, 1988 (N) (E)
Boldoria baldensis (J. Müller, 1928) (N) (E)
Boldoria breviclavata (J. Müller, 1931) (N) (E)
Boldoria comottii Vailati, 1988 (N) (E)
Boldoria ghidinii Lona, 1937
 Boldoria ghidinii blesioi Vailati, 1988 (N) (E)
 Boldoria ghidinii ghidinii Lona, 1937 (N) (E)
 Boldoria ghidinii kahleni Vailati, 1988 (N) (E)
 Boldoria ghidinii polavenensis Pavan, 1939 (N) (E)
Boldoria glacialis Vailati, 1975
 Boldoria glacialis filicornis Vailati, 1979 (N) (E)
 Boldoria glacialis glacialis Vailati, 1975 (N) (E)
 Boldoria glacialis monguzzii Vailati, 1988 (N) (E)
 Boldoria glacialis rosai Vailati, 1988 (N) (E)
Boldoria longitarsis Pavan, 1941 (N) (E)
Boldoria morettii (Pavan, 1939)
 Boldoria morettii morettii (Pavan, 1939) (N) (E)
 Boldoria morettii vesallae (Vailati, 1974) (N) (E)
Boldoria regalini Vailati, 1988 (N) (E)
Boldoria trumplina Vailati, 1988 (N) (E)
Boldoria vailatii (Cavadini, 1988) (N) (E)
Boldoria vestae Ghidini, 1936
 Boldoria vestae meridionalis Vailati, 1988 (N) (E)
 Boldoria vestae vestae Ghidini, 1936 (N) (E)
Boldoria viallii Pavan, 1938 (N) (E)

Insubriella Vailati, 1990

Insubriella paradoxa Vailati, 1990 (N) (E)

Monguzziella Vailati, 1993

Monguzziella grottoloi Vailati, 1993 (N) (E)

Pholeuonidius Jeannel, 1911

Pholeuonidius ferroi Paoletti, 1977 (N) (E)
Pholeuonidius halbherri (Reitter, 1887) (N) (E)
Pholeuonidius pacei Paoletti, 1977 (N) (E)
Pholeuonidius pinkeri Jeannel, 1911 (N) (E)

Ceuthmonocharis (Ceuthmonocharis) Jeannel, 1914

Ceuthmonocharis (Ceuthmonocharis) doderoi Jeannel, 1924 (N) (E)
Ceuthmonocharis (Ceuthmonocharis) heteromorphus (Dodero, 1909) (N) (E)

Leptodirus Schmidt, 1832

Leptodirus hohenwarthi Schmidt, 1832

Leptodirus hohenwarthi reticulatus J. Müller, 1905 (N)

Phaneropella (Phaneropella) Jeannel, 1910

Phaneropella (Phaneropella) lesinae (Reitter, 1881) (S)

Aphaobius (Aphaobius) Abeille, 1878

Aphaobius (Aphaobius) milleri Schmidt, 1885

Aphaobius (Aphaobius) milleri forojulensis J. Müller, 1931 (N) (E)

Pretneria J. Müller, 1931

Pretneria saulii J. Müller, 1941 (N)

Orostygia J. Müller, 1912

Orostygia bassanii Daffner, 1988 (N) (E)

Orostygia doderoi J. Müller, 1919

Orostygia doderoi bucciarellii Tamanini, 1955 (N) (E)

Orostygia doderoi doderoi J. Müller, 1919 (N) (E)

Orostygia marcelloi Agazzi, 1957 (N) (E)

Orostygia meggii Agazzi, 1968 (N) (E)

Orostygia moczarskii J. Müller, 1912

Orostygia moczarskii moczarskii J. Müller, 1912 (N) (E)

Orostygia moczarskii tibialis Paoletti, 1979 (N) (E)

Orostygia pampaninii Paoletti, 1968 (N) (E)

Orostygia pretneri J. Müller, 1931 (N) (E)

Orostygia rossii Porro & Quaia, 1969 (N) (E)

Oryotus Miller, 1856

Oryotus dreoni Piva & Zoia, 1989 (N) (E)

Oryotus micklitzi Reitter, 1885

Oryotus micklitzi indentatus Pretner, 1955 (N)

Oryotus ravasinii J. Müller, 1922 (N) (E)

Oryotus sebenelloi Daffner, 1988 (N) (E)

Oryotus tragoniae J. Müller, 1935 (N) (E)

Cansiliella Paoletti, 1972

Cansiliella servadeii Paoletti, 1980 (N) (E)

Cansiliella tonielloi Paoletti, 1972 (N) (E)

Sphaerobathyscia J. Müller, 1907

Sphaerobathyscia hoffmanni (Motschulsky, 1856) (N)

Bathysciotes Jeannel, 1910

Bathysciotes khevenhulleri (Miller, 1851)

Bathysciotes khevenhulleri tergestinus J. Müller, 1922 (N) (E)

Neobathyscia J. Müller, 1917

Neobathyscia affinis Piva, 1984 (N) (E)

Neobathyscia antrorum (Doderò, 1900)

Neobathyscia antrorum antrorum (Doderò, 1900) (N) (E)

Neobathyscia antrorum fenzoii Rallo, 1971 (N) (E)

Neobathyscia dalpiazii Paoletti, 1977 (N) (E)

Neobathyscia fabianii (Doderò, 1904) (N) (E)

Neobathyscia isabelae Piva, 1984 (N) (E)

Neobathyscia leccei Piva, 1984 (N) (E)

Neobathyscia lessinica J. Müller, 1935 (N) (E)

Neobathyscia mancinii Jeannel, 1924 (N) (E)

Neobathyscia pasai Ruffo, 1950 (N) (E)

Neobathyscia roboretana J. Müller, 1931 (N) (E)

Halbherria Conci & Tamanini, 1951

Halbherria cimbrica Piva, 1985 (N) (E)

Halbherria stefani (Breit, 1914) (N) (E)

Halbherria tamaninii (J. Müller, 1931) (E)

Halbherria tamaninii pacei Piva, 1988 (N) (E)

Halbherria tamaninii tamaninii (J. Müller, 1931) (N) (E)

Halbherria vericoi Piva, 1984 (N) (E)

Halbherria zorzii (Ruffo, 1950) (N) (E)

Aphaotus Breit, 1914

Aphaotus cadamuroi Busulini, 1958 (N) (E)

Aphaotus jureceki Breit, 1914 (N) (E)

Aphaotus nivalis J. Müller, 1931

Aphaotus nivalis granulatus Piva, 1986 (N) (E)

Aphaotus nivalis nivalis J. Müller, 1931 (N) (E)

Lessiniella Pavan, 1941

Lessiniella berica Piva, 1993 (N) (E)

Lessiniella trevisioli Pavan, 1941 (N) (E)

Chrysomelidae

Orsodacne Latreille, 1802

Orsodacne cerasi (Linné, 1758) (N, S) (*)
Orsodacne lineola (Panzer, 1795) (N, S, Si)

Zeugophora Kunze, 1818

Zeugophora flavicollis (Marsham, 1802) (N)
Zeugophora scutellaris Suffrian, 1840 (N)
Zeugophora subspinosa (Fabricius, 1781) (N, S)

Donacia (Donaciella) Reitter, 1920

Donacia (Donaciella) cinerea (Herbst, 1784) (N, S)
Donacia (Donaciella) clavipes (Fabricius, 1793) (N, Sa)
Donacia (Donaciella) tomentosa (Ahrens, 1810) (N)

Donacia (Askevoldia) Kippenberg, 1994

Donacia (Askevoldia) reticulata (Gyllenhal, 1817) (N, S, Si)

Donacia (Donacia) Fabricius, 1775

Donacia (Donacia) crassipes Fabricius, 1775 (N, S) (*)

Donacia (Donaciomima) Medvedev, 1973

Donacia (Donaciomima) antiqua Kunze, 1818 (N)
Donacia (Donaciomima) apricans Lacordaire, 1845 (Si)
Donacia (Donaciomima) aquatica (Linné, 1758) (N, S) (*)
Donacia (Donaciomima) bicolora Zschach, 1788 (*)
 Donacia (Donaciomima) bicolora bicolora Zschach, 1788 (N, S)
 Donacia (Donaciomima) bicolora meridionalis Weise, 1886 (S, Si)
Donacia (Donaciomima) brevicornis Ahrens, 1810 (N)
Donacia (Donaciomima) brevitarsis Thomson, 1884 (N, S) (*)
Donacia (Donaciomima) dentata Hoppe, 1795 (*)
 Donacia (Donaciomima) dentata angustata Kunze, 1818 (N, S, Si?) (E)
Donacia (Donaciomima) impressa Paykull, 1799 (N, S, Si)
Donacia (Donaciomima) marginata Hoppe, 1795 (N, S, Si, Sa)
Donacia (Donaciomima) obscura Gyllenhal, 1813 (N)
Donacia (Donaciomima) polita Kunze, 1818 (N, S, Si?, Sa)
Donacia (Donaciomima) semicuprea Panzer, 1796 (N, S?) (*)
Donacia (Donaciomima) simplex Fabricius, 1775 (N, S, Si, Sa)
Donacia (Donaciomima) sparganii Ahrens, 1810 (N)
Donacia (Donaciomima) springeri G. Müller, 1916 (N)
Donacia (Donaciomima) thalassina Germar, 1811 (N, S?) (*)

*Donacia (Donaciomima) versicolore*a (Brahm, 1790) (N, S) (*)
Donacia (Donaciomima) vulgaris Zschach, 1788 (N, S, Si, Sa)

Plateumaris Thomson, 1859

Plateumaris braccata (Scopoli, 1772) (N)
Plateumaris consimilis (Schrank, 1781) (N)
Plateumaris rustica (Kunze, 1818) (N)
Plateumaris sericea (Linné, 1758) (N, S)

Macrolea Samouelle, 1819

Macrolea appendiculata (Panzer, 1794) (N?) (*)
Macrolea mutica (Fabricius, 1792) (S, Sa)

Lilioceris Reitter, 1912

Lilioceris lili (Scopoli, 1763)
 Lilioceris lili lili (Scopoli, 1763) (N, S, Si, Sa)
 Lilioceris lili stercoraria (Linné, 1767) (S?, Si?)
Lilioceris merdigera (Linné, 1758) (N, S)
Lilioceris schneideri (Weise, 1900) (N, S, Si?)
Lilioceris tibialis (Villa, 1838) (N)

Crioceris O.F. Müller, 1764

Crioceris asparagi (Linné, 1758) (N, S, Sa?) (*)
Crioceris duodecimpunctata (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)
Crioceris macilenta Weise, 1880 (N, S, Si, Sa) (*)
Crioceris paracenthesis (Linné, 1767) (N, S, Si, Sa)
Crioceris quatuordecimpunctata (Scopoli, 1763) (N?)
Crioceris quinquepunctata (Scopoli, 1763) (N)

Lema Fabricius, 1798

Lema cyanella (Linné, 1758) (N, S, Sa)

Oulema Gozis, 1886

Oulema duftschmidi (Redtenbacher, 1874) (N, S, Si, Sa)
Oulema erichsoni (Suffrian, 1841) (N, S)
Oulema gallaeciana (Heyden, 1870) (N)
Oulema hoffmannseggii (Lacordaire, 1845) (N, S?)
Oulema magistrettiorum (Ruffo, 1964) (N, S) (E) (*)
Oulema melanopus (Linné, 1758) (N, S, Si?, Sa?)
Oulema rufocyanea (Suffrian, 1847) (N, S)
Oulema tristis (Herbst, 1786) (N, S)

***Timarcha (Timarcha)* Dejean, 1821**

Timarcha (Timarcha) apuana Daccordi & Ruffo, 1990 (S) (E) (*)
Timarcha (Timarcha) fracassii Meier, 1900 (S) (E) (*)
Timarcha (Timarcha) nicaeensis Villa, 1835 (N, S)
Timarcha (Timarcha) pimelioides Herrich-Schaeffer, 1838 (S, Si) (E)
Timarcha (Timarcha) pratensis Duftschmid, 1825 (N)
Timarcha (Timarcha) sardea Villa, 1835 (Sa) (*)
Timarcha (Timarcha) sicelidis Reiche, 1860 (Si) (E)
Timarcha (Timarcha) tenebricosa (Fabricius, 1775) (N, S)

***Timarcha (Metallotimarcha)* Motschulsky, 1860**

Timarcha (Metallotimarcha) gibba (Hagenbach, 1825) (N)
Timarcha (Metallotimarcha) metallica (Laicharting, 1781) (N, S)

***Entomoscelis* Chevrolat, 1843**

Entomoscelis adonidis (Pallas, 1771) (N)

***Gonioctena (Gonioctena)* Chevrolat, 1837**

Gonioctena (Gonioctena) decemnotata (Marsham, 1802) (N)
Gonioctena (Gonioctena) holdhausi (Leeder, 1950) (N) (*)
Gonioctena (Gonioctena) kaufmanni (Miller, 1881) (N) (*)
Gonioctena (Gonioctena) linneana (Schrank, 1781) (N) (*)
Gonioctena (Gonioctena) nivosa (Suffrian, 1851) (N)
Gonioctena (Gonioctena) viminalis (Linné, 1758) (N, S) (*)

***Gonioctena (Spartomena)* Reitter, 1912**

Gonioctena (Spartomena) fornicata (Brüggemann, 1873) (N, S) (*)

***Gonioctena (Spartophila)* Stephens, 1834**

Gonioctena (Spartophila) olivacea (Forster, 1771) (N, S)

***Gonioctena (Goniomena)* Motschulsky, 1860**

Gonioctena (Goniomena) intermedia Helliessen, 1911 (N)
Gonioctena (Goniomena) interposita (Franz & Palmen, 1950) (N)
Gonioctena (Goniomena) pallida (Linné, 1758) (N)
Gonioctena (Goniomena) quinquepunctata (Fabricius, 1787) (N, S)

***Gonioctena (Spartoxena)* Motschulsky, 1860**

Gonioctena (Spartoxena) gobanzi (Reitter, 1902) (N) (*)

***Machomena* Dubois, 1887**

Machomena lineata (Gené, 1839) (Sa) (*)

***Chrysolina (Stichoptera)* Motschulsky, 1860**

Chrysolina (Stichoptera) gypsophilae (Küster, 1845) (*)
 Chrysolina (Stichoptera) gypsophilae gypsophilae (Küster, 1845) (S)
 Chrysolina (Stichoptera) gypsophilae lucidicollis (Küster, 1845) (Si, Sa)
Chrysolina (Stichoptera) latecincta (Demaison, 1896) (*)
 Chrysolina (Stichoptera) latecincta graja (Franz, 1938) (N)
 Chrysolina (Stichoptera) latecincta norica (Holdhaus, 1914) (N)
 Chrysolina (Stichoptera) latecincta vallesiaca (Franz, 1949) (N)
Chrysolina (Stichoptera) rossia (Illiger, 1802) (N, S)
Chrysolina (Stichoptera) sanguinolenta (Linné, 1758) (N?, S?) (*)
Chrysolina (Stichoptera) stachydis (Gené, 1839) (Sa) (*)
Chrysolina (Stichoptera) variolosa (Petagna, 1819) (S?, Si) (E)

***Chrysolina (Bittotaenia)* Motschulsky, 1860**

Chrysolina (Bittotaenia) salviae (Germar, 1824) (N)

***Chrysolina (Fastuolina)* Warchalowski, 1991**

Chrysolina (Fastuolina) fastuosa (Scopoli, 1763) (*)
 Chrysolina (Fastuolina) fastuosa fastuosa (Scopoli, 1763) (N, S)
 Chrysolina (Fastuolina) fastuosa ventricosa (Suffrian, 1858) (S)

***Chrysolina (Synerga)* Weise, 1900**

Chrysolina (Synerga) coerulans (Scriba, 1791) (N)

***Chrysolina (Menthastriella)* Bechyné, 1950**

Chrysolina (Menthastriella) herbacea (Duftschmid, 1825) (N, S, Si, Sa)
Chrysolina (Menthastriella) suffriani (Fairmaire, 1859) (Sa) (*)
Chrysolina (Menthastriella) viridana (Küster, 1844)
 Chrysolina (Menthastriella) viridana chloris (Lucas, 1849) (S, Si)
 Chrysolina (Menthastriella) viridana viridana (Küster, 1844) (Sa)

***Chrysolina (Erythrochrysa)* Bechyné, 1950**

Chrysolina (Erythrochrysa) polita (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)

***Chrysolina (Euchrysolina)* Bechyné, 1950**

Chrysolina (Euchrysolina) graminis (Linné, 1758)
 Chrysolina (Euchrysolina) graminis santonici (Contarini, 1847) (N, S) (E)

***Chrysolina (Melasomoptera)* Bechyné, 1950**

- Chrysolina (Melasomoptera) grossa* (Fabricius, 1792) (N, S, Si, Sa)
- Chrysolina (Melasomoptera) lucida* (Olivier, 1807) (S?, Si?) (*)
- Chrysolina (Melasomoptera) lutea* (Petagna, 1810) (N, S, Si) (*)

***Chrysolina (Chrysomorpha)* Motschulsky, 1860**

- Chrysolina (Chrysomorpha) cerealis* (Linné, 1767)
- Chrysolina (Chrysomorpha) cerealis mixta* (Suffrian, 1851) (N, S)
- Chrysolina (Chrysomorpha) relucens* (Rosenhauer, 1847) (N) (*)

***Chrysolina (Maenadochrysa)* Bechyné, 1950**

- Chrysolina (Maenadochrysa) affinis* (Fabricius, 1787) (Si?) (*)
- Chrysolina (Maenadochrysa) femoralis* (Olivier, 1790) (N, S, Si)
- Chrysolina (Maenadochrysa) hyacinthina* (Suffrian, 1851) (E)
- Chrysolina (Maenadochrysa) hyacinthina hyacinthina* (Suffrian, 1851) (S)
- Chrysolina (Maenadochrysa) hyacinthina cribellata* (Suffrian, 1851) (Si)

***Chrysolina (Taeniochrysea)* Bechyné, 1950**

- Chrysolina (Taeniochrysea) americana* (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)

***Chrysolina (Centoptera)* Motschulsky, 1860**

- Chrysolina (Centoptera) bicolor* (Fabricius, 1775) (Si)

***Chrysolina (Ovostoma)* Motschulsky, 1860**

- Chrysolina (Ovostoma) olivieri* (Bedel, 1892) (*)
- Chrysolina (Ovostoma) olivieri veneta* (G. Müller, 1948) (N) (E)

***Chrysolina (Colaphosoma)* Motschulsky, 1860**

- Chrysolina (Colaphosoma) sturmi* (Westhoff, 1882) (N)

***Chrysolina (Colaphoptera)* Motschulsky, 1860**

- Chrysolina (Colaphoptera) crassicollis* (Suffrian, 1851) (N) (*)
- Chrysolina (Colaphoptera) crassimargo* (Germar, 1824) (N?) (*)
- Chrysolina (Colaphoptera) hemisphaerica* (Germar, 1817) (N) (*)
- Chrysolina (Colaphoptera) globosa* (Panzer, 1805) (N?) (*)
- Chrysolina (Colaphoptera) marcasitica* (Germar, 1824) (N?) (*)
- Chrysolina (Colaphoptera) purpurascens* (Germar, 1822) (N?) (*)
- Chrysolina (Colaphoptera) rufa* (Duftschmid, 1825) (N) (*)

***Chrysolina (Chrysolina)* Motschulsky, 1860**

Chrysolina (Chrysolina) bankii (Fabricius, 1775) (S, Si, Sa)

Chrysolina (Chrysolina) staphylaea (Linné, 1758) (N, S)

***Chrysolina (Craspeda)* Motschulsky, 1860**

Chrysolina (Craspeda) limbata (Fabricius, 1775) (*)

Chrysolina (Craspeda) limbata findeli (Suffrian, 1851) (N, S) (E)

Chrysolina (Craspeda) limbata luigionii (Depoli, 1936) (S) (E)

***Chrysolina (Palaeosticta)* Bechyné, 1952**

Chrysolina (Palaeosticta) diluta (Germar, 1824) (N?) (*)

***Chrysolina (Taeniosticha)* Motschulsky, 1860**

Chrysolina (Taeniosticha) reitteri (Weise, 1884) (*)

Chrysolina (Taeniosticha) reitteri fageli Bechyné, 1957 (S) (E)

Chrysolina (Taeniosticha) reitteri obscurefacta Bechyné, 1952 (N, S) (E)

***Chrysolina (Threnosoma)* Motschulsky, 1860**

Chrysolina (Threnosoma) cribrata (Ahrens, 1812) (*)

Chrysolina (Threnosoma) cribrata cribrata (Ahrens, 1812) (N)

Chrysolina (Threnosoma) cribrata sirentensis (Meier, 1900) (S) (E)

Chrysolina (Threnosoma) fimbrialis (Küster, 1845) (*)

Chrysolina (Threnosoma) fimbrialis fimbrialis (Küster, 1845) (N)

Chrysolina (Threnosoma) fimbrialis langobarda Daccordi & Ruffo, 1979 (N) (E)

Chrysolina (Threnosoma) inflata (Weise, 1916) (S?, Si) (E)

Chrysolina (Threnosoma) obscurella (Suffrian, 1851) (N)

Chrysolina (Threnosoma) osellai Daccordi & Ruffo, 1979 (S) (E) (*)

***Chrysolina (Bechynia)* Bourdonné, 1977**

Chrysolina (Bechynia) milleri (Weise, 1884) (N) (*)

***Chrysolina (Ovosoma)* Motschulsky, 1860**

Chrysolina (Ovosoma) vernalis (Brullé, 1836)

Chrysolina (Ovosoma) vernalis italica (Weise, 1882) (S, Si) (E)

***Chrysolina (Colaphodes)* Motschulsky, 1860**

Chrysolina (Colaphodes) haemoptera (Linné, 1758) (N, S, Si?, Sa)

***Chrysolina (Minckia)* Strand, 1935**

Chrysolina (Minckia) chalcites (Germar, 1824) (S)
Chrysolina (Minckia) oricalcia (O.F. Müller, 1776) (N, S, Si)
Chrysolina (Minckia) peregrina (Herrich-Schaeffer, 1839)
 Chrysolina (Minckia) peregrina erythromera (Lucas, 1849) (S, Si, Sa)
 Chrysolina (Minckia) peregrina peregrina (Herrich-Schaeffer, 1839) (N?)

***Chrysolina (Chalcoidea)* Motschulsky, 1860**

Chrysolina (Chalcoidea) analis (Linné, 1758) (N)
Chrysolina (Chalcoidea) carnifex (Fabricius, 1792)
 Chrysolina (Chalcoidea) carnifex melanaria (Suffrian, 1851) (N)
Chrysolina (Chalcoidea) interstincta (Suffrian, 1851) (S)
Chrysolina (Chalcoidea) marginata (Linné, 1758) (*)
 Chrysolina (Chalcoidea) marginata dierythra (Rottenberg, 1871) (Si) (E)
 Chrysolina (Chalcoidea) marginata glacialis (Weise, 1884) (N)
 Chrysolina (Chalcoidea) marginata marginata (Linné, 1758) (N)
 Chrysolina (Chalcoidea) marginata portai Bechyné, 1948 (N, S)

***Chrysolina (Allochrysolina)* Bechyné, 1950**

Chrysolina (Allochrysolina) fuliginosa (Olivier, 1807) (*)
 Chrysolina (Allochrysolina) fuliginosa microsticha Bechyné, 1949 (N) (E)
Chrysolina (Allochrysolina) lepida (Olivier, 1807) (N?) (*)

***Chrysolina (Anopachys)* Motschulsky, 1860**

Chrysolina (Anopachys) aurichalcea (Mannerheim, 1825)
 Chrysolina (Anopachys) aurichalcea asclepiadis (Villa, 1833) (N, S)
Chrysolina (Anopachys) schatzmayri (G. Müller, 1916) (N) (*)

***Chrysolina (Sphaeromela)* Bedel, 1899**

Chrysolina (Sphaeromela) varians (Schaller, 1783) (N, S) (*)

***Chrysolina (Hypericia)* Bedel, 1899**

Chrysolina (Hypericia) corcyrica (Suffrian, 1851) (S, Si?, Sa?)
Chrysolina (Hypericia) cuprina (Duftschmid, 1825) (N)
Chrysolina (Hypericia) didymata (Scriba, 1791) (N)
Chrysolina (Hypericia) geminata (Paykull, 1799) (N, S, Si)
Chrysolina (Hypericia) hyperici (Forster, 1771) (N, S, Si, Sa)
Chrysolina (Hypericia) quadrigemina (Suffrian, 1851) (N, S, Si, Sa)

***Oreina (Oreina)* Chevrolat, 1837**

Oreina (Oreina) alpestris (Schummel, 1844)
 Oreina (Oreina) alpestris marsicana (Luigioni, 1933) (S) (E)
 Oreina (Oreina) alpestris variabilis (Weise, 1883) (N)

Oreina (Oreina) bifrons (Fabricius, 1792) (*)
 Oreina (Oreina) bifrons bifrons (Fabricius, 1792) (N, S)
 Oreina (Oreina) bifrons cadorensis Bechyné, 1958 (N)
Oreina (Oreina) gloriosa (Fabricius, 1781) (N)
Oreina (Oreina) liturata (Scopoli, 1763) (*)
 Oreina (Oreina) liturata liturata (Scopoli, 1763) (N)
 Oreina (Oreina) liturata tomasii Daccordi & Ruffo, 1977 (N) (E)
Oreina (Oreina) speciosa (Linné, 1758) (N)
Oreina (Oreina) viridis (Duftschmid, 1825) (N, S)

***Oreina (Chrysochloa)* Hope, 1840**

Oreina (Chrysochloa) cacaliae (Schrank, 1785)
 Oreina (Chrysochloa) cacaliae barii (Schatzmayr, 1943) (S) (E)
 Oreina (Chrysochloa) cacaliae magistretti (Schatzmayr, 1941) (S) (E)
 Oreina (Chrysochloa) cacaliae senilis (K. Daniel, 1903) (N)
 Oreina (Chrysochloa) cacaliae tristis (Fabricius, 1792) (N)
Oreina (Chrysochloa) elegans (Aragona, 1830) (N) (E)
Oreina (Chrysochloa) elongata (Suffrian, 1851) (*)
 Oreina (Chrysochloa) elongata elongata (Suffrian, 1851) (N)
 Oreina (Chrysochloa) elongata occidentalis (Ruffo, 1946) (N)
 Oreina (Chrysochloa) elongata ruffoi (Franz, 1949) (N)
 Oreina (Chrysochloa) elongata siparii (Luigioni, 1930) (S) (E)
 Oreina (Chrysochloa) elongata zangherii Daccordi & Ruffo, 1986 (N) (E)
 Oreina (Chrysochloa) elongata zoiai Daccordi & Ruffo, 1986 (N) (E)
Oreina (Chrysochloa) speciosissima (Scopoli, 1763) (*)
 Oreina (Chrysochloa) speciosissima binaghii Daccordi & Ruffo, 1976 (N) (E)
 Oreina (Chrysochloa) speciosissima solarii Daccordi & Ruffo, 1976 (S) (E)
 Oreina (Chrysochloa) speciosissima speciosissima (Scopoli, 1763) (N)
 Oreina (Chrysochloa) speciosissima troglodytes (Kiesenwetter, 1861) (N)

***Oreina (Frigidorina)* Kühnelt, 1984**

Oreina (Frigidorina) frigida (Weise, 1883) (N)

***Oreina (Intricatorina)* Kühnelt, 1984**

Oreina (Intricatorina) intricata (Germar, 1824)
 Oreina (Intricatorina) intricata anderschi (Duftschmid, 1825) (N)

***Oreina (Virgulatorina)* Kühnelt, 1984**

Oreina (Virgulatorina) virgulata (Germar, 1824) (N, S)

***Oreina (Allorina)* Weise, 1902**

Oreina (Allorina) bidentata Bontems, 1981 (N, S)
Oreina (Allorina) canavesei Bontems, 1984 (N) (E) (*)

Oreina (Allorina) collucens (K.Daniel, 1903) (N)
Oreina (Allorina) luctuosa (Olivier, 1807) (N)

Oreina (Protorina) Weise, 1894

Oreina (Protorina) melancholica (Heer, 1845) (N)
Oreina (Protorina) peirolerii (Bassi, 1834) (N)
Oreina (Protorina) plagiata (Suffrian, 1861) (N)
Oreina (Protorina) plagiata pennina (Binaghi, 1938) (N)
Oreina (Protorina) sybilla (Binaghi, 1938) (S) (E) (*)

Leptinotarsa Chevrolat, 1837

Leptinotarsa decemlineata (Say, 1824) (N, S, Si) (*)

Gastrophysa Chevrolat, 1837

Gastrophysa polygoni (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)
Gastrophysa viridula (De Geer, 1775) (N)

Phaedon Dahl, 1823

Phaedon armoraciae (Linné, 1758) (N, S)
Phaedon cochleariae (Fabricius, 1792) (N, S)
Phaedon laevigatus (Duftschmid, 1825) (N, S)
Phaedon salicinus (Herr, 1845) (N) (*)

Neophaedon Jacobson, 1901

Neophaedon pyritosus (Rossi, 1792) (N, S)

Prasocuris Latreille, 1802

Prasocuris distincta (Lucas, 1849) (Si)
Prasocuris junci (Brahm, 1790) (N, S, Sa?)
Prasocuris phellandrii (Linné, 1758) (N, S)
Prasocuris vicina (Lucas, 1849) (S, Si, Sa)

Hydrothassa Thomson, 1866

Hydrothassa flavocincta (Brullé, 1832) (S) (*)
Hydrothassa glabra (Herbst, 1783) (N, S, Si)
Hydrothassa marginella (Linné, 1758) (N)
Hydrothassa suffriani (Küster, 1852) (Sa) (*)

Sclerophaedon Weise, 1892

Sclerophaedon orbicularis (Suffrian, 1851) (N, S)

***Phratora (Phratora)* Chevrolat, 1837**

Phratora (Phratora) laticollis (Suffrian, 1851) (N, S, Si)

Phratora (Phratora) tibialis (Suffrian, 1851)

Phratora (Phratora) tibialis cornelii (Weise, 1882) (N, S)

Phratora (Phratora) vitellinae (Linné, 1758) (N, S)

***Phratora (Chaeroceta)* Mroczkowski, 1990**

Phratora (Chaeroceta) vulgatissima (Linné, 1758) (N) (*)

***Chrysomela (Chrysomela)* Linné, 1758**

Chrysomela (Chrysomela) populi Linné, 1758 (N, S, Si, Sa)

Chrysomela (Chrysomela) saliceti Suffrian, 1849 (N, S)

Chrysomela (Chrysomela) tremulae Fabricius, 1787 (N, S)

***Chrysomela (Pachylina)* Medvedev & Cernov, 1969**

Chrysomela (Pachylina) collaris Linné, 1758 (*)

***Chrysomela (Strickerus)* Lucas, 1920**

Chrysomela (Strickerus) cuprea Fabricius, 1775 (N)

Chrysomela (Strickerus) lapponica Linné, 1758 (N)

Chrysomela (Strickerus) vigintipunctata (Scopoli, 1763) (N, S)

***Linaeidea* Motschulsky, 1860**

Linaeidea aenea (Linné, 1758) (N, S)

***Plagiodera* Chevrolat, 1837**

Plagiodera versicolora (Laicharting, 1781) (N, S, Si, Sa)

***Diorhabda* Weise, 1883**

Diorhabda elongata (Brullé, 1832) (N, S, Si)

***Galerucella (Galerucella)* Crotch, 1873**

Galerucella (Galerucella) grisea (Joannis, 1866) (N, Si?)

Galerucella (Galerucella) nymphaeae (Linné, 1758) (N, S, Sa?) (*)

Galerucella (Galerucella) sagittariae (Gyllenhal, 1813) (N)

***Galerucella (Neogalerucella)* Chûjô, 1962**

Galerucella (Neogalerucella) californiensis (Linné, 1767) (N, S, Si, Sa)
Galerucella (Neogalerucella) lineola (Fabricius, 1781) (*)
 Galerucella (Neogalerucella) lineola lineola (Fabricius, 1781) (N, S, Si, Sa)
 Galerucella (Neogalerucella) lineola solarii Burlini, 1942 (S) (E)
Galerucella (Neogalerucella) pusilla (Duftschmid, 1825) (N, S)
Galerucella (Neogalerucella) tenella (Linné, 1761) (N, S)

***Pyrrhalta* Joannis, 1866**

Pyrrhalta viburni (Paykull, 1799) (N, S)

***Xanthogaleruca* Laboissière, 1934**

Xanthogaleruca luteola (O.F. Müller, 1766) (N, S, Si, Sa)

***Lochmaea* Weise, 1883**

Lochmaea capreae (Linné, 1758) (N, S)
Lochmaea crataegi (Forster, 1771) (N, S, Si, Sa)
Lochmaea suturalis (Thomson, 1866) (N?) (*)

***Galeruca (Galeruca)* O.F. Müller, 1764**

Galeruca (Galeruca) abbreviata (Joannis, 1866) (N) (*)
Galeruca (Galeruca) angusta (Küster, 1849) (Si)
Galeruca (Galeruca) dahli (Joannis, 1866) (N)
Galeruca (Galeruca) interrupta (Illiger, 1802)
 Galeruca (Galeruca) interrupta interrupta (Illiger, 1802) (N, S)
 Galeruca (Galeruca) interrupta sicelidis Weise, 1886 (S, Si)
Galeruca (Galeruca) laticollis (Sahlberg, 1838) (N)
Galeruca (Galeruca) littoralis (Fabricius, 1787) (N, S)
Galeruca (Galeruca) nebrodensis Ragusa, 1887 (Si) (E)
Galeruca (Galeruca) pomonae (Scopoli, 1763) (N, S, Si, Sa)
Galeruca (Galeruca) reichei (Joannis, 1866) (S, Si) (*)
Galeruca (Galeruca) sardoa Gené, 1839 (Sa)
Galeruca (Galeruca) sicana (Reiche, 1860) (Si) (E)
Galeruca (Galeruca) tanaceti (Linné, 1758) (N, S, Si)

***Galeruca (Emarhopa)* Weise, 1866**

Galeruca (Emarhopa) rufa (Germar, 1824) (N, S, Si?, Sa?)

***Galeruca (Haptoscelis)* Weise, 1886**

Galeruca (Haptoscelis) melanocephala Ponza, 1805 (N)

***Arima* Chapuis, 1875**

Arima buai Havelka, 1959 (N) (E) (*)
Arima brachyptera (Küster, 1844) (S, Si) (E) (*)
Arima marginata (Fabricius, 1781) (E) (*)
 Arima marginata caprai Havelka, 1959 (N) (E)
 Arima marginata heyrovskyi Havelka, 1959 (N?)
 Arima marginata marginata (Fabricius, 1781) (N)
 Arima marginata obenbergeri Havelka, 1959 (N?)
Arima maritima Bua, 1953 (N) (*)
 Arima maritima brigaensis Havelka, 1959 (N?)
 Arima maritima fascensis Havelka, 1959 (N) (E)
 Arima maritima maritima Bua, 1953 (N)

Sermylassa Reitter, 1912

Sermylassa halensis (Linné, 1767) (N, S)

Agelastica Chevrolat, 1837

Agelastica alni (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)

Aulacophora Chevrolat, 1837

Aulacophora foveicollis (Lucas, 1949) (S, Si, Sa)

Asbecesta Harold, 1877

Asbecesta signata (Kirsch, 1866) (Si) (*)

Phyllobrotica Chevrolat, 1837

Phyllobrotica quadrimaculata (Linné, 1758) (N, S) (*)

Exosoma Jacoby, 1903

Exosoma lusitanicum (Linné, 1767) (N, S, Si, Sa)

Calomicrus Dillwin, 1829

Calomicrus circumfusus (Marsham, 1802) (N, S)
Calomicrus gularis Gradler, 1857 (N)
Calomicrus pinicola (Duftschmid, 1825) (N)
Calomicrus rottenbergi Ragusa, 1873 (Si) (E)
Calomicrus suturalis Joannis, 1866 (N) (*)

Leptomona Bechyné, 1958

Leptomona erythrocephala (Olivier, 1790) (N?, Si) (*)

***Luperus* O.F. Müller, 1764**

Luperus alpinus Desbrochers, 1898 (N, S) (*)
Luperus biraghii Ragusa, 1871 (S, Si) (E)
Luperus calabricus Laboissière, 1911 (S) (E) (*)
Luperus fiorii Weise, 1895 (S) (E) (*)
Luperus flavipes (Linné, 1767) (N, S)
Luperus leonardii Fogato, 1978 (N, S) (E)
Luperus longicornis (Fabricius, 1781)
 Luperus longicornis diniensis Bellier, 1870 (N, S)
 Luperus longicornis longicornis (Fabricius, 1781) (N)
Luperus luperus (Sulzer, 1776) (N?, S?, Si) (*)
Luperus nigripes Kiesenwetter, 1861 (N)
Luperus pygmaeus Joannis, 1866 (N, S, Si?)
Luperus ragusai Laboissière, 1919 (Si) (E)
Luperus revelierei Perris, 1864 (Sa) (*)
Luperus viridipennis Germar, 1824 (N, S) (*)
Luperus vitalei Ragusa, 1923 (Si) (E)
Luperus xanthopoda (Schrank, 1781) (N)

***Phyllotreta* Chevrolat, 1837**

Phyllotreta aerea Allard, 1859 (N, S, Si, Sa)
Phyllotreta armoraciae (Koch, 1803) (N)
Phyllotreta astrachanica Lopatin, 1977 (N, S, Si)
Phyllotreta atra (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa)
Phyllotreta balcanica Heikertinger, 1909 (N, S)
Phyllotreta christinae Heikertinger, 1941 (N) (*)
Phyllotreta consobrina (Curtis, 1837) (N, S, Si, Sa)
Phyllotreta corrugata Reiche, 1858 (N, S, Si)
Phyllotreta crassicornis Allard, 1866 (S?, Si) (*)
Phyllotreta cruciferae (Goeze, 1777) (N, S, Si, Sa)
Phyllotreta diademata Foudras, 1860 (N, S, Si?, Sa?)
Phyllotreta exclamationis (Thunberg, 1784) (N, S, Si)
Phyllotreta flexuosa (Illiger, 1794) (N)
Phyllotreta foudrasi Ch. Brisout, 1873 (N) (*)
Phyllotreta ganglbaueri Heikertinger, 1909 (N, S, Si)
Phyllotreta latevittata Kutschera, 1860 (S, Si) (*)
Phyllotreta nemorum (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)
Phyllotreta nigripes (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa)
Phyllotreta nitidicollis Weise, 1888 (S?, Si)
Phyllotreta nodicornis (Marsham, 1802) (N, S) (*)
Phyllotreta ochripes (Curtis, 1837) (N, S, Si)
Phyllotreta parallela (Boieldieu, 1859) (N, S, Si, Sa)
Phyllotreta procera (Redtenbacher, 1849) (N, S, Si, Sa)
Phyllotreta rufitarsis Allard, 1859 (Si)
Phyllotreta rugifrons Küster, 1849 (N, S, Si, Sa)
Phyllotreta striolata (Fabricius, 1803) (N, S)

Phyllotreta tetrastigma (Comolli, 1837) (N)
Phyllotreta undulata Kutschera, 1860 (N, S, Si, Sa)
Phyllotreta variipennis (Boieldieu, 1859) (N, S, Si, Sa)
Phyllotreta vilis Weise, 1888 (S)
Phyllotreta vittula (Redtenbacher, 1849) (N, S)

Aphthona Chevrolat, 1842

Aphthona abdominalis (Duftschmid, 1825) (N, S)
Aphthona aeneomicans Allard, 1875 (N?, S) (*)
Aphthona alcina Leonardi, 1975 (Sa) (*)
Aphthona atrovirens (Foerster, 1849) (N, S)
Aphthona bonvouloiri Allard, 1860 (N, S, Si)
Aphthona carbonaria Rosenhauer, 1856 (N, S, Si, Sa)
Aphthona coerulea (Geoffroy, 1785) (N, S, Si, Sa)
Aphthona cyanella (Redtenbacher, 1849) (N, S)
Aphthona cyparissiae (Koch, 1803) (N, S) (*)
Aphthona delicatula Foudras, 1860 (N)
Aphthona depressa Allard, 1859 (N, S?, Si?)
Aphthona erichsoni (Zetterstedt, 1838) (N?)
Aphthona euphorbiae (Schränk, 1781) (N, S, Si, Sa)
Aphthona flava Guillebaume, 1894 (N, S)
Aphthona flaviceps Allard, 1859 (N, S, Si, Sa)
Aphthona franzi Heikertinger, 1944 (S) (*)
Aphthona fuentei Reitter, 1901 (S) (*)
Aphthona herbigrada (Curtis, 1837) (N, S, Si, Sa)
Aphthona illigeri Bedel, 1898 (N, S, Sa)
Aphthona juliana Springer, 1953 (N) (*)
Aphthona lacertosa Rosenhauer, 1847 (N?)
Aphthona lutescens (Gyllenhal, 1808) (N, S, Sa)
Aphthona nigriceps (Redtenbacher, 1842) (N, S, Si, Sa)
Aphthona nigriscutis Foudras, 1860 (N) (*)
Aphthona ovata Foudras, 1860 (N, S, Si)
Aphthona pallida (Bach, 1856) (N, S?)
Aphthona perrisi Allard, 1869 (S, Sa) (*)
Aphthona placida Kutschera, 1864 (N)
Aphthona punctiventris Mulsant & Rey, 1874 (Si, Sa)
Aphthona pygmaea Kutschera, 1861 (N, S, Si, Sa)
Aphthona sardea Allard, 1866 (Sa) (E)
Aphthona semicyanea Allard, 1859 (N, S, Si)
Aphthona stussineri Weise, 1888 (N) (*)
Aphthona variolosa Foudras, 1860 (N, S, Si, Sa) (*)
Aphthona venustula Kutschera, 1861 (N, S, Si)
Aphthona violacea (Koch, 1803) (N, S, Sa)
Aphthona wagneri Heikertinger, 1909 (S) (*)

Longitarsus Latreille in Berthold, 1827

Longitarsus absynthii Kutschera, 1863 (N, S)
Longitarsus aeneicollis (Faldermann, 1837) (N, S, Si, Sa)
Longitarsus aeneus Kutschera, 1862 (N, S, Si, Sa)
Longitarsus aeruginosus (Foudras, 1860) (N, S, Si, Sa)
Longitarsus albineus (Foudras, 1860) (N, S, Si, Sa)
Longitarsus anchusae (Paykull, 1793) (N, S, Si, Sa?)
Longitarsus apicalis (Beck, 1817) (N)
Longitarsus atricillus (Linné, 1761) (N, S, Si)
Longitarsus australis (Mulsant & Rey, 1874) (N, Si) (*)
Longitarsus ballotae (Marsham, 1802) (N, S, Si, Sa)
Longitarsus bertii Leonardi, 1973 (N)
Longitarsus bonnairei (Allard, 1866) (Sa)
Longitarsus brisouti Heikertinger, 1912 (S, Si, Sa)
Longitarsus brunneus (Duftschmid, 1825) (N, S)
Longitarsus callidus Warchalowski, 1967 (N)
Longitarsus candidulus (Foudras, 1860) (S, Si, Sa)
Longitarsus celticus Leonardi, 1975 (N) (*)
Longitarsus codinai Madar & Madar, 1965 (N, S, Si, Sa)
Longitarsus corynthius (Reiche, 1858) (N, S, Si, Sa)
Longitarsus curtus (Allard, 1860) (N, S, Si)
Longitarsus dimidiatus (Allard, 1860) (N, S, Si)
Longitarsus dorsalis (Fabricius, 1781) (N, S)
Longitarsus echii (Koch, 1803) (N, S, Si, Sa)
Longitarsus exoletus (Linné, 1758) (N, S, Si)
Longitarsus ferrugineus (Foudras, 1860) (N, S, Sa)
Longitarsus foudrasi Weise, 1893 (N, S, Si)
Longitarsus frontosus Normand, 1947 (S) (*)
Longitarsus fulgens (Foudras, 1860) (N)
Longitarsus fuscoaeneus Redtenbacher, 1859 (N, Si?)
Longitarsus ganglbaueri Heikertinger, 1912 (N, S, Si)
Longitarsus gracilis Kutschera, 1864 (N, S, Si, Sa)
Longitarsus gruevi Leonardi & Mohr, 1974 (N) (*)
Longitarsus holsaticus (Linné, 1758) (N, S)
Longitarsus jacobaeae (Waterhouse, 1858) (N, S, Si, Sa)
Longitarsus juncicola (Foudras, 1860) (N, S, Si, Sa)
Longitarsus kutscherae Rye, 1872 (N, S, Sa?)
Longitarsus languidus Kutschera, 1863 (N) (*)
Longitarsus lateripunctatus Rosenhauer, 1856 (N, S, Si, Sa)
Longitarsus laureolae Biondi, 1988 (S, Si) (E) (*)
Longitarsus lewisii (Baly, 1874) (N, S)
Longitarsus linnaei (Duftschmid, 1825) (N, S, Si, Sa)
Longitarsus longipennis Kutschera, 1863 (N, S)
Longitarsus longiseta Weise, 1889 (N)
Longitarsus luridus (Scopoli, 1763) (N, S, Si, Sa)
Longitarsus lycopi (Foudras, 1860) (N, S, Si, Sa)
Longitarsus melanocephalus (De Geer, 1775) (N, S, Si, Sa)
Longitarsus membranaceus (Foudras, 1860) (N, S, Si)
Longitarsus minimus Kutschera, 1863 (N, S)

Longitarsus minusculus (Foudras, 1860) (N, S, Sa)
Longitarsus nanus (Foudras, 1860) (N, S, Si, Sa)
Longitarsus nasturtii (Fabricius, 1792) (N, S)
Longitarsus nebulosus (Allard, 1866) (Sa) (*)
Longitarsus nervosus Wollaston, 1854 (N, S, Si, Sa)
Longitarsus niger (Koch, 1803) (N, S, Si, Sa)
Longitarsus nigerrimus (Gyllenhal, 1827) (N) (*)
Longitarsus nigrocillus Motschulsky, 1849 (N, S?, Sa) (*)
Longitarsus nigrofasciatus (Goeze, 1777) (N, S, Si, Sa)
Longitarsus nimrodi Furth, 1979 (N) (*)
Longitarsus noricus Leonardi, 1976 (N)
Longitarsus obliteratoides Gruev, 1973 (N, S, Si)
Longitarsus obliteratus (Rosenhauer, 1847) (N, S)
Longitarsus ochroleucus (Marsham, 1802) (N, S, Si, Sa)
Longitarsus ordinatus (Foudras, 1860) (N, S)
Longitarsus pallidicornis Kutschera, 1863 (N) (*)
Longitarsus parvulus (Paykull, 1799) (N, S, Si, Sa)
Longitarsus pellucidus (Foudras, 1860) (N, S, Si, Sa)
Longitarsus pinguis (Weise, 1888) (N, S)
Longitarsus pratensis (Panzer, 1794) (N, S, Si, Sa)
Longitarsus quadriguttatus (Pontoppidan, 1765) (N)
Longitarsus rectelineatus (Foudras, 1860) (N, S, Sa)
Longitarsus refugiensis Leonardi & Mohr, 1974 (N) (E) (*)
Longitarsus reichei (Allard, 1860) (N, S)
Longitarsus rubellus (Foudras, 1860) (N)
Longitarsus rubiginosus (Foudras, 1860) (N, S, Sa)
Longitarsus rutilus (Illiger, 1807) (N, S)
Longitarsus salviae Gruev, 1975 (N, S)
Longitarsus scaphidioides Abeille, 1896 (Si)
Longitarsus scutellaris (Rey, 1874) (N, S)
Longitarsus springeri Leonardi, 1975 (S) (E) (*)
Longitarsus stragulatus (Foudras, 1860) (Si, Sa)
Longitarsus strigicollis Wollaston, 1864 (N, S, Si, Sa)
Longitarsus substriatus Kutschera, 1863 (N, S, Si)
Longitarsus succineus (Foudras, 1860) (N, S, Si, Sa)
Longitarsus suturatus (Foudras, 1860) (S, Sa)
Longitarsus suturellus (Duftschmid, 1825) (N, S, Si)
Longitarsus symphyti Heikertinger, 1912 (N)
Longitarsus tabidus (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa)
Longitarsus ventricosus (Foudras, 1860) (N?)
Longitarsus vilis Wollaston, 1864 (S, Si, Sa)
Longitarsus zangherii Warchalowski, 1968 (N, S) (E) (*)

Altica O.F. Müller, 1764

Altica aenescens (Weise, 1888) (N, S)
Altica ampelophaga Guérin-Meneville, 1858 (N, S, Si)
Altica brevicollis Foudras, 1860 (N, S)

Altica carduorum Guérin-Meneville, 1858 (N, S, Sa)
Altica carinthiaca (Weise, 1888) (N, S)
Altica ericeti (Allard, 1859) (N?)
Altica impressicollis Reiche, 1862 (N, S, Si, Sa)
Altica lythri Aubé, 1843 (N, S)
Altica oleracea (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)
Altica palustris (Weise, 1888) (N, S, Si, Sa)
Altica pusilla Duftschmid, 1825 (N, S)
Altica quercetorum Foudras, 1860 (N, S, Si, Sa)
Altica tamaricis (Schränk, 1785) (N, S, Si, Sa)

Hermaeophaga (Hermaeophaga) Foudras, 1860

Hermaeophaga (Hermaeophaga) cicatrix (Illiger, 1807) (N, S, Si)
Hermaeophaga (Hermaeophaga) mercurialis (Fabricius, 1792) (N, S)

Hermaeophaga (Orthocrepis) Weise, 1888

Hermaeophaga (Orthocrepis) ruficollis (Lucas, 1849) (N, S, Si, Sa) (*)

Batophila Foudras, 1860

Batophila aerata (Marsham, 1802) (N, S, Si, Sa)
Batophila rubi (Paykull, 1799) (N)

Arrhenocoela Foudras, 1860

Arrhenocoela lineata (Rossi, 1790) (N, S, Si, Sa) (*)

Lythraria Bedel, 1897

Lythraria salicariae (Paykull, 1800) (N, S)

Ochrosis Foudras, 1860

Ochrosis ventralis (Illiger, 1807) (N, S, Si, Sa)

Asiolestia Jacobson, 1925

Asiolestia adelinae (Binaghi, 1947) (N) (E) (*)
Asiolestia basalis (K. Daniel, 1900) (N) (*)
Asiolestia brevicollis (J. Daniel, 1904) (N, S)
Asiolestia corpulenta (Kutschera, 1860) (N, S)
Asiolestia crassicornis (Faldermann, 1837) (N)
Asiolestia cyanescens (Duftschmid, 1825) (*)
 Asiolestia cyanescens concolor (K. Daniel, 1900) (N)
 Asiolestia cyanescens cyanescens (Duftschmid, 1825) (N)
Asiolestia cyanipennis (Kutschera, 1860) (N)

Asiolestia femorata (Gyllenhal, 1813) (N)
Asiolestia ferruginea (Scopoli, 1763) (N, S, Si, Sa)
Asiolestia impressa (Fabricius, 1801) (N, S, Si, Sa)
Asiolestia ligurica (J. Daniel, 1904) (N) (*)
Asiolestia melanostoma (Redtenbacher, 1849) (N, S?)
Asiolestia nigrigula (Gyllenhal, 1813) (N) (*)
Asiolestia nobilis (J. Daniel, 1904) (N) (*)
Asiolestia norica (Weise, 1890) (N) (*)
Asiolestia peirolerii (Kutschera, 1860) (*)
 Asiolestia peirolerii melanothorax (Biondi, 1982) (S) (E)
 Asiolestia peirolerii peirolerii (Kutschera, 1860) (N)
Asiolestia rhaetica (Kutschera, 1860) (N)
Asiolestia transversa (Marsham, 1802) (N, S, Si, Sa)

Orestia Germar, 1845

Orestia alpina (Germar, 1824) (N, S) (*)
Orestia apennina Weise, 1886 (N, S) (E)
Orestia aubei Allard, 1859 (S?) (*)
Orestia calabra Heikertinger, 1909 (S) (E) (*)
Orestia carnica Leonardi, 1974 (N) (*)
Orestia carniolica Weise, 1886 (N) (*)
Orestia electra Gredler, 1868 (E) (*)
 Orestia electra brunnea (Halbherr, 1898) (N)
 Orestia electra electra Gredler, 1868 (N)
Orestia heikertingeri Leonardi, 1974 (N) (E) (*)
Orestia kraatzi Allard, 1861 (S) (E)
Orestia sierrana Heyden, 1882 (N?) (*)

Derocrepis Weise, 1886

Derocrepis rufipes (Linné, 1758) (N)
Derocrepis sodalis (Kutschera, 1860) (N, S)

Hippuriphila Foudras, 1860

Hippuriphila modeeri (Linné, 1761) (N, S, Sa?)

Crepidodera Chevrolat, 1837

Crepidodera aurata (Marsham, 1802) (N, S, Si, Sa)
Crepidodera aurea (Geoffroy, 1785) (N, S, Si)
Crepidodera fulvicornis (Fabricius, 1792) (N, S)
Crepidodera lamina (Bedel, 1901) (N)
Crepidodera nitidula (Linné, 1758) (N, S)
Crepidodera plutus (Latreille, 1804) (N, S, Sa)

Epitrix Foudras, 1860

Epitrix atropae Foudras, 1860 (N, S, Si)
Epitrix hirtipennis (Melsheimer, 1847) (N, S) (*)
Epitrix intermedia Foudras, 1860 (N)
Epitrix pubescens (Koch, 1803) (N, S, Sa)

Minota Kutschera, 1859

Minota alpina Biondi, 1986 (N) (E) (*)
Minota carpathica Heikertinger, 1911 (N)
Minota halmae (Apfelbeck, 1906) (N) (*)
Minota impuncticollis (Allard, 1860) (N)
Minota obesa (Waltl, 1839) (N)

Podagrica Chevrolat, 1837

Podagrica fuscicornis (Linné, 1766) (N, S, Si, Sa)
Podagrica fuscipes (Fabricius, 1775) (N, S)
Podagrica malvae (Illiger, 1807) (N, S, Si, Sa)
Podagrica menetriesi (Faldermann, 1837) (N, S, Si, Sa)

Mantura (Mantura) Stephens, 1831

Mantura (Mantura) chrysanthemi (Koch, 1803)
 Mantura (Mantura) chrysanthemi chrysanthemi (Koch, 1803) (N, S, Si)
 Mantura (Mantura) chrysanthemi diluta Abeille, 1895 (Sa)
Mantura (Mantura) lutea Allard, 1860 (N, S, Si, Sa) (*)
Mantura (Mantura) mathewsi (Stephens, 1832) (N, Si)
Mantura (Mantura) obtusata (Gyllenhal, 1813) (N, S, Si)
Mantura (Mantura) rustica (Linné, 1766) (N, S)

Mantura (Stenomantura) Heikertinger, 1909

Mantura (Stenomantura) cylindrica Miller, 1880 (N, S, Si)

Chaetocnema (Tlanoma) Motschulsky, 1845

Chaetocnema (Tlanoma) chlorophana (Duftschmid, 1825) (N, S, Si, Sa)
Chaetocnema (Tlanoma) concinna (Marsham, 1802) (N, S, Si, Sa?)
Chaetocnema (Tlanoma) conducta (Motschulsky, 1838) (N, S, Si, Sa)
Chaetocnema (Tlanoma) depressa (Boieldieu, 1859) (N, S)
Chaetocnema (Tlanoma) heikertingeri Ljubishev, 1963 (N, S)
Chaetocnema (Tlanoma) punctifrons Abeille, 1907 (S, Si) (*)
Chaetocnema (Tlanoma) scheffleri (Kutschera, 1864) (S, Si)
Chaetocnema (Tlanoma) semicoerulea (Koch, 1803) (N, S)
Chaetocnema (Tlanoma) tibialis (Illiger, 1807) (N, S, Si, Sa)

Chaetocnema (Chaetocnema) Stephens, 1813

Chaetocnema (*Chaetocnema*) *aerosa* (Letzner, 1846) (N, S, Sa?)
Chaetocnema (*Chaetocnema*) *angustula* (Rosenhauer, 1847) (N)
Chaetocnema (*Chaetocnema*) *arenacea* (Allard, 1860) (S) (*)
Chaetocnema (*Chaetocnema*) *arida* Foudras, 1860 (N, S, Si, Sa)
Chaetocnema (*Chaetocnema*) *aridula* (Gyllenhal, 1827) (N, S, Si, Sa)
Chaetocnema (*Chaetocnema*) *confusa* (Boheman, 1851) (N, S)
Chaetocnema (*Chaetocnema*) *hortensis* (Geoffroy, 1785) (N, S, Si, Sa)
Chaetocnema (*Chaetocnema*) *mannerheimi* (Gyllenhal, 1827) (N)
Chaetocnema (*Chaetocnema*) *montenegrina* Heikertinger, 1912 (S) (*)
Chaetocnema (*Chaetocnema*) *obesa* (Boieldieu, 1859) (N, S, Sa)
Chaetocnema (*Chaetocnema*) *procerula* (Rosenhauer, 1856) (N, S, Si, Sa)
Chaetocnema (*Chaetocnema*) *sahlbergi* (Gyllenhal, 1827) (N)
Chaetocnema (*Chaetocnema*) *subcoerulea* (Kutschera, 1864) (N, S)

Sphaeroderma Stephens, 1831

Sphaeroderma rubidum (Graells, 1858) (N, S, Si, Sa)
Sphaeroderma testaceum (Fabricius, 1775) (N, S, Si)

Argopus Fischer, 1824

Argopus ahrensi (Germar, 1817) (N, S)

Apteropeda Chevrolat in Stephens, 1839

Apteropeda globosa (Illiger, 1794) (N) (*)
Apteropeda orbiculata (Marsham, 1802) (N, S, Si)
Apteropeda splendida Allard, 1860 (N) (*)

Mniophila Stephens, 1831

Mniophila muscorum (Koch, 1803) (N, S)

Dibolia Latreille, 1829

Dibolia chevrolati Allard, 1861 (Si)
Dibolia cryptocephala (Koch, 1803) (N, S, Si)
Dibolia cynoglossi (Koch, 1803) (N, S)
Dibolia depressiuscula Letzner, 1846 (N, S)
Dibolia femoralis Redtenbacher, 1849 (N, S)
Dibolia foersteri Bach, 1859 (N, S) (*)
Dibolia maura Allard, 1860 (Si)
Dibolia occultans (Koch, 1803) (N, S, Si, Sa)
Dibolia rugulosa Redtenbacher, 1849 (N, S)
Dibolia schillingi Letzner, 1846 (N)
Dibolia timida (Illiger, 1807) (N, S, Si)
Dibolia tyrrhenica Mohr, 1981 (S, Si) (E) (*)

Psylliodes Latreille in Berthold, 1827

- Psylliodes aereus* Foudras, 1860 (N, S) (*)
Psylliodes affinis (Paykull, 1799) (N, S, Sa)
Psylliodes algiricus Allard, 1859 (S, Si, Sa)
Psylliodes attenuatus (Koch, 1803) (N, S)
Psylliodes brisouti Bedel, 1898 (N, S, Si) (*)
Psylliodes chalcomerus (Illiger, 1807) (N, S, Si)
Psylliodes chrysocephalus (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)
Psylliodes circumdatus Redtenbacher, 1842 (N, S, Si, Sa)
Psylliodes cucullatus (Illiger, 1807) (N, S?) (*)
Psylliodes cupreus (Koch, 1803) (N, S, Si, Sa)
Psylliodes danieli Weise, 1900 (N) (E) (*)
Psylliodes dulcamarae (Koch, 1803) (N, S)
Psylliodes feroniae Leonardi, 1978 (S) (E) (*)
Psylliodes fiorellae Leonardi, 1978 (N, S?) (E) (*)
Psylliodes fusiformis (Illiger, 1807) (N, S, Si, Sa)
Psylliodes gibbosus Allard, 1860 (N, S, Si, Sa)
Psylliodes glaber (Duftschmid, 1825) (N)
Psylliodes heikertingeri Jacobson, 1922 (Si)
Psylliodes hospes Wollaston, 1854 (Si, Sa)
Psylliodes hyoscyami (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)
Psylliodes inflatus Reiche, 1858 (Si, Sa)
Psylliodes instabilis Foudras, 1860 (N, S, Si)
Psylliodes isatidis Heikertinger, 1912 (S, Si)
Psylliodes kiesenwetteri Kutschera, 1864 (N, S)
Psylliodes laevifrons Kutschera, 1864 (N, S, Si, Sa)
Psylliodes laticollis Kutschera, 1864 (S, Si, Sa)
Psylliodes leonhardi Heikertinger, 1926 (Si) (E)
Psylliodes luteolus (O.F. Müller, 1776) (N, S, Si)
Psylliodes marcidus (Illiger, 1807) (N, S, Si, Sa)
Psylliodes maroccanus Heikertinger, 1916 (S, Sa) (*)
Psylliodes milleri Kutschera, 1864 (S, Si)
Psylliodes napi (Fabricius, 1792) (N, S, Si, Sa)
Psylliodes obscuraeneus Rosenhauer, 1856 (S, Si)
Psylliodes pallidipennis Rosenhauer, 1856 (S, Si, Sa)
Psylliodes picinus (Marsham, 1802) (N)
Psylliodes picipes Redtenbacher, 1849 (N)
Psylliodes puncticollis Rosenhauer, 1856 (N, S, Si, Sa)
Psylliodes pyritosus Kutschera, 1864 (N, S, Si, Sa)
Psylliodes rambouseki Heikertinger, 1909 (*)
Psylliodes rambouseki forojuliensis Heikertinger, 1926 (N)
Psylliodes ruffoi Leonardi, 1975 (S, Si) (E) (*)
Psylliodes schwarzi Weise, 1900 (N) (*)
Psylliodes solarii Leonardi, 1975 (N) (E) (*)
Psylliodes sophiae Koch, 1807 (N)
Psylliodes springeri Leonardi, 1975 (S) (E) (*)

Psylliodes thlaspi Foudras, 1860 (N, S)
Psylliodes toelgi Heikertinger, 1914 (N)
Psylliodes vindobonensis Heikertinger, 1914 (N, S) (*)
Psylliodes wachsmanni Csiki, 1903 (N) (*)

***Labidostomis (Labidostomis)* Germar, 1817**

Labidostomis (Labidostomis) axillaris (Lacordaire, 1848) (N) (*)
Labidostomis (Labidostomis) cyanicornis Germar, 1817 (N, S)
Labidostomis (Labidostomis) humeralis (Schneider, 1792) (N, S)
Labidostomis (Labidostomis) longimana (Linné, 1761) (N, S, Si?)
Labidostomis (Labidostomis) lucida (Germar, 1824) (N, S)
Labidostomis (Labidostomis) lusitanica (Germar, 1824) (N?, Sa?)
Labidostomis (Labidostomis) pallidipennis (Gebler, 1830) (N, S)
Labidostomis (Labidostomis) propinqua Faldermann, 1837 (N?) (*)
Labidostomis (Labidostomis) taxicornis (Fabricius, 1792) (N, S, Si, Sa)
Labidostomis (Labidostomis) tridentata (Linné, 1758) (N)

***Labidostomis (Chlorostola)* Weise, 1882**

Labidostomis (Chlorostola) centromaculata Gené, 1839 (Sa) (*)
Labidostomis (Chlorostola) guerini (Bassi, 1834) (S, Si)
Labidostomis (Chlorostola) hordei (Fabricius, 1787) (Si?) (*)

***Macrolenes* Chevrolat, 1837**

Macrolenes bellieri Reiche, 1860 (Si)
Macrolenes dentipes (Olivier, 1808) (N, S, Si)

***Tituboea* Lacordaire, 1848**

Tituboea biguttata (Olivier, 1791) (N, S, Si, Sa)
Tituboea macropus (Illiger, 1800) (N) (*)
Tituboea octopunctata (Fabricius, 1787) (Si) (*)
Tituboea sexmaculata (Fabricius, 1781) (N, Si, Sa) (*)

***Lachnaia* Chevrolat, 1837**

Lachnaia caprai (Grasso, 1958) (Si) (E)
Lachnaia cylindrica (Lacordaire, 1848) (S, Si)
Lachnaia hirta (Fabricius, 1801) (S, Si)
Lachnaia italica (Weise, 1882) (*)
 Lachnaia italica italica (Weise, 1882) (N, S, Si)
 Lachnaia italica occidentalis (Grasso, 1961) (Sa)
Lachnaia paradoxa (Olivier, 1808) (Si)
Lachnaia pubescens (Dufour, 1820) (N?, Sa) (*)
Lachnaia sexpunctata (Scopoli, 1763) (N, Si?)
Lachnaia straminipennis (Lucas, 1845) (Si?) (*)

Lachnaia tristigma (Lacordaire, 1848) (N, S, Si)
Lachnaia variolosa (Linné, 1767) (Si?) (*)
Lachnaia vicina (Lacordaire, 1848) (Si?) (*)

Clytra (Clytra) Laicharting, 1781

Clytra (Clytra) laeviuscula Ratzeburg, 1837 (N, S, Sa)
Clytra (Clytra) quadripunctata (Linné, 1758) (*)
Clytra (Clytra) quadripunctata appendicina Lacordaire, 1848 (N, S, Si)
Clytra (Clytra) quadripunctata latina G. Müller, 1953 (N, S) (E)
Clytra (Clytra) quadripunctata quadripunctata (Linné, 1758) (N, S)

Clytra (Clytraria) Semenov, 1903

Clytra (Clytraria) atraphaxidis (Pallas, 1773) (N?, S, Si) (*)
Clytra (Clytraria) novempunctata Olivier, 1808 (Si)

Smaragdina Chevrolat, 1837

Smaragdina affinis (Illiger, 1794) (N, S)
Smaragdina aurita (Linné, 1767) (N, S)
Smaragdina chloris (Lacordaire, 1848) (Si?) (*)
Smaragdina salicina (Scopoli, 1763) (N, S, Si)
Smaragdina concolor (Fabricius, 1793) (N, S, Si)
Smaragdina diversipes (Letzner, 1839) (N?) (*)
Smaragdina ferulae Gené, 1839 (Sa) (*)
Smaragdina flavicollis (Charpentier, 1825) (N)
Smaragdina xanthaspis (Germar, 1824) (N)

Chilotomina Reitter, 1912

Chilotomina nigritarsis (Lacordaire, 1848) (N?, Sa) (*)

Cheilotoma Chevrolat, 1837

Cheilotoma italica (Leoni, 1906) (N, S)
Cheilotoma musciformis (Goeze, 1777) (N, S)

Coptocephala Chevrolat, 1837

Coptocephala chalybaea (Germar, 1824) (N) (*)
Coptocephala cyanocephala (Lacordaire, 1848) (Sa) (E)
Coptocephala fossulata Lefevre, 1872 (S, Si) (*)
Coptocephala plagiocephala (Fabricius, 1792) (Si)
Coptocephala quadrimaculata (Linné, 1767) (N, S, Si) (*)
Coptocephala rubicunda (Laicharting, 1781) (N)
Coptocephala scopolina (Linné, 1767) (*)
Coptocephala scopolina kuesteri Kraatz, 1872 (N, S, Si)

Coptocephala scopolina scopolina (Linné, 1767) (N)
Coptocephala unicolor (Lucas, 1845) (S, Si) (*)
Coptocephala unifasciata (Scopoli, 1763) (N, S, Si)

***Stylosomus (Stylosomus)* Suffrian, 1848**

Stylosomus (Stylosomus) corsicus Rey, 1883 (Sa)
Stylosomus (Stylosomus) tamaricis Herrich-Schaeffer, 1838 (N, S, Si, Sa)

***Stylosomus (Microstylus)* Rey, 1883**

Stylosomus (Microstylus) ilicicola Suffrian, 1848 (N)
Stylosomus (Microstylus) lutetianus Deville, 1914 (N?) (*)
Stylosomus (Microstylus) minutissimus (Germar, 1823) (N, S, Si, Sa)

***Pachybrachis* Chevrolat, 1836**

Pachybrachis anoguttatus Suffrian, 1886 (Sa)
Pachybrachis burlinii Daccordi & Ruffo, 1971 (S) (E) (*)
Pachybrachis cinctus Suffrian, 1848 (Sa) (*)
Pachybrachis danieli Burlini, 1968 (*)
 Pachybrachis danieli assiettae Burlini, 1968 (N)
Pachybrachis exclusus Rey, 1883
 Pachybrachis exclusus etruscus Weise (N, S, Si, Sa)
Pachybrachis fimbriolatus Suffrian, 1848 (N, S)
Pachybrachis flexuosus Weise, 1882 (N, S, Si)
Pachybrachis fraudulentus G. Müller, 1955 (N)
Pachybrachis hieroglyphicus (Laicharting, 1781) (N, S, Si)
Pachybrachis hippophaes Suffrian, 1848 (N, S, Si, Sa?)
Pachybrachis karamani Weise, 1893 (N, S)
Pachybrachis limbatus Ménétriés, 1836 (N) (*)
Pachybrachis osellai Daccordi & Ruffo, 1975 (Si) (E) (*)
Pachybrachis picus Weise, 1882 (N, S)
Pachybrachis pradensis Marseul, 1875 (S) (*)
Pachybrachis ruffoi Burlini, 1956 (E) (*)
 Pachybrachis ruffoi ruffoi Burlini, 1956 (N, S, Si)
 Pachybrachis ruffoi sibillinus Burlini, 1959 (S)
Pachybrachis salffii Burlini, 1956 (N, S)
Pachybrachis scriptus Herrich-Schaeffer, 1838
 Pachybrachis scriptus hellwigi Weise, 1882 (Sa)
 Pachybrachis scriptus scriptus Herrich-Schaeffer, 1838 (N, S, Si)
Pachybrachis sinuatus Mulsant & Rey, 1859 (N)
Pachybrachis sculus Weise, 1891 (Si) (E)
Pachybrachis tessellatus (Olivier, 1791) (N, S, Si)
Pachybrachis testaceus Perris, 1865 (Si, Sa)

***Cryptocephalus (Disopus)* Stephens, 1839**

Cryptocephalus (Disopus) pini Linné, 1758 (N, S)
Cryptocephalus (Disopus) tardus Weise, 1888 (N) (*)

Cryptocephalus (Protophysus) Chevrolat, 1837

Cryptocephalus (Protophysus) cyanipes Suffrian, 1847 (N, S)
Cryptocephalus (Protophysus) schaefferi Schrank, 1789 (N?)
Cryptocephalus (Protophysus) villosulus Suffrian, 1847 (N) (*)

Cryptocephalus (Burlinius) Lopatin, 1965

Cryptocephalus (Burlinius) alboscuteatus Suffrian, 1853 (Si, Sa)
Cryptocephalus (Burlinius) alnicola Costa, 1884 (Sa) (*)
Cryptocephalus (Burlinius) bilineatus (Linné, 1767) (N, S)
Cryptocephalus (Burlinius) blanduloides Normand, 1947 (S, Sa) (*)
Cryptocephalus (Burlinius) blandulus Harold, 1872 (Si, Sa)
Cryptocephalus (Burlinius) capucinus Suffrian, 1853 (N?) (*)
Cryptocephalus (Burlinius) chrysopus Gmelin, 1788 (N, S)
Cryptocephalus (Burlinius) cognatus Costa, 1886 (Sa) (*)
Cryptocephalus (Burlinius) connexus Olivier, 1807 (N, S, Si)
Cryptocephalus (Burlinius) czwalinae Weise, 1882 (N, S)
Cryptocephalus (Burlinius) elegantulus Gravenhorst, 1807 (N, S)
Cryptocephalus (Burlinius) equiseti Costa, 1886 (Sa) (E)
Cryptocephalus (Burlinius) exiguus Schneider, 1792 (N)
Cryptocephalus (Burlinius) frontalis Marsham, 1802 (N, S?) (*)
Cryptocephalus (Burlinius) fulvus (Goeze, 1777) (N, S, Si, Sa)
Cryptocephalus (Burlinius) labiatus (Linné, 1761) (N, S, Si)
Cryptocephalus (Burlinius) lostianus Burlini, 1955 (Sa) (E)
Cryptocephalus (Burlinius) luridicollis Suffrian, 1868 (S, Si)
Cryptocephalus (Burlinius) macellus Suffrian, 1860 (N, S, Si, Sa)
Cryptocephalus (Burlinius) ocellatus Drapiez, 1819 (N, S, Si, Sa)
Cryptocephalus (Burlinius) ochroleucus Stephens, 1834 (N)
Cryptocephalus (Burlinius) planifrons Weise, 1882 (N)
Cryptocephalus (Burlinius) politus Suffrian, 1853 (S, Si, Sa)
Cryptocephalus (Burlinius) populi Suffrian, 1848 (N, S)
Cryptocephalus (Burlinius) punctiger Paykull, 1799 (N) (*)
Cryptocephalus (Burlinius) pusillus Fabricius, 1776 (N, S)
Cryptocephalus (Burlinius) pygmaeus Fabricius, 1792 (Si?)
Cryptocephalus (Burlinius) querceti Suffrian, 1848 (N, S, Si?)
Cryptocephalus (Burlinius) ragusanus Roubal, 1912 (S, Si)
Cryptocephalus (Burlinius) rufipes (Goeze, 1777) (N, S)
Cryptocephalus (Burlinius) saliceti Zebe, 1855 (N)
Cryptocephalus (Burlinius) scapularis Suffrian, 1848 (N, S)
Cryptocephalus (Burlinius) strigosus Germar, 1823 (N, S)
Cryptocephalus (Burlinius) vittula Suffrian, 1848 (N, S)

Cryptocephalus (Cryptocephalus) Geoffroy, 1762

Cryptocephalus (Cryptocephalus) albolineatus Suffrian, 1847 (N)
Cryptocephalus (Cryptocephalus) atrifrons Abeille, 1901 (N) (*)
Cryptocephalus (Cryptocephalus) aureolus Suffrian, 1847 (N, S)
Cryptocephalus (Cryptocephalus) barii Burlini, 1948 (N) (E) (*)
Cryptocephalus (Cryptocephalus) biguttatus (Scopoli, 1763) (N, S)
Cryptocephalus (Cryptocephalus) bimaculatus Fabricius, 1781 (N, S)
Cryptocephalus (Cryptocephalus) bipunctatus (Linné, 1758) (N, S)
Cryptocephalus (Cryptocephalus) celtibericus Suffrian, 1848 (Sa?) (*)
Cryptocephalus (Cryptocephalus) cicatricosus Lucas, 1845 (Si)
Cryptocephalus (Cryptocephalus) coerulescens Sahlberg, 1839 (N?)
Cryptocephalus (Cryptocephalus) cordiger (Linné, 1758) (N, S) (*)
Cryptocephalus (Cryptocephalus) crassus Olivier, 1791 (N)
Cryptocephalus (Cryptocephalus) curvilinea Olivier, 1808 (Si, Sa)
Cryptocephalus (Cryptocephalus) decemmaculatus (Linné, 1758) (N?)
Cryptocephalus (Cryptocephalus) flavipes Fabricius, 1781 (N, S, Si)
Cryptocephalus (Cryptocephalus) frenatus Laicharting, 1781 (N, S)
Cryptocephalus (Cryptocephalus) globicollis Suffrian, 1847 (N) (*)
Cryptocephalus (Cryptocephalus) gridellii Burlini, 1950 (N, Si)
Cryptocephalus (Cryptocephalus) grohmanni Suffrian, 1848 (S, Si) (E) (*)
Cryptocephalus (Cryptocephalus) hirticollis Suffrian, 1847 (Si) (E)
Cryptocephalus (Cryptocephalus) hypochoeridis (Linné, 1758) (N)
Cryptocephalus (Cryptocephalus) ilicis Olivier, 1808 (S, Si, Sa)
Cryptocephalus (Cryptocephalus) imperialis Laicharting, 1781 (N, S)
Cryptocephalus (Cryptocephalus) infirmior Kraatz, 1876 (N, S?) (*)
Cryptocephalus (Cryptocephalus) janthinus Germar, 1824 (N, S, Sa)
Cryptocephalus (Cryptocephalus) laetus Fabricius, 1792 (S?) (*)
Cryptocephalus (Cryptocephalus) leonhardi Breit, 1918 (S)
Cryptocephalus (Cryptocephalus) marginatus Fabricius, 1781 (N, S)
Cryptocephalus (Cryptocephalus) marginellus Olivier, 1791 (N, S)
Cryptocephalus (Cryptocephalus) mariae Rey, 1851 (N)
Cryptocephalus (Cryptocephalus) moraei (Linné, 1758) (N, S, Si)
Cryptocephalus (Cryptocephalus) nitidulus Fabricius, 1787 (N)
Cryptocephalus (Cryptocephalus) nitidus (Linné, 1758) (N, S)
Cryptocephalus (Cryptocephalus) octacosmus Bedel, 1891 (N, S)
Cryptocephalus (Cryptocephalus) octoguttatus Linné, 1767 (N?) (*)
Cryptocephalus (Cryptocephalus) octomaculatus Rossi, 1790 (N, S)
Cryptocephalus (Cryptocephalus) octopunctatus (Scopoli, 1763) (N, S) (*)
Cryptocephalus (Cryptocephalus) paganensis (Pic, 1914) (S) (E) (*)
Cryptocephalus (Cryptocephalus) parvulus O.F. Müller, 1776
 Cryptocephalus (Cryptocephalus) parvulus devillei G. Müller, 1948 (Sa)
 Cryptocephalus (Cryptocephalus) parvulus parvulus O.F. Müller, 1776 (N, S)
Cryptocephalus (Cryptocephalus) primarius Harold, 1872 (N, S)
Cryptocephalus (Cryptocephalus) quadriguttatus Richter, 1820 (N) (*)
Cryptocephalus (Cryptocephalus) quadripustulatus Gyllenhal, 1813 (N)
Cryptocephalus (Cryptocephalus) quinquepunctatus (Scopoli, 1763) (N)
Cryptocephalus (Cryptocephalus) rugicollis Olivier, 1791 (N, S, Si, Sa)
Cryptocephalus (Cryptocephalus) sericeus (Linné, 1758)
 Cryptocephalus (Cryptocephalus) sericeus intrusus Weise, 1882 (N)

Cryptocephalus (Cryptocephalus) sericeus zambanellus Marseul, 1875 (N, S)
Cryptocephalus (Cryptocephalus) sexmaculatus Olivier, 1791 (N) (*)
Cryptocephalus (Cryptocephalus) sexpunctatus (Linné, 1758) (N, S)
Cryptocephalus (Cryptocephalus) sexpustulatus Villers, 1789 (N)
Cryptocephalus (Cryptocephalus) signatifrons Suffrian, 1847 (N, S)
Cryptocephalus (Cryptocephalus) sulphureus Olivier, 1808 (S, Sa) (*)
Cryptocephalus (Cryptocephalus) tetraspilus Suffrian, 1851 (N, S) (*)
Cryptocephalus (Cryptocephalus) transiens Franz, 1949
Cryptocephalus (Cryptocephalus) transiens falzonii Burlini, 1956 (S) (E)
Cryptocephalus (Cryptocephalus) transiens rugulipennis Suffrian, 1853 (S) (E)
Cryptocephalus (Cryptocephalus) transiens therondi Franz, 1949 (S?)
Cryptocephalus (Cryptocephalus) transiens transiens Franz, 1949 (N)
Cryptocephalus (Cryptocephalus) trimaculatus Rossi, 1790 (N, S)
Cryptocephalus (Cryptocephalus) tristigma Charpentier, 1825 (Si?) (*)
Cryptocephalus (Cryptocephalus) turcicus Suffrian, 1847 (N, S, Si, Sa)
Cryptocephalus (Cryptocephalus) variegatus Fabricius, 1781 (N, S)
Cryptocephalus (Cryptocephalus) violaceus Laicharting, 1781 (N, S)
Cryptocephalus (Cryptocephalus) virens Suffrian, 1847 (N?) (*)
Cryptocephalus (Cryptocephalus) vittatus Fabricius, 1775 (N)

Cryptocephalus (Homalopus) Chevrolat, 1837

Cryptocephalus (Homalopus) carinthiacus Suffrian, 1848 (N, S) (*)
Cryptocephalus (Homalopus) coryli (Linné, 1758) (N, S)
Cryptocephalus (Homalopus) informis Suffrian, 1847 (N, S) (*)
Cryptocephalus (Homalopus) loreyi Solier, 1836 (N, S)
Cryptocephalus (Homalopus) quadripunctatus Olivier, 1808 (N) (*)
Cryptocephalus (Homalopus) stragula Rossi, 1794 (N, S)
Cryptocephalus (Homalopus) tricolor Rossi, 1792 (N, S)

Cryptocephalus (Lamellosus) Tomov, 1979

Cryptocephalus (Lamellosus) laevicollis Gebler, 1830 (N) (*)

Oomorplus Curtis, 1831

Oomorplus concolor (Sturm, 1807) (N, S)

Eumolpus Illiger, 1758

Eumolpus asclepiadeus (Pallas, 1776) (N, S)

Bromius Chevrolat, 1837

Bromius obscurus (Linné, 1758) (N, S)

Colaspidea Laporte, 1833

Colaspidea globosa (Küster, 1848) (S, Si)
Colaspidea metallica (Rossi, 1790) (S, Si, Sa)
 Colaspidea metallica juengeri Doguet, 1988 (Si)
Colaspidea oblonga Blanchard, 1855 (N, S, Si, Sa)

Pachnephorus Chevrolat, 1837

Pachnephorus bistriatus Mulsant, 1852 (S, Si, Sa)
Pachnephorus canus Weise, 1882 (N, S, Si, Sa)
Pachnephorus corinthius Fairmaire, 1861 (S, Si, Sa)
Pachnephorus cylindricus Lucas, 1849 (S, Si, Sa)
Pachnephorus laevicollis Fairmaire, 1861 (Si)
Pachnephorus pilosus (Rossi, 1790) (N, S, Si)
Pachnephorus tessellatus (Duftschmid, 1825) (N, S, Si, Sa)
Pachnephorus villosus (Duftschmid, 1825) (N, S, Si)

Lepthispa Baly, 1858

Lepthispa filiformis (Germar, 1842) (S, Si)

Hispa Linné, 1767

Hispa atra Linné, 1767 (N, S, Si, Sa)

Polyconia Weise, 1905

Polyconia caroli (Leprieur, 1883) (Si)

Dicladispa Gestro, 1897

Dicladispa testacea (Linné, 1767) (N, S, Si, Sa)

Oxylepis Desbrochers, 1884

Oxylepis deflexicollis (Boheman, 1862)
 Oxylepis deflexicollis deflexicollis (Boheman, 1862) (Sa)
 Oxylepis deflexicollis involuta (Fairmaire, 1880) (S, Si)

Cassida (Cassida) Linné, 1758

Cassida (Cassida) algerica Lucas, 1849 (N, S, Si, Sa)
Cassida (Cassida) alpina Brems, 1856 (N, S)
Cassida (Cassida) aurora Weise, 1907 (N)
Cassida (Cassida) deflorata Suffrian, 1844 (N, S, Si?, Sa)
Cassida (Cassida) denticollis Suffrian, 1844 (N, S)
Cassida (Cassida) ferruginea Goeze, 1777 (N, S, Si)
Cassida (Cassida) flaveola Thunberg, 1794 (N, S)
Cassida (Cassida) hexastigma Suffrian, 1844 (N, S, Sa) (*)

Cassida (Cassida) humeralis Kraatz, 1874 (Si)
Cassida (Cassida) inquinata Brullé, 1832 (N, S, Si, Sa)
Cassida (Cassida) nebulosa Linné, 1758 (N, S)
Cassida (Cassida) panzeri Weise, 1907 (N)
Cassida (Cassida) prasina Illiger, 1798 (N, S, Si?)
Cassida (Cassida) rubiginosa O.F. Müller, 1776 (N, S, Si, Sa?)
Cassida (Cassida) sanguinolenta O.F. Müller, 1776 (N, S, Si)
Cassida (Cassida) sanguinosa Suffrian, 1844 (N, S?) (*)
Cassida (Cassida) seladonia Gyllenhal, 1827 (N, S, Si, Sa) (*)
Cassida (Cassida) stigmatica Suffrian, 1844 (N)
Cassida (Cassida) vibex Linné, 1767 (N, S, Si?, Sa?)

***Cassida (Cassidulella)* Strand, 1928**

Cassida (Cassidulella) nobilis Linné, 1758 (N, S, Si?, Sa?)
Cassida (Cassidulella) pusilla Walldt, 1839 (N, S, Si, Sa)
Cassida (Cassidulella) vittata Villers, 1789 (N, S, Si, Sa)

***Cassida (Pseudocassida)* Desbrochers, 1891**

Cassida (Pseudocassida) murraea Linné, 1767 (N, S, Sa)

***Cassida (Mionycha)* Weise, 1891**

Cassida (Mionycha) azurea Fabricius, 1801 (N, S)
Cassida (Mionycha) margaritacea Schaller, 1783 (N, S, Si, Sa?)
Cassida (Mionycha) subreticulata Suffrian, 1844 (N, S, Si)

***Cassida (Lordiconia)* Reitter, 1926**

Cassida (Lordiconia) canaliculata Laicharting, 1781 (N)

***Cassida (Hypocassida)* Weise, 1893**

Cassida (Hypocassida) meridionalis Suffrian, 1844 (N, S)
Cassida (Hypocassida) subferruginea Schrank, 1776 (N, S, Si, Sa?)

***Cassida (Odontionycha)* Weise, 1891**

Cassida (Odontionycha) viridis Linné, 1758 (N, S, Si, Sa)

***Cassida (Mionychella)* Spaeth, 1952**

Cassida (Mionychella) hemisphaerica Herbst, 1799 (N, S, Si, Sa)

Note

Orsodacne cerasi: In S presente nell'Appennino Toscano.

Donacia (Donacia) crassipes: In S presente in Toscana.
Donacia (Donaciomima) aquatica: In S nota di Toscana e Molise.
Donacia (Donaciomima) bicolora: La ssp. *bicolora* in S in Toscana e Molise.
Donacia (Donaciomima) brevitarsis: In S solo in Toscana.
Donacia (Donaciomima) dentata: La ssp. *angustata* in S fino al Lazio.
Donacia (Donaciomima) semicuprea: In S citata da Porta (1934) per l'Umbria.
Donacia (Donaciomima) thalassina: In S citata da Porta (1934) per il Lazio.
Donacia (Donaciomima) versicolore: In S presente in Toscana e citata da Porta (1934) per il Lazio.
Macrolea appendiculata: Presenza dubbia in Trentino Alto Adige.
Crioceris asparagi: In S presente fino al Lazio, citazioni dubbie per Campania e Sardegna.
Crioceris macilenta: In N presente in Liguria.
Oulema magistrettiorum: In N presente in Liguria.
Timarcha (Timarcha) apuana: Presente nelle Alpi Apuane.
Timarcha (Timarcha) fracassii: Presente più di frequente in alta quota nell'Appennino abruzzese fino ai confini con il Lazio.
Timarcha (Timarcha) sardea: Specie endemica di Sardegna e Corsica.
Gonioctena (Gonioctena) holdhausi: Presente in stazioni di quota del Trentino Alto Adige.
Gonioctena (Gonioctena) kaufmanni: Presente in stazioni di quota delle Alpi orientali.
Gonioctena (Gonioctena) linneana: Presente nelle Alpi orientali.
Gonioctena (Gonioctena) viminalis: In S solo nel Lazio (Terminillo, Vallonina).
Gonioctena (Spartomena) fornicata: Specie introdotta di origine orientale.
Gonioctena (Spartoxena) gobanzi: Presente in alcune stazioni di quota soprattutto delle Alpi orientali.
Machomena lineata: Specie endemica di Sardegna e Corsica.
Chrysolina (Stichoptera) gypsophilae: La sottospecie tipica presente in alcune località appenniniche.
Chrysolina (Stichoptera) latecincta: La ssp. *norica* in Trentino Alto Adige; la ssp. *vallesiaca* nota su un solo esemplare di Piemonte (Val Formazza).
Chrysolina (Stichoptera) sanguinolenta: Quasi certamente estranea alla fauna italiana.
Chrysolina (Stichoptera) stachydis: Specie endemica di Sardegna e Corsica.
Chrysolina (Fastuolina) fastuosa: La ssp. *ventricosa* è di dubbio valore sistematico.
Chrysolina (Menthastriella) suffriani: Specie endemica di Sardegna e Corsica.
Chrysolina (Melasomoptera) lucida: Quasi certamente estranea alla fauna italiana.
Chrysolina (Melasomoptera) lutea: In N presente in Liguria orientale.
Chrysolina (Chrysomorpha) relucens: Presente sul Monte Spluga e in Val di Vizze (Brennero).
Chrysolina (Maenadochrysa) affinis: Quasi certamente estranea alla fauna italiana.
Chrysolina (Ovostoma) olivieri: La ssp. *veneta* in Friuli Venezia Giulia (Carnia) e Veneto orientale.
Chrysolina (Colaphoptera) crassicollis: Presente nelle Alpi e Prealpi Giulie. Rarissima, da definire sia lo status sistematico che la distribuzione.
Chrysolina (Colaphoptera) crassimargo: Presente nelle Alpi orientali. Da definire sia lo status sistematico che la distribuzione.
Chrysolina (Colaphoptera) hemisphaerica: Presente dalle Alpi orientali al Monte Antola con popolazioni isolate. Da definire sia lo status sistematico che la distribuzione.
Chrysolina (Colaphoptera) globosa: Segnalata per il Friuli Venezia Giulia. Da definire sia lo status sistematico che la distribuzione.
Chrysolina (Colaphoptera) marcasitica: Citata da Porta (1934) per il Piemonte e Friuli Venezia

Giulia. Da definire sia lo status sistematico che la distribuzione.

Chrysolina (Colaphoptera) purpurascens: Citata del Monte Canin (Carnia). Da definire sia lo status sistematico che la distribuzione.

Chrysolina (Colaphoptera) rufa: Citata per il Trentino Alto Adige, Alto Carso e Goriziano. Rara, da confermare.

Chrysolina (Craspeda) limbata: Le sspp. findeli e luigionii sono di dubbio valore sistematico.

Chrysolina (Palaeosticta) diluta: Presenza dubbia marginale sul confine orientale delle Alpi.

Chrysolina (Taeniosticha) reitteri: La ssp. fageli rappresenta probabilmente solo una forma alticola del Gran Sasso; la ssp. obscurefacta a quote elevate dai Monti Sibillini al Pollino.

Chrysolina (Threnosoma) cribrosa: La sottospecie tipica è elemento xerofilo, rarissimo sul Carso Triestino.

Chrysolina (Threnosoma) fimbrialis: La ssp. langobarda nelle Prealpi lombarde.

Chrysolina (Threnosoma) osellai: Presente nelle Alpi Apuane.

Chrysolina (Bechynia) milleri: Presente in alcune località del Friuli Venezia Giulia.

Chrysolina (Chalcoidea) marginata: La ssp. glacialis a quote elevate nelle Alpi occidentali; la ssp. portai razza di dubbio valore sistematico.

Chrysolina (Allochrysolina) fuliginosa: La ssp. microsticha nelle Alpi sud occidentali.

Chrysolina (Allochrysolina) lepida: Presenza dubbia marginale sulle Alpi Marittime.

Chrysolina (Anopachys) schatzmayri: Presente su terreni salsi della Laguna Veneta.

Chrysolina (Sphaeromela) varians: In S presente nell'Appennino tosco-emiliano.

Oreina (Oreina) bifrons: La ssp. cadorensis è di dubbio valore sistematico e con areale da definire.

Oreina (Oreina) liturata: La ssp. tomasii nelle Alpi Giudicarie.

Oreina (Chrysochloa) elongata: La ssp. zangherii nell'Appennino romagnolo (Foresta Campigna; Monte Falco); la ssp. zoiai nelle Alpi Apuane.

Oreina (Chrysochloa) speciosissima: La ssp. binaghii nelle Alpi Marittime; la ssp. solarii nell'Appennino pistoiense (Boscolungo).

Oreina (Allorina) canavesei: Presente sulle Alpi Graie (Gran Paradiso).

Oreina (Protorina) sybilla: Presente in alcune località di quota dell'Appennino centrale.

Leptinotarsa decemlineata: Specie introdotta di origine nearctica; dannosa a Solanaceae coltivate.

Phaedon salicinus: Presente nelle Alpi centrali ed occidentali.

Hydrothassa flavocincta: Presente in Italia meridionale; probabile elemento transadriatico/transionico.

Hydrothassa suffriani: Specie endemica di Sardegna e Corsica.

Phratora (Chaeroceta) vulgatissima: Nota soltanto di Sartirana (Como) e Cansiglio (Pian dell'Osteria).

Chrysomela (Pachylina) collaris: Presente nelle Alpi centrali e occidentali.

Galerucella (Galerucella) nymphaeae: In S presente in Toscana.

Galerucella (Neogalerucella) lineola: In Si probabilmente da attribuire alla ssp. solarii.

Lochmaea suturalis: Citata da Porta (1934) di Venezia Tridentina, Lombardia e Piemonte, da confermare.

Galeruca (Galeruca) abbreviata: In N presente in Piemonte e Alpi Marittime.

Galeruca (Galeruca) reichei: In S presente in Puglia.

Arima buai: In N presente in Liguria.

Arima brachyptera: In S presente in Campania.

Arima marginata: La ssp. marginata presente in Lombardia, Piemonte e Liguria; la ssp. caprai presente in Piemonte e forse in Lombardia e Liguria; la ssp. heyrovskyi citata genericamente

per l'Italia e probabilmente presente in N presso il confine occidentale; la ssp. *obenbergeri* segnalata dubitativamente per le Alpi Marittime.

Arima maritima: Le sspp. *maritima* e *fascensis* presenti in Liguria; la ssp. *brigaensis* presente dubitativamente nelle Alpi Marittime.

Asbecesta signata: Specie tradizionalmente attribuita a *Raphidopalpa* Chevrolat, 1837.

Phyllobrotica quadrimaculata: In S presente nel Lazio (Piana di Rieti).

Calomicrus suturalis: Citata per il Piemonte da Bertolini (1899), presenza dubbia.

Leptomona erythrocephala: Specie tradizionalmente attribuita a *Monolepta* Chevrolat, 1837.

Luperus alpinus: In N presente nelle Alpi Marittime, in S in Toscana e Calabria.

Luperus calabricus: Presente in Calabria e Puglia.

Luperus fiorii: Presente in Abruzzo.

Luperus luperus: Citato da Porta (1934) per diverse regioni del N, per l'Italia centrale e meridionale. Da confermare.

Luperus revelierei: Specie endemica di Sardegna e Corsica.

Luperus viridipennis: In S presente nell'Appennino Toscano.

Phyllotreta christinae: Presente in Trentino Alto Adige.

Phyllotreta crassicornis: In S presenza dubbia in Toscana.

Phyllotreta foudrasi: Presente in Liguria.

Phyllotreta latevittata: In S presente in Basilicata e Calabria.

Phyllotreta nodicornis: In S presente in Toscana.

Aphthona aeneomicans: In N probabile presenza in Liguria; in S presente in Abruzzo (Gran Sasso).

Aphthona alcina: Specie endemica di Sardegna e Corsica.

Aphthona cyparissiae: In S presente in Abruzzo (Gran Sasso).

Aphthona franzi: Presente in Abruzzo (Gran Sasso).

Aphthona fuentei: Presente in Toscana (Isola d'Elba) e Puglia.

Aphthona juliana: Presente sulle Alpi Giulie.

Aphthona nigriscutis: Presente in Friuli Venezia Giulia e Val d'Aosta.

Aphthona perrisi: In S presente in Toscana (Isola del Giglio).

Aphthona stussineri: Presente in Friuli Venezia Giulia.

Aphthona variolosa: In N presente in Liguria (Alpi Marittime); in S presente in Calabria.

Aphthona wagneri: Presente in Toscana (Arcipelago toscano).

Longitarsus australis: In N presente in Friuli Venezia Giulia.

Longitarsus celticus: Presente in Veneto (Altopiano di Asiago).

Longitarsus frontosus: Presente in Toscana (Monte Argentario e Isola del Giglio).

Longitarsus gruevi: Presente nelle Alpi sud occidentali.

Longitarsus languidus: Presente in Friuli Venezia Giulia.

Longitarsus laureolae: In S presente in Calabria (Aspromonte).

Longitarsus nebulosus: Specie endemica di Sardegna e Corsica.

Longitarsus nigerrimus: Presente in Trentino Alto Adige (Lago di Varna).

Longitarsus nigrocillus: In S dubitativamente citato per la Puglia.

Longitarsus nimrodi: Presente in Friuli Venezia Giulia e Liguria.

Longitarsus pallidicornis: Presente nelle Alpi orientali.

Longitarsus refugiensis: Presente nelle Alpi centrali e nord occidentali.

Longitarsus springeri: Presente nell'Appennino centrale.

Longitarsus zangherii: In N presente nell'Appennino emiliano.

Hermaeophaga (Orthocrepis) ruficollis: In N presente in Trentino Alto Adige; in S presente nel Lazio.

Arrhenocoela lineata: In N presente in Liguria.
Asiolestia adelinae: Presente nelle Alpi nord occidentali.
Asiolestia basalis: Presente nelle Alpi nord occidentali.
Asiolestia cyanescens: La sottospecie tipica presente nelle Alpi orientali; la ssp. concolor nelle Alpi sud occidentali.
Asiolestia ligurica: Presente nelle Alpi sud occidentali.
Asiolestia nigritula: Presente in Friuli Venezia Giulia e Veneto.
Asiolestia nobilis: Presente nelle Alpi occidentali.
Asiolestia norica: Presente nelle Alpi orientali.
Asiolestia peirolerii: La ssp. melanothorax presente in Abruzzo.
Orestia alpina: In N presente nelle Alpi orientali; in S presente in Toscana e Puglia.
Orestia aubei: Presenza dubbia in Calabria.
Orestia calabra: Presente in Calabria (Aspromonte).
Orestia carnica: Presente in Friuli Venezia Giulia e Veneto.
Orestia carniolica: Presenza dubbia in Friuli Venezia Giulia.
Orestia electra: La sottospecie tipica presente nelle Alpi centrali; la ssp. brunnea nelle Alpi orientali.
Orestia heikertingeri: Presente in Lombardia e Piemonte.
Orestia sierrana: Citata da Heikertinger (1948-1950) per le Alpi occidentali (Monte Viso).
Epitrix hirtipennis: Specie introdotta di origine nearctica; dannosa al Tabacco.
Minota alpina: Presente nelle Alpi centrali e nord occidentali.
Minota halmae: Presente in Friuli Venezia Giulia.
Mantura (Mantura) lutea: In N presente in Trentino Alto Adige.
Chaetocnema (Tlanoma) punctifrons: In S presente in Basilicata e Calabria.
Chaetocnema (Chaetocnema) arenacea: Presente in Basilicata e Calabria.
Chaetocnema (Chaetocnema) montenegrina: Presente in Calabria.
Apteropeda globosa: Presente nelle Alpi occidentali.
Apteropeda splendida: Presente nelle Alpi orientali.
Dibolia foersteri: In S presente nel Lazio (Monte Viglio).
Dibolia tyrrenica: In S presente in Toscana (Monte Argentario).
Psylliodes aereus: In S presente in Abruzzo e Campania.
Psylliodes brisouti: In N presente in Veneto.
Psylliodes cucullatus: Sicuramente presente in Trentino Alto Adige.
Psylliodes danieli: Presente nelle Alpi tridentine.
Psylliodes feroniae: Presente nel Lazio.
Psylliodes fiorellae: In N presente in Liguria; in S dubitativamente citata per la Toscana.
Psylliodes maroccanus: In S presente in Calabria.
Psylliodes rambouseki: Presente con la ssp. forojuliensis nelle Alpi orientali.
Psylliodes ruffoi: In S presente in Campania e Calabria.
Psylliodes schwarzi: Presente nelle Alpi occidentali.
Psylliodes solarii: Presente in Liguria (Monte Penna).
Psylliodes springeri: Presente nell'Appennino marchigiano ed abruzzese.
Psylliodes vindobonensis: In S presente in Abruzzo (Gran Sasso).
Psylliodes wachsmanni: Presente in Friuli Venezia Giulia.
Labidostomis (Labidostomis) axillaris: In N presente in Venezia Giulia.
Labidostomis (Labidostomis) propinqua: Presenza dubbia sul confine orientale.
Labidostomis (Chlorostola) centromaculata: Specie endemica di Sardegna e Corsica.
Labidostomis (Chlorostola) hordei: Segnalata di Sicilia da Vitale (1933), da confermare.

Tituboea macropus: In N presente in Veneto, Venezia Giulia e Trentino.
Tituboea octopunctata: Presenza dubbia da confermare.
Tituboea sexmaculata: In N presente in Liguria e Venezia Giulia.
Lachnaia italica: La ssp. *occidentalis* endemica di Sardegna e Corsica.
Lachnaia pubescens: In N presenza dubbia presso il confine occidentale.
Lachnaia straminipennis: Probabilmente estranea alla fauna italiana.
Lachnaia variolosa: Segnalata di Sicilia da Bertolini (1899), da confermare.
Lachnaia vicina: Segnalata di Sicilia da Vitale (1933), da confermare.
Clytra (Clytra) quadripunctata: Le sspp. *appendicina* e *latina* necessitano di revisione critica.
Clytra (Clytraria) atraphaxidis: In N presenza dubbia presso il confine occidentale.
Smaragdina chloris: Segnalata dubitativamente di Si da Bertolini (1899).
Smaragdina diversipes: Segnalata delle Alpi Marittime e del Piemonte da Porta (1934), da confermare.
Smaragdina ferulae: Specie endemica di Sardegna e Corsica.
Chilotomina nigratarsis: In N presenza dubbia presso il confine occidentale.
Coptocephala chalybaea: In N presente in Veneto e Venezia Giulia.
Coptocephala fossulata: In S presente in Toscana, Lazio e Calabria.
Coptocephala quadrimaculata: In N presente nelle Alpi Marittime e Liguria, in S in Toscana e Lazio.
Coptocephala scopolina: La ssp. *scopolina* marginalmente presso i confini occidentale e orientale.
Coptocephala unicolor: In S presente in Campania, Basilicata, Puglia e Calabria.
Stylosomus (Microstylus) lutetianus: Presenza dubbia nelle Alpi occidentali.
Pachybrachis burlinii: Presente in Lazio (Arcipelago pontino).
Pachybrachis cinctus: Specie endemica di Sardegna e Corsica.
Pachybrachis danieli: La ssp. *assiettae* nelle Alpi Cozie.
Pachybrachis limbatus: Burlini (1968) segnala per l'Italia un esemplare di piccole dimensioni di Liguria (Alassio).
Pachybrachis osellai: In Si presente solo nelle isole Egadi.
Pachybrachis pradensis: Presente in Umbria (Perugia).
Pachybrachis ruffoi: La sottospecie tipica in N in Emilia; la ssp. *sibillinus* sui Monti Sibillini.
Cryptocephalus (Disopus) tardus: Presente nelle Alpi nord occidentali.
Cryptocephalus (Protophysus) villosulus: Riportata per le Alpi Giudicarie da Luigioni (1929).
Cryptocephalus (Burlinius) alnicola: Specie endemica di Sardegna e Corsica.
Cryptocephalus (Burlinius) blanduloides: In S presente nel Lazio.
Cryptocephalus (Burlinius) capucinus: Riportato dubitativamente per l'Italia da Luigioni (1929).
Cryptocephalus (Burlinius) cognatus: Specie endemica di Sardegna e Corsica.
Cryptocephalus (Burlinius) frontalis: In S segnalato dubitativamente di Toscana da Burlini (1955-1956).
Cryptocephalus (Burlinius) punctiger: Presente in Trentino Alto Adige.
Cryptocephalus (Cryptocephalus) atrifrons: Presente in Piemonte (Colle di Tenda).
Cryptocephalus (Cryptocephalus) barii: Presente nelle Prealpi lombarde.
Cryptocephalus (Cryptocephalus) celtibericus: Segnalata dubitativamente per la Sardegna da Luigioni (1929).
Cryptocephalus (Cryptocephalus) cordiger: In S presente in Abruzzo (Gran Sasso).
Cryptocephalus (Cryptocephalus) globicollis: Presente nelle Alpi Marittime italiane.
Cryptocephalus (Cryptocephalus) grohmanni: In S presente in Calabria.
Cryptocephalus (Cryptocephalus) infirmior: In S riportata di Toscana da Porta (1934).

Cryptocephalus (Cryptocephalus) laetus: Riportata dubitativamente di Campania e Calabria da Luigioni (1929).
Cryptocephalus (Cryptocephalus) octoguttatus: Riportata di Liguria da Luigioni (1929).
Cryptocephalus (Cryptocephalus) octopunctatus: In S presente in Abruzzo (Pescasseroli).
Cryptocephalus (Cryptocephalus) paganensis: Presente in Abruzzo.
Cryptocephalus (Cryptocephalus) quadriguttatus: Presente in Friuli Venezia Giulia (Carnia).
Cryptocephalus (Cryptocephalus) sexmaculatus: In N presente in Liguria (Finale Ligure).
Cryptocephalus (Cryptocephalus) sulphureus: In S presente in Toscana (Siena).
Cryptocephalus (Cryptocephalus) tetraspilus: In S presente in Abruzzo (Gran Sasso).
Cryptocephalus (Cryptocephalus) tristigma: Segnalata dubitativamente di Sicilia da Burlini (1955-1956).
Cryptocephalus (Cryptocephalus) virens: Riportata dubitativamente di Piemonte e Venezia Tridentina da Luigioni (1929).
Cryptocephalus (Homalopus) carinthiacus: In S presente sino in Abruzzo (Gran Sasso).
Cryptocephalus (Homalopus) informis: In S presente sino in Abruzzo (Gran Sasso).
Cryptocephalus (Homalopus) quadripunctatus: Presente nelle Alpi sud occidentali.
Cryptocephalus (Lamellosus) laevicollis: Riportata per la Venezia Tridentina da Luigioni (1929) e Porta (1934).
Cassida (Cassida) hexastigma: In N presente in Liguria; in S presente in Toscana, Umbria, Puglia e Basilicata.
Cassida (Cassida) sanguinosa: In S presenza da confermare.
Cassida (Cassida) seladonia: In N presente in Piemonte e Repubblica di San Marino; in S presente in Toscana e Calabria.

Ciidae

Octotemnus Mellié, 1847

Octotemnus glabriculus (Gyllenhal, 1827) (N, S, Si, Sa)
Octotemnus mandibularis (Gyllenhal, 1813) (N)

Xylographus Mellié, 1847

Xylographus bostrychoides (Dufour, 1843) (N, S, Si, Sa)

Rhopalodontus Mellié, 1847

Rhopalodontus baudueri (Abeille de Perrin, 1874) (S?) (*)
Rhopalodontus novorossicus Reitter, 1902 (S)
Rhopalodontus perforatus (Gyllenhal, 1813) (N, S, Si, Sa)
Rhopalodontus populi Brisout, 1877 (S, Sa)

Sulcacis (Sulcacis) Dury, 1917

Sulcacis (Sulcacis) affinis (Gyllenhal, 1827) (S)

Sulcacis (Entypocis) Lohse, 1964

Sulcacis (Entypocis) bicornis (Mellié, 1848) (N, S, Sa)
Sulcacis (Entypocis) bidentulus (Rosenhauer, 1847) (N, S, Si)
Sulcacis (Entypocis) fronticornis (Panzer, 1809) (N, S, Sa)

Cis (Cis) Latreille, 1796

Cis (Cis) bidentatus (Olivier, 1790) (N, S, Si)
Cis (Cis) boleti (Scopoli, 1763) (N, S, Si, Sa)
Cis (Cis) castaneus Mellié, 1848 (N, S, Si, Sa)
Cis (Cis) comptus Gyllenhal, 1827 (N, S, Si)
Cis (Cis) dentatus Mellié, 1848 (N, S)
Cis (Cis) fissicollis Mellié, 1848 (N, S)
Cis (Cis) fissicornis Mellié, 1848 (N, S)
Cis (Cis) glabratus Mellié, 1848 (N, S)
Cis (Cis) hispidus (Paykull, 1798) (N, S, Si, Sa)
Cis (Cis) jacquemarti Mellié, 1848 (N, Si)
Cis (Cis) laminatus Mellié, 1848 (N, S)
Cis (Cis) lineatocribratus Mellié, 1848 (N, S)
Cis (Cis) micans (Fabricius, 1792) (N, S, Si)
Cis (Cis) multidentatus (Pic, 1920) (N)
Cis (Cis) nitidus (Fabricius, 1792) (N, S, Si, Sa)
Cis (Cis) perrisi Abeille de Perrin, 1874 (N)
Cis (Cis) punctifer Mellié, 1848 (S, Si)
Cis (Cis) punctulatus Gyllenhal, 1827 (N, S)
Cis (Cis) quadridens Mellié, 1848 (N, S)
Cis (Cis) quadridentulus Perris, 1874 (S, Sa)
Cis (Cis) rugulosus Mellié, 1848 (N, S)
Cis (Cis) sericeus Mellié, 1848 (Si)
Cis (Cis) setiger Mellié, 1848 (N, S, Si, Sa)
Cis (Cis) striatulus Mellié, 1848 (N, S, Si, Sa)

Cis (Orthocis) Casey, 1898

Cis (Orthocis) alni Gyllenhal, 1813 (N, S, Sa)
Cis (Orthocis) coluber Abeille de Perrin, 1874 (S, Si, Sa)
Cis (Orthocis) festivus (Panzer, 1793) (N, S)
Cis (Orthocis) lucasi Abeille de Perrin, 1874 (N)
Cis (Orthocis) oblongus Mellié, 1848 (N, S, Sa)
Cis (Orthocis) pygmaeus (Marsham, 1802) (S)
Cis (Orthocis) vestitus Mellié, 1848 (N, S)

Ennearthron Mellié, 1847

Ennearthron cornutum (Gyllenhal, 1827) (N, S)
Ennearthron filum Abeille de Perrin, 1874 (Si)
Ennearthron fronticorne (Redtenbacher, 1847) (S)
Ennearthron pruinolum (Perris, 1864) (N)

Hadreule Thomson, 1859

Hadreule elongatula (Gyllenhal, 1827) (N)

Diphyllocis Reitter, 1885

Diphyllocis opaculus (Reitter, 1878) (N, Si, Sa)

Note

Rhopalodontus baudueri: Presenza dubbia.

Clambidae

Calyptomerus Redtenbacher, 1849

Calyptomerus alpestris Redtenbacher, 1849 (N)

Calyptomerus dubius (Marsham, 1802) (N, S, Si, Sa)

Clambus Fischer von Waldheim, 1820

Clambus armadillo (De Geer, 1774) (N)

Clambus caucanus Endrödy-Younga, 1960 (S)

Clambus dux Endrödy-Younga, 1960 (N, S)

Clambus evae Endrödy-Younga, 1960 (N, S)

Clambus hayekae Endrödy-Younga, 1960 (S, Sa)

Clambus minutus (Sturm, 1807)

Clambus minutus complicans Wollaston, 1864 (S, Si, Sa)

Clambus minutus minutus (Sturm, 1807) (S, Sa)

Clambus nigrellus Reitter, 1914 (N)

Clambus nigriclavis Stephens, 1853 (N)

Clambus pallidulus Reitter, 1911 (S, Si, Sa)

Clambus pilosellus Reitter, 1876 (N)

Clambus pubescens Redtenbacher, 1849 (N, S)

Clambus punctulum (Beck, 1817) (N, S)

Loricaster Mulsant & Rey, 1861

Loricaster testaceus Mulsant, 1861

Loricaster testaceus pumilus Reitter, 1884 (S, Sa)

Loricaster testaceus testaceus Mulsant, 1861 (N, S, Si, Sa)

Cleridae

Denops Fischer von Waldheim, 1829

Denops albofasciatus (Charpentier, 1825) (N, S, Si, Sa)

Tillus Olivier, 1790

Tillus elongatus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)

Tillus pallidipennis Bielz, 1850 (N?, S) (*)

Tillus espinosai Winkler, 1985 (Si) (E) (*)

Tilloidea Laporte de Castelnau, 1832

Tilloidea transversalis (Charpentier, 1825) (S, Si, Sa)

Tilloidea unifasciata (Fabricius, 1787) (N, S, Si, Sa)

Opilo Latreille, 1802

Opilo domesticus (Sturm, 1837) (N, S, Sa)

Opilo mollis (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Opilo pallidus (Olivier, 1795) (N, S)

Opilo taeniatus Klug, 1842 (S?)

Allonyx Jacquelin Du Val, 1860

Allonyx quadrimaculatus (Schaller, 1783) (N)

Thanasimus Latreille, 1806

Thanasimus femoralis (Zetterstedt, 1828) (N)

Thanasimus formicarius (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Thaneroclerus Lefèbvre, 1838

Thaneroclerus buquet (Lefèbvre, 1835) (N, S) (*)

Clerus Geoffroy, 1762

Clerus mutillarius Fabricius, 1775 (N, S, Si, Sa)

Trichodes Herbst, 1792

Trichodes alvearius (Fabricius, 1792) (N, S, Si, Sa)

Trichodes ammios Fahreus, 1787 (Si, Sa)

Trichodes apiarius (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Trichodes crabroniformis (Fabricius, 1787) (Si) (*)

Trichodes favarius (Illiger, 1802) (N, S?) (*)

Trichodes flavocinctus Spinola, 1844 (Si?) (*)

Trichodes leucopsideus Olivier, 1795 (N, S, Si)

Trichodes octopunctatus (Fabricius, 1787) (Si)

Trichodes umbellatarum (Olivier, 1795) (Si) (*)

Tarsostenus Spinola, 1844

Tarsostenus univittatus (Rossi, 1792) (N, S, Si, Sa)

Enoplium Latreille, 1802

Enoplium doderoi Luigioni, 1926 (S, Sa) (E)

Enoplium serraticorne (Olivier, 1790) (N, S, Si, Sa)

Aporthopleura Barr, 1977

Aporthopleura sanguinicollis (Fabricius, 1787) (N, S, Sa)

Opetiopalpus Spinola, 1844

Opetiopalpus bicolor Laporte de Castelnau, 1836 (S?, Si?) (*)

Opetiopalpus scutellaris (Panzer, 1797) (N, S, Si)

Necrobia Olivier, 1795

Necrobia konowi Hoffmann, 1887 (N) (*)

Necrobia ruficollis (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa)

Necrobia rufipes (De Geer, 1775) (N, S, Si, Sa)

Necrobia violacea (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Korynetes Herbst, 1792

Korynetes caeruleus (De Geer, 1775) (N, S, Si, Sa)

Korynetes pusillus Klug, 1842 (N, S, Si, Sa)

Note

Tillus pallidipennis: Presenza dubbia in Alto Adige; citata in S di Toscana.

Tillus espinosai: Descritto come sottospecie di *T. pallidipennis*, ma forse da elevare al rango specifico.

Thaneroclerus buquet: Specie subcosmopolita sovente introdotta in magazzini e aree portuali.

Trichodes crabroniformis: Presenza accertata in Si, ma senza precise indicazioni di località.

Trichodes favarius: In S solo una citazione molto dubbia per la Toscana.

Trichodes flavocinctus: Presenza dubbia.

Trichodes umbellatarum: Presenza da confermare; possibile presenza anche in N in Liguria occidentale.

Aporthopleura: La disponibilità nomenclatoriale del nome di rango generico *Dermestoides* J.C. Schaeffer, 1771, sinonimo seniore oggettivo di *Aporthopleura* Barr, 1977, è discutibile; si preferisce perciò in questa sede utilizzare il nome certamente valido di *Aporthopleura*.

Opetiopalpus bicolor: Specie iberica, con una antica citazione per incerta località italiana.

Necrobia konowi: In N solo presso Trieste.

Coccinellidae

Pharoscymnus Bedel, 1906

Pharoscymnus setulosus (Chevrolat, 1861) (Si?) (*)

Coelopterus Mulsant, 1852

Coelopterus salinus Mulsant, 1852 (Sa)

Stethorus Weise, 1885

Stethorus gilvifrons (Mulsant, 1850) (S, Si, Sa)

Stethorus punctillum Weise, 1891 (N, S, Si, Sa)

Scymnus (Mimopullus) Fürsch, 1987

Scymnus (Mimopullus) flagellisiphonatus (Fürsch, 1969) (N, S)

Scymnus (Mimopullus) fulvicollis Mulsant, 1846 (N) (*)

Scymnus (Mimopullus) mediterraneus lablokoff-Khnzorian, 1972 (N, S, Si, Sa)

Scymnus (Mimopullus) sacium Roubal, 1927 (S) (*)

Scymnus (Neopullus) Sasaji, 1971

Scymnus (Neopullus) ater Kugelann, 1794 (N, S, Si, Sa)

Scymnus (Neopullus) haemorrhoidalis (Herbst, 1797) (N, S)

Scymnus (Neopullus) limbatus (Stephens, 1831)

Scymnus (Neopullus) limbatus limbatus (Stephens, 1831) (N, S)

Scymnus (Pullus) Mulsant, 1846

Scymnus (Pullus) araraticus lablokoff-Khnzorian, 1969 (S, Si, Sa)

Scymnus (Pullus) auritus (Thunberg, 1795) (N, S, Si, Sa)

Scymnus (Pullus) fraxini Mulsant, 1850 (N, S, Si)

Scymnus (Pullus) impexus Mulsant, 1850 (N)

Scymnus (Pullus) subvillosus (Goeze, 1777) (N, S, Si, Sa)

Scymnus (Pullus) suturalis (Thunberg, 1795) (N, S, Si, Sa)

Scymnus (Scymnus) Kugelann, 1794

Scymnus (Scymnus) abietis (Paykull, 1798) (N, S)

Scymnus (Scymnus) apetzi Mulsant, 1846 (N, S, Si, Sa)

Scymnus (Scymnus) bivulnerus Capra & Fürsch, 1967 (S, Si, Sa)

Scymnus (Scymnus) caprai Canepari, 1983 (Si) (*)

Scymnus (Scymnus) damryi Weise, 1879 (Sa)

Scymnus (Scymnus) doriai Capra, 1924 (N, S)

Scymnus (Scymnus) femoralis (Gyllenhal, 1827) (N, S)
Scymnus (Scymnus) frontalis (Fabricius, 1787) (N, S)
Scymnus (Scymnus) inderihensis Mulsant, 1850 (S)
Scymnus (Scymnus) interruptus (Goeze, 1777) (N, S, Si, Sa)
Scymnus (Scymnus) laetificus Weise, 1879 (Si, Sa)
Scymnus (Scymnus) levaillanti Mulsant, 1850 (S, Si, Sa)
Scymnus (Scymnus) marginalis (Rossi, 1794) (N, S, Si, Sa)
Scymnus (Scymnus) mimulus Capra & Fürsch, 1967
 Scymnus (Scymnus) mimulus mimulus Capra & Fürsch, 1967 (N)
Scymnus (Scymnus) nigrinus Kugelann, 1794 (N) (*)
Scymnus (Scymnus) pallipediformis Günther, 1958
 Scymnus (Scymnus) pallipediformis apetzoides Capra & Fürsch, 1967 (N, S)
Scymnus (Scymnus) pavesii Canepari, 1983 (Si) (*)
Scymnus (Scymnus) quadriguttatus Capra, 1924 (S) (*)
Scymnus (Scymnus) rubromaculatus (Goeze, 1778) (N, S, Si, Sa)
Scymnus (Scymnus) rufipes (Fabricius, 1798)
 Scymnus (Scymnus) rufipes rufipes (Fabricius, 1798) (N, S, Si, Sa)

***Nephus (Bipunctatus)* Fürsch, 1987**

Nephus (Bipunctatus) bipunctatus (Kugelann, 1794) (N, S, Si)
Nephus (Bipunctatus) bisignatus (Bohemann, 1850)
 Nephus (Bipunctatus) bisignatus bisignatus (Bohemann, 1850) (N, S, Si, Sa)
Nephus (Bipunctatus) includens (Kirsch, 1870) (S, Si)
Nephus (Bipunctatus) kiesenwetteri Mulsant, 1850 (S, Si, Sa)
Nephus (Bipunctatus) nigricans Weise, 1879
 Nephus (Bipunctatus) nigricans nigricans Weise, 1879 (S, Si, Sa)

***Nephus (Diomus)* Mulsant 1850**

Nephus (Diomus) rubidus (Motschulsky, 1835) (S, Si)

***Nephus (Nephus)* Mulsant, 1846**

Nephus (Nephus) ludyi Weise, 1897 (S, Si)
Nephus (Nephus) quadrimaculatus (Herbst, 1783) (N, S)
Nephus (Nephus) redtenbacheri Mulsant, 1846 (N)
Nephus (Nephus) schatzmayri Canepari & Tedeschi, 1977 (S, Si)
Nephus (Nephus) ulbrichi Fürsch, 1977 (Sa)

***Nephus (Sidis)* Mulsant, 1850**

Nephus (Sidis) anomus Mulsant, 1852 (N, S, Si, Sa)
Nephus (Sidis) helgae Fürsch, 1965 (S, Si)
Nephus (Sidis) hiekei Fürsch, 1965 (S, Si, Sa)
Nephus (Sidis) semirufus Weise, 1885 (S?, Si, Sa)

***Clitostethus* Weise, 1865**

Clitostethus arcuatus (Rossi, 1794) (N, S, Si, Sa)

Cryptolaemus Mulsant, 1853

Cryptolaemus montrouzieri Mulsant, 1853 (N, S, Si, Sa) (*)

Hyperaspis Dejean, 1833

Hyperaspis algerica Crotch, 1874 (Sa)

Hyperaspis campestris (Herbst, 1783) (N, S)

Hyperaspis chevrolati Canepari, 1985 (S, Si, Sa)

Hyperaspis concolor Suffrian, 1843 (N, S, Si, Sa)

Hyperaspis dellabeffai Canepari, 1979 (N) (E) (*)

Hyperaspis duvergeri Fürsch, 1985 (N, S, Si)

Hyperaspis hoffmannseggii (Gravenhorst, 1807) (N, Si)

Hyperaspis inexpectata Günther, 1959 (N, S)

Hyperaspis lata Fürsch, 1985 (N, S)

Hyperaspis peezi Fürsch, 1976 (N, S, Si)

Hyperaspis pseudopustulata Mulsant, 1853 (N)

Hyperaspis reppensis (Herbst, 1783)

Hyperaspis reppensis reppensis (Herbst, 1783) (S, Sa)

Platynaspis Redtenbacher, 1843

Platynaspis luteorubra (Goeze, 1777) (N, S, Si, Sa)

Platynaspis luteorubra confluens Mulsant, 1846 (Sa)

Chilocorus Leach, 1815

Chilocorus bipustulatus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Chilocorus renipustulatus (Scriba, 1790) (N)

Chilocorus similis (Rossi, 1790) (S) (E) (*)

Exochomus Redtenbacher, 1843

Exochomus nigripennis (Erichson, 1843) (Si) (*)

Exochomus nigromaculatus (Goeze, 1777) (N, S, Si)

Exochomus quadripustulatus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Brumus Mulsant, 1850

Brumus oblongus (Weidenbach, 1859) (N) (*)

Brumus octosignatus (Gebler, 1830) (Si?) (*)

Novius Mulsant, 1850

Novius cruentatus (Mulsant, 1846) (Si)

Rodolia Mulsant, 1850

Rodolia cardinalis (Mulsant, 1850) (N, S, Si, Sa) (*)

Coccidula Gyllenhal, 1827

Coccidula rufa (Herbst, 1783) (N, S, Sa?)

Coccidula scutellata (Herbst, 1783) (N, S, Si, Sa)

Rhizobius Stephens, 1831

Rhizobius chrysomeloides (Herbst, 1792) (N, Sa)

Rhizobius litura (Fabricius, 1787) (N, S, Si, Sa)

Rhizobius lophanthae Blaisdell, 1892 (N, S, Si, Sa) (*)

Anisosticta Dejean, 1833

Anisosticta novemdecimpunctata (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)

Hippodamia (Adaliopsis) Capra, 1926

Hippodamia (Adaliopsis) alpina (Villa, 1835) (*)

Hippodamia (Adaliopsis) alpina alpina (Villa, 1835) (N)

Hippodamia (Adaliopsis) alpina redtenbacheri Capra, 1928 (N)

Hippodamia (Adonia) Mulsant, 1846

Hippodamia (Adonia) variegata (Goeze, 1777)

Hippodamia (Adonia) variegata variegata (Goeze, 1777) (N, S, Si, Sa)

Hippodamia (Asemiadalia) Barovskij, 1931

Hippodamia (Asemiadalia) rufocincta Mulsant, 1850 (*)

Hippodamia (Asemiadalia) rufocincta rufocincta Mulsant, 1850 (N)

Hippodamia (Asemiadalia) rufocincta doderoi (Capra, 1944) (N)

Hippodamia (Hippodamia) Dejean, 1833

Hippodamia (Hippodamia) tredecimpunctata (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)

Hippodamia (Semiadalia) Crotch, 1874

Hippodamia (Semiadalia) notata (Laicharting, 1781) (N)

Hippodamia (Semiadalia) undecimnotata (Schneider, 1792) (N, S, Si, Sa)

Aphidecta Weise, 1893

Aphidecta oblitterata (Linnaeus, 1758) (N, S)

Adalia (Adalia) Mulsant, 1846

Adalia (Adalia) bipunctata (Linnaeus, 1758) (*)

Adalia (Adalia) bipunctata bipunctata (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Adalia (Adalia) bipunctata revelierei Mulsant, 1866 (Sa)

Adalia (Adalia) decempunctata (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Adalia (Adaliomorpha) Khnzorian, 1982

Adalia (Adaliomorpha) conglomerata (Linnaeus, 1758) (N) (*)

Bulaea Mulsant, 1850

Bulaea lichatschovi (Hummel, 1827) (N) (*)

Tytthaspis Crotch, 1874

Tytthaspis phalerata (A. Costa, 1849) (Si)

Tytthaspis sedecimpunctata (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Coccinella (Chelonitis) Weise, 1879

Coccinella (Chelonitis) venusta Weise, 1879 (*)

Coccinella (Chelonitis) venusta venusta Weise, 1879 (N, S)

Coccinella (Chelonitis) venusta adalioides Sicard, 1907 (N)

Coccinella (Coccinella) Linnaeus, 1758

Coccinella (Coccinella) hieroglyphica Linnaeus, 1758 (N) (*)

Coccinella (Coccinella) magnifica Redtenbacher, 1843 (N, Sa?)

Coccinella (Coccinella) quinquepunctata Linnaeus, 1758 (N, S)

Coccinella (Coccinella) septempunctata Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)

Coccinella (Coccinella) trifasciata Linnaeus, 1758 (N) (*)

Coccinella (Neococcinella) Savojskaia, 1969

Coccinella (Neococcinella) undecimpunctata Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)

Coccinula Dobzhansky, 1925

Coccinula quatuordecimpustulata (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Coccinula sinuatomarginata (Faldermann, 1837) (N, S, Si)

Oenopia Mulsant, 1850

Oenopia conglobata (Linnaeus, 1758)

Oenopia conglobata conglobata (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
Oenopia doublieri (Mulsant, 1846) (N, S, Si, Sa)
Oenopia impustulata (Linnaeus, 1758) (N) (*)
Oenopia lyncea (A.G. Olivier, 1808)
Oenopia lyncea agnata (Rosenhauer, 1847) (N, S, Si, Sa)
Oenopia lyncea lyncea (A.G. Olivier, 1808) (N, S, Si, Sa)

Harmonia Mulsant, 1850

Harmonia quadripunctata (Pontoppidan, 1763) (N, S, Sa)

Halyzia Mulsant, 1846

Halyzia sedecimguttata (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Vibidia Mulsant, 1846

Vibidia duodecimguttata (Poda, 1761) (N, S, Si, Sa)

Myzia Mulsant, 1846

Myzia oblongoguttata (Linnaeus, 1758) (N, S, Si?)

Sospita Mulsant, 1846

Sospita vigintiguttata (Linnaeus, 1758) (N, S)

Anatis Mulsant, 1846

Anatis ocellata (Linnaeus, 1758) (N)

Myrrha Mulsant, 1846

Myrrha octodecimguttata (Linnaeus, 1758)
Myrrha octodecimguttata octodecimguttata (Linnaeus, 1758) (N, Sa?)
Myrrha octodecimguttata formosa (A. Costa, 1849) (N, S, Si, Sa)

Calvia (Anisocalvia) Crotch, 1874

Calvia (Anisocalvia) quatuordecimguttata (Linnaeus, 1758) (N, S, Sa)
Calvia (Anisocalvia) quindecimguttata (Fabricius, 1777) (N, S, Si, Sa?)

Calvia (Calvia) Mulsant, 1846

Calvia (Calvia) decemguttata (Linnaeus, 1758) (N, S, Sa)

Propylea Mulsant, 1846

Propylea quatuordecimpunctata (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Psyllobora Dejean, 1833

Psyllobora vigintiduopunctata (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Henosepilachna Li, 1961

Henosepilachna argus (Geoffroy, 1762) (N, S, Si, Sa)

Henosepilachna elaterii (Rossi, 1794)

Henosepilachna elaterii elaterii (Rossi, 1794) (N, S, Si, Sa)

Subcoccinella Huber, 1841

Subcoccinella vigintiquatuorpunctata (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Cynegetis Redtenbacher, 1843

Cynegetis impunctata (Linnaeus, 1758) (N, S?)

Note

Pharoscymnus setulosus: Specie del Nord Africa. Vecchie segnalazioni di Sicilia da parte Bedel e di Weise nella seconda metà del 1800. Non è più stato catturato.

Scymnus (Mimopullus) fulvicollis: Presente in N solo nella riviera ligure di ponente.

Scymnus (Mimopullus) sacium: Presente in S solo in Puglia probabilmente come elemento transadriatico.

Scymnus (Scymnus) caprai: Presente in Si solo a Pantelleria.

Scymnus (Scymnus) nigrinus: Presente in N solo nelle Alpi.

Scymnus (Scymnus) pavesii: Presente in Si solo a Lampedusa.

Scymnus (Scymnus) quadriguttatus: Citato in S per un solo esemplare della Calabria.

Cryptolaemus montrouzieri: Introdotto in Italia nel 1907. Patria: Australia.

Hyperaspis dellabeffai: Conosciuta sinora solo delle prealpi torinesi.

Chilocorus similis: Endemismo italiano delle pinete del litorale tirrenico.

Exochomus nigripennis: Presente in Si solo a Lampedusa.

Brumus oblongus: Presente in N solo in Alto Adige.

Brumus octosignatus: Specie asiatica citata della Sicilia da Mulsant (1850). Non mi risultano catture successive a tale data.

Rodolia cardinalis: Introdotto in Italia nel 1901. Patria: Australia.

Rhizobius lophanthae: Introdotto in Italia nel 1901. Patria: Australia.

Hippodamia (Adaliopsis) alpina: La ssp. alpina nelle Alpi occidentali e centrali, la ssp. redtenbacheri nelle Alpi orientali.

Hippodamia (Asemiadalia) rufocincta: La ssp. rufocincta nelle Alpi Marittime, Cozie e nell'Appennino Emiliano (M.te Cimone), la ssp. doderoi nelle Alpi dalle Graie alle Retiche.

Adalia (Adalia) bipunctata: La ssp. revelierei probabilmente come razza ecologica. In allevamento si ottengono tutte e due le razze.

Adalia (Adaliomorpha) conglomerata: Presente in N solo in poche località marginali delle Alpi centrali ed orientali.

Bulaea lichatschovi: Presente solo in lagune salmastre del Veneto e dell'Emilia.

Coccinella (Chelonitis) venusta: La ssp. *venusta* presente in N nelle Alpi Marittime e Cozie in S sui Monti della Laga; la ssp. *adalioides* presente in N nelle Alpi Graie e Pennine.

Coccinella (Coccinella) hieroglyphica: Presente in N solo in alcune località delle Alpi e delle Prealpi.

Coccinella (Coccinella) trifasciata: Specie boreo-alpina presente in N solo nell'alta Valtellina.

Oenopia impustulata: Presente in N nella Pianura Padana tra Milano e Pavia.

Colonidae

Colon (Eurycolon) Ganglbauer, 1899

Colon (Eurycolon) latum Kraatz, 1850 (N, S?)

Colon (Eurycolon) rufescens Kraatz, 1850 (N)

Colon (Myloechus) Latreille, 1807

Colon (Myloechus) affine Sturm, 1839 (N, S, Sa)

Colon (Myloechus) angulare Erichson, 1837 (N)

Colon (Myloechus) appendiculatum (Sahlberg, 1822) (N, S)

Colon (Myloechus) armipes Kraatz, 1854 (N)

Colon (Myloechus) barnevillei Kraatz, 1858 (N)

Colon (Myloechus) beszedesi Depoli, 1915 (N)

Colon (Myloechus) brunneum (Latreille, 1807) (N, S)

Colon (Myloechus) calcaratum Erichson, 1837 (N)

Colon (Myloechus) clavigerum Herbst, 1797 (S)

Colon (Myloechus) dentipes (Sahlberg, 1822) (N, S, Si, Sa)

Colon (Myloechus) emarginatum Rosenhauer, 1856 (N)

Colon (Myloechus) fuscicornis Kraatz, 1852 (S?)

Colon (Myloechus) griseum Czwalińska, 1881 (N, S, Si, Sa)

Colon (Myloechus) murinum Kraatz, 1850 (N, S, Si, Sa)

Colon (Myloechus) perrini Reitter, 1885 (Si)

Colon (Myloechus) purkynei Fleischer, 1909 (S) (E)

Colon (Myloechus) puncticeps Czwalińska, 1884 (S, Si) (E)

Colon (Myloechus) sekerae Reitter, 1909 (N) (E)

Colon (Myloechus) subcurvipes Reitter, 1885 (N, S)

Colon (Myloechus) zebei Kraatz, 1854 (N, S)

Colon (Colon) Herbst, 1797

Colon (Colon) bidentatum (Sahlberg, 1822) (N)

Colon (Colon) serripes (Sahlberg, 1822) (N)

Colon (Colon) viennense Herbst, 1797

Colon (Colon) viennense alpestre Pic, 1901 (N)

Colon (Colon) viennense viennense Herbst, 1797 (N)

Colydiidae

Colydium Fabricius, 1792

Colydium elongatum Fabricius, 1787 (N, S, Si, Sa)

Colydium filiforme Fabricius, 1792 (N, S, Si, Sa)

Aulonium Erichson, 1845

Aulonium ruficorne (Olivier, 1790) (N, S, Si, Sa)

Aulonium trisulcum Fourcoy, 1785 (N)

Synchita Hellwig, 1792

Synchita humeralis (Fabricius, 1792) (N, S, Si, Sa)

Synchita mediolanensis A. Villa & G.B. Villa, 1836 (N, S, Si, Sa)

Synchita separanda Reitter, 1882 (N, S, Si, Sa)

Bitoma Herbst, 1793

Bitoma crenata (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa)

Cicones Curtis, 1827

Cicones pictus Erichson, 1845 (N, S, Si, Sa)

Cicones undatus (Guérin-Ménéville, 1844) (N, S)

Cicones variegatus (Hellwig, 1792) (N, S, Si, Sa)

Endophloeus Dejean, 1834

Endophloeus markovichianus (Piller & Mitterpacher, 1783) (N, S, Si, Sa)

Xylolaemus Redtenbacher, 1858

Xylolaemus fasciculosus (Gyllenhal, 1827) (S, Sa)

Colobicus Latreille, 1807

Colobicus hirtus (Rossi, 1790) (N, S)

Coxelus Dejean, 1821

Coxelus pictus (Sturm, 1807) (N, S, Sa)

Tarphius Erichson, 1845

Tarphius gibbulus Erichson, 1845 (S) (E)

Lyreus Aubé, 1861

Lyreus septemstriatus Fancello & Leo, 1991 (Sa) (E)
Lyreus subterraneus Aubé, 1861 (N?)

Orthocerus Latreille, 1796

Orthocerus clavicornis (Linnaeus, 1758) (N, S, Sa)
Orthocerus crassicornis (Erichson, 1845) (N, S)

Nosodomodes Reitter, 1922

Nosodomodes tuberculatus Germar, 1831 (N?)

Corticus Latreille, 1829

Corticus celtis (Germar, 1824) (S, Si)

Rhopalocerus Redtenbacher, 1842

Rhopalocerus rondanii (A. Villa & G.B. Villa, 1833) (N, S)

Diodesma Latreille, 1829

Diodesma denticincta Abeille de Perrin, 1899 (N, S)
Diodesma subterranea Latreille, 1829 (N, S)

Langelandia Aubé, 1843

Langelandia anophthalma Aubé, 1843 (N, S)
Langelandia antennaria Binaghi, 1937 (Sa) (E)
Langelandia ausonica Obenberger, 1914 (S) (E)
Langelandia exigua Perris, 1869 (Si?, Sa)
Langelandia insularis Dajoz, 1968 (Sa) (*)
Langelandia hummleri Obenberger, 1918 (S) (E)
Langelandia leonhardi Reitter, 1912 (Si, Sa) (E)
Langelandia nitidicollis Reitter, 1910 (Sa) (E)

Pycnomerus Erichson, 1842

Pycnomerus inexpecta (Jacquelin DuVal, 1859) (N) (*)
Pycnomerus terebrans (Olivier, 1790) (N, S, Si, Sa)

Dechomus Jacquelin DuVal, 1859

Dechomus reitteri Belon, 1882 (N, S, Si, Sa)
Dechomus italicus Ganglbauer, 1899 (S) (E)

Note

Langelandia insularis: Forse solo una sottospecie di 037.0.001.0.

Pycnomerus inexpecta: Specie di introduzione antropica, poi acclimatata in serre e orti botanici.

Corylophidae

Sacium Leconte, 1852

Sacium brunneum Brisout, 1863 (N)

Sacium damryi Reitter, 1884 (S, Sa)

Sacium oblongum Matthews, 1899 (N)

Sacium parvum Matthews, 1886 (N) (E)

Arthrolips Wollaston, 1854

Arthrolips aequalis Wollaston, 1857 (N, S, Si, Sa)

Arthrolips ferrugatus (Reitter, 1878) (Sa)

Arthrolips humilis (Rosenhauer, 1856) (N, S, Si, Sa)

Arthrolips nanus (Mulsant, 1861) (N, S, Si) (*)

Arthrolips obscurus (Sahlberg, 1817) (N, S, Si, Sa)

Arthrolips piceus (Comolli, 1837) (N, S, Si, Sa)

Arthrolips polypori Fiori, 1915 (S) (E)

Arthrolips scaber Matthews, 1899 (Sa)

Peltinus Mulsant, 1861

Peltinus alutaceus Reitter, 1885 (S, Sa)

Peltinus velatus Mulsant, 1861 (N, S, Si, Sa)

Peltinus walkeri Matthews, 1886 (Sa)

Corylophus Stephens, 1832

Corylophus cassidoides (Marsham, 1802) (N, S, Sa)

Corylophus sublaevipennis Jacquelin du Val, 1859 (N, S, Si, Sa)

Sericoderus Stephens, 1829

Sericoderus lateralis (Gyllenhal, 1827) (N, S, Si, Sa)

Anisomeristes Matthews, 1886

Anisomeristes revelierei (Reitter, 1878) (N, S, Sa)

Microstagetus Wollaston, 1861

Microstagetus parvulus Wollaston, 1861 (S)

Rhypobius Leconte, 1852

Rhypobius fiorianus (Matthews, 1886) (N, Si)

Rhypobius ruficollis (Jacquelin du Val, 1854) (N, S, Si, Sa)

Gloeosoma Wollaston, 1854

Gloeosoma velox Wollaston, 1854 (S, Si)

Orthoperus Stephens, 1829

Orthoperus aequalis Sharp, 1885 (S)

Orthoperus anxius Mulsant, 1861 (N, S, Si, Sa)

Orthoperus atomarius (Heer, 1841) (N, S)

Orthoperus atomus (Gyllenhal, 1808) (N, S, Si)

Orthoperus borrei Matthews, 1885 (Sa)

Orthoperus brunnipes (Gyllenhal, 1808) (N, S, Si)

Orthoperus coriaceus Mulsant, 1861 (N, S, Si)

Orthoperus improvisus Bruce, 1946 (N, S)

Orthoperus intersitus Bruce, 1951 (S)

Orthoperus pilosiusculus Jacquelin du Val, 1857 (N, S, Si)

Orthoperus punctatulus Reitter, 1876 (Si?) (*)

Orthoperus punctatus Wankowicz, 1865 (Si?) (*)

Note

Sacium: Alla luce di recenti studi ancora in corso, le specie europee tradizionalmente attribuite al genere neartico *Sacium* Leconte, 1854 sembrano competere ad altro (altri?) genere. Le specie qui attribuite a *Sacium* Auct. nec Leconte, 1854 devono quindi intendersi come specie "incertae sedis".

Arthrolips nanus: Tradizionalmente attribuito al gen. *Sacium*.

Orthoperus punctatulus: Presenza estremamente dubbia.

Orthoperus punctatus: Presenza estremamente dubbia.

Cryptophagidae

Telmatophilus Heer, 1841

Telmatophilus brevicollis Aubé, 1862 (N, S, Si, Sa)

Telmatophilus caricis (Olivier, 1790) (N, S, Si, Sa)

Telmatophilus typhae (Fallén, 1802) (N, S, Si, Sa)

Paramecosoma Curtis, 1833

Paramecosoma melanocephalum (Herbst, 1793) (N, S, Sa)

Henoticus C.G. Thomson, 1868

Henoticus serratus (Gyllenhal, 1808) (N, S)

Pteryngium Reitter, 1887

Pteryngium crenatum (Fabricius, 1798) (N, S, Sa)

Micrambe C.G. Thomson, 1863

Micrambe abietis (Paykull, 1798) (N)

Micrambe bimaculata (Panzer, 1798) (N)

Micrambe lindbergorum Bruce, 1934 (S)

Micrambe perrisi (Brisout, 1882) (N, S)

Micrambe villosa (Heer, 1841) (S, Si)

Micrambe vini (Panzer, 1797) (N, S, Si, Sa)

Cryptophagus Herbst, 1792

Cryptophagus acutangulus Gyllenhal, 1827 (N, S)

Cryptophagus angustus Ganglbauer, 1899 (S)

Cryptophagus badius Sturm, 1845 (N, S, Si, Sa)

Cryptophagus baldensis Erichson, 1846 (N, S)

Cryptophagus bedeli Grouvelle, 1919 (N)

Cryptophagus brisouti Reitter, 1875 (S)

Cryptophagus cellaris (Scopoli, 1763) (N, S, Si)

Cryptophagus confertus Casey, 1900 (N)

Cryptophagus croaticus Reitter, 1879 (N)

Cryptophagus cylindrus Kiesenwetter, 1858 (N, S, Si)

Cryptophagus demarzoi Otero & Angelini, 1981 (S) (E)

Cryptophagus dentatus (Herbst, 1793) (N, S, Si, Sa)

Cryptophagus distinguendus Sturm, 1845 (N, S, Si)

Cryptophagus dorsalis C. Sahlberg, 1834 (N)

Cryptophagus durus Reitter, 1878 (S)

Cryptophagus fallax Balfour-Browne, 1953 (N)

Cryptophagus falcozi Roubal, 1927 (S)

Cryptophagus fasciatus Kraatz, 1852 (N, S, Si, Sa)

Cryptophagus fuscicornis Sturm, 1845 (N, Sa)

Cryptophagus gonzalezi Otero & Angelini, 1981 (S) (E)

Cryptophagus hexagonalis Tournier, 1869 (N, S, Sa)

Cryptophagus inaequalis Reitter, 1878 (N, S)

Cryptophagus intermedius Bruce, 1934 (S)

Cryptophagus labilis Erichson, 1846 (N, S, Si, Sa)

Cryptophagus lapponicus Gyllenhal, 1828 (N, S, Si)

Cryptophagus laticollis Lucas, 1849 (N, S, Si, Sa)

Cryptophagus lycoperdi (Scopoli, 1763) (N, S, Si, Sa)

Cryptophagus micaceus Rey, 1889 (N, S, Si)
Cryptophagus montanus Brisout, 1863 (N, S)
Cryptophagus montemurroi Otero & Angelini, 1984 (S) (E)
Cryptophagus nitidulus Miller, 1858 (Si)
Cryptophagus pallidus Sturm, 1845 (N, S, Si, Sa)
Cryptophagus pilosus Gyllenhal, 1828 (N, S, Si, Sa)
Cryptophagus populi Paykull, 1800 (N, S, Sa)
Cryptophagus postpositus J. Sahlberg, 1903 (N, S, Si, Sa)
Cryptophagus pseudodentatus Bruce, 1934 (N, S, Si)
Cryptophagus pubescens Sturm, 1845 (N, S, Si)
Cryptophagus quercinus Kraatz, 1852 (N, S)
Cryptophagus reflexicollis Reitter, 1876 (N, S)
Cryptophagus rotundatus Coombs & Woodroffe, 1955 (N, S, Si)
Cryptophagus ruficornis Stephens, 1830 (S)
Cryptophagus saginatus Sturm, 1845 (N, S, Si, Sa)
Cryptophagus scanicus (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)
Cryptophagus schmidtii Sturm, 1845 (N)
Cryptophagus schrotteri Reitter, 1912 (S, Si, Sa)
Cryptophagus scutellatus Newman, 1834 (N, S, Sa)
Cryptophagus setulosus Sturm, 1845 (N, S, Sa)
Cryptophagus skalitzkyi Reitter, 1875 (N, S)
Cryptophagus sporadum Bruce, 1934 (N, S)
Cryptophagus subdepressus Gyllenhal, 1828 (N, S)
Cryptophagus subfumatus Kraatz, 1856 (S, Sa)
Cryptophagus thomsoni Reitter, 1875 (N, S, Si, Sa)
Cryptophagus umbripennis Reitter, 1887 (S)

Spavius Motschulsky, 1845

Spavius glaber (Gyllenhal, 1808) (N)

Antherophagus Latreille, 1829

Antherophagus canescens Grouvelle, 1916 (N, S)
Antherophagus nigricornis (Fabricius, 1787) (N, S)
Antherophagus pallens (Fabricius, 1781) (N, S)

Caenoscelis Thomson, 1863

Caenoscelis ferruginea (Sahlberg, 1822) (N, S)
Caenoscelis subdeplanata Brisout, 1882 (N)

Sternodea Reitter, 1875

Sternodea baudii Reitter, 1875 (S)

Atomaria (Atomaria) Stephens, 1830

Atomaria (Atomaria) abietina Reitter, 1887 (N)
Atomaria (Atomaria) affinis Sahlberg, 1834 (S)
Atomaria (Atomaria) alpina Heer, 1841 (N, S, Si)
Atomaria (Atomaria) atrata Reitter, 1875 (N)
Atomaria (Atomaria) barani Brisout, 1863 (N, S)
Atomaria (Atomaria) bella Reitter, 1875 (N)
Atomaria (Atomaria) bicolor Erichson, 1846 (N, Si)
Atomaria (Atomaria) diluta Erichson, 1846 (N, S)
Atomaria (Atomaria) fimetarii (Fabricius, 1792) (N, S)
Atomaria (Atomaria) gottwaldi Johnson, 1971 (N)
Atomaria (Atomaria) impressa Erichson, 1846 (N)
Atomaria (Atomaria) linearis Stephens, 1830 (N, S)
Atomaria (Atomaria) nigrirostris Stephens, 1830 (N, S, Si)
Atomaria (Atomaria) nigriventris Stephens, 1830 (N, S, Si, Sa)
Atomaria (Atomaria) procerula Erichson, 1846 (S, Si)
Atomaria (Atomaria) pulchra Erichson, 1846 (N, S)
Atomaria (Atomaria) puncticollis Thomson, 1868 (S)
Atomaria (Atomaria) umbrina (Gyllenhal, 1827) (N, S)

***Atomaria (Anchicera)* Thomson, 1863**

Atomaria (Anchicera) analis Erichson, 1846 (N, S, Si, Sa)
Atomaria (Anchicera) apicalis Erichson, 1846 (N, S, Si, Sa)
Atomaria (Anchicera) atricapilla Stephens, 1830 (N, S, Si, Sa)
Atomaria (Anchicera) atra (Herbst, 1793) (N)
Atomaria (Anchicera) basalis Erichson, 1846 (N)
Atomaria (Anchicera) fasciata Kolenati, 1846 (N, S)
Atomaria (Anchicera) fuscata (Schönherr, 1808) (N, S, Si)
Atomaria (Anchicera) fuscipes (Gyllenhal, 1808) (N, S, Si)
Atomaria (Anchicera) gibbula Erichson, 1846 (N, S, Si, Sa)
Atomaria (Anchicera) godarti Guillebeau, 1885 (S, Si)
Atomaria (Anchicera) grandicollis Brisout, 1882 (N)
Atomaria (Anchicera) gravidula Erichson, 1846 (N, S)
Atomaria (Anchicera) gutta Newman, 1834 (N, S, Sa)
Atomaria (Anchicera) ionica Reitter, 1887 (N)
Atomaria (Anchicera) lewisi Reitter, 1877 (N)
Atomaria (Anchicera) mesomela (Herbst, 1792) (N, S, Si, Sa)
Atomaria (Anchicera) munda Erichson, 1846 (N, S, Si, Sa)
Atomaria (Anchicera) nigripennis (Kugelann, 1794) (N, S, Sa)
Atomaria (Anchicera) ornata Heer, 1841 (N)
Atomaria (Anchicera) pallidipennis Holdhaus, 1903 (S, Si)
Atomaria (Anchicera) parvula Reitter, 1875 (N, S)
Atomaria (Anchicera) peltata Kraatz, 1853 (N, S)
Atomaria (Anchicera) plicata Reitter, 1875 (N, Si)
Atomaria (Anchicera) pseudatra Reitter, 1875 (N)
Atomaria (Anchicera) pusilla (Paykull, 1798) (N, S, Si, Sa)
Atomaria (Anchicera) rubella Heer, 1841 (N)
Atomaria (Anchicera) rubida Reitter, 1875 (N, S, Si)

Atomaria (Anchicera) rubricollis Brisout, 1863 (N, S)
Atomaria (Anchicera) scutellaris Motschulsky, 1849 (N, S, Si, Sa)
Atomaria (Anchicera) slavonica Johnson, 1971 (S, Si)
Atomaria (Anchicera) testacea Stephens, 1830 (N, S, Si, Sa)
Atomaria (Anchicera) turgida Erichson, 1846 (N)
Atomaria (Anchicera) versicolor Erichson, 1846 (N, S)
Atomaria (Anchicera) zetterstedti Zetterstedt, 1838 (N, S)

Ootypus Ganglbauer, 1899

Ootypus globosus (Waltl, 1838) (N, S, Sa)

Curelius Casey, 1900

Curelius exiguus (Erichson, 1846) (N, S, Si, Sa)

Ephistemus Stephens, 1829

Ephistemus globulus (Paykull, 1798) (N, S, Si, Sa)
Ephistemus reitteri Casey, 1900 (N, S)

Cucujidae

Cucujus Fabricius, 1781

Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) (S) (R)
Cucujus clavipes Fabricius, 1781 (N, Si?) (*)
Cucujus haematodes Erichson, 1845 (S) (R)

Pediacus Shuckard, 1839

Pediacus depressus (Herbst, 1794) (N, S)
Pediacus dermestoides (Fabricius, 1792) (N, S, Si, Sa)
Pediacus fuscus Erichson, 1845 (N)

Lathropus Erichson, 1845

Lathropus sepicola (Ph. W. Müller, 1821) (N, S, Sa)

Laemophloeus Dejean, 1837

Laemophloeus biguttatus (Say, 1827) (N) (*)
Laemophloeus fasciatus (Melsheimer, 1846) (N) (*)
Laemophloeus kraussi Ganglbauer, 1897 (S)
Laemophloeus monilis (Fabricius, 1787) (N, S, Si, Sa)
Laemophloeus muticus (Fabricius, 1781) (N) (R)
Laemophloeus nigricollis Lucas, 1849 (S, Sa)

***Placonotus* McLeay, 1871**

Placonotus majus Lefkovitch, 1962 (N) (*)
Placonotus politissimus (Wollaston, 1867) (N) (*)
Placonotus testaceus (Fabricius, 1787) (N, S, Si, Sa)
Placonotus zimmermanni (Leconte, 1854) (N) (*)

***Notolaemus* Lefkovitch, 1962**

Notolaemus castaneus (Erichson, 1846) (N, S) (R)
Notolaemus unifasciatus (Latreille, 1804) (N) (R)

***Cryptolestes (Cryptolestes)* Ganglbauer, 1899**

Cryptolestes (Cryptolestes) abietis (Wankowicz, 1865) (N) (*)
Cryptolestes (Cryptolestes) capensis (Waltl, 1832) (N, S, Si, Sa)
Cryptolestes (Cryptolestes) corticinus (Erichson, 1845) (N)
Cryptolestes (Cryptolestes) duplicatus (Waltl, 1839) (N, S, Si)
Cryptolestes (Cryptolestes) ferrugineus (Stephens, 1831) (N, S, Si, Sa)
Cryptolestes (Cryptolestes) fractipennis (Motschulsky, 1845) (N, S, Si, Sa)
Cryptolestes (Cryptolestes) pusilloides (Steel & Howe, 1952) (N) (*)
Cryptolestes (Cryptolestes) pusillus (Schönherr, 1817) (N, S) (*)
Cryptolestes (Cryptolestes) spartii (Curtis, 1834) (N, S, Si, Sa)
Cryptolestes (Cryptolestes) turcicus (Grouvelle, 1876) (N, S, Si, Sa) (*)
Cryptolestes (Cryptolestes) weisei (Reitter, 1879) (N) (*)

***Cryptolestes (Leptophloeus)* Casey, 1916**

Cryptolestes (Leptophloeus) alternans (Erichson, 1845) (N, S)
Cryptolestes (Leptophloeus) clematidis (Erichson, 1845) (N, S)
Cryptolestes (Leptophloeus) hypobori (Perris, 1855) (N, S, Si, Sa)
Cryptolestes (Leptophloeus) juniperi (Grouvelle, 1874) (N, S, Si, Sa)
Cryptolestes (Leptophloeus) perrisi (Grouvelle, 1876) (S, Si, Sa)

Note

Cucujus clavipes: Alloctono, neartico, con certezza solo porto di Venezia.
Laemophloeus biguttatus: Alloctono, neartico, solo porto di Venezia.
Laemophloeus fasciatus: Alloctono, neartico, solo porto di Venezia.
Placonotus majus: Alloctono, afrotropicale, solo porto di Venezia.
Placonotus politissimus: Alloctono, afrotropicale, solo porto di Venezia.
Placonotus zimmermanni: Alloctono, neartico, solo porto di Venezia.
Cryptolestes (Cryptolestes) abietis: Solo in Alto Adige.
Cryptolestes (Cryptolestes) pusilloides: Alloctono, spesso introdotto dall'emisfero australe.
Cryptolestes (Cryptolestes) pusillus: In Italia prevalentemente sinantropo.
Cryptolestes (Cryptolestes) turcicus: In Italia prevalentemente sinantropo.
Cryptolestes (Cryptolestes) weisei: Solo in Alto Adige.

Cryptolestes (Leptophloeus): Considerato di rango generico da una parte degli AA.

Curculionidae

***Otiorhynchus (Dodecastichus)* Stierlin, 1861**

- Otiorhynchus (Dodecastichus) brevipes* Apfelbeck, 1895
 - Otiorhynchus (Dodecastichus) brevipes tarentinus* A. Solari & F. Solari, 1915 (S) (E)
- Otiorhynchus (Dodecastichus) consentaneus* Boheman, 1843
 - Otiorhynchus (Dodecastichus) consentaneus consentaneus* Boheman, 1843 (N, S)
 - Otiorhynchus (Dodecastichus) consentaneus dimorphus* A. Solari & F. Solari, 1915 (S) (E)
 - Otiorhynchus (Dodecastichus) consentaneus latialis* A. Solari & F. Solari, 1915 (S) (E)
- Otiorhynchus (Dodecastichus) dalmatinus* Gyllenhal, 1834
 - Otiorhynchus (Dodecastichus) dalmatinus dalmatinus* Gyllenhal, 1834 (S)
 - Otiorhynchus (Dodecastichus) dalmatinus lauri* Stierlin, 1861 (S) (E)
- Otiorhynchus (Dodecastichus) dolomitae* Stierlin, 1862 (N) (E)
- Otiorhynchus (Dodecastichus) geniculatus* (Germar, 1817) (N)
- Otiorhynchus (Dodecastichus) heydeni* Stierlin, 1861
 - Otiorhynchus (Dodecastichus) heydeni heydeni* Stierlin, 1861 (N)
 - Otiorhynchus (Dodecastichus) heydeni ovoideus* Reitter, 1913 (S) (E)
- Otiorhynchus (Dodecastichus) inflatus* Gyllenhal, 1834 (N, S)
- Otiorhynchus (Dodecastichus) mastix* (Olivier, 1807)
 - Otiorhynchus (Dodecastichus) mastix mastix* (Olivier, 1807) (N)
 - Otiorhynchus (Dodecastichus) mastix perlongus* A. Solari & F. Solari, 1915 (S) (E)
 - Otiorhynchus (Dodecastichus) mastix scabrior* Reitter, 1913 (S) (E)
- Otiorhynchus (Dodecastichus) obsoletus* Stierlin, 1861 (N)
- Otiorhynchus (Dodecastichus) pulverulentus* Germar, 1824 (N)

***Otiorhynchus (Thalycrynychus)* Reitter, 1912**

- Otiorhynchus (Thalycrynychus) perdix* (Olivier, 1807)
 - Otiorhynchus (Thalycrynychus) perdix brutius* Reitter, 1913 (S) (E)
 - Otiorhynchus (Thalycrynychus) perdix eugubinus* F. Solari, 1932 (S) (E)
 - Otiorhynchus (Thalycrynychus) perdix perdix* (Olivier, 1807) (N)
- Otiorhynchus (Thalycrynychus) thalassinus* Apfelbeck, 1905
 - Otiorhynchus (Thalycrynychus) thalassinus sanctus* F. Solari, 1932 (S) (E)
 - Otiorhynchus (Thalycrynychus) thalassinus thalassinus* Apfelbeck, 1905 (N)

***Otiorhynchus (Urorrhynchus)* Reitter, 1912**

- Otiorhynchus (Urorrhynchus) nobilis* Germar, 1824 (N)
- Otiorhynchus (Urorrhynchus) sensitivus* (Scopoli, 1763) (N)

***Otiorhynchus (Otiorhynchus)* Germar, 1824**

- Otiorhynchus (Otiorhynchus) alutaceus* (Germar, 1817)
Otiorhynchus (Otiorhynchus) alutaceus alutaceus (Germar, 1817) (N)
Otiorhynchus (Otiorhynchus) alutaceus coarctaticornis A. Solari & F. Solari, 1907 (S)
- (E)
Otiorhynchus (Otiorhynchus) amplipennis Fairmaire, 1859
Otiorhynchus (Otiorhynchus) amplipennis amplipennis Fairmaire, 1859 (N)
Otiorhynchus (Otiorhynchus) amplipennis olieri Hoffmann, 1950 (N) (E)
Otiorhynchus (Otiorhynchus) armadillo (Rossi, 1792) (N, S)
Otiorhynchus (Otiorhynchus) aurifer Boheman, 1843 (N, S, Si, Sa)
Otiorhynchus (Otiorhynchus) auropupillatus Stierlin, 1861 (S) (E)
Otiorhynchus (Otiorhynchus) bertarinii Stierlin, 1894 (N) (E)
Otiorhynchus (Otiorhynchus) binaghii Luigioni, 1931 (S) (E)
Otiorhynchus (Otiorhynchus) bisulcatus (Fabricius, 1787) (N)
Otiorhynchus (Otiorhynchus) brigantii Pesarini, 1980 (N) (E)
Otiorhynchus (Otiorhynchus) caesipes Mulsant & Rey, 1858 (N)
Otiorhynchus (Otiorhynchus) carbo Pesarini, 1980 (Sa) (E)
Otiorhynchus (Otiorhynchus) cardiniger (Host, 1798) (N)
Otiorhynchus (Otiorhynchus) caudatus (Rossi, 1792) (N, S, Si)
Otiorhynchus (Otiorhynchus) civis Stierlin, 1861 (N)
Otiorhynchus (Otiorhynchus) cupreosparsus Fairmaire, 1859 (N)
Otiorhynchus (Otiorhynchus) fortis Rosenhauer, 1847 (E)
Otiorhynchus (Otiorhynchus) fortis fortis Rosenhauer, 1847 (N)
Otiorhynchus (Otiorhynchus) fortis valarsae Reitter, 1913 (N)
Otiorhynchus (Otiorhynchus) ghilianii Fairmaire, 1856 (N)
Otiorhynchus (Otiorhynchus) griseopunctatus Boheman, 1843
Otiorhynchus (Otiorhynchus) griseopunctatus falteronae Pesarini, 1968 (N, S) (E)
Otiorhynchus (Otiorhynchus) griseopunctatus griseopunctatus Boheman, 1843 (N, S)
Otiorhynchus (Otiorhynchus) griseopunctatus judicariensis Reitter, 1913 (N) (E)
Otiorhynchus (Otiorhynchus) griseopunctatus nigerrimus A. Solari & F. Solari, 1903
- (N) (E)
Otiorhynchus (Otiorhynchus) griseopunctatus sellae Stierlin, 1883 (N)
Otiorhynchus (Otiorhynchus) grouvellei Stierlin, 1883 (N)
Otiorhynchus (Otiorhynchus) halbherri Stierlin, 1890 (N) (E)
Otiorhynchus (Otiorhynchus) laevigatus (Fabricius, 1792) (N)
Otiorhynchus (Otiorhynchus) lanuginosus Boheman, 1843 (N)
Otiorhynchus (Otiorhynchus) luigionii A. Solari & F. Solari, 1908 (S) (E)
Otiorhynchus (Otiorhynchus) margaritifer Reitter, 1913 (S) (E)
Otiorhynchus (Otiorhynchus) martinensis G. Müller, 1898 (N) (E)
Otiorhynchus (Otiorhynchus) meridionalis Gyllenhal, 1834 (N)
Otiorhynchus (Otiorhynchus) minutesquamosus A. Solari & F. Solari, 1908 (S) (E)
Otiorhynchus (Otiorhynchus) niger (Fabricius, 1777) (N)
Otiorhynchus (Otiorhynchus) olivieri Abbazzi & Osella, 1992 (N, S)
Otiorhynchus (Otiorhynchus) osellai Magnano, 1969 (S) (E)
Otiorhynchus (Otiorhynchus) paradisiacus Pesarini, 1968 (N)
Otiorhynchus (Otiorhynchus) rhacusensis Germar, 1822
Otiorhynchus (Otiorhynchus) rhacusensis siculus Stierlin, 1861 (Si) (E)
Otiorhynchus (Otiorhynchus) ruffoi Magnano, 1969 (S) (E)
Otiorhynchus (Otiorhynchus) salicicola Heyden, 1908 (N, S)

Otiorhynchus (Otiorhynchus) sanguinipes Boheman, 1843 (N, S) (E)
Otiorhynchus (Otiorhynchus) scaberrimus Stierlin, 1861 (S) (E)
Otiorhynchus (Otiorhynchus) sibillanicus Magnano, 1969 (S) (E)
Otiorhynchus (Otiorhynchus) stomachosus Gyllenhal, 1834 (N)
Otiorhynchus (Otiorhynchus) sulphurifer (Herbst, 1797) (N)
Otiorhynchus (Otiorhynchus) transadriaticus Reitter, 1913 (S) (E)
Otiorhynchus (Otiorhynchus) vehemens Boheman, 1843 (N, S) (E)

***Otiorhynchus (Phalantorrhynchus)* Reitter, 1912**

Otiorhynchus (Phalantorrhynchus) fulvipes Gyllenhal, 1834 (N, S)
Otiorhynchus (Phalantorrhynchus) morio (Fabricius, 1781) (N)

***Otiorhynchus (Microphalantus)* Reitter, 1912**

Otiorhynchus (Microphalantus) winkleri F. Solari, 1937 (N)

***Otiorhynchus (Cirorrhynchus)* Apfelbeck, 1899**

Otiorhynchus (Cirorrhynchus) crinipes Miller, 1863
Otiorhynchus (Cirorrhynchus) crinipes pilipes Leoni, 1907 (S) (E)
Otiorhynchus (Cirorrhynchus) falzonii F. Solari, 1947 (S) (E)
Otiorhynchus (Cirorrhynchus) plumipes (Germar, 1817) (N)

***Otiorhynchus (Asphaerorrhynchus)* Reitter, 1912**

Otiorhynchus (Asphaerorrhynchus) raucus (Fabricius, 1777) (N, S)

***Otiorhynchus (Postaremus)* Reitter, 1912**

Otiorhynchus (Postaremus) nodosus (Müller, 1764)
Otiorhynchus (Postaremus) nodosus comosellus Boheman, 1843 (N) (E)
Otiorhynchus (Postaremus) nodosus gobanzi Gredler, 1868 (N) (E)
Otiorhynchus (Postaremus) nodosus nodosus (Müller, 1764) (N)
Otiorhynchus (Postaremus) schmidtii Stierlin, 1861
Otiorhynchus (Postaremus) schmidtii schmidtii Stierlin, 1861 (N)
Otiorhynchus (Postaremus) schmidtii tridentinus K. Daniel & J. Daniel, 1891 (N) (E)

***Otiorhynchus (Jelenatus)* Reitter, 1912**

Otiorhynchus (Jelenatus) affaber Boheman, 1843 (S, Si)

***Otiorhynchus (Neobudemus)* Reitter, 1912**

Otiorhynchus (Neobudemus) ligneoides Stierlin, 1902 (S) (E)

***Otiorhynchus (Zustalestus)* Reitter, 1912**

Otiorhynchus (Zustalestus) rugosostriatus (Goeze, 1777) (N, S, Si, Sa)

***Otiorhynchus (Elecranus)* Reitter, 1912**

Otiorhynchus (Elecranus) carnicus F. Solari, 1947 (N)

Otiorhynchus (Elecranus) chalceus Stierlin, 1861 (N)

Otiorhynchus (Elecranus) densatus Boheman, 1843 (N)

Otiorhynchus (Elecranus) vestitus Gyllenhal, 1834 (N) (E)

***Otiorhynchus (Rusnepranus)* Reitter, 1912**

Otiorhynchus (Rusnepranus) arenosus Stierlin, 1894 (N)

***Otiorhynchus (Otismotilus)* Reitter, 1912**

Otiorhynchus (Otismotilus) heeri Stierlin, 1858 (N)

Otiorhynchus (Otismotilus) permundus Reitter, 1913 (N) (E)

***Otiorhynchus (Nilepolemis)* Reitter, 1912**

Otiorhynchus (Nilepolemis) articulatus K. Daniel & J. Daniel, 1898 (N)

Otiorhynchus (Nilepolemis) breiti Franz, 1938 (N) (E)

Otiorhynchus (Nilepolemis) cadoricus K. Daniel & J. Daniel, 1891 (N) (E)

Otiorhynchus (Nilepolemis) coniceps K. Daniel & J. Daniel, 1898 (N) (E)

Otiorhynchus (Nilepolemis) decipiens Franz, 1938 (N) (E)

Otiorhynchus (Nilepolemis) distincticornis Rosenhauer, 1847 (N) (E)

Otiorhynchus (Nilepolemis) focarilei Pesarini, 1970 (N) (E)

Otiorhynchus (Nilepolemis) foraminosus Boheman, 1843

Otiorhynchus (Nilepolemis) foraminosus alpestris Stierlin, 1858 (N) (E)

Otiorhynchus (Nilepolemis) foraminosus foraminosus Boheman, 1843 (N)

Otiorhynchus (Nilepolemis) hadrocerus K. Daniel & J. Daniel, 1898 (N) (E)

Otiorhynchus (Nilepolemis) kuennemanni Reitter, 1917 (N) (E)

Otiorhynchus (Nilepolemis) lessinicus Franz, 1938 (N) (E)

Otiorhynchus (Nilepolemis) lombardus Stierlin, 1866 (N) (E)

Otiorhynchus (Nilepolemis) muelleri Rosenhauer, 1856 (N) (E)

Otiorhynchus (Nilepolemis) sulcatellus K. Daniel & J. Daniel, 1898 (E)

Otiorhynchus (Nilepolemis) sulcatellus inermis Franz, 1938 (N)

Otiorhynchus (Nilepolemis) sulcatellus sulcatellus K. Daniel & J. Daniel, 1898 (N)

Otiorhynchus (Nilepolemis) tagenioides Stierlin, 1861

Otiorhynchus (Nilepolemis) tagenioides ravasinii Lona, 1921 (N) (E)

Otiorhynchus (Nilepolemis) tagenioides serniensis Franz, 1938 (N)

Otiorhynchus (Nilepolemis) tagenioides tagenioides Stierlin, 1861 (N)

***Otiorhynchus (Lolatismus)* Reitter, 1912**

Otiorhynchus (Lolatismus) costipennis Rosenhauer, 1856 (N)

Otiorhynchus (Lolatismus) lasius Germar, 1817 (N)

Otiorhynchus (Lolatismus) manellii Osella & Zuppa, 1994 (S) (E)

Otiorhynchus (Lolatismus) porcatus (Herbst, 1795) (N)
Otiorhynchus (Lolatismus) secretus Reitter, 1913 (N) (E)

***Otiorhynchus (Nihus)* Reitter, 1912**

Otiorhynchus (Nihus) azaleae Penecke, 1894 (N)
Otiorhynchus (Nihus) gredleri K. Daniel & J. Daniel, 1898 (N)
Otiorhynchus (Nihus) hypocrita Rosenhauer, 1847 (N)
Otiorhynchus (Nihus) scaber (Linné, 1758) (N)
Otiorhynchus (Nihus) spaethi Reitter, 1913 (N) (E)
Otiorhynchus (Nihus) subcostatus Stierlin, 1866 (N)
Otiorhynchus (Nihus) uncinatus Germar, 1824 (N)
Otiorhynchus (Nihus) venustus Stierlin, 1880 (N)

***Otiorhynchus (Eunihus)* Reitter, 1912**

Otiorhynchus (Eunihus) abruzzensis Stierlin, 1892 (S) (E)
Otiorhynchus (Eunihus) globulus Gredler, 1866 (N)
Otiorhynchus (Eunihus) salassorum Magnano, 1975 (N) (E)

***Otiorhynchus (Delhandus)* Reitter, 1912**

Otiorhynchus (Delhandus) guttula Fairmaire, 1859
Otiorhynchus (Delhandus) guttula assimilis Gemminger, 1861 (Sa) (E)

***Otiorhynchus (Cerdelcus)* Reitter, 1912**

Otiorhynchus (Cerdelcus) frescati Boheman, 1843 (N, S)
Otiorhynchus (Cerdelcus) ligneus (Olivier, 1807) (N?)
Otiorhynchus (Cerdelcus) misellus Stierlin, 1861 (N)

***Otiorhynchus (Dorymerus)* Seidlitz, 1890**

Otiorhynchus (Dorymerus) austriacus (Fabricius, 1801) (N)

***Otiorhynchus (Metopiorrhynchus)* Reitter, 1912**

Otiorhynchus (Metopiorrhynchus) camunus Magnano, 1973 (N) (E)
Otiorhynchus (Metopiorrhynchus) carmagnoiae Villa & Villa, 1835 (N) (E)
Otiorhynchus (Metopiorrhynchus) cancellatus Boheman, 1843 (N)
Otiorhynchus (Metopiorrhynchus) cesaraccioi Osella, Mammoli & Zuppa, 1991 (Sa) (E)
Otiorhynchus (Metopiorrhynchus) cornirostris Reitter, 1913 (N) (E)
Otiorhynchus (Metopiorrhynchus) cyclophthalmus F. Solari, 1946 (N, S) (E)
Otiorhynchus (Metopiorrhynchus) cyclopterus F. Solari, 1946 (N) (E)
Otiorhynchus (Metopiorrhynchus) delicatulus Marseul, 1872 (N)
Otiorhynchus (Metopiorrhynchus) diecki Stierlin, 1872 (N, S) (E)
Otiorhynchus (Metopiorrhynchus) difficilis Stierlin, 1858 (N)
Otiorhynchus (Metopiorrhynchus) diversicollis Lona, 1939 (N, S) (E)

Otiorhynchus (Metopiorrhynchus) dolichopterus Magnano, 1967 (N, S) (E)
Otiorhynchus (Metopiorrhynchus) franciscoloi F. Solari, 1947 (S) (E)
Otiorhynchus (Metopiorrhynchus) frigidus Mulsant, 1859 (N)
Otiorhynchus (Metopiorrhynchus) garibaldinus A. Solari & F. Solari, 1908 (S, Si) (E)
Otiorhynchus (Metopiorrhynchus) ianuargenti Osella, Mammoli & Zuppa, 1991 (Sa) (E)
Otiorhynchus (Metopiorrhynchus) insolitus Magnano, 1967 (N) (E)
Otiorhynchus (Metopiorrhynchus) litigosus Magnano, 1967 (N) (E)
Otiorhynchus (Metopiorrhynchus) lostiai Osella, Mammoli & Zuppa, 1991 (Sa) (E)
Otiorhynchus (Metopiorrhynchus) nigrinus F. Solari, 1946 (N) (E)
Otiorhynchus (Metopiorrhynchus) pasubianus F. Solari, 1946 (N) (E)
Otiorhynchus (Metopiorrhynchus) pignoris Reitter, 1913 (N) (E)
Otiorhynchus (Metopiorrhynchus) pupillatus Gyllenhal, 1834
 Otiorhynchus (Metopiorrhynchus) pupillatus angustipennis Stierlin, 1883 (N)
 Otiorhynchus (Metopiorrhynchus) pupillatus pupillatus Gyllenhal, 1834 (N, S)
Otiorhynchus (Metopiorrhynchus) pusillus Stierlin, 1861
 Otiorhynchus (Metopiorrhynchus) pusillus cottianus Magnano, 1967 (N) (E)
 Otiorhynchus (Metopiorrhynchus) pusillus pusillus Stierlin, 1861 (N, S)
Otiorhynchus (Metopiorrhynchus) respersus Stierlin, 1861 (N)
Otiorhynchus (Metopiorrhynchus) rhododendri Stierlin, 1861 (N)
Otiorhynchus (Metopiorrhynchus) rosaemariae Magnano, 1973 (N) (E)
Otiorhynchus (Metopiorrhynchus) singularis (Linné, 1767) (N)
Otiorhynchus (Metopiorrhynchus) teretirostris Stierlin, 1866
 Otiorhynchus (Metopiorrhynchus) teretirostris globosipennis F. Solari, 1946 (N) (E)
 Otiorhynchus (Metopiorrhynchus) teretirostris teretirostris Stierlin, 1866 (N)
Otiorhynchus (Metopiorrhynchus) thoracicus Stierlin, 1892 (N) (E)
Otiorhynchus (Metopiorrhynchus) tirolensis Stierlin, 1894 (N)
Otiorhynchus (Metopiorrhynchus) varius Boheman, 1843 (N, S?)
Otiorhynchus (Metopiorrhynchus) venetus F. Solari, 1947 (N) (E)
Otiorhynchus (Metopiorrhynchus) vernalis Stierlin, 1861 (N, S) (E)
Otiorhynchus (Metopiorrhynchus) veterator Uyttenboogaart, 1932 (S)

***Otiorhynchus (Lixorrhynchus)* Reitter, 1913**

Otiorhynchus (Lixorrhynchus) gracilis Gyllenhal, 1834 (N)

***Otiorhynchus (Aleutinops)* Reitter, 1912**

Otiorhynchus (Aleutinops) elegantulus Germar, 1824 (N)

***Otiorhynchus (Satnalistus)* Reitter, 1912**

Otiorhynchus (Satnalistus) duinensis Germar, 1824 (N, S)
Otiorhynchus (Satnalistus) paulinus Lona, 1928 (N, S)
Otiorhynchus (Satnalistus) signatipennis Gyllenhal, 1834 (N)
Otiorhynchus (Satnalistus) stenorostris Apfelbeck, 1898 (N)

***Otiorhynchus (Majetnecus)* Reitter, 1912**

Otiorhynchus (Majetnecus) lepidopterus (Fabricius, 1794) (N)
Otiorhynchus (Majetnecus) squamosus Miller, 1859 (N)

Otiorhynchus (Duphanastus) Reitter, 1913

Otiorhynchus (Duphanastus) burlinii F. Solari, 1947 (N) (E)
Otiorhynchus (Duphanastus) fraxini Germar, 1824 (N)

Otiorhynchus (Usipoconus) Reitter, 1913

Otiorhynchus (Usipoconus) auricomus Germar, 1824 (N)
Otiorhynchus (Usipoconus) eremicola Rosenhauer, 1847 (N)
Otiorhynchus (Usipoconus) subquadratus Rosenhauer, 1847 (N)

Otiorhynchus (Mitarodes) Reitter, 1912

Otiorhynchus (Mitarodes) lavandus Germar, 1824 (N)

Otiorhynchus (Necotaleus) Reitter, 1913

Otiorhynchus (Necotaleus) sirentensis D'Amore, 1906 (S) (E)
Otiorhynchus (Necotaleus) vestinus Magnano, 1977 (S) (E)

Otiorhynchus (Rosvolestus) Reitter, 1912

Otiorhynchus (Rosvolestus) globus Boheman, 1843 (N)

Otiorhynchus (Nehrodistus) Reitter, 1912

Otiorhynchus (Nehrodistus) armatus Boheman, 1843 (N, S, Si) (E)
Otiorhynchus (Nehrodistus) corruptor (Host, 1789) (N, S, Si)
Otiorhynchus (Nehrodistus) rhinoceros F. Solari, 1940 (S) (E)
Otiorhynchus (Nehrodistus) turca Boheman, 1843 (N)

Otiorhynchus (Advenardus) Reitter, 1912

Otiorhynchus (Advenardus) populeti Boheman, 1843 (N)

Otiorhynchus (Ulozenus) Reitter, 1912

Otiorhynchus (Ulozenus) infernalis (Gyllenhal, 1817) (Sa)

Otiorhynchus (Normotionus) Reitter, 1912

Otiorhynchus (Normotionus) linearis Stierlin, 1861 (N, S) (E)
Otiorhynchus (Normotionus) raffrayanus F. Solari, 1940 (N, S) (E)
Otiorhynchus (Normotionus) sulcatus (Fabricius, 1775) (N, S)

Otiorhynchus (*Ergiferanus*) Reitter, 1912

Otiorhynchus (Ergiferanus) nubilus Boheman, 1843 (N)

Otiorhynchus (Ergiferanus) tener Stierlin, 1866 (N)

Otiorhynchus (*Mierginus*) Reitter, 1912

Otiorhynchus (Mierginus) auricapillus Germar, 1824 (N)

Otiorhynchus (Mierginus) clathratus (Germar, 1817) (N)

Otiorhynchus (Mierginus) montivagus Boheman, 1843 (N)

Otiorhynchus (*Provadilus*) Reitter, 1912

Otiorhynchus (Provadilus) alpicola Boheman, 1843 (N)

Otiorhynchus (Provadilus) moestus Gyllenhal, 1834 (N, S)

Otiorhynchus (Provadilus) pedemontanus Stierlin, 1861 (N)

Otiorhynchus (Provadilus) pseudocoriarius F. Solari, 1950 (N)

Otiorhynchus (Provadilus) rugifrons (Gyllenhal, 1813) (N, S)

Otiorhynchus (Provadilus) strigirostris Boheman, 1843 (S) (E)

Otiorhynchus (*Postupatus*) Reitter, 1912

Otiorhynchus (Postupatus) brusinae Stierlin, 1888 (N)

Otiorhynchus (*Prilisvanus*) Reitter, 1912

Otiorhynchus (Prilisvanus) gemmatus (Scopoli, 1763) (N, S)

Otiorhynchus (*Otiolehus*) Reitter, 1913

Otiorhynchus (Otiolehus) calabrus Stierlin, 1883 (S) (E)

Otiorhynchus (*Anchorrhynchus*) Reitter, 1913

Otiorhynchus (Anchorrhynchus) sabbadinii Pesarini, 1985 (Si) (E)

Otiorhynchus (*Misenatus*) Reitter, 1912

Otiorhynchus (Misenatus) lugens (Germar, 1817) (N, S, Si)

Otiorhynchus (*Padilehus*) Reitter, 1912

Otiorhynchus (Padilehus) kahleni Magnano, 1991 (N)

Otiorhynchus (Padilehus) pinastri (Herbst, 1795) (N)

Otiorhynchus (*Kreinidinus*) Reitter, 1912

Otiorhynchus (Kreinidinus) planiceps K. Daniel & J. Daniel, 1898 (N)

Otiorhynchus (*Spodocellinus*) Reitter, 1912

Otiorhynchus (Spodocellinus) subpubescens Stierlin, 1894 (N)

Otiorhynchus (*Acunotus*) Reitter, 1912

Otiorhynchus (Acunotus) lutosus Stierlin, 1858 (N, S)

Otiorhynchus (*Piopisidus*) Reitter, 1912

Otiorhynchus (Piopisidus) denigrator Boheman, 1843 (N?)

Otiorhynchus (*Limatogaster*) Apfelbeck, 1898

Otiorhynchus (Limatogaster) cribrirostris Leoni, 1906 (S) (E)

Otiorhynchus (Limatogaster) colonnellii Magnano, 1986 (S) (E)

Otiorhynchus (Limatogaster) lasioscelis Reitter, 1903 (S)

Otiorhynchus (*Podonebistus*) Reitter, 1912

Otiorhynchus (Podonebistus) bericus Magnano, 1977 (N) (E)

Otiorhynchus (Podonebistus) jovis Miller, 1872

Otiorhynchus (Podonebistus) jovis holdhausi A. Solari & F. Solari, 1913 (S) (E)

Otiorhynchus (Podonebistus) prolixus Rosenhauer, 1847 (N)

Otiorhynchus (*Panorosemus*) Reitter, 1912

Otiorhynchus (Panorosemus) porcellus K. Daniel & J. Daniel, 1898 (S) (E)

Otiorhynchus (*Pocodalemes*) Reitter, 1912

Otiorhynchus (Pocodalemes) crataegi Germar, 1824 (N, S)

Otiorhynchus (*Namertanus*) Reitter, 1912

Otiorhynchus (Namertanus) pauxillus Rosenhauer, 1847 (N)

Otiorhynchus (*Zavodesus*) Reitter, 1912

Otiorhynchus (Zavodesus) glabellus Rosenhauer, 1847 (N)

Otiorhynchus (*Prodeminus*) Reitter, 1912

Otiorhynchus (Prodeminus) maxillosus Gyllenhal, 1834 (N)

Otiorhynchus (*Tournieria*) Stierlin, 1861

Otiorhynchus (Tournieria) corneolus Weise, 1906 (N)
Otiorhynchus (Tournieria) meregallii Magnano, 1977 (N) (E)

***Otiorhynchus (Pendragon)* Gozis, 1882**

Otiorhynchus (Pendragon) desertus Rosenhauer, 1847 (N, S)
Otiorhynchus (Pendragon) ovatus (Linné, 1758) (N, S)

***Otiorhynchus (Rhinotournieria)* F. Solari, 1947**

Otiorhynchus (Rhinotournieria) oculatus F. Solari, 1947 (S, Si) (E)

***Otiorhynchus (Tyloderes)* Schönherr, 1826**

Otiorhynchus (Tyloderes) chrysops (Herbst, 1795) (N)
Otiorhynchus (Tyloderes) megerlei (Fabricius, 1801) (N)

***Otiorhynchus (Tithonus)* Germar, 1824**

Otiorhynchus (Tithonus) chrysocomus Germar, 1824 (N)

***Otiorhynchus (Cryphiphorus)* Stierlin, 1861**

Otiorhynchus (Cryphiphorus) anthracinus (Scopoli, 1763) (N, S)
Otiorhynchus (Cryphiphorus) ligustici (Linné, 1758) (N)
Otiorhynchus (Cryphiphorus) mancinii F. Solari, 1932 (N, S) (E)
Otiorhynchus (Cryphiphorus) orbicularis (Herbst, 1795) (N)
Otiorhynchus (Cryphiphorus) subseriatus F. Solari, 1931 (N) (*)
Otiorhynchus (Cryphiphorus) turbatus Boheman, 1834 (N?, S?) (E)

***Otiorhynchus (Arammichnus)* Gozis, 1882**

Otiorhynchus (Arammichnus) aegatensis Magnano, 1992 (Si) (E)
Otiorhynchus (Arammichnus) apulus A. Solari & F. Solari, 1913 (S) (E)
Otiorhynchus (Arammichnus) bagnolii Stierlin, 1891 (S) (E)
Otiorhynchus (Arammichnus) calabrensis Stierlin, 1891 (S, Si) (E)
Otiorhynchus (Arammichnus) calabrolucanus Lona, 1957 (S) (E)
Otiorhynchus (Arammichnus) catinensis Magnano, 1993 (Si) (E)
Otiorhynchus (Arammichnus) cossyrensis Magnano, 1992 (Si) (E)
Otiorhynchus (Arammichnus) cribricollis Gyllenhal, 1834 (N, S, Si, Sa)
Otiorhynchus (Arammichnus) echidna K. Daniel & J. Daniel, 1898 (S) (E)
Otiorhynchus (Arammichnus) ferdinandi Reitter, 1913 (Si) (E)
Otiorhynchus (Arammichnus) ferrarii Miller, 1863 (N, S)
Otiorhynchus (Arammichnus) flavimanus Stierlin, 1861 (N, Sa) (E)
Otiorhynchus (Arammichnus) hyblaeicus Magnano, 1992 (Si) (E)
Otiorhynchus (Arammichnus) indefinitus Reitter, 1912 (N, S) (E)
Otiorhynchus (Arammichnus) italicus Stierlin, 1888 (N?, S?) (E) (*)
Otiorhynchus (Arammichnus) juvenus Gyllenhal, 1834 (N, S, Si, Sa)

Otiorhynchus (Arammichnus) lacertosus Pesarini, 1975 (Si) (E)
Otiorhynchus (Arammichnus) linussae A. Solari & F. Solari, 1922 (Si) (E)
Otiorhynchus (Arammichnus) lopadusae A. Solari & F. Solari, 1922 (Si) (E)
Otiorhynchus (Arammichnus) lubricus Boheman, 1843
 Otiorhynchus (Arammichnus) lubricus ausonius Pesarini, 1974 (S) (E)
 Otiorhynchus (Arammichnus) lubricus lubricus Boheman, 1843 (Si)
Otiorhynchus (Arammichnus) matutinus Reitter, 1912 (S) (E)
Otiorhynchus (Arammichnus) meligunensis Magnano, 1992 (Si) (E)
Otiorhynchus (Arammichnus) neapolitanus Stierlin, 1861 (Si) (E)
Otiorhynchus (Arammichnus) ocellifer Reitter, 1912 (Si) (E)
Otiorhynchus (Arammichnus) pseudoumbilicatoides Magnano, 1993 (Si) (E)
Otiorhynchus (Arammichnus) reticollis Boheman, 1849 (Si) (E)
Otiorhynchus (Arammichnus) scabrosoides Stierlin, 1877 (Si) (E)
Otiorhynchus (Arammichnus) setosulus Stierlin, 1861 (Si) (E)
Otiorhynchus (Arammichnus) striatosetosulus Boheman, 1843 (Si) (E)
Otiorhynchus (Arammichnus) tuscoinsularis Magnano, 1992 (S) (E)
Otiorhynchus (Arammichnus) umbilicatoides Reitter, 1912 (Si) (E)
Otiorhynchus (Arammichnus) velutinus Germar, 1824 (N, S)
Otiorhynchus (Arammichnus) villosus Stierlin, 1883 (S)
Otiorhynchus (Arammichnus) vulturensis Lona, 1931 (S) (E)

***Troglorhynchus* Schmidt, 1854**

Troglorhynchus amicalis Osella, 1983 (E)
 Troglorhynchus amicalis amicalis Osella, 1983 (N)
 Troglorhynchus amicalis caoduroi Osella, 1983 (N)
 Troglorhynchus amicalis lessinicus Osella, 1983 (N)
Troglorhynchus andreinii F. Solari, 1932 (S) (E)
Troglorhynchus angelinii Osella, 1983 (S) (E)
Troglorhynchus anophthalmus Schmidt, 1854
 Troglorhynchus anophthalmus anophthalmus Schmidt, 1854 (N)
 Troglorhynchus anophthalmus istriensis F. Solari, 1954 (N)
Troglorhynchus aquilanus Osella, 1976 (S) (E)
Troglorhynchus baldensis Czwalińska, 1875 (N) (E)
Troglorhynchus blesioi Osella, 1983 (N) (E)
Troglorhynchus brixianus Osella, 1983 (N) (E)
Troglorhynchus camaldulensis Rottenberg, 1870 (S) (E)
Troglorhynchus carinatus Osella, 1983 (N) (E)
Troglorhynchus cirocchii Osella & Abbazzi, 1985 (S) (E)
Troglorhynchus doderoi A. Solari & F. Solari, 1903 (S) (E)
Troglorhynchus ferrarii F. Solari, 1955 (N) (E)
Troglorhynchus giaquintoii F. Solari, 1932 (S) (E)
Troglorhynchus giustii Osella, 1981 (S) (E)
Troglorhynchus hummleri Flack, 1899 (E)
 Troglorhynchus hummleri cheminii Osella, 1966 (S)
 Troglorhynchus hummleri hummleri Flack, 1899 (S)
Troglorhynchus judicariensis Osella, 1983 (N) (E)
Troglorhynchus latirostris Bargagli, 1871 (S) (E)

Troglorhynchus laurae A. Solari & F. Solari, 1907 (S) (E)
Troglorhynchus leonii A. Solari & F. Solari, 1908 (S) (E)
Troglorhynchus kahleni Osella, 1983 (E)
 Troglorhynchus kahleni kahleni Osella, 1983 (N)
 Troglorhynchus kahleni toscolanus Osella, 1983 (N)
 Troglorhynchus kahleni valvestinus Osella, 1983 (N)
Troglorhynchus magrinii Osella, 1979 (S) (E)
Troglorhynchus majusculus F. Solari, 1932 (S) (E)
Troglorhynchus microphthalmus A. Solari & F. Solari, 1908 (S) (E)
Troglorhynchus moczarskii Breit, 1913 (E)
 Troglorhynchus moczarskii comottii Osella, 1983 (N)
 Troglorhynchus moczarskii moczarskii Breit, 1913 (N)
Troglorhynchus monteionii Osella & Abbazzi, 1985 (S) (E)
Troglorhynchus pacei Osella, 1974 (S) (E)
Troglorhynchus pennisii Osella & Abbazzi, 1985 (S) (E)
Troglorhynchus phasma (Rottenberg, 1871) (Si) (E)
Troglorhynchus samniticus Osella, 1976 (S) (E)
Troglorhynchus sardous F. Solari, 1932 (Sa) (E)
Troglorhynchus stolzi Holdhaus, 1908 (S) (E)
Troglorhynchus taitii Abbazzi, Bartolozzi & Osella, 1992 (S) (E)
Troglorhynchus vailatii Osella, 1983 (N) (E)

Solariola Flach, 1908

Solariola doderoi F. Solari, 1923 (Si) (E)
Solariola gestroi (A. Solari & F. Solari, 1903) (S) (E)
 Solariola gestroi gestroi (A. Solari & F. Solari, 1903) (S)
 Solariola gestroi hirtula F. Solari, 1923 (S)
Solariola paganettii (Flach, 1905) (S) (E)
Solariola vitalei F. Solari, 1923 (Si) (E)

Stomodes Schönherr, 1826

Stomodes gyrosicollis (Boheman, 1843) (N, S)
Stomodes puncticollis Tournier, 1864
 Stomodes puncticollis amorei Desbrochers, 1904 (N, S) (E)
 Stomodes puncticollis lanzae F. Solari, 1947 (S) (E)
 Stomodes puncticollis puncticollis Tournier, 1864 (N)

Parameira Seidlitz, 1868

Parameira peritelina (Pesarini, 1970) (S) (E)

Simo Dejean, 1821

Simo astragali (Stierlin, 1861) (Sa) (E)
Simo cremieri (Boheman, 1843) (N, S, Si)
Simo grandis (Desbrochers, 1888) (S, Si) (E)

Simo hirticornis (Herbst, 1795) (N, S, Si)
Simo ignoratus (A. Solari & F. Solari, 1922) (Sa) (E)
Simo juniperi (Desbrochers, 1888) (Sa) (E)
Simo ottonis (Reitter, 1913) (Sa) (E)
Simo schoenherri (Boheman, 1843) (N)

Ctenochirus Seidlitz, 1890

Ctenochirus leucogrammus (Germar, 1824) (N)

Peritelus Germar, 1824

Peritelus grenieri Seidlitz, 1865 (Si) (E)
Peritelus noxius Boheman, 1843 (N, S)
Peritelus senex Boheman, 1843 (N)
Peritelus sphaeroides Germar, 1824 (N)

Meira Jacquelin du Val, 1852

Meira baudii Stierlin, 1892 (N, S) (E)
Meira elongatula Fairmaire, 1859 (N) (E)
Meira stierlini Sainte Claire Deville, 1906 (N)
Meira straneoi F. Solari, 1954 (S) (E)
Meira suturella Fairmaire, 1859 (N, S) (E)

Dolichomeira F. Solari, 1954

Dolichomeira amorei (A. Solari & F. Solari, 1905) (S) (E)
Dolichomeira kraatzi (Tournier, 1878) (Si) (E)
Dolichomeira microphthalma (Desbrochers, 1888) (Si) (E)
Dolichomeira nasuta Péricart, 1963 (Sa) (E)
Dolichomeira sassariensis (Desbrochers, 1888) (Sa) (E)
Dolichomeira seidlitzii (Desbrochers, 1888) (Sa) (E)

Heteromeira F. Solari, 1954

Heteromeira caprasiae (F. Solari, 1931) (S) (E)
Heteromeira latiscrobs (Desbrochers, 1871) (Sa) (E)
Heteromeira margheritae Bellò & Pierotti, 1992 (S) (E)
Heteromeira marianii Pesarini, 1972 (S) (E)
Heteromeira neapolitana (Faust, 1890) (S, Si) (E)
Heteromeira pacei Bellò & Pierotti, 1992 (Si) (E)
Heteromeira proxima F. Solari, 1954 (Sa) (E)
Heteromeira raffrayi (Pic, 1908) (S) (E)
Heteromeira sicula (Desbrochers, 1892) (Si) (E)
Heteromeira variegata (A. Solari & F. Solari, 1903) (N) (E)

Pseudomeira Stierlin, 1881

Pseudomeira andreae (Desbrochers, 1902) (N) (E)
Pseudomeira apula Bellò & Pierotti, 1992 (S) (E)
Pseudomeira binaghii F. Solari, 1954 (S) (E)
Pseudomeira clairi Stierlin, 1882 (N) (E)
Pseudomeira crassirostris F. Solari, 1954 (S, Si?) (E)
Pseudomeira doderoi F. Solari, 1954 (Si) (E)
Pseudomeira echidna (Seidlitz, 1865) (N, S) (E)
Pseudomeira exigua (Stierlin, 1861) (Si) (E)
Pseudomeira flavipennis (Jacquelin du Val, 1852) (E)
 Pseudomeira flavipennis flavipennis (Jacquelin du Val, 1852) (N)
 Pseudomeira flavipennis sicala (Seidlitz, 1865) (Si)
Pseudomeira holdhausi (A. Solari & F. Solari, 1907) (S) (E)
Pseudomeira incognita Osella & Gregori, 1989 (Sa) (E)
Pseudomeira ligurica (A. Solari & F. Solari, 1907) (N) (E)
Pseudomeira lostiae (Desbrochers, 1892) (Sa) (E)
Pseudomeira lucana Bellò & Pierotti, 1992 (S) (E)
Pseudomeira mancinii F. Solari, 1954 (S) (E)
Pseudomeira meles Bellò & Pierotti, 1992 (S) (E)
Pseudomeira obscura (A. Solari & F. Solari, 1907) (S, Si) (E)
Pseudomeira paganettii (A. Solari & F. Solari, 1907) (S) (E)
Pseudomeira parvula (Seidlitz, 1865) (S, Si?) (E)
Pseudomeira pfisteri (Stierlin, 1864) (Si) (E)
Pseudomeira pseudobscura Bellò & Pierotti, 1992 (S) (E)
Pseudomeira reitteri (Vitale, 1903) (Si) (E)
Pseudomeira rudis (Boheman, 1843) (N, S) (E)
Pseudomeira sardoa (Costa, 1884) (Sa) (E)
Pseudomeira silvestrii (A. Solari & F. Solari, 1907) (S) (E)
Pseudomeira sinuariae Osella & Gregori, 1989 (Sa) (E)
Pseudomeira solarii (Péricart, 1963) (Si) (E)
Pseudomeira transversicollis F. Solari, 1954 (Sa) (E)
Pseudomeira vitalei (Desbrochers, 1892) (Si) (E)

***Cathomiorcerus* Schönherr, 1843**

Cathomiorcerus curvipes Wollaston, 1854 (N)
Cathomiorcerus hircus Desbrochers, 1896 (Sa) (E)
Cathomiorcerus ragusae Vitale, 1904 (Si) (E)
Cathomiorcerus sardous Osella & Gregori, 1988 (Sa) (E)
Cathomiorcerus variegatus (Küster, 1849) (Sa)

***Trachyphloeus* Germar, 1817**

Trachyphloeus alternans Gyllenhal, 1834 (N, S, Si)
Trachyphloeus amicalis Borovec & Osella, 1993 (S) (E)
Trachyphloeus angustisetulus Hansen, 1985 (N, S)
Trachyphloeus apuanus A. Solari & F. Solari, 1905 (N, S) (E)
Trachyphloeus aristatus (Gyllenhal, 1827) (N)

Trachyphloeus asperatus Boheman, 1843 (N)
Trachyphloeus belloii Borovec & Osella, 1993 (Sa) (E)
Trachyphloeus bifoveolatus (Beck, 1817) (N, S, Si?, Sa?)
Trachyphloeus calabricus Borovec, 1986 (S)
Trachyphloeus fusciscapus Desbrochers, 1909 (Sa)
Trachyphloeus granulatus Seidlitz, 1868 (N)
Trachyphloeus heymesii Hubenthal, 1934 (N)
Trachyphloeus italicus Hoffmann, 1956 (N)
Trachyphloeus laticollis Boheman, 1843 (N, S, Si, Sa)
Trachyphloeus lotharii Borovec, 1991 (N)
Trachyphloeus mamillosus Formanek, 1909 (N)
Trachyphloeus margheritae Borovec & Osella, 1993 (Sa)
Trachyphloeus melitensis Borovec & Osella, 1993 (Si)
Trachyphloeus monspeliensis Hustache, 1932 (N, S)
Trachyphloeus nodipennis Chevrolat, 1860 (S, Si)
Trachyphloeus peyerimhoffi Formanek, 1910 (S, Sa)
Trachyphloeus pericarti Borovec, 1991 (Sa)
Trachyphloeus pierottii Borovec, 1993 (S) (E)
Trachyphloeus rectus Thomson, 1865 (N)
Trachyphloeus scabriculus (Linné, 1771) (N, S, Si)
Trachyphloeus setiger Seidlitz, 1868 (S, Si, Sa)
Trachyphloeus spinimanus Germar, 1824 (N, S, Sa)

Cyrtolepus Desbrochers, 1898

Cyrtolepus siculus (Seidlitz, 1868) (Si) (E)

Elytrodon Boheman, 1843

Elytrodon bidentatus (Steven, 1829) (S)
Elytrodon hyperoides Ragusa, 1904 (Si) (E)
Elytrodon italicus Pesarini, 1980 (S) (E)
Elytrodon luigionii Desbrochers, 1899 (S) (E)

Choerocephalus Chevrolat, 1861

Choerocephalus araneus (Flach, 1907) (S) (E)
Choerocephalus baudii (Stierlin, 1892) (Si) (E)
Choerocephalus procerus (Rottenberg, 1871) (Si?) (E)
Choerocephalus siculus (Ragusa, 1904) (Si) (E)

Omiias Germar, 1817

Omiias brancsiki (Reitter, 1906) (S)
Omiias focarilei (Pesarini, 1972) (S)
Omiias globulus (Boheman, 1843) (N, S)
Omiias haematopus (Rosenhauer, 1856) (N)
Omiias nitidulus (Vitale, 1904) (S, Si) (E)

Omiarotundatus (Fabricius, 1792) (N)

Omiamima Silfverberg, 1977

Omiamima concinna (Boheman, 1843) (N, S)

Omiamima fulgida (Formanek, 1909) (Sa) (E)

Omiamima heydeni (Tournier, 1884) (N) (E)

Omiamima metallescens (Seidlitz, 1868) (S, Si) (E)

Omiamima mollina (Boheman, 1843) (N)

Rhinomias Reitter, 1894

Rhinomias forticornis (Boheman, 1843) (N)

Argoptochus (Argoptochus) Weise, 1883

Argoptochus (Argoptochus) bisignatus (Germar, 1824) (N)

Argoptochus (Argoptochus) schwarzi (Reitter, 1888) (N, S) (E)

Pseudomyllocerus Desbrochers, 1873

Pseudomyllocerus cinerascens (Fabricius, 1792)

Pseudomyllocerus cinerascens cinerascens (Fabricius, 1792) (N)

Pseudomyllocerus cinerascens invreæ F. Solari, 1948 (N, S)

Pseudomyllocerus neapolitanus (Pic, 1901) (S, Si) (E)

Pseudomyllocerus sinuatus (Fabricius, 1801) (N, S?)

Oedecnemidius K. Daniel, 1903

Oedecnemidius pictus (Steven, 1829) (S?)

Phyllobius (Parnemoicus) Schilsky, 1911

Phyllobius (Parnemoicus) chloropus (Linné, 1758) (N, S)

Phyllobius (Parnemoicus) subdentatus Boheman, 1843

Phyllobius (Parnemoicus) subdentatus roboretanus Gredler, 1892 (N, S)

Phyllobius (Parnemoicus) subdentatus subdentatus Boheman, 1843 (S, Si) (E)

Phyllobius (Phyllobius) Germar, 1824

Phyllobius (Phyllobius) alpinus Stierlin, 1859 (N)

Phyllobius (Phyllobius) arborator (Herbst, 1797) (N, S)

Phyllobius (Phyllobius) emeryi Desbrochers, 1873 (S) (E)

Phyllobius (Phyllobius) etruscus Desbrochers, 1873 (N, S, Si) (E)

Phyllobius (Phyllobius) longipilis Boheman, 1843 (N, S, Si) (E)

Phyllobius (Phyllobius) maculicornis Germar, 1824

Phyllobius (Phyllobius) maculicornis lucanus A. Solari & F. Solari, 1903 (S, Si) (E)

Phyllobius (Phyllobius) maculicornis maculicornis Germar, 1824 (N, S)

Phyllobius (Phyllobius) pellitus Boheman, 1843 (Sa)
Phyllobius (Phyllobius) pilipes Desbrochers, 1873 (Sa) (E)
Phyllobius (Phyllobius) pyri (Linné, 1758)
 Phyllobius (Phyllobius) pyri italicus A. Solari & F. Solari, 1903 (S) (E)
 Phyllobius (Phyllobius) pyri pyri (Linné, 1758) (N, S)
 Phyllobius (Phyllobius) pyri reicheidius Desbrochers, 1873 (S, Si) (E)
Phyllobius (Phyllobius) romanus Faust, 1890 (S) (E)
Phyllobius (Phyllobius) vespertinus (Fabricius, 1792) (N, S, Sa)
Phyllobius (Phyllobius) virideaeris (Laicharting, 1781)
 Phyllobius (Phyllobius) virideaeris padanus Pesarini, 1974 (N) (E)
 Phyllobius (Phyllobius) virideaeris pedestris Schilsky, 1911 (S, Si) (E)

***Phyllobius (Metaphyllobius)* Smirnov, 1913**

Phyllobius (Metaphyllobius) calcaratus (Fabricius, 1792) (N)

***Phyllobius (Plagius)* Desbrochers, 1873**

Phyllobius (Plagius) pallidus (Fabricius, 1792) (S) (E)

***Phyllobius (Nemoicus)* Stephens, 1831**

Phyllobius (Nemoicus) oblongus (Linné, 1758) (N, S)

***Phyllobius (Italoscythropus)* Pesarini, 1980**

Phyllobius (Italoscythropus) raveræ A. Solari & F. Solari, 1904 (S) (E)

***Phyllobius (Dieletus)* Reitter, 1916**

Phyllobius (Dieletus) argentatus (Linné, 1758) (N, S)

***Parascythropus* Desbrochers, 1875**

Parascythropus baudii (Stierlin, 1892) (S) (E)

***Polydrusus (Leucodrosus)* Stierlin, 1884**

Polydrusus (Leucodrosus) sicanus Chevrolat, 1860 (Si) (E)
Polydrusus (Leucodrosus) tibialis Gyllenhal, 1834 (N, S)

***Polydrusus (Metallites)* Germar, 1824**

Polydrusus (Metallites) elegantulus (Boheman, 1840) (S, Si)
Polydrusus (Metallites) impar Gozis, 1882 (N, S)
Polydrusus (Metallites) inopinatus Binaghi, 1968 (N, S) (E)
Polydrusus (Metallites) marginatus Stephens, 1831 (N, S)
Polydrusus (Metallites) modestus Stierlin, 1864 (S, Si) (E)

Polydrusus (Metallites) pallidus (Gyllenhal, 1834) (N, S)
Polydrusus (Metallites) parallelus Chevrolat, 1860 (S, Sa)
Polydrusus (Metallites) pirazzolii Stierlin, 1857 (N, S, Si) (E)
Polydrusus (Metallites) scutellaris Chevrolat, 1860 (S, Si, Sa) (E)
Polydrusus (Metallites) subnotatus Schilsky, 1910 (S) (E)

Polydrusus (Chaerodrys) Jacquelin du Val, 1854

Polydrusus (Chaerodrys) derosasi Zumpt, 1933 (Sa) (E)
Polydrusus (Chaerodrys) setifrons Jacquelin du Val, 1852 (N)

Polydrusus (Conocetus) Desbrochers, 1902

Polydrusus (Conocetus) calabricus Faust, 1890 (S, Si)
Polydrusus (Conocetus) kahri Kirsch, 1865 (N, S)
Polydrusus (Conocetus) siculus Desbrochers, 1879 (S, Si) (E)

Polydrusus (Tylodrusus) Stierlin, 1884

Polydrusus (Tylodrusus) flavipes (De Geer, 1775) (N)
Polydrusus (Tylodrusus) pterygomalis Boheman, 1840 (N, S)
Polydrusus (Tylodrusus) viridicinctus Gyllenhal, 1834 (S)

Polydrusus (Eustolus) Thomson, 1859

Polydrusus (Eustolus) armipes Brullé, 1832
 Polydrusus (Eustolus) armipes faillae Desbrochers, 1859 (Si) (E)
Polydrusus (Eustolus) brevicollis Desbrochers, 1871 (S, Si) (E)
Polydrusus (Eustolus) cervinus (Linné, 1758) (N, S, Si)
Polydrusus (Eustolus) confluens Stephens, 1831 (N, S?)
Polydrusus (Eustolus) impressifrons Gyllenhal, 1834 (N, S)
Polydrusus (Eustolus) pilosus Gredler, 1866
 Polydrusus (Eustolus) pilosus italicus Schilsky, 1910 (S, Si) (E)
 Polydrusus (Eustolus) pilosus pilosus Gredler, 1866 (N, S)
Polydrusus (Eustolus) prasinus (Olivier, 1790) (N, S)
Polydrusus (Eustolus) solarii Pesarini, 1974 (S) (E)

Polydrusus (Thomsoneonymus) Desbrochers, 1902

Polydrusus (Thomsoneonymus) amplicollis Desbrochers, 1902 (N, S) (E)
Polydrusus (Thomsoneonymus) frater Rottenberg, 1871 (N, S, Si) (E)
Polydrusus (Thomsoneonymus) lateralis Gyllenhal, 1834 (N, S, Si) (E)
Polydrusus (Thomsoneonymus) lucianae Francia, 1985 (S) (E)
Polydrusus (Thomsoneonymus) neapolitanus Desbrochers, 1871 (N, S, Si) (E)
Polydrusus (Thomsoneonymus) raveriae A. Solari & F. Solari, 1904 (S) (E)
Polydrusus (Thomsoneonymus) sericeus (Schaller, 1783) (N, S)
Polydrusus (Thomsoneonymus) splendens A. Solari & F. Solari, 1908 (S) (E)

Polydrusus (Chlorodrosus) Daniel, 1898

- Polydrusus (Chlorodrosus) abeillei* Desbrochers, 1869
- Polydrusus (Chlorodrosus) abeillei abeillei* Desbrochers, 1869 (N)
- Polydrusus (Chlorodrosus) abeillei focarilei* Pesarini, 1975 (N) (E)
- Polydrusus (Chlorodrosus) alchemillae* Hustache, 1929 (N)
- Polydrusus (Chlorodrosus) amoenus* Germar, 1824 (N)
- Polydrusus (Chlorodrosus) bartolii* Pesarini, 1975 (E)
- Polydrusus (Chlorodrosus) bartolii bartolii* Pesarini, 1975 (N)
- Polydrusus (Chlorodrosus) bartolii gardinii* Bartoli, 1977 (N)
- Polydrusus (Chlorodrosus) emmae* G. Müller, 1928 (N)

Polydrusus (Piezocnemis) Chevrolat, 1869

- Polydrusus (Piezocnemis) paradoxus* Stierlin, 1859 (N)
- Polydrusus (Piezocnemis) pedemontanus* Chevrolat, 1869 (N)

Polydrusus (Eudipnus) Thomson, 1859

- Polydrusus (Eudipnus) auronitens* D'Amore, 1906 (S) (E)
- Polydrusus (Eudipnus) mollis* (Ström, 1768) (N, S)

Polydrusus (Metadrosus) Schilsky, 1910

- Polydrusus (Metadrosus) manteroi* A. Solari & F. Solari, 1903 (N) (E)

Polydrusus (Polydrusus) Germar, 1817

- Polydrusus (Polydrusus) leucaspis* Boheman, 1840 (Sa) (E)
- Polydrusus (Polydrusus) picus* (Fabricius, 1792) (S)
- Polydrusus (Polydrusus) ruficornis* (Bonsdorff, 1785) (N, S)
- Polydrusus (Polydrusus) sparsus* Gyllenhal, 1834 (N, S, Si, Sa)
- Polydrusus (Polydrusus) transalpinus* K. Daniel & J. Daniel, 1906 (N, S)

Pachyrhinus Schönherr, 1823

- Pachyrhinus lethierrhyi* (Desbochers, 1875) (Sa)
- Pachyrhinus mustela* (Herbst, 1797) (N)

Liophloeus Germar, 1817

- Liophloeus ophthalmicus* Stierlin, 1869 (N, S)
- Liophloeus tessulatus* (Müller, 1776) (N, S)

Barypeithes Jacquelin du Val, 1855

- Barypeithes araneiformis* (Schrank, 1781) (N, S)
- Barypeithes chevrolati* (Boheman, 1843) (N, S)

Barypeithes gracilipes (Panzer, 1798) (N, S) (E)
Barypeithes maritimus Formanek, 1904 (N)
Barypeithes metallicus Stierlin, 1868 (Si, Sa) (E)
Barypeithes mollicomus (Ahrens, 1812) (N)
Barypeithes virguncula Seidlitz, 1868 (N)

Chiloneus (Chiloneus) Schönherr, 1843

Chiloneus (Chiloneus) meridionalis (Boheman, 1838) (Si) (E)
Chiloneus (Chiloneus) solarii Pesarini, 1970 (Si) (E)

Chiloneus (Mylaconeus) Pesarini, 1970

Chiloneus (Mylaconeus) lonai Pesarini, 1970 (S, Si) (E)

Chilonorrhinus Reitter, 1915

Chilonorrhinus aliquoi Pesarini, 1974 (Si) (E)

Eusomus Germar, 1824

Eusomus ovulum Germar, 1824 (N, S)

Sciaphilus Schönherr, 1823

Sciaphilus asperatus (Bonsdorff, 1785) (N, S)

Brachyderes (Brachyderes) Schönherr, 1826

Brachyderes (Brachyderes) incanus (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa?)
Brachyderes (Brachyderes) pubescens Boheman, 1833 (Si, Sa)

Brachyderes (Sulciurus) Flach, 1907

Brachyderes (Sulciurus) lusitanicus (Fabricius, 1781) (S)

Brachysomus Schönherr, 1826

Brachysomus echinatus (Bonsdorff, 1785) (N, S)
Brachysomus hirtus Boheman, 1845 (N, S, Si, Sa)
Brachysomus hispidus Redtenbacher, 1849 (N)
Brachysomus setiger Gyllenhal, 1840 (N)
Brachysomus styriacus Formanek, 1905 (N)

Sciaphilomorphus F. Solari, 1948

Sciaphilomorphus aurosus (Boheman, 1845) (Si) (E)

Pseudometallites D'Amore, 1907

Pseudometallites doderoi D'Amore, 1907 (S) (E)

Pseudometallites murinus (Gyllenhal, 1834) (N?)

Sciaphobus K. Daniel, 1904

Sciaphobus abbreviatus (Desbrochers, 1871) (S) (E)

Sciaphobus barbatulus (Germar, 1824) (N)

Sciaphobus scitulus (Germar, 1824) (N)

Sciaphobus setosulus (Germar, 1824) (N)

Sciaphobus smaragdinus (Boheman, 1849) (N)

Stasiodis Gozis, 1886

Stasiodis parvulus (Fabricius, 1792) (N, S)

Caulostrophus (Caulostrophus) Fairmaire, 1859

Caulostrophus (Caulostrophus) caesipes A. Solari & F. Solari, 1905 (S)

Caulostrophus (Caulostrophus) ottomanus Fairmaire, 1859 (S)

Caulostrophus (Caulostrophus) subsulcatus (Boheman, 1833) (N, S, Si, Sa)

Strophosoma (Strophosoma) Billberg, 1820

Strophosoma (Strophosoma) capitatum (De Geer, 1775) (N)

Strophosoma (Strophosoma) erinaceum Chevrolat, 1865 (N, S)

Strophosoma (Strophosoma) melanogrammum (Forster, 1771) (N, S, Sa)

Strophosoma (Neliocarus) Thomson, 1859

Strophosoma (Neliocarus) faber (Herbst, 1785) (N)

Strophomorphus Seidlitz, 1867

Strophomorphus porcellus (Schönherr, 1832) (N, S, Si, Sa)

Parafoucartia F. Solari, 1948

Parafoucartia squamulata (Herbst, 1795)

Parafoucartia squamulata carsiana G. Müller, 1937 (N) (E)

Parafoucartia squamulata squamulata (Herbst, 1795) (N, S)

Philopedon Stephens, 1831

Philopedon plagiatum (Schaller, 1783) (S)

Leptolepurus Desbrochers, 1872

Leptolepurus meridionalis (Jacquelin du Val, 1854)
Leptolepurus meridionalis meridionalis (Jacquelin du Val, 1854) (S)
Leptolepurus meridionalis siculus Rottenberg, 1871 (Si) (E)

Pantomorus Schönherr, 1839

Pantomorus cervinus Boheman, 1840 (N, S, Si, Sa) (*)

Mesagroicus Schönherr, 1839

Mesagroicus occipitalis (Germar, 1824) (S)

Barynotus Germar, 1817

Barynotus affinis F. Solari, 1943 (N) (E)
Barynotus balianii F. Solari, 1943 (N) (E)
Barynotus conjux Daniel, 1898 (N) (E)
Barynotus fairmairei Tournier, 1876 (N)
Barynotus liguricus F. Solari, 1943 (N) (E)
Barynotus maculatus Boheman, 1842 (N) (E)
Barynotus mainardii F. Solari, 1943 (N, S) (E)
Barynotus mancinii F. Solari, 1943 (N) (E)
Barynotus margaritaceus Germar, 1824 (N)
Barynotus maritimus Hustache, 1920 (N)
Barynotus obscurus (Fabricius, 1775) (N, S, Si)
Barynotus solarii Mainardi, 1907 (S) (E)

Sitona (Charagmus) Schönherr, 1826

Sitona (Charagmus) cachectus (Gyllenhal, 1834) (Sa)
Sitona (Charagmus) gressorius (Fabricius, 1792) (N, S, Si)
Sitona (Charagmus) griseus (Fabricius, 1775) (Si)
Sitona (Charagmus) intermedius (Küster, 1847) (N, S, Si, Sa)
Sitona (Charagmus) variegatus (Fåhræus, 1840) (S, Si, Sa)

Sitona (Sitona) Germar, 1817

Sitona (Sitona) burlinii F. Solari, 1948 (N)
Sitona (Sitona) cambricus Stephens, 1831 (N, S)
Sitona (Sitona) cinerascens (Fåhræus, 1840) (N, S, Si, Sa)
Sitona (Sitona) cinnamomeus (Allard, 1863) (S, Si, Sa)
Sitona (Sitona) cylindricollis (Fåhræus, 1840) (N, S)
Sitona (Sitona) discoideus (Gyllenhal, 1834) (N, S, Si, Sa)
Sitona (Sitona) gemellatus (Gyllenhal, 1834) (N, S, Si, Sa)
Sitona (Sitona) goetzelmanni A. Solari & F. Solari, 1909 (S) (E)
Sitona (Sitona) hirsutus Desbrochers, 1884 (S, Si, Sa)
Sitona (Sitona) hispidulus (Fabricius, 1777) (N, S)

Sitona (Sitona) humeralis Stephens, 1831 (N, S)
Sitona (Sitona) inops (Gyllenhal, 1832) (N, Si)
Sitona (Sitona) languidus (Gyllenhal, 1834) (N)
Sitona (Sitona) lepidus (Gyllenhal, 1834) (N, S)
Sitona (Sitona) limosus (Rossi, 1792) (N, S)
Sitona (Sitona) lineatus (Linné, 1758) (N, S)
Sitona (Sitona) lineellus (Bosdorff, 1785)
 Sitona (Sitona) lineellus lineellus (Bosdorff, 1785) (N, S)
 Sitona (Sitona) lineellus samniticus F. Solari, 1948 (S) (E)
Sitona (Sitona) lividipes (Fåhraeus, 1840) (S, Si, Sa)
Sitona (Sitona) longulus (Gyllenhal, 1834) (N)
Sitona (Sitona) macularius (Marsham, 1802) (N, S)
Sitona (Sitona) obscuratus Faust, 1882 (N)
Sitona (Sitona) ophthalmicus Desbrochers, 1869 (N, S)
Sitona (Sitona) puberulus Reitter, 1903 (N, S, Si)
Sitona (Sitona) puncticollis Stephens, 1831 (N, S, Si, Sa)
Sitona (Sitona) ragusae Reitter, 1903 (N, S, Si)
Sitona (Sitona) regensteinensis (Herbst, 1797) (N, S)
Sitona (Sitona) sekerae Reitter, 1903 (N, S) (E)
Sitona (Sitona) striatellus (Gyllenhal, 1834) (N, S)
Sitona (Sitona) sulcifrons (Thunberg, 1798)
 Sitona (Sitona) sulcifrons argutulus (Gyllenhal, 1834) (N, S)
Sitona (Sitona) suturalis Stephens, 1831 (N, S)
Sitona (Sitona) tenuis (Rosenhauer, 1847) (N, S, Si?)
Sitona (Sitona) treneri F. Solari, 1948 (N) (E)
Sitona (Sitona) verecundus (Rossi, 1790) (N, S, Si, Sa)
Sitona (Sitona) virgatus (Fåhraeus, 1840) (S, Si, Sa)
Sitona (Sitona) waterhousei (Walton, 1846) (N, Si)

Psolidium Illiger, 1807

Psolidium maxillosum (Fabricius, 1792) (N)

Tropiphorus Schönherr, 1842

Tropiphorus bertolinii Stierlin, 1894 (N) (E)
Tropiphorus cucullatus Fauvel, 1888 (N, S)
Tropiphorus elevatus (Herbst, 1795) (N, S)
Tropiphorus obtusus (Bosdorff, 1785) (N, S)
Tropiphorus ochraceosignatus Boheman, 1842 (N, S)
Tropiphorus styriacus Bedel, 1883 (N)
Tropiphorus terricola (Newman, 1838) (N, S)

Cycloderes Sahlberg, 1823

Cycloderes argenteus (Perris, 1866) (Si)
Cycloderes beloni (Desbrochers, 1871) (Si)
Cycloderes canescens (Rossi, 1792) (N, S, Si, Sa)

Cycloderes depilis (Fairmaire, 1863) (N, S, Sa)
Cycloderes doderoi F. Solari, 1953 (Sa) (E)
Cycloderes dubius (Desbrochers, 1871) (Sa) (E)
Cycloderes lostiae (Desbrochers, 1894) (Sa) (E)
Cycloderes musculus Pesarini, 1980 (Si) (E)
Cycloderes pominii F. Solari, 1953 (S) (E)
Cycloderes setosulus (Halbherr, 1896) (N)
Cycloderes sicanus (Desbrochers, 1903) (Si) (E)
Cycloderes siculus (Desbrochers, 1871) (Si) (E)

Chlorophanus Sahlberg, 1823

Chlorophanus gibbosus (Paykull, 1792) (N)
Chlorophanus graminicola Schönherr, 1832 (N, S)
Chlorophanus viridis (Linné, 1758)
 Chlorophanus viridis balcanicus Behne, 1989 (N)
 Chlorophanus viridis viridis (Linné, 1758) (N, S)

Tanymecus (Tanymecus) Germar, 1823

Tanymecus (Tanymecus) palliatus (Fabricius, 1787) (N, S, Sa)
Tanymecus (Tanymecus) revelierei Tournier, 1874 (N, S) (E)

Tanymecus (Geomecus) Reitter, 1903

Tanymecus (Geomecus) fausti Desbrochers, 1884 (Si)
Tanymecus (Geomecus) submaculatus Chevrolat, 1860 (S, Si)

Gonipterus Schönherr, 1833

Gonipterus scutellatus Gyllenhal, 1833 (N, S) (*)

Metacinops Kraatz, 1862

Metacinops calabrus Stierlin, 1862 (S) (E)

Auchmerestes Kraatz, 1862

Auchmerestes kiesenwetteri Kraatz, 1862 (S, Si)

Haptomerus Faust, 1889

Haptomerus siculus Kraatz, 1859 (S, Si) (E)

Conorhynchus Motschulsky, 1860

Conorhynchus conicirostris (Olivier, 1807) (Si, Sa)
Conorhynchus luigionii A. Solari & F. Solari, 1905 (N, S, Si?, Sa?)

Temnorhinus Chevrolat, 1873

Temnorhinus brevirostris (Gyllenhal, 1834) (Si, Sa)
Temnorhinus mendicus (Gyllenhal, 1834) (N, S, Si, Sa)
Temnorhinus menozzii F. Solari, 1950 (S) (E)

Gonocleonus Chevrolat, 1873

Gonocleonus helferi Chevrolat, 1873 (Si) (E)

Stephanocleonus Motschulsky, 1860

Stephanocleonus cicatricosus (Hoppe, 1795) (N)
Stephanocleonus excoriatus (Gyllenhal, 1834) (N, S, Si, Sa)
Stephanocleonus hollbergi (Fåhræus, 1842) (N)
Stephanocleonus megalographus (Fåhræus, 1842) (N, S, Si, Sa)
Stephanocleonus nebulosus (Linné, 1758) (N, Sa)
Stephanocleonus nigrosuturatus (Goeze, 1777) (Si)
Stephanocleonus pseudobliquus (G. Müller, 1921) (N, S, Si)
Stephanocleonus sulcicollis (Fåhræus, 1842) (Si, Sa) (E)
Stephanocleonus tabidus (Olivier, 1807) (N, S, Si, Sa)
Stephanocleonus variolosus Wollaston, 1864 (Si)

Bothynoderes Schönherr, 1826

Bothynoderes albicans Gyllenhal, 1834 (N, S, Si, Sa)
Bothynoderes andreae Colonnelli, 1991 (S) (E)
Bothynoderes crotchii Chevrolat, 1873 (S, Sa)
Bothynoderes meridionalis Chevrolat, 1873 (N)
Bothynoderes punctiventris (Germar, 1824) (N, S)

Leucomigus Motschulsky, 1860

Leucomigus candidatus (Pallas, 1781)
Leucomigus candidatus tessellatus (Fairmaire, 1849) (Sa)

Chromoderus Motschulsky, 1860

Chromoderus affinis (Schränk, 1781) (N, S, Si)

Leucosomus Motschulsky, 1860

Leucosomus occidentalis Dieckmann, 1982 (N)
Leucosomus pedestris (Poda, 1761) (N, S, Si)

Mecaspis Schönherr, 1826

Mecaspis alternans (Herbst, 1795) (N, S, Si, Sa)
Mecaspis caesus (Gyllenhal, 1834) (N)
Mecaspis emarginatus (Fabricius, 1787) (N, S)
Mecaspis nanus Gyllenhal, 1834 (S, Si, Sa)
Mecaspis striatellus (Fabricius, 1792) (N, Si)

Liocleonus Motschulsky, 1860

Liocleonus clathratus (Olivier, 1807) (Si?)

Pseudocleonus Chevrolat, 1873

Pseudocleonus carinatus (Gyllenhal, 1834) (S, Si, Sa)
Pseudocleonus cinereus (Schränk, 1781) (N, S, Si, Sa)
Pseudocleonus grammicus (Panzer, 1789)
 Pseudocleonus grammicus grammicus (Panzer, 1789) (N)
 Pseudocleonus grammicus adriaticus G. Müller, 1940 (N) (E)
Pseudocleonus italicus F. Solari, 1950 (S) (E)
Pseudocleonus senilis (Rosenhauer, 1856) (S, Si, Sa)

Pachycerus Schönherr, 1826

Pachycerus borrae F. Solari, 1950 (N) (E)
Pachycerus cordiger (Germar, 1819) (N, S, Si, Sa)
Pachycerus madidus (Olivier, 1807) (N, S, Si)
Pachycerus planirostris (Gyllenhal, 1834) (N, Si, Sa)

Rabdorrhynchus Motschulsky, 1860

Rabdorrhynchus menetriesi (Gyllenhal, 1834) (N, S, Si)
Rabdorrhynchus mixtus (Fabricius, 1793) (N, Sa)
Rabdorrhynchus varius (Herbst, 1795) (N, S)

Cyphocleonus Motschulsky, 1860

Cyphocleonus achates (Fåhræus, 1842) (S)
Cyphocleonus dealbatus (Gmelin, 1790) (N, S, Si)
Cyphocleonus morbillosus (Fabricius, 1792) (N, S, Si, Sa)
Cyphocleonus sparsus (Gyllenhal, 1834) (S)
Cyphocleonus trisulcatus (Herbst, 1795) (N, S, Si)

Cleonis Dejean, 1821

Cleonis pigra (Scopoli, 1763) (N, S, Si, Sa)
Cleonis sardoa Chevrolat, 1869 (Sa) (E)

Adosomus Faust, 1904

Adosomus roridus (Pallas, 1781) (N)

Lixomorphus Faust, 1904

Lixomorphus algirus (Linné, 1758) (S, Si, Sa)

Trachydemus Chevrolat, 1873

Trachydemus rugosus (Lucas, 1849) (S, Si, Sa)

Lixus (Lixus) Fabricius, 1801

Lixus (Lixus) paraplecticus (Linné, 1758) (N, S)

Lixus (Eulixus) Reitter, 1916

Lixus (Eulixus) bidens Capiomont, 1873 (S, Si)
Lixus (Eulixus) brevipes C. Brisout, 1866 (N, S)
Lixus (Eulixus) brevirostris Boheman, 1836 (N, S, Si, Sa)
Lixus (Eulixus) iridis Olivier, 1807 (N, S, Si, Sa)
Lixus (Eulixus) lateralis (Panzer, 1793) (N, S, Si, Sa)
Lixus (Eulixus) myagri Olivier, 1807 (N, S, Si, Sa)
Lixus (Eulixus) scabricollis Boheman, 1843 (N, S, Si, Sa)
Lixus (Eulixus) siculus Boheman, 1836 (Si) (E)
Lixus (Eulixus) subtilis Boheman, 1836 (N)
Lixus (Eulixus) umbellatarum (Fabricius, 1787) (S, Si, Sa)

Lixus (Ortholixus) Reitter, 1916

Lixus (Ortholixus) acicularis Germar, 1824 (N, S, Si, Sa)
Lixus (Ortholixus) angustus (Herbst, 1795) (N, S, Si, Sa)
Lixus (Ortholixus) curvirostris Capiomont, 1874 (S, Sa)
Lixus (Ortholixus) elegantulus Boheman, 1843 (N, S)
Lixus (Ortholixus) mucronatus Olivier, 1807 (N, S, Si, Sa)
Lixus (Ortholixus) rosenschoeldi Boheman, 1843 (S)
Lixus (Ortholixus) tibialis Boheman, 1843 (S)

Lixus (Compsolixus) Reitter, 1916

Lixus (Compsolixus) albomarginatus Boheman, 1843 (N, S)
Lixus (Compsolixus) anguinus (Linné, 1767) (N, S, Si, Sa)
Lixus (Compsolixus) ascanii (Linné, 1767) (N, S, Si)
Lixus (Compsolixus) junci Boheman, 1836 (N, S, Si, Sa)
Lixus (Compsolixus) ochraceus Boheman, 1843 (N, S, Si)

Lixus (Callistolixus) Reitter, 1916

Lixus (Callistolixus) cylindrus (Fabricius, 1781) (N, S, Si)

Lixus (Callistolixus) furcatus Olivier, 1807 (S, Si)

***Lixus (Lixoglyptus)* Reitter, 1916**

Lixus (Lixoglyptus) spartii Olivier, 1807 (N?, S)

***Lixus (Dilixellus)* Reitter, 1916**

Lixus (Dilixellus) angustatus (Fabricius, 1775) (N, S, S, Sa)

Lixus (Dilixellus) bardanae (Fabricius, 1787) (N, S, Si, Sa)

Lixus (Dilixellus) cribricollis Boheman, 1836 (N, S, Si)

Lixus (Dilixellus) fasciculatus Boheman, 1836 (N, S)

Lixus (Dilixellus) ferrugatus Olivier, 1807 (N)

Lixus (Dilixellus) meregallii Fremuth, 1983 (S) (E)

Lixus (Dilixellus) punctiventris Boheman, 1836 (N, S, Si, Sa)

Lixus (Dilixellus) rubicundus Zoubkoff, 1833 (N, S)

Lixus (Dilixellus) speciosus Miller, 1861 (S)

Lixus (Dilixellus) vilis (Rossi, 1790) (N, S, Si, Sa)

***Lixus (Lixochelus)* Reitter, 1924**

Lixus (Lixochelus) cardui (Olivier, 1808) (N, S, Si, Sa)

Lixus (Lixochelus) filiformis (Fabricius, 1781) (N, S, Si, Sa)

Lixus (Lixochelus) lutescens Capiomont, 1874 (S)

Lixus (Lixochelus) nigricornis Desbrochers, 1893 (Si)

Lixus (Lixochelus) scolopax Boheman, 1836 (N, S, Sa)

Lixus (Lixochelus) ulcerosus Petri, 1904 (Si)

***Lixus (Hypolixus)* Desbrochers, 1898**

Lixus (Hypolixus) augurius Boheman, 1836 (S, Si, Sa)

***Larinus (Larinus)* Germar, 1824**

Larinus (Larinus) brevis (Herbst, 1795) (N, S)

Larinus (Larinus) buccinator (Olivier, 1807) (Si, Sa)

Larinus (Larinus) carinirostris Gyllenhal, 1836 (N, S, Si, Sa)

Larinus (Larinus) cynarae (Fabricius, 1787) (N, S, S, Sa)

Larinus (Larinus) genei Boheman, 1907 (S, Si, Sa) (E)

Larinus (Larinus) maurus (Olivier, 1808) (S, Si)

Larinus (Larinus) siculus Boheman, 1843 (Si)

Larinus (Larinus) ursus (Fabricius, 1792) (N, S, Si, Sa)

Larinus (Larinus) vulpes (Olivier, 1808) (S, Si)

***Larinus (Larinodontes)* Faust, 1898**

Larinus (Larinodontes) albocinctus Chevrolat, 1866 (Si)

Larinus (Larinodontes) brenskei Faust, 1900 (Si)

Larinus (Larinodontes) griseus Gyllenhal, 1836 (S, Si)
Larinus (Larinodontes) jaceae (Fabricius, 1775) (N, S, Si)
Larinus (Larinodontes) longirostris Gyllenhal, 1836 (N, S, Si)
Larinus (Larinodontes) planus (Fabricius, 1792) (N, S, Si)
Larinus (Larinodontes) rusticanus Gyllenhal, 1836 (S, Si, Sa)
Larinus (Larinodontes) sturnus (Schaller, 1783) (N, S, Si, Sa)
Larinus (Larinodontes) turbinatus Gyllenhal, 1836 (N, S, Si, Sa)

***Larinus (Larinomesius)* Reitter, 1924**

Larinus (Larinomesius) australis Capiomont, 1874 (N)
Larinus (Larinomesius) curtus Hochhut, 1851 (S, Si)
Larinus (Larinomesius) flavescens Germar, 1824 (S, Si, Sa)
Larinus (Larinomesius) obtusus Gyllenhal, 1836 (N, S, Si)
Larinus (Larinomesius) scolymi (Olivier, 1808) (N, S, Si, Sa)

***Larinus (Cryphopus)* Petri, 1907**

Larinus (Cryphopus) canescens Gyllenhal, 1836
Larinus (Cryphopus) canescens pulvinatus Petri, 1907 (N, S)
Larinus (Cryphopus) ferrugatus Gyllenhal, 1836 (N, S, Si)
Larinus (Cryphopus) rugulosus Petri, 1907 (N)

***Lachnaeus* Schönherr, 1826**

Lachnaeus crinitus Boheman, 1836 (N, S, Si)

***Bangasternus* Gozis, 1886**

Bangasternus fausti (Reitter, 1890) (S)
Bangasternus orientalis (Capiomont, 1873) (S)
Bangasternus provincialis (Fairmaire, 1863) (N, S, Si)
Bangasternus sculus (Capiomont, 1873) (Si)

***Rhinocyllus* Germar, 1819**

Rhinocyllus conicus (Frölich, 1792) (N, S, Si, Sa)
Rhinocyllus oblongus Capiomont, 1873 (S)

***Microlarinus* Hochhut, 1847**

Microlarinus lareynii (Jacquelin du Val, 1852) (S, Si)
Microlarinus lypriformis Wollaston, 1861 (Si)

***Horridorhinus* F. Solari, 1940**

Horridorhinus asper (Allard, 1870) (Si)
Horridorhinus deformis (Reiche, 1858) (S, Si)

Pseudorhinus Melichar, 1923

- Pseudorhinus impressicollis* (Boheman, 1834)
- Pseudorhinus impressicollis jarrigei* Roudier, 1959 (N)
- Pseudorhinus impressicollis luciae* (Ragusa, 1883) (Si) (E)
- Pseudorhinus impressicollis peninsularis* F. Solari, 1940 (S) (E)
- Pseudorhinus laesirostris* (Fairmaire, 1859) (Sa)

Gronops Schönherr, 1826

- Gronops lunatus* (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa)

Asperogronops F. Solari, 1940

- Asperogronops olmii* Meregalli, 1983 (N) (E)

Dichotrachelus Stierlin, 1853

- Dichotrachelus alpestris* Stierlin, 1878 (N)
- Dichotrachelus augusti* F. Solari, 1946 (N) (E)
- Dichotrachelus baldensis* Barajon, 1946 (N) (E)
- Dichotrachelus baudii* (Seidlitz, 1875) (N)
- Dichotrachelus bensae* A. Solari & F. Solari, 1903 (S) (E)
- Dichotrachelus bischoffi* Stierlin, 1878 (N) (E)
- Dichotrachelus doderoi* A. Solari & F. Solari, 1905
 - Dichotrachelus doderoi doderoi* A. Solari & F. Solari, 1905 (N)
 - Dichotrachelus doderoi valdieriensis* Osella, 1967 (N) (E)
- Dichotrachelus freyi* Stierlin, 1878 (N) (E)
- Dichotrachelus grignensis* Breit, 1902 (N) (E)
- Dichotrachelus imhoffi* Stierlin, 1857 (N) (E)
- Dichotrachelus lepontinus* Osella, 1971 (N) (E)
- Dichotrachelus manuelei* Marseul, 1871 (N) (E)
- Dichotrachelus margaritae* Osella, 1967 (N) (E)
- Dichotrachelus meregallii* Osella, 1971 (N) (E)
- Dichotrachelus philippi* Osella, Bellò & Pogliano, 1983 (N) (E)
- Dichotrachelus pygmaeus* Stierlin, 1888 (N) (E)
- Dichotrachelus ragusae* A. Solari & F. Solari, 1906 (Si) (E)
- Dichotrachelus rossettoi* Meregalli & Osella, 1975 (N) (E)
- Dichotrachelus rudeni* Stierlin, 1853 (N)
- Dichotrachelus sardous* A. Solari & F. Solari, 1903 (Sa) (E)
- Dichotrachelus stierlini* Gredler, 1856
 - Dichotrachelus stierlini stierlini* Gredler, 1856 (N)
 - Dichotrachelus stierlini knechti* Stierlin, 1875 (N)
- Dichotrachelus sulcipennis* Stierlin, 1853
 - Dichotrachelus sulcipennis sulcipennis* Stierlin, 1853 (N)
 - Dichotrachelus sulcipennis bernhardinus* Stierlin, 1878 (N)
 - Dichotrachelus sulcipennis pedemontanus* Stierlin, 1878 (N) (E)

Dichotrachelus valesiacus Stierlin, 1878 (N)
Dichotrachelus variegatus K. Daniel & J. Daniel, 1898 (E)
 Dichotrachelus variegatus variegatus K. Daniel & J. Daniel, 1898 (S)
 Dichotrachelus variegatus milettianus Osella, 1971 (S)
Dichotrachelus vignai Osella, 1967 (N)
Dichotrachelus vulpinus Gredler, 1857
 Dichotrachelus vulpinus vulpinus Gredler, 1857 (N) (E)
 Dichotrachelus vulpinus liegeli Penecke, 1894 (N)
Dichotrachelus walteri Barajon, 1947 (N) (E)

Hypera Germar, 1821

Hypera adspersa (Fabricius, 1792) (N, S)
Hypera arator (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)
Hypera constans (Boheman, 1834) (N, S, Si, Sa)
Hypera contaminata (Herbst, 1795) (S)
Hypera dauci (Olivier, 1807) (N, S, Si)
Hypera diversipunctata (Schränk, 1798) (N, Si)
Hypera fasciculata (De Geer, 1775) (N, S, Si, Sa)
Hypera fuscocinerea (Marsham, 1802) (N, S, Si, Sa)
Hypera isabellina (Boheman, 1834) (Si)
Hypera jucunda (Capiomont, 1868) (Si)
Hypera lunata Wollaston, 1854 (S, Si)
Hypera maculipennis (Fairmaire, 1859) (S, Si, Sa)
Hypera meles (Fabricius, 1792) (N, S, Si, Sa)
Hypera nigrirostris (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa)
Hypera ononidis (Chevrolat, 1863) (N)
Hypera pastinacae (Rossi, 1790) (N, S, Si, Sa)
Hypera plantaginis (De Geer, 1775) (N, S, Si, Sa)
Hypera postica (Gyllenhal, 1813) (N, S, Si, Sa)
Hypera rumicis (Linné, 1758) (N, S, Sa)
Hypera scolymi (Capiomont, 1868) (Si)
Hypera signata (Boheman, 1834) (S)
Hypera striata (Boheman, 1834) (N, S, Si, Sa)
Hypera suspiciosa (Herbst, 1795) (N, S, Si, Sa)
Hypera triangularis (Petri, 1801) (N, S, Si)
Hypera venusta (Fabricius, 1781) (N, S, Si, Sa)
Hypera viciae (Gyllenhal, 1813) (N, S)
Hypera vidua (Gené, 1837) (N, S)
Hypera zoilus (Scopoli, 1763) (N, S, Si, Sa)

Donus Jekel, 1864

Donus apfelbecki Petri, 1901 (S)
Donus austerus (Boheman, 1834) (Si, Sa)
Donus bosnicus (Petri, 1901) (N)
Donus brucki (Capiomont, 1868) (N, S, Si) (E)
Donus cyrtus Germar, 1821 (S, Si)

Donus circumvagus (Boheman, 1834) (Si)
Donus comatus (Boheman, 1842) (N)
Donus crinitus (Boheman, 1834) (N, S, Si, Sa)
Donus fiumanus (Petri, 1901) (N, S)
Donus globosus (Fairmaire, 1858) (N)
Donus intermedius (Boheman, 1842) (N, S)
Donus oblongus (Boheman, 1840) (S, Si) (E)
Donus ovalis (Boheman, 1842) (N, S?)
Donus oxalidis (Herbst, 1795) (N)
Donus palumbarius (Germar, 1821) (N)
Donus philanthus (Olivier, 1808) (N, S, Si, Sa)
Donus salviae (Schrank, 1790) (N, S, Si)
Donus segnis (Capiomont, 1868) (N)

Limobius Schönherr, 1847

Limobius borealis (Paykull, 1792) (N, S, Si, Sa)

Coniatus (Coniatus) Germar, 1821

Coniatus (Coniatus) repandus (Fabricius, 1792) (N?, Si, Sa)
Coniatus (Coniatus) tamarisci (Fabricius, 1787) (N, S, Si, Sa)

Coniatus (Bagoides) Capiomont, 1868

Coniatus (Bagoides) suavis Gyllenhal, 1834 (N, S, Si, Sa)

Rhytideres Schönherr, 1826

Rhytideres plicatus (Olivier, 1790) (N, S, Si, Sa)

Alophus Schönherr, 1826

Alophus austriacus Otto, 1894 (N)
Alophus kaufmanni Stierlin, 1884
 Alophus kaufmanni kaufmanni Stierlin, 1884 (N)
 Alophus kaufmanni albidus Fiori, 1905 (S, Si?) (E)
Alophus nictitans Boheman, 1842
 Alophus nictitans singularis Jacquelin du Val, 1854 (S, Si)
Alophus triguttatus (Fabricius, 1775) (N)
Alophus weberi Penecke, 1901
 Alophus weberi italicus Fiori, 1905 (S) (E)

Lepyrus Germar, 1817

Lepyrus armatus Weise, 1893 (N, S)
Lepyrus capucinus (Schaller, 1783) (N, S)
Lepyrus palustris (Scopoli, 1763) (N, S, Si?)

Lepyrus variegatus Schmidt, 1850 (N)

Hylobitelus Reitter, 1923

Hylobitelus abietis (Linné, 1758) (N, S, Si)

Hylobitelus pinastri (Gyllenhal, 1813) (N)

Hylobitelus transversovittatus (Goeze, 1777) (N, S, Si)

Hylobius Germar, 1817

Hylobius piceus (De Geer, 1775) (N)

Liparus (Liparus) Olivier, 1807

Liparus (Liparus) baldensis Reitter, 1896 (E)

Liparus (Liparus) baldensis baldensis Reitter, 1896 (N)

Liparus (Liparus) baldensis ruffoi Magnano, 1948 (N)

Liparus (Liparus) coronatus (Goeze, 1777) (N, S, Si)

Liparus (Liparus) dirus (Herbst, 1795) (N, S)

Liparus (Liparus) engadinensis Reitter, 1897 (N)

Liparus (Liparus) germanus (Linné, 1758) (N, S)

Liparus (Liparus) glabrirostris Küster, 1849 (N)

Liparus (Liparus) grappensis Grandi, 1907 (E)

Liparus (Liparus) grappensis grappensis Grandi, 1907 (N)

Liparus (Liparus) grappensis pedemontanus F. Solari, 1933 (N)

Liparus (Liparus) illyricus Gyllenhal, 1834 (N)

Liparus (Liparus) interruptus Magnano, 1955 (S) (E)

Liparus (Liparus) mariae Grandi, 1907 (S) (E)

Liparus (Liparus) petrii Reitter, 1896 (N)

Liparus (Liparus) solarii Magnano, 1975 (N)

Anisorhynchus Schönherr, 1842

Anisorhynchus barbarus Boheman, 1834

Anisorhynchus barbarus sturmi Boheman, 1842 (S, Si)

Anisorhynchus barbatus (Rossi, 1792) (N, S, Si, Sa)

Anisorhynchus costatus Boheman, 1842 (Sa) (E)

Anisorhynchus monachus (Germar, 1817) (S, Si, Sa)

Leiosoma Stephens, 1831

Leiosoma apenninicola Hoffmann, 1961 (S) (E)

Leiosoma bedeli K. Daniel, 1906 (N, S) (E)

Leiosoma concinnum Boheman, 1842 (N, S)

Leiosoma cribrum (Gyllenhal, 1834) (N, S)

Leiosoma deflexum (Panzer, 1795) (N)

Leiosoma kirschi Gredler, 1866 (N)

Leiosoma oblongulum Boheman, 1842 (N, S)

Leiosoma scrobiferum Rottenberg, 1871 (E)
 Leiosoma scrobiferum baudii Bedel, 1884 (N, S)
 Leiosoma scrobiferum scrobiferum Rottenberg, 1871 (Si)
Leiosoma stierlini Tournier, 1860 (Si) (E)
Leiosoma subcoriaceum K. Daniel, 1906 (N)

Plinthus Germar, 1817

Plinthus findeli Boheman, 1842 (N, S)
Plinthus griseus (Reitter, 1890) (N)
Plinthus illigeri Germar, 1824
 Plinthus illigeri illigeri Germar, 1824 (N, S)
 Plinthus illigeri colonnellii Meregalli, 1985 (S) (E)
Plinthus megerlei (Panzer, 1794) (N, S)
Plinthus squalidus Gyllenhal, 1834
 Plinthus squalidus granulipennis (Fairmaire, 1852) (N, S, Si)

Neoplinthus Bedel, 1884

Neoplinthus caprae F. Solari, 1941 (N) (E)
Neoplinthus dentimanus F. Solari, 1941 (N) (E)
Neoplinthus mancinii F. Solari, 1941 (N) (E)
Neoplinthus mucronatus (Rosenhauer, 1847) (N) (E)
Neoplinthus tigratus (Rossi, 1792)
 Neoplinthus tigratus tigratus (Rossi, 1792) (S) (E)
 Neoplinthus tigratus granulatus (Boheman, 1842) (N) (E)
 Neoplinthus tigratus porcatus (Panzer, 1798) (N)
 Neoplinthus tigratus tridentinus F. Solari, 1941 (N) (E)

Mitoplinthus Reitter, 1897

Mitoplinthus caliginosus (Fabricius, 1775) (N)
Mitoplinthus pubescens (Petri, 1796) (N, S)

Hoplopteridius Daniel, 1898

Hoplopteridius lutosus (E. Frivaldszky, 1835)
 Hoplopteridius lutosus bertolinii Stierlin, 1892 (S) (E)
 Hoplopteridius lutosus calaber Osella & Lodos, 1979 (S) (E)

Minyops Schönherr, 1826

Minyops carinatus (Linné, 1767) (N, S, Si)

Aparopion Bedel, 1884

Aparopion costatum (Fåhræus, 1843) (N, S)
Aparopion suturidens Reitter, 1891 (S, Si)

Adexius Schönherr, 1834

Adexius scrobipennis Gyllenhal, 1834 (N)

Ruffodytes Osella, 1973

Ruffodytes italicus Osella, 1976 (S) (E)

Ruffodytes pacei Osella, 1976 (S) (E)

Ruffodytes servadeii Osella, 1982 (S) (E)

Absoloniella Formanek, 1913

Absoloniella reitteri (G. Müller, 1912) (N) (E)

Styphloderes Wollaston, 1873

Styphloderes exsculptus (Boheman, 1843) (N, S, Si, Sa)

Echinomorphus Fauvel, 1889

Echinomorphus ravouxi (Jacquet, 1888) (N, S)

Cotaster Motschulsky, 1851

Cotaster cuneipennis (Aubé, 1850) (N)

Cotaster uncipes (Boheman, 1838) (N, S)

Pissodes Germar, 1817

Pissodes harcyniae (Herbst, 1795) (N)

Pissodes castaneus (Degeer, 1775) (N, S, Sa)

Pissodes piceae (Illiger, 1807) (N, S)

Pissodes pini (Linné, 1758) (N)

Pissodes piniphilus (Herbst, 1795) (N)

Pissodes scabricollis Miller, 1859 (N)

Pissodes validirostris (Sahlberg, 1834) (N, S)

Magdalis (Edo) Germar, 1819

Magdalis (Edo) nitidipennis (Boheman, 1843) (N, S)

Magdalis (Edo) ruficornis (Linné, 1758) (N, S, Si)

Magdalis (Panopsis) K. Daniel, 1903

Magdalis (Panopsis) flavicornis (Gyllenhal, 1836) (N, S, Sa)

Magdalis (Panopsis) fuscicornis Desbrochers, 1870 (N)

Magdalis (Panopsis) stricta Desbrochers, 1905 (N)

***Magdalis (Panus)* Seidlitz, 1891**

Magdalis (Panus) barbicornis (Latreille, 1804) (N, S, Si, Sa)

***Magdalis (Neopanus)* Reitter, 1916**

Magdalis (Neopanus) cerasi (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)

Magdalis (Neopanus) exarata H. Brisout, 1862 (N, S, Si)

Magdalis (Neopanus) scutellaris K. Daniel, 1903 (N, S)

***Magdalis (Magdalinus)* K. Daniel, 1903**

Magdalis (Magdalinus) armigera (Fourcroy, 1785) (N, S, Si, Sa)

Magdalis (Magdalinus) asphaltina Stephens, 1831 (N)

Magdalis (Magdalinus) carbonaria (Linné, 1758) (N)

Magdalis (Magdalinus) caucasica Tournier, 1872 (S)

***Magdalis (Magdalis)* Germar, 1817**

Magdalis (Magdalis) cyanea Seidlitz, 1875 (N)

Magdalis (Magdalis) duplicata Germar, 1819 (N)

Magdalis (Magdalis) frontalis (Gyllenhal, 1827) (N, S, Si)

Magdalis (Magdalis) linearis (Gyllenhal, 1827) (N)

Magdalis (Magdalis) memnonia (Gyllenhal, 1837) (N, S)

Magdalis (Magdalis) nitida (Gyllenhal, 1827) (N)

Magdalis (Magdalis) phlegmatica (Herbst, 1797) (N)

Magdalis (Magdalis) punctulata Mulsant & Rey, 1858 (N, S)

Magdalis (Magdalis) rufa (Germar, 1824) (N, S, Si, Sa)

Magdalis (Magdalis) violacea (Linné, 1758) (N, S)

***Trachodes* Germar, 1824**

Trachodes heydeni Stierlin, 1881 (N)

Trachodes hispidulus (Linné, 1758) (N)

***Poggionymus* Colonnelli, 1983**

Poggionymus crassus Colonnelli, 1983 (Sa) (E)

***Acallorneuma* Mainardi, 1906**

Acallorneuma doderoi A. Solari & F. Solari, 1908 (Si) (E)

Acallorneuma mainardii A. Solari & F. Solari, 1908 (Sa) (E)

Acallorneuma reitteri Mainardi, 1906 (N, S) (E)

***Camptorhinus* Schönherr, 1826**

Camptorhinus simplex Seidlitz, 1867 (S, Si, Sa)
Camptorhinus statua (Rossi, 1790) (N, S, Sa)

Cryptorhynchus Illiger, 1807

Cryptorhynchus lapathi (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)

Acalles Schönherr, 1826

Acalles aubei Boheman, 1837 (N, S)
Acalles barbarus Lucas, 1849 (Si)
Acalles camelus (Fabricius, 1792) (N, S)
Acalles commutatus Dieckmann, 1982 (N)
Acalles croaticus H. Brisout, 1867 (N)
Acalles dieckmanni Péricart, 1989 (Sa) (E)
Acalles diocletianus (Germar, 1817) (N, S, Si, Sa)
Acalles dromedarius Germar, 1844 (S, Si, Sa)
Acalles dubius A. Solari & F. Solari, 1907 (N)
Acalles echinatus (Germar, 1824) (N)
Acalles fausti Meyer, 1896 (N, S)
Acalles henoni Bedel, 1888 (S?, Sa)
Acalles humerosus Fairmaire, 1862 (S)
Acalles italicus A. Solari & F. Solari, 1905 (S) (E)
Acalles kippenbergi Dieckmann, 1982 (N) (E)
Acalles lemur (Germar, 1824) (N, S, Sa?)
Acalles longus Desbrochers, 1892 (S, Si)
Acalles luigionii A. Solari & F. Solari, 1907 (N, S)
Acalles micros Dieckmann, 1982 (N, S)
Acalles papei A. Solari & F. Solari, 1905 (S)
Acalles parvulus Boheman, 1837 (N, S)
Acalles pyrenaeus Boheman, 1844 (N, S)
Acalles pulchellus H. Brisout, 1864 (S)
Acalles punctaticollis Lucas, 1849 (N)
Acalles roboris Curtis, 1834 (N, S, Si, Sa)
Acalles rolleti (Germar, 1817) (S, Si, Sa)
Acalles saccoi Colonnelli, 1973 (S) (E)
Acalles setulipennis Desbrochers, 1871 (Sa)
Acalles solarii Fiori, 1903 (S) (E)
Acalles teter Boheman, 1844 (Si, Sa)
Acalles tibialis Weise, 1891 (N)

Echinodera (Echinodera) Wollaston, 1864

Echinodera (Echinodera) brisouti (Reitter, 1885) (S, Si)
Echinodera (Echinodera) capiomonti (H. Brisout, 1864) (N)
Echinodera (Echinodera) variegata (Boheman, 1837) (N, S, Sa)

Echinodera (Ruteria) Roudier, 1954

Echinodera (Ruteria) bellieri (Reiche, 1860) (S, Si, Sa) (E)
Echinodera (Ruteria) hypocrita (Boheman, 1837) (N, S, Si)
Echinodera (Ruteria) tyrrhenica Caldara, 1978 (S) (E)

Acallocrates Reitter, 1916

Acallocrates denticollis (Germar, 1824) (N, S)
Acallocrates minutesquamosus (Reiche, 1869) (N, S, Si, Sa)

Neumatora Normand, 1920

Neumatora depressa Normand, 1920 (Si)

Torneuma Wollaston, 1860

Torneuma curtulum F. Solari, 1937 (Sa) (E)
Torneuma damryi Perris, 1876 (Sa)
Torneuma deplanatum Hampe, 1864 (Si, Sa) (E)
Torneuma grouvellei Desbrochers, 1889 (N, S)
Torneuma minutum Meyer, 1895 (Sa) (E)
Torneuma raymondi Perris, 1870 (Sa)
Torneuma rosaliae Rottenberg, 1871 (E)
 Torneuma rosaliae rosaliae Rottenberg, 1871 (Si)
 Torneuma rosaliae andreinii A. Solari & F. Solari, 1908 (S)
Torneuma sardoum Desbrochers, 1889 (Sa) (E)
Torneuma siculum Ragusa, 1881 (Si, Sa) (E)

Choerorhinus Fairmaire, 1857

Choerorhinus squalidus Fairmaire, 1857 (N, S, Si, Sa)

Amaurorhinus Fairmaire, 1860

Amaurorhinus bewickianus (Wollaston, 1860) (N, S, Si, Sa?)
Amaurorhinus caoduroi Osella & Pogliano, 1984 (S) (E)
Amaurorhinus cesaraccioi Osella & Gregori, 1989 (Sa) (E)
Amaurorhinus lostiae Fairmaire, 1883 (Sa) (E)
Amaurorhinus mediterraneus Folwaczny, 1973 (N, S, Si)
Amaurorhinus sardous Folwaczny, 1973 (E)
 Amaurorhinus sardous sardous Folwaczny, 1973 (Sa)
 Amaurorhinus sardous gardinii Osella, 1981 (S)

Pentarthrum Wollaston, 1854

Pentarthrum huttoni Wollaston, 1854 (N)

Cossonus Clairville & Schellenberg, 1798

Cossonus cylindricus Sahlberg, 1834 (N)
Cossonus linearis (Fabricius, 1775) (N, S)
Cossonus parallelepipedus (Herbst, 1795) (N)

Mesites Schönherr, 1838

Mesites aquitanus Fairmaire, 1859 (S)
Mesites cunipes (Boheman, 1837) (N, S, Si?)
Mesites pallidipennis (Boheman, 1837) (N, S, Si, Sa)

Pselactus Broun, 1886

Pselactus caoduroi Osella, 1985 (S) (E)
Pselactus spadix (Herbst, 1795) (N, S, Si, Sa)

Rhyncolus Germar, 1824

Rhyncolus ater (Linné, 1758) (N, S)
Rhyncolus elongatus (Gyllenhal, 1827) (N, S, Si)
Rhyncolus punctatulus Boheman, 1838 (N, S, Si, Sa)
Rhyncolus sculpturatus Waltl, 1839 (N, S)
Rhyncolus strangulatus Perris, 1852 (N)

Axenomimetes Voss, 1955

Axenomimetes reflexus (Boheman, 1838) (N, S, Si, Sa)

Brachytemnus Wollaston, 1873

Brachytemnus porcatus (Germar, 1824) (N, S, Si, Sa)

Aphanommata Wollaston, 1873

Aphanommata filum (Mulsant & Rey, 1859) (S)

Stenoscelis Wollaston, 1861

Stenoscelis submuricatus (Schönherr, 1832) (N, S, Si, Sa)

Hexarthrum Wollaston, 1860

Hexarthrum capitulum (Wollaston, 1858) (N, S, Si)
Hexarthrum exiguum (Boheman, 1838) (N, S, Si)

Neohexarthrum Hoffmann, 1938

Neohexarthrum bonnairei Hoffmann, 1938 (Sa)

Stereocorynes Wollaston, 1873

Stereocorynes truncorum (Germar, 1824) (N, S)

Phloeophagus Schönherr, 1838

Phloeophagus cylindrus Boheman, 1838 (N, S, Si, Sa)

Phloeophagus gracilis Rosenhauer, 1856 (N, S, Si, Sa)

Phloeophagus lignarius (Marsham, 1802) (N, S)

Micromimus Wollaston, 1873

Micromimus osellai Voss, 1968 (N) (E) (*)

Alaocyba Perris, 1869

Alaocyba carinulata Perris, 1869 (Sa) (E)

Alaocyba lam pedusae Doderò, 1916 (Si) (E)

Alaocyba marcuzzii Osella, 1977 (S) (E)

Alaocyba separanda Doderò, 1916 (Si) (E)

Pararaymondionymus Osella, 1977

Pararaymondionymus andreinii Osella, 1977 (S) (E)

Pararaymondionymus bartolii Osella, 1977 (N) (E)

Pararaymondionymus gardinii Osella & Giusto, 1983 (N) (E)

Pararaymondionymus magnificus Osella, 1977 (S) (E)

Pararaymondionymus meggiorai Osella, 1977 (N) (E)

Pararaymondionymus mingazzinii Osella & Abbazzi, 1985 (N) (E)

Pararaymondionymus mirabilis Osella, 1977 (S) (E)

Pararaymondionymus ochsi (Hervé, 1949)

Pararaymondionymus ochsi problematicus (Hervé, 1949) (N)

Pararaymondionymus orientalis (Hervé, 1953) (N)

Pararaymondionymus sanfilippoi Osella & Giusto, 1983 (N) (E)

Pararaymondionymus stricticollis (Reitter, 1894)

Pararaymondionymus stricticollis stricticollis (Reitter, 1894) (N)

Pararaymondionymus stricticollis picens Osella, 1977 (S) (E)

Pararaymondionymus zoiai Osella & Giusto, 1983 (N) (E)

Raymondionymus Wollaston, 1873

Raymondionymus doriai Osella, 1977 (N) (E)

Raymondionymus marqueti (Aubé, 1863)

Raymondionymus marqueti apenninus (Dieck, 1869) (N, S) (E)

Raymondionymus marqueti taurinorum Osella, 1977 (N) (E)

Raymondionymus marqueti venetus Osella, 1977 (N) (E)

Tarattostichus Ganglbauer, 1906

Tarattostichus irregularis (Kodric, 1939) (N) (E)

Tarattostichus stussineri (Reitter, 1891) (N)

Raymondiellus Ganglbauer, 1906

Raymondiellus doderoi Ganglbauer, 1906 (Sa) (E)

Raymondiellus inopinatus Osella, 1977 (N) (E)

Raymondiellus lagrecai Osella, 1977 (Si) (E)

Raymondiellus latialis Osella, 1977 (S) (E)

Raymondiellus pacei Osella, 1977 (S) (E)

Raymondiellus sardous (Perris, 1869) (E)

Raymondiellus sardous sardous (Perris, 1869) (Sa)

Raymondiellus sardous insularis Osella, 1977 (Sa)

Raymondiellus sbordonii Osella, 1977 (S) (E)

Raymondiellus siculus (Rottenberg, 1871) (Si) (E)

Raymondiellus solarii Ganglbauer, 1906 (Sa) (E)

Raymondiellus vignai Osella, 1977 (Sa) (E)

Ubychia Rost, 1881

Ubychia leonhardi Reitter, 1914 (N) (E)

Derosasius Ganglbauer, 1906

Derosasius damryi (Perris, 1874)

Derosasius damryi aritzensis Osella, 1977 (Sa) (E)

Derosasius damryi sardous Osella, 1977 (Sa) (E)

Mononychus Germar, 1824

Mononychus punctumalbum (Herbst, 1784) (N, S, Si, Sa)

Rhinoncus Schönherr, 1825

Rhinoncus albicinctus Gyllenhal, 1837 (N)

Rhinoncus bruchoides (Herbst, 1784) (N, S, Sa)

Rhinoncus castor (Fabricius, 1792) (N, S)

Rhinoncus incospectus (Herbst, 1795) (N, S)

Rhinoncus pericarpus (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)

Rhinoncus perpendicularis (Reich, 1797) (N, S, Si, Sa)

Eubrychius Thomson, 1859

Eubrychius velutus (Beck, 1817) (N)

Phytobius Schönherr, 1833

Phytobius leucogaster (Marsham, 1802) (N, S)

Neophytobius Wagner, 1936

Neophytobius granatus (Gyllenhal, 1836) (N, S, Sa)

Neophytobius muricatus (C. Brisout, 1867) (N)

Neophytobius quadrinodosus (Gyllenhal, 1813) (N)

Pelenomus Thomson, 1859

Pelenomus canaliculatus (Fåhræus, 1843) (N)

Pelenomus comari (Herbst, 1795) (N, S)

Pelenomus hygrophilus (Hustache, 1923) (N)

Pelenomus quadricorniger Colonnelli, 1986 (N)

Pelenomus quadrituberculatus (Fabricius, 1787) (N, S)

Pelenomus velaris (Gyllenhal, 1827) (N)

Pelenomus waltoni (Boheman, 1843) (N, S)

Brachiodontus Schultze, 1897

Brachiodontus kraussi Ganglbauer, 1902 (N) (E)

Brachiodontus pseudoalpinus Osella & Cornacchia, 1974 (N) (E)

Rutidosoma (Rutidosoma) Stephens, 1831

Rutidosoma (Rutidosoma) globulus (Herbst, 1795) (N)

Rutidosoma (Scleropteridius) Otto, 1897

Rutidosoma (Scleropteridius) fallax (Otto, 1897) (N, S)

Scleropterus Schönherr, 1826

Scleropterus offensus Boheman, 1837 (N)

Amalus Schönherr, 1826

Amalus scortillum (Herbst, 1795) (N, S)

Tapinotus Schönherr, 1826

Tapinotus sellatus (Fabricius, 1794) (N, S)

Drupenatus Reitter, 1913

Drupenatus nasturtii (Germar, 1824) (N, S, Si, Sa)

Amalorrhynchus Reitter, 1913

Amalorrhynchus melanarius (Stephens, 1831) (N, S)

Poophagus Schönherr, 1837

Poophagus sisymbrii (Fabricius, 1776) (N, S)

Ceutorhynchus Germar, 1824

Ceutorhynchus aeneicollis Germar, 1824 (N, S, Si)
Ceutorhynchus algericus C. Brisout, 1869 (Si?)
Ceutorhynchus alliaricola Colonnelli, 1987 (N, S) (E)
Ceutorhynchus angustus Dieckmann, 1972 (N, S)
Ceutorhynchus assimilis (Paykull, 1792) (N, S, Si, Sa)
Ceutorhynchus atomus Boheman, 1845 (N, S, Si)
Ceutorhynchus barbareae Suffrian, 1847 (N, S)
Ceutorhynchus bifidus Colonnelli, 1987 (S) (E)
Ceutorhynchus caietani Colonnelli, 1992 (S) (E)
Ceutorhynchus cakilis (Hansen, 1917) (Si)
Ceutorhynchus carinatus Gyllenhal, 1837 (N, S)
Ceutorhynchus chalybaeus Germar, 1824 (N, S, Si, Sa)
Ceutorhynchus chlorophanus Rouget, 1857 (N, S, Si)
Ceutorhynchus clunicularis Schultze, 1903 (Si) (E)
Ceutorhynchus cochleariae (Gyllenhal, 1813) (N, S)
Ceutorhynchus constrictus (Marsham, 1802) (N, S)
Ceutorhynchus contractus (Marsham, 1802) (N, S, Si, Sa)
Ceutorhynchus declivis Colonnelli, 1988 (S) (E)
Ceutorhynchus dubius C. Brisout, 1883 (N)
Ceutorhynchus duvali C. Brisout, 1869 (N, S, Si, Sa)
Ceutorhynchus erysimi (Fabricius, 1787) (N, S, Si, Sa)
Ceutorhynchus fallax Boheman, 1845 (N, S, Si, Sa)
Ceutorhynchus floralis (Paykull, 1792) (N, S, Si, Sa)
Ceutorhynchus franzi Dieckmann, 1971 (N)
Ceutorhynchus fulvitaris Gougelet & H. Brisout, 1860 (N, S)
Ceutorhynchus gallorhenanus F. Solari, 1949 (N, S, Si, Sa)
Ceutorhynchus grenieri Gougelet & H. Brisout, 1860 (N, S, Si)
Ceutorhynchus griseus C. Brisout, 1869 (N, S)
Ceutorhynchus hampei (C. Brisout, 1869) (N)
Ceutorhynchus hepaticus Gyllenhal, 1837 (S, Si)
Ceutorhynchus hirtulus Germar, 1824 (N, S, Si, Sa)
Ceutorhynchus ignitus Germar, 1824 (N)
Ceutorhynchus inaeffectatus Gyllenhal, 1837 (N, S, Si)
Ceutorhynchus laetus Rosenhauer, 1856 (N, S, Si)
Ceutorhynchus leonhardi F. Solari, 1932 (S) (E)
Ceutorhynchus leprieuri C. Brisout, 1881 (N, S, Si, Sa)
Ceutorhynchus littoralis Schultze, 1898 (S)
Ceutorhynchus lukesi Tyl, 1914 (S)

Ceutorhynchus matthiolae Hoffmann, 1954 (S)
Ceutorhynchus melitensis Schultze, 1900 (S, Si)
Ceutorhynchus micans C. Brisout, 1869 (S, Si)
Ceutorhynchus nanoides Colonnelli, 1987 (N, S) (E)
Ceutorhynchus nanus Gyllenhal, 1837 (N, S)
Ceutorhynchus napi Gyllenhal, 1837 (N, S)
Ceutorhynchus obstructus (Marsham, 1802) (N, S, Si, Sa)
Ceutorhynchus osellai Colonnelli, 1984 (S) (E)
Ceutorhynchus pallidactylus (Marsham, 1802) (N, S, Si, Sa)
Ceutorhynchus pantellarianus Hoffmann, 1964 (N, S, Si, Sa)
Ceutorhynchus parvulus C. Brisout, 1869 (N)
Ceutorhynchus pectoralis Weise, 1895 (N)
Ceutorhynchus pervicax Weise, 1883 (N)
Ceutorhynchus peyerimhoffi Hustache, 1916 (S, Si)
Ceutorhynchus picitarsis Gyllenhal, 1837 (N, S, Si, Sa)
Ceutorhynchus pinguis Colonnelli, 1987 (S) (E)
Ceutorhynchus plumbeus C. Brisout, 1869 (S)
Ceutorhynchus posthumus Germar, 1824 (S)
Ceutorhynchus pulvinatus Gyllenhal, 1837 (N)
Ceutorhynchus puncticollis Boheman, 1845 (N, S)
Ceutorhynchus querceti (Gyllenhal, 1813) (N)
Ceutorhynchus rapae Gyllenhal, 1837 (N, S)
Ceutorhynchus resedae (Marsham, 1802) (S, Si)
Ceutorhynchus roberti Gyllenhal, 1837 (N, S, Si)
Ceutorhynchus rusticus Gyllenhal, 1837 (S, Si)
Ceutorhynchus sardeanensis Schultze, 1903 (Sa)
Ceutorhynchus scapularis Gyllenhal, 1837 (N)
Ceutorhynchus scrobicollis Neresheimer & Wagner, 1924 (S)
Ceutorhynchus similis C. Brisout, 1869 (S)
Ceutorhynchus sophiae Steven, 1829 (N)
Ceutorhynchus strejceki Dieckmann, 1981 (S)
Ceutorhynchus subpilosus C. Brisout, 1869 (S)
Ceutorhynchus sulcicollis (Paykull, 1800) (N, S, Si, Sa)
Ceutorhynchus syrites Germar, 1824 (N)
Ceutorhynchus thlaspi C. Brisout, 1869 (S)
Ceutorhynchus turbatus Schultze, 1903 (N)
Ceutorhynchus unguicularis Thomson, 1871 (N, S, Si)
Ceutorhynchus verticalis Colonnelli, 1992 (S) (E)
Ceutorhynchus viridipennis C. Brisout, 1869 (N, S, Si, Sa)
Ceutorhynchus wagneri Smreczynski, 1937 (S)

Calosirus Thomson, 1859

Calosirus apicalis (Gyllenhal, 1827) (N)
Calosirus terminatus (Herbst, 1795) (N, S, Si, Sa)

Sirocalodes Voss, 1958

Sirocalodes depressicollis (Gyllenhal, 1813) (N, S)
Sirocalodes mixtus (Mulsant & Rey, 1858) (N, S, Si, Sa)
Sirocalodes quercicola (Paykull, 1792) (N)

Oprohinus Reitter, 1916

Oprohinus consputus (Germar, 1824) (N, S, Si, Sa)
Oprohinus suturalis (Fabricius, 1777) (N, S)

Ranunculiphilus Dieckmann, 1972

Ranunculiphilus faeculentus (Gyllenhal, 1837) (N)

Ethelcus Reitter, 1916

Ethelcus cinnamomeus (Schultze, 1897) (S, Si)
Ethelcus verrucatus (Schränk, 1781) (N, S, Si)

Glocianus Reitter, 1916

Glocianus africanus (Schultze, 1899) (Si)
Glocianus distinctus (C. Brisout, 1870) (N, S, Si)
Glocianus lethierryi (C. Brisout, 1866) (Si)
Glocianus moelleri (Thomson, 1868) (N)
Glocianus pilosellus (Gyllenhal, 1837) (N, S, Si)
Glocianus punctiger (Gyllenhal, 1837) (N, S, Si, Sa)
Glocianus ragusae (C. Brisout, 1884) (S, Si)

Neoglocianus Dieckmann, 1972

Neoglocianus albovittatus Germar, 1824 (N)
Neoglocianus maculaalba (Herbst, 1795) (N, S, Si)

Stenocarus Thomson, 1859

Stenocarus cardui (Herbst, 1784) (N, S, Si, Sa)
Stenocarus ruficornis (Stephens, 1831) (N, S, Si, Sa)

Phrydiuchus Gozis, 1885

Phrydiuchus speiseri (Schultze, 1897) (N)
Phrydiuchus spilmani Warner, 1969 (S, Si)
Phrydiuchus topiarius (Germar, 1824) (N)

Parethelcus Dieckmann, 1972

Parethelcus pollinarius (Forster, 1771) (N, S, Si, Sa)

Bohemanius Schultze, 1898

Bohemanius uroleucus (Boheman, 1845) (Sa) (E)

Hadroplontus Thomson, 1859

Hadroplontus litura (Fabricius, 1775) (N)

Hadroplontus trimaculatus (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa)

Coeliastes Weise, 1883

Coeliastes lamii (Fabricius, 1792) (N, S)

Nedyus Schönherr, 1825

Nedyus quadrimaculatus (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)

Datonychus Wagner, 1944

Datonychus angulosus (Boheman, 1845) (N, S)

Datonychus arquata (Herbst, 1795) (N)

Datonychus maurus (Schultze, 1899) (Sa)

Datonychus melanostictus (Marsham, 1802) (N, S, Si, Sa)

Datonychus urticae (Boheman, 1845) (N, S)

Mogulones Reitter, 1916

Mogulones abbreviatulus (Fabricius, 1792) (N)

Mogulones amplipennis (Schultze, 1896) (S)

Mogulones angulicollis (Schultze, 1896) (N, S, Si)

Mogulones annibal (Desbrochers, 1896) (S, Si)

Mogulones arcasi (C. Brisout, 1869) (S, Sa)

Mogulones asperifoliarum (Gyllenhal, 1813) (N, S, Si, Sa)

Mogulones bartolii (Colonnelli, 1983) (N) (E)

Mogulones beckeri (Schultze, 1900) (S, Si)

Mogulones borraginis (Fabricius, 1792) (N)

Mogulones crucifer (Pallas, 1776) (N, S, Si, Sa)

Mogulones diecki (C. Brisout, 1870) (N)

Mogulones euphorbiae (C. Brisout, 1866) (N, S, Si)

Mogulones geographicus (Goeze, 1777) (N, S, Si, Sa)

Mogulones javetii (Gerhardt, 1867) (S, Si)

Mogulones larvatus (Schultze, 1896) (N)

Mogulones lucanus (Colonnelli, 1983) (N, S) (E)

Mogulones pallidicornis (Gougelet & H. Brisout, 1860) (N, S)

Mogulones peregrinus (Gyllenhal, 1837) (N, S, Si, Sa)

Mogulones raphani (Fabricius, 1792) (N)

Mogulones t-album (Gyllenhal, 1837) (N, S, Si, Sa)

Mogulones venedicus (Weise, 1879) (N, S)

Mogulonoides Colonnelli, 1986

Mogulonoides radula (Germar, 1824) (N)

Thamiocolus Thomson, 1859

Thamiocolus hexatomus (Penecke, 1922) (N)
Thamiocolus kraatzi (C. Brisout, 1869) (N)
Thamiocolus paravilis Dieckmann, 1973 (N)
Thamiocolus pubicollis (Gyllenhal, 1837) (N, S, Sa)
Thamiocolus signatus (Gyllenhal, 1837) (N, S)
Thamiocolus sinapis (Desbrochers, 1893) (S)
Thamiocolus uniformis (Gyllenhal, 1837) (S)
Thamiocolus viduatus (Gyllenhal, 1837) (N, S)

Microplontus Wagner, 1944

Microplontus binaghii (Colonnelli, 1977) (N, S) (E)
Microplontus brevisculus (Schultze, 1896) (S, Si) (E)
Microplontus campestris (Gyllenhal, 1837) (N, S)
Microplontus fairmairei (C. Brisout, 1860) (N, S)
Microplontus melonii Colonnelli, 1984 (Sa) (E)
Microplontus molitor (Gyllenhal, 1837) (N, S, Si, Sa)
Microplontus rugulosus (Herbst, 1795) (N, S, Si, Sa)
Microplontus subfasciatus (Chevrolat, 1860) (S, Si, Sa)
Microplontus triangulum (Boheman, 1845) (N)

Austroceutorhynchus Korotyaev, 1980

Austroceutorhynchus italicus (C. Brisout, 1869) (N, S, Si)

Trichosirocalus Colonnelli, 1979

Trichosirocalus baldensis (Schultze, 1896) (N)
Trichosirocalus barneivillei (Grenier, 1866) (N)
Trichosirocalus centrimacula (Schultze, 1899) (Si, Sa)
Trichosirocalus horridus (Panzer, 1801) (N, S, Si, Sa)
Trichosirocalus rufulus (Dufour, 1851) (N, S, Si, Sa)
Trichosirocalus spurnyi (Schultze, 1901) (N)
Trichosirocalus thalhammeri (Schultze, 1906) (N)
Trichosirocalus troglodytes (Fabricius, 1787) (N, S, Si, Sa)
Trichosirocalus urens (Gyllenhal, 1837) (N, S, Si)

Micrelus Thomson, 1859

Micrelus ericae (Gyllenhal, 1813) (N, S)
Micrelus ferrugatus (Perris, 1847) (N, S)

Zacladus Reitter, 1913

Zacladus exiguus (Olivier, 1807) (N, S, Si, Sa)

Zacladus geranii (Paykull, 1800) (N, S, Si, Sa)

Eucoeliodes Smreczynski, 1974

Eucoeliodes mirabilis (Villa & Villa, 1835) (N)

Coeliodes (Coeliodes) Schönherr, 1837

Coeliodes (Coeliodes) angulipennis F. Solari, 1940 (N, S, Si) (E)

Coeliodes (Coeliodes) dryados (Gmelin, 1790) (N, S)

Coeliodes (Coeliodes) erythroleucos (Gmelin, 1790) (N, S, Si, Sa)

Coeliodes (Coeliodes) ilicis (Bedel, 1885) (N, S, Si, Sa)

Coeliodes (Coeliodes) proximus Schultze, 1895 (S)

Coeliodes (Coeliodes) ruber (Marsham, 1802) (N, S, Si, Sa)

Coeliodes (Coeliodes) sculus Schultze, 1901 (S, Si)

Coeliodes (Coeliodes) solarii Baccetti, 1959 (S) (E)

Coeliodes (Coeliodes) trifasciatus Bach, 1854 (S, Si)

Coeliodes (Coeliodinus) Dieckmann, 1972

Coeliodes (Coeliodinus) rubicundus (Herbst, 1795) (N)

Pseudocoeliodes Hoffmann, 1956

Pseudocoeliodes rubricus (Boheman, 1837) (S, Si)

Paroxyonyx Hustache, 1931

Paroxyonyx gobbii Colonnelli, 1977 (S) (E)

Neoxyonyx Hoffmann, 1930

Neoxyonyx strigirostris (Hochhut, 1847) (Si)

Auleutes Dietz, 1896

Auleutes epilobii (Paykull, 1800) (N)

Aphytobius Wagner, 1937

Aphytobius monticola (F. Solari, 1951) (S) (E)

Aphytobius sphaerion (Boheman, 1845) (N, S)

Hypurus Rey, 1882

Hypurus bertrandi (Perris, 1852) (N, S, Si)

Oreorhynchaeus Otto, 1894

Oreorhynchaeus baldensis Osella, Bellò & Pogliano, 1985 (N) (E)

Oreorhynchaeus focarilei F. Solari, 1951 (N) (E)

Oreorhynchaeus pacei Osella & Cornacchia, 1974 (N) (E)

Oreorhynchaeus spectator (Holdhaus, 1936) (N) (E)

Pseudophytobius Desbrochers, 1884

Pseudophytobius acalloides (Fairmaire, 1857) (Si, Sa)

Orobitis Germar, 1817

Orobitis cyaneus (Linné, 1758) (N, S)

Orobitis nigrinus Reitter, 1885 (N, S)

Coryssomerus Schönherr, 1826

Coryssomerus capucinus (Beck, 1817) (N, S, Si)

Baris Germar, 1824

Baris analis (Olivier, 1790) (N, S, Si)

Baris andalusica (H. Brisout, 1870) (Sa)

Baris angusta Brullé, 1832 (S, Si, Sa)

Baris artemisiae (Herbst, 1795) (N, S)

Baris atricolor (Boheman, 1844) (S, Si?)

Baris binaghii F. Solari, 1952 (S) (E)

Baris chlorizans Germar, 1824 (N, S)

Baris coerulescens (Scopoli, 1763) (N, S, Si, Sa)

Baris corynthia Fairmaire, 1892 (Si)

Baris corsicana Schultze, 1904 (Sa)

Baris cuprirostris (Fabricius, 1787) (N, S, Si, Sa)

Baris dalmatina (H. Brisout, 1870) (S)

Baris fallax (H. Brisout, 1870) (S)

Baris gudenusi Schultze, 1901 (N)

Baris insularis Desbrochers, 1892 (N, S)

Baris janthina (Boheman, 1836) (S, Si)

Baris joffrei Hustache, 1926 (Si?)

Baris kaufmanni Reitter, 1897 (N, S)

Baris laticollis (Marsham, 1802) (N, S, Si, Sa)

Baris lepidii Germar, 1824 (N, Sa)

Baris memnonia (Boheman, 1836) (Si)

Baris morio (Boheman, 1844) (S, Sa)

Baris nivalis H. Brisout, 1870 (N)

Baris ocellata Desbrochers, 1900 (N) (E)
Baris parumpunctata Fairmaire, 1865 (S, Sa?)
Baris pedemontana Desbrochers, 1908 (N) (E)
Baris pertusa Kiesenwetter, 1864 (S)
Baris picicornis (Marsham, 1802) (N, S, Si, Sa)
Baris picturata Ménétries, 1849
 Baris picturata opiparis Jacquelin du Val, 1852 (S, Si, Sa)
Baris prasina (Boheman, 1836) (N, S, Si, Sa)
Baris quadraticollis (Boheman, 1844) (Si)
Baris rufa (Boheman, 1844) (Si, Sa)
Baris scolopacea Germar, 1824 (N, S, Si, Sa)
Baris sellata (Boheman, 1844) (S)
Baris siciliensis Desbrochers, 1892 (Si, Sa) (E)
Baris spoliata (Boheman, 1836) (S, Si, Sa)
Baris stierlini Tournier, 1873 (Si) (E)
Baris subferruginea Reitter, 1910 (Sa) (E)
Baris timida (Rossi, 1792) (N, S, Si, Sa)
Baris villae Comolli, 1837 (N, S, Si)
Baris viridipennis Rosenhauer, 1856 (Si)

***Limnobaris* Bedel, 1885**

Limnobaris dolorosa (Goeze, 1777) (N, S)
Limnobaris t-album (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)

***Anthonomus* (*Anthonomus*) Germar, 1817**

Anthonomus (*Anthonomus*) *amygdali* Hustache, 1930 (S, Si, Sa)
Anthonomus (*Anthonomus*) *bituberculatus* Thomson, 1868 (N, S, Si, Sa)
Anthonomus (*Anthonomus*) *bonvouloiri* Desbrochers, 1868 (S)
Anthonomus (*Anthonomus*) *chevrolati* Desbrochers, 1868 (N, S, Sa)
Anthonomus (*Anthonomus*) *conspersus* Desbrochers, 1868 (N)
Anthonomus (*Anthonomus*) *humeralis* (Panzer, 1795) (N, S)
Anthonomus (*Anthonomus*) *kirschi* Desbrochers, 1868 (N, S)
Anthonomus (*Anthonomus*) *pedicularius* (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)
Anthonomus (*Anthonomus*) *piri* Kollar, 1837 (N, S, Si, Sa)
Anthonomus (*Anthonomus*) *pomorum* (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)
Anthonomus (*Anthonomus*) *rubi* (Herbst, 1795) (N, S, Si, Sa)
Anthonomus (*Anthonomus*) *rufus* Gyllenhal, 1836 (N, S, Si, Sa)
Anthonomus (*Anthonomus*) *spilotus* Redtenbacher, 1849 (N, S, Si, Sa)
Anthonomus (*Anthonomus*) *stierlini* Desbrochers, 1869 (S, Si, Sa)
Anthonomus (*Anthonomus*) *terreus* Gyllenhal, 1836 (N, S?)
Anthonomus (*Anthonomus*) *ulmi* (De Geer, 1775) (N, S, Si, Sa)
Anthonomus (*Anthonomus*) *undulatus* Gyllenhal, 1836 (N)

***Anthonomus* (*Paranthonomus*) Dietz, 1891**

Anthonomus (*Paranthonomus*) *phyllocola* (Herbst, 1795) (N)

Anthonomus (Paranthonomus) pinivorax Silfverberg, 1977 (N)

Anthonomus (Anthonomidius) Reitter, 1915

Anthonomus (Anthonomidius) rubripes Gyllenhal, 1836 (S)

Furcipes Desbrochers, 1868

Furcipes rectirostris (Linné, 1758) (N)

Brachonyx Schönherr, 1826

Brachonyx pineti (Paykull, 1792) (N, S?)

Bradybatus (Bradybatus) Germar, 1824

Bradybatus (Bradybatus) creutzeri Germar, 1824 (N, S, Si, Sa)

Bradybatus (Bradybatus) kellneri Bach, 1854 (N, S)

Bradybatus (Bradybatus) tomentosus Desbrochers, 1892 (Si)

Bradybatus (Nothops) Marseul, 1868

Bradybatus (Nothops) elongatulus (Boheman, 1843) (N, S)

Derelomus Schönherr, 1826

Derelomus chamaeropsis (Fabricius, 1793) (S, Si)

Derelomus subcostatus (Boheman, 1844) (N, S, Si, Sa)

Pseudoderelomus Hoffmann, 1938

Pseudoderelomus piriformis Hoffmann, 1938 (S, Si)

Curculio (Curculio) Linné, 1758

Curculio (Curculio) betulae (Stephens, 1831) (N)

Curculio (Curculio) elephas (Gyllenhal, 1836) (N, S, Si, Sa)

Curculio (Curculio) glandium Marsham, 1802 (N, S, Si, Sa)

Curculio (Curculio) nucum Linné, 1758 (N, S, Si, Sa)

Curculio (Curculio) pellitus (Boheman, 1843) (N, S, Si?, Sa?)

Curculio (Curculio) propinquus (Desbrochers, 1868) (N, S)

Curculio (Curculio) reichei (Desbrochers, 1868) (N, Si?)

Curculio (Curculio) rubidus (Gyllenhal, 1836) (N)

Curculio (Curculio) venosus (Gravenhorst, 1807) (N, S, Si?, Sa?)

Curculio (Balanobius) Jekel, 1861

Curculio (Balanobius) crux Fabricius, 1776 (N, S)

Curculio (Balanobius) pyrrhoceras Marsham, 1802 (N, S, Si, Sa)
Curculio (Balanobius) salicivorus Paykull, 1792 (N, S, Si, Sa)
Curculio (Balanobius) troglodytes (Jekel, 1861) (S)
Curculio (Balanobius) vicetinus Cussigh, 1989 (N, S) (E)
Curculio (Balanobius) villosus Fabricius, 1781 (N, S)

***Acalyptus* Schönherr, 1836**

Acalyptus carpini (Herbst, 1795) (N, S, Si, Sa)
Acalyptus sericeus Gyllenhal, 1836 (N, Si)

***Ellescus* Dejean, 1821**

Ellescus bipunctatus (Linné, 1758) (N)
Ellescus infirmus (Herbst, 1795) (N, S)
Ellescus scanicus (Paykull, 1792) (N, S)

***Lignyodes* Schönherr, 1836**

Lignyodes enucleator (Panzer, 1798) (N, S)

***Tychius (Apeltarius)* Desbrochers, 1873**

Tychius (Apeltarius) amplicollis Aubé, 1850 (S, Si, Sa)
Tychius (Apeltarius) multilineatus (Desbrochers, 1873) (Si)

***Tychius (Tychius)* Germar, 1817**

Tychius (Tychius) alpinus Hustache, 1926 (N)
Tychius (Tychius) arcistrostris Normand, 1938 (S)
Tychius (Tychius) argentatus Chevrolat, 1859 (N, S, Si, Sa)
Tychius (Tychius) aureolus Kiesenwetter, 1851 (N, S, Si)
Tychius (Tychius) bicolor C. Brisout, 1862 (N, S, Si, Sa)
Tychius (Tychius) bivittatus Perris, 1866 (Sa)
Tychius (Tychius) brevisculus Desbrochers, 1873 (N, S)
Tychius (Tychius) caldarai Dieckmann, 1986 (N, S)
Tychius (Tychius) capucinus (Boheman, 1843) (S, Si, Sa)
Tychius (Tychius) cinnamomeus Kiesenwetter, 1851 (N)
Tychius (Tychius) consputus Kiesenwetter, 1864 (S, Si)
Tychius (Tychius) crassirostris Kirsch, 1871 (N)
Tychius (Tychius) cuprifer (Panzer, 1799) (N, S, Si, Sa)
Tychius (Tychius) cupriferoides (Ragusa, 1922) (S, Si)
Tychius (Tychius) curtirostris Desbrochers, 1873 (N, S, Si, Sa)
Tychius (Tychius) decretus Tournier, 1873 (S, Si, Sa)
Tychius (Tychius) depressus Desbrochers, 1873 (N, S, Si, Sa)
Tychius (Tychius) dispar Desbrochers, 1908 (S) (E)
Tychius (Tychius) doderoi (F. Solari, 1950) (Si, Sa) (E)
Tychius (Tychius) fanalesi Ragusa, 1908 (Si) (E)

Tychius (Tychius) flavus Becker, 1864 (N, S)
Tychius (Tychius) focarilei F. Solari, 1950 (S) (E)
Tychius (Tychius) funicularis C. Brisout, 1862 (Sa)
Tychius (Tychius) grandicollis Desbrochers, 1873 (N, S, Si, Sa)
Tychius (Tychius) grenieri C. Brisout, 1861 (S, Si, Sa)
Tychius (Tychius) hueti Tournier, 1873 (S) (E)
Tychius (Tychius) irregularis Faust, 1890 (N)
Tychius (Tychius) junceus (Reich, 1797) (N, S, Si)
Tychius (Tychius) kulzeri Penecke, 1934 (N, S)
Tychius (Tychius) laticollis Perris, 1864 (Si)
Tychius (Tychius) lineatulus Stephens, 1831 (N, S, Si)
Tychius (Tychius) longicollis C. Brisout, 1862 (N, S)
Tychius (Tychius) medicaginis C. Brisout, 1862 (N, Si)
Tychius (Tychius) meliloti Stephens, 1831 (N, S, Si, Sa)
Tychius (Tychius) naxiae Faust, 1889 (S, Si)
Tychius (Tychius) nigricollis Chevrolat, 1859 (Si)
Tychius (Tychius) parallelus (Panzer, 1794) (N, S)
Tychius (Tychius) picirostris (Fabricius, 1787) (N, S, Si, Sa)
Tychius (Tychius) polylineatus Germar, 1824 (N, S, Si, Sa)
Tychius (Tychius) pumilus C. Brisout, 1862 (N, S)
Tychius (Tychius) pusillus Germar, 1842 (N, S, Si, Sa)
Tychius (Tychius) quinquepunctatus (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)
Tychius (Tychius) rufipennis C. Brisout, 1862 (N, S, Si)
Tychius (Tychius) schneideri (Herbst, 1795) (N, S, Si)
Tychius (Tychius) schuleri Tempère, 1970 (N)
Tychius (Tychius) sharpi Tournier, 1873 (N)
Tychius (Tychius) sculus Boheman, 1843 (Si)
Tychius (Tychius) similis Tournier, 1873 (Sa)
Tychius (Tychius) spinicrus Desbrochers, 1895 (Sa)
Tychius (Tychius) squamulatus Gyllenhal, 1836 (N, S)
Tychius (Tychius) stephensi Schönherr, 1836 (N, S, Si)
Tychius (Tychius) striatulus Gyllenhal, 1836 (N, S, Si, Sa)
Tychius (Tychius) suturatus (Perris, 1866) (Sa)
Tychius (Tychius) terrosus Tournier, 1873 (S)
Tychius (Tychius) thoracicus Boheman, 1843 (N, S, Si)
Tychius (Tychius) tibialis Boheman, 1843 (N, S, Si, Sa)
Tychius (Tychius) tridentinus Penecke, 1922 (N)
Tychius (Tychius) trivialis Boheman, 1843 (N, S)

Sibinia Germar, 1824

Sibinia abdominalis Tournier, 1873 (N)
Sibinia arenariae Stephens, 1831 (N, S, Si?, Sa)
Sibinia attalica Gyllenhal, 1836 (N, S, Si, Sa)
Sibinia beckeri Desbrochers, 1873 (N, S)
Sibinia exigua Faust, 1885 (Sa)
Sibinia femoralis Germar, 1824 (N, S, Si, Sa)
Sibinia meridionalis C. Brisout, 1867 (S, Sa)

Sibinia pellucens (Scopoli, 1772) (N, S)
Sibinia phalerata Gyllenhal, 1836 (N, S)
Sibinia planiuscula Desbrochers, 1873 (N, S, Si, Sa)
Sibinia pyrrhodactyla (Marsham, 1802) (N)
Sibinia reichei Tournier, 1873 (S)
Sibinia seriata Desbrochers, 1873 (Sa)
Sibinia sicana Ragusa, 1908 (S, Si) (E)
Sibinia sodalis Germar, 1824 (N, S, Sa)
Sibinia subelliptica (Desbrochers, 1873) (N, S)
Sibinia subtriangulifera Desbrochers, 1888 (S, Si?, Sa)
Sibinia tibialis (Gyllenhal, 1836) (N)
Sibinia tychiiformis Pic, 1902 (Si)
Sibinia unicolor (Fåhræus, 1843) (N)
Sibinia variata Gyllenhal, 1836 (N, S, Si, Sa)
Sibinia viscaria (Linné, 1761) (N, S, Si)
Sibinia vittata Germar, 1824 (N, S)

Ita Tournier, 1878

Ita crassirostris Tournier, 1871 (Si)

Dorytomus (Dorytomus) Germar, 1817

Dorytomus (Dorytomus) dejeani Faust, 1882 (N, S, Si)
Dorytomus (Dorytomus) edoughensis Desbrochers, 1875 (N, S)
Dorytomus (Dorytomus) filirostris (Gyllenhal, 1836) (N, S)
Dorytomus (Dorytomus) longimanus (Forster, 1771) (N, S, Si, Sa)
Dorytomus (Dorytomus) schoenherri Faust, 1882 (N, S, Si)
Dorytomus (Dorytomus) suratus (Gyllenhal, 1836) (N, S)
Dorytomus (Dorytomus) taeniatum (Fabricius, 1781) (N, S, Si)
Dorytomus (Dorytomus) tortrix (Linné, 1761) (N, S, Sa)
Dorytomus (Dorytomus) tremulae (Fabricius, 1800) (N, S)

Dorytomus (Euolamus) Reitter, 1916

Dorytomus (Euolamus) hirtipennis (Bedel, 1884) (N, S)
Dorytomus (Euolamus) ictor (Herbst, 1795) (N, S, Si, Sa)
Dorytomus (Euolamus) minutus (Gyllenhal, 1836) (N, S)
Dorytomus (Euolamus) nebulosus (Gyllenhal, 1836) (N)
Dorytomus (Euolamus) occallesens (Gyllenhal, 1836) (N, S)
Dorytomus (Euolamus) salicis Walton, 1851 (N)

Dorytomus (Olamus) Reitter, 1916

Dorytomus (Olamus) majalis (Paykull, 1800) (N)
Dorytomus (Olamus) melanophthalmus (Paykull, 1792) (N, S, Si, Sa)
Dorytomus (Olamus) puberulus (Boheman, 1843) (N)
Dorytomus (Olamus) rufatus (Bedel, 1888) (N, S, Sa?)

Dorytomus (Olamus) salicinus (Gyllenhal, 1836) (N, S)
Dorytomus (Olamus) villosulus (Gyllenhal, 1836) (N, S)

Siraton Hustache, 1934

Siraton devillei Hustache, 1934 (N)

Paroryx Reitter, 1912

Paroryx nitidus (Chevrolat, 1861) (Si)

Acentrus Schönherr, 1845

Acentrus histrio Boheman, 1845 (N, S, Si, Sa)

Styphlidius Penecke, 1936

Styphlidius corcyreus (Reitter, 1884)
Styphlidius corcyreus italicus Osella, 1981 (S, Si) (E)

Styphlus Schönherr, 1826

Styphlus jonicus Reitter, 1899 (S, Si)

Comasinus Dejean, 1821

Comasinus alpicola (Daniel, 1904) (N)
Comasinus insignis (Aubé, 1863) (S, Si, Sa)
Comasinus setiger (Beck, 1817) (N, S, Si)

Trachysoma Penecke, 1894

Trachysoma alpinum Penecke, 1894 (N, S)

Notaris (Notaris) Germar, 1817

Notaris (Notaris) aethiops (Fabricius, 1792) (N)
Notaris (Notaris) bimaculatus (Fabricius, 1787) (N)
Notaris (Notaris) scirpi (Fabricius, 1792) (N, S, Si)

Notaris (Erycus) Tournier, 1874

Notaris (Erycus) acridulus (Linné, 1758) (N)
Notaris (Erycus) aterrimus (Hampe, 1850) (N)
Notaris (Erycus) maerkelii (Boheman, 1843) (N)

Lostianus Desbrochers, 1900

Lostianus sardous Desbrochers, 1900 (Sa) (E)

Echinocnemus Schönherr, 1843

Echinocnemus efferus Faust, 1887 (N?)

Icaris Tournier, 1874

Icaris sparganii (Gyllenhal, 1836) (N)

Aubeonymus Jacquelin du Val, 1854

Aubeonymus carinicollis (Lucas, 1849) (S, Si)

Pachytychius Jekel, 1861

Pachytychius aridicola (Wollaston, 1864) (Si, Sa)

Pachytychius avulsus Faust, 1885 (S, Si)

Pachytychius discithorax Desbrochers, 1873 (S)

Pachytychius fuligineus Desbrochers, 1875 (Si)

Pachytychius haematocephalus (Gyllenhal, 1836) (N, S, Si, Sa)

Pachytychius hordei (Brullé, 1832)

Pachytychius hordei squamosus (Gyllenhal, 1836) (N, S, Si, Sa)

Pachytychius lucasi Jekel, 1861

Pachytychius lucasi lucasi Jekel, 1861 (Si, Sa)

Pachytychius picteti (Tournier, 1860) (Si)

Pachytychius sellatus (Lucas, 1849) (Si)

Pachytychius sparsutus (Olivier, 1807) (N, S, Si, Sa)

Grypus Germar, 1817

Grypus brunnistrois (Fabricius, 1792) (N)

Grypus equiseti (Fabricius, 1775) (N)

Thryogenes Bedel, 1884

Thryogenes festucae (Herbst, 1795) (N, S)

Thryogenes fiorii Zumpt, 1928 (N)

Thryogenes nereis (Paykull, 1800) (N)

Procas Stephens, 1831

Procas armillatus (Fabricius, 1801) (S, Sa)

Geranorrhinus Chevrolat, 1860

Geranorrhinus pusillus (Motschulsky, 1851) (Si)

Sharpia Tournier, 1874

Sharpia rubida (Rosenhauer, 1856) (Sa)

Smicronyx (Chalybodontus) Desbrochers, 1885

Smicronyx (Chalybodontus) cyaneus (Gyllenhal, 1836) (N, S, Si, Sa)

Smicronyx (Smicronyx) Schönherr, 1843

Smicronyx (Smicronyx) albosquamosus Wollaston, 1854 (S, Si, Sa)

Smicronyx (Smicronyx) funebris Tournier, 1874 (N, S)

Smicronyx (Smicronyx) gratiosus F. Solari, 1952 (N)

Smicronyx (Smicronyx) jungermanniae (Reich, 1797) (N, S, Si, Sa)

Smicronyx (Smicronyx) menozzii F. Solari, 1952 (N, S)

Smicronyx (Smicronyx) pauperculus Wollaston, 1864 (Si)

Smicronyx (Smicronyx) pygmaeus Curtis, 1840 (N, S)

Smicronyx (Smicronyx) reichi (Gyllenhal, 1836) (N, S, Si, Sa)

Smicronyx (Smicronyx) revelierei Tournier, 1874 (Sa)

Smicronyx (Smicronyx) rugicollis Rey, 1895 (N, S)

Smicronyx (Smicronyx) scops Tournier, 1874 (N, S, Si, Sa)

Smicronyx (Smicronyx) striatipennis Tournier, 1874

Smicronyx (Smicronyx) striatipennis italicus Voss, 1953 (S) (E)

Dicranthus Germar, 1917

Dicranthus majzlani Kodada, Holecová & Behne, 1992 (N)

Bagous (Lyprus) Schönherr, 1826

Bagous (Lyprus) angustus Silfverberg, 1977 (N, Si?)

Bagous (Ephimeropus) Hochhut, 1847

Bagous (Ephimeropus) biimpressus Fåhraeus, 1845 (S, Sa)

Bagous (Ephimeropus) geniculatus (Hochhut, 1847) (Sa)

Bagous (Ephimeropus) mulsanti Fauvel, 1885 (S, Sa)

Bagous (Ephimeropus) petro (Herbst, 1795) (N, S, Si?, Sa?)

Bagous (Ephimeropus) sardiniensis H. Brisout, 1863 (Sa)

Bagous (Parabagous) Schilsky, 1907

Bagous (Parabagous) chevrolati Tournier, 1874 (S, Sa)

Bagous (Parabagous) costulatus Perris, 1870 (Si, Sa)

Bagous (Parabagous) kirschi Reitter, 1884 (S, Si, Sa)

Bagous (Parabagous) longirostris Vitale, 1904 (Si)

Bagous (Bagous) Germar, 1817

Bagous (Bagous) argillaceus Gyllenhal, 1836 (Si, Sa)
Bagous (Bagous) binodulus (Herbst, 1795) (N)
Bagous (Bagous) collignensis (Herbst, 1797) (N)
Bagous (Bagous) czwalinae Seidlitz, 1891 (N)
Bagous (Bagous) diglyptus Boheman, 1845 (N)
Bagous (Bagous) frit (Herbst, 1795) (N, Sa?)
Bagous (Bagous) limosus (Gyllenhal, 1827) (N, S, Sa)
Bagous (Bagous) longitarsis Thomson, 1868 (N, Si?)
Bagous (Bagous) lutulosus (Gyllenhal, 1827) (N, S, Si)
Bagous (Bagous) nodulosus Gyllenhal, 1836 (N)
Bagous (Bagous) revelieri Tournier, 1884 (Sa)
Bagous (Bagous) rotundicollis Boheman, 1845
 Bagous (Bagous) rotundicollis rotundicollis Boheman, 1845 (N)
 Bagous (Bagous) rotundicollis bucciarellii Pesarini, 1980 (Si) (E)
Bagous (Bagous) rufimanus Hoffmann, 1954 (N, S, Si, Sa)
Bagous (Bagous) septemcostatus Chevrolat, 1860 (Si, Sa)
Bagous (Bagous) subcarinatus Gyllenhal, 1836 (N, S, Si)
Bagous (Bagous) tempestivus (Herbst, 1795) (N)

***Bagous (Abagous)* Sharp, 1916**

Bagous (Abagous) glabrirostris (Herbst, 1795) (N, S)
Bagous (Abagous) lutosus (Gyllenhal, 1813) (S, Sa)
Bagous (Abagous) lutulentus (Gyllenhal, 1813) (N, S)
Bagous (Abagous) puncticollis Boheman, 1845 (N, S)
Bagous (Abagous) robustus H. Brisout, 1863 (N, S, Sa)
Bagous (Abagous) validus Rosenhauer, 1847 (Si)
Bagous (Abagous) wagneri Dieckmann, 1964 (N, Sa)

***Hydronomus* Schönherr, 1826**

Hydronomus alismatis (Marsham, 1802) (N, S, Sa)

***Stenopelmus* Schönherr, 1836**

Stenopelmus rufinasus Gyllenhal, 1836 (N, S)

***Tanysphyrus* Schönherr, 1826**

Tanysphyrus lemnae (Paykull, 1792) (N, S, Sa)

***Anoplus* Schönherr, 1826**

Anoplus plantaris (Naezen, 1794) (N)
Anoplus roboris Suffrian, 1840 (N, S)
Anoplus setulosus Kirsch, 1870 (N, S)

Rhamphus Clairville & Schellenberg, 1798

- Rhamphus kiesenwetteri* Tournier, 1873 (Si)
- Rhamphus oxyacanthae* (Marsham, 1802) (N, S, Si, Sa)
- Rhamphus pulicarius* (Herbst, 1795) (N, S, Si, Sa)
- Rhamphus subaeneus* Illiger, 1807 (N, S)

Rhynchaenus (Rhynchaenus) Clairville & Schellenberg, 1798

- Rhynchaenus (Rhynchaenus) alni* (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)
- Rhynchaenus (Rhynchaenus) erythropus* (Germar, 1821)
 - Rhynchaenus (Rhynchaenus) erythropus erythropus* (Germar, 1821) (N, S)
 - Rhynchaenus (Rhynchaenus) erythropus tricolor* Kiesenwetter, 1851 (S)
- Rhynchaenus (Rhynchaenus) irroratus* Kiesenwetter, 1851 (Si, Sa)
- Rhynchaenus (Rhynchaenus) jota* (Fabricius, 1787) (N)
- Rhynchaenus (Rhynchaenus) longulus* Schaufuss, 1862 (Si)
- Rhynchaenus (Rhynchaenus) pilosus* (Fabricius, 1781) (N, S, Si, Sa)
- Rhynchaenus (Rhynchaenus) quedenfeldti* (Gerhardt, 1865) (S)
- Rhynchaenus (Rhynchaenus) quercus* (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)
- Rhynchaenus (Rhynchaenus) rufus* (Schränk, 1781) (N, S, Sa)
- Rhynchaenus (Rhynchaenus) sparsus* Fåhræus, 1843 (N, S)

Rhynchaenus (Alyctus) Thomson, 1859

- Rhynchaenus (Alyctus) lonicerae* (Herbst, 1795) (N)
- Rhynchaenus (Alyctus) rusci* (Herbst, 1795) (N, S)
- Rhynchaenus (Alyctus) signifer* (Creutzer, 1799) (N, S, Si, Sa)
- Rhynchaenus (Alyctus) subfasciatus* (Gyllenhal, 1836) (N)

Rhynchaenus (Euthoron) Thomson, 1859

- Rhynchaenus (Euthoron) fagi* (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)

Rhynchaenus (Threcticus) Thomson, 1859

- Rhynchaenus (Threcticus) calceatus* (Germar, 1821)
 - Rhynchaenus (Threcticus) calceatus semirufus* Gyllenhal, 1821 (N)
- Rhynchaenus (Threcticus) testaceus* (Müller, 1776) (N, S, Sa)

Rhynchaenus (Tachyerges) Schönherr, 1826

- Rhynchaenus (Tachyerges) decoratus* (Germar, 1821) (N, S)
- Rhynchaenus (Tachyerges) rufitarsis* (Germar, 1821) (N, S)
- Rhynchaenus (Tachyerges) salicis* (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)
- Rhynchaenus (Tachyerges) stigma* (Germar, 1821) (N, S)

Rhynchaenus (Isochnus) Thomson, 1859

Rhynchaenus (Isochnus) foliorum (Müller, 1776) (N)
Rhynchaenus (Isochnus) populicola Silfverberg, 1977 (N)

Pseudorchestes Bedel, 1894

Pseudorchestes cinereus (Fåhraeus, 1843) (N, S, Si, Sa)
Pseudorchestes flavidus (H. Brisout, 1865) (Si)
Pseudorchestes persimilis (Reitter, 1911) (N, S)
Pseudorchestes pratensis (Germar, 1821) (N, S, Si)
Pseudorchestes smreczynskii (Dieckmann, 1958) (S)

Mecinus Germar, 1821

Mecinus circulatus (Marsham, 1802) (N, S, Si, Sa)
Mecinus collaris Germar, 1821 (N, S)
Mecinus comosus Boheman, 1845 (S, Si, Sa)
Mecinus heydeni Wencker, 1866 (Si)
Mecinus hesteticus Vitale, 1906 (Si, Sa)
Mecinus humeralis Tournier, 1873 (Si)
Mecinus janthinus (Germar, 1817) (N, S, Si)
Mecinus kammereri Wagner, 1827 (S, Si) (E)
Mecinus longiusculus Boheman, 1845 (N, S, Si, Sa)
Mecinus pyraster (Herbst, 1795) (N, S, Si, Sa)
Mecinus setosus Kiesenwetter, 1864 (Si, Sa)
Mecinus sicardi Hustache, 1920 (N)

Miarus Schönherr, 1826

Miarus abeillei Desbrochers, 1893 (N)
Miarus abnormis F. Solari, 1947 (N)
Miarus ajugae (Herbst, 1795) (N)
Miarus alzonae F. Solari, 1947 (N, S)
Miarus campanulae (Linné, 1767) (N, S)
Miarus distinctus (Boheman, 1845) (N, S)
Miarus graminis (Gyllenhal, 1813) (N, S)
Miarus longirostris (Gyllenhal, 1838) (N, S)
Miarus meridionalis (H. Brisout, 1862) (N, S, Si)
Miarus micros (Germar, 1821) (N, Si)
Miarus moroi F. Solari, 1947 (N) (E)
Miarus plantarum (Germar, 1824) (N, S, Si, Sa)
Miarus portae F. Solari, 1947 (N)
Miarus ursinus Abeille, 1906 (N, S)

Gymnetron (Gymnetron) Schönherr, 1826

Gymnetron (Gymnetron) alboscutellatum Hustache, 1913
Gymnetron (Gymnetron) alboscutellatum atratum F. Solari, 1931 (S) (E)
Gymnetron (Gymnetron) aper Desbrochers, 1893 (N, S)

Gymnetron (Gymnetron) ictericum (Gyllenhal, 1838) (N, S, Si)
Gymnetron (Gymnetron) labile (Herbst, 1795) (N, S, Si)
Gymnetron (Gymnetron) latiusculum Jacquelin du Val, 1855 (N, S, Si, Sa)
Gymnetron (Gymnetron) ludyi Reitter, 1907 (N)
Gymnetron (Gymnetron) melanarium (Germar, 1821) (N, S)
Gymnetron (Gymnetron) pascuorum (Gyllenhal, 1813) (N, S, Si, Sa)
Gymnetron (Gymnetron) pirazzolii (Stierlin, 1867) (N)
Gymnetron (Gymnetron) plantaginis Eppelsheim, 1875 (N)
Gymnetron (Gymnetron) rostellum (Herbst, 1795) (N, S, Si)
Gymnetron (Gymnetron) simum Mulsant & Rey, 1858 (S, Si, Sa)
Gymnetron (Gymnetron) stimulosum (Germar, 1821) (N, S)
Gymnetron (Gymnetron) tibiellum Desbrochers, 1900 (Sa)
Gymnetron (Gymnetron) variabile Rosenhauer, 1856 (N, S, Si, Sa)
Gymnetron (Gymnetron) veronicae (Germar, 1821) (N, S, Si, Sa)
Gymnetron (Gymnetron) villosulum Gyllenhal, 1838 (N, S, Si, Sa)

***Gymnetron (Rhinusa)* Stephens, 1831**

Gymnetron (Rhinusa) antirrhini (Paykull, 1800) (N, S, Si, Sa)
Gymnetron (Rhinusa) asellus (Gravenhorst, 1807) (N, S, Si, Sa)
Gymnetron (Rhinusa) bipustulatum (Rossi, 1794) (N, S, Si, Sa)
Gymnetron (Rhinusa) canescens Desbrochers, 1893 (S, Si)
Gymnetron (Rhinusa) collinum (Gyllenhal, 1813) (S, Sa)
Gymnetron (Rhinusa) depressum Rottenberg, 1871 (Si)
Gymnetron (Rhinusa) herbarum H. Brisout, 1862 (N, S, Si, Sa)
Gymnetron (Rhinusa) hispidum Brullé, 1832 (N, S)
Gymnetron (Rhinusa) lanigerum H. Brisout, 1862 (Si)
Gymnetron (Rhinusa) linariae (Panzer, 1792) (N, S, Si)
Gymnetron (Rhinusa) melas Boheman, 1838 (N)
Gymnetron (Rhinusa) netum (Germar, 1821)
 Gymnetron (Rhinusa) netum netum (Germar, 1821) (N, S, Si, Sa)
 Gymnetron (Rhinusa) netum liebmanni Hoffmann, 1962 (S) (E)
Gymnetron (Rhinusa) tetrum (Fabricius, 1792) (N, S, Si, Sa)
Gymnetron (Rhinusa) thapsicola (Germar, 1821) (N, S, Si)
Gymnetron (Rhinusa) vestitum (Germar, 1821) (N, S, Si)

***Cionus* Clairville & Schellenberg, 1798**

Cionus alauda (Herbst, 1784) (N, S, Si, Sa?)
Cionus clairvillei Boheman, 1838 (N)
Cionus ganglbaueri Wingelmüller, 1914 (N)
Cionus gebleri Gyllenhal, 1838 (N, S)
Cionus hortulanus (Fourcroy, 1785) (N, S, Si, Sa)
Cionus leonhardi Wingelmüller, 1914 (N)
Cionus longicollis C. Brisout, 1863
 Cionus longicollis montanus Wingelmüller, 1914 (N, S)
Cionus nigratarsis Reitter, 1904 (N, S)
Cionus olens (Fabricius, 1792) (N, S)

Cionus olivieri Rosenschöld, 1838 (N, S, Si, Sa)
Cionus schoenherri C. Brisout, 1863 (N, S)
Cionus scrophulariae (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)
Cionus subalpinus Reitter, 1904 (N)
Cionus thapsus (Fabricius, 1792) (N, S, Si, Sa)
Cionus tuberculosus (Scopoli, 1792) (N, S, Si, Sa)

Stereonychus Suffrian, 1854

Stereonychus fraxini (De Geer, 1775) (N, S, Si)
Stereonychus phillyreae Chevrolat, 1859 (S, Si)

Cleopus Stephens, 1831

Cleopus pulchellus (Herbst, 1795) (N, S, Sa)
Cleopus solani (Fabricius, 1792) (N, S, Sa)

Cionellus Reitter, 1904

Cionellus gibbifrons (Kiesenwetter, 1851) (N, S, Si, Sa)

Note

Otiorhynchus (Cryphiphorus) subseriatus: Località tipica: "Italia", nell'accezione del secolo scorso, quindi escluse Sardegna e Sicilia. Specie mai più ritrovata.
Otiorhynchus (Arammichnus) italicus: Località tipica: "Italia", nell'accezione del secolo scorso, quindi escluse Sardegna e Sicilia. Specie mai più ritrovata.
Pantomorus cervinus: Specie di origine neotropica, dannosa alle coltivazioni.
Gonipterus scutellatus: Specie australiana di recente insediamento in Italia sugli Eucalyptus.
Micromimus osellai: Il genere è centro-sud americano. Specie importata probabilmente con legname di origine brasiliana, ma non nota della sua reale patria di origine.

Cybocephalidae

Cybocephalus Erichson, 1844

Cybocephalus diadematus Chevrolat, 1861 (Si)
Cybocephalus festivus Erichson, 1845 (N, S)
Cybocephalus flaviceps Reitter, 1874 (Si?) (*)
Cybocephalus fodori Endrödy-Younga, 1965 (N, S)
Cybocephalus freyi Endrödy-Younga, 1968 (Sa)
Cybocephalus heydeni Reitter, 1875 (N) (*)
Cybocephalus micans Reitter, 1874 (S) (*)
Cybocephalus nigriceps (J. Sahlberg, 1908) (Si?) (*)
Cybocephalus planiceps Endrödy-Younga, 1968 (N?) (*)
Cybocephalus politissimus Reitter, 1898 (N, S)
Cybocephalus politus (Gyllenhal, 1813) (N, S) (*)

Cybocephalus pulchellus Erichson, 1845 (N) (*)
Cybocephalus rufifrons Reitter, 1874 (N, S, Si, Sa)
Cybocephalus similiceps Jacquelin DuVal, 1858 (N?) (*)
Cybocephalus wollastoni H. Lindberg, 1950 (Sa)

Note

Cybocephalus flaviceps: Presenza dubbia; specie nordafricana.
Cybocephalus heydeni: Presente solo in Liguria occidentale.
Cybocephalus micans: In S almeno in Puglia.
Cybocephalus nigriceps: Forse introdotto in Si con Palme da dattero.
Cybocephalus planiceps: Forse solo in Liguria occidentale, ma presenza dubbia.
Cybocephalus politus: In S forse solo lungo l'Appennino Tosco-Emiliano.
Cybocephalus pulchellus: Presenza dubbia in Val Pusteria orientale.
Cybocephalus similiceps: Forse solo in Liguria occidentale, ma presenza dubbia.

Dascillidae

Dascillus Latreille, 1796

Dascillus aprutianus Depoli, 1936 (S) (E)
Dascillus cervinus (Linnaeus, 1758) (N, S)
Dascillus sicanus Fairmaire, 1861 (N, S, Si)

Eurypogon Motschulsky, 1859

Eurypogon cribratus (Hampe, 1866) (N, S, Si?) (E)

Dasyceridae

Dasycerus Brongniart, 1800

Dasycerus sulcatus Brongniart, 1800 (N, S, Sa?)

Dermestidae

***Dermestes* (*Dermestinus*)** Zhantiev, 1967

Dermestes (*Dermestinus*) *aurichalceus* Küster, 1846 (N, S?, Sa)
Dermestes (*Dermestinus*) *erichsoni* Ganglbauer, 1904 (N, S, Si, Sa)
Dermestes (*Dermestinus*) *frischii* Kugelann, 1792
 Dermestes (*Dermestinus*) *frischii frischii* Kugelann, 1792 (N, S, Si, Sa)
Dermestes (*Dermestinus*) *gyllenhalii* Laporte de Castelnau, 1840
 Dermestes (*Dermestinus*) *gyllenhalii gyllenhalii* Laporte de Castelnau, 1840 (N, S)
Dermestes (*Dermestinus*) *lanarius* Illiger, 1801 (N, S, Sa)

Dermestes (Dermestinus) maculatus Degeer, 1774
Dermestes (Dermestinus) maculatus maculatus Degeer, 1774 (N, S, Si, Sa)
Dermestes (Dermestinus) murinus Linné, 1758
Dermestes (Dermestinus) murinus murinus Linné, 1758 (N, S, Si, Sa)
Dermestes (Dermestinus) mustelinus Erichson, 1846 (N, S, Si, Sa)
Dermestes (Dermestinus) pardalis Billberg, 1808 (Sa)
Dermestes (Dermestinus) sardous Küster, 1846 (N, S, Sa) (*)
Dermestes (Dermestinus) undulatus Brahm, 1790 (N, S, Si, Sa)

***Dermestes (Dermestes)* Linné, 1758**

Dermestes (Dermestes) ater Degeer, 1774 (N) (*)
Dermestes (Dermestes) bicolor Fabricius, 1781 (N, S, Sa)
Dermestes (Dermestes) fuliginosus Rossi, 1792 (N, S, Si)
Dermestes (Dermestes) haemorrhoidalis Küster, 1852 (N) (*)
Dermestes (Dermestes) hirticollis Fabricius, 1792 (Sa)
Dermestes (Dermestes) lardarius Linné, 1758 (N, S, Si, Sa)
Dermestes (Dermestes) olivieri Lepesme, 1939 (N, S, Si)
Dermestes (Dermestes) peruvianus Laporte de Castelnau, 1840 (N?, S?) (*)

***Attagenus (Attagenus)* Latreille, 1802**

Attagenus (Attagenus) brunneus Faldermann, 1835 (N, S, Si, Sa)
Attagenus (Attagenus) pellio (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)
Attagenus (Attagenus) schaefferi (Herbst, 1792)
Attagenus (Attagenus) schaefferi schaefferi (Herbst, 1792) (N, S, Si, Sa)
Attagenus (Attagenus) unicolor (Brahm, 1791)
Attagenus (Attagenus) unicolor unicolor (Brahm, 1791) (N, S, Si, Sa)

***Attagenus (Lanorus)* Mulsant & Rey, 1868**

Attagenus (Lanorus) bifasciatus (A.G. Olivier, 1790) (S, Si, Sa)
Attagenus (Lanorus) calabricus Reitter, 1881 (S, Si) (E)
Attagenus (Lanorus) fallax Gené, 1839 (S, Si, Sa)
Attagenus (Lanorus) lobatus Rosenhauer, 1856 (S, Si)
Attagenus (Lanorus) pantherinus (Ahrens, 1814) (N?, S?) (*)
Attagenus (Lanorus) picipennis Pic, 1894 (Si) (E)
Attagenus (Lanorus) punctatus (Scopoli, 1772) (N, S, Si)
Attagenus (Lanorus) quadrimaculatus Kraatz, 1858 (N?, S?) (*)
Attagenus (Lanorus) simplex Reitter, 1881 (S, Si, Sa)
Attagenus (Lanorus) trifasciatus (Fabricius, 1787) (N)

***Attagenus (Telopes)* L. Redtenbacher, 1843**

Attagenus (Telopes) maritimus Gené, 1839 (Si, Sa)
Attagenus (Telopes) obtusus (Gyllenhal, 1808) (Sa)
Attagenus (Telopes) uniformis Fairmaire, 1860 (Si)

Megatoma (Megatoma) Herbst, 1792

Megatoma (Megatoma) ruficornis Aubé, 1866 (S)

Megatoma (Megatoma) undata (Linné, 1758)

Megatoma (Megatoma) undata undata (Linné, 1758) (N, S)

Ctesias Stephens, 1830

Ctesias serra (Fabricius, 1792) (N, S)

Globicornis (Globicornis) Latreille, 1829

Globicornis (Globicornis) bifasciata (Perris, 1866) (Si)

Globicornis (Globicornis) breviclavus (Reitter, 1878) (N?) (*)

Globicornis (Globicornis) fasciata (Fairmaire, 1859) (N, S, Sa) (*)

Globicornis (Globicornis) nigripes (Fabricius, 1792) (N, S) (*)

Globicornis (Globicornis) picta (Küster, 1851) (S, Si, Sa)

Globicornis (Globicornis) tristis (Reitter, 1881) (S) (*)

Globicornis (Globicornis) variegata (Küster, 1851) (N, S, Si, Sa) (*)

Globicornis (Hadrotoma) Erichson, 1846

Globicornis (Hadrotoma) corticalis (Eichhoff, 1863) (N, Si)

Globicornis (Hadrotoma) emarginata (Gyllenhal, 1808) (N, S, Si, Sa)

Globicornis (Hadrotoma) sulcata (C. Brisout de Barneville, 1866) (S) (*)

Trogoderma Dejean, 1821

Trogoderma glabrum (Herbst, 1783)

Trogoderma glabrum glabrum (Herbst, 1783) (N, S)

Trogoderma granarium Everts, 1898 (S, Si, Sa?) (*)

Trogoderma inclusum J.L. Leconte, 1854 (S) (*)

Trogoderma megatomoides Reitter, 1881 (N) (*)

Trogoderma versicolor (Creutzer, 1799) (N, S, Si, Sa)

Phradonoma (Phradonoma) Jacquelin du Val, 1859

Phradonoma (Phradonoma) villosulum (C. Duftschmid, 1825) (N) (*)

Anthrenus (Anthrenus) Geoffroy, 1762

Anthrenus (Anthrenus) delicatus Kiesenwetter, 1851 (N, S, Si, Sa) (*)

Anthrenus (Anthrenus) festivus Erichson, 1846 (S?, Si, Sa) (*)

Anthrenus (Anthrenus) flavipes J.L. Leconte, 1854 (*)

Anthrenus (Anthrenus) flavipes flavipes J.L. Leconte, 1854 (Sa)

Anthrenus (Anthrenus) goliath Mulsant & Rey, 1868 (N, S, Si, Sa) (*)

Anthrenus (Anthrenus) munroi Hinton, 1943 (S)

Anthrenus (Anthrenus) pimpinellae Fabricius, 1775 (*)

Anthrenus (Anthrenus) pimpinellae mroczkowskii Kalík, 1954 (S)
Anthrenus (Anthrenus) pimpinellae pimpinellae Fabricius, 1775 (N, S, Si, Sa)
Anthrenus (Anthrenus) scrophulariae (Linné, 1758)
Anthrenus (Anthrenus) scrophulariae scrophulariae (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)
Anthrenus (Anthrenus) scrophulariae suecius Palm, 1940 (S, Si)

***Anthrenus (Nathrenus)* Casey, 1900**

Anthrenus (Nathrenus) biskrensis Reitter, 1887 (Si)
Anthrenus (Nathrenus) molitor Aubé, 1850 (N, Sa) (*)
Anthrenus (Nathrenus) signatus Erichson, 1846 (N, S, Si, Sa)
Anthrenus (Nathrenus) verbasci (Linné, 1767) (N, S, Si, Sa)
Anthrenus (Nathrenus) versicolor Reitter, 1887 (Si, Sa?)

***Anthrenus (Florilinus)* Mulsant & Rey, 1868**

Anthrenus (Florilinus) museorum (Linné, 1761) (N, S, Si, Sa)
Anthrenus (Florilinus) oberthueri Reitter, 1881 (N, Si) (*)

***Anthrenus (Helocerus)* Mulsant & Rey, 1868**

Anthrenus (Helocerus) fuscus A.G. Olivier, 1789 (N, S, Si, Sa)
Anthrenus (Helocerus) minutus Erichson, 1846 (S, Si, Sa) (*)

***Orphilus* Erichson, 1846**

Orphilus niger (Rossi, 1790) (N, S, Si, Sa)

***Trinodes* Dejean, 1821**

Trinodes hirtus (Fabricius, 1781) (N, S, Si, Sa)

***Thylodrias* Motschulsky, 1839**

Thylodrias contractus Motschulsky, 1839 (N) (*)

Note

Dermestes (Dermestinus): *Dermestes (Dermestinus) dimidiatus* Steven, 1808 e *D. (Dermestinus) sibiricus* Erichson, 1846 non sono stati inclusi poiché i loro corotipi (cfr. Mroczkowski, 1968) rendono improbabili le vecchie segnalazioni per "Italia" (cfr. Luigioni, 1929; Porta, 1929).

Dermestes (Dermestinus) sardous: In N segnalata solo dalla Liguria (Luigioni, 1929).

Dermestes (Dermestes) ater: Specie cosmopolita sinantropica sinora segnalata dalla Lombardia e del Veneto.

Dermestes (Dermestes) haemorrhoidalis: Specie ritenuta in passato sinonimo di *Dermestes (Dermestes) peruvianus*, nuova per la fauna italiana: Venezia, 25.V.1947, E. Busulini legit, 3 es. (Mroczkowski, in litteris, 1994).

Dermestes (Dermestes) peruvianus: Specie di origine neotropica, introdotta in Europa; segnalata genericamente di "Italia" (cfr. Luigioni, 1929; Porta, 1929).

Attagenus (Attagenus): Una nuova specie in litteris "Attagenus n.sp." e una presunta nuova specie "Attagenus? n. sp." sono state segnalate rispettivamente dal Bosco di Policoro (Basilicata) e dalle isole Alicudi, Lipari e Ustica (Sicilia).

Attagenus (Lanorus) pantherinus: Antiche segnalazioni per "Italia"; la specie è nota anche dall'Europa centrale.

Attagenus (Lanorus) quadrimaculatus: Antiche segnalazioni per "Italia"; la specie è nota anche da Francia, ex Jugoslavia e Grecia.

Globicornis (Globicornis) breviclavis: Specie del Caucaso (Mroczkowski 1968); le vecchie segnalazioni per Liguria e Piemonte (cfr. Luigioni, 1929; Porta, 1929) sono quasi certamente erranee.

Globicornis (Globicornis) fasciata: In N segnalata solo dalle Alpi Marittime (Porta, 1929).

Globicornis (Globicornis) nigripes: In Italia sinora segnalata solo dall'Alto Adige e dalla Calabria.

Globicornis (Globicornis) tristis: Specie transadriatica in Italia nota solo dal Bosco di Policoro (Basilicata).

Globicornis (Globicornis) variegata: In N segnalata solo dalle Alpi Marittime (Porta, 1929).

Globicornis (Hadrotoma) sulcata: Determinazione dubbia su materiale del Massiccio del Pollino (Calabria).

Trogoderma granarium: Specie, originaria della regione orientale, pressoché cosmopolita, introdotta in Italia probabilmente nel decennio 1940-1950.

Trogoderma inclusum: Determinazione dubbia; specie di origine nearctica, in Italia raccolta nel Bosco di Policoro (Basilicata) nel 1986.

Trogoderma megatomoides: Specie originaria dell'America centrale, introdotta in Europa; in Italia sinora segnalata solo dall'Alto Adige, dove è stata raccolta per la prima volta nel 1957.

Phradonoma (Phradonoma): *Phradonoma (Phradonoma) nobile nobile* (Reitter, 1881) indicata genericamente di tutta la regione Mediterranea (Mroczkowski, 1968) non risulta segnalata per l'Italia (Mroczkowski, in litteris, 1994).

Phradonoma (Phradonoma) villosulum: In Italia segnalata solo dalla Lombardia (Luigioni, 1929; Porta, 1929).

Anthrenus (Anthrenus) delicatus: Taxon solo recentemente riconosciuto come specie valida di Francia e Spagna (Kálík, 1993 sub "*Anthrenus delicatulus* Kiesw."); le segnalazioni per l'Italia essendo relative tutte ad *A. pimpinellae* var. *delicatus* necessitano di conferma.

Anthrenus (Anthrenus) festivus: La descrizione della specie è stata in passato attribuita a Rosenhauer (1856). In S solo una segnalazione dubbia per la Campania (Luigioni, 1929).

Anthrenus (Anthrenus) flavipes: Specie originaria della regione orientale attualmente pressoché cosmopolita (cfr. Peacock, 1992).

Anthrenus (Anthrenus) goliath: Le indicazioni per l'Italia riferendosi quasi tutte ad *Anthrenus (Anthrenus) pimpinellae* var. *goliath* necessitano di conferma; inoltre sembra che il vero *A. (A.) goliath* sia stato male interpretato (cfr. Kálík, 1992, 1993).

Anthrenus (Anthrenus) pimpinellae: Alcuni taxa infraspecifici sono probabilmente delle specie valide (cfr. Kálík, 1992); nel Bosco di Policoro (Basilicata) la ssp. *mroczkowskii* convive con la ssp. *pimpinellae*.

Anthrenus (Nathrenus) molitor: In N segnalata solo dalla Venezia Giulia (Luigioni, 1929).

Anthrenus (Florilinus) oberthueri: In N segnalata solo dalle Alpi Marittime e del Piemonte.

Anthrenus (Helocerus) minutus: In S segnalata solo dall'Isola del Giglio (Luigioni, 1929).

Thylodrias contractus: Specie sinantropica, distribuita in gran parte della regione olartica, forse

originaria dell'Asia centrale (cfr. Mroczkowski, 1968); in Italia è stata raccolta per la prima volta nel 1935 ed è sinora nota di Lombardia e Venezia Giulia. Alcuni autori l'hanno attribuita alla famiglia monospecifica Thylodriidae (cfr. Süss & Fogato, 1978).

Derodontidae

Derodontus LeConte, 1861

Derodontus macularis (Fuss, 1850) (N?) (*)

Derodontus raffrayi Grouvelle, 1917 (S) (E) (*)

Laricobius Rosenhauer, 1846

Laricobius erichsoni Rosenhauer, 1846 (N)

Note

Derodontus macularis: Mancano segnalazioni recenti di catture effettuate realmente all'interno degli attuali confini italiani (cfr. Poggi, 1995).

Derodontus raffrayi: Per una evidente confusione di località Nikitsky (1993) cita il tipo per la Sicilia, mentre esso proviene dall'Abruzzo.

Drilidae

Malacogaster Bassi, 1833

Malacogaster nigripes Schaufuss, 1867 (Si)

Malacogaster passerinii Bassi, 1833 (Si, Sa)

Drilus G.A. Olivier, 1790

Drilus concolor Ahrens, 1812 (N)

Drilus flavescens (Fourcroy, 1785) (N, S, Si, Sa?)

Dryopidae

Pomatinus Sturm, 1853

Pomatinus substriatus (Ph. Müller, 1806) (N, S, Si, Sa) (*)

Dryops Olivier, 1791

Dryops algiricus (Lucas, 1849) (N, S, Si, Sa)

Dryops anglicanus Edwards, 1909 (N)

Dryops costae (Heyden, 1891) (Sa) (E)

Dryops doderoi Bollow, 1936 (N, S, Si, Sa)
Dryops ernesti Des Gozis, 1886 (N, S)
Dryops gracilis (Karsch, 1881) (N, Si)
Dryops luridus (Erichson, 1847) (N, S, Si, Sa)
Dryops lutulentus (Erichson, 1847) (N, S, Si)
Dryops nitidulus (Heer, 1841) (N, S)
Dryops rufipes (Krynicky, 1832) (N, S)
Dryops similis Bollow, 1936 (N, S, Sa)
Dryops striatellus (Fairmaire & Brisout, 1859) (S, Si)
Dryops striatopunctatus (Heer, 1841) (N, S)
Dryops subincanus (Kuwert, 1890) (N, S, Si)
Dryops sulcipennis (A. Costa, 1883) (N, S, Si, Sa)
Dryops vienensis (Heer, 1841) (N, S)

Note

Pomatinus substriatus: Specie tradizionalmetne attribuita al genere *Helichus* Erichson, 1847.

Dynastidae

Calicnemis Castelnau, 1832

Calicnemis latreillei Castelnau, 1832 (S, Si)
Calicnemis sardiniensis Leo, 1985 (Sa) (E)

Pentodon Hope, 1837

Pentodon algerinum (Herbst, 1789)
Pentodon algerinum algerinum (Herbst, 1789) (Sa)
Pentodon bidens (Pallas, 1771)
Pentodon bidens punctatum (Villers, 1789) (N, S, Si, Sa)

Phyllognathus Eschscholtz, 1830

Phyllognathus excavatus (Forster, 1771) (N, S, Si, Sa)

Oryctes Illiger, 1798

Oryctes nasicornis (Linné, 1758)
Oryctes nasicornis laevigatus Heer, 1841 (N, S, Si, Sa)

Dytiscidae

Methles Sharp, 1882

Methles cribratellus (Fairmaire, 1880) (Si, Sa)

Hyphydrus Illiger, 1807

Hyphydrus anatolicus Guignot, 1957 (N, S)
Hyphydrus aubei Ganglbauer, 1892 (N, S, Si, Sa)
Hyphydrus ovatus (Linné, 1761) (N, S)

Hydrovatus (Vathydrus) Guignot, 1954

Hydrovatus (Vathydrus) clypealis Sharp, 1876 (S, Sa)
Hydrovatus (Vathydrus) cuspidatus (Kunze, 1818) (N, S, Si, Sa)
Hydrovatus (Vathydrus) simplex Sharp, 1882 (Si, Sa)

Yola Gozis, 1886

Yola bicarinata (Latreille, 1804) (N, S, Si, Sa)

Bidessus Sharp, 1882

Bidessus calabricus Guignot, 1957 (S, Si)
Bidessus delicatulus (Schaum, 1844) (N, S, Si, Sa)
Bidessus goudoti (Castelnau, 1834) (S, Si, Sa)
Bidessus grossepunctatus Vorbringer, 1907 (N)
Bidessus minutissimus (Germar, 1824) (N, S, Si, Sa)
Bidessus pumilus (Aubé, 1836) (N, S, Sa)
Bidessus saucius (Desbrochers, 1871) (N, S, Si, Sa)
Bidessus tiragalloi Sanfilippo, 1978 (N, S) (E)
Bidessus unistriatus (Schränk, 1781) (N, S)

Hydroglyphus Motschulsky, 1853

Hydroglyphus pusillus (Fabricius, 1781) (N, S, Si, Sa)
Hydroglyphus signatellus (Klug, 1834) (N, S, Si)

Coelambus Thomson, 1860

Coelambus confluens (Fabricius, 1787) (N, S, Si, Sa)
Coelambus impressopunctatus (Schaller, 1783) (N, S, Sa)
Coelambus lagari Fery, 1992 (Si)
Coelambus pallidulus (Aubé, 1850) (Si, Sa)
Coelambus parallelogrammus (Ahrens, 1812) (N, S, Si, Sa)
Coelambus sanfilippoi Fery, 1992 (Sa) (E)

Hygrotus Stephens, 1828

Hygrotus decoratus (Gyllenhal, 1810) (N, S)
Hygrotus inaequalis (Fabricius, 1777) (N, S, Si, Sa)
Hygrotus versicolor (Schaller, 1783) (N, S)

***Herophydrus (Herophydrus)* Sharp, 1882**

Herophydrus (Herophydrus) guineensis (Aubé, 1838) (Si, Sa)

Herophydrus (Herophydrus) musicus (Klug, 1833) (Si, Sa)

***Suphrodytes* Gozis, 1914**

Suphrodytes dorsalis (Fabricius, 1787) (N)

***Hydroporus (Hydroporus)* Clairville, 1806**

Hydroporus (Hydroporus) analis Aubé, 1836 (N, S, Si, Sa)

Hydroporus (Hydroporus) angustatus Sturm, 1835 (N, S)

Hydroporus (Hydroporus) discretus Fairmaire, 1859 (N, S, Si, Sa)

Hydroporus (Hydroporus) erythrocephalus (Linné, 1758) (N, S)

Hydroporus (Hydroporus) ferrugineus Stephens, 1828 (N)

Hydroporus (Hydroporus) foveolatus Heer, 1839 (N)

Hydroporus (Hydroporus) gridellii Focarile, 1960 (S, Si, Sa)

Hydroporus (Hydroporus) incognitus Sharp, 1869 (N, S)

Hydroporus (Hydroporus) ionicus Miller, 1862 (N, S)

Hydroporus (Hydroporus) limbatus Aubé, 1836 (S, Si, Sa)

Hydroporus (Hydroporus) lucasi Reiche, 1866 (Si)

Hydroporus (Hydroporus) marginatus (Duftschmidt, 1805) (N, S, Si, Sa)

Hydroporus (Hydroporus) memnonius Nicolai, 1822 (N, S, Si, Sa)

Hydroporus (Hydroporus) nigellus Mannerheim, 1853 (N)

Hydroporus (Hydroporus) nigrita (Fabricius, 1792) (N, S)

Hydroporus (Hydroporus) nivalis Heer, 1839 (N)

Hydroporus (Hydroporus) obsoletus Aubé, 1836 (N, S, Si, Sa)

Hydroporus (Hydroporus) palustris (Linné, 1761) (N, S, Si, Sa)

Hydroporus (Hydroporus) piceus Stephens, 1828 (N)

Hydroporus (Hydroporus) planus (Fabricius, 1781) (N, S, Si, Sa)

Hydroporus (Hydroporus) pubescens (Gyllenhal, 1808) (N, S, Si, Sa)

Hydroporus (Hydroporus) rufifrons (Duftschmidt, 1805) (N)

Hydroporus (Hydroporus) sanfilippo Ghidini, 1958 (N, S) (E)

Hydroporus (Hydroporus) springeri G.Müller, 1924 (N)

Hydroporus (Hydroporus) striola (Gyllenhal, 1827) (N)

Hydroporus (Hydroporus) tessellatus Drapiez, 1819 (N, S, Si, Sa)

Hydroporus (Hydroporus) tristis (Paykull, 1798) (N, S)

***Hydroporus (Hydroporidius)* Guignot, 1949**

Hydroporus (Hydroporidius) melanarius Sturm, 1835 (N)

***Hydroporus (Sternoporus)* Falkenstroem, 1930**

Hydroporus (Sternoporus) jurjurensis Régimbart, 1895 (Si)

Hydroporus (Sternoporus) kraatzi Schaum, 1868 (N)

Hydroporus (Sternoporus) longicornis Sharp, 1870 (N)
Hydroporus (Sternoporus) longulus Mulsant, 1860 (N)
Hydroporus (Sternoporus) regularis Sharp, 1882 (Sa)

Porhydrus Guignot, 1945

Porhydrus genei (Aubé, 1836) (Si, Sa)
Porhydrus lineatus (Fabricius, 1775) (N, S)
Porhydrus obliquesignatus (Bielz, 1852) (N, S, Si)

Rhythrodytes Bameul, 1989

Rhythrodytes crux (Fabricius, 1792) (N, S)
Rhythrodytes sexguttatus (Aubé, 1836) (S, Sa)

Graptodytes Seidlitz, 1887

Graptodytes bilineatus (Sturm, 1835) (N, S)
Graptodytes concinnus (Stephens, 1835) (N, S, Si, Sa)
Graptodytes fractus (Sharp, 1882) (N, S, Si, Sa)
Graptodytes granularis (Linné, 1767) (N, S)
Graptodytes ignotus (Mulsant & Rey, 1861) (N, S, Si, Sa)
Graptodytes pictus (Fabricius, 1787) (N, S)
Graptodytes pietrii Normand, 1933 (Si)
Graptodytes varius (Aubé, 1836) (N, S, Si, Sa)
Graptodytes veterator Zimmermann, 1918 (N, S)

Metaporus Guignot, 1945

Metaporus meridionalis (Aubé, 1836) (N, Si, Sa)

Scarodytes Gozis, 1914

Scarodytes halensis (Fabricius, 1787)
Scarodytes halensis halensis (Fabricius, 1787) (N, S, Si)
Scarodytes halensis nigriventris Zimmermann, 1917 (Sa)
Scarodytes pederzanii Angelini, 1972 (S)
Scarodytes ruffoi Franciscolo, 1961 (S)

Stictonectes Brinck, 1943

Stictonectes escheri (Aubé, 1836) (S, Si)
Stictonectes lepidus (Olivier, 1795) (N)
Stictonectes optatus (Seidlitz, 1887) (N, S, Si, Sa)
Stictonectes rufulus (Aubé, 1836) (Si, Sa)

Deronectes Sharp, 1882

Deronectes aubei (Mulsant, 1843) (N, S)
Deronectes delarouzei (Jacques du Val, 1868) (N, S, Si)
Deronectes fairmairei (Leprieur, 1876) (N, S, Sa)
Deronectes latus (Stephens, 1828) (N, S, Si)
Deronectes moestus (Fairmaire, 1858) (N, S, Si, Sa)

Stictotarsus Zimmermann, 1917

Stictotarsus duodecimpustulatus (Fabricius, 1792) (N, S, Si, Sa)
Stictotarsus procerus (Aubé, 1838) (Si, Sa)

Potamonectes (Potamonectes) Zimmermann, 1921

Potamonectes (Potamonectes) bucheti (Regimbart, 1898) (N)
Potamonectes (Potamonectes) canaliculatus (Lacordaire, 1835) (N, S)
Potamonectes (Potamonectes) cerisyi (Aubé, 1836) (N, S, Si, Sa)
Potamonectes (Potamonectes) clarki (Wollaston, 1862) (Sa)
Potamonectes (Potamonectes) elegans (Panzer, 1794) (N, S)
Potamonectes (Potamonectes) fenestratus (Aubé, 1836) (S, Si) (E)
Potamonectes (Potamonectes) griseostriatus (De Geer, 1774) (N, S, Sa)
Potamonectes (Potamonectes) luctuosus (Aubé, 1836) (N, S, Si)
Potamonectes (Potamonectes) martini (Fairmaire, 1858)
Potamonectes (Potamonectes) martini sardus (Gemminger & Harold, 1868) (Si, Sa)
Potamonectes (Potamonectes) sansi (Aubé, 1836) (N, S, Si)

Oreodytes Seidlitz, 1887

Oreodytes davisi (Curtis, 1831) (N, S)
Oreodytes meridionalis Binaghi & Sanfilippo, 1971 (S) (E)
Oreodytes sanmarki (Sahlberg, 1834) (N, S)
Oreodytes septentrionalis (Gyllenhal, 1827) (N, S)

Canthydrus Sharp, 1882

Canthydrus diophthalmus (Reiche & Saulcy, 1855) (Si, Sa)

Noterus Clairville, 1806

Noterus clavicornis (De Geer, 1774) (N, S, Si, Sa)
Noterus crassicornis (Müller, 1776) (N, S, Si)
Noterus laevis Sturm, 1834 (Si, Sa)

Laccophilus Leach, 1817

Laccophilus hyalinus (De Geer, 1774)
Laccophilus hyalinus hyalinus (De Geer, 1774) (N)
Laccophilus hyalinus testaceus Aubé, 1836 (N, S, Si, Sa)
Laccophilus minutus (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)

Laccophilus obsoletus Westhoff, 1881 (N, S, Si, Sa)

Copelatus Erichson, 1832

Copelatus atriceps Sharp, 1882 (S, Si, Sa)

Copelatus haemorrhoidalis (Fabricius, 1787) (N, S, Si, Sa)

Metronectes Sharp, 1882

Metronectes aubei (Perris, 1869) (S)

Platambus Thomson, 1860

Platambus maculatus (Linné, 1758) (N, S)

Agabus (Gabinectes) Guignot, 1931

Agabus (Gabinectes) brunneus (Fabricius, 1798) (N, S, Si, Sa)

Agabus (Gabinectes) didymus (Olivier, 1795) (N, S, Si, Sa)

Agabus (Dichonectes) Guignot, 1945

Agabus (Dichonectes) biguttatus (Olivier, 1795) (N, S, Si, Sa)

Agabus (Dichonectes) binotatus Aubé, 1836 (N, S, Si, Sa)

Agabus (Dichonectes) dilatatus (Brullé, 1832) (N, S, Si)

Agabus (Dichonectes) guttatus (Paykull, 1798)

Agabus (Dichonectes) guttatus guttatus (Paykull, 1798) (N, S, Si, Sa)

Agabus (Dichonectes) guttatus baudii Seidlitz, 1887 (N) (E)

Agabus (Dichonectes) nitidus (Fabricius, 1801) (N, S, Si, Sa)

Agabus (Gaurodytes) Thomson, 1859

Agabus (Gaurodytes) affinis (Paykull, 1798) (N)

Agabus (Gaurodytes) bipustulatus (Linné, 1767) (N, S, Si, Sa)

Agabus (Gaurodytes) chalconotus (Panzer, 1796) (N, S, Si, Sa)

Agabus (Gaurodytes) congener (Thunberg, 1794) (N, S, Sa)

Agabus (Gaurodytes) conspersus (Marsham, 1802) (N, S, Si, Sa)

Agabus (Gaurodytes) erichsoni (Gemminger & Harold, 1868) (N)

Agabus (Gaurodytes) lagabrunensis Schizzerotto & Fery, 1989 (N, S) (E)

Agabus (Gaurodytes) lapponicus (Thomson, 1867) (N)

Agabus (Gaurodytes) melanarius Aubé, 1836 (N)

Agabus (Gaurodytes) montanus (Stephens, 1828) (Si, Sa)

Agabus (Gaurodytes) nebulosus (Forster, 1771) (N, S, Si, Sa)

Agabus (Gaurodytes) neglectus Erichson, 1837 (N)

Agabus (Gaurodytes) paludosus (Fabricius, 1801) (N, S)

Agabus (Gaurodytes) pederzanii Fery & Nilsson, 1993 (N, S) (E)

Agabus (Gaurodytes) pseudoneglectus Franciscolo, 1972 (N, S)

Agabus (Gaurodytes) solieri Aubé, 1836 (N, S)

Agabus (Gaurodytes) striolatus (Gyllenhal, 1808) (S)
Agabus (Gaurodytes) sturmi (Gyllenhal, 1808) (N)
Agabus (Gaurodytes) subtilis Erichson, 1837 (N)
Agabus (Gaurodytes) uliginosus (Linné, 1761) (N, S)

Agabus (Eriglenus) Thomson, 1860

Agabus (Eriglenus) undulatus (Schränk, 1776) (N)

Ilybius (Ilybius) Erichson, 1832

Ilybius (Ilybius) aenescens Thomson, 1870 (N)
Ilybius (Ilybius) ater (De Geer, 1774) (N, S)
Ilybius (Ilybius) fenestratus (Fabricius, 1781) (N)
Ilybius (Ilybius) fuliginosus (Fabricius, 1792) (N, S)
Ilybius (Ilybius) guttiger (Gyllenhal, 1808) (N)
Ilybius (Ilybius) meridionalis Aubé, 1836 (N, Sa)
Ilybius (Ilybius) obscurus (Marsham, 1802) (N, S)
Ilybius (Ilybius) subaeneus Erichson, 1837 (N)

Nartus Zaitzev, 1907

Nartus grapei (Gyllenhal, 1808) (N, S)

Melanodytes Seidlitz, 1887

Melanodytes pustulatus (Rossi, 1792) (N, S, Sa)

Rhantus Stephens, 1835

Rhantus bistriatus (Bergsträsser, 1778) (N, S, Si, Sa)
Rhantus exsoletus (Forster, 1771) (N)
Rhantus latitans Sharp, 1882 (N)
Rhantus notaticollis (Aubé, 1836) (N)
Rhantus notatus (Fabricius, 1781) (N)
Rhantus pulverosus (Stephens, 1828) (N, S, Si, Sa)
Rhantus suturellus (Harris, 1828) (S)

Colymbetes Clairville, 1806

Colymbetes fuscus (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)
Colymbetes schildknechti Dettner, 1983 (S, Si, Sa)

Meladema Castelnau, 1834

Meladema coriacea Castelnau, 1834 (N, S, Si, Sa)

Eretes Castelnau, 1833

Eretes sticticus (Linné, 1767) (N, S, Si, Sa)

***Hydaticus (Hydaticus)* Leach, 1817**

Hydaticus (Hydaticus) continentalis J.Balfour-Browne, 1944 (N)

Hydaticus (Hydaticus) seminiger (De Geer, 1774) (N, S, Sa)

Hydaticus (Hydaticus) transversalis (Pontoppidan, 1763) (N, S)

***Hydaticus (Guignotites)* Brinck, 1943**

Hydaticus (Guignotites) grammicus (Germar, 1830) (N)

Hydaticus (Guignotites) leander (Rossi, 1790) (N, S, Si, Sa)

***Graphoderus* Stephens, 1835**

Graphoderus austriacus (Sturm, 1834) (N, S)

Graphoderus bilineatus (De Geer, 1774) (N, S)

Graphoderus cinereus (Linné, 1758) (N, S, Si)

Graphoderus verrucifer (Sahlberg, 1824) (N)

Graphoderus zonatus (Hoppe, 1795) (N)

***Acilius (Acilius)* Leach, 1817**

Acilius (Acilius) canaliculatus (Nicolai, 1822) (N, S)

Acilius (Acilius) sulcatus (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)

***Acilius (Homoeolytrus)* Gobert, 1874**

Acilius (Homoeolytrus) duvergeri Gobert, 1874 (Sa)

***Dytiscus* Linné, 1758**

Dytiscus circumcinctus Ahrens, 1811 (N, S, Sa)

Dytiscus circumflexus Fabricius, 1801 (N, S, Si, Sa)

Dytiscus dimidiatus Bergstrasser, 1778 (N, S)

Dytiscus lapponicus Gyllenhal, 1808

Dytiscus lapponicus disjunctus Camerano, 1880 (N)

Dytiscus latissimus Linné, 1758 (N)

Dytiscus marginalis Linné, 1758 (N, S, Si)

Dytiscus mutinensis Pederzani, 1971 (N, S, Si)

Dytiscus pisanus Castelnau, 1834 (N, S, Sa)

Dytiscus semisulcatus Müller, 1776 (N, S, Si)

***Cybister (Melanectes)* Brinck, 1945**

Cybister (Melanectes) vulneratus Klug, 1834 (Si)

Cybister (Cybister) Curtis, 1827

Cybister (Cybister) senegalensis Aubé, 1838 (Si, Sa)

Cybister (Cybister) tripunctatus (Olivier, 1795)

Cybister (Cybister) tripunctatus africanus Castelnau, 1834 (N, S, Si, Sa)

Cybister (Trochalus) Dejean, 1833

Cybister (Trochalus) lateralimarginalis (De Geer, 1774) (N, S, Si, Sa)

Elateridae

Agrypnus Eschscholtz, 1829

Agrypnus crenicollis (Ménétriés, 1832) (N, S, Si)

Agrypnus murinus (Linné, 1758) (N, S, Si)

Danosoma C.G. Thomson, 1859

Danosoma fasciatum (Linné, 1758) (N)

Lacon Castelnau, 1838

Lacon lepidopterus (Panzer) (N, S)

Lacon punctatus (Herbst, 1779) (N, S, Si, Sa)

Lacon querceus (Herbst, 1784) (N, S, Si?)

Lanelater Arnett, 1952

Lanelater notodonta (Latreille, 1827) (Si) (*)

Aeoloderma Fleutiaux, 1928

Aeoloderma crucifer (Rossi, 1790) (N, S, Si, Sa)

Drasterius Eschscholtz, 1829

Drasterius bimaculatus (Rossi, 1790) (N, S, Si, Sa)

Berninelsonius Leseigneur, 1970

Berninelsonius hyperboreus (Gyllenhal, 1827) (N)

Hypnoidus Dillwyn, 1829

Hypnoidus consobrinus (Mulsant & Guillebeau, 1855) (N)

Hypnoidus riparius (Fabricius, 1792) (N, S)

Hypnoidus rivularius (Gyllenhal, 1808) (N)

Actenicerus Kiesenwetter, 1858

Actenicerus sjaelandicus (O.F. Müller, 1764) (N, S)

Anostirus (Anostirus) C.G. Thomson, 1859

Anostirus (Anostirus) castaneus (Linné, 1758) (N)

Anostirus (Ipostirus) Binaghi, 1940

Anostirus (Ipostirus) gracilicollis (Stierlin, 1896) (N, S)

Anostirus (Parastirus) Binaghi, 1940

Anostirus (Parastirus) cerrutii Binaghi, 1940 (S) (E)

Anostirus (Parastirus) purpureus (Poda, 1761) (N, S)

Anostirus (Pseudostirus) Binaghi, 1940

Anostirus (Pseudostirus) gabilloti (Pic, 1907) (N)

Anostirus (Pseudostirus) gudenзии Platia, 1983 (S) (E)

Anostirus (Pseudostirus) marginatus (Pic, 1931) (S) (E)

Anostirus (Pseudostirus) reissi (Reitter, 1913) (N) (E)

Anostirus (Pseudostirus) sulphuripennis (Germar, 1843) (N)

Anostirus (Pseudostirus) zenii (Rosenhauer, 1856) (N)

Ctenicera Latreille, 1829

Ctenicera bononii Binaghi, 1940 (N) (E)

Ctenicera cuprea (Fabricius, 1775) (N, S)

Ctenicera doderoi Binaghi, 1940 (N) (E)

Ctenicera heyeri (Saxesen, 1838) (N)

Ctenicera pectinicornis (Linné, 1758) (N, S)

Ctenicera virens (Schrank, 1781) (N, S)

Calambus C.G. Thomson, 1859

Calambus bipustulatus (Linné, 1767) (N, S)

Aplotarsus Stephens, 1830

Aplotarsus incanus (Gyllenhal, 1827) (N, S)

Hypoganus Kiesenwetter, 1858

Hypoganus inunctus (Panzer, 1795) (N, S)

Liotrichus Kiesenwetter, 1858

Liotrichus affinis (Paykull, 1800) (N)

Metanomus Buysson, 1887

Metanomus grouvellei (Buysson, 1900) (N)

Metanomus infuscatus (Eschscholtz, 1829) (N)

Paraphotistus (Paraphotistus) Kishii, 1966

Paraphotistus (Paraphotistus) impressus (Fabricius, 1792) (N, S)

Paraphotistus (Setasomus) Gurjeva, 1985

Paraphotistus (Setasomus) nigricornis (Panzer, 1799) (N)

Prosternon Latreille, 1834

Prosternon tessellatum (Linné, 1758) (N, S)

Selatosomus Stephens, 1830

Selatosomus aeneus (Linné, 1758) (N, S)

Selatosomus amplicollis (Germar, 1843) (N, S, Si)

Selatosomus cruciatus (Linné, 1758) (N)

Selatosomus latus (Fabricius, 1801) (N, S)

Selatosomus melancholicus (Fabricius, 1798) (N, S)

Selatosomus rugosus (Germar, 1817) (N)

Cidnopus C.G. Thomson, 1859

Cidnopus aeruginosus (Olivier, 1790) (N, S?)

Cidnopus pilosus (Leske, 1785) (N, S, Si)

Cidnopus pseudopilosus Platia & Gudenzi, 1985 (N, S, Si)

Elathous Reitter, 1890

Elathous perrisi (Desbrochers des Loges, 1873) (Sa)

Kibunea Kishii, 1966

Kibunea minuta (Linné, 1758) (N, S, Si)

Limonius Eschscholtz, 1829

Limonius aeneoniger (DeGeer, 1774) (N)

Limonius quercus (Olivier, 1790) (N, S)

Nothodes LeConte, 1861

Nothodes parvulus (Panzer, 1799) (N, S)

Denticollis Piller & Mitterpacher, 1783

Denticollis linearis (Linné, 1758) (N, S)

Denticollis rubens Piller & Mitterpacher, 1783 (N, S)

Odontoderus Schwarz, 1894

Odontoderus antigai (Buysson, 1895) (S, Si)

Dima Charpentier, 1825

Dima elateroides Charpentier, 1825 (N)

Athous (Athous) Eschscholtz, 1829

Athous (Athous) haemorrhoidalis (Fabricius, 1801) (N, S)

Athous (Athous) ineptus Candèze, 1860 (S, Si)

Athous (Athous) limoniiformis Candèze, 1865 (N, S)

Athous (Athous) vittatus (Fabricius, 1792) (N, S, Si)

Athous (Euplathous) Reitter, 1905

Athous (Euplathous) frigidus Mulsant & Guillebeau, 1855 (N, S)

Athous (Euplathous) villardi Carret, 1904 (N) (E)

Athous (Exanathrotus) Méquignon, 1930

Athous (Exanathrotus) angulifrons Reitter, 1905 (N)

Athous (Exanathrotus) austriacus Desbrochers des Loges, 1873 (N)

Athous (Exanathrotus) brevicornis Desbrochers des Loges, 1871 (Sa)

Athous (Exanathrotus) cachecticus Candèze, 1860 (S, Si) (E)

Athous (Exanathrotus) cavifrons Redtenbacher, 1858 (N)

Athous (Exanathrotus) corsicus Reiche, 1861 (Sa)

Athous (Exanathrotus) crassicornis Candèze, 1860 (N)

Athous (Exanathrotus) emaciatus Candèze, 1860 (N)

Athous (Exanathrotus) flavipennis Candèze, 1860 (N, S)

Athous (Exanathrotus) incognitus Platia, 1988 (N) (E)

Athous (Exanathrotus) lepontinus Schwarz, 1900 (N)

Athous (Exanathrotus) marginicollis Reitter, 1890 (N?, S)

Athous (Exanathrotus) melanoderes Mulsant & Guillebeau, 1855 (N)

Athous (Exanathrotus) subfuscus (O.F. Muller, 1764) (N, S)

Athous (Exanathrotus) villosulus Desbrochers des Loges, 1875 (Sa)

Athous (Exanathrotus) zebei Bach, 1854 (N, S?)

Athous (Orthathous) Reitter, 1905

Athous (Orthathous) bicolor (Goeze, 1777) (N, S)

Athous (Orthathous) binaghii Platia, 1984 (S) (E)

Athous (Orthathous) dorgaliensis Buysson, 1912 (Sa)

Athous (Orthathous) ganglbaueri Schwarz, 1897 (N)

Athous (Orthathous) goriciensis Reitter, 1905 (N)

Athous (Orthathous) insularis Desbrochers des Loges, 1869 (Sa?)

Athous (Orthathous) judicariensis Schwarz, 1900 (N) (E)

Athous (Orthathous) luigionii Platia, 1988 (S) (E)

Athous (Orthathous) melonii Platia, 1984 (Sa) (E)

Athous (Orthathous) olbiensis Mulsant & Guillebeau, 1856 (N)

Athous (Orthathous) pedemontanus Platia, 1988 (N)

Athous (Orthathous) plagipennis Reitter, 1905 (N)

Athous (Orthathous) subvirgatus K. Daniel, 1904 (N) (E)

Athous (Orthathous) zappiorum Platia, 1985 (S) (E)

Diacanthous Reitter, 1905

Diacanthous undulatus (DeGeer, 1774) (N)

Harminius Fairmaire, 1851

Harminius florentinus (Desbrochers des Loges, 1870) (N, S) (E)

Harminius spiniger (Candèze, 1860) (N, S, Si)

Megathous Reitter, 1905

Megathous ficuzzensis (Buysson, 1912) (Si) (E)

Megathous nigerrimus (Desbrochers des Loges, 1870) (N, S)

Hemicrepidius Germar, 1839

Hemicrepidius hirtus (Herbst, 1784) (N, S, Si)

Hemicrepidius niger (Linné, 1758) (N)

Stenagostus C.G. Thomson, 1859

Stenagostus rhombeus (Olivier, 1790) (N, S, Si)

Stenagostus rufus (DeGeer, 1774) (N)

Stenagostus sardiniensis (Reitter, 1914) (Sa) (E)

Adrastus Eschscholtz, 1829

Adrastus axillaris Erichson, 1841 (N, S)

Adrastus binaghii Leseigneur, 1969 (N, S) (E)

Adrastus lacertosus Erichson, 1841 (N, S)
Adrastus limbatus (Fabricius, 1776) (N, S)
Adrastus montanus (Scopoli, 1763) (N)
Adrastus pallens (Fabricius, 1792) (N, S)
Adrastus rachifer (Fourcroy, 1785) (N, S, Si, Sa?)
Adrastus temperei Leseigneur, 1974 (Sa?)

Peripontius Gurjeva, 1979

Peripontius rutilipennis (Illiger, 1807) (N)
Peripontius terminatus (Erichson, 1841) (N, S)

Synaptus Eschscholtz, 1829

Synaptus filiformis (Fabricius, 1781) (N, S, Si, Sa)

Agriotes Eschscholtz, 1829

Agriotes acuminatus (Stephens, 1830) (N, S)
Agriotes aequalis Schwarz, 1891 (N, S, Si) (E)
Agriotes brevis Candèze, 1863 (N, S)
Agriotes corsicus Candèze, 1863 (S, Si, Sa)
Agriotes gallicus Lacordaire, 1835 (N)
Agriotes infuscatus Desbrochers des Loges, 1870 (N, S)
Agriotes lineatus (Linné, 1767) (N, S, Si, Sa)
Agriotes litigiosus (Rossi, 1792) (N, S, Si, Sa?)
Agriotes modestus Kiesenwetter, 1858 (N, S, Si?)
Agriotes obscurus (Linné, 1758) (N, S)
Agriotes pallidulus (Illiger, 1807) (N)
Agriotes pilosellus (Schönherr, 1817) (N)
Agriotes proximus Schwarz, 1891 (N, S)
Agriotes siciliensis Pic, 1912 (Si)
Agriotes sordidus (Illiger, 1807) (N, S, Si, Sa)
Agriotes sputator (Linné, 1758) (N, S)
Agriotes ustulatus (Schaller, 1783) (N, S, Si)

Dalopius Eschscholtz, 1829

Dalopius marginatus (Linné, 1758) (N, S)

Ectinus Eschscholtz, 1829

Ectinus aterrimus (Linné, 1761) (N)

Ampedus Dejean, 1833

Ampedus aethiops (Lacordaire, 1835) (N, S)
Ampedus balteatus (Linné, 1758) (N)

Ampedus brunnicornis Germar, 1844 (N, S?)
Ampedus cardinalis (Schiödte, 1865) (N, S, Si, Sa)
Ampedus cinnabarinus (Eschscholtz, 1829) (N, S, Si)
Ampedus coenobita (A. Costa, 1881) (N, S, Si)
Ampedus corsicus (Reitter, 1918) (Sa?)
Ampedus elegantulus (Schönherr, 1817) (N, S)
Ampedus elongatulus (Fabricius, 1787) (N, S)
Ampedus erythrogonus (Ph.W. Müller, 1821) (N, S)
Ampedus forticornis (Schwarz, 1900) (N)
Ampedus magistrettii Platia & Schimmel, 1988 (S) (E)
Ampedus melanurus Mulsant & Guillebeau, 1855 (N, S)
Ampedus nemoralis Bouwer, 1980 (N, S)
Ampedus nigerrimus (Lacordaire, 1835) (N, S)
Ampedus nigrinus (Herbst, 1784) (N)
Ampedus nigroflavus (Goeze, 1777) (N, S)
Ampedus pomonae (Stephens, 1830) (N, S, Si?)
Ampedus pomorum (Herbst, 1784) (N, S)
Ampedus praeustus (Fabricius, 1792) (N, S, Si, Sa)
Ampedus quadrisignatus (Gyllenhal, 1817) (N?, S)
Ampedus quercicola (Buysson, 1887) (N, S, Si)
Ampedus robustus Bouwer, 1980 (N?, S)
Ampedus rufipennis (Stephens, 1830) (N, S)
Ampedus sanguineus (Linné, 1758) (N, S, Si?)
Ampedus sanguinolentus (Schränk, 1776) (N, S, Si)
Ampedus sinuatus Germar, 1844 (N, S)
Ampedus triangulum (Dorn, 1925) (N)
Ampedus tristis (Linné, 1758) (N)

Brachygonus Buysson, 1912

Brachygonus megerlei (Lacordaire, 1835) (N, S)
Brachygonus ruficeps (Mulsant & Guillebeau, 1855) (N, S)

Reitterelater Platia & Cate, 1990

Reitterelater dubius Platia & Cate, 1990 (N, S?, Si)

Ischnodes Germar, 1844

Ischnodes sanguinicollis (Panzer, 1793) (N, S, Si)

Ectamenogonus Buysson, 1893

Ectamenogonus montandoni (Buysson, 1888) (Si)

Megapenthes Kiesenwetter, 1858

Megapenthes lugens (Redtenbacher, 1842) (N, S, Si)

Prokraerus Reitter, 1905

Prokraerus tibialis (Lacordaire, 1835) (N, S, Si)

Podeonius Kiesenwetter, 1858

Podeonius acuticornis (Germar, 1824) (N, S)

Porthmidius Germar, 1847

Porthmidius austriacus (Schränk, 1781) (N?, S)

Campylomorphus Jacquelin du Val, 1860

Campylomorphus homalisinus (Illiger, 1807) (N, S)

Elater Linné, 1758

Elater ferrugineus Linné, 1758 (N, S)

Neotrichophorus Jacobson, 1913

Neotrichophorus guillebeaudi (Mulsant & Godart, 1853) (N?, S, Si)

Sericus Eschscholtz, 1829

Sericus brunneus (Linné, 1758) (N, S)

Sericus subaeneus (Redtenbacher, 1842) (N)

Agriotella Brown, 1933

Agriotella picipennis (Bach, 1852) (N, S, Si, Sa)

Betarmon Kiesenwetter, 1858

Betarmon bisbimaculatus (Fabricius, 1803) (N, S, Si, Sa)

Idiotarmon Binaghi, 1940

Idiotarmon quadrivittatus (Ragusa, 1893) (N, S, Si) (E)

Isidus Mulsant & Rey, 1874

Isidus moreli Mulsant & Rey, 1874 (N, S, Si?, Sa)

Melanotus Eschscholtz, 1829

Melanotus brunnipes (Germar, 1824) (N)
Melanotus castanipes (Paykull, 1800) (N, S, Si)
Melanotus cinerascens Küster, 1852 (N)
Melanotus crassicollis (Erichson, 1841) (N, S, Si, Sa?)
Melanotus dichrous (Erichson, 1841) (N, S, Si, Sa)
Melanotus fusciceps (Gyllenhal, 1817) (N?)
Melanotus punctolineatus (Pelerin, 1829) (N, S, Si)
Melanotus tenebrosus (Erichson, 1841) (N, S, Si?, Sa)
Melanotus villosus (Geoffroy, 1785) (N, S, Si)

Spheniscosomus Schwarz, 1892

Spheniscosomus sulcicollis (Mulsant & Guillebeau, 1855) (N)

Fleutiauxellus Méquignon, 1930

Fleutiauxellus maritimus (Curtis, 1840) (N)

Negastrius C.G. Thomson, 1859

Negastrius pulchellus (Linné, 1758) (N, S)
Negastrius sabulicola (Boheman, 1852) (N, S)

Oedostethus LeConte, 1853

Oedostethus novaki (Binaghi, 1935) (N) (E)
Oedostethus quadripustulatus (Fabricius, 1792) (N)
Oedostethus tenuicornis (Germar, 1824) (N)

Quasimus Des Gozis, 1886

Quasimus liliputanus (Germar, 1844) (Si)
Quasimus minutissimus (Germar, 1817) (N, S, Si, Sa)

Zorochros C.G. Thomson, 1859

Zorochros alysidotus (Kiesenwetter, 1858) (N, S)
Zorochros boubersi Leseigneur, 1970 (N, S, Si?)
Zorochros crux (Küster, 1849) (Sa)
Zorochros curtus (Germar, 1844) (N, S, Si, Sa)
Zorochros flavipes (Aubé, 1850) (N, S, Sa)
Zorochros ibericus (Franz, 1967) (N, S?)
Zorochros meridionalis (Castelnau, 1840) (N, S)
Zorochros minimus (Lacordaire, 1835) (N, S, Si, Sa)
Zorochros pumilio (Kiesenwetter, 1858) (N, S, Si)
Zorochros quadriguttatus (Castelnau, 1840) (N?, S)
Zorochros stibicki Leseigneur, 1970 (N)
Zorochros trigonochirus (Binaghi, 1933) (N, S)

Cardiophorus Eschscholtz, 1829

Cardiophorus albofasciatus Schwarz, 1893 (Si) (E)
Cardiophorus anticus Erichson, 1840 (N, S, Si, Sa)
Cardiophorus argiolus (Géné, 1836) (Sa)
Cardiophorus biguttatus (Olivier, 1790) (N, S)
Cardiophorus castillanus Buysson, 1902 (N, S)
Cardiophorus collaris Erichson, 1840 (N, S, Si, Sa?)
Cardiophorus discicollis (Herbst, 1806) (N)
Cardiophorus ebeninus (Germar, 1824) (N)
Cardiophorus eleonora (Géné, 1836) (S, Si, Sa)
Cardiophorus exaratus Erichson, 1840 (S, Si, Sa)
Cardiophorus gramineus (Scopoli, 1763) (N, S)
Cardiophorus italicus Platia & Bartolozzi, 1988 (S, Si)
Cardiophorus nathalieae Platia & Schimmel, 1988 (S) (E)
Cardiophorus nigerrimus Erichson, 1840 (N, S?)
Cardiophorus ruficollis (Linné, 1758) (N)
Cardiophorus ruficuris (Brullé, 1832) (N, S)
Cardiophorus rufipes (Goeze, 1777) (N, S, Si, Sa)
Cardiophorus ulcerosus (Géné, 1836) (S, Si, Sa)
Cardiophorus vestigialis Erichson, 1840 (N, S, Si, Sa)

Dicronychus Brullé, 1832

Dicronychus cinereus (Herbst, 1784) (N, S, Si)
Dicronychus equiseti (Herbst, 1784) (N, S, Sa)
Dicronychus equisetioides Lohse, 1976 (N, S?)
Dicronychus incanus (Erichson, 1840) (N, S, Si, Sa)
Dicronychus rubripes (Germar, 1824) (S)

Paracardiophorus Schwarz, 1895

Paracardiophorus musculus (Erichson, 1840) (N, S, Si, Sa?)

Note

Lanelater notodonta: Non è escluso che questa vistosa specie dell'Africa intertropicale, rinvenuta in Sicilia in una ristrettissima zona intorno alle terme di Termini Imerese, possa essere estinta. Infatti gli ultimi reperti a me noti risalgono a circa 50 anni fa.

Elmidae

Potamophilus Germar, 1811

Potamophilus acuminatus (Fabricius, 1792) (N, S, Sa)

Stenelmis Dufour, 1835

Stenelmis canaliculata (Gyllenhal, 1808) (N, S, Sa)
Stenelmis consobrina Dufour, 1835 (N, S, Sa)

Elmis Latreille, 1798

Elmis aenea (Ph. Müller, 1806) (N, S)
Elmis latreillei (Bedel, 1878) (N)
Elmis maugetii Latreille, 1798
 Elmis maugetii maugetii Latreille, 1798 (N, S, Si)
 Elmis maugetii fossulata (Kuwert, 1890) (Sa) (E)
Elmis obscura (Ph. Müller, 1806) (N, S)
Elmis rietscheli Steffan, 1958 (N)
Elmis rioloides (Kuwert, 1890) (N, S, Si)

Esolus Mulsant & Rey, 1872

Esolus angustatus (Ph. Müller, 1821) (N, S, Si)
Esolus berthelemyi Olmi, 1975 (N, S, Si) (E)
Esolus brevis Kuwert, 1890 (Sa) (E)
Esolus czwalinae Kuwert, 1889 (N, S)
Esolus parallelepipedus (Ph. Müller, 1806) (N, S)

Oulimnius Des Gozis, 1886

Oulimnius rivularis (Rosenhauer, 1856) (Si, Sa)
Oulimnius troglodytes (Gyllenhal, 1827) (N, Sa)
Oulimnius tuberculatus (Ph. Müller, 1806)
 Oulimnius tuberculatus tuberculatus (Ph. Müller, 1806) (N, S, Si)

Limnius Illiger, 1802

Limnius intermedius Fairmaire, 1881
 Limnius intermedius intermedius Fairmaire, 1881 (N, S, Si, Sa)
 Limnius intermedius horioni Illies, 1953 (N)
Limnius opacus Ph. Müller, 1806 (N, S, Si)
Limnius perrisi (Dufour, 1843)
 Limnius perrisi perrisi (Dufour, 1843) (N, S)
Limnius sulcipennis Fairmaire, 1881
 Limnius sulcipennis sulcipennis Fairmaire, 1881 (Sa) (E)
Limnius volckmari (Panzer, 1793) (N, S)

Normandia Pic, 1900

Normandia nitens (Ph. Müller, 1817) (N, S, Sa)
Normandia sodalis (Erichson, 1847) (N)

Riolus Mulsant & Rey, 1872

Riolus cupreus (Ph. Müller, 1806) (N, S)

Riolus subviolaceus (Ph. Müller, 1817) (N, S)

Macronychus Ph. Müller, 1806

Macronychus quadrituberculatus Ph. Müller, 1806 (N, S, Si)

Endomychidae

Symbiotes Redtenbacher, 1849

Symbiotes armatus Reitter, 1881 (N)

Symbiotes gibberosus (Lucas, 1846) (N, S, Si, Sa?)

Symbiotes latus Redtenbacher, 1849 (N, S)

Mycetaea Stephens, 1830

Mycetaea subterranea (Fabricius, 1801) (N, S, Si, Sa)

Clemmus Hampe, 1850

Clemmus troglodytes Hampe, 1850 (N) (*)

Mychothenus Strohecker, 1953

Mychothenus minutus (Frivaldszky, 1877) (N, S)

Aclemmysa Reitter, 1904

Aclemmysa solarii Reitter, 1904 (S, Sa?) (E)

Leiestes Dejean, 1837

Leiestes seminiger (Gyllenhal, 1808) (N, S?, Sa?)

Dapsa Latreille, 1829

Dapsa denticollis (Germar, 1817) (N?) (*)

Dapsa obscurissima Pic, 1902 (S) (*)

Dapsa opuntiae Reitter, 1884 (S) (*)

Dapsa trimaculata Motschulsky, 1835 (N, S, Sa?)

Ancylopus A. Costa, 1854

Ancylopus melanocephalus (Olivier, 1808) (S, Si)

Lycoperdina Latreille, 1807

Lycoperdina bovistae (Fabricius, 1792) (N, S, Si)
Lycoperdina maritima Reitter, 1884 (N)
Lycoperdina succincta (Linnaeus, 1767) (N, S, Sa)
Lycoperdina validicornis Gerstaecker, 1858 (S, Sa)

Hylaia Guérin-Ménéville, 1857

Hylaia dalmatina Kaufmann, 1883 (N?) (*)
Hylaia rubricollis (Germar, 1845) (N?) (*)

Mycetina Mulsant, 1846

Mycetina cruciata (Schaller, 1783) (N, S)

Endomychus Panzer, 1794

Endomychus coccineus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa?)

Note

Clemmus troglodytes: Presenza dubbia nella Venezia Giulia.

Dapsa denticollis: Presente lungo il confine italo-austriaco a Tarvisio; le citazioni per l'Italia meridionale sono da riferire all'affine *D. opuntiae* Reitter.

Dapsa obscurissima: In Italia nota solo delle aree costiere e subcostiere dall'Argentario (GR) alla Piana di Fondi (LT).

Dapsa opuntiae: Nella Penisola presente dall'Abruzzo e dal Lazio settentrionali all'Aspromonte.

Hylaia dalmatina: Presenza dubbia in Venezia Giulia.

Hylaia rubricollis: Presenza dubbia in N.

Erotylidae

Tritoma Fabricius, 1775

Tritoma bipustulata Fabricius, 1775 (N, S, Si, Sa)
Tritoma subbasalis Reitter, 1896 (N?)

Triplax Herbst, 1793

Triplax aenea (Schaller, 1783) (N, S, Si, Sa)
Triplax collaris (Schaller, 1783) (N, S)
Triplax elongata Lacordaire, 1842 (N, S, Si, Sa)
Triplax lacordairei Crotch, 1870 (N, S, Si)
Triplax lepida Faldermann, 1835 (N, S)

Triplax marseuli Bedel, 1867 (S)
Triplax melanocephala (Latreille, 1804) (N, S, Si)
Triplax nigratarsis Reitter, 1898 (N)
Triplax rufipes (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa)
Triplax russica (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
Triplax scutellaris Charpentier, 1825 (N)
Triplax tergestana Reitter, 1881 (N)

Dacne Latreille, 1796

Dacne bipustulata (Thunberg, 1781) (N, S, Si, Sa)
Dacne notata (Gmelin, 1788) (N, S, Sa)
Dacne pontica Bedel, 1867 (N, S)
Dacne rufifrons (Fabricius, 1775) (N, S)

Combocerus Bedel, 1868

Combocerus glaber (Schaller, 1783) (N)

Eucinetidae

Eucinetus Germar, 1818

Eucinetus haemorrhoidalis (Germar, 1818) (N, S, Sa)
Eucinetus hopffgarteni Reitter, 1885
Eucinetus hopffgarteni prospector Vit, 1985 (N, S)
Eucinetus meridionalis (Laporte de Castelnau, 1836) (S, Si, Sa)

Eucnemidae

Phyllocerus Lepeletier & Serville, 1825

Phyllocerus elateroides Ménétriés, 1832 (Si?)
Phyllocerus flavipennis Guérin, 1836 (N, Si)
Phyllocerus ullmanni Kirchsberg, 1897 (N)

Melasis Olivier, 1790

Melasis buprestoides (Linné, 1761) (N, S)

Isorhipis Boisduval & Lacordaire, 1835

Isorhipis melasoides (Castelnau, 1835) (N, S)

Eucnemis Ahrens, 1812

Eucnemis capucina Ahrens, 1812 (N, S)

Dromaeolus Kiesenwetter, 1858

Dromaeolus barnabita (Villa, 1838) (N)

Dirrhagus Latreille, 1834

Dirrhagus emyi Rouget, 1855 (N, Sa?)

Dirrhagus hummleri Reitter, 1911 (S)

Dirrhagus lepidus Rosenhauer, 1847 (N, S)

Dirrhagus pygmaeus (Fabricius, 1792) (N, Si?)

Dirrhagus sahlbergi (Mannerheim, 1823) (N)

Farsus Duval, 1859

Farsus dubius (Piller, 1783) (N, S, Si, Sa)

Epiphanis Eschscholtz, 1829

Epiphanis cornutus Eschscholtz, 1829 (N, S)

Nematodes Berthold, 1827

Nematodes filum (Fabricius, 1801) (Si)

Hypocoelus Guérin, 1843

Hypocoelus cariniceps Reitter, 1902 (N)

Hypocoelus procerulus (Mannerheim, 1823) (N, S, Sa)

Hylis Des Gozis, 1886

Hylis foveicollis (Thomson, 1874) (N) (*)

Xylobius Latreille, 1834

Xylobius corticalis (Paykull, 1800) (N, S, Si)

Xylobius seidlitzi Csiki, 1906 (N)

Anelastes Kirby, 1818

Anelastes barbarus Lucas, 1846 (Sa?)

Note

Hylis foveicollis: A questa specie va riferita (teste J. Muona) il reperto già pubblicato da Minelli (1977) come *Thambus frivaldskyi* Bonvouloir.

Georissidae

Georissus Latreille, 1809

- Georissus caelatus* Erichson, 1847 (N, S, Si)
- Georissus costatus* Laporte de Castelnau, 1840 (N, S, Si, Sa)
- Georissus crenulatus* Rossi, 1794 (N, S, Si, Sa)
- Georissus laesicollis* Germar, 1831 (N, S, Si, Sa)
- Georissus substriatus* Heer, 1841 (N, Sa)

Geotrupidae

Bolbelasmus Boucomont, 1911

- Bolbelasmus gallicus* (Mulsant, 1842) (N, Si)
- Bolbelasmus unicornis* (Schränk, 1789) (N, Si)

Odonteus Samouelle, 1819

- Odonteus armiger* (Scopoli, 1772) (N, S, Sa?)

Typhoeus (Chelotrupes) Jekel, 1866

- Typhoeus (Chelotrupes) hiostius* Gené, 1836 (Sa) (E)

Typhoeus (Typhoeus) Leach, 1815

- Typhoeus (Typhoeus) typhoeus* (Linné, 1758) (N, S, Si)

Ceratophyus Fischer von Waldheim, 1823

- Ceratophyus rossii* Jekel, 1866 (Sa?) (*)

Sericotrupes Zunino, 1984

- Sericotrupes niger* (Marsham, 1802) (N, S, Si, Sa)

Anoplotrupes Jekel, 1866

- Anoplotrupes stercorosus* (Scriba, 1796) (N, S, Sa?)

Geotrupes Latreille, 1796

- Geotrupes douei* Gory, 1841 (Si, Sa?)
- Geotrupes mutator* Marsham, 1802 (N, S, Si)

Geotrupes spiniger Marsham, 1802 (N, S, Si, Sa)
Geotrupes stercorarius (Linné, 1758) (N, Si)

Thorectes (Jekelius) López Colón, 1989

Thorectes (Jekelius) brullei (Jekel, 1866)
Thorectes (Jekelius) brullei brullei (Jekel, 1866) (S)
Thorectes (Jekelius) intermedius (A. Costa, 1827)
Thorectes (Jekelius) intermedius intermedius (A. Costa, 1827) (S, Si, Sa)
Thorectes (Jekelius) marginatus (Poirét, 1787) (Si)
Thorectes (Jekelius) sardous Erichson, 1847 (Sa)

Thorectes (Silphotrupes) Jekel, 1865

Thorectes (Silphotrupes) geminatus (Gené, 1839) (Sa)

Thorectes (Zuninoeus) López Colón, 1989

Thorectes (Zuninoeus) hoppei (Hagenbach, 1825) (N)

Trypocopris Motschulsky, 1858

Trypocopris alpinus (Sturm & Hagenbach, 1825)
Trypocopris alpinus alpinus (Sturm & Hagenbach, 1825) (N)
Trypocopris alpinus balcanicola Miksic, 1954 (N)
Trypocopris alpinus opacus Mariani, 1958 (N)
Trypocopris pyrenaeus (Charpentier, 1825)
Trypocopris pyrenaeus bartolii Dellacasa, 1974 (N) (E)
Trypocopris pyrenaeus cyanicolor Capra, 1930 (S, Si) (E)
Trypocopris pyrenaeus splendens (Heer, 1841) (N, S) (E)
Trypocopris vernalis (Linné, 1758)
Trypocopris vernalis apenninicus Mariani, 1958 (S) (E)
Trypocopris vernalis fauveli Bedel, 1911 (N)
Trypocopris vernalis vernalis (Linné, 1758) (N)

Note

Ceratophyus rossii: Forse non endemica perché esiste un'antica citazione, da verificare, della Corsica.

Glaphyridae

Anthypna Latreille, 1807

Anthypna abdominalis (Fabricius, 1781)
Anthypna abdominalis abdominalis (Fabricius, 1781) (N)
Anthypna abdominalis aemiliana Ghidini, 1956 (N) (E)

Anthypna abdominalis binaghii Ghidini, 1956 (N) (E)
Anthypna carceli Castelnau, 1832 (S) (E)

Gyrinidae

Aulonogyrus (Aulonogyrus) Régimbart, 1883

Aulonogyrus (Aulonogyrus) concinnus (Klug, 1833) (N, S, Si, Sa)
Aulonogyrus (Aulonogyrus) striatus (Fabricius, 1792) (N, S, Si, Sa)

Gyrinus (Gyrinulus) Zaitzev, 1907

Gyrinus (Gyrinulus) minutus Fabricius, 1798 (N, Sa)

Gyrinus (Gyrinus) Linné 1767

Gyrinus (Gyrinus) caspius Ménetries, 1832 (N, S, Si, Sa)
Gyrinus (Gyrinus) colymbus Erichson, 1837 (S)
Gyrinus (Gyrinus) dejeani Brullé, 1832 (N, S, Si, Sa)
Gyrinus (Gyrinus) distinctus Aubé, 1836 (N, S, Si)
Gyrinus (Gyrinus) marinus Gyllenhal, 1808 (N, Sa)
Gyrinus (Gyrinus) paykulli Ochs, 1927 (N, S)
Gyrinus (Gyrinus) substriatus Stephens, 1828 (N, S, Si, Sa)
Gyrinus (Gyrinus) suffriani Scriba, 1855 (N, S)
Gyrinus (Gyrinus) urinator Illiger, 1807 (N, S, Si, Sa)

Orectochilus (Orectochilus) Lacordaire, 1835

Orectochilus (Orectochilus) villosus (Müller, 1776) (N, S, Si, Sa)

Haliplidae

Peltodytes Régimbart, 1878

Peltodytes caesus Duftschmidt, 1805 (N, S, Si, Sa)
Peltodytes rotundatus (Aubé, 1836)
Peltodytes rotundatus rotundatus (Aubé, 1836) (N, S, Si, Sa)
Peltodytes rotundatus conifer (Seidlitz, 1887) (Si)

Brychius Thomson, 1860

Brychius elevatus (Panzer, 1794) (N)
Brychius glabratus (Villa, 1833) (N) (E)

Haliphus (Haliphus) Latreille, 1802

Haliphus (Haliphus) confinis Stephens, 1828 (N)
Haliphus (Haliphus) obliquus (Fabricius, 1787) (N, S, Sa)
Haliphus (Haliphus) varius Nicolai, 1822 (N)

***Haliphus (Neohaliphus)* Netolitzki, 1911**

Haliphus (Neohaliphus) lineaticollis (Marsham, 1802) (N, S, Si, Sa)

***Haliphus (Haliplinus)* Guignot, 1939**

Haliphus (Haliplinus) fluviatilis Aubé, 1836 (N, S)
Haliphus (Haliplinus) fulvicollis Erichson, 1837 (N, S)
Haliphus (Haliplinus) furcatus Seidlitz, 1887 (N)
Haliphus (Haliplinus) heydeni Wehncke, 1875 (N, S)
Haliphus (Haliplinus) lineolatus Mannerheim, 1844 (N)
Haliphus (Haliplinus) ruficollis (De Geer, 1774) (N, S, Sa)

***Haliphus (Liaphlus)* Guignot, 1928**

Haliphus (Liaphlus) flavicollis Sturm, 1834 (N, S, Si, Sa)
Haliphus (Liaphlus) fulvus (Fabricius, 1801) (N, S, Si)
Haliphus (Liaphlus) guttatus Aubé, 1836 (N, S, Si, Sa)
Haliphus (Liaphlus) laminatus (Schaller, 1783) (N, S)
Haliphus (Liaphlus) mucronatus Stephens, 1828 (N, S, Si, Sa)
Haliphus (Liaphlus) rubidus Perris, 1857 (N)
Haliphus (Liaphlus) variegatus Sturm, 1834 (N, S, Si, Sa)

Helophoridae

***Helophorus (Empleurus)* Hope, 1838**

Helophorus (Empleurus) nubilus Fabricius, 1776 (N, Sa)
Helophorus (Empleurus) porculus Bedel, 1881 (N, S, Si, Sa)
Helophorus (Empleurus) rufipes (Bosc, 1791) (N, S, Si, Sa)
Helophorus (Empleurus) schmidtii A. Villa & G.B. Villa, 1838 (N)

***Helophorus (Trichelophorus)* Kuwert, 1889**

Helophorus (Trichelophorus) alternans Gené, 1836 (N, S, Si, Sa)

***Helophorus (Megalelophorus)* Kuwert, 1886**

Helophorus (Megalelophorus) aquaticus Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)
Helophorus (Megalelophorus) grandis Illiger, 1798
Helophorus (Megalelophorus) grandis maritimus Rey, 1884 (N, S, Si, Sa)
Helophorus (Megalelophorus) liguricus Angus, 1970 (N)

***Helophorus (Atractelophorus)* Kuwert, 1886**

- Helophorus (Atractelophorus) arvernicus* Mulsant, 1846 (N, S)
- Helophorus (Atractelophorus) brevipalpis* Bedel, 1881 (N, S)
- Helophorus (Atractelophorus) glacialis* A. Villa & G.B. Villa, 1833 (N, S, Sa)
- Helophorus (Atractelophorus) nivalis* Giraud, 1851 (N)

***Helophorus (Helophorus)* Fabricius, 1775**

- Helophorus (Helophorus) asperatus* Rey, 1884 (N, S)
- Helophorus (Helophorus) discrepans* Rey, 1884 (N, S)
- Helophorus (Helophorus) dorsalis* (Marsham, 1802) (N, S, Si)
- Helophorus (Helophorus) flavipes* Fabricius, 1792 (N, S)
- Helophorus (Helophorus) fulgidicollis* Motschulsky, 1860 (N, S, Si, Sa)
- Helophorus (Helophorus) granularis* (Linnaeus, 1761) (S, Si, Sa)
- Helophorus (Helophorus) griseus* Herbst, 1793 (N, S, Si, Sa)
- Helophorus (Helophorus) illustris* Sharp, 1915 (N, S, Si, Sa)
- Helophorus (Helophorus) longitarsis* Wollaston, 1864 (S, Si, Sa)
- Helophorus (Helophorus) minutus* Fabricius, 1775 (N, S)
- Helophorus (Helophorus) nanus* Sturm, 1836 (N, Sa)
- Helophorus (Helophorus) obscurus* Mulsant, 1844 (N, S, Si)
- Helophorus (Helophorus) pallidipennis* Mulsant, 1852 (S, Si)

Heteroceridae

***Micilus* Mulsant & Rey, 1872**

- Micilus murinus* Kiesenwetter, 1843 (N, S)

***Littorimus* Des Gozis, 1885**

- Littorimus crinitus* (Kiesenwetter, 1850) (N)
- Littorimus curtus* (Rosenhauer, 1856) (Si)
- Littorimus flavidus* (Rossi, 1794) (N, S, Si, Sa)
- Littorimus hispidulus* (Kiesenwetter, 1843) (N, S)
- Littorimus maritimus* (Guérin-Méneville, 1844) (S, Si, Sa)
- Littorimus marmota* (Kiesenwetter, 1850) (N, S, Si)
- Littorimus pruinus* (Kiesenwetter, 1851) (N, S)
- Littorimus sericans* (Kiesenwetter, 1843) (N)

***Heterocerus* Fabricius, 1792**

- Heterocerus aragonicus* Kiesenwetter, 1850 (N, S, Si, Sa)
- Heterocerus fenestratus* (Thunberg, 1784) (N, S, Si, Sa)
- Heterocerus flexuosus* Stephens, 1828 (N, S, Si, Sa)
- Heterocerus fossor* Kiesenwetter, 1843 (N, S)
- Heterocerus fuscus* Kiesenwetter, 1843

Heterocerus fuscus fuscus Kiesenwetter, 1843 (N)
Heterocerus fuscus etruscus Mascagni, 1986 (S) (E)
Heterocerus holosericeus Rosenhauer, 1856 (N, S, Si)
Heterocerus marginatus (Fabricius, 1787) (N)
Heterocerus obsoletus Curtis, 1828 (N)
Heterocerus parallelus Gebler, 1830 (N)

Histeridae

Chaetabraeus Portevin, 1929

Chaetabraeus globulus (Creutzer, 1799) (N, S, Si, Sa)
Chaetabraeus lucidus (Peyerimhoff, 1917) (S)

Abraeus Leach, 1817

Abraeus granulum Erichson, 1839 (N, S)
Abraeus parvulus Aubé, 1842 (Si)
Abraeus perpusillus (Marsham, 1802) (N, S, Sa)

Spelaeabraeus Moro, 1957

Spelaeabraeus agazzii Moro, 1957 (N) (E)
Spelaeabraeus georgii Vienna, 1981 (N) (E)
Spelaeabraeus infidus Busulini, 1958 (N) (E)
Spelaeabraeus tormenei Daffner, 1988 (N) (E)

Plegaderus Erichson, 1834

Plegaderus caesus (Herbst, 1792) (N)
Plegaderus discisus Erichson, 1839 (N)
Plegaderus dissectus Erichson, 1839 (S, Si)
Plegaderus otti Marseul, 1856 (N, S)
Plegaderus sanatus Truqui, 1852
Plegaderus sanatus gobanzi J. Müller, 1902 (N)
Plegaderus saucius Erichson, 1834
Plegaderus saucius meridionalis J. Müller, 1907 (S)
Plegaderus saucius saucius Erichson, 1834 (N)
Plegaderus vulneratus (Panzer, 1797) (N, S)

Eubrachium Wollaston, 1862

Eubrachium pusillum (P. Rossi, 1792) (N, S, Si, Sa)

Acritus (Pycnacritus) Casey, 1916

Acritus (Pycnacritus) homoeopathicus (Wollaston, 1857) (N, S, Si, Sa)

Acritus (Acritus) J.L. LeConte, 1853

- Acritus (Acritus) hopffgarteni* Reitter, 1878 (N, S)
- Acritus (Acritus) italicus* Reitter, 1904 (S, Si) (E)
- Acritus (Acritus) minutus* (Herbst, 1792) (N, S, Si)
- Acritus (Acritus) nigricornis* (Hoffmann, 1803) (N, S, Si, Sa)

Aeletes Horn, 1873

- Aeletes atomarius* (Aubé, 1842) (S, Sa)

Halacritus Schmidt, 1893

- Halacritus punctum* (Aubé, 1842)
- Halacritus punctum punctum* (Aubé, 1842) (N, S, Si, Sa)
- Halacritus punctum viennai* Gomy, 1978 (N) (E)

Teretrius (Neotepetrius) G. Müller, 1937

- Teretrius (Neotepetrius) parasita* Marseul, 1862 (Sa)

Teretrius (Teretrius) Erichson, 1834

- Teretrius (Teretrius) fabricii* Mazur, 1972 (N, Si, Sa)

Saprinus Erichson, 1834

- Saprinus acuminatus* (Fabricius, 1798) (N, S, Si, Sa)
- Saprinus aegialus* Reitter in Brenske & Reitter, 1844 (N, S, Si)
- Saprinus aeneus* (Fabricius, 1775) (N, S)
- Saprinus algericus* (Paykull, 1811) (N, S, Si, Sa)
- Saprinus beduinus* Marseul, 1862 (S, Si)
- Saprinus calatravensis* Fuente, 1899 (N, S, Si)
- Saprinus chalcites* (Illiger, 1807) (N, S, Si, Sa)
- Saprinus deterius* (Illiger, 1807) (N, S, Si, Sa)
- Saprinus furvus* Erichson, 1834 (N, S, Si, Sa)
- Saprinus georgicus* Marseul, 1862 (N, S, Si, Sa)
- Saprinus godeti* (Brullé, 1832) (S)
- Saprinus immundus* (Gyllenhal, 1827) (N, S)
- Saprinus lautus* Erichson, 1839 (Sa)
- Saprinus lugens* Erichson, 1834 (S) (*)
- Saprinus maculatus* (P. Rossi, 1792) (N, S, Si)
- Saprinus planiusculus* Motschulsky, 1849 (N, S, Si, Sa)
- Saprinus politus* (Brahm, 1790) (N, S, Si, Sa)
- Saprinus prasinus* Erichson, 1834 (Sa)
- Saprinus semipunctatus* (Fabricius, 1792) (N, S, Si, Sa)
- Saprinus semistriatus* (Scriba, 1790) (N, S, Si, Sa)

Saprinus subnitescens Bickhardt, 1909 (N, S, Si, Sa)
Saprinus tenuistrius Marseul, 1855
 Saprinus tenuistrius sparsutus Solskiy, 1876 (N, S)
Saprinus vermiculatus Reichardt, 1923 (S)
Saprinus virescens (Paykull, 1798) (N, S)

***Chalcionellus (Chalcionellus)* Reichardt, 1932**

Chalcionellus (Chalcionellus) decemstriatus (P. Rossi, 1792) (N, S, Si, Sa)
Chalcionellus (Chalcionellus) prolixus Reichardt, 1932 (Si)

***Chalcionellus (Izpaniolus)* Mazur, 1972**

Chalcionellus (Izpaniolus) aemulus (Illiger, 1807) (N, S, Si, Sa)

***Pholioxenus* Reichardt, 1932**

Pholioxenus schatzmayri (J. Müller, 1910) (S)

***Hypocacculus (Colpellus)* Reichardt, 1932**

Hypocacculus (Colpellus) praecox (Erichson, 1834) (S, Si)
Hypocacculus (Colpellus) solieri (Marseul, 1862) (Sa)

***Hypocacculus (Hypocacculus)* Bickhardt, 1916**

Hypocacculus (Hypocacculus) elongatulus (Rosenhauer, 1856)
 Hypocacculus (Hypocacculus) elongatulus elongatulus (Rosenhauer, 1856) (Si, Sa)
Hypocacculus (Hypocacculus) metallescens (Erichson, 1834) (S, Si, Sa)
Hypocacculus (Hypocacculus) spretulus (Erichson, 1834) (S, Si, Sa)

***Hypocacculus (Nessus)* Reichardt, 1932**

Hypocacculus (Nessus) interpunctatus (Schmidt, 1855) (Si)
Hypocacculus (Nessus) puncticollis (Küster, 1849) (Si, Sa)
Hypocacculus (Nessus) rubripes (Erichson, 1834) (N, S, Si, Sa)

***Hypocaccus (Hypocaccus)* Thomson, 1867**

Hypocaccus (Hypocaccus) brasiliensis (Paykull, 1811) (N, S, Si, Sa)
Hypocaccus (Hypocaccus) crassipes (Erichson, 1834) (N, S, Si, Sa)
Hypocaccus (Hypocaccus) metallicus (Herbst, 1792) (N)
Hypocaccus (Hypocaccus) pelleti (Marseul, 1862) (S, Sa)
Hypocaccus (Hypocaccus) rugiceps (Duftschmidt, 1805) (N, Si?, Sa?)
Hypocaccus (Hypocaccus) rugifrons (Paykull, 1798) (N, S, Si)
Hypocaccus (Hypocaccus) specularis (Marseul, 1855) (Si)

***Hypocaccus (Baeckmanniolus)* Reichardt, 1926**

Hypocaccus (Baeckmanniolus) dimidiatus (Illiger, 1807) (N, S, Si, Sa)

Exaesiopus Reichardt, 1926

Exaesiopus grossipes (Marseul, 1855) (N, Si, Sa)

Gnathoncus Jacquelin-Duval, 1858

Gnathoncus buyssoni Auzat, 1917 (N, S)

Gnathoncus cerberus Auzat, 1932 (Sa) (E)

Gnathoncus communis (Marseul, 1862) (N, S)

Gnathoncus nannetensis (Marseul, 1862) (N, S, Sa)

Gnathoncus nidorum Stockmann, 1957 (Sa)

Gnathoncus rotundatus (Kugelann, 1792) (N, S, Si, Sa)

Myrmetes Marseul, 1862

Myrmetes paykulli Kanaar, 1979 (N)

Xenonychus Wollaston, 1864

Xenonychus tridens (Jacquelin du Val, 1852) (S, Si, Sa)

Dendrophilus Leach, 1817

Dendrophilus punctatus (Herbst, 1792) (N, S)

Dendrophilus pygmaeus (Linnaeus, 1758) (N)

Kissister Marseul, 1862

Kissister minimus (Aubé, 1850) (N, S, Si, Sa)

Bacanius (Neobacanius) G. Müller, 1925

Bacanius (Neobacanius) solarii G. Müller, 1925 (S) (E)

Bacanius (Bacanius) J. L. LeConte, 1853

Bacanius (Bacanius) consobrinus (Aubé, 1850) (N)

Cyclobacanius G. Müller, 1925

Cyclobacanius medvidovici Reitter, 1912 (N)

Cyclobacanius soliman Marseul, 1862 (S)

Sardulus Patrizi, 1955

Sardulus spelaeus Patrizi, 1955 (Sa) (E)

Carcinops Marseul, 1855

Carcinops pumilio (Erichson, 1834) (N, S, Si, Sa)

Platylomalus Cooman, 1948

Platylomalus complanatus (Panzer, 1797) (N, S, Si)

Paromalus Erichson, 1834

Paromalus filum Reitter, 1884 (N, S, Si, Sa)

Paromalus flavicornis (Herbst, 1792) (N, S, Si, Sa)

Paromalus parallelepipedus (Herbst, 1792) (N, S, Si, Sa)

Paromalus simplicistrius Schmidt, 1885 (S?)

Onthophilus Leach, 1817

Onthophilus affinis Redtenbacher, 1849 (N, S)

Onthophilus globulosus (Olivier, 1789) (N, S, Si, Sa)

Onthophilus punctatus (O.F. Müller, 1776)

Onthophilus punctatus punctatus (O.F. Müller, 1776) (N, S)

Onthophilus punctatus cicatricosus Reitter in Brenske & Reitter, 1884 (S)

Onthophilus striatus (Forster, 1771) (N, S, Si)

Epierus Erichson, 1834

Epierus comptus Erichson, 1834 (N, S, Si, Sa)

Pseudepierus Casey, 1916

Pseudepierus italicus (Paykull, 1811) (N, S, Si)

Tribalus Erichson, 1834

Tribalus maroccanus Olexa, 1980 (Si)

Tribalus minimus (P. Rossi, 1790) (N, S, Si, Sa)

Tribalus scaphidiformis (Illiger, 1807) (N, S, Si, Sa)

Margarinotus (Ptomister) Houlbert & Monnot, 1922

Margarinotus (Ptomister) brunneus (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa)

Margarinotus (Ptomister) distinctus (Erichson, 1834) (N)

Margarinotus (Ptomister) merdarius (Hoffmann, 1803) (N, S, Si)

Margarinotus (Ptomister) striola (C. R. Sahlberg, 1819)

Margarinotus (Ptomister) striola succicola (Thomson, 1862) (N, S)

Margarinotus (Ptomister) terricola (Germar, 1824) (N, S)

Margarinotus (*Eucalohister*) Reitter, 1909

- Margarinotus (Eucalohister) binotatus* (Erichson, 1834) (N)
- Margarinotus (Eucalohister) bipustulatus* (Schrank, 1781) (N, S, Sa) (*)
- Margarinotus (Eucalohister) kurdistanus* (Marseul, 1857) (Si) (*)

Margarinotus (*Stenister*) Reichardt, 1926

- Margarinotus (Stenister) graecus* (Brullé, 1832)
- Margarinotus (Stenister) graecus graecus* (Brullé, 1832) (Si)
- Margarinotus (Stenister) obscurus* (Kugelann, 1792) (N, S, Si)

Margarinotus (*Paralister*) Bickhardt, 1917

- Margarinotus (Paralister) carbonarius* (Hoffmann, 1803) (N, S, Si)
- Margarinotus (Paralister) ignobilis* (Marseul, 1854) (N, S)
- Margarinotus (Paralister) neglectus* (Germar, 1813) (N, S, Si)
- Margarinotus (Paralister) punctiventer* (Marseul, 1854) (N, S)
- Margarinotus (Paralister) purpurascens* (Herbst, 1792) (N, S, Sa)
- Margarinotus (Paralister) uncostriatus* (Marseul, 1854) (Si)
- Margarinotus (Paralister) ventralis* (Marseul, 1854) (N, S, Si)

Margarinotus (*Grammostethus*) Lewis, 1906

- Margarinotus (Grammostethus) ruficornis* (Grimm, 1852) (N, S, Si)

Margarinotus (*Promethister*) Kryzhanovskij, 1966

- Margarinotus (Promethister) marginatus* (Erichson, 1834) (N, S)

Pactolinus Motschulsky, 1860

- Pactolinus major* (Linnaeus, 1767) (N, S, Si, Sa)

Pachylister Lewis, 1904

- Pachylister inaequalis* (Olivier, 1789) (N, S, Sa)

Hister Linnaeus, 1758

- Hister bissexstriatus* Fabricius, 1801 (N, S, Sa)
- Hister capsirensis* Auzat, 1922 (N, S)
- Hister funestus* Erichson, 1834 (N, S)
- Hister grandicollis* Illiger, 1807 (Si, Sa)
- Hister helluo* Truqui, 1852 (N, S)
- Hister illigeri* Duftschmidt, 1805 (N, S, Si, Sa)
- Hister lugubris* Truqui, 1852 (N, S, Sa)

Hister mediterraneus Lundgren in Johnson et al., 1992 (Si?)
Hister moerens Erichson, 1834 (N, S, Si)
Hister pustulosus Gén  , 1839 (Si, Sa)
Hister quadrimaculatus Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)
Hister quadrinotatus Scriba, 1790 (N, S, Si, Sa)
Hister teter Truqui, 1852 (N, S)
Hister thoracicus Paykull, 1811 (S, Si, Sa)
Hister unicolor Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)

Merohister Reitter, 1909

Merohister ariasi (Marseul, 1864) (N, S)

Atholus Thomson, 1859

Atholus bimaculatus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
Atholus corvinus (Germar, 1817) (N, S, Si)
Atholus debeauxi (Moro, 1942) (Sa) (E) (*)
Atholus duodecimstriatus (Schr  nk, 1781) (N, S, Si, Sa)
Atholus paganettii (Bickhardt, 1911) (Sa)
Atholus praetermissus (Peyron, 1856) (N, S, Si, Sa)
Atholus scutellaris (Erichson, 1834) (S, Si)
Atholus siculus (Tournier, 1869) (S, Si) (*)

Platysoma (Eurylistera) Bickhardt, 1920

Platysoma (Eurylistera) minor (P. Rossi, 1792) (N, S, Si, Sa) (*)

Platysoma (Platysoma) Leach, 1817

Platysoma (Platysoma) algericum Lucas, 1849 (Si, Sa)
Platysoma (Platysoma) compressum (Herbst, 1783) (N, S, Si)

Platysoma (Cylister) Cooman, 1941

Platysoma (Cylister) angustatum (Hoffmann, 1803) (N)
Platysoma (Cylister) elongatum (Thunberg, 1787) (N, S, Si, Sa)
Platysoma (Cylister) filiforme Erichson, 1834 (N, S, Si, Sa)
Platysoma (Cylister) lineare Erichson, 1834 (N, S)

Hololepta Paykull, 1811

Hololepta plana (Sulzer, 1776) (N, S)

Satrapes Schmidt, 1855

Satrapes sartorii (Redtenbacher, 1858) (N, S)

Hetaerius Erichson, 1834

Hetaerius ferrugineus (Olivier, 1789) (N, S, Si, Sa)

Sternocoelis Lewis, 1888

Sternocoelis puberulus (Motschulsky, 1837) (Si, Sa)

Note

Saprinus lugens: Secondo Mazur (1984: 54) introdotta in Abruzzo; patria: America centrale e settentrionale.

Margarinotus (Eucalohister) bipustulatus: Attribuito da alcuni autori al sottogenere *Stenister*.

Margarinotus (Eucalohister) kurdistanus: Specie segnalata di Sicilia in alcuni antichi lavori, senza precisare le località di cattura.

Atholus debeauxi: La specie viene talora attribuita al genere *Hister*.

Atholus siculus: La specie viene talora attribuita al genere *Hister*.

Platysoma (Eurylistes) minor: La specie viene talora attribuita al sottogenere nominale .

Platysoma (Cylister): *Cylister* viene spesso considerato genere a sé stante.

Hybosoridae

Hybosorus Macleay, 1819

Hybosorus illigeri Reiche, 1853 (S, Si, Sa)

Hydraenidae

Hydraena Kugelann, 1794

Hydraena aethaliensis Breit, 1917 (S) (E, M)

Hydraena alia D'Orchymont, 1934 (S) (E)

Hydraena andreinii D'Orchymont, 1934 (N, S) (E)

Hydraena angulosa Mulsant, 1844 (N, S)

Hydraena angustata Sturm, 1836 (N)

Hydraena assimilis Rey, 1885 (N, S, Si?)

Hydraena atrata Desbrocher des Loges, 1891 (N)

Hydraena britteni Joy, 1907 (N)

Hydraena claryi Jäch, 1994 (N)

Hydraena fiorii Porta, 1899 (N) (E)

Hydraena imperatrix Knisch, 1919 (S) (E)

Hydraena intermedia Rosenhauer, 1847 (N)

Hydraena melas Dalla Torre, 1877 (N, S)

Hydraena minutissima Stephens, 1829 (N, S, Si?)

Hydraena morio Kiesenwetter, 1849 (N)

Hydraena nigrita Germar, 1824 (N)

Hydraena paganettii Ganglbauer, 1901 (N, S)
Hydraena palustris Erichson, 1837 (N, S)
Hydraena pretneri Chiesa, 1927 (N, S) (E)
Hydraena pulchella Germar, 1824 (N, S)
Hydraena pygmaea Waterhouse, 1833 (N, S, Si?, Sa)
Hydraena reyi Kuwert, 1888 (N)
Hydraena riparia Kugelann, 1794 (N)
Hydraena rugosa Mulsant, 1844 (N)
Hydraena sardoa Binaghi, 1961 (Sa) (E)
Hydraena sricula Kiesenwetter, 1849 (S, Si) (E)
Hydraena similis D'Orchymont, 1930 (N, S, Si) (E)
Hydraena spinipes Baudi, 1882 (N, S, Si?) (E)
Hydraena subacuminata Rey, 1884 (S) (M)
Hydraena subimpressa Rey, 1885 (N, S, Si?)
Hydraena subirregularis Pic, 1918 (S, Si) (E)
Hydraena subjuncta D'Orchymont, 1929 (S?) (*)
Hydraena subsequens Rey, 1886 (N?, Sa)
Hydraena testacea Curtis, 1830 (N, S, Sa)

***Haenydra* Rey, 1886**

Haenydra alpicola Pretner, 1931 (N) (*)
Haenydra belgica D'Orchymont, 1930 (N)
Haenydra bensai Ganglbauer, 1901 (N)
Haenydra bononiensis Chiesa, 1959 (N, S) (E)
Haenydra czernohorskyi Müller, 1911 (N)
Haenydra decolor Sainte-Claire Deville, 1903 (N)
Haenydra dentipes Germar, 1824 (N)
Haenydra devillei Ganglbauer, 1901 (N, S)
Haenydra devincta D'Orchymont, 1940 (N)
Haenydra discreta Ganglbauer, 1904 (N, S?) (E)
Haenydra emarginata Rey, 1885 (N) (*)
Haenydra gracilis Germar, 1824 (N)
Haenydra heterogyna Bedel, 1898 (N, S) (*)
Haenydra lapidicola Kiesenwetter, 1849 (N, S)
Haenydra muelleri Pretner, 1931 (N)
Haenydra occitana Audisio & De Biase, 1995 (N) (*)
Haenydra plumipes Rey, 1884 (N, S) (E)
Haenydra saga D'Orchymont, 1930 (N) (*)
Haenydra samnitica Fiori, 1904 (S) (E)
Haenydra sanfilippoi Audisio & De Biase, 1995 (N, S) (*)
Haenydra schuleri Ganglbauer, 1901 (N)
Haenydra solarii Pretner, 1930 (N) (E)
Haenydra tarvisina Ferro, 1992 (N) (E)
Haenydra truncata Rey, 1885 (N, S, Si)
Haenydra tyrrhena Binaghi, 1961 (Sa) (E)

***Ochthebius* Leach, 1815**

Ochthebius adriaticus Reitter, 1886 (4, 5)
Ochthebius aeneus Stephens, 1835 (N)
Ochthebius auropallens (Fairmaire, 1879) (S, Si, Sa)
Ochthebius basilicatus Fiori, 1915 (S) (E)
Ochthebius bonnairei Guillebeau, 1896 (Si)
Ochthebius brevicollis Baudi, 1864 (4, 5)
Ochthebius celatus Jäch, 1989 (3, 4, 5)
Ochthebius colveranus Ferro, 1979 (N) (*)
Ochthebius corsicus Sainte-Claire Deville, 1908 (Sa) (*)
Ochthebius corcyraeus Jäch, 1990 (N)
Ochthebius crenulatus Mulsant & Rey, 1850 (N, S, Si)
Ochthebius cuprescens Guillebeau, 1893 (Si)
Ochthebius dentifer Rey, 1885 (N, S, Si, Sa) (*)
Ochthebius difficilis Mulsant, 1844 (N, S, Si, Sa)
Ochthebius dilatatus Stephens, 1829 (N, S, Si, Sa)
Ochthebius dilucidus D'Orchymont, 1940 (N, S, Sa)
Ochthebius exaratus Mulsant, 1844 (N, S, Si, Sa)
Ochthebius exsculptus Germar, 1824 (N?) (*)
Ochthebius eyrei Jäch, 1990 (S)
Ochthebius fossulatus Mulsant, 1844 (S, Si, Sa)
Ochthebius foveolatus Germar, 1824 (N, S, Si, Sa)
Ochthebius gagliardii D'Orchymont, 1940 (N, S) (E)
Ochthebius gereckeii Jäch, 1993 (Si) (E)
Ochthebius gibbosus Germar, 1824 (N, S)
Ochthebius granulatus Mulsant, 1844 (N, S) (*)
Ochthebius haberfelneri Reitter, 1890 (N) (*)
Ochthebius halbherri Reitter, 1890 (N, S, Si)
Ochthebius hyblaemajoris Ferro, 1986 (Si) (E)
Ochthebius impressipennis Rey, 1886 (N, S, Si, Sa)
Ochthebius italicus Jäch, 1990 (N) (E) (*)
Ochthebius lanuginosus Reiche & Saulcy, 1856 (S)
Ochthebius lividipennis (Peyron, 1858) (N, S)
Ochthebius lobicollis Rey, 1885 (S, Sa)
Ochthebius lucanus Ferro, 1990 (S) (E) (*)
Ochthebius maculatus Reiche, 1872 (Si, Sa)
Ochthebius mediterraneus lenistea, 1978 (N, S)
Ochthebius melanescens Dalla Torre, 1877 (N) (*)
Ochthebius meridionalis (Rey, 1885) (N, S)
Ochthebius metallescens Rosenhauer, 1847 (N, S, Si, Sa)
Ochthebius minimus (Fabricius, 1792) (N, S, Si, Sa?)
Ochthebius montanus Frivaldsky, 1881 (N) (*)
Ochthebius monychus D'Orchymont, 1941 (N?) (*)
Ochthebius nanus Stephens, 1829 (N, S, Si, Sa)
Ochthebius narentinus Reitter, 1885 (N)
Ochthebius nobilis Villa, 1835 (N, S)
Ochthebius opacus Baudi, 1882 (N, S, Si)
Ochthebius pedicularius Kuwert, 1887 (N, S, Si?)

Ochthebius peregrinus D'Orchymont, 1941 (N, S) (*)
Ochthebius pilosus Walzl, 1835 (S, Si, Sa) (*)
Ochthebius poweri Rye, 1870 (N, S, Si)
Ochthebius punctatus Stephens, 1829 (N, S, Si, Sa)
Ochthebius pusillus Stephens, 1835 (N, S, Si, Sa)
Ochthebius quadricollis Mulsant, 1844 (3, 5?)
Ochthebius quadrifossulatus Walzl, 1835 (S, Si)
Ochthebius ragusae (Kuwert, 1887) (N, S, Si)
Ochthebius rugulosus Wollaston, 1857 (N?, Sa) (*)
Ochthebius sardus Jäch, 1990 (Sa) (E) (*)
Ochthebius semisericeus Sainte-Claire Deville, 1908 (N, S, Si, Sa) (*)
Ochthebius sculus Kuwert, 1887 (S, Si) (E)
Ochthebius sidanus D'Orchymont, 1942 (N, S)
Ochthebius subinteger Mulsant & Rey, 1861 (3, 4, 5)
Ochthebius subpictus Wollaston, 1857 (N)
Ochthebius tacapasensis Ferro, 1983 (S, Si)
Ochthebius vedovai Ferro, 1987 (N) (E)
Ochthebius velutinus Fairmaire, 1883 (Si, Sa)
Ochthebius virgula Ferro, 1986 (N, S) (E)
Ochthebius viridis (Peyron, 1858) (N, S, Si, Sa)

***Limnebius* Leach, 1815**

Limnebius aluta (Bedel, 1881) (N, S, Si, Sa)
Limnebius asperatus Knisch, 1922 (N?, S?) (E) (*)
Limnebius atomus (Duftschmid, 1805) (N, S)
Limnebius calabricus Jäch, 1993 (S) (E) (*)
Limnebius crinifer Rey, 1885 (N)
Limnebius doderoi Gridelli, 1926 (S, Sa)
Limnebius furcatus Baudi, 1872 (N, S, Si, Sa?)
Limnebius mucronatus Baudi, 1872 (N, S, Si, Sa)
Limnebius myrmidon Rey, 1883 (N, S, Sa) (*)
Limnebius nitiduloides Baudi, 1872 (N, S, Si, Sa?) (E)
Limnebius nitidus (Marsham, 1802) (N, S, Si?, Sa?)
Limnebius oblongus Rey, 1883 (N) (*)
Limnebius papposus Mulsant, 1844 (N, S)
Limnebius perparvulus Jäch, 1993 (N, S, Si, Sa)
Limnebius pilicauda Guillebeau, 1896 (Si) (*)
Limnebius simplex Baudi, 1882 (Si) (E)
Limnebius sternalis (Guillebeau, 1890) (N) (*)
Limnebius truncatellus (Thunberg, 1794) (N)

***Micragasma* J. Sahlberg, 1900**

Micragasma paradoxum J. Sahlberg, 1900 (S) (*)

Note

Hydraena subjuncta: Specie propria della Grecia; una recente citazione per la Calabria ionica è da attribuire quasi certamente ad errore di cartellino.

Haenydra alpicola: Solo nel Friuli orientale.

Haenydra emarginata: Popolazioni con genitali maschili identici a quelli di popolazioni pirenaiche tipiche sono presenti nel biellese; esiste peraltro ancora qualche dubbio sulla loro attribuzione alla vera *H. emarginata*.

Haenydra heterogyna: Lo status tassonomico delle numerose "forme" e "sottospecie" italiane di questa variabilissima specie è ancora da chiarire.

Haenydra occitana: Solo in Liguria, Piemonte meridionale, Toscana settentrionale ed Emilia occidentale.

Haenydra saga: Solo lungo l'Appennino Abruzzese.

Haenydra sanfilippo: Solo lungo l'Appennino Ligure e Tosco-Emiliano.

Ochthebius colveranus: Solo in Friuli e Venezia-Giulia.

Ochthebius corsicus: Presenza dubbia in Sardegna.

Ochthebius dentifer: In N solo in Liguria occidentale.

Ochthebius exsculptus: Presenza dubbia in Val d'Aosta.

Ochthebius granulatus: In S solo lungo l'Appennino Tosco-Emiliano e a Vallombrosa.

Ochthebius haberfelneri: Solo nel Tarvisino.

Ochthebius italicus: Solo in Piemonte.

Ochthebius lucanus: Noto solo di aree ioniche di Basilicata e Calabria.

Ochthebius melanescens: Solo in Friuli e Trentino-Alto Adige.

Ochthebius montanus: Presenza dubbia in Piemonte sud-occidentale.

Ochthebius monychus: Citazione dubbia per il Piemonte, probabilmente da riferire a *O. italicus* Jäch.

Ochthebius peregrinus: In N e S solo nelle aree costiere adriatiche.

Ochthebius pilosus: In S solo in Toscana sud-occidentale.

Ochthebius rugulosus: In N forse lungo le Alpi Occidentali.

Ochthebius sardus: Specie distinta o sottospecie di *O. opacus*.

Ochthebius semisericeus: La situazione di questa specie e dei suoi numerosi (presunti o reali) sinonimi necessita ancora di qualche chiarimento tassonomico.

Limnebius asperatus: Noto solo di incerta località italiana.

Limnebius calabricus: Noto solo della Calabria ionica.

Limnebius myrmidon: Solo in Liguria occidentale.

Limnebius oblongus: In N e S solo in Liguria e Toscana.

Limnebius pilicauda: In Si noto solo delle Isole Egadi.

Limnebius stagnalis: Presenza dubbia in Friuli-Venezia Giulia.

Micragasma paradoxum: Dato inedito di Ferro & Audisio per la Puglia, dintorni di Taranto (Leg. F. Montemurro). La specie era conosciuta solo sui tipi, descritti di Grecia (Corfù).

Hydrochidae

Hydrochus Leach, 1817

Hydrochus angustatus Germar, 1824 (N)

Hydrochus brevis (Herbst, 1793) (N, S)

Hydrochus carinatus Germar, 1824 (N, S, Sa)

Hydrochus elongatus (Schaller, 1783) (N, S, Sa)

Hydrochus flavipennis Küster, 1852 (N, S)
Hydrochus grandicollis Kiesenwetter, 1870 (N, S, Si, Sa)
Hydrochus nitidicollis Mulsant, 1844 (N, Si, Sa)

Hydrophilidae

Berosus Leach, 1817

Berosus affinis Brullé, 1835 (N, S, Si, Sa)
Berosus bispina Reiche, 1856 (N, S, Si, Sa)
Berosus luridus (Linnaeus, 1761) (N, S, Sa)
Berosus signaticollis (Charpentier, 1825) (N, S, Si, Sa)
Berosus spinosus (Steven, 1808) (N, S, Sa)

Hydrous Leach, 1815

Hydrous aterrimus (Eschscholtz, 1822) (N)
Hydrous piceus Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)
Hydrous pistaceus (Castelnau, 1840) (N, Si, Sa)

Hydrophilus Leach, 1815

Hydrophilus caraboides (Linnaeus, 1758) (N, Si, Sa)
Hydrophilus flavipes Steven, 1808 (N, S, Sa)

Chaetarthria Stephens, 1835

Chaetarthria seminulum (Herbst, 1797) (N, S, Sa)

Cymbiodyta Bedel, 1881

Cymbiodyta marginella (Fabricius, 1792) (N, S, Sa)

Helochares Mulsant, 1844

Helochares griseus Fabricius, 1787 (N, S, Si)
Helochares lividus (Forst, 1771) (N, S, Sa)
Helochares livornicus Kuwert, 1889 (S, Si)
Helochares nigrutilus Kuwert, 1889 (Si)

Enochrus Thomson, 1859

Enochrus affinis (Thunberg, 1794) (N, S)
Enochrus bicolor (Fabricius, 1792) (S)
Enochrus calabricus Ferro, 1976 (S)
Enochrus coarctatus (Gredler, 1863) (N, S)
Enochrus melanocephalus (Oliver, 1792) (N, S, Sa)

Enochrus ochropterus (Marsham, 1802) (N, S)
Enochrus politus (Küster, 1849) (N, S)
Enochrus quadripunctatus (Herbst, 1797) (N, S)
Enochrus ragusai Kuwert, 1889 (Si)
Enochrus testaceus (Fabricius, 1801) (N, S, Si, Sa)

Laccobius Erichson, 1837

Laccobius albipes Kuwert, 1889 (N)
Laccobius alternus Motschulsky, 1855 (N, S, Si)
Laccobius atrocephalus Reitter, 1872 (Si)
Laccobius bipunctatus (Fabricius, 1775) (N, S, Sa)
Laccobius gracilis Motschulsky, 1855 (N, S, Si)
Laccobius hispanicus Gentili, 1974 (N)
Laccobius minutus (Linnaeus, 1758) (N)
Laccobius mulsanti Zaitzev, 1908 (S, Si, Sa)
Laccobius neapolitanus Rottenberg, 1874 (N, S, Si, Sa)
Laccobius obscuratus Rottenberg, 1874 (N, S)
Laccobius revelierei Perris, 1864 (S, Si, Sa)
Laccobius simulator D'Orchymont, 1932 (N, S)
Laccobius sinuatus Motschulsky, 1849
 Laccobius sinuatus sinuatus Motschulsky, 1849 (N)
 Laccobius sinuatus binaghii Gentili 1974 (Sa)
Laccobius striatulus (Fabricius, 1801) (N, S, Si, Sa)

Anacaena Thomson, 1859

Anacaena bipustulata (Marsham, 1802) (N, S, Sa)
Anacaena globulus (Paykull, 1798) (N, S, Si, Sa)
Anacaena limbata (Fabricius, 1792) (N, S, Sa)

Paracymus Thomson, 1867

Paracymus aeneus (Germar, 1824) (N, S, Si, Sa)
Paracymus scutellaris (Rosenhauer, 1856) (N, S, Sa)

Hemisphaera Pandellé, 1876

Hemisphaera seriatopunctata (Perrin, 1875) (Sa)

Limnoxenus Motschulsky, 1853

Limnoxenus niger (Zschach, 1788) (N, S, Si, Sa)

Hydrobius Leach, 1815

Hydrobius convexus Brullé, 1835 (S, Si, Sa)
Hydrobius fuscipes (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Hydroscaphidae

Hydroscapha Leconte, 1874

Hydroscapha crotchii Sharp, 1874 (Sa?)

Hydroscapha granulum Motschulsky, 1855 (N, S, Sa)

Hygrobiiidae

Hygrobia Latreille, 1804

Hygrobia tarda (Herbst, 1779) (N, S, Si, Sa)

Hypocopridae

Hypocoprus Motschulsky, 1839

Hypocoprus lathridioides Motschulsky, 1839 (N, S, Si, Sa)

Kateretidae

Kateretes Herbst, 1793

Kateretes dalmatinus (Sturm, 1844) (N, S, Si?) (*)

Kateretes pedicularius (Linnaeus, 1758) (N)

Kateretes pusillus (Thunberg, 1794) (N)

Kateretes rufilabris (Latreille, 1807) (N, S, Si, Sa)

Heterhelus Jacquelin DuVal, 1858

Heterhelus scutellaris (Heer, 1841) (N, S)

Heterhelus solani (Heer, 1841) (N, S) (*)

Brachypterus Kugelann, 1794

Brachypterus curtulus Wollaston, 1854 (S, Si, Sa) (*)

Brachypterus glaber Stephens, 1832 (N, S, Si, Sa)

Brachypterus labiatus Erichson, 1843 (Sa)

Brachypterus rotundicollis Murray, 1864 (S) (*)

Brachypterus urticae (Fabricius, 1792) (N, S)

Brachypterolus Grouvelle, 1913

Brachypterolus antirrhini (Murray, 1864) (N, S, Si, Sa)
Brachypterolus cinereus (Heer, 1841) (N?) (*)
Brachypterolus linariae (Stephens, 1830) (N, S, Si)
Brachypterolus longulus (Reitter, 1885) (N?) (*)
Brachypterolus pulicarius (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa) (*)
Brachypterolus vestitus (Kiesenwetter, 1850) (N, S) (*)

Note

Kateretes dalmatinus: In N solo in Friuli-Venezia Giulia, in S solo in Puglia.
Heterhelus solani: In S con certezza solo lungo l'Appennino Tosco-Emiliano.
Brachypterus curtulus: In S solo nelle regioni costiere ioniche di Puglia, Basilicata e Calabria.
Brachypterus rotundicollis: In S noto solo dei dintorni di Foggia.
Brachypterolus cinereus: Presenza dubbia in incerta località delle Alpi Marittime.
Brachypterolus longulus: Presenza dubbia in incerta località delle Alpi Marittime.
Brachypterolus pulicarius: Forse solo introdotto in Sa.
Brachypterolus vestitus: In N solo in Piemonte e Liguria, in S solo in Toscana occidentale .

Lagriidae

Lagria (Lagria) Fabricius, 1775

Lagria (Lagria) atripes Mulsant & Guillebeau, 1855 (N, S, Si)
Lagria (Lagria) hirta (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)

Lagria (Apteronympha) Seidlitz, 1898

Lagria (Apteronympha) glabrata Olivier, 1792 (N, S, Si, Sa)

Lampyridae

Nyctophila E. Olivier, 1884

Nyctophila bonvouloirii (Jacquelin du Val, 1860) (Si) (E)
Nyctophila calabriae Geisthardt, 1982 (S) (E) (*)
Nyctophila molesta (Jacquelin du Val, 1860) (N) (*)
Nyctophila reichei (Jacquelin du Val, 1859) (N?) (*)

Lampyris Geoffroy, 1762

Lampyris ambigena Jacquelin du Val, 1860 (Si) (E)
Lampyris brutia A. Costa, 1881 (S) (E) (*)
Lampyris fuscata Geisthardt, 1987 (*)
 Lampyris fuscata fuscata Geisthardt, 1987 (S) (E)
 Lampyris fuscata apuliae Geisthardt, 1987 (S) (E)
Lampyris lareyniei Jacquelin du Val, 1859 (*)

Lampyris lareyniei maculata Geisthardt, 1987 (S) (E)
Lampyris lusitanica Motschulsky, 1854 (N, S, Sa)
Lampyris noctiluca Linnaeus, 1767 (N, S, Si, Sa)
Lampyris sardiniae Geisthardt, 1987 (*)
Lampyris sardiniae sardiniae Geisthardt, 1987 (Sa) (E)
Lampyris sardiniae brunnea Geisthardt, 1987 (Sa) (E)

Lamprohiza Motschulsky, 1852

Lamprohiza boieldieui Jacquelin du Val, 1860 (N)
Lamprohiza delarouzei Jacquelin du Val, 1859 (N?)
Lamprohiza foliacea (Baudi, 1871) (Sa)
Lamprohiza germari (Küster, 1844) (N?)
Lamprohiza morio (Baudi, 1875) (S)
Lamprohiza mulsanti (Kiesenwetter, 1850) (N?)
Lamprohiza splendidula (Linnaeus, 1767) (N, S)

Phosphaenus Laporte de Castelnau, 1833

Phosphaenus hemipterus (Fourcroy, 1785) (N)

Luciola Laporte de Castelnau, 1833

Luciola italica (Linnaeus, 1767) (N, S, Si, Sa)
Luciola lusitanica (Charpentier, 1825) (N, S)

Note

Nyctophila calabriae: Solo Calabria.
Nyctophila molesta: Solo Piemonte.
Nyctophila reichei: In N possibile presenza al confine occidentale.
Lampyris brutia: Nota di Calabria.
Lampyris fuscata: La ssp. *apuliae* nota solo dalla Penisola Salentina.
Lampyris lareyniei: Solo la ssp. *maculata* presente in Italia, limitatamente all'isola del Giglio.
Lampyris sardiniae: la ssp. *brunnea* solo all'Asinara.

Languriidae

Leucohimatium Rosenhauer, 1856

Leucohimatium arundinaceum (Forskål, 1775) (N, S, Si, Sa)

Setariola Jacobson, 1915

Setariola sericea (Mulsant & Rey, 1863) (N, S, Si, Sa)

Xenoscelis Wollaston, 1864

Xenoscelis costipennis (Fairmaire, 1852) (S, Si, Sa)

Latridiidae

Metophthalmus Wollaston, 1854

- Metophthalmus niveicollis* (Jacquelin du Val, 1859) (*)
- Metophthalmus niveicollis intermedius* Binaghi, 1946 (S, Si) (E)
- Metophthalmus niveicollis niveicollis* (Jacquelin du Val, 1859) (N)
- Metophthalmus niveicollis obesus* Reitter, 1880 (Sa)
- Metophthalmus ragusae* Reitter, 1875 (Si, Sa)
- Metophthalmus sculus* Binaghi, 1946 (Si) (E)
- Metophthalmus solarii* Binaghi, 1946 (N) (E)

Revelieria Perris, 1869

- Revelieria genei* (Aubé, 1850) (S, Sa)

Latridius Herbst, 1793

- Latridius anthracinus* Mannerheim, 1844 (N, S)
- Latridius brevicollis* (C.G. Thomson, 1868) (S)
- Latridius consimilis* Mannerheim, 1844 (N, S)
- Latridius hirtus* Gyllenhal, 1827 (N, S)
- Latridius minutus* (Linnaeus, 1767) (N, S, Si, Sa)
- Latridius pseudominutus* (A. Strand, 1958) (S)

Enicmus C.G. Thomson, 1859

- Enicmus atriceps* Hansen, 1962 (S)
- Enicmus brevicornis* (Mannerheim, 1844) (N, S, Si, Sa)
- Enicmus fungicola* C.G. Thomson, 1868 (N, S)
- Enicmus histrio* Joy et Tomlin, 1910 (N, S)
- Enicmus rugosus* (Herbst, 1793) (N, S, Si, Sa)
- Enicmus testaceus* (Stephens, 1830) (N, S, Sa)
- Enicmus transversus* (G.A. Olivier, 1790) (N, S, Si, Sa)

Dienerella Reitter, 1911

- Dienerella anatolica* (Mannerheim, 1844) (N?, S, Si, Sa)
- Dienerella argus* (Reitter, 1884) (N, S)
- Dienerella beloni* (Reitter, 1882) (Sa)
- Dienerella clathrata* (Mannerheim, 1844) (N, S)
- Dienerella corsica* Vincent, 1990 (S)
- Dienerella costulata* (Reitter, 1877) (N, Sa)
- Dienerella elegans* (Aubé, 1850) (N, S, Sa)

Dienerella elongata (Curtis, 1830) (N, S, Sa)
Dienerella filiformis (Gyllenhal, 1827) (N, S)
Dienerella filum (Aubé, 1850) (N)
Dienerella parilis (Rey, 1889) (N, S)
Dienerella pilifera (Reitter, 1875) (N, Si, Sa)
Dienerella ruficollis (Marsham, 1802) (N, S, Si, Sa)
Dienerella separanda (Reitter, 1887) (S, Si, Sa)
Dienerella siciliana Vincent, 1990 (S, Si) (E)

Adistemia Fall, 1899

Adistemia watsoni (Wollaston, 1871) (N, S, Si)

Stephostethus LeConte, 1878

Stephostethus alternans (Mannerheim, 1844) (N, S)
Stephostethus angusticollis (Gyllenhal, 1827) (N, S, Sa)
Stephostethus lardarius (Degeer, 1775) (N)
Stephostethus pandellei (Brisout de Barneville, 1863) (N, S)
Stephostethus productus (Rosenhauer, 1856) (S)
Stephostethus rugicollis (G.A. Olivier, 1790) (N)
Stephostethus sinuatocollis (Faldermann, 1837) (N) (*)

Thes Semenov-Tian-Shansky, 1910

Thes bergrothi (Reitter, 1880) (N)

Cartodere C.G.Thomson, 1859

Cartodere constricta (Gyllenhal, 1827) (N, S, Si, Sa)
Cartodere nodifera (Westwood, 1839) (N, S, Si, Sa) (*)

Corticaria Marsham, 1802

Corticaria abietorum Motschulsky, 1867 (N)
Corticaria bella Redtenbacher, 1849 (S?, Sa)
Corticaria ciliata Motschulsky, 1867 (N?) (*)
Corticaria corsica Brisout de Barneville, 1878 (Sa) (*)
Corticaria crenicollis Mannerheim, 1844 (N, Sa)
Corticaria crenulata (Gyllenhal, 1827) (N, S, Si, Sa)
Corticaria cucujiformis Reitter, 1880 (S, Sa)
Corticaria elongata (Gyllenhal, 1827) (N, S, Si, Sa)
Corticaria ferruginea Marsham, 1802 (N, S, Sa)
Corticaria foveola (Beck, 1817) (N, Sa)
Corticaria fulva (Comolli, 1837) (N, S, Si, Sa)
Corticaria illaesa Mannerheim, 1844 (N, S, Sa)
Corticaria impressa (G.A.Olivier, 1790) (N, S)
Corticaria lapponica (Zetterstedt, 1838) (N)

Corticaria lateritia Mannerheim, 1844 (S?)
Corticaria linearis (Paykull, 1798) (N)
Corticaria longicollis (Zetterstedt, 1838) (N, S?)
Corticaria longicornis (Herbst, 1793) (N, Sa)
Corticaria obscura Brisout de Barneville, 1863 (N, S, Sa)
Corticaria pineti Lohse, 1960 (N, S)
Corticaria pubescens (Gyllenhal, 1827) (N, S, Sa)
Corticaria saginata Mannerheim, 1844 (N, S, Si)
Corticaria serrata (Paykull, 1798) (N, S, Si, Sa)
Corticaria solarii Reitter, 1904 (S) (E)
Corticaria umbilicata (Beck, 1817) (N)
Corticaria weisei Reitter, 1875 (N, S)

Cortinicara Johnson, 1975

Cortinicara gibbosa (Herbst,) 1793) (N, S, Si, Sa)

Corticarina Reitter, 1880

Corticarina fulvipes (Comolli, 1837) (N, S, Si, Sa)
Corticarina fuscula (Gyllenhal, 1827) (N, S)
Corticarina lambiana (Sharp, 1910) (N)
Corticarina similata (Gyllenhal, 1827) (N, S)
Corticarina truncatella (Mannerheim, 1844) (N, S)

Melanophthalma Motschulsky, 1866

Melanophthalma curticollis (Mannerheim, 1844) (N, S)
Melanophthalma distinguenda (Comolli, 1837) (N, S, Si, Sa?)
Melanophthalma fuscipennis (Mannerheim, 1844) (N, S, Si, Sa)
Melanophthalma maura Motschulsky, 1866 (N, S, Sa)
Melanophthalma sericea (Mannerheim, 1844) (S)
Melanophthalma suturalis (Mannerheim, 1844) (S)
Melanophthalma taurica (Mannerheim, 1844) (N, S, Sa)

Migneauxia Jacquelin du Val, 1859

Migneauxia crassiuscula (Aubé, 1850) (N, S, Si?, Sa?)
Migneauxia inflata (Rosenhauer, 1856) (N?, Si, Sa)

Note

Metophthalmus niveicollis: La specie appartiene al subg. Bonvouloiria Jacquelin du Val, 1857-59; tutte le altre specie appartengono al subg. nominale.
Stephostethus sinuatocollis: Importato nella Laguna di Venezia (cfr. Ratti E. 1987 - Boll. Mus. civ. St. nat. Venezia, 37, (1986): 187).
Cartodere nodifera: La specie appartiene al subg. Aridius Motschulsky, 1866, mentre 102.0.001.0 appartiene al subg. nominale.

Corticaria ciliata: La validità della specie è dubbia.
Corticaria corsica: La validità della specie è dubbia.

Leiodidae

Triarthron Märkel, 1840

Triarthron maerkeli Märkel, 1840 (N)

Trichohydnobius Vogt, 1961

Trichohydnobius secundus (Guillebeau, 1897) (S)

Trichohydnobius suturalis (Zetterstedt, 1828) (N)

Hydnobius Schmidt, 1841

Hydnobius danieli Vogt, 1961 (N, S)

Hydnobius claviger Strand, 1943 (N)

Hydnobius latifrons (Curtis, 1840) (N)

Hydnobius multistriatus (Gyllenhal, 1813) (N)

Hydnobius punctatus (Sturm, 1807) (N, S, Si, Sa)

Hydnobius spinipes (Gyllenhal, 1813) (N, Si)

Leiodes (Leiodes) Latreille, 1796

Leiodes (Leiodes) bicolor (Schmidt, 1841) (N)

Leiodes (Leiodes) brandisi (Holdhaus, 1902) (N)

Leiodes (Leiodes) brunnea (Sturm, 1807) (N, S)

Leiodes (Leiodes) ciliaris (Schmidt, 1841) (N, S)

Leiodes (Leiodes) cinnamomea (Panzer, 1793) (N, S, Si)

Leiodes (Leiodes) dubia (Kugelann, 1794) (N, S)

Leiodes (Leiodes) ferruginea (Fabricius, 1787) (N, S)

Leiodes (Leiodes) flavescens (Schmidt, 1841) (N, S)

Leiodes (Leiodes) fracta (Seidlitz, 1874) (N)

Leiodes (Leiodes) furva (Erichson, 1845) (N)

Leiodes (Leiodes) gallica (Reitter, 1884) (N)

Leiodes (Leiodes) ganglbaueri (Holdhaus, 1902) (N)

Leiodes (Leiodes) hybrida (Erichson, 1845) (N, S)

Leiodes (Leiodes) litura Stephens, 1832 (N, S, Sa)

Leiodes (Leiodes) longipes (Schmidt, 1841) (N, S)

Leiodes (Leiodes) lucens (Fairmaire, 1855) (N)

Leiodes (Leiodes) lunicollis (Rye, 1872) (N)

Leiodes (Leiodes) macropus (Rye, 1873) (N, S)

Leiodes (Leiodes) maculicollis (Rye, 1875) (S, Si)

Leiodes (Leiodes) obesa (Schmidt, 1841) (N, S)

Leiodes (Leiodes) oblonga (Erichson, 1845) (N)

Leiodes (Leiodes) obscura (Fairmaire, 1858) (N, S, Si, Sa)

Leiodes (Leiodes) pallens (Sturm, 1807) (N, S)
Leiodes (Leiodes) picea (Panzer, 1797) (N, S)
Leiodes (Leiodes) polita (Marsham, 1802) (N, S, Si, Sa)
Leiodes (Leiodes) punctulata (Gyllenhal, 1818) (N)
Leiodes (Leiodes) rhaetica (Erichson, 1845) (N)
Leiodes (Leiodes) rotundata (Erichson, 1845) (N)
Leiodes (Leiodes) rubiginosa (Schmidt, 1841) (N, S)
Leiodes (Leiodes) ruficollis (J. Sahlberg, 1898) (N)
Leiodes (Leiodes) rufipennis (Paykull, 1798) (N)
Leiodes (Leiodes) rugosa Stephens, 1829 (N, Si)
Leiodes (Leiodes) skalitzkyi (Ganglbauer, 1899) (N)
Leiodes (Leiodes) sparreschneideri (Strand, 1943) (N)
Leiodes (Leiodes) subconvexa Daffner, 1983 (N)
Leiodes (Leiodes) triepkei (Schmidt, 1841) (N)
Leiodes (Leiodes) vladimiri (Fleischer, 1906) (N)

Leiodes (Oosphaerula) Ganglbauer, 1896

Leiodes (Oosphaerula) badia (Sturm, 1807) (N, Si)
Leiodes (Oosphaerula) castanescens (Fairmaire, 1881) (Sa)
Leiodes (Oosphaerula) flavicornis (Brisout, 1883) (N, S)
Leiodes (Oosphaerula) gyllenhalii Stephens, 1829 (N, S)
Leiodes (Oosphaerula) javorniki (Hlisnikovsky, 1964) (N)
Leiodes (Oosphaerula) nigrita (Schmidt, 1841) (N, S)
Leiodes (Oosphaerula) nitidula (Erichson, 1845) (N)
Leiodes (Oosphaerula) rosai Daffner, 1983 (N) (E)
Leiodes (Oosphaerula) strigipenne Daffner, 1983 (N, S)
Leiodes (Oosphaerula) subtilis (Reitter, 1885) (N, S)

Liocyrtusa Daffner, 1982

Liocyrtusa minuta (Ahrens, 1812) (N, Sa)
Liocyrtusa vittata (Curtis, 1840) (N, S)

Cyrtusa Erichson, 1842

Cyrtusa subtestacea (Gyllenhal, 1813) (N, S)

Colenis (Colenis) Erichson, 1842

Colenis (Colenis) immunda (Sturm, 1807) (N, S)

Agaricophagus Schmidt, 1841

Agaricophagus cephalotes Schmidt, 1841 (N, S)
Agaricophagus italicum Hlisnikovsky, 1964 (S) (E)

Anisotoma Panzer, 1797

Anisotoma axillaris Gyllenhal, 1810 (N)
Anisotoma castanea (Herbst, 1792) (N, S)
Anisotoma glabra (Fabricius, 1792) (N, S)
Anisotoma humeralis (Fabricius, 1792) (N, S)
Anisotoma orbicularis (Herbst, 1792) (N, S)

***Amphicyllis* Erichson, 1845**

Amphicyllis globiformis (C.R. Sahlberg, 1834) (N, S)
Amphicyllis globus (Fabricius, 1792) (N, S, Sa)

***Cyrtoplastus* Reitter, 1884**

Cyrtoplastus seriepunctatus (Brisout, 1867) (N)

***Liodopria* Reitter, 1909**

Liodopria serricornis (Gyllenhal, 1813) (N)

***Agathidium (Cyphoceble)* Thomson, 1859**

Agathidium (Cyphoceble) arcticum Thomson, 1862 (N)
Agathidium (Cyphoceble) discoideum Erichson, 1845 (N)
Agathidium (Cyphoceble) nigrinum Sturm, 1807 (N, S)

***Agathidium (Neoceble)* Gozis, 1886**

Agathidium (Neoceble) aglyptoides Reitter, 1884 (S)
Agathidium (Neoceble) banaticum Reitter, 1884 (N)
Agathidium (Neoceble) brisouti Reitter, 1884 (S)
Agathidium (Neoceble) confusum Brisout, 1863 (N, S)
Agathidium (Neoceble) convexum Sharp, 1866 (N)
Agathidium (Neoceble) haemorrhoum Erichson, 1845 (N, S, Si, Sa)
Agathidium (Neoceble) mandibulare Sturm, 1807 (N, S)
Agathidium (Neoceble) marginatum Sturm, 1807 (N, S, Si)
Agathidium (Neoceble) montemurroi Angelini & De Marzo, 1985 (S)
Agathidium (Neoceble) nigriceps Brisout, 1872 (Si)
Agathidium (Neoceble) nigripenne (Fabricius, 1792) (N, S)
Agathidium (Neoceble) nudum Hampe, 1870 (S)
Agathidium (Neoceble) plagiatum (Gyllenhal, 1810) (N, S, Si)
Agathidium (Neoceble) pseudopallidum Hlisnikovsky, 1964 (S)
Agathidium (Neoceble) rotundatum (Gyllenhal, 1827)
 Agathidium (Neoceble) rotundatum rotundatum (Gyllenhal, 1827) (N, S)
 Agathidium (Neoceble) rotundatum paganettii Reitter, 1908 (S) (E)
Agathidium (Neoceble) varians Beck, 1817 (N, S, Si)

***Agathidium (Agathidium)* Panzer, 1797**

Agathidium (Agathidium) atrum (Paykull, 1798) (N, S)
Agathidium (Agathidium) badium Erichson, 1845 (N, S)
Agathidium (Agathidium) bartolii Poggi, 1981 (N) (E)
Agathidium (Agathidium) bohemicum Reitter, 1884
 Agathidium (Agathidium) bohemicum bohemicum Reitter, 1884 (N)
 Agathidium (Agathidium) bohemicum heyrovskyi Hlisnikovsky, 1964 (N) (E)
 Agathidium (Agathidium) bohemicum rosai Angelini & De Marzo, 1985 (N) (E)
Agathidium (Agathidium) dentatum Mulsant & Rey, 1861 (N, S, Si)
Agathidium (Agathidium) italicum Hlisnikovsky, 1964 (N, S)
Agathidium (Agathidium) laevigatum Reitter, 1904 (S, Si) (E)
Agathidium (Agathidium) laevigatum Erichson, 1845 (N, S, Si, Sa)
Agathidium (Agathidium) minimum Doderer, 1916 (N, S) (E)
Agathidium (Agathidium) obenbergeri Hlisnikovsky, 1964 (S) (E)
Agathidium (Agathidium) paganettianum Hlisnikovsky, 1964 (S, Si) (E)
Agathidium (Agathidium) pisanum Brisout, 1872 (N, S)
Agathidium (Agathidium) seminulum (Linné, 1758) (N, S, Si)

Limnichidae

Pelochares Mulsant & Rey, 1869

Pelochares versicolor (Waltl, 1838) (N, S, Si, Sa)

Limnichus Latreille, 1829

Limnichus angustulus Weise, 1877 (Sa)
Limnichus auricomus Reitter, 1878 (S)
Limnichus aurosericeus J. du Val, 1857 (S, Si)
Limnichus incanus Kiesenwetter, 1851 (N, S)
Limnichus punctipennis Kraatz, 1858 (Si)
Limnichus pygmaeus (Sturm, 1807) (N, S)
Limnichus sericeus (Duftschmid, 1825) (N, S)

Bothriophorus Mulsant & Rey, 1852

Bothriophorus atomus Mulsant & Rey, 1852 (N, Sa)

Lucanidae

Aesalus Fabricius, 1801

Aesalus scarabaeoides (Panzer, 1794)
 Aesalus scarabaeoides scarabaeoides (Panzer, 1794) (N)
 Aesalus scarabaeoides meridionalis Bartolozzi, 1989 (S) (E)

Ceruchus Macleay, 1819

Ceruchus chrysomelinus (Hochenwart, 1785) (N, S)

Sinodendron Hellwig, 1792

Sinodendron cylindricum (Linné, 1758) (*)

Sinodendron cylindricum cylindricum (Linné, 1758) (N, S, Si)

Sinodendron cylindricum aspromontanum G. Müller, 1938 (S) (E)

Platycerus Geoffroy, 1762

Platycerus caraboides (Linné, 1758) (N, S)

Platycerus caprea (Degeer, 1774) (N, S)

Dorcus Macleay, 1819

Dorcus parallelipipedus (Linné, 1758) (*)

Dorcus parallelipipedus parallelipipedus (Linné, 1758) (N)

Dorcus parallelipipedus truquii Mulsant, 1855 (S, Si, Sa?) (E)

Dorcus musimon Gené, 1836 (Sa)

Lucanus Scopoli, 1763

Lucanus cervus (Linné, 1758)

Lucanus cervus cervus (Linné, 1758) (N, S, Sa?)

Lucanus tetraodon Thunberg, 1806 (S, Si, Sa)

Note

Sinodendron cylindricum: Sottospecie non valida secondo Bartolozzi (in verbis).

Dorcus parallelipipedus: Sottospecie non valida secondo Bartolozzi (in verbis).

Lycidae

Lygistopterus Dejean, 1833

Lygistopterus anorachilus Ragusa, 1883 (S, Si) (E)

Lygistopterus sanguineus (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)

Lopheros LeConte, 1881

Lopheros rubens (Gyllenhal, 1817) (N, Sa)

Dictyoptera Latreille, 1829

Dictyoptera aurora (Herbst, 1784)

Dictyoptera aurora aurora (Herbst, 1784) (N, S)
Dictyoptera aurora caprai Puppini, 1974 (S) (E)
Dictyoptera aurora limbaticollis Pic, 1914 (S) (E)

Pyropterus Mulsant, 1838

Pyropterus nigroruber (Degeer, 1774) (N, S, Sa)

Platycis C.G.Thomson, 1859

Platycis minutus (Fabricius, 1787) (N, S, Si, Sa)

Lyctidae

Trogoxylon J.L. Leconte, 1862

Trogoxylon impressum (Comolli, 1837) (N, S, Si, Sa)
Trogoxylon parallelopipedum (Melsheimer, 1846) (N?, S?) (*)

Lyctus Fabricius, 1792

Lyctus africanus Lesne, 1907 (N?, S?) (*)
Lyctus brunneus (Stephens, 1830) (N, S, Sa) (*)
Lyctus hipposideros Lesne, 1908 (N?, S?) (*)
Lyctus linearis (Goeze, 1777) (N, S, Si, Sa)
Lyctus planicollis J.L. Leconte, 1858 (N?, S?) (*)
Lyctus pubescens Panzer, 1793 (N, Sa)

Minthea Pascoe, 1866

Minthea rugicollis (F. Walker, 1858) (Si) (*)

Lyctoxylon Reitter, 1878

Lyctoxylon dentatum (Pascoe, 1866) (N?) (*)

Note

Trogoxylon parallelopipedum: Specie di origine nearctica acclimatata in alcuni stati europei; intercettata in Gran Bretagna in un carico di riso proveniente dall'Italia.

Lyctus africanus: Specie di origine etiopica largamente diffusa nelle regioni intertropicali del globo; in Italia rinvenuta in depositi di legname. Nel suo areale primario sono note alcune presunte spp., la segnalazione per il nostro Paese è relativa a "*Lyctus africanus*" e si riferisce quasi certamente alla ssp. nominale.

Lyctus brunneus: Specie cosmopolita, probabilmente di origine tropicale.

Lyctus hipposideros: Specie di origine etiopica, reperita nel 1975 in depositi di legname proveniente dal Mozambico.

Lyctus planicollis: Specie nearctica introdotta in diversi paesi europei; in Italia è stata rinvenuta in depositi di legname proveniente dal Nord America.

Minthea rugicollis: Specie di origine tropicale attualmente subcosmopolita; in Sicilia sembra acclimatata.

Lyctoxylon dentatum: Specie di origine orientale invasiva in diverse aree del pianeta; intercettata tra il 1969 e il 1971 nel porto di Venezia su rizomi di manioca provenienti dallo Zambia; non si hanno dati su una eventuale acclimatazione.

Lymexylidae

Hylecoetus Latreille, 1806

Hylecoetus dermestoides (Linné, 1761) (N, S)

Lymexylon Fabricius, 1755

Lymexylon navale (Linné, 1758) (N, S, Sa?)

Melandryidae

Orchesia (Clinocara) C.G. Thomson, 1859

Orchesia (Clinocara) blandula Brancsik, 1874 (N)

Orchesia (Clinocara) fasciata (Illiger, 1798) (N)

Orchesia (Clinocara) grandicollis Rosenhauer, 1847 (N)

Orchesia (Clinocara) maculata Mulsant & Godart, 1856 (Si)

Orchesia (Clinocara) minor Walker, 1837 (N)

Orchesia (Clinocara) undulata Kraatz, 1853 (N, S, Si, Sa)

Orchesia (Orchesia) Latreille, 1807

Orchesia (Orchesia) micans (Panzer, 1794) (N, S, Sa)

Anisoxya Mulsant, 1856

Anisoxya fuscula (Illiger, 1798) (N, S)

Abdera (Carida) Mulsant, 1856

Abdera (Carida) affinis (Paykull, 1799) (N)

Abdera (Carida) flexuosa (Paykull, 1799) (N)

Abdera (Abdera) Stephens, 1832

Abdera (Abdera) biflexuosa (Curtis, 1829) (N, S, Sa)

Abdera (Abdera) quadrifasciata (Curtis, 1829) (N, S, Si, Sa)

Wanachia Schulze, 1912

Wanachia triguttata (Gyllenhal, 1810) (N)

Dircaea Fabricius, 1798

Dircaea australis Fairmaire, 1856 (N?) (*)

Dircaea quadriguttata (Paykull, 1798) (N)

Phloiotrya Stephens, 1832

Phloiotrya granicollis Seidlitz, 1898 (Si) (E)

Phloiotrya rufipes (Gyllenhal, 1810) (N)

Phloiotrya vaudoueri Mulsant, 1856 (N, S)

Rushia Forel, 1893

Rushia parreyssi (Mulsant, 1856) (N, S)

Xylita Paykull, 1798

Xylita laevigata (Hellenius, 1786) (N)

Scotochroa LeConte, 1874

Scotochroa livida (C.R. Sahlberg, 1834) (N)

Serropalpus Hellenius, 1786

Serropalpus barbatus (Schaller, 1783) (N, S)

Hypulus Paykull, 1798

Hypulus bifasciatus (Fabricius, 1792) (N, S)

Hypulus quercinus (Quensel, 1790) (N, S)

Marolia Mulsant, 1856

Marolia variegata (Bosc d'Antic, 1792) (N)

Zilora Mulsant, 1856

Zilora sericea (Sturm, 1807) (N)

Melandrya (Melandrya) Fabricius, 1801

Melandrya (Melandrya) barbata (Fabricius, 1792) (N)

Melandrya (Melandrya) caraboides (Linnaeus, 1761) (N, S)
Melandrya (Melandrya) dubia (Schaller, 1783) (N)

Conopalpus Gyllenhal, 1810

Conopalpus brevicollis Kraatz, 1855 (N, S, Si)
Conopalpus testaceus (Olivier, 1790) (N, S)

Osphya Illiger, 1807

Osphya aeneipennis Kriechbaumer, 1848 (N)
Osphya bipunctata (Fabricius, 1775) (N?, S)

Note

Orchesia (Clinocara): È probabile la presenza in Liguria occidentale di *Orchesia* (*Orchestera*) *luteipalpis* Mulsant, 1857, segnalata di località del Nizzardo, Svizzera e Austria.
Dircaea australis: Forse da escludere dalla fauna italiana, poiché i reperti potrebbero riferirsi al Nizzardo.
Phloiotrya: Di norma citata come *Phloeotrya* Stephens.
Scotochroa: Di norma citata come *Xylita* Paykull.

Meloidae

Cabalia Mulsant & Rey, 1858

Cabalia segetum (Fabricius, 1792) (Si)

Lytta (Lytta) Fabricius, 1775

Lytta (Lytta) vesicatoria (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)

Trichomeloe Reitter, 1911

Trichomeloe sericellus (Reiche, 1857) (Si?) (*)

Alosimus Mulsant, 1857

Alosimus syriacus (Linnaeus, 1758)
Alosimus syriacus austriacus (Schränk, 1781) (N)
Alosimus tyrrhenicus Bologna, 1989 (S) (E)

Lydus Latreille, 1803

Lydus trimaculatus (Fabricius, 1775)
Lydus trimaculatus italicus Kaszab, 1952 (N, S) (E)

Oenas Latreille, 1802

Oenas crassicornis (Illiger, 1800) (N)

Cerocoma (Cerocoma) Geoffroy, 1762

Cerocoma (Cerocoma) schaefferi (Linnaeus, 1758) (N, S) (*)

Cerocoma (Metacerocoma) Kaszab, 1951

Cerocoma (Metacerocoma) schreberi Fabricius, 1781 (N, S)

Epicauta (Epicauta) Dejean, 1834

Epicauta (Epicauta) rufidorsum (Goeze, 1777) (N, S)

Epicauta (Epicauta) flabellicornis (Germar, 1817) (N) (*)

Hycleus Latreille, 1829

Hycleus duodecimpunctatus (Olivier, 1811) (N?)

Hycleus polymorphus (Pallas, 1771) (N) (*)

Mylabris (Mylabris) Fabricius, 1775

Mylabris (Mylabris) quadripunctata (Linnaeus, 1767)

Mylabris (Mylabris) quadripunctata quadripunctata (Linnaeus, 1767) (N, S)

Mylabris (Mylabris) schreibersi Reiche, 1865 (Si)

Mylabris (Mylabris) variabilis (Pallas, 1781) (N, S, Si, Sa) (*)

Mylabris (Eumylabris) Kuzin, 1954

Mylabris (Eumylabris) fabricii Soumacov, 1924 (N, S, Si)

Mylabris (Eumylabris) impressa Chevrolat, 1837

Mylabris (Eumylabris) impressa stillata Baudi, 1878 (Si) (E)

Mylabris (Micrabris) Kuzin, 1954

Mylabris (Micrabris) connata (Rey, 1892) (N) (*)

Mylabris (Micrabris) flexuosa Olivier, 1811 (N, S, Si?)

Mylabris (Micrabris) obsoleta Nowicki, 1873 (S) (E)

Mylabris (Micrabris) pusilla Olivier, 1811

Mylabris (Micrabris) pusilla latialis Magistretti, 1943 (S) (E)

Actenodia Laporte de Castelnau, 1840

Actenodia billbergi (Gyllenhal, 1817) (N?) (*)

Actenodia distincta (Chevrolat, 1837) (Si)

Meloe (Eurymeloe) Reitter, 1911

- Meloe (Eurymeloe) apenninicus* Bologna, 1988 (S, Si) (E)
- Meloe (Eurymeloe) baudii* Leoni, 1907 (N, S, Si, Sa)
- Meloe (Eurymeloe) brevicollis* Panzer, 1793
 - Meloe (Eurymeloe) brevicollis algiricus* Escherich, 1890 (Si)
 - Meloe (Eurymeloe) brevicollis brevicollis* Panzer, 1793 (N, S, Sa)
- Meloe (Eurymeloe) ganglbaueri* Apfelbeck, 1905 (N, S, Si, Sa)
- Meloe (Eurymeloe) luctuosus* Brandt & Erichson, 1832 (Si)
- Meloe (Eurymeloe) mediterraneus* G. Müller, 1925 (N, S, Si, Sa)
- Meloe (Eurymeloe) murinus* Brandt & Erichson, 1832 (Si, Sa)
- Meloe (Eurymeloe) rugosus* Marsham, 1802 (N)
- Meloe (Eurymeloe) scabriusculus* Brandt & Erichson, 1832 (N?) (*)

Meloe (Coelomeloe) Reitter, 1911

- Meloe (Coelomeloe) tuccius* Rossi, 1792
 - Meloe (Coelomeloe) tuccius tuccius* Rossi, 1792 (N, S, Sa)
 - Meloe (Coelomeloe) tuccius corrosus* Brandt & Erichson, 1832 (S, Si) (E)

Meloe (Meloegonius) Reitter, 1911

- Meloe (Meloegonius) cicatricosus* Leach, 1815 (N, S, Si, Sa)
- Meloe (Meloegonius) rufiventris* Germar, 1817 (*)
 - Meloe (Meloegonius) rufiventris rufiventris* Germar, 1817 (N?)

Meloe (Taphromeloe) Reitter, 1911

- Meloe (Taphromeloe) erythrocnemus* Pallas, 1782 (N, S, Si) (*)
- Meloe (Taphromeloe) foveolatus* Guérin de Méneville, 1842 (S?) (*)

Meloe (Micromeloe) Reitter, 1911

- Meloe (Micromeloe) decorus* Brandt & Erichson, 1832 (N)
- Meloe (Micromeloe) uralensis* Pallas, 1777 (N?) (*)

Meloe (Lampromeloe) Reitter, 1911

- Meloe (Lampromeloe) cavensis* Petagna, 1819 (S, Si, Sa)
- Meloe (Lampromeloe) variegatus* Donovan, 1793
 - Meloe (Lampromeloe) variegatus variegatus* Donovan, 1793 (N, S)

Meloe (Treiodous) Dugès, 1869

- Meloe (Treiodous) autumnalis* Olivier, 1792
 - Meloe (Treiodous) autumnalis autumnalis* Olivier, 1792 (N, S, Sa)
 - Meloe (Treiodous) autumnalis heydeni* Escherich, 1889 (Si) (E)

Meloe (Meloe) Linnaeus, 1758

Meloe (Meloe) aegyptius Brandt & Erichson, 1832 (Si)

Meloe (Meloe) proscarabaeus Linnaeus, 1758

Meloe (Meloe) proscarabaeus proscarabaeus Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)

Meloe (Meloe) violaceus Marsham, 1802 (N, S, Si, Sa)

Apalus Fabricius, 1775

Apalus bimaculatus (Linnaeus, 1761) (N, S, Si)

Apalus bipunctatus Germar, 1817 (N, S, Si)

Apalus guerini (Mulsant, 1858) (N, S, Si)

Sitaris (Sitaris) Latreille, 1802

Sitaris (Sitaris) muralis (Foerster, 1771) (N, S, Si, Sa)

Sitaris (Sitaris) solieri Pecchioli, 1839

Sitaris (Sitaris) solieri solieri Pecchioli, 1839 (N, S, Si)

Stenoria (Stenoria) Mulsant, 1857

Stenoria (Stenoria) analis Schaum, 1859 (N, S, Si)

Stenoria (Stenoria) apicalis (Latreille, 1802) (N, S, Si, Sa)

Zonitis (Zonitis) Fabricius, 1775

Zonitis (Zonitis) bellieri Reiche, 1860 (Si)

Zonitis (Zonitis) flava Fabricius, 1775 (N, S, Si, Sa)

Zonitis (Zonitis) immaculata (Olivier, 1789) (N, S, Si, Sa)

Zonitis (Zonitis) nana Ragusa, 1882 (N, S, Si)

Euzonitis Semenow, 1893

Euzonitis fulvipennis (Fabricius, 1792) (S?) (*)

Euzonitis quadrimaculata (Pallas, 1782) (N, S, Si, Sa)

Euzonitis sexmaculata (Olivier, 1789) (N, S, Si)

Euzonitis terminata (Abeille de Perrin, 1880) (N, S, Si)

Leptopalpus Guérin de Méneville, 1844

Leptopalpus rostratus (Fabricius, 1792) (Si, Sa?)

Nemognatha (Nemognatha) Illiger, 1807

Nemognatha (Nemognatha) chrysomelina (Fabricius, 1775) (Si, Sa?)

Note

Trichomeloe sericellus: La presenza di questa specie E-mediterranea, basata su antichi reperti è meritevole di conferma.

Cerocoma (Cerocoma) schaefferi: Presenza in N solo in Alto Adige.

Epicauta (Epicauta) flabellicornis: Presenza limitata solo in ristrette aree della Venezia Giulia.

Hycleus: Specie di norma citate come *Mylabris* Fabricius.

Hycleus polymorphus: Presenza in Liguria occidentale meritevole di conferma.

Mylabris (Mylabris) variabilis: Presenza in Sa dovuta ad introduzione nel 1947 per lotta biologica alle cavallette.

Mylabris (Micrabris) connata: Presenza in N limitata all'alta Val Susa.

Actenodia: Di norma segnalate come *Coryna* Billberg.

Actenodia billbergi: Presenza in Liguria occidentale meritevole di conferma.

Meloe (Eurymeloe) scabriusculus: Presenza in N meritevole di conferma.

Meloe (Meloegonius) rufiventris: Presenza in N meritevole di conferma.

Meloe (Taphromeloe) erythrocnemus: Presenza in N limitata all'Emilia Romagna.

Meloe (Taphromeloe) foveolatus: La presenza in S di questa specie W-mediterranea è limitata ad un reperto della Puglia meritevole di conferma.

Meloe (Micromeloe) uralensis: Presenza in N limitata ad un antico reperto in Alto Adige.

Euzonitis fulvipennis: Presenza in S basata su un antico reperto della Calabria jonica.

Melolonthidae

Serica (Serica) Macleay, 1819

Serica (Serica) brunnea (Linné, 1758) (N, S)

Maladera (Maladera) Mulsant & Rey, 1871

Maladera (Maladera) holosericea (Scopoli, 1772) (N, S)

Homaloplia (Homaloplia) Stephens, 1830

Homaloplia (Homaloplia) alternata Küster, 1849

Homaloplia (Homaloplia) alternata occidentalis Baraud, 1965 (N)

Homaloplia (Homaloplia) nicolasi Baraud, 1965

Homaloplia (Homaloplia) nicolasi nicolasi Baraud, 1965 (N, S, Sa?)

Homaloplia (Homaloplia) nicolasi tergestina Baraud, 1965 (N)

Triodonta Mulsant, 1842

Triodonta alni Blanchard, 1850 (Sa) (E)

Triodonta bucculenta Baraud, 1962 (N)

Triodonta nitidula (Rossi, 1790) (N, S, Sa) (E)

Triodonta raymondi Perris, 1869 (Sa) (E)

Triodonta sardoa Baraud, 1962 (Sa) (E)

Paratriodonta Baraud, 1962

Paratriodonta cinctipennis (Lucas, 1849) (Si)
Paratriodonta romana (Brenske, 1890) (S) (E)

Hymenoplia Eschscholtz, 1830

Hymenoplia sicula Blanchard, 1850 (S, Si) (E)

Hoplia Illiger, 1803

Hoplia argentea (Poda, 1761) (N, S)
Hoplia attilioi Massa, 1979 (Si) (E)
Hoplia brunnipes Bonelli, 1807 (N, S)
Hoplia dubia (Rossi, 1790) (S, Si) (E)
Hoplia farinosa (Linné, 1761) (N)
Hoplia fiorii Fracassi, 1906 (N) (E)
Hoplia flavipes Germar, 1824 (N)
Hoplia graminicola (Fabricius, 1792) (N)
Hoplia minuta Panzer, 1889 (N, S, Si) (E)
Hoplia paganettii G. Müller, 1907 (S, Si) (E)
Hoplia praticola Duftschmid, 1805 (N)
Hoplia pubicollis Küster, 1849 (Sa)
Hoplia walterrossii Sabatinelli, in Baraud, 1992 (S) (E)

Haplidia Hope, 1837

Haplidia attenuata Reiche, 1862 (Sa) (E) (*)
Haplidia etrusca Kraatz, 1882 (N, S) (E)
Haplidia hirticollis Burmeister, 1855 (S, Si, Sa) (E)
Haplidia massai Baraud, 1975 (Si) (E)
Haplidia transversa (Fabricius, 1801)
Haplidia transversa transversa (Fabricius, 1801) (N, S, Si, Sa)
Haplidia villigera Burmeister, 1885 (Si) (E)

Miltotrogus Reitter, 1902

Miltotrogus fraxinicola (Sturm & Hagenbach, 1825) (N, S)
Miltotrogus vernus (Germar, 1823) (N, S)

Rhizotrogus Berthold, 1827

Rhizotrogus aestivus (Olivier, 1789) (N, S)
Rhizotrogus baudii Brenske, 1882 (S) (E)
Rhizotrogus bellieri Reiche, 1862 (Sa)
Rhizotrogus cicatricosus Mulsant, 1842 (N, Sa)
Rhizotrogus ciliatus Reiche, 1862 (E)
Rhizotrogus ciliatus ciliatus Reiche, 1862 (Si)
Rhizotrogus ciliatus vexillis Reitter, 1901 (N, S)
Rhizotrogus fossulatus Mulsant, 1869 (Sa)

Rhizotrogus genei Blanchard, 1850 (Sa)
Rhizotrogus grassii Mainardi, 1902 (S) (E)
Rhizotrogus insubricus Burmeister, 1855 (N, S, Si)
Rhizotrogus maculicollis Villa, 1833 (N, S, Sa)
Rhizotrogus marginipes Mulsant, 1842 (N)
Rhizotrogus pallidipennis Blanchard, 1850 (Si)
Rhizotrogus praecox Leoni, 1906 (S) (E)
Rhizotrogus procerus Baudi, 1870 (N, S) (E)
Rhizotrogus romanoi Sabatinelli, 1975 (Si) (E)
Rhizotrogus rugifrons Burmeister, 1855 (Sa)
Rhizotrogus sassariensis Perris, 1870 (S, Sa)
Rhizotrogus siculus Baraud, 1970 (Si) (E)
Rhizotrogus tarsalis Reiche, 1862 (Si) (E)
Rhizotrogus vicinus Mulsant, 1842 (N, S, Si)

Pseudoapterogyna Escalera, 1914

Pseudoapterogyna euphytus (Buquet, 1840) (Si)
Pseudoapterogyna vorax (Marseul, 1878) (Si)

Geotrogus Guérin, 1842

Geotrogus sicelis Blanchard, 1850 (Si) (E)

Amphimallon (Amadotrogus) Reitter, 1902

Amphimallon (Amadotrogus) quercanum Burmeister, 1855 (N, S) (E)

Amphimallon (Amphimallon) Le Peletier & Serville, 1825

Amphimallon (Amphimallon) assimile (Herbst, 1790) (N, S, Si)
Amphimallon (Amphimallon) atrum (Herbst, 1790) (N)
Amphimallon (Amphimallon) burmeisteri Brenske, 1886 (N)
Amphimallon (Amphimallon) fuscum (Scopoli, 1786) (N, S, Si)
Amphimallon (Amphimallon) gianfranceschii Luigioni, 1931 (S) (E)
Amphimallon (Amphimallon) majale (Razoumowsky, 1789) (N)
Amphimallon (Amphimallon) montanum zur Strassen, 1954 (Sa) (E)
Amphimallon (Amphimallon) ochraceum (Knoch, 1801) (N)
Amphimallon (Amphimallon) pini (Olivier, 1789) (N)
Amphimallon (Amphimallon) pseudomajale Sabatinelli, 1977 (S, Si) (E)
Amphimallon (Amphimallon) solstitiale (Linné, 1758)
 Amphimallon (Amphimallon) solstitiale solstitiale (Linné, 1758) (N, S, Sa)
 Amphimallon (Amphimallon) solstitiale javeti Stierlin, 1864 (Si) (E)
Amphimallon (Amphimallon) vitalei Luigioni, 1932 (Si) (E)

Melolontha Fabricius, 1775

Melolontha hippocastani (Fabricius, 1802) (N, S)

Melolontha melolontha (Linné, 1758) (N, S)
Melolontha pectoralis Megerle von Mühlfeld, 1812 (N, S)

Anoxia (*Anoxia*) Castelnau, 1832

Anoxia (Anoxia) pilosa (Fabricius, 1792) (N)
Anoxia (Anoxia) scutellaris Mulsant, 1842
 Anoxia (Anoxia) scutellaris scutellaris Mulsant, 1842 (N, S, Sa)
 Anoxia (Anoxia) scutellaris argentea Aliquò & Massa, 1976 (Si) (E)
 Anoxia (Anoxia) scutellaris sicula Motschulsky, 1861 (Si) (E)
Anoxia (Anoxia) villosa (Fabricius, 1781)
 Anoxia (Anoxia) villosa villosa (Fabricius, 1781) (N)

Anoxia (*Mesanoxia*) Medvedev, 1951

Anoxia (Mesanoxia) australis (Gyllenhal, 1817) (N)
Anoxia (Mesanoxia) matutinalis Castelnau, 1832
 Anoxia (Mesanoxia) matutinalis matutinalis Castelnau, 1832 (N, S, Si)
 Anoxia (Mesanoxia) matutinalis corsicana Sabatinelli, 1976 (Sa)
 Anoxia (Mesanoxia) matutinalis moltonii Sabatinelli, 1976 (Si) (E)
 Anoxia (Mesanoxia) matutinalis sardoa Motschulsky, 1861 (Sa) (E)

Anoxia (*Protanoxia*) Medvedev, 1951

Anoxia (Protanoxia) orientalis (Krynicky, 1832) (S, Si)

Polyphylla (*Polyphylla*) Harris, 1842

Polyphylla (Polyphylla) fullo (Linné, 1758) (N, S)
Polyphylla (Polyphylla) ragusae Kraatz, 1881 (E)
 Polyphylla (Polyphylla) ragusae ragusae Kraatz, 1881 (Si)
 Polyphylla (Polyphylla) ragusae aliquoi Massa & Tassi, in Baraud, 1977 (Si)

Elaphocera Gené, 1836

Elaphocera emarginata (Gyllenhal, 1817) (N, Sa) (E)
Elaphocera erichsoni Duval, 1860 (Sa) (E)

Pachydema Castelnau, 1832

Pachydema hirticollis (Fabricius, 1787) (Si)

Peritryssus Reitter, 1918

Peritryssus excisus Reitter, 1918 (Si) (E)

Note

Haplidia attenuata: Species inquirenda.

Melyridae

Brachemys Abeille de Perrin, 1890

Brachemys brevipennis (Castelnau, 1836) (N?, Sa)

Brachemys peragalloi (Perris, 1866) (N) (M) (*)

Troglops Erichson, 1840

Troglops albicans (Linnaeus, 1767) (N, S, Sa?)

Troglops brevis Erichson, 1840 (Sa) (*)

Troglops cephalotes (Olivier, 1790) (N, S)

Troglops italicus Wittmer, 1984 (S, Si) (E)

Troglops latifrons (Peyron, 1877) (Si?)

Troglops silo Erichson, 1840 (N, S, Si, Sa?)

Colotes Erichson, 1840

Colotes maculatus (Castelnau, 1836) (N, S, Si, Sa)

Colotes punctatus (Erichson, 1840) (S, Si, Sa)

Charopus Erichson, 1840

Charopus apicalis Kiesenwetter, 1859 (S, Si, Sa)

Charopus bonadonai Pardo, 1962 (N?)

Charopus concolor (Fabricius, 1801) (N, S?)

Charopus docilis Kiesenwetter, 1851 (N, S, Sa)

Charopus flavipes (Paykull, 1798) (N, S?)

Charopus madidus Kiesenwetter, 1863 (N)

Charopus pallipes (Olivier, 1790) (N, S, Sa)

Charopus philoctetes Abeille de Perrin, 1885 (N) (*)

Charopus rotundatus Erichson, 1840 (Si, Sa)

Hypebaeus Kiesenwetter, 1863

Hypebaeus albifrons (Fabricius, 1775) (N) (*)

Hypebaeus flavicollis (Erichson, 1840) (N, S, Si, Sa)

Hypebaeus flavipes (Fabricius, 1787) (N, S)

Ebaeus Erichson, 1840

Ebaeus abietinus Abeille de Perrin, 1869 (N?)

Ebaeus appendiculatus Erichson, 1840 (N)

Ebaeus ater Kiesenwetter, 1863 (N, S)

Ebaeus battonii Pardo, 1962 (N, S)

Ebaeus coerulescens Erichson, 1840 (N)
Ebaeus collaris Erichson, 1840 (N?, Sa)
Ebaeus flavicornis Erichson, 1840 (N, S) (*)
Ebaeus gibbus (Drapiez, 1819) (N, S, Si)
Ebaeus humilis Erichson, 1840 (Sa)
Ebaeus mediterraneus Abeille de Perrin, 1882 (Si)
Ebaeus nigrocaudatus Abeille de Perrin, 1885 (S?) (*)
Ebaeus nigrocoeruleus Gorham, 1898 (N?)
Ebaeus pedicularis (Fabricius, 1777) (N)
Ebaeus ruffoi Pardo, 1962 (Si) (E)
Ebaeus thoracicus (Fourcroy, 1785) (N?)

***Sphinginus* Mulsant & Rey, 1867**

Sphinginus coarctatus (Erichson, 1840) (N, S, Si)
Sphinginus constrictus (Erichson, 1840) (Sa)
Sphinginus lobatus (Olivier, 1790) (N, S, Sa)

***Attalus (Abrinus)* Mulsant & Rey, 1867**

Attalus (Abrinus) amictus (Erichson, 1840) (N, S)
Attalus (Abrinus) analis (Panzer, 1796) (N, S)
Attalus (Abrinus) parietariae (Erichson, 1840) (S, Si)
Attalus (Abrinus) ragusae (Schaufuss, 1870) (Si) (E)

***Attalus (Attalus)* Erichson, 1840**

Attalus (Attalus) aetnensis Abeille de Perrin, 1891 (Si)
Attalus (Attalus) alpinus (Giraud, 1851) (N)
Attalus (Attalus) cyaneus (Fabricius, 1792) (Si, Sa)
Attalus (Attalus) dalmatinus Erichson, 1840 (Si?)
Attalus (Attalus) lusitanicus Erichson, 1840 (Sa?)
Attalus (Attalus) melitensis Peyron, 1877 (Si?)
Attalus (Attalus) nourricheli (Castelnau, 1836) (E)
Attalus (Attalus) nourricheli nourricheli (Castelnau, 1836) (N, S, Si)
Attalus (Attalus) nourricheli palliatus Baudi, 1871 (Sa)
Attalus (Attalus) postremus Abeille de Perrin, 1882 (Si) (E)
Attalus (Attalus) semitogatus (Fairmaire, 1863) (Si?)
Attalus (Attalus) sicanus Erichson, 1840 (Si, Sa?)
Attalus (Attalus) tristis (Lucas, 1849) (Si?)
Attalus (Attalus) vidualis Pardo, 1968 (Si) (E)

***Attalus (Antholinus)* Mulsant & Rey, 1867**

Attalus (Antholinus) elzeari Uhagon, 1901 (Sa)
Attalus (Antholinus) jocosus (Erichson, 1840) (S?)
Attalus (Antholinus) labilis (Erichson, 1840) (Sa) (*)
Attalus (Antholinus) minimus (Rossi, 1790) (N, S, Si, Sa)

Attalus (Antholinus) sericans (Erichson, 1840) (Sa) (*)

Attalus (Antholinus) variitarsis (Kraatz, 1862) (Si)

Attalus (Nepachys) Thomson, 1859

Attalus (Nepachys) cardiaca (Linnaeus, 1761) (*)

Attalus (Nepachys) cardiaca cardiaca (Linnaeus, 1761) (N)

Attalus (Nepachys) cardiaca punctipennis Doderer, 1927 (N)

Axinotarsus Motschulsky, 1853

Axinotarsus brevicornis (Kraatz, 1862) (Sa?)

Axinotarsus dodereri Escalera, 1926 (Sa)

Axinotarsus insularis Abeille de Perrin, 1881 (S?, Si, Sa)

Axinotarsus italicus Escalera, 1926 (N, S)

Axinotarsus longicornis (Kiesenwetter, 1859)

Axinotarsus longicornis longicornis (Kiesenwetter, 1859) (Si, Sa)

Axinotarsus longicornis rufithorax (Kiesenwetter, 1859) (S, Si)

Axinotarsus marginalis (Castelnau, 1840) (N, S, Si)

Axinotarsus pulicarius (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa)

Axinotarsus ruficollis (Olivier, 1790) (N, S, Si, Sa)

Axinotarsus siciliensis Escalera, 1926 (Si)

Malachius (Malachius) Fabricius, 1775

Malachius (Malachius) aeneus (Linnaeus, 1758) (N, S)

Malachius (Malachius) affinis Ménétrières, 1832 (N, S)

Malachius (Malachius) ambiguus Peyron, 1877 (S)

Malachius (Malachius) arnaldi Pardo, 1966 (N)

Malachius (Malachius) australis Mulsant & Rey, 1867 (N, S, Si)

Malachius (Malachius) barnevillei Puton, 1865 (N)

Malachius (Malachius) bellieri Peyron, 1877 (Si)

Malachius (Malachius) bipustulatus (Linnaeus, 1758) (N, S)

Malachius (Malachius) calabrus Baudi, 1873 (S) (E)

Malachius (Malachius) dentifrons Erichson, 1840 (N?)

Malachius (Malachius) dilaticornis Germar, 1824 (N?)

Malachius (Malachius) elegans Olivier, 1790

Malachius (Malachius) elegans elegans Olivier, 1790 (N, S, Si)

Malachius (Malachius) elegans emarginatus Krauss, 1902 (N)

Malachius (Malachius) falcifer Abeille de Perrin, 1882 (S)

Malachius (Malachius) geniculatus Germar, 1824 (N, S)

Malachius (Malachius) graecus Kraatz, 1862 (N?)

Malachius (Malachius) italicus Pardo, 1967 (N, S) (E)

Malachius (Malachius) lusitanicus Erichson, 1840 (Si?)

Malachius (Malachius) marginellus Olivier, 1790 (N, S)

Malachius (Malachius) parilis Erichson, 1840 (Si, Sa)

Malachius (Malachius) rubidus Erichson, 1840 (S?)

Malachius (Malachius) sardous Erichson, 1840 (Sa) (*)

Malachius (Malachius) spinipennis Germar, 1824 (N, S, Si)
Malachius (Malachius) spinosus Erichson, 1840 (S, Si)
Malachius (Malachius) strangulatus (Abeille de Perrin, 1885) (S?)
Malachius (Malachius) viridis Fabricius, 1787 (N, S, Si)

Malachius (Micrinus) Abeille de Perrin, 1891

Malachius (Micrinus) heteromorphus Abeille de Perrin, 1869 (N)
Malachius (Micrinus) inornatus Küster, 1846 (N)

Cyrtosus (Oogynes) Mulsant & Rey, 1867

Cyrtosus (Oogynes) dispar (Fairmaire, 1859) (*)
Cyrtosus (Oogynes) dispar dispar (Fairmaire, 1859) (Sa)
Cyrtosus (Oogynes) dispar variicollis Abeille de Perrin, 1891 (S)
Cyrtosus (Oogynes) longicollis (Erichson, 1840) (Sa) (*)
Cyrtosus (Oogynes) ovalis (Castelnau, 1836) (N, S, Si, Sa)

Cyrtosus (Cyrtosus) Motschulsky, 1853

Cyrtosus (Cyrtosus) abeillei Doderò, 1922 (Sa) (E)
Cyrtosus (Cyrtosus) cyanipennis (Erichson, 1840) (N, S)

Cerapheles Mulsant & Rey, 1867

Cerapheles terminatus (Ménétrières, 1832) (N?)

Anthocomus (Celidus) Mulsant & Rey, 1867

Anthocomus (Celidus) coccineus (Schaller, 1783) (N, S)

Anthocomus (Paremballus) Mulsant & Rey, 1867

Anthocomus (Paremballus) fasciatus (Linnaeus, 1758) (N, S)

Anthocomus (Neotrotus) Abeille de Perrin, 1891

Anthocomus (Neotrotus) bipunctatus (Harrer, 1784) (N)

Apalochrus Erichson, 1840

Apalochrus flavolimbatus Mulsant & Rey, 1853 (N, S)

Danacea (Danacea) Castelnau, 1836

Danacea (Danacea) ambigua Mulsant & Rey, 1868 (N, S)
Danacea (Danacea) aurichalcea (Küster, 1850) (S)
Danacea (Danacea) bucciarellii Liberti, 1979 (Si) (E)

Danacea (Danacea) concii Liberti, 1984 (S) (E)
Danacea (Danacea) cusanensis (A. Costa, 1847) (S) (E)
Danacea (Danacea) dauci Liberti, 1984 (S) (E) (*)
Danacea (Danacea) delphini Liberti, 1984 (N) (E, M) (*)
Danacea (Danacea) denticollis Baudi, 1861 (N)
Danacea (Danacea) distincta (Lucas, 1847) (Si) (*)
Danacea (Danacea) imperialis (Gené, 1836) (Sa) (E)
Danacea (Danacea) leonardii Liberti, 1979 (S) (*)
Danacea (Danacea) ligurica Liberti, 1984 (N) (E) (*)
Danacea (Danacea) lucana Liberti, 1989 (S) (E)
Danacea (Danacea) luigionii Pic, 1920 (S) (E)
Danacea (Danacea) marginata (Küster, 1851) (N) (*)
Danacea (Danacea) mitis (Küster, 1850) (Sa) (E)
Danacea (Danacea) montivaga Mulsant & Rey, 1868 (N) (*)
Danacea (Danacea) morosa Kiesenwetter, 1863 (N) (*)
Danacea (Danacea) nigripalpis Fiori, 1912 (Si)
Danacea (Danacea) nigratarsis (Küster, 1850) (*)
 Danacea (Danacea) nigratarsis alpina Pic, 1895 (N, S)
 Danacea (Danacea) nigratarsis brunneipes Pic, 1927 (S) (E)
 Danacea (Danacea) nigratarsis ingauna Liberti, 1984 (N)
Danacea (Danacea) pallidipalpis Abeille de Perrin, 1894 (N)
Danacea (Danacea) pallipes (Panzer, 1793) (N, S)
Danacea (Danacea) sardoa Kiesenwetter, 1871 (*)
 Danacea (Danacea) sardoa sardoa Kiesenwetter, 1871 (Sa)
 Danacea (Danacea) sardoa declivis Liberti, 1989 (Sa)
 Danacea (Danacea) sardoa mancinii Pic, 1927 (S)
Danacea (Danacea) scyllea Liberti, 1981 (S) (E) (*)
Danacea (Danacea) sicala Pic, 1895 (Si) (E)
Danacea (Danacea) temporalis Schilsky, 1897 (Si) (E) (*)
Danacea (Danacea) trinacriae Liberti, 1979 (Si) (E)

***Danacea (Allodanacaea)* Liberti, 1985**

Danacea (Allodanacaea) caneparii Liberti, 1985 (Si) (E) (*)
Danacea (Allodanacaea) caprariae Liberti, 1985 (S) (E) (*)
Danacea (Allodanacaea) elongatipennis Pic, 1985 (Si) (E)
Danacea (Allodanacaea) ilicis Liberti, 1985 (S) (E) (*)
Danacea (Allodanacaea) jonica Liberti, 1985 (S) (E) (*)
Danacea (Allodanacaea) milleri Schilsky, 1897 (Sa) (*)
Danacea (Allodanacaea) nympa Liberti, 1985 (Sa) (E) (*)
Danacea (Allodanacaea) oreas Liberti, 1985 (Sa) (E)
Danacea (Allodanacaea) picicornis (Küster, 1850)
 Danacea (Allodanacaea) picicornis picicornis (Küster, 1850) (Sa)
 Danacea (Allodanacaea) picicornis supramontana Liberti, 1985 (Sa) (E)
Danacea (Allodanacaea) poggii Liberti, 1985 (S) (E) (*)
Danacea (Allodanacaea) romana Pic, 1902 (S) (E) (*)
Danacea (Allodanacaea) sicana Liberti, 1985 (Si) (E)
Danacea (Allodanacaea) sulcitana Liberti, 1985 (Sa) (E)

Danacea (Allodanacaea) wittmeri Liberti, 1985 (S) (E) (*)

Enicopus Stephens, 1830

Enicopus falculifer Fairmaire, 1859 (N, S, Si) (*)

Enicopus hirtus (Linnaeus, 1767) (S) (*)

Enicopus hirtus truncatus Fairmaire, 1859 (N)

Enicopus scutellaris (Fabricius, 1792) (Si?)

Dasytidius Schilsky, 1896

Dasytidius medius (Rottenberg, 1870) (Si)

Dasytidius melitensis (Bourgeois, 1885) (Si)

Dasytidius ragusai (Prochazka, 1895) (Si) (*)

Divales Castelnau, 1836

Divales bipustulatus (Fabricius, 1781) (N, S, Si)

Divales cinctus (Gené, 1839) (Sa) (*)

Divales communimacula (A. Costa, 1847) (N, S, Si) (E) (*)

Divales haemorrhoidalis (Fabricius, 1798) (Si?)

Divales quadrimaculatus (Olivier, 1790) (N) (*)

Divales uhligi Majer, 1984 (S) (E) (*)

Dasytes Paykull, 1799

Dasytes aeniventris Küster, 1850 (N, S, Si, Sa)

Dasytes aeratus Stephens, 1830 (N, S)

Dasytes alpigradus Kiesenwetter, 1863 (N) (*)

Dasytes apenninus Schilsky, 1896 (N, S) (*)

Dasytes bupthalmus Baudi, 1873 (N?)

Dasytes caeruleus (De Geer, 1774) (N, S)

Dasytes calabrus A. Costa, 1847 (S)

Dasytes coerulescens Küster, 1852 (Sa) (*)

Dasytes dalmatinus Baudi, 1873 (S)

Dasytes doderoi Pic, 1924 (Sa) (E) (*)

Dasytes erratus Schilsky, 1895 (N, S)

Dasytes flavescens Gené, 1839 (N?, S, Si, Sa)

Dasytes flavipes (Olivier, 1790) (N, S) (*)

Dasytes fuscus (Illiger, 1801) (N)

Dasytes iteratus Peyerimhoff, 1925 (Sa) (*)

Dasytes lombardus Fiori, 1909 (N) (*)

Dasytes lucanus Wittmer, 1935 (S) (E) (*)

Dasytes metallicus (Fabricius, 1792) (Si) (E)

Dasytes niger (Linnaeus, 1761) (N)

Dasytes nigroaeneus Küster, 1850 (S, Si, Sa)

Dasytes obscurus Gyllenhal, 1813 (N)

Dasytes pauperculus Castelnau, 1840 (N, S)

Dasytes plumbeus (O.F Müller, 1776) (N, S, Si)
Dasytes productus Schilsky, 1894 (Si) (E)
Dasytes subaeneus Schönherr, 1817
 Dasytes subaeneus provincialis Abeille de Perrin, 1907 (N, S)
 Dasytes subaeneus subaeneus Schönherr, 1817 (N)
Dasytes subalpinus Baudi, 1873 (N)
Dasytes tardus Schaufuss, 1872 (N, S) (*)
Dasytes thoracicus Mulsant & Rey, 1868 (N) (*)
Dasytes tristiculus Mulsant & Rey, 1868 (N, S)

Dolichosoma Stephens, 1830

Dolichosoma filum Fairmaire, 1860 (Sa)
Dolichosoma lineare (Rossi, 1792) (N, S)
Dolichosoma simile (Brullé, 1832) (S, Si, Sa)

Psilothrix Redtenbacher, 1858

Psilothrix aureola Kiesenwetter, 1859 (S, Si, Sa)
Psilothrix femoralis Morawitz, 1861 (N)
Psilothrix protensa (Gené, 1836) (Si, Sa)
Psilothrix viridicoerulea (Geoffroy, 1785) (N, S, Si, Sa)

Aplocnemus (Diplambe) Schilsky, 1894

Aplocnemus (Diplambe) abietum (Kiesenwetter, 1859) (Sa) (*)
Aplocnemus (Diplambe) crenicollis (Kiesenwetter, 1863) (Si)
Aplocnemus (Diplambe) duplicatus (Kiesenwetter, 1871) (Sa) (E)

Aplocnemus (Aplocnemus) Stephens, 1830

Aplocnemus (Aplocnemus) acutangulus (Schilsky, 1897) (Si)
Aplocnemus (Aplocnemus) alpestris (Kiesenwetter, 1861) (N)
Aplocnemus (Aplocnemus) angelinii Liberti, 1994 (S)
Aplocnemus (Aplocnemus) chalconatus (Germar, 1817) (N, S)
Aplocnemus (Aplocnemus) corcyricus (Miller, 1866) (S)
Aplocnemus (Aplocnemus) cribricollis (Mulsant & Rey, 1868) (S, Sa) (*)
Aplocnemus (Aplocnemus) difficilis (Holdhaus, 1923) (S) (E) (*)
Aplocnemus (Aplocnemus) impressus Marsham, 1802 (N)
Aplocnemus (Aplocnemus) integer (Baudi, 1873) (N, S)
Aplocnemus (Aplocnemus) jejunos (Kiesenwetter, 1863) (N, S, Sa)
Aplocnemus (Aplocnemus) koziorowiczi (Desbrochers, 1870) (S) (E) (*)
Aplocnemus (Aplocnemus) marginatus (Rottenberg, 1870) (Si) (E)
Aplocnemus (Aplocnemus) nigricornis (Fabricius, 1792) (*)
 Aplocnemus (Aplocnemus) nigricornis garganicus Liberti, 1994 (S) (E)
 Aplocnemus (Aplocnemus) nigricornis nigricornis (Fabricius, 1792) (N, S)
Aplocnemus (Aplocnemus) panalpinus Liberti, 1994 (N)
Aplocnemus (Aplocnemus) pectinatus (Küster, 1849) (S, Si, Sa)

Aplocnemus (Aplocnemus) pulverulentus (Küster, 1849) (N?) (*)
Aplocnemus (Aplocnemus) rufomarginatus (Perris, 1869) (Sa)
Aplocnemus (Aplocnemus) tarsalis (Sahlberg, 1822) (N)
Aplocnemus (Aplocnemus) trinacriensis (Ragusa, 1872) (Si)
Aplocnemus (Aplocnemus) virens (Suffrian, 1843) (N) (*)

***Trichoceble* Thomson, 1864**

Trichoceble floralis (Olivier, 1790) (N)
Trichoceble memnonia (Kiesenwetter, 1861) (N, S)

***Falsomelyris* Pic, 1913**

Falsomelyris granulata (Fabricius, 1792) (Sa?)

***Melyris (Zygia)* Fabricius, 1775**

Melyris (Zygia) bicolor Fabricius, 1801 (Si?)
Melyris (Zygia) oblonga Fabricius, 1775 (S, Si)
Melyris (Zygia) versicolor Chevrolat, 1829 (Sa?)

Note

Brachemys peragalloi: Endemica del litorale marino fra Sanremo e Montpellier.
Troglops brevis: Specie nordafricana, presente in Sardegna.
Charopus philoctetes: Presente in N in Trentino Alto Adige (provincia di Trento).
Hypebaeus albifrons: Indicato di Piemonte.
Ebaeus flavicornis: Specie di dubbia validità.
Ebaeus nigrocaudatus: Specie di inattendibile località tipica: italiana o siberiana (!).
Attalus (Antholinus) labilis: Endemica di Corsica e Sardegna.
Attalus (Antholinus) sericans: Endemica di Corsica e Sardegna.
Attalus (Nepachys) cardiacae: La ssp. punctipennis nota di Val d'Aosta.
Malachius (Malachius) sardous: Endemica di Corsica e Sardegna.
Cyrtosus (Oogynes) dispar: Endemica di Corsica e Sardegna. La ssp. variicollis solo nell'Arcipelago Toscano.
Cyrtosus (Oogynes) longicollis: Endemica di Corsica e Sardegna.
Danacea (Danacea) dauci: Presente solo in Toscana: Argentario, Isole Giannutri e Giglio.
Danacea (Danacea) delphini: Solo sul Monte di Portofino.
Danacea (Danacea) distincta: Presente in Si solo a Pantelleria .
Danacea (Danacea) leonardii: Presente solo nell'Arcipelago Toscano.
Danacea (Danacea) ligurica: Presente solo in Liguria orientale.
Danacea (Danacea) marginata: Presente in N solo nella zona di Trieste.
Danacea (Danacea) montivaga: Presente in N solo al confine occidentale.
Danacea (Danacea) morosa: Presente in N solo al confine austriaco.
Danacea (Danacea) nigritarsis: La forma tipica assente dall'Italia. La ssp. ingauna solo in Liguria occidentale.
Danacea (Danacea) sardoa: La ssp. declivis presente solo in Sardegna sud-occidentale. La ssp. mancinii in Arcipelago Toscano e Corsica.

Danacea (Danacea) scyllea: Solo Calabria e Basilicata.
Danacea (Danacea) temporalis: Localizzata sulle Madonie.
Danacea (Allodanacaea) caneparii: Solo a Pantelleria.
Danacea (Allodanacaea) caprariae: Solo nelle isole Capraia e Gorgona.
Danacea (Allodanacaea) ilicis: Solo all'Isola del Giglio e nella regione litoranea laziale.
Danacea (Allodanacaea) jonica: Solo nella zona dell' Aspromonte.
Danacea (Allodanacaea) milleri: Endemica di Corsica e Sardegna.
Danacea (Allodanacaea) nympa: Solo in Sardegna nord-occidentale.
Danacea (Allodanacaea) poggii: Solo all'Isola di Montecristo.
Danacea (Allodanacaea) romana: Regione tirrenica toско-laziale (Isola d'Elba inclusa).
Danacea (Allodanacaea) wittmeri: Isole di Capri e d'Ischia.
Enicopus falculifer: Il nome falculifer viene qui provvisoriamente conservato a fine di stabilità della nomenclatura.
Enicopus hirtus: La ssp. truncatus presente in N in Liguria occidentale.
Dasytidius ragusai: Presente in Si a Lampedusa.
Divales cinctus: Endemica di Corsica e di Sardegna.
Divales communimacula: Considerata qui buona specie (non syn. di cinctus).
Divales quadrimaculatus: Presente in N in Liguria occidentale.
Divales uhligi: Il nome qui utilizzato potrebbe non essere prioritario.
Dasytes alpigradus: Presente sulle Alpi centrali e orientali.
Dasytes apenninus: Probabile sinonimo di erratus.
Dasytes coerulescens: Endemica di Corsica e Sardegna.
Dasytes doderoi: Nota solo del Gennargentu.
Dasytes flavipes: Questo nome potrebbe risultare non utilizzabile perchè omonimo secondario.
Dasytes iteratus: Specie presente in Nord Africa (Algeria) e Sardegna.
Dasytes lombardus: Endemica delle prealpi lombarde.
Dasytes lucanus: Nota di Basilicata (Pollino).
Dasytes tardus: In N solo nella zona di Trieste. Specie transionica.
Dasytes thoracicus: In N solo presso il confine occidentale.
Aplocnemus (Diplambe) abietum: Attribuzione del nome dubbia.
Aplocnemus (Aplocnemus) cribricollis: Specie tirrenica: Corsica, Sardegna, zona costiera dalla Toscana alla Campania.
Aplocnemus (Aplocnemus) difficilis: Specie tirrenica: Arcipelago Toscano, Argentario.
Aplocnemus (Aplocnemus) koziorowiczi: Specie tirrenica: Arcipelago Toscano, Corsica.
Aplocnemus (Aplocnemus) nigricornis: La ssp. garganicus nota solo di Puglia (Gargano).
Aplocnemus (Aplocnemus) pulverulentus: Possibile presenza in N al confine orientale.
Aplocnemus (Aplocnemus) virens: In N solo nel settore occidentale.

Merophysiidae

Holopamecus Curtis, 1833

Holopamecus atomus Ragusa, 1888 (Si) (E)
Holopamecus beloni Reitter, 1884 (S)
Holopamecus bertouti Aubé, 1861 (Si, Sa)
Holopamecus caularum (Aubé, 1843) (N, S, Si, Sa)

Holopamecus depressus Curtis, 1833 (N, S, Si)
Holopamecus niger (Aubé, 1843) (S, Si, Sa)
Holopamecus punctatulus Reitter, 1908 (S) (E)
Holopamecus ragusae Reitter, 1875 (N, Si, Sa)
Holopamecus singularis (Beck, 1817) (N, S, Si, Sa)

***Cholovocera* Motschulsky, 1838**

Cholovocera attae (Kraatz, 1858) (S, Sa)
Cholovocera fleischeri (Reitter, 1902) (S)
Cholovocera formicaria Motschulsky, 1838 (N, S, Si, Sa)
Cholovocera punctata Märkel, 1844 (N, S, Si)
Cholovocera sardoa (Reitter, 1911) (Sa) (E)

***Merophysia* Lucas, 1852**

Merophysia formicaria Lucas, 1852 (N?, S, Si, Sa)
Merophysia oblonga Kiesenwetter, 1872 (S, Si)
Merophysia sekerae Reitter, 1908 (N) (E)
Merophysia sicala Kiesenwetter, 1872 (S, Si, Sa)
Merophysia striatella Reitter, 1890 (S)

Micropeplidae

***Micropeplus* Latreille, 1809**

Micropeplus calabricus Reitter, 1907 (N?, S, Si)
Micropeplus fulvus Erichson, 1840 (N, S, Si, Sa)
Micropeplus latus Hampe, 1861 (S)
Micropeplus longipennis Kraatz, 1859 (N, S)
Micropeplus marietti Jacquelin du Val, 1857 (N, S)
Micropeplus porcatus (Paykull, 1789)
 Micropeplus porcatus insularis Koch, 1937 (Sa) (E)
 Micropeplus porcatus porcatus (Paykull, 1789) (N, S)
Micropeplus staphylinoides (Marsham, 1802) (N, S, Si, Sa)
Micropeplus tesserula Curtis, 1828 (N, S)

Microsporidae

***Microsporus* Kolenati, 1846**

Microsporus acaroides (Waltl, 1838) (N, S, Si?)
Microsporus hispanicus (Matthews, 1899) (N?, Si?) (*)
Microsporus spississimus (Lesne, 1935) (Sa)

Note

Microsporus hispanicus: Presenza dubbia in Liguria occidentale e Sicilia; presenza in Sa da riferire a 001.0.003.

Mordellidae

Stenalia Mulsant, 1856

Stenalia bisecta Baudi, 1883 (S, Si)
Stenalia brunneipennis Mulsant, 1856 (*)
Stenalia brunneipennis unistrigosa Chobaut, 1924 (N)
Stenalia testacea (Fabricius, 1787) (N, S, Si, Sa)

Tomoxia A. Costa, 1854

Tomoxia bucephala A. Costa, 1854 (N, S, Si)

Mordella Linnaeus, 1758

Mordella aculeata Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)
Mordella brachyura Mulsant, 1856 (N, S)
Mordella holomelaena Apfelbeck, 1914 (N)
Mordella horvathi Apfelbeck, 1914 (S, Si)
Mordella leucaspis Küster, 1849 (N, S)
Mordella meridionalis Méquignon, 1946 (N, S)
Mordella palmai Emery, 1876 (Si) (E)
Mordella purpurascens Apfelbeck, 1914 (S)
Mordella velutina Emery, 1876 (N, S, Si)
Mordella viridescens A. Costa, 1854 (N, S, Si, Sa)

***Variimorda* (*Variimorda*)** Méquignon, 1946

Variimorda (*Variimorda*) *argyropleura* (Franciscolo, 1942) (S) (E)
Variimorda (*Variimorda*) *basalis* (A. Costa, 1854) (N, S)
Variimorda (*Variimorda*) *briantea* (Comolli, 1837) (N)
Variimorda (*Variimorda*) *fagniezi* Méquignon, 1946 (N)
Variimorda (*Variimorda*) *fasciata* (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa)
Variimorda (*Variimorda*) *mendax* (Méquignon, 1946) (N)
Variimorda (*Variimorda*) *quomoi* (Franciscolo, 1951) (S) (E) (*)
Variimorda (*Variimorda*) *ragusai* (Emery, 1876) (N, S, Si, Sa)
Variimorda (*Variimorda*) *villosa* (Schrank, 1781) (N?)

***Variimorda* (*Galeimorda*)** Horak, 1985

Variimorda (*Galeimorda*) *caprai* (Franciscolo, 1951) (S)

Hoshihananomia Kôno, 1935

Hoshihananomia gacognei (Mulsant, 1856) (N?) (*)
Hoshihananomia perlata (Sulzer, 1776) (N)

Mordellaria Ermisch, 1949

Mordellaria aurofasciata (Comolli, 1837) (N)

Curtimorda Méquignon, 1946

Curtimorda bisignata (Redtenbacher, 1849) (N)
Curtimorda maculosa (Naezen, 1794) (N)

Mediimorda Méquignon, 1946

Mediimorda bipunctata (Germar, 1827) (N, S, Si, Sa)

Mordellistenula Scegoleva-Barovskaja, 1930

Mordellistenula perrisi (Mulsant, 1857) (S, Si)
Mordellistenula planifrons Scegoleva-Barovskaja, 1930 (Si)

Mordellokoiles Franciscolo, 1942

Mordellokoiles grandii Franciscolo, 1942 (S) (E) (*)

Mordellistena (Pseudomordellina) Ermisch 1952

Mordellistena (Pseudomordellina) acuticollis Schilsky, 1895 (N)
Mordellistena (Pseudomordellina) csikii Ermisch, 1977 (N)
Mordellistena (Pseudomordellina) klapperichi Ermisch, 1956 (S)
Mordellistena (Pseudomordellina) minima A. Costa, 1854 (S)
Mordellistena (Pseudomordellina) pseudonana Ermisch, 1956 (N)

Mordellistena (Mordellistena) A. Costa, 1854

Mordellistena (Mordellistena) alpicola Ermisch, 1963 (N)
Mordellistena (Mordellistena) balianii Franciscolo, 1942 (N, S, Si) (E)
Mordellistena (Mordellistena) brevicauda (Bohemann, 1849) (N, S, Si)
Mordellistena (Mordellistena) caprai Franciscolo, 1942 (N, S) (E)
Mordellistena (Mordellistena) confinis A. Costa, 1854 (N, S, Si, Sa)
Mordellistena (Mordellistena) dieckmanni Ermisch, 1963 (N?)
Mordellistena (Mordellistena) dives Emery, 1876 (N, Si)
Mordellistena (Mordellistena) dvoraki Ermisch, 1956 (N)
Mordellistena (Mordellistena) emeryi Schilsky, 1895 (N, S, Si, Sa)
Mordellistena (Mordellistena) episternalis Mulsant, 1856 (N, S, Si, Sa)
Mordellistena (Mordellistena) fallaciosa Ermisch, 1969 (N)
Mordellistena (Mordellistena) falsoparvula Ermisch, 1956 (N)

Mordellistena (Mordellistena) humeralis (Linnaeus, 1758) (N, S)
Mordellistena (Mordellistena) inaequalis Mulsant, 1856 (N)
Mordellistena (Mordellistena) intersecta Emery, 1876 (Si)
Mordellistena (Mordellistena) irritans Franciscolo, 1991 (Si) (E) (*)
Mordellistena (Mordellistena) kraatzi Emery, 1876 (N)
Mordellistena (Mordellistena) majuscula Ermisch, 1977 (S)
Mordellistena (Mordellistena) manteroi Franciscolo, 1942 (N) (E)
Mordellistena (Mordellistena) micans (Germar, 1817) (N, S, Si, Sa)
Mordellistena (Mordellistena) micantoides Ermisch, 1954 (N, S)
Mordellistena (Mordellistena) michalki Ermisch, 1956 (N)
Mordellistena (Mordellistena) neuwaldeggiana (Panzer, 1796) (N, S, Si, Sa)
Mordellistena (Mordellistena) paraepisternalis Ermisch, 1965 (S)
Mordellistena (Mordellistena) parapentas Ermisch, 1977 (S)
Mordellistena (Mordellistena) parvula (Gyllenhal, 1827) (N, S)
Mordellistena (Mordellistena) parvuloides Ermisch, 1956 (N)
Mordellistena (Mordellistena) perroudi Mulsant, 1856 (Si)
Mordellistena (Mordellistena) pseudohirtipes Ermisch, 1965 (S)
Mordellistena (Mordellistena) pseudomicans Ermisch, 1977 (N)
Mordellistena (Mordellistena) pseudoreichei Ermisch, 1977 (S)
Mordellistena (Mordellistena) pumila (Gyllenhal, 1810) (N, S, Si, Sa)
Mordellistena (Mordellistena) purpurascens A. Costa, 1854 (S)
Mordellistena (Mordellistena) purpureonigrans Ermisch, 1963 (N)
Mordellistena (Mordellistena) pygmaeola Ermisch, 1956 (N)
Mordellistena (Mordellistena) reichei Emery, 1876 (N, S)
Mordellistena (Mordellistena) reitteri Schilsky, 1894 (N)
Mordellistena (Mordellistena) schatzmayri Franciscolo, 1949 (S)
Mordellistena (Mordellistena) solarii Franciscolo, 1942 (Sa) (E)
Mordellistena (Mordellistena) stenidea Mulsant, 1856 (N, S, Si)
Mordellistena (Mordellistena) subepisternalis Ermisch, 1965 (S)
Mordellistena (Mordellistena) tarsata Mulsant, 1856 (S, Sa)
Mordellistena (Mordellistena) umbra Franciscolo, 1949 (S) (E) (*)
Mordellistena (Mordellistena) variegata (Fabricius, 1798) (N, S, Sa)
Mordellistena (Mordellistena) weisei Schilsky, 1895 (N)

Mordellochroa Emery, 1876

Mordellochroa abdominalis (Fabricius, 1775) (N, S)
Mordellochroa tournieri Emery, 1876 (N)

Tolida Mulsant, 1856

Tolida artemisiae Mulsant & Rey, 1859 (N)
Tolida graeca Schilsky, 1895 (N)
Tolida pulchella Mulsant & Rey, 1859 (S, Si, Sa)
Tolida schusteri Schilsky, 1895 (N)

Note

Stenalia brunneipennis: Presente in N solo sul promontorio di Portofino.
Variimorda (Variimorda) quomoi: Presente in S solo all'Isola del Giglio.
Hoshihananomia gacognei: Dubbia presenza in Piemonte.
Mordellokoiles grandii: Presente in S solo nella Valle del Crati.
Mordellistena (Mordellistena) irritans: Presente in S solo a Lampedusa.
Mordellistena (Mordellistena) umbra: Presente in S solo a Pistrino (Perugia).

Mycetophagidae

Pseudotriphyllus Reitter, 1879

Pseudotriphyllus suturalis (Fabricius, 1801) (S, Si, Sa)

Triphyllus Dejean, 1821

Triphyllus bicolor (Fabricius, 1777) (N, S, Si, Sa)

Litargus Erichson, 1846

Litargus balteatus J. Leconte, 1856 (S)

Litargus coloratus Rosenhauer, 1856 (S, Si, Sa)

Litargus connexus (Geoffroy, 1785) (N, S, Si, Sa)

Mycetophagus Hellwig, 1792

Mycetophagus atomarius (Fabricius, 1787) (N, S)

Mycetophagus decempunctatus Fabricius, 1801 (N, S, Si)

Mycetophagus fulvicollis Fabricius, 1792 (N, S, Si, Sa)

Mycetophagus multipunctatus Fabricius, 1792 (N, S, Si, Sa)

Mycetophagus piceus (Fabricius, 1777) (N, S, Si)

Mycetophagus populi Fabricius, 1798 (N)

Mycetophagus quadriguttatus J.P.W. Müller, 1821 (N, S, Sa)

Mycetophagus quadripustulatus (Linnaeus, 1761) (N, S, Si, Sa)

Typhaea Stephens, 1829

Typhaea stercorea (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Typhaeola Ganglbauer, 1899

Typhaeola maculata (Perris, 1865) (N, S, Si, Sa)

Berginus Erichson, 1846

Berginus tamarisci Wollaston, 1854 (N, S, Si, Sa)

Esarcus Reiche, 1864

Esarcus abeille (Ancey, 1870) (N, Sa)

Esarcus baudii Seidlitz, 1889 (N)

Esarcus fiorii Reitter, 1887 (S, Si)

Mycteridae

***Mycterus* (*Mycterus*)** Clairville & Schellenberg, 1798

Mycterus (*Mycterus*) *curculioides* (Fabricius, 1781) (N, S)

***Mycterus* (*Eutryptes*)** Gistel, 1856

Mycterus (*Eutryptes*) *tibialis* Küster, 1850 (S, Si)

Mycterus (*Eutryptes*) *umbellatarum* (Fabricius, 1787) (N?, S, Si, Sa)

Nemonychidae

Nemonyx Redtenbacher, 1845

Nemonyx lepturoides (Fabricius, 1801) (N, S)

Cimberis Gozis, 1881

Cimberis attelaboides (Fabricius, 1787) (N, S)

Doydirhynchus Dejean, 1821

Doydirhynchus austriacus (Olivier, 1807) (N)

Nitidulidae

Nitidula Fabricius, 1775

Nitidula bipunctata (Linnaeus, 1758) (N)

Nitidula carnaria (Schaller, 1783) (N, S, Si, Sa)

Nitidula flavomaculata Rossi, 1790 (N, S, Si, Sa)

Nitidula rufipes (Linnaeus, 1767) (N, S)

Omosita Erichson, 1843

Omosita colon (Linnaeus, 1758) (N, S)

Omosita depressa (Linnaeus, 1758) (N)

Omosita discoidea (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa)

Soronia Erichson, 1843

Soronia grisea (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
Soronia oblonga C. Brisout de Barneville, 1863 (N, S, Si, Sa)
Soronia punctatissima (Illiger, 1794) (N, Si?) (*)

Amphotis Erichson, 1843

Amphotis marginata (Fabricius, 1781) (N, S)
Amphotis orientalis Reiche, 1861 (N) (*)

Ipidia Erichson, 1843

Ipidia binotata Reitter, 1875 (N, S, Si, Sa)
Ipidia sexguttata (R.F. Sahlberg, 1834) (N?) (*)

Ithyra Reitter, 1873

Ithyra hirsutula Reitter, 1873 (Si) (*)

Xenostrogylus Wollaston, 1854

Xenostrogylus arcuatus Kiesenwetter, 1859 (N, S, Si?)
Xenostrogylus deyrollei Jacquelin duVal, 1860 (Si?, Sa)
Xenostrogylus lateralis Chevrolat, 1861 (S, Si) (*)
Xenostrogylus truncatus Kiesenwetter, 1870 (Si?)

Cychramus Kugelann, 1794

Cychramus luteus (Fabricius, 1787) (N, S)
Cychramus variegatus (Herbst, 1792) (N)

Cyllodes Erichson, 1843

Cyllodes ater (Herbst, 1792) (N, S?)

Pocadius Erichson, 1843

Pocadius adustus Reitter, 1888 (N)
Pocadius ferrugineus (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa)

Thalycra Erichson, 1843

Thalycra fervida (Olivier, 1790) (N, S, Si, Sa)

Cryptarcha Shuckard, 1839

Cryptarcha strigata (Fabricius, 1787) (N, S, Si, Sa)

Cryptarcha undata (Olivier, 1790) (N, S, Si)

Glischrochilus Reitter, 1873

Glischrochilus hortensis (Fourcroy, 1785) (N, S) (*)

Glischrochilus quadriguttatus (Fabricius, 1776) (N, S)

Glischrochilus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa?)

Glischrochilus quadrisignatus (Say, 1835) (N) (*)

Pityophagus Shuckard, 1839

Pityophagus ferrugineus (Linnaeus, 1761) (N, S)

Pityophagus laevior Abeille, 1872 (N, S) (*)

Carpophilus Stephens, 1829

Carpophilus bipustulatus (Heer, 1841) (N, S, Si, Sa)

Carpophilus dimidiatus (Fabricius, 1792) (N, S, Si, Sa) (*)

Carpophilus freemani Dobson, 1956 (N, S, Si, Sa)

Carpophilus fumatus Boheman, 1851 (Si)

Carpophilus hemipterus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Carpophilus ligneus Murray, 1864 (N, S, Si, Sa) (*)

Carpophilus marginellus Motschulsky, 1858 (N, S, Si, Sa) (*)

Carpophilus mutilatus Erichson, 1843 (N, S, Si, Sa) (*)

Carpophilus obsoletus Erichson, 1843 (N, S, Si, Sa) (*)

Carpophilus pilosellus Motschulsky, 1858 (N, S, Si, Sa) (*)

Carpophilus quadrisignatus Erichson, 1843 (N, S, Si, Sa)

Carpophilus sexpustulatus (Fabricius, 1791) (N, S, Si, Sa)

Carpophilus tersus Wollaston, 1865 (N, S, Si, Sa)

Carpophilus zeaphilus Dobson, 1969 (Si) (*)

Urophorus Murray, 1864

Urophorus humeralis (Fabricius, 1798) (N, S, Si, Sa) (*)

Urophorus rubripennis (Heer, 1841) (N, S, Si, Sa)

Epuraea Erichson, 1843

Epuraea aestiva (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Epuraea angustula Sturm, 1844 (N, S) (*)

Epuraea argus Reitter, 1894 (N) (*)

Epuraea biguttata (Thunberg, 1784) (N, S) (*)

Epuraea binotata Reitter, 1872 (N, S)

Epuraea boreella (Zetterstedt, 1828) (N)

Epuraea deubeli Reitter, 1898 (N) (*)

Epuraea distincta (Grimmer, 1841) (N)

Epuraea fageticola Audisio, 1991 (S, Si)

Epuraea fuscicollis (Stephens, 1832) (N, S, Si, Sa)

Epuraea guttata (Olivier, 1811) (N, S) (*)
Epuraea laeviuscula (Gyllenhal, 1827) (N)
Epuraea limbata (Fabricius, 1787) (N) (*)
Epuraea longiclavis Sjöberg, 1939 (N)
Epuraea longula Erichson, 1845 (N, S, Si)
Epuraea luteola Erichson, 1843 (S, Si, Sa) (*)
Epuraea marseuli Reitter, 1872 (N, S, Si)
Epuraea melanocephala (Marsham, 1802) (N, S, Si)
Epuraea melina Erichson, 1843 (N, S, Si)
Epuraea muehli Reitter, 1908 (N)
Epuraea neglecta (Heer, 1841) (N) (*)
Epuraea oblonga (Herbst, 1793) (N, S) (*)
Epuraea pallescens (Stephens, 1832) (N, S)
Epuraea placida Mäklin, 1853 (N) (*)
Epuraea pygmaea (Gyllenhal, 1808) (N)
Epuraea rufomarginata (Stephens, 1830) (N, S) (*)
Epuraea silacea (Herbst, 1784) (N, S)
Epuraea terminalis Mannerheim, 1843 (N, S) (*)
Epuraea thoracica Tournier, 1872 (N, S) (*)
Epuraea unicolor (Olivier, 1790) (N, S, Si, Sa)
Epuraea variegata (Herbst, 1793) (N, S) (*)

Pria Stephens, 1829

Pria dulcamarae (Scopoli, 1763) (N, S, Si, Sa)

Meligethinus Grouvelle, 1906

Meligethinus pallidulus (Erichson, 1843) (N, S, Si, Sa) (*)

Meligethes Stephens, 1830

Meligethes acicularis C. Brisout de Barneville, 1863 (N, S)
Meligethes aeneus (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa)
Meligethes angustatus Küster, 1848 (N, S)
Meligethes anthracinus C. Brisout de Barneville, 1863 (N, S, Si)
Meligethes assimilis Sturm, 1845 (N, S) (*)
Meligethes ater C. Brisout de Barneville, 1863 (N) (*)
Meligethes atramentarius Förster, 1849 (N, S) (*)
Meligethes atratus (Olivier, 1790) (N, S, Si)
Meligethes bidens C. Brisout de Barneville, 1863 (N, S, Si, Sa)
Meligethes bidentatus C. Brisout de Barneville, 1863 (N, S, Sa)
Meligethes brachialis Erichson, 1845 (N, S)
Meligethes brevis Sturm, 1845 (N, S) (*)
Meligethes brunnicornis Sturm, 1845 (N, S)
Meligethes bucciarellii Audisio, 1976 (S)
Meligethes buduensis Ganglbauer, 1899 (S)
Meligethes buyssoni C. Brisout de Barneville, 1882 (N?) (*)

Meligethes carinulatus Förster, 1849 (N, S, Si, Sa)
Meligethes caudatus Guillebeau, 1897 (N, S) (*)
Meligethes chlorocyaneus Jelínek & Audisio, 1977 (N) (*)
Meligethes coeruleovirens Förster, 1849 (N) (*)
Meligethes coracinus Sturm, 1845 (N, S)
Meligethes corvinus Erichson, 1845 (N, S)
Meligethes czwalinai Reitter, 1871 (N, S)
Meligethes denticulatus (Heer, 1841) (N, S)
Meligethes devillei Grouvelle, 1912 (N, S) (*)
Meligethes difficilis (Heer, 1841) (N, S, Si)
Meligethes distinctus Sturm, 1845
Meligethes egenus Erichson, 1845 (N, S, Si)
Meligethes elongatus Rosenhauer, 1856 (Si) (*)
Meligethes erichsoni C. Brisout de Barneville, 1863 (N, S, Si, Sa)
Meligethes exilis Sturm, 1845 (N, S, Si, Sa)
Meligethes flavimanus Stephens, 1830 (N, S)
Meligethes fulvipes C. Brisout de Barneville, 1863 (N, S?) (*)
Meligethes fumatus Erichson, 1845 (N, S)
Meligethes funereus Jelínek, 1967 (N, S)
Meligethes fuscus (Olivier, 1790) (N, S, Si, Sa) (*)
Meligethes gagathinus Erichson, 1845 (N, S)
Meligethes gracilis C. Brisout de Barneville, 1863 (N, S) (*)
Meligethes grenieri C. Brisout de Barneville, 1872 (N, S, Si, Sa) (*)
Meligethes haemorrhoidalis Förster, 1849 (N)
Meligethes hoffmanni Reitter, 1871 (N, S, Si, Sa) (M)
Meligethes humerosus Reitter, 1871 (N) (M)
Meligethes immundus Kraatz, 1858 (N, S, Si, Sa) (*)
Meligethes incanus Sturm, 1845 (N, S)
Meligethes jelineki Audisio, 1976 (N, S, Si)
Meligethes kunzei Erichson, 1845 (N, S) (*)
Meligethes leati Easton, 1956 (Si)
Meligethes lepidii Miller, 1851 (S, Si) (*)
Meligethes lindbergi Rebmann, 1940 (N, S, Si, Sa) (*)
Meligethes longulus Schilsky, 1894 (N, S, Si)
Meligethes lugubris Sturm, 1845 (N, S, Sa) (*)
Meligethes matronalis Audisio & Spornraft, 1990 (N, S)
Meligethes maurus Sturm, 1845 (N, S)
Meligethes minutus C. Brisout de Barneville, 1863 (Si, Sa?)
Meligethes morosus Erichson, 1845 (N, S, Si)
Meligethes nanus Erichson, 1845 (N, S, Si)
Meligethes nigerrimus Rosenhauer, 1856 (Sa)
Meligethes nigrescens Stephens, 1830 (N, S, Si, Sa)
Meligethes nigrinus (Lucas, 1849) (N, S, Si, Sa) (*)
Meligethes nuragicus Audisio & Jelínek, 1990 (Sa)
Meligethes obscurus Erichson, 1845 (N, S) (*)
Meligethes ochropus Sturm, 1845 (N, S) (M) (*)
Meligethes opacus Rosenhauer, 1856 (Sa) (M)
Meligethes oreophilus Audisio, 1984 (N, S) (*)

Meligethes ovatus Sturm, 1845 (N, S)
Meligethes paschalis Spornraft, 1975 (S) (E) (*)
Meligethes pedicularius (Gyllenhal, 1808) (N, S)
Meligethes planiusculus (Heer, 1841) (N, S, Si, Sa)
Meligethes punctatus C. Brisout de Barneville, 1863 (N, S, Si, Sa)
Meligethes reitteri Schilsky, 1894 (S) (M) (*)
Meligethes reyi Guillebeau, 1885 (N, S) (*)
Meligethes rosenhaueri Reitter, 1871 (N, S) (M) (*)
Meligethes rotundicollis C. Brisout de Barneville, 1863 (N, S, Si, Sa)
Meligethes ruficornis (Marsham, 1802) (N, S, Si, Sa)
Meligethes scholzi Easton, 1960 (S, Si)
Meligethes serripes (Gyllenhal, 1827) (N)
Meligethes solidus (Kugelann, 1794) (N, S) (*)
Meligethes spornrafti Audisio, 1977 (N, S) (*)
Meligethes subaeneus Sturm, 1845 (N, S)
Meligethes subfumatus Ganglbauer, 1899 (N) (*)
Meligethes submetallicus Sainte-Claire Deville, 1908 (N, S, Si, Sa) (*)
Meligethes subrugosus (Gyllenhal, 1808) (N, S, Si, Sa)
Meligethes sulcatus C. Brisout de Barneville, 1863 (N, S) (*)
Meligethes symphyti (Heer, 1841) (N, S)
Meligethes persicus Faldermann, 1837 (N, S)
Meligethes tener Reitter, 1873 (S) (*)
Meligethes tristis Sturm, 1845 (N, S) (*)
Meligethes umbrosus Sturm, 1845 (N, S, Si, Sa?)
Meligethes varicollis Wollaston, 1854 (Sa)
Meligethes variolosus Easton, 1964 (N?) (*)
Meligethes villosus C. Brisout de Barneville, 1863 (N, S, Si, Sa)
Meligethes viridescens (Fabricius, 1787) (N, S, Si, Sa)

Note

Soronia punctatissima: Presenza dubbia in Si.
Amphotis orientalis: Solo in aree costiere di Veneto e Friuli.
Ipidia sexguttata: Presenza dubbia lungo il confine italo-sloveno.
Ithyra hirsutula: Specie probabilmente introdotta dall'Africa tropicale, di acclimatazione dubbia in Si.
Xenostrogylus lateralis: In S solo nelle regioni centromeridionali tirreniche.
Glischrochilus hortensis: In S solo lungo l'Appennino Tosco-Emiliano.
Glischrochilus quadrisignatus: Specie neartica, acclimatata in Europa centrale e in diffusione verso Sud; per ora presente in N solo nel Friuli-Venezia Giulia.
Pityophagus laevior: Presente in N solo in Friuli e in Liguria, in S solo in Toscana occidentale.
Carpophilus dimidiatus: Specie di origine tropicale introdotta e acclimatata.
Carpophilus ligneus: Specie di origine tropicale introdotta in aree portuali ma di dubbia acclimatazione in Italia.
Carpophilus marginellus: Specie di origine tropicale introdotta e acclimatata.
Carpophilus mutilatus: Specie di origine tropicale introdotta e acclimatata.
Carpophilus obsoletus: Specie di origine tropicale introdotta e acclimatata.
Carpophilus pilosellus: Specie di origine tropicale introdotta e acclimatata.

Carpophilus zeaphilus: Specie di origine tropicale introdotta in aree portuali ma di dubbia acclimatazione in Si.

Urophorus humeralis: Specie di origine tropicale introdotta e acclimatata.

Epuraea angustula: In S nota solo della Basilicata.

Epuraea argus: Presenza dubbia in Valchiavenna presso il confine italo-svizzero.

Epuraea biguttata: In S solo lungo l'Appennino Calabro-Lucano.

Epuraea deubeli: Presenza dubbia al Brennero presso il confine italo-austriaco.

Epuraea guttata: Citazione molto dubbia anche per Sa.

Epuraea limbata: Citazione molto dubbia anche per Sa.

Epuraea luteola: Specie di origine tropicale introdotta e acclimatata.

Epuraea neglecta: Citazione molto dubbia anche per Si.

Epuraea oblonga: In S nota solo dell'Appennino Tosco-Emiliano.

Epuraea placida: Nota solo del Trentino-Alto Adige.

Epuraea rufomarginata: In S solo lungo l'Appennino Calabro-Lucano.

Epuraea terminalis: In S solo lungo l'Appennino Tosco-Emiliano e recentemente raccolta anche lungo quello calabro-lucano (Audisio, dati inediti).

Epuraea thoracica: In S solo lungo l'Appennino Calabro-Lucano.

Epuraea variegata: Citazione molto dubbia anche per Sa.

Meligethinus pallidulus: Distribuzione primaria solo nelle regioni tirreniche, introdotto e acclimatato altrove.

Meligethes assimilis: In S solo lungo l'Appennino Tosco-Emiliano.

Meligethes ater: Solo nella Venezia Giulia.

Meligethes atramentarius: In S solo lungo l'Appennino Tosco-Emiliano.

Meligethes brevis: Presenza molto dubbia anche in Sa.

Meligethes buyssoni: Presenza dubbia sulle Alpi Marittime.

Meligethes caudatus: Noto solo di aree montane.

Meligethes chlorocyaneus: In Italia noto solo della Val di Stura d'Ala (TO).

Meligethes coeruleovirens: Noto solo delle Alpi Giulie.

Meligethes devillei: In S noto solo del Monte Terminillo (RI).

Meligethes elongatus: Solo nell'Isola di Pantelleria.

Meligethes fulvipes: In N solo in Liguria occidentale e Piemonte meridionale, in S nota di incerta località della Toscana.

Meligethes fuscus: In N solo in Liguria e Piemonte meridionale.

Meligethes gracilis: In N solo in Piemonte e Liguria, in S solo nelle regioni tirreniche.

Meligethes grenieri: In N solo in Liguria occidentale, in S solo nelle regioni costiere tirreniche.

Meligethes immundus: In N solo nelle aree costiere.

Meligethes kunzei: In S solo lungo l'Appennino Calabro-Lucano.

Meligethes lepidii: Esiste anche una citazione molto dubbia per il Friuli.

Meligethes lindbergi: In N solo nelle regioni costiere di Liguria e Venezia Giulia.

Meligethes lugubris: La posizione tassonomica delle popolazioni sarde non è del tutto chiara .

Meligethes nigritus: In N e S solo nelle regioni costiere tirreniche.

Meligethes obscurus: In S noto solo della Toscana.

Meligethes ochropus: In S noto con certezza solo della Toscana.

Meligethes oreophilus: Noto solo di aree montane.

Meligethes paschalis: Noto solo del Molise e delle regioni tirreniche dal Lazio alla Calabria.

Meligethes reitteri: Noto di una singola località del Lazio (Colli Albani).

Meligethes reyi: Noto solo di aree montane.

Meligethes rosenhaueri: In N noto solo dell'Alto Adige, in S solo dei dintorni di Foggia.

Meligethes solidus: Noto solo di aree montane.
Meligethes spornrafti: In N solo lungo le Alpi Occidentali e l'Appennino Ligure.
Meligethes subfumatus: In N solo lungo le Alpi sud-occidentali.
Meligethes submetallicus: In N forse solo in Piemonte.
Meligethes sulcatus: In S noto solo dei Monti Sibillini.
Meligethes tener: In S noto solo del Promontorio del Gargano.
Meligethes tristis: In S noto solo dell'Appennino Tosco-Emiliano (Mugello).
Meligethes variolosus: Presenza dubbia lungo le Alpi Marittime, presso il confine italo-francese.

Nosodendridae

Nosodendron Latreille, 1804

Nosodendron fasciculare (A.G. Olivier, 1790) (N, S)

Ochodaeidae

Ochodaeus Serville, 1825

Ochodaeus chrysomeloides (Schrank, 1781) (N, S, Sa)

Ochodaeus cychramoides Reitter, 1892 (N, S) (E)

Oedemeridae

Chrysanthia Schmidt, 1846

Chrysanthia geniculata Schmidt, 1846 (N, S)

Chrysanthia viridissima (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)

Nacerdes (Nacerdes) Dejean, 1834

Nacerdes (Nacerdes) melanura (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Nacerdes (Xanthochroa) Schmidt, 1846

Nacerdes (Xanthochroa) carniolica (Gistel, 1834) (N)

Nacerdes (Xanthochroa) gracilis Schmidt, 1846

Nacerdes (Xanthochroa) gracilis gracilis Schmidt, 1846 (N)

Anogcodes Dejean, 1834

Anogcodes ferrugineus (Schrank, 1776) (N, S)

Anogcodes fulvicollis (Scopoli, 1763) (N)

Anogcodes medius (Gredler, 1866) (N) (E)

Anogcodes ruficollis (Fabricius, 1781) (N, S, Si, Sa)
Anogcodes rufiventris (Scopoli, 1763) (N, S, Si?)
Anogcodes seladonius (Fabricius, 1792) (*)
 Anogcodes seladonius seladonius (Fabricius, 1792) (N, S, Sa)
 Anogcodes seladonius alpinus (Schmidt, 1846) (N)
Anogcodes ustulatus (Fabricius, 1787) (N)

Sparedrus Dejean, 1821

Sparedrus orsinii A. Costa, 1852 (N, S, Si) (E) (*)
Sparedrus testaceus (Andersch, 1797) (N, S?)

Calopus Fabricius, 1775

Calopus serraticornis (Linnaeus, 1758) (N, S)

Probosca Schmidt, 1846

Probosca viridana Schmidt, 1846 (Si, Sa)

Ischnomera Stephens, 1832

Ischnomera cinerascens (Pandellé, 1867)
 Ischnomera cinerascens cinerascens (Pandellé, 1867) (N, S, Si)
Ischnomera coerulea (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)
Ischnomera cyanea (Fabricius, 1792) (N, S)
Ischnomera sanguinicollis (Fabricius, 1787) (N, S)
Ischnomera xanthoderes (Mulsant, 1858) (Si) (*)

Chitona Schmidt, 1846

Chitona connexa (Fabricius, 1798) (Sa?) (*)

Oedemera (Oncomera) Stephens, 1829

Oedemera (Oncomera) femoralis Olivier, 1803
 Oedemera (Oncomera) femoralis femoralis Olivier, 1803 (N, S, Si)

Oedemera (Oedemera) Olivier, 1789

Oedemera (Oedemera) abdominalis Pic, 1897 (Si) (*)
Oedemera (Oedemera) barbara (Fabricius, 1792) (N, S, Si, Sa)
Oedemera (Oedemera) croceicollis (Gyllenhal, 1827) (N, S)
Oedemera (Oedemera) flavipes (Fabricius, 1792) (N, S, Si, Sa)
Oedemera (Oedemera) lateralis Gebler, 1830 (N)
Oedemera (Oedemera) melanopyga Schmidt, 1846 (S, Si?) (E)
Oedemera (Oedemera) podagrariae (Linnaeus, 1767) (N, S, Si, Sa?)
Oedemera (Oedemera) simplex (Linnaeus, 1767) (N, S, Si, Sa)

Oedemera (Oedemera) annulata Germar, 1824 (N)
Oedemera (Oedemera) atrata Schmidt, 1846 (N, S, Si)
Oedemera (Oedemera) caudata Seidlitz, 1899 (N, S, Si, Sa)
Oedemera (Oedemera) femorata (Scopoli, 1763) (N, S, Si)
Oedemera (Oedemera) lurida (Marsham, 1802) (N, S, Si, Sa)
Oedemera (Oedemera) monticola Svihla, 1978 (N) (*)
Oedemera (Oedemera) nobilis (Scopoli, 1763) (N, S, Si, Sa)
Oedemera (Oedemera) subulata (Olivier, 1795) (N, S, Si)
Oedemera (Oedemera) tristis Schmidt, 1846 (N, S)
Oedemera (Oedemera) virescens (Linnaeus, 1767) (N, S, Si?, Sa)

Stenostoma Latreille, 1810

Stenostoma rostratum (Fabricius, 1787) (S, Si, Sa)
Stenostoma sp. (Si) (E) (*)

Note

Nacerdes (Xanthochroa): Di norma citato come genere distinto.
Anogcodes: Specie tradizionalmente attribuite al genere *Nacerdes* Dejean.
Anogcodes seladonius: La sistematica infraspecifica non è ben chiarita e la ssp. alpina potrebbe risultare una specie distinta.
Sparedrus orsinii: Presenza in N solo in poche località dell'Emilia Romagna.
Ischnomera xanthoderes: Le popolazioni siciliane appartengono forse ad una sottospecie inedita.
Chitona connexa: La presenza in Sa di questa specie W-mediterranea è dubbia e basata su un'antica citazione.
Oedemera (Oncomera): Di norma citato come genere distinto.
Oedemera (Oedemera): Le specie 001.0-008.0 e 009.0-018.0 formano, rispettivamente, due sezioni infrageneriche ben caratterizzate.
Oedemera (Oedemera) abdominalis: La presenza di questa specie maghrebina in Si è limitata a Lampedusa; l'attribuzione alla ssp. algerica Pic, 1899 è dubbia e non viene pertanto considerata.
Oedemera (Oedemera) monticola: Specie descritta recentemente, poi citata di varie località centroeuropee. Nuova per la fauna italiana (Alto Adige, BZ, Val Pusteria, Humold Hütte, 1400 m, collez. M. Bologna).
Stenostoma sp.: La descrizione di questa specie è in corso di stampa (Nat. sic., 19, suppl.). La specie, endemica di Pantelleria, è stata precedentemente citata come *S. melitense* che è invece endemica di Malta e Gozo.

Omalisidae

Omalisus Geoffroy, 1762

Omalisus fontisbellaquaei Geoffroy in Fourcroy, 1785 (N, S)
Omalisus nicaeensis (Lesne, 1921) (N)
Omalisus sanguinipennis (Laporte de Castelnau, 1840) (N)

Omalisus taurinensis (Baudi, 1871) (N)
Omalisus unicolor (A. Costa, 1856) (S, Sa) (*)
Omalisus victoris (Mulsant, 1850) (N)

Thilmanus Gemminger & Harold, 1869

Thilmanus longipennis Pic, 1912 (Sa)
Thilmanus obscurus Baudi, 1871 (Sa)

Note

Omalisus: In letteratura esiste anche un "*Homalisus bimaculatus*" descritto di Sicilia da Zuccarello Patti nel 1842, la cui diagnosi è però insufficiente per una sicura identificazione; se fosse davvero riferibile al genere *Omalisus* si tratterebbe dell'unica specie per ora citata di Sicilia.

Omalisus unicolor: La specie costituisce il tipo del sottogenere *Phaeopterus* A. Costa, 1856. Le altre specie elencate appartengono tutte al sottogenere nominale.

Orphnidae

Chaetonyx Schaum, 1862

Chaetonyx robustus Schaum, 1862
Chaetonyx robustus italicus Mariani, 1946 (S) (E)
Chaetonyx robustus liguricus Mariani, 1946 (N) (E)

Hybalus Brullé, 1834

Hybalus benoiti Tournier, 1864 (Si) (E)
Hybalus bigibber Reitter, 1892 (Si)
Hybalus graecus Sturm, 1843 (S?) (*)

Note

Hybalus graecus: Abbiamo visto un esemplare cartellinato "Calabria". Da confermare.

Othniidae

Aglenus Erichson, 1845

Aglenus brunneus (Gyllenhal, 1813) (N, S, Si, Sa)

Pachypodidae

Pachypus Serville, 1828

Pachypus caesus Erichson, 1840 (Si) (E)
Pachypus candidae (Petagna, 1786) (S, Sa)

Passandridae

Aulonosoma Motschulsky, 1858

Aulonosoma tenebrioides Motschulsky, 1858 (N) (*)

Note

Aulonosoma tenebrioides: Alloctono, tropicopolita, solo porto di Venezia.

Pedilidae

Agnathus Germar, 1818

Agnathus decoratus Germar, 1825 (N, S)

Phalacridae

Tolyphus Erichson, 1845

Tolyphus granulatus (Guérin-Meneville, 1844) (S, Si, Sa)

Tolyphus punctatostriatus Kraatz, 1858 (S, Si)

Tolyphus rufescens Pic, 1914 (S)

Olibrus Erichson, 1845

Olibrus aenescens Küster, 1852 (S, Si, Sa)

Olibrus aeneus (Fabricius, 1792) (N, S)

Olibrus affinis (Sturm, 1807) (N, S, Si, Sa)

Olibrus baudueri Flach, 1888 (N, S)

Olibrus bicolor (Fabricius, 1792) (N, S, Si, Sa)

Olibrus bimaculatus Küster, 1848 (N, S, Si, Sa)

Olibrus bisignatus (Ménétriés, 1849) (N, S)

Olibrus castaneus Baudi, 1870 (N, S, Si, Sa)

Olibrus corticalis (Panzer, 1792) (N, S, Si, Sa)

Olibrus demarzoii Svec & Angelini, 1995 (S) (E)

Olibrus desbrochersi Guillebeau, 1892 (N, S, Si, Sa)

Olibrus gerhardti Flach, 1888 (N?)

Olibrus fallax Flach, 1889 (S, Si)

Olibrus flavicornis (Sturm, 1807) (N, S, Si, Sa)

Olibrus liquidus Erichson, 1845 (N, S, Si, Sa)

Olibrus millefolii (Paykull, 1800) (N, S, Sa)
Olibrus norvegicus Munster, 1901 (N?)
Olibrus particeps Mulsant, 1861 (N, S, Si, Sa)
Olibrus pygmaeus (Sturm, 1807) (N, S, Si, Sa)
Olibrus reitteri Flach, 1888 (S, Si, Sa)
Olibrus stierlini Flach, 1888 (N, S, Si, Sa)

***Stilbus* Seidlitz, 1872**

Stilbus atomarius (Linnaeus, 1767) (N, S, Si?)
Stilbus oblongus (Erichson, 1845) (N, S, Si, Sa)
Stilbus pannonicus Franz, 1968 (N, S)
Stilbus polygramma Flach, 1888 (S?, Si?, Sa?)
Stilbus testaceus (Panzer, 1797) (N, S, Si, Sa)

***Phalacrus* Paykull, 1800**

Phalacrus brunnipes C. Brisout de Barneville, 1863 (N, S, Si)
Phalacrus brisouti Rye, 1872 (N, S, Si)
Phalacrus caricis Sturm, 1807 (N, S)
Phalacrus corruscus (Panzer, 1797) (N, S, Si, Sa)
Phalacrus fimetarius (Fabricius, 1775) (N)
Phalacrus grossus Erichson, 1845 (N, S, Sa?)
Phalacrus maximus Fairmaire, 1852 (N, S, Sa?)
Phalacrus seriepunctatus C. Brisout de Barneville, 1863 (S, Si, Sa)
Phalacrus substriatus Gyllenhal, 1813 (N, S, Si, Sa)

Phloeostichidae

***Phloeostichus* Redtenbacher, 1842**

Phloeostichus denticollis Redtenbacher, 1842 (N, S) (R)

Phloiophilidae

***Phloiophilus* Stephens, 1830**

Phloiophilus edvarsii Stephens, 1830 (N) (*)

Note

Phloiophilus edvarsii: Presente in N solo nella zona di Trieste.

Platypodidae

Platypus Herbst, 1793

Platypus cylindrus (Fabricius, 1792) (N, S, Si, Sa)

Platypus oxyurus Dufour, 1843 (S, Sa?)

Platypsyllidae

Leptinus P.W.J. Müller, 1817

Leptinus seriatus Doderö, 1916 (N)

Leptinus testaceus P.W.J. Müller, 1817 (N, S, Si)

Prostomidae

Prostomis Latreille, 1825

Prostomis mandibularis (Fabricius, 1801) (N, S, Sa)

Pselaphidae

Faronus Aubé, 1844

Faronus aubei Lucas, 1854 (S)

Faronus besucheti Castellini, 1990 (Sa) (E)

Faronus brucki Saulcy, 1874 (S) (E)

Faronus insularis Sainte-Claire Deville, 1908 (Sa)

Faronus lafertei Aubé, 1844 (N, S, Si, Sa)

Faronus nicaeensis Saulcy, 1874 (N)

Faronus sculus Fiori, 1913 (Si) (E)

Faronus stolzi W. Blatný & C. Blatný, 1914 (S) (E)

Faronus vitalei Raffray, 1913 (Si) (E)

Octomicrus L.W. Schaufuss, 1877

Octomicrus staphylinoides (Fiori, 1900) (N, S)

Mayetia Mulsant & Rey, 1875

Mayetia calabra Pace, 1974 (S) (E)

Mayetia curtii Orousset, 1983 (S) (E)

Mayetia garganica Pace, 1974 (S) (E)

Mayetia italica Pace, 1977 (N) (E) (*)

Mayetia ligur Pace, 1977 (N) (E)

Mayetia lunensis Pace, 1977 (N) (E)

Mayetia monilis Coiffait, 1955 (Sa) (E)

Mayetia solarii Coiffait, 1955 (N) (E)

Panaphantus Kiesenwetter, 1858

Panaphantus atomus Kiesenwetter, 1858 (N, S, Si, Sa)

Bibloporus C.G. Thomson, 1859

Bibloporus bicolor (Denny, 1825)

Bibloporus bicolor bicolor (Denny, 1825) (N)

Bibloporus bicolor devillei Jeannel, 1950 (N, S)

Bibloporus mayeti Guillebeau, 1888 (N, S)

Bibloporus minutus Raffray, 1914 (N, S)

Bibloporus ultimus Guillebeau, 1892 (S)

Pseudoplectus Reitter, 1881

Pseudoplectus perplexus (Jacquelin du Val, 1854) (N, S, Si, Sa)

Biblopectus Reitter, 1881

Biblopectus aculeatus Guillebeau, 1888 (S)

Biblopectus ambiguus (Reichenbach, 1816) (N, S, Sa?)

Biblopectus delhermi Guillebeau, 1888 (N, S, Si)

Biblopectus jucundus Normand, 1939 (Si)

Biblopectus limatus Normand, 1939 (N, S, Si, Sa)

Biblopectus obtusus Guillebeau, 1888 (N, S)

Biblopectus pusillus (Denny, 1825) (N, S, Si?)

Biblopectus tenebrosus (Reitter, 1880) (N)

Euplectus Leach, 1817

Euplectus bonvouloiri Reitter, 1881

Euplectus bonvouloiri felschei Reitter, 1887 (Sa) (E)

Euplectus bonvouloiri narentinus Reitter, 1881 (N, S)

Euplectus bonvouloiri rosae Raffray, 1910 (N, S)

Euplectus bonvouloiri sculus Raffray, 1910 (Si) (E)

Euplectus brunneus Grimmer, 1841 (N, S)

Euplectus corsicus Guillebeau, 1888 (N, S, Si, Sa)

Euplectus decipiens Raffray, 1910 (S?) (*)

Euplectus doderoi Reitter, 1884 (Sa)

Euplectus duponti Aubé, 1833 (S?) (*)

Euplectus fauveli Guillebeau, 1888 (N, S)

Euplectus frater Besuchet, 1964 (N)

Euplectus infirmus Raffray, 1910 (N, S, Si)

Euplectus karsteni (Reichenbach, 1816) (N, S, Sa)

Euplectus kirbyi Denny, 1825

Euplectus kirbyi hummleri Reitter, 1906 (S) (E)

Euplectus kirbyi kirbyi Denny, 1825 (N, S)
Euplectus kirbyi luigionii Doderò, 1908 (S)
Euplectus linderi Reitter, 1884 (N, S, Sa)
Euplectus nanus (Reichenbach, 1816) (N)
Euplectus piceus Motschulsky, 1835
Euplectus piceus lucanus Meggiolaro, 1966 (S) (E)
Euplectus piceus piceus Motschulsky, 1835 (N, S)
Euplectus punctatus Mulsant & Rey, 1861 (N, S)
Euplectus sanguineus Denny, 1825 (N, S, Si, Sa)
Euplectus signatus (Reichenbach, 1816) (N, S, Si)
Euplectus sparsus Besuchet, 1964 (N)
Euplectus theryi Guillebeau, 1894 (S, Si)
Euplectus tholini Guillebeau, 1888 (S, Sa?)
Euplectus validus Besuchet, 1958 (N)
Euplectus verticalis Reitter, 1884 (S)

Leptoplectus Casey, 1908

Leptoplectus spinolae (Aubé, 1844) (N, S)

Plectophloeus Reitter, 1891

Plectophloeus binaghii Besuchet, 1964 (N, S) (E) (*)
Plectophloeus erichsoni (Aubé, 1844)
Plectophloeus erichsoni occidentalis Besuchet, 1969 (N, S)
Plectophloeus fischeri (Aubé, 1833) (N, S)
Plectophloeus nitidus (Fairmaire, 1857) (N, S)
Plectophloeus nubigena (Reitter, 1876)
Plectophloeus nubigena nubigena (Reitter, 1876) (N, S)

Scotoplectus Reitter, 1879

Scotoplectus capellae Reitter, 1879 (N)

Meliceria Raffray, 1898

Meliceria italica Besuchet, 1966 (N) (E) (*)
Meliceria sulciventris (Guillebeau, 1888) (S)

Trimium Aubé, 1833

Trimium aemonae Reitter, 1881 (N)
Trimium amplipenne Reitter, 1908 (Sa) (E)
Trimium besucheti Sabella, 1989 (Si) (E)
Trimium brevicorne Aubé, 1833 (N, S, Si)
Trimium diecki Reitter, 1881 (S)
Trimium illyricum Besuchet, 1969 (N)
Trimium latiusculum Reitter, 1879 (N?)

Trimium minimum Doderò, 1900 (N, S)
Trimium paganettii Reitter, 1906 (S, Si) (E)
Trimium zoufali Krauss, 1900 (N, S, Si) (E)

Zibus Saulcy, 1874

Zibus leiocephalus (Aubé, 1833) (Si)

Aphiliops Reitter, 1884

Aphiliops annae Poggi, 1992 (Sa) (E)
Aphiliops baccettii Poggi, 1992 (Sa) (E)

Pseudozibus Jeannel, 1956

Pseudozibus crassipes (Raffray, 1908) (S) (E)

Trogaster Sharp, 1874

Trogaster binaghii Besuchet, 1969 (N) (E)
Trogaster caprai Besuchet, 1969 (N) (E)
Trogaster devillei Holdhaus, 1923 (S) (*)
Trogaster doderoi Besuchet, 1969 (N) (E)
Trogaster doriae Doderò, 1891 (N) (E)
Trogaster fiorii (Menozzi, 1917) (N) (E)
Trogaster gestroi Besuchet, 1969 (N) (E)
Trogaster solarii Besuchet, 1969 (N) (E)

Trogasteropsis Doderò, 1918

Trogasteropsis aglenus Doderò, 1919 (Sa) (E)
Trogasteropsis anillus Doderò, 1919 (Sa) (E)
Trogasteropsis coecus Doderò, 1919 (Sa) (E)

Batrisus Aubé, 1833

Batrisus formicarius Aubé, 1833 (N, S, Sa)

Batrisodes Reitter, 1882

Batrisodes adnexus (Hampe, 1863) (N, S, Si)
Batrisodes buqueti (Aubé, 1833) (N)
Batrisodes delaportei (Aubé, 1833) (N, S)
Batrisodes hubenthali Reitter, 1913 (N)
Batrisodes oculatus (Aubé, 1833) (N, S, Si, Sa)
Batrisodes venustus (Reichenbach, 1816) (N, S, Si)

Amaurops Fairmaire, 1851

Amaurops aubei Fairmaire, 1852 (E)
 Amaurops aubei aubei Fairmaire, 1852 (Si)
 Amaurops aubei binaghii Besuchet, 1980 (Si)
Amaurops sulcatula Doderò, 1919 (E)
 Amaurops sulcatula confusa Binaghi, 1944 (Si)
 Amaurops sulcatula sulcatula Doderò, 1919 (Si)

***Tropidamaurops* Jeannel, 1948**

Tropidamaurops carinatus (Baudi, 1875) (N) (E)

***Paramaurops* Jeannel, 1948**

Paramaurops aculeatus (Doderò, 1919) (Sa) (E)
Paramaurops alpinus (Doderò, 1900) (E)
 Paramaurops alpinus alpinus (Doderò, 1900) (N)
 Paramaurops alpinus vesulanus (Binaghi, 1945) (N)
Paramaurops ancestralis (Binaghi, 1945) (Sa) (E)
Paramaurops burlinii Meggiolaro, 1966 (N) (E)
Paramaurops caeretanus Cerruti, 1957 (S) (E)
Paramaurops denticulatus (Doderò, 1919) (Sa) (E)
Paramaurops diecki (Saulcy, 1874) (E)
 Paramaurops diecki andreinii (Binaghi, 1944) (S)
 Paramaurops diecki bucciarellii Meggiolaro, 1966 (N)
 Paramaurops diecki dentibasis (Doderò, 1919) (S)
 Paramaurops diecki diecki (Saulcy, 1874) (S)
 Paramaurops diecki fiorii (Holdhaus, 1910) (N, S)
 Paramaurops diecki florentinus (Doderò, 1919) (N, S)
 Paramaurops diecki massetanus Castellini, 1975 (S)
 Paramaurops diecki mingazzinii Castellini, 1986 (S)
 Paramaurops diecki moczarskii (Holdhaus, 1910) (S)
 Paramaurops diecki senensis (Baudi, 1889) (S)
 Paramaurops diecki troglodytes (Binaghi, 1944) (S)
 Paramaurops diecki trossarellii (Binaghi, 1944) (S)
Paramaurops euganeus Pace, 1974 (N) (E)
Paramaurops exaratus (Baudi, 1875) (E)
 Paramaurops exaratus brevicarina (Raffray, 1914) (S)
 Paramaurops exaratus doderoi (Binaghi, 1943) (S)
 Paramaurops exaratus exaratus (Baudi, 1875) (S)
 Paramaurops exaratus intermedius (Binaghi, 1943) (S)
 Paramaurops exaratus neapolitanus Besuchet, 1958 (S)
 Paramaurops exaratus picenus (Binaghi, 1943) (S)
 Paramaurops exaratus romanus (Raffray, 1906) (S)
 Paramaurops exaratus solarii (Binaghi, 1943) (S)
 Paramaurops exaratus tiberinus (Binaghi, 1943) (S)
Paramaurops longipes (Doderò, 1919) (Sa) (E)
Paramaurops luigionii (Raffray, 1914) (S) (E)

Paramaurops osellai Pace, 1976 (S) (E)
Paramaurops pasquinii Sbordon, 1966 (S) (E)
Paramaurops pinkeri (Ganglbauer, 1904) (N) (E)
Paramaurops pirazzolii (Saulcy, 1874) (N) (E)
Paramaurops sardous (Saulcy, 1874) (Sa) (E)

Pygoxyon Reitter, 1880

Pygoxyon lombardum Binaghi, 1943 (N) (E) (*)
Pygoxyon obesum Doder, 1919 (N) (E)
Pygoxyon tychioforme Reitter, 1884 (N) (E)

Trichonyx Chaudoir, 1845

Trichonyx sulcicollis (Reichenbach, 1816) (N, S)

Amauronyx Reitter, 1881

Amauronyx italicus Pace, 1974 (S) (E)
Amauronyx maerkeli (Aubé, 1844) (N, S)

Machaerites Miller, 1855

Machaerites ravasinii (G. Müller, 1922) (N)

Bythoxenus Motschulsky, 1859

Bythoxenus italicus Poggi, 1992 (N) (E)

Tychobythinus Ganglbauer, 1896

Tychobythinus amato (F. Rasetti, 1939) (S) (E)
Tychobythinus andreinii (Doder, 1919) (S) (E)
Tychobythinus anophthalmus (Doder, 1900) (N) (E)
Tychobythinus aymerichi (Doder, 1904) (Sa) (E) (*)
Tychobythinus cameratensis (Karaman, 1959) (S) (E)
Tychobythinus crassitarsis (Doder, 1919) (N) (E)
Tychobythinus curtii Besuchet, 1980 (N) (E)
Tychobythinus damryi (Croissandeau, 1891) (Sa) (E)
Tychobythinus dentimanus (Reitter, 1884) (Sa)
Tychobythinus foroiuliensis Pace, 1976 (N) (E)
Tychobythinus foveipennis (Doder, 1919) (Sa) (E)
Tychobythinus glabratus (Rye, 1870) (N, S, Si)
Tychobythinus gladiator (Reitter, 1884) (E)
 Tychobythinus gladiator gladiator (Reitter, 1884) (N, S)
 Tychobythinus gladiator miles (Raffray, 1914) (S)
Tychobythinus glyptomerus (Jeannel, 1950) (Sa)
Tychobythinus gracilicornis (Raffray, 1914) (S) (E)

Tychobythinus gularis (Dodero, 1919) (S) (E)
Tychobythinus lessinicus Pace, 1974 (N) (E)
Tychobythinus majori (Holdhaus, 1905) (S) (E)
Tychobythinus mirandus (Dodero, 1919) (Sa) (E)
Tychobythinus myrmido (Reitter, 1881) (Sa)
Tychobythinus propomacrus (Dodero, 1919) (S) (E)
Tychobythinus rosai Besuchet, 1980 (N) (E)
Tychobythinus thermalis (Dodero, 1919) (Sa) (E)
Tychobythinus tibialis (Dodero, 1919) (Sa) (E)
Tychobythinus triangulifer (Dodero, 1919) (Sa) (E)
Tychobythinus vannii Castellini, 1984 (S) (E)
Tychobythinus zoiai Poggi, 1990 (N) (E)

Gasparobythus Poggi, 1992

Gasparobythus tergestinus Poggi, 1992 (N) (E)

Glyphobythus Raffray, 1904

Glyphobythus doriae (L.W. Schaufuss, 1874) (E)
Glyphobythus doriae binaghii Poggi, 1976 (S)
Glyphobythus doriae doriae (L.W. Schaufuss, 1874) (N)
Glyphobythus maritimus (Reitter, 1884) (N)
Glyphobythus vaccae (Dodero, 1900) (N) (E)

Bythinus Leach, 1817

Bythinus burrelli Denny, 1825 (N)
Bythinus confusus Besuchet, 1973 (N, S)
Bythinus reichenbachii (Machulka, 1928) (N, S)
Bythinus securiger (Reichenbach, 1816) (N)

Bryaxis Kugelann, 1794

Bryaxis acernus Castellini, 1978 (N) (E)
Bryaxis aelistae (Reitter, 1881) (Sa)
Bryaxis alpestris (Dodero, 1900) (N) (E)
Bryaxis argus (Kraatz, 1863) (N)
Bryaxis bergamascus (Stolz, 1917) (E)
Bryaxis bergamascus bergamascus (Stolz, 1917) (N)
Bryaxis bergamascus sorinensis (Stolz, 1917) (N)
Bryaxis bericus Pace, 1974 (N) (E)
Bryaxis brachati Besuchet, 1980 (N) (E)
Bryaxis brescianus Daffner, 1986 (N) (E)
Bryaxis brusinae (Reitter, 1879) (N)
Bryaxis bulbifer (Reichenbach, 1816) (N, S, Sa)
Bryaxis carinula (Rey, 1888) (N)
Bryaxis casalei Poggi, 1992 (N) (E)

Bryaxis cateniger (Krauss, 1899)
 Bryaxis cateniger anabates (Holdhaus, 1902) (N) (E)
 Bryaxis cateniger bothrophorus (Stolz, 1917) (N) (E)
 Bryaxis cateniger cateniger (Krauss, 1899) (N)
Bryaxis chevrolati (Aubé, 1833) (N, S)
Bryaxis claudioi Daffner, 1992 (N) (E)
Bryaxis collaris (Baudi, 1859) (N, S)
Bryaxis colledanii Daffner, 1984 (N) (E)
Bryaxis curtisi (Leach, 1817)
 Bryaxis curtisi curtisi (Leach, 1817) (N, S)
 Bryaxis curtisi orientalis (Karaman, 1952) (N, S, Si?)
Bryaxis difficilis (Reitter, 1884) (Sa) (E)
Bryaxis effeminatus Besuchet, 1983 (N) (E)
Bryaxis emilianus (Stolz, 1926) (N) (E)
Bryaxis fiorianus (Reitter, 1906) (S) (E)
Bryaxis focarilei Besuchet, 1980 (N) (E)
Bryaxis frustratus Besuchet, 1983 (N) (E)
Bryaxis gallicus (Reitter, 1887) (N, S)
Bryaxis ganglbaueri (Stolz, 1917) (N) (E)
Bryaxis glabricollis (Schmidt-Goebel, 1836) (N, S)
Bryaxis grouvellei (Reitter, 1881) (N, S)
Bryaxis halbherri (Reitter, 1885) (E)
 Bryaxis halbherri halbherri (Reitter, 1885) (N)
 Bryaxis halbherri pacei Besuchet, 1983 (N)
Bryaxis insularis (Holdhaus, 1905) (S) (E)
Bryaxis italicus (Baudi, 1869) (N, S, Si)
Bryaxis judicariensis (Dodero, 1919) (N)
Bryaxis kahleni Pace, 1978 (N) (E)
Bryaxis konecznii (Machulka, 1938) (N)
Bryaxis kruegeri (Machulka, 1932) (N)
Bryaxis lagari (Halbherr, 1890) (N) (E) (*)
Bryaxis latebrosus (Reitter, 1884) (N)
Bryaxis lessinicus Pace, 1974 (N)
Bryaxis liguricus (Dodero, 1919) (N)
Bryaxis longulus (Kiesenwetter, 1849)
 Bryaxis longulus inflatus Besuchet, 1983 (N) (E)
 Bryaxis longulus longulus (Kiesenwetter, 1849) (N)
Bryaxis mancinii (Dodero, 1919) (S) (E)
Bryaxis marinae Sabella, 1989 (Si) (E)
Bryaxis mirificus Besuchet, 1983 (N) (E)
Bryaxis monguzzii Besuchet, 1980 (N) (E)
Bryaxis muscorum (Kiesenwetter, 1849) (N)
Bryaxis nebrodensis Besuchet, 1980 (Si) (E)
Bryaxis nodicornis (Aubé, 1833) (N)
Bryaxis odontogena (Dodero, 1919) (Sa) (E)
Bryaxis oertzeni (Reitter, 1881) (N)
Bryaxis paganettii (W. Blatný & C. Blatný, 1914) (S) (E)
Bryaxis pavani (Tamanini, 1940) (N) (E)

Bryaxis pedator (Reitter, 1881) (N, S) (E)
Bryaxis pedemontanus Besuchet, 1958 (N)
Bryaxis pentagonoceras (Stolz, 1917) (N) (E)
Bryaxis persicoi (F. Rasetti, 1939) (N) (E)
Bryaxis pescaroloi Poggi, 1984 (N) (E)
Bryaxis petri Raffray, 1914 (S) (E)
Bryaxis picteti (Tournier, 1859)
 Bryaxis picteti meridionalis (Machulka, 1932) (S, Si) (E)
 Bryaxis picteti picteti (Tournier, 1859) (N, S)
Bryaxis pinkeri (Stolz, 1917) (N) (E)
Bryaxis porsenna (Reitter, 1881) (N, S)
Bryaxis procerus (Gredler, 1873) (N) (E)
Bryaxis puncticollis (Denny, 1825) (N, S)
Bryaxis reissi (Machulka, 1933) (N) (E)
Bryaxis rhinophorus (W. Blatný & C. Blatný, 1914) (S) (E)
Bryaxis rossii Castellini, 1986 (S) (E)
Bryaxis rugosicollis (Fiori, 1905) (E)
 Bryaxis rugosicollis cadamuroi (Meggiolaro, 1962) (N)
 Bryaxis rugosicollis montellensis (Meggiolaro, 1962) (N)
 Bryaxis rugosicollis perissinottoi (Meggiolaro, 1960) (N)
 Bryaxis rugosicollis rugosicollis (Fiori, 1905) (N)
Bryaxis sculpticornis (Guillebeau, 1891) (N)
Bryaxis sculus (Fiori, 1913) (Si) (E)
Bryaxis solidus (Reitter, 1881) (N)
Bryaxis subdentatus (Dodero, 1919) (Sa) (E)
Bryaxis trigonoceras (Holdhaus, 1904) (N) (E)
Bryaxis troglodytes (Fiori, 1900) (E)
 Bryaxis troglodytes lausbergeri Daffner, 1984 (N)
 Bryaxis troglodytes pierottii Besuchet, 1980 (N)
 Bryaxis troglodytes troglodytes (Fiori, 1900) (N)
Bryaxis vicinus (Dodero, 1919) (N) (E)

***Paratychnus* Besuchet, 1960**

Paratychnus pulcherrimus (Dodero, 1919) (S) (E)

***Tychus* Leach, 1817**

Tychus alicatai Sabella, 1992 (Si) (E)
Tychus anophthalmus Reitter, 1881 (Sa) (E)
Tychus aretinus Dodero, 1919 (S) (E)
Tychus asuniensis Besuchet, 1964 (Sa) (E)
Tychus confusus Dodero, 1919 (Sa) (E)
Tychus corsicus Reitter, 1881
 Tychus corsicus insularis Karaman, 1955 (Si) (E)
 Tychus corsicus lostiensis Karaman, 1955 (Sa) (E)
 Tychus corsicus spissatus Rey, 1888 (N, S)
Tychus dalmatinus Reitter, 1880

Tychus dalmatinus mutinensis Reitter, 1884 (N, S) (E)
Tychus florentinus Reitter, 1884 (N, S) (E)
Tychus hennensis Sabella & Poggi, 1986 (Si) (E)
Tychus monilicornis Reitter, 1880 (N, S, Si)
Tychus nebrodensis Sabella, 1992 (Si) (E)
Tychus niger (Paykull, 1800) (N, S, Sa?)
Tychus normandi Jeannel, 1950 (S, Sa)
Tychus pullus Kiesenwetter, 1858 (N, S)
Tychus rufopictus Reitter, 1881 (Sa) (E)
Tychus rufus Motschulsky, 1851 (N)
Tychus sardous Besuchet, 1964 (Sa) (E)
Tychus sbordonii Meggiolaro, 1967 (S) (E)
Tychus striola Guillebeau, 1888
Tychus striola striola Guillebeau, 1888 (N, S, Si?)
Tychus tritonus Doderò, 1919 (Sa)

Tychomorphus Jeannel, 1950

Tychomorphus cossyrensis (Doderò, 1919) (Si) (E)
Tychomorphus integer (Reitter, 1881) (Si)
Tychomorphus jacquelini (Boieldieu, 1859) (N, S, Si)

Rybaxis Saulcy, 1876

Rybaxis longicornis (Leach, 1817) (N, S, Si, Sa) (*)

Brachygluta C.G.Thomson, 1859

Brachygluta abrupta Doderò, 1919
Brachygluta abrupta abrupta Doderò, 1919 (Si) (E)
Brachygluta abrupta occidentalis Besuchet, 1963 (Sa)
Brachygluta abrupta septemtrionalis Besuchet, 1963 (N, S)
Brachygluta appennina (Saulcy, 1876) (N, S, Si)
Brachygluta corsica (Saulcy, 1876) (S, Sa)
Brachygluta dentiventris (Saulcy, 1876) (N, S, Si, Sa)
Brachygluta diecki (Saulcy, 1876) (N) (*)
Brachygluta fossulata (Reichenbach, 1816) (N, S, Si, Sa?)
Brachygluta furcata (Motschulsky, 1835)
Brachygluta furcata picciolii (Saulcy, 1876) (N, S) (E)
Brachygluta globulicollis (Mulsant & Rey, 1861)
Brachygluta globulicollis aubei (Tournier, 1867) (Si, Sa)
Brachygluta globulicollis globulicollis (Mulsant & Rey, 1861) (S)
Brachygluta guillemardi (Saulcy, 1876) (N, S, Si)
Brachygluta haematica (Reichenbach, 1816) (*)
Brachygluta haematica haematica (Reichenbach, 1816) (N, S)
Brachygluta haematica simplicior Raffray, 1904 (N, S)
Brachygluta haematica sinuata (Aubé, 1833) (N, S)
Brachygluta helferi (Schmidt-Goebel, 1836)

Brachygluta helferi helferi (Schmidt-Goebel, 1836) (N, S, Si, Sa)
Brachygluta lefebvrei (Aubé, 1833)
 Brachygluta lefebvrei lefebvrei (Aubé, 1833) (N, S, Si, Sa)
Brachygluta narentina Reitter, 1890
 Brachygluta narentina klimbschi Holdhaus, 1902 (N)
Brachygluta numidica (Saulcy, 1876) (Si, Sa)
Brachygluta pandellei (Saulcy, 1876) (N, S)
Brachygluta perforata (Aubé, 1833) (N, S, Si)
Brachygluta pirazzolii (Saulcy, 1876) (E)
 Brachygluta pirazzolii galathea (Saulcy, 1876) (S, Si)
 Brachygluta pirazzolii pirazzolii (Saulcy, 1876) (N, S)
Brachygluta ragusae (Saulcy, 1876) (S, Si)
Brachygluta revelierei (Saulcy, 1876) (S) (*)
Brachygluta sardoa (Saulcy, 1876) (Si, Sa)
Brachygluta schueppeli (Aubé, 1844) (N, S, Si, Sa)
Brachygluta sengleti Besuchet, 1969 (Sa) (E)
Brachygluta simplex Waterhouse, 1862 (*)
 Brachygluta simplex exigua Besuchet, 1963 (S?)
 Brachygluta simplex hipponensis (Saulcy, 1876) (S?, Si, Sa)
 Brachygluta simplex hispana Besuchet, 1963 (S?)
Brachygluta tibialis (Aubé, 1844) (N, S, Sa)
Brachygluta trigonoprocta (Ganglbauer, 1895) (N, S, Si)
Brachygluta tristis (Hampe, 1863) (N, S) (*)
Brachygluta xanthoptera (Reichenbach, 1816) (N, S, Si, Sa?)

Reichenbachia Leach, 1826

Reichenbachia chevrieri (Aubé, 1844) (N, S, Si, Sa)
Reichenbachia juncorum (Leach, 1817) (N, S)
Reichenbachia nigriventris (Schaum, 1859) (N, S, Si, Sa)

Trissemus Jeannel, 1949

Trissemus antennatus (Aubé, 1833)
 Trissemus antennatus antennatus (Aubé, 1833) (N, S, Si, Sa)
Trissemus olivieri (Raffray, 1871) (N, S, Si, Sa)

Fagniezia Jeannel, 1950

Fagniezia impressa (Panzer, 1805) (N, S, Si, Sa)

Pselaphaulax Reitter, 1909

Pselaphaulax dresdensis (Herbst, 1792)
 Pselaphaulax dresdensis dresdensis (Herbst, 1792) (N)
 Pselaphaulax dresdensis longicornis (Saulcy, 1863) (N, S)

Pselaphus Herbst, 1792

Pselaphus heisei Herbst, 1792

Pselaphus heisei parvus Karaman, 1940 (N, S) (E)

Dicentrius Reitter, 1882

Dicentrius aspromontanus (Reitter, 1910) (S) (E)

Dicentrius calabrus (Reitter, 1910) (S) (E)

Dicentrius carusoi (Sabella, 1992) (Si) (E)

Dicentrius conosternum (Holdhaus, 1905) (E)

Dicentrius conosternum argentarius (Holdhaus, 1910) (S)

Dicentrius conosternum conosternum (Holdhaus, 1905) (S)

Dicentrius conosternum gardinii (Castellini, 1983) (S)

Dicentrius cottianus (Doderò, 1919) (N) (E)

Dicentrius fiorii (Raffray, 1904) (N, S) (E)

Dicentrius grajus (Doderò, 1919) (N) (E)

Dicentrius latinus (Besuchet, 1980) (S) (E)

Dicentrius lepontinus (Besuchet, 1980) (N) (E)

Dicentrius lucanicus (Besuchet, 1964) (S) (E)

Dicentrius neapolitanus (Besuchet, 1964) (S) (E)

Dicentrius peloritanus (Holdhaus, 1910) (Si) (E)

Dicentrius quadricostatus (Reitter, 1884) (N) (E) (*)

Pselaphostomus Reitter, 1909

Pselaphostomus argutus (Reitter, 1881) (Sa) (E)

Pselaphostomus bergamascus Besuchet, 1980 (N) (E)

Pselaphostomus focarilei Besuchet, in litt. (Sa) (E) (*)

Pselaphostomus ganglbaueri (Reitter, 1881) (Sa) (E)

Pselaphostomus globiventris (Reitter, 1904) (Si) (E)

Pselaphostomus insulcatus (Doderò, 1919) (Sa) (E)

Pselaphostomus revelierei (Reitter, 1881) (Sa)

Pselaphostomus sardous (Doderò, 1919) (Sa) (E)

Pselaphostomus stussineri (Saulcy, 1881)

Pselaphostomus stussineri stussineri (Saulcy, 1881) (N, S)

Pselaphostomus stussineri vesulinus Besuchet, 1961 (N) (E)

Chennium Latreille, 1807

Chennium bituberculatum Latreille, 1807 (N, S)

Chennium eppelsheimi Reitter, 1887 (N) (E) (*)

Chennium insulare Doderò, 1919 (Sa) (E)

Chennium petri Raffray, 1915 (S) (E)

Chennium siculum Fiori, 1914 (Si) (E)

Chennium steigerwaldi Reitter, 1881 (N)

Centrotoma C.H.G. Heyden, 1849

Centrotoma lucifuga C.H.G. Heyden, 1849 (N, S)
Centrotoma ludyi Reitter, 1882 (N) (E)

Ctenistes Reichenbach, 1816

Ctenistes kiesenwetteri Saulcy, 1874 (Si)
Ctenistes palpalis Reichenbach, 1816 (N, S, Si, Sa)

Enoptostomus Schaum, 1864

Enoptostomus doderoi Reitter, 1884 (Sa)
Enoptostomus globulicornis (Motschulsky, 1851) (N, S)

Tyrus Aubé, 1833

Tyrus mucronatus (Panzer, 1805) (N, S)

Claviger Preyssler, 1790

Claviger apenninus Baudi, 1869 (E)
Claviger apenninus apenninus Baudi, 1869 (N, S)
Claviger apenninus besucheti Castellini, 1975 (S)
Claviger longicornis P.W. Müller, 1818 (N, S)
Claviger nebrodensis Ragusa, 1871 (Si) (E)
Claviger testaceus Preyssler, 1790 (N)

Note

Mayetia italica: La specie appartiene al subg. *Promayetia* Coiffait, 1962; tutte le altre specie appartengono al subg. nominale.

Biblopectus: Non si tiene conto di *B. minutissimus* (Aubé, 1833) perché non è accertabile a quale entità sia effettivamente da riferire la citazione di Aubé, che descrisse questa specie anche su un es. di Sicilia oggi non più a disposizione per controlli.

Euplectus decipiens: La confusione creatasi tra *E. decipiens* (= *duponti* sensu Reitter) e il vero *E. duponti* Aubé non permette al momento una attribuzione certa degli esemplari di Italia centrale citati in letteratura.

Euplectus duponti: La confusione creatasi tra *E. decipiens* (= *duponti* sensu Reitter) e il vero *E. duponti* Aubé non permette al momento una attribuzione certa degli esemplari di Italia centrale citati in letteratura.

Plectophloeus binaghii: Sconfina in Svizzera, nel Canton Ticino meridionale.

Meliceria italica: Sconfina in Slovenia, nell'Alto Isonzo (Kamno).

Trogaster devillei: Presente in S solo nell'Isola d'Elba.

Pygoxyon lombardum: Sconfina in Svizzera, nel Canton Ticino meridionale.

Tychobythinus aymerichi: Compresa la "var." *lapidicola* (Dodero, 1919).

Bryaxis: Molte delle specie appartenenti a questo genere sono state in passato attribuite al gen. *Bythinus* Leach.

Bryaxis lagari: Sconfina in Svizzera, nel Canton Ticino meridionale.

Tychus: Non si tiene conto di *T. castaneus* Aubé, 1844, indicato di Sicilia nella descrizione

originale forse a seguito di un errore di località e ricitato da Vitale nel 1910 forse per un errore di identificazione.

Rybaxis longicornis: Compresa la morfa maschile laminata (Motschulsky, 1836), a lungo isolata a livello specifico proprio per le notevoli differenze morfologiche esterne ed edeagiche.

Brachygluta diecki: Sconfina dalla Francia nell'estremo ponente ligure.

Brachygluta haematica: Le due sottospecie non nominali sono probabilmente da elevare a livello specifico; la distribuzione italiana va riesaminata.

Brachygluta revelierei: Presente in S solo nell'Isola d'Elba.

Brachygluta simplex: Il valore delle "sottospecie" va rivisto e conseguentemente vanno riconsiderate le citazioni relative all'Italia centromeridionale.

Brachygluta tristis: Compresa la "m." vicaria Besuchet, 1963.

Dicentrius quadricostatus: Modesti sconfinamenti in Svizzera al Sempione e in Canton Ticino (Centovalli).

Pselaphostomus focarilei: Specie inedita di Sardegna S-W, ma già citata in letteratura (cfr. Casale A., 1985, Annali Mus. civ. St. nat. G. Doria, Genova, 85: 266).

Chennium eppelsheimi: La validità della specie resta da verificare.

Psephenidae

Eubria Germar, 1818

Eubria palustris Germar, 1818 (N, S, Si)

Ptiliidae

Nossidium Erichson, 1845

Nossidium flachi Ganglbauer, 1899 (N, S)

Nossidium pilosellum (Marsham, 1802) (N, S)

Ptenidium Erichson, 1845

Ptenidium brenskei Flach, 1887 (N?)

Ptenidium doderoi Flach, in litt. (Sa) (*)

Ptenidium formicetorum Kraatz, 1851 (N, S, Sa)

Ptenidium fuscicorne Erichson, 1845 (N, S)

Ptenidium gressneri Erichson, 1845 (N?, S?)

Ptenidium insulare Flach, 1889 (S, Sa)

Ptenidium intermedium Wankowicz, 1869 (N, S, Si, Sa)

Ptenidium laevigatum Erichson, 1845 (S, Si, Sa)

Ptenidium laevipenne Abeille, 1904 (S)

Ptenidium longicorne Fuss, 1868 (N, S)

Ptenidium nitidum (Heer, 1841) (N, S)

Ptenidium punctatum (Gyllenhal, 1827) (N)

Ptenidium pusillum (Gyllenhal, 1808) (N, S, Si, Sa)

Ptenidium reitteri Flach, 1887 (N, S)

Ptenidium turgidum C.G. Thomson, 1855 (N, S)

Actidium Matthews, 1868

Actidium aterrimum (Motschulsky, 1845) (S, Si, Sa)

Actidium boudieri (Allibert, 1844) (N, S)

Actidium coarctatum (Haliday, 1855) (N, S, Si, Sa)

Actidium kraatzi Flach, 1889 (N, Si)

Oligella Motschulsky, 1869

Oligella foveolata (Allibert, 1844) (N, S, Si, Sa)

Micridium Motschulsky, 1869

Micridium angulicolle (Fairmaire, 1857) (N?, S?)

Micridium halidaii (Matthews, 1868) (Si)

Ptilium Gyllenhal, 1827

Ptilium affine Erichson, 1845 (N, S, Sa)

Ptilium caesum Erichson, 1845 (N, S, Si)

Ptilium canaliculatum Erichson, 1845 (N, S)

Ptilium exaratum (Allibert, 1844) (N, S, Sa)

Ptilium latum (Gillmeister, 1845) (N)

Ptilium minutissimum (Ljungh, 1804) (N) (*)

Ptilium modestum Wankowicz, 1869 (N)

Ptilium myrmecophilum (Allibert, 1844) (N?)

Ptilium tenue Kraatz, 1858 (N, S)

Ptilium vexans Flach, 1889 (S)

Euryptilium Matthews, 1872

Euryptilium gillmeisteri Flach, 1889 (N, S)

Euryptilium saxonicum Gillmeister, 1845 (N, S, Si)

Ptiliola Haldeman, 1849

Ptiliola kunzei (Heer, 1841) (N, S, Si, Sa)

Ptiliolium Flach in Seidlitz, 1888

Ptiliolium africanum Peyerimhoff, 1917 (S, Si)

Ptiliolium caledonicum (Sharp, 1871) (N, S)

Ptiliolium depressum (Motschulsky, 1845) (N?, S?)

Ptiliolium fuscum (Erichson, 1845) (N, S, Si)

Ptiliolium hopffgarteni Flach, 1888 (N, S, Si)

Ptiliolium marginatum (Aubé, 1850) (S)

Ptiliolum oedipus (Flach, 1886) (S)
Ptiliolum sahlbergi (Flach, 1888) (N)
Ptiliolum schwarzi (Flach, 1887) (N, S, Si)
Ptiliolum spencei (Allibert, 1844) (N, S, Si, Sa)

Microptilium Matthews, 1872

Microptilium pulchellum (Allibert, 1844) (N, S)

Ptinella Motschulsky, 1845

Ptinella aptera (Guérin-Méneville, 1839) (N, S, Sa)
Ptinella britannica Matthews, 1858 (S)
Ptinella denticollis (Fairmaire, 1857) (N, S, Si, Sa)
Ptinella limbata (Heer, 1841) (N, S)
Ptinella mekura Kubota, 1943 (N, S)
Ptinella perrini Reitter, 1906 (N?, S?)
Ptinella tenella (Erichson, 1845) (S)

Pteryx Matthews, 1858

Pteryx ganglbaueri Ericson, 1909 (S) (E)
Pteryx suturalis (Heer, 1841) (N, S, Si)

Astatopteryx Perris, 1862

Astatopteryx laticollis Perris, 1862 (N, S)

Nephanes C.G. Thomson, 1859

Nephanes titan (Newman, 1834) (N, S, Si, Sa)

Smicrus Matthews, 1872

Smicrus filicornis (Fairmaire & Laboulbène, 1855) (N, S)

Baeocrara C.G. Thomson, 1859

Baeocrara variolosa Mulsant & Rey, 1867 (N)

Actinopteryx Matthews, 1872

Actinopteryx fucicola (Allibert, 1844) (N, S, Si, Sa)

Acrotrichis Motschulsky, 1850

Acrotrichis atomaria (Degeer, 1774) (N, S, Si, Sa)
Acrotrichis brevipennis (Erichson, 1845) (N, S, Si)

Acrotrichis chevrolati (Allibert, 1844) (N, S)
Acrotrichis dispar (Matthews, 1865) (N)
Acrotrichis fascicularis (Herbst, 1793) (N, S, Si, Sa)
Acrotrichis grandicollis (Mannerheim, 1844) (N, S, Si, Sa) (*)
Acrotrichis intermedia (Gillmeister, 1845) (N, S, Si, Sa)
Acrotrichis montandoni (Allibert, 1844) (N, S, Si) (*)
Acrotrichis pumila (Erichson, 1845) (N) (*)
Acrotrichis rosskotheni Sundt, 1971 (N, S, Si, Sa)
Acrotrichis sericans (Heer, 1841) (N, S, Si)
Acrotrichis sitkaensis (Motschulsky, 1845) (S)
Acrotrichis thoracica (Waltl, 1838) (N, S, Si, Sa)

Note

Ptenidium: Le specie 001.0 e 007.0 appartengono al subg. Wankowiczium Flach, 1889; le specie 002.0, 008.0, 009.0 e 015.0 appartengono al subg. Matthewsium Flach, 1889; le specie 003.0, 004.0, 010.0, 012.0 e 013.0 appartengono al subg. nominale; la specie 005.0 appartiene al subg. Gressnerium Ganglbauer, 1899; le specie 006.0, 011.0 e 014.0 appartengono al subg. Gillmeisterium Flach, 1889.

Ptenidium doderoi: La specie non è descritta, ma è citata e sparsa in varie collezioni.

Ptilium minutissimum: La specie appartiene al subg. Millidium Motschulsky, 1855; tutte le altre specie appartengono al subg. nominale.

Acrotrichis grandicollis: Con la 008.0 appartiene al subg. Ctenopteryx Flach, 1889; tutte le altre specie appartengono al subg. nominale.

Acrotrichis montandoni: Con la 006.0 appartiene al subg. Ctenopteryx Flach, 1889; tutte le altre specie appartengono al subg. nominale.

Acrotrichis pumila: Se la sinonimia dovesse essere confermata, la specie dovrebbe essere indicata per priorità col nome di picicornis (Mannerheim, 1843).

Ptinidae

Dignomus (Dignomus) Wollaston, 1862

Dignomus (Dignomus) brevicrinatus (Desbrochers, 1871) (N, S, Sa) (*)
Dignomus (Dignomus) brevipilis (Desbrochers, 1875) (S, Si, Sa)
Dignomus (Dignomus) carinatus (Lucas, 1847) (S, Si)
Dignomus (Dignomus) dilophus (Illiger, 1807) (Sa)
Dignomus (Dignomus) irroratus (Kiesenwetter, 1851) (N, S) (*)
Dignomus (Dignomus) lusitanus (Illiger, 1807) (N, Sa)
Dignomus (Dignomus) nitidus (Duftschmid, 1825) (N?) (*)
Dignomus (Dignomus) reichei (Boieldieu, 1854) (N, Si, Sa)

Ptinus (Tectoptynus) lablokoff-Khnzorian & Karapetian, 1991

Ptinus (Tectoptynus) tectus Boieldieu, 1856 (N?, S) (*)

Ptinus (Gynopterus) Mulsant & Rey, 1868

Ptinus (Gynopterus) aubei Boieldieu, 1854 (N, S, Si, Sa)
Ptinus (Gynopterus) crassicornis Kiesenwetter, 1877 (N?, S?) (*)
Ptinus (Gynopterus) dubius Sturm, 1837 (N, S, Sa)
Ptinus (Gynopterus) sexpunctatus Panzer, 1789 (N, S, Si, Sa)
Ptinus (Gynopterus) subroseus (Reitter, 1888) (Si?) (*)
Ptinus (Gynopterus) variegatus Rossi, 1792 (N, S, Si, Sa) (*)

***Ptinus (Bruchoptinus)* Reitter, 1884**

Ptinus (Bruchoptinus) femoralis (Reitter, 1884) (S, Si)
Ptinus (Bruchoptinus) italicus Aragona, 1830 (N, S, Si)
Ptinus (Bruchoptinus) palliatus Perris, 1847 (S, Si) (*)
Ptinus (Bruchoptinus) rufipes Olivier, 1790 (N, S)

***Ptinus (Pseudoptinus)* Reitter, 1884**

Ptinus (Pseudoptinus) auberti Abeille de Perrin, 1869 (S)
Ptinus (Pseudoptinus) capellae Reitter, 1879 (N)
Ptinus (Pseudoptinus) coarcticollis Sturm, 1837 (N?) (*)
Ptinus (Pseudoptinus) indutus Abeille de Perrin, 1894 (N?, S?) (*)
Ptinus (Pseudoptinus) lichenum (Marsham, 1802) (N, S, Si, Sa)
Ptinus (Pseudoptinus) spissicornis Abeille de Perrin, 1894 (N?) (*)

***Ptinus (Ptinus)* Linné, 1767**

Ptinus (Ptinus) affinis Desbrochers, 1871 (Si) (*)
Ptinus (Ptinus) atricapillus Kiesenwetter, 1877 (S, Si)
Ptinus (Ptinus) bicinctus Dahl, 1823 (N, S, Sa) (*)
Ptinus (Ptinus) calcaratus Kiesenwetter, 1877 (N, S, Si, Sa)
Ptinus (Ptinus) clavipes Panzer, 1792 (N, S, Si, Sa) (*)
Ptinus (Ptinus) corsicus Kiesenwetter, 1877 (S, Sa)
Ptinus (Ptinus) desbrochersi (Reitter, 1884) (Si)
Ptinus (Ptinus) ellipticus (Reitter, 1894) (S) (E)
Ptinus (Ptinus) fur (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)
Ptinus (Ptinus) leprieuri Pic, 1896 (S) (*)
Ptinus (Ptinus) mobilis Moore, 1957 (N, S, Si, Sa) (*)
Ptinus (Ptinus) nigripennis Comolli, 1837 (N) (E) (*)
Ptinus (Ptinus) obesus Lucas, 1847 (N, S, Si, Sa) (*)
Ptinus (Ptinus) perplexus Mulsant & Rey, 1868 (N, S)
Ptinus (Ptinus) perrini (Reitter, 1884) (S)
Ptinus (Ptinus) phlomidis Boieldieu, 1854 (S, Si)
Ptinus (Ptinus) pilosus P.W.J. Müller, 1821 (N, S, Si, Sa)
Ptinus (Ptinus) pusillus Sturm, 1837 (N, S, Si, Sa)
Ptinus (Ptinus) reitteri Pic, 1894 (Si, Sa) (*)
Ptinus (Ptinus) spitzyi A. Villa & G.B. Villa, 1838 (N, S, Sa)
Ptinus (Ptinus) subpillosus Sturm, 1837 (N, S, Sa)
Ptinus (Ptinus) tarsalis (Reitter, 1884) (S, Sa)

Ptinus (Cyphoderes) Mulsant & Rey, 1868

- Ptinus (Cyphoderes) bidens* Olivier, 1790 (N, S)
- Ptinus (Cyphoderes) hirticornis* Kiesenwetter, 1867 (S)
- Ptinus (Cyphoderes) raptor* Sturm, 1837 (N, S)

Niptus (Niptus) Boieldieu, 1856

- Niptus (Niptus) hololeucus* (Faldermann, 1835) (N, S)

Epaulaecus Mulsant & Rey, 1868

- Epaulaecus unicolor* (Piller & Mitterpacher, 1783) (N, S)

Eurostodes Reitter, 1884

- Eurostodes quisquiliarum* (Baudi, 1874) (N)

Pseudeurostus L. von Heyden, 1906

- Pseudeurostus apenninus* (Baudi, 1874) (N, S, Si) (E)
- Pseudeurostus frigidus* (Boieldieu, 1854) (N)

Niptodes Reitter, 1884

- Niptodes elongatus* (Boieldieu, 1854) (Si)
- Niptodes nobilis* (Reitter, 1884) (Si)
- Niptodes reitteri* (Pic, 1895) (Si)

Paraniptus Kiesenwetter, 1877

- Paraniptus globulus* (Illiger, 1807) (Si?) (*)

Sphaericus Wollaston, 1854

- Sphaericus exiguus* (Boieldieu, 1854) (S, Si, Sa)
- Sphaericus gibboides* (Boieldieu, 1854) (N, S, Si, Sa)

Gibbium Scopoli, 1777

- Gibbium boieldieui* Levrat, 1857 (N?) (*)
- Gibbium psylloides* (Czenpinski, 1778) (N, S, Si, Sa)

Mezium Curtis, 1828

- Mezium affine* Boieldieu, 1856 (N, S, Si, Sa)
- Mezium americanum* Laporte de Castelnau, 1840 (S, Sa) (*)

Mezium sulcatum (Fabricius, 1781) (N, Si, Sa)

Note

Dignomus (Dignomus) brevicrinus: Secondo alcuni autori è probabilmente sinonimo di *Dignomus reichei* (cfr. Porta, 1929).

Dignomus (Dignomus) irroratus: Secondo alcuni autori (cfr. Freude, 1969; Lucht, 1987) la specie è stata descritta da Küster nel 1851.

Dignomus (Dignomus) nitidus: Presenza dubbia o comunque marginale sui confini Ovest ed Est.

Ptinus (Tectoptynus) tectus: Specie originaria della regione australiana, attualmente cosmopolita, importata a Bari nel 1961 con un carico di stoccafisso norvegese e rinvenuta nel 1964 (ma determinazione dubbia) su pasta in due località dell'Emilia-Romagna.

Ptinus (Gynopterus) crassicornis: Specie descritta e segnalata genericamente di "Italia" (cfr. Luigioni, 1929; Porta, 1929; Iablokoff-Khnzorian & Karapetian, 1991).

Ptinus (Gynopterus) subroseus: Secondo alcuni autori il materiale siciliano è stato male determinato o forse si tratta di un sinonimo di *Ptinus (Ptinus) lichenum* (cfr. Porta, 1929:423 nota).

Ptinus (Gynopterus) variegatus: Alcuni autori considerano duvali specie valida (cfr. Porta, 1929).

Ptinus (Bruchoptinus) palliatus: Specie tradizionalmente attribuita al sottogenere *Gynopterus*.

Ptinus (Pseudoptinus) coarcticollis: Presenza dubbia o comunque marginale lungo i confini Ovest e Nord-Est.

Ptinus (Pseudoptinus) indutus: Specie descritta su materiale proveniente "probabilmente" da Mentone (Francia); successivamente indicata genericamente delle Alpi Marittime e segnalata con dubbio del Vulture (Basilicata) (cfr. Porta, 1929).

Ptinus (Pseudoptinus) spissicornis: Specie quasi sicuramente estranea alla fauna italiana; descritta su materiale proveniente "probabilmente" da Mentone (Francia) e successivamente indicata genericamente delle Alpi Marittime.

Ptinus (Ptinus) affinis: Specie subendemica segnalata anche di Malta.

Ptinus (Ptinus) bicinctus: Specie tradizionalmente attribuita a Sturm, 1837 (cfr. Iablokoff-Khnzorian & Karapetian, 1991).

Ptinus (Ptinus) clavipes: Per le complesse vicende sistematico-nomenclatoriali vedi Woodroffe (1958) e Iablokoff-Khnzorian & Karapetian (1991).

Ptinus (Ptinus) leprieuri: In Italia segnalata solo di Calabria (cfr. Luigioni, 1929; Porta, 1929) come *Ptinus (Ptinus) leprieuri* var. *calabricus*; per stabilire lo status di tale taxon sarà necessario esaminare la serie tipica.

Ptinus (Ptinus) mobilis: Specie costituita da sole femmine triploidi che si riproducono per partenogenesi ginogenetica dopo che le uova sono state "attivate", ma non fecondate, da spermatozoi di *Ptinus (Ptinus) clavipes*, specie da cui si è evoluta, o di *P. (P.) pusillus* o di *P. (P.) fur* (cfr. Woodroffe, 1958).

Ptinus (Ptinus) nigripennis: Specie proveniente dai Colli della Brianza (Lombardia) e nota solo sulla base della descrizione originale (cfr. Porta, 1929); per stabilirne lo status sarà necessario esaminare la serie tipica.

Ptinus (Ptinus) obesus: Per stabilire lo status della var. *ater*, descritta di Sicilia, sarà necessario esaminare la serie tipica.

Ptinus (Ptinus) reitteri: Secondo alcuni autori *leonhardi* è specie valida (cfr. Porta, 1929).

Paraniptus globulus: Specie probabilmente endemica, ma segnalata con dubbio dell'Algeria.

Gibbium: In Italia è probabilmente presente anche *Gibbium aequinoctiale* Boieldieu, 1854, specie praticamente cosmopolita spesso confusa con *G. psylloides* (cfr. Bellés, 1985).

Gibbium boieldieui: In passato confusa con *Gibbium psylloides*; una segnalazione per il Friuli-Venezia Giulia necessita di conferma.

Mezium americanum: Specie paracosmopolita, probabilmente di origine americana.

Pyrochroidae

Pyrochroa O.F. Müller, 1764

Pyrochroa coccinea (Linnaeus, 1761) (N, S)

Pyrochroa serraticornis (Scopoli, 1763)

Pyrochroa serraticornis serraticornis (Scopoli, 1763) (N, S)

Pyrochroa serraticornis kiesenwetteri Fairmaire, 1849 (S, Si) (E)

Schizotus Newman, 1838

Schizotus pectinicornis (Linnaeus, 1758) (N)

Pythidae

Pytho Latreille, 1796

Pytho depressus (Linnaeus, 1767) (N)

Rhipiphoridae

Ptilophorus Dejean, 1833

Ptilophorus dufouri (Latreille, 1817) (S, Sa)

Macrosiagon Hentz, 1830

Macrosiagon ferrugineum (Fabricius, 1773) (N, S, Si, Sa)

Macrosiagon meridionale (Costa, 1859) (S) (E)

Macrosiagon praeustum Gebler, 1830 (N, Si, Sa)

Macrosiagon tricuspdatum (Lepechin, 1774) (N, S, Sa)

Metoeacus Dejean, 1834

Metoeacus paradoxus (Linnaeus, 1761) (N, S, Si, Sa)

Rhipiphorus Bosc d'Antic, 1792

Rhipiphorus subdipterus Bosc d'Antic, 1792 (N, S, Si, Sa)

Rhipidius Thunberg, 1806

Rhipidius quadriceps Abeille de Perrin, 1872 (N)

Rhizostylops Silvestri, 1906

Rhizostylops inquirendus Silvestri, 1906 (S) (E)

Rhizophagidae

Cyanostolus Ganglbauer, 1899

Cyanostolus aeneus (Richter, 1820) (N, S)

Rhizophagus Herbst, 1793

Rhizophagus bipustulatus (Fabricius, 1792) (N, S, Si, Sa)

Rhizophagus brancsiki Reitter, 1905 (N) (*)

Rhizophagus cribratus Gyllenhal, 1827 (N, S)

Rhizophagus depressus (Fabricius, 1792) (N, S)

Rhizophagus dispar (Paykull, 1800) (N, S, Si, Sa)

Rhizophagus ferrugineus (Paykull, 1800) (N, S)

Rhizophagus grandis Gyllenhal, 1827 (N)

Rhizophagus nitidulus (Fabricius, 1798) (N, S, Si, Sa)

Rhizophagus oblongicollis Blatch & Horner, 1892 (N)

Rhizophagus parallelcollis Gyllenhal, 1827 (N, S, Si?, Sa?)

Rhizophagus parvulus (Paykull, 1800) (N, S)

Rhizophagus perforatus Erichson, 1845 (N, S, Si, Sa) (*)

Rhizophagus picipes (G.A. Olivier, 1790) (N, S, Sa)

Rhizophagus puncticollis C.R. Sahlberg, 1837 (N?) (*)

Rhizophagus unicolor Lucas, 1846 (S, Si, Sa)

Monotoma Herbst, 1793

Monotoma angusticollis Gyllenhal, 1827 (N, S, Si, Sa)

Monotoma bicolor A. Villa & G.B. Villa, 1835 (N, S, Si, Sa)

Monotoma brevicollis Aubé, 1837 (N, S, Si, Sa)

Monotoma conicicollis Aubé, 1837 (N)

Monotoma diecki Reitter, 1877 (N, S, Si, Sa)

Monotoma gotzi Holzschuh & Lohse, 1981 (N?) (*)

Monotoma longicollis (Gyllenhal, 1827) (N, S, Sa)

Monotoma picipes Herbst, 1793 (N, S, Si, Sa)

Monotoma punctaticollis Aubé, 1843 (N, S, Si?, Sa)

Monotoma quadrifoveolata Aubé, 1837 (N, S, Si, Sa)

Monotoma spinicollis Aubé, 1837 (N, S, Si, Sa)

Monotoma testacea Motschulsky, 1845 (N, S?, Sa?)

Note

Rhizophagus brancsiki: Presenza dubbia in Friuli orientale.

Rhizophagus perforatus: Lo status tassonomico dei vari taxa descritti in Europa nell'ambito del complesso di *Rhizophagus perforatus* deve ancora essere chiarito; per il momento è forse più opportuno includerli tutti sotto il nome di *R. perforatus* s.l..

Rhizophagus puncticollis: Presenza dubbia in Friuli orientale.

Monotoma gotzi: Possibile presenza marginale al confine nord-orientale.

Rhynchophoridae

Dryophthorus Schönherr, 1826

Dryophthorus corticalis (Paykull, 1792) (N, S, Si, Sa)

Sphenophorus Schönherr, 1838

Sphenophorus abbreviatus (Fabricius, 1787) (N, S, Si, Sa)

Sphenophorus meridionalis (Gyllenhal, 1837) (S, Si, Sa)

Sphenophorus parumpunctatus (Gyllenhal, 1837) (S, Si, Sa)

Sphenophorus piceus (Pallas, 1776) (N, S, Si, Sa)

Sphenophorus striatopunctatus (Goeze, 1777) (S, Si, Sa)

Sitophilus Schönherr, 1838

Sitophilus granarius (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)

Sitophilus linearis (Herbst, 1795) (N)

Sitophilus oryzae (Linné, 1763) (N, S, Si, Sa)

Sitophilus zeamais Motschulsky, 1855 (N?, S, Si?, Sa?) (*)

Note

Sitophilus zeamais: Specie confusa con *S. oryzae* e probabilmente diffusa in tutta Italia.

Rutelidae

Mimela Kirby, 1825

Mimela aurata (Fabricius, 1801)

Mimela aurata aurata (Fabricius, 1801) (N)

Mimela junii (Duftschmid, 1805)

Mimela junii junii (Duftschmid, 1805) (N, S)

Mimela junii calabrica Machatschke, 1952 (S, Si) (E)

Mimela junii gigliocola Machatschke, 1952 (S) (E)

Mimela junii rugosula Fairmaire, 1859 (Sa)

Anomala (Anomala) Samouelle, 1819

Anomala (Anomala) ausonia Erichson, 1847 (S, Si)
Anomala (Anomala) dubia (Scopoli, 1763) (N, S, Si, Sa)
Anomala (Anomala) vitis (Fabricius, 1775) (N, S)

Anomala (Dichomala) Reitter, 1903

Anomala (Dichomala) devota (Rossi, 1790) (S)

Phyllopertha Stephens, 1830

Phyllopertha horticola (Linné, 1758) (N)

Exomala Reitter, 1903

Exomala campestris (Latreille, 1804) (N, S)
Exomala leonii (Luigioni, 1933) (S, Si) (E)

Hemichaetoptia Baraud, 1986

Hemichaetoptia pallidipennis (Gyllenhal, 1817) (Sa)

Anisoplia (Anisoplia) Fischer, 1824

Anisoplia (Anisoplia) bromicola (Germar, 1817) (N)
Anisoplia (Anisoplia) monticola Erichson, 1847
 Anisoplia (Anisoplia) monticola monticola Erichson, 1847 (N, S)
 Anisoplia (Anisoplia) monticola marginata Kraatz, 1883 (S, Si)
Anisoplia (Anisoplia) sabatinellii Baraud, 1991 (S) (E)
Anisoplia (Anisoplia) tempestiva Erichson, 1847 (N, S, Si, Sa)
Anisoplia (Anisoplia) villosa (Goeze, 1777) (N, S)

Salpingidae

Lissodema (Lissodema) Curtis, 1833

Lissodema (Lissodema) cursor (Gyllenhal, 1813) (N)
Lissodema (Lissodema) denticolle (Gyllenhal, 1813) (N, S)

Lissodema (Stenolissodema) Desbrochers, 1900

Lissodema (Stenolissodema) lituratum Costa, 1847 (N, S, Si, Sa)

Colposis Mulsant, 1859

Colposis mutilatus (Beck, 1817) (N)

Rabocerus Mulsant, 1859

Rabocerus foveolatus (Ljungh, 1823) (N, S)

Rabocerus gabrieli (Gerhardt, 1901) (N)

Salpingus (Sphaeriestes) Stephens, 1829

Salpingus (Sphaeriestes) castaneus (Panzer, 1796) (N)

Salpingus (Salpingus) Illiger, 1801

Salpingus (Salpingus) aeratus Mulsant, 1859 (N)

Salpingus (Salpingus) bimaculatus Gyllenhal, 1810 (N)

Salpingus (Salpingus) reyi (Abeille de Perrin, 1874) (N, S, Sa)

Salpingus (Salpingus) stockmanni Biström, 1977 (N, Si)

Vincenzellus Reitter, 1911

Vincenzellus ruficollis (Panzer, 1794) (N, S)

Rhinosimus (Rhinosimus) Latreille, 1802

Rhinosimus (Rhinosimus) ruficollis (Linnaeus, 1761) (N, S)

Rhinosimus (Cariderus) Mulsant, 1859

Rhinosimus (Cariderus) aeneus Olivier, 1807 (S, Si)

Rhinosimus (Cariderus) planirostris (Fabricius, 1787) (N, S, Si, Sa)

Rhinosimus (Cariderus) tapirus Abeille de Perrin, 1874 (Si, Sa)

Scaphidiidae

Scaphidium G.A. Olivier, 1790

Scaphidium quadrimaculatum G.A. Olivier, 1790 (N, S, Si)

Scaphium Kirby, 1837

Scaphium immaculatum (G.A. Olivier, 1790) (N, S, Si)

Baeocera Erichson, 1845

Baeocera nobilis Reitter, 1884 (N, S, Si, Sa) (*)

Baeocera schirmeri Reitter, 1881 (N, S)

Caryoscapha Ganglbauer, 1899

Caryoscapha limbatum (Erichson, 1845) (S, Si, Sa)

Scaphisoma Leach, 1815

Scaphisoma agaricinum (Linnaeus, 1758) (N, S)

Scaphisoma assimile Erichson, 1845 (N)

Scaphisoma balcanicum Tamanini, 1954 (N, S)

Scaphisoma boleti (Panzer, 1793) (N, S)

Scaphisoma boreale Lundblad, 1952 (N, S)

Scaphisoma flavonotatum Pic, 1905 (Sa)

Scaphisoma inopinatum Löbl, 1967 (N)

Scaphisoma italicum Tamanini, 1955 (S)

Scaphisoma loebli Tamanini, 1969 (N, S, Sa)

Scaphisoma obenbergeri Löbl, 1963 (S) (*)

Scaphisoma palumboi (Ragusa, 1892) (Si) (E) (*)

Scaphisoma ruffoi Tamanini, 1969 (Sa) (E)

Scaphisoma subalpinum Reitter, 1881 (N, S, Si)

Note

Baeocera nobilis: In N nota solo della Liguria.

Scaphisoma obenbergeri: Dati inediti di Löbl e Angelini per la Basilicata.

Scaphisoma palumboi: La valutazione di *S. palumboi* (Ragusa, 1892) di Sicilia, di *S. ruffoi* Tamanini, 1969 di Sardegna e di *S. erratum* Löbl 1965 del Nord Africa al rango di semispecie distinte o sottospecie di un'unica specie ha un carattere piuttosto soggettivo; in questa sede si preferisce ritenerle semispecie distinte.

Scarabaeidae

Scarabaeus (Scarabaeus) Linné, 1758

Scarabaeus (Scarabaeus) sacer Linné, 1758 (N, S, Si, Sa)

Scarabaeus (Scarabaeus) typhon Fischer von Waldheim, 1823 (N, S, Si, Sa)

Scarabaeus (Scarabaeus) pius Illiger, 1803 (N)

Scarabaeus (Ateuchetus) Bedel, 1892

Scarabaeus (Ateuchetus) laticollis Linné, 1767 (N, S, Si, Sa)

Scarabaeus (Ateuchetus) semipunctatus Fabricius, 1792 (N, S, Si, Sa)

Scarabaeus (Ateuchetus) variolosus Fabricius, 1787 (N, S, Si, Sa?)

Gymnopleurus Illiger, 1803

Gymnopleurus flagellatus (Fabricius, 1787) (N, S, Si?, Sa?)

Gymnopleurus geoffroyi (Fuessly, 1775) (N, S, Sa?)

Gymnopleurus mopsus (Pallas, 1781) (N, S, Si, Sa)
Gymnopleurus sturmi Macleay, 1821 (N, S, Si, Sa)

Sisyphus Latreille, 1807

Sisyphus schaefferi (Linné, 1785)
Sisyphus schaefferi schaefferi (Linné, 1785) (N, S, Si, Sa)

Copris Geoffroy, 1762

Copris lunaris (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa?)
Copris umbilicatus Abeille de Perrin, 1901 (N, S)
Copris hispanus (Linné, 1764)
Copris hispanus hispanus (Linné, 1764) (Sa)
Copris hispanus cavolinii (Petagna, 1792) (N, S, Si)

Chironitis Lansberge, 1875

Chironitis hungaricus (Herbst, 1789) (N)
Chironitis irroratus (Rossi, 1790) (S, Si, Sa) (*)
Chironitis furcifer (Rossi, 1792) (N, S, Si, Sa)

Onitis Fabricius, 1798

Onitis alexis Klug, 1835
Onitis alexis septentrionalis Balthasar, 1942 (Si)
Onitis belial Fabricius, 1798 (N, Sa?)
Onitis ion (Olivier, 1789) (S, Si, Sa?)

Bubas Mulsant, 1842

Bubas bison (Linné, 1767) (N, S, Si, Sa)

Euoniticellus Janssens, 1953

Euoniticellus fulvus (Goeze, 1777) (N, S, Si, Sa)
Euoniticellus intermedius (Reiche, 1849) (S) (*)
Euoniticellus pallens (Olivier, 1789) (Si, Sa)
Euoniticellus pallipes (Fabricius, 1781) (N, S, Si, Sa)

Caccobius Thomson, 1863

Caccobius schreberi (Linné, 1767) (N, S, Si, Sa)

Euonthophagus Balthasar, 1959

Euonthophagus amyntas (Olivier, 1789) (N, S, Si, Sa?)
Euonthophagus gibbosus (Scriba, 1790) (N, S)

***Onthophagus (Furconthophagus)* Zunino, 1979**

Onthophagus (Furconthophagus) furcatus (Fabricius, 1781) (N, S, Si, Sa?)

***Onthophagus (Onthophagus)* Latreille, 1802**

Onthophagus (Onthophagus) illyricus (Scopoli, 1763) (N, S)

Onthophagus (Onthophagus) taurus (Schreber, 1759) (N, S, Si, Sa)

***Onthophagus (Paleonthophagus)* Zunino, 1979**

Onthophagus (Paleonthophagus) andalusicus Walzl, 1835 (S, Si) (*)

Onthophagus (Paleonthophagus) baraudi Nicolas, 1964 (N, S?)

Onthophagus (Paleonthophagus) coenobita (Herbst, 1783) (N, S, Si, Sa?)

Onthophagus (Paleonthophagus) fracticornis (Preyssler, 1790) (N, S, Si, Sa)

Onthophagus (Paleonthophagus) massai Baraud, 1975 (Si) (E) (*)

Onthophagus (Paleonthophagus) gibbulus (Pallas, 1781) (N)

Onthophagus (Paleonthophagus) grossepunctatus Reitter, 1905 (N, S, Si)

Onthophagus (Paleonthophagus) joannae Goljan, 1953 (N, S)

Onthophagus (Paleonthophagus) lemur (Fabricius, 1781) (N, S, Si)

Onthophagus (Paleonthophagus) nuchicornis (Linné, 1758) (N, S?, Si?)

Onthophagus (Paleonthophagus) opacicollis Reitter, 1892 (N, S, Si, Sa)

Onthophagus (Paleonthophagus) ovatus (Linné, 1767) (N, S)

Onthophagus (Paleonthophagus) ruficapillus Brullé, 1832 (N, S, Si, Sa)

Onthophagus (Paleonthophagus) semicornis (Panzer, 1798) (N, S, Si)

Onthophagus (Paleonthophagus) vacca (Linné, 1767) (N, S, Si, Sa)

Onthophagus (Paleonthophagus) verticicornis (Laicharting, 1781) (N, S, Si, Sa?)

Onthophagus (Paleonthophagus) vitulus (Fabricius, 1776) (N)

***Onthophagus (Parentius)* Zunino, 1979**

Onthophagus (Parentius) punctatus (Illiger, 1803) (N)

***Onthophagus (Trichonthophagus)* Zunino, 1979**

Onthophagus (Trichonthophagus) maki (Illiger, 1803) (N, S)

Note

Chironitis irroratus: Secondo Martín Piera (1987) sarebbe una sottospecie di *hungaricus*; opinione non condivisa da Baraud (1992).

Euoniticellus intermedius: Antico reperto. Specie sicuramente introdotta dall'Africa.

Onthophagus (Paleonthophagus) andalusicus: Secondo Martín Piera & Zunino (1981) si tratta di una sottospecie di *marginalis* Gebler, 1817; opinione non condivisa da Baraud (1992).

Onthophagus (Paleonthophagus) massai: Ritenuta sinonimo di *fracticornis* da Palestini (1981), sarebbe specie valida secondo Baraud (1992) e Pittino (in verbis).

Scirtidae

Elodes Latreille, 1796

- Elodes angelinii* (Klausnitzer, 1987) (S) (E)
- Elodes calabriae* (Klausnitzer, 1987) (S) (E)
- Elodes denticulata* (Klausnitzer, 1973) (N, S, Si) (E)
- Elodes elongata* (Tournier, 1868) (Sa)
- Elodes genei* (Guérin-Méneville, 1843) (Si, Sa)
- Elodes gredleri* (Kiesenwetter, 1863) (N, S)
- Elodes hausmanni* (Gredler, 1857) (N, S)
- Elodes koelleri* (Klausnitzer, 1970) (N)
- Elodes marginata* (Fabricius, 1798) (N, S)
- Elodes minuta* (Linné, 1767) (N, S)
- Elodes nebrodensis* (Ragusa, 1885) (Si) (E) (*)
- Elodes pseudominuta* (Klausnitzer, 1971) (N)
- Elodes tournieri* (Kiesenwetter, 1871) (Sa)
- Elodes venetae* (Klausnitzer, 1987) (N) (E) (*)

Flavohelodes Klausnitzer, 1980

- Flavohelodes flavicollis* (Kiesenwetter, 1859) (N, Si, Sa)

Microcara C.G. Thomson, 1859

- Microcara pilosula* Reitter, 1911 (N, S, Si) (E)
- Microcara testacea* (Linnaeus, 1767) (N, S)

Cyphon Paykull, 1799

- Cyphon coarctatus* Paykull, 1799 (N, S, Si)
- Cyphon impressus* Kiesenwetter, 1871 (Sa)
- Cyphon kongsbergensis* Munster, 1924 (N)
- Cyphon ochraceus* Stephens, 1830
 - Cyphon ochraceus ochraceus* Stephens, 1830 (N, S, Sa)
- Cyphon padi* (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
- Cyphon palmi* Nyholm, 1949 (S)
- Cyphon palustris* C.G. Thomson, 1855 (N, S, Si, Sa)
- Cyphon phragmiteticola* Nyholm, 1955 (N, S, Si, Sa)
- Cyphon poggii* Klausnitzer, 1990 (Sa) (E)
- Cyphon pubescens* (Fabricius, 1792) (N, S) (*)
- Cyphon ruficeps* Tournier, 1868 (N)
- Cyphon siculus* Tournier, 1868 (Si) (E) (*)
- Cyphon solarii* Nyholm, 1957 (N) (E)
- Cyphon unguiculatus* Nyholm, 1950 (N, S) (E)
- Cyphon variabilis* (Thunberg, 1787) (N)

Prionocyphon Redtenbacher, 1858

Prionocyphon serricornis (P.W.J. Müller, 1821) (N, S, Si, Sa)

Hydrocyphon Redtenbacher, 1858

Hydrocyphon australis Linder, 1864 (N, S, Si, Sa)

Hydrocyphon deflexicollis (P.W.J. Müller, 1821) (N, S, Sa)

Hydrocyphon hydrocyphonoides (Tournier, 1868) (S, Si)

Hydrocyphon novaki Nyholm, 1967 (N)

Hydrocyphon ovatus Nyholm, 1967 (N, S) (E)

Hydrocyphon pallidicollis Raffray, 1873 (Sa)

Hydrocyphon proximus Nyholm, 1967 (S) (E)

Scirtes Illiger, 1807

Scirtes hemisphaericus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)

Scirtes orbicularis (Panzer, 1793) (N, S)

Note

Elodes nebrodensis: La validità della specie è da confermare sulla base dell'esame dei tipi.

Elodes venetae: "venetae", sic !

Cyphon pubescens: Klausnitzer (1990b) ha citato con dubbio la specie come nuova per la Sardegna. Non tengo conto di tale citazione perché a mio parere deriva da un errore di lettura del cartellino di località, trascritto "Poretz sut M." (località comunque non sarda) al posto di "Ponti sul M[incio]".

Cyphon siculus: La validità della specie è da confermare sulla base dell'esame dei tipi.

Scolytidae

Scolytus Geoffroy, 1762

Scolytus amygdali Guérin-Ménéville, 1847 (N, S?, Si, Sa)

Scolytus carpini (Ratzeburg, 1837) (N)

Scolytus ensifer Eichhoff, 1881 (S)

Scolytus intricatus (Ratzeburg, 1837) (N, S, Si, Sa)

Scolytus kirschii Skalitzky, 1876 (N, S, Si)

Scolytus koenigi Schevyrev, 1890 (S, Si)

Scolytus laevis Chapuis, 1873 (N, S)

Scolytus mali Bechstein, 1805 (N, S, Si)

Scolytus multistriatus (Marsham, 1802) (N, S, Si, Sa)

Scolytus pygmaeus (Fabricius, 1787) (N, S)

Scolytus ratzeburgi Janson, 1856 (N)

Scolytus rugulosus (Müller, 1818) (N, S, Si, Sa?)

Scolytus scolytus (Fabricius, 1775) (N)

Scolytus sulcifrons Rey, 1883 (N, S)
Scolytus triarmatus (Eggers, 1912) (N)

Hylesinus Fabricius, 1801

Hylesinus crenatus (Fabricius, 1787) (N, S)
Hylesinus oleiperda (Fabricius, 1792) (N, S, Si, Sa)

Leperisinus Reitter, 1913

Leperisinus varius (Fabricius, 1775) (N, S, Si?, Sa)

Pteleobius Bedel, 1888

Pteleobius kraatzi (Eichhoff, 1864) (N, S, Sa?)
Pteleobius vittatus (Fabricius, 1787) (N, S, Sa?)

Chaetoptelius Fuchs in Reitter, 1913

Chaetoptelius vestitus (Mulsant & Rey, 1860) (S, Si, Sa)

Xylechinus Chapuis, 1869

Xylechinus pilosus (Ratzeburg, 1837) (N)

Kissophagus Chapuis, 1869

Kissophagus hederæ (Schmitt, 1843) (N, S?, Si, Sa?)
Kissophagus novaki Reitter, 1894 (N, S, Si, Sa)

Hylastinus Bedel, 1888

Hylastinus fankhauseri Reitter, 1894 (N, S)
Hylastinus obscurus (Marsham, 1802) (N?, Si)

Phloeotribus Latreille, 1796

Phloeotribus scarabaeoides (Bernard, 1792) (N, S, Si, Sa)

Phthorophloeus Rey, 1883

Phthorophloeus spinulosus Rey, 1883 (N)

Phloeophthorus Wollaston, 1854

Phloeophthorus cristatus Fauvel, 1889 (N?, S, Si?, Sa)
Phloeophthorus perfoliatus Wollaston, 1854 (S, Si, Sa)
Phloeophthorus pubifrons Guillebeau, 1893 (N?, S, Si, Sa) (*)

Phloeophthorus rhododactylus (Marsham, 1802) (N, S, Si, Sa?)

Phloeosinus Chapuis, 1869

Phloeosinus armatus Reitter, 1887 (N)

Phloeosinus aubei (Perris, 1855) (N, S, Si, Sa)

Phloeosinus thujae (Perris, 1855) (N, S, Si?, Sa?)

Hylurgops Leconte, 1876

Hylurgops glabratus (Zetterstedt, 1828) (N)

Hylurgops palliatus (Gyllenhal, 1813) (N, S)

Hylastes Erichson, 1836

Hylastes angustatus (Herbst, 1793) (N, S, Sa)

Hylastes ater (Paykull, 1800) (N, S, Sa)

Hylastes attenuatus Erichson, 1836 (N, S)

Hylastes batnensis Brisout de Barneville, 1883 (S)

Hylastes brunneus (Erichson, 1836) (N) (*)

Hylastes cunicularius Erichson, 1836 (N, S)

Hylastes linearis Erichson, 1836 (N, S?, Si, Sa?)

Hylastes opacus Erichson, 1836 (N)

Dendroctonus Erichson, 1836

Dendroctonus micans (Kugelann, 1794) (N)

Tomicus Latreille, 1803

Tomicus destruens (Wollaston, 1865) (N, S, Si)

Tomicus minor (Hartig, 1834) (N, S)

Tomicus piniperda (Linnaeus, 1758) (N)

Hylurgus Latreille, 1807

Hylurgus ligniperda (Fabricius, 1792) (N, S, Si, Sa)

Hylurgus micklitzi Wachtl, 1881 (N?, S, Si, Sa)

Polygraphus Erichson, 1836

Polygraphus grandiclava Thomson, 1886 (N, S)

Polygraphus poligraphus (Linnaeus, 1758) (N)

Carphoborus Eichhoff, 1864

Carphoborus minimus (Fabricius, 1801) (N, Sa?)

Carphoborus perrisi (Chapuis, 1869) (S, Si, Sa?)

Carphoborus pini Eichhoff, 1881 (S, Si?, Sa)

Hypoborus Erichson, 1836

Hypoborus ficus Erichson, 1836 (N, S, Si, Sa)

Liparthrum Wollaston, 1854

Liparthrum genistae (Aubé, 1862) (N, S, Si, Sa)

Liparthrum mori (Aubé, 1862) (N, S?, Sa?)

Crypturgus Erichson, 1836

Crypturgus cinereus (Herbst, 1793) (N, S)

Crypturgus cribrellus Reitter, 1894 (N, S?)

Crypturgus hispidulus Thomson, 1870 (N)

Crypturgus mediterraneus Eichhoff, 1871 (N, S)

Crypturgus numidicus Ferrari, 1867 (S, Si, Sa)

Crypturgus pusillus (Gyllenhal, 1813) (N, S)

Thamnurgus Eichhoff, 1864

Thamnurgus characiae Rosenhauer, in Eichhoff, 1878 (Si)

Thamnurgus delphinii (Rosenhauer, 1856) (N, Si)

Thamnurgus euphorbiae (Küster, 1845) (S, Si, Sa?)

Thamnurgus kaltenbachii (Bach, 1849) (N, S)

Thamnurgus sardus Eggers, 1912 (Si, Sa) (*)

Pseudothamnurgus Eggers, 1912

Pseudothamnurgus mediterraneus Eggers, 1912 (S)

Dryocoetes Eichhoff, 1864

Dryocoetes alni (Georg, 1856) (N)

Dryocoetes autographus (Ratzeburg, 1836) (N)

Dryocoetes hectographus Reitter, 1913 (N)

Dryocoetes villosus (Fabricius, 1792) (N, S, Si, Sa)

Coccotrypes Eichhoff, 1878

Coccotrypes dactyliperda (Fabricius, 1801) (N?, S, Si, Sa?)

Dactylotrypes Eggers, 1927

Dactylotrypes longicollis (Wollaston, 1864) (N, S, Si)

Xylocleptes Ferrari, 1867

Xylocleptes bispinus (Duftschmidt, 1825) (N, S, Si, Sa)
Xylocleptes biuncus Reitter, 1894 (N, S)

Taphrorychus Eichhoff, 1878

Taphrorychus bicolor (Herbst, 1793) (N, S, Si)
Taphrorychus minor Eggers, 1923 (S, Sa)
Taphrorychus villifrons (Dufour, 1843) (S, Sa?)

Xyloterus Erichson, 1836

Xyloterus domesticus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si?, Sa)
Xyloterus lineatus (Olivier, 1795) (N, S, Sa?)
Xyloterus signatus (Fabricius, 1787) (S, Si)

Hypothenemus Westwood, 1836

Hypothenemus eruditus Westwood, 1836 (N, Si, Sa?)

Cisurgus Erichson, 1836

Cisurgus ragusae Reitter, 1906 (S, Si, Sa)

Cryphalus Erichson, 1836

Cryphalus abietis (Ratzeburg, 1837) (N, S)
Cryphalus intermedius Ferrari, 1867 (N)
Cryphalus piceae (Ratzeburg, 1837) (N, S)
Cryphalus saltuarius Weise, 1891 (N?)

Ernoporos Thomson, 1865

Ernoporos fagi (Fabricius, 1798) (N, S)
Ernoporos tiliae (Panzer, 1793) (N)

Trypophloeus Fairmaire, 1868

Trypophloeus asperatus (Gyllenhal, 1813) (N)
Trypophloeus alni Lindemann, 1875 (N?)

Xyleborus Eichhoff, 1864

Xyleborus cryptographus (Ratzeburg, 1837) (N?)
Xyleborus dispar (Fabricius, 1792) (N, S, Sa) (*)
Xyleborus dryographus (Ratzeburg, 1837) (N, S, Si, Sa)
Xyleborus eurygraphus (Ratzeburg, 1837) (N, S)
Xyleborus monographus (Fabricius, 1792) (N, S, Si, Sa)

Xyleborus saxesenii (Ratzeburg, 1837) (N, S, Si, Sa)

Pityophthorus Eichhoff, 1864

Pityophthorus buyssoni Reitter, 1901 (N, S) (*)
Pityophthorus exsculptus (Ratzeburg, 1837) (N)
Pityophthorus glabratus Eichhoff, 1878 (N?)
Pityophthorus henscheli Seitner, 1887 (N)
Pityophthorus knoteki Reitter, 1898 (N)
Pityophthorus lichtensteinii (Ratzeburg, 1837) (N, S, Si?)
Pityophthorus pityographus (Ratzeburg, 1837) (N, S)
Pityophthorus pubescens (Marsham, 1802) (N?, S, Si)

Pityogenes Bedel, 1888

Pityogenes bidentatus (Herbst, 1783) (N, S, Sa?)
Pityogenes bistridentatus (Eichhoff, 1878) (N, S)
Pityogenes calcaratus (Eichhoff, 1878) (S, Sa)
Pityogenes chalcographus (Linnaeus, 1791) (N, S?)
Pityogenes conjunctus (Reitter, 1887) (N, S?) (*)
Pityogenes quadridens (Hartig, 1834) (N)
Pityogenes trepanatus (Nördlinger, 1848) (N, S)

Pityokteines Fuchs, 1911

Pityokteines curvidens (Germar, 1824) (N, S)
Pityokteines vorontzovi (Jacobson, 1895) (S)

Ips De Geer, 1775

Ips acuminatus (Gyllenhal, 1827) (N, S, Si?)
Ips amitinus (Eichhoff, 1871) (N, S?)
Ips cembrae (Heer, 1836) (N) (*)
Ips mannsfeldi (Wachtl, 1879) (N)
Ips sexdentatus (Boerner, 1767) (N, S, Sa?)
Ips typographus (Linnaeus, 1758) (N, S?, Sa)

Orthotomicus Ferrari, 1867

Orthotomicus erosus (Wollaston, 1857) (N, S, Si, Sa)
Orthotomicus laricis (Fabricius, 1792) (N, S, Sa?)
Orthotomicus longicollis (Gyllenhal, 1827) (N)
Orthotomicus proximus (Eichhoff, 1867) (N, S)
Orthotomicus suturalis (Gyllenhal, 1827) (N, S)

Note

Phloeophthorus pubifrons: Sinonimia di *Comesiella sicula* Del Guercio secondo A. Pfeffer,

1972.

Hylurgops: *H. starki* Eggers, 1933 è citato di Macugnaga (Piemonte) e di Fiumalbo (Emilia).

Hylastes brunneus: Distinto da *H. ater* (Paykull) secondo V. Hansen, 1955.

Tomicus: Specie tradizionalmente attribuite a *Blastophagus* Eichhoff, 1864.

Thamnurgus sardus: Mancano ulteriori attendibili riferimenti.

Xyleborus dispar: Spesso attribuito al genere *Anisandrus* Ferrari, 1867.

Pityophthorus buyssoni: Citato d'Italia in vari casi come *P. glabratus* Eichhoff.

Pityogenes conjunctus: Citato d'Italia in vari casi come *P. bistridentatus* (Eichhoff).

Ips cembrae: Probabili confusioni d'antica data con *I. amitinus* (Eichhoff).

Scraptiidae

Pentaria Mulsant, 1856

Pentaria badia (Rosenhauer, 1847) (N, Si, Sa)

Pentaria defarguesi Abeille de Perrin, 1885 (Sa)

Cyrtanaspis Emery, 1876

Cyrtanaspis phalerata (Germar, 1831) (N, S)

***Anaspis* (*Anaspis*)** Geoffroy, 1762

Anaspis (*Anaspis*) *fasciata* (Forster, 1775) (N, S, Si, Sa)

Anaspis (*Anaspis*) *frontalis* (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)

Anaspis (*Anaspis*) *incognita* Schilsky, 1895 (Si)

Anaspis (*Anaspis*) *lucana* Franciscolo, 1943 (S) (E)

Anaspis (*Anaspis*) *lurida* Stephens, 1832 (N, S, Si, Sa)

Anaspis (*Anaspis*) *maculata* (Fourcroy, 1785) (N, S, Si, Sa)

Anaspis (*Anaspis*) *nigripes* Brisout, 1866 (N, S, Si)

Anaspis (*Anaspis*) *poggii* Franciscolo, 1982 (Sa) (E)

Anaspis (*Anaspis*) *pulicaria* A. Costa, 1854 (N, S, Si, Sa)

Anaspis (*Anaspis*) *regimbarti* Schilsky, 1895 (N, S, Si)

Anaspis (*Anaspis*) *ruficollis* (Fabricius, 1792) (N, S, Si, Sa)

Anaspis (*Anaspis*) *stussineri* Fleischer, 1909 (S) (E) (*)

Anaspis (*Anaspis*) *thoracica* (Linnaeus, 1758) (N, S)

Anaspis (*Anaspis*) *viennensis* Schilsky, 1895 (N, S, Si)

***Anaspis* (*Nassipa*)** Emery, 1876

Anaspis (*Nassipa*) *costai* Emery, 1876 (N, S, Sa)

Anaspis (*Nassipa*) *flava* (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Anaspis (*Nassipa*) *melanostoma* A. Costa, 1854 (N, S, Sa)

Anaspis (*Nassipa*) *rufilabris* Gyllenhal, 1827 (N, S)

Anaspis (*Nassipa*) *versicolor* Baudi, 1878 (S) (E)

***Anaspis* (*Spanisa*)** Emery, 1876

Anaspis (Spanisa) labiata A. Costa, 1854 (N, S, Si, Sa)

Anaspis (Spanisa) subtilis Hampe, 1870 (S?) (*)

***Anaspis (Silaria)* Mulsant, 1856**

Anaspis (Silaria) brunnipes Mulsant, 1856 (N, S, Si)

Anaspis (Silaria) latiuscula Mulsant, 1856 (N)

Anaspis (Silaria) mancinii Franciscolo, 1942 (S) (E) (*)

Anaspis (Silaria) quadrimaculata Gyllenhal, 1817 (N, S, Sa)

Anaspis (Silaria) serbica Apfelbeck, 1931 (N, S)

Anaspis (Silaria) suturalis Emery, 1876 (S, Sa) (E)

Anaspis (Silaria) thoracoxantha Franciscolo, 1943 (N, S) (E)

Anaspis (Silaria) trifasciata Chevrolat, 1860 (Sa)

Anaspis (Silaria) varians Mulsant, 1856 (N, S, Si)

***Anaspis (Larisia)* Emery, 1876**

Anaspis (Larisia) akaira Franciscolo, 1991 (Si) (E) (*)

Anaspis (Larisia) chevrolati Mulsant, 1856 (N, Si, Sa)

Anaspis (Larisia) dichroa Emery, 1876 (N, S, Sa)

Anaspis (Larisia) mulsanti Brisout, 1859 (N, S)

Anaspis (Larisia) palpalis Gerhardt, 1876 (N, S, Si)

Anaspis (Larisia) revelierei Emery, 1876 (S, Si, Sa)

***Scraptia* Latreille, 1807**

Scraptia bifoveolata Küster, 1853 (S)

Scraptia dubia (Olivier, 1790) (N, S)

Scraptia fuscula Müller, 1821 (N, S, Si, Sa)

Scraptia ferruginea Kiesenwetter, 1861 (N, S, Si, Sa)

Scraptia ophthalmica Mulsant, 1856 (N, Si, Sa)

***Trotomma* Kiesenwetter, 1851**

Trotomma antennata Pic, 1902 (Sa) (E)

Trotomma pubescens Kiesenwetter, 1851 (N, S, Si)

***Trotommidea* Reitter, 1883**

Trotommidea revelierei Abeille de Perrin, 1885 (Sa)

Note

Anaspis (Anaspis) stussineri: Presente in S solo nella Valle del Crati.

Anaspis (Spanisa) subtilis: Dubbia per Is. Pianosa in Adriatico.

Anaspis (Silaria) mancinii: In S solo all'Is. di Capraia.

Anaspis (Larisia) akaira: In Si solo all'Is. dei Conigli (Pelagie).

Scydmaenidae

Chevrolatia Jacquelin du Val, 1850

Chevrolatia insignis Jacquelin du Val, 1850 (N, S)

Euthiconus Reitter, 1881

Euthiconus conicicollis (Fairmaire & Laboulbène, 1854) (N, S)

Eutheia Stephens, 1830

Eutheia carreti Guillebeau, 1896 (N) (E)

Eutheia formicetorum Reitter, 1881 (S)

Eutheia minutissima Saint-Claire Deville, 1901 (N, S)

Eutheia schaumii Kiesenwetter, 1858 (N, S, Sa)

Eutheia ventricosa G. Müller, 1926 (S) (E)

Protoeuthia Franz, 1970

Protoeuthia argentaria Pace, 1977 (S) (E)

Protoeuthia mirifica Franz, 1970 (S) (E)

Chelonoidum Strand, 1935

Chelonoidum latum (Motschulsky, 1851) (N)

***Cephennium* (*Cephennarium*)** Reitter, 1881

Cephennium (*Cephennarium*) *apicale* Reitter, 1881 (N, S) (E)

Cephennium (*Cephennarium*) *carrarai* Reitter, 1884 (N, S) (E)

Cephennium (*Cephennarium*) *insulare* Holdhaus, 1905 (S) (E)

Cephennium (*Cephennarium*) *nobile* Holdhaus, 1905 (S) (E)

Cephennium (*Cephennarium*) *sardoum* Reitter, 1884 (Sa) (E)

Cephennium (*Cephennarium*) *tarsale* Holdhaus, 1905 (S) (E)

***Cephennium* (*Cephennium*)** Müller & Kunze, 1822

Cephennium (*Cephennium*) *argodi* Croissandeau, 1891 (N) (*)

Cephennium (*Cephennium*) *carnicum* Reitter, 1881 (N)

Cephennium (*Cephennium*) *crinitum* Blattný, 1914 (N)

Cephennium (*Cephennium*) *doderi* Binaghi, 1942 (N)

Cephennium (*Cephennium*) *helveticum* Machulka, 1930 (N)

Cephennium (*Cephennium*) *horni* Machulka, 1933

Cephennium (*Cephennium*) *horni horni* Machulka, 1933 (S) (E)

Cephennium (*Cephennium*) *horni montanellum* Machulka, 1933 (N) (E)

Cephennium (Cephennium) istriense Machulka, 1932 (N) (*)
Cephennium (Cephennium) italicum Machulka, 1930 (N)
Cephennium (Cephennium) jureceki Machulka, 1930 (N)
Cephennium (Cephennium) laticolle Aubé, 1842 (N)
Cephennium (Cephennium) majus Reitter, 1881
 Cephennium (Cephennium) majus majus Reitter, 1881 (N)
Cephennium (Cephennium) maritimum Reitter, 1884 (N)
Cephennium (Cephennium) montanum Reitter, 1884 (N)
Cephennium (Cephennium) nicaeense Reitter, 1881 (N)
Cephennium (Cephennium) reissi Machulka, 1933
 Cephennium (Cephennium) reissi bergamascum Machulka, 1933 (N) (E)
 Cephennium (Cephennium) reissi reissi Machulka, 1933 (N) (E)
Cephennium (Cephennium) simile Reitter, 1881 (N, S)
Cephennium (Cephennium) stolzi Machulka, 1932 (N)
Cephennium (Cephennium) thoracicum Müller & Kunze, 1822 (N)
Cephennium (Cephennium) tirolense Machulka, 1930 (N)

***Cephennium (Geodytes)* Saulcy, 1864**

Cephennium (Geodytes) minutissimum Aubé, 1842 (N, S)
Cephennium (Geodytes) romanum Blattný, 1914 (S) (E)
Cephennium (Geodytes) roubali Machulka, 1929 (Sa)

***Cephennium (Neocephennium)* Apfelbeck, 1911**

Cephennium (Neocephennium) cyclonotum Holdhaus, 1924 (N)
Cephennium (Neocephennium) fulvum Schaum, 1859 (N)
Cephennium (Neocephennium) weingaertneri Reitter, 1916 (N) (*)

***Cephennium (Phennecium)* Normand, 1912**

Cephennium (Phennecium) garganicum Pace, 1977 (S) (E)
Cephennium (Phennecium) grouvellei Croissandeau, 1891 (N)
Cephennium (Phennecium) lostiai Doderò, 1887 (Sa) (E)
Cephennium (Phennecium) siculum Reitter, 1913 (Si) (E)
Cephennium (Phennecium) solarii Besuchet, 1958 (S) (E)

***Nanophthalmus* Motschulsky, 1851**

Nanophthalmus beszedesi Reitter, 1903 (N) (*)

***Neuraphes (Neuraphes)* Thomson, 1862**

Neuraphes (Neuraphes) angulatus (Müller & Kunze, 1822) (N, S)
Neuraphes (Neuraphes) carinatus (Mulsant & Rey, 1861) (N) (*)
Neuraphes (Neuraphes) elongatulus (Müller & Kunze, 1822) (N, S)
Neuraphes (Neuraphes) fiorii Reitter, 1887 (N, S) (E)
Neuraphes (Neuraphes) imitator Blattný, 1919 (N)

Neuraphes (Neuraphes) ottonis Reitter, 1910 (S) (E)
Neuraphes (Neuraphes) pinkeri Franz, 1966 (N) (E)
Neuraphes (Neuraphes) rubicundus (Schaum, 1841) (N)
Neuraphes (Neuraphes) ruthenus Machulka, 1925 (N)
Neuraphes (Neuraphes) stussineri Reitter, 1891 (S) (E)
Neuraphes (Neuraphes) talparum Lokay, 1920 (N)
Neuraphes (Neuraphes) uzaci Reitter, 1913 (Sa) (E)
Neuraphes (Neuraphes) wuesthoffi Roubal, 1916 (Sa) (E)

***Neuraphes (Pararaphes)* Reitter, 1891**

Neuraphes (Pararaphes) beszedesi Reitter, 1915 (N) (*)
Neuraphes (Pararaphes) capellae Reitter, 1881 (N)
Neuraphes (Pararaphes) caviceps Croissandeau, 1894 (N)
Neuraphes (Pararaphes) coecus Reitter, 1887 (N)
Neuraphes (Pararaphes) coronatus R.F. Sahlberg, 1883 (N)
Neuraphes (Pararaphes) doderoi Schatzmayr, 1908 (N)
Neuraphes (Pararaphes) emonae Reitter, 1882 (N) (*)
Neuraphes (Pararaphes) frigidus Holdhaus, 1902 (N)
Neuraphes (Pararaphes) gestroi Flach, 1891 (N)
Neuraphes (Pararaphes) holdhausi Franz, 1971 (N)
Neuraphes (Pararaphes) indigena Hölzel, 1956 (N) (*)
Neuraphes (Pararaphes) knabli Machulka, 1938 (N)
Neuraphes (Pararaphes) laminatus Ganglbauer, 1899 (N, S)
Neuraphes (Pararaphes) nodifer (Reitter, 1879) (N)
Neuraphes (Pararaphes) parallelus (Chaudoir, 1845) (N)
Neuraphes (Pararaphes) pechlaneri Machulka, 1938 (N)
Neuraphes (Pararaphes) praeteritus Rye, 1872 (N)
Neuraphes (Pararaphes) semicastaneus (Reitter, 1879) (N, S)
Neuraphes (Pararaphes) strupii Machulka, 1949 (N)
Neuraphes (Pararaphes) toscanus Franz, 1971 (S) (E)
Neuraphes (Pararaphes) weiratheri Machulka, 1938 (N)

***Scydmoraphes* Reitter, 1891**

Scydmoraphes adoxus Castellini, 1987 (Sa) (E)
Scydmoraphes angelinii Castellini, 1987 (S) (E)
Scydmoraphes bordonii Castellini, 1987 (N) (E)
Scydmoraphes brucki (Reitter, 1881) (S) (E)
Scydmoraphes diutius Castellini, 1987 (S) (E)
Scydmoraphes dubius (Reitter, 1881) (Sa) (*)
Scydmoraphes elbanus Franz, 1961 (S) (E)
Scydmoraphes fimbriatus Castellini, 1987 (Sa) (E)
Scydmoraphes flaminii (Reitter, 1884) (N, S) (E)
Scydmoraphes focarilei Castellini, 1987 (Sa) (E)
Scydmoraphes geticus (Saulcy, 1876) (N, S)
Scydmoraphes helvolus (Schaum, 1844) (N, S)
Scydmoraphes kippenbergi Castellini, 1987 (N) (E)

Scydmoraphes leptocerus (Reitter, 1881) (N, S) (E)
Scydmoraphes longicollis (Motschulsky, 1845) (N) (*)
Scydmoraphes matchai (Reitter, 1915) (N) (*)
Scydmoraphes minutus (Chaudoir, 1845) (N)
Scydmoraphes myrmecophilus (Aubé, 1861)
 Scydmoraphes myrmecophilus myrmecophilus (Aubé, 1861) (N)
 Scydmoraphes myrmecophilus nanctus Castellini, 1987 (Sa) (E)
Scydmoraphes panormitanus Ragusa, 1892 (Si) (E)
Scydmoraphes poggii Franz, 1976 (N) (E)
Scydmoraphes praetermissus Castellini, 1987 (S) (E)
Scydmoraphes revelierei (Reitter, 1881)
 Scydmoraphes revelierei agna Castellini, 1987 (Sa) (E)
Scydmoraphes romanus Franz, 1961 (S) (E)
Scydmoraphes sardous Franz, 1961 (Sa) (E)
Scydmoraphes sparshalli (Denny, 1825) (N, S)
Scydmoraphes subcordatus (Fairmaire, 1859) (N, S)
Scydmoraphes tarsalis Machulka, 1930 (S) (E)
Scydmoraphes tenuicornis (Reitter, 1881) (Sa)
Scydmoraphes tuberculifer Roubal, 1926 (N)
Scydmoraphes ventricosus (Rottenberg, 1870) (Si) (E)
 Scydmoraphes ventricosus subg. *Cyrtoscydmus* Motschulsky, 1869

***Stenichnus* Thomson, 1862**

Stenichnus apulicus Pic, 1902 (S) (E)
Stenichnus bicolor (Denny, 1825) (N) (*)
Stenichnus collaris (Müller & Kunze, 1822)
 Stenichnus collaris collaris (Müller & Kunze, 1822) (N)
 Stenichnus collaris paganettii Franz, 1960 (S) (E)
Stenichnus damryi (Reitter, 1881)
 Stenichnus damryi hilfi Holdhaus, 1915 (S) (E)
 Stenichnus damryi kraussei Franz, 1960 (Sa) (E)
Stenichnus depressipennis Reitter, 1910
 Stenichnus depressipennis depressipennis Reitter, 1910 (Si) (E)
Stenichnus egregius Holdhaus, 1915 (S) (E)
Stenichnus godarti (Latreille, 1806) (N)
Stenichnus goriciensis Franz, 1961 (N)
Stenichnus helferi (Schaum, 1841) (N, S, Si)
Stenichnus hirtellus Binaghi, 1942 (Sa) (E)
Stenichnus holdhausi Franz, 1960 (Si) (E)
Stenichnus horni Machulka, 1930 (Sa) (E)
Stenichnus kunzei (Gené, 1836) (Sa) (E)
Stenichnus peezi Franz, 1964 (N)
Stenichnus pusillus (Müller & Kunze, 1822) (N, S)
Stenichnus sardous Reitter, 1913 (Sa) (E)
Stenichnus scutellaris (Müller & Kunze, 1822) (N, S, Si)
Stenichnus sculus Franz, 1960 (Si) (E)

Stenichnus (Stenichnus) Thomson, 1862

Stenichnus (Stenichnus) angustissimus Peyerimhoff, 1901 (N) (*)

Leptocharis Reitter, 1887

Leptocharis revelierei Reitter, 1887 (Sa)

Microscydmus Saulcy & Croissandeau, 1893

Microscydmus minimus (Chaudoir, 1845) (N, S)

Microscydmus nanus (Schaum, 1844) (N, S)

Euconnus (Cladoconnus) Reitter, 1909

Euconnus (Cladoconnus) carinthiacus Ganglbauer, 1896 (N)

Euconnus (Cladoconnus) castellinii Franz, 1971 (N, S) (E)

Euconnus (Cladoconnus) denticornis (Müller & Kunze, 1822) (N, S)

Euconnus (Cladoconnus) goerzensis Reitter, 1894 (N)

Euconnus (Cladoconnus) kiesenwetteri (Kiesenwetter, 1851) (N, S)

Euconnus (Cladoconnus) motschulskyi (Sturm, 1838) (N, S)

Euconnus (Cladoconnus) schlosseri Reitter, 1879 (N) (*)

Euconnus (Cladoconnus) similis (Weise, 1875) (N)

Euconnus (Cladoconnus) toscanus Franz, 1966 (N, S) (E)

Euconnus (Euconnus) Thomson, 1862

Euconnus (Euconnus) fimetarius (Chaudoir, 1845) (N, S)

Euconnus (Euconnus) hirticollis (Illiger, 1798) (N, S)

Euconnus (Euconnus) rutilipennis (Müller & Kunze, 1822) (N, S)

Euconnus (Napochus) Reitter, 1881

Euconnus (Napochus) chrysocomus (Saulcy, 1864) (N)

Euconnus (Napochus) claviger (Müller & Kunze, 1822) (N, S)

Euconnus (Napochus) cornutus (Saulcy, 1863) (N, Sa)

Euconnus (Napochus) duboisi Méquignon, 1929 (N, S)

Euconnus (Napochus) pragensis Machulka, 1923 (N, S)

Euconnus (Neonapochus) Machulka, 1929

Euconnus (Neonapochus) maeklini (Mannerheim, 1844) (N, S)

Euconnus (Spanioconnus) Ganglbauer, 1899

Euconnus (Spanioconnus) intrusus (Schaum, 1844)

Euconnus (Spanioconnus) intrusus intrusus (Schaum, 1844) (S)

Euconnus (Spanioconnus) wetterhalli (Gyllenhal, 1813) (N, S)

Euconnus (Tetramelus) Motschulsky, 1869

- Euconnus (Tetramelus) aelurus* Bonadona, 1950 (N)
- Euconnus (Tetramelus) bedeli* Reitter, 1884 (N)
- Euconnus (Tetramelus) demissus* Reitter, 1887 (N)
- Euconnus (Tetramelus) eppelsheimi* Croissandeau, 1893 (N)
- Euconnus (Tetramelus) helenae* Flach, 1891 (N)
- Euconnus (Tetramelus) hoelzeli* Schweiger, 1958 (N) (*)
- Euconnus (Tetramelus) holdhausi* Stolz, 1915 (N)
- Euconnus (Tetramelus) istriani* Daffner, 1987 (N) (*)
- Euconnus (Tetramelus) lombardus* Daffner, 1986 (N) (E)
- Euconnus (Tetramelus) longulus* Halbherr, 1890 (N) (E)
- Euconnus (Tetramelus) oblongus* (Sturm, 1838) (N, S)
- Euconnus (Tetramelus) pavionis* Schweiger, 1961 (N) (E)
- Euconnus (Tetramelus) pseudolongulus* Schweiger, 1961 (N) (E)
- Euconnus (Tetramelus) pubicollis* (Müller & Kunze, 1822) (N, S)
- Euconnus (Tetramelus) saulcyi* (Croissandeau, 1891) (N)
- Euconnus (Tetramelus) styriacus* (Grimmer, 1841) (N)

Scydmaenus (Cholerus) Thomson, 1859

- Scydmaenus (Cholerus) cornutus* Motschulsky, 1845 (N, S)
- Scydmaenus (Cholerus) hellwigi* (Herbst, 1792) (N, S)
- Scydmaenus (Cholerus) perrisi* Reitter, 1881 (N)
- Scydmaenus (Cholerus) rufus* Müller & Kunze, 1822 (S)

Scydmaenus (subg) . Eustemmus Reitter, 1881

- Scydmaenus (subg) antidotus* Germar, 1817 (S, Si) (E)

Scydmaenus (Scydmaenus) Latreille, 1802

- Scydmaenus (Scydmaenus) tarsatus* Müller & Kunze, 1822 (N, S)

Eudesis Reitter, 1881

- Eudesis aglena* Reitter, 1881 (Sa) (E)
- Eudesis minima* Binaghi, 1948 (Sa) (E)

Pseudoeudesis Binaghi, 1948

- Pseudoeudesis sricula* (Doderer, 1920)
 - Pseudoeudesis sricula sricula* (Doderer, 1920) (Si) (E)
- Pseudoeudesis sulcipennis* (Reitter, 1890) (*)
 - Pseudoeudesis sulcipennis doderi* Binaghi, 1948 (Si) (E)
 - Pseudoeudesis sulcipennis lampedusae* Binaghi, 1948 (Si) (E)

Mastigus Latreille, 1806

- Mastigus heydeni* Rottenberg, 1870 (S) (E)
- Mastigus pilifer* Kraatz, 1879 (S) (E)
- Mastigus ruficornis* Motschulsky, 1859 (*)
 - Mastigus ruficornis liguricus* Fairmaire, 1859 (N)
 - Mastigus ruficornis neapolitanus* Ganglbauer, 1899 (S) (E)
 - Mastigus ruficornis ruficornis* Motschulsky, 1859 (S) (E)

Leptomastax Pirazzoli, 1855

- Leptomastax hypogea* Pirazzoli, 1855 (N, S)
- Leptomastax raymondi* Saulcy, 1864 (N)
- Leptomastax stussineri* Reitter, 1880 (S)

Note

Cephennium (Cephennium) argodi: Presenza probabile al confine occidentale.
Cephennium (Cephennium) istriense: Presenza probabile al confine orientale.
Cephennium (Neocephennium) weingaertneri: Presenza probabile al confine orientale.
Nanophthalmus beszedesi: Presenza probabile al confine orientale.
Neuraphes (Neuraphes) carinatus: Presenza probabile al confine occidentale.
Neuraphes (Pararaphes) beszedesi: Presenza probabile al confine orientale.
Neuraphes (Pararaphes) emonae: Presenza probabile al confine orientale.
Neuraphes (Pararaphes) indigena: Presenza probabile al confine orientale.
Scydmorephes dubius: In Sa è probabilmente ssp. ancora inedita.
Scydmorephes longicollis: Presenza probabile al confine orientale.
Scydmorephes matchai: Presenza probabile al confine orientale.
Stenichnus bicolor: Presenza probabile al confine orientale.
Stenichnus (Stenichnus) angustissimus: Presenza probabile al confine occidentale.
Euconnus (Cladoconnus) schlosseri: Presenza probabile al confine orientale.
Euconnus (Tetramelus) hoelzeli: Presenza probabile al confine orientale.
Euconnus (Tetramelus) istrianus: Presenza probabile al confine orientale.
Pseudoeudesis sulcipennis: La ssp. *lampedusae* in Si solo a Lampedusa.
Mastigus ruficornis: La ssp. *ruficornis* in S solo nell'Appennino Toscano.

Silphidae

Nicrophorus Fabricius, 1775

- Nicrophorus antennatus* Reitter, 1885 (N) (M) (*)
- Nicrophorus fossor* Erichson, 1837 (N, S, Si, Sa)
- Nicrophorus germanicus* (Linnaeus, 1758) (N, S, Si) (M)
- Nicrophorus humator* G.A. Olivier, 1790 (N, S, Si)
- Nicrophorus investigator* Zetterstedt, 1824 (N, S)
- Nicrophorus nigricornis* Faldermann, 1835 (N, S)
- Nicrophorus sepultor* Charpentier, 1825 (N, S)

Nicrophorus vespillo (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)
Nicrophorus vespilloides Herbst, 1784 (N, S)
Nicrophorus vestigator Herschel, 1807 (N, S, Si, Sa)

Nicrodes Leach, 1815

Nicrodes littoralis (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)

Thanatophilus Leach, 1815

Thanatophilus dispar (Herbst, 1793) (N)
Thanatophilus rugosus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
Thanatophilus sinuatus (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa)

Xylodrepa C.G. Thomson, 1859

Xylodrepa quadrimaculata (Scopoli, 1772) (N, S, Si)

Oiceoptoma Leach, 1815

Oiceoptoma thoracicum (Linnaeus, 1758) (N, S)

Aclypea Reitter, 1885

Aclypea opaca (Linnaeus, 1758) (N, S)
Aclypea undata (O.F. Müller, 1776) (N, S)

Silpha Linnaeus, 1758

Silpha carinata Herbst, 1783 (N, S)
Silpha oblonga Küster, 1851 (S) (*)
Silpha obscura Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)
Silpha olivieri Bedel, 1887 (N, S, Si, Sa)
Silpha puncticollis Lucas, 1849 (Sa)
Silpha tristis Illiger, 1798 (N, S, Si, Sa)
Silpha tyrolensis Laicharting, 1781 (N)

Phosphuga Leach, 1817

Phosphuga atrata (Linnaeus, 1758) (N, S)

Ablattaria Reitter, 1885

Ablattaria laevigata (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa)

Note

Nicrophorus antennatus: Un solo reperto in Friuli.

Silpha oblonga: Nota solo di Calabria; la validità tassonomica della specie è per altro dubbia.

Silvanidae

Dendrophagus Schönherr, 1809

Dendrophagus crenatus (Paykull, 1799) (N) (R) (*)

Uleiota Latreille, 1796

Uleiota planata (Linnaeus, 1761) (N, S, Si, Sa)

Cryptamorpha Wollaston, 1854

Cryptamorpha desjardinsi (Guérin, 1844) (N) (*)

Psammoecus Latreille, 1829

Psammoecus bipunctatus (Fabricius, 1792) (N, S, Si, Sa)

Monanus Sharp, 1879

Monanus concinnulus (Walker, 1858) (N) (*)

Airaphilus Redtenbacher, 1858

Airaphilus arcadius Reitter, 1884 (Si)

Airaphilus calabricus Obenberger, 1914 (S) (E) (*)

Airaphilus corsicus Grouvelle, 1874 (S) (*)

Airaphilus elongatus (Gyllenhal, 1813) (N, S, Sa)

Airaphilus ferrugineus Kraatz, 1862 (S, Si)

Airaphilus nasutus Chevrolat, 1860 (S?, Si, Sa)

Airaphilus sculus Reitter, 1879 (Si)

Airaphilus talpa Kraatz, 1862 (N, S, Si, Sa) (*)

Astilpnus Perris, 1866

Astilpnus multistriolatus Perris, 1866 (Si)

Cathartus Reiche, 1854

Cathartus quadricollis (Guérin-Meneville, 1844) (N) (*)

Ahasverus Gozis, 1881

Ahasverus advena (Waltl, 1832) (N, S, Si, Sa)

Ahasverus excisus (Reitter, 1876) (N) (*)

Nausibius Redtenbacher, 1858

Nausibius clavicornis (Kugelann, 1794) (N) (*)

Oryzaeophilus Ganglbauer, 1899

Oryzaeophilus mercator (Fauvel, 1889) (N, S, Si) (*)

Oryzaeophilus surinamensis (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Silvanoprus Reitter, 1911

Silvanoprus fagi (Guérin-Meneville, 1844) (N, S)

Silvanus Latreille, 1807

Silvanus bidentatus (Fabricius, 1792) (N, S, Sa)

Silvanus inarmatus Wollaston, 1867 (N) (*)

Silvanus lateritius (Broun, 1880) (N) (*)

Silvanus lewisi Reitter, 1876 (N) (*)

Silvanus mediocris Grouvelle, 1889 (N) (*)

Silvanus muticus Sharp, 1899 (N) (*)

Silvanus proximus Grouvelle, 1904 (N) (*)

Silvanus recticollis Reitter, 1876 (Si?, Sa) (*)

Silvanus unidentatus (Fabricius, 1792) (N, S, Si, Sa)

Cathartosilvanus Grouvelle, 1912

Cathartosilvanus imbellis (Leconte, 1854) (N) (*)

Cathartosilvanus trivialis (Grouvelle, 1878) (N) (*)

Parasilvanus Grouvelle, 1912

Parasilvanus fairmairei (Grouvelle, 1883) (N) (*)

Parasilvanus ocellatus (Grouvelle, 1889) (N) (*)

Parasilvanus pulcher (Grouvelle, 1905) (N) (*)

Note

Dendrophagus crenatus: In Italia solo nella regione alpina.

Cryptamorpha desjardinsi: Alloctono, tropicopolita, solo porto di Genova.

Monanus concinnulus: Alloctono, tropicopolita, solo porto di Trieste.

Airaphilus calabricus: Specie non più rinvenuta dopo la descrizione originale.

Airaphilus corsicus: In Italia solo nell'Isola d'Elba.

Airaphilus talpa: Usualmente considerato sinonimo di *nasutus* Chevrolat, 1860.

Cathartus quadricollis: Alloctono, neotropicale, porti di Genova, Ravenna e Venezia.

Ahasverus excisus: Alloctono, neotropicale, solo porto di Genova.

Nausibius clavicornis: Alloctono, neotropicale, porti di Genova e Trieste.

Oryzaephilus mercator: In Italia quasi esclusivamente sinantropo.
Silvanus inarmatus: Alloctono, afrotropicale, solo porto di Venezia.
Silvanus lateritius: Alloctono, d'origine australiana, solo porto di Venezia.
Silvanus lewisi: Alloctono, orientale, solo porto di Venezia.
Silvanus mediocris: Alloctono, afrotropicale, solo porto di Venezia.
Silvanus muticus: Alloctono, neartico e neotropicale, solo porto di Venezia.
Silvanus proximus: Alloctono, afrotropicale, solo porto di Venezia.
Silvanus recticollis: Alloctono, afrotropicale e orientale, acclimatato nella Sardegna meridionale.
Cathartosilvanus imbellis: Alloctono, neotropicale, solo porto di Venezia.
Cathartosilvanus trivialis: Alloctono, neotropicale, solo porto di Venezia.
Parasilvanus fairmairei: Alloctono, afrotropicale, solo porto di Venezia.
Parasilvanus ocellatus: Alloctono, afrotropicale, solo porto di Venezia.
Parasilvanus pulcher: Alloctono, afrotropicale, solo porto di Venezia.

Spercheidae

Spercheus Kugelann, 1798

Spercheus emarginatus (Schaller, 1783) (N, S, Sa)

Sphaeridiidae

Coelostoma Brullé, 1835

Coelostoma hispanicum (Küster, 1848) (N, S, Si, Sa)

Coelostoma orbiculare (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa)

Dactylosternum Wollaston, 1854

Dactylosternum abdominale (Fabricius, 1792) (N, S, Si, Sa)

Sphaeridium Fabricius, 1775

Sphaeridium bipustulatum Fabricius, 1781 (N, S, Si, Sa)

Sphaeridium lunatum Fabricius, 1792 (N, S, Si, Sa)

Sphaeridium scarabaeoides (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Sphaeridium substriatum Faldermann, 1838 (N, S, Si, Sa)

Cercyon (Dicyrtocercyon) Ganglbauer, 1904

Cercyon (Dicyrtocercyon) ustulatus (Preyssler, 1790) (N, S)

Cercyon (Paracycreon) d'Orchymont, 1942

Cercyon (Paracycreon) laminatus Sharp, 1873 (N, S)

Cercyon (Cercyon) Leach, 1817

Cercyon (Cercyon) arenarius Rey, 1885 (N, S, Si, Sa)
Cercyon (Cercyon) atricapillus (Marsham, 1802) (N, S, Si, Sa)
Cercyon (Cercyon) bifenestratus Küster, 1851 (N, S?) (*)
Cercyon (Cercyon) bononiensis Chiesa, 1964 (N)
Cercyon (Cercyon) convexiusculus Stephens, 1829 (N, S?) (*)
Cercyon (Cercyon) depressus Stephens, 1829 (Sa?) (*)
Cercyon (Cercyon) granarius Erichson, 1837 (N, S, Si)
Cercyon (Cercyon) haemorrhoidalis (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa)
Cercyon (Cercyon) impressus (Sturm, 1807) (N, S, Si)
Cercyon (Cercyon) inquinatus Wollaston, 1854 (N?) (*)
Cercyon (Cercyon) lateralis (Marsham, 1802) (N, S, Si, Sa)
Cercyon (Cercyon) litoralis (Gyllenhal, 1808) (N?) (*)
Cercyon (Cercyon) marinus Thomson, 1853 (N?) (*)
Cercyon (Cercyon) melanocephalus (Linnaeus, 1758) (N, Si, Sa)
Cercyon (Cercyon) obsoletus (Gyllenhal, 1808) (N, S, Si, Sa)
Cercyon (Cercyon) pigmaeus (Illiger, 1801) (N, S, Si, Sa)
Cercyon (Cercyon) quisquilius (Linnaeus, 1761) (N, S, Si, Sa)
Cercyon (Cercyon) rhomboidalis Perris, 1875 (Sa)
Cercyon (Cercyon) sternalis (Sharp, 1918) (N, S, Si)
Cercyon (Cercyon) terminatus (Marsham, 1802) (N, Si, Sa)
Cercyon (Cercyon) tristis (Illiger, 1801) (N, S)
Cercyon (Cercyon) unipunctatus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)

Cercyon (Paracercyon) Seidlitz, 1888

Cercyon (Paracercyon) analis (Paykull, 1798) (N, S?) (*)

Megasternum Mulsant, 1844

Megasternum obscurum (Marsham, 1802) (N, S, Si, Sa)

Cryptopleurum Mulsant, 1844

Cryptopleurum crenatum (Panzer, 1794) (N, S)
Cryptopleurum minutum (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa)
Cryptopleurum subtile Sharp, 1884 (N, S) (*)

Note

Cercyon (Cercyon) bifenestratus: In S noto solo in Abruzzo (Monte Pagano).
Cercyon (Cercyon) convexiusculus: In S presenza certa solo in Toscana.
Cercyon (Cercyon) depressus: Specie non Italiana, la presenza in Sa incerta.
Cercyon (Cercyon) inquinatus: Specie di Madera, la presenza in N dubbia.
Cercyon (Cercyon) litoralis: Non sicura la presenza in Italia.
Cercyon (Cercyon) marinus: Dubbia la presenza in Italia.

Cercyon (Paracercyon) analis: In S segnalato solo in Abruzzo.
Cryptopleurum subtile: In S certo solo in Basilicata.

Sphaeritidae

Sphaerites Duftschmidt, 1805

Sphaerites glabratus (Fabricius, 1792) (N)

Sphindidae

Sphindus Dejean, 1821

Sphindus dubius (Gyllenhal, 1808) (N, S, Si, Sa)

Arpidiphorus Dejean, 1821

Arpidiphorus lareyniei (Jacquelin du Val, 1859) (N, S, Si)

Arpidiphorus orbiculatus (Gyllenhal, 1808) (N, S, Sa)

Staphylinidae

Trigonurus Mulsant & Rey, 1847

Trigonurus mellyi Mulsant & Rey, 1847 (N, S) (*)

Siagonium Kirby, 1815

Siagonium humerale Germar, 1817 (N, S, Si)

Siagonium quadricorne Kirby, 1815 (N, S, Si)

Bacillopsis Normand, 1920

Bacillopsis siculus Pace, 1979 (Si) (E)

Bacillopsis vignai Pace, 1979 (Sa) (E)

Leptotyphlopsis Scheerpeltz, 1931

Leptotyphlopsis doderoi (Razzauti, 1913) (S) (E)

Leptotyphlopsis lopadusae Bordoni, 1973 (Si) (E) (*)

Cylindropsis Fauvel, 1885

Cylindropsis andreinii Bordoni, 1968 (E)

Cylindropsis andreinii andreinii Bordoni, 1968 (S)

Cylindropsis andreinii bordonii Pace, 1979 (S)
Cylindropsis bordei Coiffait, 1955 (N)
Cylindropsis sardoa Saulcy, 1878 (Sa) (E)

Thoracophorus Motschulsky, 1837

Thoracophorus corticinus Motschulsky, 1837 (N)

Pseudopsis Newman, 1834

Pseudopsis sulcata Newman, 1834 (S)

Phloeocharis Mannerheim, 1831

Phloeocharis ichnusae Doderò, 1900 (Sa) (E)
Phloeocharis laticollis Fauvel, 1872 (N) (E)
Phloeocharis subtilissima Mannerheim, 1831 (N, S, Si)

Olisthaerus Dejean, 1833

Olisthaerus substriatus (Paykull, 1790) (N?) (*)

Metopsia Wollaston, 1854

Metopsia clypeata (Müller, 1821) (N, S, Si)
Metopsia refusa (Stephens, 1834) (Sa)

Megarthus Stephens, 1829

Megarthus affinis Miller, 1852 (N, S, Si, Sa)
Megarthus denticollis (Beck, 1817) (N, S?)
Megarthus hemipterus (Illiger, 1794) (N)
Megarthus nitidulus Kraatz, 1858 (N)
Megarthus prosseni Schatzmayr, 1904 (N)
Megarthus sinuatocollis (Lacordaire, 1835) (N, S?)
Megarthus stercorarius Mulsant & Rey, 1977 (N)

Proteinus Latreille, 1796

Proteinus atomarius Erichson, 1840 (N, S, Si, Sa)
Proteinus brachypterus (Fabricius, 1792) (N, S, Si, Sa)
Proteinus crenulatus Pandellé, 1867 (N, S, Si)
Proteinus longicornis Doderò, 1923 (N)
Proteinus macropterus (Gravenhorst, 1806) (N, S, Si, Sa)
Proteinus ovalis Stephens, 1834 (N, S, Si, Sa)
Proteinus siculus Doderò, 1923 (Si) (E)

Eusphalerum Kraatz, 1858

Eusphalerum abdominale (Gravenhorst, 1806) (N, S)
Eusphalerum albertae Zanetti, 1981 (N)
Eusphalerum albipile (Fauvel, 1900) (N) (E)
Eusphalerum alpinum (Heer, 1839)
 Eusphalerum alpinum alpinum (Heer, 1839) (N)
Eusphalerum anale (Erichson, 1840) (N)
Eusphalerum angusticollis (Fauvel, 1869) (N)
Eusphalerum annaerosae Zanetti, 1986 (N) (E)
Eusphalerum atrum (Heer, 1839) (N, S, Si)
Eusphalerum bargaglii (Luze, 1910) (N, S) (E)
Eusphalerum baudii (Fiori, 1894) (S) (E)
Eusphalerum bivittatum (Eppelsheim, 1887) (S, Si) (E)
Eusphalerum brandmayri Zanetti, 1981 (N)
Eusphalerum calabrum Zanetti, 1980 (S) (E)
Eusphalerum cerrutii (Bernhauer, 1940) (S) (E)
Eusphalerum clavipes (Scriba, 1868) (N, S) (E)
Eusphalerum cribellum (Fauvel, 1800) (S) (E)
Eusphalerum elongatum (Ganglbauer, 1895) (N)
Eusphalerum florale (Erichson, 1840) (N)
Eusphalerum foveicollis (Fauvel, 1868) (N)
Eusphalerum italicum (Koch, 1938) (E)
 Eusphalerum italicum italicum (Koch, 1938) (N, S)
 Eusphalerum italicum audisioi Zanetti, 1980 (S)
 Eusphalerum italicum binaghii Zanetti, 1980 (S)
Eusphalerum kahleni Zanetti, 1986 (N)
Eusphalerum limbatum (Erichson, 1840)
 Eusphalerum limbatum diolii Zanetti, 1982 (N)
 Eusphalerum limbatum limbatum (Erichson, 1840) (N)
 Eusphalerum limbatum paternum Zanetti, 1982 (N)
 Eusphalerum limbatum visentinii Zanetti, 1982 (N)
Eusphalerum longipenne (Erichson, 1839) (N)
Eusphalerum luteicorne (Erichson, 1840)
 Eusphalerum luteicorne luteicorne (Erichson, 1840) (Si, Sa?)
Eusphalerum luteum (Marsham, 1802)
 Eusphalerum luteum dispar (Baudi, 1889) (N, S, Si) (E)
 Eusphalerum luteum luteum (Marsham, 1802) (N)
Eusphalerum macropterum (Kraatz, 1858) (N)
Eusphalerum marshami (Fauvel, 1868) (N, S)
Eusphalerum minutum (Fabricius, 1792) (N)
Eusphalerum miricollis (Sainte-Claire Deville, 1901) (N)
Eusphalerum montivagum (Heer, 1839)
 Eusphalerum montivagum vesubianum Coiffait, 1959 (N, S)
Eusphalerum morator Zanetti, 1986 (S)
Eusphalerum nitidicollis (Baudi, 1857) (N)
Eusphalerum octavii (Fauvel, 1869) (N, S)
Eusphalerum pallens (Heer, 1841) (N, S)
Eusphalerum palligerum (Kiesenwetter, 1847) (N)

Eusphalerum primulae (Stephens, 1834) (N, S)
Eusphalerum procerum (Baudi, 1857) (N)
Eusphalerum pruinosum (Fauvel, 1869) (S) (*)
Eusphalerum pseudaucupariae (Strand, 1917) (N)
Eusphalerum pulcherrimum (Bernhauer, 1901) (N) (E)
Eusphalerum rectangulum (Fauvel, 1869) (N, S)
Eusphalerum rhododendri (Baudi, 1848) (N)
Eusphalerum robustum (Heer, 1839) (N, S)
Eusphalerum ruffoi (Scheerpeltz, 1956) (S) (E)
Eusphalerum schatzmayri (Koch, 1938) (S) (E)
Eusphalerum settei Zanetti, 1982 (N)
Eusphalerum sicanum Zanetti, 1980 (Si) (E)
Eusphalerum signatum (Märkel, 1857) (N)
 Eusphalerum signatum angulatum (Luze, 1911) (N, S) (E)
 Eusphalerum signatum signatum (Märkel, 1857) (N)
Eusphalerum sorbi (Gyllenhal, 1810) (N) (*)
Eusphalerum stramineum (Kraatz, 1858) (N, S)
Eusphalerum stussineri (Bernhauer, 1909) (S)
Eusphalerum tempestivum (Erichson, 1840) (Sa)
Eusphalerum torquatum (Marsham, 1802) (N?) (*)
Eusphalerum viertli (Ganglbauer, 1895) (S) (*)

***Acrulia* Thomson, 1859**

Acrulia inflata (Gyllenhal, 1813) (N, S)

***Acrolocha* Thomson, 1858**

Acrolocha amabilis (Heer, 1841) (S)
Acrolocha daccordii Zanetti, 1979 (S)
Acrolocha minuta (Olivier, 1795) (N?, S)
Acrolocha pliginskii Bernhauer, 1912 (N)
Acrolocha sulcula (Stephens, 1834) (S, Si, Sa?)

***Phyllodrepa* Thomson, 1859**

Phyllodrepa ammanni Bernhauer, 1940 (N)
Phyllodrepa devillei Bernhauer, 1902 (N, S?, Sa)
Phyllodrepa floralis (Paykull, 1789) (N, S, Si, Sa)
Phyllodrepa gracilicornis (Fairmaire & Laboulbène, 1856) (N, S)
Phyllodrepa ioptera (Stephens, 1834) (N, S)
Phyllodrepa linearis (Zetterstedt, 1828) (N)
Phyllodrepa melanocephala (Fabricius, 1787)
 Phyllodrepa melanocephala melanocephala (Fabricius, 1787) (N)
 Phyllodrepa melanocephala pollinensis Scheerpeltz, 1956 (S)
Phyllodrepa nigra (Gravenhorst, 1806) (N, S)
Phyllodrepa palpalis Luze, 1906 (N, S)
Phyllodrepa perforata Fiori, 1900 (N, S)

Phyllodrepa puberula Bernhauer, 1903 (N)
Phyllodrepa salicis (Gyllenhal, 1810) (N, S)
Phyllodrepa vilis (Erichson, 1840) (S, Sa)

Hapalaraea Thomson, 1859

Hapalaraea pygmaea (Paykull, 1800) (N, S, Si)

Hypopycna Rey, 1880

Hypopycna rufula (Erichson, 1840) (N, S, Si, Sa)

Dialycera Ganglbauer, 1895

Dialycera distincticornis (Baudi, 1869) (N, S, Si)

Omalium Gravenhorst, 1802

Omalium allardi Fairmaire & Brisout, 1859 (N, S, Si, Sa)
Omalium caesum Gravenhorst, 1806 (N, S)
Omalium cerrutii Zanetti, 1985 (N, S) (E)
Omalium cinnamomeum Kraatz, 1858 (S, Si)
Omalium doderoi Zanetti, 1980 (Sa) (E)
Omalium excavatum Stephens, 1834 (N, S, Si, Sa)
Omalium exiguum Gyllenhal, 1810 (N)
Omalium ferrugineum Kraatz, 1858 (N)
Omalium funebre Fauvel, 1869 (N)
Omalium italicum Bernhauer, 1902 (N, S, Si)
Omalium littorale Kraatz, 1858 (N)
Omalium nigriceps Kiesenwetter, 1850 (N)
Omalium oxyacanthae Gravenhorst, 1806 (N, S, Si, Sa)
Omalium poggii Zanetti, 1985 (Sa) (E)
Omalium riparium Thomson, 1856
 Omalium riparium impar Mulsant & Rey, 1861 (N, S, Si, Sa)
Omalium rivulare (Paykull, 1789) (N, S, Si)
Omalium rugatum Rey, 1880 (N, S, Si, Sa)
Omalium validum Kraatz, 1858 (N)
Omalium xambeui Fauvel, 1876 (N, S)

Carcinocephalus Bernhauer, 1903

Carcinocephalus blandus (Luze, 1906) (N) (E)

Phloeostiba Thomson, 1859

Phloeostiba lapponica (Zetterstedt, 1838) (N)
Phloeostiba plana (Paykull, 1792) (N, S, Si, Sa)

Paraphloeostiba Steel, 1960

Paraphloeostiba gayndahensis (Macleay, 1871) (N, S, Si) (*)

Phloeonomus Heer, 1839

Phloeonomus minimus (Erichson, 1839) (N, S)

Phloeonomus punctipennis Thomson, 1867 (N, S, Si?, Sa)

Phloeonomus pusillus (Gravenhorst, 1806) (N, S, Si?, Sa?)

Xylostiba Ganglbauer, 1895

Xylostiba bosnica (Bernhauer, 1902) (N, S, Si)

Xylostiba monilicornis (Gyllenhal, 1810) (N, S?)

Xylodromus Heer, 1839

Xylodromus affinis (Gerhardt, 1877) (N, S, Si)

Xylodromus concinnus (Marsham, 1802) (N, S, Sa)

Xylodromus depressus (Gravenhorst, 1802) (N, S, Si?, Sa?)

Xylodromus testaceus (Erichson, 1840) (N, S, Si)

Orochares Kraatz, 1858

Orochares angustatus (Erichson, 1840) (N, S)

Orochares calaber (Zanetti, 1983) (E)

Orochares calaber calaber (Zanetti, 1983) (S)

Orochares calaber sculus (Zanetti, 1983) (Si)

Mannerheimia Maerklin, 1880

Mannerheimia aprutiana Gridelli, 1924 (S) (E)

Mannerheimia arctica (Erichson, 1840) (N)

Mannerheimia doderoi Gridelli, 1924 (N)

Phyllodrepoidea Ganglbauer, 1895

Phyllodrepoidea crenata (Gravenhorst, 1802) (N, S, Si?)

Deliphrum Erichson, 1839

Deliphrum algidum Erichson, 1840 (N)

Deliphrum tectum (Paykull, 1789) (N)

Lathrimaeum Erichson, 1839

Lathrimaeum atrocephalum (Gyllenhal, 1827)

Lathrimaeum atrocephalum atrocephalum (Gyllenhal, 1827) (N, S, Si)

Lathrimaeum atrocephalum sardoum Scheerpeltz, 1961 (Sa) (E)
Lathrimaeum fuscum Erichson, 1839 (N)
Lathrimaeum melanocephalum (Illiger, 1794) (N, S)

Olophrum Erichson, 1839

Olophrum assimile (Paykull, 1800) (N?) (*)
Olophrum consimile (Gyllenhal, 1810) (N)
Olophrum piceum (Gyllenhal, 1810) (N)
Olophrum transversicollis Luze, 1905 (N)

Arpedium Erichson, 1839

Arpedium quadrum (Gravenhorst, 1806) (N)

Eucnecosum Reitter, 1909

Eucnecosum brachypterum (Gravenhorst, 1802) (N)
Eucnecosum tenue (LeConte, 1863) (N)

Deliphrosoma Reitter, 1909

Deliphrosoma macrocephalum (Eppelsheim, 1873) (N)
Deliphrosoma platyophthalmum Koch, 1937 (S) (E)
Deliphrosoma prolongatum (Rottenberg, 1873) (N)

Acidota Stephens, 1829

Acidota crenata (Fabricius, 1792) (N)
Acidota cruentata Mannerheim, 1831 (N, S, Si)

Philorinum Kraatz, 1858

Philorinum pallidicorne Fairmaire, 1860 (Si)
Philorinum sordidum (Stephens, 1834) (N, S, Si?)

Amphichroum Kraatz, 1858

Amphichroum canaliculatum (Erichson, 1840) (N, S)
Amphichroum hirtellum (Heer, 1839) (N)

Lesteva Latreille, 1796

Lesteva bavarica Lohse, 1955 (N)
Lesteva benicki Lohse, 1958 (N)
Lesteva breiti Lohse, 1955 (N)
Lesteva corsica Perris, 1869 (S?, Sa)
Lesteva foveolata Luze, 1903 (N) (E)

Lesteva hansenii Lohse, 1953 (N)
Lesteva lepontia Baudi, 1869 (N, S)
Lesteva longoelytrata (Goeze, 1777)
 Lesteva longoelytrata longoelytrata (Goeze, 1777) (N, S, Si)
 Lesteva longoelytrata maura Erichson, 1840 (Sa)
Lesteva luctuosa Fauvel, 1869 (N, S)
Lesteva monticola Kiesenwetter, 1847 (N, S, Si)
Lesteva omissa Rey, 1880 (*)
 Lesteva omissa carinthiaca Lohse, 1955 (N, S, Si)
 Lesteva omissa omissa Rey, 1880 (S, Sa)
Lesteva pubescens Mannerheim, 1831 (N, S, Sa?)
Lesteva punctata Erichson, 1839 (N, S)
Lesteva sbordonii Bordoni, 1973 (S) (E)
Lesteva sricula Erichson, 1840
 Lesteva sricula sricula Erichson, 1840 (S, Si)
Lesteva villardi Rey, 1880 (N)

Geodromicus Redtenbacher, 1856

Geodromicus corsicus Fagel, 1858 (Sa?) (*)
Geodromicus kunzei (Heer, 1839) (N)
Geodromicus nigrita (O.F. Müller, 1821) (N)
Geodromicus pedemontanus Fagel, 1958 (N, S)
Geodromicus plagiatus (Fabricius, 1798) (N)
Geodromicus suturalis (Lacordaire, 1835) (N)

Hygrogeus Rey, 1880

Hygrogeus aemulus (Rosenhauer, 1847) (N, S)

Anthophagus Gravenhorst, 1802

Anthophagus aeneicollis Fauvel, 1873 (N)
Anthophagus alpestris Heer, 1839
 Anthophagus alpestris alpestris Heer, 1839 (N)
 Anthophagus alpestris kochi Bernhauer, 1935 (S) (E)
Anthophagus alpinus (Fabricius, 1792)
 Anthophagus alpinus alpinus (Fabricius, 1792) (N)
 Anthophagus alpinus aprutianus Koch, 1934 (S) (E)
Anthophagus angusticollis (Mannerheim, 1831)
 Anthophagus angusticollis angusticollis (Mannerheim, 1831) (N)
Anthophagus apenninus Baudi, 1869 (N, S) (E)
Anthophagus bicornis (Block, 1799) (N, S)
Anthophagus caraboides (Linné, 1758) (N)
Anthophagus fallax Kiesenwetter, 1848 (N)
Anthophagus fauveli Luze, 1902 (E)
 Anthophagus fauveli caprai Koch, 1933 (N, S)
 Anthophagus fauveli fauveli Luze, 1902 (Si)

Anthophagus forticornis Kiesenwetter, 1846 (N)
Anthophagus melanocephalus Heer, 1838 (N, S?)
Anthophagus noricus Ganglbauer, 1895 (N)
Anthophagus omalinus Zetterstedt, 1828
 Anthophagus omalinus arrowi Koch, 1933 (N)
Anthophagus rotundicollis Heer, 1839 (N)
Anthophagus scutellaris Erichson, 1840 (N, S)
Anthophagus spectabilis Heer, 1839 (N)
Anthophagus torretassoi Koch, 1933 (E)
 Anthophagus torretassoi pollinensis Koch, 1934 (S)
 Anthophagus torretassoi torretassoi Koch, 1933 (S)
Anthophagus transversus Motschulsky, 1857
 Anthophagus transversus dinaricus Apfelbeck, 1909 (N)

Hadrognathus Schaum, 1852

Hadrognathus longipalpis (Mulsant & Rey, 1851) (N)

Eudectus Redtenbacher, 1857

Eudectus giraudi Redtenbacher, 1857 (N)

Coryphium Stephens, 1834

Coryphium angusticolle Stephens, 1834 (N, S, Si)
 Coryphium atratum Breit, 1911 (S)
 Coryphium dilutipes Ganglbauer, 1904 (N)
 Coryphium gredleri Kraatz, 1870 (N)

Boreaphilus Sahlberg, 1832

Boreaphilus melichari Jurecek, 1910 (N)
 Boreaphilus pacei Zanetti, 1983 (Si)
 Boreaphilus velox (Heer, 1839) (N, S, Si, Sa)

Euphantias Fairmaire & Laboulbène, 1856

Euphantias insignis (Mulsant & Rey, 1856) (*)
 Euphantias insignis insignis (Mulsant & Rey, 1856) (S, Si)
 Euphantias insignis insularis Koch, 1934 (Sa)

Syntomium Curtis, 1828

Syntomium aeneum (O.F. Müller, 1821) (N)

Deleaster Erichson, 1839

Deleaster dichrous (Gravenhorst, 1802) (N, S, Si, Sa)

Coprophilus Latreille, 1829

Coprophilus striatulus (Fabricius, 1792) (N, S)

Manda Blackwelder, 1952

Manda mandibularis (Gyllenhal, 1827) (N, S)

Ochtheophilus Mulsant & Rey, 1856

Ochtheophilus angustatus (Erichson, 1840) (N, S, Si)

Ochtheophilus filum (Fauvel, 1875) (N)

Ochtheophilus aureus (Fauvel, 1869) (N, S, Sa)

Ochtheophilus emarginatus (Fauvel, 1872) (N)

Ochtheophilus flexuosus (Fairmaire & Laboulbène, 1856) (N, S, Sa)

Ochtheophilus longipennis (Fairmaire & Laboulbène, 1856) (N, S, Si, Sa)

Ochtheophilus mediterraneus (Scheerpeltz, 1950) (N)

Ochtheophilus omalinus (Erichson, 1840) (N, S, Si, Sa)

Ochtheophilus rosenhaueri (Kiesenwetter, 1850) (N)

Ochtheophilus carnicus (Scheerpeltz, 1950) (N)

Ochtheophilus gracilis (Fagel, 1951) (N)

Ochtheophilus grigolettoi (Fagel, 1951) (N)

Carpelimus Leach, 1819

Carpelimus anthracinus (Mulsant & Rey, 1861) (N, S)

Carpelimus alutaceus (Fauvel, 1898) (N, Sa)

Carpelimus augustae (Bernhauer, 1901) (N)

Carpelimus bilineatus (Stephens, 1834) (N, S, Si, Sa)

Carpelimus corticinus (Gravenhorst, 1806) (N, S, Si, Sa)

Carpelimus despectus (Baudi, 1869) (N, S, Sa)

Carpelimus elongatulus (Erichson, 1839) (N, S)

Carpelimus exiguus (Erichson, 1839) (N, S, Si, Sa)

Carpelimus foveolatus (Sahlberg, 1832) (N, S, Si, Sa)

Carpelimus fuliginosus (Gravenhorst, 1802) (N, S)

Carpelimus gracilis (Mannerheim, 1831) (N, S, Si, Sa)

Carpelimus gradensis (Bernhauer, 1923) (N)

Carpelimus halophilus (Kiesenwetter, 1844) (N, Sa)

Carpelimus impressus (Lacordaire, 1835) (N, Si)

Carpelimus nigrita (Wollaston, 1857) (N, S, Si)

Carpelimus nitidus (Baudi, 1848) (N, S, Si, Sa)

Carpelimus obesus (Kiesenwetter, 1844) (N, S, Si, Sa)

Carpelimus opacus (Baudi, 1848) (N, S)

Carpelimus parvulus (Mulsant & Rey, 1861) (N, S, Si, Sa)

Carpelimus politus (Kiesenwetter, 1850) (N, S, Si)

Carpelimus punctatellus (Erichson, 1840) (N, S)

Carpelimus punctipennis (Kiesenwetter, 1850) (N, S)

Carpelimus pusillus (Gravenhorst, 1802) (N, S, Si, Sa)
Carpelimus rivularis (Motschulsky, 1860) (N, S, Si, Sa)
Carpelimus schneideri (Ganglbauer, 1895) (N)
Carpelimus sculus (Rey, 1879) (S, Si)
Carpelimus similis (Smetana, 1967) (N, S) (*)
Carpelimus subtilicornis (Roubal, 1946) (N)
Carpelimus subtilis (Erichson, 1839) (N)
Carpelimus troglodytes (Erichson, 1839) (Si, Sa)
Carpelimus vitalei (Bernhauer, 1935) (Si)

Thinodromus Kraatz, 1857

Thinodromus arcuatus (Stephens, 1834) (N, S)
Thinodromus dilatatus (Erichson, 1839) (N, S, Si)
Thinodromus distinctus (Fairmaire & Laboulbène, 1854) (N)
Thinodromus hirticollis (Mulsant & Rey, 1879) (N, S, Si)
Thinodromus mannerheimi (Kolenati, 1846) (N, S, Si, Sa)

Thinobius Kiesenwetter, 1844

Thinobius angusticeps Fauvel, 1889 (N)
Thinobius atomus Fauvel, 1869 (N) (*)
Thinobius brevipennis Kiesenwetter, 1850 (N)
Thinobius brunneipennis Kraatz, 1858 (N)
Thinobius crinifer Smetana, 1959 (N)
Thinobius delicatulus Kraatz, 1858 (N, S, Sa)
Thinobius fageli Smetana, 1959 (N)
Thinobius garreisi Bernhauer, 1915 (N)
Thinobius heterogaster Fauvel, 1889 (N)
Thinobius ligeris Pyot, 1874 (N)
Thinobius linearis Kraatz, 1858 (N, S)
Thinobius lohsei Smetana, 1984 (N)
Thinobius longipennis (Heer, 1841) (N, S, Si, Sa) (*)
Thinobius major Kraatz, 1857 (N)
Thinobius micros Fauvel, 1869 (N)
Thinobius nitens Fauvel, 1869 (N)
Thinobius obscurus Eppelsheim, 1889 (N) (*)
Thinobius peezi Scheerpeltz, 1957 (N)
Thinobius praetor Smetana, 1959 (N)
Thinobius silvaticus Bernhauer, 1899 (N) (*)

Planeustomus Jacquelin Du Val, 1857

Planeustomus cephalotes (Erichson, 1839) (S)
Planeustomus curtispennis Fauvel, 1869 (Si, Sa)
Planeustomus elegantulus Kraatz, 1857 (S, Si)
Planeustomus kahri Kraatz, 1857 (N, S)
Planeustomus miles Scriba, 1868 (S)

Planeustomus palpalis (Erichson, 1839) (N, S)
Planeustomus rosti Reitter, 1884 (N?, S?, Si?, Sa?) (*)

Aploderus Stephens, 1833

Aploderus caelatus (Gravenhorst, 1802) (N, S, Sa)
Aploderus caesus (Erichson, 1839) (N?) (*)

Oxytelus Gravenhorst, 1802

Oxytelus fulvipes Erichson, 1839 (N)
Oxytelus laqueatus (Marsham, 1802) (N, S)
Oxytelus migrator Fauvel, 1904 (N) (*)
Oxytelus piceus (Linné, 1767) (N, S, Si, Sa)
Oxytelus sculptus Gravenhorst, 1806 (N, S, Si, Sa)

Anotylus Thomson, 1859

Anotylus affinis (Czwalina, 1870) (N)
Anotylus clypeonitens (Pandellé, 1867) (N, S, Si, Sa)
Anotylus complanatus (Erichson, 1839) (N, S, Si, Sa) (*)
Anotylus fairmairei (Pandellé, 1867) (N)
Anotylus hamatus (Fairmaire & Laboulbène, 1856) (N, S)
Anotylus insecatus (Gravenhorst, 1806) (N)
Anotylus intricatus (Erichson, 1840) (N, S, Si)
Anotylus inustus (Gravenhorst, 1806) (N, S, Si, Sa)
Anotylus mutator (Lohse, 1963) (N)
Anotylus nitidulus (Gravenhorst, 1802) (N, S, Si, Sa)
Anotylus plagiat (Rosenhauer, 1856) (N?, S?, Si?, Sa?) (*)
Anotylus pumilus (Erichson, 1839) (N, S, Si)
Anotylus rugifrons (Hochhuth, 1849) (N)
Anotylus rugosus (Fabricius, 1775) (N, S, Sa)
Anotylus saulcyi (Pandellé, 1867) (N)
Anotylus sculpturatus (Gravenhorst, 1806) (N, S, Si, Sa)
Anotylus speculifrons (Kraatz, 1857) (N, S, Si, Sa)
Anotylus tetracarinatus (Block, 1799) (N, S, Si, Sa)
Anotylus tetratoma (Czwalina, 1870) (N)
Anotylus torretassoi (Koch, 1932) (Si)

Platystethus Mannhereim, 1831

Platystethus alutaceus Thomson, 1861 (N, S, Si, Sa)
Platystethus arenarius (Fourcroy, 1785) (N, S, Si, Sa)
Platystethus brevipennis Baudi, 1857 (S, Si, Sa) (*)
Platystethus burlei Brisout, 1861 (N, S, Si)
Platystethus capito Heer, 1839 (N, S, Si?)
Platystethus cornutus (Gravenhorst, 1802) (N, S, Si, Sa)
Platystethus degener Mulsant & Rey, 1879 (N, Si?)

Platystethus laevis Kiesenwetter, 1848 (N, S)
Platystethus nitens (Sahlberg, 1832) (N, S, Si, Sa) (*)
Platystethus nodifrons Mannerheim, 1831 (N, S)
Platystethus rufospinus Hochhuth, 1851 (Si, Sa)
Platystethus spinosus Erichson, 1840 (N, S, Si, Sa)

Bledius Leach, 1819

Bledius agriculator Heer, 1839 (N)
Bledius angustus Mulsant & Rey, 1861 (Si)
Bledius atramentarius Rottenberg, 1870 (Si, Sa)
Bledius atratus Fauvel, 1875 (Sa)
Bledius baudii Fauvel, 1870 (N)
Bledius bosnicus Bernhauer, 1902 (N)
Bledius corniger Rosenhauer, 1856 (Si)
Bledius crassicollis Lacordaire, 1835 (N, S, Si)
Bledius cribricollis Heer, 1839 (N, S, Si, Sa)
Bledius dama (Motschulsky, 1857) (N, Sa)
Bledius debilis Erichson, 1840 (N, S, Si)
Bledius defensus Fauvel, 1870 (N)
Bledius denticollis Fauvel, 1870 (N, S, Si)
Bledius dissimilis Erichson, 1840 (N, S, Si)
Bledius elongatus Mannerheim, 1831 (N) (*)
Bledius ensifer Fauvel, 1898 (Si)
Bledius erraticus Erichson, 1839 (N, S)
Bledius femoralis (Gyllenhal, 1827) (N, S)
Bledius fergussoni Joy, 1912 (N, S, Si, Sa)
Bledius fontinalis Bernhauer, 1929 (N)
Bledius fossor Heer, 1839 (N, S, Si, Sa)
Bledius frater Kraatz, 1857 (N, S, Si)
Bledius furcatus (Olivier, 1811) (N, S, Si, Sa)
Bledius gallicus (Gravenhorst, 1806) (N, S, Si, Sa)
Bledius graellsii Fauvel, 1865 (N, S, Si, Sa)
Bledius heterocerus (Eppelsheim, 1889) (N)
Bledius littoralis Heer, 1838 (N)
Bledius longulus Erichson, 1839 (N, S, Si)
Bledius minor Mulsant & Rey, 1878 (*)
 Bledius minor minor Mulsant & Rey, 1878 (N, S)
 Bledius minor doderoi Bondroit, 1912 (S)
Bledius morio Heer, 1839 (S)
Bledius nanus Erichson, 1840 (N, S)
Bledius occidentalis Bondroit, 1907 (N, S) (*)
Bledius opacus (Block, 1799) (N, S, Si, Sa)
Bledius osiris Normand, 1934 (*)
 Bledius osiris burlinii Koch, 1938 (N)
Bledius pallipes (Gravenhorst, 1806) (N)
Bledius paradoxus Gridelli, 1936 (S)
Bledius praetermissus Williams, 1922 (N, S, Si, Sa) (*)

Bledius procerulus Erichson, 1840 (N, S)
Bledius pusillus Erichson, 1839 (N)
Bledius pygmaeus Erichson, 1839 (N)
Bledius secessus Bondroit, 1912 (N)
Bledius spectabilis Kraatz, 1857 (N, Si, Sa)
Bledius strictus Fauvel, 1870 (N)
Bledius subterraneus Erichson, 1839 (N)
Bledius talpa (Gyllenhal, 1810) (N)
Bledius tibialis Heer, 1839 (N)
Bledius tricornis (Herbst, 1784) (N?, S?, Si?) (*)
Bledius tristis Aubé, 1843
 Bledius tristis minarzi Bernhauer, 1929 (N, S)
 Bledius tristis tristis Aubé, 1843 (N, S, Si)
Bledius unicornis (Germar, 1825) (N, S, Si, Sa)
Bledius verres Erichson, 1840 (N, S, Si, Sa)
Bledius infans Rottenberg, 1870 (Si)

Cephalotyphlus Coiffait, 1955

Cephalotyphlus bergamascus Pace, 1991 (N) (E)
Cephalotyphlus florentinus (Pace, 1978) (S) (E)
Cephalotyphlus foroiuliensis (Pace, 1976) (N) (E)
Cephalotyphlus vicetinus (Pace, 1975) (N) (E)

Neocyrtotyphlus Pace, 1976

Neocyrtotyphlus apulus (Pace, 1974) (S) (E)

Cyrtotyphlus Doderò, 1900

Cyrtotyphlus convexus Doderò, 1900 (N, S)
Cyrtotyphlus winkleri Breit, 1913 (N)

Entomoculia Croissandeau, 1891

Entomoculia apuana Pace, 1977 (S) (E)
Entomoculia atomus (Saulcy, 1878) (Sa) (E)
Entomoculia caprai Poggi, 1977 (Si) (E)
Entomoculia consiglioi Pace, 1991 (S) (E) (*)
Entomoculia doderoi Coiffait, 1955 (N) (E)
Entomoculia etrurica Coiffait, 1957 (S) (E)
Entomoculia gardinii Pace, 1994 (Sa) (E)
Entomoculia hadriatica Pace, 1974 (S) (E)
Entomoculia iknusa Coiffait, 1959 (Sa) (E)
Entomoculia julii Poggi, 1985 (S) (E) (*)
Entomoculia labronica Poggi, 1985 (S) (E)
Entomoculia lepinensis Pace, 1991 (S) (E)
Entomoculia ligurica Coiffait, 1957 (N) (E)

Entomoculia magrinii Pace, 1994 (S) (E)
Entomoculia maremmana Pace, 1978 (S) (E)
Entomoculia marinae Pace, 1991 (S) (E) (*)
Entomoculia montisconeri Pace, 1977 (S) (E)
Entomoculia nerviensis Coiffait, 1962 (N) (E)
Entomoculia pardii Pace, 1978 (S) (E)
Entomoculia pretiosa Pace, 1977 (S) (E)
Entomoculia rosai Pace, 1978 (S) (E) (*)
Entomoculia sardoa Coiffait, 1959 (Sa) (E)
Entomoculia sassariensis Pace, 1978 (Sa) (E)
Entomoculia sicana Pace, 1995 (Si) (E)
Entomoculia solarii Coiffait, 1957 (N) (E)
Entomoculia toscanensis Coiffait, 1957 (S) (E) (*)
Entomoculia vignai Pace, 1991 (S) (E)

Allotyphlus Coiffait, 1955

Allotyphlus bericiensis Coiffait, 1973 (N) (E)
Allotyphlus garganicus Pace, 1974 (S) (E)
Allotyphlus pacei Coiffait, 1973 (E)
 Allotyphlus pacei baldensis Pace, 1978 (N)
 Allotyphlus pacei euganeus Pace, 1975 (N)
 Allotyphlus pacei lessiniensis (Coiffait, 1973) (N)
 Allotyphlus pacei marosticanus Pace, 1978 (N)
 Allotyphlus pacei monsfortensis Pace, 1978 (N)
 Allotyphlus pacei pacei Coiffait, 1973 (N)
Allotyphlus sipontinus Pace, 1985 (S) (E)
Allotyphlus transhadriaticus Pace, 1977 (S) (E)

Mesotyphlus Coiffait, 1955

Mesotyphlus andreinii Pace, 1979 (S) (E)
Mesotyphlus bordonii Pace, 1977 (S) (E)
Mesotyphlus calaber Pace, 1974 (S) (E)
Mesotyphlus etruscus Pace, 1978 (S) (E)
Mesotyphlus grossetensis Pace, 1979 (S) (E)
Mesotyphlus solarii Coiffait, 1957 (N) (E)

Leptotyphlus Fauvel, 1874

Leptotyphlus aithaliensis Orousset, 1983 (S) (E) (*)
Leptotyphlus albingaunicus Pace, 1981 (N) (E)
Leptotyphlus anachoreta Pace, 1974 (S) (E)
Leptotyphlus apenninus Pace, 1991 (N) (E)
Leptotyphlus brevicornis Coiffait, 1955 (Sa) (E)
Leptotyphlus calabricus Coiffait, 1971 (S) (E)
Leptotyphlus campanus Pace, 1977 (S) (E)
Leptotyphlus circaeus Pace, 1977 (S) (E)

Leptotyphlus denticulatus Coiffait, 1957 (Sa) (E)
Leptotyphlus doderoi Coiffait, 1957 (Sa) (E)
Leptotyphlus elbanus Pace, 1980 (S) (E)
Leptotyphlus finalensis Pace, 1981 (N) (E)
Leptotyphlus foroiuliensis Pace, 1976 (N) (E)
Leptotyphlus foveiceps Dodero, 1908 (N, S) (E)
Leptotyphlus giglionicus Coiffait, 1955 (S) (E) (*)
Leptotyphlus ilvensis Orousset, 1983 (S) (E) (*)
Leptotyphlus impressus Coiffait, 1955 (Sa) (E)
Leptotyphlus inopinatus Pace, 1974 (S) (E)
Leptotyphlus kahleni Pace, 1991 (N) (E)
Leptotyphlus lepinensis Pace, 1977 (S) (E)
Leptotyphlus lessinicus Pace, 1973 (N) (E)
Leptotyphlus liguricus Coiffait, 1957 (N) (E)
Leptotyphlus magrinii Pace, 1995 (Sa) (E)
Leptotyphlus martellii Pace, 1974 (S) (E)
Leptotyphlus mimus Pace, 1977 (S) (E)
Leptotyphlus molisensis Pace, 1977 (S) (E)
Leptotyphlus nerviensis Coiffait, 1962 (N) (E)
Leptotyphlus oglasensis Poggi, 1976 (S) (E) (*)
Leptotyphlus osellai Pace, 1973 (N) (E)
Leptotyphlus picenus Pace, 1977 (S) (E)
Leptotyphlus remensis Pace, 1981 (N) (E)
Leptotyphlus romanus Pace, 1974 (S) (E)
Leptotyphlus ruffoi Pace, 1974 (S) (E)
Leptotyphlus samniticus Pace, 1977 (S) (E)
Leptotyphlus sardous Coiffait, 1955 (Sa) (E)
Leptotyphlus savonensis Pace, 1981 (N) (E)
Leptotyphlus sbordonii Pace, 1991 (S) (E) (*)
Leptotyphlus senensis Pace, 1978 (S) (E)
Leptotyphlus serianensis Coiffait, 1957 (N) (E)
Leptotyphlus solarii Coiffait, 1957 (Sa) (E)
Leptotyphlus taggiensis Coiffait, 1962 (N) (E)
Leptotyphlus tyrrhenius Dodero, 1908 (S) (E)
Leptotyphlus uccellinensis Pace, 1978 (S) (E)
Leptotyphlus velatus Coiffait, 1955 (Sa) (E)
Leptotyphlus veronensis Pace, 1978 (N) (E)
Leptotyphlus viti Pace, 1978 (Sa) (E)

***Metrotyphlus* Coiffait, 1959**

Metrotyphlus brixianus Pace, 1973 (N) (E)
Metrotyphlus castrii Coiffait, 1965 (N) (E)
Metrotyphlus gorititanus Pace, 1977 (N) (E)
Metrotyphlus pauper Pace, 1976 (N) (E)
Metrotyphlus sbordonii Pace, 1979 (Sa) (E)
Metrotyphlus serianensis (Coiffait, 1957)
 Metrotyphlus serianensis serianensis (Coiffait, 1957) (N) (E)

Metrotyphlus tarvisianus Pace, 1991 (N) (E)
Metrotyphlus viti Pace, 1985 (N) (E)
Metrotyphlus zoiai Pace, 1991 (N) (E)

Gynotyphlus Coiffait, 1955

Gynotyphlus perpusillus (Doderò, 1900)
Gynotyphlus perpusillus perpusillus (Doderò, 1900) (N, S)
Gynotyphlus perpusillus meridionalis Coiffait, 1957 (S, Si) (E)

Apheliotyphlus Pace, 1976

Apheliotyphlus nobilis (Pace, 1976) (N) (E)

Megatyphlus Coiffait, 1955

Megatyphlus carniolicus (Bernhauer, 1908)
Megatyphlus carniolicus goritjanus Pace, 1978 (N)

Oxyporus Fabricius, 1775

Oxyporus maxillosus Fabricius, 1792 (N, S?)
Oxyporus rufus (Linné, 1758) (N, S, Si)

Dianous Leach, 1819

Dianous coerulescens (Gyllenhal, 1810) (N, S)

Stenus Latreille, 1796

Stenus abruzzorum Puthz, 1965 (S) (E)
Stenus aceris Stephens, 1833 (N, S, Si, Sa)
Stenus alpicola Fauvel, 1872
Stenus alpicola alpicola Fauvel, 1872 (N, S)
Stenus ampliventris Sahlberg, 1890 (N)
Stenus angelinii Puthz, 1994 (Si) (E)
Stenus annulipes Heer, 1839 (N)
Stenus areolatus Benick, 1929 (N) (E)
Stenus argus Gravenhorst, 1806 (N, S?)
Stenus asphaltinus Erichson, 1840 (N, S, Si, Sa)
Stenus assequens Rey, 1884 (N, S, Si, Sa)
Stenus ater Mannerheim, 1831 (N, S, Si, Sa)
Stenus aterrimus Erichson, 1840 (N, S?, Sa?)
Stenus atratulus Erichson, 1839 (N, S, Si, Sa)
Stenus bifoveolatus Gyllenhal, 1827 (N, S)
Stenus biguttatus (Linné, 1758) (N, S)
Stenus bimaculatoides Scheerpeltz, 1969 (S) (E)
Stenus bimaculatus Gyllenhal, 1810 (N?, S)

Stenus binaghii Puthz, 1970 (S) (E)
Stenus binotatus Ljungh, 1804 (N, S)
Stenus boops Ljungh, 1804
 Stenus boops ludmilae Hromadka, 1979 (N, S?, Sa?)
Stenus bordonii Puthz, 1974 (S) (E)
Stenus brunnipes Stephens, 1833
 Stenus brunnipes brunnipes Stephens, 1833 (N, S, Si)
 Stenus brunnipes maximus Puthz, 1968 (S, Si)
Stenus butrintensis Smetana, 1959 (N, S)
Stenus cadoricola Puthz, 1967 (N) (E)
Stenus caligicola Puthz, 1970 (S) (E)
Stenus canaliculatus Gyllenhal, 1827 (N)
Stenus canescens Rosenhauer, 1856 (Sa)
Stenus capitatus Eppelsheim, 1878 (Si)
Stenus carbonarius Gyllenhal, 1827 (N, S?)
Stenus cautus Erichson, 1839 (N)
Stenus cavallomontis Puthz, 1993 (N) (E)
Stenus chobauti Benick, 1927 (N, S, Si)
Stenus cincidoides (Schaller, 1783) (N, S, Sa?)
Stenus circularis Gravenhorst, 1802 (N, S?, Sa?)
Stenus clavicornis (Scopoli, 1763) (N, S, Si?)
Stenus comma LeConte, 1863
 Stenus comma aeneiceps Rey, 1883 (N, S)
 Stenus comma comma LeConte, 1863 (N)
 Stenus comma peroculatus Puthz, 1986 (S)
Stenus cordatus Gravenhorst, 1802 (N, S, Si, Sa)
Stenus cottianus Puthz, 1994 (N) (E)
Stenus crassus Stephens, 1833 (N, S?)
Stenus cribratus Kiesenwetter, 1850 (N, S, Si, Sa)
Stenus edentatus Puthz, 1986 (S, Si)
Stenus elegans Rosenhauer, 1856 (N, S, Si, Sa)
Stenus eumerus Kiesenwetter, 1850 (N)
Stenus europaeus Puthz, 1966 (N, S)
Stenus flavipalpis Thomson, 1860 (N)
Stenus flavipes Stephens, 1833
 Stenus flavipes flavipes Stephens, 1833 (N, S, Si?, Sa)
Stenus focarilei Puthz, 1994 (N) (E)
Stenus formicetorum Mannerheim, 1843 (N, S?, Sa?)
Stenus fornicatus Stephens, 1833 (N, S, Si, Sa)
Stenus fossulatus Erichson, 1840 (N, S)
Stenus fulvicornis Stephens, 1833
 Stenus fulvicornis fulvicornis Stephens, 1833 (N, S?, Sa)
Stenus fuscicornis Erichson, 1840 (N, S, Si, Sa)
Stenus fuscipes Gravenhorst, 1802 (N, S)
Stenus gallicus Fauvel, 1872 (N)
Stenus ganglbaueri Bernhauer, 1905 (N, S)
Stenus geniculatus Gravenhorst, 1806 (N)
Stenus glacialis Heer, 1839

Stenus glacialis glacialis Heer, 1839 (N)
Stenus gracilipes Kraatz, 1857 (N)
Stenus guglielmomontis Puthz, 1993 (N) (E)
Stenus guttula O.F. Müller, 1821
 Stenus guttula guttula O.F. Müller, 1821 (N, S, Si, Sa)
Stenus guynemeri Duval, 1850
 Stenus guynemeri guynemeri Duval, 1850 (N, S)
Stenus holdhausi Benick, 1938 (E)
 Stenus holdhausi holdhausi Benick, 1938 (N)
 Stenus holdhausi temperans Puthz, 1967 (N)
Stenus hospes Erichson, 1840 (N, S, Si, Sa)
Stenus humilis Erichson, 1839 (N, S?, Sa?)
Stenus hypoproditor Puthz, 1965 (N)
Stenus hypsidromus Ganglbauer, 1902 (N) (*)
Stenus ignifuga Bondroit, 1912 (N)
Stenus ignotus Eppelsheim, 1890 (N, Sa?)
Stenus impressus Germar, 1824
 Stenus impressus impressus Germar, 1824 (N, S)
Stenus incanus Erichson, 1839 (N, S, Si, Sa)
Stenus incrassatus Erichson, 1839 (N, S?, Sa)
Stenus indifferens Puthz, 1967 (S)
Stenus intermedius Rey, 1884 (N, Si, Sa)
Stenus intricatus Erichson, 1840 (*)
 Stenus intricatus intricatus Erichson, 1840 (N, S, Sa)
 Stenus intricatus zoufali Fleischer, 1909 (N, S)
Stenus jarrigei Puthz, 1970 (N)
Stenus juno (Paykull, 1789) (N, S)
Stenus kahleni Puthz, 1994 (N) (E)
Stenus kuennemanni Benick, 1917 (N)
Stenus laevigatus Mulsant & Rey, 1861 (N, S, Sa)
Stenus languidus Erichson, 1840 (S, Si, Sa)
Stenus latifrons Erichson, 1839 (N, S, Si?, Sa?)
Stenus leonhardi Bernhauer, 1914 (Si) (E)
Stenus leprieuri Cussac, 1851 (S?) (*)
Stenus liechtensteini Bernhauer, 1900 (N) (E)
Stenus lohsei Puthz, 1965 (N)
Stenus longipes Heer, 1839 (N, S)
Stenus longitarsis Thomson, 1851 (N, S?)
Stenus ludyi Fauvel, 1886 (N, S)
Stenus lustrator Erichson, 1839 (N)
Stenus macrocephalus Aubé, 1863 (N, S, Sa)
Stenus maculiger Weise, 1875 (N)
Stenus melanarius Stephens, 1833
 Stenus melanarius melanarius Stephens, 1833 (N)
Stenus melanopus (Marsham, 1802) (N, S, Si, Sa)
Stenus mendicus Erichson, 1840
 Stenus mendicus mendicus Erichson, 1840 (S, Si, Sa)
Stenus morio Gravenhorst, 1806 (N)

Stenus nanus Stephens, 1833 (N, S?)
Stenus nigrutilus Gyllenhal, 1827 (N)
Stenus nitens Stephens, 1833 (N)
Stenus nitidiusculus Stephens, 1833 (*)
 Stenus nitidiusculus nitidiusculus Stephens, 1833 (N, S)
 Stenus nitidiusculus quadratipennis Bernhauer, 1915 (N?, S?)
Stenus niveus Fauvel, 1865 (N?) (*)
Stenus noctivagus Casey, 1884 (N)
Stenus nodipes Puthz, 1972 (Sa?) (*)
Stenus ochropus Kiesenwetter, 1858 (N, S, Sa?)
Stenus opticus Gravenhorst, 1806 (N, S)
Stenus oscillator Rye, 1870 (N)
Stenus ossium Stephens, 1833 (N, S, Si, Sa)
Stenus pallipes Gravenhorst, 1802 (N)
Stenus pallitarsis Stephens, 1833
 Stenus pallitarsis pallitarsis Stephens, 1833 (N, S, Si, Sa)
Stenus palposus Zetterstedt, 1838 (N?) (*)
Stenus paludicola Kiesenwetter, 1858 (N, S)
Stenus parcior Fagel, 1958
 Stenus parcior limonensis Fagel, 1958 (N, S)
Stenus pedemontanus Puthz, 1994 (N) (E)
Stenus phyllobates Penecke, 1901 (*)
 Stenus phyllobates miscellus Benick, 1925 (N, S)
 Stenus phyllobates phyllobates Penecke, 1901 (N)
Stenus picipennis Erichson, 1840 (N, S, Si, Sa)
Stenus picipes Stephens, 1833 (*)
 Stenus picipes brevipennis Thomson, 1851 (N?)
 Stenus picipes picipes Stephens, 1833 (N, S, Si)
 Stenus picipes vulturnus Benick, 1951 (S)
Stenus planifrons Rey, 1884
 Stenus planifrons misael Bondroit, 1912 (N, S)
 Stenus planifrons planifrons Rey, 1884 (N, S)
Stenus proditor Erichson, 1839 (N?) (*)
Stenus providus Erichson, 1839
 Stenus providus providus Erichson, 1839 (N, S, Si, Sa)
 Stenus providus simplex Rey, 1884 (N, S)
Stenus pubescens Stephens, 1833
 Stenus pubescens pubescens Stephens, 1833 (N)
Stenus pumilio Erichson, 1839 (N)
Stenus pusillus Stephens, 1833 (N)
Stenus ruralis Erichson, 1840 (N, S)
Stenus salinus Brisout, 1863 (S?, Si, Sa)
Stenus scaber Fauvel, 1869 (N, S, Si, Sa)
Stenus scrutator Erichson, 1839 (N, S?)
Stenus similis (Herbst, 1784) (N, S, Si, Sa)
Stenus solutus Erichson, 1840 (N)
Stenus sparsus Fauvel, 1874 (Sa?) (*)
Stenus stigmula Erichson, 1840 (N)

Stenus strigosus Fauvel, 1872 (S, Sa) (*)
Stenus subaeneus Erichson, 1840 (N, S, Si, Sa)
Stenus subdepressus Mulsant & Rey, 1861 (N)
Stenus sylvester Erichson, 1839 (N, S?)
Stenus tardus Puthz, 1970 (Sa) (E)
Stenus tarsalis Ljungh, 1804 (N, S, Sa?)
Stenus trivialis Kraatz, 1857 (N, S)
Stenus umbricus Baudi, 1869 (N, S)
Stenus vitalei Bernhauer, 1935 (N, S, Si)

Edaphus Motschulsky, 1857

Edaphus beszedesi Reitter, 1913 (N)
Edaphus dissimilis (Aubé, 1863) (N, S)

Euaesthetus Gravenhorst, 1806

Euaesthetus bipunctatus (Ljungh, 1804) (N, Si)
Euaesthetus laeviusculus (Mannerheim, 1844) (N)
Euaesthetus ruficapillus (Lacordaire, 1835) (N, S)

Octavius Fauvel, 1872

Octavius bordei Sainte-Claire Deville, 1911 (N?) (*)
Octavius castrii Coiffait, 1963 (E)
 Octavius castrii castrii Coiffait, 1963 (N)
 Octavius castrii euganeensis Coiffait, 1972 (N)
Octavius doderoi Coiffait, 1965 (Sa) (E)
Octavius doriai Poggi, 1977 (S) (E) (*)
Octavius hervei Ochs, 1949 (N)
Octavius italus Fauvel, 1907 (S) (E)
Octavius puthzi Pace, 1983 (N) (E)
Octavius raymondi Saulcy, 1878 (Sa) (E)
Octavius sardous Coiffait, 1965 (Sa) (E)
Octavius vitalei Bernhauer, 1908 (*)
 Octavius vitalei abruzzensis Coiffait, 1965 (S) (E)
 Octavius vitalei cossyrensis Coiffait, 1965 (Si) (E)
 Octavius vitalei vitalei Bernhauer, 1908 (S, Si)

Procirrus Latreille, 1829

Procirrus lefebvrei Latreille, 1829 (S, Si, Sa)

Oedichirus Erichson, 1840

Oedichirus oedipus Rottenberg, 1870 (S, Si, Sa)
Oedichirus paederinus Erichson, 1840 (S, Si, Sa)

Mimopinophilus Coiffait, 1978

Mimopinophilus sculus (Kraatz, 1857) (S, Si, Sa)

Paederidus Mulsant & Rey, 1877

Paederidus rubrothoracicus (Goeze, 1777) (N, S, Si, Sa)

Paederidus ruficollis (Fabricius, 1781) (N, S, Si, Sa?)

Paederus Fabricius, 1775

Paederus balcanicus Koch, 1938 (N, S)

Paederus baudii Fairmaire, 1859 (N, S)

Paederus brevipennis Lacordaire, 1835 (N)

Paederus caligatus Erichson, 1840 (N, S?, Si?, Sa?)

Paederus fuscipes Curtis, 1826 (N, S, Si, Sa)

Paederus limnophilus Erichson, 1840 (N, S, Si?)

Paederus littoralis Gravenhorst, 1802 (N, S, Si, Sa)

Paederus melanurus Aragona, 1830 (N) (E)

Paederus meridionalis Fauvel, 1872 (S, Si, Sa)

Paederus schoenherri Czwalińska, 1889 (N)

Astenus Stephens, 1833

Astenus anguinus (Baudi, 1848) (N, S?)

Astenus bimaculatus (Erichson, 1840) (N, S, Si, Sa)

Astenus brevelytratus Coiffait, 1960 (N, S, Si, Sa)

Astenus cerrutii Coiffait, 1960 (Sa) (E)

Astenus cribrellus (Baudi, 1870) (N, S, Si, Sa?)

Astenus curtulus (Erichson, 1840) (N, S, Sa)

Astenus focarilei Coiffait, 1960 (S) (E)

Astenus gracilis (Paykull, 1789) (N, S)

Astenus immaculatus Stephens, 1833 (N, S, Si?, Sa?)

Astenus italicus Coiffait, 1960 (S) (E)

Astenus knizi Bernhauer, 1928 (S) (E)

Astenus melanurus Kuster, 1853 (N?, S, Si, Sa)

Astenus misellus Mulsant & Rey, 1875 (N?, S?, Sa) (*)

Astenus procerus (Gravenhorst, 1806) (N, S, Si?, Sa?)

Astenus puglianus Coiffait, 1960 (S) (E)

Astenus pulchellus (Heer, 1839) (N, Sa)

Astenus romanus Coiffait, 1960 (S) (E)

Astenus schatzmayri Bernhauer, 1929 (Si) (E)

Astenus sculus Fauvel, 1900 (Si) (E)

Astenus thoracicus (Baudi, 1857) (N, S, Si?)

Astenus tristis Erichson, 1840 (S?, Sa) (E)

Astenus unicolor Mulsant & Rey, 1877 (N?, S?) (*)

Astenus uniformis Jacquelin Du Val, 1852 (N, S, Si, Sa)

Nazeris Fauvel, 1872

Nazeris pulcher Aubé, 1850 (Sa?) (*)

Rugilus Curtis, 1827

Rugilus angustatus (Fourcroy, 1785) (N, S, Sa?)

Rugilus erichsoni (Fauvel, 1867) (N)

Rugilus festivus (Mulsant & Rey, 1853) (Si?, Sa)

Rugilus geniculatus (Erichson, 1839) (N)

Rugilus orbiculatus (Paykull, 1789)

Rugilus orbiculatus orbiculatus (Paykull, 1789) (N, S, Si)

Rugilus orbiculatus sardous (Lohse, 1956) (Sa)

Rugilus rossii (Zanetti, 1977) (S) (E)

Rugilus rufipes (Germar, 1836) (N, S?)

Rugilus similis (Erichson, 1839) (N, S)

Rugilus subtilis (Erichson, 1840) (N)

Medon Stephens, 1833

Medon apicalis (Kraatz, 1857) (N, S, Sa)

Medon brunneus (Erichson, 1839) (N, S, Si, Sa?) (*)

Medon castaneus (Gravenhorst, 1802) (N, S)

Medon dilutus (Erichson, 1839)

Medon dilutus cephalus Koch, 1939 (Sa) (E)

Medon dilutus meridionalis Bordoni, 1980 (S) (E)

Medon fuscus (Mannerheim, 1831) (N, S, Si?, Sa?)

Medon orgianus Bordoni, 1980 (S) (E)

Medon perniger Coiffait, 1969 (E) (*)

Medon perniger perniger Coiffait, 1969 (N, S)

Medon perniger fraudulentus Coiffait, 1978 (Si)

Medon piceus (Kraatz, 1858) (N, S, Si)

Medon pocoferus Peyron, 1857 (N, S, Si, Sa)

Medon ripicola (Kraatz, 1854) (N, S, Si, Sa)

Medon rufiventris (Nordmann, 1837) (N, Sa?)

Medon sardous Doderò, 1922 (Sa) (E)

Medon sicilianus Coiffait, 1970 (Si) (E)

Medon vitalei Bernhauer, 1936 (Si) (E)

Luzea Blackwelder, 1952

Luzea nigritula (Erichson, 1840) (N, S, Si, Sa)

Sunius Stephens, 1829

Sunius algiricus (Coiffait, 1969) (S, Si) (*)

Sunius bicolor (Olivier, 1795) (N, Sa?) (*)

Sunius italicus (Coiffait, 1961) (N, S) (E) (*)

Sunius melanocephalus (Fabricius, 1792) (N, S, Si?, Sa?)
Sunius propinquus (Brisout, 1867) (N, S, Si?, Sa)
Sunius puglianus (Coiffait, 1961) (S, Si?) (E) (*)

Chloecharis Lynch, 1884

Chloecharis debilicornis (Wollaston, 1857) (N, S, Si?)

Pseudomedon Mulsant & Rey, 1877

Pseudomedon huetheri (Hubenthal, 1927) (N?) (*)
Pseudomedon obscurellus (Erichson, 1840) (N, S, Sa)
Pseudomedon obsoletus (Nordmann, 1837) (N, S, Si, Sa)

Lithocharis Lacordaire, 1835

Lithocharis nigriceps (Kraatz, 1859) (N, S) (*)
Lithocharis tricolor (Fabricius, 1787) (N, S, Si, Sa)

Scopaeus Erichson, 1840

Scopaeus ampliatus Binaghi, 1935 (N, S, Sa) (E)
Scopaeus bicolor Baudi, 1848 (N, S)
Scopaeus brevicuspis Binaghi, 1935 (S, Si, Sa)
Scopaeus debilis Hochhuth, 1851 (N, S, Si, Sa)
Scopaeus didymus Erichson, 1840 (Sa)
Scopaeus furcatus Binaghi, 1935 (N)
Scopaeus gracilis (Sperk, 1835)
 Scopaeus gracilis gracilis (Sperk, 1835) (N, S, Sa)
 Scopaeus gracilis sículus Binaghi, 1935 (S, Si) (E)
Scopaeus laevigatus (Gyllenhal, 1827)
 Scopaeus laevigatus laevigatus (Gyllenhal, 1827) (N, S, Si?)
 Scopaeus laevigatus schneideri Bernhauer, 1900 (Sa)
Scopaeus lanceolatus Binaghi, 1935 (N, S) (*)
Scopaeus longicollis Fauvel, 1874 (N, Si?)
Scopaeus micropterus Fauvel, 1872 (*)
 Scopaeus micropterus micropterus Fauvel, 1872 (N, S)
 Scopaeus micropterus championi Binaghi, 1935 (N)
Scopaeus minimus (Erichson, 1839) (N, S, Sa?)
Scopaeus minutus Erichson, 1840 (N, S)
Scopaeus mitratus Binaghi, 1935 (N, S, Si)
Scopaeus portai Luze, 1910 (N, S, Si)
Scopaeus pusillus Kiesenwetter, 1843 (N, S)
Scopaeus rubidus Mulsant & Rey, 1855 (N, S)
Scopaeus sericans Mulsant & Rey, 1855 (N, Si?)
Scopaeus sulcicollis Stephens, 1832 (N, S)

Domene Fauvel, 1872

Domene scabricollis (Erichson, 1840) (N)
Domene stilicina (Erichson, 1840) (S, Si, Sa)

Pseudolathra Casey, 1905

Pseudolathra lusitanica (Erichson, 1840) (N, S, Si, Sa)
Pseudolathra manueli (Fauvel, 1865) (N, S, Si?)

Lobrathium Mulsant & Rey, 1877

Lobrathium diecki (Saulcy, 1878) (Si) (E)
Lobrathium lethierryi (Reiche, 1869) (S?, Si)
Lobrathium lostiae (Dodero, 1916) (Sa) (E)
Lobrathium multipunctum (Gravenhorst, 1802) (*)
 Lobrathium multipunctum cassolai Coiffait, 1972 (Sa) (E)
 Lobrathium multipunctum multipunctum (Gravenhorst, 1802) (N, S, Si)
Lobrathium solarii (Koch, 1936) (S) (E)

Platydomene Ganglbauer, 1895

Platydomene angusticollis (Lacordaire, 1835) (N, S)
Platydomene bicolor (Erichson, 1840)
 Platydomene bicolor bicolor (Erichson, 1840) (N, S?)
 Platydomene bicolor fiorii (Koch, 1939) (N, S) (E)
Platydomene picipes (Erichson, 1840) (N, S, Si)
Platydomene springeri (Koch, 1937) (N)

Tetartopeus Czwalińska, 1888

Tetartopeus angustatus (Lacordaire, 1835) (N?, S, Si, Sa)
Tetartopeus paeneinsularum Bordoni, 1980 (N, S, Si) (E)
Tetartopeus scutellaris (Nordmann, 1837) (N?) (*)
Tetartopeus sphagnetorum (Muona, 1977) (N)
Tetartopeus terminatus (Gravenhorst, 1802) (N, S?, Si?) (*)

Lathrobium Gravenhorst, 1802

Lathrobium alzonai Capra & Binaghi, 1938 (N) (E)
Lathrobium andreinii Schatzmayr & Koch, 1934 (N?, S) (E)
Lathrobium apenninum Baudi, 1869 (N, S) (E)
Lathrobium baldense Pace, 1975 (N) (E)
Lathrobium brunnipes (Fabricius, 1792) (N)
Lathrobium caprai Koch, 1936 (N) (E)
Lathrobium castaneipenne Kolenati, 1846 (N)
Lathrobium castellinii Bordoni, 1979 (S) (E)
Lathrobium cavicola (Müller, 1856) (N)
Lathrobium cirocchii Bordoni, 1987 (S) (E)

Lathrobium crassipes Mulsant & Rey, 1877 (N, S)
Lathrobium dilutum Erichson, 1839 (N)
Lathrobium doderoi Abeille, 1900 (N) (E)
Lathrobium elegantulum Kraatz, 1857 (N, S)
Lathrobium etruscum Piccioli, 1870 (N, S) (E)
Lathrobium fovulum Stephens, 1833 (N, S?)
Lathrobium franzinii Bordoni, 1985 (S) (E)
Lathrobium freyi Koch, 1938 (N) (E)
Lathrobium fulvipenne (Gravenhorst, 1806) (N, S, Sa)
Lathrobium garganicum Koch, 1939 (S) (E)
Lathrobium garioi Bordoni, 1984 (N) (E)
Lathrobium genganum Bordoni, 1972 (S) (E)
Lathrobium impressum Heer, 1841 (N, S)
Lathrobium lanzai Bordoni, 1984 (S) (E)
Lathrobium livatense Bordoni, 1985 (S) (E)
Lathrobium longulum Gravenhorst, 1802 (N, Si?)
Lathrobium lottii Holdhaus, 1923 (S) (E)
Lathrobium maginii Bordoni, 1972 (E)
 Lathrobium maginii maginii Bordoni, 1972 (N, S)
 Lathrobium maginii mingazzinii Bordoni, 1986 (S)
Lathrobium magistrettiorum Koch, 1944 (N, S) (E)
Lathrobium magrinianum Bordoni, 1986 (N) (E)
Lathrobium oblitum Pace, 1977 (S) (E)
Lathrobium pacei Piva, 1995 (N) (E)
Lathrobium pallidum Nordmann, 1837 (N)
Lathrobium pinkeri Ganglbauer, 1901 (N) (E)
Lathrobium ripicola Czwalina, 1888 (N, S)
Lathrobium rosai Bordoni, 1985 (S) (E)
Lathrobium rufipenne Gyllenhal, 1813 (N)
Lathrobium settei Pace & Zanetti, 1983 (N) (E)
Lathrobium spadiceum Erichson, 1840 (N?, S) (*)
*Lathrobium straneo*i Schatzmayr & Koch, 1934 (S) (E)
Lathrobium volgense Hochhuth, 1851 (N) (E)
Lathrobium wingelmuelleri Breit, 1904 (N) (E)

***Throbalium* Mulsant & Rey, 1877**

Throbalium dividuum (Erichson, 1840) (S, Sa)
Throbalium schatzmayri (Koch, 1935) (N)

***Pseudobium* Mulsant & Rey, 1877**

Pseudobium gridellii Jarrige, 1947 (N, S, Si?)
Pseudobium labile Erichson, 1840 (Si?, Sa)

***Scimbalium* Erichson, 1840**

Scimbalium anale (Nordmann, 1836) (N, S, Si, Sa)

***Micrillus* Raffray, 1873**

Micrillus calabricus Coiffait, 1980 (S) (E)
Micrillus pubipenne (Fairmaire, 1860) (S?, Si)
Micrillus testaceus (Erichson, 1840) (N?, S, Si, Sa?)

***Achenium* Curtis, 1826**

Achenium apenninum Koch, 1937 (N, S, Si, Sa?) (*)
Achenium basale Erichson, 1840
 Achenium basale basale Erichson, 1840 (Sa)
 Achenium basale erichsoni Ragusa, 1883 (S, Si)
Achenium humile (Nicolai, 1822) (N, S, Si, Sa)
Achenium ieium Erichson, 1840 (Sa)
Achenium inuus Koch, 1937 (Si)
Achenium italicum Koch, 1937 (N, S)
Achenium schatzmayri Koch, 1937 (N) (*)
Achenium striatum Latreille, 1804
 Achenium striatum nuragicum Bordoni, 1981 (Sa) (E)
 Achenium striatum striatum Latreille, 1804 (S, Si)
Achenium tenellum Erichson, 1840 (S, Si, Sa)

***Leptobium* Casey, 1905**

Leptobium gracile (Gravenhorst, 1802) (N, S)
Leptobium haemorrhoum (Erichson, 1840) (Si, Sa)
Leptobium pominii (Gridelli, 1949) (S) (E)
Leptobium siculum (Gridelli, 1926) (Si) (E)
Leptobium vulcanum Coiffait, 1969 (Si) (E) (*)

***Scotonomus* Fauvel, 1872**

Scotonomus albertae Zanetti, 1977 (S) (E)
Scotonomus andreinii Binaghi, 1970 (S) (E)
Scotonomus arganoi Bordoni, 1975 (S) (E)
Scotonomus auruncus Pace, 1977 (S) (E)
Scotonomus ausonius Pace, 1977 (S) (E)
Scotonomus binaghii Coiffait, 1972 (Sa) (E)
Scotonomus calaber Pace, 1977 (S) (E)
Scotonomus cerrutii Binaghi, 1970 (S) (E)
Scotonomus etruscus Saulcy, 1878 (N, S) (E)
Scotonomus guareschii Koch, 1944 (S) (E)
Scotonomus latinus Coiffait, 1970 (S) (E)
Scotonomus lepinensis Pace, 1977 (S) (E)
Scotonomus picentinus Pace, 1977 (S) (E)
Scotonomus proximus Binaghi, 1970 (S) (E)
Scotonomus raymondi Fauvel, 1872 (Sa) (E)

Scotonomus sardus Fagel, 1969 (Sa) (E)
Scotonomus saulcyi Coiffait, 1970 (Sa) (E)
Scotonomus simpatricus Binaghi, 1970 (Sa) (E)
Scotonomus solarii Holdhaus, 1924 (S) (E)
Scotonomus straneoi Binaghi, 1970 (S) (E)
Scotonomus troglophilus Coiffait, 1970 (Sa) (E)
Scotonomus viator Pace, 1977 (S) (E)
Scotonomus vignai Binaghi, 1970 (S) (E)

Cryptobium Mannerheim, 1830

Cryptobium algericum Fagel, 1967 (Si, Sa)
Cryptobium brevipenne Mulsant & Rey, 1861 (N, S)
Cryptobium collare (Reitter, 1884) (N, S)
Cryptobium fracticorne (Paykull, 1798) (N)
Cryptobium turkestanicum Korge, 1968 (S) (*)

Zeteotomus Jacquelin Du Val, 1856

Zeteotomus brevicornis (Erichson, 1839) (N)

Leptacinus Erichson, 1839

Leptacinus batychrus (Gyllenhal, 1827) (N, S, Si, Sa?)
Leptacinus faunus Coiffait, 1956 (Si)
Leptacinus formicetorum Märkel, 1841 (N, S)
Leptacinus intermedius Donisthorpe, 1936 (N, S, Si, Sa)
Leptacinus marocanus Coiffait, 1969 (Sa)
Leptacinus othioides Baudi, 1869 (N, S)
Leptacinus pusillus (Stephens, 1832) (N, S)
Leptacinus sulcifrons (Stephens, 1832) (N, S)

Phacophallus Coiffait, 1956

Phacophallus parumpunctatus (Gyllenhal, 1827) (N, S, Si, Sa)
Phacophallus tricolor (Kraatz, 1859) (Si)

Gauropterus Thomson, 1860

Gauropterus fulgidus (Fabricius, 1787) (N, S, Si, Sa)

Nudobius Thomson, 1860

Nudobius collaris (Erichson, 1839) (N, S, Si, Sa)
Nudobius lentus (Gravenhorst, 1806) (N)

Gyrophypnus Leach, 1819

Gyrophypnus angustatus (Stephens, 1833) (N, S, Si, Sa)
Gyrophypnus atratus (Heer, 1839) (N)
Gyrophypnus fracticornis (Müller, 1776) (N, S, Si, Sa)
Gyrophypnus liebei (Scheerpeltz, 1926) (N, S)
Gyrophypnus scoticus (Joy, 1913) (N, S)

Megalinus Mulsant & Rey, 1877

Megalinus glabratus (Gravenhorst, 1802) (N, S, Si, Sa)
Megalinus sabellai Ciceroni & Zanetti, 1993 (Si) (E)

Leptolinus Kraatz, 1856

Leptolinus cephalotes Kraatz, 1858 (S, Si, Sa)
Leptolinus nothus (Erichson, 1839) (N, S, Si, Sa)

Xantholinus Dejean, 1821

Xantholinus alpinus Bordoni, 1972 (N) (E) (*)
Xantholinus alverniae Bordoni, 1972 (S) (E) (*)
Xantholinus apenninicola Steel, 1945 (N, S) (E)
Xantholinus audrasi Coiffait, 1956 (N, S)
Xantholinus bonomettoi Bordoni, 1972 (N) (E) (*)
Xantholinus bordonii Coiffait, 1969 (N) (E)
Xantholinus carnicus Bordoni, 1972 (N) (E) (*)
Xantholinus cerrutii Coiffait, 1964 (S) (E)
Xantholinus devillei Coiffait, 1956 (S) (E)
Xantholinus elegans (Olivier, 1794) (N, S)
Xantholinus flavocinctus Hochhuth, 1849 (N)
Xantholinus graecus Kraatz, 1858 (*)
 Xantholinus graecus calcidicus Bordoni, 1973 (S)
 Xantholinus graecus graecus Kraatz, 1858 (S, Si)
Xantholinus laevigatus Jacobson, 1847 (N, S)
Xantholinus linearis (Olivier, 1795) (N, S, Si)
Xantholinus loebli Bordoni, 1976 (N) (E) (*)
Xantholinus longiventris Heer, 1839 (N, S, Si)
Xantholinus magrinii Bordoni, 1987 (S) (E) (*)
Xantholinus maritimus Reitter, 1908 (N, S)
Xantholinus morandi Coiffait, 1958 (Si) (*)
Xantholinus padus Coiffait, 1973 (N) (E) (*)
Xantholinus pellegrinus Coiffait, 1969 (N)
Xantholinus proceroides Coiffait, 1970 (S, Si) (E)
Xantholinus rhenanus Coiffait, 1962 (N, S)
Xantholinus ruffoi Bordoni, 1972 (N) (E) (*)
Xantholinus rufipennis Erichson, 1839 (N, S, Si)
Xantholinus rufipes Lucas, 1849 (Si)
Xantholinus samniticus Bordoni, 1987 (S) (E) (*)
Xantholinus sardous Gridelli, 1947 (Sa)

Xantholinus sontianus Bordoni, 1972 (N) (E) (*)
Xantholinus sublinearis Coiffait, 1969 (N, S)
Xantholinus vitalei Bernhauer, 1943 (Si) (E)

Hypnogyra Casey, 1906

Hypnogyra glabra (Nordmann, 1837) (N, S, Si)

Lepidophallus Coiffait, 1956

Lepidophallus hesperius (Erichson, 1839) (N, S)
Lepidophallus pseudoheperius (Reitter, 1908) (Si, Sa)

Vulda Jacquelin Du Val, 1852

Vulda angusticollis (Fauvel, 1874) (N, S) (E)
Vulda doderoi (Rambousek, 1914) (N) (E)
Vulda gracilipes (Jacquelin Du Val, 1852) (N)
Vulda garganica Bernhauer, 1908 (S) (E)
Vulda holdhausi Bernhauer, 1908 (S) (E)
Vulda italica (Sharp, 1873) (N, S) (E)
Vulda lepinensis Pace, 1977 (S) (E)
Vulda magrinii Bordoni, 1987 (S) (E)
Vulda mihoki (Bernhauer, 1914) (N)
Vulda minima Fiori, 1915 (Si) (E) (*)
Vulda myops Fauvel, 1873 (N)
Vulda ophthalmica (Gridelli, 1947) (S) (E)
Vulda sbordonii Pace, 1979 (S) (E)
Vulda simbruinica Pace, 1977 (S) (E)
Vulda tenuipes (Baudi, 1869)
Vulda tenuipes fallaciosa (Gridelli, 1947) (N, S) (E)
Vulda tenuipes tenuipes (Baudi, 1869) (N)

Atrecus Jacquelin Du Val, 1856

Atrecus affinis (Paykull, 1789) (N, S, Si)
Atrecus ardeanus Ciceroni, 1990 (S) (E)
Atrecus longiceps Fauvel, 1872 (N, S)
Atrecus pilicornis (Paykull, 1790) (N)

Othius Stephens, 1829

Othius angustus (Stephens, 1833) (N, S)
Othius brevipennis Kraatz, 1857 (N)
Othius crassus Motschulsky, 1858 (N)
Othius laeviusculus Stephens, 1832 (N, S, Si, Sa)
Othius lapidicola Kiesenwetter, 1848 (N, S)
Othius myrmecophilus Kiesenwetter, 1843 (N)

Othius punctulatus (Goeze, 1777) (N, S, Si, Sa)

Neobisnius Ganglbauer, 1895

Neobisnius lathrobioides (Baudi, 1848) (N, S, Sa)

Neobisnius orbus (Kiesenwetter, 1850) (S, Sa)

Neobisnius procerulus (Gravenhorst, 1806) (N, S, Si?, Sa?)

Neobisnius prolixus (Erichson, 1840) (N, S, Si, Sa)

Neobisnius villosulus (Stephens, 1832) (N, S)

Erichsonius Fauvel, 1872

Erichsonius cinerascens (Gravenhorst, 1802) (N, S)

Erichsonius signaticornis (Mulsant & Rey, 1863) (N, S)

Erichsonius subopacus (Hochhuth, 1851) (N, S)

Cafius Stephens, 1829

Cafius cicatricosus Erichson, 1840 (N, S, Si, Sa)

Cafius flicki Vauloger, 1897 (Si) (*)

Cafius xantholoma (Gravenhorst, 1806) (N, S, Si, Sa)

Orthidus Mulsant & Rey, 1875

Orthidus cribratus (Erichson, 1840) (N, S, Si, Sa)

Remus Holme, 1837

Remus filum Kiesenwetter, 1849 (N, S, Si)

Remus pruinosis (Holme, 1837) (S, Sa)

Remus sericeus Holme, 1837 (N, S, Si, Sa)

Hesperus Fauvel, 1872

Hesperus rufipennis (Gravenhorst, 1802) (N, S, Sa)

Philonthus Curtis, 1829

Philonthus addendus Sharp, 1867 (N, S)

Philonthus aerosus Kiesenwetter, 1851 (N)

Philonthus agilis (Gravenhorst, 1806) (N, S, Si, Sa)

Philonthus agyrtes Smetana, 1973 (N) (E) (*)

Philonthus albipes (Gravenhorst, 1802) (N, S)

Philonthus alcyoneus Erichson, 1840

Philonthus alcyoneus alcyoneus Erichson, 1840 (Sa)

Philonthus alcyoneus ragusai Scheerpeltz, 1933 (Si) (E)

Philonthus alpinus Eppelsheim, 1875 (N)

Philonthus atratus (Gravenhorst, 1802) (N?, S, Sa?)

Philonthus carbonarius (Gravenhorst, 1802) (N, S, Si, Sa)
Philonthus caucasicus (Nordmann, 1837) (S?, Si?) (*)
Philonthus cephalotes (Gravenhorst, 1802) (N, Sa?)
Philonthus cochleatus Scheerpeltz, 1937 (N, S, Si)
Philonthus coerulescens (Lacordaire, 1835) (N)
Philonthus cognatus (Stephens, 1832) (N, S, Si, Sa)
Philonthus concinnus (Gravenhorst, 1802) (N, S, Si, Sa)
Philonthus confinis Strand, 1941 (N, S, Si)
Philonthus coprophilus Jarrige, 1949 (N, S)
Philonthus coracion Peyerimhoff, 1902 (N)
Philonthus corruscus (Gravenhorst, 1802) (N, S, Si, Sa)
Philonthus corvinus Erichson, 1839 (N)
Philonthus cruentatus (Gmelin, 1789) (N, S, Si, Sa)
Philonthus cyanipennis (Fabricius, 1792) (N, S, Sa?)
Philonthus debilis (Gravenhorst, 1802) (N, S, Si, Sa)
Philonthus decorus (Gravenhorst, 1802) (N, S, Sa?)
Philonthus dimidiatipennis Erichson, 1840 (N, S, Si, Sa)
Philonthus discoideus (Gravenhorst, 1802) (N, S, Si, Sa)
Philonthus diversiceps Bernhauer, 1901 (N, S, Si?, Sa)
Philonthus ebeninus (Gravenhorst, 1802) (N, S, Si, Sa)
Philonthus fenestratus Fauvel, 1869 (N?, S, Si, Sa)
Philonthus fimetarius Gravenhorst, 1802 (N, S, Si, Sa)
Philonthus frigidus Kiesenwetter, 1848 (N, S)
Philonthus fumarius (Gravenhorst, 1806) (N, S)
Philonthus gagates Mulsant & Rey, 1875 (N, S, Si, Sa)
Philonthus heterodoxus Mulsant & Rey, 1875 (N, Si)
Philonthus immundus (Gyllenhal, 1810) (N?) (*)
Philonthus intermedius (Lacordaire, 1835) (N, S, Si, Sa)
Philonthus jurgans Tottenham, 1937 (N, S, Si)
Philonthus laetus Heer, 1841 (N)
Philonthus laevicollis (Lacordaire, 1835) (N?) (*)
Philonthus laminatus (Creutzer, 1799) (N, S, Si, Sa)
Philonthus lepidus (Gravenhorst, 1802) (N)
Philonthus longicornis Stephens, 1832 (N, S, Si, Sa)
Philonthus luxurians Erichson, 1840 (Sa)
Philonthus mannerheimi Fauvel, 1869 (N, S?)
Philonthus marginatus (Strom, 1768) (N, S?)
Philonthus micans (Gravenhorst, 1802) (N, S, Si, Sa)
Philonthus montivagoides Coiffait, 1963 (N)
Philonthus montivagus Heer, 1839 (N)
Philonthus nigrita (Gravenhorst, 1806) (N)
Philonthus nigriventris Thomson, 1867 (N)
Philonthus nimbicola Fauvel, 1864 (N)
Philonthus nitidicollis (Lacordaire, 1835) (N, S, Si, Sa)
Philonthus nitidulus (Gravenhorst, 1802) (N?, S?) (*)
Philonthus nitidus (Fabricius, 1787) (N)
Philonthus obirensis Lohse, 1988 (N)
Philonthus oblitus Jarrige, 1951 (N, S, Sa)

Philonthus paganettii Linke, 1915 (S)
Philonthus palmi Smetana, 1954 (Si) (*)
Philonthus parvus Sharp, 1874 (N, S) (*)
Philonthus politus (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)
Philonthus pseudovarians Strand, 1941 (N)
Philonthus puella Nordmann, 1837 (N)
Philonthus punctus (Gravenhorst, 1802) (N?, S, Si, Sa)
Philonthus quisquiliarius (Gyllenhal, 1810) (N, S, Si, Sa)
Philonthus rectangulus Sharp, 1874 (N, S, Sa) (*)
Philonthus rotundicollis (Ménétriés, 1832) (N, S?, Sa?)
Philonthus rubripennis Stephens, 1832 (N, S)
Philonthus rufimanus Erichson, 1840 (N, S)
Philonthus sanguinolentus (Gravenhorst, 1802) (N, S, Si, Sa)
Philonthus sculus Gridelli, 1923 (Si, Sa?)
Philonthus sordidus Gravenhorst, 1802 (N, S, Si)
Philonthus spinipes Sharp, 1874 (N, S) (*)
Philonthus splendens (Fabricius, 1792) (N, Sa?)
Philonthus stragulatus Erichson, 1840 (S?, Si?, Sa?) (*)
Philonthus subuliformis (Gravenhorst, 1802) (N)
Philonthus succicola Thomson, 1860 (N, S, Si)
Philonthus temporalis Mulsant & Rey, 1853 (N)
Philonthus tenuicornis Mulsant & Rey, 1853 (N, S, Si)
Philonthus turbatus Erichson, 1840 (Sa)
Philonthus turbidus Erichson, 1840 (Si)
Philonthus umbratilis (Gravenhorst, 1802) (N, S, Si, Sa)
Philonthus varians (Paykull, 1789) (N, S, Si)
Philonthus ventralis (Gravenhorst, 1802) (N?, S, Si, Sa)

***Rabigus* Mulsant & Rey, 1875**

Rabigus pullus Nordmann, 1837 (N, S)
Rabigus tenuis (Fabricius, 1792) (N, S, Sa)

***Gabronthus* Tottenham, 1955**

Gabronthus maritimus (Motschulsky, 1858) (N, S, Si, Sa)
Gabronthus thernarum (Aubé, 1850) (N?) (*)

***Gabrius* Stephens, 1832**

Gabrius astutoides Strand, 1946 (N)
Gabrius astutus (Erichson, 1840) (N, S, Sa?)
Gabrius badius (Kiesenwetter, 1858) (Si, Sa)
Gabrius coxalus Hochhuth, 1871 (N, S?)
Gabrius doderoi Gridelli, 1920 (S, Si) (E)
Gabrius exiguus (Nordmann, 1837) (N, S, Sa)
Gabrius femoralis (Hochhuth, 1851) (N, S, Si?)
Gabrius gagliardii Gridelli, 1936 (S) (E)

Gabrius kahleni Schillhammer, 1992 (N) (E)
Gabrius keysianus Sharp, 1910 (Si?, Sa?) (*)
Gabrius lividipes (Baudi, 1848) (N, Sa)
Gabrius nigrutilus (Gravenhorst, 1802) (N, S, Si, Sa)
Gabrius obenbergeri Smetana, 1952 (S) (*)
Gabrius osseticus (Kolenati, 1846) (N, S?, Sa?)
Gabrius palmi Schillhammer, 1992 (Sa) (E)
Gabrius piliger (Mulsant & Rey, 1876) (N, S, Si)
Gabrius ravausii Gridelli, 1920 (N, S, Si)
Gabrius satanellus Bordoni, 1973 (S) (E) (*)
Gabrius sexualis Smetana, 1954 (N, S) (*)
Gabrius splendidulus (Gravenhorst, 1802) (N, S, Si?)
Gabrius subnigrutilus (Reitter, 1909) (N)
Gabrius tirolensis (Luze, 1903) (N)
Gabrius toxotes Joy, 1913 (N)
Gabrius trossulus (Nordmann, 1837) (N)

Creophilus Mannerheim, 1830

Creophilus maxillosus (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)

Ontholestes Ganglbauer, 1895

Ontholestes haroldi (Eppelsheim, 1884) (N)
Ontholestes marginalis (Gené, 1836) (Sa)
Ontholestes murinus (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa?)
Ontholestes tessellatus (Fourcroy, 1785) (N)

Emus Leach, 1819

Emus hirtus (Linné, 1758) (N, S)

Abemus Mulsant & Rey, 1875

Abemus chloropterus (Panzer, 1796) (N) (*)

Platydracus Thomson, 1858

Platydracus chalcocephalus (Fabricius, 1801) (N)
Platydracus flavopunctatus (Latreille, 1804) (N, S)
Platydracus fulvipes (Scopoli, 1763) (N, S)
Platydracus latebricola (Gravenhorst, 1806) (N, S?)
Platydracus stercorarius (Olivier, 1795) (N, S)

Dinothenarus Thomson, 1858

Dinothenarus flavocephalus (Goeze, 1777) (N, S, Si, Sa)
Dinothenarus pubescens (De Geer, 1774) (N, S, Sa)

Parabemus Reitter, 1909

Parabemus fossor (Scopoli, 1772) (N, S)

Staphylinus Linné, 1758

Staphylinus caesareus Cederhjelm, 1798 (N, S)

Staphylinus dimidiaticornis Gemminger, 1851 (N, S, Si)

Staphylinus erythropterus Linné, 1758 (N)

Ocypus Leach, 1819

Ocypus aeneocephalus (De Geer, 1774) (N) (*)

Ocypus aethiops (Waltl, 1835)

Ocypus aethiops luigionii (G. Müller, 1926) (Si) (E)

Ocypus alpestris Erichson, 1840 (N)

Ocypus ater (Gravenhorst, 1802) (N, S)

Ocypus brevipennis (Heer, 1842) (N)

Ocypus brunnipes (Fabricius, 1781)

Ocypus brunnipes alpicola Erichson, 1840 (N, S)

Ocypus chevrolati (Baudi, 1848)

Ocypus chevrolati chevrolati (Baudi, 1848) (N)

Ocypus compressus (Marsham, 1802)

Ocypus compressus cerdo Erichson, 1840 (N, S, Si, Sa)

Ocypus cupreus (Rossi, 1790) (N, S, Si)

Ocypus falcifer (Nordmann, 1837)

Ocypus falcifer aliquoi Bordoni, 1975 (Si) (E)

Ocypus falcifer falcifer (Nordmann, 1837) (N, S, Sa)

Ocypus fortunatarum Wollaston, 1871 (S, Si, Sa)

Ocypus fulvipennis Erichson, 1840 (N, S)

Ocypus globulifer (Fourcroy, 1785)

Ocypus globulifer globulifer (Fourcroy, 1785) (N, S, Sa)

Ocypus globulifer sicanus (Coiffait, 1974) (S?, Si) (E)

Ocypus italicus (Aragona, 1830) (*)

Ocypus italicus garganicus (Fiori, 1894) (S) (E)

Ocypus italicus italicus (Aragona, 1830) (N, S)

Ocypus italicus silensis (Fiori, 1894) (S) (E)

Ocypus megalocephalus (Nordmann, 1837) (N)

Ocypus melanarius (Heer, 1839) (N)

Ocypus mus (Brullé, 1832)

Ocypus mus transadriaticus (G. Müller, 1926) (S, Si) (E)

Ocypus nero (Falderman, 1835) (*)

Ocypus nero ochropus (G. Müller, 1950) (S) (E)

Ocypus nero nero (Falderman, 1835) (N, S)

Ocypus olens (O.F. Müller, 1764) (N, S, Si, Sa)

Ocypus ophthalmicus (Scopoli, 1763) (N, S, Si, Sa)

Ocypus pedator (Gravenhorst, 1802)

Ocypus pedator pedator (Gravenhorst, 1802) (N, S, Sa)
Ocypus pedator sculus (Aubé, 1842) (Si) (E)
Ocypus pedemontanus (Müller, 1924) (N)
Ocypus picipennis (Fabricius, 1792) (*)
Ocypus picipennis fallaciosus (Müller, 1926) (N, S)
Ocypus picipennis abruzzensis (Müller, 1926) (S) (E)
Ocypus picipennis picipennis (Fabricius, 1792) (N)
Ocypus planipennis (Aubé, 1842) (Sa)
Ocypus rhaeticus (Eppelsheim, 1873) (N)
Ocypus solarii (Müller, 1923) (N)
Ocypus tenebricosus (Gravenhorst, 1806) (N)
Ocypus tricinctus (Aragona, 1830) (N, S) (E)
Ocypus winkleri (Bernhauer, 1906) (N, S, Si, Sa)

Heterothops Stephens, 1829

Heterothops binotatus (Gravenhorst, 1802) (N, S, Si, Sa)
Heterothops dissimilis (Gravenhorst, 1802) (N, S, Si, Sa) (*)
Heterothops niger Kraatz, 1868 (N, S, Si)
Heterothops praeivius Erichson, 1839 (N, S)
Heterothops quadripunctulus (Gravenhorst, 1806) (N?, S?) (*)

Euryporus Erichson, 1839

Euryporus aeneiventris Lucas, 1849 (S, Si)
Euryporus picipes (Paykull, 1800) (N)

Astrapaeus Gravenhorst, 1802

Astrapaeus ulmi (Rossi, 1790) (N, S, Si, Sa)

Velleius Mannherheim, 1830

Velleius dilatatus (Fabricius, 1787) (N, S, Si)

Quedius Stephens, 1829

Quedius abietum (Kiesenwetter, 1858) (S, Si, Sa)
Quedius abruzzensis Drugmand, 1988 (S) (E) (*)
Quedius acuminatus Hochhuth, 1849 (N?) (*)
Quedius aetolicus Kraatz, 1858 (N, S, Sa)
Quedius alpestris (Heer, 1839) (N)
Quedius andreinii Gridelli, 1924 (N, S, Si) (E)
Quedius aspromontanus Bernhauer, 1908 (S)
Quedius balcanicus Bernhauer, 1908 (N) (*)
Quedius bicolor Mulsant & Rey, 1875 (N)
Quedius boopoides Munster, 1922 (N) (*)
Quedius boops (Gravenhorst, 1802) (N, S, Si)

Quedius brandmayri Zanetti, 1993 (Si) (E)
Quedius brevicornis Thomson, 1860 (N) (*)
Quedius brevis Erichson, 1840 (N)
Quedius bruttius Zanetti, 1977 (S) (E) (*)
Quedius cincticollis Kraatz, 1847 (N)
Quedius cinctus (Paykull, 1790) (N, S, Si, Sa)
Quedius coelebs Rottenberg, 1870 (Si) (E)
Quedius collaris Erichson, 1840
 Quedius collaris italicus Gridelli, 1924 (N, S) (E)
Quedius crassus Fairmaire, 1860 (N, S)
Quedius cruentus (Olivier, 1795) (N, S, Si)
Quedius curtippennis Bernhauer, 1908 (N, S)
Quedius curtus Erichson, 1840 (N, S, Si)
Quedius cyanescens Mulsant & Rey, 1875 (N, S)
Quedius doderoi Gridelli, 1922 (N) (E)
Quedius dubius (Heer, 1834)
 Quedius dubius dubius (Heer, 1834) (N, S)
 Quedius dubius fimbriatus Erichson, 1840 (N)
Quedius fuliginosus (Gravenhorst, 1802) (N, S, Sa)
Quedius fulvicollis (Stephens, 1833) (N)
Quedius fumatus (Stephens, 1833) (N, S, Si)
Quedius haberfelneri Eppelsheim, 1891 (N)
Quedius humeralis Stephens, 1832 (N, S, Si, Sa)
Quedius infuscatus Erichson, 1840 (Si?) (*)
Quedius invreae Gridelli, 1924 (N, S)
Quedius lateralis (Gravenhorst, 1802) (N)
Quedius latialis Gridelli, 1924 (S) (E)
Quedius latinus Gridelli, 1938 (N, S, Si)
Quedius limbatus (Heer, 1834) (N)
Quedius longicornis Kraatz, 1857 (N, S)
Quedius lucidulus Erichson, 1839 (N, S)
Quedius magniceps Bernhauer, 1915 (Si) (E)
Quedius marcuzzii Scheerpeltz, 1953 (N) (E) (*)
Quedius masoni Zanetti, 1993 (N, S, Si)
Quedius maurorufus (Gravenhorst, 1806) (N)
Quedius maurus (Sahlberg, 1830) (N, S)
Quedius meridiocarpaticus Smetana, 1958 (N, S)
Quedius mesomelinus (Marsham, 1802) (*)
 Quedius mesomelinus mesomelinus (Marsham, 1802) (N)
 Quedius mesomelinus silensis Fiori, 1894 (N, S) (E)
 Quedius mesomelinus skoraszewskyi Korge, 1961 (N)
Quedius microps Gravenhorst, 1847 (N)
Quedius molochinus (Gravenhorst, 1806) (N, S?)
Quedius muelleri Gridelli, 1924 (N)
Quedius nemoralis Baudi, 1848 (N, S, Si, Sa)
Quedius nigriceps Kraatz, 1857 (S)
Quedius nigrocaeruleus Fauvel, 1874 (N, S, Si, Sa)
Quedius nitipennis (Stephens, 1833) (N, S, Si)

Quedius obscuripennis Bernhauer, 1900 (N, S)
Quedius ochripennis (Ménétriés, 1832) (N, S, Si, Sa)
Quedius ochropterus Erichson, 1840 (N, S)
Quedius pallipes (Lucas, 1849) (N, S, Si, Sa) (*)
Quedius paradisianus (Heer, 1839) (N, S)
Quedius picipes (Mannerheim, 1831) (N, S, Si)
Quedius plagiatus Mannerheim, 1843 (N, S)
Quedius plancus Erichson, 1840 (Sa)
Quedius poggii Coiffait, 1972 (N)
Quedius praecox Gravenhorst, 1802 (Si, Sa)
Quedius punctatellus (Heer, 1839) (N)
Quedius puncticollis Thomson, 1867 (N, S)
Quedius ragusae Eppelsheim, 1899 (Si) (E)
Quedius reitteri Gridelli, 1924 (N, S, Si)
Quedius riparius (Kellner, 1843) (N) (*)
Quedius rufitarsis (Marsham, 1802) (N, S, Si, Sa)
Quedius satanas Bernhauer, 1899 (N, S)
Quedius scintillans (Gravenhorst, 1806) (N, S, Si, Sa)
Quedius scitus (Gravenhorst, 1806) (N, S)
Quedius semiaeneus (Stephens, 1833) (N, S, Si, Sa)
Quedius semiobscurus (Marsham, 1802) (N, S, Si, Sa)
Quedius simplicifrons Fairmaire, 1861 (N) (*)
Quedius solarii Gridelli, 1924 (N)
Quedius sturanyi Ganglbauer, 1895 (N)
Quedius subalpestris Coiffait, 1963 (N)
Quedius subunicolor Korge, 1961 (N)
Quedius suturalis Kiesenwetter, 1845 (N, S)
Quedius tristis (Gravenhorst, 1802) (N, S, Si, Sa)
Quedius truncicola Fairmaire & Laboulbène, 1854 (N, S, Si)
Quedius umbrinus Erichson, 1839 (N, Si)
Quedius vexans Eppelsheim, 1881 (S) (*)
Quedius virgulatus Stephens, 1832 (Sa)
Quedius xanthippae Lohse, 1963 (N) (E)
Quedius xanthopus Erichson, 1839 (N, S)

***Acylophorus* Nordmann, 1837**

Acylophorus glaberrimus (Herbst, 1784) (N, S)

***Atanygnathus* Jacobson, 1909**

Atanygnathus terminalis Erichson, 1839 (N)
Atanygnathus varicornis Wollaston, 1867 (S)

***Habrocerus* Erichson, 1839**

Habrocerus capillaricornis (Gravenhorst, 1806) (N, S, Si, Sa)
Habrocerus pisidicus Korge, 1971 (S)

Trichophya Mannerheim, 1830

Trichophya pilicornis (Gyllenhal, 1810) (N, S)

Mycetoporus Mannerheim, 1830

Mycetoporus aequalis Thomson, 1868 (N)
Mycetoporus ambiguus Luze, 1901 (N)
Mycetoporus angularis Mulsant & Rey, 1853 (N, S, Si, Sa) (*)
Mycetoporus baudueri Mulsant & Rey, 1875 (N, S, Si, Sa?)
Mycetoporus bimaculatus Lacordaire, 1835 (N)
Mycetoporus boreellus Sahlberg, 1876 (N) (*)
Mycetoporus brucki (Pandellé, 1869) (N)
Mycetoporus clavicornis (Stephens, 1832) (N, S, Si)
Mycetoporus corpulentus Luze, 1901 (N)
Mycetoporus despectus Strand, 1969 (N) (*)
Mycetoporus eppelsheimianus Fagel, 1968 (N, S, Sa)
Mycetoporus erichsonianus Fagel, 1960 (N, S?, Si?)
Mycetoporus forticornis Fauvel, 1872 (N, S)
Mycetoporus gracilis Luze, 1901 (N, Si?) (*)
Mycetoporus ignidorsum Eppelsheim, 1880 (Si?) (*)
Mycetoporus inaris Luze, 1901 (N)
Mycetoporus lepidus Gravenhorst, 1802 (N, S?, Si?, Sa?)
Mycetoporus longulus Mannerheim, 1830 (N, S)
Mycetoporus macrocephalus Bernhauer, 1917 (S, Si)
Mycetoporus maerkeli Kraatz, 1857 (N)
Mycetoporus monticola Fowler, 1888 (N)
Mycetoporus mulsanti Ganglbauer, 1895 (N, S, Si)
Mycetoporus niger Fairmaire & Laboulbène, 1865 (N, S, Si?)
Mycetoporus nigricollis (Stephens, 1835) (N, S, Si, Sa) (*)
Mycetoporus piceolus Rey, 1882 (N, S, Si) (*)
Mycetoporus pollinensis Scheerpeltz, 1955 (S) (E)
Mycetoporus punctipennis Scriba, 1868 (N, S, Si?) (*)
Mycetoporus punctus (Gyllenhal, 1810) (N, S, Si)
Mycetoporus reichei Pandellé, 1869 (S)
Mycetoporus revelierei Rey, 1882 (Sa)
Mycetoporus rufescens (Stephens, 1832) (N, S, Si, Sa)
Mycetoporus ruffoi Scheerpeltz, 1961 (S) (E)
Mycetoporus santicensis Schatzmayr, 1908 (N)
Mycetoporus solidicornis Wollaston, 1864 (N, S, Si, Sa) (*)

Ischnosoma Stephens, 1829

Ischnosoma longicorne (Mäklin, 1847) (N, S)
Ischnosoma pseudolongicorne (Palm, 1980) (Si, Sa) (*)
Ischnosoma splendidum (Gravenhorst, 1806) (N, S, Si, Sa)

Bryoporus Kraatz, 1857

Bryoporus crassicornis Märkel, 1847 (N)
Bryoporus fasciatus Fauvel, 1891 (N, S)
Bryoporus merdarius (Olivier, 1795) (N, S)
Bryoporus multipunctus Hampe, 1866 (N, S)
Bryoporus rufus (Erichson, 1839) (N, S)
Bryoporus rugipennis Pandellé, 1869 (N, S)
Bryoporus tirolensis Jatzenkowsky, 1910 (N) (*)

Carphacis Gozis, 1886

Carphacis striatus (Olivier, 1794) (N, S, Si)

Lordithon Thomson, 1858

Lordithon bicolor (Gravenhorst, 1806) (N?) (*)
Lordithon exoletus (Erichson, 1839) (N, S, Si, Sa)
Lordithon lunulatus (Linné, 1761) (N, S, Sa)
Lordithon pulchellus (Mannerheim, 1830) (N)
Lordithon speciosus (Erichson, 1839) (N, S)
Lordithon thoracicus (Fabricius, 1777) (N, S, Si, Sa)
Lordithon trimaculatus (Paykull, 1800) (N)
Lordithon trinotatus (Erichson, 1839) (N, S)

Bolitobius Samouelle, 1819

Bolitobius castaneus (Stephens, 1832) (N, S, Si, Sa)
Bolitobius cingulatus (Mannerheim, 1831) (N, S, Sa)
Bolitobius formosus (Gravenhorst, 1806) (N, S)
Bolitobius haematicus (Baudi, 1869) (N) (E?) (*)
Bolitobius inclinans (Gravenhorst, 1806) (N, S, Si)
Bolitobius sicilianus (Luze, 1911) (Si) (E)

Sepedophilus Gistel, 1856

Sepedophilus binotatus (Gravenhorst, 1802) (N)
Sepedophilus bipunctatus (Gravenhorst, 1802) (N, S)
Sepedophilus bipustulatus (Gravenhorst, 1802) (N, S)
Sepedophilus cavicola (Scriba, 1870) (S, Sa) (*)
Sepedophilus constans (Fowler, 1888) (N)
Sepedophilus doderoi (Gridelli, 1931) (N)
Sepedophilus immaculatus (Stephens, 1832) (N, S, Si, Sa)
Sepedophilus littoreus (Linné, 1758) (N, S)
Sepedophilus lusitanicus Hammond, 1973 (S?, Si?) (*)
Sepedophilus marshami (Stephens, 1832) (N, S, Si?)
Sepedophilus nigripennis (Stephens, 1832) (N, S, Si, Sa) (*)
Sepedophilus obtusus (Luze, 1902) (N)

Sepedophilus pedicularius (Gravenhorst, 1802) (N)
Sepedophilus sicilianus (Bernhauer, 1917) (Si) (E)
Sepedophilus testaceus (Fabricius, 1792) (N, S, Si?, Sa?)

Tachyporus Gravenhorst, 1802

Tachyporus abdominalis (Fabricius, 1781) (N, S, Si, Sa)
Tachyporus abner Saulcy, 1864 (N, S, Si, Sa)
Tachyporus atriceps Stephens, 1832 (N, S, Si)
Tachyporus austriacus Luze, 1901 (N)
Tachyporus caucasicus Kolenati, 1846 (S, Si, Sa)
Tachyporus chrysomelinus (Linné, 1758) (N, S, Si?)
Tachyporus dispar (Paykull, 1789) (N, S)
Tachyporus formosus Matthew, 1838 (N, S, Si, Sa)
Tachyporus hypnorum (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa)
Tachyporus nitidulus (Fabricius, 1781) (N, S, Si, Sa)
Tachyporus obtusus (Linné, 1767) (N, S)
Tachyporus pallidus Sharp, 1871 (N)
Tachyporus pulchellus Mannerheim, 1841 (N?) (*)
Tachyporus pusillus Gravenhorst, 1806 (N, S, Si, Sa)
Tachyporus ruficollis Gravenhorst, 1802 (N, Si?)
Tachyporus scitulus Erichson, 1839 (N, S, Si?, Sa?)
Tachyporus solutus Erichson, 1839 (N, S, Si, Sa)
Tachyporus tersus Erichson, 1839 (N?, S?) (*)
Tachyporus transversalis Gravenhorst, 1806 (N)

Lamprinodes Luze, 1901

Lamprinodes haematopterus (Kraatz, 1847) (N)
Lamprinodes pictus (Fairmaire, 1852) (Si)
Lamprinodes saginatus (Gravenhorst, 1806) (N)

Lamprinus Heer, 1839

Lamprinus erythropterus (Panzer, 1796) (N)

Tachinus Gravenhorst, 1802

Tachinus bipustulatus (Fabricius, 1792) (N)
Tachinus bonvouloiri Pandellé, 1869 (N, S, Si)
Tachinus corticinus Gravenhorst, 1802 (N)
Tachinus elongatus Gyllenhal, 1810 (N)
Tachinus fimetarius Gravenhorst, 1802 (N, S, Si)
Tachinus flavolimbatus Pandellé, 1869 (S, Si)
Tachinus humeralis Gravenhorst, 1802 (N, S, Si)
Tachinus laticollis Gravenhorst, 1802 (N, S, Si?)
Tachinus latiusculus Kiesenwetter, 1848 (N)
Tachinus lignorum (Linné, 1758) (N, S)

Tachinus manuelyi Sharp, 1874 (N, S?)
Tachinus marginatus Gyllenhal, 1810 (N?) (*)
Tachinus marginellus (Fabricius, 1781) (N, S) (*)
Tachinus mercatii Jarrige, 1965 (S)
Tachinus pallipes Gravenhorst, 1806 (N, S)
Tachinus proximus Kraatz, 1855 (N, Si?)
Tachinus rufipennis Gyllenhal, 1810 (N, S)
Tachinus scapularis Stephens, 1832 (N, Si?)
Tachinus signatus Gravenhorst, 1802 (N, S)
Tachinus subterraneus (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)

Coproporus Kraatz, 1858

Coproporus colchicus Kraatz, 1858 (S)

Cilea Jacquelin Du Val, 1856

Cilea silphoides (Linné, 1767) (N, S, Si, Sa)

Deinopsis Matthews, 1838

Deinopsis erosa (Stephens, 1832) (N)

Gymnusa Gravenhorst, 1806

Gymnusa brevicollis (Paykull, 1800) (N)
Gymnusa variegata Kiesenwetter, 1845 (N?) (*)

Myllaena Erichson, 1837

Myllaena brevicornis (Matthews, 1838) (N, S, Si, Sa)
Myllaena dubia (Gravenhorst, 1806) (N, S, Si)
Myllaena elongata (Matthews, 1838) (N, S, Si)
Myllaena gracilicornis Fairmaire & Brisout, 1859 (N, S, Si)
Myllaena gracilis (Matthews, 1838) (N, S)
Myllaena graeca Kraatz, 1858 (N)
Myllaena infuscata Kraatz, 1853 (N, S)
Myllaena intermedia Erichson, 1837 (N, S, Si, Sa)
Myllaena kraatzi Sharp, 1871 (S, Sa)
Myllaena masoni (Matthews, 1883) (N, S) (*)
Myllaena minuta (Gravenhorst, 1806) (N, S, Si)

Diglotta Campion, 1887

Diglotta mersa (Halliday, 1837) (N) (*)
Diglotta submarina (Fairmaire & Laboulbène, 1854) (N?) (*)

Mataris Fauvel, 1886

Mataris grouvellei Fauvel, 1886 (N)

Pronomaea Erichson, 1837

Pronomaea korgei Lohse, 1974 (N, S)

Pronomaea rostrata Erichson, 1837 (N, S, Si, Sa)

Oligota Mannerheim, 1831

Oligota atomaria Erichson, 1837 (N, Si, Sa)

Oligota granaria (Erichson, 1837) (N)

Oligota inflata Mannerheim, 1831 (N, S, Si, Sa)

Oligota lohsei Williams, 1970 (N, S)

Oligota parva Kraatz, 1862 (N, S, Si, Sa)

Oligota pumilio Kiesenwetter, 1858 (N, S, Si, Sa)

Oligota punctulata (Heer, 1839) (N, Si) (*)

Oligota pusillima (Gravenhorst, 1806) (N, S, Si, Sa)

Oligota ruficornis Sharp, 1870 (N, S)

Holobus Solier, 1849

Holobus apicatus (Erichson, 1837) (N, S, Si, Sa)

Holobus flavicornis (Lacordaire, 1835) (N, S, Si)

Cypha Leach, 1819

Cypha apicalis (Brisout, 1863) (S, Si, Sa)

Cypha clavigera (Fauvel, 1900) (S)

Cypha discoidea (Erichson, 1839) (N, S, Si)

Cypha hansenii (Palm, 1949) (N)

Cypha laeviuscula (Mannerheim, 1831) (N, S, Si, Sa)

Cypha lindbergi (Palm, 1935) (S)

Cypha longicornis (Paykull, 1800) (N, S, Si, Sa)

Cypha nitida (Palm, 1935) (N)

Cypha ovulum (Heer, 1839) (N, S, Si)

Cypha pirazzolii (Baudi, 1839) (N, Si)

Cypha pulicaria (Erichson, 1839) (N)

Cypha punctum (Motschulsky, 1857) (N)

Cypha seminulum (Erichson, 1839) (N, S, Si, Sa)

Cypha suecica (Palm, 1935) (N)

Cypha tarsalis (Luze, 1902) (N, S)

Cypha unicolor (Rosenhauer, 1856) (Si, Sa)

Typhlocyptus Saulcy, 1878

Typhlocyptus pandellei Pandellé, 1878 (N, S, Si, Sa)

Hygronoma Erichson, 1837

Hygronoma dimidiata (Gravenhorst, 1806) (N, S)

Brachida Mulsant & Rey, 1871

Brachida exigua (Heer, 1839) (N, S)

Encephalus Stephens, 1832

Encephalus complicans Stephens, 1832 (N)

Gyrophæna Mannerheim, 1831

Gyrophæna affinis Mannerheim, 1831 (N, S, Si, Sa)

Gyrophæna angustata (Stephens, 1832) (N, S)

Gyrophæna bihamata Thomson, 1867 (N, S)

Gyrophæna boleti (Linné, 1758) (N, S, Si)

Gyrophæna congrua Erichson, 1837 (N, S)

Gyrophæna fasciata (Marsham, 1802) (N, S)

Gyrophæna gentilis Erichson, 1839 (N, S, Sa)

Gyrophæna joyi Wendeler, 1924 (N, S)

Gyrophæna joyioides Wüsthoff, 1937 (N, S)

Gyrophæna lucidula Erichson, 1837 (N, Sa)

Gyrophæna minima Erichson, 1837 (N)

Gyrophæna muensteri Strand, 1935 (N, S)

Gyrophæna nana (Paykull, 1800) (N)

Gyrophæna nitidula (Gyllenhal, 1810) (N, S, Si)

Gyrophæna obsoleta Ganglbauer, 1895 (N)

Gyrophæna polita (Gravenhorst, 1802) (N, Sa?)

Gyrophæna poweri Crotch, 1866 (N, S)

Gyrophæna pulchella Heer, 1839 (N, S)

Gyrophæna strictula Erichson, 1839 (N, Sa)

Gyrophæna transversalis Strand, 1939 (N)

Gyrophæna williamsi Strand, 1935 (N)

Agaricochara Kraatz, 1856

Agaricochara aspera (Fauvel, 1872) (Sa)

Agaricochara latissima (Stephens, 1832) (N, S, Si)

Diestota Mulsant & Rey, 1870

Diestota guadalupensis Pace, 1987 (N) (*)

Cyphæa Fauvel, 1863

Cyphæa curtula (Erichson, 1837) (N?, S?, Si?, Sa?) (*)

Placusa Erichson, 1837

Placusa adscita Erichson, 1839 (N, Si, Sa)
Placusa atrata (Sahlberg, 1831) (N, S)
Placusa complanata Erichson, 1839 (N, S, Sa)
Placusa depressa Maeklin, 1845 (N)
Placusa pumilio (Gravenhorst, 1802) (N, S, Si, Sa)
Placusa tachyporoides (Waltl, 1838) (N, Sa)

Homalota Mannerheim, 1831

Homalota plana (Gyllenhal, 1810) (N, S)

Anomognathus Solier, 1849

Anomognathus cuspidatus (Erichson, 1839) (N, S, Sa)
Anomognathus tricuspis Eppelsheim, 1884 (Sa)

Silusa Erichson, 1837

Silusa rubiginosa Erichson, 1837 (N)
Silusa rubra Erichson, 1839 (N, S)

Actocharis Fauvel, 1869

Actocharis marina Fauvel, 1869 (N, Si?, Sa?)

Phytosus Curtis, 1838

Phytosus balticus Kraatz, 1859 (N, S, Si, Sa)
Phytosus nigriventris (Chevrolat, 1843) (S)
Phytosus spinifer Curtis, 1838 (N, S, Si, Sa)

Arena Fauvel, 1862

Arena tabida (Kiesenwetter, 1850) (N, S)

Rhopalocerina Reitter, 1909

Rhopalocerina clavigera (Scriba, 1859) (N, S, Si)

Thecturota Casey, 1893

Thecturota marchii (Dodero, 1922) (N, S, Si)

Megaloscapa Seidlitz, 1891

Megaloscapa punctipennis (Kraatz, 1856) (S, Sa)

Leptusa Kraatz, 1856

- Leptusa abdominalis* (Motschulsky, 1858) (*)
 - Leptusa abdominalis abdominalis* (Motschulsky, 1858) (N)
 - Leptusa abdominalis carinthiaca* Scheerpeltz, 1948 (N?)
- Leptusa albergianensis* Pace, 1989 (N) (E)
- Leptusa angustiarumberninae* Scheerpeltz, 1972
 - Leptusa angustiarumberninae angustiarumberninae* Scheerpeltz, 1972 (N)
 - Leptusa angustiarumberninae rosaorum* Pace, 1978 (N)
- Leptusa apennina* Holdhaus, 1924 (S) (E)
- Leptusa areraensis* Scheerpeltz, 1972 (E)
 - Leptusa areraensis areraensis* Scheerpeltz, 1972 (N)
 - Leptusa areraensis elegantula* Scheerpeltz, 1972 (N)
 - Leptusa areraensis gabriellae* Pace, 1982 (N)
- Leptusa baldensis* Ganglbauer, 1895 (E)
 - Leptusa baldensis baldensis* Ganglbauer, 1895 (N)
 - Leptusa baldensis kahleniana* Pace, 1980 (N)
 - Leptusa baldensis strupiana* Pace, 1980 (N)
- Leptusa baldomontis* Scheerpeltz, 1972 (N) (E)
- Leptusa benacensis* Pace, 1980 (E)
 - Leptusa benacensis benacensis* Pace, 1980 (N)
 - Leptusa benacensis lonai* Pace, 1980 (N)
- Leptusa bergamasca* Scheerpeltz, 1972 (N) (E)
- Leptusa binaghii* Pace, 1978 (N) (E)
- Leptusa biumbonata* Scheerpeltz, 1972 (N) (E)
- Leptusa blesioi* Pace, 1980 (N) (E)
- Leptusa brachati* Pace, 1980 (N) (E)
- Leptusa brigantii* Pace, 1978 (Sa) (E)
- Leptusa brixensis* Pace, 1978 (N) (E)
- Leptusa brucki* Scriba, 1867 (N, S)
- Leptusa camunnensis* Pace, 1980 (N) (E)
- Leptusa cansigliensis* Pace, 1975 (N) (E)
- Leptusa carinata* Bernhauer, 1909 (N) (E)
- Leptusa cavallensis* Pace, 1980 (N) (E)
- Leptusa cavallicola* Pace, 1980 (N) (E)
- Leptusa cephalotes* Bernhauer, 1909 (E)
 - Leptusa cephalotes cephalotes* Bernhauer, 1909 (N)
 - Leptusa cephalotes granulifera* Pace, 1983 (N)
- Leptusa ceresoleana* Pace, 1978 (E)
 - Leptusa ceresoleana bartolii* Pace, 1989 (N)
 - Leptusa ceresoleana ceresoleana* Pace, 1978 (N, S?)
 - Leptusa ceresoleana zangherii* Pace, 1978 (N, S)
- Leptusa cuneensis* Pace, 1978 (N) (E)
- Leptusa etrusca* Pace, 1978 (E)
 - Leptusa etrusca apuana* Pace, 1982 (S)
 - Leptusa etrusca etrusca* Pace, 1978 (S)

Leptusa fauciumberninae Scheerpeltz, 1972 (N)
Leptusa fischeri Bernhauer, 1910 (N, S)
Leptusa foroiuliensis Pace, 1980 (N) (E)
Leptusa fuliginosa (Aubé, 1850) (S)
Leptusa fumida (Erichson, 1839) (N, S)
Leptusa gracilentia Pace, 1983 (N)
Leptusa granulicauda Eppelsheim, 1890 (N)
Leptusa grignaensis Scheerpeltz, 1972 (N) (E)
Leptusa hummleriana Bernhauer, 1935 (Sa)
Leptusa ilsae Bernhauer, 1935 (N)
Leptusa italica Pace, 1977 (S) (E)
Leptusa janetscheki Scheerpeltz, 1956 (N)
Leptusa juliana Pace, 1980 (N)
Leptusa kahleni Pace, 1980 (N) (E)
Leptusa knabli Bernhauer, 1909 (E)
 Leptusa knabli knabli Bernhauer, 1909 (N)
 Leptusa knabli recticollis Scheerpeltz, 1953 (N)
 Leptusa knabli strupii Scheerpeltz, 1935 (N)
Leptusa kochiana Bernhauer, 1936 (E)
 Leptusa kochiana aspromontana Pace, 1977 (S)
 Leptusa kochiana kochiana Bernhauer, 1936 (S)
Leptusa koronensis Ganglbauer, 1896 (*)
 Leptusa koronensis gridellii Scheerpeltz, 1957 (N?)
Leptusa laticeps Scheerpeltz, 1972 (N) (E)
Leptusa lessiniensis Pace, 1978 (N) (E)
Leptusa linderiana Scheerpeltz, 1965 (N)
Leptusa loebli Pace, 1984 (N)
Leptusa lombarda Bernhauer, 1905 (N) (E)
Leptusa luigionii Bernhauer, 1935 (E)
 Leptusa luigionii luigionii Bernhauer, 1935 (S)
 Leptusa luigionii pretneri Scheerpeltz, 1957 (S)
Leptusa major Bernhauer, 1900
 Leptusa major major Bernhauer, 1900 (N)
Leptusa mancinii Pace, 1980 (N) (E)
Leptusa mandli Scheerpeltz, 1953 (E)
 Leptusa mandli golemiensis Pace, 1980 (N)
 Leptusa mandli mandli Scheerpeltz, 1953 (N)
Leptusa manfredi Pace, 1980 (N) (E)
Leptusa marianii Pace, 1978 (N) (E)
Leptusa media Scheerpeltz, 1972 (N) (E)
Leptusa monacha (Fauvel, 1898) (N)
Leptusa monguzzii Pace, 1989 (N)
Leptusa montiscathedrae Pace, 1978 (N) (E)
Leptusa montisgrappae Pace, 1975 (N) (E)
Leptusa montisgrignae Scheerpeltz, 1972 (N) (E)
Leptusa montisparii Scheerpeltz, 1953 (N) (E)
Leptusa montispasubii Pace, 1975 (E)
 Leptusa montispasubii montispasubii Pace, 1975 (N)

Leptusa montispasubii settei Pace, 1980 (N)
Leptusa montiumcarnorum Scheerpeltz, 1958 (N)
Leptusa mucronemontis Scheerpeltz, 1972 (N)
Leptusa nubigena (Kiesenwetter, 1861) (N)
Leptusa occulta Pace, 1975 (N) (E)
Leptusa oropaensis Pace, 1978 (N) (E)
Leptusa orumboviorum Pace, 1982 (N) (E)
Leptusa osellai Pace, 1977 (S) (E)
Leptusa paradoxa Pace, 1980 (E)
 Leptusa paradoxa gardinii Pace, 1980 (N)
 Leptusa paradoxa paradoxa Pace, 1980 (N)
 Leptusa paradoxa poggiana Pace, 1980 (N)
 Leptusa paradoxa tendana Pace, 1980 (N)
 Leptusa paradoxa saccarelloana Pace, 1983 (N)
Leptusa pascuorum Pace, 1975 (E)
 Leptusa pascuorum pascuorum Pace, 1975 (N)
 Leptusa pascuorum pavionis Pace, 1989 (N)
Leptusa pasubiana Scheerpeltz, 1953 (E)
 Leptusa pasubiana pasubiana Scheerpeltz, 1953 (N)
 Leptusa pasubiana pauli Pace, 1980 (N)
Leptusa pedemontana Bernhauer, 1935 (N) (E)
Leptusa piceata (Mulsant & Rey, 1853) (N)
Leptusa pilatensis Scheerpeltz, 1972
 Leptusa pilatensis camunnorum Pace, 1978 (N) (E)
Leptusa pinkeri Ganglbauer, 1904 (E)
 Leptusa pinkeri pavesii Pace, 1980 (N)
 Leptusa pinkeri pinkeri Ganglbauer, 1904 (N)
 Leptusa pinkeri sebina Pace, 1989 (N)
 Leptusa pinkeri transmontana Pace, 1980 (N)
 Leptusa pinkeri victoris Pace, 1978 (N)
Leptusa pizzocolensis Pace, 1980 (N) (E)
Leptusa poggii Pace, 1978 (N) (E)
Leptusa portusnaoniensis Pace, 1989 (N)
Leptusa pratensis Pace, 1989 (N) (E)
Leptusa pseudoalpestris Scheerpeltz, 1935 (E)
 Leptusa pseudoalpestris asiagana Pace, 1975 (N)
 Leptusa pseudoalpestris pseudoalpestris Scheerpeltz, 1935 (N)
 Leptusa pseudoalpestris venetiana Pace, 1980 (N)
Leptusa pulchella (Mannerheim, 1831) (N, S)
Leptusa rosai Pace, 1978 (N) (E)
Leptusa ruffoi Pace, 1983 (N) (E)
Leptusa ruficollis (Erichson, 1839) (N, S, Si)
Leptusa salernitana Pace, 1978 (S) (E)
Leptusa sanfilippoi Pace, 1980 (N) (E)
Leptusa savonensis Pace, 1977 (N) (E)
Leptusa schaschli Ganglbauer, 1897 (N)
Leptusa secreta Bernhauer, 1900 (S) (*)
Leptusa semiscabra Scheerpeltz, 1972 (N) (E)

Leptusa seriana Scheerpeltz, 1972 (N) (E)
Leptusa sibyllinica Pace, 1977 (E)
 Leptusa sibyllinica s.aurunca Pace, 1989 (S)
 Leptusa sibyllinica doderoana Pace, 1978 (S)
 Leptusa sibyllinica franzinii Pace, 1978 (S)
 Leptusa sibyllinica sibyllinica Pace, 1977 (S)
Leptusa stoeckleini Bernhauer, 1914 (E)
 Leptusa stoeckleini grappamontis Scheerpeltz, 1972 (N)
 Leptusa stoeckleini stoeckleini Bernhauer, 1914 (N)
Leptusa subalpina Fiori, 1889 (N) (E)
Leptusa sudetica Lokay, 1900 (N)
Leptusa sulcicollis Bernhauer, 1931 (Sa)
Leptusa tarvisiana Pace, 1989 (N)
Leptusa taurinensis Pace, 1978 (N) (E)
Leptusa tendamontis Scheerpeltz, 1972 (N, S)
Leptusa tenuissima Scheerpeltz, 1972 (E)
 Leptusa tenuissima ligurica Pace, 1978 (N)
 Leptusa tenuissima tenuissima Scheerpeltz, 1972 (N)
Leptusa tirolensis Bernhauer, 1900 (E)
 Leptusa tirolensis tirolensis Bernhauer, 1900 (N)
 Leptusa tirolensis zanettii Pace, 1980 (N)
Leptusa tridentina Pace, 1980 (N) (E)
Leptusa trumplinensis Pace, 1980 (N) (E)
Leptusa tusculanensis Pace, 1980 (N) (E)
Leptusa ultracollensis Pace, 1982 (N) (E)
Leptusa vailatii Pace, 1989 (N) (E)
Leptusa vallisvenyi Scheerpeltz, 1972 (N)
Leptusa veronensis Pace, 1983 (E)
 Leptusa veronensis lessinicola Pace, 1989 (N)
 Leptusa veronensis veronensis Pace, 1983 (N)
Leptusa zanettiorum Pace, 1980 (N) (E)
Leptusa zoiai Pace, 1982 (N) (E)

Euryusa Erichson, 1837

Euryusa castanoptera Kraatz, 1856 (N, S, Si?)
Euryusa cerrutii Bernhauer, 1940 (S) (E)
Euryusa optabilis Heer, 1839 (N, S, Si)
Euryusa sinuata Erichson, 1837 (N, S)

Heterota Mulsant & Rey, 1873

Heterota plumbea (Waterhouse, 1858) (N, S, Si)

Caloderina Ganglbauer, 1895

Caloderina hierosolymitana (Saulcy, 1864) (S, Si)

Phymatura Sahlberg, 1876

Phymatura brevicollis (Kraatz, 1856) (N?, S?, Si?, Sa?) (*)

Bolitochara Mannerheim, 1831

Bolitochara bella Maerkel, 1844 (N, S, Si, Sa)

Bolitochara lucida (Gravenhorst, 1802) (N, S, Si)

Bolitochara mulsanti Sharp, 1875 (N, S)

Bolitochara obliqua Erichson, 1837 (N, S, Si)

Bolitochara pulchra (Gravenhorst, 1806) (N, S, Si)

Bolitochara reyi Sharp, 1875 (Si)

Bolitochara varia Erichson, 1839 (N?, S?, Si, Sa) (*)

Autalia Leach, 1819

Autalia impressa (Olivier, 1795) (N, S?, Si?)

Autalia longicornis Scheerpeltz, 1947 (N, S)

Autalia puncticollis Sharp, 1864 (N)

Autalia rivularis (Gravenhorst, 1802) (N, S)

Cordalia Jacobs, 1925

Cordalia obscura (Gravenhorst, 1802) (N, S, Si, Sa)

Falagria Leach, 1819

Falagria caesa Erichson, 1837 (N, S, Si, Sa)

Falagria concinna Erichson, 1839 (N, S, Si)

Falagria laevigata Eppelsheim, 1883 (N, S, Si)

Falagria nigra (Gravenhorst, 1802) (N, S, Si)

Falagria splendens Kraatz, 1858 (N, S, Si)

Falagria sulcatula (Gravenhorst, 1806) (N, S, Sa)

Falagria thoracica Stephens, 1832 (N, S, Si)

Falagria vitalei Bernhauer, 1931 (Si) (E)

Borboropora Kraatz, 1862

Borboropora kraatzi Fuss, 1862 (N)

Bohemiellina Machulka, 1941

Bohemiellina flavipennis (Cameron, 1920) (N)

Myrmecopora Saulcy, 1864

Myrmecopora crassiuscula (Aubé, 1850) (S)

Xenusa Mulsant & Rey, 1875

Xenusa laesa (Erichson, 1839) (N, S, Sa)
Xenusa mediterranea Fagel, 1970 (Sa)
Xenusa sulcata (Kiesenwetter, 1850) (N, S, Si, Sa)
Xenusa uvida (Erichson, 1839) (N, S, Si, Sa)

Ilyusa Mulsant & Rey, 1875

Ilyusa fugax (Erichson, 1839) (N, S, Si, Sa)

Ischnopoda Stephens, 1835

Ischnopoda agilis (Baudi, 1869) (Si)
Ischnopoda atra (Gravenhorst, 1806) (N, Si)
Ischnopoda balteata (Erichson, 1839) (N, S, Si)
Ischnopoda coarctata (Erichson, 1837) (N, S, Si)
Ischnopoda constricta (Erichson, 1837) (N, S, Si)
Ischnopoda exarata (Mannerheim, 1831) (N)
Ischnopoda ferialis (Erichson, 1839) (Si, Sa)
Ischnopoda leucopus (Marsham, 1802) (N)
Ischnopoda nitella (Fauvel, 1895) (N, S, Si)
Ischnopoda nitidula (Mulsant & Rey, 1875) (Si, Sa)
Ischnopoda objecta (Mulsant & Rey, 1870) (N, S, Si, Sa)
Ischnopoda scitula (Erichson, 1837) (N)
Ischnopoda umbratica (Erichson, 1837) (N, S, Si)

Dasygnypeta Scheerpeltz, 1968

Dasygnypeta velata (Erichson, 1837) (S)

Gnypeta Thomson, 1858

Gnypeta caerulea (Sahlberg, 1831) (N)
Gnypeta carbonaria (Mannerheim, 1831) (N, S?, Si?, Sa?)
Gnypeta ripicola (Kiesenwetter, 1844) (N)
Gnypeta rubrior Tottenham, 1939 (N, S, Si)
Gnypeta ruffoi Scheerpeltz, 1958 (S) (*)

Brachyusa Mulsant & Rey, 1871

Brachyusa concolor (Erichson, 1839) (N?, S?, Si?, Sa?) (*)

Outachyusa Pace, 1991

Outachyusa raptoria (Wollaston, 1854) (S)

Brundinia Tottenham, 1949

Brundinia marina (Mulsant & Rey, 1853) (N, S, Si, Sa)
Brundinia meridionalis (Mulsant & Rey, 1853) (N, S, Si, Sa)

Dacrila Mulsant & Rey, 1875

Dacrila fallax (Kraatz, 1856) (N, S, Si)
Dacrila pruinosa (Kraatz, 1856) (N, S)

Callicerus Gravenhorst, 1802

Callicerus atricollis Aubé, 1850 (N, S)
Callicerus gagliardii Scheerpeltz, 1957 (N)
Callicerus kaufmanni Eppelsheim, 1887 (S, Sa)
Callicerus muensteri Bernhauer, 1900 (S) (E)
Callicerus obscurus Gravenhorst, 1802 (N, S, Si)
Callicerus rigidicornis (Erichson, 1839) (N?, S?, Si?, Sa?) (*)
Callicerus stolfai Scheerpeltz, 1957 (S) (E)

Schistoglossa Kraatz, 1856

Schistoglossa aubei (Brisout, 1860) (N)
Schistoglossa gemina (Erichson, 1837) (N, S)
Schistoglossa viduata (Erichson, 1837) (N, S)

Boreophilia Benick & Lohse, 1975

Boreophilia eremita (Rye, 1866) (N) (*)

Platyola Mulsant & Rey, 1874

Platyola fusicornis Mulsant & Rey, 1853 (N, S, Si)

Actocharina Bernhauer, 1907

Actocharina leptotyphloides Bernhauer, 1907 (N)

Hydrosmecta Thomson, 1850

Hydrosmecta bernhaueri (Peyerimhoff, 1901) (N, Si)
Hydrosmecta bohiniensis Scheerpeltz, 1944 (N)
Hydrosmecta capitalis Benick, 1969 (N) (E)
Hydrosmecta delicatissima (Bernhauer, 1908) (N, S, Si)
Hydrosmecta delicatula (Sharp, 1869) (N)
Hydrosmecta embryonalis Benick, 1969 (N) (E)
Hydrosmecta eximia (Sharp, 1869) (N)
Hydrosmecta fluviatilis (Kraatz, 1854) (N, S)
Hydrosmecta fragilicornis (Kraatz, 1854) (N, Si)

Hydrosmeeta fragilis (Kraatz, 1854) (N)
Hydrosmeeta gessoensis Scheerpeltz, 1944 (N)
Hydrosmeeta gracilicornis (Erichson, 1839) (N, S)
Hydrosmeeta lessinica Scheerpeltz, 1944 (N) (*)
Hydrosmeeta longula (Heer, 1839) (N, S, Si, Sa)
Hydrosmeeta panaroensis Scheerpeltz, 1943 (N) (E)
Hydrosmeeta perpusilla Scheerpeltz, 1943 (N)
Hydrosmeeta pseudofragilis Scheerpeltz, 1944 (N)
Hydrosmeeta sardoa Scheerpeltz, 1943 (Sa) (E)
Hydrosmeeta sardinica (Likovsky, 1984) (Sa) (E)
Hydrosmeeta subtilissima (Kraatz, 1854) (N)
Hydrosmeeta tenuissima (Eppelsheim, 1892) (N, Sa)
Hydrosmeeta tricolor Benick, 1969 (N)
Hydrosmeeta valderiana Scheerpeltz, 1944 (N)

Aloconota Thomson, 1858

Aloconota aloconotoides Benick, 1940 (N) (E) (*)
Aloconota appulsa (Scriba, 1867) (N)
Aloconota cambrica (Wollaston, 1855) (N, S, Si)
Aloconota currax (Kraatz, 1856) (N, S)
Aloconota cyanea (Mulsant & Rey, 1874) (S, Sa)
Aloconota debilicornis (Erichson, 1839) (N, Sa?)
Aloconota eichhoffi (Scriba, 1867) (N, Si)
Aloconota ernestinae (Bernhauer, 1898) (N)
Aloconota grandicornis (Fauvel, 1900) (N)
Aloconota gregaria (Erichson, 1939) (N, S, Si, Sa)
Aloconota insecta (Thomson, 1856) (N, S, Si, Sa) (*)
Aloconota languida (Erichson, 1837) (N, S, Si)
Aloconota longicollis (Mulsant & Rey, 1852) (N, S, Si)
Aloconota mediterranea (Benick, 1941) (S?, Si?, Sa?) (*)
Aloconota mihoki (Bernhauer, 1913) (N)
Aloconota pfefferi (Roubal, 1929) (N, S)
Aloconota planifrons (Waterhouse, 1864) (N, S)
Aloconota subgrandis (Brundin, 1954) (N)
Aloconota sulcifrons (Stephens, 1832) (N, S, Si, Sa) (*)

Enalodroma Thomson, 1859

Enalodroma hepatica (Erichson, 1839) (N, S)

Pycnota Mulsant & Rey, 1873

Pycnota paradoxa (Mulsant & Rey, 1861) (N)

Amischa Thomson, 1858

Amischa analis (Gravenhorst, 1802) (N, S, Si, Sa)

Amischa cavifrons (Sharp, 1869) (N, S)
Amischa decipiens (Sharp, 1869) (N)
Amischa filum Mulsant & Rey, 1870 (N?, S?, Si?, Sa?) (*)
Amischa forcipata Mulsant & Rey, 1873 (N, S)
Amischa leporina (Fauvel, 1881) (S, Si) (E)
Amischa nigrofusca (Stephens, 1832) (N, S, Si, Sa)
Amischa scrobicollis (Kraatz, 1859) (S, Si)
Amischa strupii Scheerpeltz, 1967 (N?)

Amidobia Thomson, 1858

Amidobia talpa (Heer, 1841) (N)

Lypoglossa Feynes, 1920

Lypoglossa lateralis (Mannerheim, 1831) (N)

Nehemitropia Lohse, 1971

Nehemitropia lividipennis (Mannerheim, 1831) (N, S, Si, Sa)

Lyprocorrhe Thomson, 1859

Lyprocorrhe anceps (Erichson, 1837) (N)

Notothecta Thomson, 1858

Notothecta brunneicollis Linke, 1934 (N) (E)
Notothecta confusa (Maerkel, 1844) (N)
Notothecta flavipes (Gravenhorst, 1806) (N)
Notothecta inflata Fauvel, 1869 (S, Si)
Notothecta laevicollis (Mulsant & Rey, 1853) (Si)

Neohilara Lohse, 1972

Neohilara subterranea (Mulsant & Rey, 1853) (N, Si)

Alaobia Thomson, 1858

Alaobia scapularis (Sahlberg, 1831) (N, Si, Sa)

Dochmonota Thomson, 1859

Dochmonota clancula (Erichson, 1837) (N, S, Sa)

Tomoglossa Kraatz, 1856

Tomoglossa luteicornis (Erichson, 1837) (N)

***Ousipalia* Gozis, 1886**

Ousipalia caesula (Erichson, 1839) (S, Si, Sa) (*)

***Alpinia* Brundin, 1948**

Alpinia alpina Benick & Lohse, 1974 (N)

Alpinia italica (Bernhauer, 1928) (S) (E)

Alpinia montiscaninii Scheerpeltz, 1956 (N)

Alpinia rosai Pace, 1977 (N) (E)

***Geostiba* Thomson, 1858**

Geostiba alexandri Pace, 1977 (S) (E)

Geostiba amplicollis Pace, 1988 (N) (E)

Geostiba anxanensis Pace, 1977 (S) (E)

Geostiba apuana (Bernhauer, 1940) (S) (E)

Geostiba arazeccana (Bernhauer, 1909) (S) (E)

Geostiba arida (Eppelsheim, 1881) (N?) (*)

Geostiba aspromontana Pace, 1977 (S) (E)

Geostiba bidens (Baudi, 1869) (N, S)

Geostiba brigantii Pace, 1988 (Sa) (E)

Geostiba calabra (Pace, 1975) (S) (E)

Geostiba calva Pace, 1977 (S) (E)

Geostiba cerrutii Pace, 1977 (S) (E)

Geostiba circaeae Pace, 1977 (S) (E)

Geostiba circellaris (Gravenhorst, 1806) (N)

Geostiba cosentina Pace, 1977 (S) (E)

Geostiba curtipennis (Aubé, 1963) (N)

Geostiba diversiventris (Bernhauer, 1909) (S)

Geostiba doderoana (Roubal, 1912) (Sa) (E)

Geostiba florentina Pace, 1977 (S) (E)

Geostiba focarilei (Scheerpeltz, 1956) (S) (E)

Geostiba fuscula (Ganglbauer, 1895) (N)

Geostiba gardinii Pace, 1988 (N) (E)

Geostiba hernica Pace, 1977 (S) (E)

Geostiba incisa (Peyerimhoff, 1900) (N?) (*)

Geostiba insularis (Bernhauer, 1909) (Sa) (E)

Geostiba ionica Pace, 1977 (S) (E)

Geostiba italica Pace, 1988 (N) (E)

Geostiba josephi Pace, 1977 (S) (E)

Geostiba lagreci Pace, 1979 (Si) (E)

Geostiba leonhardi (Bernhauer, 1908) (S) (E)

Geostiba lepinensis Pace, 1977 (S) (E)

Geostiba ligurica Pace, 1988 (E)

Geostiba ligurica bordonii Pace, 1988 (S)

Geostiba ligurica ligurica Pace, 1988 (N)

Geostiba ligurica poggiana Pace, 1988 (N)
Geostiba linkei (Bernhauer, 1940) (N)
Geostiba lonai (Scheerpeltz, 1957) (E)
 Geostiba lonai amestratiensis Pace, 1979 (Si)
 Geostiba lonai lonai (Scheerpeltz, 1957) (Si)
Geostiba luigionii (Bernhauer, 1899) (S) (E)
Geostiba magistrettii (Scheerpeltz, 1958) (S) (E)
Geostiba maroneiensis Pace, 1979 (Si) (E)
Geostiba matajurensis (Scheerpeltz, 1957) (N)
Geostiba mendax Pace, 1977 (S) (E)
Geostiba menozzii Pace, 1988 (N) (E)
Geostiba myops (Kiesenwetter, 1850) (N?, S?, Si?, Sa?) (*)
Geostiba nebrodensis Pace, 1979 (Si) (E)
Geostiba nitida (Fauvel, 1871) (N?) (*)
Geostiba osellai Pace, 1977 (N) (E)
Geostiba padana (Weise, 1878) (N)
Geostiba panormitana Pace, 1979 (Si) (E)
Geostiba picena Pace, 1977 (S) (E)
Geostiba poggii Pace, 1988 (S) (E) (*)
Geostiba pulchella (Baudi, 1869) (N)
Geostiba romana (Bernhauer, 1909) (S) (E)
Geostiba rossii Pace, 1977 (S) (E)
Geostiba rugosipennis (Scriba, 1867) (S) (E)
Geostiba sacra Pace, 1977 (S) (E)
Geostiba samnitica Pace, 1977 (S) (E)
Geostiba sardoa Pace, 1988 (Sa) (E)
Geostiba schneideri (Bernhauer, 1940) (S) (E)
Geostiba siciliana Pace, 1979 (Si) (E)
Geostiba simbruinica Pace, 1977 (S) (E)
Geostiba simplex (Baudi, 1869) (N) (E)
Geostiba solarii (Bernhauer, 1902) (S) (E)
Geostiba solifuga (Ganglbauer, 1895) (N)
Geostiba straneoi (Bernhauer, 1943) (N) (E)
Geostiba sublaevis (Mulsant & Rey, 1875) (S) (*)
Geostiba tamaninii (Scheerpeltz, 1958) (S) (E)
Geostiba tergestina Pace, 1988 (N)
Geostiba tyrrhenica Pace, 1977 (S) (E)
Geostiba veneta Pace, 1977 (N) (E)
Geostiba zeithammeri (Bernhauer, 1940) (N)

Tropimenelytron Scheerpeltz, 1955

Tropimenelytron tuberiventris (Eppelsheim, 1879) (S)

Paraleptusa Peyerimhoff, 1901

Paraleptusa helitasi (Peyerimhoff, 1900) (N)

Emmelostiba Pace, 1982

Emmelostiba rosai (Pace, 1978) (S) (E)

Taxicera Mulsant & Rey, 1875

Taxicera deplanata (Gravenhorst, 1802) (N, S)

Taxicera dolomitana Bernhauer, 1900 (N)

Taxicera perfoliata (Mulsant & Rey, 1873) (N)

Taxicera sericophila (Baudi, 1869) (N, S)

Taxicera truncata (Eppelsheim, 1875) (N)

Dinaraea Thomson, 1858

Dinaraea aequata (Erichson, 1837) (N)

Dinaraea angustula (Gyllenhal, 1810) (N, S)

Dinaraea arcana (Erichson, 1839) (N)

Dinaraea linearis (Gravenhorst, 1802) (N, S)

Paranopleta Brundin, 1954

Paranopleta inhabilis (Kraatz, 1856) (N)

Dadobia Thomson, 1858

Dadobia immersa (Erichson, 1837) (N)

Plataraea Thomson, 1858

Plataraea abruzziana Benick, 1934 (S) (E)

Plataraea brunnea (Fabricius, 1798) (N)

Plataraea fiorii (Bernhauer, 1908) (N) (E)

Plataraea nigrifrons (Erichson, 1839) (N, S?)

Liogluta Thomson, 1858

Liogluta alpestris (Heer, 1839)

Liogluta alpestris alpestris (Heer, 1839) (N)

Liogluta alpestris nitidula (Kraatz, 1856) (N, S)

Liogluta bertolinii (Porta, 1904) (N) (E) (*)

Liogluta foliicola (Brundin, 1954) (S) (E)

Liogluta granigera (Kiesenwetter, 1850) (N, S)

Liogluta longiuscula (Gravenhorst, 1802) (N, S, Si, Sa)

Liogluta micans (Mulsant & Rey, 1852) (N)

Liogluta microptera (Thomson, 1867) (N, S?)

Liogluta oblongiuscula (Sharp, 1869) (N, S)

Liogluta pagana (Erichson, 1839) (N)

Liogluta pollinensis (Scheerpeltz, 1956) (S) (E)

Liogluta roettgeni (Bernhauer, 1903) (N, S?)
Liogluta wankai (Bernhauer, 1908) (S)
Liogluta wuesthoffi (Benick, 1938) (N, S)

***Atheta (Philhygra)* Mulsant & Rey, 1873**

Atheta (Philhygra) antennaria Fauvel, 1872 (N, S, Sa)
Atheta (Philhygra) arctica (Thomson, 1856) (N)
Atheta (Philhygra) brisouti (Harold, 1867) (N)
Atheta (Philhygra) convexiuscula (Mulsant & Rey, 1874) (Si, Sa) (*)
Atheta (Philhygra) debilis (Erichson, 1837) (N, S)
Atheta (Philhygra) deformis (Kraatz, 1856) (N)
Atheta (Philhygra) elongatula (Gravenhorst, 1802)
Atheta (Philhygra) elongatula elongatula (Gravenhorst, 1802) (N, S, Si)
Atheta (Philhygra) fallaciosa (Sharp, 1869) (N)
Atheta (Philhygra) hygrobia (Thomson, 1856)
Atheta (Philhygra) hygrobia vindobonensis Brundin, 1942 (N, Si?)
Atheta (Philhygra) hygrotopora (Kraatz, 1856) (N, S)
Atheta (Philhygra) kaiseriana Brundin, 1943 (N) (*)
Atheta (Philhygra) luridipennis (Mannerheim, 1831) (N, Si)
Atheta (Philhygra) melanocera (Thomson, 1856) (N)
Atheta (Philhygra) palustris (Kiesenwetter, 1844) (N, S, Si, Sa)
Atheta (Philhygra) parca (Mulsant & Rey, 1873) (N)
Atheta (Philhygra) ripicola Hanssen, 1932 (N)
Atheta (Philhygra) sequanica (Brisout, 1859) (N?, Sa)
Atheta (Philhygra) terminalis (Gravenhorst, 1806) (N?) (*)
Atheta (Philhygra) volans (Scriba, 1859) (N, S)

***Atheta (Dilacra)* Thomson, 1858**

Atheta (Dilacra) laticeps (Thomson, 1856) (N)
Atheta (Dilacra) luteipes (Erichson, 1837) (N, S, Si, Sa)
Atheta (Dilacra) vilis (Erichson, 1837) (N, S, Sa)

***Atheta (Bessobia)* Thomson, 1858**

Atheta (Bessobia) excellens (Kraatz, 1856) (N)
Atheta (Bessobia) fungivora (Thomson, 1867) (N)
Atheta (Bessobia) monticola (Thomson, 1862) (N)
Atheta (Bessobia) occulta (Erichson, 1837) (N, S, Si)
Atheta (Bessobia) spatula (Fauvel, 1872) (N?)

***Atheta (gruppo misto III, IV)* (sensu Benick & Lohse, 1975)**

Atheta (gruppo misto III, IV) divisa (Maerkel, 1844) (N, S, Si)
Atheta (gruppo misto III, IV) euryptera (Stephens, 1832) (N, S)
Atheta (gruppo misto III, IV) harwoodi Williams, 1930 (N)
Atheta (gruppo misto III, IV) liturata (Stephens, 1838) (N?, S)

Atheta (gruppo misto III, IV) *nigritula* (Gravenhorst, 1802) (N, S, Si, Sa)
Atheta (gruppo misto III, IV) *ruffoi* Scheerpeltz, 1961 (S)
Atheta (gruppo misto III, IV) *vaga* (Heer, 1839) (N, S, Si)

***Atheta* (*Anopleta*) Mulsant & Rey, 1874**

Atheta (*Anopleta*) *corvina* (Thomson, 1856) (N, S, Sa)
Atheta (*Anopleta*) *depressicollis* (Fauvel, 1872) (N, S)
Atheta (*Anopleta*) *puberula* (Sharp, 1869) (N)
Atheta (*Anopleta*) *strupiana* Benick & Lohse, 1974 (N)

***Atheta* (*Microdota*) Mulsant & Rey, 1873**

Atheta (*Microdota*) *aegra* (Heer, 1841) (N, S, Si)
Atheta (*Microdota*) *amicula* (Stephens, 1832) (N, S, Si, Sa)
Atheta (*Microdota*) *atomaria* (Kraatz, 1856) (N, S)
Atheta (*Microdota*) *atricolor* (Sharp, 1869) (N, S) (*)
Atheta (*Microdota*) *benickiella* Brundin, 1948 (N, S, Si?)
Atheta (*Microdota*) *boreella* Brundin, 1948 (N)
Atheta (*Microdota*) *columbae* Benick, 1975 (N) (E?)
Atheta (*Microdota*) *excelsa* Bernhauer, 1911 (N)
Atheta (*Microdota*) *excisa* Eppelsheim, 1883 (S)
Atheta (*Microdota*) *excisoides* Benick, 1975 (N)
Atheta (*Microdota*) *exigua* Benick, 1943 (Si) (E)
Atheta (*Microdota*) *foveicollis* (Kraatz, 1856) (N)
Atheta (*Microdota*) *ganglbaueri* Brundin, 1948 (N, S, Si)
Atheta (*Microdota*) *glabriceps* Brundin, 1948 (S) (E)
Atheta (*Microdota*) *glabricula* (Thomson, 1857) (N, S)
Atheta (*Microdota*) *indubia* (Sharp, 1869) (N)
Atheta (*Microdota*) *inquinula* (Gravenhorst, 1802) (N, S, Si, Sa)
Atheta (*Microdota*) *koltzei* Bernhauer, 1928 (N) (*)
Atheta (*Microdota*) *liliputana* Brisout, 1860 (N) (*)
Atheta (*Microdota*) *luctuosa* (Mulsant & Rey, 1853) (N, S, Si)
Atheta (*Microdota*) *paganettii* Bernhauer, 1909 (S) (*)
Atheta (*Microdota*) *palleola* (Erichson, 1837) (N, S)
Atheta (*Microdota*) *pittionii* Scheerpeltz, 1950 (N, S)
Atheta (*Microdota*) *schneideri* Eppelsheim, 1889 (S)
Atheta (*Microdota*) *spatuloides* Benick, 1938 (N) (*)
Atheta (*Microdota*) *subtilis* (Scriba, 1866) (N, S)

***Atheta* (*Pachyatheta*) Münster, 1925**

Atheta (*Pachyatheta*) *cribrata* (Kraatz, 1856) (N)

***Atheta* (*Ceritaxa*) Mulsant & Rey, 1873**

Atheta (*Ceritaxa*) *brevicollis* (Baudi, 1848) (N, S)
Atheta (*Ceritaxa*) *dilaticornis* (Kraatz, 1856) (N, S)

Atheta (Ceritaxa) dilutipennis Motschulsky, 1858 (S) (*)
Atheta (Ceritaxa) inermis Fauvel, 1878 (Sa)
Atheta (Ceritaxa) kraatzi Eppelsheim, 1891 (Si) (E)
Atheta (Ceritaxa) pervagata Benick, 1974 (N, S)

Atheta (gruppo misto II) (sensu Benick & Lohse, 1975)

Atheta (gruppo misto II) anisi Bernhauer, 1913 (N)
Atheta (gruppo misto II) cadaverina (Brisout, 1860) (N, S, Si)
Atheta (gruppo misto II) cellaria Benick, 1940 (N)
Atheta (gruppo misto II) gagatina (Baudi, 1848) (N, S, Si, Sa)
Atheta (gruppo misto II) hansseni Strand, 1943 (N)
Atheta (gruppo misto II) hybrida (Sharp, 1869) (N, S)
Atheta (gruppo misto II) linderi (Brisout, 1863) (N, Sa)
Atheta (gruppo misto II) opacicornis (Thomson, 1856) (N, S)
Atheta (gruppo misto II) pallidicornis (Thomson, 1856) (N, S)
Atheta (gruppo misto II) picipes (Thomson, 1856) (N, S)
Atheta (gruppo misto II) sodalis (Erichson, 1837) (N, S)
Atheta (gruppo misto II) spelaea (Erichson, 1840) (N, Sa?)
Atheta (gruppo misto II) tibialis (Heer, 1839) (N, S)
Atheta (gruppo misto II) trinotata (Kraatz, 1856) (N, S, Si, Sa)
Atheta (gruppo misto II) woerndlei Bernhauer, 1917 (N)

Atheta (Coprothassa) Thomson, 1861

Atheta (Coprothassa) melanaria (Mannerheim, 1831) (N, S, Si, Sa)

Atheta (Mocyta) Mulsant & Rey, 1874

Atheta (Mocyta) amplicollis (Mulsant & Rey, 1873) (N)
Atheta (Mocyta) clientula (Erichson, 1839) (N, S, Si, Sa)
Atheta (Mocyta) fungi (Gravenhorst, 1806) (N, S, Si, Sa)
Atheta (Mocyta) fussi Bernhauer, 1908 (N)
Atheta (Mocyta) haematica Eppelsheim, 1884 (Sa)
Atheta (Mocyta) orbata (Erichson, 1837) (N, S, Si)
Atheta (Mocyta) orphana (Erichson, 1837) (N, S, Si)

Atheta (Rhagocneme) Münster, 1922

Atheta (Rhagocneme) subsinuata (Erichson, 1839) (N, S, Sa)

Atheta (Datomicra) Mulsant & Rey, 1873

Atheta (Datomicra) canescens (Sharp, 1869) (N, S)
Atheta (Datomicra) celata (Erichson, 1837) (N, S, Si)
Atheta (Datomicra) crebrepunctata Benick, 1940 (N)
Atheta (Datomicra) dadopora (Thomson, 1857) (N, S?, Sa?)
Atheta (Datomicra) nigra (Kraatz, 1856) (N, S, Si, Sa)

Atheta (Datomicra) sordidula (Erichson, 1837) (N, S, Sa)
Atheta (Datomicra) transitoria Benick, 1940 (N)

***Atheta (Atheta)* Thomson, 1858**

Atheta (Atheta) aeneicollis (Sharp, 1869) (N, S, Si, Sa)
Atheta (Atheta) alpigrada (Fauvel, 1900) (N)
Atheta (Atheta) aquatica (Thomson, 1852) (N)
Atheta (Atheta) aquatilis (Thomson, 1867) (N)
Atheta (Atheta) brunneipennis (Thomson, 1852) (N)
Atheta (Atheta) castanoptera (Mannerheim, 1831) (N, S, Si, Sa)
Atheta (Atheta) contristata (Kraatz, 1856) (N, S)
Atheta (Atheta) ebenina (Mulsant & Rey, 1874) (N)
Atheta (Atheta) graminicola (Gravenhorst, 1806) (N)
Atheta (Atheta) heymesi Hubenthal, 1913 (N)
Atheta (Atheta) hummleri Bernhauer, 1898 (S)
Atheta (Atheta) hypnorum (Kiesenwetter, 1850) (N, S)
Atheta (Atheta) incognita (Sharp, 1869) (N)
Atheta (Atheta) laevicauda Sahlberg, 1876 (N)
Atheta (Atheta) oraria (Kraatz, 1856) (N, S, Si) (*)
Atheta (Atheta) pechlaneri Scheerpeltz, 1933 (N)
Atheta (Atheta) triangulum (Kraatz, 1856) (N, S, Si, Sa)
Atheta (Atheta) xanthopus (Thomson, 1856) (N, S, Si)

***Atheta (gruppo misto I)* (sensu Benick & Lohse 1975)**

Atheta (gruppo misto I) allocera Eppelsheim, 1893 (N)
Atheta (gruppo misto I) autumnalis (Erichson, 1839) (N, S)
Atheta (gruppo misto I) basicornis (Mulsant & Rey, 1852) (N)
Atheta (gruppo misto I) boletophila (Thomson, 1856) (N, S)
Atheta (gruppo misto I) britanniae Bernhauer & Schubert, 1926 (N, S)
Atheta (gruppo misto I) coriaria (Kraatz, 1856) (N, S, Si, Sa)
Atheta (gruppo misto I) crassicornis (Fabricius, 1792) (N, S, Si, Sa)
Atheta (gruppo misto I) fimorum (Brisout, 1860) (N, S, Si)
Atheta (gruppo misto I) fungicola (Thomson, 1852) (N, S)
Atheta (gruppo misto I) intermedia (Thomson, 1852) (N, S, Si)
Atheta (gruppo misto I) italiensis Benick, 1943 (S) (E) (*)
Atheta (gruppo misto I) laticollis (Stephens, 1832) (N, S, Si, Sa)
Atheta (gruppo misto I) monacha Bernhauer, 1899 (N, S)
Atheta (gruppo misto I) myrmecobia (Kraatz, 1856) (N)
Atheta (gruppo misto I) nidicola (Johannsen, 1914) (N)
Atheta (gruppo misto I) oblita (Erichson, 1839) (N, S, Si, Sa)
Atheta (gruppo misto I) paracrassicornis Brundin, 1954 (N)
Atheta (gruppo misto I) pfaundleri Benick, 1940 (N) (*)
Atheta (gruppo misto I) pilicornis (Thomson, 1852) (N, S)
Atheta (gruppo misto I) procera (Kraatz, 1856) (N)
Atheta (gruppo misto I) ravilla (Erichson, 1839) (N, S, Si, Sa)

Atheta (Dimetrota) Mulsant & Rey, 1873

Atheta (Dimetrota) aeneipennis (Thomson, 1856) (N, S, Si)
Atheta (Dimetrota) atramentaria (Gyllenhal, 1810) (N, S, Si, Sa)
Atheta (Dimetrota) cinnamoptera (Thomson, 1856) (N, S)
Atheta (Dimetrota) episcopalis Bernhauer, 1910 (N)
Atheta (Dimetrota) europaea Likovsky, 1984 (N, S)
Atheta (Dimetrota) knabli Benick, 1938 (N)
Atheta (Dimetrota) laevana (Mulsant & Rey, 1852) (N, S, Si)
Atheta (Dimetrota) leonhardi Bernhauer, 1911 (N, S)
Atheta (Dimetrota) macrocera (Thomson, 1856) (N, S, Si)
Atheta (Dimetrota) malleiformis Benick, 1975 (N) (E)
Atheta (Dimetrota) marcida (Erichson, 1837) (N, S)
Atheta (Dimetrota) nigripes (Thomson, 1856) (N, S, Si)
Atheta (Dimetrota) parapicipennis Brundin, 1954 (N)
Atheta (Dimetrota) puncticollis Benick, 1938 (N)
Atheta (Dimetrota) putrida (Kraatz, 1856) (N, S)
Atheta (Dimetrota) sachtlebeni Brundin, 1954 (Si) (E)
Atheta (Dimetrota) setigera (Sharp, 1869) (N)
Atheta (Dimetrota) subrugosa (Kiesenwetter, 1848) (N)

Atheta (Chaetida) Mulsant & Rey, 1873

Atheta (Chaetida) longicornis (Gravenhorst, 1802) (N, S, Si, Sa)

Atheta (Thinobaena) Thomson, 1859

Atheta (Thinobaena) cephalotes Bernhauer, 1901 (N)
Atheta (Thinobaena) vestita (Gravenhorst, 1806) (N)

Atheta (Earota) Mulsant & Rey, 1873

Atheta (Earota) reyi Kiesenwetter, 1850 (N, S, Si)

Acrotona Thomson, 1859

Acrotona aterrima (Gravenhorst, 1802) (N, S, Si)
Acrotona consanguinea (Eppelsheim, 1875) (N)
Acrotona exigua (Erichson, 1837) (N)
Acrotona lucida (Dodero, 1922) (N) (*)
Acrotona muscorum (Brisout, 1860) (N, S)
Acrotona nigerrima (Aubé, 1850) (N, S, Si)
Acrotona obfusca (Gravenhorst, 1802) (N)
Acrotona paranigerrima (Brundin, 1952) (S)
Acrotona parens (Mulsant & Rey, 1852) (N, S, Si, Sa)
Acrotona parvula (Mannerheim, 1831) (N, S, Si, Sa)
Acrotona pellucida (Fauvel, 1878) (Sa)
Acrotona piceorufa (Mulsant & Rey, 1873)

Acrotona piceorufa piceorufa (Mulsant & Rey, 1873) (N, S)
Acrotona pusilla (Brundin, 1952) (N, S)
Acrotona pygmaea (Gravenhorst, 1802) (N, S)
Acrotona sylvicola (Kraatz, 1856) (N)

Alevonota Thomson, 1858

Alevonota aurantiaca Fauvel, 1895 (S, Si, Sa) (*)
Alevonota crypticola Pace, 1977 (S) (E)
Alevonota egregia (Rye, 1875) (N)
Alevonota gracilenta (Erichson, 1839) (N, S, Si)
Alevonota kiesenwetteri (Kraatz, 1856) (S)
Alevonota rufotestacea (Kraatz, 1856) (N, S, Sa)
Alevonota vitalei Bernhauer, 1931 (Si)

Halobrecta Thomson, 1850

Halobrecta flavipes Thomson, 1861 (N, S, Si, Sa)
Halobrecta puncticeps (Thomson, 1852) (N, S, Si, Sa)

Alianta Thomson, 1858

Alianta bipartita Fauvel, 1900 (N, S, Si)
Alianta brucki Eppelsheim, 1876 (Si)
Alianta incana (Erichson, 1837) (N, S)

Pachnida Mulsant & Rey, 1874

Pachnida nigella (Erichson, 1837) (N)

Trichiusa Casey, 1893

Trichiusa immigrata Lohse, 1984 (N) (*)

Thamiaraea Thomson, 1858

Thamiaraea cinnamomea (Gravenhorst, 1802) (N, S, Si)
Thamiaraea hospita (Maerkel, 1844) (N, S, Sa)

Rhopaletes Cameron, 1931

Rhopaletes bericus (Pace, 1975) (N) (E)

Drusilla Leach, 1819

Drusilla canaliculata (Fabricius, 1787) (N, S, Si?, Sa?)
Drusilla italica (Bernhauer, 1903) (N, S, Si)
Drusilla memnonia (Maerkel, 1844)

Drusilla memnonia mnemonia (Maerkel, 1844) (Si) (E)

Zyras Stephens, 1835

Zyras cognatus (Maerkel, 1842) (N, S)
Zyras collaris (Paykull, 1800) (N, S, Si, Sa)
Zyras erraticus (Hagens, 1863) (Si)
Zyras fulgidus (Gravenhorst, 1806) (N, S, Sa)
Zyras funestus (Gravenhorst, 1806) (N, S, Si)
Zyras haworthii (Stephens, 1832) (N, S, Si, Sa)
Zyras humeralis (Gravenhorst, 1802) (N, S)
Zyras laticollis (Maerkel, 1844) (N, S)
Zyras leonhardi Bernhauer, 1912 (Si) (E)
Zyras limbatus (Paykull, 1789) (N, S)
Zyras lugens (Gravenhorst, 1802) (N, S)
Zyras maurus Fauvel, 1898 (Si)
Zyras pumilus Fiori, 1914 (S) (E)
Zyras ruficollis (Grimmer, 1843) (N, S, Si)
Zyras similis (Maerkel, 1844) (N, S)

Myrmoecia Mulsant & Rey, 1873

Myrmoecia confragosa (Hochhuth, 1849) (N)
Myrmoecia physogaster (Fairmaire, 1860) (Si)
Myrmoecia plicata (Erichson, 1837) (N)
Myrmoecia rigida (Erichson, 1839) (N, S, Si, Sa)
Myrmoecia tuberiventrifera (Fairmaire, 1853) (Si)

Lomechusoides Tottenham, 1939

Lomechusoides straneoii (Koch, 1936) (S) (E)
Lomechusoides strumosus (Fabricius, 1775)
Lomechusoides strumosus sicularis (Fiori, 1914) (Si) (E)
Lomechusoides strumosus strumosus (Fabricius, 1775) (N, S)

Lomechusa Gravenhorst, 1806

Lomechusa bifoveolata (Brisout, 1860) (N?) (*)
Lomechusa emarginata (Paykull, 1789) (N, S)
Lomechusa paradoxa (Gravenhorst, 1806) (N, S, Sa)
Lomechusa pubicollis (Brisout, 1860) (N)
Lomechusa sicularis (Rottenberg, 1870) (Si) (E)

Dinarda Leach, 1819

Dinarda dentata (Gravenhorst, 1806) (N, S) (*)

Phloeopora Erichson, 1837

Phloeopora angustiformis Baudi, 1869 (N, S, Sa)
Phloeopora concolor (Kraatz, 1856) (N)
Phloeopora scribae (Eppelsheim, 1884) (N)
Phloeopora teres (Gravenhorst, 1802) (N, S, Si, Sa)
Phloeopora testacea (Mannerheim, 1831) (N, S, Si, Sa)

Rhopalotella Bernhauer, 1911

Rhopalotella validiuscula (Kraatz, 1856) (N, S?, Si?)

Ilyobates Kraatz, 1856

Ilyobates mech (Baudi, 1848) (N)
Ilyobates nigricollis (Paykull, 1800) (N, S?)
Ilyobates propinquus (Aubé, 1850) (N)

Calodera Mannerheim, 1831

Calodera aethiops (Gravenhorst, 1802) (N, S, Si)
Calodera nigrita Mannerheim, 1831 (N?, S?, Si?, Sa?)
Calodera protensa Mannerheim, 1831 (N, S)
Calodera riparia Erichson, 1837 (N, S)
Calodera rufescens Kraatz, 1856 (N)
Calodera uliginosa Erichson, 1837 (N)

Chilomorpha Krasa, 1914

Chilomorpha longitarsis (Thomson, 1867) (N)

Parocyusa Bernhauer, 1902

Parocyusa cingulata (Kraatz, 1856) (N)
Parocyusa knabli (Bernhauer, 1915) (N)
Parocyusa longitarsis (Erichson, 1837) (N, S, Si, Sa)
Parocyusa rubicunda (Erichson, 1837) (N, S)
Parocyusa tirolensis Scheerpeltz, 1958 (N)

Ityocara Thomson, 1867

Ityocara rubens (Erichson, 1837) (N)

Amarochara Thomson, 1858

Amarochara bonnairei (Fauvel, 1865) (S)
Amarochara crassicornis Quedenfeldt, 1882 (Si)
Amarochara cribripennis Mulsant & Rey, 1874 (Sa)
Amarochara forticornis (Lacordaire, 1835) (N, S, Si, Sa)

Amarochara umbrosa (Erichson, 1837) (N, S, Si)

Blepharhymenus Solier, 1850

Blepharhymenus breiti Scheerpeltz, 1954 (N) (*)

Blepharhymenus mirandus Fauvel, 1899 (N)

Blepharhymenus sardous Scheerpeltz, 1954 (Sa) (E)

Ocalea Erichson, 1837

Ocalea badia Erichson, 1837 (N, S)

Ocalea concolor Kiesenwetter, 1847 (N, S)

Ocalea corsicana Fagel, 1957 (E)

Ocalea corsicana aprutiana Fagel, 1957 (S)

Ocalea latipennis Sharp, 1870 (N, S?)

Ocalea picata (Stephens, 1832) (N, S, Si, Sa)

Ocalea pollinensis Scheerpeltz, 1956 (S, Si) (E) (*)

Ocalea puncticollis Mulsant & Rey, 1874 (N, S?, Si?)

Ocalea rivularis Miller, 1851 (N, S, Si, Sa)

Euryalaea Mulsant & Rey, 1874

Euryalaea decumana (Erichson, 1839) (N, Sa)

Euryalaea murina (Erichson, 1839) (N, S, Si, Sa)

Apimela Mulsant & Rey, 1875

Apimela macella (Erichson, 1839) (N, S)

Apimela mulsanti (Ganglbauer, 1895) (N, S)

Meotica Mulsant & Rey, 1873

Meotica alpina Benick, 1954 (N)

Meotica calabrica Scheerpeltz, 1954 (S) (*)

Meotica capitalis (Mulsant & Rey, 1873) (N)

Meotica exigua Benick, 1954 (N)

Meotica exilis (Erichson, 1837) (N, S, Si)

Meotica filaria (Fauvel, 1898) (S, Sa)

Meotica neapolitana Scheerpeltz, 1954 (S) (E)

Meotica pallens (Redtenbacher, 1849) (N, S)

Meotica romana Benick, 1954 (S) (E)

Meotica testacea Benick, 1954 (N)

Deubelia Bernhauer, 1899

Deubelia picina (Aubé, 1850) (N)

Ocyusa Kraatz, 1856

Ocyusa defecta Rey, 1874 (N, S, Si)
Ocyusa fauveli Ragusa, 1891 (Si)
Ocyusa maura (Erichson, 1837) (N)
Ocyusa nigrata (Fairmaire & Laboulbène, 1854) (N, S, Si, Sa)
Ocyusa nitidiventris Fagel, 1958 (N)
Ocyusa picta Mulsant & Rey, 1874 (S, Si, Sa)

Leptusina Bernhauer, 1900

Leptusina longicollis (Eppelsheim, 1889) (S)

Cephalocousya Lohse, 1971

Cephalocousya nivicola (Thomson, 1870) (N)

Zoosetha Mulsant & Rey, 1875

Zoosetha inconspicua (Erichson, 1839) (N, S)
Zoosetha procidua (Erichson, 1837) (N)

Mniusa Mulsant & Rey, 1874

Mniusa incrassata (Mulsant & Rey, 1852) (N, S)

Ocyusida Bernhauer, 1900

Ocyusida rufescens (Kraatz, 1856) (N)

Hygropora Kraatz, 1856

Hygropora cunctans (Erichson, 1837) (N)

Hygropetrophila Bernhauer, 1929

Hygropetrophila grandis (Fauvel, 1900) (N)

Derocala Mulsant & Rey, 1875

Derocala rugatipennis (Kraatz, 1885) (N, S)

Oxypoda Mannerheim, 1831

Oxypoda abdominalis Mannerheim, 1831 (N)
Oxypoda acuminata (Stephens, 1832) (N, S, Sa)
Oxypoda alternans (Gravenhorst, 1802) (N, S, Si, Sa)
Oxypoda ambigena Fauvel, 1869 (S, Si, Sa)
Oxypoda amicta Erichson, 1839 (Si, Sa)

Oxypoda annularis Mannerheim, 1831 (N, S, Sa)
Oxypoda arborea Zerche, 1994 (S)
Oxypoda assimilis Kraatz, 1855 (N)
Oxypoda attenuata Mulsant & Rey, 1853 (S, Si, Sa)
Oxypoda bicolor Mulsant & Rey, 1853 (N, S, Si?, Sa?)
Oxypoda brachyptera (Stephens, 1832) (N?, S, Sa)
Oxypoda brevicornis (Stephens, 1832) (N, S, Si, Sa)
Oxypoda carbonaria (Heer, 1841) (N, S, Si, Sa)
Oxypoda castanea Mulsant & Rey, 1874 (Sa)
Oxypoda densa Fauvel, 1900 (N, S)
Oxypoda depressipennis (Aubé, 1862) (N, S)
Oxypoda doderoi Bernhauer, 1902 (N, S)
Oxypoda elbana Bernhauer, 1936 (S) (E) (*)
Oxypoda elongatula Aubé, 1850 (Si?, Sa?) (*)
Oxypoda exoleta Erichson, 1839 (N, S, Si, Sa)
Oxypoda ferruginea Erichson, 1839 (N, S)
Oxypoda filiformis Redtenbacher, 1849 (N, S, Sa)
Oxypoda flavicornis Kraatz, 1856 (N, S, Si)
Oxypoda formiceticola Maerkel, 1841 (N)
Oxypoda formosa Kraatz, 1856 (N, S, Si, Sa)
Oxypoda funebris Kraatz, 1856 (N)
Oxypoda fusina Mulsant & Rey, 1874 (S, Sa)
Oxypoda graeca Kraatz, 1855 (S)
Oxypoda haemorrhoea Mannerheim, 1831 (N, S, Si, Sa)
Oxypoda induta Mulsant & Rey, 1861 (N, S, Si, Sa)
Oxypoda islandica Kraatz, 1867 (N)
Oxypoda lentula Erichson, 1837 (N?) (*)
Oxypoda longiceps Bernhauer, 1914 (S) (E)
Oxypoda longipes Mulsant & Rey, 1861 (N, S, Si)
Oxypoda luctifera Fauvel, 1869 (N, S, Sa)
Oxypoda lugubris Kraatz, 1856 (N)
Oxypoda lurida Wollaston, 1857 (N, S, Si, Sa)
Oxypoda mutata Sharp, 1871 (N)
Oxypoda nigricornis Motschulsky, 1860 (N)
Oxypoda nigrocincta Mulsant & Rey, 1875 (S)
Oxypoda nimbicola Fauvel, 1900 (N)
Oxypoda nova Bernhauer, 1902 (S, Sa)
Oxypoda opaca (Gravenhorst, 1802) (N, S, Si, Sa)
Oxypoda parvipennis Fauvel, 1891 (N)
Oxypoda platyptera Fairmaire, 1859 (N, S)
Oxypoda praecox Erichson, 1839 (N, Sa)
Oxypoda pratensicola Lohse, 1967 (N)
Oxypoda pubescens Bernhauer, 1902 (N, Sa)
Oxypoda recondita Kraatz, 1856 (Si)
Oxypoda referens Mulsant & Rey, 1875 (Sa)
Oxypoda reyi Zerche, 1994 (N)
Oxypoda rufa Kraatz, 1856 (N, S)
Oxypoda signifera Fauvel, 1886 (S)

Oxypoda skalitzkyi Bernhauer, 1902 (N)
Oxypoda soror Thomson, 1855 (N, S)
Oxypoda spectabilis Maerker, 1844 (N, S)
Oxypoda subnitida Mulsant & Rey, 1874 (Si)
Oxypoda tirolensis Gredler, 1863 (N, S)
Oxypoda togata Erichson, 1837 (N, S, Si)
Oxypoda vicina Kraatz, 1856 (N, S, Si, Sa)
Oxypoda vittata Maerker, 1842 (N, S)

Maurachelia Bernhauer, 1902

Maurachelia pilosicollis Bernhauer, 1902 (N)

Devia Blackwelder, 1952

Devia prospera (Erichson, 1839) (N)

Stichoglossa Fairmaire & Laboulbène, 1856

Stichoglossa gobanzi (Reitter, 1891) (N)
Stichoglossa semirufa (Erichson, 1839) (N, S, Si)

Ischnoglossa Kraatz, 1856

Ischnoglossa elegantula (Mannerheim, 1831) (N, S?)

Dexiogyia Thomson, 1858

Dexiogyia corticina (Erichson, 1837) (N, S, Si, Sa)

Homoeusa Kraatz, 1856

Homoeusa acuminata (Maerker, 1842) (N, S, Si, Sa)
Homoeusa paradoxa (Scriba, 1868) (N, S)

Thiasophila Kraatz, 1856

Thiasophila angulata (Erichson, 1837) (N, S)
Thiasophila canaliculata Mulsant & Rey, 1874 (N)
Thiasophila inquinula (Maerker, 1842) (N)
Thiasophila nitescens Fauvel, 1900 (N)

Eurymniusa Ganglbauer, 1895

Eurymniusa crassa (Eppelsheim, 1883) (N, S)

Crataraea Thomson, 1858

Crataera suturalis (Mannerheim, 1831) (N, S, Si)

***Haploglossa* Kraatz, 1856**

Haploglossa bernhaueri (Sainte-Claire Deville, 1907) (N) (*)

Haploglossa gentilis (Maerkel, 1844) (N, S)

Haploglossa marginalis (Gravenhorst, 1806) (N)

Haploglossa nidicola (Fairmaire, 1852) (N)

Haploglossa picipennis (Gyllenhal, 1827) (N, Sa?)

Haploglossa villosula (Stephens, 1832) (N, S)

***Tinotus* Sharp, 1883**

Tinotus morion (Gravenhorst, 1802) (N, S, Si)

***Ocyota* Sharp, 1883**

Ocyota brevicornis (Kraatz, 1856) (N, S)

***Aleochara* Gravenhorst, 1802**

Aleochara albovillosa Bernhauer, 1901 (N, S)

Aleochara bilineata Gyllenhal, 1810 (N, S, Si, Sa)

Aleochara binotata Kraatz, 1856 (N, Si, Sa)

Aleochara bipustulata (Linné, 1761) (N, S, Si, Sa)

Aleochara brevipennis Gravenhorst, 1806 (N, S)

Aleochara brundini Bernhauer, 1936 (N)

Aleochara caprae Gridelli, 1922 (N) (E)

Aleochara clavicornis Redtenbacher, 1849 (N, S, Si, Sa)

Aleochara crassa Baudi, 1848 (N, S, Si, Sa)

Aleochara cuniculorum Kraatz, 1858 (N)

Aleochara curtula (Goeze, 1777) (N, S, Si, Sa)

Aleochara discipennis (Mulsant & Rey, 1853) (N, S, Si)

Aleochara diversicollis Fauvel, 1900 (N) (*)

Aleochara erythroptera Gravenhorst, 1806 (N, S, Sa)

Aleochara fumata Gravenhorst, 1802 (N)

Aleochara ganglbaueri Bernhauer, 1901 (N)

Aleochara haematodes Kraatz, 1862

Aleochara haematodes ripicola Mulsant & Rey, 1874 (N, S, Si, Sa)

Aleochara haemoptera Kraatz, 1856 (N?, S?, Si?, Sa?)

Aleochara heeri Likovsky, 1982 (N, S) (*)

Aleochara hummleri Bernhauer, 1914 (S) (E)

Aleochara inconspicua Aubé, 1850 (N, S)

Aleochara intricata Mannerheim, 1831 (N, S, Si, Sa)

Aleochara kamila Likovsky, 1984 (N, S, Si, Sa)

Aleochara laevigata Gyllenhal, 1810 (N, S, Si, Sa)

Aleochara lanuginosa Gravenhorst, 1802 (N, S, Si, Sa)

Aleochara lata Gravenhorst, 1802 (N, S)

Aleochara laticornis Kraatz, 1856 (N, S, Sa)
Aleochara lygaea Kraatz, 1856 (N, S)
Aleochara maculata Brisout, 1863 (N, S)
Aleochara melichari (Reitter, 1889) (N)
Aleochara meschniggi Bernhauer, 1943 (N)
Aleochara milleri Kraatz, 1862 (N, S, Si)
Aleochara moerens Gyllenhal, 1827 (N)
Aleochara moesta Gravenhorst, 1802 (N, S, Si, Sa)
Aleochara opacina Fauvel, 1900 (N)
Aleochara pauxilla (Mulsant & Rey, 1874) (S)
Aleochara peeziiana Lohse, 1961 (N)
Aleochara puberula Klug, 1833 (N, S, Si, Sa)
Aleochara rudella Fauvel, 1886 (Si)
Aleochara ruficornis Gravenhorst, 1802 (N, S?)
Aleochara sanguinea (Linné, 1758) (N, S, Si)
Aleochara sparsa Heer, 1839 (N, S, Si, Sa)
Aleochara spissicornis Erichson, 1839 (N, S, Si)
Aleochara stichai Likovsky, 1965 (N)
Aleochara tenuicornis Kraatz, 1856 (S, Si, Sa)
Aleochara tristis Gravenhorst, 1806 (N, S, Si, Sa)
Aleochara vagepunctata Kraatz, 1856 (N)
Aleochara villosa Mannerheim, 1831 (N, S, Si)

***Rheochara* Mulsant & Rey, 1875**

Rheochara spadicea (Erichson, 1837) (N)

***Polystomota* Casey, 1906**

Polystomota grisea (Kraatz, 1856) (N, S, Si, Sa)

***Emplenota* Casey, 1884**

Emplenota albopila (Mulsant & Rey, 1852) (N, S, Si, Sa)

Emplenota obscurella (Gravenhorst, 1806) (S, Si)

Note

Trigonurus mellyi: Per il S presenza marginale (Abetone).

Leptotyphlopsis lopadusae: Solo Isola di Lampedusa.

Olisthaerus: Genere presente dubitativamente in Italia.

Olisthaerus substriatus: Presenza in Italia dubbia.

Proteinus: Due specie inedite di questo genere presenti al S.

Eusphalerum pruinatum: Presenza in Italia dubbia.

Eusphalerum sorbi: Presenza marginale (Carso triestino).

Eusphalerum torquatum: Presenza in Italia dubbia.

Eusphalerum viertli: Specie nuova per la fauna italiana (Basilicata).

Paraphloeostiba gayndahensis: Specie introdotta, originaria dell'Australia, comparsa in Italia

intorno al 1988.

Olophrum assimile: Presenza in Italia dubbia.

Lesteva omissa: La ssp. omissa per il S solo all'Isola d'Elba e al M. Amiata.

Geodromicus corsicus: Presenza in Italia dubbia.

Euphantias insignis: Da verificare il valore della ssp. insularis e l'attribuzione subspecifica delle popolazioni di S e Si.

Carpelimus similis: Possibile sinonimo di *C. augustae* (Bernhauer, 1901).

Thinobius: Genere che necessita di revisione.

Thinobius atomus: Specie dubbia.

Thinobius longipennis: Numerose specie diverse segnalate sotto questo nome (ad es. crinifer e praetor). Presenza in Italia da verificare.

Thinobius obscurus: Segnalazione marginale da verificare (Ventimiglia).

Thinobius silvaticus: Rappresenta un complesso di specie.

Planeustomus rosti: Presenza in Italia dubbia.

Aploderus caesus: Presenza in Italia dubbia.

Oxytelus migrator: Specie introdotta, originaria dell'Asia orientale e sudorientale, segnalata per l'Europa dal 1975, nuova per la fauna italiana (Veneto e Alto Adige).

Anotylus complanatus: Al N presenti due forme, una delle quote basse e una alpina, rappresentanti forse due specie diverse.

Anotylus plagiatus: Presenza in Italia dubbia, forse confuso con *A. torretassoi* (Koch, 1932).

Platystethus brevipennis: Per S solo Isola d'Elba.

Platystethus nitens: Rappresenta un complesso di "forme" di difficile interpretazione.

Bledius elongatus: Specie dubbia.

Bledius minor: Nuovo per l'Italia (Basilicata).

Bledius occidentalis: Le popolazioni italiane non corrispondono perfettamente alla f.typ. di Olanda.

Bledius osiris: Presenza in Italia dubbia. *B. osiris burlinii* Koch, 1938 possibile sinonimo di *B. erraticus* Erichson, 1839.

Bledius praetermissus: Le popolazioni italiane sono leggermente diverse da quelle mitteleuropee.

Bledius tricornis: Presenza dubbia. Probabilmente le segnalazioni per l'Italia sono da riferire a *B. graellsii* Fauvel, 1865.

Entomoculia consiglieri: Solo Isola di Palmarola.

Entomoculia julii: Solo Isola di Montecristo.

Entomoculia marinae: Solo Isola di Zannone.

Entomoculia rosai: Solo Isola di Capraia.

Entomoculia toscanensis: Solo Isola di Ponza.

Leptotyphlus aithaliensis: Solo Isola d'Elba.

Leptotyphlus giglionicus: Solo Isola del Giglio.

Leptotyphlus ilvensis: Solo Isola d'Elba.

Leptotyphlus oglasensis: Solo Isola di Montecristo.

Leptotyphlus sbordonii: Solo Isola di Ponza.

Stenus hypsidromus: Presenza marginale (Alpi Giulie).

Stenus intricatus: La ssp. intricatus in Liguria e Toscana.

Stenus leprieuri: Presenza in Italia dubbia.

Stenus nitidiusculus: La ssp. quadratipennis presente dubitativamente in Italia.

Stenus niveus: Presenza in Italia dubbia.

Stenus nodipes: Presenza in Italia dubbia.

Stenus palposus: Presenza in Italia dubbia.
Stenus phyllobates: La ssp. *phyllobates* solo in Alto Adige.
Stenus picipes: La ssp. *brevipennis* presente dubitativamente in Italia. La ssp. *vulturnus* rappresenta solo una forma macrottera (segnalata per la Calabria).
Stenus proditor: Presenza in Italia dubbia.
Stenus sparsus: Presenza in Sardegna dubbia.
Stenus strigosus: Per S solo all'Isola d'Elba.
Octavius bordei: Presenza in Italia dubbia (Alpi Marittime?).
Octavius doriai: Solo Isola del Giglio.
Octavius vitalei: La ssp. *abruzzensis* solo in Abruzzo; la ssp. *cossyrensis* solo all'Isola di Pantelleria.
Paederidus: Probabilmente sottogenere di *Paederus*.
Astenus: Genere che necessita di revisione.
Astenus misellus: Probabile sinonimo di *A. thoracicus* (Baudi, 1857).
Astenus unicolor: Presenza in Italia dubbia.
Nazeris: Genere presente dubitativamente in Italia.
Nazeris pulcher: Presenza in Italia dubbia.
Medon brunneus: Per la Sicilia, solo a Pantelleria.
Medon perniger: Specie e sottospecie dubbie.
Sunius algericus: Specie nuova per la fauna italiana (Calabria e Sicilia).
Sunius bicolor: Presenza in Italia dubbia.
Sunius italicus: Vicariato in Sicilia da specie inedita.
Sunius puglianus: Specie cui potrebbero riferirsi le segnalazioni di *S. simoni* (Quedenfeldt, 1881) e *S. seminiger* (Fairmaire, 1860) per la Sicilia.
Pseudomedon huetheri: Presenza segnalata su determinazione dubbia.
Lithocharis nigriceps: Specie introdotta, originaria di Ceylon, comparsa in Europa intorno al 1930.
Scopaeus lanceolatus: Per il S, solo all'Isola del Giglio.
Scopaeus micropterus: Sottospecie dubbia.
Lobrathium multipunctum: Al S (Calabria) presente specie affine inedita.
Tetartopeus scutellaris: Presenza in Italia dubbia.
Tetartopeus terminatus: Vicariato al S da specie inedita.
Lathrobium spadiceum: Presente al S con caratteri leggermente diversi da quelli tipici.
Achenium apenninum: Probabile sottospecie di *A. depressum* (Gravenhorst, 1802).
Achenium schatzmayri: Probabile sottospecie di *A. depressum* (Gravenhorst, 1802). *A. reitteri* Ganglbauer, 1895 può essere suo sinonimo seniore.
Leptobium vulcanum: Probabile sinonimo di *L. siculum* (Gridelli, 1949).
Cryptobium turkestanicum: Specie nuova per l'Italia (Puglia).
Xantholinus alpinus: Probabile sinonimo di *X. bordonii* Coiffait, 1969.
Xantholinus alverniae: Probabile sinonimo di *X. cerrutii* Coiffait, 1964.
Xantholinus bonomettoi: Probabile sinonimo di *X. tricolor* (Fabricius, 1787).
Xantholinus carnicus: Probabile sinonimo di *X. bordonii* Coiffait, 1969.
Xantholinus graecus: Sottospecie dubbia.
Xantholinus loebli: Probabile sinonimo di *X. longiventris* Heer, 1839.
Xantholinus magrinii: Probabile sinonimo di *X. cerrutii* Coiffait, 1964.
Xantholinus morandi: Solo all'Isola di Pantelleria.
Xantholinus padus: Probabile sinonimo di *X. jarrigei* Coiffait, 1956.
Xantholinus ruffoi: Probabile sinonimo di *X. bordonii* Coiffait, 1969.

Xantholinus samniticus: Probabile sinonimo di *X. cerrutii* Coiffait, 1964.
Xantholinus sontianus: Probabile sinonimo di *X. cerrutii* Coiffait, 1964.
Vulda minima: Specie incertae sedis.
Cafius flicki: Solo all'Isola di Favignana. Specie nuova per la fauna italiana.
Philonthus agyrtes: Specie dubbia.
Philonthus caucasicus: Presenza in Italia dubbia.
Philonthus immundus: Presenza in Italia dubbia.
Philonthus laevicollis: Presenza in Italia dubbia.
Philonthus nitidulus: Presenza in Italia dubbia.
Philonthus palmi: Descritto di Sicilia e mai più ritrovato, è in realtà ampiamente diffuso nell'est del Nordamerica (Smetana in litteris). Presenza in Italia accidentale.
Philonthus parvus: Specie introdotta, originaria del Giappone, comparsa in Europa intorno al 1960.
Philonthus rectangulus: Specie introdotta, originaria dell'Estremo Oriente, comparsa in Europa intorno al 1920.
Philonthus spinipes: Specie introdotta, originaria del Giappone, comparsa in Europa intorno al 1980.
Philonthus stragulatus: Presenza in Italia dubbia.
Gabronthus thermarum: Presenza in Italia dubbia.
Gabius keysianus: Presenza in Italia dubbia.
Gabius obenbergeri: Specie nuova per l'Italia (Puglia).
Gabius satanellus: Probabile sinonimo di *doderi* Gridelli, 1920.
Gabius sexualis: Probabile sottospecie meridionale di *coxalus*.
Abemus chloropterus: Presenza marginale (Carso triestino).
Ocypus aeneocephalus: Presenza marginale (Alto Adige).
Ocypus italicus: Sottospecie di dubbio valore, con ampie intergradazioni. *O. i. mirtensis* (Müller, 1943) rientra probabilmente nell'ambito di *i. italicus* (Aragona, 1830).
Ocypus nero: Attribuzione subspecifica dubbia.
Ocypus picipennis: La ssp. *p. abruzzensis* (Müller, 1926) solo in Abruzzo; la ssp. *p. picipennis* (Fabricius, 1792) solo nelle Alpi Marittime.
Heterothops dissimilis: Rappresenta probabilmente un complesso di specie.
Heterothops quadripunctulus: Presenza in Italia dubbia.
Quedius abruzzensis: Specie dubbia.
Quedius acuminatus: Presenza in Italia dubbia.
Quedius balcanicus: Presenza marginale (Carso triestino).
Quedius boopoides: Presenza marginale (Alta Val Venosta).
Quedius brevicornis: Specie nuova per la fauna italiana (Veneto).
Quedius bruttius: Probabilmente ssp. di *latialis* Gridelli, 1924.
Quedius infuscatus: Presenza in Italia dubbia.
Quedius marcuzzii: Specie dubbia.
Quedius mesomelinus: Sottospecie di dubbio valore.
Quedius pallipes: La var. *pallipoides* Coiffait, 1961 ha forse valore di ssp. in Italia continentale e Sicilia.
Quedius riparius: Vicariato al S da specie inedita.
Quedius simplicifrons: Presenza dubbia (Liguria?).
Quedius vexans: Specie nuova per la fauna italiana (Abruzzo).
Mycetoporus: Genere che necessita di revisione.
Mycetoporus angularis: Specie di status sistematico dubbio.

Mycetoporus boreellus: Specie di status sistematico dubbio.
Mycetoporus despectus: Specie di status sistematico dubbio.
Mycetoporus gracilis: Specie di status sistematico dubbio.
Mycetoporus ignidorsum: Forse da attribuire a nobilis Luze, 1901.
Mycetoporus nigricollis: Rappresenta un complesso di specie.
Mycetoporus piceolus: Status sistematico dubbio.
Mycetoporus punctipennis: Probabilmente vicariato al S (pro parte) e Si da specie inedita.
Mycetoporus solidicornis: Status sistematico dubbio.
Ischnosoma pseudolongicorne: Specie nuova per l'Italia.
Bryoporus: Genere che necessita di revisione.
Bryoporus tirolensis: Specie dubbia.
Lordithon bicolor: Presenza in Italia dubbia.
Bolitobius: Al S esiste specie inedita.
Bolitobius haematicus: Suo probabile sinonimo è decellei (Fagel, 1966).
Sepedophilus cavicola: Attribuzione specifica dubbia.
Sepedophilus lusitanicus: Presenza in Italia dubbia.
Sepedophilus nigripennis: Attribuzione specifica dubbia.
Tachyporus pulchellus: Presenza in Italia dubbia.
Tachyporus tersus: Presenza in Italia dubbia.
Tachinus marginatus: Presenza in Italia dubbia.
Tachinus marginellus: Al S ssp. inedita.
Gymnusa variegata: Presenza in Italia dubbia.
Myllaena: Genere che necessita di revisione per la fauna italiana.
Myllaena masoni: Specie nuova per la fauna italiana.
Diglotta mersa: Specie nuova per l'Italia (Veneto).
Diglotta submarina: Presenza in Italia dubbia.
Oligota: Genere che necessita di revisione per la fauna italiana.
Oligota punctulata: Specie dubbia.
Cypha: Genere che necessita di revisione per la fauna italiana.
Diestota guadalupensis: Specie introdotta, originaria della Guadalupa, nuova per l'Italia, segnalata dal 1982 (Veneto).
Cyphaea: Genere presente dubitativamente in Italia.
Cyphaea curtula: Presenza in Italia dubbia.
Leptusa abdominalis: La ssp. carinthiaca presente dubitativamente in Italia (Alpi Carniche).
Leptusa koronensis: Presenza in Italia dubbia.
Leptusa secreta: Segnalata dubitativamente, presente sicuramente al S.
Phymatura: Genere presente dubitativamente in Italia.
Phymatura brevicollis: Presenza in Italia dubbia.
Bolitochara varia: Specie dubbia, forse ssp. sardo-corsa di obliqua.
Gnypeta ruffoi: Probabile sinonimo di rubrior.
Brachyusa concolor: Presenza in Italia dubbia.
Callicerus rigidicornis: Presenza in Italia dubbia.
Boreophilia eremita: Attribuzione specifica su base biogeografica, da verificare (segnalata in letteratura come islandica).
Hydrosmecta: Genere che necessita di revisione.
Hydrosmecta lessinica: Probabile sinonimo di fragilis.
Aloconota aloconotoides: Attribuzione generica da verificare.
Aloconota insecta: In tutta Italia presente una forma intermedia tra insecta e sulcifrons.

Aloconota mediterranea: Presenza in Italia dubbia.
Aloconota sulcifrons: Vedi 217.0.011.0.
Amischa filum: Presenza in Italia dubbia.
Ousipalia caesula: È suo probabile sinonimo *Atheta doderoi* Cameron, 1913.
Geostiba: Genere che necessita di revisione.
Geostiba arida: Presenza in Italia dubbia (specie di Dalmazia, Erzegovina e Montenegro).
Geostiba incisa: Presenza in Italia dubbia (Alpi occidentali).
Geostiba myops: Presenza in Italia dubbia (specie dei Pirenei).
Geostiba nitida: Presenza in Italia dubbia.
Geostiba poggii: Solo all'Isola d'Elba.
Geostiba sublaevis: Specie di Corsica segnalata per l'Isola d'Elba.
Liogluta: Genere che necessita di revisione.
Liogluta bertolinii: Specie dubbia.
Atheta (Philhygra): La sistematica di *Atheta* e generi vicini richiede revisione. Si riprende qui quella di Benick & Lohse (1975) dichiaratamente provvisoria, e si riportano anche i sottogeneri per la possibilità che ad alcuni venga attribuito in futuro rango di genere.
Atheta (Philhygra) convexiuscula: Probabile sinonimo di *elongatula*.
Atheta (Philhygra) kaiseriana: Specie nuova per l'Italia (Veneto e Romagna).
Atheta (Philhygra) terminalis: Presenza in Italia dubbia.
Atheta (Microdota) atricolor: È suo probabile sinonimo *exigua* Benick, 1943.
Atheta (Microdota) koltzei: Presenza marginale (Passo del Brennero).
Atheta (Microdota) liliputana: Posizione generica da verificare.
Atheta (Microdota) paganettii: Posizione sistematica da verificare.
Atheta (Microdota) spatuloides: Specie nuova per l'Italia (Liguria).
Atheta (Ceritaxa) dilutipennis: Specie tropicale (Africa e Oriente) introdotta. Secondo Pace è da attribuire al sottogenere *Xenota*.
Atheta (gruppo misto II) opacicollis: Posizione sistematica da verificare.
Atheta (Atheta) oraria: Posizione sistematica dubbia.
Atheta (gruppo misto I) italiensis: Posizione sistematica da verificare.
Atheta (gruppo misto I) pfaundleri: Specie nuova per l'Italia (Trentino).
Acrotona lucida: Posizione sistematica da verificare.
Alevonota: Genere che necessita di revisione.
Alevonota aurantiaca: Specie dubbia.
Trichiusa immigrata: Specie descritta di Germania, dove è segnalata dal 1975, ma sicuramente introdotta dal Nordamerica. Nuova per l'Italia (Trentino, Veneto, Friuli).
Lomechusa bifoveolata: Presenza dubbia (specie dei Pirenei e di Spagna).
Dinarda dentata: Rappresenta un complesso di specie affini legate a varie specie del gen. Formica. Da stabilire quali siano effettivamente presenti in Italia.
Blepharhymenus breiti: Specie nuova per l'Italia (Veneto).
Ocalea: Genere che necessita di revisione.
Ocalea pollinensis: Specie dubbia, forse sinonimo di *latipennis*.
Meotica: Genere che necessita di revisione.
Meotica calabrica: Attribuzione generica errata, ma posizione non ancora chiarita.
Oxypoda: Genere che necessita di revisione.
Oxypoda elbana: Solo all'Isola d'Elba.
Oxypoda elongatula: Presenza in Italia dubbia.
Oxypoda lentula: Presenza in Italia dubbia.
Haploglossa bernhaueri: Specie nuova per l'Italia (Veneto).

Aleochara diversicollis: Presenza marginale dubbia (Alpi Marittime).

Aleochara heeri: Entità che rappresenta probabilmente un complesso di specie.

Tenebrionidae

Erodium (Erodium) Fabricius, 1775

Erodium (Erodium) audouini Solier, 1834 (*)

Erodium (Erodium) audouini destefanii Failla Tebaldi, 1887 (Si) (E)

Erodium (Erodium) audouini peyroleri Solier, 1834 (Sa) (E)

Erodium (Erodium) sculus Solier, 1834 (*)

Erodium (Erodium) sculus dalmatinus Kraatz, 1865 (N, S)

Erodium (Erodium) sculus neapolitanus Solier, 1834 (S, Si) (E)

Erodium (Erodium) sculus sculus Solier, 1834 (Si) (E)

Zophosis Latreille, 1807

Zophosis punctata Brullé, 1832 (S, Si, Sa)

Hymatismus (Curimosphena) Gebien, 1920

Hymatismus (Curimosphena) villosus Haag-Rutenberg, 1870 (Si) (*)

Pachychila (Pachychilina) Reitter, 1900

Pachychila (Pachychilina) dejeani (Besser, 1832) (*)

Pachychila (Pachychilina) dejeani dejeani (Besser, 1832) (S, Si)

Pachychila (Pachychilina) dejeani doderoi Peyerimhoff, 1927 (Si) (E)

Pachychila (Pachychila) Eschscholtz, 1831

Pachychila (Pachychila) crassicollis Kraatz, 1865 (*)

Pachychila (Pachychila) crassicollis cossyrensis Ragusa, 1875 (Si)

Pachychila (Pachychila) frioli Solier, 1835 (S, Si)

Pachychila (Pachychila) germari Solier, 1835 (Si?, Sa)

Pachychila (Pachychila) servillei Solier, 1835 (Sa)

Pachychila (Pachychila) tazmaltensis Desbrochers des Loges, 1881 (Si) (*)

Tentyria Latreille, 1804

Tentyria grossa Besser, 1832 (*)

Tentyria grossa angustata Kraatz, 1896 (Si)

Tentyria grossa grossa Besser, 1832 (S, Si)

Tentyria grossa sardiniensis Ardoin, 1973 (Sa) (E)

Tentyria grossa sommieri Baudi, 1874 (Si) (E)

Tentyria italica Solier, 1835 (S)

Tentyria laevigata Steven, 1829

Tentyria laevigata laevigata Steven, 1829 (S, Si) (E)
Tentyria ligurica Solier, 1835
Tentyria ligurica confusa Ardoin, 1973 (Sa) (E)
Tentyria ligurica ligurica Solier, 1835 (Sa)
Tentyria ligurica pseudorugosa Ardoin, 1973 (Sa) (E)
Tentyria ramburi Solier, 1835
Tentyria ramburi cassolai Ardoin, 1973 (Sa) (E)
Tentyria ramburi floresi Gené, 1836 (Sa) (E)
Tentyria ramburi maillei Solier, 1835 (Sa)
Tentyria ramburi rugosa Gené, 1836 (Sa) (E)

Machlopsis Pomel, 1871

Machlopsis doderoi Gridelli, 1930 (Si) (E) (*)

Adelostoma Duponchel, 1827

Adelostoma sulcatum Duponchel, 1827 (Si)

Stenosis Herbst, 1799

Stenosis angusticollis (Reiche, 1861)
Stenosis angusticollis angusticollis (Reiche, 1861) (S, Si, Sa)
Stenosis angusticollis elongatissima Koch, 1940 (Sa) (E)
Stenosis brenthoides (Rossi, 1790)
Stenosis brenthoides brenthoides (Rossi, 1790) (S)
Stenosis brignonei Koch, 1935 (Si) (E)
Stenosis consilioi Canzoneri, 1976 (S) (E) (*)
Stenosis freyi Koch, 1944 (Si)
Stenosis intermedia (Solier, 1838) (N, S, Si)
Stenosis melitana Reitter, 1894 (Si)
Stenosis sardoa (Küster, 1848)
Stenosis sardoa ardoini Canzoneri, 1970 (S, Si) (E)
Stenosis sardoa sardoa (Küster, 1848) (N, S, Si, Sa)

Eutagenia Reitter, 1886

Eutagenia aegyptiaca Reitter, 1889 (*)
Eutagenia aegyptiaca tunisea Normand, 1936 (Si)
Eutagenia elvirae Marcuzzi & Turchetto, 1982 (S) (E)

Dichillus (Dichillus) Jacquelin du Val, 1861

Dichillus (Dichillus) corsicus (Solier, 1838) (S, Sa)
Dichillus (Dichillus) minutus (Solier, 1838) (N, S)
Dichillus (Dichillus) pumilus Auct. (nec Solier, 1838) (S, Sa)
Dichillus (Dichillus) socius Rottenberg, 1870 (Si) (E)
Dichillus (Dichillus) subtilis Kraatz, 1862 (Si) (E)

Dichillus (Dichillus) sp. (S) (*)

Dichillus (Dichillocerus) Reitter, 1916

Dichillus (Dichillocerus) pertusus Kiesenwetter, 1861 (S, Si)

Microtelus Solier, 1838

Microtelus lethierryi Reiche, 1860 (Si) (*)

Elenophorus Latreille, 1829

Elenophorus collaris (Linné, 1767) (S, Si, Sa)

Alphasida Escalera, 1905

Alphasida grossa (Solier, 1836)

Alphasida grossa grossa (Solier, 1836) (S, Si) (E)

Alphasida grossa sicala (Solier, 1836) (Si)

Alphasida himerera Reitter, 1917 (Si) (E)

Alphasida puncticollis (Solier, 1836) (*)

Alphasida puncticollis moltonii Canzoneri, 1972 (Si) (E)

Alphasida puncticollis tirellii Leoni, 1929 (Si) (E)

Asida (Polasida) Reitter, 1917

Asida (Polasida) jurinei Solier, 1836 (N)

Asida (Asida) Latreille, 1804

Asida (Asida) argentierae Leo, 1980 (Sa) (E)

Asida (Asida) australis Baudi, 1875 (Sa) (E)

Asida (Asida) bayardi Solier, 1836

Asida (Asida) bayardi bayardi Solier, 1836 (S) (E)

Asida (Asida) bayardi leosinii Leoni, 1909 (S) (E)

Asida (Asida) calabra Leoni, 1909 (S) (E)

Asida (Asida) combae Gené, 1839 (Sa) (E)

Asida (Asida) corsica Laporte de Castelnau, 1833

Asida (Asida) corsica corsica Laporte de Castelnau, 1833 (Sa)

Asida (Asida) corsica genei Solier, 1836 (Sa) (E)

Asida (Asida) dejeani Solier, 1836

Asida (Asida) dejeani ligurica Baudi, 1875 (N) (E)

Asida (Asida) doderoi Leoni, 1909 (Sa) (E)

Asida (Asida) dorgaliensis Leoni, 1911

Asida (Asida) dorgaliensis dorgaliensis Leoni, 1911 (Sa) (E)

Asida (Asida) dorgaliensis montalbica Reitter, 1917 (Sa) (E)

Asida (Asida) fascicularis Germar, 1817

Asida (Asida) fascicularis fiorii Leoni, 1909 (S) (E)

Asida (Asida) gestroi Leoni, 1909 (*)
Asida (Asida) gestroi capraiensis Gridelli, 1972 (S) (E)
Asida (Asida) gestroi gestroi Leoni, 1909 (S) (E)
Asida (Asida) gestroi tyrrhena Leoni, 1910 (S) (E)
Asida (Asida) gestroi ssp. A+B (S) (E)
Asida (Asida) glacialis Gené, 1839
Asida (Asida) glacialis barbaricina Leoni, 1911 (Sa) (E)
Asida (Asida) glacialis glacialis Gené, 1839 (Sa) (E)
Asida (Asida) glacialis rustica Gené, 1839 (Sa) (E)
Asida (Asida) goryi Solier, 1836 (Si) (E)
Asida (Asida) longicollis Solier, 1836 (S, Sa) (*)
Asida (Asida) lostiae Allard, 1886 (Sa) (E)
Asida (Asida) luigionii Leoni, 1909 (*)
Asida (Asida) luigionii doriae Leoni, 1910 (S) (E)
Asida (Asida) luigionii insularis Leoni, 1910 (S) (E)
Asida (Asida) luigionii luigionii Leoni, 1909 (N, S) (E)
Asida (Asida) lulensis Reitter, 1917 (Sa) (E)
Asida (Asida) minima Reitter, 1917 (Si) (E) (*)
Asida (Asida) novasiriensis Grimm, 1985 (S) (E)
Asida (Asida) nuragica Leo, 1984 (Sa) (E)
Asida (Asida) piligera Leoni, 1909 (S) (E)
Asida (Asida) pirazzolii Allard, 1869
Asida (Asida) pirazzolii pirazzolii Allard, 1869 (S) (E)
Asida (Asida) pirazzolii sardiniensis Allard, 1869 (S) (E)
Asida (Asida) sabulosa (Fuesslin, 1775) (N, S)
Asida (Asida) sardoa Leoni, 1910 (Sa) (E)
Asida (Asida) solieri Gené, 1836
Asida (Asida) solieri fancelloi Leo, 1984 (Sa) (E)
Asida (Asida) solieri solieri Gené, 1836 (Sa) (E)

Sepidium Fabricius, 1775

Sepidium siculum Solier, 1843 (S?, Si) (E)

Akis Herbst, 1799

Akis bacarozzo (Schrank, 1786) (S, Sa)
Akis italica Solier, 1836 (S)
Akis spinosa (Linné, 1764) (*)
Akis spinosa barbara Solier, 1836 (Si, Sa)
Akis spinosa spinosa (Linné, 1764) (S, Si)
Akis subterranea Solier, 1836 (S, Si)

Scaurus Fabricius, 1775

Scaurus aegyptiacus Solier, 1838
Scaurus aegyptiacus giganteus Küster, 1848 (Si, Sa)
Scaurus atratus Fabricius, 1775 (N, S, Si, Sa) (*)

Scaurus punctatus Fabricius, 1798 (Sa) (*)
Scaurus striatus Fabricius, 1792 (N, S, Si, Sa) (*)
Scaurus tristis Olivier, 1795 (S, Si, Sa)

Trachyderma Latreille, 1829

Trachyderma lima (Petagna, 1819) (Si, Sa?)

Pimelia (Pimelia) Fabricius, 1775

Pimelia (Pimelia) angusticollis Solier, 1836
 Pimelia (Pimelia) angusticollis punctatorugosa Reitter, 1915 (Sa) (E)
 Pimelia (Pimelia) angusticollis sulcitana Leo & Pisano, 1978 (Sa) (E)
Pimelia (Pimelia) bipunctata Fabricius, 1781
 Pimelia (Pimelia) bipunctata cajetana S  nac, 1887 (S) (E)
 Pimelia (Pimelia) bipunctata papii Canzoneri, 1963 (N, S) (E)
Pimelia (Pimelia) goryi Solier, 1836
 Pimelia (Pimelia) goryi cassolai Ardoin, 1973 (Sa) (E)
 Pimelia (Pimelia) goryi goryi Solier, 1836 (Sa) (E)
Pimelia (Pimelia) grossa Fabricius, 1792 (Si, Sa)
Pimelia (Pimelia) payraudi Latreille, 1829
 Pimelia (Pimelia) payraudi payraudi Latreille, 1829 (Sa)
 Pimelia (Pimelia) payraudi subalpina Ardoin, 1973 (Sa) (E)
Pimelia (Pimelia) rugulosa Germar, 1824
 Pimelia (Pimelia) rugulosa apula Gridelli, 1950 (S) (E)
 Pimelia (Pimelia) rugulosa rugulosa Germar, 1824 (S, Si) (E)
 Pimelia (Pimelia) rugulosa sublaevigata Solier, 1836 (Si) (E)
Pimelia (Pimelia) undulata Solier, 1836 (Sa) (E)

Blaps Fabricius, 1775

Blaps gibba Laporte de Castelnau, 1840 (N, S, Si, Sa)
Blaps gigas (Linn  , 1767) (N, S, Si, Sa)
Blaps lethifera Marsham, 1802 (N, S, Si, Sa)
Blaps mortisaga (Linn  , 1758) (N)
Blaps mucronata Latreille, 1804 (N, S, Si, Sa)
Blaps nitens Laporte de Castelnau, 1840 (*)
 Blaps nitens mercatii Canzoneri, 1969 (Sa) (E)
 Blaps nitens n. ssp. (Si)

Leichenum Blanchard, 1845

Leichenum pictum (Fabricius, 1801)
 Leichenum pictum pictum (Fabricius, 1801) (N, S)
Leichenum pulchellum (Lucas, 1849)
 Leichenum pulchellum pulchellum (Lucas, 1849) (N, S, Si, Sa)

Allophylax (Allophylax) Bedel, 1906

Allophylax (Allophylax) brevicollis (Baudi, 1875) (Sa) (E)
Allophylax (Allophylax) costatipennis (Lucas, 1849) (*)
 Allophylax (Allophylax) costatipennis costatipennis (Lucas, 1849) (Si)
 Allophylax (Allophylax) costatipennis godenigoi Canzoneri, 1970 (Si) (E)
Allophylax (Allophylax) picipes (Olivier, 1811)
 Allophylax (Allophylax) picipes picipes (Olivier, 1811) (S, Si)

Melambiophylax Schuster, 1922

Melambiophylax sardous (Baudi, 1875) (Sa) (E)

Psammoardoinellus Leo, 1981

Psammoardoinellus sardiniensis (Ardoïn, 1972) (Sa) (E)

Cnemeplatia A. Costa, 1847

Cnemeplatia atropos A. Costa, 1847
 Cnemeplatia atropos atropos A. Costa, 1847 (N, S, Si)

Melanimon Steven, 1829

Melanimon tibialis (Fabricius, 1781) (N, S)

Anemia (Anemia) Laporte de Castelnau, 1840

Anemia (Anemia) brevicollis (Wollaston, 1864) (S, Si)
Anemia (Anemia) sardoa (Gené, 1839)
 Anemia (Anemia) sardoa sardoa (Gené, 1839) (S, Si, Sa)

Pedinus (Pedinus) Latreille, 1796

Pedinus (Pedinus) fallax Mulsant & Rey, 1853
 Pedinus (Pedinus) fallax fallax Mulsant & Rey, 1853 (N)
Pedinus (Pedinus) fatuus Mulsant & Rey, 1853 (Si?)
Pedinus (Pedinus) femoralis (Linné, 1767) (N)
Pedinus (Pedinus) helopioides Ahrens, 1814 (S, Si)
Pedinus (Pedinus) longulus Rottenberg, 1870 (Si) (E)
Pedinus (Pedinus) meridianus Mulsant & Rey, 1853 (N, S, Sa)
Pedinus (Pedinus) punctatostriatus Mulsant & Rey, 1853 (S?, Si)
Pedinus (Pedinus) sicanus Canzoneri, 1984 (Si) (E)
Pedinus (Pedinus) siculus Seidlitz, 1893 (Si) (E)

Pedinus (Pedinulus) Seidlitz, 1893

Pedinus (Pedinulus) joncus Kiesenwetter, 1880 (Si)
Pedinus (Pedinulus) ragusae Baudi, 1875 (S, Si) (E)

Colpotus Mulsant & Rey, 1853

Colpotus godarti Mulsant & Rey, 1853 (Sa)

Colpotus strigosus (A. Costa, 1847) (*)

Colpotus strigosus ganglbaueri d'Amore Fracassi, 1907 (S) (E)

Colpotus strigosus oglasensis Gardini, 1976 (S) (E)

Colpotus strigosus ragusae d'Amore Fracassi, 1907 (Si) (E)

Colpotus strigosus strigosus (A. Costa, 1847) (N, S) (E)

Dendarus (Pandarinus) Mulsant & Rey, 1854

Dendarus (Pandarinus) caelatus Brullé, 1832 (S)

Dendarus (Pandarinus) dalmatinus (Germar, 1824) (N, S) (*)

Dendarus (Dendarus) Latreille, 1829

Dendarus (Dendarus) carinatus Mulsant & Rey, 1854 (Sa)

Dendarus (Dendarus) tristis Laporte de Castelnau, 1840 (N, S, Sa)

Dendarus (Dichromma) Seidlitz, 1893

Dendarus (Dichromma) lugens Mulsant & Rey, 1854 (S, Si)

Bioplanes Mulsant & Rey, 1854

Bioplanes meridionalis Mulsant & Rey, 1854 (N) (*)

Phylan (Phylan) Stephens, 1832

Phylan (Phylan) abbreviatus (Olivier, 1795)

Phylan (Phylan) abbreviatus italicus (Reitter, 1904) (S) (E)

Heliopathes Mulsant & Rey, 1854

Heliopathes avarus Mulsant & Rey, 1854 (*)

Heliopathes avarus avarus Mulsant & Rey, 1854 (S?, Si) (E)

Heliopathes avarus donatellae Canzoneri, 1970 (Si) (E)

Heliopathes batnensis Mulsant, 1865 (Si)

Dilamus Jacquelin du Val, 1861

Dilamus planicollis Fairmaire, 1883

Dilamus planicollis planicollis Fairmaire, 1883 (Si)

Gonocephalum (Gonocephalum) Chevrolat, 1849

Gonocephalum (Gonocephalum) assimile (Küster, 1849) (N, S, Si, Sa)

Gonocephalum (Gonocephalum) costatum (Brullé, 1832) (Si?)
Gonocephalum (Gonocephalum) obscurum (Küster, 1849)
Gonocephalum (Gonocephalum) obscurum obscurum (Küster, 1849) (N, S, Si, Sa)
Gonocephalum (Gonocephalum) perplexum (Lucas, 1849) (Si) (*)
Gonocephalum (Gonocephalum) pygmaeum (Steven, 1829) (N)
Gonocephalum (Gonocephalum) pusillum (Fabricius, 1791)
Gonocephalum (Gonocephalum) pusillum pusillum (Fabricius, 1791) (N, S, Si, Sa)
Gonocephalum (Gonocephalum) rusticum (Olivier, 1811) (N, S, Si, Sa)
Gonocephalum (Gonocephalum) setulosum (Faldermann, 1837) (Si, Sa)

***Gonocephalum (Megadasus)* Reitter, 1904**

Gonocephalum (Megadasus) lefranci Fairmaire, 1863 (Si, Sa)

***Opatrum (Colpophorus)* Mulsant & Rey, 1859**

Opatrum (Colpophorus) emarginatum Lucas, 1849 (Si, Sa) (*)
Opatrum (Colpophorus) nivale Gené, 1839 (Sa) (E)
Opatrum (Colpophorus) validum Rottenberg, 1870 (*)
Opatrum (Colpophorus) validum marcuzzii Canzoneri, 1972 (Si) (E)
Opatrum (Colpophorus) validum rottenbergi Canzoneri, 1972 (Si) (E)
Opatrum (Colpophorus) validum schlicki Gebien, 1906 (Si, Sa)
Opatrum (Colpophorus) validum validum Rottenberg, 1870 (Si) (E)

***Opatrum (Opatrum)* Fabricius, 1775**

Opatrum (Opatrum) asperidorsum Fairmaire, 1878 (Sa)
Opatrum (Opatrum) dahli Küster, 1849 (Sa) (E)
Opatrum (Opatrum) italicum Reitter, 1904 (S) (E)
Opatrum (Opatrum) obesum Olivier, 1811 (S, Si)
Opatrum (Opatrum) sabulosum (Linné, 1761) (*)
Opatrum (Opatrum) sabulosum lucifugum Küster, 1849 (N)
Opatrum (Opatrum) sabulosum sabulosum (Linné, 1761) (N, S)
Opatrum (Opatrum) sabulosum sculptum Mulsant, 1854 (N?, S) (E)
Opatrum (Opatrum) sculpturatum Fairmaire, 1860 (*)
Opatrum (Opatrum) sculpturatum caprariense Razzauti, 1919 (S) (E)
Opatrum (Opatrum) sculpturatum igiliense Razzauti, 1919 (S) (E)
Opatrum (Opatrum) sculpturatum ilvense Razzauti, 1919 (S) (E)
Opatrum (Opatrum) sculpturatum urgonense Razzauti, 1919 (S) (E)
Opatrum (Opatrum) sculpturatum sculpturatum Fairmaire, 1860 (N, S)
Opatrum (Opatrum) verrucosum Germar, 1817 (S, Si)

***Sinorus* Mulsant & Rey, 1860**

Sinorus colliardi (Fairmaire, 1860) (Sa)

***Opatroides* Brullé, 1832**

Opatroides punctulatus Brullé, 1832 (S, Si, Sa)

Ammobius Guérin-Méneville, 1846

Ammobius rufus Lucas, 1849 (N, S, Si, Sa)

Clitobius Mulsant & Rey, 1859

Clitobius ovatus (Erichson, 1843)

Clitobius ovatus ovatus (Erichson, 1843) (Si)

Scleron Hope, 1840

Scleron armatum (Waltl, 1835) (Si)

Scleron multistriatum (Forskål, 1775) (Si, Sa?)

Trachyscelis Latreille, 1809

Trachyscelis aphodioides Latreille, 1809 (*)

Trachyscelis aphodioides aphodioides Latreille, 1809 (N, S, Si, Sa)

Trachyscelis aphodioides lopadusae Koch, 1935 (Si) (E)

Phaleria (Phaleria) Latreille, 1802

Phaleria (Phaleria) acuminata Küster, 1852 (S, Si, Sa)

Phaleria (Phaleria) bimaculata (Linné, 1767) (*)

Phaleria (Phaleria) bimaculata adriatica Rey, 1891 (N) (E)

Phaleria (Phaleria) bimaculata bimaculata (Linné, 1767) (N, S, Si)

Phaleria (Phaleria) bimaculata marcuzzii Aliquò, 1993 (Si) (E)

Phaleria (Phaleria) insulana Rey, 1890 (Sa) (E)

Phaleria (Phaleria) provincialis Fauvel, 1901

Phaleria (Phaleria) provincialis ghidinii Canzoneri, 1961 (S) (E)

Phaleria (Phaleria) provincialis intermedia Schuster, 1930 (N, S) (E)

Phaleria (Phaleria) reveillierei Mulsant & Rey, 1858 (S, Si, Sa)

Halammobia Semenow, 1901

Halammobia pellucida (Herbst, 1799) (N, S, Si, Sa)

Lamprocrypticus (Lamprocrypticus) Español, 1948

Lamprocrypticus (Lamprocrypticus) alpinus (Comolli, 1837) (N)

Crypticus (Crypticus) Latreille, 1817

Crypticus (Crypticus) gibbulus (Quensel, 1806) (S, Si, Sa)

Crypticus (Crypticus) quisquilius (Linné, 1761)

Crypticus (Crypticus) quisquilius aprutianus Gridelli, 1949 (S) (E)

Crypticus (Crypticus) quisquilius quisquilius (Linné, 1761) (N)

Pseudoseriscius Español, 1948

Pseudoseriscius griseovestis (Fairmaire, 1879) (Si) (*)

Pseudoseriscius helvolus (Küster, 1852)

Pseudoseriscius helvolus adriaticus (Español, 1949) (S)

Pseudoseriscius helvolus helvolus (Küster, 1852) (S, Si) (E)

Pseudoseriscius helvolus ssp. A (Sa) (E)

Pseudoseriscius normandi (Español, 1949)

Pseudoseriscius normandi pacificii Leo, 1982 (S) (E)

Pseudoseriscius olivieri (Desbrochers des Loges, 1881)

Pseudoseriscius olivieri sardiniensis Leo, 1982 (Sa) (E)

Oochrotus Lucas, 1852

Oochrotus unicolor Lucas, 1852

Oochrotus unicolor ardoi Canzoneri, 1961 (S) (E)

Oochrotus unicolor chilivani Rallo, 1974 (Sa) (E)

Oochrotus unicolor laurae Canzoneri, 1961 (S) (E)

Oochrotus unicolor moltonii Canzoneri, 1961 (Si) (E)

Oochrotus unicolor sardous Canzoneri, 1961 (Sa) (E)

Bolitophagus Illiger, 1798

Bolitophagus interruptus Illiger, 1800 (N?, S)

Bolitophagus reticulatus (Linné, 1767) (N, S, Si)

Eledonoprius Reitter, 1911

Eledonoprius armatus (Panzer, 1799) (Si, Sa)

Eledona Latreille, 1796

Eledona agaricola (Herbst, 1783) (N, S, Si, Sa)

Diaperis Geoffroy Saint-Hilaire, 1762

Diaperis boleti (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)

Hoplocephala Laporte de Castelnau & Brullé, 1831

Hoplocephala haemorrhoidalis (Fabricius, 1787) (N?, S, Si, Sa)

Scaphidema Redtenbacher, 1849

Scaphidema metallicum (Fabricius, 1792) (N, S)

Platydema Laporte de Castelnau & Brullé, 1831

Platydema europaeum Laporte de Castelnau & Brullé, 1831 (N, S)

Platydema violaceum (Fabricius, 1790) (N, S)

Alphitophagus Stephens, 1832

Alphitophagus bifasciatus (Say, 1823) (N, S, Si, Sa)

Pentaphyllus Latreille, 1829

Pentaphyllus chrysomeloides (Rossi, 1792) (N, S, Si, Sa)

Pentaphyllus testaceus (Hellwig, 1792) (N, S, Si, Sa)

Phtora Mulsant, 1854

Phtora crenata Mulsant, 1854 (Si)

Gnathocerus (Echocerus) Horn, 1870

Gnathocerus (Echocerus) maxillosus (Fabricius, 1801) (N)

Gnathocerus (Gnathocerus) Thunberg, 1814

Gnathocerus (Gnathocerus) cornutus (Fabricius, 1798) (N, S, Si, Sa)

Lyphia Mulsant & Rey, 1859

Lyphia tetraphylla (Fairmaire, 1856) (S, Si, Sa)

Latheticus Waterhouse, 1880

Latheticus oryzae Waterhouse, 1880 (N, S, Si)

Tribolium (Eusemostene) Gebien, 1940

Tribolium (Eusemostene) confusum Jacquelin du Val, 1868 (N, S, Si, Sa)

Tribolium (Tribolium) Macleay, 1825

Tribolium (Tribolium) castaneum (Herbst, 1797) (N, S, Si, Sa)

Tribolium (Tribolium) madens (Charpentier, 1825) (N)

Palorus Mulsant, 1854

Palorus depressus (Fabricius, 1790) (N, S, Si, Sa)

Palorus ratzeburgi (Wissmann, 1848) (N, S, Si, Sa)

Palorus subdepressus (Wollaston, 1864) (N, S, Si, Sa)

Erelus Mulsant & Rey, 1853

Erelus sulcipennis Mulsant & Rey, 1853 (Si)

Ulomina Baudi, 1876

Ulomina carinata Baudi, 1876 (S) (E)

Uloma Laporte de Castelnau, 1840

Uloma culinaris (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa?)

Uloma rufa (Piller & Mitterpacher, 1783) (N, S, Sa)

Alphitobius Stephens, 1832

Alphitobius diaperinus (Panzer, 1797) (N, S, Si, Sa)

Alphitobius laevigatus (Fabricius, 1871) (N, Si)

Diaclina Jacquelin du Val, 1861

Diaclina testudinea (Piller & Mitterpacher, 1783) (N?, S, Si)

Cataphronetis Lucas, 1849

Cataphronetis crenata (Germar, 1836) (N?, S, Si, Sa)

Hypophloeus (Hypophloeus) Fabricius, 1790

Hypophloeus (Hypophloeus) unicolor (Piller & Mitterpacher, 1783) (N, S, Si, Sa)

Hypophloeus (Paraphloeus) Seidlitz, 1894

Hypophloeus (Paraphloeus) bicolor (Olivier, 1790) (N, S, Si, Sa)

Hypophloeus (Paraphloeus) fasciatus Fabricius, 1790 (N, S, Si, Sa)

Hypophloeus (Paraphloeus) fraxini Kugelann, 1794 (N, S)

Hypophloeus (Paraphloeus) leonhardi Reitter, 1906 (N, Sa)

Hypophloeus (Paraphloeus) linearis Fabricius, 1790 (N)

Hypophloeus (Paraphloeus) pini (Panzer, 1799) (N, S, Sa)

Hypophloeus (Paraphloeus) rufulus Rosenhauer, 1847 (S?)

Hypophloeus (Paraphloeus) versipellis Baudi, 1876 (S)

Cossyphus (Cossyphus) Olivier, 1795

Cossyphus (Cossyphus) moniliferus Chevrolat, 1829 (S, Si, Sa)

Cossyphus (Cossyphus) tauricus Steven, 1829 (S, Si)

Iphthiminus Spilman, 1973

Iphthiminus italicus (Truqui, 1857)

Iphthiminus italicus italicus (Truqui, 1857) (S, Si)

Menepphilus Mulsant, 1854

Menepphilus cylindricus (Herbst, 1784)

Menepphilus cylindricus cylindricus (Herbst, 1784) (N, S, Si, Sa)

Tenebrio (Tenebrio) Linné, 1758

Tenebrio (Tenebrio) molitor Linné, 1758 (N, S, Si, Sa)

Tenebrio (Tenebrio) obscurus Fabricius, 1792 (N, S, Si, Sa)

Tenebrio (Tenebrio) opacus Duftschmid, 1812 (N)

Tenebrio (Tenebrio) punctipennis Seidlitz, 1896 (N, S, Si, Sa)

Neatus J. Leconte, 1862

Neatus noctivagus (Mulsant & Rey, 1854) (S, Si) (E)

Neatus picipes (Herbst, 1797)

Neatus picipes intermedius (Fiori, 1903) (N) (E)

Neatus picipes picipes (Herbst, 1797) (N)

Belopus (Belopus) Gebien, 1911

Belopus (Belopus) elongatus (Herbst, 1797)

Belopus (Belopus) elongatus ecalcaratus (Seidlitz, 1898) (S?, Si)

Belopus (Belopus) elongatus elongatus (Herbst, 1797) (Sa)

Belopus (Centorus) Mulsant, 1854

Belopus (Centorus) crassipes (Fischer-Waldheim, 1844) (S)

Belopus (Centorus) proceroides Leo, 1984 (Sa) (E)

Belopus (Centorus) procerus Mulsant, 1854

Belopus (Centorus) procerus procerus Mulsant, 1854 (S, Si)

Metaclisa Jacquelin du Val, 1861

Metaclisa azurea (Waltl, 1838) (Si)

Laena Latreille, 1829

Laena viennensis (Sturm, 1807) (N)

Allardius Ragusa, 1898

Allardius oculatus (Baudi, 1876) (Si) (E)

Allardius sardiniensis (Allard, 1877) (Sa) (E)

Nephodinus (Nephodinus) Gebien, 1942

Nephodinus (Nephodinus) metallescens (Küster, 1846) (Sa)

Italohelops Español, 1961

Italohelops subchalybaeus (Reitter, 1907) (S, Si) (E)

Helops Fabricius, 1775

Helops coeruleus (Linné, 1758) (N, S, Si)

Helops rossii (Germar, 1817) (N, S, Si)

Raiboscelis Allard, 1876

Raiboscelis azureus (Brullé, 1832) (*)

Raiboscelis azureus azureus (Brullé, 1832) (S)

Probaticus (Helopotrachus) Reitter, 1922

Probaticus (Helopotrachus) gibbithorax (Gemminger, 1870) (Sa) (E)

Probaticus (Helopotrachus) sphaericollis (Küster, 1850) (S, Si) (E)

Probaticus (Helopotrachus) tomentosus Reitter, 1906 (Si) (E)

Probaticus (Pelorinus) Vauloger, 1899

Probaticus (Pelorinus) anthrax (Seidlitz, 1898) (S, Si) (E)

Probaticus (Pelorinus) ebeninus (Villa, 1838) (*)

Probaticus (Pelorinus) ebeninus cassolai Ardoïn, 1973 (Sa) (E)

Probaticus (Pelorinus) ebeninus ebeninus (Villa, 1838) (S, Sa)

Stenohelops (Gunarellus) Reitter, 1922

Stenohelops (Gunarellus) carlofortinus Leo, 1980 (Sa) (E)

Stenohelops (Stenohelops) Reitter, 1922

Stenohelops (Stenohelops) narcissus Reitter, 1922 (Si)

Gunarus Gozis, 1886

Gunarus parvulus (Lucas, 1849) (S, Si, Sa)

Catomus (Catomus) Allard, 1876

Catomus (Catomus) consentaneus (Küster, 1851) (S, Si, Sa)

Catomus (Catomus) rotundicollis (Guérin-Ménéville, 1825) (N, S, Si, Sa)

Enoplopus Solier, 1848

Enoplopus dentipes (Rossi, 1790) (N, S, Si)

Xanthomus Mulsant, 1854

Xanthomus pallidus (Curtis, 1830)

Xanthomus pallidus ghidinii Canzoneri, 1959 (S, Si, Sa)

Xanthomus pallidus residuus Canzoneri, 1959 (N)

Xanthomus pellucidus (Mulsant, 1856) (S, Si)

Odocnemis Allard, 1876

Odocnemis exaratus (Germar, 1817) (N, S, Si)

Odocnemis ruffoi (Canzoneri, 1970) (*)

Odocnemis ruffoi osellai (Gardini, 1979) (S) (E)

Odocnemis ruffoi ruffoi (Canzoneri, 1970) (Si) (E)

Stenomax (Asyrmatus) Canzoneri, 1959

Stenomax (Asyrmatus) foudrasi (Mulsant, 1854) (N) (*)

Stenomax (Asyrmatus) piceus (Sturm, 1826) (N, S) (*)

Stenomax (Stenomax) Allard, 1876

Stenomax (Stenomax) aeneus (Scopoli, 1763) (N)

Stenomax (Stenomax) lanipes (Linné, 1771) (N, S)

Nalassus Mulsant, 1854

Nalassus aemulus (Küster, 1850)

Nalassus aemulus aemulus (Küster, 1850) (S, Si) (E)

Nalassus aemulus calaritanus Leo, 1986 (Sa) (E)

Nalassus alpigradus (Fairmaire, 1882) (N)

Nalassus assimilis (Küster, 1850) (N, S, Si, Sa)

Nalassus convexus (Küster, 1850) (N, S) (*)

Nalassus dermestoides (Illiger, 1798) (N, S)

Nalassus dryadophilus (Mulsant, 1854) (N, S, Si, Sa)

Nalassus genei (Gené, 1839)

Nalassus genei genei (Gené, 1839) (Sa)

Nalassus genei melonii Leo, 1982 (Sa) (E)

Nalassus picinus (Küster, 1850) (N)

Nalassus planipennis (Küster, 1850) (N, S) (E)

Nalassus plebejus (Küster, 1850) (S)

Myrmechixenus Chevrolat, 1835

Myrmechixenus picinus Aubé, 1850 (N, S, Si, Sa)
Myrmechixenus subterraneus Chevrolat, 1835 (N, S)
Myrmechixenus vaporariorum Guérin-Ménéville, 1843 (S, Si, Sa)

Note

Erodium (Erodium) audouini: La ssp. *destefanii* in Si solo nell'Is. Lampedusa.
Erodium (Erodium) siculus: La ssp. *neapolitanus* in Si solo nelle Is. Stromboli e Panarea.
Hymatismus (Curimosphena) villosus: Presente in Si solo nell'Is. Linosa.
Pachychila (Pachychilina) dejeani: La ssp. *doderoi* in Si solo nell'Is. Lampedusa.
Pachychila (Pachychila) crassicollis: La ssp. *cossyrensis* in Si solo nell'Is. Pantelleria.
Pachychila (Pachychila) tazmaltensis: Presente in Si solo nell'Is. Lampedusa.
Tentyria grossa: La ssp. *angustata* in Si solo nell'Is. Pantelleria; la ssp. *sommieri* in Si solo nelle Is. Linosa e Lampione.
Machlopsis doderoi: Presente in Si solo nell'Is. Lampedusa.
Stenosis consilioi: Presente in S solo nell'Is. Palmarola.
Eutagenia aegyptiaca: La ssp. *tunisea* in Si solo nell'Is. Lampedusa.
Dichillus (Dichillus) sp.: Presente in S solo in stazioni tirreniche campane e calabre.
Microtelus lethierryi: Presente in Si solo nell'Is. Lampedusa.
Alphasida puncticollis: La ssp. *moltonii* in Si solo nell'Is. Lampione; la ssp. *tirellii* in Si solo nell'Is. Lampedusa.
Asida (Asida) gestroi: La ssp. *capraiensis* in S solo nell'Is. Capraia; la ssp. *gestroi* in S solo nell'Is. Montecristo; la ssp. *tyrrhena* in S solo nell'Is. Gorgona; le ssp. A+B in S solo nelle Is. Pianosa e Cerboli.
Asida (Asida) longicollis: Presente in S solo nell'Is. Capraia.
Asida (Asida) luigionii: La ssp. *doriae* in S solo nell'Is. Giglio; la ssp. *insularis* in S solo in altre isole dell'Arcipelago Toscano; la ssp. *luigionii* in N solo nella Liguria orientale.
Asida (Asida) minima: Presente in Si solo nell'Is. Lampedusa.
Akis spinosa: La ssp. *barbara* in Si solo nelle Is. Linosa, Pantelleria e Lampedusa, in Sa solo nel sud dell'isola.
Scaurus atratus: In N limitata alla Liguria occidentale.
Scaurus punctatus: In Sa limitata all'estremo NW dell'isola.
Scaurus striatus: In N limitata alla Liguria occidentale.
Blaps nitens: La ssp. A in Si solo nell'Is. Lampedusa.
Allophylax (Allophylax) costatipennis: La ssp. *costatipennis* in Si solo nelle Is. Linosa e Lampedusa; la ssp. *godenigoi* in Si solo nell'Is. Marettimo.
Colpotus strigosus: La ssp. *oglasensis* in S solo nell'Is. Montecristo.
Dendarus (Pandarinus) dalmatinus: In N presenza marginale sul confine orientale.
Bioplanes meridionalis: In N limitata alla Liguria centro-occidentale.
Heliopathes avarus: La ssp. *donatellae* in Si solo nell'Is. Pantelleria.
Gonocephalum (Gonocephalum) perplexum: Presente in Si solo nelle Is. Lampedusa e Pantelleria.
Opatrum (Colpophorus) emarginatum: Specie maghrebina di recente introduzione in Si e Sa.
Opatrum (Colpophorus) validum: La ssp. *marcuzzii* in Si solo nell'Is. Ustica; la ssp. *rottenbergi* in Si solo nell'Is. Lampione; la ssp. *schlicki* in Si solo nell'Is. Pantelleria.
Opatrum (Opatrum) sabulosum: La ssp. *lucifugum* a N presente sul confine orientale.
Opatrum (Opatrum) sculpturatum: La ssp. *caprariense* a S solo nell'Is. Capraia; la ssp. *igiliense* solo nell'Is. Giglio; la ssp. *ilvense* solo nell'Is. Elba; la ssp. *urgonense* solo nell'Is.

Gorgona.

Trachyscelis aphodioides: La ssp. *lopadusae* in Si solo nell'Is. Lampedusa.

Phaleria (Phaleria) bimaculata: La ssp. *marcuzzii* in Si solo nelle Is. Eolie.

Pseudoseriscius griseovestis: Presente in Si solo nell'Is. Linosa.

Raiboscelis azureus: Presente in S solo nelle Is. Tremiti.

Probaticus (Pelorinus) ebeninus: La ssp. *ebeninus* in S solo nell'Is. Giglio.

Odocnemis ruffoi: La ssp. *osellai* in S solo nell'Is. Montecristo; la ssp. *ruffoi* in Si solo nell'Is. Marettimo.

Stenomax (Asyrmatus) foudrasi: In N limitata alla Liguria occidentale.

Stenomax (Asyrmatus) piceus: In S limitata alle Marche.

Nalassus convexus: In S limitata alla Toscana settentrionale.

Tetraphaleridae

Crowsoniella Pace, 1975

*Crowsoniella relict*a Pace, 1975 (S) (E)

Tetratomidae

Tetratoma Fabricius, 1790

Tetratoma ancora Fabricius, 1790 (N)

Tetratoma desmaresti Latreille, 1807 (S)

Tetratoma fungorum Fabricius, 1790 (N, S, Si)

Tetratoma tedaldii Reitter, 1887 (S) (E)

Mycetoma Mulsant, 1856

Mycetoma suturale (Panzer, 1797) (N?) (*)

Eustrophus Latreille, 1809

Eustrophus dermestoides (Fabricius, 1792) (N, Si, Sa)

Hallomenus (Hallomenus) Panzer, 1794

Hallomenus (Hallomenus) axillaris (Illiger, 1807) (N)

Hallomenus (Hallomenus) binotatus (Quensel, 1790) (N, S)

Note

Mycetoma suturale: Presenza dubbia, e solo marginale, nella Venezia Giulia italiana.

Thorictidae

Thorictus Germar, 1817

Thorictus grandicollis Germar, 1817 (S, Si, Sa?)
Thorictus mauritanicus Lucas, 1849 (Si, Sa)
Thorictus pilosus Peyron, 1857 (S?)
Thorictus sicilianus John, 1965 (Si)
Thorictus studti John, 1971 (Si) (E)
Thorictus wasmanni Reitter, 1895 (Si?)

Thorictodes Reitter, 1875

Thorictodes heydeni Reitter, 1875 (N, S) (*)

Note

Thorictodes heydeni: Specie sud-mediterranea introdotta in località litoranee liguri e toscane.

Throscidae

Throscus Latreille, 1796

Throscus algiricus Bonvouloir, 1861 (S, Sa)
Throscus asiaticus Bonvouloir, 1859 (N, S, Si, Sa)
Throscus brevicollis Bonvouloir, 1859 (N, S, Sa)
Throscus carinifrons Bonvouloir, 1859 (N, S, Si, Sa)
Throscus dermestoides (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)
Throscus duvali Bonvouloir, 1859 (N, S, Si, Sa?)
Throscus elateroides Heer, 1841 (N, S, Si, Sa)
Throscus obtusus Curtis, 1827 (N, S, Si, Sa)
Throscus rougeti Fauvel, 1885 (N)

Drapetes Redtenbacher, 1849

Drapetes biguttatus (Piller, 1783) (N, S, Si, Sa)
Drapetes cinctus (Panzer, 1796) (S)

Trogidae

Trox Fabricius, 1775

Trox cadaverinus Illiger, 1802 (N?) (*)
Trox cribrum Gené, 1836 (Sa)
Trox fabricii Reiche, 1853 (Si)
Trox hispidus (Pontoppidan, 1763)

Trox hispidus niger Rossi, 1792 (N, S, Si)
Trox hispidus nodulosus Harold, 1872 (Sa)
Trox litoralis Pittino, 1991 (S, Si)
Trox perlatus (Geoffroy, 1762) (N)
Trox perrisi Fairmaire, 1868 (N)
Trox sabulosus (Linné, 1758) (N, S?, Sa?)
Trox scaber (Linné, 1767) (N, S, Si, Sa?)

Omorgus Erichson, 1847

Omorgus melancholicus Fåhraeus, 1857 (Si) (*)

Note

Trox cadaverinus: Presenza in Italia da verificare.

Omorgus melancholicus: Unico reperto; probabilmente si tratta di una specie introdotta dall'Africa.

Trogossitidae

Peltis Kugelann, 1792

Peltis grossa (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)

Ostoma Laicharting, 1781

Ostoma ferrugineum (Linnaeus, 1758) (N, S)

Grynocharis C.G. Thomson, 1859

Grynocharis oblonga (Linnaeus, 1758) (N, S) (*)

Thymalus Latreille, 1802

Thymalus limbatus (Fabricius, 1787) (N, S, Si, Sa)

Calitys C.G. Thomson, 1859

Calitys scabra (Thunberg, 1784) (N)

Temnochila Westwood, 1835

Temnochila coerulea (Olivier, 1790) (N, S, Si, Sa)

Tenebroides Piller & Mitterpacher, 1783

Tenebroides fuscus (Goeze, 1777) (N?) (*)

Tenebroides maroccanus Reitter, 1884 (Sa)
Tenebroides mauritanicus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Nemosoma Latreille, 1804

Nemosoma elongatum (Linnaeus, 1761) (N, S, Si, Sa)

Lophocateres Olliff, 1883

Lophocateres pusillus (Klug, 1832) (S) (*)

Note

Grynocharis oblonga: In S dato inedito (E. Colonnelli leg.) per il Monte Pollino.

Tenebroides fuscus: Presenza dubbia in Alto Adige.

Lophocateres pusillus: Specie subcosmopolita ad introduzione antropica, occasionalmente acclimatata.

Urodontidae

Bruchela Dejean, 1821

Bruchela argentata (Küster, 1848) (Si)

Bruchela cana (Küster, 1848) (Si, Sa)

Bruchela flavescens (Küster, 1850) (S, Si, Sa)

Bruchela pygmaea (Gyllenhal, 1833) (N)

Bruchela rufipes (Olivier, 1790)

Bruchela rufipes rufipes (Olivier, 1790) (N, S, Sa)

Bruchela suturalis (Fabricius, 1792)

Bruchela suturalis suturalis (Fabricius, 1792) (N, S, Si)

Cercomorphus Perris, 1864

Cercomorphus bicolor Abeille, 1895 (Sa)

Cercomorphus duvalii Perris, 1864 (Si)

Megaloptera

Sialidae

Sialis Latreille, 1803

Sialis fuliginosa Pictet, 1836 (N, S)

Sialis lutaria (Linné, 1758) (N, S)

Sialis morio Klingstedt, 1932 (N) (*)

Sialis nigripes Pictet, 1865 (N, S)

Note

Sialis morio: Presenza marginale sul confine orientale (Tarvisio).

Raphidioptera

Raphidiidae

Phaeostigma (Phaeostigma) Navás, 1909

Phaeostigma (Phaeostigma) galloitalica (H. Aspöck & U. Aspöck, 1976) (N, S) (*)

Phaeostigma (Phaeostigma) italogallica (H. Aspöck & U. Aspöck, 1976) (N, S) (*)

Phaeostigma (Phaeostigma) notata (Fabricius, 1781) (N)

Phaeostigma (Pontoraphidia) H. Aspöck & U. Aspöck, 1968

Phaeostigma (Pontoraphidia) grandii (Principi, 1960) (S) (E)

Dichrostigma Navás, 1909

Dichrostigma flavipes (Stein, 1863) (N, S) (*)

Tjederiraphidia H. Aspöck, U. Aspöck & Rausch, 1985

Tjederiraphidia santuzza (H. Aspöck, U. Aspöck & Rausch, 1980) (S) (E) (*)

Subilla Navás, 1916

Subilla confinis (Stephens, 1836) (N?, S) (*)

Ornatoraphidia H. Aspöck & U. Aspöck, 1968

Ornatoraphidia etrusca (Albarda, 1891) (N, S) (*)

Xanthostigma Navás, 1909

Xanthostigma aloysiana (A. Costa, 1855) (S)

Xanthostigma corsica (Hagen, 1867) (S, Si, Sa)

Xanthostigma xanthostigma (Schummel, 1832) (N?) (*)

Raphidia (Raphidia) Linné, 1758

Raphidia (Raphidia) ligurica Albarda, 1891 (N, S)

Raphidia (Raphidia) mediterranea H. Aspöck, U. Aspöck & Rausch, 1977 (S)

Raphidia (Raphidia) ophiopsis Linné, 1758 (N)
Raphidia (Raphidia) ulrikae Aspöck, 1964 (N) (*)

Italoraphidia H. Aspöck & U. Aspöck, 1968

Italoraphidia solariana (Navás, 1928) (S) (E)

Puncha Navás, 1915

Puncha ratzeburgi (Brauer, 1876) (N, S?) (*)

Venustoraphidia H. Aspöck & U. Aspöck, 1968

Venustoraphidia nigricollis (Albarda, 1891) (N, S)

Note

Phaeostigma (Phaeostigma) galloitalica: In N nota solo dell'Appennino Romagnolo.
Phaeostigma (Phaeostigma) italogallica: In N nota solo dell'Appennino Romagnolo.
Dichrostigma flavipes: In S nota solo di Toscana e Marche.
Tjederiraphidia santuzza: Nota solo dell'Aspromonte (Calabria).
Subilla confinis: In N presenza dubbia e marginale, in S forse un taxon distinto.
Ornatoraphidia etrusca: In N nota con certezza solo dell'Appennino Romagnolo e del Friuli Venezia Giulia.
Xanthostigma xanthostigma: Non ancora segnalata con sicurezza di località entro il territorio politicamente italiano.
Raphidia (Raphidia) ulrikae: Presenza marginale sul confine orientale (Tarvisio).
Puncha ratzeburgi: In S presenza dubbia e comunque limitata all'Appennino Toscano.

Inocelliidae

Fibla (Fibla) Navás, 1915

Fibla (Fibla) maclachlani (Albarda, 1891) (Si, Sa) (*)

Parainocellia (Parainocellia) H. Aspöck & U. Aspöck, 1968

Parainocellia (Parainocellia) bicolor (A. Costa, 1855) (N, S)

Note

Fibla (Fibla) maclachlani: Endemismo siculo-sardo-corso.

Planipennia

Coniopterygidae

Aleuropteryx Löw, 1855

Aleuropteryx juniperi Ohm, 1968 (S, Sa)
Aleuropteryx loewii Klapalek, 1894 (N, S)

Helicoconis (Helicoconis) Enderlein, 1905

Helicoconis (Helicoconis) hirtinervis Tjeder, 1960 (S)
Helicoconis (Helicoconis) lutea (Wallengren, 1871) (N)

Helicoconis (Ohmopteryx) Kis, 1970

Helicoconis (Ohmopteryx) pseudolutea Ohm, 1965 (N, S)

Coniopteryx (Coniopteryx) Curtis, 1834

Coniopteryx (Coniopteryx) borealis Tjeder, 1930 (N, S, Sa)
Coniopteryx (Coniopteryx) pygmaea Enderlein, 1906 (N, S)
Coniopteryx (Coniopteryx) tineiformis Curtis, 1834 (N, S, Sa?)

Coniopteryx (Holoconiopteryx) Meinander, 1972

Coniopteryx (Holoconiopteryx) drammonti Rousset, 1964 (S)
Coniopteryx (Holoconiopteryx) haematica McLachlan, 1868 (N, S, Sa)
Coniopteryx (Holoconiopteryx) renate Rausch & H. Aspöck, 1977 (S)

Coniopteryx (Metaconiopteryx) Kis, Nagler & Mandru, 1970

Coniopteryx (Metaconiopteryx) arcuata Kis, 1965 (N, S, Sa)
Coniopteryx (Metaconiopteryx) esbenpeterseni Tjeder, 1930 (N, S)
Coniopteryx (Metaconiopteryx) lentiae H. Aspöck & U. Aspöck, 1964 (N, S, Sa?)

Parasemidalis Enderlein, 1905

Parasemidalis fuscipennis (Reuter, 1894) (N, S, Sa)

Hemisemidalis Meinander, 1972

Hemisemidalis pallida (Withycombe, 1924) (S)

Conwentzia Enderlein, 1905

Conwentzia pineticola Enderlein, 1905 (N, S)
Conwentzia psociformis (Curtis, 1834) (N, S, Si, Sa)

Semidalis Enderlein, 1905

Semidalis aleyrodiformis (Stephens, 1836) (N, S, Si, Sa)

Semidalis pseudouncinata Meinander, 1963 (N, S, Sa)

Semidalis vicina (Hagen, 1861) (S)

Osmylidae

Osmylus Latreille, 1802

Osmylus fulvicephalus (Scopoli, 1763) (N, S, Si?)

Nevrorthidae

Nevrorthus A. Costa, 1863

Nevrorthus fallax (Rambur, 1842) (Sa) (*)

Nevrorthus iridipennis A. Costa, 1863 (S, Si) (E) (*)

Note

Nevrorthus fallax: Endemismo sardo-corso.

Nevrorthus iridipennis: Nota solo di Aspromonte (Calabria) e Monti Peloritani (Sicilia).

Sisyridae

Sisyra Burmeister, 1839

Sisyra iridipennis A. Costa, 1884 (Sa)

Sisyra niger (Retzius, 1783) (N, S, Sa)

Sisyra terminalis Curtis, 1854 (N)

Berothidae

Isoscelipteron A. Costa, 1863

Isoscelipteron fulvum A. Costa, 1863 (S) (*)

Note

Isoscelipteron fulvum: Nota solo di Aspromonte (Calabria).

Mantispidae

Mantispa Illiger, 1798

Mantispa styriaca (Poda, 1761) (N, S, Si, Sa)

Perlamantispa Handschin, 1960

Perlamantispa aphavexelte U. Aspöck & H. Aspöck, 1994 (S, Si)

Perlamantispa perla (Pallas, 1772) sensu Erichson, 1839 (N, S, Si)

Dilaridae

Dilar Rambur, 1842

Dilar corsicus Navás, 1909 (S) (*)

Dilar parthenopaeus A. Costa, 1855 (N, S, Si?, Sa) (E) (*)

Note

Dilar corsicus: Nota solo di Corsica e dell'Isola di Zannone (Arcipelago Pontino).

Dilar parthenopaeus: 1In N presente solo nell'Appennino ligure e nelle Alpi Marittime; in S nel versante tirrenico dell'Appennino dalla Calabria al Lazio. Non è impossibile che le diverse popolazioni appartengano a taxa separati.

Hemerobiidae

Hemerobius Linné, 1758

Hemerobius atrifrons McLachlan, 1868 (N)

Hemerobius contumax Tjeder, 1932 (N, S)

Hemerobius fenestratus Tjeder, 1932 (N)

Hemerobius gilvus Stein, 1863 (N, S, Si, Sa)

Hemerobius handschini Tjeder, 1957 (N, S, Si)

Hemerobius humulinus Linné, 1758 (N, S, Si, Sa)

Hemerobius lutescens Fabricius, 1793 (N, S, Sa?) (*)

Hemerobius marginatus Stephens, 1836 (N)

Hemerobius micans Olivier, 1792 (N, S, Si?, Sa?)

Hemerobius nitidulus Fabricius, 1777 (N, S)

Hemerobius perelegans Stephens, 1836 (N)

Hemerobius pini Stephens, 1836 (N)

Hemerobius schedli Hölzel, 1970 (N)

Hemerobius simulans Walker, 1853 (N)

Hemerobius stigma Stephens, 1836 (N, S, Sa)

Wesmaelius Krüger, 1922

Wesmaelius concinnus (Stephens, 1836) (N)
Wesmaelius cunctatus (Ohm, 1967) (N)
Wesmaelius fassnidgei (Killington, 1933) (N)
Wesmaelius helveticus (H. Aspöck & U. Aspöck, 1964) (N)
Wesmaelius malladai (Navás, 1925) (N)
Wesmaelius mortoni (McLachlan, 1899) (N?) (*)
Wesmaelius nervosus (Fabricius, 1793) (N, S, Si?)
Wesmaelius quadrifasciatus (Reuter, 1894) (N)
Wesmaelius ravus (Withycombe, 1923) (N, Si)
Wesmaelius subnebulosus (Stephens, 1836) (N, S, Si, Sa)
Wesmaelius tjederi (Kimmings, 1963) (N, S, Si)

Symphorobius Banks, 1904

Symphorobius elegans (Stephens, 1836) (N, S, Sa?)
Symphorobius fallax Navás, 1908 (N, S, Si, Sa) (*)
Symphorobius fuscescens (Wallengren, 1863) (N, S)
Symphorobius klapaleki Zeleny, 1963 (N, S)
Symphorobius luqueti Leraut, 1991 (N, S, Si)
Symphorobius pellucidus (Walker, 1853) (N, S)
Symphorobius pygmaeus (Rambur, 1842) (N, S, Si, Sa)

Psectra Hagen, 1866

Psectra diptera (Burmeister, 1839) (N)

Megalomus Rambur, 1842

Megalomus hirtus (Linné, 1761) (N, S)
Megalomus pyraloides Rambur, 1842 (N, S, Si)
Megalomus tineoides Rambur, 1842 (N, S, Si, Sa)
Megalomus tortricoides Rambur, 1842 (N, S)

Drepanopteryx Leach, 1815

Drepanopteryx algida (Erichson, 1851) (N)
Drepanopteryx phalaenoides (Linné, 1758) (N)

Micromus Rambur, 1842

Micromus angulatus (Stephens, 1836) (N, S, Si, Sa)
Micromus lanosus (Zeleny, 1962) (N, S) (*)
Micromus paganus (Linné, 1767) (N, S, Si)
Micromus variegatus (Fabricius, 1793) (N, S, Si, Sa)

Note

Hemerobius lutescens: In S nota con certezza solo dell'Appennino Toscano e Marchigiano.

Wesmaelius mortoni: Presenza dubbia.

Symphorobius fallax: In N presente solo in Liguria.

Micromus lanosus: In S nota con certezza solo dell'Appennino Marchigiano.

Chrysopidae

Italochrysa Principi, 1946

Italochrysa italica (Rossi, 1790) (N, S, Si, Sa)

Brinckochrysa Tjeder, 1966

Brinckochrysa nachoi Monserrat, 1977 (S?, Sa) (*)

Chrysopa Leach, 1815

Chrysopa abbreviata Curtis, 1834 (N)

Chrysopa dorsalis Burmeister, 1839 (N, S, Si, Sa?)

Chrysopa formosa Brauer, 1850 (N, S, Si, Sa)

Chrysopa nigricostata Brauer, 1850 (N, S, Sa)

Chrysopa pallens (Rambur, 1838) (N, S, Si, Sa)

Chrysopa perla (Linné, 1758) sensu Schneider, 1851 (N, S, Si, Sa?)

Chrysopa phyllochroma Wesmael, 1841 (N)

Chrysopa viridana Schneider, 1845 (N, S, Si, Sa)

Chrysopa walkeri McLachlan, 1893 (N, S)

Chrysoperla Steinmann, 1964

Chrysoperla carnea (Stephens, 1836) (N, S, Si, Sa)

Chrysoperla lucasina (Lacroix, 1912) (N, S, Si, Sa)

Chrysoperla mediterranea (Hölzel, 1972) (N, Si, Sa)

Chrysopidia (Chrysotropia) Navás, 1911

Chrysopidia (Chrysotropia) ciliata (Wesmael, 1841) (N, S)

Cunctochrysa Hölzel, 1970

Cunctochrysa albolineata (Killington, 1935) (N, S, Sa?)

Cunctochrysa baetica (Hölzel, 1972) (N, S, Sa)

Mallada Navás, 1925

Mallada clathratus (Schneider, 1845) (N, S, Si, Sa)

Mallada flavifrons (Brauer, 1850) (N, S, Si, Sa)

Mallada genei (Rambur, 1842) (N, S, Si, Sa) (*)

Mallada ibericus (Navás, 1903) (N, Sa) (*)
Mallada inornatus (Navás, 1901) (N?, S, Si, Sa)
Mallada marianus (Navás, 1905) (N, S?, Si?) (*)
Mallada sp. pr. picteti (McLachlan, 1880) (N, S, Si, Sa) (*)
Mallada prasinus (Burmeister, 1839) (N, S, Si, Sa)
Mallada ventralis (Curtis, 1834) (N, S)
Mallada venustus (Hölzel, 1974) (N, S, Si) (*)
Mallada zelleri (Schneider, 1851) (N, S, Si)

Nineta Navás, 1912

Nineta flava (Scopoli, 1763) (N, S, Si)
Nineta gadarramensis (Pictet, 1865)
Nineta gadarramensis principiae Monserrat, 1980 (N, S)
Nineta inpunctata (Reuter, 1894) (N, S)
Nineta pallida (Schneider, 1845) (N, S)
Nineta vittata (Wesmael, 1841) (N)

Peyrimhoffina Lacroix, 1920

Peyrimhoffina gracilis (Schneider, 1851) (N, S)

Rexa Navás, 1920

Rexa lordina Navás, 1920 (Sa)

Hypochrysa Hagen, 1866

Hypochrysa elegans (Burmeister, 1839) (N, S, Si)

Nothochrysa McLachlan, 1868

Nothochrysa fulviceps (Stephens, 1836) (N, S)
Nothochrysa capitata (Fabricius, 1793) (N, S)

Note

Brinckochrysa nachoi: In S (Lazio) nota una sola femmina (a determinazione specifica problematica).

Mallada genei: In N presente solo in Liguria.

Mallada ibericus: In N presente solo in Liguria.

Mallada marianus: Specie critica, discriminabile con difficoltà da *M. prasinus* su base esclusivamente morfologica.

Mallada sp. pr. picteti: Specie qui riportata, anche se ancora non ben definita tassonomicamente, perché già più volte segnalata in bibliografia.

Mallada venustus: In N presente solo in Liguria.

Myrmeleontidae

Palpares Rambur, 1842

Palpares libelluloides (Linné, 1764) (N, S, Si, Sa)

Dendroleon Brauer, 1866

Dendroleon pantherinus (Fabricius, 1787) (N, S, Si)

Acanthaclisis Rambur, 1842

Acanthaclisis baetica Rambur, 1842 (N, S, Si, Sa)

Acanthaclisis occitanica (Villers, 1789) (N, S, Si, Sa)

Myrmecaelurus (Myrmecaelurus) A. Costa, 1855

Myrmecaelurus (Myrmecaelurus) trigrammus (Pallas, 1781) (N, S, Si, Sa) (*)

Cueta Navás, 1911

Cueta lineosa (Rambur, 1842) (S) (*)

Myrmeleon (Myrmeleon) Linné, 1767

Myrmeleon (Myrmeleon) formicarius Linné, 1767 (N, S, Si, Sa?)

Myrmeleon (Myrmeleon) gerlindae Hölzel, 1974 (Sa)

Myrmeleon (Morter) Navás, 1915

Myrmeleon (Morter) bore (Tjeder, 1941) (N)

Myrmeleon (Morter) hyalinus Olivier, 1811

Myrmeleon (Morter) hyalinus distinguendus Rambur, 1842 (S, Si, Sa)

Myrmeleon (Morter) inconspicuus Rambur, 1842 (N, S, Si, Sa)

Euroleon Esben-Petersen, 1918

Euroleon nostras (Fourcroy, 1785) (N, S, Si)

Macronemurus A. Costa, 1855

Macronemurus appendiculatus (Latreille, 1807) (N, S, Si, Sa)

Neuroleon Navás, 1909

Neuroleon arenarius (Navás, 1904) (S, Si, Sa)

Neuroleon egenus (Navás, 1915) (S, Sa)

Neuroleon microstenus (McLachlan, 1898) (N, S, Si)
Neuroleon nemausienis (Borkhausen, 1791) (N, S, Si, Sa)
Neuroleon ocreatus (Navás, 1904) (N, S)

Distoleon Banks, 1910

Distoleon annulatus (Klug, 1834) (Si) (*)
Distoleon tetragrammicus (Fabricius, 1798) (N, S, Si, Sa)

Nemoleon Navás, 1909

Nemoleon notatus (Rambur, 1842) (Sa)

Nicarinus Navás, 1914

Nicarinus poecilopterus (Stein, 1863) (S, Si)

Creoleon Tillyard, 1918

Creoleon aegyptiacus (Rambur, 1842) (Si) (*)
Creoleon corsicus (Hagen, 1860) (S, Sa) (*)
Creoleon griseus (Klug, 1834) (Si) (*)
Creoleon lugdunensis (Villers, 1789) (S, Si, Sa) (*)
Creoleon plumbeus (Olivier, 1811) (N, S) (*)

Megistopus Rambur, 1842

Megistopus flavicornis (Rossi, 1790) (N, S, Sa)
Megistopus mirabilis Hölzel, 1980 (S)

Gymnocnemia Schneider, 1845

Gymnocnemia variegata (Schneider, 1845) (N, S, Si, Sa)

Note

Myrmecaelurus (*Myrmecaelurus*) *trigrammus*: In N nota solo della Val di Susa (Piemonte).

Cueta lineosa: Finora nota in Italia solo di Calabria.

Distoleon annulatus: Nota solo di Vulcano (Isole Egadi), di Pantelleria e di Lampedusa (Isole Pelagie).

Creoleon aegyptiacus: Presente nelle Isole Pelagie (Lampedusa e Linosa) e, probabilmente con un taxon separato, in Sicilia.

Creoleon corsicus: Endemita sardo-corso presente in S solo nell'Arcipelago Toscano (Isole di Capraia e, dubitativamente, Pianosa e Giglio).

Creoleon griseus: Nota solo di Lampedusa (Isole Pelagie).

Creoleon lugdunensis: Presente lungo le coste tirreniche e ioniche della penisola. Vi sono dubbi sull'effettiva appartenenza a questo taxon degli esemplari sardi.

Creoleon plumbeus: Presente lungo le coste adriatiche e ioniche della penisola.

Ascalaphidae

Bubopsis McLachlan, 1898

Bubopsis agrionoides (Rambur, 1838) (Si) (*)

Deleproctophylla Lefebvre, 1842

Deleproctophylla australis (Fabricius, 1787) (S, Si, Sa)

Libelloides Tjeder, 1972

Libelloides coccajus (Denis & Schiffermüller, 1775) (N, S, Si)

Libelloides ictericus (Charpentier, 1825) (*)

Libelloides ictericus corsicus (Rambur, 1842) (S, Sa)

Libelloides ictericus sculus (Angelini, 1827) (Si)

Libelloides italicus (Fabricius, 1781) (N, S, Si?) (E) (*)

Libelloides longicornis (Linné, 1764) (N, S, Si?) (*)

Libelloides macaronius (Scopoli, 1763) (N) (*)

Libelloides ottomanus (Germar, 1817) (S)

Note

Bubopsis agrionoides: Presente solo a Lampedusa (Isole Pelagie).

Libelloides ictericus: Le due sottospecie andrebbero forse considerate come buone specie. La ssp. *corsicus* è un endemita sardo-corso presente in S solo nell'Isola di Capraia (Arcipelago Toscano).

Libelloides italicus: In Si presenza dubbia, forse di esemplari erratici (specie con grandi capacità di volo).

Libelloides longicornis: In Si presenza dubbia, forse di esemplari erratici (specie con grandi capacità di volo).

Libelloides macaronius: Presente solo agli estremi confini orientali (Venezia Giulia).

Mecoptera

Bittacidae

Bittacus Latreille, 1805

Bittacus hageni Brauer, 1860 (N)

Bittacus italicus (O.F. Müller, 1766) (N)

Boreidae

Boreus Latreille, 1816

Boreus hyemalis (Linnaeus, 1767) (N)

Boreus westwoodi Hagen, 1866 (N)

Panorpidae

Panorpa Linnaeus, 1758

Panorpa alpina Rambur, 1842 (N, S) (*)

Panorpa annexa McLachlan, 1869 (N?, S, Si) (E) (*)

Panorpa cognata Rambur, 1842 (N, S, Si)

Panorpa communis Linnaeus, 1758

Panorpa communis communis Linnaeus, 1758 (N)

Panorpa communis diffinis McLachlan, 1869 (N, S)

Panorpa etrusca Willmann, 1976 (N, S)

Panorpa germanica Linnaeus, 1758 (N, S)

Note

Panorpa alpina: In S nota con certezza solo dell'Appennino Tosco-Emiliano.

Panorpa annexa: In N presenza segnalata da citazioni storiche dubbie.

Siphonaptera

Ceratophyllidae

Amalareus Ioff, 1936

Amalareus arvicolae (Ioff, 1948) (N)

Amalareus penicilliger (Grube, 1851)

Amalareus penicilliger kratochvili (Rosicky, 1955) (N)

Callopsylla (**Callopsylla**) Wagner, 1934

Callopsylla (*Callopsylla*) *saxatilis* (Ioff & Argyropulo, 1934) (N)

Callopsylla (**Orneacus**) Jordan, 1937

Callopsylla (*Orneacus*) *waterstoni* (Jordan, 1925) (N)

Ceratophyllus (**Ceratophyllus**) Curtis, 1832

Ceratophyllus (*Ceratophyllus*) *fringillae* (Walker, 1856) (N)

Ceratophyllus (Ceratophyllus) gallinae (Schrank, 1803) (N, S)
Ceratophyllus (Ceratophyllus) hirundinis (Curtis, 1826) (N, S)
Ceratophyllus (Ceratophyllus) rusticus Wagner, 1903 (N)

***Ceratophyllus (Emmareus)* Smit, 1983**

Ceratophyllus (Emmareus) borealis Rothschild, 1907 (N)
Ceratophyllus (Emmareus) columbae (Gervais, 1844) (N, S)

***Ceratophyllus (Monopsyllus)* Kolenati, 1857**

Ceratophyllus (Monopsyllus) sciurorum (Schrank, 1803)
Ceratophyllus (Monopsyllus) sciurorum sciurorum (Schrank, 1803) (N, S, Si, Sa)

***Dasypsyllus (Dasypsyllus)* Baker, 1905**

Dasypsyllus (Dasypsyllus) gallinulae (Dale, 1878)
Dasypsyllus (Dasypsyllus) gallinulae gallinulae (Dale, 1878) (N, S)

***Megabothris (Gebiella)* Smit, 1983**

Megabothris (Gebiella) turbidus (Rothschild, 1909) (N, S)

***Myoxopsylla (Myoxopsylla)* Wagner, 1927**

Myoxopsylla (Myoxopsylla) laverani (Rothschild, 1911)
Myoxopsylla (Myoxopsylla) laverani laverani (Rothschild, 1911) (N, Si, Sa)

***Nosopsyllus (Nosopsyllus)* Jordan, 1933**

Nosopsyllus (Nosopsyllus) barbarus (Jordan & Rothschild, 1912) (Si, Sa)
Nosopsyllus (Nosopsyllus) fasciatus (Bosc, 1800) (N, S, Si, Sa)
Nosopsyllus (Nosopsyllus) londiniensis (Rothschild, 1903)
Nosopsyllus (Nosopsyllus) londiniensis londiniensis (Rothschild, 1903) (N, Si)

***Paraceras* Wagner, 1914**

Paraceras melis (Walker, 1856) (N, S)

***Tarsopsylla* Wagner, 1927**

Tarsopsylla octodecimdentata (Kolenati, 1863)
Tarsopsylla octodecimdentata octodecimdentata (Kolenati, 1863) (N)

Hystrichopsyllidae

***Atyphloceras* Jordan & Rothschild, 1915**

Atyphloceras nuperus (Jordan, 1931) (N)

***Ctenophthalmus (Ctenophtalmus)* Kolenati, 1856**

Ctenophthalmus (Ctenophtalmus) agyrtes (Heller, 1896) (*)

Ctenophthalmus (Ctenophtalmus) agyrtes culter Beaucournu, Valle & Launay, 1981

(S)

Ctenophthalmus (Ctenophtalmus) agyrtes impavidus Jordan, 1928 (N, S)

Ctenophthalmus (Ctenophtalmus) agyrtes ohridanus Wagner, 1939 (S)

Ctenophthalmus (Ctenophtalmus) agyrtes rugosus Peus, 1959 (Si)

Ctenophthalmus (Ctenophtalmus) agyrtes sapaudianus Beaucournu, 1964 (N)

Ctenophthalmus (Ctenophtalmus) agyrtes sardiniensis Ioff, 1927 (N, S, Sa)

Ctenophthalmus (Ctenophtalmus) agyrtes verbanus Jordan & Rothschild, 1920 (N, S)

Ctenophthalmus (Ctenophtalmus) agyrtes wagnerianus Peus, 1950 (N)

Ctenophthalmus (Ctenophtalmus) bisoctodentatus Kolenati, 1863 (*)

Ctenophthalmus (Ctenophtalmus) bisoctodentatus bisoctodentatus Kolenati, 1863

(N, S?)

Ctenophthalmus (Ctenophtalmus) bisoctodentatus certus Beaucournu, Valle &

Launay, 1978 (N)

Ctenophthalmus (Ctenophtalmus) egregius Peus, 1964

Ctenophthalmus (Ctenophtalmus) egregius celatus Beaucournu, Valle & Launay,

1981 (S)

Ctenophthalmus (Ctenophtalmus) egregius egregius Peus, 1964 (N, S)

Ctenophthalmus (Ctenophtalmus) egregius garganus Beaucournu & Grulich, 1976

(S)

Ctenophthalmus (Ctenophtalmus) niethammeri Beaucournu, Valle & Launay, 1981

Ctenophthalmus (Ctenophtalmus) niethammeri aspromontis Beaucournu, Valle &

Launay, 1981 (S)

Ctenophthalmus (Ctenophtalmus) niethammeri niethammeri Beaucournu, Valle &

Launay, 1981 (S)

Ctenophthalmus (Ctenophtalmus) solutus Jordan & Rothschild, 1920 (*)

Ctenophthalmus (Ctenophtalmus) solutus nasutus Beaucournu, Valle & Launay,

1988 (S)

Ctenophthalmus (Ctenophtalmus) solutus siculus Peus, 1959 (Si)

Ctenophthalmus (Ctenophtalmus) solutus solutus Jordan & Rothschild, 1920 (N, S,

Sa?)

***Ctenophthalmus (Euctenophthalmus)* Wagner, 1940**

Ctenophthalmus (Euctenophthalmus) assimilis (Taschenberg, 1880) (N, S?) (*)

Ctenophthalmus (Euctenophthalmus) congener (Rothschild, 1907)

Ctenophthalmus (Euctenophthalmus) congener congener (Rothschild, 1907) (N, S)

Ctenophthalmus (Euctenophthalmus) congener grulichii Beaucournu, 1964 (N)

Ctenophthalmus (Euctenophthalmus) savii Jordan & Rothschild, 1920

Ctenophthalmus (Euctenophthalmus) savii calabricus Beaucournu, Valle, Launay,

1981 (S)

Ctenophthalmus (Euctenophthalmus) savii matilei Beaucournu & Grulich, 1976 (S)

Ctenophthalmus (Euctenophthalmus) savii savii Jordan & Rothschild, 1921 (S)
Ctenophthalmus (Euctenophthalmus) secundus Peus, 1977
Ctenophthalmus (Euctenophthalmus) secundus geminus Peus, 1959 (Si)

Ctenophthalmus (Medioctenophthalmus) Hopkins & Rothschild, 1966

Ctenophthalmus (Medioctenophthalmus) nivalis Rothschild, 1909
Ctenophthalmus (Medioctenophthalmus) nivalis helvetius Smit, 1963 (N)
Ctenophthalmus (Medioctenophthalmus) nivalis nivalis Rothschild, 1909 (N)
Ctenophthalmus (Medioctenophthalmus) orphilus Jordan & Rothschild, 1923
Ctenophthalmus (Medioctenophthalmus) orphilus dolomiticus (Jordan, 1928) (N)
Ctenophthalmus (Medioctenophthalmus) orphilus orphilus Jordan & Rothschild, 1923
(N, S)
Ctenophthalmus (Medioctenophthalmus) russulae Jordan & Rothschild, 1912 (Sa)
Ctenophthalmus (Medioctenophthalmus) ubayensis Lumaret & Lumaret, 1969
Ctenophthalmus (Medioctenophthalmus) ubayensis ubayensis Lumaret & Lumaret, 1969 (N)

Doratopsylla Jordan & Rothschild, 1912

Doratopsylla dasyncnema (Rothschild, 1897)
Doratopsylla dasyncnema cuspis Rothschild, 1915 (N, S)

Hystrihopsylla (Hystrihopsylla) Taschenberg, 1880

Hystrihopsylla (Hystrihopsylla) orientalis Smit, 1956
Hystrihopsylla (Hystrihopsylla) orientalis orientalis Smit, 1956 (N)
Hystrihopsylla (Hystrihopsylla) talpae (Curtis, 1826)
Hystrihopsylla (Hystrihopsylla) talpae alpina Beaucournu & Launay, 1979 (N)
Hystrihopsylla (Hystrihopsylla) talpae istricea Beaucournu, Launay & Mahnert, 1982
(N)
Hystrihopsylla (Hystrihopsylla) talpae talpae (Curtis, 1826) (N, Si)
Hystrihopsylla (Hystrihopsylla) talpae transalpina Beaucournu & Launay, 1982 (S)

Palaeopsylla Wagner, 1903

Palaeopsylla cisalpina Jordan & Rothschild, 1920 (N)
Palaeopsylla hamata Peus, 1964 (S)
Palaeopsylla kohauti Dampf, 1910 (N)
Palaeopsylla minor (Dale, 1878) (N)
Palaeopsylla soricis (Dale, 1878) (*)
Palaeopsylla soricis rosickyi Smit, 1960 (N, S)
Palaeopsylla soricis soricis (Dale, 1878) (N, S?)
Palaeopsylla vallei Beaucournu, 1978 (S)

Rhadinopsylla (Actenophthalmus) Fox, 1925

Rhadinopsylla (Actenophthalmus) integella Jordan & Rothschild, 1921

Rhadinopsylla (Actenophtalmus) integella integella Jordan e Rothschild, 1921 (N)
Rhadinopsylla (Actenophtalmus) isacantha (Rothschild, 1907) (N, S)
Rhadinopsylla (Actenophtalmus) mesa Jordan & Rothschild, 1920 (N)
Rhadinopsylla (Actenophtalmus) pentacantha (Rothschild, 1897) (N, S, Si)

***Stenoponia* Jordan & Rothschild, 1911**

Stenoponia tripectinata (Tiraboschi, 1902)
Stenoponia tripectinata tripectinata (Tiraboschi, 1902) (S, Si, Sa)

***Typhloceras* Wagner, 1903**

Typhloceras favosus Jordan & Rothschild, 1914
Typhloceras favosus asunicus Jordan, 1938 (Sa)
Typhloceras poppei Wagner, 1903 (N, S, Si)

Note

Ctenophthalmus (Ctenophtalmus) agyrtes: Esistono dubbi sull'effettiva presenza in Italia della ssp. *ohridanus* (cfr. Beaucornu & Launay 1990).

Ctenophthalmus (Ctenophtalmus) bisoctodentatus: Presenza dubbia per il S della specie nominale in quanto in tale area geografica sono state reperite femmine isolate, indeterminabili sottospecificamente su base morfologica.

Ctenophthalmus (Ctenophtalmus) solutus: Presenza dubbia della specie nominale in Sa in quanto in tale area geografica sono state reperite solo femmine indeterminabili sottospecificamente su base morfologica.

Ctenophthalmus (Euctenophthalmus) assimilis: Segnalazione dubbia per il S.

Palaeopsylla soricis: Presenza dubbia per il S della specie nominale in quanto in tale area geografica sono state reperite femmine isolate, indeterminabili sottospecificamente su base morfologica.

Ischnopsyllidae

***Araeopsylla* Jordan & Rothschild, 1921**

Araeopsylla gestroi (Rothschild, 1906) (N, S)

***Ischnopsyllus (Hexactenopsylla)* Oudemans, 1909**

Ischnopsyllus (Hexactenopsylla) hexactenus (Kolenati, 1856) (N, S)

***Ischnopsyllus (Ischnopsyllus)* Westwood, 1833**

Ischnopsyllus (Ischnopsyllus) elongatus (Curtis, 1832) (S)
Ischnopsyllus (Ischnopsyllus) intermedius (Rothschild, 1898) (N, S, Si, Sa)
Ischnopsyllus (Ischnopsyllus) octactenus (Kolenati, 1856) (N, S, Si, Sa)
Ischnopsyllus (Ischnopsyllus) variabilis (Wagner, 1898) (S)

Nycteridopsylla Oudemans, 1906

Nycteridopsylla ancyluris Jordan, 1942 (S)
Nycteridopsylla eusarca Dampf, 1908 (N, S)
Nycteridopsylla longiceps Rothschild, 1908 (N, S)
Nycteridopsylla pentactena (Kolenati, 1856) (S)

Rhinolophopsylla Oudemans, 1909

Rhinolophopsylla unipectinata (Taschenberg, 1880)
Rhinolophopsylla unipectinata unipectinata (Taschenberg, 1880) (N, S, Si, Sa)

Leptopsyllidae

Amphipsylla Wagner, 1909

Amphipsylla sibirica (Wagner, 1898)
Amphipsylla sibirica sepifera Jordan & Rothschild, 1920 (N)

Frontopsylla (Orfrontia) Joff, 1946

Frontopsylla (Orfrontia) laeta (Jordan & Rothschild, 1920) (N)

Leptopsylla (Leptopsylla) Jordan & Rothschild, 1911

Leptopsylla (Leptopsylla) segnis (Schoenherr, 1911) (N, S, Si, Sa)
Leptopsylla (Leptopsylla) taschenbergi (Wagner, 1898)
Leptopsylla (Leptopsylla) taschenbergi calamana Jordan, 1951 (N, S, Si)

Peromyscopsylla I. Fox, 1939

Peromyscopsylla bidentata (Kolenati, 1883) (*)
Peromyscopsylla bidentata bidentata (Kolenati, 1883) (N, S?)
Peromyscopsylla fallax (Rothschild, 1909) (N)
Peromyscopsylla spectabilis (Rothschild, 1898) (N) (*)

Note

Peromyscopsylla bidentata: Segnalazione dubbia per il S in quanto è stata reperita finora una sola femmina a Pistoia (Peus, 1964) indeterminabile sottospecificamente.
Peromyscopsylla spectabilis: Segnalazione dubbia secondo Beaucournu & Launay (1990). Nella collezione dell'Istituto di Parassitologia dell'Università di Roma è presente una femmina catturata su *Clethrionomys glareolus* del Parco Nazionale del Gran Paradiso, identificata come *P. spectabilis*, ma con due setole sul lobo anale.

Pulicidae

Archaeopsylla Dampf, 1908

Archaeopsylla erinacei (Bouché, 1835)

Archaeopsylla erinacei erinacei (Bouché, 1835) (N, S, Si, Sa)

Ctenocephalides Stiles & Collins, 1930

Ctenocephalides canis (Curtis, 1826) (N, S, Si, Sa)

Ctenocephalides felis (Bouché, 1835)

Ctenocephalides felis felis (Bouché, 1835) (N, S, Si, Sa)

Echidnophaga Olliff, 1886

Echidnophaga murina (Tiraboschi, 1903) (N, S, Si, Sa)

Euhoplopsyllus Ewing, 1940

Euhoplopsyllus glacialis (Taschenberg, 1880) (*)

Euhoplopsyllus glacialis affinis (Baker, 1904) (N)

Pulex Linnaeus, 1758

Pulex irritans Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)

Spilopsyllus Baker, 1905

Spilopsyllus cuniculi (Dale, 1878) (N, Sa)

Xenopsylla Glinkiewicz, 1907

Xenopsylla cheopis (Rothschild, 1903) (N, S, Si)

Xenopsylla gratiosa Jordan & Rothschild, 1923 (S)

Note

Euhoplopsyllus glacialis: Introdotta in Italia nel secolo XX; patria: America Settentrionale.

Vermipsyllidae

***Chaetopsylla* (*Arctopsylla*)** Wagner, 1930

Chaetopsylla (*Arctopsylla*) *tuberculaticeps* (Bezzi, 1890)

Chaetopsylla (*Arctopsylla*) *tuberculaticeps tuberculaticeps* (Bezzi, 1890) (N)

***Chaetopsylla (Chaetopsylla)* Kohaut, 1903**

Chaetopsylla (Chaetopsylla) globiceps (Taschenberg, 1880) (N)

Chaetopsylla (Chaetopsylla) homoea Rothschild, 1906

Chaetopsylla (Chaetopsylla) homoea homoea Rothschild, 1906 (N)

Chaetopsylla (Chaetopsylla) rothschildi Kohaut, 1903 (N)

Chaetopsylla (Chaetopsylla) trichosa Kohaut, 1903 (N, S)

Strepsiptera

Mengenillidae

***Eoxenos* Peyerimhoff, 1919**

Eoxenos laboulbenei Peyerimhoff, 1919 (S, Si, Sa) (E)

***Mengenilla* Hofeneder, 1910**

Mengenilla chobautii Hofeneder, 1910 (S, Si, Sa) (E)

Mengenilla parvula Silvestri, 1940 (Si) (E)

Halictophagidae

***Halictophagus* Perkins, 1905**

Halictophagus tettigometrae Silvestri, 1934 (N)

Stylopidae

***Xenos* Rossi, 1793**

Xenos vesparum Rossi, 1793 (N, S, Si)

***Paraxenos* Saunders, 1872**

Paraxenos erberi Saunders, 1872 (N)

Paraxenos spheccidarum Dufour, 1872 (N, Si)

***Hylecthrus* Saunders, 1850**

Hylecthrus rubi Saunders, 1850 (N, S, Si)

***Halictoxenos* Pierce, 1908**

Halictoxenos spencii Nasonow, 1893 (S)
Halictoxenos tumulorum Perkins, 1918 (S)

Stylops Kirby, 1802

Stylops alfkeni Hofeneder, 1939 (S)
Stylops bimaculatae Perkins, 1918 (S)
Stylops borcherti Luna de Carvalho, 1974 (S)
Stylops dominquei Pierce, 1909 (S)
Stylops flavipedis Hofeneder, 1923 (S)
Stylops gwynanae Noskiewicz & Poluszynski, 1927 (S)
Stylops melitae Kirby, 1802 (N)
Stylops nassonowi Pierce, 1909 (S)
Stylops nitidiusculae Poluszynski, 1927 (S)
Stylops obsoletus Luna de Carvalho, 1974 (S)
Stylops thwaiti Saunders, 1872 (S)

Diptera

Limoniidae

Dactylolabis Osten Sacken, 1860

Dactylolabis denticulata (Bergroth, 1891) (N)
Dactylolabis sexmaculata (Macquart, 1826) (N)
Dactylolabis symplectoidea Egger, 1863 (N)
Dactylolabis transversa (Meigen, 1804) (N, S)

Austrolimnophila (Archilimnophila) Alexander, 1934

Austrolimnophila (Archilimnophila) unica (Osten Sacken, 1869) (N)

Austrolimnophila (Austrolimnophila) Alexander, 1920

Austrolimnophila (Austrolimnophila) latistyla Starý, 1977 (S, Si)
Austrolimnophila (Austrolimnophila) ochracea (Meigen, 1804) (N, S, Si)

Eloeophila Rondani, 1856

Eloeophila apicata (Loew, 1871) (N, Si)
Eloeophila maculata (Meigen, 1804) (N)
Eloeophila miliaria (Egger, 1863) (S)
Eloeophila mundata (Loew, 1871) (N)
Eloeophila submarmorata (Verrall, 1887) (N, S, Si)
Eloeophila trimaculata (Zetterstedt, 1838) (N)

Epiphragma Osten Sacken, 1860

Epiphragma ocellare (Linnaeus, 1761) (N, S)

Euphylidorea Alexander, 1972

Euphylidorea aperta (Verrall, 1887) (N, S)

Euphylidorea dispar (Meigen, 1818) (S)

Euphylidorea lineola (Meigen, 1804) (N, S, Si)

Euphylidorea meigenii (Verrall, 1887) (N)

Euphylidorea phaeostigma (Schummel, 1829) (N)

Eutonia Van der Wulp, 1874

Eutonia barbipes (Meigen, 1804) (N, S)

Hexatoma (Eriocera) Macquart, 1838

Hexatoma (Eriocera) chirothecata (Scopoli, 1763) (N)

Hexatoma (Hexatoma) Latreille, 1809

Hexatoma (Hexatoma) bicolor (Meigen, 1818) (N)

Hexatoma (Hexatoma) fuscipennis (Curtis, 1836) (N)

Hexatoma (Hexatoma) gaedii (Meigen, 1830) (N, S)

Idioptera Macquart, 1834

Idioptera linnei Oosterbroek, 1992 (Si)

Limnophila (Limnophila) Macquart, 1834

Limnophila (Limnophila) pictipennis (Meigen, 1818) (N, Si)

Limnophila (Limnophila) schranki Oosterbroek, 1992 (N, S, Si)

Neolimnomyia (Brachylimnophila) Alexander, 1966

Neolimnomyia (Brachylimnophila) adjuncta (Walker, 1848) (S, Si)

Neolimnomyia (Brachylimnophila) nemoralis (Meigen, 1818) (N, S, Si)

Neolimnomyia (Neolimnomyia) Séguy, 1937

Neolimnomyia (Neolimnomyia) batava (Edwards, 1938) (N)

Paradelphomyia (Oxyrhiza) De Meijere, 1946

Paradelphomyia (Oxyrhiza) senilis (Haliday, 1833) (N)

Phylidorea (Paraphylidorea) Savchenko, 1986

Phylidorea (Paraphylidorea) fulvonervosa (Schummel, 1829) (N, S)

Phylidorea (Phylidorea) Bigot, 1854

Phylidorea (Phylidorea) ferruginea (Meigen, 1818) (N, S, Si, Sa)

Phylidorea (Phylidorea) squalens (Zetterstedt, 1838) (N)

Pilaria Sintenis, 1889

Pilaria discicollis (Meigen, 1818) (N, S, Si)

Pilaria fuscipennis (Meigen, 1818) (N, S)

Prionolabis Osten Sacken, 1860

Prionolabis astans Starý, 1982 (N) (E)

Prionolabis hospes (Egger, 1863) (N, S)

Pseudolimnophila Alexander, 1919

Pseudolimnophila ebulata Starý, 1982 (Si) (E)

Pseudolimnophila lucorum (Meigen, 1818) (N, S)

Pseudolimnophila sepium (Verrall, 1886) (N, S, Si)

Arctoconopa Alexander, 1955

Arctoconopa melampodia (Loew, 1873) (N)

Baeoura Alexander, 1924

Baeoura directa (Kuntze, 1914) (Si)

Cheilotrichia (Cheilotrichia) Rossi, 1848

Cheilotrichia (Cheilotrichia) cinerea (Strobl, 1898) (N)

Cheilotrichia (Cheilotrichia) imbuta (Meigen, 1818) (N)

Cheilotrichia (Cheilotrichia) meridiana Mendl, 1974 (N, S, Si)

Cheilotrichia (Empeda) Osten Sacken, 1869

Cheilotrichia (Empeda) affinis (Lackschewitz, 1927) (N)

Cheilotrichia (Empeda) cinerascens (Meigen, 1804) (N, S)

Cheilotrichia (Empeda) mendli Starý, 1987 (Sa)

Cheilotrichia (Empeda) minima (Strobl, 1898) (Si)

Cheilotrichia (Empeda) staryi Mendl, 1973 (N)

Chionea (Chionea) Dalman, 1816

Chionea (Chionea) araneoides Dalman, 1816 (N)

***Chionea (Sphaeconophilus)* Becker, 1912**

Chionea (Sphaeconophilus) alpina Bezzi, 1908 (N)

Chionea (Sphaeconophilus) lutescens Lundström, 1907

Chionea (Sphaeconophilus) lutescens lutescens Lundström, 1907 (N)

Chionea (Sphaeconophilus) lutescens stelviana Süss, 1982 (N) (E)

***Crypteria* Bergroth, 1913**

Crypteria limnophiloides Bergroth, 1913 (Si)

***Ellipteroides (Ellipteroides)* Becker, 1907**

Ellipteroides (Ellipteroides) lateralis (Macquart, 1835) (N, Si)

***Ellipteroides (Protogonomyia)* Alexander, 1934**

Ellipteroides (Protogonomyia) alboscuteatus (Von Roser, 1840) (N)

Ellipteroides (Protogonomyia) limbatus (Von Roser, 1840) (N)

***Erioconopa* Stary, 1976**

Erioconopa diuturna (Walker, 1848) (S)

Erioconopa trivialis (Meigen, 1818) (N)

***Erioptera (Erioptera)* Meigen, 1803**

Erioptera (Erioptera) divisa (Walker, 1848) (N)

Erioptera (Erioptera) flavata (Westhoff, 1882) (N)

Erioptera (Erioptera) fuscipennis Meigen, 1818 (N, S, Si)

Erioptera (Erioptera) fusciculenta Edwards, 1938 (S, Si)

Erioptera (Erioptera) griseipennis Meigen, 1838 (N, S)

Erioptera (Erioptera) lutea Meigen, 1804 (N, S, Si)

Erioptera (Erioptera) meijerei Edwards, 1921 (N, S)

Erioptera (Erioptera) verralli Edwards, 1921 (N)

***Erioptera (Mesocyphona)* Osten Sacken, 1869**

Erioptera (Mesocyphona) bivittata (Loew, 1873) (N)

***Gonomyia (Gonomyia)* Meigen, 1818**

Gonomyia (Gonomyia) bifida Tonnoir, 1920 (N)

Gonomyia (Gonomyia) conoviensis Barnes, 1924 (N, S, Si)

Gonomyia (Gonomyia) dentata De Meijere, 1920 (N)

Gonomyia (Gonomyia) lucidula De Meijere, 1920 (N)
Gonomyia (Gonomyia) sricula Lackschewitz, 1940 (N, Si) (E)
Gonomyia (Gonomyia) simplex Tonnoir, 1920 (N)
Gonomyia (Gonomyia) tenella (Meigen, 1818) (N, S?)
Gonomyia (Gonomyia) theowaldi Starý, 1982 (Sa)

***Gonomyia (Teuchogonomyia)* Alexander, 1968**

Gonomyia (Teuchogonomyia) edwardsi Lackschewitz, 1925 (N)
Gonomyia (Teuchogonomyia) ithyphallus Lackschewitz, 1935 (N)

***Hoplolabis (Parilisia)* Savchenko, 1976**

Hoplolabis (Parilisia) mannheimsi (Mendl, 1974) (S)
Hoplolabis (Parilisia) punctigera (Lackschewitz, 1940) (N, S, Si)
Hoplolabis (Parilisia) sororcula (Lackschewitz, 1940) (N, Si)
Hoplolabis (Parilisia) spinula (Mendl, 1973) (N)
Hoplolabis (Parilisia) yezoana (Alexander, 1924) (N)

***Idiocera (Idiocera)* Dale, 1842**

Idiocera (Idiocera) alexanderiana (Lackschewitz, 1940) (N)
Idiocera (Idiocera) antilopina Starý, 1982 (Si) (E)
Idiocera (Idiocera) bradleyi (Edwards, 1939) (N)
Idiocera (Idiocera) lackschewitzi (Starý, 1977) (Si)
Idiocera (Idiocera) pulchripennis (Loew, 1856) (N?, Si)
Idiocera (Idiocera) punctata (Edwards, 1938) (N?)

***Ilisia* Rondani, 1856**

Ilisia maculata (Meigen, 1804) (N, Si)
Ilisiaoccoecata Edwards, 1936 (Si)

***Molophilus (Molophilus)* Curtis, 1833**

Molophilus (Molophilus) appendiculatus (Staeger, 1840) (N)
Molophilus (Molophilus) bifidus Goetghebuer, 1920 (N, S, Si)
Molophilus (Molophilus) clavistylus Mendl, 1979 (Si)
Molophilus (Molophilus) corniger De Meijere, 1920 (N)
Molophilus (Molophilus) curvatus Tonnoir, 1920 (N, S)
Molophilus (Molophilus) flavus Goetghebuer, 1920 (N)
Molophilus (Molophilus) fluvialis Bangerter, 1947 (N)
Molophilus (Molophilus) griseus (Meigen, 1804) (N, Si)
Molophilus (Molophilus) incurvus Mendl, 1979 (S) (E)
Molophilus (Molophilus) lackschewitzianus Alexander, 1953 (N, S)
Molophilus (Molophilus) medius De Meijere, 1918 (N)
Molophilus (Molophilus) monstrosus Mendl, 1974 (S) (E)
Molophilus (Molophilus) nodicornis Lackschewitz, 1935 (N, S)

Molophilus (Molophilus) obscurus (Meigen, 1818) (N, S, Si)
Molophilus (Molophilus) ochraceus (Meigen, 1818) (N)
Molophilus (Molophilus) oldenbergi Lackschewitz, 1935 (S) (E)
Molophilus (Molophilus) priapoides Starý, 1971 (N)
Molophilus (Molophilus) priapus Lackschewitz, 1935 (N)
Molophilus (Molophilus) propinquus (Egger, 1863) (N, S?)
Molophilus (Molophilus) pullus Lackschewitz, 1927 (S)
Molophilus (Molophilus) scutellatus Goetghebuer, 1929 (N)
Molophilus (Molophilus) serpentiger Edwards, 1938 (N, S)
Molophilus (Molophilus) vafer Lackschewitz, 1940 (Si)

***Neolimnophila* Alexander, 1920**

Neolimnophila bergrothi (Kuntze, 1919) (N)
Neolimnophila carteri (Tonnoir, 1921) (N)

***Ormosia (Oreophila)* Lackschewitz, 1935**

Ormosia (Oreophila) bergrothi (Strobl, 1895) (N)

***Ormosia (Ormosia)* Rondani, 1856**

Ormosia (Ormosia) aciculata Edwards, 1921 (N)
Ormosia (Ormosia) albitibia Edwards, 1921 (N)
Ormosia (Ormosia) baldensis Mendl, 1974 (N)
Ormosia (Ormosia) bifida (Lackschewitz, 1940) (N)
Ormosia (Ormosia) bihamata Lackschewitz, 1935 (N)
Ormosia (Ormosia) clavata (Tonnoir, 1920) (N)
Ormosia (Ormosia) depilata Edwards, 1938 (N)
Ormosia (Ormosia) egena (Bergroth, 1891) (N)
Ormosia (Ormosia) fascipennis (Zetterstedt, 1838) (N)
Ormosia (Ormosia) hartigi Mendl, 1973 (S)
Ormosia (Ormosia) hederæ (Curtis, 1835) (N)
Ormosia (Ormosia) lackschewitzi Bangerter, 1947 (N)
Ormosia (Ormosia) nodulosa (Macquart, 1826) (N)
Ormosia (Ormosia) staegeriana Alexander, 1953 (N)

***Phyllolabis* Osten Sacken, 1877**

Phyllolabis macroura (Siebke, 1863) (N)
Phyllolabis pubipennis Lackschewitz, 1940 (N)

***Rhabdomastix (Palaeogonomyia)* Meunier, 1899**

Rhabdomastix (Palaeogonomyia) hirticornis (Lackschewitz, 1940) (Si)

***Rhabdomastix (Sacandaga)* Alexander, 1911**

Rhabdomastix (Sacandaga) lurida (Loew, 1873) (N)
Rhabdomastix (Sacandaga) subparva Starý, 1971 (N)

Rhypholophus Kolenati, 1860

Rhypholophus bifurcatus Goetghebuer, 1920 (S)
Rhypholophus haemorrhoidalis (Zetterstedt, 1838) (N)
Rhypholophus lichtwardti (Lackschewitz, 1935) (N)
Rhypholophus phryganopterus Kolenati, 1860 (N)

Scleroprocta Edwards, 1938

Scleroprocta pentagonalis (Loew, 1873) (N, S)
Scleroprocta sororcula (Zetterstedt, 1851) (N)

Symplecta (Psiloconopa) Zetterstedt, 1838

Symplecta (Psiloconopa) stictica (Meigen, 1818) (N, S, Si)

Symplecta (Symplecta) Meigen, 1830

Symplecta (Symplecta) grata Loew, 1873 (Si)
Symplecta (Symplecta) hybrida (Meigen, 1804) (N, S, Si)

Symplecta (Trimicra) Osten Sacken, 1861

Symplecta (Trimicra) pilipes (Fabricius, 1787) (Si)

Tasiocera (Dasymolophilus) Goetghebuer, 1920

Tasiocera (Dasymolophilus) exigua Savchenko, 1973 (N)
Tasiocera (Dasymolophilus) fuscescens (Lackschewitz, 1940) (Si)
Tasiocera (Dasymolophilus) jenkinsi Freman, 1951 (N)
Tasiocera (Dasymolophilus) malickyiana Mendl, 1985 (Sa) (E)
Tasiocera (Dasymolophilus) minima Mendl, 1974 (S, Si) (E)
Tasiocera (Dasymolophilus) murina (Meigen, 1818) (N, S)

Achyrolimonia Alexander, 1965

Achyrolimonia decemmaculata (Loew, 1873) (N, Si)

Antocha (Antocha) Osten Sacken, 1860

Antocha (Antocha) vitripennis (Meigen, 1830) (N, Si)

Antocha (Orimargula) Mik, 1883

Antocha (Orimargula) alpigena (Mik, 1883) (N)

***Dicranomyia (Dicranomyia)* Stephens, 1829**

Dicranomyia (Dicranomyia) aperta Wahlgren, 1904 (N)
Dicranomyia (Dicranomyia) autumnalis (Staeger, 1840) (N)
Dicranomyia (Dicranomyia) chorea (Meigen, 1818) (N, S, Si)
Dicranomyia (Dicranomyia) conchifera (Strobl, 1901) (N, S)
Dicranomyia (Dicranomyia) didyma (Meigen, 1804) (N, S)
Dicranomyia (Dicranomyia) frontalis (Staeger, 1840) (N)
Dicranomyia (Dicranomyia) goritiensis (Mik, 1864) (N, S, Si)
Dicranomyia (Dicranomyia) incisurata Lackschewitz, 1928 (N)
Dicranomyia (Dicranomyia) livornica Lackschewitz, 1928 (N, S, Si)
Dicranomyia (Dicranomyia) longipennis (Schummel, 1829) (N)
Dicranomyia (Dicranomyia) lucida De Meijere, 1918 (S)
Dicranomyia (Dicranomyia) luteipennis Goetghebuer, 1920 (N)
Dicranomyia (Dicranomyia) microrychia Lackschewitz, 1941 (Si)
Dicranomyia (Dicranomyia) mitis (Meigen, 1830) (N, S)
Dicranomyia (Dicranomyia) modesta (Meigen, 1818) (N, S)
Dicranomyia (Dicranomyia) ornata (Meigen, 1818) (N, S)
Dicranomyia (Dicranomyia) signata Lackschewitz, 1941 (S?)
Dicranomyia (Dicranomyia) strobli Pagast, 1941 (N)
Dicranomyia (Dicranomyia) ventralis (Schummel, 1829) (N, Si)

***Dicranomyia (Glochina)* Meigen, 1830**

Dicranomyia (Glochina) bangerteri (Mendl, 1974) (N)
Dicranomyia (Glochina) hansiana Starý & Geiger, 1985 (N)
Dicranomyia (Glochina) kinensis (Alexander, 1934) (N)
Dicranomyia (Glochina) mediterranea Lackschewitz, 1942 (Sa)
Dicranomyia (Glochina) pauli Geiger, 1983 (N)
Dicranomyia (Glochina) schineri Lackschewitz, 1928 (N)
Dicranomyia (Glochina) sericata (Meigen, 1830) (N, S, Si, Sa)
Dicranomyia (Glochina) transsilvanica Lackschewitz, 1928 (N, S)
Dicranomyia (Glochina) tristis (Schummel, 1829) (N)

***Dicranomyia (Idiopyga)* Savchenko, 1987**

Dicranomyia (Idiopyga) stigmatica (Meigen, 1830) (N?)

***Dicranomyia (Melanolimonia)* Alexander, 1965**

Dicranomyia (Melanolimonia) caledonica Edwards, 1926 (N)
Dicranomyia (Melanolimonia) morio (Fabricius, 1787) (N, S, Si)
Dicranomyia (Melanolimonia) occidua Edwards, 1926 (N, S)
Dicranomyia (Melanolimonia) styliifera Lackschewitz, 1928 (N, S)

***Dicranomyia (Numantia)* Bigot, 1854**

Dicranomyia (Numantia) fusca (Meigen, 1804) (N, Si)

Dicranomyia (Sivalimnobia) Alexander, 1963

Dicranomyia (Sivalimnobia) aquosa Verrall, 1886 (N, S)

Dicranoptycha Osten Sacken, 1860

Dicranoptycha cinerascens (Meigen, 1818) (N?, S?)

Dicranoptycha fuscescens (Schummel, 1829) (N, S, Si, Sa)

Dicranoptycha livescens Loew, 1871 (N)

Dicranoptycha paralivescens Starý, 1972 (N)

Dicranoptycha pseudocinerea Starý, 1972 (N)

Discobola Osten Sacken, 1865

Discobola annulata (Linnaeus, 1758) (N)

Elliptera Schiner, 1863

Elliptera hungarica Madarassy, 1881 (N)

Elliptera omissa Schiner, 1863 (N)

Geranomyia Haliday, 1833

Geranomyia caloptera Mik, 1867 (N, Si)

Geranomyia inornata Lackschewitz, 1928 (N)

Helius Lepeletier & Serville, 1828

Helius calviensis Edwards, 1928 (S, Si)

Helius flavus (Walker, 1856) (N)

Helius longirostris (Meigen, 1818) (N)

Helius pallirostris Edwards, 1921 (Si)

Limonia Meigen, 1803

Limonia albifrons (Meigen, 1818) (N)

Limonia alpicola (Lackschewitz, 1928) (N)

Limonia flavipes (Fabricius, 1787) (N, S, Si)

Limonia hercegovinae (Strobl, 1898) (N, S)

Limonia macrostigma (Schummel, 1829) (N, S, Si)

Limonia maculipennis (Meigen, 1818) (N, S, Si)

Limonia nigropunctata (Schummel, 1829) (N, S)

Limonia nubeculosa Meigen, 1804 (N, S, Si, Sa)

Limonia pannonica (Kowarz, 1868) (N, S)

Limonia phragmitidis (Schränk, 1781) (N, S, Si, Sa)

Limonia stigma (Meigen, 1818) (N)

Limonia sylvicola (Schummel, 1829) (N)
Limonia taurica (Strobl, 1895) (N, S, Si)
Limonia trivittata (Schummel, 1829) (N, S)

Lipsothrix Loew, 1873

Lipsothrix errans (Walker, 1848) (N)
Lipsothrix remota (Walker, 1848) (N, S)

Metalimnobia Matsumura, 1911

Metalimnobia bifasciata (Schrank, 1781) (N)
Metalimnobia quadrimaculata (Linnaeus, 1761) (N)
Metalimnobia quadrinotata (Meigen, 1818) (N)
Metalimnobia zetterstedti (Tjeder, 1968) (N)

Neolimonia Alexander, 1964

Neolimonia dumetorum (Meigen, 1804) (N, S)

Orimarga Osten Sacken, 1869

Orimarga attenuata (Walker, 1848) (N, S)
Orimarga juvenilis (Zetterstedt, 1851) (N)
Orimarga virgo (Zetterstedt, 1851) (N, Si)

***Rhipidia* (*Rhipidia*)** Meigen, 1818

Rhipidia (*Rhipidia*) *ctenophora* Loew, 1871 (Si)
Rhipidia (*Rhipidia*) *maculata* Meigen, 1818 (N)

Thaumastoptera Mik, 1866

Thaumastoptera calceata Mik, 1866 (N, S)

Pediciidae

***Dicranota* (*Dicranota*)** Zetterstedt, 1838

Dicranota (*Dicranota*) *bimaculata* (Schummel, 1829) (N)

***Dicranota* (*Paradicranota*)** Alexander, 1934

Dicranota (*Paradicranota*) *brevicornis* Bergroth, 1891 (N, S)
Dicranota (*Paradicranota*) *brevitarsis* Bergroth, 1891 (N)
Dicranota (*Paradicranota*) *capillata* Lackschewitz, 1940 (N)
Dicranota (*Paradicranota*) *consimilis* Mendl, 1987 (Sa)

Dicranota (Paradicranota) flammata Starý, 1981 (N)
Dicranota (Paradicranota) fuscipennis Lackschewitz, 1940 (N)
Dicranota (Paradicranota) gracilipes Wahlgren, 1905 (N)
Dicranota (Paradicranota) lackschewitziana Mendl, 1988 (N)
Dicranota (Paradicranota) landrocki Czizek, 1931 (N)
Dicranota (Paradicranota) minuta Lackschewitz, 1940 (N)
Dicranota (Paradicranota) pallens Lackschewitz, 1940 (N)
Dicranota (Paradicranota) reitteri Mik, 1882 (N)
Dicranota (Paradicranota) rostrata Mendl, 1987 (N) (E)
Dicranota (Paradicranota) simulans Lackschewitz, 1940 (N, S)
Dicranota (Paradicranota) subtilis Loew, 1871 (N, S)

***Dicranota (Plectromyia)* Osten Sacken, 1869**

Dicranota (Plectromyia) acuminata Mendl, 1972 (N, S) (E)

***Dicranota (Rhaphidolabina)* Alexander, 1916**

Dicranota (Rhaphidolabina) claripennis (Verrall, 1888) (N)
Dicranota (Rhaphidolabina) lucidipennis (Edwards, 1921) (N, S)
Dicranota (Rhaphidolabina) meridiana Mendl, 1988 (S, Si) (E)
Dicranota (Rhaphidolabina) trifurcata (Edwards, 1928) (Sa?)

***Pedicia (Amalopsis)* Haliday, 1856**

Pedicia (Amalopsis) occulta (Meigen, 1830) (N, S, Si, Sa)

***Pedicia (Crunobia)* Kolenati, 1859**

Pedicia (Crunobia) littoralis (Meigen, 1804) (N, S)
Pedicia (Crunobia) riedeli (Lackschewitz, 1940) (N)
Pedicia (Crunobia) straminea (Meigen, 1838) (N)
Pedicia (Crunobia) tjederi Mendl, 1974 (N) (E)
Pedicia (Crunobia) zangheriana Nielsen, 1950 (N, S, Si)

***Pedicia (Pedicia)* Latreille, 1809**

Pedicia (Pedicia) rivosa (Linnaeus, 1758) (N)

***Tricyphona (Tricyphona)* Zetterstedt, 1837**

Tricyphona (Tricyphona) alticola Strobl, 1909 (N)
Tricyphona (Tricyphona) contraria Bergroth, 1888 (N?)
Tricyphona (Tricyphona) immaculata (Meigen, 1804) (N, S, Si)
Tricyphona (Tricyphona) livida Madarassy, 1881 (N)
Tricyphona (Tricyphona) schummeli Edwards, 1921 (N)
Tricyphona (Tricyphona) unicolor (Schummel, 1829) (N)
Tricyphona (Tricyphona) zwicki Mendl, 1973 (N)

Ula Haliday, 1833

Ula mollissima Haliday, 1833 (N, S)

Ula sylvatica (Meigen, 1818) (N)

Cylindrotomidae

Cylindrotoma Macquart, 1834

Cylindrotoma distinctissima (Meigen, 1818)

Cylindrotoma distinctissima distinctissima (Meigen, 1818) (N)

Cylindrotoma distinctissima alpestris Peus, 1952 (N) (E)

Tipulidae

Ctenophora (Cnemoncosis) Enderlein, 1921

Ctenophora (Cnemoncosis) ornata Meigen, 1818 (N)

Ctenophora (Ctenophora) Meigen, 1803

Ctenophora (Ctenophora) elegans Meigen, 1818 (N)

Ctenophora (Ctenophora) flaveolata (Fabricius, 1794) (N, S)

Ctenophora (Ctenophora) guttata Meigen, 1818 (N)

Ctenophora (Ctenophora) pectinicornis (Linnaeus, 1758) (N, S)

Dictenidia Brullé, 1833

Dictenidia bimaculata (Linnaeus, 1761) (*)

Dictenidia bimaculata bimaculata (Linnaeus, 1761) (N, S)

Dictenidia bimaculata fulvida (Bigot, 1861) (Si) (E)

Dolichopeza (Dolichopeza) Curtis, 1825

Dolichopeza (Dolichopeza) fuscipes Bergroth, 1889 (S, Si, Sa)

Dolichopeza (Dolichopeza) nitida Mik, 1874 (N)

Dolichopeza (Oropeza) Needham, 1908

Dolichopeza (Oropeza) modesta (Savchenko, 1980) (N) (*)

Nephrotoma Meigen, 1803

Nephrotoma aculeata (Loew, 1871) (N)

Nephrotoma analis (Schummel, 1833) (N)

Nephrotoma appendiculata (Pierre, 1919) (*)
 Nephrotoma appendiculata appendiculata (Pierre, 1919) (Sa)
 Nephrotoma appendiculata pertenua Oosterbroek, 1978 (N, S, Si)
Nephrotoma austriaca (Mannheims & Theowald, 1959) (N)
Nephrotoma cornicina (Linnaeus, 1758)
 Nephrotoma cornicina cornicina (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)
 Nephrotoma cornicina sardiniensis Oosterbroek, 1978 (Sa) (E)
Nephrotoma crocata (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)
Nephrotoma croceiventris (Strobl, 1909)
 Nephrotoma croceiventris lindneri (Mannheims, 1951) (N)
Nephrotoma dorsalis (Fabricius, 1782) (N)
Nephrotoma euchroma (Mik, 1874) (N, S, Si)
Nephrotoma flavescens (Linnaeus, 1758) (N)
Nephrotoma flavipalpis (Meigen, 1830) (N, S, Si, Sa)
Nephrotoma guestfalica (Westhoff, 1879)
 Nephrotoma guestfalica guestfalica (Westhoff, 1879) (N, S, Si)
 Nephrotoma guestfalica hartigiana Oosterbroek, 1982 (Sa) (E)
Nephrotoma lunulicornis (Schummel, 1833) (N, S) (*)
Nephrotoma pratensis (Linnaeus, 1758) (N, S)
Nephrotoma quadrifaria (Meigen, 1804) (N, S)
Nephrotoma quadristriata (Schummel, 1833) (N)
Nephrotoma saccai (Mannheims, 1951) (S, Si) (E)
Nephrotoma scalaris (Meigen, 1818) (N, S, Si)
Nephrotoma scurra (Meigen, 1818) (N)
Nephrotoma submaculosa Edwards, 1928 (N, S, Si, Sa)
Nephrotoma tenuipes (Riedel, 1910) (N)

Nigrotipula Hutson & Vane-Wright, 1969

Nigrotipula nigra (Linnaeus, 1758) (N)

Tanyptera (Tanyptera) Latreille, 1804

Tanyptera (Tanyptera) atrata (Linnaeus, 1758) (N, S)

Tipula (Acutipula) Alexander, 1924

Tipula (Acutipula) corsica Pierre, 1921 (Sa)
 Tipula (Acutipula) doriae Pierre, 1926 (S, Sa)
 Tipula (Acutipula) fulvipennis De Geer, 1776 (N, S, Si, Sa) (*)
 Tipula (Acutipula) luctuosa Mannheims, 1963 (S) (E)
 Tipula (Acutipula) luna Westhoff, 1879 (N, S)
 Tipula (Acutipula) maxima Poda, 1761 (N, S, Si)
 Tipula (Acutipula) vittata Meigen, 1804 (N, S)

Tipula (Beringotipula) Savchenko, 1961

Tipula (Beringotipula) unca Wiedemann, 1817 (N)

***Tipula (Dendrotipula)* Savchenko, 1964**

Tipula (Dendrotipula) flavolineata Meigen, 1804 (N, S)

***Tipula (Emodotipula)* Alexander, 1966**

Tipula (Emodotipula) obscuriventris Strobl, 1900 (S, Si)

Tipula (Emodotipula) saginata Bergroth, 1891 (N)

***Tipula (Lunatipula)* Edwards, 1931**

Tipula (Lunatipula) alpina Loew, 1873 (N, S, Si) (*)

Tipula (Lunatipula) bezzii Mannheims & Theowald, 1959 (N)

Tipula (Lunatipula) bimacula Theowald, 1980 (S, Si)

Tipula (Lunatipula) bispina Loew, 1873 (N)

Tipula (Lunatipula) buchholzi Mannheims & Theowald, 1959 (N, S) (E)

Tipula (Lunatipula) bullata Loew, 1873 (N)

Tipula (Lunatipula) capra Theischinger, 1980 (S) (E)

Tipula (Lunatipula) cerva Mannheims & Theowald, 1959 (N, S)

Tipula (Lunatipula) cervula Mannheims & Theowald, 1959 (S) (E)

Tipula (Lunatipula) charybdis Theischinger, 1979 (S, Si) (E)

Tipula (Lunatipula) cinerascens Loew, 1873 (N)

Tipula (Lunatipula) circumdata Siebke, 1863 (N)

Tipula (Lunatipula) cretis Mannheims, 1965 (S)

Tipula (Lunatipula) engeli Theowald, 1957 (S)

Tipula (Lunatipula) falcata Riedel, 1913 (N, S, Si)

Tipula (Lunatipula) fasciculata Mannheims, 1966 (N, S)

Tipula (Lunatipula) fascipennis Meigen, 1818 (N)

Tipula (Lunatipula) forcipula Mannheims, 1966 (N, S) (E)

Tipula (Lunatipula) gelensis Loi, 1971 (Si) (E)

Tipula (Lunatipula) griesheimae Mannheims & Theowald, 1959 (Si) (E)

Tipula (Lunatipula) handschini Mannheims, 1967 (S)

Tipula (Lunatipula) helvola Loew, 1873 (N)

Tipula (Lunatipula) heros Egger, 1863 (N)

Tipula (Lunatipula) iberica Mannheims, 1963 (S, Si)

Tipula (Lunatipula) laetabilis Zetterstedt, 1838 (N)

Tipula (Lunatipula) limitata Schummel, 1833 (N)

Tipula (Lunatipula) livida Van der Wulp, 1858

Tipula (Lunatipula) livida livida Van der Wulp, 1858 (N, S, Si)

Tipula (Lunatipula) livida sardolivida Mannheims & Theowald, 1968 (Sa)

Tipula (Lunatipula) luebenauorum Theischinger, 1977 (S) (E)

Tipula (Lunatipula) lunata Linnaeus, 1758 (N, S)

Tipula (Lunatipula) macciana Edwards, 1928 (Sa)

Tipula (Lunatipula) magnicauda Strobl, 1895 (N)

Tipula (Lunatipula) onusta Riedel, 1913 (N, S)

Tipula (Lunatipula) parapeliostigma Mannheims & Theowald, 1959 (Sa)

Tipula (Lunatipula) peliostigma Schummel, 1833 (S)

Tipula (Lunatipula) pelma Mannheims, 1965 (S) (E)
Tipula (Lunatipula) praecox Loew, 1873 (N, S)
Tipula (Lunatipula) rauschorum Theischinger, 1977 (S) (E)
Tipula (Lunatipula) sacerdotula Riedel, 1918 (Sa) (E)
Tipula (Lunatipula) skylla Theischinger, 1979 (Si) (E)
Tipula (Lunatipula) subhelvola Mannheims & Theowald, 1959 (S) (E)
Tipula (Lunatipula) subonusta Mannheims & Theowald, 1959 (Si) (E)
Tipula (Lunatipula) subtruncata Mannheims, 1954 (N, S)
Tipula (Lunatipula) tergestina Loew, 1873 (N) (*)
Tipula (Lunatipula) truncata Loew, 1873 (N)
Tipula (Lunatipula) vernalis Meigen, 1804 (N, S)
Tipula (Lunatipula) verrucosa Pierre, 1919 (N, S)
Tipula (Lunatipula) xyrophora Theischinger, 1977 (N)
Tipula (Lunatipula) zangherii Lackschewitz, 1932 (N, S) (E)

***Tipula (Mediotipula)* Pierre, 1924**

Tipula (Mediotipula) mikiana Bergroth, 1888 (N)
Tipula (Mediotipula) sarajevensis Strobl, 1898 (N)
Tipula (Mediotipula) siebkei Zetterstedt, 1852 (N, S, Si)
Tipula (Mediotipula) stigmatella Schummel, 1833 (N)

***Tipula (Platytipula)* Matsumura, 1916**

Tipula (Platytipula) luteipennis Meigen, 1830
Tipula (Platytipula) luteipennis agilis Dufour & Brunhes, 1984 (N, S, Sa)

***Tipula (Pterelachisus)* Rondani, 1842**

Tipula (Pterelachisus) berteii (Rondani, 1842) (N, S)
Tipula (Pterelachisus) bilobata Pokorny, 1887 (N)
Tipula (Pterelachisus) crassiventris Riedel, 1913 (N)
Tipula (Pterelachisus) dolomitensis Theowald, 1980 (N) (E)
Tipula (Pterelachisus) glacialis (Pokorny, 1887) (N)
Tipula (Pterelachisus) irregularis (Pokorny, 1887) (N)
Tipula (Pterelachisus) irrorata Macquart, 1826 (N)
Tipula (Pterelachisus) luridorostris Schummel, 1833 (N)
Tipula (Pterelachisus) mayerduerii Egger, 1863 (N)
Tipula (Pterelachisus) neurotica Mannheims, 1966 (N)
Tipula (Pterelachisus) osellai Theowald, 1980 (N) (E)
Tipula (Pterelachisus) pabulina Meigen, 1818 (N)
Tipula (Pterelachisus) padana Dufour, 1981 (N, S)
Tipula (Pterelachisus) pseudovariipennis Czizek, 1912 (N)
Tipula (Pterelachisus) spathifera Mannheims, 1953 (S) (E)
Tipula (Pterelachisus) submarmorata Schummel, 1833 (N, S)
Tipula (Pterelachisus) truncorum Meigen, 1830 (N)
Tipula (Pterelachisus) varipennis Meigen, 1818 (N)

***Tipula (Savtshenkia)* Alexander, 1965**

- Tipula (Savtshenkia) alpium* Bergroth, 1888 (N)
- Tipula (Savtshenkia) aspromontensis* Theowald, 1973 (S)
- Tipula (Savtshenkia) benesignata* Mannheims, 1954 (N)
- Tipula (Savtshenkia) breviantennata* Lackschewitz, 1933 (S, Sa)
- Tipula (Savtshenkia) cheethami* Edwards, 1924 (N, S)
- Tipula (Savtshenkia) cyrnosardensis* Theowald, Dufour & Oosterbroek, 1982 (Sa)
- Tipula (Savtshenkia) eugeni* Theowald, 1973 (S, Si)
- Tipula (Savtshenkia) gimmerthali* Lackschewitz, 1925 (N)
- Tipula (Savtshenkia) goriziensis* Strobl, 1893 (N)
- Tipula (Savtshenkia) griseescens* Zetterstedt, 1851 (N, S)
- Tipula (Savtshenkia) hartigiana* Theowald, Dufour & Oosterbroek, 1982 (Sa)
- Tipula (Savtshenkia) invenusta* Riedel, 1919
- Tipula (Savtshenkia) invenusta subinvenusta* Slipka, 1950 (N)
- Tipula (Savtshenkia) jeekeli* Mannheims & Theowald, 1959 (Si, Sa) (*)
- Tipula (Savtshenkia) limbata* Zetterstedt, 1838 (N)
- Tipula (Savtshenkia) mannheimsi* Theowald, 1973 (N) (E)
- Tipula (Savtshenkia) nielsenii* Mannheims & Theowald, 1959 (N)
- Tipula (Savtshenkia) obsoleta* Meigen, 1818 (N, S) (*)
- Tipula (Savtshenkia) omega* De Jong, 1994 (Sa) (E)
- Tipula (Savtshenkia) rufina* Meigen, 1818 (N, S, Sa)
- Tipula (Savtshenkia) sardosignata* Mannheims & Theowald, 1959 (Sa)
- Tipula (Savtshenkia) serrulifera* Alexander, 1942 (N, Si, Sa) (*)
- Tipula (Savtshenkia) subnodicornis* Zetterstedt, 1838 (N)
- Tipula (Savtshenkia) subsignata* Lackschewitz, 1933 (N)
- Tipula (Savtshenkia) trinacria* De Jong, 1994 (Si) (E)

***Tipula (Schummelia)* Edwards, 1931**

- Tipula (Schummelia) variicornis* Schummel, 1833 (N)
- Tipula (Schummelia) zernyi* Mannheims, 1952 (N)
- Tipula (Schummelia) zonaria* Goetghebuer, 1921 (N)

***Tipula (Tipula)* Linnaeus, 1758**

- Tipula (Tipula) italica* Lackschewitz, 1930 (*)
- Tipula (Tipula) italica italica* Lackschewitz, 1930 (N, S, Si)
- Tipula (Tipula) italica errans* Theowald, 1984 (Sa)
- Tipula (Tipula) mediterranea* Lackschewitz, 1930 (N?, S?, Si, Sa)
- Tipula (Tipula) oleracea* Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)
- Tipula (Tipula) orientalis* Lackschewitz, 1930 (N, S, Si)
- Tipula (Tipula) paludosa* Meigen, 1830 (N)
- Tipula (Tipula) plumbea* Fabricius, 1782 (N, S, Sa)
- Tipula (Tipula) subcunctans* Alexander, 1921 (N, S, Si, Sa) (*)

***Tipula (Vestiplex)* Bezzi, 1924**

Tipula (Vestiplex) cisalpina Riedel, 1913 (N)
Tipula (Vestiplex) crolina Dufour, 1992 (N) (*)
Tipula (Vestiplex) excisa Schummel, 1833 (N)
Tipula (Vestiplex) fragilicornis Riedel, 1913 (N, S) (E)
Tipula (Vestiplex) hemapterandra Bezzi, 1924 (N) (E)
Tipula (Vestiplex) hemiptera Mannheims, 1953
Tipula (Vestiplex) hemiptera strobliana Mannheims, 1966 (N)
Tipula (Vestiplex) hortorum Linnaeus, 1758 (N)
Tipula (Vestiplex) montana Curtis, 1834 (N)
Tipula (Vestiplex) nubeculosa Meigen, 1804 (N)
Tipula (Vestiplex) pallidicosta Pierre, 1924 (N, S, Sa)
Tipula (Vestiplex) riedeliana Mannheims, 1953 (N) (E)
Tipula (Vestiplex) saccai Mannheims, 1950 (N) (E)
Tipula (Vestiplex) scripta Meigen, 1830
Tipula (Vestiplex) scripta scripta Meigen, 1830 (N, S)
Tipula (Vestiplex) scripta hartigi Mannheims, 1950 (Si) (E)

***Tipula (Yamatotipula)* Matsumura, 1916**

Tipula (Yamatotipula) afriberia Theowald & Oosterbroek, 1980
Tipula (Yamatotipula) afriberia italia Theowald, Dufour & Oosterbroek, 1982 (N, S, Si, Sa)
Tipula (Yamatotipula) caesia Schummel, 1833 (N, S)
Tipula (Yamatotipula) lateralis Meigen, 1804 (N, S, Si)
Tipula (Yamatotipula) marginella Theowald, 1980 (N)
Tipula (Yamatotipula) montium Egger, 1863 (N)
Tipula (Yamatotipula) pruinosa Wiedemann, 1817 (N)

Note

Dictenidia bimaculata: Si tratta probabilmente di una variazione cromatica di *bimaculata*.
Dolichopeza (Oropeza) modesta: Questo è il primo reperto W-paleartico di *Oropeza*, un sottogenere E-paleartico, orientale e neartico. La specie *modesta*, che era nota solo per Primoriye, è stata raccolta nelle vicinanze di Padova nell'Agosto 1974 da A. Minelli. Il materiale è conservato nel Museo Zoologico di Amsterdam.
Nephrotoma appendiculata: La presenza in nord Italia, data da Oosterbroek & Theowald, 1992 (Cat. Pal. Diptera, 1: 56-178), potrebbe non essere confermata.
Nephrotoma lunulicornis: Conosciuta in S solo da Marano Equo, Lazio.
Tipula (Acutipula) fulvipennis: Nuova per la Sicilia (parecchie località).
Tipula (Emodotipula): Le specie europee del sottogenere *Emodotipula* are trattate da Dufour, 1991 (Mitt. schweiz. ent. Ges. 64: 81-91). La specie *obscuriventris* (=abruzzina Tjeder, nomen nudum) è nota dall'Abruzzo, dalla Calabria e dalla Sicilia, mentre *saginata* è ristretta al nord Italia (nota dalla Ferret) e Svizzera.
Tipula (Lunatipula) alpina: Nuova per la Sicilia (Cesarò).
Tipula (Lunatipula) tergestina: La specie *tergestina* fu reintegrata da Theischinger, 1987 (Beaufortia 37: 99-120).
Tipula (Savtshenkia): La filogenesi e la distribuzione delle specie del sottogenere *Savtshenkia* sono trattate da De Jong, 1994 (Tijdschr. Ent., 137: 271-323).

Tipula (Savtshenkia) jeekeli: Nuova per la Sicilia (parecchie località).
Tipula (Savtshenkia) obsoleta: In S nota da Cagnano Amiterno, Abruzzo.
Tipula (Savtshenkia) serrulifera: Nuova per la Sicilia (parecchie località).
Tipula (Tipula): La filogenesi e la distribuzione delle specie del sottogenere *Tipula* sono trattate da Theowald, 1984 (Tijdschr. Ent., 127: 33-78).
Tipula (Tipula) italica: Theowald & Oosterbroek, 1984, riportano anche parecchie località dall'Italia peninsulare ma la specie è nota con certezza solo da Sicilia e Sardegna.
Tipula (Tipula) subcunctans: In S nota da Abruzzo e Molise.
Tipula (Vestiplex) crolina: Descritta da Dufour, 1992 (Mitt. schweiz. ent. Ges., 57: 79-84, come *carolae*) su materiale alpino di alta quota proveniente da Svizzera, Austria, e Italia (Lombardia, Piz Umbrail).
Tipula (Yamatotipula): Le sottospecie di *lateralis* e *montium* sono state riviste da Oosterbroek, 1994 (Eur. J. Ent., 91: 429-435).

Blephariceridae

Apistomyia Bigot, 1862

Apistomyia elegans Bigot, 1862 (Sa) (M)

Hapalothrix Loew, 1876

Hapalothrix lugubris Loew, 1876 (N)

Blepharicera Macquart, 1843

Blepharicera fasciata (Westwood, 1842) (M)
Blepharicera fasciata fasciata (Westwood, 1842) (N, S)
Blepharicera fasciata gynops Zwick, 1970 (Sa) (E)

Dioplopsis Enderlein, 1937

Dioplopsis sardous Zwick, 1968 (Sa) (E, M)

Liponeura Loew, 1844

Liponeura bezzii Bischoff, 1925 (S, Si) (E)
Liponeura bischoffi Edwards, 1928 (Sa)
Liponeura cinerascens Loew, 1844 (*)
Liponeura cinerascens cinerascens Loew, 1844 (N, S)
Liponeura cinerascens minor Bischoff, 1922 (N)
Liponeura cordata Vimmer, 1916 (N, S)
Liponeura decipiens Bezzi, 1913 (N, S)
Liponeura discophora Zwick, 1980 (S, Si) (E, M) (*)
Liponeura itala Zwick, 1978 (S, Si) (E)
Liponeura limomi Zwick, 1980 (S, Si) (E, M) (*)
Liponeura paradecipiens Zwick, 1980 (S, Si) (E, M)

Note

Liponeura cinerascens: La ssp. cinerascens in N solo nelle Alpi Marittime e Liguri.

Liponeura discophora: Presente in S solo in Calabria a Sud della Sila.

Liponeura limomi: Presente in S solo in Calabria.

Pachyneuridae

Pachyneura Zetterstedt, 1838

Pachyneura fasciata Zetterstedt, 1838 (N?)

Hesperinidae

Hesperinus Walker, 1848

Hesperinus imbecillus (Loew, 1858) (N)

Pleciidae

Penthetria Meigen, 1803

Penthetria funebris Meigen, 1804 (N?, S?)

Bibionidae

Bibio Geoffroy, 1762

Bibio clavipes Meigen, 1818 (N)

Bibio femoralis Meigen, 1838 (N?, S?)

Bibio fulvipes (Zetterstedt, 1838) (N) (*)

Bibio fulviventrìs Meigen, 1818 (N?, S?)

Bibio hortulanus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Bibio johannis (Linnaeus, 1767) (Si)

Bibio lanigerus Meigen, 1818 (N)

Bibio leucopterus (Meigen, 1804) (N)

Bibio marci (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)

Bibio picinitarsis Brullé, 1832 (Si)

Bibio pomonae (Fabricius, 1775) (N)

Bibio siculus Loew, 1846 (S, Si)

Bibio varipes Meigen, 1830 (N)

Dilophus Meigen, 1803

Dilophus antipedalis Meigen, 1818 (Sa)
Dilophus bispinosus Lundstroem, 1913 (S)
Dilophus febrilis (Linnaeus, 1758) (N, Si, Sa)
Dilophus femoratus Meigen, 1804 (N, S, Sa)
Dilophus humeralis Zetterstedt, 1850 (N, Si)
Dilophus tenuis Meigen, 1818 (Si)

Note

Bibio fulvipes: Nota da incerta località italiana.

Bolitophilidae

***Bolitophila* (*Bolitophila*)** Meigen, 1818

Bolitophila (*Bolitophila*) *cinerea* Meigen, 1818 (N)
Bolitophila (*Bolitophila*) *saundersi* (Curtis, 1836) (N)
Bolitophila (*Bolitophila*) *spinigera* Edwards, 1925 (N)

***Bolitophila* (*Cliopisa*)** Enderlein, 1936

Bolitophila (*Cliopisa*) *dubia* Siebke, 1861 (N)
Bolitophila (*Cliopisa*) *glabrata* Loew, 1869 (N)
Bolitophila (*Cliopisa*) *maculipennis* Walker, 1836 (N)
Bolitophila (*Cliopisa*) *pseudohybrida* Landrock, 1912 (N)

Ditomyiidae

Ditomyia Winnertz, 1846

Ditomyia macroptera Winnertz, 1852 (N)

Symmerus Walker, 1848

Symmerus annulatus (Meigen, 1830) (N)

Keroplastidae

***Antlemon* (*Antlemon*)** Loew, 1871

Antlemon (*Antlemon*) *halidayi* (Loew, 1871) (S, Si)

Cerotelion Rondani, 1956

Cerotelion lineatus (Fabricius, 1775) (S)

Keroplatus Bosc, 1792

Keroplatus reaumuri Dufour, 1839 (N, S)

Keroplatus testaceus Dalman, 1818 (N?, S)

Keroplatus tipuloides Bosc, 1792 (N, S, Sa)

Macrorrhyncha Winnertz, 1846

Macrorrhyncha italica (A. Costa, 1857) (S)

Monocentrotia Edwards, 1925

Monocentrotia lundstroemi Edwards, 1925 (N?, S, Si?)

Neoplatyura Malloch, 1928

Neoplatyura flava (Macquart, 1826) (N)

Orfelia A. Costa, 1857

Orfelia basalis (Winnertz, 1863) (N)

Orfelia discoloria (Meigen, 1818) (N)

Orfelia minima (Giglio-Tos, 1890) (N)

Orfelia nemoralis (Meigen, 1818) (N)

Orfelia persimilis Caspers, 1991 (Sa)

Orfelia unicolor (Staeger, 1840) (N)

Urytalpa Edwards, 1929

Urytalpa ochraceae (Meigen, 1918) (N)

Diadocidiidae

***Diadocidia* (*Diadocidia*)** Ruthe, 1831

Diadocidia (*Diadocidia*) *ferruginosa* (Meigen, 1830) (N, S)

Macroceridae

Macrocera Meigen, 1803

Macrocera alpicola Winnertz, 1863 (N)

Macrocera angulata Meigen, 1818 (N)

Macrocera centralis Meigen, 1818 (N)

Macrocera fasciata Meigen, 1804 (N, S)
Macrocera inversa Loew, 1869 (N)
Macrocera lutea Meigen, 1804 (N) (*)
Macrocera maculata Meigen, 1818 (N)
Macrocera nana Macquart, 1826 (N)
Macrocera penicillata A. Costa, 1857 (S)
Macrocera phalerata Meigen, 1818 (N)
Macrocera stigma Curtis, 1833 (N, S)
Macrocera tusca Loew, 1869 (S)

Note

Macrocera: Il nome *Euphrosyne* Meigen, 1800 è stato soppresso dall'International Commission on Zoological Nomenclature nel 1963 (Opinion 678: 339).

Macrocera lutea: Nota da incerta località italiana.

Mycetobiidae

Mycetobia Meigen, 1818

Mycetobia pallipes Meigen, 1818 (N, S)

Mycetophilidae

Mycomya Rondani, 1856

Mycomya alpina Matile, 1972 (N)
Mycomya bicolor (Dziedzicki, 1885) (N)
Mycomya brunnea (Dziedzicki, 1885) (N)
Mycomya cinerascens (Macquart, 1826) (N)
Mycomya circumdata (Staeger, 1840) (N)
Mycomya fasciata (Zetterstedt, 1852) (N)
Mycomya fimbriata (Meigen, 1818) (N, S)
Mycomya fissa (Lundstrom, 1911) (N)
Mycomya flavicollis (Zetterstedt, 1852) (N)
Mycomya fornicata (Lundström, 1911) (N)
Mycomya fuscata (Winnertz, 1836) (N)
Mycomya hebrardi Väisänen & Matile, 1980 (N)
Mycomya hyalinata (Meigen, 1830) (N)
Mycomya marginata (Meigen, 1818) (N, S)
Mycomya neohyalinata Väisänen, 1984 (N)
Mycomya occultans (Winnertz, 1863) (N?, S)
Mycomya penicillata (Dziedzicki, 1885) (N, S)
Mycomya prominens (Lundstrom, 1913) (N)
Mycomya ruficollis (Zetterstedt, 1852) (N)
Mycomya shermani Garrett, 1924 (N, S)

Mycomya sigma Johannsen, 1910 (N)
Mycomya tenuis (Walker, 1856) (N, S)
Mycomya trilineata (Zetterstedt, 1838) (N?, S)
Mycomya tumida (Winnertz, N, 1863) (S)
Mycomya vittiventris (Zetterstedt, 1852) (N)
Mycomya winnertzi (Dziedzicki, 1885) (N)

Neoempheria Ostensacken, 1878

Neoempheria lineola (Meigen, 1818) (N?, S)
Neoempheria proxima (Winnertz, 1863) (N?, S)
Neoempheria striata (Meigen, 1818) (N, S)

Acnemias Winnertz, 1863

Acnemias amoena Winnertz, 1863 (N?, S)

Azana Walker, 1856

Azana anomala (Staeger, 1840) (N, S)

Leptomorphus (Leptomorphus) Curtis, 1831

Leptomorphus (Leptomorphus) walkeri Curtis, 1831 (N?, S)

Neuratelia Rondani, 1856

Neuratelia nemoralis (Meigen, 1818) (N)

Phthinia Winnertz, 1863

Phthinia humilis Winnertz, 1863 (N?, S)
Phthinia winnertzi Mik, 1869 (N, S)

Sciophila Meigen, 1818

Sciophila hirta Meigen, 1818 (N, S)
Sciophila interrupta (Winnertz, 1863) (N)
Sciophila lutea Macquart, 1826 (N, S)
Sciophila rufa Meigen, 1830 (N, S)

Syntemna Winnert, 1863

Syntemna morosa Winnertz, 1863 (N)

Boletina Staeger, 1840

Boletina basalis (Meigen, 1818) (N)

Boletina borealis Zetterstedt, 1852 (N)
Boletina dubia (Meigen, 1804) (N?, S)
Boletina sciarina Staeger, 1840 (N)
Boletina trivittata (Meigen, 1818) (N)
Boletina villosa Landrock, 1912 (N)

Coelosia Winnertz, 1863

Coelosia truncata Lundstrom, 1909 (N)

Gnoriste Meigen, 1818

Gnoriste bilineata Zetterstedt, 1852 (N)

Docosia Winnertz, 1863

Docosia gilvipes (Walker, 1856) (N)
Docosia sciarina (Meigen, 1830) (N)

Ectrepesthoneura Enderlein, 1911

Ectrepesthoneura referta Plassmann, 1976 (N)

Leia Meigen, 1818

Leia bilineata (Winnertz, 1863) (N)
Leia bimaculata (Meigen, 1804) (N, S)
Leia fascipennis Meigen, 1818 (N)
Leia immaculata (Giglio-Tos, 1891) (N)
Leia subfasciata (Meigen, 1818) (N)

Dynatosoma Winnertz, 1863

Dynatosoma fuscicorne (Meigen, 1818) (N, S)
Dynatosoma thoracicum (Zetterstedt, 1838) (N)

Epicypta Winnertz, 1863

Epicypta aterrima (Zetterstedt, 1852) (N?, S)

Mycetophila Meigen, 1803

Mycetophila alea Laffoon, 1965 (N?, S)
Mycetophila bialorussica Dziedzicki, 1884 (N)
Mycetophila binotata (Shinji, 1939) (N)
Mycetophila biusta Meigen, 1818 (N)
Mycetophila fungorum (De Geer, 1776) (N, S)
Mycetophila gratiosa Winnertz, 1863 (N)

Mycetophila luctuosa Meigen, 1830 (N)
Mycetophila lunata Meigen, 1804 (N, S)
Mycetophila marginata Winnertz, 1863 (N)
Mycetophila ocellus Walker, 1848 (N)
Mycetophila ornata Stephens, 1829 (N)
Mycetophila pictula Meigen, 1830 (N)
Mycetophila signata Meigen, 1830 (N, S)
Mycetophila spectabilis Winnertz, 1863 (N)
Mycetophila stolidus Walker, 1856 (N)
Mycetophila trinotata Staeger, 1840 (N?, S)
Mycetophila unipunctata Meigen, 1818 (N)
Mycetophila vittipes Zetterstedt, 1852 (N)

Phronia Winnertz, 1863

Phronia nitidiventris (van der Wulp, 1858) (N)
Phronia spinigera Hackman, 1970 (N)
Phronia tenuis Winnertz, 1863 (N, S)

Sceptonia Winnertz, 1863

Sceptonia nigra (Meigen, 1804) (N, S)

Trichonta Winnertz, 1863

Trichonta bifida Lundstrom, 1909 (N)
Trichonta conjungens Lundstrom, 1909 (N)
Trichonta girschneri Landrock, 1912 (N)
Trichonta hamata Mik, 1880 (N)
Trichonta obesa Winnertz, 1863 (N)
Trichonta terminalis (Walker, 1856) (N)
Trichonta vulcani (Dziedzicki, 1889) (N)

Zygomyia Winnertz, 1863

Zygomyia notata (Stannius, 1831) (S)
Zygomyia valida Winnertz, 1863 (N, S)

Allodia (Allodia) Winnertz, 1863

Allodia (Allodia) lugens (Wiedeman, 1817) (N, S)
Allodia (Allodia) ornatocollis (Meigen, 1818) (N)

Allodiopsis (Allodiopsis) Tuomikoski, 1966

Allodiopsis (Allodiopsis) rustica (Edwards, 1941) (N?, S)

Allodiopsis (Gymnogonia) Tuomikoski, 1966

Allodiopsis (Gymnogonia) praeformida (Dziedzicki, 1910) (N)

Cordyla Meigen, 1803

Cordyla crassicornis Meigen, 1818 (N, S)

Cordyla fusca (Meigen, 1804) (N)

Exechia Winnertz, 1863

Exechia confinis Winnertz, 1863 (N)

Exechia fusca (Meigen, 1804) (N)

Exechia seriata (Meigen, 1830) (N?, S)

Rymosia Winnertz, 1863

Rymosia affinis Winnertz, 1863 (N)

Rymosia cretensis Lundstrom, 1911 (N)

Rymosia fasciata (Meigen, 1804) (N)

Rymosia placida Winnertz, 1863 (N)

Rymosia signatipes (Van der Wulp, 1859) (N)

Rymosia spinipes Winnertz, 1863 (N)

Tarnania Tuomikoski, 1966

Tarnania dziedzickii (Edwards, 1941) (N?, S)

Tarnania fenestralis (Meigen, 1818) (N?, S)

Sciaridae

Sciara Meigen, 1803

Sciara analis Schiner, 1864 (S)

Sciara flavimana Zetterstedt, 1851 (N)

Sciara longipes Meigen, 1818 (S)

Sciara lugubris Winnertz, 1867 (N)

Sciara modesta (Winnertz, 1867) (N)

Sciara nemoralis Meigen, 1818 (N)

Sciara pallidiventrif Winnertz, 1867 (N)

Sciara pallipes Fabricius, 1787 (N, S)

Sciara pulicaria Meigen, 1818 (N, S)

Sciara quinquelineata (Macquart, 1834) (N, S)

Sciara thomae (Linnaeus, 1767) (N, S, Si)

Sciara vittata Meigen, 1830 (N)

Trichosia (Trichosia) Winnertz, 1867

Trichosia (Trichosia) trochanterata (Zetterstedt, 1851) (N)

***Trichosia (Leptosciarella)* Tuomikoski, 1960**

Trichosia (Leptosciarella) brevipalpa Mohrig & Menzel, 1992 (N)

Trichosia (Leptosciarella) coarctata (Winnertz, 1867) (N)

Trichosia (Leptosciarella) elegans (Winnertz, 1867) (N)

Trichosia (Leptosciarella) hirtipenniis (Zetterstedt, 1838) (N)

Trichosia (Leptosciarella) mediterranea Mohrig & Kauschke, 1994 (S)

Trichosia (Leptosciarella) subelegans Mohrig & Mamaev, 1985 (N)

Trichosia (Leptosciarella) subspinosula (Edwards, 1925) sensu Freeman, 1983 (N)

Trichosia (Leptosciarella) subvagula (Mohrig & Krivosheina, 1983) (N)

Trichosia (Leptosciarella) tomentosa Mohrig & Kauschke, 1994 (S)

***Schwenckfeldina* Frey, 1942**

Schwenckfeldina carbonaria (Meigen, 1830) (N)

***Plastosciara (Spathobdella)* Frey, 1948**

Plastosciara (Spathobdella) nobilis (Winnertz, 1867) (N)

***Plastosciara (Peyerimhoffia)* Kieffer, 1903**

Plastosciara (Peyerimhoffia) aptera (Kieffer, 1903) (Si)

Plastosciara (Peyerimhoffia) brachyptera (Kieffer, 1903) (N)

***Plastosciara* Berg, ? 1899**

Plastosciara saetistyla (Mohrig & Krivosheina, 1985) (N)

***Corynoptera* Winnertz, 1867**

Corynoptera apuliaensis Mohrig & Kauschke, 1994 (S)

Corynoptera bernardoensis Mohrig & Röschmann, 1993 (N)

Corynoptera blanda Tuomikoski, 1960 (S)

Corynoptera dubitata Tuomikoski, 1960 (S)

Corynoptera forcipata (Winnertz, 1867) (N)

Corynoptera francescae Mohrig & Kauschke, 1994 (S)

Corynoptera parvula (Winnertz, 1867) (N)

Corynoptera piniphila (Lengersdorf, 1940) (N)

Corynoptera postobscuripila Mohrig & Röschmann, 1993 (N)

Corynoptera proboletiphaga Mohrig & Röschmann, 1993 (N)

Corynoptera subdentata Mohrig, 1985 (N)

Corynoptera winnertzii Mohrig, 1993 (S)

***Lycoriella (Lycoriella)* Frey, 1942**

Lycoriella (Lycoriella) auripila (Winnertz, 1867) (S)
Lycoriella (Lycoriella) fucorum (Frey, 1948) (S)
Lycoriella (Lycoriella) lundstromi (Frey, 1948) (N)
Lycoriella (Lycoriella) mali Fitch, 1856 (S)

Lycoriella (Bradysiopsis) Tuomikoski, 1960

Lycoriella (Bradysiopsis) alpujarrensis (Strobl, 1900) (S)
Lycoriella (Bradysiopsis) bruckii (Winnertz, 1867) (S)
Lycoriella (Bradysiopsis) nigripes (Strobl, 1898) (N)

Lycoriella (Hemineurina) Frey, 1942

Lycoriella (Hemineurina) modesta (Staeger, 1840) (N)
Lycoriella (Hemineurina) venosa (Staeger, 1840) (N)

Epidapus (Epidapus) Haliday, 1851

Epidapus (Epidapus) atomaria (De Geer, 1778) (N)
Epidapus (Epidapus) gracilis (Winnertz, 1853) (N)
Epidapus (Epidapus) microthorax (Börner, 1903) (N, Si)
Epidapus (Epidapus) schillei (Börner, 1903) (N)

Epidapus (Vimmeria) Kratochvil, 1936

Epidapus (Vimmeria) gracilicornis (Lengersdorf, 1926) (N)

Epidapus Haliday, ? 1851

Epidapus bispinosulus Mohrig & Kauschke, 1994 (S)
Epidapus canicattii Mohrig & Kauschke, 1994 (S)

Lengersdorfia Kratochvil, 1936

Lengersdorfia acutehomerata Venturi, 1964 (Si)

Pnyxia Johannsen, 1912

Pnyxia scabiei (Hopkins, 1895) (N, S)

Allopnixia Freeman, 1952

Allopnixia patrizii Freeman, 1952 (S)

Phytosciara (Dolichosciara) Tuomikoski, 1960

Phytosciara (Dolichosciara) flavipes (Meigen, 1804) (N)

Phytosciara (Prosciara) Frey, 1942

Phytosciara (Prosciara) quadriangulata Mohrig & Krivosheina, 1985 (N)

Ctenosciara Tuomikoski, 1960

Ctenosciara hyalipennis (Meigen, 1804) (N)

Bradysia Winnertz, 1867

Bradysia amoena (Winnertz, 1867) (N, S)
Bradysia aprica (Winnertz, 1867) (S)
Bradysia barbarossae Mohrig & Mamaev, 1970 (N)
Bradysia brachyflagellata Mohrig & Kauschke, 1994 (S)
Bradysia brevispina Tuomikoski, 1960 (N)
Bradysia bulbiger Mohrig & Kauschke, 1994 (S)
Bradysia callicera Frey, 1948 (N)
Bradysia entraqueensis Mohrig & Röschmann, 1993 (N)
Bradysia fenestralis (Zetterstedt, 1838) (N)
Bradysia fimbricauda Tuomikoski, 1960 (N)
Bradysia forcipata (Fabricius, 1775) (N, Si, Sa)
Bradysia fungicola (Winnertz, 1867) (S)
Bradysia giraudi (Schiner, 1864) (N)
Bradysia grandicellaris Lengersdorf, 1926 (Si)
Bradysia hilariformis Tuomikoski, 1960 (N)
Bradysia hilaris (Winnertz, 1867) (N)
Bradysia inusitata Tuomikoski, 1960 (N)
Bradysia iridipennis (Zetterstedt, 1838) (N)
Bradysia lanicaudata Tuomikoski, 1960 (N)
Bradysia nervosa (Meigen, 1818) (N, Si)
Bradysia nitidicollis (Meigen, 1818) (N)
Bradysia nocturna Tuomikoski, 1960 (N)
Bradysia paupera Tuomikoski, 1960 (N)
Bradysia pauperata (Winnertz, 1867) (N)
Bradysia peraffinis Tuomikoski, 1960 (N)
Bradysia polonica (Lengersdorf, 1929) (N)
Bradysia praecox (Meigen, 1818) (N)
Bradysia pseudodalmatina Mohrig & Röschmann, 1993 (N)
Bradysia pseudopolonica Mohrig & Röschmann, 1994 (N)
Bradysia reflexa Tuomikoski, 1960 (N)
Bradysia rufescens (Zetterstedt, 1852) (N)
Bradysia ruginosa Mohrig, 1992 (S)
Bradysia siciliensis Lengersdorf, 1926 (Si)
Bradysia strenua Winnertz, 1867 (N)
Bradysia subscabricornis Mohrig & Menzel, 1990 (N)
Bradysia triseriata (Winnertz, 1867) (N)
Bradysia trivittata (Staeger, 1840) (N)
Bradysia urticae Mohrig & Menzel, 1992 (S)

Scatopsciara Edwards, 1927

Scatopsciara calamophila (Frey, 1948) (N)
Scatopsciara nana (Winnertz, 1871) (N)
Scatopsciara vitripennis (Meigen, 1818) (N)
Scatopsciara vivida (Winnertz, 1867) (N)

Dasysciara Kieffer, 1903

Dasysciara lagrecai Venturi, 1963 (Si)

Sciarobezzia Venturi, 1964

Sciarobezzia italica (Venturi, 1963) (Si)

Xylosciara (Xylosciara) Tuomikoski, 1957

Xylosciara (Xylosciara) betulae Tuomikoski, 1960 (N)

Cecidomyiidae

Acodiplosis Kieffer, 1895

Acodiplosis inulae (H. Loew, 1847) (N)

Adelgimyza Del Guercio, 1919

Adelgimyza dactylopii Del Guercio, 1919 (S)
Adelgimyza strobilobii Del Guercio, 1919 (S)
Adelgimyza tripidiperda Del Guercio, 1919 (S)

Allocontarinia Solinas, 1986

Allocontarinia sorghicola (Coquillett, 1899) (S)

Ampelocusta Stefani, 1912

Ampelocusta illata Stefani, 1912 (S)

Anabremia Kieffer, 1912

Anabremia bellevoeyi (Kieffer, 1896) (Si)
Anabremia inquilina Solinas, 1965 (N, S)
Anabremia massalongoi (Kieffer, 1909) (N)
Anabremia trotteri (Kieffer, 1909) (N)

Aphidoletes Kieffer, 1904

Aphidoletes aphidimyza (Rondani, 1847) (S)

Apiomyia Kieffer, 1912

Apiomyia bergenstammi (Wachtl, 1882) (N, S)

Aplonyx de Stefani Perez, 1908

Aplonyx chenopodii de Stefani Perez, 1908 (Si)

Arnoldiola Strand, 1926

Arnoldiola baldratii (Kieffer, 1909) (S)

Arnoldiola trotteri (Kieffer, 1909) (S)

Arnoldiola tympanifex (Kieffer, 1909) (S)

Arthrocnodax Rübsaamen, 1899

Arthrocnodax corylligallarum (Targioni-Tozzetti, 1886) (S, Si)

Arthrocnodax diaspidis Kieffer, 1910 (S)

Aschistonyx Rübsaamen, 1917

Aschistonyx carpinicolus Rübsaamen, 1917 (N)

Asphondylia H. Loew, 1850

Asphondylia baudysi Vimmer, 1937 (N)

Asphondylia borzi (Stefani, 1898) (S, Si)

Asphondylia calaminthae Kieffer, 1909 (N)

Asphondylia calycotomae Kieffer, 1912 (Si)

Asphondylia capparis Rübsaamen, 1893 (S)

Asphondylia celsiae Kieffer, 1909 (N)

Asphondylia conglomerata Stefani, 1900 (S, Si)

Asphondylia coronillae (Vallot, 1829) (N, S)

Asphondylia cytisi Frauenfeld, 1873 (N)

Asphondylia dorycnii (Müller, 1870) (N)

Asphondylia gennadii (Marchal, 1904) (S)

Asphondylia lupini Silvestri, 1908 (S)

Asphondylia massalongoi Rübsaamen, 1893 (N)

Asphondylia melanopus Kieffer, 1890 (N, S)

Asphondylia menthae Kieffer, 1901 (S, Si)

Asphondylia miki Wachtl, 1890 (N)

Asphondylia ononidis F. Löw, 1873 (N, S)

Asphondylia phlomidis Trotter, 1901 (S)

Asphondylia pruniperda Rondani, 1867 (N)

Asphondylia rosmarini Kieffer, 1896 (S, Si)
Asphondylia rutae Kieffer, 1909 (S)
Asphondylia ruebsaameni Kertész, 1898 (S)
Asphondylia sarothamni H. Loew, 1850 (N, S)
Asphondylia scrophulariae Schiner, 1856 (N, S)
Asphondylia serpylli Kieffer, 1898 (N)
Asphondylia stachydis Stelter, 1965 (N)
Asphondylia stefanii Kieffer, 1898 (Si)
Asphondylia verbasci (Vallot, 1827) (N, S, Sa)

Asynapta H. Loew, 1850

Asynapta furcifer Barnes, 1932 (Si)

Atrichosema Kieffer, 1904

Atrichosema aceris Kieffer, 1904 (N)

Baldratia Kieffer, 1897

Baldratia salicorniae Kieffer, 1897 (N, Si)

Bayeriola Gagné, 1991

Bayeriola salicariae (Kieffer, 1888) (N)
Bayeriola thymicola (Kieffer, 1888) (S)

Blastodiplosis Kieffer, 1912

Blastodiplosis cocciferae (Tavares, 1902) (S)

Blastomyia Kieffer, 1913

Blastomyia origani (Tavares, 1902) (N, S)

Brachineura Rondani, 1840

Brachineura fuscogrisea Rondani, 1840 (N)

Braueriella Kieffer, 1896

Braueriella phillyreae (F. Löw, 1877) (S, Si)

Bremiola Rübsaamen, 1915

Bremiola onobrychidis (Bremi, 1847) (N, S)

Campylomyza Meigen, 1818

Campylomyza fenestralis (Rondani, 1840) (N)
Campylomyza hedysari (Kieffer, 1913) (S)
Campylomyza silvalis (Rondani, 1840) (N)
Campylomyza turmalis (Rondani, 1840) (N)

Catocha Haliday, 1833

Catocha latipes Haliday, 1833 (N)

Cecidomyella Del Guercio, 1919

Cecidomyella aulacaspidis Del Guercio, 1919 (S)

Clinodiplosis Kieffer, 1894

Clinodiplosis botularia (Winnertz, 1853) (N)
Clinodiplosis cilicrus (Kieffer, 1889) (S)
Clinodiplosis cirsii Kieffer, 1909 (N)

Contarinia Rondani, 1860

Contarinia acerplicans (Kieffer, 1889) (N, S)
Contarinia aequalis Kieffer, 1898 (S)
Contarinia ballotae Kieffer, 1898 (S, Sa)
Contarinia carpini Kieffer, 1897 (N, S)
Contarinia citri Barnes, 1944 (Si)
Contarinia coryli (Kaltenbach, 1859) (N, S)
Contarinia cracca Kieffer, 1897 (N, S, Si)
Contarinia cucubali Kieffer, 1898 (N)
Contarinia galeobdolonis Kieffer, 1909 (N, S)
Contarinia helianthemis (Hardy, 1850) (N, S)
Contarinia ilicis Kieffer, 1898 (S)
Contarinia jacobaeae (H. Loew, 1850) (S)
Contarinia lonicerae Kieffer, 1909 (N)
Contarinia loti (De Geer, 1778) (N, S)
Contarinia luteola Tavares, 1902 (S)
Contarinia medicaginis Kieffer, 1895 (N, S)
Contarinia melanocera Kieffer, 1904 (S)
Contarinia minima (Kieffer, 1909) (Si)
Contarinia molluginis (Rübsaamen, 1889) (N)
Contarinia nasturtii (Kieffer, 1888) (N, S, Si)
Contarinia petioli (Kieffer, 1898) (N, S)
Contarinia picridis (Kieffer, 1912) (N)
Contarinia pyrivora (Riley, 1886) (N)
Contarinia quercicola (Rübsaamen, 1899) (N, S, Si)
Contarinia quercina (Rübsaamen, 1890) (S)
Contarinia sambuci (Kaltenbach, 1873) (N)

Contarinia schlechtendaliana (Rübsaamen, 1893) (N)
Contarinia solani (Rübsaamen, 1891) (N)
Contarinia sorbi Kieffer, 1896 (N)
Contarinia subulifex Kieffer, 1897 (N)
Contarinia tiliarum (Kieffer, 1890) (N)
Contarinia tritici (Kirby, 1798) (N)

Craneiobia Kieffer, 1913

Craneiobia corni (Giraud, 1863) (N, S)

Cystiphora Kieffer, 1892

Cystiphora leontodontis (Bremi, 1847) (N)
Cystiphora sanguinea (Bremi, 1847) (N, S)
Cystiphora sonchi (Bremi, 1847) (N)
Cystiphora taraxaci (Kieffer, 1888) (N)

Dasineura Rondani, 1880

Dasineura abietiperda (Henschel, 1880) (N)
Dasineura acrophila (Winnertz, 1853) (N)
Dasineura affinis (Kieffer, 1886) (N, S)
Dasineura albipennis (H. Loew, 1850) (N)
Dasineura andreuxi (Tavares, 1902) (S)
Dasineura asperulae (F. Löw, 1875) (S)
Dasineura axillaris (Kieffer, 1896) (N, S)
Dasineura brassicae (Winnertz, 1853) (N)
Dasineura campanularum (Kieffer, 1909) (N)
Dasineura capsulae (Kieffer, 1901) (S, Sa)
Dasineura cecconiana (Kieffer, 1909) (S)
Dasineura clavifex (Kieffer, 1891) (S)
Dasineura clematidiana (Kieffer, 1909) (N, S)
Dasineura crataegi (Winnertz, 1853) (N, S)
Dasineura daphnes (Kieffer, 1901) (N)
Dasineura ericaescopariae (Dufour, 1837) (S, Si)
Dasineura erigerontis (Rübsaamen, 1912) (N)
Dasineura excavans (Kieffer, 1909) (N)
Dasineura filicina (Kieffer, 1889) (S)
Dasineura fraxini (Bremi, 1847) (N, S)
Dasineura galeopsis (Kieffer, 1897) (N)
Dasineura gallicola (F. Löw, 1880) (N, S)
Dasineura glechomae (Kieffer, 1889) (N)
Dasineura gleditchiae (OstenSacken, 1866) (N)
Dasineura glycyphylli (Rübsaamen, 1912) (N)
Dasineura heterobia (H. Loew, 1850) (N)
Dasineura hygrophila (Mik, 1883) (N)
Dasineura hyperici (Bremi, 1847) (N, S)

Dasineura insignis (Kieffer, 1906) (S)
Dasineura irregularis (Bremi, 1847) (N, S)
Dasineura iteophila (Kieffer, 1890) (N)
Dasineura lathierei (Del Guercio, 1910) (S)
Dasineura lathyri (Kieffer, 1909) (N)
Dasineura lithospermi (H. Loew, 1850) (N, S)
Dasineura lotharingiae (Kieffer, 1888) (N)
Dasineura lupulinae (Kieffer, 1891) (N, S)
Dasineura luteofusca Rondani, 1840 (N)
Dasineura mali (Kieffer, 1904) (N, S)
Dasineura marginemtorquens (Bremi, 1847) (N, S)
Dasineura medicaginis (Bremi, 1847) (N, S, Si)
Dasineura minardii (Stefani, 1913) (Si)
Dasineura obscura Rondani, 1840 (N)
Dasineura odoratae Stelter, 1982 (S)
Dasineura oleae (F. Löw, 1885) (N, S, Si)
Dasineura phyteumatis (F. Löw, 1885) (N)
Dasineura pierrei (Kieffer, 1896) (S)
Dasineura plicatrix (H. Loew, 1850) (N)
Dasineura populeti (Rübsaamen, 1889) (N, S)
Dasineura pteridicola (Kieffer, 1901) (N)
Dasineura pustulans (Rübsaamen, 1889) (N)
Dasineura pyri (Bouché, 1847) (N)
Dasineura ranunculi (Bremi, 1847) (N, Si)
Dasineura rosaria (H. Loew, 1850) (N, S)
Dasineura rubella (Kieffer, 1896) (S)
Dasineura ruebsaameni (Kieffer, 1909) (N)
Dasineura rufescens (Stefani, 1898) (Si)
Dasineura saliciperda (Dufour, 1841) (S)
Dasineura salicis (Schrank, 1803) (N, S)
Dasineura salviae (Kieffer, 1909) (N)
Dasineura sampaina (Tavares, 1902) (S)
Dasineura serotina (Winnertz, 1853) (N, S)
Dasineura similis (F. Löw, 1888) (S)
Dasineura sisymbrii (Schrank, 1803) (N, S)
Dasineura strumosa (Bremi, 1847) (N)
Dasineura subpatula (Bremi, 1847) (N)
Dasineura terminalis (H. Loew, 1850) (N)
Dasineura teucarii (Tavares, 1903) (N)
Dasineura thomasiana (Kieffer, 1888) (N, S)
Dasineura tiliae (Schrank, 1803) (S)
Dasineura tortilis (Bremi, 1848) (N, S)
Dasineura tortrix (F. Löw, 1877) (N, S)
Dasineura trifolii (F. Löw, 1874) (N)
Dasineura turionum (Kieffer & Trotter, 1904) (S)
Dasineura ulmaria (Bremi, 1847) (N, S)
Dasineura urticae (Perris, 1840) (N, S)
Dasineura vagans (Kieffer, 1909) (N)

Dasineura vallisumbrosae (Kieffer, 1904) (S)
Dasineura viciae (Kieffer, 1888) (N, S, Si)
Dasineura vincae (Kieffer & Trotter, 1904) (S)
Dasineura virgaeaureae (Liebel, 1889) (S)
Dasineura xylostei (Kieffer, 1909) (S)

Dicrodiplosis Kieffer, 1895

Dicrodiplosis pseudococci (Felt, 1914) (Si)

Dictyomyia Tavares, 1919

Dictyomyia setubalensis (Tavares, 1902) (Sa)

Diplosis Loew, 1850

Diplosis fleothripetiperda (Del Guercio, 1931) (S)

Didymomyia (Rübsaamen, 1912)

Didymomyia tiliacea (Bremi, 1847) (N, S)

Diodaulus Rübsaamen, 1917

Diodaulus linariae (Winnertz, 1853) (N, S)

Diplosiola Solinas, 1965

Diplosiola bursaria Solinas, 1965 (N)

Drisina Giard, 1893

Drisina glutinosa Giard, 1893 (N, Si)

Dryomyia Kieffer, 1898

Dryomyia circinans (Giraud, 1861) (N, S, Si)
Dryomyia lichtensteini (F. Löw, 1878) (S, Si, Sa)

Geocrypta Kieffer, 1913

Geocrypta braueri (Handlirsch, 1884) (N)
Geocrypta gallii (H. Loew, 1850) (N, S, Si, Sa)
Geocrypta trachelii (Wachtl, 1885) (N)

Gephyraulus Rübsaamen, 1915

Gephyraulus diplotaxis (Solinas, 1982) (S)

Haplodiplosis Rübsaamen, 1910

Haplodiplosis marginata (von Roser, 1840) (S)

Harmandia Kieffer, 1896

Harmandia cavernosa (Rübsaamen, 1899) (N, S)

Harmandia globuli (Rübsaamen, 1889) (N, S)

Harmandia tremulae (Winnertz, 1853) (N, S)

Harrisomyia Skuhrová, 1986

Harrisomyia vitrina (Kieffer, 1909) (N, S, Si)

Hartigiola Rübsaamen, 1912

Hartigiola annulipes (Hartig, 1839) (N, S, Si)

Hybolasioptera Rübsaamen, 1915

Hybolasioptera cerealis (Lindemann, 1881) (S)

Inulomyia Stelter, 1965

Inulomyia subterranea (Frauenfeld, 1861) (N)

Iteomyia Kieffer, 1913

Iteomyia caprae (Winnertz, 1853) (N, S)

Jaapiella Rübsaamen, 1915

Jaapiella alpina (F. Löw, 1885) (N)

Jaapiella bryoniae (Bouché, 1847) (Si)

Jaapiella buhri Stelter, 1975 (N)

Jaapiella cucubali (Kieffer, 1909) (N, S)

Jaapiella floriperda (F. Löw, 1888) (N, S, Si)

Jaapiella genistamtorquens (Kieffer, 1888) (N, S)

Jaapiella genisticola (F. Löw, 1877) (N)

Jaapiella loticola (Rübsaamen, 1889) (N)

Jaapiella medicaginis (Rübsaamen, 1912) (N, S)

Jaapiella parvula (Liebel, 1889) (S)

Jaapiella vaccinatorum (Kieffer, 1913) (N, S)

Jaapiella veronicae (Vallot, 1827) (N, S)

Janetia Kieffer, 1896

Janetia cerris (Kollar, 1850) (N, S)
Janetia homocera (F. Löw, 1877) (N, S)
Janetia plicans (Kieffer, 1909) (S)
Janetia szepligetii Kieffer, 1896 (N, S)

Janetiella Kieffer, 1898

Janetiella euphorbiae Stefani, 1908 (S, Si)
Janetiella goiranica Kieffer & Trotter, 1905 (N)
Janetiella lemeei (Kieffer, 1904) (N, S)
Janetiella oenophila (Haimhoffen, 1875) (N, S)
Janetiella thymi (Kieffer, 1888) (N, S)

Kiefferia Mik, 1895

Kiefferia pericarpiicola (Bremi, 1847) (N, S, Si)

Lasioptera Meigen, 1818

Lasioptera berlesiana Paoli, 1907 (N, S)
Lasioptera carophila F. Löw, 1874 (N, S, Si, Sa)
Lasioptera eryngii (Vallot, 1829) (N, S, Si)
Lasioptera rubi (Schränk, 1803) (N, S)
Lasioptera umbelliferarum Kieffer, 1909 (Si)

Lestodiplosis Kieffer, 1894

Lestodiplosis asphodeli Barnes, 1934 (Sa)
Lestodiplosis conyzae Kieffer, 1909 (S)
Lestodiplosis massalongoi Rübsaamen, 1895 (N, S)
Lestodiplosis woeldickii (Contarini, 1840) (N)

Lestremia Macquart, 1826

Lestremia leucophaea (Meigen, 1818) (N)

Loewiola Kieffer, 1896

Loewiola centaureae (F. Löw, 1875) (N)
Loewiola serratulae Kieffer, 1905 (N)

Macrodiplosis Kieffer, 1895

Macrodiplosis dryobia (F. Löw, 1877) (N, S)
Macrodiplosis volvens (Kieffer, 1897) (N, S)

Macrolabis Kieffer, 1892

Macrolabis heraclei (Kaltenbach, 1862) (N, S)
Macrolabis hippocrepidis Kieffer, 1898 (Si)
Macrolabis marteli Kieffer, 1892 (S)
Macrolabis luceti Kieffer, 1809 (N, S)
Macrolabis podagrariae Stelter, 1962 (N)

Massalongia Kieffer, 1897

Massalongia rubra (Kieffer, 1890) (N)

Mayetiola Kieffer, 1896

Mayetiola avenae (Marchal, 1895) (S)
Mayetiola bromicola Roberti, 1953 (S)
Mayetiola destructor (Say, 1817) (N, S)
Mayetiola poae (Bosc, 1817) (N)

Micromya Rondani, 1840

Micromya lucorum Rondani, 1840 (N)

Mikomya Kieffer, 1912

Mikomya coryli (Kieffer, 1912) (N)

Mikiola Kieffer, 1896

Mikiola fagi (Hartig, 1839) (N, S)

Monarthropalpus Rübsaamen, 1892

Monarthropalpus flavus (Schrank, 1776) (N, S)

Monodiplosis Rübsaamen, 1910

Monodiplosis liebeli (Kieffer, 1889) (N, S)

Moreschiella Del Guercio, 1918

Moreschiella ilicicola Del Guercio, 1918 (S)
Moreschiella moricola Del Guercio, 1918 (S)
Moreschiella roburella Del Guercio, 1918 (S)

Mycodiplosis Rübsaamen, 1895

Mycodiplosis erisiphes (Rübsaamen, 1889) (S)

Myricomyia Kieffer, 1900

Myricomyia mediterranea (F. Löw, 1885) (N, S, Si, Sa)

Neomikiella Hedicke, 1938

Neomikiella beckiana (Mik, 1885) (N, S)

Neomikiella lychnidis (Heyden, 1861) (N, S)

Oligotrophus Latreille, 1805

Oligotrophus juniperinus (Linnaeus, 1788) (N, S)

Oligotrophus panteli (Kieffer, 1898) (N, S)

Orseolia Kieffer & Massalongo, 1902

Orseolia cynodontis Kieffer & Massalongo, 1902 (N)

Ozirhincus Rondani, 1840

Ozirhincus anthemidis (Rübsaamen, 1915) (S, Si)

Ozirhincus longicollis Rondani, 1840 (N, S, Si)

Ozirhincus millefolii (Wachtl, 1884) (N, S)

Ozirhincus tanacetii (Kieffer, 1889) (N, S)

Paradiplosis Felt, 1908

Paradiplosis abietis (Hubault, 1945) (S)

Parallelodiplosis Rübsaamen, 1910

Parallelodiplosis bupleuri Rübsaamen, 1895 (N)

Parallelodiplosis galliperda (F. Löw, 1898) (S)

Phegomyia Kieffer, 1913

Phegomyia fagicola (Kieffer, 1901) (N, S)

Physemocecis Rübsaamen, 1914

Physemocecis hartigi (Liebel, 1892) (S)

Physemocecis ulmi (Kieffer, 1909) (N)

Placochela Rübsaamen, 1916

Placochela nigripes (F. Löw, 1877) (S)

Planetella Westwood, 1840

Planetella gibbosa (Rondani, 1860) (N)
Planetella subterranea (Kieffer & Trotter, 1904) (S)
Planetella tumorifica (Rübsaamen, 1899) (N)

Porricondyla Rondani, 1840

Porricondyla nigripennis (Meigen, 1880) (N)

Probruggmanniella Möhn, 1961

Probruggmanniella phyllireae (Tavares, 1907) (N, S)

Procontarinia Kieffer & Cecconi, 1906

Procontarinia matteiana Kieffer & Cecconi, 1906

Psectrosema Kieffer, 1904

Psectrosema tamaricis (Stefani, 1902) (Si)

Pumilomyia Stefani, 1919

Pumilomyia protrahenda Stefani, 1919 (Si)

Putoniella Kieffer, 1896

Putoniella pruni (Kaltenbach, 1872) (N, S)

Resseliella Seitner, 1906

Resseliella oleisuga (Targioni-Tozzetti, 1886) (S, Si)

Rhopalomyia Rübsaamen, 1892

Rhopalomyia artemisiae (Bouché, 1834) (N, S)
Rhopalomyia baccarum (Wachtl, 1883) (N, S)
Rhopalomyia foliorum (Loew, 1850) (N)
Rhopalomyia hypogaea (F. Löw, 1885) (N)
Rhopalomyia kiefferi Trotter, 1900 (N, S)
Rhopalomyia millefolii (Loew, 1850) (N)
Rhopalomyia tubifex (Bouché, 1847) (N)

Rondaniolla Hedicke, 1938

Rondaniolla bursaria (Bremi, 1847) (N)

Sackenomyia Felt, 1908

Sackenomyia reaumurii (Bremi, 1847) (N)

Schizomyia Kieffer, 1889

Schizomyia galiorum Kieffer, 1889 (N, S)

Schizomyia tami Kieffer, 1901 (S)

Silvestrina Kieffer, 1912

Silvestrina asphodeli Barnes, 1934 (Sa)

Silvestrina chinagliana Del Guercio, 1918 (S)

Silvestrina farinicola (Barnes, 1929) (S)

Silvestrina silvestrii (Kieffer, 1910) (S)

Spurgia Gagné, 1990

Spurgia capitigena (Bremi, 1897) (N, S)

Spurgia esulae Gagné, 1990 (S)

Stefaniella Kieffer, 1898

Stefaniella atriplicis Kieffer, 1898 (Si, Sa)

Stefaniella brevipalpis Kieffer, 1898 (N)

Stefaniella cecconii Kieffer, 1909 (S)

Stefaniella trinacriae Stefani, 1990 (S, Si)

Stefaniola Kieffer, 1913

Stefaniola mediterranea Möhn, 1971 (N)

Taxomyia Rübsaamen, 1861

Taxomyia taxi (Inchbald, 1861) (N, S)

Thecodiplosis Kieffer, 1895

Thecodiplosis brachyntera (Schwägrichen, 1835) (N)

Therodiplosis Kieffer, 1912

Therodiplosis persicae Kieffer, 1912 (S)

Trilobia Del Guercio, 1919

Trilobia aphidisuga Del Guercio, 1919 (S)

Trilobiella Del Guercio, 1919

Trilobiella siphae Del Guercio, 1919 (S)

Trotteria Kieffer, 1901

Trotteria obtusa (Loew, 1845) (S)

Uncinulella Del Guercio, 1919

Uncinulella eriosomiperda Del Guercio, 1919 (S)

Wachtliella Rübsaamen, 1915

Wachtliella ericina (F. Löw, 1885) (N, S, Sa)

Wachtliella persicariae (Linnaeus, 1767) (N)

Wachtliella riparia (Winnertz, 1853) (N, S)

Wachtliella rosarum (Hardy, 1850) (N, S, Si)

Wachtliella stachydis (Bremi, 1847) (N)

Zeuxidiplosis Kieffer, 1904

Zeuxidiplosis giardi (Kieffer, 1896) (N, S, Si)

Zygiobia Kieffer, 1913

Zygiobia carpini (F. Löw, 1874) (N, S)

Psychodidae

Phlebotomus Rondani & Berté, 1840

Phlebotomus ariasi Tonnoir, 1921 (N)

Phlebotomus mascittii Grassi, 1908 (N, S)

Phlebotomus neglectus Tonnoir, 1921 (S, Si)

Phlebotomus papatasi (Scopoli, 1786) (N, S, Si, Sa)

Phlebotomus perfiliowi Parrot, 1930 (N, S, Si, Sa)

Phlebotomus perniciosus Newstead, 1911 (N, S, Si, Sa)

Phlebotomus sergenti Parrot, 1917 (Si)

Sergentomyia Franca & Parrot, 1920

Sergentomyia minuta (Rondani, 1843) (N, S, Si, Sa)

Sycorax Haliday in Curtis, 1839

Sycorax feuerborni Jung, 1954 (N)

Sycorax silacea Haliday in Curtis, 1839 (N, S)

Neoariseumus Botosaneanu & Vaillant, 1970

Neoariseumus sardous Wagner & Salamanna, 1984 (Sa) (E)

Mormia (Mormia) Enderlein, 1935

Mormia (Mormia) elongata Sarà, 1953 (S) (E)

Mormia (Mormia) ichnusae Salamanna, 1982 (Sa) (E)

Mormia (Mormia) nigripennis Krek, 1971 (N)

Mormia (Mormia) revisenda (Eaton, 1893) (N, S)

Mormia (Mormia) tenebricosa Vaillant, 1954 (N)

Mormia (Hemimormia) Krek, 1971

Mormia (Hemimormia) eatoni (Tonnoir, 1940) (N)

Mormia (Limomormia) Vaillant, 1982

Mormia (Limomormia) apicealba (Tonnoir, 1922) (N, S)

Mormia (Limomormia) sarai Wagner & Salamanna, 1983 (Si) (E)

Mormia (Palpomormia) Salamanna & Raggio, 1984

Mormia (Palpomormia) palposa (Tonnoir, 1919) (N)

Mormia (Palpomormia) bezzii Salamanna, 1983 (N) (E)

Paramormia Enderlein, 1937

Paramormia ustulata (Walker, 1856) (N, S, Sa)

Phyllotelmatoscopus Vaillant, 1982

Phyllotelmatoscopus acutus (Krek, 1971) (N)

Phyllotelmatoscopus decipiens (Eaton, 1893) (N)

Jungiella (Jungiella) Vaillant, 1972

Jungiella (Jungiella) calcicola Vaillant, 1972 (N)

Jungiella (Jungiella) domusdemariae Wagner & Salamanna, 1984 (Sa) (E)

Jungiella (Jungiella) sybaritana Salamanna, 1975 (S) (E)

Jungiella (Jungiella) troiano Salamanna & Raggio, 1984 (N) (E)

Panimerus (Panimerus) Eaton, 1913

Panimerus (Panimerus) britteni (Tonnoir, 1940) (N, S)

Panimerus (Panimerus) kreki Vaillant, 1972 (S)

Panimerus (Panimerus) maynei Tonnoir, 1920 (S)

Panimerus (Panimerus) notabilis (Eaton, 1893) (N)

Panimerus (Panimerus) sarai Salamanna, 1975 (S)

Panimerus (Krekiella) Vaillant, 1972

Panimerus (Krekiella) bartolii Salamanna, 1974 (Sa) (E)

Panimerus (Krekiella) ligusticus (Sarà & Salamanna, 1967) (N) (E)

Panimerus (Krekiella) parvus (Sarà, 1956) (N)

Panimerus (Krekiella) similis (Tonnoir, 1922) (N)

Peripsychoda Enderlein, 1935

Peripsychoda auriculata (Curtis, 1839) (N, S, Sa)

Peripsychoda fusca (Macquart, 1826) (N, S)

Clogmia Enderlein, 1937

Clogmia albipunctata (Williston, 1893) (N, S, Si, Sa)

Clogmia rotschildi (Eaton, 1912) (N)

Clogmia tristis (Meigen, 1818) (S)

Telmatoscopus Eaton, 1904

Telmatoscopus apicalis Sarà, 1953 (S)

Telmatoscopus latipennis Sarà, 1953 (Si)

Telmatoscopus wagneri (Salamanna, 1982) (N, Sa) (E)

Trichopsychoda Tonnoir, 1922

Trichopsychoda hirtella (Tonnoir, 1919) (N)

Philosepedon Eaton, 1904

Philosepedon humeralis (Meigen, 1818) (N, S)

Philosepedon kalehnus Vaillant, 1974 (S)

Philosepedon sandalioticus Salamanna, 1982 (Sa) (E)

Philosepedon soljani Krek, 1971 (N)

Feuerborniella Vaillant, 1974

Feuerborniella obscura (Tonnoir, 1940) (N)

Berdeniella Vaillant, 1976

Berdeniella bodoni Salamanna & Raggio, 1984 (N) (E)

Berdeniella brauxica Vaillant, 1976 (N) (E)

Berdeniella caprai Salamanna & Sarà, 1980 (N) (E)

Berdeniella dispar (Sarà, 1958) (N, S)

Berdeniella elkeae Wagner, 1975 (N)

Berdeniella freyi (Berdén, 1954) (N)
Berdeniella gardinii Salamanna & Raggio, 1984 (N) (E)
Berdeniella glacialis (Vaillant, 1958) (N)
Berdeniella helvetica (Sarà, 1957) (N)
Berdeniella lucasioides Salamanna & Sarà, 1980 (N) (E)
Berdeniella manicata (Tonnoir, 1920) (N)
Berdeniella matthesi (Jung, 1956) (N)
Berdeniella nivalis Vaillant, 1976 (N)
Berdeniella salamannai Wagner, 1983 (N) (E)
Berdeniella sardoa Salamanna, 1983 (Sa) (E)
Berdeniella unispinosa (Tonnoir, 1919) (N, S)
Berdeniella zoiai Salamanna, 1983 (Sa) (E)
Berdeniella zwicki Wagner, 1983 (N) (E)

Pericoma (Pericoma) Walker, 1856

Pericoma (Pericoma) alticola Vaillant, 1955 (N)
Pericoma (Pericoma) calcilega Feuerborn, 1923 (N)
Pericoma (Pericoma) corsicana Vaillant, 1955 (Sa)
Pericoma (Pericoma) exquisita Eaton, 1893 (N, S)
Pericoma (Pericoma) insularis Wagner & Salamanna, 1984 (Sa) (E)
Pericoma (Pericoma) latina Sarà, 1954 (S) (E)
Pericoma (Pericoma) modesta Tonnoir, 1922 (N)
Pericoma (Pericoma) pseudoexquisita Tonnoir, 1940 (N)
Pericoma (Pericoma) servadeii Salamanna, 1982 (N) (E)
Pericoma (Pericoma) solitaria Wagner & Salamanna, 1984 (Sa) (E)
Pericoma (Pericoma) trifasciata (Meigen, 1804) (N, S)
Pericoma (Pericoma) viperina Vaillant, 1961 (N)

Pericoma (Pachypericoma) Vaillant, 1978

Pericoma (Pachypericoma) blandula Eaton, 1893 (N, S, Sa)

Szaboiella Vaillant, 1979

Szaboiella hibernica (Eaton, 1893) (N)
Szaboiella modenesei Salamanna & Raggio, 1984 (N) (E)

Satchelliella Vaillant, 1979

Satchelliella compta (Eaton, 1893) (N, S)
Satchelliella cubitospinosa (Jung, 1953) (N, S)
Satchelliella fonticola (Szabò, 1960) (N)
Satchelliella gracilis (Eaton, 1893) (N)
Satchelliella hirticornis (Tonnoir, 1922) (N)
Satchelliella jungi (Vaillant, 1961) (N)
Satchelliella mutua (Eaton, 1893) (N)
Satchelliella nubila (Meigen, 1818) (N, S, Si, Sa)

Satchelliella pilularia (Tonnoir, 1940) (S)
Satchelliella plumicornis (Tonnoir, 1922) (N)
Satchelliella sandaliae Salamanna, 1983 (Sa) (E)
Satchelliella vaillanti Wagner, 1981 (N) (E)

Saraiella Vaillant, 1981

Saraiella auberti (Sarà, 1954) (N, S)
Saraiella clastrieri (Vaillant, 1962) (N)
Saraiella consigliana (Sarà, 1953) (N, S) (E)
Saraiella diaclasica Vaillant, 1981 (N)
Saraiella gennargentui Salamanna, 1983 (Sa) (E)
Saraiella gredenica Salamanna & Sarà, 1980 (N) (E)
Saraiella onerata (Vaillant, 1957) (N)
Saraiella parva (Vaillant, 1963) (N)
Saraiella rotunda (Krek, 1970) (N)
Saraiella squamigera (Tonnoir, 1922) (N)

Ulomyia Walker, 1856

Ulomyia mirabilis (Sarà, 1952) (N) (E)
Ulomyia montanoi Salamanna & Raggio, 1984 (N) (E)
Ulomyia opaca (Tonnoir, 1922) (N, Si) (E)
Ulomyia scurina (Vaillant, 1958) (N)

Thornburghiella Vaillant, 1973

Thornburghiella quezeli (Vaillant, 1955) (S, Sa)

Bazarella (Parabazarella) Vaillant, 1983

Bazarella (Parabazarella) subneglecta (Tonnoir, 1922) (N)

Clytocerus (Clytocerus) Eaton, 1904

Clytocerus (Clytocerus) intermedius Sarà, 1951 (S) (E)
Clytocerus (Clytocerus) ocellaris (Meigen, 1804) (N, S, Si, Sa)
Clytocerus (Clytocerus) saccai Sarà, 1953 (N, S, Sa) (E)
Clytocerus (Clytocerus) siculus Sarà, 1953 (Si) (E)

Tonnoiriella Vaillant, 1982

Tonnoiriella anchoriformis Salamanna, 1975 (S) (E)
Tonnoiriella fontinalis Wagner & Salamanna, 1984 (Sa) (E)
Tonnoiriella pulchra (Eaton, 1893) (N, S)

Psychoda Latreille, 1796

Psychoda albipennis Zetterstedt, 1850 (N, S)
Psychoda alternata Say, 1824 (N, S, Si, Sa)
Psychoda cinerea Banks, 1894 (N, S, Sa)
Psychoda dolomitica Salamanna & Sarà, 1980 (N) (E)
Psychoda erminea Eaton, 1898 (N, S)
Psychoda gemina Eaton, 1904 (N, S)
Psychoda grisescens Tonnoir, 1922 (N)
Psychoda lativentris Berdén, 1952 (S, Sa)
Psychoda lobata Tonnoir, 1940 (N)
Psychoda minuta Banks, 1894 (N, S, Si, Sa)
Psychoda parthenogenetica Tonnoir, 1940 (N, S)
Psychoda phalaenoides (Linnaeus, 1758) (N)
Psychoda pontina Sarà, 1953 (S) (E)
Psychoda pseudoalternicula Salamanna, 1975 (S, Sa) (E)
Psychoda pusilla Tonnoir, 1922 (N, S)
Psychoda quatei Sarà & Salamanna, 1967 (N) (E)
Psychoda satchelli Quate, 1955 (N, S)
Psychoda setigera Tonnoir, 1922 (N)
Psychoda severini Tonnoir, 1922 (N, S, Sa)
Psychoda trinodulosa Tonnoir, 1922 (Sa)
Psychoda uniformata Haseman, 1907 (N)
Psychoda vaillanti Sarà & Salamanna, 1967 (N) (E)
Psychoda villosa Salamanna & Raggio, 1984 (N) (E)

Trichoceridae

***Trichocera* (*Trichocera*)** Meigen, 1803

Trichocera (*Trichocera*) *annulata* Meigen, 1818 (S, Si)
Trichocera (*Trichocera*) *hiemalis* (De Geer, 1776) (N, S)
Trichocera (*Trichocera*) *maculipennis* Meigen, 1818 (N)
Trichocera (*Trichocera*) *parva* Meigen, 1804 (S)
Trichocera (*Trichocera*) *regelationis* (Linnaeus, 1758) (N, S)
Trichocera (*Trichocera*) *saltator* (Harris, 1776) (S)

Anisopodidae

Sylvicola Harris, 1776

Sylvicola cinctus (Fabricius, 1787) (N?)
Sylvicola fenestralis (Scopoli, 1763) (N)
Sylvicola limpidus (Edwards, 1923) (N)
Sylvicola punctatus (Fabricius, 1787) (N)

Scatopsidae

Aspistes Meigen, 1818

Aspistes berolinensis Meigen, 1818 (N, Si?)

Anapausis Enderlein, 1912

Anapausis inermis (Ruthe, 1831) (Si)

Anapausis soluta (Loew, 1846) (N, S, Si)

Anapausis talpae (Verrall, 1912) (N?)

Parascatopse Cook, 1955

Parascatopse minutissima (Verrall, 1886) (N)

Rhegmoclema Enderlein, 1912

Rhegmoclema halteratum (Meigen, 1838) (S)

Apiloscatopse Cook, 1874

Apiloscatopse flavicollis (Meigen, 1818) (N)

Apiloscatopse handlirschi (Duda, 1928) (N)

Colobostema Enderlein, 1926

Colobostema nigripenne (Meigen, 1830) (Si)

Colobostema triste (Zetterstedt, 1850) (N)

***Reichertella* (*Reichertella*)** Enderlein, 1912

Reichertella (*Reichertella*) *geniculata* (Zetterstedt, 1850) (N)

Reichertella (*Reichertella*) *pulicaria* (Loew, 1846) (N, S, Si)

Scatopse Geoffroy, 1762

Scatopse notata (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)

Coboldia Melander, 1916

Coboldia fuscipes (Meigen, 1830) (N, S)

Swammerdamella Enderlein, 1912

Swammerdamella brevicornis (Meigen, 1830) (N, Si)

Ptychopteridae

Ptychoptera Meigen, 1803

Ptychoptera albimana (Fabricius, 1787) (N, S, Si)

Ptychoptera contaminata (Linnaeus, 1758) (S)

Ptychoptera paludosa Meigen, 1804 (S)

Dixidae

Dixa Meigen, 1818

Dixa dilatata Strobl, 1900 (N)

Dixa maculata Meigen, 1818 (N, S)

Dixa nebulosa Meigen, 1830 (N, S, Si, Sa)

Dixa nubilipennis Curtis, 1832 (N)

Dixa obsoleta Peus, 1934 (N)

Dixa puberula Loew, 1849 (N, S, Si)

Dixa serrifera Edwards, 1928 (Si, Sa)

Dixa submaculata Edwards, 1920 (N)

Dixella Dyar & Shannon, 1924

Dixella aestivalis (Meigen, 1818) (N, S)

Dixella amphibia (De Geer, 1776) (N)

Dixella attica (Pandazis, 1933) (Sa)

Dixella autumnalis (Meigen, 1838) (N, Sa)

Dixella graeca (Pandazis, 1937) (Sa)

Dixella laeta (Loew, 1849) (Sa)

Dixella martinii (Peus, 1934) (Sa)

Dixella obscura (Loew, 1849) (N?)

Palaeodixa Contini, 1965

Palaeodixa frizzii Contini, 1965 (Sa)

Chaoboridae

***Chaoborus* (*Chaoborus*)** Lichtenstein, 1800

Chaoborus (*Chaoborus*) *crystallinus* (De Geer, 1776) (N, S)

Chaoborus (*Chaoborus*) *flavicans* (Meigen, 1830) (N, S, Sa)

Chaoborus (*Chaoborus*) *obscuripes* (van der Wulp, 1859) (N) (*)

***Chaoborus* (*Peusomyia*)** Saether, 1970

Chaoborus (Peusomyia) pallidus (Fabricius, 1794) (N, S, Sa)

Mochlonyx Loew, 1844

Mochlonyx fuliginosus (Felt, 1905) (N) (*)

Mochlonyx velutinus (Ruthe, 1831) (N, S)

Note

Chaoborus (Chaoborus) obscuripes: Presente solo sulle Alpi.

Mochlonyx fuliginosus: Presente solo sulle Alpi.

Culicidae

Anopheles (Anopheles) Meigen, 1818

Anopheles (Anopheles) algeriensis Theobald, 1903 (N, S, Si, Sa)

Anopheles (Anopheles) atroparvus Van Thiel, 1927 (N, S)

Anopheles (Anopheles) claviger (Meigen, 1804) (N, S, Si, Sa)

Anopheles (Anopheles) hyrcanus (Pallas, 1771) (N, S, Si, Sa)

Anopheles (Anopheles) labranchiae Falleroni, 1926 (S, Si, Sa)

Anopheles (Anopheles) maculipennis Meigen, 1818 (N, S, Si)

Anopheles (Anopheles) marteri Senevet & Prunelle, 1927 (N?, S, Si, Sa)

Anopheles (Anopheles) melanoon Hackett, 1934 (N, S, Sa)

Anopheles (Anopheles) messeae Falleroni, 1926 (N, S)

Anopheles (Anopheles) petragrani Del Vecchio, 1939 (N, S, Si, Sa)

Anopheles (Anopheles) plumbeus Stephens, 1828 (N, S, Si, Sa)

Anopheles (Anopheles) sacharovi Favre, 1903 (N, S, Sa) (M)

Anopheles (Anopheles) subalpinus Hackett & Lewis, 1935 (N, S) (*)

Anopheles (Cellia) Theobald, 1902

Anopheles (Cellia) hispaniola (Theobald, 1903) (S, Si, Sa)

Anopheles (Cellia) sergentii (Theobald, 1907) (Si) (M)

Anopheles (Cellia) superpictus Grassi, 1899 (N, S, Si)

Aedes (Aedes) Meigen, 1818

Aedes (Aedes) cinereus Meigen, 1818 (N)

Aedes (Aedimorphus) Theobald, 1903

Aedes (Aedimorphus) vexans (Meigen, 1830) (N, S, Si, Sa)

Aedes (Finlaya) Theobald, 1903

Aedes (Finlaya) echinus (Edwards, 1920) (S, Si, Sa)

Aedes (Finlaya) geniculatus (Olivier, 1791) (N, S, Si, Sa)

***Aedes (Ochlerotatus)* Lynch Arribalzaga, 1891**

Aedes (Ochlerotatus) annulipes (Meigen, 1830) (N)
Aedes (Ochlerotatus) berlandi Seguy, 1921 (N, S, Si, Sa)
Aedes (Ochlerotatus) cantans (Meigen, 1818) (N)
Aedes (Ochlerotatus) caspius (Pallas, 1771) (N, S, Si, Sa)
Aedes (Ochlerotatus) cataphylla Dyar, 1916 (N, S)
Aedes (Ochlerotatus) communis (De Geer, 1776) (N, S)
Aedes (Ochlerotatus) detritus (Haliday, 1833) (N, S, Si, Sa)
Aedes (Ochlerotatus) dorsalis (Meigen, 1830) (N?)
Aedes (Ochlerotatus) mariae Sergent & Sergent, 1903 (N, S, Si, Sa)
Aedes (Ochlerotatus) pulchritarsis (Rondani, 1872) (N, S, Si, Sa)
Aedes (Ochlerotatus) pullatus (Coquillett, 1904) (N, S)
Aedes (Ochlerotatus) punctor (Kirby, 1837) (N, S)
Aedes (Ochlerotatus) rusticus (Rossi, 1790) (N, S, Si, Sa)
Aedes (Ochlerotatus) surcoufi (Theobald, 1912) (N, S)
Aedes (Ochlerotatus) sticticus (Meigen, 1838) (N, S)
Aedes (Ochlerotatus) zammitii (Theobald, 1903) (N, S, Si)

***Aedes (Rusticoidus)* Shevchenko & Prudkina, 1973**

Aedes (Rusticoidus) refiki Medschid, 1928 (N, S, Si)

***Aedes (Stegomyia)* Theobald, 1901**

Aedes (Stegomyia) aegypti (Linnaeus, 1762) (N, S, Si, Sa) (*)
Aedes (Stegomyia) albopictus (Skuse, 1894) (N, S, Sa) (*)
Aedes (Stegomyia) vittatus (Bigot, 1861) (S, Si?, Sa)

***Coquillettidia (Coquillettidia)* Dyar, 1905**

Coquillettidia (Coquillettidia) buxtoni (Edwards, 1923) (N, S, Si, Sa)
Coquillettidia (Coquillettidia) richiardi (Ficalbi, 1899) (N, S, Si, Sa)

***Culex (Barraudius)* Edwards, 1921**

Culex (Barraudius) modestus Ficalbi, 1889 (N, S, Si, Sa)

***Culex (Culex)* Linnaeus, 1758**

Culex (Culex) brumpti Galliard, 1931 (Sa)
Culex (Culex) laticinctus Edwards, 1913 (S, Si, Sa)
Culex (Culex) mimeticus Noè, 1899 (N, S, Si, Sa)
Culex (Culex) pipiens Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa) (*)
Culex (Culex) theileri Theobald, 1903 (N, S, Si, Sa)
Culex (Culex) torrentium Martini, 1925 (N)

Culex (Culex) univittatus Theobald, 1901 (S, Si)

***Culex (Maillotia)* Theobald, 1907**

Culex (Maillotia) hortensis Ficalbi, 1889 (N, S, Si, Sa)

***Culex (Neoculex)* Dyar, 1905**

Culex (Neoculex) impudicus Ficalbi, 1890 (S, Si, Sa)

Culex (Neoculex) martinii Medschid, 1930 (N, S, Si, Sa)

Culex (Neoculex) territans Walker, 1856 (N, S)

***Culiseta (Allotheobaldia)* Broelemann, 1919**

Culiseta (Allotheobaldia) longiareolata (Macquart, 1838) (N, S, Si, Sa)

***Culiseta (Culicella)* Felt, 1904**

Culiseta (Culicella) fumipennis (Stephens, 1825) (N, S, Si, Sa)

Culiseta (Culicella) litorea (Shute, 1928) (S, Si, Sa)

Culiseta (Culicella) morsitans (Theobald, 1901) (N, S, Si, Sa)

***Culiseta (Culiseta)* Felt, 1904**

Culiseta (Culiseta) annulata (Schrank, 1776) (N, S, Si, Sa)

Culiseta (Culiseta) subochrea (Edwards, 1921) (N, S, Si, Sa)

***Orthopodomyia* Theobald, 1904**

Orthopodomyia pulcripalpis (Rondani, 1872) (N, S, Si, Sa)

***Uranotaenia (Pseudoficalbia)* Theobald, 1912**

Uranotaenia (Pseudoficalbia) unguiculata Edwards, 1913 (N, S, Si, Sa)

Note

Anopheles (Anopheles) subalpinus: Specie di dubbia validità.

Aedes (Stegomyia) aegypti: Diverse introduzioni temporanee.

Aedes (Stegomyia) albopictus: Introdotta in Italia probabilmente alla fine degli anni '80; patria: Regione Orientale.

Culex (Culex) pipiens: Comprende una forma ornitofila eterodinama primitiva ed una più recente antropofila omodinama con varie condizioni di intergradazione.

Thaumaleidae

***Androposopa* Mik, 1898**

Androposopa larvata (Mik, 1888) (N)

Orphnephilina Enderlein, 1936

Orphnephilina nigra (Loew, 1871) (N, S)

Protothaumalea Vaillant, 1977

Protothaumalea tarda (Loew, 1847) (Si)

Thaumalea Ruthé, 1831

Thaumalea appendiculata Wagner, 1987 (Si) (E)

Thaumalea austriaca Edwards, 1929 (N)

Thaumalea bezzii Edwards, 1929 (S)

Thaumalea caudata Bezzi, 1913 (N)

Thaumalea divaricata Bezzi, 1913 (N)

Thaumalea gerecki Wagner, 1988 (Sa) (E)

Thaumalea inflata Bezzi, 1913 (N) (E)

Thaumalea major Bezzi, 1913 (N)

Thaumalea sandaliae Wagner, 1987 (Sa) (E)

Thaumalea testacea Ruthé, 1831 (N, S, Sa)

Thaumalea toscanica Vaillant, 1981 (S) (E)

Simuliidae

Greniera Doby & David, 1959

Greniera fabri Doby & David, 1959 (S, Sa)

Metacnephia Crosskey, 1969

Metacnephia blanci (Grenier & Theodoridés, 1953) (Si)

Metacnephia nuragica Rivosecchi, Raastad & Contini, 1975 (Sa) (E)

Metacnephia sardoa (Rivosecchi & Contini, 1965) (Sa) (E)

Prosimulium (Helodon) Enderlein, 1921

Prosimulium (Helodon) albense Rivosecchi, 1961 (S, Si) (E)

Prosimulium (Urosimulium) Contini, 1963

Prosimulium (Urosimulium) aculeatum Rivosecchi, 1963 (Si, Sa)

Prosimulium (Urosimulium) juccii (Contini, 1966) (Sa)

Prosimulium (Prosimulium) Roubaud, 1906

Prosimulium (Prosimulium) calabrum Rivosecchi, 1966 (S) (E)
Prosimulium (Prosimulium) fulvipes (Edwards, 1921) (N)
Prosimulium (Prosimulium) italicum Rivosecchi, 1967 (S, Si) (E)
Prosimulium (Prosimulium) latimucro (Enderlein, 1925) (N, S)
Prosimulium (Prosimulium) rufipes (Meigen, 1830) (N, S)
Prosimulium (Prosimulium) tomosvaryi (Enderlein, 1921) (S, Si)

Twinnia Stone & Jamnback, 1955

Twinnia tatrensis Novak, 1959 (N)

Simulium (Boophthora) Enderlein, 1925

Simulium (Boophthora) erythrocephalum (De Geer, 1776) (N, S, Sa)

Simulium (Byssodon) Enderlein, 1925

Simulium (Byssodon) maculatum (Meigen, 1804) (N) (M) (*)

Simulium (Eusimulium) Roubaud, 1906

Simulium (Eusimulium) angustipes Edwards, 1915 (N, S)
Simulium (Eusimulium) petricolum (Rivosecchi, 1963) (S, Si, Sa)
Simulium (Eusimulium) silvaticum (Rubtsov, 1962) (N)
Simulium (Eusimulium) velutinum (Santos Abreau, 1922) (N, S, Si, Sa)

Simulium (Hellichiella) Rivosecchi & Cardinali, 1975

Simulium (Hellichiella) saccai (Rivosecchi, 1967) (S) (E) (*)

Simulium (Nevermannia) Enderlein, 1921

Simulium (Nevermannia) angustitarse (Lundstrom, 1911) (N, S)
Simulium (Nevermannia) bertrandi Grenier & Dorier, 1959 (N, S)
Simulium (Nevermannia) brevidens (Rubtsov, 1956) (N, S)
Simulium (Nevermannia) carpathicum (Knoz, 1961) (N)
Simulium (Nevermannia) carthusiense Grenier & Dorier, 1959 (N)
Simulium (Nevermannia) costatum Friederichs, 1920 (N)
Simulium (Nevermannia) cryophilum (Rubtsov, 1959) (N, S, Si, Sa)
Simulium (Nevermannia) dolomitense (Rivosecchi, 1971) (N) (E)
Simulium (Nevermannia) fucense (Rivosecchi, 1962) (N, S) (E)
Simulium (Nevermannia) ibleum (Rivosecchi, 1966) (Si)
Simulium (Nevermannia) ichnusae Rivosecchi & Contini, 1993 (Sa) (E)
Simulium (Nevermannia) latigonium (Rubtsov, 1956) (N, S)
Simulium (Nevermannia) marsicanum (Rivosecchi, 1962) (S, Si) (E)
Simulium (Nevermannia) minutum (Rubtsov, 1959) (N)
Simulium (Nevermannia) quasidecolletum Crosskey, 1987 (N, S)

Simulium (Nevermannia) vernum Macquart, 1826 (N, S, Si)

***Simulium (Obuchovia)* Rubtsov, 1947**

Simulium (Obuchovia) auricoma Meigen, 1818 (N)

Simulium (Obuchovia) brevifile (Rubtsov, 1956) (S, Si, Sa)

Simulium (Obuchovia) continii (Rivosecchi & Cardinali, 1975) (Sa) (E, M)

Simulium (Obuchovia) galloprovinciale Giudicelli, 1963 (S)

Simulium (Obuchovia) segusina (Couvert, 1968) (N) (E) (*)

***Simulium (Simulium)* Latreille, 1802**

Simulium (Simulium) argenteostriatum Strobl, 1898 (N)

Simulium (Simulium) argyreatum Meigen, 1838 (N, S)

Simulium (Simulium) curvifilum (Rivosecchi, 1963) (S) (*)

Simulium (Simulium) degrangei Dorier & Grenier, 1960 (S)

Simulium (Simulium) hispaniola Grenier & Bertrand, 1954 (S)

Simulium (Simulium) intermedium Roubaud, 1906 (N, S, Si, Sa)

Simulium (Simulium) liriense Rivosecchi, 1961 (S) (E, M) (*)

Simulium (Simulium) maximum Knoz, 1961 (N)

Simulium (Simulium) monticola Friederichs, 1920 (N, S)

Simulium (Simulium) noelleri Friederichs, 1920 (N)

Simulium (Simulium) ornatum Meigen, 1818 (N, S, Si)

Simulium (Simulium) paramorsitans Rubtsov, 1956 (S)

Simulium (Simulium) pontinum Rivosecchi, 1960 (S) (E) (*)

Simulium (Simulium) reptans (Linnaeus, 1758) (N, S)

Simulium (Simulium) rivosecchii Rubtsov, 1964 (S) (E, M) (*)

Simulium (Simulium) sicanum (Rivosecchi, 1963) (S, Si) (E)

Simulium (Simulium) subtile Rubtsov, 1956 (N)

Simulium (Simulium) trifasciatum Curtis, 1839 (N, S)

Simulium (Simulium) variegatum Meigen, 1818 (N, S, Si)

Simulium (Simulium) voilense Serban, 1960 (N)

***Simulium (Tetisimulium)* Rubtsov, 1963**

Simulium (Tetisimulium) bezzii (Corti, 1914) (N, S, Si, Sa)

Simulium (Tetisimulium) graium (Couvert, 1967) (N) (*)

***Simulium (Wilhemia)* Enderlein, 1921**

Simulium (Wilhemia) balcanicum (Enderlein, 1924) (S)

Simulium (Wilhemia) equinum (Linnaeus, 1758) (N, S)

Simulium (Wilhemia) lineatum (Meigen, 1804) (N, S, Si, Sa)

Simulium (Wilhemia) paraequinum Puri, 1933 (N)

Simulium (Wilhemia) pseudequinum Séguy, 1921 (N, S, Si, Sa) (*)

Simulium (Wilhemia) pseudequinum sulphuricolum (Rivosecchi, 1972) (S)

Simulium (Wilhemia) sangrense (Rivosecchi, 1967) (S) (E, M) (*)

Note

Simulium (Byssodon) maculatum: Presente solo nel Fiume Po fino al 1916.
Simulium (Hellichiella) saccai: Solo nel bosco del Parco Nazionale del Circeo.
Simulium (Obuchovia) segusina: Solo nelle Alpi Occidentali.
Simulium (Simulium) curvifilum: Trovato una sola volta nei dintorni di Isernia.
Simulium (Simulium) liriense: Un tempo ampiamente diffuso in vari fiumi dell'Italia centrale (Tevere, Sangro, Liri), è ora ridotto a un unico focolaio nel Fiume Liri.
Simulium (Simulium) pontinum: Trovato una sola volta nei dintorni di Roma.
Simulium (Simulium) rivosecchii: In varie sorgenti sulfuree e non sulfuree di Lazio e Abruzzo.
Simulium (Tetisimulium) graium: Solo nelle Alpi Occidentali.
Simulium (Wilhemia) pseudequinum: La sottospecie *sulphuricum* è presente solo in Toscana nelle sorgenti sulfuree di Saturnia.
Simulium (Wilhemia) sangrense: Trovato una sola volta nel F. Sangro.

Ceratopogonidae

***Leptoconops (Leptoconops)* Skuse, 1889**

Leptoconops (Leptoconops) bezzii (Noe, 1905) (N, S)
Leptoconops (Leptoconops) bidentatus Gutsevich, 1960 (*)
Leptoconops (Leptoconops) irritans (Noe, 1905) (S)
Leptoconops (Leptoconops) noei Clastrier & Coluzzi, 1973 (*)

***Leptoconops (Holoconops)* Kieffer, 1918**

Leptoconops (Holoconops) kerteszi Kieffer, 1908 (S)

***Atrichopogon (Atrichopogon)* Kieffer, 1906**

Atrichopogon (Atrichopogon) brunnipes (Meigen, 1804) (*)
Atrichopogon (Atrichopogon) fuscus (Meigen, 1804) (*)
Atrichopogon (Atrichopogon) infuscus Goetghebuer, 1929 (*)

***Atrichopogon (Psammopogon)* Remm, 1979**

Atrichopogon (Psammopogon) bilineatus Kieffer, 1922 (*)
Atrichopogon (Psammopogon) latipygus Vaillant, 1957 (*)

***Forcipomyia (Forcipomyia)* Meigen, 1818**

Forcipomyia (Forcipomyia) armandi Harant & Huttel, 1952 (N)
Forcipomyia (Forcipomyia) coprophila Kieffer, 1914 (N) (*)
Forcipomyia (Forcipomyia) nigra (Winnertz, 1852) (N) (*)
Forcipomyia (Forcipomyia) pulchrithorax Edwards, 1924 (S, Si)
Forcipomyia (Forcipomyia) venetiana Kieffer, 1919 (*)

***Forcipomyia (Microhelea)* Kieffer, 1917**

Forcipomyia (Microhelea) fuliginosa (Meigen, 1818) (S)

***Dasyhelea (Dicryptoscena)* Enderlein, 1936**

Dasyhelea (Dicryptoscena) aestiva (Winnertz, 1852) (*)

***Dasyhelea (Dasyhelea)* Kieffer, 1911**

Dasyhelea (Dasyhelea) coarctata Kieffer, 1914 (*)

Dasyhelea (Dasyhelea) dieuzeidei (Vaillant, 1957) (*)

Dasyhelea (Dasyhelea) dufouri (Laboulbene, 1869) (*)

Dasyhelea (Dasyhelea) halophila Kieffer, 1911 (*)

Dasyhelea (Dasyhelea) homocera Kieffer, 1919 (*)

Dasyhelea (Dasyhelea) strigosa Kieffer, 1922 (*)

***Dasyhelea (Pseudoculicoides)* Malloch, 1915**

Dasyhelea (Pseudoculicoides) flavoscutellata (Zetterstedt, 1850) (N) (*)

Dasyhelea (Pseudoculicoides) palustris (Meigen, 1804) (N) (*)

Dasyhelea (Pseudoculicoides) sericata (Winnertz, 1852) (N)

***Culicoides (Avaritia)* Fox, 1955**

Culicoides (Avaritia) chiopterus (Meigen, 1830) (*)

Culicoides (Avaritia) dewulfi Goetghebuer, 1936 (S)

Culicoides (Avaritia) montanus Shakirzjanova, 1962 (Si)

Culicoides (Avaritia) obsoletus (Meigen, 1818) (S, Si)

Culicoides (Avaritia) scoticus Downes & Kettle, 1952 (S)

***Culicoides (Beltranmyia)* Vargas, 1953**

Culicoides (Beltranmyia) circumscriptus Kieffer, 1918 (S, Si)

Culicoides (Beltranmyia) kirovabadicus Dzhafarov, 1964 (Si)

***Culicoides (Culicoides)* Latreille, 1809**

Culicoides (Culicoides) delta Edwards, 1939 (*)

Culicoides (Culicoides) fagineus Edwards, 1939 (S)

Culicoides (Culicoides) impunctatus Goetghebuer, 1920 (S)

Culicoides (Culicoides) newsteadi Austen, 1921 (S, Si)

Culicoides (Culicoides) pulicaris (Linnaeus, 1758) (S, Si)

Culicoides (Culicoides) punctatus (Meigen, 1804) (S, Si)

***Culicoides (Monoculicoides)* Khalaf, 1954**

Culicoides (Monoculicoides) nubeculosus (Meigen, 1830) (S)

Culicoides (Monoculicoides) parroti Kieffer, 1922 (S, Si)
Culicoides (Monoculicoides) puncticollis (Becker, 1903) (S)
Culicoides (Monoculicoides) riethi Kieffer, 1914 (S)
Culicoides (Monoculicoides) stigma (Meigen, 1818) (N)

***Culicoides (Oecacta)* Poey, 1851**

Culicoides (Oecacta) accraensis Carter, Ingram & Macfie, 1920 (S)
Culicoides (Oecacta) alazanicus Dzhafarov, 1961 (S)
Culicoides (Oecacta) azerbaijdzhanicus Dzhafarov, 1962 (Si)
Culicoides (Oecacta) begueti Clastrier, 1957 (S)
Culicoides (Oecacta) brunnicans Edwards, 1939 (S)
Culicoides (Oecacta) cataneii Clastrier, 1957 (S, Si)
Culicoides (Oecacta) caucoliberensis Callot, Kremer, Rioux & Descous, 1967 (S)
Culicoides (Oecacta) clastrieri Callot, Kremer & Deduit, 1962 (S)
Culicoides (Oecacta) dendriticus Boorman, 1976 (S)
Culicoides (Oecacta) festivipennis Kieffer, 1914 (S)
Culicoides (Oecacta) geigelensis Dzhafarov, 1964 (S, Si)
Culicoides (Oecacta) griseolus (Zetterstedt, 1855)
Culicoides (Oecacta) haranti Rioux, Descous & Pech, 1959 (S)
Culicoides (Oecacta) heteroclitus Callot & Kremer, 1965 (S)
Culicoides (Oecacta) jurensis Callot, Kremer & Deduit, 1962 (S)
Culicoides (Oecacta) kibunensis Tokunaga, 1937 (S, Si)
Culicoides (Oecacta) kurensis Dzhafarov, 1960 (Si)
Culicoides (Oecacta) latipennis Kieffer, 1919
Culicoides (Oecacta) longipennis Khalaf, 1957 (S)
Culicoides (Oecacta) malevillei Kremer & Coluzzi, 1971 (S)
Culicoides (Oecacta) maritimus Kieffer, 1924 (S, Si)
Culicoides (Oecacta) odiatus Austen, 1921 (S, Si)
Culicoides (Oecacta) pictipennis (Staeger, 1839) (S, Si)
Culicoides (Oecacta) pseudoheliophilus Callot & Kremer, 1961 (S)
Culicoides (Oecacta) saevanicus Dzhafarov, 1960 (S)
Culicoides (Oecacta) sahariensis Kieffer, 1923 (S, Si)
Culicoides (Oecacta) semimaculatus Clastrier, 1958 (S)
Culicoides (Oecacta) shaklawensis Khalaf, 1957 (S)
Culicoides (Oecacta) similis Carter, Ingram & Macfie, 1920 (S)
Culicoides (Oecacta) simulator Edwards, 1939 (S)
Culicoides (Oecacta) susae Kieffer, 1919 (*)
Culicoides (Oecacta) univittatus Vimmer, 1932 (*)

***Culicoides (Pontoculicoides)* Remm, 1968**

Culicoides (Pontoculicoides) ibericus Dzhafarov, 1964 (S)
Culicoides (Pontoculicoides) seifadinei Dzhafarov, 1958 (S, Si)
Culicoides (Pontoculicoides) tauricus Gutsevich, 1959 (Si)

***Culicoides (Silvaticulicoides)* Glukhova, 1977**

Culicoides (Silvaticulicoides) fascipennis (Staeger, 1839) (S)
Culicoides (Silvaticulicoides) pallidicornis Kieffer, 1919 (S)
Culicoides (Silvaticulicoides) picturatus Kremer & Deduit, 1961 (S, Si)
Culicoides (Silvaticulicoides) subfasciipennis Kieffer, 1919 (S, Si)

Alluaudomyia Kieffer, 1913

Alluaudomyia bertrandi Harant & Cellier, 1949 (*)
Alluaudomyia hygropetrica Vaillant, 1954 (*)

Serromyia Meigen, 1818

Serromyia ledicola Kieffer, 1925 (*)

Stilobezzia (Stilobezzia) Kieffer, 1911

Stilobezzia (Stilobezzia) flavirostris (Winnertz, 1852) (S)

Mallochohelea Wirth, 1962

Mallochohelea inermis (Kieffer, 1909) (*)

Probezzia Kieffer, 1906

Probezzia soikoi (Harant & Huttel, 1952) (N)

Sphaeromias Curtis, 1829

Sphaeromias fasciatus (Meigen, 1804) (*)
Sphaeromias pictus (Meigen, 1818) (*)

Bezzia (Bezzia) Kieffer, 1899

Bezzia (Bezzia) albipes (Winnertz, 1852) (N)
Bezzia (Bezzia) ornata (Meigen, 1830) (S)

Bezzia (Homobezzia) Macfie, 1932

Bezzia (Homobezzia) bicolor (Meigen, 1804) (S)

Palpomyia (Palpomyia) Meigen, 1818

Palpomyia (Palpomyia) armipes (Meigen, 1838) (*)
Palpomyia (Palpomyia) flavipes (Meigen, 1804)
Palpomyia (Palpomyia) fulva (Macquart, 1826) (N)
Palpomyia (Palpomyia) serripes (Meigen, 1818) (*)
Palpomyia (Palpomyia) venetiae Harant & Huttel, 1952 (*)

Note

Leptoconops (Leptoconops) bidentatus: Distribuzione italiana da precisare.
Leptoconops (Leptoconops) noei: Distribuzione italiana da precisare.
Atrichopogon (Atrichopogon) brunnipes: Presenza in Italia dubbia.
Atrichopogon (Atrichopogon) fuscus: Presenza in Italia dubbia.
Atrichopogon (Atrichopogon) infuscus: Presenza in Italia dubbia.
Atrichopogon (Psammopogon) bilineatus: Presenza in Italia dubbia.
Atrichopogon (Psammopogon) latipygus: Distribuzione italiana da precisare.
Forcipomyia (Forcipomyia) coprophila: Presenza in Italia dubbia.
Forcipomyia (Forcipomyia) nigra: Presenza in Italia dubbia.
Forcipomyia (Forcipomyia) venetiana: Distribuzione italiana da precisare.
Dasyhelea (Dicryptoscena) aestiva: Distribuzione italiana da precisare.
Dasyhelea (Dasyhelea) coarctata: Distribuzione italiana da precisare.
Dasyhelea (Dasyhelea) dieuzeidei: Distribuzione italiana da precisare.
Dasyhelea (Dasyhelea) dufouri: Distribuzione italiana da precisare.
Dasyhelea (Dasyhelea) halophila: Distribuzione italiana da precisare.
Dasyhelea (Dasyhelea) homocera: Distribuzione italiana da precisare.
Dasyhelea (Dasyhelea) strigosa: Presenza in Italia dubbia.
Dasyhelea (Pseudoculicoides) flavoscutellata: Presenza in Italia dubbia.
Dasyhelea (Pseudoculicoides) palustris: Presenza in Italia dubbia.
Culicoides (Avaritia) chiopterus: Distribuzione italiana da precisare.
Culicoides (Culicoides) delta: Distribuzione italiana da precisare.
Culicoides (Oecacta) susae: Distribuzione italiana da precisare.
Culicoides (Oecacta) univittatus: Distribuzione italiana da precisare.
Alluaudomyia bertrandi: Presenza in Italia dubbia.
Alluaudomyia hygropetrica: Distribuzione italiana da precisare.
Serromyia ledicola: Distribuzione italiana da precisare.
Mallochohelea inermis: Presenza in Italia dubbia.
Sphaeromyias fasciatus: Presenza in Italia dubbia.
Sphaeromyias pictus: Presenza in Italia dubbia.
Palpomyia (Palpomyia) armipes: Distribuzione italiana da precisare.
Palpomyia (Palpomyia) serripes: Distribuzione italiana da precisare.
Palpomyia (Palpomyia) venetiae: Distribuzione italiana da precisare.

Chironomidae

Thalassomyia Schiner, 1856

Thalassomyia frauenfeldi Schiner, 1856 (3)

Ablabesmyia Johannsen, 1905

Ablabesmyia longistyla Fittkau, 1962 (N, S, Si)

Ablabesmyia monilis (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)

Apsectrotanypus Fittkau, 1962

Apsectrotanypus trifascipennis (Zetterstedt, 1838) (N)

Arctopelopia Fittkau, 1962

Arctopelopia griseipennis (van der Wulp, 1858) (S)

Arctopelopia sp. sensu Ferrarese, 1990 (N) (A)

Clinotanypus Kieffer, 1913

Clinotanypus nervosus (Meigen, 1818) (N)

Conchapelopia Fittkau, 1957

Conchapelopia melanops (Meigen, 1818) (N)

Conchapelopia pallidula (Meigen, 1818) (N, S, Si)

Guttipelopia Fittkau, 1962

Guttipelopia guttipennis (van der Wulp, 1861) (N) (*)

Krenopelopia Fittkau, 1962

Krenopelopia binotata (Wiedemann, 1817) (N)

Larsia Fittkau, 1962

Larsia atrocincta (Goetghebuer, 1942) (Si)

Macropelopia Thienemann, 1916

Macropelopia adaucta Kieffer, 1916 (N)

Macropelopia fehlmanni (Kieffer, 1912) (N)

Macropelopia fittkaui Ferrarese & Ceretti, 1987 (N)

Macropelopia nebulosa (Meigen, 1804) (N, S, Si)

Macropelopia notata (Meigen, 1818) (N)

Monopelopia Fittkau, 1962

Monopelopia tenuicalcar (Kieffer, 1918) (N, Si)

Natarsia Fittkau, 1962

Natarsia nugax (Walker, 1856) (S)

Natarsia punctata (Meigen, 1804) (N)

Nilotanypus Kieffer, 1923

Nilotanypus dubius (Meigen, 1804) (N, Si)

Paramerina Fittkau, 1962

Paramerina cingulata (Walker, 1856) (N)

Paramerina divisa (Walker, 1856) (N, Sa)

Paramerina sp. A sensu Rossaro, 1988 (N) (*)

Paramerina sp. B (N) (*)

Procladius Skuse, 1889

Procladius choreus (Meigen, 1804) (N, S, Si)

Procladius sagittalis (Kieffer, 1909) (N, S, Si)

Psectrotanypus Kieffer, 1909

Psectrotanypus varius (Fabricius, 1787) (N, S, Si)

Rheopelopia Fittkau, 1962

Rheopelopia ornata (Meigen, 1838) (N, S)

Tanypus Meigen, 1803

Tanypus kraatzi (Kieffer, 1912) (N, Sa)

Tanypus punctipennis Meigen, 1818 (N, S, Si)

Tanypus vilipennis (Kieffer, 1918) (N, S)

Telmatopelopia Fittkau, 1962

Telmatopelopia nemorum (Goetghebuer, 1921) (N)

Telopelopia Roback, 1971

Telopelopia fascigera (Verneaux, 1970) (N, S)

Thienemannimyia Fittkau, 1957

Thienemannimyia carnea (Fabricius, 1805) (N)

Thienemannimyia fuscipes (Edwards, 1929) (N)

Thienemannimyia geijskesi (Goetghebuer, 1934) (N, S)

Thienemannimyia northumbrica (Edwards, 1929) (N)

Thienemannimyia pseudocarnea Murray, 1976 (N, Si)

Thienemannimyia woody (Edwards, 1929) (N)

Trissopelopia Kieffer, 1923

Trissopelopia longimana (Staeger, 1839) (N, S, Si)

Xenopelopia Fittkau, 1962

Xenopelopia falcigera (Kieffer, 1911) (N)

Zavrelimyia Fittkau, 1962

Zavrelimyia barbatipes (Kieffer, 1911) (N)

Zavrelimyia hirtimana (Kieffer, 1918) (N)

Zavrelimyia melanura (Meigen, 1804) (N, S)

Zavrelimyia nubila (Meigen, 1830) (N)

Zavrelimyia punctatissima (Goetghebuer, 1934) (N)

Zavrelimyia signatipennis (Kieffer, 1924) (N)

Boreoheptagyia Brundin, 1966

Boreoheptagyia cinctipes (Edwards, 1928) (N)

Diamesa Meigen, 1835

Diamesa aberrata Lundbeck, 1889 (N, S)

Diamesa bertrami Edwards, 1935 (N, S)

Diamesa cinerella Meigen, 1935 (N)

Diamesa dampfi (Kieffer, 1924) (N, S)

Diamesa goetghebueri Pagast, 1947 (N)

Diamesa incallida (Walker, 1856) (N)

Diamesa insignipes Kieffer, 1908 (N, S)

Diamesa laticauda Serra-Tosio, 1964 (N)

Diamesa latitarsis (Goetghebuer, 1921) (N, S)

Diamesa lindrothi Goetghebuer, 1931 (N)

Diamesa longipes Goetghebuer, 1941 (N)

Diamesa modesta Serra-Tosio, 1967 (N)

Diamesa permacra (Walker, 1856) (N)

Diamesa steimboeckii Goetghebuer, 1933 (N)

Diamesa tonsa (Walker, 1856) (N, S)

Diamesa vaillanti Serra-Tosio, 1972 (N)

Diamesa wuelkeri Serra-Tosio, 1964 (N) (*)

Diamesa zernyi Edwards, 1933 (N, S)

Potthastia Kieffer, 1922

Potthastia gaedii (Meigen, 1838) (N, S)

Potthastia longimanus (Kieffer, 1922) (N)

Protanypus Kieffer, 1906

Protanypus caudatus Edwards, 1924 (N)

Pseudodiamesa Goetghebuer, 1939

Pseudodiamesa branickii (Nowicki, 1873) (N, S)

Pseudodiamesa nivosa (Goetghebuer, 1928) (N)

Pseudokiefferiella Zavrel, 1941

Pseudokiefferiella parva (Edwards, 1932) (N, S)

Sympotthastia Pagast, 1947

Sympotthastia spinifera Serra-Tosio, 1968 (N, S, Sa)

Syndiamesa Kieffer, 1918

Syndiamesa nigra Rossaro, 1980 (N)

Monodiamesa Kieffer, 1922

Monodiamesa sp. (N)

Odontomesa Pagast, 1947

Odontomesa fulva (Kieffer, 1919) (N)

Prodiamesa Kieffer, 1906

Prodiamesa olivacea (Meigen, 1818) (N, S)

Prodiamesa rufovittata Goetghebuer, 1932 (N)

Acricotopus Kieffer, 1921

Acricotopus lucens (Zetterstedt, 1850) (N, S)

Brillia Kieffer, 1913

Brillia longifurca Kieffer, 1921 (N, S)

Brillia modesta (Meigen, 1830) (N, S)

Bryophaenocladus Thienemann, 1934

Bryophaenocladus aestivus (Brundin, 1947) (N)

Bryophaenocladus illimbatus (Edwards, 1929) (N, S)

Bryophaenocladus inconstans (Brundin, 1947) (N)

Bryophaenocladus scanicus (Brundin, 1947) (N)

Bryophaenocladus subvernalis (Edwards, 1929) (N)

Bryophaenocladus tuberculatus (Edwards, 1929) (N)

Bryophaenocladus vernalis (Goetghebuer, 1921) (N)

Camptocladius van der Wulp, 1874

Camptocladius stercorarius (De Geer, 1776) (N, S)

Cardiocladius Kieffer, 1912

Cardiocladius capucinus (Zetterstedt, 1850) (N, S, Sa)

Cardiocladius fuscus Kieffer, 1924 (N, S, Sa)

Chaetocladius Kieffer, 1911

Chaetocladius dissipatus (Edwards, 1929) (N)

Chaetocladius gelidus Brundin, 1956 (N)

Chaetocladius laminatus Brundin, 1947 (N, S)

Chaetocladius perennis (Meigen, 1830) (N)

Chaetocladius suecicus (Kieffer, 1916) (N)

Corynoneura Winnertz, 1846

Corynoneura coronata (Edwards, 1924) (N)

Corynoneura edwardsi Brundin, 1949 (N)

Corynoneura fittkaui Schlee, 1968 (N, S)

Corynoneura lacustris Edwards, 1924 (N)

Corynoneura lobata Edwards, 1924 (N, S)

Corynoneura scutellata Winnertz, 1846 (N)

Cricotopus (Cricotopus) van der Wulp, 1874

Cricotopus (Cricotopus) algarum (Kieffer, 1911) (S)

Cricotopus (Cricotopus) annulator Goetghebuer, 1927 (N, S)

Cricotopus (Cricotopus) bicinctus (Meigen, 1818) (N, S)

Cricotopus (Cricotopus) cilindraceus (Kieffer, 1908) (N)

Cricotopus (Cricotopus) curtus Hirvenoja, 1973 (N, S)

Cricotopus (Cricotopus) festivellus (Kieffer, 1906) (N)

Cricotopus (Cricotopus) fuscus (Kieffer, 1909) (N)

Cricotopus (Cricotopus) patens Hirvenoja, 1973 (N)

Cricotopus (Cricotopus) pulchripes Verrall, 1912 (N, S)

Cricotopus (Cricotopus) tibialis (Meigen, 1804) (N, S)

Cricotopus (Cricotopus) tremulus (Linnaeus, 1756) (N)

Cricotopus (Cricotopus) triannulatus (Macquart, 1826) (N, S)

Cricotopus (Cricotopus) trifascia Edwards, 1929 (N, S)

Cricotopus (Cricotopus) vierriensis Goetghebuer, 1935 (N)

Cricotopus (Isocladius) Kieffer, 1909

Cricotopus (Isocladius) glacialis Edwards, 1922 (N)

Cricotopus (Isocladius) intersectus (Staeger, 1839) (N, S)

Cricotopus (Isocladius) laricomalis Edwards, 1932 (N, S)
Cricotopus (Isocladius) ornatus (Meigen, 1818) (N, S)
Cricotopus (Isocladius) sylvestris (Fabricius, 1794) (N, S, Si, Sa)
Cricotopus (Isocladius) tricinatus (Meigen, 1818) (N)
Cricotopus (Isocladius) trifasciatus (Meigen, 1813) (N, S)

Diplocladius Kieffer, 1908

Diplocladius cultriger Kieffer, 1908 (N, S)

Epoicocladius Sulc & Zavrel, 1924

Epoicocladius ephemerae (Kieffer, 1924) (N)

Eukiefferiella Thienemann, 1926

Eukiefferiella brehmi Gouin, 1943 (N)
Eukiefferiella brevicar (Kieffer, 1911) (N, S, Sa)
Eukiefferiella claripennis Lundbeck, 1898 (N, S, Si)
Eukiefferiella clypeata (Kieffer, 1923) (N, S)
Eukiefferiella coerulescens (Kieffer, 1926) (N, S)
Eukiefferiella cyanea Thienemann, 1936 (N, S)
Eukiefferiella devonica (Edwards, 1929) (N, S)
Eukiefferiella dittmari Lehmann, 1972 (N)
Eukiefferiella fittkau Lehmann, 1972 (N, S)
Eukiefferiella fuldensis Lehmann, 1972 (N, S)
Eukiefferiella gracei (Edwards, 1929) (N)
Eukiefferiella ilkleyensis (Edwards, 1929) (N, S)
Eukiefferiella lobifera Goetghebuer, 1934 (N, S)
Eukiefferiella minor (Edwards, 1929) (N, S)
Eukiefferiella pseudomontana Goetghebuer, 1935 (N, S)
Eukiefferiella tirolensis Goetghebuer, 1938 (N)

Euryhopsis Oliver, 1981

Euryhopsis subviridis (Siebert, 1979) (N)

Georthocladius Strenzke, 1941

Georthocladius sp. (N)

Gymnometriocnemus Goetghebuer, 1932

Gymnometriocnemus subnudus (Edwards, 1929) (N)
Gymnometriocnemus volitans (Goetghebuer, 1940) (N)

Halocladius (Halocladius) Hirvenoja, 1973

Halocladius (Halocladius) millenarius (Santos Abreu, 1918) (N, S)
Halocladius (Halocladius) varians (Staeger, 1839) (N)

Heleniella Gouin, 1943

Heleniella drieri Serra-Tosio, 1967 (N)
Heleniella ornatocollis (Edwards, 1929) (N)
Heleniella serratosioi Ringe, 1976 (N)

Heterotanytarsus Spärk, 1923

Heterotanytarsus apicalis (Kieffer, 1921) (N)

Heterotrissocladius Spärk, 1923

Heterotrissocladius grimshawi (Edwards, 1929) (N)
Heterotrissocladius marcidus (Walker, 1856) (N, S)

Hydrobaenus Fries, 1830

Hydrobaenus distylus (Kieffer, 1915) (N, S)

Krenosmittia Thienemann & Krüger, 1939

Krenosmittia boreoalpina (Goetghebuer, 1944) (N)
Krenosmittia camptophleps (Edwards, 1929) (N, S)
Krenosmittia hispanica Wülker, 1957 (N)

Limnophyes Eaton, 1875

Limnophyes bidumus Sæther, 1985 (N)
Limnophyes italicus Marcuzzi, 1949 (N)
Limnophyes minimus (Meigen, 1818) (N)
Limnophyes natalensis Kieffer, 1914 (N)
Limnophyes spinigus Sæther, 1985 (N)

Mesosmittia Brundin, 1956

Mesosmittia flexuella (Edwards, 1929) (N, S)

Metriocnemus van der Wulp, 1874

Metriocnemus fuscipes (Meigen, 1818) (N, S)
Metriocnemus hirticollis (Staeger, 1839) (N)
Metriocnemus hygropetricus Kieffer, 1912 (N, S)

Nanocladius Kieffer, 1913

Nanocladius balticus Palmén, 1959 (N)
Nanocladius bicolor (Zetterstedt, 1838) (N, S)
Nanocladius rectinervis (Kieffer, 1911) (N)

Orthocladius (Eudactylocladius) Thienemann, 1935

Orthocladius (Eudactylocladius) fuscimanus Kieffer, 1908 (N, S)
Orthocladius (Eudactylocladius) gelidus Kieffer, 1922 (N)
Orthocladius (Eudactylocladius) mixtus (Holmgren, 1869) (N)
Orthocladius (Eudactylocladius) olivaceus (Kieffer, 1911) (N)

Orthocladius (Euorthocladius) Thienemann, 1935

Orthocladius (Euorthocladius) ashei Soptonis, 1990 (N)
Orthocladius (Euorthocladius) luteipes Goetghebuer, 1938 (N)
Orthocladius (Euorthocladius) rivicola Kieffer, 1921 (N, S)
Orthocladius (Euorthocladius) rivulorum Kieffer, 1909 (N, S)
Orthocladius (Euorthocladius) saxosus (Tokunaga, 1939) (N, S)
Orthocladius (Euorthocladius) thienemanni Kieffer, 1906 (N, S)

Orthocladius (Orthocladius) van der Wulp, 1874

Orthocladius (Orthocladius) frigidus (Zetterstedt, 1838) (N, S)
Orthocladius (Orthocladius) marchettii Rossaro & Prato, 1991 (N, S)
Orthocladius (Orthocladius) oblidens (Walker, 1856) (N)
Orthocladius (Orthocladius) obumbratus Johannsen, 1905 (N, S, Si, Sa)
Orthocladius (Orthocladius) pedestris Kieffer, 1909 (N)
Orthocladius (Orthocladius) pinderi Rossaro & Prato, 1991 (N, S)
Orthocladius (Orthocladius) rivinus Kieffer, 1915 (S)
Orthocladius (Orthocladius) rubicundus (Meigen, 1818) (N, S)
Orthocladius (Orthocladius) ruffoi Rossaro & Prato, 1991 (N, S)
Orthocladius (Orthocladius) ticinoi Rossaro & Prato, 1991 (N)
Orthocladius (Orthocladius) wetterensis Brundin, 1956 (N)

Parachaetocladius Wülker, 1959

Parachaetocladius abnobaeus (Wülker, 1959) (N)

Paracladius Hirvenoja, 1973

Paracladius alpicola (Zetterstedt, 1850) (N)
Paracladius conversus (Walker, 1856) (N, S)

Paracricotopus Thienemann & Harnisch, 1932

Paracricotopus niger (Kieffer, 1913) (N)

Parakiefferiella Thienemann, 1936

Parakiefferiella gracillima (Kieffer, 1924) (N)
Parakiefferiella bathophila (Kieffer, 1912) (N)
Parakiefferiella coronata (Edwards, 1929) (N)

Parametriocnemus Goetghebuer, 1932

Parametriocnemus boreoalpina Gouin, 1942 (N)
Parametriocnemus stylatus (Kieffer, 1924) (N, S)

Paraphaenocladus Thienemann, 1924

Paraphaenocladus impensus (Walker, 1856) (N, S)

Parasmittia Strenzke, 1950

Parasmittia carinata Strenzke, 1950 (N)

Paratrachocladus Santos-Abreu, 1918

Paratrachocladus gayi Serra-Tosio, 1983 (N)
Paratrachocladus guidalii Rossaro, 1990 (N)
Paratrachocladus lanzavecchiai Rossaro, 1990 (S)
Paratrachocladus micans (Kieffer, 1918) (S)
Paratrachocladus nivalis Goetghebuer, 1938 (N)
Paratrachocladus osellai Rossaro, 1990 (N)
Paratrachocladus pierfrancescoi Rossaro, 1990 (S)
Paratrachocladus rufiventris (Meigen, 1830) (N, S)
Paratrachocladus skirwithensis (Edwards, 1929) (N, S)
Paratrachocladus veronicae Rossaro, 1990 (S)

Paratrissocladius Zavrel, 1937

Paratrissocladius excerptus (Walker, 1856) (N, S)

Parorthocladus Thienemann, 1935

Parorthocladus nudipennis (Kieffer, 1908) (N)

***Psectrocladius* (*Allopsectrocladius*)** Wülker, 1956

Psectrocladius (*Allopsectrocladius*) *obvius* (Walker, 1856) (N, S)

***Psectrocladius* (*Monopsectrocladius*)** Wülker, 1956

Psectrocladius (*Monopsectrocladius*) *sp.* (N, S)

***Psectrocladius* (*Psectrocladius*)** Kieffer, 1906

Psectrocladius (Psectrocladius) brehmi Kieffer, 1923 (N, S)
Psectrocladius (Psectrocladius) fennicus Storå, 1939 (N)
Psectrocladius (Psectrocladius) limbatellus (Holmgren, 1869) (N, Si)
Psectrocladius (Psectrocladius) octomaculatus Wülker, 1956 (N)
Psectrocladius (Psectrocladius) psilopterus (Kieffer, 1906) (N, Si)
Psectrocladius (Psectrocladius) sordidellus (Zetterstedt, 1838) (N, S)
Psectrocladius (Psectrocladius) schlienzi Wülker, 1956 (N, S)

Pseudorthocladius Goetghebuer, 1932

Pseudorthocladius curtistylus (Goetghebuer, 1921) (N)

Pseudosmittia Goetghebuer, 1932

Pseudosmittia angusta (Edwards, 1929) (N)
Pseudosmittia danconai (Marcuzzi, 1947) (N)
Pseudosmittia gracilis (Goetghebuer, 1913) (N, S)
Pseudosmittia holsata Thienemann & Strenzke, 1940 (N)
Pseudosmittia mathildae Albu, 1968 (N)
Pseudosmittia recta (Edwards, 1929) (N)
Pseudosmittia subtrilobata (Freeman, 1956) (N, S)
Pseudosmittia trilobata (Edwards, 1929) (N, S)

Rheocricotopus Thienemann & Harnisch, 1932

Rheocricotopus atripes (Kieffer, 1913) (N, S)
Rheocricotopus chalybeatus (Edwards, 1929) (N, S)
Rheocricotopus effusus (Walker, 1856) (N)
Rheocricotopus fuscipes Kieffer, 1909 (N, S, Si, Sa)
Rheocricotopus gallicus Lehmann, 1969 (S)
Rheocricotopus glabricollis (Meigen, 1830) (N)

Rheosmittia Brundin, 1956

Rheosmittia spinicornis Brundin, 1956 (N)

Smittia Holmgren, 1869

Smittia amoena Caspers, 1988 (N)
Smittia aterrima (Meigen, 1819) (N, S)
Smittia edwardsi Goetghebuer, 1932 (N)
Smittia foliacea (Kieffer, 1921) (N)
Smittia nudipennis Goetghebuer, 1913 (N)
Smittia pratorum Goetghebuer, 1927 (N, S)
Smittia scutellosetosa Caspers, 1988 (N)

Stilocladius Rossaro, 1979

Stilocladius montanus Rossaro, 1979 (N)

Symposiocladius Cranston, 1982

Symposiocladius lignicola (Kieffer, 1915) (N, S, Sa)

Synorthocladius Thienemann, 1935

Synorthocladius semivirens Kieffer, 1909 (N, S, Si, Sa)

Thienemannia Kieffer, 1909

Thienemannia gracilis Kieffer, 1909 (N, S)

Thienemanniella Kieffer, 1911

Thienemanniella clavicornis (Kieffer, 1911) (N, S)

Thienemanniella obscura Brundin, 1947 (N)

Thienemanniella partita Schlee, 1968 (N)

Tokunagaia Sæther, 1973

Tokunagaia rectangularis (Goetghebuer, 1940) (N)

Tokunagaia tonollii Rossaro, 1983 (N)

Tvetenia Kieffer, 1922

Tvetenia bavarica (Goetghebuer, 1934) (N, S, Sa)

Tvetenia calvescens (Edwards, 1929) (N, S, Sa)

Tvetenia discoloripes Goetghebuer, 1936 (N, S)

Tvetenia verralli (Edwards, 1929) (N, S, Sa)

Zalutschia Lipina, 1939

Zalutschia tatrica (Pagast, 1935) (N)

Baeotendipes Kieffer, 1913

Baeotendipes noctivaga (Kieffer, 1911) (Sa)

Beckidia Sæther, 1979

Beckidia tethys (Townes, 1945) (N)

Beckidia zabolotskyi (Goetghebuer, 1938) (N)

Chernovskiiia Sæther, 1977

Chernovskiiia macrocera Sæther, 1977 (N)

Chironomus (Camptochironomus) Kieffer, 1918

Chironomus (Camptochironomus) pallidivittatus (Malloch, 1915) (N)

Chironomus (Chironomus) Meigen, 1803

Chironomus (Chironomus) annularius Auct. (nec De Geer, 1776) (N)

Chironomus (Chironomus) anthracinus Zetterstedt, 1860 (N)

Chironomus (Chironomus) calipterus Kieffer, 1908 (N)

Chironomus (Chironomus) cingulatus Meigen, 1830 (N)

Chironomus (Chironomus) dorsalis Auct. (nec Meigen, 1818) (N)

Chironomus (Chironomus) melanotus Keyl, 1961 (N)

Chironomus (Chironomus) obtusidens Goetghebuer, 1921 (N)

Chironomus (Chironomus) plumosus (Linnaeus, 1758) (N, S)

Chironomus (Chironomus) riparius Meigen, 1804 (N, S)

Chironomus (Chironomus) salinarius Kieffer, 1915 (N, S, Si, Sa)

Cladopelma Kieffer, 1921

Cladopelma edwardsi (Kruseman, 1933) (N)

Cladopelma virescens (Meigen, 1818) (N)

Cladopelma viridula (Linnaeus, 1767) (N)

Cladotanytarsus Kieffer, 1921

Cladotanytarsus atridorsum Kieffer, 1924 (N, S)

Cladotanytarsus mancus (Walker, 1856) (N)

Constempellina Brundin, 1947

Constempellina brevicosta (Edwards, 1937) (S, Si)

Cryptochironomus Kieffer, 1918

Cryptochironomus albofasciatus (Staeger, 1839) (N)

Cryptochironomus defectus (Kieffer, 1913) (N, S)

Cryptochironomus obreptans (Walker, 1856) (N)

Cryptochironomus rostratus Kieffer, 1921 (N)

Cryptochironomus supplicans (Meigen, 1830) (N)

Cryptotendipes Lenz, 1941

Cryptotendipes holsatus Lenz, 1959 (N)

Cyphomella Sæther, 1977

Cyphomella sp. (N)

Demicryptochironomus Lenz, 1941

Demicryptochironomus vulneratus (Zetterstedt, 1838) (N)

Dicrotendipes Kieffer, 1913

Dicrotendipes lobiger (Kieffer, 1921) (N, S)

Dicrotendipes modestus (Say, 1823) (N)

Dicrotendipes nervosus (Staeger, 1839) (N, S)

Dicrotendipes notatus (Meigen, 1818) (N)

Dicrotendipes peringueyanus Kieffer, 1924 (Si) (*)

Dicrotendipes tritonus (Kieffer, 1916) (N)

Einfeldia Kieffer, 1924

Einfeldia carbonaria (Meigen, 1804) (N)

Einfeldia dissidens (Walker, 1856) (N)

Einfeldia longipes (Staeger, 1839) (N)

Einfeldia pagana (Meigen, 1838) (N)

Endochironomus Kieffer, 1918

Endochironomus albipennis (Meigen, 1830) (N, S)

Endochironomus dispar (Meigen, 1830) (N)

Endochironomus lepidus (Meigen, 1830) (N)

Endochironomus tendens (Fabricius, 1775) (N, S)

Fleuria Kieffer, 1924

Fleuria lacustris Kieffer, 1924 (N)

Glyptotendipes Kieffer, 1913

Glyptotendipes gripekoveni (Kieffer, 1913) (N)

Glyptotendipes imbecillis (Walker, 1856) (N, S)

Glyptotendipes pallens (Meigen, 1804) (N)

Glyptotendipes paripes (Edwards, 1929) (N)

Harnischia Kieffer, 1921

Harnischia angularis Albu & Botnariuc, 1966 (N)

Harnischia curtilamellata (Malloch, 1915) (N)

Harnischia fuscimana Kieffer, 1921 (N)

Krenopsectra Reiss, 1969

Krenopsectra fallax Reiss, 1969 (N)

Kiefferulus Goetghebuer, 1922

Kiefferulus tendipediformis (Goetghebuer, 1921) (N, S)

Microchironomus Kieffer, 1918

Microchironomus deribae (Freeman, 1957) (Sa) (*)

Microchironomus tener (Kieffer, 1918) (N, S?)

Microtendipes Kieffer, 1915

Microtendipes chloris (Meigen, 1818) (N)

Microtendipes pedellus (De Geer, 1776) (N)

Microtendipes tarsalis (Walker, 1856) (N)

Micropsectra Kieffer, 1909

Micropsectra apposita (Walker, 1856) (N, S)

Micropsectra aristata Pinder, 1976 (N, S)

Micropsectra atrofasciata (Kieffer, 1911) (N, S)

Micropsectra attenuata Reiss, 1969 (N)

Micropsectra bidentata (Goetghebuer, 1921) (N)

Micropsectra clastrieri Reiss, 1969 (N)

Micropsectra contracta Reiss, 1965 (N)

Micropsectra groenlandica Andersen, 1937 (N)

Micropsectra junci (Meigen, 1818) (N)

Micropsectra lindrothi Goetghebuer, 1931 (N)

Micropsectra notescens (Walker, 1856) (N, S)

Micropsectra radialis Goetghebuer, 1939 (N)

Micropsectra recurvata Goetghebuer, 1928 (N)

Micropsectra roseiventris (Kieffer, 1909) (N)

Neozavrelia Goetghebuer, 1941

Neozavrelia fuldensis Fittkau, 1954 (N)

Nilothauma Kieffer, 1921

Nilothauma brayi (Goetghebuer, 1921) (N, S)

Pagastiella Brundin, 1949

Pagastiella orophila (Edwards, 1929) (N)

Parachironomus Lenz, 1921

Parachironomus arcuatus (Goetghebuer, 1919) (N)
Parachironomus frequens (Johannsen, 1905) (N)
Parachironomus monochromus (van der Wulp, 1874) (N)
Parachironomus parilis (Walker, 1856) (N)
Parachironomus varus (Goetghebuer, 1921) (N)
Parachironomus vitiosus (Goetghebuer, 1921) (N)

Paracladopelma Harnisch, 1923

Paracladopelma camptolabis (Kieffer, 1913) (N, S)
Paracladopelma nigrifula (Goetghebuer, 1942) (N)

Paralauterborniella Lenz, 1941

Paralauterborniella nigrohalteralis (Malloch, 1915) (N)

Parapsectra Reiss, 1969

Parapsectra nana (Meigen, 1818) (N)

Paratanytarsus Thienemann & Bause, 1913

Paratanytarsus austriacus (Kieffer, 1924) (N)
Paratanytarsus bituberculatus (Edwards, 1929) (N, S, Sa)
Paratanytarsus confusus Palmén, 1960 (N)
Paratanytarsus grimmii (Schneider, 1885) (N, S)
Paratanytarsus inopertus (Walker, 1856) (N)
Paratanytarsus lauterborni Kieffer, 1909 (N, S)
Paratanytarsus mediterraneus Reiss & Säwedel, 1981 (N, S)
Paratanytarsus natvigii (Goetghebuer, 1933) (N, S)
Paratanytarsus penicillatus (Goetghebuer, 1928) (N)
Paratanytarsus tenellulus (Goetghebuer, 1921) (N)

Paratendipes Kieffer, 1911

Paratendipes albimanus (Meigen, 1818) (N)
Paratendipes nubilus (Meigen, 1830) (N)
Paratendipes plebeius (Meigen, 1818) (N)

Phaenopsectra Kieffer, 1921

Phaenopsectra flavipes (Meigen, 1818) (N, S)
Phaenopsectra punctipes (Wiedemann, 1817) (N)

Polypedilum (Pentapedilum) Kieffer, 1913

Polypedilum (Pentapedilum) nubens (Edwards, 1929) (N)
Polypedilum (Pentapedilum) sordens (van der Wulp, 1874) (N, S)

***Polypedilum (Polypedilum)* Kieffer, 1912**

Polypedilum (Polypedilum) acutum Kieffer, 1915 (N)
Polypedilum (Polypedilum) albicorne (Meigen, 1838) (N)
Polypedilum (Polypedilum) convictum (Walker, 1856) (N, S)
Polypedilum (Polypedilum) cultellatum Goetghebuer, 1931 (S)
Polypedilum (Polypedilum) laetum (Meigen, 1818) (N, S, Si)
Polypedilum (Polypedilum) nubeculosum (Meigen, 1804) (N, S, Sa)
Polypedilum (Polypedilum) nubifer (Skuse, 1889) (N, Sa)
Polypedilum (Polypedilum) pedestre (Meigen, 1830) (N, S)
Polypedilum (Polypedilum) sp. A sensu Ferrarese, 1990 (N)

***Polypedilum (Tripodura)* Townes, 1945**

Polypedilum (Tripodura) acifer Townes, 1945 (S)
Polypedilum (Tripodura) aegyptium Kieffer, 1925 (N)
Polypedilum (Tripodura) apfelbecki (Strobl, 1900) (N)
Polypedilum (Tripodura) bicrenatum Kieffer, 1921 (N)
Polypedilum (Tripodura) pullum (Zetterstedt, 1838) (N)
Polypedilum (Tripodura) quadriguttatum Kieffer, 1921 (S)
Polypedilum (Tripodura) scalaenum (Schrank, 1803) (N, S, Si)

***Pseudochironomus* Malloch, 1915**

Pseudochironomus prasinatus (Staeger, 1839) (N)

***Rheotanytarsus* Thienemann & Bause, 1913**

Rheotanytarsus curtistylus (Goetghebuer, 1921) (N, S, Sa)
Rheotanytarsus montanus Lehmann, 1979 (N, S)
Rheotanytarsus muscicola Thienemann, 1929 (N)
Rheotanytarsus nigricauda Fittkau, 1960 (N)
Rheotanytarsus pentapoda (Kieffer, 1909) (N, Sa)
Rheotanytarsus photophilus (Goetghebuer, 1921) (N, S)
Rheotanytarsus reissi Lehmann, 1970 (N)
Rheotanytarsus ringei Lehmann, 1970 (Si)

***Robackia* Saether, 1977**

Robackia demeijerei (Kruseman, 1933) (N)
Robackia pilicauda Saether, 1977 (N)

Genus prope Robackia

Genus prope Robackia sp. (N)

***Saetheria* Jackson, 1977**

Saetheria sp. (S)

Sergentia Kieffer, 1922

Sergentia sp. (N)

Stempellina Thienemann & Bause, 1913

Stempellina bausei (Kieffer, 1911) (N)

Stempellina subglabripennis (Brundin, 1947) (S)

Stempellinella Brundin, 1947

Stempellinella brevis (Edwards, 1929) (N, S)

Stenochironomus (Stenochironomus) Kieffer, 1919

Stenochironomus (Stenochironomus) gibbus (Fabricius, 1794) (N)

Stenochironomus (Stenochironomus) ranzii Rossaro, 1982 (N)

Stictochironomus Kieffer, 1919

Stictochironomus pictulus (Meigen, 1830) (N)

Tanytarsus van der Wulp, 1874

Tanytarsus apenninicus Rossaro, 1993 (N)

Tanytarsus bathophilus Kieffer, 1911 (N)

Tanytarsus brundini Lindeberg, 1963 (N, S)

Tanytarsus buchonius Reiss & Fittkau, 1971 (N, Sa)

Tanytarsus chinyensis Goetghebuer, 1934 (N)

Tanytarsus curticornis Kieffer, 1911 (N)

Tanytarsus ejuncidus (Walker, 1856) (N)

Tanytarsus eminulus (Walker, 1856) (N, Sa)

Tanytarsus fimbriatus Reiss & Fittkau, 1971 (N, S, Sa)

Tanytarsus gracilentus (Holmgren, 1883) (N, S)

Tanytarsus heusdensis Goetghebuer, 1923 (N, S, Sa)

Tanytarsus horni Goetghebuer, 1934 (N)

Tanytarsus lestagei Goetghebuer, 1922 (N)

Tanytarsus lugens (Kieffer, 1916) (N)

Tanytarsus miriforceps (Kieffer, 1921) (N)

Tanytarsus nemorosus Edwards, 1929 (N)

Tanytarsus nigricollis Goetghebuer, 1939 (N)

Tanytarsus pallidicornis (Walker, 1856) (N, S)

Tanytarsus recurvatus Brundin, 1947 (N)

Tanytarsus signatus (van der Wulp, 1858) (N, S)

Tanytarsus sylvaticus (van der Wulp, 1858) (N)

Tanytarsus usmaensis Pagast, 1931 (N, Sa)

Tribelos Townes, 1945

Tribelos intextus (Walker, 1856) (N)

Virgatanytarsus Pinder, 1982

Virgatanytarsus albisutus (Santos-Abreu, 1918) (N, S, Sa)

Virgatanytarsus arduennensis (Goetghebuer, 1922) (N)

Virgatanytarsus triangularis (Goetghebuer, 1928) (N, Sa)

Xenochironomus Kieffer, 1921

Xenochironomus xenolabis Kieffer, 1916 (N, S)

Zavrelia Kieffer, 1913

Zavrelia pentatoma Kieffer, 1913 (N)

Zavreliella Kieffer, 1920

Zavreliella marmorata (van der Wulp, 1858) (S)

Note

Guttipelopia guttipennis: Nuova per l'Italia.

Paramerina sp. A: Potrebbe trattarsi della specie 082.0.004.0 (comunque non ancora descritta).

Paramerina sp. B: Potrebbe trattarsi della specie 082.0.003.0 (comunque non ancora descritta).

Diamesa wuelkeri: Presenza in Italia dubbia.

Chironomus (*Chironomus*): A questo (sotto)genere va riferito il nomen dubium *Chironomus cavazzai* Kieffer, 1913 (distribuzione: N).

Dicrotendipes: A questo genere è attribuito il nomen dubium *Dicrotendipes venetus* (Marcuzzi, 1949) (distribuzione: N).

Dicrotendipes peringueyanus: Nuova per l'Italia.

Harnischia: A questo genere va riferito il nomen dubium *Harnischia falcata* Kieffer, 1916 (distribuzione: N).

Microchironomus deribae: Nuova per l'Italia.

Micropsectra: A questo genere va riferito il nomen dubium *Micropsectra miki* Marcuzzi, 1950 (distribuzione: N).

Paratendipes: A questo genere va riferito il nomen dubium *Paratendipes hexatomus* Kieffer, 1921 (distribuzione: N).

Xylophagidae

Xylophagus Meigen, 1803

Xylophagus ater Meigen, 1804 (N) (*)
Xylophagus cinctus (De Geer, 1776) (N)

Note

Xylophagus ater: Citato da incerta località italiana.

Xylomyidae

Solva Walker, 1860

Solva marginata (Meigen, 1820) (N?, S)
Solva varia (Meigen, 1820) (N?, S)

Stratiomyidae

Actina Meigen, 1804

Actina nitens (Latreille, 1905) (N, Si)

Beris Latreille, 1802

Beris chalybata (Forster, 1771) (N)
Beris clavipes (Linnaeus, 1767) (N, S)
Beris fuscipes Meigen, 1820 (N, S, Si)
Beris geniculata Curtis, 1830 (N)
Beris morrisii Dale, 1841 (N, S)
Beris strobli Dušek & Rozkošný, 1968 (N)
Beris vallata (Forster, 1771) (N)

Chorisops Rondani, 1856

Chorisops tibialis (Meigen, 1820) (N)

Exodontha Rondani, 1856

Exodontha dubia (Zetterstedt, 1838) (N)

Chloromyia Duncan, 1837

Chloromyia formosa (Scopoli, 1763) (N, S, Sa)
Chloromyia speciosa (Macquart, 1834) (N, S)

Microchrysa Loew, 1855

Microchrysa flavicornis (Meigen, 1822) (N)
Microchrysa polita (Linnaeus, 1758) (N)

Sargus Fabricius, 1798

Sargus albibarbus Loew, 1855 (N) (M)
Sargus bipunctatus (Scopoli, 1763) (N, S, Si, Sa)
Sargus cuprarius (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)
Sargus flavipes Meigen, 1822 (N, S) (M)
Sargus iridatus (Scopoli, 1763) (N)
Sargus rufipes Wahlberg, 1854 (N) (M)

Odontomyia Meigen, 1803

Odontomyia angulata (Panzer, 1798) (N, S, Si)
Odontomyia annulata (Meigen, 1822) (N, S, Si, Sa)
Odontomyia argentata (Fabricius, 1794) (N) (M)
Odontomyia cephalonica Strobl, 1898 (Si)
Odontomyia discolor Loew, 1846 (S, Si, Sa)
Odontomyia flavissima (Rossi, 1790) (S, Si)
Odontomyia hydroleon (Linnaeus, 1758) (N)
Odontomyia limbata (Meigen, 1822) (N, S, Si)
Odontomyia ornata (Meigen, 1822) (N, S, Sa)
Odontomyia tigrina (Fabricius, 1775) (N)

Oplodontha Rondani, 1863

Oplodontha viridula (Fabricius, 1775) (N, S)

Stratiomys Geoffroy, 1762

Stratiomys cenisia Meigen, 1822 (N, S, Si)
Stratiomys chamaeleon (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
Stratiomys concinna Meigen, 1822 (N, Si)
Stratiomys equestris Meigen, 1838 (N)
Stratiomys longicornis (Scopoli, 1763) (N, S, Si, Sa)
Stratiomys potamida Meigen, 1822 (N, S)
Stratiomys rubricornis (Bezzi, 1896) (S) (E, M)
Stratiomys singularior (Harris, 1776) (N, Si)

Adoxomyia Kertész, 1907

Adoxomyia dahlia (Meigen, 1830) (N, Si)

Clitellaria Meigen, 1803

Clitellaria ephippium (Fabricius, 1775) (N, S) (M)

Lasiopa Brullé, 1832

Lasiopa calva (Meigen, 1822) (Si)
Lasiopa krkensis Lindner, 1938 (N)
Lasiopa pseudovillosa Rozkošný, 1983 (S, Si) (E, M)
Lasiopa tsacasi Dušek & Rozkošný, 1970 (N)
Lasiopa villosa (Fabricius, 1794) (N, S, Si)

Nemotelus Geoffroy, 1762

Nemotelus anchora Loew, 1846 (S, Si) (M)
Nemotelus andalusiacus Lindner, 1937 (Si) (M)
Nemotelus argentifer Loew, 1846 (S, Si) (M)
Nemotelus brachystomus Loew, 1846 (S)
Nemotelus crenatus Egger, 1859 (N)
Nemotelus lasiops Loew, 1846 (Si)
Nemotelus latiusculus Loew, 1871 (N, S)
Nemotelus nigrifrons Loew, 1846 (Si)
Nemotelus notatus Zetterstedt, 1842 (N, S)
Nemotelus obscuripes Loew, 1871 (S)
Nemotelus pantherinus (Linnaeus, 1758) (N, S)
Nemotelus punctatus Fabricius, 1764 (S, Si)

Oxycera Meigen, 1803

Oxycera analis Meigen, 1822 (N)
Oxycera fallenii Staeger, 1844 (N)
Oxycera germanica (Szilády, 1832) (N)
Oxycera leonina (Panzer, 1798) (N)
Oxycera locuples Loew, 1857 (N)
Oxycera marginata Loew, 1859 (S, Si)
Oxycera meigenii Staeger, 1844 (N, S)
Oxycera morrisii Curtis, 1833 (N, S)
Oxycera muscaria (Fabricius, 1794) (N)
Oxycera nigricornis Olivier, 1812 (N, S, Si, Sa)
Oxycera pardalina Meigen, 1822 (N)
Oxycera pygmaea (Fallén, 1817) (N)
Oxycera rara (Scopoli, 1763) (N)
Oxycera trilineata (Linnaeus, 1767) (N, Si)
Oxycera varipes Loew, 1870 (N)

Hermetia Latreille, 1804

Hermetia illucens (Linnaeus, 1758) (N, S, Sa)

Pachygaster Meigen, 1803

Pachygaster atra (Panzer, 1798) (N)

Praomyia Kertész, 1916

Praomyia leachii (Curtis, 1824) (N, S)

Rhagionidae

Chrysopilus Macquart, 1826

Chrysopilus auratus (Fabricius, 1805) (S)

Chrysopilus aureus (Meigen, 1804)

Chrysopilus aureus aureus (Meigen, 1804) (N)

Chrysopilus aureus meridionalis Bezzi, 1898 (S)

Chrysopilus erythrophthalmus Loew, 1840 (N, S)

Chrysopilus flaveolus (Meigen, 1820) (N, S)

Chrysopilus helvolus (Meigen, 1820) (N, Si)

Chrysopilus intermedius Bezzi, 1895 (S) (E)

Chrysopilus laetus Zetterstedt, 1842 (N, S)

Chrysopilus latifrons Bezzi, 1898 (S) (E)

Chrysopilus luteolus (Fallén, 1814) (N?)

Chrysopilus nubecula (Fallén, 1814) (N, S)

Chrysopilus sículus Loew, 1869 (S, Si)

Chrysopilus splendidus (Meigen, 1820) (N, S, Si)

Ptiolina Zetterstedt, 1842

Ptiolina obscura (Fallén, 1814) (N, S)

Ptiolina paradoxa (Jaennicke, 1866) (N)

Ptiolina pelliticornis Becker, 1900 (N)

Rhagio Fabricius, 1775

Rhagio annulatus (De Geer, 1776) (N, S)

Rhagio ardea Fabricius, 1794 (N?) (E)

Rhagio cavannae (Bezzi, 1898) (S) (E)

Rhagio chrysopilaeformis (Bezzi, 1898) (S) (E)

Rhagio chrysostigma (Loew, 1857) (N)

Rhagio cinerascens (von Röder, 1884) (Sa) (E)

Rhagio cingulatus (Loew, 1856) (N, S?)

Rhagio conspicuus Meigen, 1804 (E)

Rhagio conspicuus florentinus (Loew, 1869) (S)

Rhagio funebris Meigen, 1820 (N, S)

Rhagio lineola Fabricius, 1794 (E)

Rhagio lineola lineola Fabricius, 1794 (N, S)

Rhagio lineola monticola (Egger, 1860) (N, S)

Rhagio maculatus (De Geer, 1776) (S)

Rhagio niger (Wiedemann in Meigen, 1820) (S?, Si)
Rhagio notatus (Meigen, 1820) (N, S)
Rhagio rondanii Bezzi, 1908 (N) (E)
Rhagio sardous Szilády, 1934 (Sa) (E)
Rhagio scolopaceus (Linnaeus, 1758) (N, S)
Rhagio sordidus (Loew, 1862) (N?)
Rhagio taorminae Becker, 1921 (Si)
Rhagio tringarius (Linnaeus, 1758) (N, S)
Rhagio venetianus (Becker, 1921) (N) (E)
Rhagio vitripennis (Meigen, 1820) (N)

Spania Meigen, 1830

Spania nigra Meigen, 1830 (N, S)

Symphoromyia (Symphoromyia) Frauenfeld, 1867

Symphoromyia (Symphoromyia) melaena (Meigen, 1820) (N, S)

Symphoromyia (Paraphoromyia) Becker, 1921

Symphoromyia (Paraphoromyia) crassicornis (Panzer, 1806) (N, S)

Athericidae

Atherix Meigen, 1803

Atherix ibis (Fabricius, 1798) (N, S)

Ibisia Rondani, 1856

Ibisia amicorum Thomas, 1985 (N?)
Ibisia marginata (Fabricius, 1781) (N, S)
Ibisia vaillanti Thomas, 1982 (N?)

Atrichops Verrol, 1909

Atrichops crassipes (Meigen, 1820) (N, S)

Tabanidae

Pangonius (Pangonius) Latreille, 1802

Pangonius (Pangonius) affinis (Loew, 1859) (N, S)
Pangonius (Pangonius) dimidiatus (Loew, 1859) (N, S)
Pangonius (Pangonius) escalarae (Strobl, 1906) (N, S)

Pangonius (Pangonius) fulvipes (Loew, 1859) (N, S)
Pangonius (Pangonius) mauritanus (Linné, 1767) (N)
Pangonius (Pangonius) striatus (Szilády, 1923) (Sa) (E)
Pangonius (Pangonius) variegatus (Fabricius, 1805) (N, S)

Pangonius (Melanopangonius) Szilády, 1923

Pangonius (Melanopangonius) haustellatus (Fabricius, 1781) (N, S)
Pangonius (Melanopangonius) micans (Meigen, 1820) (N, S, Si, Sa)

Silvius Meigen, 1820

Silvius alpinus (Scopoli, 1763) (N)

Nemorius Rondani, 1856

Nemorius vitripennis (Meigen, 1820) (N, S, Sa)

Chrysops (Chrysops) Meigen, 1803

Chrysops (Chrysops) caecutiens (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
Chrysops (Chrysops) connexus Loew, 1858 (N, S)
Chrysops (Chrysops) flavipes Meigen, 1804 (N, S)
Chrysops (Chrysops) italicus Meigen, 1804 (N, S, Si, Sa)
Chrysops (Chrysops) melicharii Mik, 1898 (N)
Chrysops (Chrysops) parallelogrammus Zeller, 1842 (N)
Chrysops (Chrysops) relictus Meigen, 1820 (N, S)
Chrysops (Chrysops) rufipes Meigen, 1820 (N, S)
Chrysops (Chrysops) viduatus (Fabricius, 1794) (N, S)

Atylous Osten-Sacken, 1876

Atylous loewianus (Villeneuve, 1920) (N, S)
Atylous pulchellus (Loew, 1858) (S)
Atylous rusticus (Linné, 1767) (N)
Atylous sublunaticornis (Zetterstedt, 1842) (N)
Atylous venturii (Leclercq, 1967) (S)

Theriopectes Zeller, 1842

Theriopectes gigas (Herbst, 1787) (N, S)
Theriopectes tricolor Zeller, 1842 (N, S, Si)
Theriopectes tunicatus (Szilády, 1927) (N)

Hybomitra Enderlein, 1922

Hybomitra acuminata (Loew, 1858) (N)
Hybomitra aterrima (Meigen, 1820) (N)

Hybomitra auripila (Meigen, 1820) (N)
Hybomitra bimaculata (Macquart, 1826) (N, S)
Hybomitra caucasica (Enderlein, 1925) (N)
Hybomitra ciureai (Séguy, 1937) (N, S)
Hybomitra distinguenda (Verrall, 1909) (N, S)
Hybomitra erberi (Brauer in Brauer & Bergenstamm, 1880) (N, S)
Hybomitra expollicata (Pandellé, 1883) (N, S)
Hybomitra kaurii Chvála & Lyneborg, 1970 (N)
Hybomitra longipalpis (Kröber, 1923) (Si)
Hybomitra lundbecki Lyneborg, 1959 (N)
Hybomitra micans (Meigen, 1804) (N)
Hybomitra montana (Meigen, 1820) (N)
Hybomitra pilosa (Loew, 1858) (N)

Tabanus Linnaeus, 1758

Tabanus bifarius Loew, 1858 (N, S)
Tabanus bovinus Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)
Tabanus briani Leclercq, 1962 (N, S, Si)
Tabanus bromius Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)
Tabanus eggeri Schiner, 1868 (N, S)
Tabanus exclusus Pandellé, 1883 (N, S)
Tabanus glaucopis Meigen, 1820 (N, S, Si, Sa)
Tabanus lunatus Fabricius, 1794 (N, S)
Tabanus marianii (Leclercq, 1956) (Si)
Tabanus nemoralis Meigen, 1820 (S)
Tabanus paradoxus Jaennicke, 1866 (N, S)
Tabanus quatuornatatus Meigen, 1820 (N, S)
Tabanus rectus Loew, 1858 (N, S)
Tabanus regularis Jaennicke, 1866 (N, S)
Tabanus rupium (Brauer in Brauer & Bergenstamm, 1880) (N)
Tabanus spectabilis Loew, 1858 (N, S)
Tabanus spodopteroides Olsufjev, Moucha & Chvála, 1969 (N)
Tabanus spodopterus Meigen, 1820 (N)
Tabanus sudeticus Zeller, 1842 (N, S, Si, Sa)
Tabanus tergestinus Egger, 1859 (N, S)
Tabanus tinctus Walker, 1850 (S)
Tabanus unifasciatus Loew, 1858 (N, S)

Haematopota Meigen, 1803

Haematopota bigoti Gobert, 1880 (N, S)
Haematopota crassicornis Wahlberg, 1848 (N, S)
Haematopota gallica Szilády, 1923 (N)
Haematopota grandis Meigen, 1820 (N, S)
Haematopota italica Meigen, 1804 (N, S)
Haematopota ocellogera (Kröber, 1922) (N, S)
Haematopota pandazisi (Kröber, 1936) (N, S)

Haematopota pluvialis (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
Haematopota scutellata (Olsufjev, Moucha & Chvála, 1964) (N)

Dasyrhamphis Enderlein, 1922

Dasyrhamphis algirus (Macquart, 1838) (Sa)
Dasyrhamphis anthracinus (Meigen, 1820) (N, S, Si, Sa)
Dasyrhamphis ater (Rossi, 1790) (N, S)
Dasyrhamphis carbonarius (Meigen, 1820) (S?)
Dasyrhamphis denticornis (Enderlein, 1925) (Sa)
Dasyrhamphis nigritus (Fabricius, 1794) (Si)
Dasyrhamphis umbrinus (Meigen, 1820) (N, S)

Philipomyia Olsufjev, 1964

Philipomyia aprica (Meigen, 1820) (N, S)
Philipomyia graeca (Fabricius, 1794) (N)

Nemestrinidae

Nemestrinus Latreille, 1802

Nemestrinus aegyptiacus (Wiedemann, 1828) (Si)

Fallenia Meigen, 1820

Fallenia fasciata (Fabricius, 1805) (N, S)

Acroceridae

Astomella Latreille, 1809

Astomella hispaniae Lamarck, 1816 (N, S)

Corononcodes Speiser, 1920

Corononcodes siculus Bezzi, 1923 (Si)

Opsebius A. Costa, 1856

Opsebius perspicillatus A. Costa, 1856 (S)

***Acrocera* (*Acrocera*)** Meigen, 1803

Acrocera (*Acrocera*) *laeta* Gerstaecker, 1856 (Sa) (E)
Acrocera (*Acrocera*) *orbicula* (Fabricius, 1787) (N, S)

Acrocera (Acrocerina) Gil Collado, 1929

Acrocera (Acrocerina) nigrofemorata Meigen, 1804 (N, S)

Acrocera (Acrocerina) sanguinea Meigen, 1804 (N)

Acrocera (Acrocerina) stelviana Pokorný, 1886 (N)

Acrocera (Acrocerina) trigramma Loew, 1845 (N, S, Si)

Ogcodes Latreille, 1796

Ogcodes etruscus (Griffini, 1896) (N) (E)

Ogcodes guttatus A. Costa, 1854 (N, S)

Ogcodes pallipes Latreille in Olivier, 1812 (N, S)

Ogcodes varius Latreille in Olivier, 1812 (N, S)

Ogcodes zonatus Erichson, 1840 (N)

Bombyliidae

Platypygus Loew, 1844

Platypygus chrysanthemi Loew, 1844 (S)

Platypygus melinoproctus Loew, 1873 (S)

Platypygus melleus Loew, 1856 (S, Sa)

Platypygus ridibundus (A. Costa, 1863) (S)

Cyrtosia Perris, 1839

Cyrtosia marginata Perris, 1839 (N, S)

Cyrtosia meridionalis Rondani, 1863 (S, Sa)

Cyrtosia nitens Loew, 1846 (S, Si)

Cyrtosia obscuripes Loew, 1855 (S)

Cyrtosia occidentalis Rondani, 1863 (S)

Cyrtosia opaca Loew, 1846 (S, Si)

Cyrtosia pallipes A. Costa, 1885 (Sa)

Cyrtosia perfecta (Becker, 1910) (Sa)

Empidideicus Becker, 1907

Empidideicus hackmani François, 1969 (S)

Empidideicus hispanus François, 1969 (S)

Empidideicus hungaricus Thalhammer, 1911 (S)

Glabellula Bezzi, 1902

Glabellula meridionalis François, 1955 (S)

Glabellula unicolor Strobl, 1910 (S)

Toxophora Meigen, 1803

Toxophora maculata (Rossi, 1790) (S)

Phthiria Meigen, 1803

Phthiria canescens Loew, 1846 (S, Si)
Phthiria conspicua Loew, 1846 (S)
Phthiria gaedei Wiedemann in Meigen, 1820 (N, S)
Phthiria minuta (Fabricius, 1805) (N, S)
Phthiria pulicaria (Mikan, 1796) (N, S)
Phthiria scutellaris Wiedemann in Meigen, 1820 (S)
Phthiria subnitens Loew, 1846 (S)
Phthiria umbripennis Loew, 1846 (S, Si)
Phthiria vagans Loew, 1846 (N, S, Si)

Apolysis Loew, 1860

Apolysis cinerea (Séguy, 1926) (N)
Apolysis eremophila Loew, 1873 (S)
Apolysis montivaga François, 1969 (N)

Oligodranes Loew, 1844

Oligodranes obscuripennis Loew, 1844 (S)

Parageron Paramonov, 1929

Parageron incisus (Wiedemann, 1830) (S)

Usia Latreille, 1802

Usia aenea (Rossi, 1794) (S)
Usia aenoides Paramonov, 1950 (S)
Usia angustifrons Becker, 1906 (N, S)
Usia atrata (Fabricius, 1798) (N, S)
Usia aurata (Fabricius, 1794) (S, Sa)
Usia bicolor Macquart, 1855 (S)
Usia engeli Paramonov, 1950 (S)
Usia florea (Fabricius, 1794) (S, Si)
Usia forcipata Brullé, 1832 (S)
Usia grata Loew in Rosenhauer, 1856 (S)
Usia lata Loew, 1846 (S)
Usia loewi Becker, 1906 (S)
Usia manca Loew, 1846 (S, Si) (E)
Usia novaki Strobl, 1902 (S)
Usia punctipennis Loew, 1846 (S)
Usia pusilla Meigen, 1820 (S)

Usia sricula Egger, 1859 (S)
Usia similis Paramonov, 1950 (S)
Usia versicolor (Fabricius, 1794) (S)

Geron Meigen, 1820

Geron albidulus Francois, 1969 (S)
Geron gibbosus (Oliver, 1789) (S, Si)
Geron halteralis Wiedemann in Meigen, 1820 (N, S)
Geron intonsus Bezzi, 1925 (N, S, Si)

Callostoma Macquart, 1840

Callostoma fascipenne Macquart, 1840 (Sa)

Cytherea Fabricius, 1794

Cytherea aurea Fabricius, 1794 (Si)
Cytherea brevirostris (Olivier, 1811) (N, S)
Cytherea holosericea (Fabricius, 1794) (S)
Cytherea infuscata (Meigen, 1820) (S)
Cytherea obscura Fabricius, 1794 (S)
Cytherea pallasii (Loew, 1856) (S)
Cytherea semiargyrea (Strobe, 1905) (S)

Amictus Wiedemann, 1817

Amictus insularis (Rondani, 1863) (S)
Amictus pictus Loew, 1869 (S, Sa)
Amictus validus Loew, 1869 (S)
Amictus variegatus (Meigen in Walzl, 1835) (S)

Eclimus Loew, 1844

Eclimus gracilis Loew, 1844 (S)
Eclimus perspicillaris Loew, 1844 (S)

Acanthogeron Bezzi, 1925

Acanthogeron senex (Wiedemann in Meigen, 1820) (S)
Acanthogeron separatus (Becker, 1906) (S)

Anastoechus Osten-Sacken, 1877

Anastoechus bitinctus Becker, 1916 (S)
Anastoechus exalbidus (Wiedemann in Meigen, 1820) (S)
Anastoechus hyrcanus (Wiedemann, 1818) (S, Si)
Anastoechus nitidulus (Fabricius, 1794) (N, S)

Anastoechus stramineus (Wiedemann in Meigen, 1820) (N, S)
Anastoechus trisignatus Portschinsky, 1881 (S)

Bombylisoma Rondani, 1856

Bombylisoma barbula (Loew, 1855) (N, S)
Bombylisoma brevisculum (Loew, 1855) (N, S)
Bombylisoma flavibarbum (Loew, 1855) (N, S)
Bombylisoma imitator (Loew, 1855) (S)
Bombylisoma melanocephalum (Fabricius, 1794) (N, S)
Bombylisoma minimum (Scopoli, 1772) (N, S)
Bombylisoma nigriceps (Loew, 1862) (N, S)
Bombylisoma notatum (Engel, 1933) (S)
Bombylisoma simulator (Loew, 1855) (S)
Bombylisoma unicolor (Loew, 1855) (N, S)

Bombylius Linnaeus, 1758

Bombylius ambustus Wiedemann, 1818 (N, S, Si)
Bombylius androgynus Loew, 1855 (S)
Bombylius angulatus Macquart, 1826 (S)
Bombylius apulus Cyrillo, 1787 (S) (E) (*)
Bombylius argentifrons Loew, 1873 (N, S, Si)
Bombylius ater Scopoli, 1763 (N, S, Si)
Bombylius canescens Mikan, 1796 (N, S, Si)
Bombylius cinerarius (Wiedemann, 1818) (N, S)
Bombylius cinerascens Mikan, 1796 (N, S)
Bombylius citrinus Loew, 1855 (N, S)
Bombylius cruciatus Fabricius, 1798 (N, S, Si, Sa)
Bombylius discoideus Fabricius, 1794 (N, S)
Bombylius discolor Mikan, 1796 (N, S, Si)
Bombylius elongatus Rossi, 1794 (S) (E) (*)
Bombylius fimbriatus Meigen, 1820
 Bombylius fimbriatus fimbriatus Meigen, 1820 (N, S, Si, Sa)
 Bombylius fimbriatus ventralis Loew, 1855 (Sa)
Bombylius flavipes Wiedemann, 1828 (S)
Bombylius floccosus Loew, 1857 (N, S)
Bombylius fuliginosus Wiedemann in Meigen, 1820 (N, S, Si)
Bombylius fulvescens Wiedemann in Meigen, 1820 (N, S, Si, Sa)
Bombylius fuscus Fabricius, 1781 (N, S, Si)
Bombylius leucopygus Macquart in Lucas, 1849 (S)
Bombylius lugubris Loew, 1855 (N, S)
Bombylius luteolus Evenhuis, 1978 (S)
Bombylius major Linnaeus, 1758
 Bombylius major major Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)
 Bombylius major basilinea Loew, 1855 (Si)
Bombylius marginatus Cyrillo, 1787 (Si) (E) (*)
Bombylius medius Linnaeus, 1758

Bombylius medius medius Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)
Bombylius medius poecilopterus Bezzi, 1925 (Si)
Bombylius melanopygus Bigot, 1860 (Si)
Bombylius minor Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)
Bombylius modestus Loew, 1873 (N, S)
Bombylius morio Olivier, 1789 (N)
Bombylius nanus Meigen, 1838 (N, S) (*)
Bombylius nigripes Macquart, 1844 (Si) (E) (*)
Bombylius nigrita Cyrillo, 1787 (S) (E)
Bombylius niveus Meigen, 1804 (N, S)
Bombylius nubilus Mikan, 1796 (S)
Bombylius pallens Wiedemann in Meigen, 1820 (N)
Bombylius pallidicruris Brullé, 1832 (S)
Bombylius pardalotus François, 1969 (S)
Bombylius pictus Panzer, [1794] (N, S, Si)
Bombylius pumilus Meigen, 1820 (N, S)
Bombylius qudrifarius Loew, 1855 (N, S)
Bombylius rhodius Loew, 1855 (S)
Bombylius semifuscus Meigen, 1820 (N)
Bombylius shelkovnikovi Paramonov, 1926 (S)
Bombylius sticticus Boisduval, 1835 (S, Si, Sa)
Bombylius torquatus Loew, 1855 (N, S)
Bombylius undatus Mikan, 1796
Bombylius undatus undatus Mikan, 1796 (N, S, Si)
Bombylius undatus diagonalis Wiedemann in Meigen, 1820 (N, S)
Bombylius venosus Mikan, 1796 (N, S, Si)
Bombylius vulpinus Wiedemann in Meigen, 1820
Bombylius vulpinus vulpinus Wiedemann in Meigen, 1820 (N, S, Si, Sa)
Bombylius vulpinus palaestinae Paramonov, 1926 (S)

Neobombylodes Evenhuis, 1978

Neobombylodes multisetosus (Loew, 1857) (S)

Conophorus Meigen, 1803

Conophorus alpicola (Villeneuve, 1904) (N)
Conophorus bivittatus (Loew, 1862) (S)
Conophorus fuliginosus (Wiedemann in Meigen, 1820) (N, S)
Conophorus fuminervis (Dufour, 1852) (N, S)
Conophorus fuscipennis (Macquart, 1840) (S)
Conophorus glaucescens (Loew, 1863) (N, S)
Conophorus griseus (Fabricius, 1787) (S)
Conophorus mauritanicus Bigot, 1892 (S)
Conophorus pusillus (Loew, 1869) (S)
Conophorus rossicus Paramonov, 1929 (N, S)
Conophorus validus (Loew, 1869) (S)
Conophorus virescens (Fabricius, 1787) (N, S)

Legnotomyia Bezzi, 1902

Legnotomyia olympiaca François, 1970 (S)
Legnotomyia trichorhoea (Loew, 1855) (S)

Prorachthes Loew, 1868

Prorachthes beckeri Paramonov, 1926
Prorachthes vespertilio (Séguy, 1932) (S)

Systoechus Loew, 1855

Systoechus autumnalis (Wiedemann, 1818) (N, S, Si)
Systoechus ctenopterus (Mikan, 1796)
 Systoechus ctenopterus ctenopterus (Mikan, 1796) (N, S, Si)
 Systoechus ctenopterus aurulentus (Wiedemann in Meigen, 1820) (N, S)
 Systoechus ctenopterus dalmatinus (Loew, 1855) (S)
Systoechus gomezmenori Rubio, 1959 (N, S)
Systoechus gradatus (Wiedemann in Meigen, 1820)
 Systoechus gradatus gradatus (Wiedemann in Meigen, 1820) (N, S)
 Systoechus gradatus lucidus (Loew, 1855) (S, Si)
 Systoechus gradatus tesquorum Becker, 1916 (N, S)
Systoechus longirostris Becker, 1916 (S)
Systoechus microcephalus (Loew, 1855) (N, S, Si)
Systoechus pumilio Becker, 1915 (S)

Cyllenia Latreille, 1802

Cyllenia maculata Latreille, 1805 (N, S)
Cyllenia marginata Loew, 1846 (N, S, Si)
Cyllenia rustica (Rossi, 1790) (S) (*)

Antonia Loew, 1856

Antonia suavissima Loew, 1856 (Si)

Aphoebantus Loew, 1872

Aphoebantus scutellatus (Meigen, 1835)

Cononedys Hermann, 1907

Cononedys erythrasis Hermann, 1907 (S)

Lomatia Meigen, 1822

Lomatia abbreviata Villeneuve, 1913 (S)

Lomatia alecto Loew, 1846 (N, S)
Lomatia atropos Egger, 1859 (S)
Lomatia belzebul (Fabricius, 1794) (N, S)
Lomatia erinnys Loew, 1869 (N, S)
Lomatia fasciculata Loew, 1869 (S)
Lomatia graeca Paramonov, 1928 (S)
Lomatia grajugena Loew, 1869 (S)
Lomatia gratiosa Loew, 1869 (S)
Lomatia hecate Meigen, 1830 (S)
Lomatia infernalis Schiner, 1868 (N, S, Si)
Lomatia lachesis Egger, 1859 (N, S)
Lomatia lateralis (Meigen, 1820) (N, S)
Lomatia obscuripennis Loew, 1869 (N, S)
Lomatia pallida Tsacas, 1962 (S)
Lomatia polyzona Loew, 1869 (N, S, Si)
Lomatia rogenhoferi Nowicki, 1867 (N, S)
Lomatia sabaea (Fabricius, 1781) (N, S, Si)

Anthrax Scopoli, 1763

Anthrax anthrax (Schrank, 1781) (N, S, Si, Sa)
Anthrax binotatus Wiedemann in Meigen, 1820 (N, S, Si, Sa)
Anthrax chionostigma Tsacas, 1962 (S)
Anthrax fuscipennis (Ricardo in Forbes, 1903) (N, S, Si)
Anthrax giselae François, 1966 (S)
Anthrax heteropyga (Sack, 1909) (N, S)
Anthrax leucogaster Wiedemann in Meigen, 1820 (N, S)
Anthrax pallidus François, 1966 (S)
Anthrax pelopeius François, 1966 (S)
Anthrax pilosulus Strobl, 1902 (S)
Anthrax punctulatus Macquart, 1835 (S)
Anthrax sticticus Klug, 1832 (N, S, Si)
Anthrax trifasciatus Meigen, 1804 (S)
Anthrax varius Fabricius, 1794 (N, S, Si)
Anthrax virgo Egger, 1859 (N, S)

Desmatoneura Williston, 1895

Desmatoneura flavifrons (Becker, 1915) (S)
Desmatoneura nivea (Rossi, 1790) (N, S)

Petrorossia Bezzi, 1908

Petrorossia chraminensis Zaitzev, 1962 (S)
Petrorossia hesperus (Rossi, 1790) (S)
Petrorossia letho (Wiedemann, 1828) (S)
Petrorossia stenogastra (A. Costa, 1884) (Sa)

Plesiocera Macquart, 1840

Plesiocera algira Macquart, 1840 (S)

Satyramoeba Sack, 1909

Satyramoeba etrusca (Fabricius, 1794) (N, S)

Spogostylum Macquart, 1840

Spogostylum aethiops (Fabricius, 1781) (N, S)

Spogostylum isis (Meigen, 1820)

Spogostylum trinotatum (Dufour, 1852) (N, S)

Spogostylum tripunctatum (Wiedemann in Meigen, 1820) (N, S)

Spogostylum velox (Loew, 1862) (N, S)

Stomylomyia Bigot, 1888

Stomylomyia europaea (Loew, 1869) (N, S)

Stomylomyia tenella (Loew, 1869) (S)

Caecanthrax Greathead, 1981

Caecanthrax arabicus (Macquart, 1840) (N, S)

Exhyalanthrax Becker, 1916

Exhyalanthrax afer (Fabricius, 1794) (N, S, Si, Sa)

Exhyalanthrax argentifer Becker, 1916 (S)

Exhyalanthrax collarti (François, 1962) (S)

Exhyalanthrax contrarius Becker, 1916 (S)

Exhyalanthrax fimbriatus (Meigen, 1804) (S)

Exhyalanthrax melanchlaenus (Loew, 1869) (S)

Exhyalanthrax vagans (Loew, 1862) (N, S, Si, Sa)

Exoprosopa Macquart, 1840

Exoprosopa baccha Loew, 1869 (S, Si)

Exoprosopa capucina (Fabricius, 1781) (N, S)

Exoprosopa cleomene Egger, 1859 (N, S)

Exoprosopa grandis (Wiedemann in Meigen, 1820) (N, S, Si, Sa)

Exoprosopa italica (Wiedemann in Meigen, 1820) (S) (*)

Exoprosopa jacchus (Fabricius, 1805) (N, S, Si)

Exoprosopa minois Loew, 1869 (N, S, Si)

Exoprosopa minos (Meigen, 1804) (N, S, Si, Sa)

Exoprosopa munda Loew, 1869 (N, S, Si)

Exoprosopa normalis Loew, 1869 (S)

Exoprosopa pallasi (Wiedemann, 1818) (S, Si, Sa)

Exoprosopa pectoralis Loew, 1862 (N, S)
Exoprosopa pygmalion (Fabricius, 1805) (N, S, Si)
Exoprosopa rutila (Wiedemann, 1818)

Hemipenthes Loew, 1869

Hemipenthes hamiferus (Loew, 1854) (N, S, Si)
Hemipenthes maurus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)
Hemipenthes morio (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)
Hemipenthes velutinus (Meigen, 1820) (N, S, Si, Sa)
Hemipenthes villeneuvei François, 1970 (S)

Heteralonia Rondani, 1863

Heteralonia aeacus (Meigen, 1804) (N, S, Si)
Heteralonia algira (Fabricius, 1794) (N, S, Si)
Heteralonia dispar (Loew, 1869) (N, S, Si)
Heteralonia megerlei (Meigen, 1820) (N, S, Si, Sa)
Heteralonia rivularis (Meigen, 1820) (N, S, Si)
Heteralonia suffusa (Klug, 1832) (N, S)

Pachyanthrax François, 1964

Pachyanthrax laconae Greathead, 1981 (S)
Pachyanthrax telamon (Loew, 1869) (N, S)
Pachyanthrax unctus (Loew, 1869) (S)

Ligyra Newman, 1841

Ligyra ferrea (Walker, 1849) (Si)

Micomitra Bowden, 1964

Micomitra iris (Loew, 1869) (N, S, Si, Sa)
Micomitra stupida (Rossi, 1790) (N, S, Si, Sa)

Thyridanthrax Osten Sacken, 1886

Thyridanthrax elegans (Wiedemann in Meigen, 1820) (N, S, Si)
Thyridanthrax fenestratus (Fallen, 1814) (N, S, Si)
Thyridanthrax graecus Paramonov, 1927 (S)
Thyridanthrax incanus (Klug, 1832) (N, S, Si)
Thyridanthrax indigenus (Becker, 1908) (S)
Thyridanthrax lotus (Loew, 1869) (N, S)
Thyridanthrax mutilus (Loew, 1869) (S)
Thyridanthrax nebulosus (Dufour, 1852) (S)
Thyridanthrax obliteratus (Loew, 1862) (N, S)
Thyridanthrax perspicillaris (Loew, 1869) (N, S, Si)

Thyridanthrax polyphemus (Wiedemann in Meigen, 1820) (N, S)

Veribudo Evenhuis, 1978

Veribudo angusteoculatus (Becker, 1902) (N, S)

Veribudo misellus (Loew, 1869) (S)

Villa Lioy, 1864

Villa abbadon (Fabricius, 1794) (N, S)

Villa albida Becker, 1918 (S)

Villa albula (Loew, 1869) (N, S)

Villa brunnea Becker, 1916 (N, S, Si)

Villa ceballosi Rubio, 1959 (N, S, Si)

Villa cingulata (Meigen, 1804) (N, S, Si, Sa)

Villa cingulum (Wiedemann in Meigen, 1820) (N, S, Si)

Villa circumdata (Meigen, 1820) (N, S, Si, Sa)

Villa claripennis (Kowarz, 1867) (N, S, Si)

Villa clarissima (Loew, 1857) (N, S, Si)

Villa deludens François, 1966 (N, S)

Villa distincta (Meigen, 1838) (S)

Villa euzona (Loew, 1869) (N, S, Si)

Villa fasciculata Becker, 1916 (N, S, Si)

Villa gooti François, 1969 (S)

Villa haesitans Becker, 1916 (N, S)

Villa halteralis (Kowarz, 1883) (N, S, Si)

Villa hottentotta (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Villa humilis (Ruthe, 1831) (N, S)

Villa ixion (Fabricius, 1794) (N, S)

Villa leucostoma (Meigen, 1820) (N, S)

Villa melanura (Loew, 1869) (N, S, Si)

Villa modesta (Meigen, 1820) (N, S, Si)

Villa multibalteata Austen, 1936 (N, S)

Villa niphobleta (Loew, 1869) (N, S, Si, Sa)

Villa occulta (Wiedemann in Meigen, 1820) (N, S, Si)

Villa paniscus (Rossi, 1790) (N, S, Si, Sa)

Villa parilis François, 1969 (N, S)

Villa praetermissa François, 1967 (N, S)

Villa pygarga (Loew, 1868) (N, S)

Villa quinquefasciata (Wiedemann in Meigen, 1820) (N, S, Si)

Villa senecio (Loew, 1869) (N, S)

Villa stenozone (Loew, 1869) (N, S, Si)

Villa tomentosa Becker, 1916 (N, S, Si)

Villa ventruosa (Loew, 1869) (N, S, Si, Sa)

Villa venusta (Meigen, 1820) (N, S, Si)

Note

Bombylius apulus: Specie trasferita nella famiglia dei Tabanidae.

Bombylius elongatus: Specie dubbia.

Bombylius marginatus: Specie trasferita nella famiglia dei Tabanidae.

Bombylius nanus: Specie dubbia.

Bombylius nigripes: Specie trasferita nella famiglia dei Tabanidae.

Cyllenia rustica: Specie dubbia.

Exoprosopa italica: Al genere *Exoprosopa* dovrebbe appartenere anche una *E. italica* (Rossi, 1794), la cui identità è però dubbia. Si rende dunque necessaria una revisione, anche in considerazione della possibile omonimia secondaria tra la specie di Rossi e quella di Wiedemann in Meigen.

Therevidae

Salentia A. Costa, 1857

Salentia fuscipennis A. Costa, 1857 (Si)

Acrosathe Irwin & Lyneborg, 1981

Acrosathe annulata (Fabricius, 1805) (N)

Acrosathe sybarita (Loew, 1873) (S, Si)

Clorismia Enderlein, 1927

Clorismia ardea (Fabricius, 1794) (N)

Clorismia rustica (Panzer, [1804]) (N)

Dialineura Rondani, 1856

Dialineura anilis (Linné, 1761) (N)

Euphycus Kröber, 1912

Euphycus dispar (Meigen, 1820) (S?, Si?)

Pandivirilia Irwin & Lyneborg, 1981

Pandivirilia caesia (Meigen, 1838) (N)

Pandivirilia eximia (Meigen, 1820) (N)

Pandivirilia melaleuca (Loew, 1847) (N)

Thereva Latreille, 1796

Thereva apicalis Wiedemann, 1821 (N?)

Thereva aurata Loew, 1854 (N)

Thereva bicinctella A. Costa, 1883 (Sa)

Thereva binotata Loew, 1847 (Si)

Thereva brevicornis Loew, 1847 (N)
Thereva cincta Meigen, 1820 (N, S, Si)
Thereva fulva Meigen, 1804 (N)
Thereva inornata Verrall, 1909 (N, S)
Thereva marginula Meigen, 1820 (S)
Thereva microcephala Loew, 1847 (N)
Thereva nobilitata (Fabricius, 1775) (N, S, Si)
Thereva obtecta Loew, 1847 (Si)
Thereva oculata Egger, 1859 (N)
Thereva plebeja (Linné, 1758) (N, S)
Thereva spiloptera Wiedemann, 1824 (Si)
Thereva spinulosa Loew, 1847 (Si)
Thereva strigata (Fabricius, 1794) (N, S, Si)
Thereva tristis Loew, 1847 (S)
Thereva tuberculata Loew, 1847 (Si)
Thereva valida Loew, 1847 (N)

Scenopinidae

Scenopinus Latreille, 1802

Scenopinus albicinctus (Rossi, 1794) (N, S, Si)
Scenopinus fenestralis (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)
Scenopinus glabrifrons Meigen, 1824 (S, Si, Sa) (*)
Scenopinus niger (De Geer, 1776)

Note

Scenopinus: Il nome generico Omphrale Meigen, 1800 è stato soppresso dalla International Commission on Zoological Nomenclature (Opinion 678, 1963).
Scenopinus glabrifrons: Prima segnalazione per la Sardegna.

Vermileonidae

Vermileo Macquart, 1834

Vermileo vermileo (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Lampromyia Macquart, 1835

Lampromyia pallida Macquart, 1835 (Si?)

Mydidae

Leptomydas Gerstaecker, 1868

Leptomydas sardous (A. Costa, 1884) (Sa)
Leptomydas rufipes (Westwood, 1841) (Si)

Asilidae

Choerades Walker, 1851

Choerades dioctriaeformis (Meigen, 1820) (N)
Choerades fimbriata (Meigen, 1820) (N, S)
Choerades fulva (Meigen, 1804) (N, S)
Choerades gilva (Linnaeus, 1758) (N, S)
Choerades ignea (Meigen, 1820) (N, S)
Choerades marginata (Linnaeus, 1758) (N, S)
Choerades rufipes (Fallén, 1814) (N)

Laphria Meigen, 1803

Laphria aurea (Fabricius, 1794) (N, S)
Laphria bomboides Macquart in Lucas, 1849 (S)
Laphria ephippium (Fabricius, 1781) (N)
Laphria flava (Linnaeus, 1761) (N)
Laphria galathei Costa, 1857 (S)
Laphria gibbosus (Linnaeus, 1758) (N, S)
Laphria meridionalis Mulsant & Revelière, 1860 (N?)
Laphria nitidula (Fabricius, 1794) (N?, S?) (E)
Laphria scutellata Macquart, 1835 (N?, S?)
Laphria venatrix Loew, 1847 (Si) (E)
Laphria vulpina Meigen, 1820 (N, S)

Andrenosoma Rondani, 1856

Andrenosoma albibarbe (Meigen, 1820) (N)
Andrenosoma atra (Linnaeus, 1758) (N)

Pogonosoma Rondani, 1856

Pogonosoma maroccanum (Fabricius, 1794) (N, S)
Pogonosoma minor Loew, 1869 (N, S)

Laphystia Loew, 1847

Laphystia erberi (Schiner, 1865) (N, S)
Laphystia sabulicola Loew, 1847 (N?)

Triclis Loew, 1851

Triclis octodecimnotatus A. Costa, 1893 (Si)
Triclis olivaceus (Loew, 1851) (N?, S?)

***Dioctria (Dioctria)* Meigen, 1803**

Dioctria (Dioctria) atricapilla Meigen, 1804 (N, S)
Dioctria (Dioctria) bicincta Meigen, 1820 (S)
Dioctria (Dioctria) bigoti A. Costa, 1884 (Sa) (E)
Dioctria (Dioctria) calceata Meigen, 1820 (N)
Dioctria (Dioctria) fuscipes Macquart, 1834 (Si) (E)
Dioctria (Dioctria) gagates Wiedemann in Meigen, 1820 (N, S)
Dioctria (Dioctria) gracilis Meigen, 1820 (Sa?)
Dioctria (Dioctria) hyalipennis (Fabricius, 1794) (N, S)
Dioctria (Dioctria) linearis (Fabricius, 1787) (N, S)
Dioctria (Dioctria) meridionalis Bezzi, 1898 (N) (E)
Dioctria (Dioctria) rufipes (De Geer, 1776) (N, S)

***Lasiopogon* Loew, 1847**

Lasiopogon apenninus Bezzi, 1921 (N) (E)
Lasiopogon bezzii Engel, 1929 (N?, S?)
Lasiopogon cinctus (Fabricius, 1781) (N, S)
Lasiopogon immaculatus Strobl, 1893 (N)
Lasiopogon montanus Schiner, 1862 (N)
Lasiopogon tarsalis Loew, 1847 (N)

***Stichopogon (Stichopogon)* Loew, 1847**

Stichopogon (Stichopogon) elegantulus (Wiedemann in Meigen, 1820) (N, Sa)
Stichopogon (Stichopogon) inaequalis Loew, 1847 (N, S)
Stichopogon (Stichopogon) kerteszi Bezzi, 1910 (S) (E)
Stichopogon (Stichopogon) scaliger Loew, 1847
 Stichopogon (Stichopogon) scaliger scaliger Loew, 1847 (N)
 Stichopogon (Stichopogon) scaliger conjungens Bezzi, 1910 (N, S)
Stichopogon (Stichopogon) schineri Koch, 1872 (N)

***Ancylorhynchus* Berthold, 1827**

Ancylorhynchus cingulatus (Rondani, 1846) (N) (E)
Ancylorhynchus glaucius (Rossi, 1790) (N)
Ancylorhynchus longicornis (Schiner, 1867) (Si)

***Cyclosocerus* Bezzi, 1927**

Cyclosocerus platycerus (Villeneuve, 1913) (N)

***Cyrtopogon* Loew, 1847**

Cyrtopogon culminus Bigot, 1885 (N)
Cyrtopogon fulvicornis (Macquart, 1834)
 Cyrtopogon fulvicornis fulvicornis (Macquart, 1834) (N)
 Cyrtopogon fulvicornis variicornis Bezzi, 1899 (N)
Cyrtopogon lateralis (Fallén, 1814) (N)
Cyrtopogon longibarbus Loew, 1857 (N)
Cyrtopogon maculipennis (Macquart, 1834) (N, S)
Cyrtopogon meyerduerii Mik, 1864 (N)
Cyrtopogon pedemontanus (Bezzi, 1927) (N, S) (E)
Cyrtopogon ruficornis (Fabricius, 1794) (N)

Habropogon Loew, 1847

Habropogon appendiculatus Schiner, 1867 (N)
Habropogon exquisitus (Wiedemann in Meigen, 1820) (N, S)

Holopogon Loew, 1847

Holopogon brunnipes (Meigen, 1820) (N)
Holopogon dimidiatus (Meigen, 1820) (N)
Holopogon fumipennis (Meigen, 1820) (N, S)
Holopogon nigriacies Bezzi, 1900 (N, S)
Holopogon nigripennis (Meigen, 1820) (N)
Holopogon venustus (Rossi, 1790) (N, S)

Pycnopogon Loew, 1847

Pycnopogon fasciculatus (Loew, 1847) (N, S, Si)

Stenopogon Loew, 1847

Stenopogon coracinus (Loew, 1847) (N)
Stenopogon roederii Bezzi, 1895 (S)
Stenopogon sabaudus (Fabricius, 1794) (N, S)

Leptarthrus Stephens, 1829

Leptarthrus brevirostris (Meigen, 1804) (N)

Dasypogon Meigen, 1803

Dasypogon diadema (Fabricius, 1781) (N, S)
Dasypogon fabricii Wiedemann in Meigen, 1820 (N) (E)

Saropogon Loew, 1847

Saropogon axillaris Loew, 1851 (N?) (E)
Saropogon comosus Loew, 1869 (N?)

Saropogon leucocephalus (Meigen, 1820) (S)
Saropogon luctuosus (Wiedemann in Meigen, 1820)
 Saropogon luctuosus luctuosus (Wiedemann in Meigen, 1820) (S)
 Saropogon luctuosus ticinense Bezzi, 1892 (S) (E)
Saropogon perlatus A. Costa, 1884 (Sa) (E)

Leptogaster Meigen, 1803

Leptogaster antenorea (Lioy, 1864) (N) (E)
Leptogaster cylindrica (De Geer, 1776)
 Leptogaster cylindrica cylindrica (De Geer, 1776) (N, S, Si)
 Leptogaster cylindrica hispanica Meigen, 1838 (N, S)
 Leptogaster cylindrica pedunculata Loew, 1847 (Si)
Leptogaster pubicornis Loew, 1847 (N, S)
Leptogaster subtilis Loew, 1847 (N)

Acanthopleura Engel, 1927

Acanthopleura brunnipes (Fabricius, 1794)
 Acanthopleura brunnipes brunnipes (Fabricius, 1794) (S)
 Acanthopleura brunnipes europaea Tsacas, 1964 (Si?)

Antipalus Loew, 1849

Antipalus similis Moucha & Hradsky, 1966 (N)
Antipalus varipes (Meigen, 1820) (N)

Antiphrisson Loew, 1849

Antiphrisson trifarius (Loew, 1849) (Si)

Asilus Linnaeus, 1758

Asilus barbarus Linnaeus, 1758 (S)
Asilus crabroniformis Linnaeus, 1758 (N, S)

Cerdistus Loew, 1849

Cerdistus erythrurus (Meigen, 1820) (N, S, Si)
Cerdistus zelleri Schiner, 1862 (N, S, Si)

Dysmachus Loew, 1860

Dysmachus bifurcus (Loew, 1848) (N, S)
Dysmachus bimucronatus (Loew, 1854) (N, S)
Dysmachus cochleatus (Loew, 1854) (S)
Dysmachus decipiens (Wiedemann in Meigen, 1820) (S)
Dysmachus fuscipennis (Meigen, 1820) (N)

Dysmachus hamulatus (Loew, 1854) (N)
Dysmachus picipes (Meigen, 1820) (N, S)
Dysmachus stylifer (Loew, 1854) (N, S)
Dysmachus trigonus (Meigen, 1804) (N, S)

Epitriptus Loew, 1849

Epitriptus arthriticus (Zeller, 1840) (N, S)
Epitriptus cingulatus (Fabricius, 1781) (N, S)
Epitriptus emarginatus (Loew, 1849) (S)
Epitriptus inconstans (Wiedemann in Meigen, 1820) (S)
Epitriptus setosulus (Zeller, 1840) (N)

Erax Scopoli, 1763

Erax punctipennis (Meigen, 1820) (N)

Etolmus Loew, 1848

Etolmus kiesenwetteri Loew, 1854 (N)
Etolmus mediocris Becker, 1923 (N)
Etolmus rufibarbis (Meigen, 1820) (N, S)

Machimus (Machimus) Loew, 1849

Machimus (Machimus) caliginosus (Meigen, 1820) (N)
Machimus (Machimus) chrystis (Meigen, 1820) (N)
Machimus (Machimus) cribratus (Loew, 1849) (S)
Machimus (Machimus) cyanopus (Loew, 1849) (N)
Machimus (Machimus) dasypygus (Loew, 1849) (S, Si)
Machimus (Machimus) fimbriatus (Meigen, 1804) (N, S)
Machimus (Machimus) fortis (Loew, 1849) (S)
Machimus (Machimus) gonatistes (Zeller, 1840) (N)
Machimus (Machimus) lacinulatus Loew, 1854 (N, S)
Machimus (Machimus) minusculus Bezzi, 1899 (S)
Machimus (Machimus) pilipes (Meigen, 1820) (S)
Machimus (Machimus) rusticus (Meigen, 1820) (N, S)
Machimus (Machimus) setibarbis (Loew, 1849) (N)

Neoitamus Osten-Sacken, 1878

Neoitamus castellanii Hradsky, 1956 (N) (E)
Neoitamus cothurnatus (Meigen, 1820) (N)
Neoitamus cyanurus (Loew, 1849) (N)
Neoitamus splendidus Oldenberg, 1912 (N)

Neomochtherus Osten-Sacken, 1878

Neomochtherus firmus Tsacas, 1968 (S) (E)
Neomochtherus flavicornis (Ruthe, 1831) (N)
Neomochtherus sardus Tsacas, 1965 (Sa) (E)
Neomochtherus schineri (Egger, 1855) (N)
Neomochtherus striatipes (Loew, 1849) (Si)

Pamponerus Loew, 1849

Pamponerus germanicus (Linnaeus, 1758) (N)

Philonicus Loew, 1849

Philonicus albiceps (Meigen, 1820) (N, S)

Stilpnogaster Loew, 1849

Stilpnogaster aemula (Meigen, 1820)
Stilpnogaster aemula aemula (Meigen, 1820) (N?, S?)
Stilpnogaster aemula setiventris (Zetterstedt, 1860) (N)

Tolmerus Loew, 1849

Tolmerus atricapillus (Fallén, 1814) (N)
Tolmerus atripes Loew, 1854 (N)
Tolmerus lesinensis Palm, 1876 (N, S)
Tolmerus poecilogaster (Loew, 1849) (N)
Tolmerus pyragra (Zeller, 1840) (N?)
Tolmerus tessellatus (Loew, 1849) (N)

Microphoridae

Microphor Macquart, 1827

Microphor albopilosus (Becker, 1910) (Si)
Microphor anomalus (Meigen, 1824) (N)
Microphor crassipes Macquart, 1827 (N, S)
Microphor holosericeus (Meigen, 1804) (N)
Microphor intermedius (Collin, 1961) (N)
Microphor rostellatus (Loew, 1864) (N)

Parathalassius Mik, 1891

Parathalassius blasigii Mik, 1891 (N, S)

Microphorella Becker, 1909

Microphorella curtipes (Becker, 1910) (N, S)

Hybotidae

Trichina Meigen, 1830

Trichina clavipes Meigen, 1830 (N)

Trichina opaca Loew, 1864 (N)

Bicellaria Macquart, 1823

Bicellaria alpina Bezzi, 1918 (N)

Bicellaria austriaca Tuomikoski, 1955 (N)

Bicellaria dispar Oldelberg, 1920 (N)

Bicellaria intermedia Lundbeck, 1910 (N)

Bicellaria nigra (Meigen, 1824) (N)

Bicellaria spuria (Fallén, 1816) (N)

Bicellaria sulcata (Zetterstedt, 1842) (N)

Bicellaria vana Collin, 1926 (N)

Oedalea Meigen, 1920

Oedalea holmgreni Zetterstedt, 1852 (N)

Oedalea stigmatella Zetterstedt, 1842 (N)

Oedalea tristis Scholz, 1851 (N)

Oedalea zetterstedti Collin, 1926 (N)

Ocydromia Meigen, 1820

Ocydromia glabricula Fallén, 1816 (N, S)

Ocydromia melanopleura Loew, 1840 (N)

Leptopeza Macquart, 1827

Leptopeza borealis Zetterstedt, 1842 (N)

Leptopeza flavipes (Meigen, 1820) (N)

Oropezella Collin, 1926

Oropezella sphenoptera (Loew, 1873) (N)

Syneches Walker, 1852

Syneches muscarius (Fabricius, 1794) (N, S, Si?)

Hybos Meigen, 1803

Hybos culiciformis (Fabricius, 1775) (N, S, Si?)

Hybos grossipes (Linnaeus, 1767) (N)

Syndyas Loew, 1857

Syndyas nigripes (Zetterstedt, 1842) (N, S, Si?)

Symballophthalmus Becker, 1889

Symballophthalmus viennai Raffone, 1986 (N)

Platypalpus Macquart, 1827

Platypalpus aeneus (Macquart, 1823) (N, S)
Platypalpus agilis (Meigen, 1822) (N)
Platypalpus albicornis (Zetterstedt, 1842) (N)
Platypalpus albocapillatus (Fallén, 1815) (S)
Platypalpus albomicans (Bezzi, 1892) (N)
Platypalpus alpigenus (Strobl, 1893) (N)
Platypalpus alpinus Chvala, 1971 (N)
Platypalpus analis (Meigen, 1830) (N)
Platypalpus annulatus (Fallén, 1815) (N)
Platypalpus annulipes (Meigen, 1822) (N)
Platypalpus articulatoides (Frey, 1918) (N)
Platypalpus articulatus Macquart, 1827 (N)
Platypalpus baldensis (Strobl, 1899) (N)
Platypalpus boreoalpinus Frey, 1943 (N)
Platypalpus brachystylus (Bezzi, 1892) (N)
Platypalpus calceatus (Meigen, 1822) (N, S)
Platypalpus candidans (Fallén, 1815) (N)
Platypalpus ciliaris (Fallén, 1816) (N)
Platypalpus cilitarsis Frey, 1943 (N)
Platypalpus commutatus (Strobl, 1893) (N)
Platypalpus confiformis Chvala, 1971 (N)
Platypalpus cothurnatus Macquart, 1827 (N)
Platypalpus cruralis (Collin, 1961) (N)
Platypalpus cursitans (Fabricius, 1775) (N, S, Si?)
Platypalpus dilatovittatus (Strobl, 1910) (N)
Platypalpus engadinicus (Mik, 1896) (N)
Platypalpus eumelaenus (Mik, 1884) (N)
Platypalpus excisus (Becker, 1907) (N)
Platypalpus eximius (Oldenberg, 1924) (N)
Platypalpus fasciatus (Meigen, 1822) (N)
Platypalpus flavicornis (Meigen, 1822) (N)
Platypalpus flaviseta Chvala, 1973 (N)
Platypalpus fuscicornis (Zetterstedt, 1842) (N)
Platypalpus hackmani Chvala, 1972 (N)
Platypalpus laticinctus Walker, 1851 (N)
Platypalpus leucothrix (Strobl, 1920) (N)

Platypalpus longimanus (Corti, 1907) (N)
Platypalpus longiseta (Zetterstedt, 1842) (N)
Platypalpus luteicornis (Meigen, 1838) (N)
Platypalpus luteolus (Collin, 1926) (N)
Platypalpus luteus (Meigen, 1804) (N)
Platypalpus macula (Zetterstedt, 1842) (N)
Platypalpus maculipes (Meigen, 1822) (N, S)
Platypalpus major (Zetterstedt, 1842) (N)
Platypalpus mikii (Becker, 1890) (N)
Platypalpus minutus (Meigen, 1804) (N, S?, Si)
Platypalpus multisetosus (Bezzi, 1899) (S)
Platypalpus nigricoxa (Mik, 1884) (N)
Platypalpus niger (Meigen, 1804) (N)
Platypalpus nigrinus (Meigen, 1822) (N)
Platypalpus nigrosetosus (Strobl, 1893) (N)
Platypalpus niveisetoides Chvala, 1973 (N)
Platypalpus nonstriatus (Strobl, 1901) (N)
Platypalpus notatus (Meigen, 1822) (N)
Platypalpus obscuripes (Strobl, 1899) (N, S)
Platypalpus obscurus (von Roser, 1840) (N)
Platypalpus optivus (Collin, 1926) (N)
Platypalpus ostiorum (Becker, 1902) (N)
Platypalpus pallidiventris (Meigen, 1822) (N, Si?)
Platypalpus pallipes (Fallén, 1815) (N)
Platypalpus pectoralis (Fallén, 1815) (N)
Platypalpus pseudociliaris (Strobl, 1910) (S)
Platypalpus pseudorapidus Kovalev, 1971 (N)
Platypalpus pseudounguiculatus (Strobl, 1909) (Si?)
Platypalpus spinicercus Chvala, 1981 (N)
Platypalpus stigma (Collin, 1926) (N, S)
Platypalpus stigmatellus (Zetterstedt, 1842) (N)
Platypalpus stroblii (Mik, 1900) (N)
Platypalpus tergestinus Egger, 1860 (N)
Platypalpus vegetus Frey, 1943 (N)
Platypalpus vegrandis Frey, 1943 (N)
Platypalpus verralli Collin, 1926 (S, Si?)

Tachypeza Meigen, 1830

Tachypeza truncorum (Fallén, 1815) (N, S)

Tachydromia Meigen, 1803

Tachydromia alteropicta (Becker, 1889) (Si?)
Tachydromia annulimana Meigen, 1822 (N, S)
Tachydromia connexa Meigen, 1822 (N)
Tachydromia costalis (von Roser, 1840) (N)
Tachydromia denticulata (Oldenberg, 1912) (N)

Tachydromia interrupta (Loew, 1864) (N)
Tachydromia nigerrima (Bezzi, 1918) (N)
Tachydromia ornatipes (Becker, 1890) (N)
Tachydromia smithi Chvala, 1966 (N)
Tachydromia styriaca (Strobl, 1893) (N)
Tachydromia umbrarum Haliday, 1833 (N)

Drapetis (Drapetis) Meigen, 1822

Drapetis (Drapetis) exilis Meigen, 1822 (N, S)
Drapetis (Drapetis) infitalis Collin, 1961 (N)
Drapetis (Drapetis) simulans Collin, 1961 (N)

Drapetis (Elaphropeza) Macquart, 1827

Drapetis (Elaphropeza) boergei Chvala, 1971 (Si, Sa)
Drapetis (Elaphropeza) ehippiata (Fallén, 1815) (N, S, Si)

Crossopalpus Bigot, 1857

Crossopalpus aeneus (Walker, 1871) (N, S, Si?, Sa)
Crossopalpus bonomettoi Raffone, 1984 (Sa)
Crossopalpus curvipes (Meigen, 1822) (N, S, Sa)
Crossopalpus demartini Raffone, 1984 (Si?)
Crossopalpus flexuosus (Loew, 1840) (S)
Crossopalpus giordanii Raffone, 1983 (N)
Crossopalpus humilis (Frey, 1913) (N)
Crossopalpus nigrifellus (Zetterstedt, 1842) (N, S)
Crossopalpus pilipes (Loew, 1859) (N, S, Si?)
Crossopalpus setiger (Loew, 1859) (N, S?, Sa)

Chersodromia Walker, 1949

Chersodromia adriatica Chvala, 1970 (N, S)
Chersodromia ancilottoi Raffone, Rampini & Scarpa, 1988 (N)
Chersodromia foddaiiae Raffone, 1994 (N)
Chersodromia italica Chvala, 1970 (N, Sa)
Chersodromia neocurtipennis Beschovski, 1974 (N)
Chersodromia nigrosetosa Chvala, 1970 (N, S)
Chersodromia oraria Collin, 1966 (N, S)
Chersodromia pontica Chvala, 1970 (S)

Stilpon Loew, 1859

Stilpon graminum (Fallén, 1815) (N, S)

Empididae

***Iteaphila* Zetterstedt, 1838**

Iteaphila italica Loew, 1873 (S)

Iteaphila nitidula Zetterstedt, 1838 (N)

***Anthepiscopus* Becker, 1891**

Anthepiscopus caelebs Becker, 1891 (N)

Anthepiscopus ribesii Becker, 1891 (N)

***Hilara* Meigen, 1822**

Hilara aeronetha Mik, 1892 (N, S)

Hilara albipennis von Roser, 1840 (N)

Hilara albitarsis von Roser, 1840 (N)

Hilara albiventris von Roser, 1840 (N)

Hilara beckeri Strobl, 1892 (N)

Hilara biseta Collin, 1927 (N)

Hilara bistriata Zetterstedt, 1842 (N)

Hilara bovina Becker, 1910 (Si)

Hilara brevopilosa Collin, 1927 (N)

Hilara brevistyla Collin, 1927 (Sa)

Hilara caerulescens Oldenberg, 1916 (N)

Hilara canescens Zetterstedt, 1849 (N)

Hilara chorica (Fallén, 1816) (N)

Hilara cilipes Meigen, 1822 (N)

Hilara clypeata Meigen, 1822 (N)

Hilara coracina Oldenberg, 1916 (N)

Hilara cornicula Loew, 1873 (N)

Hilara curtisi Collin, 1927 (N)

Hilara dimidiata Strobl, 1892 (N)

Hilara discolor Strobl, 1892 (N)

Hilara femorella Zetterstedt, 1842 (N)

Hilara fulvibarba Strobl, 1899 (N)

Hilara fuscipes (Fabricius, 1794) (N)

Hilara gallica (Meigen, 1804) (N)

Hilara griseola (Zetterstedt, 1838) (N)

Hilara hirtipes Collin, 1927 (N)

Hilara hystrix Strobl, 1892 (N)

Hilara intersticta (Fallén, 1816) (N)

Hilara lasiochira Strobl, 1892 (N)

Hilara longivittata Zetterstedt, 1842 (N)

Hilara lundbecki Frey, 1913 (N)

Hilara manicata Meigen, 1822 (N)

Hilara matronella Straka, 1976 (N)

Hilara maura (Fabricius, 1776) (N, S)

Hilara miriptera Straka, 1976 (N?)
Hilara nigrina (Fallén, 1816) (N)
Hilara nigrohirta Collin, 1927 (S)
Hilara perversa Oldenberg, 1916 (N)
Hilara platyura Loew, 1873 (S)
Hilara pseudochorica Strobl, 1892 (N)
Hilara pruinosa Wiedemann, 1822 (N)
Hilara rejecta Collin, 1927 (N)
Hilara sartor Becker, 1888 (N)
Hilara scrobiculata Loew, 1873 (N)
Hilara strobliana Bezzi, 1899 (S)
Hilara tanythrix Frey, 1913 (N)
Hilara tenella (Fallén, 1816) (N)
Hilara triglavensis Straka, 1976 (N?)
Hilara tyrolensis Strobl, 1892 (N)
Hilara veneta Collin, 1966 (N)
Hilara woodi Collin, 1927 (N)

***Empis (Euempis)* Frey, 1953**

Empis (Euempis) calcarata Bezzi, 1899 (S)
Empis (Euempis) ciliata Fabricius, 1758 (N, S)
Empis (Euempis) erosa Loew, 1869 (N)
Empis (Euempis) picipes Meigen, 1804 (N)
Empis (Euempis) sericans Brullè, 1832 (Si)

***Empis (Pachymeria)* Stephens, 1829**

Empis (Pachymeria) femorata Fabricius, 1798 (N)
Empis (Pachymeria) picena Bezzi, 1899 (N, S)
Empis (Pachymeria) scotica Curtis, 1835 (N)
Empis (Pachymeria) tumida Meigen, 1822 (N)

***Empis (Polyblepharis)* Bezzi, 1909**

Empis (Polyblepharis) opaca Meigen, 1804 (S)

***Empis (Leptempis)* Collin, 1926**

Empis (Leptempis) adusta Loew, 1869 (N)
Empis (Leptempis) affinis Egger, 1860 (Si)
Empis (Leptempis) alpina Loew, 1867 (N)
Empis (Leptempis) confusa Loew, 1865 (N, S)
Empis (Leptempis) dimidiata Meigen, 1835 (S)
Empis (Leptempis) discolor Loew, 1856 (N)
Empis (Leptempis) flavitarsis von Roser, 1840 (N)
Empis (Leptempis) grisea Fallén, 1816 (N)
Empis (Leptempis) maculata Fabricius, 1781 (N, S)

Empis (Leptempis) mesogramma Loew, 1867 (N, S)
Empis (Leptempis) nigricans Meigen, 1804 (N)
Empis (Leptempis) pteropoda Egger, 1860 (N?)

***Empis (Anacrostichus)* Bezzi, 1909**

Empis (Anacrostichus) lucida Zetterstedt, 1838 (N?)
Empis (Anacrostichus) monticola Loew, 1868 (N?)
Empis (Anacrostichus) nitida Meigen, 1804 (N)

***Empis (Platyptera)* Meigen, 1803**

Empis (Platyptera) borealis Linnaeus, 1758 (N?)

***Empis (Empis)* Linnaeus, 1758**

Empis (Empis) aestiva Loew, 1867 (N)
Empis (Empis) alampira Loew, 1873 (N)
Empis (Empis) alpicola Strobl, 1893 (N)
Empis (Empis) baldensis Strobl, 1899 (N)
Empis (Empis) ciliatipennata Strobl, 1893 (N)
Empis (Empis) corvina Loew, 1899 (N)
Empis (Empis) dasypoda Egger, 1860 (Si)
Empis (Empis) decora Meigen, 1822 (N)
Empis (Empis) florisomna Loew, 1856 (N)
Empis (Empis) genualis Strobl, 1893 (N)
Empis (Empis) hystrix Loew, 1865 (Si)
Empis (Empis) lepidopus Meigen, 1822 (N, S)
Empis (Empis) maerens Loew, 1867 (N?)
Empis (Empis) nigricoma Loew, 1867 (N?)
Empis (Empis) nigripes Fabricius, 1794 (N)
Empis (Empis) nigriritibialis Strobl, 1898 (N)
Empis (Empis) pennipes Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa?)
Empis (Empis) planetica Collin, 1927 (N)
Empis (Empis) procera Loew, 1873 (N)
Empis (Empis) prodromus Loew, 1867 (N)
Empis (Empis) protarsalis Collin, 1927 (N)
Empis (Empis) pusio Egger, 1860 (N)
Empis (Empis) scaura Loew, 1867 (N)
Empis (Empis) sricula Loew, 1867 (Si)
Empis (Empis) simulium (Novicki, 1868) (N)
Empis (Empis) tanysphyra Loew, 1873 (N)
Empis (Empis) woodi Collin, 1927 (N)

***Empis (Coptophlebia)* Bezzi, 1909**

Empis (Coptophlebia) abbreviata Loew, 1869 (N)
Empis (Coptophlebia) albinervis Meigen, 1822 (N)

Empis (Coptophlebia) leptomorion Bezzi, 1909 (N)
Empis (Coptophlebia) pavesii Bezzi, 1895 (S)

***Empis (Xanthempis)* Bezzi, 1909**

Empis (Xanthempis) aequalis Loew, 1867 (N)
Empis (Xanthempis) albifrons Bezzi, 1909 (N)
Empis (Xanthempis) diagramma Meigen, 1835 (N)
Empis (Xanthempis) kuntzei Becker, 1910 (N)
Empis (Xanthempis) lutea Meigen, 1804 (N)
Empis (Xanthempis) punctata Meigen, 1804 (N)
Empis (Xanthempis) scutellata Curtis, 1835 (N)
Empis (Xanthempis) semicinerea Loew, 1867 (N)
Empis (Xanthempis) stercorea Linnaeus, 1761 (N, S)
Empis (Xanthempis) styriaca Strobl, 1893 (N)
Empis (Xanthempis) trigramma Wiedemann, 1822 (N)

***Empis (Lissemphis)* Bezzi, 1909**

Empis (Lissemphis) cuneipennis Bezzi, 1899 (S)
Empis (Lissemphis) liosoma Bezzi, 1909 (N)
Empis (Lissemphis) nigratarsis Meigen, 1804 (N)

***Rhamphomyia (Aclonempis)* Collin, 1926**

Rhamphomyia (Aclonempis) albohirta Collin, 1926 (N)
Rhamphomyia (Aclonempis) andalusiaca Strobl, 1899 (N)
Rhamphomyia (Aclonempis) clypeata Macquart, 1834 (Si)
Rhamphomyia (Aclonempis) eupterota Loew, 1873 (N)
Rhamphomyia (Aclonempis) galactoptera Strobl, 1893 (N)
Rhamphomyia (Aclonempis) leptopus Loew, 1873 (N)
Rhamphomyia (Aclonempis) longipes (Meigen, 1804) (N)
Rhamphomyia (Aclonempis) minor Oldenberg, 1922 (N)
Rhamphomyia (Aclonempis) nox Oldenberg, 1917 (N)
Rhamphomyia (Aclonempis) nubes (Collin, 1969) (N?)
Rhamphomyia (Aclonempis) umbripes Becker, 1887 (N)

***Rhamphomyia (Rhamphomyia)* Meigen, 1822**

Rhamphomyia (Rhamphomyia) albosegmentata (Zetterstedt, 1838) (N?)
Rhamphomyia (Rhamphomyia) anthracina Meigen, 1822 (N?)
Rhamphomyia (Rhamphomyia) armimana Oldenberg, 1910 (N?)
Rhamphomyia (Rhamphomyia) aucta Oldenberg, 1917 (N)
Rhamphomyia (Rhamphomyia) brevipila Oldenberg, 1922 (N)
Rhamphomyia (Rhamphomyia) chionoptera Bezzi, 1904 (N)
Rhamphomyia (Rhamphomyia) cinerascens (Meigen, 1804) (Sa)
Rhamphomyia (Rhamphomyia) crassimana Strobl, 1898 (N)
Rhamphomyia (Rhamphomyia) crinita Becker, 1887 (N)

Rhamphomyia (Rhamphomyia) curvinervis Oldenberg, 1915 (N)
Rhamphomyia (Rhamphomyia) discoidalis Becker, 1889 (N)
Rhamphomyia (Rhamphomyia) hirtimana Oldenberg, 1922 (N)
Rhamphomyia (Rhamphomyia) loewi Nowicki, 1868 (N?)
Rhamphomyia (Rhamphomyia) luridipennis Nowicki, 1868 (N?)
Rhamphomyia (Rhamphomyia) melania Becker, 1887 (N?)
Rhamphomyia (Rhamphomyia) montana Oldenberg, 1915 (N?)
Rhamphomyia (Rhamphomyia) morio (Zetterstedt, 1838) (N?)
Rhamphomyia (Rhamphomyia) nubigena Bezzi, 1904 (N)
Rhamphomyia (Rhamphomyia) scitula Frey, 1922 (N)
Rhamphomyia (Rhamphomyia) serpentata Loew, 1856 (N?)
Rhamphomyia (Rhamphomyia) siebecki Strobl, 1898 (N?)
Rhamphomyia (Rhamphomyia) stigmosa Macquart, 1827 (N)
Rhamphomyia (Rhamphomyia) subdolomitica Barták, 1981 (N)
Rhamphomyia (Rhamphomyia) sulcata (Meigen, 1804) (N)
Rhamphomyia (Rhamphomyia) tibialis Meigen, 1822 (N?)
Rhamphomyia (Rhamphomyia) ursina Oldenberg, 1915 (N?)

***Rhamphomyia (Megacyttarus)* Bigot, 1880**

Rhamphomyia (Megacyttarus) poissoni (Trehen, 1966) (N?)

***Rhamphomyia (Pararhamphomyia)* Frey, 1922**

Rhamphomyia (Pararhamphomyia) dentata Oldenberg, 1910 (N?)
Rhamphomyia (Pararhamphomyia) modesta Wahlberg, 1844 (N?)
Rhamphomyia (Pararhamphomyia) nudipes Oldenberg, 1927 (N)
Rhamphomyia (Pararhamphomyia) pilifer Meigen, 1838 (N)
Rhamphomyia (Pararhamphomyia) praestans Frey, 1913 (N?)
Rhamphomyia (Pararhamphomyia) tibiella Zetterstedt, 1842 (N?)

***Rhamphomyia (Holoclera)* Schiner, 1860**

Rhamphomyia (Holoclera) caliginosa Collin, 1926 (N)
Rhamphomyia (Holoclera) flava (Fallén, 1816) (N)
Rhamphomyia (Holoclera) heterochroma Bezzi, 1898 (N)
Rhamphomyia (Holoclera) umbripennis Meigen, 1822 (N)
Rhamphomyia (Holoclera) variabilis (Fallén, 1816) (N)

***Rhamphomyia (Amydroneura)* Collin, 1926**

Rhamphomyia (Amydroneura) claripennis Oldenberg, 1922 (N)
Rhamphomyia (Amydroneura) crassicauda Strobl, 1893 (N)

***Rhamphomyia (Lundstroemiella)* Frey, 1922**

Rhamphomyia (Lundstroemiella) aterrima Frey, 1922 (N?)
Rhamphomyia (Lundstroemiella) australis Frey, 1922 (N)

Rhamphomyia (Lundstroemiella) brevistylata Oldenberg, 1927 (S)
Rhamphomyia (Lundstroemiella) hybotina (Zetterstedt, 1838) (N)
Rhamphomyia (Lundstroemiella) magellensis Frey, 1922 (N)
Rhamphomyia (Lundstroemiella) nigripes Strobl, 1898 (N?)
Rhamphomyia (Lundstroemiella) rupestris Oldenberg, 1927 (N)
Rhamphomyia (Lundstroemiella) sphenoptera Loew, 1873 (N?)
Rhamphomyia (Lundstroemiella) tumiditarsis Oldenberg, 1917 (N)

Heleodromia Haliday, 1833

Heleodromia immaculata Haliday, 1833 (N?) (*)
Heleodromia irwini Wagner, 1985 (N?) (*)
Heleodromia oldenbergi Wagner, 1985 (N?) (*)

Hemerodromia Meigen, 1822

Hemerodromia baetica Collin, 1927 (S)
Hemerodromia gerecki Wagner, 1993 (S)
Hemerodromia oratoria (Fallén, 1816) (S)

Chelifera Macquart, 1823

Chelifera alpina Vaillant, 1981 (N, S, Si, Sa)
Chelifera astigma Collin, 1927 (N?) (*)
Chelifera flavella (Zetterstedt, 1838) (N, S)
Chelifera precabunda Collin, 1961 (N?) (*)
Chelifera precatoria (Fallén, 1816) (N, S, Sa)
Chelifera serraticauda Engel, 1939
 Chelifera serraticauda serraticauda Engel, 1939 (N)
 Chelifera serraticauda meridionalis Vaillant, 1981 (N)
Chelifera stigmatica (Schiner, 1862) (N, Sa)
Chelifera trapezina (Zetterstedt, 1838) (N)

Chelipoda Macquart, 1823

Chelipoda vocatoria (Fallén, 1816) (N)

Phyllodromia Zetterstedt, 1837

Phyllodromia melanocephala (Fabricius, 1794) (N)

Metachela Coquillett, 1903

Metachela nigriventris (Loew, 1864) (N?) (*)

Dryodromia Rondani, 1856

Dryodromia testacea Rondani, 1856 (N?) (*)

Trichopeza Rondani, 1856

Trichopeza albocincta (Boheman, 1864) (N)
Trichopeza longicornis (Meigen, 1822) (N, S)

Dolichocephala Macquart, 1823

Dolichocephala austriaca Vaillant, 1968 (N)
Dolichocephala basilicata Wagner, 1993 (S)
Dolichocephala guttata (Haliday, 1833) (N)
Dolichocephala ocellata (Costa, 1854) (N)

Roederiodes Coquillett, 1901

Roederiodes gerecke Wagner & Horvat, 1993 (Sa)
Roederiodes oldenbergi (Engel, 1918) (N, S)

Wiedemannia (Wiedemannia) Zetterstedt, 1838

Wiedemannia (Wiedemannia) bilobata Oldenberg, 1910 (N?) (*)
Wiedemannia (Wiedemannia) braueri (Mik, 1880) (N)
Wiedemannia (Wiedemannia) dolichocephala Vaillant, 1964 (N)
Wiedemannia (Wiedemannia) oxystoma (Bezzi, 1905) (N, S)
Wiedemannia (Wiedemannia) rhynchops (Nowicki, 1868) (N)
Wiedemannia (Wiedemannia) styliifera Mik, 1889 (N)

Wiedemannia (Chamaedipsia) Mik, 1881

Wiedemannia (Chamaedipsia) alpina Engel, 1918 (N?) (*)
Wiedemannia (Chamaedipsia) beckeri (Mik, 1880) (N?) (*)
Wiedemannia (Chamaedipsia) hastata (Mik, 1880) (N)
Wiedemannia (Chamaedipsia) lota Walker, 1851 (N, S, Si)
Wiedemannia (Chamaedipsia) mikiana (Bezzi, 1899) (N, S)
Wiedemannia (Chamaedipsia) zwicki Wagner, 1982 (N, S)

Wiedemannia (Philolutra) Mik, 1881

Wiedemannia (Philolutra) bohemani (Zetterstedt, 1838) (N)
Wiedemannia (Philolutra) erminea (Mik, 1887) (N)
Wiedemannia (Philolutra) fallaciosa (Loew, 1873) (N, S)
Wiedemannia (Philolutra) hygrobica (Loew, 1858) (N, S)
Wiedemannia (Philolutra) impudica (Mik, 1880) (N?) (*)
Wiedemannia (Philolutra) phantasma (Mik, 1880) (N)
Wiedemannia (Philolutra) quercifolia (Engel, 1918) (N, S)

Wiedemannia (Pseudowiedemannia) Engel, 1918

Wiedemannia (Pseudowiedemannia) armata Engel, 1918 (N?) (*)

***Wiedemannia (Eucedilia)* Mik, 1881**

Wiedemannia (Eucedilia) pirata (Mik, 1880) (N)

Wiedemannia (Eucedilia) zetterstedti (Fallén, 1826) (N)

***Wiedemannia (Roederella)* Engel, 1918**

Wiedemannia (Roederella) czernyi (Bezzi, 1905) (S, Si, Sa)

***Clinocera (Clinocera)* Meigen, 1803**

Clinocera (Clinocera) appendiculata (Zetterstedt, 1838) (N)

Clinocera (Clinocera) nigra Meigen, 1804 (N, Sa)

Clinocera (Clinocera) rufipes Bezzi, 1899 (S)

Clinocera (Clinocera) schremmeri (Vaillant, 1964) (N?) (*)

***Clinocera (Hydrodromia)* Macquart, 1835**

Clinocera (Hydrodromia) stagnalis (Haliday, 1833) (N, S, Si, Sa)

Clinocera (Hydrodromia) wesmaeli (Macquart, 1835) (N, S)

***Clinocera (Phaeobalia)* Mik, 1881**

Clinocera (Phaeobalia) dimidiata Loew, 1869 (N)

Clinocera (Phaeobalia) inermis Loew, 1861 (N)

Clinocera (Phaeobalia) maculata (Vaillant, 1964) (N?) (*)

Clinocera (Phaeobalia) montana (Vaillant, 1973) (N?) (*)

Clinocera (Phaeobalia) orophila Vaillant, 1973 (N?) (*)

Clinocera (Phaeobalia) pokornyi (Mik, 1886) (N)

Clinocera (Phaeobalia) ramosa (Vaillant, 1964) (N?) (*)

Clinocera (Phaeobalia) trinotata Mik, 1869 (N)

Clinocera (Phaeobalia) vaillanti Wagner, 1982 (N)

Clinocera (Phaeobalia) varipennis Nowicki, 1868 (N)

***Clinocera (Kowarzia)* Mik, 1881**

Clinocera (Kowarzia) barbatula Mik, 1880 (N)

Clinocera (Kowarzia) bipunctata (Haliday, 1833) (N, S, Sa)

Clinocera (Kowarzia) calabria Wagner, 1994 (S)

Clinocera (Kowarzia) fonticola Wagner, 1994 (S)

Clinocera (Kowarzia) italia Wagner, 1994 (S, Si)

Clinocera (Kowarzia) madicola (Vaillant, 1964) (N, S, Si, Sa)

Clinocera (Kowarzia) plectrum Mik, 1880 (N)

Clinocera (Kowarzia) rivalis Wagner, 1994 (S)

Clinocera (Kowarzia) sandaliae Wagner, 1994 (Si, Sa)

Clinocera (Kowarzia) tenella Wahlberg, 1844 (Si)

Clinocera (Kowarzia) tibiella Mik, 1880 (N, S)

***Bergenstammia* Mik, 1881**

Bergenstammia aurinae Pusch & Wagner, 1993 (N?) (*)

Bergenstammia frigida (Vaillant, 1964) (N?) (*)

Bergenstammia multiseta (Strobl, 1893) (N?) (*)

Bergenstammia nudimana Vaillant, 1973 (N?) (*)

Bergenstammia nudipes Loew, 1858 (N?) (*)

Bergenstammia pulla Vaillant & Wagner, 1989 (N?) (*)

***Brachystoma* Meigen, 1822**

Brachystoma vesiculosum (Fabricius, 1794) (N, S, Si, Sa?)

Note

Heleodromia immaculata: Presente sulle Alpi.

Heleodromia irwini: Presente sulle Alpi.

Heleodromia oldenbergi: Presente sulle Alpi.

Chelifera astigma: Presente sulle Alpi.

Chelifera precabunda: Presente sulle Alpi.

Metachela nigriventris: Presente sulle Alpi.

Dryodromia testacea: Presente sulle Alpi.

Wiedemannia (Wiedemannia) bilobata: Presente sulle Alpi.

Wiedemannia (Chamaedipsia) alpina: Presente sulle Alpi.

Wiedemannia (Chamaedipsia) beckeri: Presente sulle Alpi.

Wiedemannia (Philolutra) impudica: Presente sulle Alpi.

Wiedemannia (Pseudowiedemannia) armata: Presente sulle Alpi.

Clinocera (Clinocera) schremmeri: Presente sulle Alpi.

Clinocera (Phaeobalia) maculata: Presente sulle Alpi.

Clinocera (Phaeobalia) montana: Presente sulle Alpi.

Clinocera (Phaeobalia) orophila: Presente sulle Alpi.

Clinocera (Phaeobalia) ramosa: Presente sulle Alpi.

Bergenstammia aurinae: Presente sulle Alpi.

Bergenstammia frigida: Presente sulle Alpi.

Bergenstammia multiseta: Presente sulle Alpi.

Bergenstammia nudimana: Presente sulle Alpi.

Bergenstammia nudipes: Presente sulle Alpi.

Bergenstammia pulla: Presente sulle Alpi.

Dolichopodidae

***Sciapus* Zeller, 1842**

Sciapus aberrans Becker, 1918 (S)

Sciapus albifrons (Meigen, 1830) (N)

Sciapus bellus (Loew, 1873) (N, S)
Sciapus contristans (Wiedemann, 1817) (N)
Sciapus costae Mik, 1890 (N, Sa) (*)
Sciapus euzonus (Loew, 1859) (S, Si)
Sciapus evanidus Bezzi, 1898 (N, S)
Sciapus fasciatus (Macquart, 1834) (Si) (*)
Sciapus flavicinctus (Loew, 1857) (N, S)
Sciapus glaucescens (Loew, 1856) (N)
Sciapus heteropygus Parent, 1926 (S) (*)
Sciapus longulus (Fallén, 1823) (N)
Sciapus nervosus (Lehmann, 1822) (N)
Sciapus opacus (Loew, 1866) (Si)
Sciapus pallens (Wiedemann, 1830) (N)
Sciapus palmipes Collin, 1966 (N) (E)
Sciapus platypterus (Fabricius, 1805) (N)
Sciapus venetus Meuffels, 1977 (N) (E)
Sciapus wiedemanni (Fallén, 1823) (N)

Xanthochlorus Loew, 1857

Xanthochlorus ornatus (Haliday, 1832) (N, S)
Xanthochlorus tenellus (Wiedemann, 1817) (N, S)

Rhaphium Meigen, 1803

Rhaphium angusticorne Loew, 1850 (Si) (E)
Rhaphium auctum Loew, 1857 (N) (*)
Rhaphium brevicorne Curtis, 1835 (S, Si)
Rhaphium caliginosum Meigen, 1824 (N, S)
Rhaphium commune (Meigen, 1824) (N)
Rhaphium crassipes (Meigen, 1824) (N, S)
Rhaphium fascipes (Meigen, 1824) (N, S)
Rhaphium fissum Loew, 1850 (N?)
Rhaphium laticorne (Fallén, 1823) (N) (*)
Rhaphium macrocerum Meigen, 1824 (N, S)
Rhaphium micans (Meigen, 1824) (N, S)
Rhaphium monotrichum Loew, 1850 (N?)
Rhaphium pectinatum (Loew, 1859) (N?) (*)
Rhaphium penicillatum Loew, 1850 (N, S) (*)
Rhaphium praerosum Loew, 1850 (N?)
Rhaphium zetterstedti (Parent, 1925) (N) (*)

Nematoproctus Loew, 1857

Nematoproctus distendens (Meigen, 1824) (N, Sa)
Nematoproctus longifilus Loew, 1857 (S)

Acropsilus Mik, 1878

Acropsilus niger (Loew, 1869) (N)

Chrysotimus Loew, 1857

Chrysotimus molliculus (Fallén, 1823) (N, S) (*)

Epithalassius Mik, 1891

Epithalassius sanctimarci Mik, 1891 (N)

Micromorphus Mik, 1878

Micromorphus albipes (Zetterstedt, 1843) (N, S)

Vetimicrotes Dyte, 1980

Vetimicrotes mediterraneus (Becker, 1918) (N)

Achalcus Loew, 1857

Achalcus cinereus (Haliday, 1851) (N)

Achalcus flavicollis (Meigen, 1824) (N)

Aphrosylus Haliday, 1851

Aphrosylus aculeatus Negrobov, 1979 (Si) (E)

Aphrosylus venator Loew, 1857 (N?, S)

Thinophilus Wahlberg, 1844

Thinophilus achilleus Mik, 1900 (Sa)

Thinophilus flavipalpis (Zetterstedt, 1843) (N, S?, Si)

Thinophilus ruficornis (Haliday, 1838) (N, S)

Schoenophilus Mik, 1878

Schoenophilus versutus (Haliday, 1851) (N)

Eucoryphus Mik, 1869

Eucoryphus brunneri Mik, 1869 (N?) (*)

Eucoryphus coeruleus Becker, 1889 (N)

Coracocephalus Mik, 1892

Coracocephalus magellensis (Bezzi, 1898) (S) (*)

Coracocephalus miki Parent, 1927 (N)

Coracocephalus strobli Mik, 1892 (N?) (*)

Diostracus Loew, 1861

Diostracus leucostomus (Loew, 1861) (N)

Orthoceratium Schrank, 1803

Orthoceratium lacustre (Scopoli, 1763) (N, Si)

Liancalus Loew, 1857

Liancalus virens (Scopoli, 1763) (N, S, Si, Sa)

Sphyrotarsus Mik, 1874

Sphyrotarsus argyrostomus Mik, 1874 (N)

Sphyrotarsus hessei Parent, 1914 (N)

Hydrophorus Fallén, 1823

Hydrophorus balticus (Meigen, 1824) (N, S)

Hydrophorus bipunctatus (Lehmann, 1822) (N?) (*)

Hydrophorus borealis Loew, 1857 (N?) (*)

Hydrophorus geminus Frey, 1915 (N?) (*)

Hydrophorus praecox (Lehmann, 1822) (N, S, Si)

Hydrophorus rogenhoferi Mik, 1874 (N?) (*)

Hydrophorus viridis (Meigen, 1824) (N, S?)

Scellus Loew, 1857

Scellus dolichocerus Gerstäcker, 1864 (N?) (*)

Scellus notatus (Fabricius, 1781) (N, S)

Oncopygius Mik, 1866

Oncopygius distans (Loew, 1857) (N)

Oncopygius magnificus Loew, 1873 (*)

Neurigona Rondani, 1856

Neurigona cilipes (Oldenburg, 1904) (N)

Neurigona pallida (Fallén, 1823) (N)

Neurigona quadrifasciata (Fabricius, 1781) (N, S)

Neurigona suturalis (Fallén, 1823) (N, S)

Systemus Loew, 1857

Systemus lamelliger Müller, 1924 (N)

Sympicnus Loew, 1857

Sympicnus aeneicoxa (Meigen, 1824) (N)
Sympicnus brevimanus Loew, 1857 (N?) (*)
Sympicnus cirrhipes Haliday, 1851 (N)
Sympicnus kowarzi Parent, 1925 (N)
Sympicnus pulicarius (Fallén, 1823) (N, S)
Sympicnus simplicipes Becker, 1908 (N, S)
Sympicnus spiculatus Gerstäcker, 1864 (N)

Syntormon Loew, 1857

Syntormon aulicus (Meigen, 1824) (S)
Syntormon filiger Verrall, 1912 (N) (*)
Syntormon fuscipes von Roser, 1840 (N)
Syntormon macula Oldenberg, 1927 (S)
Syntormon mikii Strobl, 1899 (S)
Syntormon monilis (Haliday, 1851) (N, S)
Syntormon pallipes (Fabricius, 1794) (N, S, Si)
Syntormon pseudospicatus Strobl, 1899 (N, S) (*)
Syntormon pumilus (Meigen, 1824) (N, S)
Syntormon setosus Parent, 1938 (S)
Syntormon zelleri (Loew, 1850) (N, S, Si)

Lamprochromus Mik, 1878

Lamprochromus elegans (Meigen, 1830) (N)
Lamprochromus speciosus (Loew, 1871) (N)

Campsicnemus Haliday, 1851

Campsicnemus armatus (Zetterstedt, 1849) (S)
Campsicnemus crinitarsis Strobl, 1906 (S)
Campsicnemus curvipes (Fallén, 1823) (N, S, Si)
Campsicnemus maculatus Becker, 1918 (N)
Campsicnemus magius (Loew, 1845) (N, Si)
Campsicnemus mamillatus Mik, 1869 (N)
Campsicnemus marginatus Loew, 1857 (N)
Campsicnemus picticornis (Zetterstedt, 1843) (N)
Campsicnemus pumilio (Zetterstedt, 1843) (N?) (*)
Campsicnemus pusillus (Meigen, 1824) (N, S)
Campsicnemus simplicissimus Strobl, 1906 (N)
Campsicnemus umbripennis Loew, 1856 (N, S)
Campsicnemus varipes Loew, 1859 (N, S)

Teuchophorus Loew, 1857

Teuchophorus calcaratus (Macquart, 1827) (Si)
Teuchophorus cristulatus Meuffels & Rootaert, 1990 (Si) (E)
Teuchophorus monacanthus Loew, 1859 (N, S)
Teuchophorus signatus (Zetterstedt, 1849) (N)
Teuchophorus simplex Mik, 1881 (N)
Teuchophorus spinigerellus (Zetterstedt, 1843) (N, S, Si)

Argyra Macquart, 1834

Argyra argentina (Meigen, 1824) (N, S)
Argyra argyria (Meigen, 1824) (N, S, Si)
Argyra atriceps Loew, 1857 (N)
Argyra auricollis (Meigen, 1824) (N)
Argyra confinis (Zetterstedt, 1849) (N)
Argyra diaphana (Fabricius, 1775) (N)
Argyra discedens Becker, 1907 (N) (*)
Argyra flabellifera Becker, 1891 (N?) (*)
Argyra hoffmeisteri (Loew, 1850) (N)
Argyra leucocephala (Meigen, 1824) (N, S)
Argyra perplexa Becker, 1918 (N)

Leucostola Loew, 1857

Leucostola vestita (Wiedemann, 1817) (N, S)

Diaphorus Meigen, 1824

Diaphorus bezzii Parent, 1924 (N)
Diaphorus disjunctus Loew, 1857 (S)
Diaphorus exungiculatus Parent, 1925 (N)
Diaphorus gredleri Mik, 1881 (N, S)
Diaphorus halteralis Loew, 1869 (N)
Diaphorus hoffmanseggii Meigen, 1830 (N, S)
Diaphorus jacobsi Parent, 1922 (*)
Diaphorus lugubris Loew, 1857 (N, S) (*)
Diaphorus nigricans Meigen, 1824 (N, S)
Diaphorus oculatus (Fallén, 1823) (N)
Diaphorus oldenbergi Parent, 1925 (N)
Diaphorus unguiculatus Parent, 1925 (N)
Diaphorus vitripennis Loew, 1859 (N?) (*)
Diaphorus winthemi Meigen, 1824 (N)

Chrysotus Meigen, 1824

Chrysotus albibarbus Loew, 1857 (N?) (*)
Chrysotus angulicornis Kowarz, 1874 (N, S) (*)
Chrysotus blepharosceles Kowarz, 1874 (N?, S) (*)

Chrysotus cilipes Meigen, 1824 (N, S)
Chrysotus collini (Parent, 1923) (N, S)
Chrysotus cupreus (Macquart, 1827) (N, S)
Chrysotus femoratus Zetterstedt, 1843 (N, S)
Chrysotus gramineus (Fallén, 1823) (N, S, Sa) (*)
Chrysotus laesus (Wiedemann, 1817) (N, S) (*)
Chrysotus melampodius Loew, 1857 (N, S, Si)
Chrysotus neglectus (Wiedemann, 1817) (N, S) (*)
Chrysotus pennatus Lichtwardt, 1902 (S)
Chrysotus pulchellus Kowarz, 1874 (N)
Chrysotus suavis Loew, 1857 (N, S)
Chrysotus viridifemoratus von Roser, 1840 (N)

Asyndetus Loew, 1869

Asyndetus exunguis Parent, 1927 (N)
Asyndetus latifrons (Loew, 1857) (N, S)
Asyndetus separatus (Becker, 1902) (N)
Asyndetus varus Loew, 1869 (N)

Tachytrechus Haliday, 1851

Tachytrechus clarus Parent, 1927 (Sa) (E)
Tachytrechus consobrinus Haliday, 1851 (N?) (*)
Tachytrechus doriae Bezzi, 1925 (S) (E) (*)
Tachytrechus eucerus Loew, 1869 (N) (*)
Tachytrechus genualis Loew, 1857 (N)
Tachytrechus insignis (Stannius, 1831) (N, S)
Tachytrechus kowarzi Mik, 1864 (S)
Tachytrechus notatus (Stannius, 1831) (N, S, Si)
Tachytrechus novus Parent, 1927 (N?) (*)
Tachytrechus ripicola Loew, 1857 (N, S, Sa)
Tachytrechus transitorius Becker, 1917 (N)

Ludovicius Rondani, 1843

Ludovicius dufourii (Macquart, 1834) (N)
Ludovicius eucerus (Loew, 1861) (N)
Ludovicius impar Rondani, 1843 (N, S)

Sybistroma Meigen, 1824

Sybistroma nodicornis Meigen, 1824 (N)

Hercostomus Loew, 1857

Hercostomus aerosus (Fallén, 1823) (N, S)
Hercostomus argentifrons Oldenberg, 1916 (N) (E)

Hercostomus beckeri Müller, 1924 (N) (E)
Hercostomus bicolor (Macquart, 1827) (N, S)
Hercostomus caudatus (Loew, 1859) (N, S)
Hercostomus celer (Meigen, 1824) (N, S)
Hercostomus chaerophylli (Meigen, 1824)
 Hercostomus chaerophylli chaerophylli (Meigen, 1824) (N)
 Hercostomus chaerophylli apicalis Bezzi, 1898 (S)
Hercostomus chalybeus (Wiedemann, 1817) (*)
Hercostomus chetifer (Haliday, 1849) (N, S)
Hercostomus chrysozygos (Wiedemann, 1817) (N)
Hercostomus convergens (Loew, 1857) (Si)
Hercostomus exarticulatus (Loew, 1857) (N)
Hercostomus flavipes (Röder, 1884) (Sa)
Hercostomus fugax (Loew, 1857) (N, S)
Hercostomus fulvicaudis (Haliday, 1851) (N) (*)
Hercostomus fuscipennis (Meigen, 1824) (N, S)
Hercostomus germanus (Wiedemann, 1817) (N)
Hercostomus inornatus (Loew, 1857) (N, S)
Hercostomus longiventris (Loew, 1857) (N, S)
Hercostomus lorifer Mik, 1878 (S)
Hercostomus metallicus (Stannius, 1831) (N)
Hercostomus nanus (Macquart, 1827) (N, S)
Hercostomus nigrilamellatus (Macquart, 1827) (N, S)
Hercostomus nigripennis (Fallén, 1823) (N)
Hercostomus nigriplantis (Stannius, 1831) (N, S)
Hercostomus parvilamellatus (Macquart, 1827) (N)
Hercostomus pilifer (Loew, 1859) (N, S)
*Hercostomus plagiatu*s (Loew, 1857) (N, S)
Hercostomus pokornyi Mik, 1889 (N, S)
Hercostomus rogenhoferi (Mik, 1878) (N)
Hercostomus rusticus (Meigen, 1824) (N, S)
Hercostomus sahlbergi (Zetterstedt, 1838) (N)
Hercostomus varicoloris Becker, 1917 (N?) (*)
Hercostomus vivax (Loew, 1857) (N, S)

Poecilobothrus Mik, 1878

Poecilobothrus basilicus (Loew, 1869) (S, Si) (E)
Poecilobothrus fumipennis (Stannius, 1831) (N, S)
Poecilobothrus infuscatus (Stannius, 1831) (S, Si)
Poecilobothrus nobilitatus (Linné, 1767) (N, S)
Poecilobothrus regalis (Meigen, 1824) (N, S)

Ortochile Latreille, 1809

Ortochile nigrocoerulea Latreille, 1809 (N, Si)
Ortochile soccata Loew, 1850 (N?, S?, Si) (*)
Ortochile unicolor Loew, 1850 (N, S)

Hypophyllus Haliday, 1832

Hypophyllus crinipes (Staeger, 1842) (N)
Hypophyllus discipes (Germar, 1817) (N)
Hypophyllus obscurellus (Fallén, 1823) (N, S)
Hypophyllus sciophilus (Loew, 1869) (N)
Hypophyllus sphenopterus Loew, 1859 (N)

Dolichopus Latreille, 1796

Dolichopus agilis Meigen, 1824 (N)
Dolichopus analis Macquart, 1834 (Si) (*)
Dolichopus arbustorum Stannius, 1831 (N)
Dolichopus atratus Meigen, 1824 (N?) (*)
Dolichopus atripes Meigen, 1824 (N) (*)
Dolichopus brevipennis Meigen, 1824 (N?) (*)
Dolichopus campestris Meigen, 1824 (N)
Dolichopus cilifemoratus Macquart, 1827 (N?, S?, Sa?) (*)
Dolichopus excisus Loew, 1859
 Dolichopus excisus excisus Loew, 1859 (N, S)
 Dolichopus excisus sicularis Loew, 1859 (Si)
Dolichopus fasciatus Macquart, 1834 (Si) (*)
Dolichopus festivus Haliday, 1832 (N, S) (*)
Dolichopus genicupallidus Becker, 1889 (N?) (*)
Dolichopus griseipennis Stannius, 1831 (N, S, Si, Sa)
Dolichopus hiliaris Loew, 1862 (N?) (*)
Dolichopus latilimbatus Macquart, 1827 (N, S)
Dolichopus lepidus Staeger, 1842 (N)
Dolichopus longicornis Stannius, 1831 (N)
Dolichopus longitarsis Stannius, 1831 (N)
Dolichopus migrans Zetterstedt, 1843 (N?) (*)
Dolichopus nigricornis Meigen, 1824 (N, S)
Dolichopus nitidus Fallén, 1823 (N, S)
Dolichopus nubilus Meigen, 1824 (N, S, Si)
Dolichopus parvus Macquart, 1834 (Si) (*)
Dolichopus pennatus Meigen, 1824 (N)
Dolichopus picipes Meigen, 1824 (N)
Dolichopus planitarsis Fallén, 1823 (N?) (*)
Dolichopus plumipes (Scopoli, 1763) (N)
Dolichopus plumitarsis Fallén, 1823 (N)
Dolichopus sabinus Haliday, 1838 (N, S, Si)
Dolichopus salictorum Loew, 1871 (N)
Dolichopus signatus Meigen, 1824 (N)
Dolichopus signifer Haliday, 1838 (S)
Dolichopus strigipes Verrall, 1875 (N)
Dolichopus syracusanus Becker, 1917 (Si)
Dolichopus tanythrix Loew, 1869 (N)

Dolichopus trivialis Haliday, 1831 (N, Sa?) (*)

Dolichopus unguatus (Linné, 1758) (N, S)

Dolichopus virgultorum Haliday, 1851 (N?, S)

Macrodolichopus Stackelberg, 1933

Macrodolichopus diadema (Haliday, 1832) (N, Si)

Medetera Fischer v. Waldheim, 1819

Medetera ambigua (Zetterstedt, 1843) (Si)

Medetera annulitarsis von Roser, 1840 (N, S)

Medetera apicalis (Zetterstedt, 1843) (N?) (*)

Medetera arrogans (Parent, 1927) (N, S) (E) (*)

Medetera dendrobaena Kowarz, 1877 (S, Sa)

Medetera diadema (Linné, 1767) (N?, S)

Medetera flavipes Meigen, 1824 (N, S)

Medetera glauca Kowarz, 1877 (N)

Medetera gracilicauda Parent, 1927 (N)

Medetera infumata Loew, 1857 (N, S)

Medetera jacula (Fallén, 1823) (N, S)

Medetera lamprostoma Loew, 1871 (N?) (*)

Medetera micacea Loew, 1857 (N, Si)

Medetera muralis Meigen, 1824 (S)

Medetera obesa Kowarz, 1877 (N)

Medetera petrophila Kowarz, 1877 (N, S)

Medetera plumbella Meigen, 1824 (S)

Medetera roghii Rampini & Canzoneri, 1979 (Si)

Medetera tenuicauda Loew, 1857 (N?, Si)

Medetera tristis (Zetterstedt, 1838) (N?, S)

Medetera truncorum Meigen, 1824 (N, S, Si)

Thrypticus Gerstäcker, 1864

Thrypticus atomus Frey, 1915 (N?) (*)

Thrypticus bellus Loew, 1869 (N) (*)

Thrypticus paludicola Negrobov, 1972 (N)

Note

Sciapus costae: Erroneamente indicata di Sicilia.

Sciapus fasciatus: Specie di dubbia validità.

Sciapus heteropygus: Reperto inedito da Roma (coll. Saccà; materiale esaminato da Di Girolamo e Rivosecchi).

Rhaphium auctum: Specie non più ritrovata dalla sua descrizione.

Rhaphium laticorne: Presenza dubbia.

Rhaphium pectinatum: Presenza dubbia.

Rhaphium penicillatum: Presenza dubbia.

Rhaphium zetterstedti: Presenza dubbia.

Chrysotimus molliculus: Specie ritenuta valida da autori anche recenti, ma non riportata in Negrobov (1991).

Eucoryphus brunneri: Presenza dubbia, marginale sui confini nord-orientali.

Coracocephalus magellensis: Specie di dubbia validità.

Coracocephalus strobli: Presenza dubbia, marginale sui confini orientali.

Hydrophorus bipunctatus: Presenza dubbia.

Hydrophorus borealis: Presenza dubbia.

Hydrophorus geminus: Presenza dubbia.

Hydrophorus rogenhoferi: Presenza dubbia.

Scellus dolichocerus: Presenza dubbia.

Oncopygius magnificus: Citata come presente in Italia in Negrobov (1991) da fonti non identificate.

Sympicnus brevimanus: Specie centro-europea, citata come presente in Italia in Negrobov (1991) da fonti non identificate.

Syntormon filiger: Presente solo sull'estremo confine orientale.

Syntormon pseudospicatus: Presente in N solo nell'Appennino Emiliano.

Campsicnemus pumilio: Presenza dubbia.

Argyra discedens: Specie non riportata in Negrobov (1991).

Argyra flabellifera: Presenza dubbia, marginale sui confini nord-orientali.

Diaphorus jacobsi: Riportata genericamente d'Italia, senza più precise indicazioni.

Diaphorus lugubris: Specie di incerta identità, i reperti italiani potrebbero riferirsi a *D. nigricans* Meigen.

Diaphorus vitripennis: Presenza dubbia.

Chrysotus albibarbus: Presenza dubbia.

Chrysotus angulicornis: Presente in S solo nell'Appennino Tosco-Romagnolo.

Chrysotus blepharosceles: Indicata genericamente delle Alpi, è presente in S solo nell'Appennino Tosco-Romagnolo.

Chrysotus gramineus: In S nota solo dell'Appennino Tosco-Romagnolo.

Chrysotus laesus: Presente in S solo nell'Appennino Tosco-Romagnolo.

Chrysotus neglectus: Presente in S solo nell'Appennino Tosco-Romagnolo.

Tachytrechus consobrinus: Presenza dubbia.

Tachytrechus doriae: Nota solo dell'Isola del Giglio.

Tachytrechus eucerus: Specie non riportata in Negrobov (1991).

Tachytrechus novus: Presenza dubbia, marginale sul confine occidentale.

Hercostomus chalybeus: Citata come presente in Italia in Negrobov (1991) da fonti non identificate.

Hercostomus fulvicaudis: Specie non riportata in Negrobov (1991).

Hercostomus varicoloris: Specie della regione caucasica, la cui segnalazione per la costa romagnola è probabilmente dovuta ad un errore di identificazione.

Ortochile soccata: Nota di Sicilia, è anche riportata genericamente d'Italia.

Dolichopus analis: Specie di incerta identità, non più ritrovata dalla sua descrizione.

Dolichopus atratus: Presenza dubbia.

Dolichopus atripes: L'unico dato è relativo all'Appennino Tosco-Romagnolo.

Dolichopus brevipennis: Presenza dubbia.

Dolichopus cilifemoratus: Specie a lungo confusa con *D. trivialis* Haliday e la cui distribuzione in Italia è ancora da chiarire.

Dolichopus fasciatus: Specie di incerta identità, non più ritrovata dalla sua descrizione.

Dolichopus festivus: Specie ritenuta valida da autori anche recenti, ma non riportata in Negrobov (1991).

Dolichopus genicupallidus: Indicata genericamente d'Italia, è presente probabilmente sulle Alpi.

Dolichopus hiliaris: Presenza dubbia.

Dolichopus migrans: Presenza dubbia.

Dolichopus parvus: Specie di dubbia validità, non riportata in Negrobov (1991).

Dolichopus planitarsis: Presenza dubbia.

Dolichopus trivialis: Specie a lungo confusa con *D. cilifemoratus* Macquart e la cui distribuzione in Italia è in larga parte da chiarire.

Medetera apicalis: Specie a diffusione boreale, citata come presente in Italia in Negrobov (1991) da fonti non identificate.

Medetera arrogans: Presente in S solo nell'Appennino Tosco-Romagnolo.

Medetera lamprostoma: Specie del Turkestan ex-sovietico, la cui segnalazione per il pedemonte romagnolo è probabilmente dovuta a un errore di identificazione.

Thrypticus atomus: Identificazione dubbia.

Thrypticus bellus: L'unico dato è relativo all'Appennino Tosco-Romagnolo.

Platypezidae

Opetia Meigen, 1830

Opetia nigra Meigen, 1830 (N)

Agathomyia Verrall, 1901

Agathomyia antennata (Zetterstedt, 1819) (N)

Agathomyia aurantiaca (Bezzi, 1893) (N)

Agathomyia cinerea (Zetterstedt, 1852) (N) (*)

Agathomyia elegantula (Fallén, 1815) (N) (*)

Callomyia Meigen, 1804

Callomyia amoena Meigen, 1824 (N)

Callomyia elegans Meigen, 1804 (N)

Callomyia speciosa Meigen, 1824 (N) (*)

Protoclythia Kessel, 1949

Protoclythia modesta (Zetterstedt, 1844) (N)

Protoclythia rufa (Meigen, 1830) (N, S)

Polyporivora Kessel & Maggioncalda, 1968

Polyporivora boletina (Fallén, 1815) (N)

Polyporivora ornata (Meigen, 1838) (N, S, Sa)

Platypeza Meigen, 1803

Platypeza consobrina Zetterstedt, 1844 (N, S) (*)

Platypeza fasciata Meigen, 1804 (N)

Platypeza hirticeps Verrall, 1901 (N) (*)

Paraplatypeza Kessel & Maggioncalda, 1968

Paraplatypeza atra (Meigen, 1804) (N, S)

Lindneromyia Kessel, 1965

Lindneromyia dorsalis (Meigen, 1804) (N, S)

Note

Agathomyia cinerea: Segnalazione nuova per l'Italia.

Agathomyia elegantula: Segnalazione nuova per l'Italia.

Callomyia speciosa: Segnalazione nuova per l'Italia.

Platypeza consobrina: Segnalazione nuova per l'Italia.

Platypeza hirticeps: Segnalazione nuova per l'Italia.

Lonchopteridae

Lonchoptera Meigen, 1803

Lonchoptera bifurcata (Fallén, 1810) (N, S)

Lonchoptera lutea Panzer, 1809 (N, S, Si)

Lonchoptera pictipennis Bezzi, 1899 (S)

Lonchoptera strobli De Meijere, 1906 (N, S)

Lonchoptera tristis Meigen, 1824 (S)

Phoridae

Anevrina Liroy, 1864

Anevrina thoracica (Meigen, 1804) (N)

Anevrina unispinosa (Zetterstedt, 1860) (*)

Anevrina urbana (Meigen, 1830) (N)

Borophaga Enderlein, 1924

Borophaga agilis (Meigen, 1830) (*)

Borophaga femorata (Meigen, 1830) (N)

Conicera Meigen, 1830

Conicera cisalpina Schmitz, 1935 (N) (E)
Conicera dauci (Meigen, 1830) (N)

Diplonevra Liroy, 1864

Diplonevra abbreviata (von Roser, 1840) (N)
Diplonevra altipetax (Schmitz, 1935) (S) (E)
Diplonevra concinna (Meigen, 1830) (N?)
Diplonevra cornutissima (Schmitz, 1927) (N) (E)
Diplonevra crassicornis (Meigen, 1830) (N?, S)
Diplonevra florea (Fabricius, 1794) (S)
Diplonevra funebris (Meigen, 1830) (N)
Diplonevra minima (Schmitz, 1927) (N) (E)
Diplonevra nitidula (Meigen, 1830) (*)
Diplonevra unisetalis (Schmitz, 1935) (N)

Dohrniphora Dahl, 1898

Dohrniphora cornuta (Bigot in de la Sagra, 1856) (*)

Gymnophora Macquart, 1835

Gymnophora arcuata (Meigen, 1830) (N)
Gymnophora lapidicola (Bezzi, 1922) (N) (E)
Gymnophora nigripennis Schmitz, 1926 (*)

Megaselia Rondani, 1856

Megaselia atrosericea Schmitz, 1927 (N)
Megaselia basispinata (Lundbeck, 1920) (N, Si)
Megaselia berndseni (Schmitz, 1919) (*)
Megaselia bicolor (Meigen, 1830) (N) (*)
Megaselia brevicostalis (Wood, 1910) (N)
Megaselia brevissima (Schmitz, 1924) (N)
Megaselia brunneipennis A. Costa, 1857 (*)
Megaselia campestris (Wood, 1908) (*)
Megaselia ciliata (Zetterstedt, 1848) (N)
Megaselia costalis (von Roser, 1840) (*)
Megaselia dahli (Becker, 1901) (*)
Megaselia ?diversa (Wood, 1909) (N) (*)
Megaselia elongata (Wood, 1914) (N)
Megaselia filamentosa Schmitz, 1958 (*)
Megaselia flava (Fallén, 1823) (*)
Megaselia flavicans Schmitz, 1935 (*)
Megaselia fuscopleuralis Schmitz, 1929 (N)
Megaselia giraudii (Egger, 1862) (N)
Megaselia goidanichi Schmitz, 1927 (N)

Megaselia halterata (Wood, 1910) (*)
Megaselia hyalipennis (Wood, 1912) (N)
Megaselia involuta (Wood, 1910) (*)
Megaselia latifemorata (Becker, 1901) (*)
Megaselia lutea (Meigen, 1830) (N)
Megaselia meconicera (Speiser, 1925) (N)
Megaselia meigeni (Becker, 1901) (*)
Megaselia melanocephala (von Roeser, 1840) (*)
Megaselia nasoni (Malloch, 1914) (*)
Megaselia nigra (Meigen, 1830) (N) (*)
Megaselia nigrescens (Wood, 1910) (N) (*)
Megaselia palmeni (Becker, 1901) (N?)
Megaselia pectoralis (Wood, 1910) (*)
Megaselia perdistsans (Schmitz, 1924) (N)
Megaselia picta (Lehmann, 1822) (N)
Megaselia pleuralis (Wood, 1909) (N)
Megaselia posticata (Strobl, 1898) (*)
Megaselia protarsalis Schmitz, 1927 (*)
Megaselia pseudociliata (Strobl, 1910) (*)
Megaselia pseudogiraudii (Schmitz, 1920) (*)
Megaselia pulicaria (Fallén, 1823) (N, S)
Megaselia pumila (Meigen, 1830) (N)
Megaselia pygmaea (Zetterstedt, 1848) (N) (*)
Megaselia quadriseta (Schmitz, 1918) (*)
Megaselia rubescens (Wood, 1912) (*)
Megaselia ruficornis (Meigen, 1830) (*)
Megaselia rufipes (Meigen, 1804) (N, S, Si)
Megaselia scalaris (Loew, 1866) (S) (*)
Megaselia sordida (Zetterstedt, 1838) (N)
Megaselia subtumida (Wood, 1909) (*)
Megaselia superciliata (Wood, 1910) (*)
Megaselia tarsalis (Wood, 1910) (N)
Megaselia teneripes Schmitz, 1957 (N) (*)
Megaselia ultrabrevis Schmitz, 1927 (*)
Megaselia verralli (Wood, 1910) (N)

***Menozziola* Schmitz, 1927**

Menozziola schmitzi (Menozzi, 1921) (S)

***Metopina* Macquart, 1835**

Metopina galeata (Haliday, 1833) (N)

***Phalacrotophora* Enderlein, 1912**

Phalacrotophora berlinensis Schmitz, 1920 (*)
Phalacrotophora fasciata (Fallén, 1823) (N)

Phora Latreille, 1796

Phora atra (Meigen, 1804) (N, S, Si?)
Phora dubia (Zetterstedt, 1848) (*)
Phora holosericea Schmitz, 1920 (N)
Phora limpida Schmitz, 1935 (N)
Phora penicillata Schmitz, 1920 (N)
Phora stictica Meigen, 1830 (N)
Phora tinctoria Schmitz, 1920 (*)
Phora velutina Meigen, 1830 (S)

Spiniphora Malloch, 1909

Spiniphora bergenstammi (Mik, 1864) (N)
Spiniphora maculata (Meigen, 1830) (N)
Spiniphora signata (Schmitz, 1935) (N)
Spiniphora strobili (Becker, 1901) (N)

Triphleba Rondani, 1856

Triphleba antricola (Schmitz, 1918) (N, S?, Si)
Triphleba apenninigena Schmitz, 1943 (S) (E)
Triphleba aptina (Schiner, 1853) (N)
Triphleba distinguenda (Strobl, 1892) (N)
Triphleba fortimana Schmitz, 1943 (N) (E)
Triphleba hyalinata (Meigen, 1830) (N)
Triphleba nivalis (Rondani, 1856) (E) (*)
Triphleba opaca (Meigen, 1830) (N)
Triphleba pachyneurella (Schmitz, 1919) (N?)

Note

Anevrina unispinosa: Segnalata in forma generica per l'Italia.
Borophaga agilis: Segnalata in forma generica per l'Italia.
Diplonevra nitidula: Segnalata in forma generica per l'Italia.
Dohrniphora cornuta: Segnalata in forma generica per l'Italia.
Gymnophora nigripennis: Segnalata in forma generica per l'Italia.
Megaselia berndseni: Segnalata in forma generica per l'Italia.
Megaselia bicolor: Specie dubbia.
Megaselia brunneipennis: Segnalata in forma generica per l'Italia (loc. typ.).
Megaselia campestris: Segnalata in forma generica per l'Italia.
Megaselia costalis: Segnalata in forma generica per l'Italia.
Megaselia dahli: Segnalata in forma generica per l'Italia.
Megaselia ?diversa: Zangheri P., 1969, Mus. civ. St. nat. Verona. Mem. f.s., n. 1, p. 1085, "determinazione dubbia" [H. Schmitz det.].
Megaselia filamentosa: Segnalata in forma generica per l'Italia.
Megaselia flava: Segnalata in forma generica per l'Italia.

Megaselia flavicans: Segnalata in forma generica per l'Italia.
Megaselia halterata: Segnalata in forma generica per l'Italia.
Megaselia involuta: Segnalata in forma generica per l'Italia.
Megaselia latifemorata: Segnalata in forma generica per l'Italia.
Megaselia meigeni: Segnalata in forma generica per l'Italia.
Megaselia melanocephala: Segnalata in forma generica per l'Italia.
Megaselia nasoni: Segnalata in forma generica per l'Italia.
Megaselia nigra: Zangheri P., 1969, op. cit., p. 1086, "determinazione dubbia" [H. Schmitz det.].
Megaselia nigrescens: Zangheri P., 1969, op. cit., p. 1086, "determinazione dubbia" [H. Schmitz det.].
Megaselia pectoralis: Segnalata in forma generica per l'Italia.
Megaselia posticata: Segnalata in forma generica per l'Italia.
Megaselia protarsalis: Segnalata in forma generica per l'Italia.
Megaselia pseudociliata: Segnalata in forma generica per l'Italia.
Megaselia pseudogiraudii: Segnalata in forma generica per l'Italia.
Megaselia pygmaea: Zangheri P., 1969, op. cit., p. 1086, "determinazione dubbia" [H. Schmitz det.].
Megaselia quadriseta: Segnalata in forma generica per l'Italia.
Megaselia rubescens: Segnalata in forma generica per l'Italia.
Megaselia ruficornis: Segnalata in forma generica per l'Italia.
Megaselia scalaris: Prima citazione per l'Italia: "San Rossore, Pisa, 1994" (H. Disney, com. pers.).
Megaselia subtumida: Segnalata in forma generica per l'Italia.
Megaselia superciliata: Segnalata in forma generica per l'Italia.
Megaselia teneripes: Prima citazione per l'Italia. Esemplare conservato nel Museo Koenig di Bonn: "Dolomiten, S. Hong + 2540 m" (H. Disney, com. pers.).
Megaselia ultrabrevis: Segnalata in forma generica per l'Italia.
Phalacrotophora berlinensis: Segnalata in forma generica per l'Italia.
Phora dubia: Segnalata in forma generica per l'Italia.
Phora tincta: Specie dubbia segnalata in forma generica per l'Italia.
Triphleba nivalis: Segnalata in forma generica per l'Italia.

Syrphidae

Dasysyrphus Enderlein, 1938

Dasysyrphus albostratus (Fallén, 1817) (N, S, Si)
Dasysyrphus eggeri (Schiner, 1862) (N)
Dasysyrphus friulensis (Van der Goot, 1960) (N)
Dasysyrphus pinastri (Degeer, 1774) (N, S)
Dasysyrphus tricinctus (Fallén, 1817) (N)
Dasysyrphus venustus (Meigen, 1822) (N, S)

Didea (Didea) Macquart, 1834

Didea (Didea) alneti (Fallén, 1817) (N)

Didea (Didea) fasciata Macquart, 1834 (N, Si)
Didea (Didea) intermedia Loew, 1854 (N)

Didea (Megasyrphus) Dusek & Laska, 1967

Didea (Megasyrphus) erratica (Linné, 1758) (N)

Doros Meigen, 1803

Doros destillatorius Mik, 1885 (N, S)
Doros profuges (Harris, 1780) (N)

Epistrophe (Epistrophe) Walker, 1852

Epistrophe (Epistrophe) diaphana (Zetterstedt, 1843) (N, S)
Epistrophe (Epistrophe) eligans (Harris, 1780) (N, S, Si, Sa)
Epistrophe (Epistrophe) grossulariae (Meigen, 1822) (N, S, Si)
Epistrophe (Epistrophe) leiophthalma (Schiner & Egger, 1853) (N)
Epistrophe (Epistrophe) melanostoma (Zetterstedt, 1843) (N, Sa)
Epistrophe (Epistrophe) nitidicollis (Meigen, 1822) (N, S)
Epistrophe (Epistrophe) ochrostoma (Zetterstedt, 1849) (N)

Epistrophe (Epistrophella) Dusek & Laska, 1967

Epistrophe (Epistrophella) euchroma (Kowarz, 1885) (N)

Episyrphus Matsumura & Adachi, 1917

Episyrphus balteatus (De Geer, 1776) (N, S, Si, Sa)

Eriozona Schiner, 1860

Eriozona syrphoides (Fallén, 1817) (N)

Eupeodes (Eupeodes) Osten Sacken, 1877

Eupeodes (Eupeodes) corollae (Fabricius, 1794) (N, S, Si, Sa)
Eupeodes (Eupeodes) flaviceps (Rondani, 1857) (N)
Eupeodes (Eupeodes) latifasciatus (Macquart, 1829) (N, S, Si, Sa)
Eupeodes (Eupeodes) latilunulatus (Collin, 1931) (N)
Eupeodes (Eupeodes) lucasi (Garcia & Laska, 1983) (N)
Eupeodes (Eupeodes) luniger (Meigen, 1822) (N, S, Si)
Eupeodes (Eupeodes) nielsenii (Dusek & Laska, 1976) (N)
Eupeodes (Eupeodes) nitens (Zetterstedt, 1843) (N, S)
Eupeodes (Eupeodes) tirolensis Dusek & Laska, 1973 (N)
Eupeodes (Eupeodes) vandergooti Dusek & Laska, 1973 (S)

Eupeodes (Lapposyrphus) Dusek & Laska, 1967

Eupeodes (Lapposyrphus) lapponicus (Zetterstedt, 1838) (N, S)

Ischyrosyrphus Bigot, 1882

Ischyrosyrphus glaucius (Linné, 1758) (N)

Ischyrosyrphus lanternarius (O.F. Müller, 1776) (N)

Leucozona Schiner, 1860

Leucozona lucorum (Linné, 1758) (N, S)

Melangyna (Melangyna) Verrall, 1901

Melangyna (Melangyna) arctica (Zetterstedt, 1838) (N)

Melangyna (Melangyna) barbifrons (Fallén, 1817) (N)

Melangyna (Melangyna) compositarum (Verrall, 1873) (N)

Melangyna (Melangyna) labiatarum (Verrall, 1901) (N)

Melangyna (Melangyna) lasiophthalma (Zetterstedt, 1843) (N, S)

Melangyna (Melangyna) quadrimaculata (Verrall, 1873) (N)

Melangyna (Melangyna) umbellatarum (Fabricius, 1794) (N, S)

Melangyna (Meligramma) Frey, 1946

Melangyna (Meligramma) cincta (Fallén, 1817) (N, S, Si)

Melangyna (Meligramma) cingulata (Egger, 1860) (N)

Melangyna (Meligramma) guttata (Fallén, 1817) (N)

Meliscaeva Frey, 1946

Meliscaeva auricollis (Meigen, 1822) (N, S, Si, Sa)

Meliscaeva cinctella (Zetterstedt, 1843) (N)

Parasyrphus Matsumura, 1917

Parasyrphus annulatus (Zetterstedt, 1838) (N, S)

Parasyrphus lineolus (Collin, 1952) (N)

Parasyrphus macularis (Zetterstedt, 1843) (N)

Parasyrphus nigratarsis (Zetterstedt, 1843) (N)

Parasyrphus punctulatus (Verrall, 1873) (N)

Parasyrphus tarsatus (Zetterstedt, 1838) (N)

Parasyrphus vittiger (Zetterstedt, 1843) (N)

Scaeva Fabricius, 1805

Scaeva albomaculata (Macquart, 1842) (N, S, Si, Sa)

Scaeva dignota (Rondani, 1857) (N, Si)

Scaeva mecogramma (Bigot, 1860) (N, Si)

Scaeva pyrastris (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)
Scaeva selenitica (Meigen, 1822) (N, S, Si, Sa)

Sphaerophoria Le Peletier & Serville, 1828

Sphaerophoria abbreviata Zetterstedt, 1859 (N) (*)
Sphaerophoria bankowskiae Goeldlin de Tiefenau, 1989 (N)
Sphaerophoria chongjini Bankowska, 1964 (N)
Sphaerophoria estebani Goeldlin de Tiefenau, 1991 (N)
Sphaerophoria infuscata Goeldlin de Tiefenau, 1974 (N)
Sphaerophoria interrupta (Fabricius, 1805) (N)
Sphaerophoria laurae Goeldlin de Tiefenau, 1989 (N)
Sphaerophoria philanthus (Meigen, 1822) (N)
Sphaerophoria rueppelli (Wiedmann, 1830) (N, S, Si, Sa)
Sphaerophoria scripta (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)
Sphaerophoria taeniata (Meigen, 1822) (N, S, Si)
Sphaerophoria virgata Goeldlin de Tiefenau, 1974 (N)

Syrphus Fabricius, 1775

Syrphus nitidifrons Becker, 1921 (N)
Syrphus ribesii (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)
Syrphus torvus Osten Sacken, 1875 (N, S)
Syrphus vitripennis Meigen, 1822 (N, S, Si)

Xanthogramma Schiner, 1860

Xanthogramma dives (Rondani, 1857) (N, S)
Xanthogramma festivum (Linné, 1758) (N, S)
Xanthogramma laetum (Fabricius, 1794) (N, S)
Xanthogramma marginale (Loew, 1854) (S)
Xanthogramma pedissequum (Harris, 1776) (N, S, Si, Sa)

Baccha Fabricius, 1805

Baccha elongata (Fabricius, 1775) (N, S, Si)
Baccha obscuripennis Meigen, 1822 (N, S, Si)

Chrysotoxum Meigen, 1803

Chrysotoxum arcuatum (Linné, 1758) (N, S, Si)
Chrysotoxum bicinctum (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)
Chrysotoxum cautum (Harris, 1776) (N, S, Si)
Chrysotoxum cisalpinum Rondani, 1845 (N, S, Si, Sa)
Chrysotoxum elegans Loew, 1841 (N, S)
Chrysotoxum fasciatum (O.F. Müller, 1764) (N)
Chrysotoxum fasciolatum (De Geer, 1776) (N, S, Sa)
Chrysotoxum festivum (Linné, 1758) (N, S)

Chrysotoxum impressum Becker, 1921 (S)
Chrysotoxum intermedium Meigen, 1822 (N, S, Si, Sa)
Chrysotoxum latifasciatum Becker, 1921 (N)
Chrysotoxum lessonae Giglio-Tos, 1890 (N)
Chrysotoxum lineare (Zetterstedt, 1819) (N)
Chrysotoxum octomaculatum Curtis, 1832 (N, S)
Chrysotoxum parmense Rondani, 1845 (N)
Chrysotoxum sackeni Giglio-Tos, 1890 (N)
Chrysotoxum vernale Loew, 1841 (N, S, Si)
Chrysotoxum verralli Collin, 1940 (N)

Melanostoma Schiner, 1860

Melanostoma abruzzense Van der Goot, 1969 (S) (E) (*)
Melanostoma dubium (Zetterstedt, 1837) (N, Si)
Melanostoma mellinum (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)
Melanostoma pumicatum (Meigen, 1838) (N, S)
Melanostoma scalare (Fabricius, 1794) (N, S, Si, Sa)

Xanthandrus Verrall, 1901

Xanthandrus comtus (Harris, 1780) (N, S, Si)

Platycheirus (Platycheirus) Le Peletier & Serville, 1828

Platycheirus (Platycheirus) albimanus (Fabricius, 1781) (N, S, Si)
Platycheirus (Platycheirus) angustatus (Zetterstedt, 1843) (N, S)
Platycheirus (Platycheirus) angustipes Goeldlin de Tiefenau, 1974 (N)
Platycheirus (Platycheirus) clypeatus (Meigen, 1822) (N, S)
Platycheirus (Platycheirus) fasciculatus Loew, 1856 (N)
Platycheirus (Platycheirus) fulviventrus (Macquart, 1829) (N)
Platycheirus (Platycheirus) immaginatus (Zetterstedt, 1849) (N)
Platycheirus (Platycheirus) manicatus (Meigen, 1822) (N, S)
Platycheirus (Platycheirus) melanopsis Loew, 1856 (N, S)
Platycheirus (Platycheirus) muelleri (Marcuzzi, 1941) (N, S) (*)
Platycheirus (Platycheirus) nielsenii Vockeroth, 1990 (N) (*)
Platycheirus (Platycheirus) parvatus Rondani, 1857 (N)
Platycheirus (Platycheirus) peltatus (Meigen, 1922) (N)
Platycheirus (Platycheirus) perpallidus (Verrall, 1901) (N)
Platycheirus (Platycheirus) podagratus (Zetterstedt, 1838) (N)
Platycheirus (Platycheirus) scambus (Staeger, 1843) (N)
Platycheirus (Platycheirus) scutatus (Meigen, 1822) (N, S, Si)
Platycheirus (Platycheirus) sticticus (Meigen, 1822) (N)
Platycheirus (Platycheirus) tarsalis (Schummel, 1837) (N)
Platycheirus (Platycheirus) tatricus Dusek & Laska, 1982 (N)

Platycheirus (Pachysphyria) Enderlein, 1938

Platycheirus (Pachysphyria) ambiguus (Fallén, 1817) (N, Si)

Pyrophaena Schiner, 1860

Pyrophaena rosarum (Fabricius, 1787) (N, S)

Rohdendorfia Smirnov, 1924

Rohdendorfia alpina Sack, 1938 (N)

Spazigaster Rondani, 1843

Spazigaster ambulans (Fabricius, 1798) (N, S)

Syrphocheilosia Stackelberg, 1964

Syrphocheilosia claviventris (Strobl, 1909) (N)

Paragus (Paragus) Latreille, 1804

Paragus (Paragus) absidatus Goeldlin de Tiefenau, 1971 (N)

Paragus (Paragus) albifrons (Fallén, 1817) (N, S, Si)

Paragus (Paragus) antoinettae Goeldlin de Tiefenau & Lucas, 1981 (N, Sa)

Paragus (Paragus) bicolor (Fabricius, 1794) (N, S, Si, Sa)

Paragus (Paragus) cinctus Schiner & Egges, 1853 (S, Si, Sa)

Paragus (Paragus) compeditus Wiedemann, 1830 (S)

Paragus (Paragus) finitimus Goeldlin de Tiefenau, 1971 (N)

Paragus (Paragus) hermonensis Kaplan, 1981 (N) (*)

Paragus (Paragus) majoranae Rondani, 1857 (N, S, Si, Sa)

Paragus (Paragus) punctulatus Zetterstedt, 1838 (N, S)

Paragus (Paragus) quadrifasciatus Meigen, 1822 (N, S, Si, Sa)

Paragus (Paragus) sexarcuatus Bigot, 1862 (Si, Sa)

Paragus (Paragus) strigatus Meigen, 1822 (Si, Sa)

Paragus (Pandasyophthalmus) Stuckenberg, 1954

Paragus (Pandasyophthalmus) ascoensis Goeldlin de Tiefenau & Lucas, 1981 (S, Sa)

Paragus (Pandasyophthalmus) coadunatus Rondani, 1847 (S, Si)

Paragus (Pandasyophthalmus) haemorrhous Meigen, 1822 (N, S, Si, Sa)

Paragus (Pandasyophthalmus) tibialis (Fallén, 1817) (N, S, Si)

Heringia (Heringia) Rondani, 1856

Heringia (Heringia) heringi (Zetterstedt, 1843) (N, S)

Heringia (Heringia) senilis Sack, 1938 (N)

Heringia (Neocnemodon) Goffe, 1944

Heringia (Neocnemodon) brevidens (Egger, 1865) (N, S)
Heringia (Neocnemodon) fulvimanus (Zetterstedt, 1843) (N)
Heringia (Neocnemodon) hispanica (Strobl, 1909) (N)
Heringia (Neocnemodon) latitarsis (Egger, 1865) (S)
Heringia (Neocnemodon) pubescens (Delucchi & Pschorn-Walcher, 1955) (N)
Heringia (Neocnemodon) vitripennis (Meigen, 1822) (N, S, Si)

Pipiza Fallén, 1810

Pipiza austriaca Meigen, 1822 (N, S)
Pipiza bimaculata Meigen, 1822 (N, S, Si)
Pipiza festiva Meigen, 1822 (N, S)
Pipiza lugubris (Fabricius, 1775) (N, S, Si)
Pipiza noctiluca (Linné, 1758) (N, S, Si)
Pipiza notata Meigen, 1822 (N)
Pipiza obscura Macquart, 1834 (S, Si)
Pipiza quadrimaculata (Panzer, 1804) (N, S)
Pipiza signata Meigen, 1822 (N)

Pipizella Rondani, 1856

Pipizella annulata (Macquart, 1829) (N, S)
Pipizella calabra (Goeldlin de Tiefenau, 1974) (S) (E)
Pipizella divicoi (Goeldlin de Tiefenau, 1974) (N)
Pipizella elegantissima Lucas, 1976 (N)
Pipizella maculipennis (Meigen, 1822) (N, S)
Pipizella nigriana (Seguy, 1961) (N)
Pipizella pennina (Goeldlin de Tiefenau, 1974) (N)
Pipizella siciliana Nelsen & Torp Pedersen, 1973 (Si) (E)
Pipizella viduata (Linné, 1758) (N)
Pipizella virens (Fabricius, 1805) (N, S, Si)
Pipizella zeneggensis (Goeldlin de Tiefenau, 1974) (N, S)

Trichopsomyia Williston, 1888

Trichopsomyia flavitarsis (Meigen, 1822) (N, S)

Triglyphus Loew, 1840

Triglyphus primus Loew, 1840 (N, S)

Chamaesyrrhus Mik, 1895

Chamaesyrrhus lusitanicus Mik, 1898 (N)
Chamaesyrrhus scaevoides (Fallén, 1817) (N)

Ferdinandea Rondani, 1844

Ferdinandea aurea Rondani, 1844 (N, Si)
Ferdinandea cuprea (Scopoli, 1763) (N, S, Si, Sa)
Ferdinandea nigrifrons (Egger, 1860) (N)
Ferdinandea ruficornis (Fabricius, 1775) (N, S)

Ischyroptera Pokorny, 1887

Ischyroptera bipilosa Pokorny, 1887 (N) (*)

Pelecocera Meigen, 1822

Pelecocera tricineta Meigen, 1822 (N)

Rhingia Scopoli, 1763

Rhingia borealis Ringdahl, 1928 (N)
Rhingia campestris Meigen, 1922 (N)
Rhingia rostrata (Linné, 1758) (N, S)

Cheilosia Meigen, 1822

Cheilosia aestivalis (Becker, 1894) (N)
Cheilosia athena (Roser, 1840) (N)
Cheilosia albipila Meigen, 1838 (N)
Cheilosia albitarsis (Meigen, 1822) (N, S, Si)
Cheilosia alpestris (Becker, 1894) (N)
Cheilosia amicorum Van der Goot, 1964 (Si) (E)
Cheilosia antiqua (Meigen, 1822) (N, S)
Cheilosia atriseta (Oldenberg, 1916) (S)
Cheilosia baldensis (Marcuzzi, 1941) (N) (E) (*)
Cheilosia barbata Loew, 1857 (N, S)
Cheilosia bergenstammi (Becker, 1894) (N)
Cheilosia brachiptera Palma, 1863 (N, S)
Cheilosia bracusi Vujic & Claussen, 1994 (N, S)
Cheilosia braueri (Becker, 1894) (N) (*)
Cheilosia brevipennis (Becker, 1894) (N)
Cheilosia brunnipennis (Becker, 1894) (Si)
Cheilosia caerulescens (Meigen, 1922) (N)
Cheilosia canicularis (Panzer, 1801) (N, S, Si)
Cheilosia capitata Goeldlin de Tiefenau, 1974 (N) (*)
Cheilosia carbonaria Egger, 1860 (N)
Cheilosia chloris (Meigen, 1822) (N, S)
Cheilosia chrysocoma (Meigen, 1822) (N, S)
Cheilosia coerulescens (Meigen, 1822) (N)
Cheilosia correcta (Becker, 1894) (S)
Cheilosia crassiseta Loew, 1859 (N)
Cheilosia cynocephala Loew, 1840 (N)
Cheilosia derasa Loew, 1857 (N)

Cheilosia erythrostroma Rondani, 1868 (N) (E)
Cheilosia faucis (Becker, 1894) (N)
Cheilosia flavipes (Panzer, 1798) (N, S)
Cheilosia fraterna (Meigen, 1830) (N, S)
Cheilosia frontalis Loew, 1857 (N, S)
Cheilosia gagatea Loew, 1857 (N)
Cheilosia gemina (Becker, 1894) (N, S)
Cheilosia gigantea (Zetterstedt, 1838) (N, S)
Cheilosia griseiventris Loew, 1857 (S, Si)
Cheilosia grisella (Becker, 1894) (N)
Cheilosia grossa (Fallén, 1817) (N, S)
Cheilosia hercyniae Loew, 1857 (N)
Cheilosia honesta Rondani, 1868 (N)
Cheilosia hypena (Becker, 1894) (N, S)
Cheilosia illustrata (Harris, 1780) (N, S)
Cheilosia imperfecta (Becker, 1921) (N) (E)
Cheilosia impressa Loew, 1840 (N, S)
Cheilosia impudens (Becker, 1894) (N)
Cheilosia laeviseta Claussen, 1987 (N)
Cheilosia laeviventris Loew, 1857 (S)
Cheilosia latifacies Loew, 1857 (N, S, Si)
Cheilosia latifrons (Zetterstedt, 1843) (N, S)
Cheilosia lenis (Becker, 1894) (N)
Cheilosia loewi (Becker, 1894) (N) (*)
Cheilosia longula (Zetterstedt, 1838) (N, S)
Cheilosia marginata (Becker, 1894) (N)
Cheilosia melanopa (Zetterstedt, 1843) (N)
Cheilosia melanura (Becker, 1894) (N, S)
Cheilosia montana Egger, 1860 (N)
Cheilosia morio (Zetterstedt, 1838) (N)
Cheilosia mutabilis (Fallén, 1817) (N, S)
Cheilosia nasutula (Becker, 1894) (N)
Cheilosia nebulosa (Verrall, 1871) (N, S)
Cheilosia nigerrima (Lindner, 1954) (N)
Cheilosia nigripes (Meigen, 1822) (N, S)
Cheilosia nivalis (Becker, 1894) (N, S)
Cheilosia omissa (Becker, 1894) (N)
Cheilosia pagana (Meigen, 1822) (N)
Cheilosia pedemontana Rondani, 1857 (N)
Cheilosia personata Loew, 1857 (N, S)
Cheilosia pictipennis Egger, 1860 (N)
Cheilosia pilifer (Becker, 1894) (N)
Cheilosia proxima (Zetterstedt, 1843) (N, S)
Cheilosia psilophthalma (Becker, 1894) (N)
Cheilosia pubera (Zetterstedt, 1838) (N, S)
Cheilosia rhynchops Egger, 1860 (N, S)
Cheilosia ruffipes (Preyssler, 1793) (N, S, Si)
Cheilosia ruralis (Meigen, 1822) (N, S)

Cheilosa sahlbergi (Becker, 1894) (N)
Cheilosa schineri Egger, 1860 (N, Si)
Cheilosa scutellata (Fallén, 1817) (N, S, Si)
Cheilosa semifasciata (Becker, 1894) (N)
Cheilosa siciliana (Becker, 1894) (Si) (E)
Cheilosa signaticornis (Becker, 1894) (N)
Cheilosa testaceicornis Rondani, 1857 (N) (E)
Cheilosa umbrisquama (Becker, 1894) (S)
Cheilosa variabilis (Panzer, 1798) (N, S, Si)
Cheilosa velutina Loew, 1840 (N)
Cheilosa vernalis (Fallén, 1817) (N, S)
Cheilosa vicina (Zetterstedt, 1849) (N)
Cheilosa violaceozonata Palma, 1863 (S) (E)
Cheilosa vulpina (Meigen, 1822) (N, S)
Cheilosa zetterstedti (Becker, 1894) (N)

Callicera Panzer, 1809

Callicera aenea Fabricius, 1777 (N, S)
Callicera aurata Rossi, 1790 (N, S, Si)
Callicera fagesii Guérin-Méneville, 1844 (N, S)
Callicera macquarti Rondani, 1844 (S)
Callicera rufa Schummel, 1842 (N)
Callicera spinolae Rondani, 1844 (N, S, Si)

Volucella Geoffroy, 1762

Volucella bombylans (Linné, 1758) (N, S)
Volucella inanis (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
Volucella inflata (Fabricius, 1794) (N, S)
Volucella pellucens (Linné, 1758) (N, S, Si)
Volucella zonaria (Poda, 1761) (N, S, Si, Sa)

Brachyopa Meigen, 1822

Brachyopa bicolor (Fallén, 1817) (N, S)
Brachyopa dorsata Zetterstedt, 1837 (N)
Brachyopa maculipennis Thompson, 1980 (N)
Brachyopa pilosa Collin, 1939 (N)
Brachyopa testacea (Fallén, 1817) (N)

Chrysogaster Meigen, 1803

Chrysogaster basalis Loew, 1857 (N, S, Si, Sa)
Chrysogaster chalybeata Meigen, 1922 (N, S) (*)
Chrysogaster hirtella Loew, 1843 (N)
Chrysogaster macquarti Loew, 1843 (N, Si)
Chrysogaster solstitialis (Fallén, 1817) (N, S, Si)

Melanogaster Rondani, 1857

Melanogaster lucida (Scopoli, 1763) (N, S, Si)

Lejogaster Rondani, 1857

Lejogaster metallina (Fabricius, 1781) (N, S)

Lejogaster tarsata (Meigen, 1822) (N, S, Si, Sa)

Lejogaster virgo Rondani, 1865 (N) (E)

Myolepta Newman, 1838

Myolepta luteola (Gmelin, 1790) (N, S, Si)

Myolepta nigritarsis Coe, 1957 (S)

Myolepta vara (Panzer, 1798) (N, S)

Orthonevra Macquart, 1829

Orthonevra brevicornis (Loew, 1843) (S)

Orthonevra elegans (Meigen, 1822) (N)

Orthonevra frontalis (Loew, 1843) (N, S)

Orthonevra nobilis (Fallén, 1817) (N, S, Si)

Orthonevra plumbago (Loew, 1840) (N, S)

Orthonevra tristis (Loew, 1781) (N)

Riponnensia Mainbach, Goeldlin de Tiefenau & Speight, 1994

Riponnensia insignis (Loew, 1843) (N)

Riponnensia longicornis (Loew, 1843) (Si)

Riponnensia splendens (Meigen, 1822) (N, S, Si)

Neoascia (Neoascia) Williston, 1886

Neoascia (Neoascia) annexa (O.F. Müller, 1776) (N, S)

Neoascia (Neoascia) podagrica (Fabricius, 1775) (N, S, Si)

Neoascia (Neoascia) tenur (Harris, 1780) (N)

Neoascia (Neoasciella) Stackelberg, 1965

Neoascia (Neoasciella) meticulosa (Scopoli, 1763) (N)

Neoascia (Neoasciella) obliqua Coe, 1940 (S)

Sphegina Meigen, 1822

Sphegina clavata (Scopoli, 1763) (N, S)

Sphegina clunipes (Fallén, 1816) (N, S, Si)

Sphegina elegans (Schummel, 1843) (N)

Sphegina cornifera Becker, 1921 (N)
Sphegina latifrons Egger, 1865 (N)
Sphegina montana Becker, 1921 (N)
Sphegina sibirica Stackelberg, 1953 (N)
Sphegina sphegina (Zetterstedt, 1838) (N)
Sphegina verecunda Collin, 1937 (N)

Arctophila Schiner, 1860

Arctophila bombiformis (Fallén, 1810) (N, S)
Arctophila superbiens (O.F. Müller, 1776) (N, S)

Sericomyia Meigen, 1803

Sericomyia lappona (Linné, 1758) (N, S)
Sericomyia silentis (Harris, 1776) (S)

Eumerus Meigen, 1822

Eumerus amoenus Loew, 1848 (N, S, Si)
Eumerus argyropus Loew, 1848 (N, S)
Eumerus barbarus Coquebert, 1804 (N, S, Si, Sa)
Eumerus basalis Loew, 1848 (N, S)
Eumerus emarginatus Loew, 1848 (N, S, Si)
Eumerus etnensis Van der Goot, 1964 (Si) (E)
Eumerus flavitarsis Zetterstedt, 1843 (N)
Eumerus graecus Becker, 1921 (Si)
Eumerus grandis Meigen, 1822 (N, S)
Eumerus hungaricus Szilady, 1940 (N)
Eumerus lasiops Rondani, 1857 (N, S)
Eumerus lunatus (Fabricius, 1794) (Si)
Eumerus nebrodensis Rondani, 1868 (Si) (E)
Eumerus nigrostriatus Lambeck, 1973 (S)
Eumerus nudus Loew, 1848 (S, Si)
Eumerus obliquus (Fabricius, 1805) (Si, Sa)
Eumerus olivaceus Loew, 1848 (N, S, Si)
Eumerus ornatus Meigen, 1822 (N, S, Si)
Eumerus ovatus Loew, 1848 (N, S)
Eumerus pulchellus Loew, 1848 (S, Si, Sa)
Eumerus pusillus Loew, 1848 (S, Si)
Eumerus ruficornis Meigen, 1822 (N, S, Si)
Eumerus sabulonum (Fallén, 1817) (N, S)
Eumerus sicilianus Van der Goot, 1964 (Si) (E)
Eumerus sogdianus Stackelberg, 1952 (Sa)
Eumerus strigatus (Fallén, 1817) (N, S)
Eumerus sulcitibius Rondani, 1868 (N, S, Si, Sa)
Eumerus tarsalis Loew, 1848 (N, S)
Eumerus tricolor (Fabricius, 1798) (N, S)

Eumerus tuberculatus Rondani, 1857 (N)
Eumerus uncipes Rondani, 1850 (N, S)

Merodon Meigen, 1803

Merodon aberrans Egger, 1860 (N, S, Si)
Merodon abruzzensis Van der Goot, 1969 (S) (E)
Merodon alexeji Paramonov, 1925 (N, S)
Merodon aeneus Meigen, 1822 (N, S, Si)
Merodon albifrons Meigen, 1822 (N, S, Si)
Merodon annulatus (Fabricius, 1794) (N, S)
Merodon armipes Rondani, 1843 (N, S)
Merodon avidus (Rossi, 1790) (N, S, Si, Sa)
Merodon biarcuatus Curran, 1939 (S)
Merodon cinereus (Fabricius, 1794) (N, S, Si)
Merodon clavipes (Fabricius, 1781) (N, S, Si, Sa)
Merodon clunipes Sack, 1913 (N, Si)
Merodon constans (Rossi, 1794) (N, S, Si)
Merodon distinctus Palma, 1863 (Si)
Merodon elegans Hurkmans, 1993 (S, Si)
Merodon eques (Fabricius, 1805) (Sa)
Merodon equestris (Fabricius, 1794) (N, S)
Merodon femoratus Sack, 1913 (S)
Merodon flavus Sack, 1913 (N)
Merodon funestus (Fabricius, 1794) (N, S, Si, Sa)
Merodon longicornis Sack, 1913 (N, S)
Merodon mariae Hurkmans, 1993 (Si, Sa)
Merodon minutus Strobl, 1893 (S, Sa)
Merodon natans (Fabricius, 1794) (N, S, Sa)
Merodon nigratarsis Rondani, 1845 (N, S, Si)
Merodon pruni (Rossi, 1790) (N, S, Si)
Merodon rubidiventris A. Costa, 1884 (Sa)
Merodon ruficornis Meigen, 1822 (N, S, Si)
Merodon rufus Meigen, 1838 (N, S)
Merodon splendens Hurkmans, 1993 (Sa) (E)
Merodon testaceus Sack, 1913 (N, S)
Merodon toscanus Hurkmans, 1993 (S) (E)
Merodon tricinctus Sack, 1913 (S)
Merodon trochantericus A. Costa, 1884 (Sa)
Merodon velox Loew, 1869 (S)

Platynochaetus Wiedemann, 1830

Platynochaetus macquarti Loew, 1862 (Si)
Platynochaetus setosus (Fabricius, 1794) (S, Si)

Psilota Meigen, 1822

Psilota anthracina Meigen, 1822 (N, S)
Psilota innupta Rondani, 1857 (N)

Psarus Latreille, 1804

Psarus abdominalis (Fabricius, 1794) (N)

Ceriana Rafinesque, 1815

Ceriana conopsoidea (Linné, 1758) (N, S, Si)
Ceriana vespiformis (Latreille, 1804) (N, S, Si, Sa)

Sphiximorpha Rondani, 1850

Sphiximorpha garibaldii Rondani, 1860 (N) (E) (*)
Sphiximorpha petronillae Rondani, 1850 (N) (E) (*)
Sphiximorpha subsessilis Illiger, 1807 (N, S)

***Eristalinus* (*Eristalinus*)** Rondani, 1845

Eristalinus (*Eristalinus*) *sepulchralis* (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)

***Eristalinus* (*Eristalodes*)** Mik, 1897

Eristalinus (*Eristalodes*) *taeniops* (Wiedemann, 1818) (N, S, Si)

***Eristalinus* (*Lathyrophthalmus*)** Mik, 1897

Eristalinus (*Lathyrophthalmus*) *aeneus* (Scopoli, 1763) (N, S, Si, Sa)
Eristalinus (*Lathyrophthalmus*) *megacephalus* (Rossi, 1794) (S)

***Eristalis* (*Eristalis*)** Latreille, 1804

Eristalis (*Eristalis*) *tenax* (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)

***Eristalis* (*Eoseristalis*)** Kanervo, 1938

Eristalis (*Eoseristalis*) *alpina* (Panzer, 1798) (N, S)
Eristalis (*Eoseristalis*) *arbustorum* (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)
Eristalis (*Eoseristalis*) *cryptarum* (Fabricius, 1794) (N)
Eristalis (*Eoseristalis*) *horticola* (De Geer, 1776) (N, S)
Eristalis (*Eoseristalis*) *interrupta* (Poda, 1761) (N, S, Si, Sa)
Eristalis (*Eoseristalis*) *intricaria* (Linné, 1758) (N, S)
Eristalis (*Eoseristalis*) *jugorum* Egger, 1858 (N)
Eristalis (*Eoseristalis*) *nigritarsis* Macquart, 1834 (N) (*)
Eristalis (*Eoseristalis*) *oestracea* (Linné, 1758) (N)
Eristalis (*Eoseristalis*) *pertinax* (Scopoli, 1763) (N, S)
Eristalis (*Eoseristalis*) *picea* (Fallén, 1817) (N)

Eristalis (Eoseristalis) pratorum Meigen, 1822 (N, S, Si)
Eristalis (Eoseristalis) rupium Fabricius, 1805 (N)
Eristalis (Eoseristalis) vitripennis Strobl, 1893 (N, S)

Anasimyia Schiner, 1864

Anasimyia contracta Claussen & Torp Pedersen, 1980 (N, S, Sa)
Anasimyia lineata (Fabricius, 1787) (N, Si)
Anasimyia transfuga (Linné, 1758) (N)

Helophilus Meigen, 1822

Helophilus parallelus (Harris, 1776) (N, S, Si)
Helophilus pendulus (Linné, 1758) (N, S)

Parhelophilus Girschner, 1897

Parhelophilus consimilis Malm, 1863 (N)
Parhelophilus frutetorum (Fabricius, 1775) (N, Si)
Parhelophilus versicolor (Fabricius, 1794) (N, Sa)

Mallota Meigen, 1822

Mallota cimbiciformis (Fallén, 1817) (N, S)
Mallota fuciformis (Fabricius, 1794) (N, S)

Mesembrius Rondani, 1857

Mesembrius peregrinus (Loew, 1846) (N, Si)

Myathropa Rondani, 1845

Myathropa florea (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)

Blera Billberg, 1820

Blera fallax (Linné, 1758) (N, S)

Brachymyia Williston, 1882

Brachymyia berberina (Fabricius, 1805) (N, S)
Brachymyia floccosa (Meigen, 1822) (N)

Caliprobola Rondani, 1845

Caliprobola speciosa (Rossi, 1790) (N, S)

Criorhina Meigen, 1822

Criorhina asilica (Fallén, 1816) (N)
Criorhina ranunculi (Panzer, 1804) (N, S)

Milesia Latreille, 1804

Milesia crabroniformis (Fabricius, 1775) (N, S, Si)
Milesia semiluctifera (Villers, 1789) (N, S, Si)

Palumbia Rondani, 1865

Palumbia bellieri (Bigot, 1860) (Si) (E)

Pocota Le Peletier & Serville, 1828

Pocota personata (Harris, 1780) (N)

Spilomyia Meigen, 1803

Spilomyia boschmai Lucas, 1964 (Si) (E)
Spilomyia digitata (Rondani, 1865) (N, S, Si)
Spilomyia diophthalma (Linné, 1758) (N, Si)
Spilomyia manicata (Rondani, 1865) (N, S)
Spilomyia saltuum (Fabricius, 1794) (N, S, Si)

Syritta Le Peletier & Serville, 1828

Syritta flaviventris Macquart, 1842 (N, S, Si, Sa)
Syritta pipiens (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)

Temnostoma Le Peletier & Serville, 1828

Temnostoma vespiforme (Linné, 1758) (N)

Tropidia Meigen, 1822

Tropidia fasciata Meigen, 1822 (N)
Tropidia scita (Harris, 1780) (N)

Brachypalpoides Hippa, 1978

Brachypalpoides lentus (Meigen, 1822) (N, S, Si)

Brachypalpus Macquart, 1834

Brachypalpus chrysites Egger, 1859 (N)
Brachypalpus valgus (Panzer, 1798) (N, S)

Chalcosyrphus (Xylotina) Hippi, 1978

Chalcosyrphus (Xylotina) nemorum (Fabricius, 1805) (N)

Chalcosyrphus (Xylotodes) Shannon, 1926

Chalcosyrphus (Xylotodes) piger (Fabricius, 1794) (N, S)

Chalcosyrphus (Xylotomima) Shannon, 1926

Chalcosyrphus (Xylotomima) femoratus (Linné, 1758) (N)

Chalcosyrphus (Xylotomima) valgus (Gmelin, 1790) (N)

Xylota Meigen, 1822

Xylota coeruleiventris Zetterstedt, 1838 (N)

Xylota florum (Fabricius, 1805) (N, S)

Xylota ignava (Panzer, 1798) (N, S)

Xylota segnis (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)

Xylota semulatra (Harris, 1780) (N)

Xylota sylvarum (Linné, 1758) (N, S)

Xylota tarda Meigen, 1822 (N)

Xylota triangularis Zetterstedt, 1838 (N)

Xylota xanthocnema Collin, 1939 (N)

Microdon Meigen, 1803

Microdon devius (Linné, 1761) (N)

Microdon eggeri Mik, 1897 (N)

Microdon latifrons Loew, 1856 (N)

Microdon mutabilis (Linné, 1758) (N, S)

Note

Sphaerophoria abbreviata: Specie del Nord Europa. La citazione per l'Italia potrebbe riferirsi a *S. fatarum*.

Melanostoma abruzzense: Molto probabilmente è da attribuirsi a *Platycheirus* subg. *Pachysphyria*.

Platycheirus (Platycheirus) muelleri: A questa specie vanno forse attribuite le citazioni di *P. albimanus* per l'Italia.

Platycheirus (Platycheirus) nielsenii: Lo status di questa specie è da precisare.

Paragus (Paragus) hermonensis: Specie descritta di Israele, citata di Lombardia, merita conferma.

Ischyroptera bipilosa: Specie erratica di alta quota nota in Italia solo per il passo dello Stelvio.

Cheilosia baldensis: Specie nota solo sul tipo, peraltro distrutto.

Cheilosia braueri: Probabile sinonimo di *C. montana*.

Cheilosia capitata: Probabile sinonimo di *C. hypena*.

Cheilosia loewi: Probabile sinonimo di *C. omissa*.

Chrysogaster chalybeata: A questa specie vanno attribuite le citazioni di *C. cimiteriorum* per l'Italia.

Sphiximorpha garibaldii: Specie nota solo sul tipo e mai più rinvenuta.

Sphiximorpha petronillae: Specie nota solo sul tipo e mai più rinvenuta.

Eristalis (Eoseristalis) nigratarsis: Probabile sinonimo di *E. cryptarum*.

Pipunculidae

Chalarus Walker, 1834

Chalarus perplexus Jervis, 1992 (N)

Chalarus zyginiae Jervis, 1992 (N)

Verrallia Mik, 1899

Verrallia aucta (Fallén, 1817) (S)

Jassidophaga Aczél, 1939

Jassidophaga villosa (von Roser, 1840) (S)

Nephrocerus Zetterstedt, 1838

Nephrocerus scutellatus (Macquart, 1834) (N)

Pipunculus Latreille, 1802

Pipunculus calceatus von Roser, 1840 (N, S)

Pipunculus campestris Latreille, 1804 (N, S)

Pipunculus fonsecai Coe, 1966 (N)

Pipunculus oldenbergi Collin, 1956 (S)

Pipunculus spinipes Meigen, 1830 (N)

Pipunculus tenuirostris Kozánek, 1981 (N)

Pipunculus thomsoni Becker, 1898 (N)

Pipunculus varipes Meigen, 1824 (N)

Cephalosphaera Enderlein, 1936

Cephalosphaera furcata (Egger, 1860) (N)

Cephalops Fallén, 1810

Cephalops aeneus Fallén, 1810 (N)

Cephalops carinatus (Verral, 1901) (N, S)

Cephalops obtusinervis (Zetterstedt, 1844) (N)

Cephalops semifumosus (Kowarz, 1887) (S)

Cephalops signatus (Becker, 1900) (N)

Cephalops subultimus Collin, 1956 (N, S)
Cephalops ultimus (Becker, 1900) (N)

Microcephalops De Meyer, 1989

Microcephalops vestitus Beker, 1900 (N)

Eudorylas Aczél, 1940

Eudorylas demeyeri Kozánek, 1993 (N, S)
Eudorylas elephas (Becker, 1898) (N)
Eudorylas fascipes (Zetterstedt, 1844) (S)
Eudorylas furvulus Collin, 1956 (N)
Eudorylas fuscipes (Zetterstedt, 1844) (N, S)
Eudorylas horridus (Becker, 1898) (N, S)
Eudorylas imperfectus (Becker, 1921) (S)
Eudorylas inferus Collin, 1956 (N)
Eudorylas melanostolus (Becker, 1898) (N)
Eudorylas montium (Becker, 1898) (N)
Eudorylas nemoralis Kozánek, 1993 (N)
Eudorylas obliquus Coe, 1966 (N)
Eudorylas obscurus Coe, 1966 (S)
Eudorylas pannonicus (Becker, 1898) (S)
Eudorylas ruralis (Meigen, 1824) (N, S)
Eudorylas sericeus (Becker, 1898) (S)
Eudorylas slovacus Kozánek, 1993 (N?)
Eudorylas subterminalis Collin, 1956 (N)
Eudorylas terminalis (Thomson, 1869) (S)
Eudorylas zermattensis (Becker, 1898) (N)
Eudorylas zonellus Collin, 1956 (N)

Dorylomorpha Aczél, 1939

Dorylomorpha aczeli Hardy, 1947 (N)
Dorylomorpha beckeri (Aczél, 1939) (N)
Dorylomorpha borealis (Wahlgren, 1910) (N)
Dorylomorpha confusa (Verrall, 1901) (N)
Dorylomorpha maculata (Walker, 1834) (N)
Dorylomorpha xanthocera (Kowarz, 1887) (N)

Tomosvaryella Aczél, 1939

Tomosvaryella cilifemorata (Becker, 1907) (N)
Tomosvaryella cilitarsis (Strobl, 1910) (S)
Tomosvaryella frontata (Becker, 1898) (N, S)
Tomosvaryella geniculata (Meigen, 1824) (N, S)
Tomosvaryella hirticollis (Becker, 1910) (N)
Tomosvaryella kuthyi Aczél, 1944 (N, S)

Tomosvaryella minima (Becker, 1898) (S)
Tomosvaryella sylvatica (Meigen, 1824) (N, S)

Conopidae

Abrachyglossum Kröber, 1919

Abrachyglossum capitatum (Loew, 1847) (N)

Leopoldius Rondani, 1843

Leopoldius brevirostris (Germar, 1827) (N)
Leopoldius calceatus (Rondani, 1857) (N, Si)
Leopoldius coronatus (Rondani, 1857) (N, S)
Leopoldius diadematus Rondani, 1845 (N, S)
Leopoldius signatus (Wiedmann in Meigen, 1824) (N, S, Si)
Leopoldius valvatus Kröber, 1914 (N)

Conops Linnaeus, 1758

Conops ceriaeformis Meigen, 1824 (N, S)
Conops elegans Meigen, 1824 (N, S, Si)
Conops flavifrons Meigen, 1824 (N, Si)
Conops flavipes Linnaeus, 1758 (N, S, Si)
Conops insignis Loew, 1848 (N, S, Si)
Conops quadrifasciatus De Geer, 1776 (N, S, Si)
Conops scutellatus Meigen, 1804 (N, S)
Conops silaceus Wiedmann in Meigen, 1824 (N, S)
Conops strigatus Wiedmann in Meigen, 1824 (N, S)
Conops vesicularis Linnaeus, 1761 (N, S)
Conops vitellinus Loew, 1847 (N, S, Si)

Physocephala Schiner, 1861

Physocephala antiqua (Wiedmann, 1830) (S) (*)
Physocephala chrysorrhoea (Meigen, 1824) (N, S)
Physocephala curticornis Kröber, 1915 (N) (*)
Physocephala lacera (Meigen, 1824) (N, S, Si)
Physocephala laticincta (Brullé, 1832) (S)
Physocephala nigra (De Geer, 1776) (N?)
Physocephala pusilla (Meigen, 1824) (N, S, Si)
Physocephala rufipes (Fabricius, 1781) (N, S, Si)
Physocephala truncata (Loew, 1847) (N, S, Si, Sa)
Physocephala vaginalis (Rondani, 1865) (N, Si)
Physocephala vittata (Fabricius, 1794) (N, S, Si, Sa)

Zodion Latreille, 1796

Zodion carceli Robineau-Desvoidy, 1830 (S)
Zodion cinereum (Fabricius, 1794) (N, S, Si, Sa)
Zodion erythrum Rondani, 1865 (S)
Zodion notatum (Meigen, 1804) (N, S, Si)

Myopa Fabricius, 1775

Myopa buccata (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)
Myopa dorsalis Fabricius, 1794 (N, S)
Myopa fasciata Meigen, 1804 (N, S, Si)
Myopa morio Meigen, 1804 (N, S)
Myopa occulta Wiedmann in Meigen, 1824 (N, S, Si)
Myopa picta Panzer, 1798 (N, S)
Myopa polystigma Rondani, 1857 (N, S)
Myopa stigma Meigen, 1824 (N, S)
Myopa strandi Duda, 1940 (N?)
Myopa testacea (Linnaeus, 1767) (N, S, Si, Sa)
Myopa variegata Meigen, 1804 (N, S)
Myopa vicaria Walker, 1849 (N)

Melanosoma Robineau-Desvoidy, 1853

Melanosoma bicolor (Meigen, 1824) (N, S, Si)

Myopotta Zimina, 1969

Myopotta pallipes (Wiedmann in Meigen, 1824) (N, S, Si)
Myopotta rubripes (Villeneuve, 1909) (N)

Thecophora Rondani, 1845

Thecophora atra (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa)
Thecophora distincta (Wiedmann in Meigen, 1824) (N, S, Si)
Thecophora fulvipes (Robineau-Desvoidy, 1830) (N, S)
Thecophora longirostris Lyneborg, 1962 (N, S, Si)
Thecophora melanopa Rondani, 1857 (N, S)
Thecophora pusilla (Meigen, 1824) (N, S, Si)

Sicus Scopoli, 1763

Sicus abdominalis Kröber, 1915 (N)
Sicus ferrugineus (Linnaeus, 1761) (N, S, Si, Sa)
Sicus nigritarsis Zimina, 1975 (N) (*)

Dalmannia Robineau-Desvoidy, 1830

Dalmannia aculeata (Linnaeus, 1761) (S, Si)

Dalmannia dorsalis (Fabricius, 1794) (N, S)
Dalmannia marginata (Meigen, 1824) (N, S)
Dalmannia punctata (Fabricius, 1794) (N, S, Si)

Note

Physocephala antiqua: Nuova per la fauna italiana.

Physocephala curticornis: Nuova per la fauna italiana.

Sicus: *Sicus femoralis* Rondani non è incluso nella lista perché nella collezione Rondani va sotto questo nome una specie del genere *Myopa*.

Sicus nigratarsis: Nuova per la fauna italiana.

Lonchaeidae

Dasiops Rondani, 1856

Dasiops calvus Morge, 1959 (N)
Dasiops ensifer (Meigen, 1826) (Sa)
Dasiops latifrons (Meigen, 1826) (S, Si)

Chaetolonchaea Czerny, 1934

Chaetolonchaea dasyops (Meigen, 1826) (N, S)
Chaetolonchaea pallipennis (Zetterstedt, 1855) (N)

Earomyia Zetterstedt, 1842

Earomyia adriatica (Becker, 1859) (N)
Earomyia caudicola Morge, 1959 (N)
Earomyia impossibile Morge, 1959 (S)
Earomyia viridiana (Meigen, 1826) (S, Si)

Lamprolonchaea Bezzi, 1920

Lamprolonchaea smaragdi (Walker, 1849) (S, Si)

Lonchaea Fallén, 1820

Lonchaea albigena Collin, 1953 (N)
Lonchaea albitarsis Zetterstedt, 1837 (S)
Lonchaea chorea (Fabricius, 1781) (N, S)
Lonchaea contigua Collin, 1953 (N)
Lonchaea contraria Czerny, 1934 (N, S)
Lonchaea laticornis Meigen, 1826 (N)
Lonchaea palposa Zetterstedt, 1847 (N, S)
Lonchaea scutellaris Rondani, 1874 (N, S)
Lonchaea sylvatica Beling, 1873 (N)

Lonchaea tarsata Fallén, 1820 (N)

Setisquamalonchaea Morge, 1963

Setisquamalonchaea fumosa (Egger, 1862) (N)

Silba Macquart, 1851

Silba adipata McAlpine, 1956 (S)

Silba virescens Macquart, 1851 (S)

Otitidae

Dorycera Meigen, 1830

Dorycera graminum (Fabricius, 1794) (N, S)

Dorycera grandis (Rondani, 1869) (N, S)

Otites Latreille, 1804

Otites anthomyina Hendel, 1911 (Sa)

Otites atripes Loew, 1858 (Si) (E)

Otites formosa (Panzer, 1798) (N)

Otites fastuosa (Rondani, 1869) (N, S)

Otites guttata (Meigen, 1830) (N)

Otites immaculata (Rondani, 1869) (N)

Otites lamed (Schrank, 1781) (N)

Otites levigata (Loew, 1873) (S)

Otites maculipennis (Olivier in Latreille, 1811) (N)

Otites murina (Loew, 1846) (N)

Otites nebulosa (Olivier in Latreille, 1811) (N)

Tetanops Fallén, 1820

Tetanops contarinii Rondani, 1869 (N, S) (E) (*)

Tetanops corsicana Becker, 1909 (S, Si, Sa)

Tetanops flavescens Macquart, 1835 (S)

Hypochra Loew, 1868

Hypochra albipennis (Loew, 1864) (N, S)

Hypochra parmensis (Rondani, 1869) (N, S)

Hypochra subapennina (Rondani, 1869) (N, S)

Meliera Robineau-Desvoidy, 1830

Meliera cana (Loew, 1858) (S)

Meliera omissa (Meigen, 1826) (N, S, Si, Sa)

Meliera picta (Meigen, 1826) (N, S)

Ceroxys Macquart, 1835

Ceroxys fraudolosa (Loew, 1864) (N, S, Si, Sa)

Ceroxys hortulana (Rossi, 1790) (N, S, Si, Sa)

Ceroxys urticae (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Herina Robineau-Desvoidy, 1830

Herina frondescentiae (Linnaeus, 1758) (N)

Herina germinationis (Rossi, 1790) (N, S)

Herina ghilianii Rondani, 1869 (Si) (*)

Herina longistylata Rivosecchi, 1992 (S) (E) (*)

Herina lugubris (Meigen, 1826) (N, S, Sa)

Herina oscillans (Meigen, 1826) (N, Sa)

Herina paludum (Fallén, 1820) (N)

Herina palustris (Meigen, 1826) (N, S)

Herina parva (Loew, 1864) (N)

Herina pseudoluctuosa Hennig, 1830 (N, S, Sa)

Herina scutellaris Robineau-Desvoidy, 1830 (N, S, Sa)

Herina tristis (Meigen, 1826) (N, S)

Cephalia Meigen, 1826

Cephalia rufipes Meigen, 1826 (N, S)

Seioptera Kirby, 1817

Seioptera vibrans (Linnaeus, 1758) (N, S)

Systata Loew, 1868

Systata rivularis (Fabricius, 1805) (Si)

Systata silvicola Rivosecchi, 1992 (S) (E) (*)

Myennis Robineau-Desvoidy, 1830

Myennis octopunctata (Coquebert, 1798) (N, S, Sa)

Note

Tetanops contarinii: Tutti i litorali marittimi italiani, escluse le isole di Sicilia e Sardegna.

Herina ghilianii: Solo l'isola di Malta e la Sicilia occidentale.

Herina longistylata: Solo l'Italia centrale (Marche e Abruzzo).

Systata silvicola: Italia centromeridionale (Lazio e Basilicata).

Ulidiidae

Physiphora Fallén, 1810

Physiphora demandata (Fabricius, 1789) (N, S, Si, Sa)

Ulidia Meigen, 1826

Ulidia albidipennis Loew, 1845 (N, S)

Ulidia apicalis (Meigen, 1826) (N, S, Si)

Ulidia atrata Loew, 1868 (S)

Ulidia erythrophthalma Meigen, 1826 (N, S, Si)

Ulidia megacephala Loew, 1845 (S)

Ulidia nigripennis Loew, 1845 (N, S, Si)

Ulidia parallela Loew, 1845 (N, S)

Ulidia ruficeps Becker, 1913 (S)

Ulidia salonikensis Hennig, 1940 (S)

Timia (Empyelocera) Loew, 1866

Timia (Empyelocera) melanorrhina (Loew, 1866) (S)

Timia (Empyelocera) xanthaspis (Loew, 1868) (S)

Euxesta Loew, 1868

Euxesta pechumani Curran, 1938 (N, S)

Homalocephala Zetterstedt, 1838

Homalocephala albitarsis Zetterstedt, 1838 (N)

Homalocephala apicalis (Wahlberg, 1839) (N)

Homalocephala bimaculata (Wahlberg, 1839) (N)

Homalocephala bipunctata (Loew, 1854) (N)

Platystomatidae

Rivellia Robineau-Desvoidy, 1830

Rivellia syngenesiae (Fabricius, 1781) (N, S)

Platystoma Meigen, 1803

Platystoma gemmationis (Rondani, 1869) (N, S)

Platystoma insularum (Rondani, 1869) (Sa)

Platystoma lugubre (Robineau-Desvoidy, 1830) (N, S, Si, Sa)

Platystoma plantationis (Rondani, 1869) (N)
Platystoma pubescens Loew, 1845 (N?)
Platystoma seminationis (Fabricius, 1775) (N, S)
Platystoma subtile Loew, 1868 (Si)
Platystoma tegularum Loew, 1859 (N, S)

Tephritidae

Myopites Blot, 1827

Myopites apicata Freidberg, 1979 (N)
Myopites cypriaca Hering, 1938 (Sa?)
Myopites inulaedyssentericae Blot, 1827 (S, Si, Sa)
Myopites lelæ Dirlbek, 1974 (S)
Myopites limbardæ Schiner, 1864 (N, S)
Myopites longirostris (Loew, 1845) (S, Si)

Urophora (Urophora) Robineau-Desvoidy, 1830

Urophora (Urophora) affinis (Frauenfeld, 1857)
Urophora (Urophora) affinis affinis (Frauenfeld, 1857) (N, S)
Urophora (Urophora) aprica (Fallén, 1820) (N, S, Si)
Urophora (Urophora) cardui (Linnaeus, 1758) (N)
Urophora (Urophora) jaceana (Hering, 1935) (N)
Urophora (Urophora) jaculata Rondani, 1870 (N, S)
Urophora (Urophora) mauritanica Macquart, 1843 (S)
Urophora (Urophora) phalolepidis Merz & White, 1991 (S)
Urophora (Urophora) quadrifasciata (Meigen, 1826) (N, S, Si) (*)
Urophora (Urophora) solstitialis (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
Urophora (Urophora) stylata (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa)
Urophora (Urophora) terebrans (Loew, 1850) (N, S, Si)

Hypenidium Loew, 1862

Hypenidium graecum Loew, 1862 (S, Si)

Euphranta Loew, 1862

Euphranta connexa (Fabricius, 1794) (N, S, Si)

Ceratitis MacLeay, 1829

Ceratitis capitata (Wiedemann, 1824) (N, S, Si, Sa)

Capparimyia Bezzi, 1920

Capparimyia savastani (Martelli, 1911) (S, Si)

Acidia Robineau-Desvoidy, 1813

Acidia cognata (Wiedemann, 1817) (N, S)

Aciura Robineau-Desvoidy, 1830

Aciura coryli (Rossi, 1790) (S, Si)

Anomoia Walker, 1835

Anomoia permunda (Harris, 1776) (N, S)

Chetostoma Rondani, 1856

Chetostoma curvinerve Rondani, 1856 (N, S, Sa)

Carpomya A. Costa, 1854

Carpomya incompleta (Becker, 1903) (N)

Carpomya schineri (Loew, 1856) (S)

Carpomya vesuviana A. Costa, 1854 (S)

Cryptaciura Hendel, 1927

Cryptaciura rotundiventris (Fallén, 1814) (N)

Euleia Walker, 1835

Euleia flavescens (Fabricius, 1798) (Si)

Euleia heraclei (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Goniglossum Rondani, 1856

Goniglossum wiedemanni (Meigen, 1826) (N, S, Si)

Hemilea Loew, 1862

Hemilea pulchella (Fabricius, 1794) (N, S)

Myoleja Rondani, 1856

Myoleja lucida (Fallén, 1826) (N, S, Si)

Philophylla Rondani, 1870

Philophylla caesio (Harris, 1776) (N, S)

Oedaspis Loew, 1862

Oedaspis multifasciata (Loew, 1850) (N)

Oxyaciura Hendel, 1927

Oxyaciura tibialis (Robineau-Desvoidy, 1830) (S, Si)

Platyparea Loew, 1850

Platyparea discoidea (Fabricius, 1787) (N, S)

Plioreocepta Kornejev, 1987

Plioreocepta poeciloptera (Schrank, 1776) (N)

Rhagoletis Loew, 1862

Rhagoletis cerasi (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Rhagoletis completa Cresson, 1929 (N)

Rhagoletis meigeni (Loew, 1844) (N)

Trypeta Meigen, 1803

Trypeta artemisiae (Fabricius, 1794) (N)

Trypeta immaculata (Macquart, 1835) (N, S)

Trypeta zoe Meigen, 1826 (N, S)

Stemonocera Rondani, 1870

Stemonocera cornuta (Scopoli, 1772) (N)

Chaetorellia Hendel, 1927

Chaetorellia hestia Hering, 1937 (N)

Chaetorellia jaceae (Robineau-Desvoidy, 1830) (N, S)

Chaetorellia loricata (Rondani, 1870) (N, S)

Chaetorellia succinea (Costa, 1844) (S)

Orellia Robineau-Desvoidy, 1830

Orellia distans (Loew, 1847) (S)

Orellia falcata (Scopoli, 1763) (N, S)

Chaetostomella Hendel, 1927

Chaetostomella cylindrica (Robineau-Desvoidy, 1830) (Si?)

Chaetostomella steropea (Rondani, 1870) (S)

Terellia (Terellia) Robineau-Desvoidy, 1830

Terellia (Terellia) colon (Meigen, 1826) (N, S, Si)
Terellia (Terellia) fuscicornis (Loew, 1844) (S)
Terellia (Terellia) longicauda (Meigen, 1838) (N)
Terellia (Terellia) luteola (Wiedemann, 1830) (S)
Terellia (Terellia) ruficauda (Fabricius, 1794) (N)
Terellia (Terellia) serratulae (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)
Terellia (Terellia) uncinata (Wiedemann, 1830) (S)
Terellia (Terellia) vectensis (Collin, 1937) (S)
Terellia (Terellia) virens (Loew, 1846) (N)
Terellia (Terellia) winthemi (Meigen, 1826) (N)

Terellia (Cerajocera) Rondani, 1856

Terellia (Cerajocera) ceratocera Hendel, 1913 (N)
Terellia (Cerajocera) cynarae (Rondani, 1870) (N)
Terellia (Cerajocera) lappae (Cederhjelm, 1798) (S)
Terellia (Cerajocera) tussilaginis (Fabricius, 1775) (N, S)

Dithrycha Rondani, 1856

Dithrycha guttularis (Meigen, 1826) (N)

Noeeta Robineau-Desvoidy, 1830

Noeeta pupillata (Fallén, 1814) (N, S)

Acanthiophilus Becker, 1908

Acanthiophilus helianthi (Rossi, 1790) (N, S, Si, Sa)

Acinia Robineau-Desvoidy, 1830

Acinia corniculata (Zetterstedt, 1819) (S)

Actinoptera Rondani, 1871

Actinoptera filaginis (Loew, 1862) (N, S)
Actinoptera mamulae (Frauenfeld, 1855) (N)
Actinoptera meigeni Hendel, 1927 (S) (*)

Campiglossa Rondani, 1870

Campiglossa absinthii (Fabricius, 1805) (N, S, Si)
Campiglossa difficilis Hendel, 1927 (N)
Campiglossa grandinata Rondani, 1870 (N)

Campiglossa guttella Rondani, 1870 (N)
Campiglossa irrorata Fallén, 1814 (N)
Campiglossa loewiana Hendel, 1927 (N, S)
Campiglossa producta (Loew, 1844) (N, S)
Campiglossa punctella (Fallén, 1814) (N, S, Si)

Euaresta Loew, 1873

Euaresta bullans (Wiedemann, 1830) (N)

Euarestella Hendel, 1927

Euarestella megacephala (Loew, 1846) (Si)

Ensina Robineau-Desvoidy, 1830

Ensina sonchi (Linnaeus, 1767) (N, S)

Icterica Loew, 1873

Icterica westermanni (Meigen, 1826) (N, S)

Ictericoides Hering, 1942

Ictericoides zelleri (Loew, 1844) (S)

Dioxyna Frey, 1945

Dioxyna bidentis (Robineau-Desvoidy, 1830) (S)

Oxyyna Robineau-Desvoidy, 1830

Oxyyna flavipennis (Loew, 1844) (N, S, Si)
Oxyyna nebulosa (Wiedemann, 1817) (N, S)
Oxyyna parietina (Linnaeus, 1758) (N, S)

Paracarpotricha Hendel, 1927

Paracarpotricha alpestris (Pokorny, 1898) (N)

Sphenella Robineau-Desvoidy, 1830

Sphenella marginata (Fallén, 1884) (N, S, Si, Sa)

Tephritis Latreille, 1804

Tephritis acanthiophilopsis Hering, 1938 (N)
Tephritis arnicae (Linnaeus, 1750) (N, S)

Tephritis bardanae (Schrank, 1803) (N, S, Sa)
Tephritis carmen Hering, 1937 (N)
Tephritis cometa (Loew, 1840) (N)
Tephritis conura (Loew, 1844) (S)
Tephritis crepidis Hendel, 1927 (N)
Tephritis dilacerata (Loew, 1846) (N)
Tephritis dioscurea (Loew, 1856) (N)
Tephritis divisa Rondani, 1871 (N)
Tephritis fallax (Loew, 1844) (N)
Tephritis formosa (Loew, 1844) (N, S, Si, Sa)
Tephritis frauenfeldi Hendel, 1927 (N, Si)
Tephritis heliophila Hendel, 1927 (N)
Tephritis hendeliana Hering, 1944 (N)
Tephritis hyoscyami (Linnaeus, 1750) (N)
Tephritis leontodontis (De Geer, 1776) (N, S, Si)
Tephritis matricariae (Loew, 1844) (N, S)
Tephritis neesii (Meigen, 1830) (N, S)
Tephritis nigricauda (Loew, 1856) (Si, Sa)
Tephritis postica (Loew, 1844) (S)
Tephritis praecox (Loew, 1844) (S, Si, Sa)
Tephritis pulchra (Loew, 1844) (N, S, Si, Sa)
Tephritis recurrens Loew, 1869 (N, S)
Tephritis ruralis (Loew, 1844) (N, Si)
Tephritis santolinae Hering, 1933 (Sa)
Tephritis scorzonerae Merz, 1993 (S)
Tephritis separata Rondani, 1871 (N, S)
Tephritis simplex (Loew, 1844) (Si)
Tephritis stictica Loew, 1862 (S)
Tephritis truncata (Loew, 1844) (S)
Tephritis vespertina (Loew, 1844) (S, Si, Sa)
Tephritis zernyi Hendel, 1927 (N)

Capitites Foote & Freidberg, 1980

Capitites ramulosa (Loew, 1844) (S)

Spathulina Rondani, 1856

Spathulina sricula Rondani, 1856 (S, Si)

Trupanea Schrank, 1795

Trupanea amoena (Frauenfeld, 1875) (N, S, Si)
Trupanea stellata (Fuessly, 1775) (N, S, Si)

Xyphosia Robineau-Desvoidy, 1830

Xyphosia miliaria (Schrank, 1781) (N, S, Si)

Bactrocera (Daculus) Speiser, 1924

Bactrocera (Daculus) oleae (Gmelin, 1788) (N, S, Si, Sa)

Note

Urophora (Urophora) quadrifasciata: Per S è segnalata anche U. q. algerica Hering, 1826.
Actinoptera meigeni: Nuova per la fauna italiana.

Pyrgotidae

Adapsilia Waga, 1842

Adapsilia coarctata Waga, 1842 (N)

Pallopteridae

Palloptera Fallén, 1820

Palloptera ambusta (Meigen, 1826) (N, S)
Palloptera ephippium Zetterstedt, 1860 (N)
Palloptera marginata (Meigen, 1826) (N?)
Palloptera modesta (Meigen, 1830) (N, S)
Palloptera muliebris (Harris, 1780) (N, S)
Palloptera pallens Loew, 1873 (N, S)
Palloptera quinquemaculata (Macquart, 1835) (N?)
Palloptera saltuum (Linnaeus, 1758) (S)
Palloptera trimaculata (Meigen, 1826) (N, S)
Palloptera umbellatarum (Fabricius, 1775) (N, S, Si)
Palloptera usta (Meigen, 1826) (Si)
Palloptera ustulata Fallén, 1820 (N, S)
Palloptera venusta Loew, 1858 (S)

Piophilidae

Liopiophila Duda, 1924

Liopiophila varipes (Meigen, 1830) (N, S)

Mycetaulus Loew, 1845

Mycetaulus bipunctatus (Fallén, 1823) (N, S)

Parapiophila McAlpine, 1977

Parapiophila vulgaris (Fallén, 1820) (N)

Piophila Fallén, 1810

Piophila casei (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Prochyliza Walker, 1849

Prochyliza nigrimana (Meigen, 1826) (N)

Protopiophila Duda, 1924

Protopiophila latipes (Meigen, 1838) (S)

Stearibia Lioy, 1864

Stearibia nigriceps (Meigen, 1826) (N)

Centrophlebomyia Hendel, 1903

Centrophlebomyia anthropophaga (Robineau-Desvoidy, 1830) (Sa)

Micropezidae

Micropeza Meigen, 1803

Micropeza atripes Bezzi, 1895 (S)

Micropeza corrigiolata (Linnaeus, 1767) (N, S, Si)

Micropeza grallatrix Loew, 1868 (N, S, Si)

Micropeza lateralis Meigen, 1826 (N, S)

Cnodacophora Czerny, 1930

Cnodacophora sellata (Meigen, 1826) (N, S)

Compsobata Czerny, 1930

Compsobata cibaria (Linnaeus, 1761) (N, S)

Rainiera Rondani, 1843

Rainiera calceata (Fallén, 1820) (S)

Calobata Meigen, 1803

Calobata petronella (Linnaeus, 1761) (N?)

Tanypezidae

Tanypeza Fallén, 1820

Tanypeza longimana Fallén, 1820 (N, S, Si, Sa)

Psilidae

Psila Meigen, 1830

Psila fimetaria (Linnaeus, 1761) (N, S)

Oxypsila Frey, 1925

Oxypsila abdominalis (Schummel, 1844) (N)

Chamaepsila Hendel, 1917

Chamaepsila atra (Meigen, 1826) (N)

Chamaepsila bicolor (Meigen, 1826) (S?)

Chamaepsila gracilis (Meigen, 1826) (N, S, Si)

Chamaepsila humeralis (Zetterstedt, 1847) (N)

Chamaepsila morio (Zetterstedt, 1835) (N)

Chamaepsila nigra (Fallén, 1820) (N)

Chamaepsila nigricornis (Meigen, 1826) (N, S, Si)

Chamaepsila pallida (Fallén, 1820) (S)

Chamaepsila rosae (Fabricius, 1794) (N, S)

Chamaepsila sardoa (Rondani, 1876) (Sa)

Psilosoma Zetterstedt, 1860

Psilosoma audouini (Zetterstedt, 1835) (N)

Psilosoma lefebvrei (Zetterstedt, 1835) (N)

Loxocera Meigen, 1803

Loxocera albiseta (Schränk, 1803) (N, S, Si)

Loxocera aristata (Panzer, 1798) (N)

Loxocera maculata Rondani, 1876 (N, S)

Chyliza (Chyliza) Fallén, 1820

Chyliza (Chyliza) leptogaster (Panzer, 1798) (N, S, Si)

Chyliza (Chyliza) vittata Meigen, 1826 (N)

Chyliza (Dasyna) Robineau-Desvoidy, 1830

Chyliza (Dasyna) extenuata (Rossi, 1790) (S, Si)

Megamerinidae

Megamerina Rondani, 1874

Megamerina dolium (Fabricius, 1805) (N, S)

Lauxaniidae

Prosopomyia Loew, 1856

Prosopomyia pallida Loew, 1856 (N, Si)

Homoneura van der Wulp, 1891

Homoneura biumbrata (Loew, 1847) (N)

Homoneura christophi (Becker, 1895) (N)

Homoneura consobrina (Zetterstedt, 1847) (N, S) (*)

Homoneura interstincta (Fallén, 1820) (N)

Homoneura limnea (Becker, 1895) (N)

Homoneura notata (Fallén, 1820) (N, S)

Homoneura patelliformis (Becker, 1895) (N)

Homoneura subnotata L. Papp, 1978 (N)

Trigonometopus Macquart, 1835

Trigonometopus frontalis (Meigen, 1830) (N, S, Si)

Minettia (Minettia) Robineau-Desvoidy, 1830

Minettia (Minettia) fasciata (Fallén, 1826) (N, S)

Minettia (Minettia) flavipalpis (Loew, 1847) (S, Si) (E)

Minettia (Minettia) flaviventris (O.G. Costa, 1844) (N, S)

Minettia (Minettia) inusta (Meigen, 1826) (N, S)

Minettia (Minettia) longiseta (Loew, 1847) (S, Si)

Minettia (Minettia) lupulina (Fabricius, 1787) (N, S)

Minettia (Minettia) plumicheta (Rondani, 1868) (N, S) (E)

Minettia (Minettia) plumicornis (Fallén, 1820) (N, S)

Minettia (Minettia) punctiventris (Rondani, 1868) (N, S, Sa) (E)

Minettia (Minettia) rivosia (Meigen, 1826) (N, S)

Minettia (Minettia) tabidiventris (Rondani, 1868) (N, S) (*)

Minettia (Minettia) tinctiventris (Rondani, 1868) (N, S) (E)

Minettia (Minettia) tubifer (Meigen, 1826) (N, S)

Minettia (Frendelia) Collin, 1948

Minettia (Frendelia) longipennis (Fabricius, 1794) (N, S)

Tricholauxania Hendel, 1925

Tricholauxania praeusta (Fallén, 1820) (N, S)

Peplomyza Haliday, 1837

Peplomyza litura (Meigen, 1826) (N, S)

Eusapromyza Malloch, 1923

Eusapromyza multipunctata (Fallén, 1820) (N)

Cnemacantha Macquart, 1835

Cnemacantha muscaria (Fallén, 1823) (N)

Aulogastromyia Hendel, 1825

Aulogastromyia anisodactyla (Loew, 1845) (N, S)

Lyciella Collin, 1948

Lyciella affinis (Zetterstedt, 1847) (N)

Lyciella conjugata (Becker, 1895) (N) (*)

Lyciella decempunctata (Fallén, 1820) (N, S)

Lyciella decipiens (Loew, 1847) (N)

Lyciella emarginata (Becker, 1895) (S) (E)

Lyciella illota (Loew, 1847) (N, S?)

Lyciella laeta (Zetterstedt, 1847) (N)

Lyciella pallidiventrtris (Fallén, 1820) (N, S)

Lyciella platycephala (Loew, 1847) (N, S?)

Lyciella rorida (Fallén, 1820) (N)

Lauxania Latreille, 1804

Lauxania cylindricornis (Fabricius, 1794) (N)

Calliopum Strand, 1928

Calliopum aeneum (Fallén, 1820) (N, S)

Calliopum elisae (Meigen, 1826) (N)

Calliopum nigripes (Macquart, 1835) (Si) (*)

***Sapromyza (Sapromyza)* Fallén, 1810**

Sapromyza (Sapromyza) apicalis Loew, 1847 (N)
Sapromyza (Sapromyza) bisigillata Rondani, 1868 (N)
Sapromyza (Sapromyza) intonsa Loew, 1847 (N, S)
Sapromyza (Sapromyza) obsoleta Fallén, 1820 (N, S)
Sapromyza (Sapromyza) obscuripennis Loew, 1847 (N)
Sapromyza (Sapromyza) opaca Becker, 1895 (N)
Sapromyza (Sapromyza) palpella Rondani, 1868 (N, S)
Sapromyza (Sapromyza) sexpunctata Meigen, 1826 (N, S)
Sapromyza (Sapromyza) simplicior Hendel, 1908 (N) (*)
Sapromyza (Sapromyza) tuberculosa Becker, 1895 (N)
Sapromyza (Sapromyza) trinotata O.G. Costa, 1844 (N?)

***Sapromyza (Sapromyzosoma)* Lioy, 1864**

Sapromyza (Sapromyzosoma) quadricincta Becker, 1895 (N, S)
Sapromyza (Sapromyzosoma) quadripunctata (Linnaeus, 1758) (N, S)

Note

Homoneura consobrina: Segnalazione molto discutibile di Rondani (1868, 1877).
Minettia (Minettia) tabidiventris: Specie dubbia.
Lyciella conjugata: Nuova per l'Italia.
Calliopum nigripes: Nomen dubium.
Sapromyza (Sapromyza): *Sapromyza rectinervis* Rondani, 1868 citata da Rondani (1877: 62-63) per l'Italia centrale è una specie di discutibile validità; è incerta anche la sua attribuzione al genere *Sapromyza*. Incerta è anche la validità di un'altra "*Sapromyza*" di Rondani (*S. albifrons*).
Sapromyza (Sapromyza) simplicior: Nomen dubium.

Chamaemyiidae

***Parochthiphila (Parochthiphila)* Czerny, 1904**

Parochthiphila (Parochthiphila) spectabilis (Loew, 1858) (N, S)

***Parochthiphila (Euestelia)* Enderlein, 1927**

Parochthiphila (Euestelia) coronata (Loew, 1858) (N, S, Sa)
Parochthiphila (Euestelia) frontella (Rondani, 1874) (N)
Parochthiphila (Euestelia) nigripes (Strobl, 1900) (N)

***Chamaemyia* Meigen, 1803**

Chamaemyia aridella (Fallén, 1823) (N)
Chamaemyia elegans (Panzer, 1809) (N)

Chamaemyia flavicornis (Strobl, 1902) (N)
Chamaemyia flavipalpis (Haliday, 1838) (N, S, Sa)
Chamaemyia geniculata (Zetterstedt, 1838) (N)
Chamaemyia juncorum (Fallén, 1823) (N, S)
Chamaemyia polystigma (Meigen, 1830) (N, S, Sa)

***Leucopis (Leucopis)* Meigen, 1830**

Leucopis (Leucopis) annulipes Zetterstedt, 1848 (N, S)
Leucopis (Leucopis) aphidiperda Rondani, 1847 (N)
Leucopis (Leucopis) aphidivora Rondani, 1847 (N)
Leucopis (Leucopis) argentata Heeger, 1848 (N, S)
Leucopis (Leucopis) armillata Rondani, 1874 (N)
Leucopis (Leucopis) atritarsis Tanasijtshuk, 1958 (S)
Leucopis (Leucopis) ballestrerii Rondani, 1874 (Si)
Leucopis (Leucopis) bursaria Rondani, 1847 (N)
Leucopis (Leucopis) fiorii Raspi, 1986 (S)
Leucopis (Leucopis) gloriae Raspi, 1985 (S)
Leucopis (Leucopis) glyphinivora Tanasijtshuk, 1958 (N, S, Sa)
Leucopis (Leucopis) griseola (Fallén, 1823) (N)
Leucopis (Leucopis) grunini Tanasijtshuk, 1979 (N, S)
Leucopis (Leucopis) lusoria Meigen, 1830 (N, S)
Leucopis (Leucopis) minuscula Rondani, 1874 (S)
Leucopis (Leucopis) misaphida Rondani, 1847 (N)
Leucopis (Leucopis) ninae Tanasijtshuk, 1966 (S)
Leucopis (Leucopis) palliditarsis Rondani, 1874 (N)
Leucopis (Leucopis) palumbii Rondani, 1872 (N, S, Si, Sa)
Leucopis (Leucopis) steinbergi Tanasijtshuk, 1965 (S) (*)
Leucopis (Leucopis) talaria Rondani, 1874 (N)

***Leucopis (Leucopomyia)* Malloch, 1921**

Leucopis (Leucopomyia) alticeps Czerny, 1936 (N, S, Si)
Leucopis (Leucopomyia) silesiaca Egger, 1862 (N, S)

***Leucopis (Neoleucopis)* Malloch, 1921**

Leucopis (Neoleucopis) atratula (Ratzeburg, 1844) (S) (*)

Note

Leucopis (Leucopis) steinbergi: Nuova per l'Italia.
Leucopis (Neoleucopis) atratula: Nuova per l'Italia.

Dryomyzidae

***Dryomyza* Fallén, 1820**

Dryomyza anilis Fallén, 1820 (N, S)
Dryomyza flaveola (Fabricius, 1794) (N, S, Si?, Sa)

Helcomyza Curtis, 1825

Helcomyza mediterranea (Loew, 1854) (N, S)
Helcomyza ustulata Curtis, 1825 (N?)

Malacomyia Westwood, 1840

Malacomyia sciomyzina (Haliday, 1833)
Malacomyia sciomyzina meridionalis (Rondani, 1868) (Si?)

Sciomyzidae

Salticella Robineau-Desvoidy, 1830

Salticella fasciata (Meigen, 1830) (N, S, Si)

Pelidnoptera Rondani, 1836

Pelidnoptera fuscipennis (Meigen, 1830) (N, S)
Pelidnoptera leptiformis (Schiner, 1866) (N, S)
Pelidnoptera nigripennis (Fabricius, 1794) (N, S)

Colobaea Zetterstedt, 1837

Colobaea bifasciella (Fallén, 1820) (N)
Colobaea distincta (Meigen, 1830) (N)
Colobaea punctata (Lundbeck, 1923) (N)

Ditaeniella Sack, 1939

Ditaeniella grisea (Meigen, 1830) (N, S, Sa)

Pherbellia Robineau-Desvoidy, 1830

Pherbellia albicarpa (Rondani, 1868) (N, S)
Pherbellia albocostata (Fallén, 1820) (N)
Pherbellia annulipes (Zetterstedt, 1846) (N)
Pherbellia brunnipes (Meigen, 1838) (N)
Pherbellia cinerella (Fallén, 1820) (N, S, Si, Sa)
Pherbellia dorsata (Zetterstedt, 1846) (N, S, Sa)
Pherbellia dubia (Fallén, 1820) (N, S)
Pherbellia garganica Rivosecchi, 1989 (S) (*)
Pherbellia griseola (Fallén, 1820) (N, S, Si, Sa)

Pherbellia limbata (Meigen, 1830) (N, S)
Pherbellia majuscula (Rondani, 1868) (N) (*)
Pherbellia mikiana (Hendel, 1900) (N, S)
Pherbellia nana (Fallén, 1820) (N, Sa)
Pherbellia pallidicarpa (Rondani, 1868) (N)
Pherbellia pallidiventris (Fallén, 1820) (N, S, Si)
Pherbellia pilosa (Hendel, 1902) (S)
Pherbellia rozkosnyi Verbeke, 1967 (N)
Pherbellia schoenherri (Fallén, 1826) (N, S)
Pherbellia scutellaris (von Roser, 1840) (N, S)
Pherbellia silana Rivosecchi, 1989 (S)
Pherbellia sordida (Hendel, 1902) (S)
Pherbellia steyskali Rozkošný & Zuska, 1965 (N)
Pherbellia ventralis (Fallén, 1820) (N, S)

Antichaeta Haliday, 1938

Antichaeta analis (Meigen, 1830) (S)
Antichaeta obliviosa Enderlein, 1939 (S)

Coremacera Rondani, 1856

Coremacera amoena (Loew, 1835) (N, S)
Coremacera catenata (Loew, 1847) (N)
Coremacera confluens Rondani, 1868 (N, S)
Coremacera fabricii Rozkošný, 1981 (N)
Coremacera marginata (Fabricius, 1775) (N, S, Si)

Dichetophora Rondani, 1868

Dichetophora finlandica Verbeke, 1964 (N)
Dichetophora obliterated (Fabricius, 1805) (N, S, Sa)

Dyctya Meigen, 1803

Dyctya umbrarum (Linnaeus, 1758) (N)

Ectinocera Zetterstedt, 1838

Ectinocera borealis Zetterstedt, 1838 (N)

Elgiva Meigen, 1838

Elgiva cucularia (Linnaeus, 1767) (N, S, Sa)
Elgiva sollicita (Harris, 1780) (N)

Euthycera Latreille, 1829

Euthycera alaris Vala, 1983

Euthycera alaris alaris Vala, 1983 (N)

Euthycera alaris sardoa Contini & Rivosecchi, 1948 (Sa) (E)

Euthycera algira (Macquart, 1849) (Si)

Euthycera chaerophylli (Fabricius, 1798) (N, S, Si)

Euthycera cribrata (Rondani, 1868) (N, S)

Euthycera fumigata (Scopoli, 1763) (N)

Euthycera stictica (Fabricius, 1805) (S)

Euthycera sticticaria (Mayer, 1953) (N, S)

Euthycera zelleri (Loew, 1847) (N, S, Si)

Hydromya Robineau-Desvoidy, 1830

Hydromya dorsalis (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa)

Ilione (Tumidicercus) Knutson & Berg, 1967

Ilione (Tumidicercus) lineata (Fallén, 1820) (S)

Ilione (Ilione) Haliday in Curtis, 1837

Ilione (Ilione) albiseta (Scopoli, 1763) (N, S, Si, Sa)

Ilione (Ilione) trifaria (Loew, 1847) (N, S, Si, Sa)

Ilione (Ilione) unipunctata (Macquart, 1849) (Si, Sa)

Limnia Robineau-Desvoidy, 1830

Limnia paludicola Elberg, 1965 (N, S)

Limnia unguicornis (Scopoli, 1763) (N, S, Si, Sa)

Pherbina Robineau-Desvoidy, 1830

Pherbina coryleti (Scopoli, 1763) (N, S)

Pherbina intermedia Verbeke, 1948 (N)

Pherbina mediterranea Mayer, 1953 (Si, Sa)

Psacadina Enderlein, 1939

Psacadina verbekei Rozkošný, 1975 (N, S, Si, Sa)

Psacadina vittigera (Schiner, 1864) (N)

Psacadina zernyi (Mayer, 1953) (N, S)

Renocera Hendel, 1900

Renocera pallida (Fallén, 1820) (N)

Renocera strobli Hendel, 1900 (N)

Sepedon Latreille, 1804

Sepedon femorata Knutson & Orth, 1984 (N)
Sepedon sphegea (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa)
Sepedon spinipes (Scopoli, 1763) (N, S, Si, Sa)

Tetanocera Duméril, 1800

Tetanocera arrogans Meigen, 1830 (N, S, Si, Sa)
Tetanocera elata (Fabricius, 1781) (N, S)
Tetanocera ferruginea Fallén, 1820 (N, S, Si, Sa)
Tetanocera fuscinervis (Zetterstedt, 1838) (N)
Tetanocera hyalipennis Roser, 1840 (N, S)
Tetanocera punctifrons Rondani, 1868 (N, S)
Tetanocera robusta Loew, 1847 (N)
Tetanocera silvatica Meigen, 1830 (N, S)

Trypetoptera Hendel, 1900

Trypetoptera punctulata (Scopoli, 1763) (N, S, Si)

Note

Pherbellia garganica: Descritta su un unico esemplare presente nella collezione Bezzi di Milano.

Pherbellia majuscula: Presente nella Pianura Padana ai tempi di Rondani; ora sembra scomparsa in tale area.

Sepsidae

Meroplius Rondani, 1874

Meroplius minutus (Wiedemann, 1830) (N, S, Si)

Nemopoda Robineau-Desvoidy, 1830

Nemopoda nitidula (Fallén, 1820) (N, S, Si)
Nemopoda pectinulata Loew, 1873 (N)

Orthalischema Frey, 1925

Orthalischema albitarse (Zetterstedt, 1847) (Sa)

Saltella Robineau-Desvoidy, 1830

Saltella nigripes Robineau-Desvoidy, 1830 (N, S)
Saltella sphondylii (Schrank, 1803) (N, S, Si?, Sa?)

Sepsis Fallén, 1810

Sepsis barbata Becker, 1907 (N, S?, Si?, Sa?) (*)
Sepsis biflexuosa Strobl, 1893 (N, S, Si?, Sa)
Sepsis cynipsea (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa?)
Sepsis duplicata Haliday, 1838 (N, S)
Sepsis fissa Becker, 1903 (Si)
Sepsis flavimana Meigen, 1826 (N, S)
Sepsis fulgens Meigen, 1826 (N, S, Si, Sa)
Sepsis helvetica Munari, 1985 (N?)
Sepsis lateralis Wiedemann, 1830 (S, Si, Sa?)
Sepsis melanopoda Duda, 1926 (N) (*)
Sepsis neocynipsea Melander & Spuler, 1917 (N, S)
Sepsis nigripes Meigen, 1826 (*)
Sepsis orthocnemis Frey, 1908 (N, S)
Sepsis pseudomonostigma Ursu, 1969 (N, S, Si, Sa)
Sepsis punctum (Fabricius, 1794) (N, S, Si, Sa)
Sepsis thoracica (Robineau-Desvoidy, 1830) (N, S, Si, Sa)
Sepsis violacea Meigen, 1826 (N, S, Si, Sa?)

Themira Robineau-Desvoidy, 1830

Themira annulipes (Meigen, 1826) (N, S, Si?, Sa)
Themira germanica Duda, 1926 (N)
Themira gracilis (Zetterstedt, 1847) (N)
Themira leachi (Meigen, 1826) (N)
Themira lucida (Staeger, 1844) (N, S)
Themira minor (Haliday, 1833) (N, S, Si?, Sa)
Themira nigricornis (Meigen, 1826) (N)
Themira putris (Linné, 1758) (N, S)
Themira superba (Haliday, 1833) (N?)

Note

Sepsis barbata: Specie termofila a vasta geonemia. In Italia la si rinviene in ambienti tipicamente mediterranei.

Sepsis melanopoda: Species inquirenda. Sino ad oggi considerata sinonimo di *S. flavimana*.

Sepsis nigripes: Considerata species dubia da Zuska & Pont (1984), è stata solo di recente reinserita fra le congeneri come taxon valido. Nel passato, qualche autore la citò per alcune regioni d'Italia, ma si tratta, per lo più, di errori di determinazione o confusione con la comunissima specie *Sepsis fulgens*. La presenza in Italia di questa specie abbisogna di conferma.

Clusiidae

Clusioides Coquillett, 1904

Clusioides albimanus (Meigen, 1830) (N)

Clusia Haliday, 1838

Clusia flava (Meigen, 1830) (N)

Paraclusia Czerny, 1903

Paraclusia tigrina (Fallén, 1820) (N)

Acartophthalmidae

Acartophthalmus Czerny, 1902

Acartophthalmus nigrinus (Zetterstedt, 1848) (N)

Odiniidae

Neoalticomerus Hendel, 1903

Neoalticomerus formosus (Loew, 1844) (N)

Odinia Robineau-Desvoidy, 1830

Odinia boletina (Zetterstedt, 1848) (N)

Odinia maculata (Meigen, 1830) (S)

Agromyzidae

Agromyza Fallén, 1810

Agromyza abiens Zetterstedt, 1848 (N, S)

Agromyza albipennis Meigen, 1830 (N)

Agromyza albitarsis Meigen, 1830 (N)

Agromyza alnibetulae Hendel, 1931 (N)

Agromyza alticeps Hendel, 1931 (N)

Agromyza ambigua Fallén, 1923 (N, S, Si)

Agromyza apfelbecki Strobl, 1902 (S, Si)

Agromyza bicophaga Hering, 1925 (Sa)

Agromyza cinerascens Macquart, 1935 (N, Si)

Agromyza conjuncta Spencer, 1966 (N, Si)

Agromyza ferruginosa Van der Wulp, 1871 (N)

Agromyza flaviceps Fallén, 1823 (N)

Agromyza frontella (Rondani, 1875) (N)

Agromyza frontosa (Becker, 1908) (N)

Agromyza hendeli Griffiths, 1963 (N)
Agromyza johannae de Meijere, 1924 (S, Si)
Agromyza lathyri Hendel, 1923 (N, S)
Agromyza lucida Hendel, 1920 (N, S)
Agromyza luteifrons Strobl, 1906 (Si)
Agromyza luteitarsis (Rondani, 1875) (N)
Agromyza mobilis Meigen, 1830 (N, S)
Agromyza nana Meigen, 1830 (N, Si, Sa)
Agromyza nigrella (Rondani, 1875) (N)
Agromyza nigrescens Hendel, 1920 (N, S)
Agromyza nigripes Meigen, 1830 (N, S)
Agromyza obscuritarsis (Rondani, 1875) (N) (E)
Agromyza potentillae (Kaltenbach, 1864) (Sa)
Agromyza pseudoreptans Nowakowski, 1967 (N, S)
Agromyza reptans Fallén, 1823 (N, Sa)
Agromyza rondensis Strobl, 1900 (N, S)
Agromyza rufipes Meigen, 1830 (Sa)
Agromyza sulfuriceps Strobl, 1898 (N)
Agromyza trebinjensis Strobl, 1920 (N)
Agromyza varicornis Strobl, 1900 (S)
Agromyza vicifoliae Hering, 1932 (Si)

Japanagromyza Sasakawa, 1958

Japanagromyza salicifolii (Collin, 1911) (N)

Ophiomyia Braschnikov, 1897

Ophiomyia asparagi Spencer, 1964 (N)
Ophiomyia beckeri (Hendel, 1923) (Si)
Ophiomyia cunctata (Hendel, 1920) (N, S)
Ophiomyia curvipalpis (Zetterstedt, 1848) (N)
Ophiomyia major (Strobl, 1900) (N)
Ophiomyia maura (Meigen, 1838) (N, S, Si)
Ophiomyia melandryi de Meijere, 1924 (N)
Ophiomyia pinguis (Fallén, 1820) (N)
Ophiomyia pulicaria (Meigen, 1830) (N, S)
Ophiomyia rapta Hendel, 1931 (N) (E)
Ophiomyia simplex (Loew, 1869) (S)

Hexomyza Enderlein, 1936

Hexomyza cecidogena (Hering, 1927) (S)
Hexomyza centaureae (Spencer, 1966) (S) (E)
Hexomyza saroathamni (Hendel, 1923) (Si)
Hexomyza schineri (Giraud, 1801) (N)
Hexomyza simplicoides (Hendel, 1920) (N, S)

Melanagromyza Hendel, 1920

Melanagromyza aenea (Meigen, 1930) (N)
Melanagromyza aeneoventris (Fallén, 1823) (N, S)
Melanagromyza arnicarum Hering, 1942 (N)
Melanagromyza cunctans (Meigen, 1830) (N, S)
Melanagromyza cuscatae Hering, 1958 (S)
Melanagromyza ferulae Spencer, 1966 (Si) (E)
Melanagromyza pubescens Hendel, 1923 (N)
Melanagromyza siciliensis Spencer, 1966 (Si) (E)

Selachops Wahlberg, 1844

Selachops flavocinctus Wahlberg, 1844 (N, S)

Phytobia Lioy, 1864

Phytobia errans (Meigen), 1830 (S)

Amauromyza (Amauromyza) Hendel, 1931

Amauromyza (Amauromyza) morionella (Zetterstedt, 1848)
Amauromyza (Amauromyza) morionella morionella (Zetterstedt, 1848) (Sa)
Amauromyza (Amauromyza) morionella novaki (Strobl, 1902) (S, Si)

Amauromyza (Cephalomyza) Hendel, 1931

Amauromyza (Cephalomyza) monfalconensis (Strobl, 1909) (N)

Amauromyza (Trilobomyza) Hendel, 1931

Amauromyza (Trilobomyza) flavifrons (Meigen, 1830) (Sa)
Amauromyza (Trilobomyza) gyrans (Fallén, 1823) (N)
Amauromyza (Trilobomyza) verbasci (Bouché, 1847) (S, Sa)

Cerodontha (Icteromyza) Hendel, 1931

Cerodontha (Icteromyza) capitata (Zetterstedt, 1848) (N)
Cerodontha (Icteromyza) geniculata (Fallén, 1823) (N)

Cerodontha (Cerodontha) Rondani, 1861

Cerodontha (Cerodontha) denticornis (Panzer, 1806) (N, S, Si)
Cerodontha (Cerodontha) flavicornis (Egger, 1862) (N, S)
Cerodontha (Cerodontha) fulvipes (Meigen, 1830) (N)
Cerodontha (Cerodontha) hennigi Nowakowski, 1967 (S)
Cerodontha (Cerodontha) phragmitophila Hering, 1935 (N, S)

***Cerodontha (Poemyza)* Hendel, 1931**

Cerodontha (Poemyza) atra (Meigen, 1830) (N)
Cerodontha (Poemyza) incisa (Meigen, 1830) (N, S)
Cerodontha (Poemyza) lateralis (Macquart, 1835) (N, S)
Cerodontha (Poemyza) lyneborgi Spencer, 1971 (N)
Cerodontha (Poemyza) pygmaea (Meigen, 1830) (N, S)

***Cerodontha (Butomomyza)* Nowakowski, 1967**

Cerodontha (Butomomyza) angulata (Loew, 1869) (N, S)

***Cerodontha (Dizygomyza)* Hendel, 1920**

Cerodontha (Dizygomyza) bimaculata (Meigen, 1830) (N)
Cerodontha (Dizygomyza) crassiseta (Strobl, 1900) (N)
Cerodontha (Dizygomyza) iridis (Hendel, 1926) (N, S)
Cerodontha (Dizygomyza) luctuosa (Meigen, 1830) (N, S, Si)
Cerodontha (Dizygomyza) morosa (Meigen, 1830) (N, S)

***Liriomyza* Mik, 1894**

Liriomyza analis (Rondani, 1875) (N)
Liriomyza approximata (Hendel, 1920) (N)
Liriomyza bryoniae (Kaltenbach, 1858) (N, S, Si)
Liriomyza centaureae Hering, 1927 (S)
Liriomyza cicerina (Rondani, 1875) (S)
Liriomyza congesta (Becker, 1903) (N, Sa)
Liriomyza cyclaminis L. Süss, 1989 (S) (E)
Liriomyza demeijerei Hering, 1930 (N, Si)
Liriomyza dianthicola (Venturi, 1949) (S)
Liriomyza eupatoriana Spencer, 1954 (N)
Liriomyza eupatorii (Kaltenbach, 1873) (N)
Liriomyza flaveola (Fallén, 1823) (N)
Liriomyza huidobrensis (Blanchard, 1926) (N, S)
Liriomyza lacertella (Rondani, 1875) (N) (E)
Liriomyza lutea (Meigen, 1830) (N)
Liriomyza nietzkei Spencer, 1973 (N)
Liriomyza orbona (Meigen, 1830) (N, S, Si)
Liriomyza pedestris Hendel, 1931 (N, Si)
Liriomyza phryne Hendel, 1931 (S)
Liriomyza ptarmicae de Meijere, 1925 (Si)
Liriomyza pusilla (Meigen, 1830) (Si)
Liriomyza sonchi Hendel, 1931 (N)
Liriomyza strigata (Meigen, 1830) (N)
Liriomyza trifolii (Burgess, 1880) (N, S, Si, Sa)
Liriomyza urophorina Mik, 1894 (S)

Metopomyza Enderlein, 1936

Metopomyza flavonotata (Haliday, 1833) (N)
Metopomyza nigrohumeralis (Hendel, 1931) (N)

Phytoliriomyza Hendel, 1931

Phytoliriomyza arctica (Lundbeck, 1901) (N, Si)
Phytoliriomyza pectoralis (Becker, 1908) (Si)

Ptochomyza Hering, 1942

Ptochomyza asparagivora Spencer, 1964 (S)
Ptochomyza mayeri (Spencer, 1966) (S)

Calycomyza Hendel, 1931

Calycomyza artemisiae (Kaltenbach, 1856) (N)
Calycomyza humeralis (von Roser, 1840) (N)

Nemorimyza Frey, 1946

Nemorimyza posticata (Meigen, 1830) (N)

Paraphytomyza Enderlein, 1936

Paraphytomyza fulvicornis (Hendel, 1935) (N)
Paraphytomyza populi (Kaltenbach, 1864) (N)
Paraphytomyza populicola (Walker, 1853) (N)
Paraphytomyza similis (Brischke, 1881) (N)
Paraphytomyza tridentata (Loew, 1858) (N)

Pseudonapomyza Hendel, 1920

Pseudonapomyza atra (Meigen, 1830) (N)
Pseudonapomyza europaea Spencer, 1973 (N)

Napomyza Westwood, 1840

Napomyza cichorii Spencer, 1966 (N)
Napomyza elegans (Meigen, 1830) (N)
Napomyza lateralis (Fallén, 1823) (N, S, Si)

Chromatomyia Hardy, 1849

Chromatomyia aprilina (Goureau, 1851) (S)
Chromatomyia fuscula (Zetterstedt, 1838) (N)
Chromatomyia gentianae (Hendel, 1920) (N)

Chromatomyia gentianella (Hendel, 1932) (N)
Chromatomyia gentii (Hendel, 1920) (N)
Chromatomyia glechomae (Kaltenbach, 1862) (N)
Chromatomyia horticola (Goureau, 1851) (N, S, Si, Sa)
Chromatomyia lonicerae (Robineau-Desvoidy, 1851) (S)
Chromatomyia milii (Kaltenbach, 1864) (N)
Chromatomyia nigra Meigen, 1830 (N)
Chromatomyia opacella (Hendel, 1935) (N)
Chromatomyia primulae (Robineau-Desvoidy, 1851) (N)
Chromatomyia ramosa Hendel, 1923 (S)
Chromatomyia scabiosarum (De Meijere, 1934) (Si)
Chromatomyia scolopendri (Robineau-Desvoidy, 1851) (N)
Chromatomyia syngenesiae (Hardy, 1849) (N, Si, Sa)

***Phytomyza* Fallén, 1810**

Phytomyza abdominalis Zetterstedt, 1848 (N)
Phytomyza achilleae Hering, 1932 (S)
Phytomyza achilleaececis L. Süss, 1984 (Si) (E)
Phytomyza adjuncta Hering, 1928 (N)
Phytomyza affinis Fallén, 1823 (N, S, Sa)
Phytomyza albipennis (Fallén, 1823) (S)
Phytomyza anemones Hering, 1925 (S)
Phytomyza aristata Hendel, 1934 (N)
Phytomyza bellidina Hendel, 1934 (N, S)
Phytomyza bipunctata Loew, 1858 (N)
Phytomyza brunnipes Brischke, 1881 (N)
Phytomyza chaerophylli Kaltenbach, 1856 (Si, Sa)
Phytomyza chaerophylliana Hering, 1931 (N)
Phytomyza continua Hendel, 1920 (N)
Phytomyza conyzae Hendel, 1920 (N, S, Si, Sa)
Phytomyza crassiseta Zetterstedt, 1860 (N)
Phytomyza evanescens Hendel, 1920 (Si)
Phytomyza fallaciosa Brischke, 1881 (N)
Phytomyza farfarae Hendel, 1935 (N)
Phytomyza ferulae Hering, 1927 (N)
Phytomyza ferulivora Griffiths, 1956 (S, Si) (E)
Phytomyza flavicornis Fallén, 1823 (N)
Phytomyza flavofemorata Strobl, 1893 (N, S)
Phytomyza gymnostoma (Loew, 1858) (Si)
Phytomyza hellebori Kaltenbach, 1872 (N)
Phytomyza heracleana Hering, 1937 (S)
Phytomyza heringiana Hendel, 1922 (N)
Phytomyza ilicis Curtis, 1846 (N)
Phytomyza jugalis Hendel, 1935 (N) (E)
Phytomyza lappae Goureau, 1851 (N)
Phytomyza nigrella Hendel, 1935 (N) (E)
Phytomyza nigripennis Fallén, 1823 (N)

Phytomyza notata Meigen, 1830 (N)
Phytomyza obscura Hendel, 1920 (N)
Phytomyza obscurella Fallén, 1823 (N, S)
Phytomyza orobanchia Kaltenbach, 1864 (N, S, Si)
Phytomyza pauliloewi Hendel, 1920 (N, S)
Phytomyza phillyreae Hering, 1930 (S, Si, Sa)
Phytomyza plantaginis Robineau-Desvoidy, 1851 (N, S)
Phytomyza pullula Zetterstedt, 1848 (N, Si, Sa)
Phytomyza pulsatillae Hering, 1924 sensu Spencer, 1976 (N)
Phytomyza ranunculi (Schrank, 1803) (N, S, Sa)
Phytomyza rectae Hendel, 1924 (N, S)
Phytomyza robustella Hendel, 1936 (N, S)
Phytomyza rufipes Meigen, 1830 (S)
Phytomyza sedicola Hering, 1924 (N)
Phytomyza socia Brischke, 1881 (N)
Phytomyza solidaginis Hendel, 1920 (N)
Phytomyza spondylii Robineau-Desvoidy, 1851 (S)
Phytomyza spoliata Strobl, 1906 (S)
Phytomyza tenella Meigen, 1830 (N)
Phytomyza tetrasticha Hendel, 1927 (S)
Phytomyza thalicticola Hendel, 1925 (N, S)
Phytomyza trolliicaulis L. Süss, 1989 (N) (E)
Phytomyza varipes Macquart, 1835 (N)
Phytomyza virgaureae Hering, 1926 (N)
Phytomyza vitalbae Kaltenbach, 1872 (N, S)
Phytomyza wahlgreni Ryden, 1944 (N)

Opomyzidae

Opomyza Fallén, 1820

Opomyza decora Oldenberg, 1910 (N, S) (E)
Opomyza florum (Fabricius, 1794) (N, S, Si, Sa)
Opomyza germinationis (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
Opomyza petrei Mesnil, 1934 (N, S, Si, Sa)
Opomyza thalhammeri Strobl, 1900 (N)

Geomyza Fallén, 1810

Geomyza angustipennis Zetterstedt, 1847 (N)
Geomyza balachowskyi Mesnil, 1934 (N, S, Si, Sa)
Geomyza majuscula (Loew, 1864) (N, S)
Geomyza paganettii (Strobl, 1909) (N, S)
Geomyza pilosula Czerny, 1928 (N)
Geomyza tripunctata Fallén, 1823 (N, S, Si, Sa)
Geomyza venusta (Meigen, 1830) (N, S)

Anthomyzidae

Anagnota Becker, 1902

Anagnota bicolor (Meigen, 1838) (N, S)

Santhomyza Roháček, 1984

Santhomyza bezzii (Czerny, 1902) (N)

Anthomyza Fallén, 1810

Anthomyza albimana (Meigen, 1830) (N)

Anthomyza anderssoni Roháček, 1984 (N)

Anthomyza gracilis Fallén, 1823 (N)

Aulacigastridae

Aulacigaster Macquart, 1835

Aulacigaster leucopeza (Meigen, 1830) (N)

Periscelididae

***Periscelis* (*Myodris*)** Lioy, 1864

Periscelis (*Myodris*) *annulata* (Fallén, 1813) (N)

Asteiidae

Leiomyza Meigen, 1835

Leiomyza dudai Sabrosky, 1956 (N)

Asteia Meigen, 1830

Asteia amoena Meigen, 1830 (N, S, Si)

Tethinidae

Pelomyiella Hendel, 1934

Pelomyiella cinerella (Haliday, 1837) (S)
Pelomyiella hungarica (Czerny, 1928) (N?)
Pelomyiella mallochi (Sturtevant, 1923) (N)

***Tethina* (*Rhinoessa*)** Loew, 1862

Tethina (*Rhinoessa*) *alboguttata* Strobl, 1900 (Si?, Sa?)
Tethina (*Rhinoessa*) *cinerea* Loew, 1862 (N, S)
Tethina (*Rhinoessa*) *czernyi* (Hendel, 1934) (N, S?)
Tethina (*Rhinoessa*) *dubiosa* (Collin, 1966) (N)
Tethina (*Rhinoessa*) *flavigenis* (Hendel, 1934) (N, S)
Tethina (*Rhinoessa*) *grisea* (Fallén, 1823) (N, S?, Si)
Tethina (*Rhinoessa*) *incisuralis* (Macquart, 1851) (Si?, Sa?)
Tethina (*Rhinoessa*) *longirostris* (Loew, 1865) (Si)
Tethina (*Rhinoessa*) *nigripes* Czerny, 1928 (S, Si)
Tethina (*Rhinoessa*) *ochracea* (Hendel, 1913) (S?, Si, Sa?)
Tethina (*Rhinoessa*) *pallipes* Loew, 1865 (Si?)
Tethina (*Rhinoessa*) *strobliana* (Mercier, 1923) (N, S?, Si, Sa)

***Tethina* (*Tethina*)** Haliday, 1838

Tethina (*Tethina*) *albosetulosa* (Strobl, 1900) (N, S, Si, Sa?)

Canacidae

Canace Haliday, 1839

Canace nasica (Haliday, 1839) (N, S, Si)
Canace salonitana Strobl, 1900 (N, S, Si)

Cryptochetidae

Cryptochetum Rondani, 1875

Cryptochetum grandicorne Rondani, 1875 (N, S, Si)

Chloropidae

Apotropina Hendel, 1907

Apotropina longepilosa (Strobl, 1893) (N, S)

Siphonellopsis Strobl, 1906

Siphonellopsis lacteibasis Strobl, 1906 (N, S, Si, Sa)

Rhodesiella Adams, 1905

Rhodesiella plumiger (Meigen, 1830) (N, S)

Gaurax Loew, 1863

Gaurax dubius (Macquart, 1835) (N)

Gaurax niger Czerny, 1906 (N)

Pseudogaurax Malloch, 1915

Pseudogaurax venustus (Czerny, 1906) (N)

Gampsocera Schiner, 1862

Gampsocera numerata (Heeger, 1858) (N, S)

Hapleginella Duda, 1933

Hapleginella coxata Collin, 1966 (N) (E)

Hapleginella laevifrons (Loew, 1858) (N)

Elachiptera Macquart, 1835

Elachiptera bimaculata (Loew, 1845) (N, S, Si)

Elachiptera brevipennis (Meigen, 1830) (N, S)

Elachiptera cornuta (Fallén, 1820) (N, S)

Elachiptera megaspis (Loew, 1858) (N, S, Si)

Elachiptera rufifrons Duda, 1932 (S)

Elachiptera scrobiculata (Strobl, 1900) (N)

Elachiptera sibirica (Loew, 1858) (N, S)

Elachiptera tuberculifera (Corti, 1909) (N, S)

Melanochaeta Bezzi, 1906

Melanochaeta capreola (Haliday, 1838) (N)

Melanochaeta pubescens (Thalhammer, 1896) (N, S)

Polyodaspis Duda, 1933

Polyodaspis ruficornis (Macquart, 1835) (N, S, Si)

Polyodaspis sulcicollis (Meigen, 1838) (N, S, Si)

Lasiambia Sabrosky, 1941

Lasiambia albidipennis (Strobl, 1893) (N)

Lasiambia coxalis (von Roser, 1840) (N)

Lasiambia discreta (Bezzi in Silvestri, 1917) (N, S, Si, Sa)
Lasiambia fycoperda (Becker, 1910) (Sa)
Lasiambia palposa (Fallén, 1820) (N, S)

Siphonella Macquart, 1835

Siphonella oscinina (Fallén, 1820) (N)

Calamoncosis Enderlein, 1911

Calamoncosis aprica (Meigen, 1830) (N, S)
Calamoncosis duinensis (Strobl, 1909) (N, S)
Calamoncosis minima (Strobl, 1893) (N, S)

Lipara Meigen, 1830

Lipara lucens Meigen, 1830 (N, S, Si)
Lipara pullitarsis Doskocil & Chvála, 1971 (N, S)
Lipara rufitarsis Loew, 1858 (N, S)
Lipara similis Schiner, 1854 (N, S)

Eribolus Becker, 1910

Eribolus gracilior (de Meijere, 1918) (N)
Eribolus hungaricus Becker, 1910 (N)
Eribolus slesvicensis Becker, 1910 (N, S)

Oscinisoma Lioy, 1864

Oscinisoma cognata (Meigen, 1830) (N, Si)
Oscinisoma gilvipes (Loew, 1858) (N, S)

Rhopalopterum Duda, 1929

Rhopalopterum anthracinum (Meigen, 1830) (N)
Rhopalopterum fasciola (Meigen, 1830) (N, S)
Rhopalopterum femorale Collin, 1946 (N)

Oscinella Becker, 1909

Oscinella angustripennis Duda, 1933 (N)
Oscinella frit (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
Oscinella maura (Fallén, 1820) (N, S)
Oscinella nitidigenis (Becker, 1908) (S)
Oscinella nitidissima (Meigen, 1838) (N, S)
Oscinella pusilla (Meigen, 1830) (N, S, Si, Sa)

Microcercis Beschovski, 1978

Microcercis trigonella (Duda, 1933) (N, S)

Incertella Sabrosky, 1980

Incertella albipalpis (Meigen, 1830) (N, S, Si, Sa)

Incertella kerteszi (Becker, 1910) (N)

Incertella zuercheri (Duda, 1933) (N)

Conioscinella Duda, 1929

Conioscinella alpicola (Strobl, 1893) (N)

Conioscinella alpigena (Strobl, 1909) (N)

Conioscinella bicingulata (Strobl, 1893) (N)

Conioscinella frontella (Fallén, 1820) (N, S)

Conioscinella gallarum (Duda, 1933) (N, S)

Conioscinella mimula Collin, 1946 (N, S)

Conioscinella obscuripila Duda, 1932 (N, S)

Conioscinella zuercheri Duda, 1933 (N)

Speccafrons Sabrosky, 1980

Speccafrons halophila (Duda, 1933) (N, S, Si, Sa)

Oscinimorpha Lioy, 1864

Oscinimorpha albisetosa (Duda, 1932) (N, S, Si, Sa)

Oscinimorpha arcuata (Duda, 1932) (N, S, Sa)

Oscinimorpha longirostris (Loew, 1858) (N, S, Si, Sa)

Oscinimorpha minutissima (Strobl, 1900) (N, S, Si, Sa)

Oscinimorpha novakii (Strobl, 1893) (N, S)

Oscinimorpha sordidissima (Strobl, 1893) (N)

Dasyopa Malloch, 1918

Dasyopa pygmaea (Meigen, 1838) (N, S, Si, Sa)

Dasyopa ruficeps (Macquart, 1835) (N, S, Si, Sa)

Dasyopa scutellata (von Roser, 1840) (N, S, Si, Sa)

Tricimba Lioy, 1864

Tricimba humeralis (Loew, 1858) (N, S, Si, Sa)

Tricimba lineella (Fallén, 1820) (N, S)

Aphanotrigonum Duda, 1932

Aphanotrigonum beschovskii Dely-Draskovits, 1981 (N, S)

Aphanotrigonum cinctellum Zettstedt, 1848 (N)

Aphanotrigonum femorellum Collin, 1946 (N)
Aphanotrigonum hungaricum Dely-Draskovits, 1981 (N)
Aphanotrigonum mejerei (Duda, 1932) (N, S)
Aphanotrigonum multicingulatum (Strobl, 1893) (N, S)
Aphanotrigonum nigripes (Zetterstedt, 1848) (N)
Aphanotrigonum trilineatum (Meigen, 1830) (N, S)

Siphunculina Rondani, 1856

Siphunculina aenea (Macquart, 1835) (N, S)
Siphunculina ornatifrons (Loew, 1858) (S, Si)
Siphunculina quinquangula (Loew, 1873) (N, S)

Dicraeus Loew, 1873

Dicraeus fennicus Duda, 1933 (N)
Dicraeus ingratus (Loew, 1866) (N)
Dicraeus napaeus Collin, 1946 (N)
Dicraeus nigropilosus Becker, 1910 (N, S, Si, Sa)
Dicraeus raptus (Haliday, 1838) (N, S, Si, Sa)
Dicraeus styriacus (Strobl, 1898) (N)
Dicraeus tibialis (Macquart, 1835) (N, S, Si, Sa)
Dicraeus vagans (Meigen, 1838) (N)

Camarota Meigen, 1830

Camarota curvipennis (Latreille, 1805) (N, S, Si, Sa)

Platycephala Fallén, 1820

Platycephala planifrons (Fabricius, 1798) (N)
Platycephala umbraculata (Fabricius, 1794) (N, S)

Eurina Meigen, 1830

Eurina calva Egger, 1862 (N, S, Si, Sa)
Eurina ducalis A. Costa, 1885 (N, S, Sa)
Eurina lurida Meigen, 1830 (N, S)

Trichieurina Duda, 1933

Trichieurina pubescens (Meigen, 1830) (N)

Paraeurina Duda, 1933

Paraeurina chloropoides (Strobl, 1909) (N) (E)

Meromyza Meigen, 1830

Meromyza bohémica Fedoseeva, 1962 (N, S)
Meromyza curvinervis (Zetterstedt, 1848) (N)
Meromyza femorata Macquart, 1835 (N, S, Si, Sa)
Meromyza laeta Meigen, 1838 (N, S)
Meromyza mosquensis Fedoseeva, 1960 (N)
Meromyza nigriseta Fedoseeva, 1960 (N)
Meromyza nigriventris Macquart, 1835 (N, S, Si, Sa)
Meromyza pluriseta Péterfi, 1961 (N, S)
Meromyza pratorum Meigen, 1830 (N, S)
Meromyza saltatrix (Linnaeus, 1761) (N, S)
Meromyza triangulina Fedoseeva, 1960 (N, S)
Meromyza variegata Meigen, 1830 (N, S, Si, Sa)
Meromyza virescens von Roser, 1840 (N, S)

Elachiptereicus Becker, 1909

Elachiptereicus italicus Duda, 1933 (S) (E)

Chlorops Meigen, 1803

Chlorops adjunctus Becker, 1910 (N)
Chlorops alpicolus Becker, 1910 (N)
Chlorops anthracophagoideus Strobl, 1900 (N, S)
Chlorops bohemicus Zuska, 1960 (N)
Chlorops brevifrons Loew, 1866 (N, S)
Chlorops brevimanus Loew, 1866 (N)
Chlorops calceatus Meigen, 1830 (N)
Chlorops centromaculatus (Duda, 1933) (N, S)
Chlorops dasycerus Loew, 1866 (N)
Chlorops fasciatus Meigen, 1830 (N, S)
Chlorops finitimus Becker, 1910 (N)
Chlorops frontosus Meigen, 1830 (N, S)
Chlorops geminatus Meigen, 1830 (N, S, Si, Sa)
Chlorops gracilis Meigen, 1830 (N, S, Si, Sa)
Chlorops horridus Becker, 1910 (N)
Chlorops hypostigma Meigen, 1830 (N, S)
Chlorops infumatus (Becker, 1910) (N)
Chlorops interruptus Meigen, 1830 (N, S, Si, Sa)
Chlorops longipalpis (Duda, 1933) (N)
Chlorops novakii Strobl, 1902 (N, S, Si, Sa)
Chlorops pallidiventris (Duda, 1933) (N)
Chlorops pallifrons Strobl, 1909 (N)
Chlorops pannonicus Strobl, 1893 (N, S, Si, Sa)
Chlorops planifrons Loew, 1866 (N, S)
Chlorops pumilionis (Bjerkander, 1778) (N, S, Si, Sa)
Chlorops puncticornis Loew, 1866 (N, S, Si, Sa)
Chlorops ringens Loew, 1866 (N, S)

Chlorops rufescens Oldenberg, 1923 (N)
Chlorops rufinus (Zetterstedt, 1848) (N)
Chlorops scalaris Meigen, 1830 (S)
Chlorops serenus Loew, 1866 (N, S, Si, Sa)
Chlorops socius Becker, 1912 (N, S, Si, Sa)
Chlorops speciosus Meigen, 1830 (N)
Chlorops strigulus (Fabricius, 1794) (N, S)
Chlorops troglodytes (Zetterstedt, 1848) (N, S)
Chlorops varsoviensis Becker, 1910 (N)

Parectecephala Becker, 1910

Parectecephala andalusiaca (Strobl, 1899) (S)
Parectecephala longicornis (Fallén, 1820) (N, S)

Melanum Becker, 1910

Melanum laterale (Haliday, 1833) (N)

Epichlorops Becker, 1910

Epichlorops puncticollis (Zetterstedt, 1848) (N)

Capnoptera Loew, 1866

Capnoptera pilosa Loew, 1866 (S, Si)
Capnoptera scutata (Rossi, 1790) (S, Sa)

Homalura Meigen, 1826

Homalura tarsata Meigen, 1826 (N, S)

Cryptonevra Lioy, 1864

Cryptonevra diadema (Meigen, 1830) (N, S)
Cryptonevra flavitarsis (Meigen, 1830) (N, S)
Cryptonevra glabra (Duda, 1933) (N, S)
Cryptonevra nigratarsis (Duda, 1933) (N, S)
Cryptonevra tarsata (Fallén, 1820) (N)

Cetema Hendel, 1907

Cetema cereris (Fallén, 1820) (N, S)
Cetema elongata (Meigen, 1830) (N, S)
Cetema monticula Becker, 1910 (N)
Cetema myopina (Loew, 1866) (N, Si)
Cetema neglecta Tonnoir, 1921 (N)

Thaumatomyia Zenker, 1833

Thaumatomyia elongatula (Becker, 1910) (N, S)
Thaumatomyia glabra (Meigen, 1830) (N, S)
Thaumatomyia hallandica Andersson, 1966 (N)
Thaumatomyia montana (Becker, 1916) (N) (E)
Thaumatomyia notata (Meigen, 1830) (N, S, Si, Sa)
Thaumatomyia rufa (Macquart, 1835) (N, S)
Thaumatomyia sulcifrons (Becker, 1907) (S, Si, Sa)
Thaumatomyia trifasciata Zetterstedt, 1848 (N)

Eutropha Loew, 1866

Eutropha fulvifrons (Haliday, 1833) (N, S, Si, Sa)

Centorisoma Becker, 1910

Centorisoma elegantulum Becker, 1910 (N, S)

Diplotoxa Loew, 1863

Diplotoxa dalmatina (Strobl, 1900) (N)
Diplotoxa messoria (Fallén, 1820) (N, S)

Pseudopachychaeta Strobl, 1902

Pseudopachychaeta heleocharis (Nartshuk, 1964) (N, S)
Pseudopachychaeta pachycera Strobl, 1902 (N, S, Si, Sa)
Pseudopachychaeta ruficeps Zetterstedt, 1838 (N)

Lasiosina Becker, 1910

Lasiosina albipila (Loew, 1866) (N, S)
Lasiosina cinctipes (Meigen, 1830) (N, S)
Lasiosina immaculata Becker, 1912 (N)
Lasiosina littoralis Becker, 1910 (N, S)
Lasiosina subnigripes Dely-Draskovits, 1977 (N)

Assuania Becker, 1903

Assuania thalhammeri (Strobl, 1893) (N, S, Si)

Phyladelphus Becker, 1910

Phyladelphus thalhammeri Becker, 1910 (N, S)

Braulidae

Braula Nitzsch, 1818

Braula coeca Nitzsch, 1818 (N, S, Si)

Braula schmitzi Örösi Pál, 1939 (N)

Carnidae

Carnus Nitzsch, 1818

Carnus hemapterus Nitzsch, 1818 (N)

Meoneura Rondani, 1856

Meoneura obscurella (Fallén, 1823) (N)

Milichiidae

Milichia Meigen, 1830

Milichia ludens (Wahlberg, 1847) (N, S)

Milichia speciosa Meigen, 1830 (N, S)

Madiza Fallén, 1810

Madiza glabra Fallén, 1820 (N, S)

Desmometopa Loew, 1866

Desmometopa m-nigrum (Zetterstedt, 1848) (N)

Desmometopa sordida (Fallén, 1820) (N)

Leptometopa Becker, 1903

Leptometopa latipes (Meigen, 1830) (N)

Leptometopa niveipennis (Strobl, 1900) (N)

Phyllomyza Fallén, 1810

Phyllomyza lucens Hendel, 1924 (N) (E)

Phyllomyza securicornis Fallén, 1823 (N)

Heleomyzidae

Oecothea Haliday, 1837

Oecothea fenestralis (Fallén, 1820) (N)

Eccoptomera Loew, 1862

Eccoptomera filata Loew, 1862 (N, S)

Eccoptomera infusata Wahlgren, 1918 (N)

Eccoptomera obscura (Meigen, 1830) (N)

Eccoptomera ornata Loew, 1862 (N)

Eccoptomera sanmartini Czerny, 1924 (N)

Neoleria Malloch, 1919

Neoleria fuscicornis Czerny, 1924 (N)

Acantholeria Garrett, 1921

Acantholeria cineraria (Loew, 1862) (N)

Acantholeria dentitibia (Oldenberg, 1916) (N)

Schroederella Enderlein, 1920

Schroederella iners (Meigen, 1830) (N)

Morpholeria (Spanoparea) Czerny, 1924

Morpholeria (Spanoparea) variabilis (Loew, 1862) (N)

Scoliocentra (Scoliocentra) Loew, 1862

Scoliocentra (Scoliocentra) amplicornis (Czerny, 1924) (N)

Scoliocentra (Chaetomus) Czerny, 1924

Scoliocentra (Chaetomus) flavotestacea (Zetterstedt, 1838) (N)

Heleomyza Fallén, 1810

Heleomyza captiosa (Gorodkov, 1962) (N)

Heleomyza modesta (Meigen, 1838) (N)

Suillia Robineau-Desvoidy, 1830

Suillia affinis (Meigen, 1830) (N)

Suillia atricornis (Meigen, 1830) (N)

Suillia bicolor (Zetterstedt, 1838) (N, S, Sa)

Suillia bistrigata (Meigen, 1830) (S, Sa)

Suillia crinimana (Czerny, 1904) (N)
Suillia femoralis (Loew, 1862) (N, S)
Suillia flagripes (Czerny, 1904) (N, S)
Suillia flava (Meigen, 1830) (N, S)
Suillia flavifrons (Zetterstedt, 1838) (N)
Suillia flavitarsis (Rondani, 1867) (N) (E)
Suillia fuscicornis (Zetterstedt, 1847) (N)
Suillia gigantea (Meigen, 1830) (N, S)
Suillia humilis (Meigen, 1830) (N)
Suillia inornata (Loew, 1862) (N)
Suillia laevifrons (Loew, 1862) (N)
Suillia lurida (Meigen, 1830) (N)
Suillia mikii (Pokorny, 1886) (N)
Suillia nemorum (Meigen, 1830) (N)
Suillia notata (Meigen, 1830) (N, S, Sa)
Suillia oxyphora (Mik, 1900) (N)
Suillia pallida (Fallén, 1820) (N)
Suillia pilimana (Loew, 1862) (N)
Suillia setitarsis (Czerny, 1904) (S)
Suillia subdola Czerny, 1927 (N)
Suillia tuberiperda (Rondani, 1867) (N, S)
Suillia umbratica (Meigen, 1838) (N)
Suillia ustulata (Meigen, 1830) (N)
Suillia variegata (Loew, 1862) (N, S, Si, Sa)
Suillia villeneuvei Czerny, 1924 (N)

Heteromyza Fallén, 1820

Heteromyza atricornis Meigen, 1830 (N)

Tephrochlamys Loew, 1862

Tephrochlamys flavipes (Zetterstedt, 1838) (N)
Tephrochlamys rufiventris (Meigen, 1830) (N, S)
Tephrochlamys tarsalis (Zetterstedt, 1847) (N)

Chyromyidae

Aphaniosoma Becker, 1903

Aphaniosoma nigrohirta Hendel, 1933 (N)

Chyromya Robineau-Desvoidy, 1830

Chyromya flava (Linnaeus, 1758) (N, S)
Chyromya oppidana (Scopoli, 1763) (N, S)

Sphaeroceridae

Alloborborus Duda, 1923

Alloborborus pallifrons (Fallén, 1820) (N?)

Apteromyia Vimmer, 1929

Apteromyia claviventris (Strobl, 1909) (Si)

Borborillus Duda, 1923

Borborillus costalis (Zetterstedt, 1847) (N)

Borborillus hispanicus (Duda, 1923) (N)

Borborillus niveipennis (Duda, 1923) (*)

Borborillus vitripennis (Meigen, 1830) (N, S)

Ceroptera Macquart, 1835

Ceroptera rufitarsis (Meigen, 1830) (Si?, Sa?)

Chaetopodella Duda, 1920

Chaetopodella scutellaris (Haliday, 1836) (N, Sa)

Coproica Rondani, 1861

Coproica acutangula (Zetterstedt, 1847) (N)

Coproica ferruginata (Stenhammar, 1854) (N, S, Si?, Sa?)

Coproica hirticula Collin, 1956 (N)

Coproica hirtula (Rondani, 1880) (N)

Coproica lugubris (Haliday, 1836) (N, S?, Si, Sa)

Coproica pusio (Zetterstedt, 1847) (N, Si)

Coproica rohaceki Carles-Tolrá, 1990 (N)

Coproica vagans (Haliday, 1833) (N, S?, Si?, Sa)

Copromyza Fallén, 1810

Copromyza equina Fallén, 1820 (N, S, Si, Sa)

Copromyza montana Roháček, 1992 (N)

Copromyza stercoraria (Meigen, 1830) (N)

Crumomyia Macquart, 1835

Crumomyia fimetaria (Meigen, 1830) (N, S)

Crumomyia glabrifrons (Meigen, 1830) (N, S, Si)

Crumomyia glacialis (Meigen, 1830) (N)
Crumomyia nigra (Meigen, 1830) (N, S)
Crumomyia nitida (Meigen, 1830) (N, S)
Crumomyia notabilis (Collin, 1902) (N)
Crumomyia parentela (Séguy, 1963) (N)
Crumomyia pedestris (Meigen, 1830) (N?)

Elachisoma Rondani, 1880

Elachisoma aterrimum (Haliday, 1833) (N)
Elachisoma bajzae Papp, 1983 (N)

Gigalimosina Roháček, 1983

Gigalimosina flaviceps (Zetterstedt, 1847) (N)

Gonioneura Rondani, 1880

Gonioneura spinipennis (Haliday, 1836) (N, S, Si?, Sa?) (*)

Herniosina Roháček, 1983

Herniosina bequaerti (Villeneuve, 1917) (N)

Ischiolepta Lioy, 1864

Ischiolepta crenata (Meigen, 1838) (N)
Ischiolepta denticulata (Meigen, 1838) (N?, S?)
Ischiolepta pusilla (Fallén, 1820) (N, S, Si, Sa?)
Ischiolepta scabricula (Haliday, 1836) (N)

Leptocera (Leptocera) Olivier, 1813

Leptocera (Leptocera) caenosa (Rondani, 1880) (N, S, Si?, Sa)
Leptocera (Leptocera) fontinalis (Fallén, 1826) (N, S, Si, Sa)
Leptocera (Leptocera) nigra Olivier, 1813 (N, S, Si, Sa)

Leptocera (Rachispoda) Lioy, 1864

Leptocera (Rachispoda) acrostichalis (Becker, 1903) (Si)
Leptocera (Rachispoda) breviceps (Stenhammar, 1854) (N) (*)
Leptocera (Rachispoda) brevior Roháček, 1991 (Si, Sa)
Leptocera (Rachispoda) caudata Roháček, 1991 (N)
Leptocera (Rachispoda) cilifera (Rondani, 1880) (N, S)
Leptocera (Rachispoda) duodecimseta Papp, 1973 (S, Si)
Leptocera (Rachispoda) fuscipennis (Haliday, 1833) (N, S?, Si, Sa)
Leptocera (Rachispoda) gel Papp, 1978 (N)
Leptocera (Rachispoda) hostica Villeneuve, 1917 (N)

Leptocera (Rachispoda) kabuli Papp, 1978 (N, S, Si, Sa)
Leptocera (Rachispoda) limosa (Fallén, 1820) (N, S, Si)
Leptocera (Rachispoda) longior Roháček, 1991 (N, S?, Si, Sa)
Leptocera (Rachispoda) lutosa (Stenhammar, 1854) (N, S, Si?, Sa?)
Leptocera (Rachispoda) lutosoidea (Duda, 1938) (N, S, Si, Sa)
Leptocera (Rachispoda) modesta (Duda, 1924) (N, S, Si, Sa)
Leptocera (Rachispoda) ochrocephala Munari, 1989 (N) (E)
Leptocera (Rachispoda) pseudohostica (Duda, 1924) (S)
Leptocera (Rachispoda) segem Roháček, 1991 (N)
Leptocera (Rachispoda) varicornis (Strobl, 1900) (N, S, Si)

***Limosina* Macquart, 1835**

Limosina silvatica (Meigen, 1830) (N, S, Sa)

***Lotobia* Lioy, 1864**

Lotobia pallidiventris (Meigen, 1830) (N, Sa)

***Lotophila* Lioy, 1864**

Lotophila atra (Meigen, 1830) (N, S, Si, Sa)

***Minilimosina (Allolimosina)* Roháček, 1983**

Minilimosina (Allolimosina) alloneura (Richards, 1952) (N)

***Minilimosina (Minilimosina)* Roháček, 1983**

Minilimosina (Minilimosina) fungicola (Haliday, 1836) (N)
Minilimosina (Minilimosina) parvula (Stenhammar, 1854) (N)

***Minilimosina (Svarciella)* Roháček, 1983**

Minilimosina (Svarciella) vitripennis (Zetterstedt, 1847) (N)

***Norrbomia* Papp, 1988**

Norrbomia sordida (Zetterstedt, 1847) (N)

***Opacifrons* Duda, 1918**

Opacifrons coxata (Stenhammar, 1854) (N, S, Si, Sa)

***Opalimosina (Dentilimosina)* Roháček, 1983**

Opalimosina (Dentilimosina) denticulata (Duda, 1924) (N)

Opalimosina (Opalimosina) Roháček, 1983

Opalimosina (Opalimosina) collini (Richards, 1929) (N)

Opalimosina (Opalimosina) mirabilis (Collin, 1902) (N)

Opalimosina (Pappiella) Roháček, 1983

Opalimosina (Pappiella) liliputana (Rondani, 1880) (N)

Paralimosina Papp, 1973

Paralimosina fucata (Rondani, 1880) (N, S, Sa)

Philocoprella Richards, 1929

Philocoprella italica (Deeming, 1964) (N)

Philocoprella quadrispina (Laurence, 1952) (N)

Phthitia Enderlein, 1938

Phthitia ciliata (Duda, 1918) (Si)

Phthitia glabrescens (Villeneuve, 1917) (S)

Phthitia longisetosa (Dahl, 1909) (N)

Phthitia pappi (Roháček, 1983) (Si)

Phthitia plumosula (Rondani, 1880) (N, S, Sa)

Phthitia sicana (Munari, 1988) (Si) (E)

Phthitia soikai (Munari, 1990) (N) (E)

Pseudocollinella Duda, 1924

Pseudocollinella humida (Haliday, 1836) (N, S, Si)

Pseudocollinella jorlii Carles-Tolrà, 1990 (N, S?, Si, Sa)

Pteremis Rondani, 1856

Pteremis fenestralis (Fallén, 1820) (N)

Pullimosina (Pullimosina) Roháček, 1983

Pullimosina (Pullimosina) heteroneura (Haliday, 1836) (N, S, Si, Sa)

Pullimosina (Pullimosina) meijerei (Duda, 1918) (N)

Pullimosina (Pullimosina) moesta (Villeneuve, 1918) (N)

Pullimosina (Pullimosina) pullula (Zetterstedt, 1847) (N)

Puncticorpus Duda, 1918

Puncticorpus cribratum (Villeneuve, 1918) (Si)

Puncticorpus lusitanicum (Richards, 1963) (Sa)

***Spelobia (Bifronsina)* Roháček, 1983**

Spelobia (Bifronsina) bifrons (Stenhammar, 1854) (N, Sa)

***Spelobia (Eulimosina)* Roháček, 1983**

Spelobia (Eulimosina) ochripes (Meigen, 1830) (N, S)

***Spelobia (Spelobia)* Spuler, 1924**

Spelobia (Spelobia) baezi (Papp, 1977) (Si, Sa)
Spelobia (Spelobia) clunipes (Meigen, 1830) (N, S, Si)
Spelobia (Spelobia) czizeki (Duda, 1918) (N)
Spelobia (Spelobia) ibrida Roháček, 1983 (N, Sa)
Spelobia (Spelobia) luteilabris (Rondani, 1880) (N, S)
Spelobia (Spelobia) nana (Rondani, 1880) (N, S)
Spelobia (Spelobia) palmata (Richards, 1927) (N)
Spelobia (Spelobia) parapusio (Dahl, 1909) (N, S)
Spelobia (Spelobia) pseudosetaria (Duda, 1918) (N, Si)
Spelobia (Spelobia) rufilabris (Stenhammar, 1854) (N)
Spelobia (Spelobia) simplicipes (Duda, 1925) (N, Sa)
Spelobia (Spelobia) talparum (Richards, 1927) (N)
Spelobia (Spelobia) villosa (Duda, 1918) (S, Sa)

***Sphaerocera* Latreille, 1804**

Sphaerocera curvipes Latreille, 1805 (N, S, Si, Sa)

***Spinilimosina* Roháček, 1983**

Spinilimosina brevicostata (Duda, 1918) (N)

***Telomerina* Roháček, 1983**

Telomerina eburnea Roháček, 1983 (N)
Telomerina flavipes (Meigen, 1830) (N, S, Si)
Telomerina levifrons (Spuler, 1925) (N)
Telomerina pseudoleuoptera (Duda, 1924) (N)

***Terrilimosina* Roháček, 1983**

Terrilimosina racovitzai (Bezzi, 1911) (N)
Terrilimosina schmitzi (Duda, 1918) (N)

***Thoracochaeta* Duda, 1918**

Thoracochaeta brachystoma (Stenhammar, 1854) (N)

Thoracochaeta johnsoni (Spuler, 1925) (N)
Thoracochaeta mediterranea Munari, 1989 (Si)
Thoracochaeta zosterae (Haliday, 1833) (N, S)

***Trachyopella (Nudopella)* Roháček & Marshall, 1986**

Trachyopella (Nudopella) leucoptera (Haliday, 1836) (N)

***Trachyopella (Trachyopella)* Duda, 1918**

Trachyopella (Trachyopella) atomus (Rondani, 1880) (N)
Trachyopella (Trachyopella) bovilla Collin, 1954 (N)
Trachyopella (Trachyopella) coprina (Duda, 1918) (N)

Note

Borborillus: Per quanto riguarda questo genere, Papp (1988, Acta zool. hung., 34: 395) così commenta: "A majority of the species in the Palaearctic region assigned hitherto to *Borborillus* [...] belongs actually to *Norrbomia*".

Borborillus niveipennis: Specie citata genericamente per l'Italia (Richards O.W., 1962. Entomologist's mon. Mag., 97 (1961): 177-179).

Gonioneura spinipennis: Specie sicuramente distribuita in tutta Italia. Rondani (1880) la cita genericamente per l'Italia.

Leptocera (Rachispoda) breviceps: Zangheri (1950) cita questa specie per la Romagna, ma con ogni probabilità si tratta di un'entità affine del "gruppo *breviceps*".

Curtonotidae

***Curtonotum* Macquart, 1843**

Curtonotum anus (Meigen, 1830) (N, S)

Camillidae

***Camilla* Haliday, 1838**

Camilla acutipennis (Loew, 1865) (N, S)
Camilla nigrifrons Collin, 1933 (N) (*)

Note

Camilla nigrifrons: Segnalazione nuova per l'Italia.

Drosophilidae

Acletoxenus Frauenfeld, 1868

Acletoxenus formosus (Loew, 1864) (N)

Amiota (**Amiota**) Loew, 1862

Amiota (*Amiota*) *alboguttata* (Wahlberg, 1839) (N)

Amiota (**Phortica**) Schiner, 1862

Amiota (*Phortica*) *semivirgo* Máca, 1977 (N, S)

Amiota (*Phortica*) *variegata* (Fallén, 1823) (N, S)

Cacoxenus Loew, 1858

Cacoxenus indagator Loew, 1858 (N, S) (*)

Gitona Meigen, 1830

Gitona distigma Meigen, 1830 (N, S)

Leucophenga Mik, 1886

Leucophenga maculata (Dufour, 1839) (N, S)

Leucophenga quinquemaculata Strobl, 1893 (N)

Stegana Meigen, 1830

Stegana furta (Linnaeus, 1767) (N)

Chymomyza Czerny, 1903

Chymomyza caudatula Oldenberg, 1914 (N)

Drosophila (**Dorsilopha**) Sturtevant, 1942

Drosophila (*Dorsilopha*) *busckii* Coquillett, 1901 (N, S, Si, Sa)

Drosophila (**Drosophila**) Fallén, 1823

Drosophila (*Drosophila*) *buzzatii* Patterson & Wheeler, 1942 (N?, S, Si, Sa?)

Drosophila (*Drosophila*) *cameraria* Haliday, 1833 (N, S, Si?, Sa?)

Drosophila (*Drosophila*) *funnebris* (Fabricius, 1787) (N, S, Si, Sa?)

Drosophila (*Drosophila*) *histrion* Meigen, 1830 (N, S)

Drosophila (*Drosophila*) *hydei* Sturtevant, 1921 (N, S, Si, Sa?)

Drosophila (*Drosophila*) *immigrans* Sturtevant, 1921 (N, S, Si, Sa?)

Drosophila (*Drosophila*) *kuntzei* Duda, 1924 (N, S)

Drosophila (*Drosophila*) *limbata* von Roser, 1840 (N, S)

Drosophila (Drosophila) littoralis Meigen, 1830 (N)
Drosophila (Drosophila) phalerata Meigen, 1830 (N, S)
Drosophila (Drosophila) repleta Wollaston, 1858 (N, S, Si, Sa)
Drosophila (Drosophila) testacea von Roser, 1840 (N, S)
Drosophila (Drosophila) transversa Fallén, 1823 (N)

***Drosophila (Sophophora)* Sturtevant, 1939**

Drosophila (Sophophora) ambigua Pomini, 1940 (N, S, Si, Sa?)
Drosophila (Sophophora) bifasciata Pomini, 1940 (N, S)
Drosophila (Sophophora) helvetica Burla, 1948 (N, S)
Drosophila (Sophophora) melanogaster Meigen, 1830 (N, S, Si, Sa)
Drosophila (Sophophora) obscura Fallén, 1823 (N, S, Si, Sa?)
Drosophila (Sophophora) simulans Sturtevant, 1919 (N, S, Si, Sa?)
Drosophila (Sophophora) subobscura Collin in Gordon, 1936 (N, S, Si, Sa)
Drosophila (Sophophora) tristis Fallén, 1823 (N, S)

***Drosophila (Spinodrosophila)* Duda, 1924**

Drosophila (Spinodrosophila) nigrosparsa Strobl, 1898 (N)

***Hirtodrosophila* Duda, 1923**

Hirtodrosophila confusa Staeger, 1844 (N)

***Lordiphosa* Basden, 1961**

Lordiphosa acuminata (Collin, 1952) (N, S)
Lordiphosa andalusiaca (Strobl, 1906) (N, S, Si, Sa?)
Lordiphosa fenestrarum (Fallén, 1823) (N, S?)

***Scaptodrosophila* Duda, 1923**

Scaptodrosophila deflexa (Duda, 1924) (N, S)
Scaptodrosophila rufifrons (Loew, 1873) (N, Si)

***Scaptomyza (Parascaptomyza)* Duda, 1924**

Scaptomyza (Parascaptomyza) pallida (Zetterstedt, 1847) (N, S, Si, Sa)

***Scaptomyza (Scaptomyza)* Hardy, 1849**

Scaptomyza (Scaptomyza) flava (Fallén, 1823) (N, S, Si?, Sa?)
Scaptomyza (Scaptomyza) graminum (Fallén, 1823) (N, S, Si, Sa?)

Note

Cacoxenus: Una richiesta di soppressione dei due nomi di Rondani (genere e 006.0.001.0) è

stata recentemente sottoposta all'International Commission on Zoological Nomenclature.
Cacoxenus indagator: Una richiesta di soppressione dei due nomi di Rondani (genere 006.0.e specie) è stata recentemente sottoposta all'International Commission on Zoological Nomenclature.

Diastatidae

Diastata Meigen, 1830

Diastata adusta Meigen, 1830 (N, S)
Diastata costata Meigen, 1830 (N)
Diastata fuscata (Fallén, 1823) (N, S)
Diastata nebulosa (Fallén, 1823) (N, S)
Diastata ornata Meigen, 1830 (N) (*)
Diastata vagans Loew, 1864 (N, S)

Euthychaeta Loew, 1864

Euthychaeta spectabilis (Loew, 1864) (N)

Campichoeta Meigen, 1830

Campichoeta griseola (Zetterstedt, 1855) (N)
Campichoeta obscuripennis (Meigen, 1830) (N, S)
Campichoeta punctum (Meigen, 1830) (N, S)

Note

Diastata ornata: La presenza in Italia necessita conferma.

Ephydriidae

Ochthera Latreille, 1802

Ochthera manicata (Fabricius, 1794) (N, S)
Ochthera schembrii Rondani, 1847 (N, S, Si, Sa)

Setacera Cresson, 1930

Setacera breviventris (Loew, 1860) (N, S, Si, Sa)
Setacera micans (Haliday, 1833) (N, S, Si, Sa)
Setacera trina Collin, 1964 (N, S, Sa)

Ephydra Fallén, 1810

Ephydra bivittata Loew, 1860 (N, S, Si, Sa)

Ephydra flavipes (Macquart, 1843) (N, S, Si, Sa)
Ephydra glauca Meigen, 1830 (N, S)
Ephydra macellaria Egger, 1862 (N, S, Si, Sa)

Paracoenia Cresson, 1935

Paracoenia beckeri (Kuntze, 1897) (S) (E)
Paracoenia fumosa (Stenhammar, 1844) (N, S)

Coenia Robineau-Desvoidy, 1830

Coenia palustris (Fallén, 1823) (N, S, Sa)

Teichomyza Macquart, 1835

Teichomyza fusca Macquart, 1835 (N)

Scatophila Becker, 1896

Scatophila caviceps (Stenhammar, 1844) (N, S, Si)
Scatophila cribrata (Stenhammar, 1844) (N)
Scatophila despecta (Haliday, 1839) (N, S, Si, Sa)
Scatophila farinae Becker, 1903 (N, S)
Scatophila modesta Becker, 1908 (N, Si)
Scatophila signata (Loew, 1860) (S, Si)
Scatophila unicornis Czerny, 1900 (N, S)

Philotelma Becker, 1896

Philotelma nigripennis (Meigen, 1830) (N, S, Si, Sa)
Philotelma rossii (Canzoneri & Meneghini, 1979) (N, S, Sa)

Lamproscatella Hendel, 1917

Lamproscatella dictaeta Loew, 1860 (N, S, Si, Sa)
Lamproscatella sibilans (Haliday, 1833) (N, S)

Scatella Robineau-Desvoidy, 1830

Scatella callosicosta Bezzi, 1895 (N, S, Sa)
Scatella ciliata Collin, 1930 (N, S, Si, Sa)
Scatella gea Canzoneri & Meneghini, 1979 (N) (E)
Scatella lutosa (Haliday, 1833) (N, S, Sa)
Scatella paludum (Meigen, 1830) (N, S, Si, Sa)
Scatella rufipes Strobl, 1906 (S, Si, Sa)
Scatella stagnalis (Fallén, 1813) (N, S, Si, Sa)
Scatella subguttata (Meigen, 1830) (N, S, Si, Sa)

***Limnellia* Malloch, 1925**

Limnellia quadrata (Fallén, 1813) (N, S, Si, Sa)

***Parydra (Parydra)* Stenhammar, 1844**

Parydra (Parydra) aquila (Fallén, 1813) (N, S, Si)

Parydra (Parydra) pubera Loew, 1860 (N, S, Si, Sa)

***Parydra (Chaetoapnaea)* Hendel, 1930**

Parydra (Chaetoapnaea) coarctata (Fallén, 1813) (N, S, Si, Sa)

Parydra (Chaetoapnaea) cognata Loew, 1860 (N, S, Si, Sa)

Parydra (Chaetoapnaea) flavitarsis Dahl, 1964 (S, Si, Sa)

Parydra (Chaetoapnaea) fossarum (Haliday, 1833) (N, S, Si, Sa)

Parydra (Chaetoapnaea) hecate (Haliday, 1833) (N, S, Si)

Parydra (Chaetoapnaea) littoralis (Meigen, 1830) (N, S)

Parydra (Chaetoapnaea) mitis (Cresson, 1930) (N, S)

Parydra (Chaetoapnaea) nigratarsis Strobl, 1893 (N)

Parydra (Chaetoapnaea) nubecula Becker, 1896 (N)

Parydra (Chaetoapnaea) pusilla (Meigen, 1830) (N, S)

Parydra (Chaetoapnaea) quinquemaculata Becker, 1896 (N)

Parydra (Chaetoapnaea) ralloi Canzoneri & Meneghini, 1978 (N, S)

***Pelina* Haliday, 1837**

Pelina aenea (Fallén, 1813) (N, S)

Pelina nitens Loew, 1873 (S)

Pelina subpunctata Becker, 1896 (N, S)

***Parydroptera* Collin, 1913**

Parydroptera discomyzina Collin, 1913 (S)

***Axysta*. Haliday, 1839**

Axysta. cesta (Haliday, 1833) (N)

***Hyadina* Haliday, 1839**

Hyadina guttata (Fallén, 1813) (N, S, Si)

Hyadina humeralis Becker, 1896 (N, S)

Hyadina nitida (Macquart, 1835) (N, S)

Hyadina pollinosa Oldenberg, 1923 (N)

***Philygria* Stenhammar, 1844**

Philygria flavipes (Fallén, 1823) (N)

Philygria interrupta (Haliday, 1833) (N)
Philygria maculipennis (Robineau-Desvoidy, 1830) (N, S)
Philygria nigricauda Stanhammar, 1844 (N)
Philygria oblecta Becker, 1896 (N)
Philygria posticata (Meigen, 1830) (N, S)
Philygria stictica (Meigen, 1830) (N, S, Si)
Philygria trilineata De Meijere, 1907 (N)

Nostima Coquillett, 1900

Nostima picta (Fallén, 1813) (N, S, Sa)
Nostima semialata (Collin, 1913) (N)

Halmopota Haliday, 1856

Halmopota mediterranea Loew, 1860 (Si)
Halmopota septentrionalis (Canzoneri & Meneghini, 1974) (N, S) (E)

Notiphila Fallén, 1810

Notiphila annulipes Stenhammar, 1844 (N, S)
Notiphila brunnipes (Robineau-Desvoidy, 1830) (N, S, Sa)
Notiphila cinerea Fallén, 1813 (N, S, Si, Sa)
Notiphila cogani Canzoneri & Meneghini, 1979 (S, Sa)
Notiphila dorsata Stenhammar, 1844 (N, S)
Notiphila maculata Stenhammar, 1844 (N)
Notiphila mima Canzoneri & Meneghini, 1979 (N) (E)
Notiphila nigricornis Stenhammar, 1844 (N, S)
Notiphila riparia Meigen, 1830 (N, S, Sa)
Notiphila stagnicola (Robineau-Desvoidy, 1830) (N, S, Si)
Notiphila venusta Loew, 1860 (N, S)

Dichaeta Meigen, 1830

Dichaeta caudata (Fallén, 1813) (N, S)

Hydrellia Robineau-Desvoidy, 1830

Hydrellia albifrons (Fallén, 1813) (N, S)
Hydrellia albilabris (Meigen, 1830) (N, S, Si)
Hydrellia argyrogonis Becker, 1896 (N, S)
Hydrellia cardamines Haliday, 1839 (N)
Hydrellia fascitibia (von Rosen, 1840) (N)
Hydrellia flaviceps (Meigen, 1830) (N)
Hydrellia fusca (Stenhammar, 1844) (N, S)
Hydrellia geniculata (Stenhammar, 1844) (N, S)
Hydrellia grisea (Stenhammar, 1844) (N, S, Sa)
Hydrellia griseola (Fallén, 1813) (N, S, Si, Sa)

Hydrellia ischiaca Loew, 1862 (N, S)
Hydrellia italica Canzoneri & Meneghini, 1974 (N) (E)
Hydrellia maculiventris Becker, 1896 (N, S, Sa)
Hydrellia maura Meigen, 1838 (N, S, Si)
Hydrellia minutissima Papp, 1983 (N, S)
Hydrellia nigricans (Stenhammar, 1844) (N, S)
Hydrellia nymphaeae (Stenhammar, 1844) (N)
Hydrellia obscura (Meigen, 1830) (N, S, Sa)
Hydrellia padi Canzoneri & Meneghini, 1985 (N) (E)
Hydrellia porphyrops Haliday, 1839 (N, S)
Hydrellia pubescens Becker, 1926 (N, S, Si, Sa)
Hydrellia raffonei Canzoneri & Rampini, 1989 (N) (E)
Hydrellia ranunculi Haliday, 1839 (N, S, Si, Sa)
Hydrellia subalbiceps Collin, 1966 (N, S, Si)
Hydrellia thoracica Haliday, 1839 (N, S)
Hydrellia transsylvana Becker, 1896 (N)

Ilythea Haliday, 1839

Ilythea spilota (Curtis, 1832) (N, S)

Trimerina Macquart, 1835

Trimerina intemeliae Canzoneri & Rallo, 1982 (N)
Trimerina madizans (Fallén, 1813) (N)

Discomyza Meigen, 1830

Discomyza incurva (Fallén, 1823) (N, S)
Discomyza italica Séguy, 1929 (N, Si)

Clanoneurum Becker, 1903

Clanoneurum cimiciforme (Haliday, 1855) (N, S, Si)

***Athyroglossa* (*Parathyroglossa*)** Hendel, 1831

Athyroglossa (*Parathyroglossa*) *ordinata* Becker, 1896 (N, S, Si)

***Athyroglossa* (*Athyroglossa*)** Loew, 1860

Athyroglossa (*Athyroglossa*) *flaviventris* (Meigen, 1830) (N, S)
Athyroglossa (*Athyroglossa*) *glabra* (Meigen, 1830) (N, S, Si)
Athyroglossa (*Athyroglossa*) *nudiuscula* Loew, 1873 (N, S)

Mosillus Latreille, 1804

Mosillus subsultans (Fabricius, 1798) (N, S, Si, Sa)

Chlorichaeta Becker, 1922

Chlorichaeta albipennis (Loew, 1848) (N, S, Si, Sa)

Chlorichaeta tuberculosa Becker, 1922 (S, Sa)

Hecamede Haliday, 1837

Hecamede albicans (Meigen, 1830) (N, S, Si, Sa)

Homalometopus Becker, 1903

Homalometopus ichnusae Munari, 1988 (Sa) (E)

Homalometopus platycephalus (Becker, 1907) (S, Si)

Asmeringa Becker, 1903

Asmeringa inermis Becker, 1903 (N, S, Si, Sa)

Glenanthe Haliday, 1839

Glenanthe ripicola Haliday, 1839 (N, S, Sa)

Allotrichoma Becker, 1896

Allotrichoma bezzii Becker, 1896 (N)

Allotrichoma filiforme Becker, 1896 (N, S)

Allotrichoma laterale (Loew, 1860) (N, S, Si, Sa)

Allotrichoma picenum Canzoneri & Rampini, 1990 (N, S)

Allotrichoma schumanni Papp, 1974 (N)

Allotrichoma sicanum Canzoneri, 1980 (Si)

Schema Becker, 1907

Schema durrenbergensis (Loew, 1864) (N, S, Si, Sa)

Ptilomyia Coquillett, 1900

Ptilomyia angustigenis (Becker, 1926) (N, S, Si, Sa)

Atissa Curtis, 1837

Atissa hepaticoloris Becker, 1903 (N, S)

Atissa limosina Becker, 1896 (N, S, Sa)

Atissa pygmaea (Haliday, 1833) (N, S, Si, Sa)

Discocerina Macquart, 1835

Discocerina obscurella (Fallén, 1813) (N, S, Si, Sa)

Polytrichophora Cresson, 1929

Polytrichophora duplosetosa (Becker, 1896) (N, S, Si, Sa)

Diclasioipa Hendel, 1917

Diclasioipa lacteipennis (Loew, 1860) (N, S)

Diclasioipa niveipennis (Becker, 1896) (N, S, Si, Sa)

Hecamedoides Hendel, 1917

Hecamedoides corleonensis (Canzoneri, 1983) (Si) (E)

Hecamedoides costatus (Loew, 1860) (N, S, Si, Sa)

Hecamedoides glaucellus (Stenhammar, 1844) (N, S, Si, Sa)

Hecamedoides morrii (Canzoneri & Rampini, 1980) (S) (E)

Ditrichophora Cresson, 1924

Ditrichophora aulisioi (Canzoneri, 1977) (N, S) (E)

Ditrichophora aurifacies (Strobl, 1893) (N)

Ditrichophora bezzii (Canzoneri & Meneghini, 1975) (N, S) (E)

Ditrichophora calceata (Meigen, 1830) (N, S)

Ditrichophora canzonerii (Rampini, 1980) (N) (E)

Ditrichophora collini (Canzoneri & Meneghini, 1977) (S)

Ditrichophora coxalis (Strobl, 1893) (N)

Ditrichophora dimidiatipennis (Strobl, 1893) (N)

Ditrichophora fuscella (Stenhammar, 1844) (N, S)

Ditrichophora glabricula (Fallén, 1813) (S)

Ditrichophora griseifacies (Canzoneri, 1976) (N, S) (E)

Ditrichophora insolita (Canzoneri & Meneghini, 1977) (N, S, Si)

Ditrichophora meridionalis (Canzoneri & Meneghini, 1977) (N, S, Si) (E)

Ditrichophora nigerrima (Strobl, 1893) (N)

Ditrichophora nivea (Becker, 1896) (N, S)

Ditrichophora palliditarsis (Becker, 1896) (N, S)

Ditrichophora plumosa (Fallén, 1823) (N, S)

Ditrichophora soikai (Canzoneri & Meneghini, 1977) (S) (E)

Ditrichophora tirolensis (Canzoneri & Rallo, 1979) (N) (E)

Psilopa Fallén, 1823

Psilopa apicalis (Perris, 1847) (N)

Psilopa biskrae Becker, 1926 (N, Si, Sa)

Psilopa compta (Meigen, 1830) (N, S, Si, Sa)

Psilopa leucostoma (Meigen, 1830) (N, S)

Psilopa maritima (Perris, 1847) (N, S, Si, Sa)

Psilopa nigritella Stenhammar, 1844 (N, S, Si, Sa)

Psilopa nilotica (Becker, 1903) (N)
Psilopa nitidula (Fallén, 1813) (N, S, Si, Sa)
Psilopa pappi Canzoneri & Meneghini, 1975 (N)
Psilopa polita (Macquart, 1835) (N, S, Si)
Psilopa pulicaria (Haliday, 1839) (N, Si)
Psilopa roderi Girschner, 1889 (N, S, Si)
Psilopa rutilans Canzoneri & Meneghini, 1972 (N, Sa) (E)

Scathophagidae

Norellia (Norellia) Robineau-Desvoidy, 1830

Norellia (Norellia) spinipes (Meigen, 1826) (N)

Norellia (Norellisoma) Wahlgren, 1917

Norellia (Norellisoma) alpestris Schiner, 1864 (N)
Norellia (Norellisoma) striolata (Meigen, 1826) (N)

Cordilura (Cordilura) Fallén, 1810

Cordilura (Cordilura) bezzii (Sack, 1937) (N) (E)

Cordilura (Cordilurina) James, 1955

Cordilura (Cordilurina) albipes (Fallén, 1819) (N)
Cordilura (Cordilurina) fuscitibia (Rondani, 1867) (N)
Cordilura (Cordilurina) nigriseta (Rondani, 1867) (N) (E)

Gonatherus Rondani, 1856

Gonatherus planiceps (Fallén, 1826) (N)

Cleigastra Macquart, 1835

Cleigastra apicalis (Meigen, 1826) (N)

Chaetosa Coquillett, 1898

Chaetosa punctipes (Meigen, 1826) (N)

Scathophaga Meigen, 1803

Scathophaga fontinalis (Rondani, 1867) (E) (*)
Scathophaga furcata (Say, 1823) (N)
Scathophaga lutaria (Fabricius, 1794) (N)
Scathophaga scybalaria (Linnaeus, 1758) (N)

Scathophaga stercoraria (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
Scathophaga suillia (Fabricius, 1794) (N)
Scathophaga taeniopa (Rondani, 1867) (N)

Note

Scathophaga fontinalis: Nota da località italiana non precisata.

Anthomyiidae

Acklandia Hennig, 1976

Acklandia servadei (Séguy, 1933) (N)

Acyglossa Rondani, 1866

Acyglossa atramentaria (Meigen, 1826) (N)
Acyglossa pollinosa Villeneuve, 1908 (N)

Adia Robineau-Desvoidy, 1830

Adia cinerella (Fallén, 1825) (N, S, Si)
Adia grisella (Rondani, 1871) (N, S)

Alliopsis Schnabl & Dziedzicki, 1911

Alliopsis atronitens (Strobl, 1893) (N)
Alliopsis glacialis (Zetterstedt, 1845) (N)

Anthomyia Meigen, 1803

Anthomyia imbrida Rondani, 1866 (N)
Anthomyia liturata (Robineau-Desvoidy, 1830) (N, S, Si)
Anthomyia monilis (Meigen, 1826) (N)
Anthomyia pluvialis (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
Anthomyia procellaris Rondani, 1866 (S, Si)
Anthomyia quinquemaculata Macquart, 1839 (S, Si)

Botanophila Lioy, 1864

Botanophila bompadrei (Bezzi, 1918) (N)
Botanophila brunneilinea (Zetterstedt, 1845) (N)
Botanophila centaureae (Hennig, 1970) (S)
Botanophila dissecta (Meigen, 1826) (N)
Botanophila facettii (Bezzi, 1918) (N)
Botanophila fugax (Meigen, 1826) (N)
Botanophila gnava (Meigen, 1826) (N)

Botanophila maculipes (Zetterstedt, 1845) (N)
Botanophila odontogaster (Zetterstedt, 1845) (N)
Botanophila prominens (Stein, 1916) (N)
Botanophila spinosa (Rondani, 1866) (N, S)
Botanophila striolata (Fallén, 1824) (N)
Botanophila varicolor (Meigen, 1826) (N, S)
Botanophila vicaria (Hennig, 1972) (N)

Calythea Schnabl & Dziedzicki, 1911

Calythea dedecorata (Rondani, 1866) (N)
Calythea nigricans (Robineau-Desvoidy, 1830) (N, S, Si)
Calythea pratincola (Panzer, 1809) (N)

Chiastocheta Pokorný, 1889

Chiastocheta lophota Karl, 1943 (N)

Chirosia Rondani, 1856

Chirosia albitarsis (Zetterstedt, 1845) (N, S, Si)
Chirosia betuleti (Ringdahl, 1935) (N)
Chirosia crassiseta Stein, 1908 (N)
Chirosia flavipennis (Fallén, 1823) (N)
Chirosia histricina (Rondani, 1866) (N)
Chirosia nigripes Bezzi, 1895 (S)

Delia Robineau-Desvoidy, 1830

Delia antiqua (Meigen, 1826) (N)
Delia bracata (Rondani, 1866) (N, S)
Delia brunnescens (Zetterstedt, 1845) (N, S)
Delia cardui (Meigen, 1826) (N, S)
Delia coarctata (Fallén, 1825) (N)
Delia crinita Hennig, 1974 (N)
Delia criniventris (Zetterstedt, 1860) (N)
Delia discalis (Séguy, 1925) (N)
Delia echinata (Séguy, 1923) (N)
Delia elongata (Pokorný, 1889) (N)
Delia floricola Robineau-Desvoidy, 1830 (S)
Delia florilega (Zetterstedt, 1845) (N)
Delia frontella (Zetterstedt, 1838) (N)
Delia hirticrura (Rondani, 1871) (N)
Delia interflua (Pandellé, 1900) (S)
Delia linearis (Stein, 1898) (N)
Delia longicauda (Strobl, 1898) (N)
Delia majuscula (Pokorný, 1889) (N, S)
Delia montium Hennig, 1974 (S)

Delia nigrescens Rondani, 1877 (N)
Delia nuda (Strobl, 1901) (S)
Delia parcepilosa (Villeneuve, 1908) (S)
Delia penicillaris (Rondani, 1866) (N)
Delia penicillosa Hennig, 1974 (N)
Delia pilitibia (Stein, 1916) (N, S)
Delia piliventris (Pokorny, 1889) (N, S)
Delia platura (Meigen, 1826) (N, S, Si)
Delia pruinosa (Zetterstedt, 1845) (N)
Delia pseudofugax (Strobl, 1893) (N)
Delia radicum (Linnaeus, 1758) (N, S)
Delia tarsifimbria (Pandellé, 1900) (N)
Delia tenuiventris (Zetterstedt, 1860) (N)
Delia tornensis (Ringdahl, 1926) (N)
Delia tumidula Ringdahl, 1949 (N)

Egle Robineau-Desvoidy, 1830

Egle ciliata (Walker, 1849) (N)
Egle parva Robineau-Desvoidy, 1830 (N)

Emmesomyia Malloch, 1917

Emmesomyia grisea (Robineau-Desvoidy, 1830) (N)
Emmesomyia socia (Fallén, 1825) (N, S)

Enneastigma Stein, 1916

Enneastigma compressum (Stein, 1916) (N)
Enneastigma triseriatum (Stein, 1900) (N)

Eustalomyia Kowarz, 1873

Eustalomyia festiva (Zetterstedt, 1845) (N, Si)
Eustalomyia hilaris (Fallén, 1823) (N)
Eustalomyia histrio (Zetterstedt, 1838) (N, S)
Eustalomyia vittipes (Zetterstedt, 1845) (N)

Eutrichota Kowarz, 1893

Eutrichota alpigena (Pokorny, 1893) (N)
Eutrichota stenometopa (Hennig, 1973) (N)
Eutrichota triticiperda (Stein, 1900) (N)

Fucellia Robineau-Desvoidy, 1841

Fucellia tergina (Zetterstedt, 1845) (N, S, Si, Sa)

Heterostylodes Hennig, 1967

Heterostylodes obscura (Macquart, 1835) (N)

Heterostylodes pratensis (Meigen, 1826) (S)

Hydrophoria Robineau-Desvoidy, 1830

Hydrophoria albiceps (Meigen, 1826) (N)

Hydrophoria lancifer (Harris, 1780) (N)

Hydrophoria linogrisea (Meigen, 1826) (N)

Hydrophoria ruralis (Meigen, 1826) (N, S)

Hydrophoria silvicola (Robineau-Desvoidy, 1830) (N)

Hylemya Robineau-Desvoidy, 1830

Hylemya nigrimana (Meigen, 1826) (N, S)

Hylemya vagans (Panzer, 1798) (N, S, Si)

Hylemya variata (Fallén, 1823) (N, S)

Lasiomma Stein, 1916

Lasiomma anthomyinum (Rondani, 1866) (N, S)

Lasiomma seminitidum (Zetterstedt, 1845) (N, S)

Leucophora Robineau-Desvoidy, 1830

Leucophora brevifrons (Stein, 1916) (N)

Leucophora cinerea Robineau-Desvoidy, 1830 (N)

Leucophora dorsalis (Stein, 1916) (N)

Leucophora grisella Hennig, 1967 (N)

Leucophora personata (Collin, 1922) (S, Sa)

Leucophora sociata (Meigen, 1826) (N)

Mycophaga Rondani, 1856

Mycophaga testacea (Gimmerthal, 1834) (N, S)

Paradelia Ringdahl, 1933

Paradelia intersecta (Meigen, 1826) (N)

Paregle Schnabl, 1911

Paregle audacula (Harris, 1780) (N, S, Si)

Paregle coerulescens (Strobl, 1893) (N, S)

Paregle pilipes (Stein, 1916) (N)

Pegomya Robineau-Desvoidy, 1830

Pegomya bicolor (Wiedemann, 1817) (N, S, Sa)
Pegomya caesia (Stein, 1906) (N)
Pegomya conformis (Fallén, 1825) (N)
Pegomya cunicularia (Rondani, 1866) (S)
Pegomya exilis (Meigen, 1826) (N)
Pegomya flavifrons (Walker, 1849) (N)
Pegomya fodiens (Hendel, 1925) (N)
Pegomya geniculata (Bouché, 1834) (N)
Pegomya haemorrhoum (Zetterstedt, 1838) (N)
Pegomya hyoscyami (Panzer, 1809) (N, S, Si)
Pegomya maculata (Stein, 1906) (N)
Pegomya meridiana (Villeneuve, 1923) (N)
Pegomya pulchripes (Loew, 1857) (N)
Pegomya seitenstettensis (Strobl, 1880) (N)
Pegomya silacea (Meigen, 1830) (S)
Pegomya solennis (Meigen, 1826) (N, S)
Pegomya steini (Hendel, 1925) (Sa)
Pegomya terminalis (Rondani, 1866) (N, S)
Pegomya transversa (Fallén, 1825) (S)
Pegomya ulmaria (Rondani, 1866) (N, S)
Pegomya valgenovensis Hennig, 1973 (N)
Pegomya varipes (Pokorny, 1899) (N)
Pegomya vittigera (Zetterstedt, 1838) (N)
Pegomya winthemi (Meigen, 1826) (N, S)
Pegomya zonata (Zetterstedt, 1838) (N)

Pegoplata Schnabl & Dziedzicki, 1911

Pegoplata aestiva (Meigen, 1826) (N, S)
Pegoplata infirma (Meigen, 1826) (N, S)
Pegoplata juvenilis (Stein, 1898)
Pegoplata juvenilis nitidicauda Schnabl, 1911 (N)

Phorbia Robineau-Desvoidy, 1830

Phorbia curvicauda (Zetterstedt, 1845) (N) (*)
Phorbia fumigata (Meigen, 1826) (S)
Phorbia italica Ackland & Michelsen, 1987 (N)
Phorbia juncorum Ringdahl, 1959 (N)

Subhylemyia Ringdahl, 1933

Subhylemyia longula (Fallén, 1824) (N, S)

Zaphne Robineau-Desvoidy, 1830

Zaphne frontata (Zetterstedt, 1838) (N)

Zaphne septimalis (Pandellé, 1899) (N, S)

Note

Phorbia curvicauda: Il reperto richiede conferma.

Fanniidae

Euryomma Stein, 1899

Euryomma peregrinum (Meigen, 1826) (N, Si)

Piezura Rondani, 1866

Piezura boletorum (Rondani, 1866) (N)

Piezura graminicola (Zetterstedt, 1846) (N, S, Sa)

Fannia Robineau-Desvoidy, 1830

Fannia armata (Meigen, 1826) (N, S)

Fannia canicularis (Linnaeus, 1761) (N, S, Si)

Fannia carbonaria (Meigen, 1826) (N?, Sa?)

Fannia carbonella (Stein, 1895) (N)

Fannia coracina (Loew, 1873) (N, S)

Fannia corvina (Verrall, 1892) (N)

Fannia difficilis (Stein, 1895) (S)

Fannia fuscula (Fallén, 1825) (N, S)

Fannia glaucescens (Zetterstedt, 1845) (N, S)

Fannia incisurata (Zetterstedt, 1838) (N, S, Si)

Fannia lepida (Wiedemann, 1817) (N, S, Si)

Fannia leucosticta (Meigen, 1838) (N, Si)

Fannia lineata (Stein, 1895)

Fannia lustrator (Harris, 1780) (N, S, Si)

Fannia manicata (Meigen, 1826) (N)

Fannia melania (Dufour, 1839) (N)

Fannia mollissima (Haliday in Westwood, 1840) (N?)

Fannia monilis (Haliday, 1838) (N)

Fannia ornata (Meigen, 1826) (Si)

Fannia pallitibia (Rondani, 1866) (N, S)

Fannia parva (Stein, 1895) (N)

Fannia polychaeta (Stein, 1895) (N)

Fannia postica (Stein, 1895) (N)

Fannia posticata (Meigen, 1826) (N)

Fannia ringdahlana Collin, 1939 (N)

Fannia rondanii (Strobl, 1893) (N)

Fannia scalaris (Fabricius, 1794) (N, S, Si)

Fannia serena (Fallén, 1825) (N)

Fannia similis (Stein, 1895) (S)
Fannia sociella (Zetterstedt, 1845) (N, S)
Fannia umbrosa (Stein, 1895)
Fannia vesparia (Meade, 1891) (S)

Muscidae

Achanthiptera Rondani, 1856

Achanthiptera rohrelliformis (Robineau-Desvoidy, 1830) (N, S)

Muscina Robineau-Desvoidy, 1830

Muscina levida (Harris, 1780) (N, S)
Muscina pascuorum (Meigen, 1826) (N)
Muscina prolapsa (Harris, 1780) (N, S, Si?, Sa?)
Muscina stabulans (Fallén, 1817) (N, S, Si)

Azelia Robineau-Desvoidy, 1830

Azelia aterrima (Meigen, 1826) (N)
Azelia cilipes (Haliday, 1838) (N)
Azelia nebulosa Robineau-Desvoidy, 1830 (N, S)
Azelia parva Rondani, 1866 (N)
Azelia triquetra (Wiedemann, 1817) (N)

Thricops Rondani, 1856

Thricops aculeipes (Zetterstedt, 1838) (N)
Thricops beckeri (Pokorny, 1893) (N)
Thricops culminum (Pokorny, 1889) (N)
Thricops cunctans (Meigen, 1826) (N)
Thricops diaphanus (Wiedemann, 1817) (N, S)
Thricops furcatus (Stein, 1916) (N)
Thricops genarum (Zetterstedt, 1838) (N)
Thricops innocuus (Zetterstedt, 1838) (N)
Thricops lividiventris (Zetterstedt, 1845) (N)
Thricops longipes (Zetterstedt, 1845) (N) (*)
Thricops nigrifrons (Robineau-Desvoidy, 1830) (N, Si)
Thricops nigritellus (Zetterstedt, 1838) (N)
Thricops rostratus (Meade, 1882) (N, S)
Thricops semicinereus (Wiedemann, 1817) (N, S)
Thricops separ (Zetterstedt, 1845) (N)
Thricops simplex (Wiedemann, 1817) (N)
Thricops sudeticus (Schnabl, 1888) (N)
Thricops villosus (Hendel, 1903) (N)

Drymeia Meigen, 1826

Drymeia alpicola (Rondani, 1871) (N)
Drymeia brumalis (Rondani, 1866) (N)
Drymeia cinerea (Meigen, 1826) (N)
Drymeia fasciculata (Stein, 1916) (N)
Drymeia glacialis (Rondani, 1866) (N) (E) (*)
Drymeia hamata (Fallén, 1823) (N)
Drymeia vicana (Harris, 1780) (N)

Hydrotaea Robineau-Desvoidy, 1830

Hydrotaea aenescens (Wiedemann, 1830) (N, S, Sa)
Hydrotaea albipuncta (Zetterstedt, 1845) (N)
Hydrotaea armipes (Fallén, 1825) (N)
Hydrotaea borussica Stein, 1899 (N, S)
Hydrotaea capensis (Wiedemann, 1818) (N, S, Si)
Hydrotaea cinerea Robineau-Desvoidy, 1830 (N, S)
Hydrotaea cyrtoneurina (Zetterstedt, 1845) (N, S)
Hydrotaea dentipes (Fabricius, 1805) (N, S, Si)
Hydrotaea diabolus (Harris, 1780) (*)
Hydrotaea floccosa Macquart, 1835 (N, S, Si)
Hydrotaea glabricula (Fallén, 1825) (N, Si)
Hydrotaea hirticeps (Fallén, 1824) (N)
Hydrotaea ignava (Harris, 1780) (N, S, Si)
Hydrotaea irritans (Fallén, 1823) (N, S, Sa)
Hydrotaea meridionalis Portschiński, 1882 (N, S, Si)
Hydrotaea meteorica (Linnaeus, 1758) (N, S)
Hydrotaea militaris (Meigen, 1826) (N, S)
Hydrotaea pandellei Stein, 1899 (N)
Hydrotaea pellucens Portschiński, 1879 (N, S)
Hydrotaea penicillata (Rondani, 1866) (N, S)
Hydrotaea similis Meade, 1887 (S)
Hydrotaea tuberculata Rondani, 1866 (N, S)
Hydrotaea velutina Robineau-Desvoidy, 1830 (N, Si)

Potamia Robineau-Desvoidy, 1830

Potamia littoralis Robineau-Desvoidy, 1830 (*)

Mesembrina Meigen, 1826

Mesembrina meridiana (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)
Mesembrina mystacea (Linnaeus, 1758) (N)

Polietes Rondani, 1866

Polietes domitor (Harris, 1780) (S)

Polietes lardaria (Fabricius, 1781) (N)
Polietes meridionalis Peris & Llorente, 1963 (S, Si)

Musca Linnaeus, 1758

Musca autumnalis De Geer, 1776 (N, S, Si, Sa)
Musca domestica Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)
Musca larvipara Portschinsky, 1910 (N, S, Sa)
Musca lucidula (Loew, 1856) (Si)
Musca osiris Wiedemann, 1830 (N, S, Si, Sa)
Musca sorbens Wiedemann, 1830 (Si, Sa?)
Musca tempestiva (Fallén, 1817) (N, S, Si, Sa)

Morellia Robineau-Desvoidy, 1830

Morellia hortorum (Fallén, 1817) (N, S)
Morellia podagrica (Loew, 1857) (N, S)
Morellia simplex (Loew, 1857) (N, S, Si)

Neomyia Walker, 1859

Neomyia cornicina (Fabricius, 1781) (N, S, Si, Sa)
Neomyia viridescens (Robineau-Desvoidy, 1830) (N)

Pyrellia Robineau-Desvoidy, 1830

Pyrellia rapax (Harris, 1780) (N, S)
Pyrellia vivida Robineau-Desvoidy, 1830 (N, S, Si, Sa)

Eudasyphora Townsend, 1911

Eudasyphora cyanella (Meigen, 1826) (N, S, Si, Sa)
Eudasyphora cyanicolor (Zetterstedt, 1845) (N)

Dasyphora Robineau-Desvoidy, 1830

Dasyphora albofasciata (Macquart in Webb & Berthelot, 1839) (N, S, Si)
Dasyphora penicillata (Egger, 1865) (N)
Dasyphora pratorum (Meigen, 1826) (N, S, Si, Sa)

Stomoxys Geoffroy, 1762

Stomoxys calcitrans (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Haematobia Le Peletier & Serville in Latreille, 1828

Haematobia irritans (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
Haematobia titillans (Bezzi, 1907) (N, S, Sa)

Haematobosca Bezzi, 1907

Haematobosca atripalpis (Bezzi, 1895) (N, S, Si)

Haematobosca stimulans (Meigen, 1824) (N, S, Si, Sa)

Eginia Robineau-Desvoidy, 1830

Eginia ocypterata (Meigen, 1826) (N?)

Atherigona Rondani, 1856

Atherigona pulla (Wiedemann, 1830) (Si)

Atherigona soccata Rondani, 1871 (N, S, Si)

Atherigona varia (Meigen, 1826) (N, S, Si)

Phaonia Robineau-Desvoidy, 1830

Phaonia alpicola (Zetterstedt, 1845) (N)

Phaonia alpina (Pokorny, 1889) (N) (E) (*)

Phaonia angelicae (Scopoli, 1763) (N)

Phaonia atriceps (Loew, 1858) (N)

Phaonia bitincta (Rondani, 1866) (N)

Phaonia boleticola (Rondani, 1866) (N)

Phaonia chalinata (Pandellé, 1899) (N)

Phaonia cincta (Zetterstedt, 1846) (N)

Phaonia consobrina (Zetterstedt, 1838) (N)

Phaonia errans (Meigen, 1826) (N)

Phaonia fuscata (Fallén, 1825) (N, S)

Phaonia gobertii (Mik, 1881) (N)

Phaonia hybrida (Schnabl, 1888) (N)

Phaonia incana (Wiedemann, 1817) (N)

Phaonia insularis (Rondani, 1871) (Sa) (E) (*)

Phaonia jugorum (Strobl, 1910) (N)

Phaonia latifrontalis Hennig, 1963 (N)

Phaonia lugubris (Meigen, 1826) (N)

Phaonia mediterranea Hennig, 1963 (S)

Phaonia meigeni Pont, 1986 (N)

Phaonia mystica (Meigen, 1826) (N)

Phaonia pallida (Fabricius, 1787) (N, S, Si)

Phaonia palpata (Stein, 1897) (S)

Phaonia pratensis (Robineau-Desvoidy, 1830) (N, S)

Phaonia profugax (Pandellé, 1899) (N)

Phaonia rufipalpis (Macquart, 1835) (N)

Phaonia rufiventris (Scopoli, 1763) (N, S)

Phaonia serva (Meigen, 1826) (N, S)

Phaonia subventa (Harris, 1780) (N, S, Si)

Phaonia tenuiseta (Pokorny, 1893) (N)

Phaonia trimaculata (Bouché, 1834) (S, Si)
Phaonia tuguriorum (Scopoli, 1763) (N, S, Si)
Phaonia valida (Harris, 1780) (N, S, Si)
Phaonia villana Robineau-Desvoidy, 1830 (*)
Phaonia vivida (Rondani, 1871) (N)
Phaonia zugmayeriae (Schnabl, 1888) (N)

Lophosceles Ringdahl, 1922

Lophosceles cinereiventris (Zetterstedt, 1845) (N)
Lophosceles frenatus (Holmgren, 1872) (N)

Helina Robineau-Desvoidy, 1830

Helina abdominalis (Zetterstedt, 1846) (N, S)
Helina albicornis (Rondani, 1871) (N) (E) (*)
Helina allotalla (Meigen, 1830) (N)
Helina annosa (Zetterstedt, 1838) (N)
Helina arctata Collin, 1953 (N)
Helina atricolor (Fallén, 1825) (N)
Helina calceata (Rondani, 1866) (N)
Helina celsa (Harris, 1780) (N, S)
Helina ciliatocosta (Zetterstedt, 1845) (Sa?) (*)
Helina cinerella (Wulp, 1867) (N)
Helina clara (Meigen, 1826) (N, S, Si)
Helina confinis (Fallén, 1825) (N, S)
Helina consimilis (Fallén, 1825) (N)
Helina cothurnata (Rondani, 1866) (N, S)
Helina czernyi Lyneborg, 1970 (Si)
Helina deleta (Stein, 1914) (N)
Helina depuncta (Fallén, 1825) (N, S)
Helina evecta (Harris, 1780) (N, S, Si)
Helina fratercula (Zetterstedt, 1845) (N, Si)
Helina fulvisquama (Zetterstedt, 1845) (N)
Helina impuncta (Fallén, 1825) (N, S)
Helina lasiophthalma (Macquart, 1835) (N, S)
Helina latitarsis Ringdahl, 1924 (N)
Helina laxifrons (Zetterstedt, 1860) (N)
Helina longicornis (Zetterstedt, 1838) (N)
Helina maculipennis (Zetterstedt, 1845) (N)
Helina moedlingensis (Schnabl in Schnabl & Dziedzicki, 1911) (N, S)
Helina montana (Rondani, 1866) (N)
Helina obscurata (Meigen, 1826) (N)
Helina obscuratoides (Schnabl, 1887) (N)
Helina obtusipennis (Fallén, 1823) (N)
Helina parcepilosa (Stein, 1907) (N)
Helina pertusa (Meigen, 1826) (N, S)
Helina protuberans (Zetterstedt, 1845) (N)

Helina pubescens (Stein, 1893) (S)
Helina pubiseta (Zettersedt, 1845) (N)
Helina quadrinotata (Meigen, 1826) (N)
Helina quadrum (Fabricius, 1805) (N, Si)
Helina reversio (Harris, 1780) (N, S, Si, Sa)
Helina setigera (Pokorny, 1887) (N)
Helina sexmaculata (Preyssler, 1791) (N, S, Si)
Helina subvittata (Séguy, 1923) (*)
Helina syracusana Hennig, 1957 (Si)
Helina tetrastigma (Meigen, 1826) (N, S)
Helina trivittata (Zetterstedt, 1860) (N)
Helina ustipennis (Rondani, 1866) (N) (E) (*)
Helina vicina (Czerny, 1900)
 Helina vicina lutea Hennig, 1958 (S) (E)
 Helina vicina vicina (Czerny, 1900) (N)

Brontaea Kowarz, 1873

Brontaea eremophila (Brauer & Bergenstamm, 1894) (S)
Brontaea genurufa (Pandellé, 1899) (S)
Brontaea polystigma (Meigen, 1826) (S)
Brontaea tonitruai (Wiedemann, 1824) (Si)

Mydaea Robineau-Desvoidy, 1830

Mydaea affinis Meade, 1891 (N)
Mydaea ancilla (Meigen, 1826) (N, Si)
Mydaea corni (Scopoli, 1763) (N, S)
Mydaea electa (Zetterstedt, 1860) (N)
Mydaea humeralis Robineau-Desvoidy, 1830 (N, S)
Mydaea lateritia (Rondani, 1866) (N, S)
Mydaea rufinervis (Pokorny, 1889) (N)
Mydaea setifemur Ringdahl, 1924 (N)
Mydaea urbana (Meigen, 1826) (N, S)

Myospila Rondani, 1856

Myospila alpina Hendel, 1901 (N)
Myospila bimaculata (Macquart, 1834) (N)
Myospila mediatubunda (Fabricius, 1781) (N, S, Si, Sa)

Hebecnema Schnabl, 1889

Hebecnema fumosa (Meigen, 1826) (N, S, Si)
Hebecnema nigra (Robineau-Desvoidy, 1830) (N)
Hebecnema nigricolor (Fallén, 1825) (N, S)
Hebecnema umbratica (Meigen, 1826) (N, S, Si)
Hebecnema vespertina (Fallén, 1823) (N, S)

Graphomya Robineau-Desvoidy, 1830

Graphomya maculata (Scopoli, 1763) (N, S, Si, Sa)
Graphomya minor Robineau-Desvoidy, 1830 (*)

Spilogona Schnabl, 1911

Spilogona alpica (Zetterstedt, 1845) (N)
Spilogona atricans (Pandellé, 1899) (N)
Spilogona brunneisquama (Zetterstedt, 1845) (N)
Spilogona caliginosa (Stein, 1916) (N)
Spilogona carbonella (Zetterstedt, 1845) (N)
Spilogona denigrata (Meigen, 1826) (N, S)
Spilogona dispar (Fallén, 1823) (N, S)
Spilogona falleni Pont, 1984 (N, S)
Spilogona meadei (Schnabl in Becker, Dziedzicki, Schnabl & Villeneuve, 1915) (N)
Spilogona solitaria (Collin, 1921) (N)
Spilogona spininervis (Villeneuve, 1922) (*)
Spilogona surda (Zetterstedt, 1845) (N)

Neolimnophora Schnabl, 1902

Neolimnophora maritima (Röder, 1887) (N)
Neolimnophora virgo (Villeneuve, 1906) (N)

Limnophora Robineau-Desvoidy, 1830

Limnophora exuta (Kowarz, 1893) (S, Si)
Limnophora maculosa (Meigen, 1826) (N, Si)
Limnophora nigripes (Robineau-Desvoidy, 1830) (S)
Limnophora obsignata (Rondani, 1866) (N, S, Si, Sa)
Limnophora olympiae Lyneborg, 1965 (N, S)
Limnophora riparia (Fallén, 1824) (N)
Limnophora rufimana (Strobl, 1893) (N)
Limnophora tigrina (Am Stein, 1860) (N, S, Si)
Limnophora triangula (Fallén, 1825) (N, S, Si)

Lispe Latreille, 1796

Lispe apicalis Mik, 1869 (N, S)
Lispe assimilis Wiedemann, 1824 (S, Sa)
Lispe caesia Meigen, 1826 (N, S, Si, Sa)
Lispe candicans Kowarz, 1892 (N, S, Sa)
Lispe consanguinea Loew, 1858 (N, S, Si)
Lispe flavicincta Loew, 1847 (N, S, Sa)
Lispe loewi Ringdahl, 1922 (N, S, Si, Sa)
Lispe melaleuca Loew, 1847 (N, S, Si)

Lispe nana Macquart, 1835 (N, S, Si, Sa)
Lispe pygmaea Fallén, 1825 (N, S, Si, Sa)
Lispe quaerens Villeneuve, 1936 (N, S)
Lispe superciliosa Loew, 1861 (N)
Lispe tentaculata (De Geer, 1776) (N, S, Si, Sa)

Limnospila Schnabl, 1902

Limnospila albifrons (Zetterstedt, 1849) (N)

Lispocephala Pokorny, 1893

Lispocephala alma (Meigen, 1826) (N)
Lispocephala brachialis (Rondani, 1877) (N, S)
Lispocephala erythrocerata (Robineau-Desvoidy, 1830) (N)
Lispocephala mikii (Strobl, 1893) (N)
Lispocephala spuria (Zetterstedt, 1838) (N, S)
Lispocephala unguolata (Rondani, 1866) (N)
Lispocephala verna (Fabricius, 1794) (N, S)

Orchisia Rondani, 1877

Orchisia costata (Meigen, 1826) (N, S, Si)

Spanochaeta Stein, 1919

Spanochaeta dorsalis (von Roser, 1840) (N, S)

Schoenomyza Haliday, 1833

Schoenomyza litorella (Fallén, 1823) (N, S)

Macrorchis Rondani, 1877

Macrorchis meditata (Fallén, 1825) (N)

Dexiopsis Pokorny, 1893

Dexiopsis ruficornis (Macquart, 1835) (N)

Coenosia Meigen, 1826

Coenosia agromyzina (Fallén, 1825) (N, S)
Coenosia ambulans (Meigen, 1826) (N)
Coenosia antennata (Zetterstedt, 1849) (N)
Coenosia atra Meigen, 1830 (N, S, Si)
Coenosia barbipes Rondani, 1866 (N, S) (E)
Coenosia bartaki Gregor, 1991 (N) (E)

Coenosia bilineella (Zetterstedt, 1838) (N)
Coenosia campestris (Robineau-Desvoidy, 1830) (N)
Coenosia dubiosa Hennig, 1961 (N)
Coenosia femoralis (Robineau-Desvoidy, 1830) (N)
Coenosia flavimana (Zetterstedt, 1845) (N)
Coenosia genualis Rondani, 1866 (N, S)
Coenosia humilis Meigen, 1826 (N, S, Si)
Coenosia infantula Rondani, 1866 (N)
Coenosia intermedia (Fallén, 1825) (N)
Coenosia means Meigen, 1826 (N, S)
Coenosia mollicula (Fallén, 1825) (N, S, Si)
Coenosia nigridigita Rondani, 1866 (N)
Coenosia obscuricula (Rondani, 1871) (N)
Coenosia octosignata Rondani, 1866 (N, Si)
Coenosia patelligera Rondani, 1866 (N, S, Si)
Coenosia pedella (Fallén, 1825) (N)
Coenosia praetexta Pandellé, 1899 (Si)
Coenosia pumila (Fallén, 1825) (N)
Coenosia rufipalpis Meigen, 1826 (N?, S?)
Coenosia sexpustulata Rondani, 1866 (N)
Coenosia stigmatica Wood, 1913 (S?)
Coenosia strigipes Stein, 1916 (N)
Coenosia testacea (Robineau-Desvoidy, 1830) (N, S, Si)
Coenosia tigrina (Fabricius, 1775) (N, S, Si)
Coenosia verralli Collin, 1953 (N)
Coenosia villipes Rondani, 1866 (N, S)

Note

Thricops longipes: *Thricops longipes* (Zetterstedt, 1845), syn: *Spilogaster tirolensis* Rondani, 1877. Bezzi (1894: 319) propose la sinonimia di *tirolensis* con *rupestris* Rondani, cioè *Thricops nigrifrons* (Robineau-Desvoidy, 1830), ma la descrizione che fa riferimento al corpo con pruinosità grigia, l'arista piumosa e la località suggeriscono che dovrebbe essere invece posto in sinonimia con *T. longipes*.

Drymeia glacialis: Specie di incerta validità.

Hydrotaea diabolus: Nota da località italiana non precisata.

Potamia littoralis: Nota da località italiana non precisata.

Phaonia alpina: Specie di incerta validità.

Phaonia insularis: Specie di incerta validità.

Phaonia villana: Nota da località italiana non precisata.

Helina albicornis: Specie di incerta validità.

Helina ciliatocosta: Nota da località italiana non precisata.

Helina subvittata: Nota da località italiana non precisata.

Helina ustipennis: Specie di incerta validità.

Graphomya minor: Nota da località italiana non precisata.

Spilogona spininervis: Nota da località italiana non precisata.

Hippoboscidae

Ornithoica Rondani, 1878

Ornithoica turdi Latreille, 1811 (N, S)

Ornithophila Rondani, 1879

Ornithophila gestroi (Rondani, 1878) (Si?, Sa)

Ornithophila metallica (Schiner, 1864) (N, S)

Ornithomya Latreille, 1802

Ornithomya avicularia (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Ornithomya biloba (Dufour, 1827) (S)

Ornithomya chloropus (Bergroth, 1901) (N, S)

Ornithomya fringillina (Curtis, 1836) (N, S, Si)

Craterina V. Olfers, 1816

Craterina melbae (Rondani, 1879) (N, S)

Craterina pallida (Olivier in Latreille, 1811) (N, S, Si, Sa)

Stenepteryx Leach, 1817

Stenepteryx hirundinis (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Icosta Speiser, 1905

Icosta ardeae (Macquart, 1835) (N, S, Si, Sa)

Pseudolynchia Bequaert, 1926

Pseudolynchia canarinensis (Macquart, 1840) (N, S, Si, Sa)

Pseudolynchia garzettae (Rondani, 1879) (N, S)

Hippobosca Linnaeus, 1758

Hippobosca equina Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)

Hippobosca longipennis Fabricius, 1805 (N, S, Si, Sa)

Liptotena Nitzsch, 1818

Liptotena cervi (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Melophagus Latreille, 1802

Melophagus ovinus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
Melophagus rupicaprinus Rondani, 1879 (N)

Streblidae

Brachytarsina Macquart, 1851

Brachytarsina flavipennis Macquart, 1851 (S, Sa)

Nycteribiidae

Nycteribia Latreille, 1796

Nycteribia kolenatii Theodor & Moscona, 1954 (N, S)
Nycteribia latreilli (Leach, 1817) (N, S, Si, Sa)
Nycteribia pedicularia Latreille, 1805 (N, S, Si, Sa)
Nycteribia schmidli Schiner, 1853 (N, S, Si, Sa)
Nycteribia vexata Westwood, 1835 (N, S, Si, Sa)

Phthiridium Hermann, 1804

Phthiridium biarticulatum Hermann, 1804 (S, Sa)

Basilia Miranda Ribeiro, 1903

Basilia italica Theodor, 1954 (S)

Penicillidia Kolenati, 1863

Penicillidia conspicua Speiser, 1901 (N, S, Si, Sa)
Penicillidia dufouri (Westwood, 1835) (N, S, Si, Sa)

Calliphoridae

Bellardia Robineau-Desvoidy, 1863

Bellardia bayeri (Jacentkovsky, 1937) (S)
Bellardia brevistylata (Villeneuve, 1926) (Si) (E)
Bellardia obsoleta (Meigen, 1824) (S?) (*)
Bellardia pandia (Walker, 1849) (N) (*)
Bellardia siciliensis (Villeneuve, 1926) (Si) (E)
Bellardia viarum (Robineau-Desvoidy, 1830) (N)
Bellardia vulgaris (Robineau-Desvoidy, 1830) (N)

Calliphora Robineau-Desvoidy, 1830

Calliphora bezzi Zumpt, 1956 (N) (E)
Calliphora stelviana (Brauer & Bergenstamm, 1891) (N)
Calliphora stylifera Pokorny, 1889 (N) (E)
Calliphora subalpina (Ringdahl, 1931) (N)
Calliphora vicina Robineau-Desvoidy, 1830 (N, S, Si, Sa) (*)
Calliphora vomitoria (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)

Cynomya Robineau-Desvoidy, 1830

Cynomya mortuorum (Linnaeus, 1761) (N, S)

Onesia Robineau-Desvoidy, 1830

Onesia austriaca Villeneuve, 1920 (N)
Onesia floralis Robineau-Desvoidy, 1830 (N, S, Si) (*)

Chrysomya Robineau-Desvoidy, 1830

Chrysomya albiceps (Wiedemann, 1819) (S, Si)

Phormia Robineau-Desvoidy, 1830

Phormia regina (Meigen, 1826) (N, S)

Protocalliphora Hough, 1899

Protocalliphora azurea (Fallén, 1817) (N, Si)
Protocalliphora chrysorrhoea Meigen, 1826 (N?) (*)
Protocalliphora falcozi Séguy, 1928 (N)

Protophormia Townsend, 1908

Protophormia terraenovae (Robineau-Desvoidy, 1830) (N, S) (*)

Eurychaeta Brauer & Bergenstamm, 1891

Eurychaeta muscaria (Meigen, 1826) (N, S)
Eurychaeta palpalis (Robineau-Desvoidy, 1830) (N)

Lucilia Robineau-Desvoidy, 1830

Lucilia ampullacea Villeneuve, 1922 (N, S)
Lucilia caesar (Linnaeus, 1758) (N, S, Si) (*)
Lucilia richardsi Collin, 1926 (N, S)
Lucilia sericata (Meigen, 1826) (N, S, Si)
Lucilia silvarum (Meigen, 1826) (N, S) (*)

Angioneura Brauer & Bergenstamm, 1893

Angioneura acerba (Meigen, 1838) (N)

Eggisops Rondani, 1862

Eggisops pecchiolii Rondani, 1862 (N, S)

Melanomya Rondani, 1856

Melanomya nana (Meigen, 1826) (N)

Melinda Robineau-Desvoidy, 1830

Melinda gentilis (Robineau-Desvoidy, 1830) (S)

Melinda viridicyanea (Robineau-Desvoidy, 1830) (N, S, Si) (*)

Morinia Robineau-Desvoidy, 1830

Morinia melanoptera (Fallén, 1817) (N)

Pollenia Robineau-Desvoidy, 1830

Pollenia amentaria (Scopoli, 1763) (N, S, Si)

Pollenia angustigena Wainwright, 1940 (N, S)

Pollenia atramentaria (Meigen, 1826) (N)

Pollenia bezziana Rognes, 1991 (N) (E)

Pollenia contempta Robineau-Desvoidy, 1863 (S)

Pollenia dasypoda Portschesky, 1881 (N)

Pollenia griseotomentosa (Jacentkovsky, 1944) (N, S)

Pollenia hungarica Rognes, 1987 (N)

Pollenia labialis Robineau-Desvoidy, 1863 (N)

Pollenia mediterranea Grunin, 1966 (N, S)

Pollenia paupera Rondani, 1862 (S, Si, Sa)

Pollenia pediculata Macquart, 1834 (N, S)

Pollenia ponti Rognes, 1991 (S)

Pollenia rudis (Fabricius, 1794) (N, Si)

Pollenia ruificrura Rondani, 1862 (N)

Pollenia vagabunda (Meigen, 1826) (N)

Pollenia venturii Zumpt, 1956 (S)

Pollenia viatica Robineau-Desvoidy, 1830 (N)

Cosmina Robineau-Desvoidy, 1830

Cosmina prasina (Brauer & Bergenstamm, 1889) (Si)

Rhyncomya Robineau-Desvoidy, 1830

Rhyncomya columbina (Meigen, 1824) (S, Si) (*)
Rhyncomya felina (Fabricius, 1794) (N, S, Si)
Rhyncomya impavida (Rossi, 1790) (S, Si, Sa)
Rhyncomya italica Bezzi, 1911 (Sa)

Stomorphina Rondani, 1861

Stomorphina lunata (Fabricius, 1805) (N, S, Si, Sa)

Note

Bellardia obsoleta: Come *Onesia obsoleta* fu segnalata di località nella provincia di Roma da Tuccimei (1911: 220). Queste identificazioni non sono attendibili. Fu segnalata dell'Italia senza ulteriori indicazioni di località da Schumann (1974).

Bellardia pandia: Il nome "*hircta*" usato da Zangheri (1950: 90, come "*Onesia hircta* Villen.") probabilmente deriva da una errata interpretazione di un cartellino manoscritto di Villeneuve con dicitura "*biseta*".

Calliphora vicina: Il nome *erythrocephala* Meigen, 1826 è stato soppresso dall'International Commission on Zoological Nomenclature.

Cynomya: In letteratura citato anche come *Cynomyia* (grafia successiva incorretta).

Onesia floralis: In letteratura citata anche come *sepulchralis* (grafia successiva incorretta).

Chrysomya: In letteratura citato anche come *Chrysomyia* Agassiz, 1847 (emendamento ingiustificato).

Protocalliphora chrysorrhoea: Segnalata da Corti (1897: 140), come *Pollenia sordida* Zetterstedt, ma l'identificazione non è attendibile.

Protophormia terraenovae: Il dato di "*Phormia caerulea* Rob. Dev." di Tuccimei (1911: 218) dalla provincia di Roma molto probabilmente si riferisce ad un esemplare non correttamente identificato della comune specie sinantropa e saprofaga *Protophormia terraenovae* e non al calliforide parassita di uccelli *Protocalliphora azurea* (Fallén), sebbene il nome di Robineau-Desvoidy *Phormia caerulea* generalmente sia considerato un sinonimo della specie di Fallén.

Lucilia caesar: In letteratura citata anche come *coesar* (grafia successiva incorretta).

Lucilia silvarum: In letteratura citata anche come *sylvarum* (grafia successiva incorretta).

Eggisops: In letteratura citato anche come *Engyops* o *Engyzops* (grafie successive incorrette).

Melinda viridicyanea: In letteratura citata anche come *caerulea* (grafia successiva incorretta).

Rhyncomya: In letteratura citata anche come *Rhynchomyia* (grafia successiva incorretta).

Rhyncomya columbina: Peris (1952b: 100) sostiene che l'esemplare riportato come *Rhyncomya impavida* da Rondani (1861: 70-71) appartiene a *R. columbina*.

Stomorphina: In letteratura citato anche come *Stomathorrhina* Bezzi, 1906 (emendamento ingiustificato), *Stomorphyna*, *Stomorrhina*, *Stomatorrhina* (grafie successive incorrette).

Sarcophagidae

Amobia Robinaeu-Desvoidy, 1830

Amobia oculata (Zetterstedt, 1844) (N)
Amobia pelopei (Rondani, 1859) (N, S)

Amobia signata (Meigen, 1824) (N, S, Si, Sa)

Apodacra Macquart, 1854

Apodacra diffusa Villeneuve, 1934 (S)

Apodacra dispar Villeneuve, 1916 (N)

Apodacra pulchra Egger, 1861 (S)

Apodacra seriemaculata Macquart, 1854 (N, S)

Craticulina Bezzi, 1906

Craticulina tabaniformis (Fabricius, 1805) (S, Si, Sa)

Hilarella Rondani, 1856

Hilarella hilarella (Zetterstedt, 1844) (N, S)

Hilarella stictica (Meigen, 1830) (N)

Macronychia Rondani, 1859

Macronychia agrestis (Fallén, 1810) (Sa)

Macronychia alpestris Rondani, 1865 (N)

Macronychia kanoi Kurahashi, 1972 (N)

Macronychia polyodon (Meigen, 1824) (N, S)

Macronychia striginervis (Zetterstedt, 1844) (N)

Metopia Meigen, 1803

Metopia argyrocephala (Meigen, 1824) (N, S, Si)

Metopia campestris (Fallén, 1810) (N, S)

Metopia grandii Venturi, 1953 (N, S)

Metopia italiana Pape, 1985 (N, S)

Metopia roserii Rondani, 1859 (S, Si)

Metopodia Brauer & Bergenstamm, 1889

Metopodia pilicornis (Pandellé, 1895) (Sa)

Miltogramma Meigen, 1803

Miltogramma aurifrons Dufour, 1850 (N, S)

Miltogramma brevipilum Villeneuve, 1911 (N, S)

Miltogramma contarinii Rondani, 1859 (N, S)

Miltogramma ibericum Villeneuve, 1912 (N)

Miltogramma germari Meigen, 1824 (N)

Miltogramma murinum Meigen, 1824 (N, S, Si, Sa)

Miltogramma occipitale Pandellé, 1895 (N)

Miltogramma oestraceum (Fallén, 1820) (N, S)

Miltogramma punctatum Meigen, 1824 (N, S, Si, Sa)
Miltogramma ruficorne Meigen, 1824 (N)
Miltogramma rutilans Meigen, 1824 (N, S, Sa)
Miltogramma taeniatum Meigen, 1824 (N, S)
Miltogramma testaceifrons (Roser, 1840) (N)
Miltogramma villeneuvei Verves, 1982 (N)

Oebalia Robineau-Desvoidy, 1863

Oebalia cylindrica (Fallén, 1810) (N, S)
Oebalia minuta (Fallén, 1810) (N)

Phrosinella Robineau-Desvoidy, 1863

Phrosinella nasuta (Wiedemann, 1824) (N, S)

Phylloteles Loew, 1844

Phylloteles pictipennis Loew, 1844 (N, S, Si)

Protomiltogramma Townsend, 1916

Protomiltogramma fasciata (Meigen, 1824) (N, S)

Pterella Robineau-Desvoidy, 1863

Pterella eleonora (Venturi, 1957) (S) (E)
Pterella grisea (Meigen, 1824) (N, S)
Pterella melanura (Meigen, 1824) (N, S, Si, Sa)
Pterella penicillaris (Rondani, 1865) (N, S)

Senotainia Macquart, 1846

Senotainia albifrons (Rondani, 1859) (N, S, Si)
Senotainia conica (Fallén, 1810) (N, S)
Senotainia tricuspis (Meigen, 1838) (N, S, Si)

Sphenometopa Townsend, 1908

Sphenometopa fastuosa (Meigen, 1824) (N, S)
Sphenometopa stelviana (Brauer & Bergenstamm, 1891) (N)

Taxigramma Perris, 1852

Taxigramma elegantulum (Zetterstedt, 1844) (*)
Taxigramma heteroneurum (Meigen, 1830) (S)
Taxigramma multipunctatum (Rondani, 1859) (N, S, Si)
Taxigramma pluriseta (Pandellé, 1895) (N)

Taxigramma pseudapertum Séguy, 1941 (S)

Agria Robineau-Desvoidy, 1830

Agria affinis (Fallén, 1817) (N, S, Sa)

Agria mamillata (Pandellé, 1896) (N)

Angiometopa Brauer & Bergenstamm, 1889

Angiometopa falleni Pape, 1986 (N, S, Si)

Brachicoma Rondani, 1856

Brachicoma devia (Fallén, 1820) (N, S)

Nyctia Robineau-Desvoidy, 1830

Nyctia halterata (Panzer, 1798) (N, S, Si)

Paramacronychia Brauer & Bergenstamm, 1889

Paramacronychia flavipalpis (Girschner, 1881) (N, S)

Sarcophila Rondani, 1856

Sarcophila latifrons (Fallén, 1817) (N, S, Si)

Sarcophila meridionalis Verves, 1982 (*)

Wohlfahrtia Brauer & Bergenstamm, 1889

Wohlfahrtia magnifica (Schiner, 1862) (S)

Wohlfahrtia vigil (Walker, 1849) (S)

Blaesoxipha (Acridiophaga) Townsend, 1917

Blaesoxipha (Acridiophaga) fossoria (Pandellé, 1896) (N)

Blaesoxipha (Blaesoxipha) Loew, 1861

Blaesoxipha (Blaesoxipha) agrestis (Robineau-Desvoidy, 1863) (N, S, Sa)

Blaesoxipha (Blaesoxipha) cochlearis (Pandellé, 1896) (N)

Blaesoxipha (Blaesoxipha) laticornis (Meigen, 1826) (N)

Blaesoxipha (Blaesoxipha) litoralis (Villeneuve, 1911) (*)

Blaesoxipha (Blaesoxipha) occatrix (Pandellé, 1896) (*)

Blaesoxipha (Blaesoxipha) pandellei (Villeneuve, 1911) (Si)

Blaesoxipha (Blaesoxipha) plumicornis (Zetterstedt, 1859) (S)

Blaesoxipha (Blaesoxipha) pygmaea (Zetterstedt, 1844) (N)

Blaesoxipha (Blaesoxipha) redempta (Pandellé, 1896) (N)

Blaesoxipha (Blaesoxipha) rufipes (Macquart, 1839) (N, S)
Blaesoxipha (Blaesoxipha) unguolata (Pandellé, 1896) (N)

Blaesoxipha (Servaisia) Robineau-Desvoidy, 1863

Blaesoxipha (Servaisia) erythrura (Meigen, 1826) (N, S)
Blaesoxipha (Servaisia) rossica Villeneuve, 1912 (N)

Blaesoxipha (Tephromyia) Robineau-Desvoidy, 1830

Blaesoxipha (Tephromyia) grisea (Meigen, 1826) (S)

Ravinia Robineau-Desvoidy, 1863

Ravinia pernix (Harris, 1780) (N, S, Si, Sa)

Sarcophaga (Bellieriomima) Rohdendorf, 1937

Sarcophaga (Bellieriomima) subulata Pandellé, 1896 (N, S)

Sarcophaga (Bercaea) Robineau-Desvoidy, 1863

Sarcophaga (Bercaea) cruentata Meigen, 1826 (N, S, Si, Sa)

Sarcophaga (Discachaeta) Enderlein, 1928

Sarcophaga (Discachaeta) arcipes Pandellé, 1896 (N)
Sarcophaga (Discachaeta) cucullans Pandellé, 1896 (N, S)
Sarcophaga (Discachaeta) cultellata Pandellé, 1896 (N, S)
Sarcophaga (Discachaeta) pumila Meigen, 1826

Sarcophaga (Helicophagella) Enderlein, 1928

Sarcophaga (Helicophagella) agnata Rondani, 1860 (N, S, Si)
Sarcophaga (Helicophagella) crassimargo Pandellé, 1896 (S)
Sarcophaga (Helicophagella) hirticrus Pandellé, 1896 (N, S)
Sarcophaga (Helicophagella) maculata Meigen, 1835 (S)
Sarcophaga (Helicophagella) melanura Meigen, 1826 (N, S, Si, Sa)
Sarcophaga (Helicophagella) noverca Rondani, 1860 (N, S)
Sarcophaga (Helicophagella) novercoides Boettcher, 1913 (N, S, Si, Sa)
Sarcophaga (Helicophagella) okaliana (Lehrer, 1975) (N)
Sarcophaga (Helicophagella) rosellei Boettcher, 1912 (S, Si)

Sarcophaga (Heteronychia) Brauer & Bergenstamm, 1889

Sarcophaga (Heteronychia) amita Rondani, 1860 (N, S)
Sarcophaga (Heteronychia) ancilla Rondani, 1865 (N, S)
Sarcophaga (Heteronychia) balanina Pandellé, 1896 (N, S)

Sarcophaga (Heteronychia) benaci Boettcher, 1913 (N)
Sarcophaga (Heteronychia) bezziana Boettcher, 1913 (N, S)
Sarcophaga (Heteronychia) boettcheriana (Rohdendorf, 1937) (S)
Sarcophaga (Heteronychia) consanguinea Rondani, 1860 (N, S, Si)
Sarcophaga (Heteronychia) depressifrons Zetterstedt, 1845 (N)
Sarcophaga (Heteronychia) dissimilis Meigen, 1826 (S)
Sarcophaga (Heteronychia) ferox Villeneuve, 1908 (S, Si)
Sarcophaga (Heteronychia) fertoni Villeneuve, 1911 (S, Si)
Sarcophaga (Heteronychia) filia Rondani, 1860 (N, S)
Sarcophaga (Heteronychia) haemorrhoea Meigen, 1826 (N, S, Si)
Sarcophaga (Heteronychia) haemorrhoides Boettcher, 1913 (N, S)
Sarcophaga (Heteronychia) minima Rondani, 1826 (N, S, Si)
Sarcophaga (Heteronychia) monspellencia Boettcher, 1913 (S)
Sarcophaga (Heteronychia) pandellei (Rohdendorf, 1937) (N, S, Si)
Sarcophaga (Heteronychia) penicillata Villeneuve, 1907 (N, S, Si)
Sarcophaga (Heteronychia) porrecta Boettcher, 1913 (N)
Sarcophaga (Heteronychia) proxima Rondani, 1860 (N, S)
Sarcophaga (Heteronychia) rondaniana (Rohdendorf, 1937) (N)
Sarcophaga (Heteronychia) schineri Bezzi, 1891 (N)
Sarcophaga (Heteronychia) schnabli Villeneuve, 1911 (S, Si)
Sarcophaga (Heteronychia) setinervis Rondani, 1860 (N, S)
Sarcophaga (Heteronychia) siciliana (Enderlein, 1928) (Si) (E)
Sarcophaga (Heteronychia) siciliana (Rohdendorf, 1937 nec Enderlein, 1928) (Si) (E) (*)
Sarcophaga (Heteronychia) siciliensis Boettcher, 1913 (Si)
Sarcophaga (Heteronychia) strenua (Robineau-Desvoidy, 1863) (*)
Sarcophaga (Heteronychia) tenuiforceps Boettcher, 1913 (N)
Sarcophaga (Heteronychia) uncicurva Pandellé, 1896 (N, S, Si)
Sarcophaga (Heteronychia) vagans Meigen, 1826 (N, S)
Sarcophaga (Heteronychia) vicina Macquart, 1835 (N, S)

***Sarcophaga (Krameromyia)* Verves, 1982**

Sarcophaga (Krameromyia) anaces Walker, 1849 (N, S)

***Sarcophaga (Liopygia)* Enderlein, 1928**

Sarcophaga (Liopygia) argyrostoma (Robineau-Desvoidy, 1830) (N, S, Si)
Sarcophaga (Liopygia) crassipalpis Macquart, 1839 (N, S, Si, Sa)

***Sarcophaga (Liosarcophaga)* Enderlein, 1928**

Sarcophaga (Liosarcophaga) dux Thomson, 1869 (N, S, Si, Sa)
Sarcophaga (Liosarcophaga) marshalli Parker, 1923 (S)
Sarcophaga (Liosarcophaga) portschinskyi (Rohdendorf, 1937) (Sa)
Sarcophaga (Liosarcophaga) teretirostris Pandellé, 1896 (N, S, Si, Sa)
Sarcophaga (Liosarcophaga) tibialis Macquart, 1851 (N, S, Si, Sa)
Sarcophaga (Liosarcophaga) tuberosa Pandellé, 1896 (S, Sa)

***Sarcophaga (Mehria)* Enderlein, 1928**

Sarcophaga (Mehria) sexpunctata (Fabricius, 1805) (N, S)

***Sarcophaga (Mimarhopocnemis)* Rohdendorf, 1937**

Sarcophaga (Mimarhopocnemis) granulata Kramer, 1908 (N)

***Sarcophaga (Pandelleana)* Rohdendorf, 1937**

Sarcophaga (Pandelleana) protuberans Pandellé, 1896 (N, S, Si)

***Sarcophaga (Pandelleisca)* Rohdendorf, 1937**

Sarcophaga (Pandelleisca) similis Meade, 1876 (N, S)

***Sarcophaga (Parasarcophaga)* Johnston & Tiegs, 1921**

Sarcophaga (Parasarcophaga) albiceps Meigen, 1826 (N, S, Si)

***Sarcophaga (Pierretia)* Robineau-Desvoidy, 1863**

Sarcophaga (Pierretia) discifera Pandellé, 1896 (S)

Sarcophaga (Pierretia) nigriventris Meigen, 1826 (N, S, Si, Sa)

Sarcophaga (Pierretia) socrus Rondani, 1860 (N, S, Si)

Sarcophaga (Pierretia) soror Rondani, 1860 (N, S)

Sarcophaga (Pierretia) villeneuvei Boettcher, 1912 (*)

***Sarcophaga (Pseudothyrsocnema)* Rohdendorf, 1937**

Sarcophaga (Pseudothyrsocnema) spinosa Villeneuve, 1911 (N)

***Sarcophaga (Robineauella)* Enderlein, 1928**

Sarcophaga (Robineauella) caerulea Zetterstedt, 1838 (N, S)

***Sarcophaga (Rosellea)* Rohdendorf, 1937**

Sarcophaga (Rosellea) aratrix Pandellé, 1896 (N, S)

***Sarcophaga (Sarcophaga)* Meigen, 1826**

Sarcophaga (Sarcophaga) carnaria (Linnaeus, 1758)

Sarcophaga (Sarcophaga) jeanleclercqi Lehrer, 1975 (N)

Sarcophaga (Sarcophaga) lehmanni Müller, 1922 (N, S)

Sarcophaga (Sarcophaga) subvicina Rohdendorf, 1937 (Si)

Sarcophaga (Sarcophaga) variegata (Scopoli, 1763) (N, S)

Sarcophaga (Sarcotachinella) Townsend, 1892

Sarcophaga (Sarcotachinella) sinuata Meigen, 1826 (N, S)

Sarcophaga (Thyrsochnema) Enderlein, 1928

Sarcophaga (Thyrsochnema) corsicana Villeneuve, 1911 (Sa)

Sarcophaga (Thyrsochnema) incisilobata Pandellé, 1896 (N, S, Si)

Sarcophaga (Varirosellea) Xue, 1979

Sarcophaga (Varirosellea) uliginosa Kramer, 1908 (S, Sa)

Note

Taxigramma elegantulum: Segnalata per l'Italia da Verves (1986) senza precisazione di località.

Sarcophila meridionalis: Segnalata per l'Italia da Verves (1986) senza precisazione di località.

Blaesoxipha (Blaesoxipha) litoralis: Segnalata per l'Italia da Verves (1986) senza precisazione di località.

Blaesoxipha (Blaesoxipha) occatrix: Segnalata per l'Italia da Verves (1986) senza precisazione di località.

Sarcophaga (Heteronychia) siciliana: Omonimo secondario, non esiste un nome sostitutivo.

Sarcophaga (Heteronychia) strenua: Segnalata per l'Italia da Verves (1986) senza precisazione di località.

Sarcophaga (Pierretia) villeneuvei: Segnalata per l'Italia da Verves (1986) senza precisazione di località.

Rhinophoridae

Macrotarsina Schiner, 1857

Macrotarsina longimana (Egger, 1856) (N)

Melanophora Meigen, 1803

Melanophora roralis (Linnaeus, 1758) (N, S)

Oplisa Rondani, 1862

Oplisa tergestina (Schiner, 1862) (N, S)

Paykullia Robineau-Desvoidy, 1830

Paykullia maculata (Fallén, 1820) (S)

Paykullia nubilipennis (Loew, 1847) (N, S, Si)

Paykullia partenopea (Rondani, 1860) (N, S)

Phyto Robineau-Desvoidy, 1830

Phyto adolescens Rondani, 1860 (N, S, Si)
Phyto angustifrons (Rondani, 1856) (N)
Phyto brevipila Herting, 1961 (N)
Phyto celer (Rondani, 1862) (N, S)
Phyto cingulata (Zetterstedt, 1844) (N)
Phyto melanocephala (Meigen, 1824) (N)

Rhinomorinia Brauer & Bergenstamm, 1889

Rhinomorinia sarcophagina Schiner, 1862 (N, S)
Rhinomorinia subrostrata Villeneuve, 1913 (N)

Rhinophora Robineau-Desvoidy, 1830

Rhinophora lepida (Meigen, 1824) (N)

Stevenia Robineau-Desvoidy, 1830

Stevenia atramentaria (Meigen, 1824) (N, S)
Stevenia deceptor (Loew, 1847) (N, S, Si, Sa)
Stevenia obscuripennis (Loew, 1847) (N, S)
Stevenia signata (Mik, 1866) (N)
Stevenia umbratica (Fallén, 1820) (N, S, Si)

Tricogena Rondani, 1856

Tricogena rubricosa (Meigen, 1824) (N)

Tromodesia Rondani, 1856

Tromodesia vibripennis Rondani, 1856 (N)

Tachinidae

Exorista (Exorista) Meigen, 1803

Exorista (Exorista) fasciata (Fallén, 1820) (N)
Exorista (Exorista) larvarum (Linné, 1758) (N, S, Sa)
Exorista (Exorista) segregata (Rondani, 1859) (N, Si, Sa)

Exorista (Exoristella) Mesnil, 1946

Exorista (Exoristella) glossatorum (Rondani, 1859) (N)

Exorista (Podotachina) Brauer & Bergenstamm, 1891

- Exorista (Podotachina) grandis* (Zetterstedt, 1844) (N)
Exorista (Podotachina) sorbillans (Wiedemann, 1830) (N, S)

Exorista (Tricholyga) Rondani, 1856

- Exorista (Tricholyga) nova* (Rondani, 1859) (N)

Exorista (Ptilotachina) Brauer & Bergenstamm, 1891

- Exorista (Ptilotachina) civilis* (Rondani, 1859) (N, S)
Exorista (Ptilotachina) florentina Herting, 1975 (N)
Exorista (Ptilotachina) xanthaspis (Wiedemann, 1830) (S)

Exorista (Adenia) Robineau-Desvoidy, 1863

- Exorista (Adenia) mimula* (Meigen, 1824) (N, S)
Exorista (Adenia) nympharum (Rondani, 1859) (N)
Exorista (Adenia) rustica (Fallén, 1810) (N, S)

Neophryxe Townsend, 1916

- Neophryxe vallina* (Rondani, 1861) (N)

Chetogena Rondani, 1856

- Chetogena acuminata* Rondani, 1859 (N, S)
Chetogena fasciata (Egger, 1856) (Si)
Chetogena filipalpis Rondani, 1859 (N)
Chetogena media Rondani, 1859 (N)
Chetogena obliquata (Fallén, 1810) (N, S)
Chetogena rondaniana (Villeneuve, 1931) (N, S)
Chetogena siciliensis (Villeneuve, 1924) (Si)

Parasetigena Brauer & Bergenstamm, 1891

- Parasetigena silvestris* (Robineau-Desvoidy, 1863) (N)

Phorocera Robineau-Desvoidy, 1830

- Phorocera assimilis* (Fallén, 1810) (N)
Phorocera grandis (Rondani, 1859) (N)
Phorocera obscura (Fallén, 1810) (N)

Phorinia Robineau-Desvoidy, 1830

- Phorinia aurifrons* Robineau-Desvoidy, 1830 (N, S)

Bessa Robineau-Desvoidy, 1863

Bessa parallela (Meigen, 1824) (N, S)

Bessa selecta (Meigen, 1824) (N)

Belida Robineau-Desvoidy, 1863

Belida angelicae (Meigen, 1824) (N, S)

Meigenia Robineau-Desvoidy, 1830

Meigenia dorsalis (Meigen, 1824) (N, S)

Meigenia majuscula (Rondani, 1859) (N, S)

Meigenia mutabilis (Fallén, 1810) (N, S)

Meigenia uncinata Mesnil, 1967 (N)

Conogaster Brauer & Bergenstamm, 1891

Conogaster pruinosa (Meigen, 1824) (N)

Zaira Robineau-Desvoidy, 1830

Zaira cinerea (Fallén, 1810) (N, Sa)

Gastrolepta Rondani, 1862

Gastrolepta anthracina (Meigen, 1826) (N)

Trigonospila Pokorny, 1886

Trigonospila ludio (Zetterstedt, 1849) (N)

Medina Robineau-Desvoidy, 1830

Medina collaris (Fallén, 1820) (N, S)

Medina luctuosa (Meigen, 1824) (N)

Medina melania (Meigen, 1824) (N)

Medina separata (Meigen, 1824) (N)

Policheta Rondani, 1856

Policheta unicolor (Fallén, 1820) (N)

Istocheta Rondani, 1859

Istocheta cinerea (Macquart, 1850) (N)

Istocheta hemichaeta (Brauer & Bergenstamm, 1889) (N, Si)

Staurochaeta Brauer & Bergenstamm, 1889

Staurochaeta albocingulata (Fallén, 1820) (N)

Lecanipa Rondani, 1859

Lecanipa leucomelas (Meigen, 1824) (N, S)

Leiophora Robineau-Desvoidy, 1863

Leiophora innoxia (Meigen, 1824) (N)

Admontia Brauer & Bergenstamm, 1889

Admontia blanda (Fallén, 1820) (N)

Admontia grandicornis (Zetterstedt, 1849) (N)

Admontia maculisquama (Zetterstedt, 1859) (N)

Oswaldia Robineau-Desvoidy, 1863

Oswaldia spectabilis (Meigen, 1824) (N, S)

Lomachantha Rondani, 1859

Lomachantha parra Rondani, 1859 (N, S)

Ligeria Robineau-Desvoidy, 1863

Ligeria angusticornis (Loew, 1847) (N, S, Si)

Erynniopsis Townsend, 1926

Erynniopsis antennata (Rondani, 1861) (N)

Ligeriella Mesnil, 1961

Ligeriella aristata (Villeneuve, 1911) (N)

Blondelia Robineau-Desvoidy, 1830

Blondelia nigripes (Fallén, 1810) (N, S)

Compsilura Bouché, 1834

Compsilura concinnata (Meigen, 1824) (N, S, Sa)

Vibrissina Rondani, 1861

Vibrissina turrita (Meigen, 1824) (N)

Acemya Robineau-Desvoidy, 1830

Acemya acuticornis (Meigen, 1824) (N, S)

Acemya rufitibia (von Roser, 1840) (N)

Ceracia Rondani, 1865

Ceracia mucronifera Rondani, 1865 (N)

Thrixion Brauer & Bergenstamm, 1889

Thrixion aberrans (Schiner, 1862) (S, Si)

Ethilla Robineau-Desvoidy, 1863

Ethilla aemula (Meigen, 1824) (N)

Paratryphera Brauer & Bergenstamm, 1891

Paratryphera barbatula (Rondani, 1859) (N)

Paratryphera bisetosa (Brauer & Bergenstamm, 1891) (N)

Paratryphera palpalis (Rondani, 1859) (N, S)

Atylomyia Brauer, 1898

Atylomyia loewi Brauer, 1898 (N, S)

Smidtia Robineau-Desvoidy, 1830

Smidtia conspersa (Meigen, 1824) (N)

Timavia Robineau-Desvoidy, 1863

Timavia amoena (Meigen, 1824) (N)

Winthemia Robineau-Desvoidy, 1830

Winthemia bohemani (Zetterstedt, 1844) (N)

Winthemia cruentata (Rondani, 1859) (N)

Winthemia quadripustulata (Fabricius, 1794) (N)

Winthemia rufiventris (Macquart, 1849) (N)

Winthemia speciosa (Egger, 1861) (N)

Winthemia venusta (Meigen, 1824) (N)

Nemorilla Rondani, 1856

Nemorilla floralis (Fallén, 1810) (N, S)
Nemorilla maculosa (Meigen, 1824) (N, S)

Aplomya Robineau-Desvoidy, 1830

Aplomya confinis (Fallén, 1820) (N, S, Sa)

Phebellia Robineau-Desvoidy, 1846

Phebellia glauca (Meigen, 1824) (N, S)
Phebellia glirina (Rondani, 1859) (N)
Phebellia nigripalpis (Robineau-Desvoidy, 1847) (N)
Phebellia pauciseta (Villeneuve, 1908) (N)
Phebellia stulta (Zetterstedt, 1844) (N)

Ptesiomyia Brauer & Bergenstamm, 1893

Ptesiomyia alacris (Meigen, 1824) (N, S)

Nilea Robineau-Desvoidy, 1863

Nilea hortulana (Meigen, 1824) (N)
Nilea innoxia Robineau-Desvoidy, 1863 (N, S)

Phonomyia Brauer & Bergenstamm, 1893

Phonomyia aristata (Rondani, 1861) (N)

Tlephusa Robineau-Desvoidy, 1863

Tlephusa cincta (Rondani, 1859) (N, S)

Epicampocera Macquart, 1849

Epicampocera succincta (Meigen, 1824) (N, S)

Buquetia Robineau-Desvoidy, 1847

Buquetia musca Robineau-Desvoidy, 1847 (N)

Phryxe Robineau-Desvoidy, 1830

Phryxe caudata (Rondani, 1859) (N, S)
Phryxe erythrostoma (Hartig, 1838) (N)
Phryxe magnicornis Zetterstedt, 1838 (N)
Phryxe nemea (Meigen, 1824) (N, Sa)
Phryxe semicaudata Herting, 1959 (S)

Phryxe setifacies (Villeneuve, 1910) (N)

Phryxe vulgaris (Fallén, 1810) (N, S)

Gymnophryxe Villeneuve, 1922

Gymnophryxe carthaginiensis (Bischof, 1900) (Si)

Periarchioloops Villeneuve, 1924

Periarchioloops scutellaris (Fallén, 1820) (N)

Bactromyia Brauer & Bergenstamm, 1891

Bactromyia aurulenta (Meigen, 1824) (S)

Pseudoperichaeta Brauer & Bergenstamm, 1889

Pseudoperichaeta nigrolineata (Walker, 1853) (N, S)

Pseudoperichaeta palesoidea (Robineau-Desvoidy, 1830) (N)

Catagonia Brauer & Bergenstamm, 1891

Catagonia aberrans (Rondani, 1859) (N, S)

Lydella Robineau-Desvoidy, 1830

Lydella grisescens Robineau-Desvoidy, 1830 (N)

Lydella stabulans (Meigen, 1824) (N, Si, Sa)

Lydella thompsoni Herting, 1959 (N)

Chetina Rondani, 1856

Chetina setigena Rondani, 1856 (N)

Cadurciella Villeneuve, 1927

Cadurciella tritaeniata (Rondani, 1859) (N)

Drino Robineau-Desvoidy, 1863

Drino atropivora (Robineau-Desvoidy, 1830) (N, S)

Drino imberbis (Wiedemann, 1830) (N)

Drino inconspicua (Meigen, 1830) (N, S)

Drino lota (Meigen, 1824) (N)

Drino vicina (Zetterstedt, 1849) (N)

Thelyconychia Brauer & Bergenstamm, 1889

Thelyconychia solivaga (Rondani, 1861) (N)

Amelibaea Mesnil, 1955

Amelibaea tultschensis (Brauer & Bergenstamm, 1891) (N)

Hubneria Robineau-Desvoidy, 1847

Hubneria affinis (Fallén, 1810) (N)

Tryphera Meigen, 1838

Tryphera lugubris (Meigen, 1824) (N)

Carcelia (Carcelia) Robineau-Desvoidy, 1830

Carcelia (Carcelia) alpestris Herting, 1966 (N)

Carcelia (Carcelia) atricosta Herting, 1961 (N)

Carcelia (Carcelia) bombylans Robineau-Desvoidy, 1830 (N)

Carcelia (Carcelia) dubia (Brauer & Bergenstamm, 1891) (S)

Carcelia (Carcelia) gnava (Meigen, 1824) (N)

Carcelia (Carcelia) laxifrons Villeneuve, 1912 (Sa)

Carcelia (Carcelia) lucorum (Meigen, 1824) (N, S, Si)

Carcelia (Carcelia) rasa (Macquart, 1849) (N)

Carcelia (Carcelia) rasella Baranov, 1931 (N)

Carcelia (Euryclea) Robineau-Desvoidy, 1863

Carcelia (Euryclea) falenaria (Rondani, 1859) (N, S, Si)

Carcelia (Euryclea) tibialis (Robineau-Desvoidy, 1863) (N)

Senometopia Macquart, 1834

Senometopia confundens (Rondani, 1859) (N)

Senometopia excisa (Fallén, 1820) (N)

Senometopia separata (Rondani, 1859) (N, S)

Senometopia susurrans (Rondani, 1859) (N, S)

Thecocarcelia Townsend, 1933

Thecocarcelia acutangulata (Macquart, 1850) (N, S)

Erycia Robineau-Desvoidy, 1830

Erycia fasciata Villeneuve, 1924 (N)

Erycia fatua (Meigen, 1824) (N)

Erycia festinans (Meigen, 1824) (S)

Erycesta Herting, 1967

Erycesta caudigera (Rondani, 1861) (N)

Cestonia Rondani, 1861

Cestonia cineraria Rondani, 1861 (N, Sa)

Xylotachina Brauer & Bergenstamm, 1891

Xylotachina diluta (Meigen, 1824) (N)

Alsomyia Brauer & Bergenstamm, 1891

Alsomyia capillata (Rondani, 1859) (N, S)

Townsendiellomyia Baranov, 1932

Townsendiellomyia nidicola (Townsend, 1908) (N, Sa)

Platymya Robineau-Desvoidy, 1830

Platymya antennata (Brauer & Bergenstamm, 1891) (N)

Platymya fimbriata (Meigen, 1824) (N)

Eumea Robineau-Desvoidy, 1863

Eumea linearicornis (Zetterstedt, 1844) (N)

Eumea mitis (Meigen, 1824) (N)

Myxexoristops Townsend, 1911

Myxexoristops bonsdorffi (Zetterstedt, 1859) (N)

Zenillia Robineau-Desvoidy, 1830

Zenillia dolosa (Meigen, 1824) (N)

Zenillia libatrix (Panzer, 1798) (N)

Clemelis Robineau-Desvoidy, 1863

Clemelis apicalis (Villeneuve, 1923) (N)

Clemelis pullata (Meigen, 1824) (N)

Pales Robineau-Desvoidy, 1830

Pales pavidata (Meigen, 1824) (N, S, Sa)

Pales processioneae (Ratzeburg, 1840) (N, S)

Pales pumicata (Meigen, 1824) (N, Sa)

Phryno Robineau-Desvoidy, 1830

Phryno vetula (Meigen, 1824) (N)

Cyzenis Robineau-Desvoidy, 1863

Cyzenis albicans (Fallén, 1810) (N)

Cyzenis jucunda (Meigen, 1838) (N, S)

Bothria Rondani, 1856

Bothria frontosa (Meigen, 1824) (N)

Bothria subalpina Villeneuve, 1910 (N)

Ceromasia Rondani, 1856

Ceromasia rubrifrons (Macquart, 1834) (N, S)

Allophorocera Hendel, 1901

Allophorocera ferruginea (Meigen, 1824) (N)

Allophorocera pachystyla (Macquart, 1850) (N)

Allophorocera rutila (Meigen, 1824) (N)

Ocytata Gistel, 1848

Ocytata pallipes (Fallén, 1820) (N, S)

Pexopsis Brauer & Bergenstamm, 1889

Pexopsis aprica (Meigen, 1824) (N)

Cadurcia Villeneuve, 1926

Cadurcia casta (Rondani, 1861) (N, Sa)

Eurysthaea Robineau-Desvoidy, 1863

Eurysthaea scutellaris (Robineau-Desvoidy, 1848) (N, S)

Erynnia Robineau-Desvoidy, 1830

Erynnia ocypterata (Fallén, 1810) (N)

Elodia Robineau-Desvoidy, 1863

Elodia ambulatoria (Meigen, 1824) (S)
Elodia morio (Fallén, 1820) (N, Si, Sa)

Sturmia Robineau-Desvoidy, 1830

Sturmia bella (Meigen, 1824) (N, S)

Blepharipa Rondani, 1856

Blepharipa pratensis (Meigen, 1824) (N, S, Sa)

Masicera Macquart, 1834

Masicera pavoniae (Robineau-Desvoidy, 1830) (N)
Masicera silvatica (Fallén, 1810) (N, S)
Masicera sphingivora (Robineau-Desvoidy, 1830) (N, S, Sa)

Dolichocolon Brauer & Bergenstamm, 1889

Dolichocolon paradoxum Brauer & Bergenstamm, 1889 (S)

Prosopea Rondani, 1861

Prosopea nigricans (Egger, 1861) (N, S)

Gaedia Meigen, 1838

Gaedia connexa (Meigen, 1824) (N, S)
Gaedia distincta Egger, 1861 (N)
Gaedia hispanica Mesnil, 1953 (N)

Frontina Meigen, 1838

Frontina laeta (Meigen, 1824) (N)

Thelymorpha Brauer & Bergenstamm, 1889

Thelymorpha marmorata (Fabricius, 1805) (N)

Baumhaueria Meigen, 1838

Baumhaueria goniaeformis (Meigen, 1824) (N)
Baumhaueria microps Mesnil, 1963 (N)

Pachystylum Macquart, 1848

Pachystylum bremii Macquart, 1848 (N, S)

Brachicheta Rondani, 1861

Brachicheta strigata (Meigen, 1824) (N)

Masistylum Brauer & Bergenstamm, 1893

Masistylum arcuatum (Mik, 1863) (N)

Gonia Meigen, 1803

Gonia atra Meigen, 1826 (Si)

Gonia bimaculata Wiedemann, 1819 (N, S, Sa)

Gonia capitata (DeGeer, 1776) (N)

Gonia distinguenda Herting, 1963 (N)

Gonia divisa Meigen, 1826 (N)

Gonia foersteri Meigen, 1838 (N)

Gonia ornata Meigen, 1826 (N)

Gonia picea (Robineau-Desvoidy, 1830) (N)

Onychogonia Brauer & Bergenstamm, 1889

Onychogonia flaviceps (Zetterstedt, 1838) (N)

Pseudogonia Brauer & Bergenstamm, 1889

Pseudogonia parisiaca (Robineau-Desvoidy, 1851) (N, S)

Pseudogonia rufifrons (Wiedemann, 1830) (N, S)

Spallanzania Robineau-Desvoidy, 1830

Spallanzania hebes (Fallén, 1820) (N, S)

Spallanzania multisetosa (Rondani, 1859) (N)

Spallanzania quadrimaculata Herting, 1967 (N)

Spallanzania rectistylum (Macquart, 1847) (N, Sa)

Tachina (**Tachina**) Meigen, 1803

Tachina (*Tachina*) *grossa* (Linnaeus, 1758) (S)

Tachina (*Tachina*) *magna* (Giglio-Tos, 1890) (N)

Tachina (**Eudoromyia**) Bezzi, 1906

Tachina (*Eudoromyia*) *casta* (Rondani, 1859) (N, S, Si)

Tachina (*Eudoromyia*) *fera* (Linnaeus, 1761) (N, S, Si)

Tachina (*Eudoromyia*) *magnicornis* (Zetterstedt, 1844) (N, S)

Tachina (*Eudoromyia*) *nupta* (Rondani, 1859) (N, S)

Tachina (**Servillia**) Robineau-Desvoidy, 1830

Tachina (Servillia) lurida (Fabricius, 1781) (N)
Tachina (Servillia) ursina Meigen, 1824 (N)

Tachina (Echinogaster) Lioy, 1864

Tachina (Echinogaster) praeceps Meigen, 1824 (N, S, Si, Sa)

Schineria Rondani, 1857

Schineria tergestina Rondani, 1859 (N)

Nowickia (Nowickia) Wachtl, 1894

Nowickia (Nowickia) marklini (Zetterstedt, 1838) (N)

Nowickia (Fabriciella) Bezzi, 1906

Nowickia (Fabriciella) atripalpis (Robineau-Desvoidy, 1863) (N, S)
Nowickia (Fabriciella) ferox (Panzer, 1809) (N, S)
Nowickia (Fabriciella) reducta Mesnil, 1970 (N)
Nowickia (Fabriciella) rondanii (Giglio-Tos, 1890) (N)

Peleteria Robineau-Desvoidy, 1830

Peleteria abdominalis Robineau-Desvoidy, 1830 (Si)
Peleteria ferina (Zetterstedt, 1844) (N)
Peleteria meridionalis (Robineau-Desvoidy, 1830) (N, S)
Peleteria popelii (Portschinsky, 1882) (N)
Peleteria prompta (Meigen, 1824) (N)
Peleteria rubescens (Robineau-Desvoidy, 1830) (N, S)
Peleteria ruficornis (Macquart, 1835) (N, S)
Peleteria sphyricera (Macquart, 1835) (N)
Peleteria varia (Fabricius, 1794) (N, S)

Sarromyia Pokorný, 1893

Sarromyia nubigena Pokorný, 1893 (N)

Germaria Robineau-Desvoidy, 1830

Germaria ruficeps (Fallén, 1820) (N)

Nemoraëa Robineau-Desvoidy, 1830

Nemoraëa pellucida (Meigen, 1824) (N, S)

Linnaemya (Linnaemya) Robineau-Desvoidy, 1830

Linnaemya (Linnaemya) comta (Fallén, 1810) (N)
Linnaemya (Linnaemya) vulpina (Fallén, 1810) (N, S)

Linnaemya (Bonellimyia) Townsend, 1919

Linnaemya (Bonellimyia) impudica (Rondani, 1859) (N)
Linnaemya (Bonellimyia) tessellans (Robineau-Desvoidy, 1830) (N)

Linnaemya (Ophina) Robineau-Desvoidy, 1863

Linnaemya (Ophina) fissiglobula Pandellé, 1895 (N)
Linnaemya (Ophina) haemorrhoidalis (Fallén, 1810) (N, S)
Linnaemya (Ophina) media Zimin, 1954 (N)
Linnaemya (Ophina) olsufjevi Zimin, 1954 (N)
Linnaemya (Ophina) perinealis Pandellé, 1895 (N)
Linnaemya (Ophina) picta (Meigen, 1824) (N, S)

Linnaemya (Homoeonychia) Brauer & Bergenstamm, 1889

Linnaemya (Homoeonychia) frater (Rondani, 1859) (N, S)
Linnaemya (Homoeonychia) lithosiophaga (Rondani, 1859) (N, S)

Chrysosomopsis Townsend, 1916

Chrysosomopsis auratus (Fallén, 1820) (N, S)

Lydina Robineau-Desvoidy, 1830

Lydina aenea (Meigen, 1824) (N)

Lypha Robineau-Desvoidy, 1830

Lypha dubia (Fallén, 1810) (N)
Lypha ruficauda (Zetterstedt, 1838) (N)

Petagnia Rondani, 1856

Petagnia subpetiolata Rondani, 1859 (N)

Ernestia Robineau-Desvoidy, 1830

Ernestia argentifera (Meigen, 1824) (N)
Ernestia puparum (Fabricius, 1794) (N)
Ernestia rudis (Fallén, 1810) (N)
Ernestia vagans (Meigen, 1824) (N)

Fausta Robineau-Desvoidy, 1830

Fausta nemorum (Meigen, 1824) (N)

Eurithia Robineau-Desvoidy, 1844

Eurithia anthophila (Robineau-Desvoidy, 1830) (N, S)

Eurithia caesia (Fallén, 1810) (N)

Eurithia connivens (Zetterstedt, 1844) (N, S)

Eurithia consobrina (Meigen, 1824) (S)

Eurithia fucosa Mesnil, 1975 (N)

Eurithia suspecta (Pandellé, 1896) (N)

Eurithia vivida (Zetterstedt, 1838) (N)

Emporomyia Brauer & Bergenstamm, 1891

Emporomyia kaufmanni Brauer & Bergenstamm, 1891 (N)

Hyalurgus Brauer & Bergenstamm, 1893

Hyalurgus crucigera (Zetterstedt, 1838) (N)

Gymnocheta Robineau-Desvoidy, 1830

Gymnocheta viridis (Fallén, 1810) (N)

Zophomyia Macquart, 1835

Zophomyia temula (Scopoli, 1763) (N, S)

Cleonice Robineau-Desvoidy, 1863

Cleonice callida (Meigen, 1824) (N, S)

Loewia Egger, 1856

Loewia adjuncta Herting, 1971 (N)

Loewia alpestris (Villeneuve, 1920) (N)

Loewia brevifrons (Rondani, 1856) (N)

Loewia nudigena Mesnil, 1973 (N)

Loewia setibarba Egger, 1856 (N, S)

Synactia Villeneuve, 1915

Synactia parvula (Rondani, 1861) (N)

Pseudopachystylum Mik, 1891

Pseudopachystylum gonioides (Zetterstedt, 1838) (N)

Brachymera Brauer & Bergenstamm, 1889

Brachymera letochai (Mik, 1874) (N)

Brachymera rugosa (Mik, 1863) (N)

Pelamera Herting, 1969

Pelamera atra (Rondani, 1861) (N)

Macquartia Robineau-Desvoidy, 1830

Macquartia chalconota (Meigen, 1824) (N, S)

Macquartia dispar (Fallén, 1820) (N, S)

Macquartia grisea (Fallén, 1810) (N, S)

Macquartia praefica (Meigen, 1824) (N, S)

Macquartia pubiceps (Zetterstedt, 1845) (N)

Macquartia tenebricosa (Meigen, 1824) (N, S)

Macquartia tessellum (Meigen, 1824) (N, S, Si)

Anthomyiopsis Townsend, 1916

Anthomyiopsis plagioderae Mesnil, 1972 (N)

Triarthria Stephens, 1829

Triarthria setipennis (Fallén, 1810) (N, S)

Neaera Robineau-Desvoidy, 1830

Neaera laticornis (Meigen, 1824) (N)

Neoplectops Malloch, 1930

Neoplectops pomonellae (Schnabl & Mokrzecki, 1903) (S)

Elfia Robineau-Desvoidy, 1850

Elfia cingulata (Robineau-Desvoidy, 1830) (N)

Phytomyptera Rondani, 1845

Phytomyptera nigrina (Meigen, 1824) (N, S, Si)

Phytomyptera stackelbergi Mesnil, 1963 (S)

Graphogaster Rondani, 1868

Graphogaster buccata Herting, 1971 (N)

Graphogaster dispar (Brauer & Bergenstamm, 1889) (N)
Graphogaster vestita Rondani, 1868 (N, S)

Ancistrophora Schiner, 1865

Ancistrophora mikii Schiner, 1865 (N)

Ceromya Robineau-Desvoidy, 1830

Ceromya bicolor (Meigen, 1824) (N)
Ceromya silacea (Meigen, 1824) (N)

Actia Robineau-Desvoidy, 1830

Actia crassicornis (Meigen, 1824) (N, S)
Actia dubitata Herting, 1971 (Sa)
Actia infantula (Zetterstedt, 1844) (N, S)
Actia lamia (Meigen, 1838) (N)
Actia maksymovi Mesnil, 1952 (N)
Actia pilipennis (Fallén, 1810) (N, S, Si)

Peribaea Robineau-Desvoidy, 1863

Peribaea apicalis Robineau-Desvoidy, 1863 (N, S)
Peribaea fissicornis (Strobl, 1909) (N, S)
Peribaea tibialis (Robineau-Desvoidy, 1851) (N, S)

Ceranthia Robineau-Desvoidy, 1830

Ceranthia samarensis (Villeneuve, 1921) (N)

Siphona Meigen, 1803

Siphona collini Mesnil, 1960 (N)
Siphona confusa Mesnil, 1961 (S, Si)
Siphona cristata (Fabricius, 1805) (N)
Siphona flavifrons Staeger, 1849 (N)
Siphona geniculata (DeGeer, 1776) (S)
Siphona paludosa Mesnil, 1960 (N)
Siphona pauciseta Rondani, 1865 (N, S)
Siphona setosa Mesnil, 1960 (N)

Aphria Robineau-Desvoidy, 1830

Aphria latifrons Villeneuve, 1908 (N)
Aphria longilingua Rondani, 1861 (N)
Aphria longirostris (Meigen, 1824) (N, S)

Demoticus Macquart, 1854

Demoticus plebejus (Fallén, 1810) (N)

Bithia Robineau-Desvoidy, 1863

Bithia demotica (Egger, 1861) (N)

Bithia glirina (Rondani, 1861) (N, S)

Bithia modesta (Meigen, 1824) (N, S)

Bithia proletaria (Egger, 1860) (N)

Bithia sprete (Meigen, 1824) (N, S)

Leskia Robineau-Desvoidy, 1830

Leskia aurea (Fallén, 1820) (N, S)

Solieria Robineau-Desvoidy, 1848

Solieria fenestrata (Meigen, 1824) (N)

Solieria inanis (Fallén, 1810) (N)

Solieria pacifica (Meigen, 1824) (N)

Solieria vacua (Rondani, 1861) (N)

Fischeria Robineau-Desvoidy, 1830

Fischeria bicolor Robineau-Desvoidy, 1830 (N, S, Si)

Clausicella Rondani, 1856

Clausicella puella (Rondani, 1861) (N)

Clausicella suturata Rondani, 1859 (N, S)

Mintho Robineau-Desvoidy, 1830

Mintho compressa (Fabricius, 1787) (N, S)

Mintho rufiventris (Fallén, 1816) (N, S)

Hyperaea Robineau-Desvoidy, 1863

Hyperaea femoralis (Meigen, 1824) (N)

Hyperaea sanguinea (Meigen, 1824) (N, S)

Hyperaea tonsa (Loew, 1847) (Si) (E)

Microphthalma Macquart, 1843

Microphthalma europaea Egger, 1860 (N, S)

Dexiosoma Rondani, 1856

Dexiosoma caninum (Fabricius, 1781) (N)

Melisoneura Rondani, 1861

Melisoneura leucoptera (Meigen, 1824) (S)

Trixa Meigen, 1824

Trixa caerulescens Meigen, 1824 (N)

Trixa conspersa (Harris, 1776) (N)

Billaea Robineau-Desvoidy, 1830

Billaea adelpha (Loew, 1873) (N, S)

Billaea fortis (Rondani, 1862) (N)

Billaea irrorata (Meigen, 1826) (N)

Billaea lata (Macquart, 1849) (Si)

Billaea maritima (Schiner, 1862) (N)

Billaea pectinata (Meigen, 1826) (N)

Billaea triangulifera (Zetterstedt, 1844) (N, S)

Dinera Robineau-Desvoidy, 1830

Dinera carinifrons (Fallén, 1816) (N)

Dinera ferina (Fallén, 1816) (N, S)

Dinera grisescens (Fallén, 1816) (N)

Estheria Robineau-Desvoidy, 1830

Estheria bohemani (Rondani, 1862) (N)

Estheria cristata (Meigen, 1826) (N)

Estheria littoralis (Rondani, 1862) (N)

Estheria microcera (Robineau-Desvoidy, 1830) (N)

Estheria pallicornis (Loew, 1873) (N)

Estheria petiolata (Bonsdorff, 1866) (N)

Estheria picta (Meigen, 1826) (Sa)

Dexia Meigen, 1826

Dexia rustica (Fabricius, 1775) (N, S)

Dexia vacua (Fallén, 1816) (N)

Prosenia Le Peletier & Serville, 1828

Prosenia siberita (Fabricius, 1775) (N, S)

Zeuxia Meigen, 1826

Zeuxia aberrans (Loew, 1847) (N, S, Si)
Zeuxia brevicornis (Egger, 1860) (N)
Zeuxia cinerea Meigen, 1826 (N, S)
Zeuxia erythraea (Egger, 1856) (N, S)
Zeuxia subapennina Rondani, 1862 (N)
Zeuxia tessellata Egger, 1860 (N)
Zeuxia zernyi Mesnil, 1963 (N, Si)

Eriothrix Meigen, 1803

Eriothrix apenninus (Rondani, 1862) (N)
Eriothrix argyreatus (Meigen, 1824) (N)
Eriothrix micronyx Stein, 1924 (N)
Eriothrix monticola (Egger, 1856) (N)
Eriothrix prolixa (Meigen, 1824) (N, S)
Eriothrix rufomaculatus (DeGeer, 1776) (N, S)

Trafoia Brauer & Bergenstamm, 1893

Trafoia monticola Brauer & Bergenstamm, 1893 (N)

Campylocheta Rondani, 1859

Campylocheta inepta (Meigen, 1824) (S)
Campylocheta praecox (Meigen, 1824) (N)

Ramonda Robineau-Desvoidy, 1863

Ramonda delphinensis (Villeneuve, 1922) (N)
Ramonda plorans (Rondani, 1861) (N, Si)
Ramonda prunaria (Rondani, 1861) (S)
Ramonda spathulata (Fallén, 1820) (N)

Periscepsia Gistel, 1848

Periscepsia carbonaria (Panzer, 1798) (N, S)
Periscepsia handlirschi (Brauer & Berenstamm, 1891) (N)

Wagneria Robineau-Desvoidy, 1830

Wagneria alpina Villeneuve, 1910 (N)
Wagneria costata (Fallén, 1815) (N)
Wagneria cunctans (Meigen, 1824) (N)
Wagneria gagatea Robineau-Desvoidy, 1830 (N)
Wagneria lacrimans (Rondani, 1861) (S)

Kirbya Robineau-Desvoidy, 1830

Kirbya moerens (Meigen, 1830) (N, S)

Athrycia Robineau-Desvoidy, 1830

Athrycia curvinervis (Zetterstedt, 1844) (N)

Athrycia trepida (Meigen, 1824) (N)

Voria Robineau-Desvoidy, 1830

Voria ruralis (Fallén, 1810) (N, S)

Cyrtophleba Rondani, 1856

Cyrtophleba ruricola (Meigen, 1824) (N, S)

Klugia Robineau-Desvoidy, 1863

Klugia marginata (Meigen, 1824) (N)

Chaetovoria Villeneuve, 1920

Chaetovoria antennata (Villeneuve, 1920) (N)

Phyllomya Robineau-Desvoidy, 1830

Phyllomya procera (Meigen, 1824) (N)

Phyllomya volvulus (Fabricius, 1794) (N, S)

Thelaira Robineau-Desvoidy, 1830

Thelaira leucozona (Panzer, 1809) (N, S)

Thelaira nigripes (Fabricius, 1794) (N, S)

Thelaira solivaga (Harris, 1780) (S)

Stomina Robineau-Desvoidy, 1830

Stomina caliendrata (Rondani, 1862) (N, S)

Stomina calvescens Herting, 1977 (N)

Stomina tachinoides (Fallén, 1816) (N, Si)

Rhamphina Macquart, 1835

Rhamphina pedemontana (Meigen, 1824) (N)

Dufouria Robineau-Desvoidy, 1830

Dufouria chalybeata (Meigen, 1824) (N)

Dufouria nigrita (Fallén, 1810) (N, S)

Chaetoptilia Rondani, 1862

Chaetoptilia puella (Rondani, 1862) (N)

Rondania Robineau-Desvoidy, 1850

Rondania cucullata Robineau-Desvoidy, 1850 (N, S)

Rondania dimidiata (Meigen, 1824) (N)

Microsoma Macquart, 1855

Microsoma exiguum (Meigen, 1824) (N)

Eliozeta Rondani, 1856

Eliozeta helluo (Fabricius, 1805) (N, S)

Eliozeta pellucens (Fallén, 1820) (N)

Clytiomya Rondani, 1861

Clytiomya continua (Panzer, 1798) (N, S)

Clytiomya mesnili Kugler, 1968 (S)

Clytiomya sola (Rondani, 1861) (N, S)

Ectophasia Townsend, 1912

Ectophasia crassipennis (Fabricius, 1794) (N, S)

Ectophasia leucoptera (Rondani, 1865) (Si)

Ectophasia oblonga (Robineau-Desvoidy, 1830) (N, Si, Sa)

Subclytia Pandellé, 1894

Subclytia rotundiventris (Fallén, 1820) (N)

Gymnosoma Meigen, 1803

Gymnosoma clavatum (Rohdendorf, 1947) (N, S)

Gymnosoma costatum (Panzer, 1800) (N)

Gymnosoma dolycoridis Dupuis, 1961 (N)

Gymnosoma nitens Meigen, 1824 (N, Si)

Gymnosoma nudifrons Herting, 1966 (N)

Gymnosoma rotundatum (Linnaeus, 1758) (N, S)

Gymnosoma rungsi (Mesnil, 1952) (S)

Gymnosoma siculum Dupuis & Genduso, 1981 (Si)

Cistogaster Latreille, 1829

Cistogaster globosa (Fabricius, 1775) (N)
Cistogaster mesnili (Zimin, 1966) (Sa)

Opesia Robineau-Desvoidy, 1863

Opesia cana (Meigen, 1824) (S)
Opesia grandis (Egger, 1860) (S)

Elomya Robineau-Desvoidy, 1830

Elomya lateralis (Meigen, 1824) (N, Si, Sa)

Phasia (Phasia) Latreille, 1804

Phasia (Phasia) aurigera (Egger, 1860) (N)
Phasia (Phasia) aurulans Meigen, 1824 (N)
Phasia (Phasia) hemiptera (Fabricius, 1794) (N, S)
Phasia (Phasia) obesa (Fabricius, 1798) (N, S, Si)
Phasia (Phasia) subcoleoprata (Linné, 1767) (N, Si)

Phasia (Hyalomya) Robineau-Desvoidy, 1830

Phasia (Hyalomya) pandellei (Dupuis, 1957) (N, S)
Phasia (Hyalomya) pusilla Meigen, 1824 (N, S)

Xysta Meigen, 1824

Xysta holosericea (Fabricius, 1805) (N, S)

Catharosia Rondani, 1868

Catharosia albisquama (Villeneuve, 1932) (N)
Catharosia pygmaea (Fallén, 1815) (N)

Strongygaster Macquart, 1834

Strongygaster globula (Meigen, 1824) (N)

Eulabidogaster Belanovsky, 1951

Eulabidogaster setifacies (Rondani, 1861) (N, S)

Leucostoma Meigen, 1803

Leucostoma crassum Kugler, 1966 (N, Si)
Leucostoma meridianum (Rondani, 1868) (N, Si)
Leucostoma simplex (Fallén, 1815) (N)

Leucostoma tetraptera (Meigen, 1824) (N)
Leucostoma turonicum Dupuis, 1964 (S)

Clairvillia Robineau-Desvoidy, 1830

Clairvillia biguttata (Meigen, 1824) (N, S, Si)
Clairvillia pninae Kugler, 1971 (Si)

Brullaea Robineau-Desvoidy, 1863

Brullaea ocypteroidea Robineau-Desvoidy, 1863 (N)

Labigastera Macquart, 1834

Labigastera forcipata (Meigen, 1824) (N)
Labigastera nitidula (Meigen, 1824) (Si)
Labigastera pauciseta (Rondani, 1861) (N)

Lophosia Meigen, 1824

Lophosia fasciata Meigen, 1824 (S)

***Cylindromyia* (*Cylindromyia*)** Meigen, 1803

Cylindromyia (*Cylindromyia*) *bicolor* (Olivier, 1812) (N, S)
Cylindromyia (*Cylindromyia*) *brassicaria* (Fabricius, 1775) (N, S, Si)
Cylindromyia (*Cylindromyia*) *brevicornis* (Loew, 1844) (N)
Cylindromyia (*Cylindromyia*) *pilipes* (Loew, 1844) (N, S)
Cylindromyia (*Cylindromyia*) *xylotina* (Egger, 1860) (N)

***Cylindromyia* (*Exogaster*)** Rondani, 1856

Cylindromyia (*Exogaster*) *rufifrons* (Loew, 1844) (N, Si)

***Cylindromyia* (*Ocypterula*)** Rondani, 1856

Cylindromyia (*Ocypterula*) *pusilla* (Meigen, 1824) (N, S)

***Cylindromyia* (*Conopisoma*)** Speiser, 1910

Cylindromyia (*Conopisoma*) *rufipes* (Meigen, 1824) (N)

***Cylindromyia* (*Dupuisia*)** Lehrer, 1973

Cylindromyia (*Dupuisia*) *crassa* (Loew, 1845) (Si)

***Cylindromyia* (*Calocyptera*)** Herting, 1983

Cylindromyia (Calocyptera) intermedia (Meigen, 1824) (N)

Cylindromyia (Neocyptera) Townsend, 1916

Cylindromyia (Neocyptera) auriceps (Meigen, 1838) (N, S)

Cylindromyia (Neocyptera) interrupta (Meigen, 1824) (N)

Cylindromyia (Neocyptera) scapularis (Loew, 1845) (Si)

Hemyda Robineau-Desvoidy, 1830

Hemyda obscuripennis (Meigen, 1824) (N)

Hemyda vittata (Meigen, 1824) (S)

Besseria Robineau-Desvoidy, 1830

Besseria anthophila (Loew, 1871) (N)

Besseria lateritia (Meigen, 1824) (N)

Besseria reflexa Robineau-Desvoidy, 1830 (S)

Besseria zonaria (Loew, 1847) (Si, Sa)

Phania Meigen, 1824

Phania curvicauda (Fallén, 1820) (N)

Phania funesta (Meigen, 1824) (N)

Phania thoracica Meigen, 1824 (N)

Oestridae

Gasterophilus Leach, 1817

Gasterophilus haemorrhoidalis (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Gasterophilus inermis (Brauer, 1858) (N)

Gasterophilus intestinalis (De Geer, 1776) (N, S, Si, Sa)

Gasterophilus nasalis (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Gasterophilus nigricornis (Loew, 1863) (*)

Gasterophilus pecorum (Fabricius, 1794) (N, S, Si, Sa)

Portschinskia Semenov, 1902

Portschinskia neugebaueri (Portschinsky, 1881) (N)

Crivellia Grunin, 1956

Crivellia silenus (Brauer, 1858) (Si)

Hypoderma Latreille, 1818

Hypoderma bovis (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
Hypoderma lineatum (Villers, 1789) (N, S)

Cephenemyia Latreille, 1818

Cephenemyia stimulator (Clark, 1815) (N)

Pharyngomyia Schiner, 1861

Pharyngomyia picta (Meigen, 1824) (N)

Oestrus Linnaeus, 1758

Oestrus ovis Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)

Rhinoestrus Brauer, 1886

Rhinoestrus purpureus (Brauer, 1858) (N)

Note

Gasterophilus nigricornis: Specie ad ampia distribuzione in Europa meridionale, secondo Soós & Minár, 1986.

Trichoptera

Rhyacophilidae

Rhyacophila Pictet, 1834

Rhyacophila albardana McLachlan, 1879 (N, S)
Rhyacophila appennina McLachlan, 1898 (N, S) (E) (*)
Rhyacophila aquitanica McLachlan, 1879 (N)
Rhyacophila arcangelina Navas, 1932 (N) (E)
Rhyacophila aurata Brauer, 1857 (N)
Rhyacophila bonaparti Schmid, 1947 (N) (*)
Rhyacophila dorsalis (Curtis, 1834)
 Rhyacophila dorsalis acutidens McLachlan, 1879 (S) (E)
 Rhyacophila dorsalis dorsalis (Curtis, 1834) (N)
 Rhyacophila dorsalis subacutidens Moretti, 1994 (S) (E)
Rhyacophila fasciata Hagen, 1859 (N)
Rhyacophila foliacea Moretti, 1981 (S) (E)
Rhyacophila glareosa McLachlan, 1867 (N)
Rhyacophila hartigi Malicky, 1971 (S, Si) (E) (*)
Rhyacophila hirticornis McLachlan, 1879 (*)
 Rhyacophila hirticornis hirticornis McLachlan, 1879 (N)

Rhyacophila hirticornis orobica Moretti, 1991 (N) (E)
Rhyacophila intermedia McLachlan, 1868 (N)
Rhyacophila italica Moretti, 1981 (*)
 Rhyacophila italica ilvana Moretti, 1981 (S) (E)
 Rhyacophila italica italica Moretti, 1981 (N, S) (E)
Rhyacophila kelterae Schmid, 1971 (N, S) (*)
Rhyacophila laevis Pictet, 1834 (N, S)
Rhyacophila meyeri McLachlan, 1879 (N, S)
Rhyacophila nubila (Zetterstedt, 1840) (S) (*)
Rhyacophila pallida Mosely, 1930 (Sa) (*)
Rhyacophila palmeri McLachlan, 1879 (N) (*)
Rhyacophila pascoei McLachlan, 1879 (N, S)
Rhyacophila praemorsa McLachlan, 1879 (N)
Rhyacophila producta McLachlan, 1879 (N)
Rhyacophila pubescens Pictet, 1834 (N, S)
Rhyacophila ravizzai Moretti, 1991 (N) (E) (*)
Rhyacophila rectispina McLachlan, 1884 (N) (E)
Rhyacophila rougemonti McLachlan, 1880 (S, Si) (E) (*)
Rhyacophila simulatrix McLachlan, 1879 (N, S)
Rhyacophila stigmatica (Kolenati, 1859) (N)
Rhyacophila torrentium Pictet, 1834 (N)
Rhyacophila trifasciata Mosely, 1930 (Sa) (*)
Rhyacophila tristis Pictet, 1834 (N, S)
Rhyacophila vulgaris Pictet, 1834 (N, S)

Note

Rhyacophila appennina: Presente in N nell'Appennino Ligure, in S nell'Appennino toscano.
Rhyacophila bonaparti: Solo nel Trentino-Alto Adige.
Rhyacophila hartigi: In S in Molise, Basilicata, Calabria.
Rhyacophila hirticornis: Solo nelle Alpi orientali. La ssp. *orobica* nelle Prealpi Orobiche.
Rhyacophila italica: In N in Emilia Romagna, in S dalla Toscana al Molise. La ssp. *ilvana* in S solo all'isola d'Elba.
Rhyacophila kelterae: In N nelle Alpi Piemontesi e Appennino Ligure, in S nelle Alpi Apuane.
Rhyacophila nubila: In Molise e Campania. Transadriatica.
Rhyacophila pallida: Nota anche in Corsica.
Rhyacophila palmeri: In Friuli-Venezia Giulia.
Rhyacophila ravizzai: Solo nelle Alpi Piemontesi.
Rhyacophila rougemonti: In S dalla Calabria all'Umbria.
Rhyacophila trifasciata: Nota anche in Corsica.

Glossosomatidae

Glossosoma Curtis, 1834

Glossosoma bifidum McLachlan, 1879 (N)
Glossosoma boltoni Curtis, 1834 (N)

Glossosoma conformis Neboiss, 1963 (N, S)

Catagapetus McLachlan, 1884

Catagapetus nigrans McLachlan, 1884 (N, S) (E)

Synagapetus McLachlan, 1879

Synagapetus dubitans McLachlan, 1879 (N)

Agapetus Curtis, 1834

Agapetus cyrnensis Mosely, 1930 (S, Sa) (*)

Agapetus delicatulus McLachlan, 1884 (N) (*)

Agapetus fuscipes Curtis, 1834 (N, S)

Agapetus incertulus McLachlan, 1884 (S) (*)

Agapetus laniger (Pictet, 1834) (N, S) (*)

Agapetus nimbulus McLachlan, 1879 (N, S, Si)

Note

Agapetus cyrnensis: In S solo all'Isola d'Elba. Noto anche in Corsica.

Agapetus delicatulus: In Friuli-Venezia Giulia.

Agapetus incertulus: In Campania.

Agapetus laniger: In N solo in Emilia Romagna.

Hydroptilidae

Ptilocolepus Kolenati, 1848

Ptilocolepus granulatus (Pictet, 1834) (N, S)

Stactobia McLachlan, 1880

Stactobia beatensis Mosely, 1934 (Si)

Stactobia caspersi Ulmer, 1950 (S) (*)

Stactobia eatoniella McLachlan, 1880 (N)

Stactobia ericae Malicky, 1981 (Sa) (E)

Stactobia furcata Mosely, 1930 (N, S) (*)

Stactobia fuscicornis Schneider, 1845 (N, S, Si, Sa)

Stactobia maculata Vaillant, 1951 (Sa)

Stactobia moselyi Kimmims, 1949 (N, S, Si)

Orthotrichia Eaton, 1873

Orthotrichia angustella (McLachlan, 1865) (N, S, Si, Sa)

Orthotrichia costalis (Curtis, 1834) (N, S)

Orthotrichia tragetti Mosely, 1930 (N, S)

Ithytrichia Eaton, 1873

Ithytrichia bosniaca Murgoci, Botnariuc & Botosaneanu, 1948 (Si)

Oxyethira Eaton, 1873

Oxyethira falcata Morton, 1893 (N, S, Si, Sa)

Oxyethira flavicornis (Pictet, 1834) (N, S, Si)

Oxyethira hartigi Moretti, 1981 (Sa) (E)

Oxyethira pirisinui Moretti, 1981 (S, Sa) (*)

Oxyethira simplex Ris, 1897 (S) (*)

Oxyethira unidentata McLachlan, 1884 (S, Si) (*)

Hydroptila Dalman, 1819

Hydroptila aegyptia Ulmer, 1963 (N, S)

Hydroptila angulata Mosely, 1922 (N, S, Si, Sa)

Hydroptila bifurcata Mosely, 1930 (Sa) (*)

Hydroptila cognata Mosely, 1930 (N)

Hydroptila cornuta Mosely, 1922 (N, S)

Hydroptila cortensis Mosely, 1937 (Sa) (*)

Hydroptila fiorii Malicky & Moretti, 1987 (Sa) (E)

Hydroptila forcipata (Eaton, 1873) (N, S)

Hydroptila giudicellorum Botosaneanu, 1980 (S, Si, Sa) (*)

Hydroptila insubrica Ris, 1903 (N, S)

Hydroptila ivisa Malicky, 1972 (N) (*)

Hydroptila martini Marshall, 1977 (S, Si)

Hydroptila occulta (Eaton, 1873) (N)

Hydroptila phaon Malicky, 1976 (S)

Hydroptila ruffoi Moretti, 1981 (S) (E)

Hydroptila serrata Morton, 1898 (Sa) (*)

Hydroptila simulans Mosely, 1920 (N, S)

Hydroptila sparsa Curtis, 1834 (N, S)

Hydroptila stellifera Morton, 1893 (S) (E)

Hydroptila tineoides Dalman, 1819 (N, S, Sa) (*)

Hydroptila uncinata Morton, 1893 (S, Si)

Hydroptila vectis Curtis, 1834 (N, S, Si, Sa)

Agraylea Curtis, 1834

Agraylea multipunctata Curtis, 1834 (S, Si)

Agraylea sexmaculata Curtis, 1834 (N, S)

Allotrichia McLachlan, 1880

Allotrichia pallicornis (Eaton, 1873) (N, S)

Microptila Ris, 1897

Microptila minutissima Ris, 1897 (N) (*)

Tricholeiochiton Kloet & Hincks, 1944

Tricholeiochiton fagesii (Guinard, 1879) (S)

Note

Stactobia caspersi: Appennino tosco-umbro-marchigiano.

Stactobia furcata: In S anche all'Isola d'Elba e Capraia.

Oxyethira pirisinui: In S solo all'Isola Capraia. Distribuzione tirrenica.

Oxyethira simplex: In Puglia.

Oxyethira unidentata: In S in Calabria.

Hydroptila bifurcata: Nota anche per la Corsica.

Hydroptila cortensis: Presente anche in Corsica.

Hydroptila giudicellorum: In S solo all'Isola Capraia.

Hydroptila ivisa: In Friuli-Venezia Giulia.

Hydroptila serrata: Presente anche in Corsica.

Hydroptila tineoides: In S anche all'Isola Capraia.

Microptila minutissima: Nelle Alpi Lombarde.

Philopotamidae

Philopotamus Stephens, 1829

Philopotamus corsicanus Mosely, 1938 (Sa) (*)

Philopotamus liguricus Malicky, 1984 (N, S) (E) (*)

Philopotamus ludificatus McLachlan, 1878 (N, S)

Philopotamus montanus (Donovan, 1813) (*)

Philopotamus montanus montanus (Donovan, 1813) (N, S)

Philopotamus montanus siculus Hagen, 1860 (S, Si) (E)

Philopotamus variegatus (Scopoli, 1763) (N, S, Sa)

Wormaldia McLachlan, 1865

Wormaldia copiosa (McLachlan, 1868) (*)

Wormaldia copiosa botosaneanui Moretti, 1981 (N, S) (E)

Wormaldia copiosa copiosa (McLachlan, 1868) (N)

Wormaldia mediana McLachlan, 1878 (*)

Wormaldia mediana mediana McLachlan, 1878 (N, S)

Wormaldia mediana nielsenii Moretti, 1981 (S, Si) (E)

Wormaldia mediana viganii Moretti, 1992 (N) (E)

Wormaldia occipitalis (Pictet, 1834) (*)

Wormaldia occipitalis bosniaca Botosaneanu, 1960 (N, S)

Wormaldia occipitalis morettii Viganò, 1974 (N, S) (E)
Wormaldia occipitalis occipitalis (Pictet, 1834) (N)
Wormaldia pulla (McLachlan, 1878) (*)
Wormaldia pulla marlieri Moretti, 1981 (N, S) (E)
Wormaldia pulla pulla (McLachlan, 1878) (N)
Wormaldia subnigra McLachlan, 1865 (N)
Wormaldia triangulifera McLachlan, 1878 (N, S)
Wormaldia variegata Mosely, 1930 (*)
Wormaldia variegata denisi Moretti, 1981 (S) (E)
Wormaldia variegata maclachlani Kimmins, 1953 (N) (E)
Wormaldia variegata variegata Mosely, 1930 (Sa)

Chimarra Stephens, 1829

Chimarra marginata (Linnaeus, 1767) (N, S, Si, Sa)

Note

Philopotamus corsicanus: Presente anche in Corsica.

Philopotamus liguricus: In N nell'Appennino Ligure, in S nell'Appennino Toscano e Appennino Calabro.

Philopotamus montanus: La ssp. *siculus* in S nell'Appennino calabro-lucano.

Wormaldia copiosa: La ssp. *botosaneanui* in N nell'Appennino Emiliano, in S nell'Appennino Tosco-Umbro-Marchigiano.

Wormaldia mediana: La ssp. *nielsenii* in S nell'Appennino Calabro-Lucano, la ssp. *viganoi* nelle Alpi Piemontesi.

Wormaldia occipitalis: La ssp. *morettii* in N in Emilia-Romagna, in S in Toscana e Marche.

Wormaldia pulla: La ssp. *marlieri* in N solo in Emilia-Romagna.

Wormaldia variegata: Presente anche in Corsica. La ssp. *denisi* solo all'isola d'Elba, la ssp. *maclachlani* solo in Piemonte.

Hydropsychidae

Diplectronea Westwood, 1840

Diplectronea atra McLachlan, 1878 (N)
Diplectronea felix McLachlan, 1878 (N, S)
Diplectronea magna Mosely, 1930 (S) (*)

Hydropsyche Pictet, 1834

Hydropsyche angustipennis (Curtis, 1834) (N, S, Sa)
Hydropsyche bulgaromanorum Malicky, 1977 (N) (*)
Hydropsyche dinarica Marinkovic, 1979 (N, S)
Hydropsyche doehleri Tobias, 1972 (S, Si, Sa) (E) (*)
Hydropsyche fulvipes (Curtis, 1834) (Sa)
Hydropsyche fumata Tobias, 1972 (Sa) (*)

*Hydropsyche gerecke*i Cianficconi & Moretti, 1990 (Si) (E)
Hydropsyche guttata Pictet, 1834 (N) (*)
Hydropsyche instabilis (Curtis, 1834) (N, S, Si)
Hydropsyche klefbecki Tjeder, 1946 (S, Si) (E)
Hydropsyche modesta Navas, 1925 (N, S, Si)
Hydropsyche ornatula McLachlan, 1878 (N, S?) (*)
Hydropsyche pellucidula (Curtis, 1834) (N, S, Si, Sa)
Hydropsyche sattleri Tobias, 1972 (Sa) (E)
Hydropsyche saxonica McLachlan, 1884 (N) (*)
Hydropsyche siltalai Döhler, 1963 (N) (*)
Hydropsyche spiritoi Moretti, 1991 (N, S) (E)
Hydropsyche tenuis Navas, 1932 (N, S)

Cheumatopsyche Wallengren, 1891

Cheumatopsyche lepida (Pictet, 1834) (N, S, Si, Sa)

Note

Diplectrona magna: In S anche all'Isola d'Elba.
Hydropsyche bulgaromanorum: Reperita solo in Emilia (F. Po).
Hydropsyche doehleri: In S solo in Calabria (Aspromonte).
Hydropsyche fumata: Presente anche in Corsica.
Hydropsyche guttata: In N in Friuli-Venezia Giulia.
Hydropsyche ornatula: In S presenza dubbia in Toscana.
Hydropsyche saxonica: In Friuli-Venezia Giulia.
Hydropsyche siltalai: In Piemonte e Lombardia.

Polycentropodidae

Neureclipsis McLachlan, 1864

Neureclipsis bimaculata (Linnaeus, 1758) (N)

Plectrocnemia Stephens, 1836

Plectrocnemia appennina McLachlan, 1884 (N, S)
Plectrocnemia brevis McLachlan, 1871 (S) (*)
Plectrocnemia conspersa (Curtis, 1834) (N, S)
Plectrocnemia geniculata McLachlan, 1871 (*)
 Plectrocnemia geniculata calabrica Malicky, 1971 (S) (E)
 Plectrocnemia geniculata corsicana Mosely, 1930 (N, S, Sa)
 Plectrocnemia geniculata factiosa Moretti, 1991 (Si) (E)
 Plectrocnemia geniculata geniculata McLachlan, 1871 (N)
Plectrocnemia praestans McLachlan, 1884 (N) (E) (*)

Polycentropus Curtis, 1835

Polycentropus divergens Mosely, 1930 (Si, Sa) (*)
Polycentropus excisus Klapalek, 1894 (N) (*)
Polycentropus flavomaculatus (Pictet, 1834) (N)
Polycentropus francavillensis Malicky, 1981 (Si) (E)
Polycentropus ichnusa Malicky, 1974 (Sa) (E)
Polycentropus irroratus Curtis, 1835 (N, S)
Polycentropus kingi McLachlan, 1881 (N, S)
Polycentropus malickyi Moretti, 1981 (S, Si) (E)
Polycentropus morettii Malicky, 1977 (N, S) (*)
Polycentropus mortoni Mosely, 1930 (N, S, Si, Sa) (*)
Polycentropus pirisinui Malicky, 1981 (N, S) (E) (*)
Polycentropus radaukles Malicky, 1977 (Sa) (E)
Polycentropus sardous Moretti, 1981 (Sa) (E)

***Holocentropus* McLachlan, 1878**

Holocentropus dubius (Rambur, 1842) (N) (*)
Holocentropus picicornis (Stephens, 1836) (N, S)
Holocentropus stagnalis (Albarda, 1874) (N, S)

***Cyrnus* Stephens, 1836**

Cyrnus crenaticornis (Kolenati, 1859) (N) (*)
Cyrnus insolutus McLachlan, 1878 (S)
Cyrnus trimaculatus (Curtis, 1834) (N, S)

Note

Plectrocnemia brevis: Reperita in Abruzzo (F. Vomano).
Plectrocnemia geniculata: La ssp. calabrica in Basilicata e Calabria; la ssp. corsicana presente anche in Corsica.
Plectrocnemia praestans: Nelle Alpi Occidentali.
Polycentropus divergens: Presente anche in Corsica.
Polycentropus excisus: Rinvenuto da Malicky (in litteris) in Friuli-Venezia Giulia.
Polycentropus morettii: In S solo in Toscana.
Polycentropus mortoni: Presente anche in Corsica.
Polycentropus pirisinui: In N nell'Appennino Emiliano, in S nell'Appennino Toscano.
Holocentropus dubius: In Emilia-Romagna.
Cyrnus crenaticornis: In Lombardia.

Psychomyidae

***Psychomyia* Latreille, 1829**

Psychomyia pusilla (Fabricius, 1781) (N, S, Sa)

Lype McLachlan, 1878

Lype phaeopa (Stephens, 1836)

Lype phaeopa meridionalis Moretti, 1991 (S, Si) (E)

Lype phaeopa phaeopa (Stephens, 1836) (N, S, Sa)

Lype reducta (Hagen, 1868) (N, S, Sa) (*)

Metalype Klapalek, 1898

Metalype fragilis (Pictet, 1834) (N)

Tinodes Curtis, 1834

Tinodes agaricinus Mosely, 1930 (Sa) (*)

Tinodes antonioi Botosaneanu & Viganò, 1974 (N, S) (E)

Tinodes apuanorum Moretti, 1981 (S) (E) (*)

Tinodes bruttius Moretti, 1981 (S) (E) (*)

Tinodes cinereus Hagen, 1865

Tinodes cinereus sardonius Moretti, 1991 (Sa) (E)

Tinodes cortensis Mosely, 1930 (Sa) (*)

Tinodes dives (Pictet, 1834) (*)

Tinodes dives consiglioi Botosaneanu, 1980 (N, S) (E)

Tinodes dives dives Pictet, 1834 (N)

Tinodes dives jeekeli Botosaneanu, 1980 (N)

Tinodes locuples McLachlan, 1878 (Si) (E)

Tinodes luscini Ris, 1903 (N)

Tinodes maclachlani Kimmins, 1966 (N, S, Si, Sa)

Tinodes maculicornis (Pictet, 1834) (N, S)

Tinodes maroccanus Mosely, 1938 (Si)

Tinodes pallidulus McLachlan, 1878 (N) (*)

Tinodes rostocki McLachlan, 1878 (N)

Tinodes sylvia Ris, 1903 (N, S) (*)

Tinodes unicolor (Pictet, 1834) (N, S)

Tinodes waeneri (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Tinodes zelleri McLachlan, 1878 (N)

Note

Lype reducta: In S anche all'Isola d'Elba.

Tinodes agaricinus: Presente anche in Corsica.

Tinodes apuanorum: Nelle Alpi Apuane.

Tinodes bruttius: In Calabria.

Tinodes cortensis: Presente anche in Corsica.

Tinodes dives: La ssp. consiglioi in N solo nell'Appennino Ligure e Romagnolo, la ssp. jeekeli nelle Prealpi Lombarde.

Tinodes pallidulus: In Friuli-Venezia Giulia.

Tinodes sylvia: In S in Abruzzo.

Ecnomidae

Ecnomus McLachlan, 1864

Ecnomus tenellus (Rambur, 1842) (N, S, Si, Sa)

Phryganeidae

Trichostegia Kolenati, 1848

Trichostegia minor (Curtis, 1834) (S)

Agrypnia Curtis, 1835

Agrypnia obsoleta Hagen, 1864 (N)

Agrypnia pagetana Curtis, 1835 (N)

Agrypnia varia (Fabricius, 1793) (N, S)

Phryganea Linnaeus, 1758

Phryganea bipunctata Retzius, 1783 (N)

Phryganea nattereri Brauer, 1873 (N, S)

Oligotricha Rambur, 1842

Oligotricha striata (Linnaeus, 1758) (N, S)

Oligostomis Kolenati, 1848

Oligostomis reticulata (Linnaeus, 1761) (N)

Brachycentridae

Brachycentrus Curtis, 1834

Brachycentrus montanus Klapalek, 1892 (N, S)

Brachycentrus subnubilus Curtis, 1834 (S)

Micrasema McLachlan, 1876

Micrasema minimum McLachlan, 1876 (N, S)

Micrasema morosum (McLachlan, 1868) (N, S)

Micrasema setiferum (Pictet, 1834)

Micrasema setiferum dolcinii Botosaneanu & Moretti, 1986 (S, Si) (E)

Micrasema togatum (Hagen, 1864) (S, Sa) (*)

Note

Micrasema togatum: In S solo all'Isola d'Elba. Presente anche in Corsica.

Limnephilidae

Apatania Kolenati, 1847

Apatania fimbriata (Pictet, 1834) (N)

Apatania volscorem Moretti, 1988 (S) (E) (*)

Drusus Stephens, 1837

Drusus alpinus Meyer-Dür, 1875 (N)

Drusus aprutiensis Moretti, 1981 (S) (E) (*)

Drusus biguttatus (Pictet, 1834) (N)

Drusus camerinus Moretti, 1981 (S) (E) (*)

Drusus chrysotus (Rambur, 1842) (N)

Drusus discolor (Rambur, 1842) (N, S) (*)

Drusus improvisus McLachlan, 1884 (N, S) (E) (*)

Drusus melanchaetes McLachlan, 1876 (N)

Drusus monticola McLachlan, 1876 (N)

Drusus muelleri McLachlan, 1868 (N) (*)

Drusus nigrescens Meyer-Dür, 1875 (N)

Drusus trifidus McLachlan, 1868 (N, S) (*)

Ecclisopteryx Kolenati, 1848

Ecclisopteryx guttulata (Pictet, 1834) (N, S)

Ecclisopteryx malickyi Moretti, 1991 (N) (E) (*)

Cryptothrix McLachlan, 1867

Cryptothrix nebulicola McLachlan, 1867 (N) (*)

Metanoea McLachlan, 1880

Metanoea flavipennis (Pictet, 1834) (N) (*)

Metanoea rhaetica Schmid, 1955 (N)

Leptodrusus Schmid, 1955

Leptodrusus budtzi (Ulmer, 1913) (Sa) (*)

Monocentra Rambur, 1842

Monocentra lepidoptera Rambur, 1842 (N, S) (E) (*)

Limnephilus Leach, 1815

Limnephilus affinis Curtis, 1834 (N, S)
Limnephilus auricola Curtis, 1834 (N, S) (*)
Limnephilus binotatus Curtis, 1834 (N)
Limnephilus bipunctatus Curtis, 1834 (N, S, Si, Sa)
Limnephilus borealis (Zetterstedt, 1840) (N) (*)
Limnephilus centralis Curtis, 1834 (N, S)
Limnephilus cianficconiae Malicky, 1980 (N, S, Si) (E) (*)
Limnephilus coenosus Curtis, 1834 (N)
Limnephilus extricatus McLachlan, 1865 (N, S) (*)
Limnephilus flavicornis (Fabricius, 1787) (N, S, Si)
Limnephilus flavospinosus Stein, 1874 (N, S)
Limnephilus griseus (Linnaeus, 1758) (N, S)
Limnephilus helveticus Schmid, 1965 (N, S)
Limnephilus hirsutus (Pictet, 1834) (N, S, Si, Sa)
Limnephilus ignavus McLachlan, 1865 (N, S)
Limnephilus italicus McLachlan, 1884 (N, S, Si) (*)
Limnephilus lunatus Curtis, 1834 (N, S, Si, Sa)
Limnephilus marmoratus Curtis, 1834 (S, Sa) (*)
Limnephilus rhombicus (Linnaeus, 1758)
 Limnephilus rhombicus reseri Malicky, 1985 (N, S)
 Limnephilus rhombicus rhombicus (Linnaeus, 1758) (N, S)
Limnephilus sericeus (Say, 1824) (N) (*)
Limnephilus sparsus Curtis, 1834 (N, S, Si)
Limnephilus stigma Curtis, 1834 (N)
Limnephilus subcentralis Brauer, 1857 (N)
Limnephilus vittatus (Fabricius, 1798) (N, S, Si, Sa)

Colpotaulius Kolenati, 1848

Colpotaulius incisus (Curtis, 1834) (S) (*)

Grammotaulius Kolenati, 1848

Grammotaulius nigropunctatus (Retzius, 1783) (N, S, Si)
Grammotaulius nitidus (O.F. Müller, 1764) (N) (*)

Glyphotaelius Stephens, 1833

Glyphotaelius pellucidus (Retzius, 1783) (N, S)

Anabolia Stephens, 1837

Anabolia lombarda Ris, 1897 (N)

Phacopteryx Kolenati, 1848

Phacopteryx brevipennis (Curtis, 1834) (N) (*)

Rhadicoleptus Wallengren, 1891

Rhadicoleptus alpestris (Kolenati, 1848) (N) (*)

Potamophylax Wallengren, 1891

Potamophylax cingulatus (Stephens, 1837)

Potamophylax cingulatus alpinus Tobias, 1994 (N)

Potamophylax gambaricus Malicky, 1971 (*)

Potamophylax gambaricus gambaricus Malicky, 1971 (S, Si) (E)

Potamophylax gambaricus spinulifer Moretti, 1994 (N, S) (E)

Potamophylax inermis Moretti & Cianficconi, 1994 (S) (E) (*)

Potamophylax nigricornis (Pictet, 1834) (N, S)

Acrophylax Brauer, 1867

Acrophylax zerberus Brauer, 1867 (N)

Leptotaulius Schmid, 1955

Leptotaulius gracilis Schmid, 1955 (N) (*)

Halesus Stephens, 1836

Halesus appenninus Moretti & Spinelli, 1981 (N, S) (E) (*)

Halesus calabrus Moretti & Spinelli, 1981 (S) (E) (*)

Halesus digitatus (Schränk, 1781) (N, S)

Halesus nurag Malicky, 1974 (Sa) (E)

Halesus radiatus (Curtis, 1834) (N)

Halesus rubricollis (Pictet, 1834) (N)

Halesus tessellatus (Rambur, 1842) (N) (*)

Melampophylax Schmid, 1955

Melampophylax melampus (McLachlan, 1876) (N, S)

Melampophylax vestinorum Moretti, 1991 (S) (E) (*)

Anisogamus McLachlan, 1874

Anisogamus difformis (McLachlan, 1867) (N)

Parachiona Thomson, 1891

Parachiona picicornis (Pictet, 1834) (N)

Enoicyla Rambur, 1842

Enoicyla costae McLachlan, 1876 (S, Si) (*)

Enoicyla pusilla (Burmeister, 1839) (N) (*)

Enoicyla reichenbachii (Kolenati, 1848) (N, S)

Stenophylax Kolenati, 1848

Stenophylax bischofi Malicky, 1992 (Si) (E)

Stenophylax crossotus McLachlan, 1884 (N, S, Si, Sa)

Stenophylax mitis McLachlan, 1875 (N, S, Si) (*)

Stenophylax mucronatus McLachlan, 1880 (N, S, Si) (*)

Stenophylax permistus McLachlan, 1895 (N, S, Si, Sa)

Stenophylax vibex (Curtis, 1834) (N, S)

Micropterna Stein, 1874

Micropterna fissa (McLachlan, 1875) (N, S, Si, Sa)

Micropterna lateralis (Stephens, 1837) (N, S)

Micropterna malaspina Schmid, 1957 (S) (*)

Micropterna malatesta Schmid, 1957 (Sa)

Micropterna nycterobia McLachlan, 1875 (N, S, Si, Sa)

Micropterna sequax McLachlan, 1875 (N, S, Si, Sa)

Micropterna testacea (Gmelin, 1789) (N, S, Si) (*)

Micropterna wageneri Malicky, 1971 (N, S) (*)

Mesophylax McLachlan, 1882

Mesophylax aspersus (Rambur, 1842) (N, S, Si, Sa)

Mesophylax impunctatus McLachlan, 1884 (N, Sa)

Mesophylax sardous Moretti & Cianficconi, 1983 (Sa) (E)

Allogamus Schmid, 1955

Allogamus antennatus (McLachlan, 1876) (N, S)

Allogamus auricollis (Pictet, 1834) (N)

Allogamus ausoniae Moretti, 1991 (N, S) (E) (*)

Allogamus botosaneanui Moretti, 1991 (N, S) (E) (*)

Allogamus hilaris (McLachlan, 1876) (*)

Allogamus hilaris hilaris (McLachlan, 1876) (N, S)

Allogamus hilaris silanus Moretti, 1991 (S) (E)

Allogamus illiesorum Botosaneanu, 1980 (Sa) (E)

Allogamus mendax (McLachlan, 1876) (N)

Allogamus uncatus (Brauer, 1857) (N, S) (*)

Consortophylax Schmid, 1955

Consorophylax consors (McLachlan, 1880) (N)
Consorophylax piemontanus Botosaneanu, 1967 (N) (E) (*)

Chaetopteryx Stephens, 1829

Chaetopteryx euganea Moretti & Malicky, 1986 (N) (E) (*)
Chaetopteryx fusca Brauer, 1857 (N) (*)
Chaetopteryx gessneri McLachlan, 1876 (*)
 Chaetopteryx gessneri gessneri McLachlan, 1876 (N)
 Chaetopteryx gessneri tomaszewskii Moretti, 1991 (N, S) (E)
Chaetopteryx trinacriae Botosaneanu, Cianficconi & Moretti, 1986 (Si) (E)
Chaetopteryx vulture Malicky, 1971 (S) (E) (*)

Pseudopsilopteryx Schmid, 1952

Pseudopsilopteryx zimmeri (McLachlan, 1876) (N)

Note

Apatania volscorem: Rinvenuta solo al Lago di Posta Fibreno (Lazio).
Drusus aprutiensis: Rinvenuto solo nella Piana Reatina e in Abruzzo.
Drusus camerinus: Nell'Appennino Umbro-Marchigiano.
Drusus discolor: In S in Toscana.
Drusus improvisus: In N in Emilia-Romagna, in S dalla Toscana all'Abruzzo.
Drusus muelleri: Nelle Alpi Occidentali.
Drusus trifidus: In N citata da Navás (1928) per la Liguria, in S segnalatoci da Botosaneanu per il Lazio (in litteris).
Ecclisopteryx malickyi: Rinvenuta solo in Trentino-Alto Adige.
Cryptothrix nebulicola: Nelle Alpi centro-occidentali.
Metanoea flavipennis: Nelle Alpi occidentali.
Leptodrusus budtzi: Noto anche in Corsica e Isole Baleari.
Monocentra: Genere monospecifico endemico italiano.
Monocentra lepidoptera: In N nelle Alpi occidentali e Appennino Ligure, in S nelle Alpi Apuane.
Limnephilus auricola: In N presente in Emilia-Romagna.
Limnephilus borealis: In Trentino-Alto Adige.
Limnephilus cianficconiae: In N in Emilia-Romagna.
Limnephilus extricatus: In S in Toscana.
Limnephilus italicus: In N in Emilia-Romagna.
Limnephilus marmoratus: In S in Toscana. Noto anche in Corsica.
Limnephilus sericeus: In Trentino-Alto Adige.
Colpotaulius incisus: Segnalato in Calabria.
Grammotaulius nitidus: In Veneto.
Phacopteryx brevipennis: Segnalato in Piemonte.
Rhadicleptus alpestris: In Lombardia.
Potamophylax gambaricus: In S in Basilicata e Calabria, la ssp. spinulifer in N in Emilia-Romagna, in S dalla Toscana al Molise.
Potamophylax inermis: Rinvenuto nel F. Velino (Lazio) e F. Nera (Marche).

Leptotaulius gracilis: In Trentino-Alto Adige.
Halesus appenninus: In N solo in Emilia-Romagna.
Halesus calabrus: In Basilicata e Calabria.
Halesus tessellatus: Noto solo in Lombardia.
Melampophylax vestinorum: Rinvenuto solo nel F. Tavo (Abruzzo).
Enoicyla: Caratterizzato dall'avere le larve terrestri e le femmine attere.
Enoicyla costae: In S dal Molise alla Calabria. Transadriatica.
Enoicyla pusilla: Solo in Piemonte.
Stenophylax mitis: Reperito in S anche all'Isola d'Elba e Capraia.
Stenophylax mucronatus: In S anche all'Isola d'Elba e Capraia.
Micropterna malaspina: Reperita solo in Molise e Puglia. Transionica.
Micropterna testacea: In S presente anche all'Isola Capraia.
Micropterna wageneri: In N in Emilia-Romagna, in S in Toscana. Transadriatica.
Allogamus ausoniae: In N in Emilia-Romagna.
Allogamus botosaneanui: In N nell'Appennino Ligure e Romagnolo, in S in Toscana.
Allogamus hiliaris: La ssp. *silanus* presente solo in Sila (Calabria).
Allogamus uncatus: In N nelle Alpi, in S solo in Toscana.
Conosorophylax piemontanus: Nelle Alpi Piemontesi.
Chaetopteryx euganea: Rinvenuta nei Colli Euganei.
Chaetopteryx fusca: In Friuli-Venezia Giulia.
Chaetopteryx gessneri: Nelle Alpi. La ssp. *tomaszewskii* in N solo in Emilia-Romagna, in S dalla Toscana al Molise.
Chaetopteryx vulture: In Basilicata e Calabria.

Goeridae

Goera Stephens, 1829

Goera pilosa (Fabricius, 1775) (N, S) (*)

Lithax McLachlan, 1876

Lithax niger (Hagen, 1859) (N)

Silo Curtis, 1830

Silo mediterraneus McLachlan, 1884 (*)

Silo mediterraneus mediterraneus McLachlan, 1884 (Sa) (E)

Silo mediterraneus saturniae Moretti, 1991 (S, Si) (E)

Silo nigricornis (Pictet, 1834) (N, S) (*)

Silo pallipes (Fabricius, 1781) (N)

Silo piceus (Brauer, 1857) (N)

Silo rufescens (Rambur, 1842) (S, Sa) (*)

Silonella Fischer, 1966

Silonella aurata (Hagen, 1864) (Sa)

Note

Goera pilosa: Segnalata in N in Lombardia, in S in Abruzzo.

Silo mediterraneus: La ssp. *saturniae* in S dalla Toscana alla Campania.

Silo nigricornis: In S in Basilicata e Calabria.

Silo rufescens: In S in Abruzzo; è presente anche in Corsica.

Thremmatidae

Thremma McLachlan, 1876

Thremma sardoum Costa, 1884 (Sa) (*)

Note

Thremma sardoum: Presente anche in Corsica.

Lepidostomatidae

Lepidostoma Rambur, 1842

Lepidostoma hirtum (Fabricius, 1775) (N, S) (*)

Lasiocephala A. Costa, 1857

Lasiocephala basalis (Kolenati, 1848) (N, S)

Crunoecia McLachlan, 1876

Crunoecia irrorata (Curtis, 1834) (*)

Crunoecia irrorata irrorata (Curtis, 1834) (N, S, Si)

Crunoecia irrorata sarda Malicky, 1981 (Sa) (E)

Note

Lepidostoma hirtum: In S anche all'Isola d'Elba.

Crunoecia irrorata: In S anche all'Isola d'Elba.

Leptoceridae

Athripsodes Billberg, 1820

Athripsodes albifrons (Linnaeus, 1758) (N, S)

Athripsodes aterrimus (Stephens, 1836) (N, S)

Athripsodes bilineatus (Linnaeus, 1758) (S, Si, Sa)
Athripsodes cinereus (Curtis, 1834) (N, S, Si)
Athripsodes genei Rambur, 1842 (Sa) (*)
Athripsodes leucophaeus (Rambur, 1842) (N)

Ceraclea Stephens, 1829

Ceraclea alboguttata (Hagen, 1860) (N)
Ceraclea aurea (Pictet, 1834) (N)
Ceraclea dissimilis (Stephens, 1836) (N, S, Sa)
Ceraclea fulva (Rambur, 1842) (N, S)
Ceraclea senilis (Burmeister, 1839) (N, S)

Mystacides Berthold, 1827

Mystacides azurea (Linnaeus, 1761) (N, S, Sa) (*)
Mystacides longicornis (Linnaeus, 1758) (N, S)
Mystacides nigra (Linnaeus, 1758) (N)

Triaenodes McLachlan, 1865

Triaenodes bicolor (Curtis, 1834) (N) (*)
Triaenodes conspersus (Rambur, 1842) (Si)
Triaenodes ochreellus McLachlan, 1877 (*)
Triaenodes ochreellus lefkas Malicky, 1974 (S)

Erotesis McLachlan, 1877

Erotesis baltica McLachlan, 1877 (S) (*)

Oecetis McLachlan, 1877

Oecetis furva (Rambur, 1842) (N, S) (*)
Oecetis lacustris (Pictet, 1834) (N, S) (*)
Oecetis notata (Rambur, 1842) (N, S)
Oecetis ochracea (Curtis, 1825) (N)
Oecetis testacea (Curtis, 1834) (N, S)
Oecetis tripunctata (Fabricius, 1793) (S) (*)

Setodes Rambur, 1842

Setodes argentipunctellus McLachlan, 1877 (N, S, Si, Sa) (*)
Setodes punctatus (Fabricius, 1793) (N, S) (*)
Setodes viridis (Fourcroy, 1785) (S) (*)

Leptocerus Leach, 1815

Leptocerus interruptus (Fabricius, 1775) (S) (*)

Leptocerus lusitanicus (McLachlan, 1884) (S) (*)
Leptocerus tineiformis Curtis, 1834 (N, S, Si, Sa)

Adicella McLachlan, 1877

Adicella cremisa Malicky, 1972 (N, S) (*)
Adicella filicornis (Pictet, 1834) (N, S) (*)
Adicella reducta (McLachlan, 1865) (N)

Note

Athripsodes genei: Presente anche in Corsica.
Mystacides azurea: In S anche all'Isola d'Elba.
Triaenodes bicolor: In Piemonte e Lombardia (risaie).
Triaenodes ochreellus: La ssp. *lefkas* solo in Puglia. Alofila. Transionica.
Erotesis baltica: Rinvenuto alle Fonti del Clitunno e al Lago di Piediluco (Umbria).
Oecetis furva: In S anche all'Isola d'Elba.
Oecetis lacustris: In S al Lago Trasimeno (Umbria).
Oecetis tripunctata: In S al F. Tevere (Umbria).
Setodes argentipunctellus: In S in Calabria.
Setodes punctatus: In S al F. Tevere (Umbria).
Setodes viridis: Nell'Appennino centrale.
Leptocerus interruptus: Segnalato in Abruzzo.
Leptocerus lusitanicus: Presente in Umbria (F. Paglia).
Adicella cremisa: In N in Friuli-Venezia Giulia, in S in Umbria (Marcite di Norcia).
Adicella filicornis: In S nelle Alpi Apuane.

Sericostomatidae

Sericostoma Latreille, 1825

Sericostoma cianficconii Moretti, 1978 (N, S) (E) (*)
Sericostoma galeatum Rambur, 1842 (N, S, Sa)
Sericostoma italicum Moretti, 1978 (S) (E) (*)
Sericostoma maclachlanianum A. Costa, 1884 (Sa) (E)
Sericostoma pedemontanum McLachlan, 1876 (N, S) (E) (*)
Sericostoma personatum (Kirby & Spence, 1876) (N, S)
Sericostoma siculum McLachlan, 1876 (S, Si) (E) (*)
Sericostoma subaequale McLachlan, 1898 (N) (E)
Sericostoma timidum Hagen, 1864 (N)
Sericostoma vittatum Rambur, 1842 (S) (*)

Note

Sericostoma cianficconii: In S nell'Appennino Tosco-Umbro-Marchigiano.
Sericostoma italicum: Rinvenuto dalla Toscana alla Puglia.
Sericostoma pedemontanum: In S nell'Appennino Tosco-Umbro-Marchigiano.

Sericostoma siculum: In S in Puglia, Basilicata, Calabria.
Sericostoma vittatum: Rinvenuto al Lago di Piediluco (Umbria).

Beraeidae

Beraea Stephens, 1833

Beraea aureomarginata Mosely, 1930 (Sa) (*)
Beraea botosaneanui Moretti, 1981 (Sa) (E)
Beraea crichtoni Moretti, 1981 (S) (E) (*)
Beraea dira McLachlan, 1875 (N)
Beraea iglesiensis Malicky, 1981 (Sa) (E)
Beraea ilvae Moretti, 1981 (S) (E) (*)
Beraea maurus Curtis, 1834 (N, S, Si) (*)
Beraea morettii Malicky, 1981 (Sa) (E)
Beraea pullata Curtis, 1834 (N)

Beraeodes Eaton, 1867

Beraeodes minutus (Linnaeus, 1761) (S) (*)

Ernodes Wallengren, 1891

Ernodes articularis (Pictet, 1834) (N, S) (*)
Ernodes botosaneanui Vaillant, 1982 (N)
Ernodes nigroauratus Mosely, 1930
 Ernodes nigroauratus nigroauratus Mosely, 1930 (N, S, Si)
 Ernodes nigroauratus siculum Malicky, 1981 (Si) (E)
Ernodes vicinus (McLachlan, 1879) (N)

Beraeodina Mosely, 1931

Beraeodina palpalis Mosely, 1931 (Sa)

Beraeamyia Mosely, 1930

Beraeamyia schmidi Botosaneanu, 1960 (N) (*)
Beraeamyia squamosa Mosely, 1930 (N, S, Si)

Note

Beraea aureomarginata: Presente anche in Corsica.
Beraea crichtoni: In Basilicata e Calabria.
Beraea ilvae: Presente solo all'Isola d'Elba.
Beraea maurus: In S anche all'Isola Capraia.
Beraeodes minutus: Rinvenuto alle Fonti del Clitunno e al Lago di Piediluco (Umbria).
Ernodes articularis: In S in Toscana e Umbria.

Beraeamyia schmidi: In Friuli-Venezia Giulia.

Helicopsychidae

Helicopsyche von Siebold, 1856

Helicopsyche revelieri McLachlan, 1884 (Sa) (*)

Helicopsyche sperata McLachlan, 1876 (N, S, Si) (E) (*)

Note

Helicopsyche revelieri: In S all'Isola Capraia. Presente anche in Corsica.

Helicopsyche sperata: In S anche all'Isola d'Elba.

Odontoceridae

Odontocerum Leach, 1815

Odontocerum albicorne (Scopoli, 1769) (N, S, Si) (*)

Note

Odontocerum albicorne: In S anche all'Isola d'Elba.

Lepidoptera

Micropterigidae

Micropterix Hübner, [1825]

Micropterix aglaella Duponchel, 1840 (N)

Micropterix allionella (Fabricius, 1794) (N)

Micropterix aruncella (Scopoli, 1763) (N, S)

Micropterix aureatella (Scopoli, 1763) (N?) (*)

Micropterix aureoviridella (Höfner, 1898) (N)

Micropterix calthella (Linnaeus, 1761) (N, S)

Micropterix completella Staudinger, 1870 (Sa) (E)

Micropterix emiliensis Viette, 1950 (N) (E)

Micropterix ertella Walsingham, 1919 (Si) (E)

Micropterix fenestrellensis Heath & Kaltenbach, 1984 (N) (E)

Micropterix garganoensis Heath, 1960 (S) (E)

Micropterix hartigi Heath, 1981 (S) (E)

Micropterix isobasella Staudinger, 1870 (N)

Micropterix italica Heath, 1981 (S) (E)

Micropterix jacobella Walsingham, 1901 (Si?) (*)
Micropterix mansuetella Zeller, 1844 (N)
Micropterix myrtetella Zeller, 1850 (S)
Micropterix osthelderi Heath, 1975 (N)
Micropterix paykullella (Fabricius, 1794) (N)
Micropterix rablensis Zeller, 1868 (N)
Micropterix rothenbachii Frey, 1856 (N, S, Si)
Micropterix schaefferi Heath, 1975 (N)
Micropterix sicanella Zeller, 1847 (S, Si)
Micropterix trifasciella Heath, 1965 (N) (E)
Micropterix tuscaniensis Heath, 1960 (S) (E)
Micropterix uxor Walsingham, 1919 (Si) (E)
Micropterix vulturensis Heath, 1981 (S) (E)
Micropterix wockei Staudinger, 1871 (N, S)
Micropterix zangheriella Heath, 1963 (S) (E)

Note

Micropterix aureatella: La presenza in Italia di aureatella richiede ulteriore conferma.

Micropterix jacobella: La presenza in Italia (Sicilia; Mariani, 1938) di jacobella è dubbia; la specie è altrimenti nota solo per il Nord Africa (Tunisia e Marocco).

Eriocraniidae

Dyseriocrania Spuler, 1910

Dyseriocrania subpurpurella (Haworth, 1828) (N, Si)

Paracrania Zagulajev, 1992

Paracrania chrysolepidella (Zeller, 1851) (N)

Eriocrania Zeller, 1851

Eriocrania sparrmannella (Bosc, 1791) (N)

Eriocrania cicatricella (Zetterstedt, 1839) (N)

Eriocrania semipurpurella (Stephens, 1835) (S?) (*)

Note

Eriocrania semipurpurella: La segnalazione di semipurpurella per l' Italia centrale (Mariani, 1943) richiede ulteriore conferma.

Hepialidae

Gazoryctra Hübner, 1820

Gazoryctra ganna (Hübner, 1808) (N)

Triodia Hübner, 1820

Triodia sylvina (Linnaeus, 1761) (N, S, Si, Sa?) (*)

Korscheltellus Börner, 1932

Korscheltellus lupulinus (Linnaeus, 1761) (N, S, Si)

Pharmacis Hübner, 1820

Pharmacis aemiliana (Costantini, 1911) (N, S) (E)

Pharmacis anselminae (Teobaldelli, 1977) (N) (E)

Pharmacis carna ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N)

Pharmacis claudiae Kristal, Hirnheisen & Steiner, 1994 (N) (E)

Pharmacis fusconebulosa (De Geer, 1778) (N, S?, Si?) (*)

Phymatopus Wallengren, 1869

Phymatopus hectus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)

Hepialus Fabricius, 1775

Hepialus humuli (Linnaeus, 1758) (N)

Note

Triodia sylvina: Mariani cita per la Sicilia *Triodia amasina* (Herrich-Schäffer, 1851). Nelle revisioni recenti la citazione non viene accolta e la specie si ritiene propria dei Balcani meridionali e Asia minore.

Pharmacis fusconebulosa: Le citazioni per l'Italia peninsulare e la Sicilia non sono ritenute valide dai recenti Autori (Zilli, 1988; Freina & Witt, 1990).

Nepticulidae

Simplimorpha Scoble, 1983

Simplimorpha promissa (Staudinger, 1870) (N, Si, Sa)

Stigmella Schrank, 1802

Stigmella aceris (Frey, 1857) (N, S)

Stigmella aeneofasciella (Herrich-Schäffer, 1855) (N) (*)

Stigmella alaternella (Le Marchand, 1937) (N, Si)

Stigmella alnetella (Stainton, 1856) (N, S, Sa)

Stigmella anomalella (Goeze, 1783) (N, S)
Stigmella assimilella (Zeller, 1848) (N) (*)
Stigmella atricapitella (Haworth, 1828) (N, S)
Stigmella aurella (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa)
Stigmella basiguttella (Heinemann, 1862) (N, S)
Stigmella betulicola (Stainton, 1856) (N) (*)
Stigmella carpinella (Heinemann, 1862) (N?, S?) (*)
Stigmella catharticella (Stainton, 1853) (N) (*)
Stigmella centifoliella (Zeller, 1848) (N, S)
Stigmella crataegella (Klimesch, 1936) (N, S) (*)
Stigmella desperatella (Frey, 1856) (N)
Stigmella dorsiguttella (Johansson, 1971) (N) (*)
Stigmella dryadella (Hofmann, 1868) (N)
Stigmella eberhardi (Johansson, 1971) (N, S, Sa)
Stigmella floslactella (Haworth, 1828) (N)
Stigmella freyella (Heyden, 1858) (N, Sa)
Stigmella glutinosae (Stainton, 1858) (N, S, Sa)
Stigmella hemargyrella (Kollar, 1832) (N, S)
Stigmella hybnerella (Hübner, 1813) (N, S)
Stigmella incognitella (Herrich-Schäffer, 1855) (N, S, Sa)
Stigmella lapponica (Wocke, 1862) (N)
Stigmella lemniscella (Zeller, 1839) (N)
Stigmella lonicerarum (Frey, 1856) (N) (*)
Stigmella luteella (Stainton, 1857) (N)
Stigmella magdalenae (Klimesch, 1950) (N) (*)
Stigmella malella (Stainton, 1854) (N, S)
Stigmella mespilicola (Frey, 1856) (N)
Stigmella microtheriella (Stainton, 1854) (N, S, Sa)
Stigmella minusculella (Herrich-Schäffer, 1855) (N, S) (*)
Stigmella myrtillella (Stainton, 1857) (N) (*)
Stigmella naturnella (Klimesch, 1936) (N)
Stigmella nivenburgensis (Priessecker, 1942) (N)
Stigmella nylandriella (Tengström, 1848) (N) (*)
Stigmella obliquella (Heinemann, 1862) (N)
Stigmella oxyacanthella (Stainton, 1854) (N) (*)
Stigmella paliurella (Klimesch, 1940) (N)
Stigmella pallidiciliella Klimesch, 1946 (N)
Stigmella paradoxa (Frey, 1858) (N, Sa) (*)
Stigmella perpygmaeella (Doubleday, 1859) (N, Sa)
Stigmella plagicolella (Stainton, 1854) (N, S, Sa)
Stigmella poterii (Stainton, 1857) (N) (*)
Stigmella prunetorum (Stainton, 1855) (N, S)
Stigmella pyri (Glitz, 1865) (N, S)
Stigmella regiella (HerrichSchäffer, 1855) (N, S)
Stigmella rhamnella (HerrichSchäffer, 1860) (N)
Stigmella roborella (Johansson, 1971) (N, Sa)
Stigmella rolandi van Nieukerken, 1990 (N, S, Sa)
Stigmella ruficapitella (Haworth, 1828) (N) (*)

Stigmella sakhalinella Puplesis, 1984 (N)
Stigmella salicis (Stainton, 1854) (N, Sa)
Stigmella samiatella (Zeller, 1839) (N, S)
Stigmella sorbi (Stainton, 1861) (N) (*)
Stigmella speciosa (Frey, 1857) (N)
Stigmella splendidissimella (Herrich-Schäffer, 1855) (N)
Stigmella stelviana (Weber, 1938) (N)
Stigmella suberivora (Stainton, 1869) (N, S, Sa)
Stigmella svenssoni (Johansson, 1971) (N)
Stigmella thuringiaca (Petry, 1904) (N)
Stigmella tiliae (Frey, 1856) (N, S)
Stigmella tityrella (Stainton, 1854) (N, S)
Stigmella tormentillella (Herrich-Schäffer, 1860) (N)
Stigmella trimaculella (Haworth, 1828) (N, S, Sa)
Stigmella ulmivora (Fologne, 1860) (N, Sa)
Stigmella vimineticola (Frey, 1856) (N)
Stigmella viscerella (Stainton, 1853) (N, S, Si)
Stigmella zangherii (Klimesch, 1951) (N, S)
Stigmella sp. (N, S) (*)

***Acalyptris* Meyrick, 1921**

Acalyptris minimella (Rebel, 1924) (S, Si) (*)
Acalyptris platani (Müller-Rutz, 1934) (N)

***Trifurcula (Glaucolepis)* Braun, 1917**

Trifurcula (Glaucolepis) bupleurella (Chrétien, 1907) (Si) (*)
Trifurcula (Glaucolepis) globulariae Klimesch, 1975 (N) (*)
Trifurcula (Glaucolepis) headleyella (Stainton, 1854) (N, S) (*)
Trifurcula (Glaucolepis) melanoptera van Nieukerken & Puplesis, 1991 (S, Sa)
Trifurcula (Glaucolepis) satirejae (Parenti, 1963) (N, S)
Trifurcula (Glaucolepis) stoechadella (Klimesch, 1975) (N) (*)

***Trifurcula (Levarchama)* Beirne, 1945**

Trifurcula (Levarchama) cryptella (Stainton, 1856) (N)
Trifurcula (Levarchama) eurema (Tutt, 1899) (N, S, Sa)

***Trifurcula (Trifurcula)* Zeller, 1848**

Trifurcula (Trifurcula) aurella Rebel, 1933 (N)
Trifurcula (Trifurcula) immundella (Zeller, 1839) (N) (*)
Trifurcula (Trifurcula) josefklimeschi van Nieukerken, 1990 (N, S)
Trifurcula (Trifurcula) orientella Klimesch, 1953 (N) (*)
Trifurcula (Trifurcula) pallidella (Duponchel, [1843]) (N)
Trifurcula (Trifurcula) silviae van Nieukerken, 1990 (N) (*)
Trifurcula (Trifurcula) subnitidella (Duponchel, 1843) (N, S)

Paraformoria Borkowski, 1975

- Paraformoria helianthemella* (Herrich-Schäffer, 1860) (N)
- Paraformoria liguricella* (Klimesch, 1946) (N)
- Paraformoria pseudocistivora* van Nieukerken, 1983 (N, Si?)

Ectoedemia (Etainia) Beirne, 1945

- Ectoedemia (Etainia) albibimaculella* (Larsen, 1927) (N) (*)
- Ectoedemia (Etainia) lousella* (Sircom, 1849) (N) (*)
- Ectoedemia (Etainia) sericopeza* (Zeller, 1839) (N, S)
- Ectoedemia (Etainia) sp.* (N) (*)

Ectoedemia (Laqueus) Scoble, 1983

- Ectoedemia (Laqueus) euphorbiella* (Stainton, 1869) (N, Si)
- Ectoedemia (Laqueus) tergestina* (Klimesch, 1940) (N)
- Ectoedemia (Laqueus) vincamajorella* (Hartig, 1964) (S) (E)

Ectoedemia (Fomoria) Beirne, 1945

- Ectoedemia (Fomoria) groschkei* (Skala, 1943) (N, Si)
- Ectoedemia (Fomoria) septembrella* (Stainton, 1849) (N, S, Sa)
- Ectoedemia (Fomoria) viridissimella* (Caradja, 1920) (N) (*)
- Ectoedemia (Fomoria) weaveri* (Stainton, 1855) (N)

Ectoedemia (Zimmermannia) Hering, 1940

- Ectoedemia (Zimmermannia) amani* Svensson, 1966 (N) (*)
- Ectoedemia (Zimmermannia) atrifrontella* (Stainton, 1851) (N, S)
- Ectoedemia (Zimmermannia) liebwerdella* (Zimmermann, 1940) (S)
- Ectoedemia (Zimmermannia) liguricella* Klimesch, 1953 (N)
- Ectoedemia (Zimmermannia) longicaudella* Klimesch, 1953 (N, S)

Ectoedemia (Ectoedemia) Busck, 1907

- Ectoedemia (Ectoedemia) agrimoniae* (Frey, 1858) (S) (*)
- Ectoedemia (Ectoedemia) albifasciella* (Heinemann, 1871) (N, S)
- Ectoedemia (Ectoedemia) angulifasciella* (Stainton, 1849) (N, S)
- Ectoedemia (Ectoedemia) arcuatella* (Herrich-Schäffer, 1855) (N) (*)
- Ectoedemia (Ectoedemia) argyropeza* (Zeller, 1839) (N)
- Ectoedemia (Ectoedemia) atricollis* (Stainton, 1857) (N, S)
- Ectoedemia (Ectoedemia) caradjai* (Groschke, 1944) (N, S, Si)
- Ectoedemia (Ectoedemia) cerris* (Zimmermann, 1944) (S)
- Ectoedemia (Ectoedemia) contorta* van Nieukerken, 1985 (N) (*)
- Ectoedemia (Ectoedemia) erythrogenella* (Joannis, 1908) (N, S, Si)
- Ectoedemia (Ectoedemia) gilvipennella* (Klimesch, 1946) (N)

Ectoedemia (Ectoedemia) hannoverella (Glitz, 1872) (N)
Ectoedemia (Ectoedemia) haraldi (Soffner, 1942) (N)
Ectoedemia (Ectoedemia) heringella (Mariani, 1939) (S, Si)
Ectoedemia (Ectoedemia) heringi (Toll, 1934) (N, S)
Ectoedemia (Ectoedemia) intimella (Zeller, 1848) (N)
Ectoedemia (Ectoedemia) klimeschi (Skala, 1933) (N)
Ectoedemia (Ectoedemia) mahalebella (Klimesch, 1936) (N, S)
Ectoedemia (Ectoedemia) minimella (Zetterstedt, 1839) (N)
Ectoedemia (Ectoedemia) occultella (Linnaeus, 1767) (N, Si)
Ectoedemia (Ectoedemia) phyllotomella (Klimesch, 1946) (N, S)
Ectoedemia (Ectoedemia) preisseckeri (Klimesch, 1941) (S) (*)
Ectoedemia (Ectoedemia) pubescivora (Weber, 1937) (N, Si, Sa)
Ectoedemia (Ectoedemia) quinquella (Bedell, 1848) (N)
Ectoedemia (Ectoedemia) rubivora (Wocke, 1860) (N, S)
Ectoedemia (Ectoedemia) rufifrontella (Caradja, 1920) (N)
Ectoedemia (Ectoedemia) spinosella (Joannis, 1908) (N, S)
Ectoedemia (Ectoedemia) subbimaculella (Haworth, 1828) (N, S, Si)
Ectoedemia (Ectoedemia) suberis (Stainton, 1869) (Si?, Sa)
Ectoedemia (Ectoedemia) turbidella (Zeller, 1848) (N)

Note

Stigmella aeneofasciella: Conosciuta solo dalle mine, identificazione da confermare.
Stigmella assimilella: Conosciuta solo dalle mine, identificazione attendibile.
Stigmella betulicola: Conosciuta solo dalle mine, da confermare in allevamento.
Stigmella carpinella: Identificazione incerta sulla base delle mine, da confermare.
Stigmella catharticella: Conosciuta solo dalle mine, identificazione attendibile.
Stigmella crataegella: Conosciuta solo dalle mine, identificazione attendibile.
Stigmella dorsiguttella: Specie nuova per l'Italia: Pralormo (Torino), leg. Delmastro, coll. Baldizzone.
Stigmella lonicerarum: Conosciuta solo dalle mine, identificazione attendibile.
Stigmella magdalenae: Conosciuta solo dalle mine, identificazione attendibile.
Stigmella minusculella: Conosciuta solo dalle mine, identificazione attendibile.
Stigmella myrtillella: Conosciuta solo dalle mine, identificazione attendibile.
Stigmella nylandriella: Conosciuta solo dalle mine, identificazione attendibile.
Stigmella oxyacanthella: Conosciuta solo dalle mine, identificazione attendibile.
Stigmella paradoxa: Conosciuta solo dalle mine, identificazione attendibile.
Stigmella poterii: Nuova per l'Italia: Tramonti di Sopra (Pordenone), leg. van Nieukerken; Caselette (Torino), leg. Parenti.
Stigmella ruficapitella: Vecchi reperti di ruficapitella non sono attendibili, essi vanno riferiti a diverse specie ospiti delle quercie. Il primo dato attendibile si trova in Borkowski (1972: Polskie Pismo ent. 42: 785).
Stigmella sorbi: Conosciuta solo dalle mine, identificazione attendibile.
Stigmella sp.: Precedentemente confusa con *S. floslactella*. Principalmente trovata su *Ostrya* (Johansson in prep.).
Acalyptis minimella: Nuova per l'Italia continentale: Lucania, Tursi: coll. Bassi.
Trifurcula (Glaucolepis) bupleurella: Raccolta in Sicilia da Klimesch.
Trifurcula (Glaucolepis) globulariae: Nuova per l'Italia: Mendel (Bolzano), Monte Ragogna

(Udine), leg. Huemer (TMAB).

Trifurcula (Glaucolepis) headleyella: Nuova per l'Italia: Monti di Tolfa (Lazio) leg. Baldizzone, diverse località di Piemonte e Veneto, leg. Parenti, van Nieuwerkerken e Bassi.

Trifurcula (Glaucolepis) stoechadella: Nuova per l'Italia: Conna (Savona), leg. Baldizzone.

Trifurcula (Trifurcula) immundella: La vera immundella potrebbe essere assente in Italia; una forma ospite di Calycotome, comune in Liguria, probabilmente è una specie separata.

Trifurcula (Trifurcula) orientella: Nuova per l'Italia: Conna (Savona), leg. van Nieuwerkerken (e.l. Genista germanica) (RMNH)(anche van Nieuwerkerken, 1990).

Trifurcula (Trifurcula) silviae: Nuova per l'Italia: Monpantero, Mt. Rocciamelone, leg. Bassi.

Ectoedemia (Etainia) albibimaculella: Trovata ad Aosta e Trento (Johansson et al. 1990).

Ectoedemia (Etainia) lousella: Conosciuta solo dalle mine. L'identificazione è attendibile.

Ectoedemia (Etainia) sp.: Specie da descrivere. Nota dal sud della Francia e dal Piemonte (van Nieuwerkerken in prep.).

Ectoedemia (Fomoria) viridissimella: Nuova per l'Italia: Almese (Torino), leg. Parenti (RMNH).

Ectoedemia (Zimmermannia) amani: Specie nuova per l'Italia: Caramagna (Cuneo), leg. Delmastro, coll. Baldizzone.

Ectoedemia (Ectoedemia) agrimoniae: Nuova per l'Italia: Vacri (Abruzzi), leg. Parenti.

Ectoedemia (Ectoedemia) arcuatella: Conosciuta dalle mine ed un possibile esemplare maschio da Giaglione (Valsusa), leg. Bassi.

Ectoedemia (Ectoedemia) contorta: Nuova per l'Italia: Cardona, Conna (Savona) leg. Baldizzone (coll. Baldizzone, RMNH).

Ectoedemia (Ectoedemia) preisseckeri: Ghisolfi considera questa specie nuova per l'Italia in una tesi di laurea non pubblicata (1983); la fotografia delle mine di preisseckeri su foglie di Ulmus, raccolte da Hartig, Monte Vulture (Lucania) conferma l'identificazione.

Opostegidae

Opostegoides Kozlov, 1985

Opostegoides menthinella (Mann, 1855) (Sa)

Opostega Zeller, 1839

Opostega salaciella (Treitschke, 1833) (N, S)

Opostega spatulella Herrich-Schäffer, 1855 (N, S, Si, Sa) (*)

Pseudopostega Kozlov, 1985

Pseudopostega crepusculella (Zeller, 1839) (N, S)

Note

Opostega spatulella: La sinonimia segue Johansson et al. (1990).

Heliozelidae

Heliozela Herrich-Schäffer, 1853

Heliozela lithargyrella (Zeller, 1850) (N, S, Si)

Heliozela sericiella (Haworth, 1828) (N, S, Si)

Antispila Hübner, 1825

Antispila treitschkiella (Fischer von Röslerstamm, 1843) (N)

Holocacista Walsingham & Durrant, 1909

Holocacista rivillei (Stainton, 1855) (N, S, Si)

Adelidae

Nematopogon Zeller, 1839

Nematopogon adansoniella (Villers, 1789) (N, S)

Nematopogon metaxella (Hübner, 1813) (N)

Nematopogon pilella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N)

Nematopogon prolai (Hartig, 1941) (S) (E)

Nematopogon robertella (Clerck, 1759) (N)

Nematopogon schwarziellus Zeller, 1839 (N, S)

Nematopogon sericinellus Zeller, 1847 (S, Si) (E)

Nematopogon swammerdamella (Linnaeus, 1758) (N, S)

Nemophora Illiger & Hoffmannsegg, 1798

Nemophora auricella (Ragonot, 1874) (N)

Nemophora barbatella (Zeller, 1847) (S, Si, Sa)

Nemophora congruella (Fischer von Röslerstamm, 1840) (N)

Nemophora cupriacella (Hübner, 1819) (N)

Nemophora degeerella (Linnaeus, 1758) (N, S)

Nemophora fasciella (Fabricius, 1775) (N)

Nemophora metallica (Poda, 1761) (N, Si)

Nemophora minimella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N)

Nemophora ochsenheimerella (Hübner, 1813) (N)

Nemophora raddella (Hübner, 1793)

Nemophora raddella latreillella (Fabricius, 1798) (S, Si)

Nemophora violella (Zeller, 1852) (N)

Adela Latreille, 1796

Adela albicinctella (Mann, 1852) (N)

Adela associatella Zeller, 1839 (N, S)

Adela australis Herrich-Schäffer, 1854 (N, S, Si)

Adela croesella (Scopoli, 1763) (N, S, Si)

Adela cuprella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)
Adela reaumurella (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)
Adela violella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N)

Cauchas Zeller, 1839

Cauchas exiguella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)
Cauchas leucocerella (Scopoli, 1763) (N)
Cauchas mazzolella (Hübner, 1796) (N, S)
Cauchas paludicolella (Zeller, 1850) (S, Sa)
Cauchas rufifrontella (Treitschke, 1833) (N, S)
Cauchas rufimitrella (Scopoli, 1763) (N, S)

Crinopterygidae

Crinopteryx de Peyerimhoff, 1871

Crinopteryx familiella de Peyerimhoff, 1871 (Si)

Incurvariidae

Incurvaria Haworth, 1828

Incurvaria koeneriella (Zeller, 1839) (N)
Incurvaria masculella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)
Incurvaria oehlmanniella (Hübner, 1796) (N, S)
Incurvaria pectinea Haworth, 1828 (N, S)
Incurvaria ploessli Huemer, 1993 (N)
Incurvaria praelatella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N)
Incurvaria stangei Rebel, 1903 (N)
Incurvaria triglavensis Hauder, 1912 (N)
Incurvaria vetulella (Zetterstedt, 1839) (N?) (*)

Paraclemensia Busck, 1982

Paraclemensia cyanella (Zeller, 1850) (N, S)

Alloclemensia Nielsen, 1981

Alloclemensia mesospilella (Herrich-Schäffer, 1854) (N, S)

Lampronia Stephens, 1829

Lampronia aeripennella Rebel, 1889 (N, S)
Lampronia corticella (Linnaeus, 1758) (N)
Lampronia flavimitrella (Hübner, 1817) (N)

Lampronia luzella (Hübner, 1817) (N, S)
Lampronia morosa Zeller, 1852 (N)
Lampronia provectella (Heyden, 1865) (N)
Lampronia pubicornis (Haworth, 1828) (Si)
Lampronia rupella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N)
Lampronia standfussiella (Zeller, 1839) (N)

Note

Incurvaria vetulella: Presenza in Italia da confermare (Huemer, 1993).

Tischeriidae

Tischeria Zeller, 1839

Tischeria decidua Wocke, 1876 (N, Si)
Tischeria dodonaea Stainton, 1858 (N, S)
Tischeria ekebladella (Bjerkander, 1895) (N, S, Sa)

Emmetia Leraut, 1993

Emmetia angusticolella (Duponchel, 1843) (N, S, Sa)
Emmetia gaunacella (Duponchel, 1843) (N, S)
Emmetia heinemanni Wocke, 1871 (N)
Emmetia marginea (Haworth, 1828) (N, S, Si, Sa)

Psychidae

Diplodoma Zeller, 1852

Diplodoma adpersella Heinemann, 1870 (N)
Diplodoma laichartingella (Goeze, 1783) (N)

Narycia Stephens, 1836

Narycia duplicella (Goeze, 1783) (N)

Dahlia Enderlein, 1912

Dahlia generosensis (Sauter, 1954) (N)
Dahlia klimeschi (Sieder, 1953) (N)
Dahlia leoi (Dierl, 1970) (N)
Dahlia lichenella (Linné, 1761) (N) (*)
Dahlia triquetrella (Hübner, 1813) (N) (*)

Siederia Meier, 1953

Siederia alpicolella (Rebel, 1919) (N)

Siederia meierella (Sieder, 1956) (N)

Siederia pineti (Zeller, 1852) (N)

Postsolenobia Meier, 1958

Postsolenobia juliella (Rebel, 1919) (N) (E)

Brevantennia Sieder, 1953

Brevantennia siederi (Sauter, 1954) (N)

Brevantennia triglavensis (Rebel, 1919) (N)

Taleporia Hübner, [1825]

Taleporia politella (Ochsenheimer, 1816)

Taleporia politella politella (Ochsenheimer, 1816) (N)

Taleporia politella clandestinella Zeller, 1852 (N)

Taleporia tubulosa (Retzius, 1783) (N)

Pseudobankesia Meier, 1963

Pseudobankesia alpestrella (Heinemann, 1870) (N)

Pseudobankesia contractella Hättenschwiler, 1994 (N)

Bankesia Tutt, 1899

Bankesia conspurcatella (Zeller, 1850) (S)

Sciopetris Meyrick, 1891

Sciopetris hartigi Sieder, 1976 (Sa)

Penestoglossa Rogenhofer, 1875

Penestoglossa dardoinella (Millière, 1865) (N, S, Sa)

Melasina Boisduval, 1840

Melasina ciliaris (Ochsenheimer, 1810) (N, S)

Luffia Tutt, 1899

Luffia lapidella (Goeze, 1783) (N) (*)

Bacotia Tutt, 1899

Bacotia claustralla (Bruand, 1845) (N)

Proutia Tutt, 1899

Proutia betulina (Zeller, 1839) (N)

Bruandia Tutt, 1900

Bruandia comitella (Bruand, 1853) (N)

Bruandia raiblensis (Mann, 1870) (N)

Bruandia reticulatella (Bruand, 1853) (N)

Psyche Schrank, 1801

Psyche casta (Pallas, 1767) (N, S, Si, Sa)

Psyche crassiorella (Bruand, [1851]) (N, S, Si, Sa)

Bijugis Heylaerts, 1881

Bijugis apistella (Rebel, 1917) (N)

Bijugis bombycella ([Denis & Schiffermüller], 1775)

Bijugis bombycella helvetica (Trautmann, 1914) (N)

Bijugis bombycella collina (Sieder, 1951) (N)

Bijugis bombycella lacteella (Dannehl, 1929) (N)

Bijugis pectinella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N)

Reisseronia Sieder, 1956

Reisseronia hofmanni (Heylaerts, 1879) (N)

Reisseronia tarnierella (Bruand, 1851) (N)

Montanima Sieder, 1949

Montanima karavankensis (Höfner, 1888) (N)

Montanima venetiana Meier, 1964 (N) (E)

Rebelia Heylaerts, 1900

Rebelia herrichiella Strand, 1912 (N)

Rebelia herrichiella claudiasolvensis Lindenbauer, 1941 (N)

Rebelia kruegeri Turati, 1914 (N)

Rebelia sapho (Millière, 1868) (N)

Rebelia surientella (Bruand, 1858) (N)

Rebelia thomanni Rebel, 1937 (N)

Epichnopterix Hübner, 1825

Epichnopterix alpina Heylaerts, 1900 (N)

Epichnopterix ardua Mann, 1867 (N)
Epichnopterix kovacsi Sieder, 1955 (N)
Epichnopterix montana Heylaerts, 1900 (N)
Epichnopterix pontbrillantella (Bruand, 1858) (N)
Epichnopterix plumella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N)

Oiketicoides Heylaerts, 1881

Oiketicoides febretta (Boyer de Fonscolombe, 1835) (Si)
Oiketicoides lutea (Staudinger, 1870) (N, S, Si)
Oiketicoides tedaldii (Heylaerts, 1881) (S, Si)

Acanthopsyche Heylaerts, 1881

Acanthopsyche atra (Linné, 1767) (N)
Acanthopsyche ecksteini (Lederer, 1855) (N)
Acanthopsyche zelleri (Mann, 1855) (N)

Canephora Hübner, 1822

Canephora unicolor (Hufnagel, 1766) (N, S)

Pachythelia Westwood, 1848

Pachythelia villosella (Ochsenheimer, 1810) (N, S, Si)

Oreopsyche Speyer, 1865

Oreopsyche tenella (Speyer, 1862) (N)
Oreopsyche vorbrodtella (Wehrli, 1920) (N)

Lepidoscioptera Dalla Torre, 1913

Lepidoscioptera dellabeffai Hartig, 1936 (N) (E)
Lepidoscioptera hirsutella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, Sa)
Lepidoscioptera plumistrella Hübner, 1793 (N)
Lepidoscioptera turatii Hartig, 1936 (N) (E)

Ptilocephala Rambur, 1866

Ptilocephala agrostidis (Schränk, 1802) (N)
Ptilocephala albida (Esper, 1776) (N)
Ptilocephala kahri (Lederer, 1857) (S, Si)
Ptilocephala muscella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N)
Ptilocephala plumifera (Ochsenheimer, 1810) (N) (*)
Ptilocephala pyrenaella (Herrich-Schäffer, 1852)
Ptilocephala pyrenaella falsevocata (Bourgogne, 1979) (N)
Ptilocephala sicheliella (Bruand, 1858) (N, S)

Ptilocephala silphella (Millière, 1871) (N)
Ptilocephala vesubiella (Millière, 1872) (N)
Ptilocephala wockei (Standfuss, 1882) (S) (E)

Megalophanes Heylaerts, 1881

Megalophanes turatii (Staudinger, 1877) (N)
Megalophanes viciella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)

Phalacropterix Hübner, 1825

Phalacropterix apiformis (Rossi, 1790)
Phalacropterix apiformis apiformis (Rossi, 1790) (N, S, Si)
Phalacropterix apiformis siculella (Bruand, 1852) (N, S, Si)
Phalacropterix graminifera (Geoffroy, 1785) (N)
Phalacropterix graslinella (Boisduval, 1852) (N)
Phalacropterix praezellens (Staudinger, 1870) (N)

Loebelia Pinker, 1956

Loebelia crassicornis (Staudinger, 1870) (S)

Sterrhopterix Hübner, 1825

Sterrhopterix fusca (Haworth, 1809) (N, S)
Sterrhopterix standfussi (Wocke, 1851) (N)

Apterona Millière, 1857

Apterona helicinella (Herrich-Schäffer, 1845) (S, Si)
Apterona helicoidella (Vallot, 1827) (N) (*)
Apterona stauderi (Wehrli, 1923) (S)

Eumasia Chrétien, 1904

Eumasia parietariella (Herrich-Schäffer, 1854) (N)

Note

Dahlica lichenella: Specie partenogenetica.

Dahlica triquetrella: È presente la forma partenogenetica tetraploide.

Luffia lapidella: Oltre alla forma bisessuata (*L. lapidella* s.str.), è presente anche la forma partenogenetica, conosciuta come *L. l. f. ferchaultella* (Stephens, 1850).

Ptilocephala plumifera: Sono presenti in Italia una forma geografica localizzata nelle Alpi occidentali meridionali (*P. plumifera* f. *mediterranea* (Lederer, 1852)) e una forma di alta quota (oltre i 3000 metri) (*f. valesiella* (Millière, 1867)).

Apterona helicoidella: Di questa specie sono presenti in Italia sia la forma partenogenetica (*A. helicoidella* (Vallot, 1827) s. str.), sia la forma bisessuata (*A. h. f. crenulella* (Bruand, 1853)).

Eriocottidae

Eriocottis Zeller, 1847

Eriocottis fuscanella Zeller, 1847 (S, Si, Sa) (E)

Tineidae

Rhodobates Ragonot, 1895

Rhodobates unicolor (Staudinger, 1870) (S, Si, Sa)

Euplocamus Latreille, 1809

Euplocamus anthracinalis (Scopoli, 1763) (N, S)

Montescardia Amsel, 1952

Montescardia tessulatella (Zeller, 1846) (N, Si)

Scardia Treitschke, 1830

Scardia boletella (Fabricius, 1794) (S)

Morophaga Herrich-Schäffer, 1854

Morophaga choragella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Sa)

Morophaga morella (Duponchel, 1838) (N, Sa)

Triaxomera Zagulajev, 1959

Triaxomera baldensis Petersen, 1983 (N)

Triaxomera marsica Petersen, 1984 (S)

Triaxomera parasitella (Hübner, 1796) (N, S, Si, Sa)

Archinemapogon Zagulajev, 1962

Archinemapogon yildizae Kocak, 1981 (N)

Nemaxera Zagulajev, 1964

Nemaxera betulinella (Fabricius, 1787) (N)

Nemapogon Schrank, 1802

Nemapogon agenjoi Petersen, 1959 (N, S)
Nemapogon clematella (Fabricius, 1781) (N, S)
Nemapogon cloacella (Haworth, 1828) (N, S)
Nemapogon granella (Linné, 1758) (N, S)
Nemapogon gravosaella Petersen, 1957 (S, Si, Sa)
Nemapogon hungarica Gozmány, 1960 (N, S, Sa)
Nemapogon inconditella (Lucas, 1956) (N, S, Sa)
Nemapogon nevadella (Caradja, 1920) (N, Sa)
Nemapogon picarella (Clerck, 1759) (N)
Nemapogon ruricolella (Stainton, 1859) (N, S, Sa)
Nemapogon sardica Gaedike, 1983 (Sa)
Nemapogon signatella Petersen, 1957 (S)
Nemapogon variatella (Clemens, 1859) (N, S)
Nemapogon wolffiella Karsholt & Schmidt Nielsen, 1976 (N)

Triaxomasia Zagulajev, 1964

Triaxomasia caprimulgella (Stainton, 1851) (N)

Neurothaumasia LeMarchand, 1934

Neurothaumasia ankerella (Mann, 1867) (N, Sa)
Neurothaumasia ragusaella (Wocke, 1889) (Si, Sa)

Tenaga Clemens, 1862

Tenaga nigripunctella (Haworth, 1828) (N, S)
Tenaga rhenania (Petersen, 1962) (N)

Eudarcia Clemens, 1880

Eudarcia brachyptera (Passerin d'Entrèves, 1974) (N)
Eudarcia confusella (Zeller, 1852) (N)
Eudarcia derrai Gaedike, 1983 (Sa)
Eudarcia granulatella (Herrich-Schäffer, 1854) (N)
Eudarcia hedemanni (Rebel, 1899) (N)
Eudarcia leopoldella (O.G. Costa, 1836) (N, S)
Eudarcia nerviella (Amsel, 1954) (N)
Eudarcia nigraella (Mariani, 1937) (N, S, Si)
Eudarcia romana Petersen, 1958 (S)
Eudarcia sardoa (Passerin d'Entrèves, 1978) (Sa)
Eudarcia vacriensis (Parenti, 1964) (S)
Eudarcia vinctella (Herrich-Schäffer, 1850) (N)

Infurcitinea Spuler, 1910

Infurcitinea albicomella (Stainton, 1851) (N, S)
Infurcitinea argentimaculella (Stainton, 1849) (N)

Infurcitinea atrifasciella (Staudinger, 1870) (N)
Infurcitinea belviella Gaedike, 1980 (Sa)
Infurcitinea captans Gozmány, 1960 (N)
Infurcitinea finalis Gozmány, 1959 (N, S)
Infurcitinea ignicomella (Zeller, 1852) (N, S)
Infurcitinea italica (Amsel, 1954) (N)
Infurcitinea klimeschi Passerin d'Entrèves, 1974 (N)
Infurcitinea parentii Petersen, 1964 (N, S)
Infurcitinea roesslerella (Heyden, 1865) (N)
Infurcitinea rumelicella (Rebel, 1903) (S)
Infurcitinea sardica (Amsel, 1951) (Sa)
Infurcitinea sardiniella Vari, 1842 (Sa)
Infurcitinea siciliana Petersen, 1964 (Si)
Infurcitinea teriolella (Amsel, 1954) (N, S)
Infurcitinea yildizae Kocak, 1981 (N)

Lichenotinea Petersen, 1957

Lichenotinea maculata Petersen, 1957 (S)
Lichenotinea pustulatella (Zeller, 1852) (N)

Novotinea Amsel, 1938

Novotinea carbonifera (Walsingham, 1900) (Sa)
Novotinea liguriella Amsel, 1950 (N)
Novotinea mistrettae Parenti, 1966 (Si)

Stenoptinea Dietz, 1905

Stenoptinea cyaneimarmorella (Millière, 1854) (N)

Karsholtia Gaedike, 1986

Karsholtia marianii (Rebel, 1936) (Si)

Agnathosia Amsel, 1954

Agnathosia propulsatella (Rebel, 1892) (N)

Myrmecozela Zeller, 1852

Myrmecozela ataxella (Chrétien, 1905) (N)
Myrmecozela ochraceella (Tengström, 1848) (N)

Crassicornella Agenjo, 1952

Crassicornella crassicornella (Zeller, 1847) (S, Si)

Ateliotum Zeller, 1839

Ateliotum hungaricellum Zeller, 1839 (N)
Ateliotum insulare (Rebel, 1896) (Si)
Ateliotum petrinellum (Herrich-Schäffer, 1854) (N, S)

Haplotinea Diakonoff & Hinton, 1956

Haplotinea ditella (Pierce & Diakonoff, 1938) (S)
Haplotinea insectella (Fabricius, 1794) (N)

Cephimallota Bruand, 1851

Cephimallota angusticostella (Zeller, 1839) (S)
Cephimallota crassiflavella Bruand, 1851 (N, S, Sa)

Reisserita Agenjo, 1952

Reisserita panormitanella (Mann, 1859) (Si, Sa)
Reisserita relicinella (Herrich-Schäffer, 1853) (N)

Fermocelina Hartig, 1950

Fermocelina gardesanella Hartig, 1950 (N, S)
Fermocelina liguriella (Millière, 1879) (N, S)

Trichophaga Ragonot, 1894

Trichophaga bipartitella (Ragonot, 1892) (N, Sa)
Trichophaga tapetzella (Linné, 1758) (N, S, Sa)

Tineola Herrich-Schäffer, 1853

Tineola bisselliella (Hummel, 1823) (N) (*)

Tinea Linné, 1758

Tinea basifasciella Ragonot, 1895 (N, S, Si, Sa)
Tinea columbariella Wocke, 1877 (N, S)
Tinea dubiella Stainton, 1859 (N, S, Si)
Tinea flavescens Haworth, 1828 (S)
Tinea messalina Robinson, 1979 (N)
Tinea murariella Staudinger, 1859 (N)
Tinea nonimella (Zagulajev, 1955) (N)
Tinea pallescentella Stainton, 1851 (N)
Tinea pellionella Linné, 1758 (N, S, Sa)
Tinea semifulvella Haworth, 1828 (N)
Tinea translucens Meyrick, 1917 (N, S, Si, Sa)

Tinea trinitella Thunberg, 1794 (N, S, Sa)

Niditinea Petersen, 1957

Niditinea fuscella (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)

Niditinea striolella Matsumura, 1931 (N, S)

Niditinea truncicolella (Tengström, 1848) (N)

Proterospastis Meyrick, 1937

Proterospastis merdella (Zeller, 1847) (Si)

Montetinea Petersen, 1957

Montetinea montana Petersen, 1957 (N)

Montetinea tenuicornella (Klimesch, 1942) (N)

Monopis Hübner, 1825

Monopis christophi Petersen, 1957 (Si)

Monopis crocicapitella (Clemens, 1859) (N, S, Si)

Monopis imella (Hübner, 1813) (N, S, Si, Sa)

Monopis laevigella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)

Monopis obviella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)

Monopis monachella (Hübner, 1796) (N)

Monopis nigricantella (Millière, 1872) (N, Sa)

Monopis weaverella (Scott, 1858) (N)

Note

Tineola bisselliella: Reperto da Verona segnalato da P. Triberti, in litteris.

Douglasiidae

Tinagma Zeller, 1839

Tinagma balteolellum (Fischer von Roeslerstamm, 1841) (N, S)

Tinagma dryadis Staudinger, 1872 (N)

Tinagma hedemanni (Caradja, 1920) (N)

Tinagma ocnestomellum (Stainton, 1850) (N, S, Si)

Tinagma perdicellum Zeller, 1839 (N)

Tinagma signatum Gaedike, 1991 (N)

Klimeschia Amsel, 1938

Klimeschia transversella (Zeller, 1839) (N)

Bucculatricidae

Bucculatrix Zeller, 1839

Bucculatrix absinthii Gärtner, 1865 (N, S)
Bucculatrix albedinella (Zeller, 1839) (N, S, Si?, Sa)
Bucculatrix albella Stainton, 1867 (N, S)
Bucculatrix albiguttella Millière, 1886 (S)
Bucculatrix alpina Frey, 1870 (N)
Bucculatrix argentisignella Herrich-Schäffer, 1855 (N)
Bucculatrix artemisiella Herrich-Schäffer, 1855 (N)
Bucculatrix atagina Wocke, 1876 (N)
Bucculatrix bechsteinella (Bechstein & Scharfenberg, 1805) (N, S)
Bucculatrix benacicolella Hartig, 1937 (N)
Bucculatrix bicolorella Chrétien, 1915 (S)
Bucculatrix cantabricella Chrétien, 1898 (N)
Bucculatrix cidarella (Zeller, 1839) (N, S, Si?, Sa)
Bucculatrix cristatella (Zeller, 1839) (N, S)
Bucculatrix demaryella (Duponchel, 1840) (N, S)
Bucculatrix fatigatella Heyden, 1863 (N)
Bucculatrix frangutella (Goeze, 1783) (N)
Bucculatrix gnaphaliella (Treitschke, 1833) (N, S, Si?, Sa)
Bucculatrix helychrysella Constant, 1890 (Sa)
Bucculatrix herbalbella Chrétien, 1915 (N)
Bucculatrix jugicola Wocke, 1876 (N)
Bucculatrix lavaterella Millière, 1865 (Si, Sa)
Bucculatrix leucanthemella Constant, 1895 (N)
Bucculatrix maritima Stainton, 1851 (N, S)
Bucculatrix nigricomella (Zeller, 1839) (N, S, Si?, Sa)
Bucculatrix noltei Petry, 1912 (N, S)
Bucculatrix ratisbonensis Stainton, 1861 (N)
Bucculatrix santolinella Walsingham, 1898 (Sa)
Bucculatrix telaviviella Amsel, 1935 (N, S)
Bucculatrix thoracella (Thunberg, 1794) (N, S)
Bucculatrix ulmella Zeller, 1848 (N, S, Si, Sa)
Bucculatrix ulmifoliae Hering, 1931 (N, S, Si?, Sa)

Roeslerstammiidae

Roeslerstammia Zeller, 1839

Roeslerstammia erxlebelli (Fabricius, 1787) (N, Sa) (*)

Note

Roeslerstammia erxlebelli: Mariani cita anche *R. pronubella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) della Dalmazia.

Gracillariidae

Gracillaria Haworth, 1828

Gracillaria syringella (Fabricius, 1794) (N, S, Si, Sa)

Caloptilia Hübner, 1825

Caloptilia alchimiella (Scopoli, 1763) (N, S)
Caloptilia azaleella (Brants, 1913) (N) (*)
Caloptilia columbaepennella (O.G. Costa, 1839) (S) (*)
Caloptilia coruscans (Walsingham, 1907) (N, S, Si, Sa?)
Caloptilia cuculipennella (Hübner, 1796) (N)
Caloptilia elongella (Linnaeus, 1761) (N)
Caloptilia falconipennella (Hübner, 1813) (N, S, Si?, Sa)
Caloptilia fidella (Reutti, 1853) (N)
Caloptilia fribergensis (Frizsche, 1871) (N)
Caloptilia hauderi (Rebel, 1906) (N)
Caloptilia hemidactylella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)
Caloptilia leucapennella (Stephens, 1835) (N, S, Si, Sa)
Caloptilia magnifica (Stainton, 1867) (N)
Caloptilia robustella Jäckh, 1972 (N, S, Si, Sa)
Caloptilia roscipennella (Hübner, 1796) (N, S, Si, Sa?)
Caloptilia rufipennella (Hübner, 1796) (N, S)
Caloptilia semifascia (Haworth, 1828) (N)
Caloptilia stigmatella (Fabricius, 1781) (N)

Aspilapteryx Spuler, 1910

Aspilapteryx inquinata Triberti, 1985 (N)
Aspilapteryx limosella (Duponchel, 1844) (N, S)
Aspilapteryx tringipennella (Zeller, 1839) (N, S, Si, Sa)

Calybites Hübner, 1822

Calybites auroguttella (Stephens, 1835) (N, S, Si, Sa)
Calybites phasianipennella (Hübner, 1813) (N, S, Si, Sa)
Calybites quadrisignella (Zeller, 1839) (N)

Aristaea Meyrick, 1907

Aristaea pavoniella (Zeller, 1847) (N)

Callisto Stephens, 1834

Callisto coffeella (Zetterstedt, 1839) (N)
Callisto denticulella (Thunberg, 1794) (N, S)

Parornix Spuler, 1910

Parornix acuta Triberti, 1980 (S, Si)
Parornix alpicola (Wocke, 1876) (N)
Parornix anglicella (Stainton, 1850) (N, S, Si, Sa)
Parornix anguliferella (Zeller, 1847) (N, S, Si, Sa)
Parornix atripalpella Wahlström, 1979 (N, Sa)
Parornix betulae (Stainton, 1854) (N)
Parornix carpinella (Frey, 1863) (N, S, Si, Sa)
Parornix devoniella (Stainton, 1850) (N, S)
Parornix fagivora (Frey, 1861) (N)
Parornix finitimella (Zeller, 1850) (N, S, Si?, Sa)
Parornix mixta Triberti, 1980 (N)
Parornix petiolella (Frey, 1863) (N)
Parornix pfaffenzelleri (Frey, 1856) (N)
Parornix scoticella (Stainton, 1850) (N)
Parornix szoecsi Gozmány, 1952 (Sa)
Parornix tenella (Rebel, 1919) (N, S, Si)
Parornix torquillella (Zeller, 1850) (N, S, Si, Sa)

Acrocercops Wallengren, 1881

Acrocercops brongniardella (Fabricius, 1798) (N, S, Si, Sa)

Dialectica Walsingham, 1897

Dialectica imperialella (Zeller, 1847) (N)
Dialectica scalariella (Zeller, 1850) (N, S, Si, Sa)

Sauterina Kuznetzov, 1979

Sauterina hofmanniella (Schleich, 1867) (N, S, Si?, Sa)

Spulerina Vari, 1961

Spulerina simploniella (F. von Röslerstamm, 1844) (N, S, Si, Sa)

Leucospilapteryx Spuler, 1910

Leucospilapteryx omissella (Stainton, 1848) (N, S?)

Parectopa Clemens, 1860

Parectopa ononidis (Zeller, 1839) (N, S)

Parectopa robiniella Clemens, 1863 (N, S) (*)

Micrurapteryx Spuler, 1910

Micrurapteryx kollariella (Zeller, 1839) (N, S, Si, Sa)

Ornixola Kuznetsov, 1979

Ornixola caudulatella (Zeller, 1839) (N)

Dextellia Triberti, 1986

Dextellia dorsilineella (Amsel, 1935) (S)

Cupedia Klimesch & Kumata, 1973

Cupedia cupediella (Herrich-Schäffer, 1855) (N)

Metriochroa Busck, 1900

Metriochroa latifoliella (Millière, 1886) (N, S, Si, Sa)

Phyllonorycter Hübner, 1822

Phyllonorycter abrasella (Duponchel, 1843) (N, S)

Phyllonorycter acaciella (Duponchel, 1843) (N, S)

Phyllonorycter acerifoliella (Zeller, 1839) (N, S)

Phyllonorycter agilella (Zeller, 1846) (N, S)

Phyllonorycter alpina (Frey, 1856) (N)

Phyllonorycter apparella (Herrich-Schäffer, 1855) (N)

Phyllonorycter baldensis Deschka, 1986 (N)

Phyllonorycter blaucardella (Fabricius, 1781) (S) (*)

Phyllonorycter cavella (Zeller, 1846) (N)

Phyllonorycter cerasicolella (Herrich-Schäffer, 1855) (N)

Phyllonorycter cerisolella (Peyerimhoff, 1872) (Sa)

Phyllonorycter comparella (Duponchel, 1843) (N, S, Si, Sa)

Phyllonorycter connexella (Zeller, 1846) (N)

Phyllonorycter coryli (Nicelli, 1851) (N, S)

Phyllonorycter corylifoliella (Hübner, 1796) (N, S, Si, Sa)

Phyllonorycter cydoniella (Fabricius, 1787) (N, S, Si, Sa)

Phyllonorycter cytissus (Amsel & Hartig, 1952) (Sa)

Phyllonorycter dalmatinella (Amsel, 1951) (N, S)

Phyllonorycter delitella (Duponchel, 1844) (N, S)

Phyllonorycter distentella (Zeller, 1846) (N)

Phyllonorycter dubitella (Herrich-Schäffer, 1855) (N)

Phyllonorycter emberizaepenella (Bouché, 1834) (N, S, Si?, Sa)

Phyllonorycter endryella (Mann, 1855) (Sa)

Phyllonorycter esperella (Goeze, 1783) (N, S)

Phyllonorycter fiumella (Krone, 1910) (N)
Phyllonorycter fraxinella (Zeller, 1846) (N, S, Si, Sa?)
Phyllonorycter froelichiella (Zeller, 1839) (N, S, Si?, Sa)
Phyllonorycter geniculella (Ragonot, 1874) (N, S)
Phyllonorycter harrisella (Linnaeus, 1761) (N, S)
Phyllonorycter heegeriella (Zeller, 1846) (N, S)
Phyllonorycter helianthemella (Herrich-Schäffer, 1861) (N, S, Si, Sa?)
Phyllonorycter hilairella (Zetterstedt, 1839) (N)
Phyllonorycter ilicifoliella (Duponchel, 1843) (N, S, Si, Sa?)
Phyllonorycter insignitella (Zeller, 1846) (N, S)
Phyllonorycter joviella (Constant, 1890) (N)
Phyllonorycter junoniella (Zeller, 1846) (N)
Phyllonorycter kleemannella (Fabricius, 1781) (N, S, Si?, Sa)
Phyllonorycter kUSDasi (Deschka, 1970) (N)
Phyllonorycter lantanella (Schrank, 1802) (N, S)
Phyllonorycter lautella (Zeller, 1846) (N)
Phyllonorycter leucographella (Zeller, 1850) (N)
Phyllonorycter maestingella (O.F. Müller, 1764) (N, S)
Phyllonorycter mespilella (Hübner, 1805) (N, S?, Si, Sa)
Phyllonorycter messaniella (Zeller, 1846) (N, S, Si, Sa)
Phyllonorycter millierella (Staudinger, 1871) (N)
Phyllonorycter monspessulanella (Fuchs, 1898) (N)
Phyllonorycter muelleriella (Zeller, 1839) (N)
Phyllonorycter nicellii (Stainton, 1851) (N, S)
Phyllonorycter nigrescentella (Logan, 1851) (N)
Phyllonorycter oxyacanthae (Frey, 1856) (N, S, Si, Sa)
Phyllonorycter parisiella (Wocke, 1848) (N, S)
Phyllonorycter pastorella (Zeller, 1846) (N)
Phyllonorycter phyllocytisi (Hering, 1936) (N)
Phyllonorycter platani (Staudinger, 1870) (N, S, Si, Sa)
Phyllonorycter platanoidella (Joannis, 1920) (N)
Phyllonorycter pomonella (Zeller, 1846) (N, S, Si, Sa)
Phyllonorycter populifoliella (Treitschke, 1833) (N, S)
Phyllonorycter quercifoliella (Zeller, 1839) (N, S)
Phyllonorycter rajella (Linnaeus, 1758) (N, S, Si?, Sa)
Phyllonorycter robiniella (Clemens, 1859) (N) (*)
Phyllonorycter roboris (Zeller, 1839) (N, S, Si, Sa?)
Phyllonorycter sagitella (Bjerkander, 1790) (N, S)
Phyllonorycter salicicolella (Sircom, 1848) (N)
Phyllonorycter salictella (Zeller, 1846) (N, S)
Phyllonorycter saportella (Duponchel, 1840) (N, S)
Phyllonorycter sardiniensis (Amsel, 1939) (Sa)
Phyllonorycter scabiosella (Douglas, 1853) (N)
Phyllonorycter schreberella (Fabricius, 1781) (N, S, Si?, Sa)
Phyllonorycter scitulella (Duponchel, 1843) (N, S)
Phyllonorycter scopariella (Zeller, 1846) (N, S)
Phyllonorycter sorbi (Frey, 1855) (N) (*)
Phyllonorycter staintoniella (Nicelli, 1853) (N, Sa)

Phyllonorycter stettinensis (Nicelli, 1852) (N)
Phyllonorycter strigulatella (Lienig & Zeller, 1846) (N)
Phyllonorycter suberifoliella (Zeller, 1850) (S)
Phyllonorycter sublautella (Stainton, 1869) (N, S)
Phyllonorycter tenerella (Joannis, 1915) (N, S)
Phyllonorycter trifasciella (Haworth, 1828) (N, S, Si?, Sa)
Phyllonorycter triflorella (Peyerimhoff, 1872) (S, Sa)
Phyllonorycter tristrigella (Haworth, 1828) (N)
Phyllonorycter ulicicolella (Stainton, 1851) (N, S?)
Phyllonorycter ulmifoliella (Hübner, 1817) (N)
Phyllonorycter viminetorum (Stainton, 1854) (N)
Phyllonorycter vulturella (Deschka, 1968) (N, S)

Note

Caloptilia azaleella: Introdotta in Italia inizi sec. XX; patria: Giappone.
Caloptilia columbaepennella: Specie di dubbia validità.
Parectopa robiniella: Introdotta in Italia metà sec. XX; patria: Nord America.
Phyllonorycter blaucardella: Al Nord è sostituita da altro taxon ancora in studio.
Phyllonorycter robiniella: Introdotta in Italia fine sec. XX; patria: Nord America.
Phyllonorycter sorbi: Sotto questo nome sono probabilmente compresi diversi taxa.

Phyllocnistidae

Phyllocnistis Zeller, 1848

Phyllocnistis labyrinthella (Bjerkander, 1790) (N, S, Si, Sa)
Phyllocnistis saligna (Zeller, 1839) (N, S, Si, Sa)
Phyllocnistis unipunctella (Stephens, 1834) (N, S)

Yponomeutidae

Scythropia Hübner, 1825

Scythropia crataegella (Linnaeus, 1767) (N, S, Sa)

Niphonympha Meyrick, 1914

Niphonympha albella (Zeller, 1847) (N, S, Si)

Yponomeuta Latreille, 1796

Yponomeuta cagnagella (Hübner, 1813) (N, S, Si, Sa)
Yponomeuta evonymella (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)
Yponomeuta irrorella (Hübner, 1796) (N, S)
Yponomeuta mahalebella Guenée, 1845 (N, S, Si)

Yponomeuta malinella Zeller, 1838 (N, S, Si, Sa)
Yponomeuta padella (Linnaeus, 1758) (N, S, Sa)
Yponomeuta plumbella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si)
Yponomeuta rorella (Hübner, 1796) (N, S, Si)
Yponomeuta sedella Treitschke, 1832 (N, S, Si)

Euhyponomeuta Toll, 1941

Euhyponomeuta stannella (Thunberg, 1794) (N)

Kessleria Nowicki, 1864

Kessleria albescens (Rebel, 1899) (N)
Kessleria alpicella (Stainton, 1851) (N)
Kessleria alternans (Staudinger, 1870) (N)
Kessleria caflischiella (Frey, 1880) (N)
Kessleria klimeschi Huemer & Tarmann, 1991 (N)
Kessleria nivescens Burmann, 1980 (N)
Kessleria petrobiella (Zeller, 1868) (N)
Kessleria saxifragae (Stainton, 1868) (N)

Paradoxus Millière, 1869

Paradoxus osyridella Millière, 1869 (Sa)

Parahyponomeuta Toll, 1941

Parahyponomeuta egregiella (Duponchel, 1838) (N, Sa)

Zelleria Stainton, 1849

Zelleria hepariella Stainton, 1849 (N, Si, Sa)
Zelleria oleastrella (Millière, 1864) (Si, Sa)

Pseudoswammerdamia Friese, 1960

Pseudoswammerdamia combinella (Hübner, 1786) (N, S, Si, Sa)

Swammerdamia Hübner, 1826

Swammerdamia caesiella (Hübner, 1796) (N, S, Si, Sa)
Swammerdamia compunctella (Herrich-Schäffer, 1855) (N)
Swammerdamia pyrella (de Villers, 1789) (N, S)

Paraswammerdamia Friese, 1960

Paraswammerdamia albicapitella (Scharfenberg, 1805) (N, Sa)
Paraswammerdamia conspersella (Tengström, 1848) (N)

Paraswammerdamia nebulella (Goeze, 1783) (N, Sa)

Cedestis Zeller, 1839

Cedestis gysselella Zeller, 1839 (N, S)

Cedestis subfasciella (Stephens, 1834) (N)

Ocnerostoma Zeller, 1847

Ocnerostoma piniariella Zeller, 1847 (N, S)

Prays Hübner, 1825

Prays citri Millière, 1873 (S, Si, Sa)

Prays fraxinella (Bjerkander, 1784) (N)

Prays oleae (Bernard, 1788) (N, S, Si, Sa)

Prays rustica Haworth, 1828 (N)

Atemelia Herrich-Schäffer, 1853

Atemelia torquatella (Lienig & Zeller, 1846) (N, S)

Argyresthiidae

Argyresthia Hübner, 1825

Argyresthia abdominalis Zeller, 1839 (N, S)

Argyresthia albistria (Haworth, 1828) (N, S, Sa)

Argyresthia amiantella Zeller, 1847 (N)

Argyresthia arcella (Fabricius, 1776) (N)

Argyresthia arceuthina Zeller, 1839 (N, S)

Argyresthia aurulentella Stainton, 1849 (N, Sa)

Argyresthia bergiella (Ratzeburg, 1840) (N)

Argyresthia bonnetella (Linnaeus, 1758) (N, S)

Argyresthia brockeella (Hübner, 1813) (N)

Argyresthia conjugella Zeller, 1839 (N, S)

Argyresthia dilectella Zeller, 1847 (N)

Argyresthia fundella (Fischer von Röslerstamm, 1835) (N)

Argyresthia glabratella (Zeller, 1847) (N)

Argyresthia goedartella (Linnaeus, 1758) (N)

Argyresthia helvetica Heinemann, 1877 (N)

Argyresthia illuminatella Zeller, 1839 (N)

Argyresthia laevigatella Herrich-Schäffer, 1855 (N)

Argyresthia praecocella Zeller, 1839 (N)

Argyresthia pruniella (Clerck, 1759) (N, Si, Sa)

Argyresthia pulchella Lienig & Zeller, 1846 (N)

Argyresthia pygmaeella [Denis & Schiffermüller], 1775 (N)

Argyresthia retinella Zeller, 1839 (N)
Argyresthia semifusca (Haworth, 1828) (N)
Argyresthia semitestacella (Curtis, 1833) (N)
Argyresthia sorbiella (Treitschke, 1833) (N, S)
Argyresthia spinosella Stainton, 1849 (N, Si, Sa)
Argyresthia submontana Frey, 1871 (N)
Argyresthia trifasciata (Staudinger, 1871) (N?)

Ypsolophidae

Phrealcia Chrétien, 1900

Phrealcia brevipalpella (Chrétien, 1900) (N)

Ypsolopha Latreille, 1796

Ypsolopha albiramella (Mann, 1861) (S?)
Ypsolopha alpella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (S, Si, Sa)
Ypsolopha asperella (Linnaeus, 1761) (N, S)
Ypsolopha dentella (Fabricius, 1775) (N, S, Si)
Ypsolopha falcella (Hübner, 1796) (N)
Ypsolopha horridella (Treitschke, 1835) (N)
Ypsolopha lucella (Fabricius, 1775) (N, Si?)
Ypsolopha mucronella (Scopoli, 1763) (N, Si, Sa)
Ypsolopha nemorella (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)
Ypsolopha parenthesella (Linnaeus, 1761) (N, S)
Ypsolopha persicella (Fabricius, 1787) (N)
Ypsolopha scabrella (Linnaeus, 1761) (N, S)
Ypsolopha sequella (Clerck, 1759) (N, S)
Ypsolopha sylvella (Linnaeus, 1767) (N)
Ypsolopha ustella (Clerck, 1759) (N, Si)
Ypsolopha vittella (Linnaeus, 1758) (N, S)

Ochsenheimeriidae

Ochsenheimeria Hübner, 1825

Ochsenheimeria taurella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si)
Ochsenheimeria urella Fischer von Röslerstamm, 1842 (N) (*)

Note

Ochsenheimeria urella: La specie citata come bisontella Zeller da Venturi (1933) è di fatto taurella.

Plutellidae

Plutella Schranck, 1802

- Plutella geniatella* Zeller, 1839 (N)
- Plutella porrectella* (Linnaeus, 1758) (N)
- Plutella xylostella* (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Rhigognostis Staudinger, 1857

- Rhigognostis annulatella* (Curtis, 1832) (N?, Si?, Sa?)
- Rhigognostis incarnatella* (Steudel, 1873) (N?)
- Rhigognostis senilella* (Zetterstedt, 1839) (N)

Eidophasia Stephens, 1842

- Eidophasia hufnagelli* (Zeller, 1839) (Si)
- Eidophasia messingiella* (Fischer von Röslerstamm, 1840) (N)
- Eidophasia syenitella* Herrich-Schäffer, 1854 (N?, Si)

Acrolepiidae

Digitivalva Gaedike, 1970

- Digitivalva arnicella* (Heyden, 1863) (N)
- Digitivalva eglanteriella* (Mann, 1855) (N, S, Sa)
- Digitivalva granitella* (Treitschke, 1833) (N) (*)
- Digitivalva pulicariae* (Klimesch, 1956) (N, S)
- Digitivalva occidentella* (Klimesch, 1956) (N, S, Sa)
- Digitivalva reticulella* (Hübner, 1796) (N)

Acrolepiopsis Gaedike, 1970

- Acrolepiopsis assectella* (Zeller, 1839) (N, S)
- Acrolepiopsis marcidella* (Curtis, 1850) (N, Sa)
- Acrolepiopsis vesperella* (Zeller, 1850) (N, S, Si, Sa)
- Acrolepiopsis tauricella* (Staudinger, 1870) (N)

Acrolepia Curtis, 1838

- Acrolepia autumnitella* Curtis, 1838 (N)

Note

Digitivalva granitella: Ci sono alcune segnalazioni dalla Sardegna in letteratura, ma tutti i reperti controllati appartengono a *occidentella*. A tutt'oggi non c'è prova della presenza di

questa specie in Sardegna.

Glyphipterygidae

Orthotelia Stephens, 1829

Orthotelia sparganella (Thunberg, 1788) (N)

Glyphipterix Hübner, 1825

Glyphipterix argyrogettella Ragonot, 1885 (N)

Glyphipterix bergstraesserella (Fabricius, 1781) (N)

Glyphipterix equitella (Scopoli, 1763)

Glyphipterix equitella crassilunella Rebel, 1916 (Sa)

Glyphipterix equitella equitella (Scopoli, 1763) (N, Si)

Glyphipterix forsterella (Fabricius, 1781) (N, S, Sa)

Glyphipterix fuscoviridella (Haworth, 1828) (N)

Glyphipterix gianelliella Ragonot, 1885 (N)

Glyphipterix haworthana (Stephens, 1934) (Si)

Glyphipterix heptaglyphella Le Marchand, 1925 (N, Sa)

Glyphipterix nicaeella Möschler, 1866 (N, S) (*)

Glyphipterix schoenicoella Boyd, 1859

Glyphipterix simplicella (Stephens, 1934) (N, S, Si, Sa)

Glyphipterix sulcosa Diakonoff, 1978 (Sa) (E)

Glyphipterix thrasonella (Scopoli, 1763) (N, S, Si)

Glyphipterix umbilici Hering, 1927 (Sa)

Note

Glyphipterix nicaeella: La specie viene citata genericamente dell'Italia da Diakonoff.

Heliodinidae

Heliodines Stainton, 1854

Heliodines roesella (Linnaeus, 1758) (N, S)

Bedelliidae

Bedellia Stainton, 1849

Bedellia ehikella Szöcs, 1967 (N, S, Si?, Sa)

Bedellia somnulentella (Zeller, 1847) (N, S, Si, Sa)

Lyonetiidae

Leucoptera Hübner, 1825

Leucoptera calycotomella Amsel, 1939 (S, Si, Sa)
Leucoptera coronillae Hering, 1933 (N, S, Sa)
Leucoptera cytisanthi Deschka, 1972 (N)
Leucoptera genistae (Hering, 1933) (N, S)
Leucoptera heringiella Toll, 1938 (N, S)
Leucoptera laburnella (Stainton, 1851) (N, S, Sa)
Leucoptera lotella (Stainton, 1859) (N, S)
Leucoptera lustratella (Herrich-Schäffer, 1855) (S)
Leucoptera malifoliella (O.G. Costa, 1836) (N, S)
Leucoptera spartifoliella (Hübner, 1813) (S, Si)
Leucoptera zancaeella (Zeller, 1848) (Si)

Paraleucoptera Heinrich, 1918

Paraleucoptera sinuella (Reutti, 1853) (N, S)

Phyllobrostis Staudinger, 1859

Phyllobrostis daphneella Staudinger, 1859 (N, S, Sa)
Phyllobrostis fregenella Hartig, 1941 (S, Si)
Phyllobrostis hartmanni Staudinger, 1867 (N)

Lyonetia Hübner, 1825

Lyonetia clerckella (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
Lyonetia prunifoliella (Hübner, 1796) (N, S)
Lyonetia pulveruntella Zeller, 1839 (N)

Pterolonchidae

Pterolonche Zeller, 1847

Pterolonche albescens Zeller, 1847 (N, S, Si, Sa)
Pterolonche dispersa Staudinger, 1859 (N, S, Sa)
Pterolonche pulverulenta Zeller, 1847 (N, Si)

Coleophoridae

Augasma Herrich-Schäffer, 1853

Augasma aeratella (Zeller, 1839) (N)

Metriotes Herrich-Schäffer, 1853

Metriotes lutarea (Haworth, 1828) (N)

Coleophora Hübner, 1822

Coleophora absinthii Heinemann & Wocke, 1877 (N, Si)
Coleophora acrisella Millière, 1872 (N, S)
Coleophora acutiphaga Baldizzone, 1982 (Sa)
Coleophora adelogrammella Zeller, 1849 (N, S)
Coleophora adjectella Hering, 1937 (N, Sa)
Coleophora adjunctella Hodgkinson, 1882 (N)
Coleophora adspersella Benander, 1939 (N, Sa)
Coleophora aethiops Heinemann & Wocke, 1877 (N) (E)
Coleophora afrosarda Baldizzone & Kaltenbach, 1983 (Sa)
Coleophora ahenella Heinemann & Wocke, 1877 (N)
Coleophora albella (Thunberg, 1788) (N, S)
Coleophora albicella Constant, 1885 (Sa)
Coleophora albicosta (Haworth, 1828) (Si)
Coleophora albicostella (Duponchel, 1842) (N)
Coleophora albidella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N)
Coleophora albineella Toll, 1960 (Sa)
Coleophora albitarsella Zeller, 1849 (N, S)
Coleophora albulae Frey, 1880 (N)
Coleophora alcyonipennella (Kollar, 1832) (N, S, Si)
Coleophora alnifoliae Barasch, 1934 (N, Sa)
Coleophora alticolella Zeller, 1849 (N, S)
Coleophora altivagella Toll, 1952 (N)
Coleophora amellivora Baldizzone, 1979 (N)
Coleophora arctostaphyli Meder, 1933 (N)
Coleophora argenteonivea Walsingham, 1907 (Sa)
Coleophora argentula (Stephens, 1834) (N, S)
Coleophora artemisicolella Bruand, [1855] (N)
Coleophora artemisiella Scott, 1861 (N)
Coleophora asteris Mühlig, 1864 (N, S)
Coleophora asthenella Constant, 1893 (S, Si, Sa)
Coleophora astragalella Zeller, 1849 (N)
Coleophora auricella (Fabricius, 1794) (N)
Coleophora badiipennella (Duponchel, 1843) (N)
Coleophora ballotella (Fischer von Roslerstamm, 1939) (N)
Coleophora barbaricina Baldizzone, 1980 (Sa) (E)
Coleophora bassii Baldizzone, 1989 (N) (E)
Coleophora bernoulliella (Goeze, 1783) (N, S, Si)
Coleophora betulella Heinemann & Wocke, 1877 (N)
Coleophora bifrondella Walsingham, 1891 (N)
Coleophora bilineatella Zeller, 1849 (N, S, Sa)
Coleophora bilineella Herrich-Schäffer, 1855 (N, Sa)

Coleophora binderella (Kollar, 1832) (N)
Coleophora breviscula Staudinger, 1880 (N)
Coleophora brunneosignata Toll, 1944 (Sa)
Coleophora caespititiella Zeller, 1839 (N, S, Sa)
Coleophora calebipennella Zeller, 1839 (N)
Coleophora calycotomella Stainton, 1869 (N, S, Si, Sa)
Coleophora cecidophorella Oudejans, 1972 (N)
Coleophora chamaedriella Bruand, [1852] (N, S, Sa)
Coleophora chiclanensis Hering, [1936] (Sa)
Coleophora chretieni Baldizzone, 1979 (Sa)
Coleophora chrysanthemi Hofmann, 1869 (N)
Coleophora ciconiella Herrich-Schäffer, 1855 (N)
Coleophora colutella (Fabricius, 1794) (N, S)
Coleophora congeriella Staudinger, 1859 (N, S)
Coleophora conspicuella Zeller, 1849 (N)
Coleophora conyzae Zeller, 1868 (N, S, Si, Sa)
Coleophora coracipennella (Hübner, 1796) (N, Si)
Coleophora coronillae Zeller, 1849 (N, S)
Coleophora corsicella Walsingham, 1898 (N)
Coleophora crepidinella Zeller, 1847 (Si, Sa)
Coleophora curripennella Zeller, 1839 (N, S)
Coleophora cyrniella Rebel, 1926 (N, S, Sa)
Coleophora cytisanthi Baldizzone, 1978 (N) (E)
Coleophora deauratella Lienig & Zeller, 1846 (N, S, Si, Sa)
Coleophora dentiferella Toll, 1952 (N)
Coleophora deviella Zeller, 1847 (S, Si, Sa)
Coleophora dianthi Herrich-Schäffer, 1855 (N, S, Si, Sa)
Coleophora dianthivora Walsingham, 1901 (S)
Coleophora didymella Chrétien, 1899 (N, S)
Coleophora dignella Toll, 1961 (N)
Coleophora directella Zeller, 1849 (N)
Coleophora discordella Zeller, 1849 (N, S, Sa)
Coleophora ditella Zeller, 1849 (N, S)
Coleophora etrusca Baldizzone, 1990 (S)
Coleophora eupreta Walsingham, 1907 (N)
Coleophora expressella Klemensiewicz, 1883 (N)
Coleophora fiorii Toll, 1953 (S)
Coleophora flaviella Mann, 1857 (N, Si)
Coleophora flavipennella (Duponchel, 1843) (N, S)
Coleophora follicularis (Vallot, 1802) (N)
Coleophora frankii Schmidt, 1886 (N)
Coleophora franzi Klimesch, 1947 (N)
Coleophora fretella Zeller, 1847 (N, S, Si)
Coleophora fringillella Zeller, 1839 (N, S)
Coleophora frischella (Linnaeus, 1758) (N)
Coleophora fuscicornis Zeller, 1847 (N)
Coleophora fuscociliella Zeller, 1849 (N, Si)
Coleophora fuscocuprella Herrich-Schäffer, 1855 (N)

Coleophora galatellae Hering, 1942 (N)
Coleophora galbulipennella Zeller, 1838 (N, S)
Coleophora gallipennella (Hübner, 1796) (N, S)
Coleophora gallurella Amsel, 1951 (Sa) (E)
Coleophora gardesanella Toll, 1953 (N)
Coleophora gaviaepennella Toll, 1952 (S)
Coleophora genistae Stainton, 1857 (N, Sa)
Coleophora glaucicolella Wood, 1892 (N, S, Sa)
Coleophora graminicolella Heinemann & Wocke, 1877 (N)
Coleophora granulatella Zeller, 1849 (N, S)
Coleophora gryhipennella (Hübner, 1796) (N)
Coleophora halimionella Baldizzone, 1980 (N, S)
Coleophora halophylella Zimmermann, 1926 (N)
Coleophora hartigi Toll, 1959 (N)
Coleophora helianthemella Millièrè, 1870 (N, S, Sa)
Coleophora helichrysiella Krone, 1909 (N, S)
Coleophora hemerobiella (Scopoli, 1763) (N, S, Si, Sa)
Coleophora hieronella Zeller, 1849 (S, Si, Sa)
Coleophora ibipennella Zeller, 1849 (N, S)
Coleophora insulicola Toll, 1942 (S, Sa)
Coleophora inulae Heinemann & Wocke, 1877 (N, S)
Coleophora juncicolella Stainton, 1851 (N)
Coleophora kautzi Rebel, 1933 (S, Sa)
Coleophora kroneella Fuchs, 1899 (S)
Coleophora kuehnella (Goeze, 1783) (N, S, Sa)
Coleophora lassella Staudinger, 1859 (N, S, Si, Sa)
Coleophora lessinica Baldizzone, 1980 (N)
Coleophora limosipennella (Duponchel, 1843) (N, S, Si, Sa)
Coleophora lineolea (Haworth, 1828) (N, S, Si)
Coleophora linosyridella Fuchs, 1880 (N)
Coleophora linosyris Hering, 1937 (N)
Coleophora lithargyrinella Zeller, 1849 (N)
Coleophora lixella Zeller, 1849 (N, S)
Coleophora longicornella Constant, 1893 (N)
Coleophora lusciniapennella (Treitschke, 1833) (N)
Coleophora luteolella Staudinger, 1880 (N, S, Si, Sa)
Coleophora lutipennella (Zeller, 1838) (N, S)
Coleophora macedonica Toll, 1959 (N)
Coleophora maritimella Newman, 1873 (N, S, Sa)
Coleophora mausolella Chrétien, 1848 (S, Si)
Coleophora mayrella (Hübner, 1813) (N, S, Si, Sa)
Coleophora medelichensis Krone, 1908 (N, S)
Coleophora mediterranea Baldizzone, 1990 (Si, Sa)
Coleophora meridionella Rebel, 1912 (N)
Coleophora micronotella Toll, 1956 (S, Sa)
Coleophora millefolii Zeller, 1849 (N)
Coleophora milvipennis Zeller, 1839 (N, S, Sa)
Coleophora moheringiae Burmann, 1967 (N) (E)

Coleophora murciana Toll, 1960 (Sa)
Coleophora niveicostella Zeller, 1839 (N)
Coleophora niveistrigella Heinemann & Wocke, 1877 (N)
Coleophora nubivagella Zeller, 1849 (N)
Coleophora nutantella Mühlig & Frey, 1857 (N, S, Si)
Coleophora obscenella Herrich-Schäffer, 1855 (N)
Coleophora obtectella Zeller, 1849 (N, S, Si)
Coleophora obviella Rebel, 1914 (N)
Coleophora occitana Baldizzone, 1989 (N) (E)
Coleophora ochrea (Haworth, 1828) (N, S)
Coleophora ochripennella Zeller, 1849 (N, S)
Coleophora onobrychiella Zeller, 1849 (N)
Coleophora ononidella Millièrè, 1879 (N)
Coleophora onopordiella Zeller, 1849 (S)
Coleophora orbitella Zeller, 1849 (N)
Coleophora oriolella Zeller, 1849 (N, S, Si, Sa)
Coleophora ornatipennella (Hübner, 1796) (N, S)
Coleophora otidipennella (Hübner, 1817) (N, S)
Coleophora paramayrella Nel, 1993 (N)
Coleophora paripennella Zeller, 1839 (N)
Coleophora partitella Zeller, 1849 (N)
Coleophora pennella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si)
Coleophora peribenanderi Toll, 1943 (N)
Coleophora peterseni Baldizzone, 1983 (Sa) (E)
Coleophora praecursella Zeller, 1847 (S, Si)
Coleophora pratella Zeller, 1871 (N)
Coleophora prunifoliae Doets, 1944 (N, S)
Coleophora pseudociconiella Toll, 1952 (Sa)
Coleophora pseudoditella Baldizzone & Patzak, 1983 (N)
Coleophora pseudolinosyris Kasy, 1979 (N)
Coleophora ptarmicia Walsingham, 1910 (Si)
Coleophora pulmonariella Ragonot, 1874 (N)
Coleophora pyrrhulipennella Zeller, 1839 (N, S, Si, Sa)
Coleophora quadristraminella Toll, 1961 (N)
Coleophora ramosella Zeller, 1849 (N)
Coleophora ravillella Toll, 1961 (N)
Coleophora rectilineella Fischer von Röslerstamm, 1843 (N)
Coleophora repentis Klimesch, 1947 (N)
Coleophora rudella Toll, 1944 (N, S, Sa)
Coleophora salicorniae Heinemann & Wocke, 1877 (N, S, Si, Sa)
Coleophora santolinella Constant, 1890 (Sa)
Coleophora saponariella Heeger, 1848 (N)
Coleophora sardiniae Baldizzone, 1983 (Sa) (E)
Coleophora sardocorsa Baldizzone, 1983 (Sa)
Coleophora saxicolella (Duponchel, 1843) (N, S, Sa)
Coleophora scabrida Toll, 1959 (N)
Coleophora semicinerea Staudinger, 1859 (Si, Sa)
Coleophora serinipennella Christoph, 1872 (S, Si)

Coleophora serpylletorum Hering, 1889 (N)
Coleophora serratella (Linnaeus, 1761) (N, S)
Coleophora settarii Wocke, 1877 (N)
Coleophora silenella Herrich-Schäffer, 1855 (N)
Coleophora sisteronica Toll, 1961 (N)
Coleophora soffneriella Toll, 1961 (N, S)
Coleophora solenella Staudinger, 1859 (N)
Coleophora solitariella Zeller, 1849 (N)
Coleophora spinella (Schranck, 1802) (N, S)
Coleophora spumoseella Staudinger, 1859 (N, S)
Coleophora squamella Constant, 1885 (N)
Coleophora squamosella Stainton, 1856 (N)
Coleophora sternipennella (Zetterstedt, 1839) (N)
Coleophora striatipennella (Nylander, 1848) (N)
Coleophora striolatella Zeller, 1849 (N, S)
Coleophora supinella Ortner, 1949 (N)
Coleophora sylvaticella Wood, 1892 (N, S)
Coleophora taeniipennella Herrich-Schäffer, 1855 (N, S, Sa)
Coleophora tamesis Waters, 1929 (N, S)
Coleophora tanaceti Mühlig, 1865 (N, Sa)
Coleophora taygeti Baldizzone, 1983 (S)
Coleophora therinella Tengström, [1848] (N, S, Sa)
Coleophora thurneri Glaser, 1968 (N)
Coleophora thymi Hering, 1942 (N)
Coleophora tolli Klimesch, 1951 (N)
Coleophora treskaensis Toll & Amsel, 1967 (N)
Coleophora trifariella Zeller, 1849 (N)
Coleophora trifolii (Curtis, 1832) (N, S, Si)
Coleophora trigeminella Fuchs, 1881 (N, S)
Coleophora trochilella (Duponchel, 1843) (N, Sa)
Coleophora tyrhaenica Amsel, 1951 (N, Sa)
Coleophora uliginosella Glitz, 1872 (N)
Coleophora unipunctella Zeller, 1849 (N)
Coleophora vacciniella Herrich-Schäffer, 1861 (N)
Coleophora valesianella Zeller, 1849 (N)
Coleophora versurella Zeller, 1849 (N, S, Si, Sa)
Coleophora vestianella (Linnaeus, 1758) (N)
Coleophora vibicella (Hübner, 1813) (N)
Coleophora vibicigerella Zeller, 1839 (N)
Coleophora vicinella Zeller, 1849 (N, S)
Coleophora violacea (Ström, 1783) (N)
Coleophora virgatella Zeller, 1849 (N)
Coleophora vitisella Gregson, 1856 (N)
Coleophora vulnerariae Zeller, 1839 (N, S)
Coleophora vulpecula Zeller, 1849 (N)
Coleophora wockeella Zeller, 1849 (N)
Coleophora zelleriella Heinemann, 1854 (N, S)
Coleophora zernyi Toll, 1944 (Sa)

Goniodoma Zeller, 1849

Goniodoma auroguttella Fischer von Röslerstamm, 1841 (S)

Goniodoma limoniella (Stainton, 1884) (S, Sa)

Goniodoma millierella Ragonot, 1882 (N)

Agonoxenidae

Chrysoclista Stainton, 1854

Chrysoclista linneella (Clerck, 1759) (N)

Heinemannia Wocke, (1876) 1877

Heinemannia albidorsella (Staudinger, 1877) (Sa)

Heinemannia festivella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, Si)

Heinemannia laspeyrella (Hübner, 1796) (N)

Blastodacna Wocke, (1876) 1877

Blastodacna atra (Haworth, 1828) (N, Sa)

Blastodacna hellerella (Duponchel, 1838) (Sa)

Spuleria Hofmann, 1897

Spuleria flavicaput (Haworth, 1828) (N)

Dystebenna Spuler, 1910

Dystebenna stephensi (Stainton, 1849) (N)

Aetia Chambers, 1880

Aetia ochraceella (Rebel, 1902) (N)

Elachistidae

Cosmiotes Clemens, 1860

Cosmiotes consortella (Stainton, 1851) (N, S, Si)

Cosmiotes excatella (Herrich-Schäffer, 1855) (N)

Cosmiotes freyerella (Hübner, 1825) (N)

Mendesia de Joannis, 1902

Mendesia echiella de Joannis, 1902 (Si, Sa)
Mendesia farinella (Thunberg, 1794) (N)

Perittia Stainton, 1854

Perittia herrichiella (Herrich-Schäffer, 1855) (N)

Stephensia Stainton, 1858

Stephensia brunnichella (Linnaeus, 1767) (N, S)

Elachista Treitschke, 1833

Elachista adscitella Stainton, 1851 (N, S)
Elachista albicapilla Höfner, 1918 (N)
Elachista albifrontella (Hübner, 1817) (N)
Elachista alpinella Stainton, 1854 (N)
Elachista anserinella Zeller, 1839 (N)
Elachista apicipunctella Stainton, 1849 (N)
Elachista argentella (Clerck, 1759) (N, S)
Elachista argentifasciella Höfner, 1898 (N)
Elachista atricomella Stainton, 1849 (N, S)
Elachista atrisquamosa Staudinger, 1880 (N, S)
Elachista bedellella (Sircom, 1848) (N)
Elachista biatomella (Stainton, 1848) (N, S, Sa)
Elachista bifasciella Treitschke, 1833 (N)
Elachista bisulcella (Duponchel, 1843) (N, S)
Elachista canapennella (Hübner, 1813) (N)
Elachista catalana Parenti, 1978 (N, S, Si)
Elachista cerusella (Hübner, 1796) (N)
Elachista chrysodesmella Zeller, 1850 (N, S)
Elachista cingillella (Herrich-Schäffer, 1855) (N, S)
Elachista collitella (Duponchel, 1843) (N, S, Si)
Elachista compsa Traugott-Olsen, 1974 (N)
Elachista curonensis Traugott-Olsen, 1990 (N)
Elachista differens Parenti, 1978 (N)
Elachista dimicatella Rebel, 1903 (N)
Elachista disemiella Zeller, 1847 (N, S, Si)
Elachista dispilella Zeller, 1839 (N)
Elachista dispunctella (Duponchel, 1843) (N)
Elachista elegans Frey, 1859 (N)
Elachista exigua Parenti, 1978 (N, S)
Elachista fasciola Parenti, 1983 (N)
Elachista gangabella Zeller, 1850 (N, S)
Elachista gleichenella (Fabricius, 1781) (N, S)
Elachista gormella Nielsen & Traugott-Olsen, 1987 (N, S, Sa)
Elachista griseella (Duponchel, 1843) (N, S)
Elachista heinemanni Frey, 1866 (N)

Elachista heringi Rebel, 1899 (N, S)
Elachista herrichii Frey, 1859 (N)
Elachista humilis Zeller, 1850 (N)
Elachista klimeschi Parenti, 1981 (N)
Elachista littoricola Le Marchand, 1938 (N, S)
Elachista luticomella Zeller, 1839 (N, S)
Elachista maculosella Chrétien, 1896 (N)
Elachista martinii Hofmann, 1898 (N)
Elachista megerlella (Hübner, 1810) (N, S)
Elachista nobilella Zeller, 1839 (N)
Elachista nuraghella Amsel, 1951 (S, Si, Sa)
Elachista occulta Parenti, 1978 (N, S)
Elachista orstadii Palm, 1943 (N, S)
Elachista parvula Parenti, 1978 (N)
Elachista pigerella (Herrich-Schäffer, 1854) (N, S, Sa)
Elachista pollinariella Zeller, 1839 (N)
Elachista pollutella Duponchel, 1843 (N, S)
Elachista pullicomella Zeller, 1839 (N)
Elachista quadripunctella (Hübner, 1825) (N)
Elachista regificella Sircom, 1849 (N, Si)
Elachista revinctella Zeller, 1850 (N)
Elachista rudectella Stainton, 1851 (N, S)
Elachista rufocinerea (Haworth, 1828) (N, S)
Elachista sricula Parenti, 1978 (Si)
Elachista spumella Caradja, 1920 (N)
Elachista squamosella (Duponchel, 1843) (N, S)
Elachista subalbidella Schläger, 1847 (N, S)
Elachista subnigrella Douglas, 1853 (N)
Elachista subocellea (Stephens, 1834) (N, S)
Elachista tetragonella (Herrich-Schäffer, 1855) (N)
Elachista triseriatella Stainton, 1854 (N)
Elachista unifasciella (Haworth, 1828) (N, S)
Elachista zernyi Hartig, 1941 (N)

Biselachista Traugott-Olsen & Nielsen, 1977

Biselachista albidella (Nylander, 1848) (S)
Biselachista brachypterella Klimesch, 1990 (N)
Biselachista cinereopunctella (Haworth, 1828) (N)
Biselachista contaminatella (Zeller, 1847) (S, Si, Sa)
Biselachista fulgens (Parenti, 1983) (N)
Biselachista igaloensis (Amsel, 1951) (Sa)
Biselachista juliensis (Frey, 1870) (N)
Biselachista ornithopodella (Frey, 1859) (N)
Biselachista scirpi (Stainton, 1887) (Sa)
Biselachista serricornis (Stainton, 1854) (N)
Biselachista trapeziella (Stainton, 1849) (N)
Biselachista utonella (Frey, 1856) (N)

Dibrachia Sinev & Sruoga, 1992

Dibrachia kalki (Parenti, 1978) (N)

Ethmiidae

Ethmia Hübner, 1819

Ethmia aurifluella (Hübner, 1810) (N, S, Sa) (*)

Ethmia bipunctella (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa)

Ethmia candidella (Alpheraki, 1908) (N, S)

Ethmia chrysopyga (Zeller, 1844) (S, Si)

Ethmia chrysopygella (Kolenati, 1846) (N)

Ethmia dodecea (Haworth, 1828) (N)

Ethmia flavianella (Treitscke, 1832) (S)

Ethmia funerella (Fabricius, 1787) (*)

Ethmia funerella funerella (Fabricius, 1787) (N, S)

Ethmia funerella luctuosella (Herrich-Schäffer, 1854) (S)

Ethmia haemorrhoidella (Eversmann, 1844) (N, S)

Ethmia pusiella (Linnaeus, 1758) (N)

Ethmia terminella Fletcher, 1938 (N, S, Si, Sa)

Note

Ethmia aurifluella: Sattler (1967) ritiene frutto di una determinazione errata la citazione di Curò (1883) di *Ethmia pyrausta* (Pallas, 1771) per l'Italia.

Ethmia funerella: Sattler (1967) cita *Ethmia funerella canuisella* (Millère, 1867) da Positano (Campania) in forma dubitativa.

Depressariidae

Semioscopis Hübner, [1825]

Semioscopis avellanella (Hübner, 1793) (N)

Semioscopis oculella (Thunberg, 1794) (N)

Semioscopis steinkellneriana ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, Si)

Semioscopis strigulana (Fabricius, 1787) (N)

Luquetia Leraut, 1991

Luquetia lobella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N)

Exaeretia Stainton, 1849

Exaeretia ciniflonella (Lienig & Zeller, 1846) (N)

Exaeretia conciliatella (Rebel, 1892) (Si)
Exaeretia culcitella (Herrich-Schäffer, 1854) (N)
Exaeretia lutosella (Herrich-Schäffer, 1854) (N, Sa)
Exaeretia preisseckeri (Rebel, 1937) (N)

***Agonopterix* Hübner, [1825]**

Agonopterix adspersella (Kollar, 1832) (N, S, Si, Sa)
Agonopterix alpigena (Frey, 1870)
 Agonopterix alpigena ragonoti (Rebel, 1889) (N)
Agonopterix alstromeriana (Clerck, 1759) (N, Si, Sa)
Agonopterix angelicella (Hübner, [1813]) (N)
Agonopterix arenella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, Sa)
Agonopterix aspersella (Constant, 1888) (Si)
Agonopterix assimilella (Treitschke, 1832) (N, S, Sa)
Agonopterix astrantiae (Heinemann, 1870) (N)
Agonopterix atomella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Sa)
Agonopterix cachritis (Staudinger, 1859) (Sa)
Agonopterix capreolella (Zeller, 1839) (N, Sa)
Agonopterix carduella (Hübner, [1817]) (N, Sa)
Agonopterix cervariella (Constant, 1885) (N)
Agonopterix chironiella (Constant, 1893) (Si)
Agonopterix ciliella (Stainton, 1849) (N)
Agonopterix cnicella (Treitschke, 1832) (N, Si, Sa)
Agonopterix conterminella (Zeller, 1839) (N)
Agonopterix curvipunctosa (Haworth, [1811]) (Sa)
Agonopterix doronicella (Wocke, 1849) (N)
Agonopterix ferocella (Chrétien, 1910) (N)
Agonopterix ferulae (Zeller, 1847) (S, Si)
Agonopterix furvella (Treitschke, 1832) (N)
Agonopterix graecella Hannemann, 1976 (N)
Agonopterix heracliiana (Linnaeus, 1758) (N)
Agonopterix hippomarathri (Nickerl, 1864) (N, S, Sa)
Agonopterix hypericella (Hübner, 1796) (N)
Agonopterix irrorata (Staudinger, 1870) (Si)
Agonopterix kaekeritziana (Linnaeus, 1767) (N, S, Si)
Agonopterix klimeschi Hannemann, 1953 (N)
Agonopterix laterella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Sa)
Agonopterix liturosa (Haworth, [1811]) (N)
Agonopterix nanatella (Stainton, 1849) (N, S, Sa)
Agonopterix nervosa (Haworth, [1811]) (N, S, Sa)
Agonopterix nodiflorella (Millière, 1866) (N, S, Si, Sa)
Agonopterix ocellana (Fabricius, 1775) (N)
Agonopterix oinochroa (Turati, 1879) (N)
Agonopterix pallorella (Zeller, 1839) (N, S, Si)
Agonopterix parilella (Treitschke, 1835) (N)
Agonopterix petasitis (Standfuss, 1851) (N)
Agonopterix propinquella (Treitschke, 1833) (N, Si)

Agonopterix pupillana (Wocke, 1887) (N)
Agonopterix purpurea (Haworth, [1811]) (N, S, Si, Sa)
Agonopterix quadripunctata (Wocke, 1857) (N)
Agonopterix rotundella (Douglas, 1846) (N, S, Si, Sa)
Agonopterix rutana (Fabricius, 1794) (N, S, Si, Sa)
Agonopterix scopariella (Heinemann, 1870) (N, Si, Sa)
Agonopterix selini (Heinemann, 1870) (N)
Agonopterix senecionis (Nickerl, 1864) (N)
Agonopterix silerella (Stainton, 1865) (N)
Agonopterix squamosa (Mann, 1864) (Si)
Agonopterix subpropinquella (Stainton, 1849) (N, Si, Sa)
Agonopterix thapsiella (Zeller, 1847) (N, Si, Sa)
Agonopterix umbellana (Fabricius, 1794) (N, S)
Agonopterix yeatiana (Fabricius, 1781) (N, Si, Sa)

Levipalpus Hannemann, 1953

Levipalpus hepatariellus (Lienig & Zeller, 1846) (N, Sa)

Depressaria (Depressaria) Haworth, [1811]

Depressaria (Depressaria) absynthiella Herrich-Schäffer, 1865 (N)
Depressaria (Depressaria) adustatella Turati, 1927 (Sa)
Depressaria (Depressaria) albipunctella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, Sa)
Depressaria (Depressaria) artemisiae Nickerl, 1864 (N, S, Si)
Depressaria (Depressaria) badiella (Hübner, 1796)
 Depressaria (Depressaria) badiella badiella (Hübner, 1796) (N, S, Si)
 Depressaria (Depressaria) badiella frustratella Rebel, 1936 (Sa)
Depressaria (Depressaria) beckmanni Heinemann, 1870 (N, S)
Depressaria (Depressaria) bupleurella Heinemann, 1870 (N)
Depressaria (Depressaria) cervicella Herrich-Schäffer, 1854 (N)
Depressaria (Depressaria) chaerophylli Zeller, 1839 (N)
Depressaria (Depressaria) daucella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, Sa)
Depressaria (Depressaria) daucivorella Ragonot, 1889 (N)
Depressaria (Depressaria) depressana (Fabricius, 1775) (N, S, Si)
Depressaria (Depressaria) discipunctella Herrich-Schäffer, 1854 (N, Si)
Depressaria (Depressaria) douglasella Stainton, 1849 (N, S, Si, Sa)
Depressaria (Depressaria) emeritella Stainton, 1849 (N)
Depressaria (Depressaria) erinaceella Staudinger, 1870 (Si, Sa)
Depressaria (Depressaria) halophilella Chrétien, 1908 (Si)
Depressaria (Depressaria) heydenii Zeller, 1854 (N)
Depressaria (Depressaria) hofmanni Stainton, 1861 (N, Si)
Depressaria (Depressaria) leucocephala Snellen, 1884 (N)
Depressaria (Depressaria) libanotidella Schläger, 1849 (N, Si, Sa)
Depressaria (Depressaria) marcella Rebel, 1901 (Si, Sa)
Depressaria (Depressaria) olerella Zeller, 1854 (N)
Depressaria (Depressaria) pastinacella (Duponchel, 1838) (N, S, Sa)
Depressaria (Depressaria) pimpinellae Zeller, 1839 (N)

Depressaria (Depressaria) pulcherrimella Stainton, 1849 (N)
Depressaria (Depressaria) silesiaca Heinemann, 1870 (N)
Depressaria (Depressaria) sordidatella Tengström, 1848 (N, S, Si)
Depressaria (Depressaria) tenebricosa Zeller, 1854 (N, S, Si, Sa)
Depressaria (Depressaria) veneficella Zeller, 1847 (Si, Sa)
Depressaria (Depressaria) zelleri Staudinger, 1879 (N)

Depressaria (Horridopalpus) Hannemann, 1953

Depressaria (Horridopalpus) dictamnella (Treitschke, 1835) (N)

Cephalispheira Bruand, [1851]

Cephalispheira denisella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si)
Cephalispheira ferrugella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)
Cephalispheira sordidella (Hübner, 1796) (N)

Chimabachidae

Cacochroa Heinemann, 1870

Cacochroa permixtella (Herrich-Schäffer, 1854) (N, Sa)

Diurnea Haworth, [1811]

Diurnea fagella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)
Diurnea lipsiella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N)

Cheimophila Hübner, [1825]

Cheimophila salicella (Hübner, 1796) (N, S)

Batrachedridae

Batrachedra Herrich-Schäffer, 1853

Batrachedra parvulipunctella Chrétien, 1915 (Si, Sa)
Batrachedra pinicolella (Zeller, 1839) (N)
Batrachedra praeangusta (Haworth, 1828) (N)

Oecophoridae

Minetia Leraut, 1991

Minetia criella (Treitschke, 1835) (N)

Minetia crinitus (Fabricius, 1798) (N)
Minetia labiosella (Hübner, [1810]) (N)

Pleurota (Macropalpula) Lvovsky, 1992

Pleurota (Macropalpula) marginella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)

Pleurota (Pleurota) Hübner, [1825]

Pleurota (Pleurota) aristella (Linnaeus, 1767) (N, S, Si)
Pleurota (Pleurota) bicostella (Clerck, 1759) (N)
Pleurota (Pleurota) brevispinella (Zeller, 1847) (N?, S?, Si) (E)
Pleurota (Pleurota) contristatella Mann, 1867 (Si, Sa)
Pleurota (Pleurota) cyrniella (Mann, 1855) (Sa)
Pleurota (Pleurota) ericella (Duponchel, 1839) (N, Sa)
Pleurota (Pleurota) grisea Amsel, 1951 (Sa) (E)
Pleurota (Pleurota) metricella (Zeller, 1847) (N?)
Pleurota (Pleurota) planella (Staudinger, 1859) (N, S, Si)
Pleurota (Pleurota) pungitiella Herrich-Schäffer, [1852] (N)
Pleurota (Pleurota) pyropella ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Pleurota (Pleurota) pyropella pyropella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)
Pleurota (Pleurota) pyropella semicanella Constant, 1885 (Sa)
Pleurota (Pleurota) pyropella siciliana Back, 1973 (Si)

Pleurota (Protasis) Herrich-Schäffer, [1853]

Pleurota (Protasis) punctella (O.G. Costa, [1836]) (N, S, Si)

Holoscolia Zeller, 1839

Holoscolia huebneri Koçak, 1980 (N, S, Si)

Aplota Stephens, 1834

Aplota kadeniella (Herrich-Schäffer, [1851]) (N)
Aplota palpella (Haworth, 1828) (N)

Bisigna Toll, [1956]

Bisigna procerella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N)

Schiffermuelleria (Schiffermuelleria) Hübner, [1825]

Schiffermuelleria (Schiffermuelleria) schaefferella (Linnaeus, 1758) (N)

Schiffermuelleria (Schiffermuellerina) Leraut, 1989

Schiffermuelleria (Schiffermuellerina) grandis (Desvignes, 1842) (N)

Denisia Hübner, [1825]

Denisia albimaculea (Haworth, 1828)
 Denisia albimaculea albimaculea (Haworth, 1828) (N, S)
 Denisia albimaculea sardiniella (Amsel, 1936) (Sa)
Denisia augustella (Hübner, 1796) (N, S, Sa)
Denisia luctuosella (Duponchel, 1840) (N)
Denisia muellerrutzi (Amsel, 1939) (Sa)
Denisia nubilosella (Herrich-Schäffer, 1854) (N)
Denisia ragonotella (Constant, 1885) (Sa)
Denisia rhaetica (Frey, 1856) (N)
Denisia similella (Hübner, 1796) (N)
Denisia stipella (Linnaeus, 1758) (N, S)

Metalampra Toll, [1956]

Metalampra cinnamomea (Zeller, 1839) (N)
Metalampra italica Baldizzone, 1977 (N, S) (E)

Endrosis Hübner, [1825]

Endrosis sarcitrella (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)

Hofmannophila Spuler, 1910

Hofmannophila pseudospretella (Stainton, 1849) (N)

Borkhausenia Hübner, [1825]

Borkhausenia fuscescens (Haworth, 1828) (N)
Borkhausenia luridicomella (Herrich-Schäffer, 1856) (N)
Borkhausenia minutella (Linnaeus, 1758) (N)
Borkhausenia panormitella Rebel, 1915 (Si) (E) (*)
Borkhausenia venturellii Costantini, 1923 (N) (E) (*)

Herrichia Staudinger, 1871

Herrichia excelsella Staudinger, 1871 (Si)

Tichonia Hübner, [1825]

Tichonia tinctella (Hübner, 1796) (N)
Tichonia unitella (Hübner, 1796) (N)

Batia Stephens, 1834

Batia inexpectella Jäckh, 1972 (N, S)

Batia internella Jäckh, 1972 (N, Si)
Batia lambdella (Donovan, 1793) (N, S, Si, Sa)
Batia lunaris (Haworth, 1828) (N, S, Si, Sa)

Callima Clemens, 1860

Callima formosella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)

Esperia Hübner, [1825]

Esperia sulphurella (Fabricius, 1775) (N, Si, Sa)

Dasycera Stephens, 1829

Dasycera oliviella (Fabricius, 1794) (N, S, Si)

Oecophora Latreille, [1796]

Oecophora bractella (Linnaeus, 1758) (N)

Alabonia Hübner, [1825]

Alabonia geoffrella (Linnaeus, 1767) (N, S, Si)
Alabonia staintoniella (Zeller, 1850) (N)

Harpella Schrank, 1802

Harpella forficella (Scopoli, 1763) (N)

Carcina Hübner, [1825]

Carcina quercana (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa)

Pseudatemelia Rebel, 1910

Pseudatemelia colurnella (Mann, 1867) (N) (E)
Pseudatemelia flavifrontella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si)
Pseudatemelia fuscifrontella (Constant, 1885) (Sa)
Pseudatemelia josephinae (Toll, [1956]) (N)
Pseudatemelia lavandulae (Mann, 1855) (Sa)
Pseudatemelia pallidella Jäckh, 1972 (S) (E)
Pseudatemelia subochreella (Doubleday, 1859) (N, S, Si)
Pseudatemelia synchrozella (Jäckh, 1959) (N)

Telechrysis Toll, [1956]

Telechrysis tripuncta (Haworth, 1828) (N)

Hypercallia Stephens, 1829

Hypercallia citrinalis (Scopoli, 1763) (N, S, Si)

Anchinia Hübner, [1825]

Anchinia cristalis (Scopoli, 1763) (N)

Anchinia daphnella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N)

Anchinia dolomiella Mann & Rogenhofer, 1877 (N)

Anchinia grandis Stainton, 1867 (N)

Anchinia grisescens Frey, 1856 (N)

Anchinia laureolella Herrich-Schäffer, 1854 (N)

Note

Borkhausenia panormitella: Specie di incerto status, che comunque non dovrebbe appartenere al genere *Borkhausenia*.

Borkhausenia venturellii: Specie di incerto status, che comunque non dovrebbe appartenere al genere *Borkhausenia*.

Symmocidae

Oegoconia Stainton, 1854

Oegoconia caradjai Popescu-Gorj & Capuse, 1965 (N, Si)

Oegoconia deauratella Herrich-Schäffer, 1854 (N, S)

Oegoconia quadripuncta (Haworth, 1829) (N, S, Si, Sa)

Apatema Walsingham, 1900

Apatema mediopallidum Walsingham, 1900 (N, S, Si, Sa)

Symmoca Hübner, 1825

Symmoca achrestella Rebel, 1889 (N)

Symmoca albicanella Zeller, 1868 (N)

Symmoca caliginella Mann, 1867 (N)

Symmoca cinerariella (Mann, 1859) (Si, Sa) (E) (*)

Symmoca dolomitana Huemer & Gozmány, 1992 (N)

Symmoca italica Gozmány, 1962 (S) (E)

Symmoca signatella Herrich-Schäffer, 1855 (N, S)

Symmoca tofosella Rebel, 1893 (S)

Telephirca Gozmány, 1957

Telephirca quadrifariella (Mann, 1855) (Sa) (*)

Donaspastus Gozmány, 1952

Donaspastus bosellii (Hartig, 1941) (Sa) (E) (*)

Donaspastus liguricus Gozmány, 1977 (N) (E)

Donaspastus pannonicus Gozmány, 1952 (S)

Symmocoides Amsel, 1939

Symmocoides oxybiella (Millière, 1872) (N, S)

Orpecovalva Gozmány, 1964

Orpecovalva acantha (Gozmány, 1963) (Sa) (E)

Pantacordis Gozmány, 1954

Pantacordis pallida (Staudinger, 1867) (S, Si)

Dysspastus Gozmány, 1964

Dysspastus hartigi Gozmány, 1977 (S) (*)

Dysspastus mediterraneus Gozmány, 1957

Dysspastus perpygmaeellus (Walsingham, 1901) (Sa) (*)

Note

Symmoca cinerariella: La sinonimia tra siciliana e cinerariella non era stata ancora proposta in precedenza.

Telephirca quadrifariella: Nota anche dalla Corsica.

Donaspastus bosellii: Endemita della Sardegna, limitato ai Monti Istiddi presso Aritzo-Belvi.

Dysspastus hartigi: Noto solo da Tivoli.

Dysspastus perpygmaeellus: Nota anche dalla Corsica.

Lecithoceridae

Homaloxestis Meyrick, 1910

Homaloxestis briantiella (Turati, 1879) (N, S, Si, Sa)

Lecithocera Herrich-Schäffer, 1853

Lecithocera nigrana (Duponchel, 1836) (N, S, Si)

Eurodachtha Gozmány, 1978

Eurodachtha canigella (Caradja, 1920) (N)

Eurodachtha siculella (Wocke, 1889) (Si)

Scythrididae

Scythris Hübner, [1825]

- Scythris adustella* Jäckh, 1978 (N, S) (E)
- Scythris aerariella* (Herrich-Schäffer, 1855) (N?)
- Scythris alseriella* (Turati, 1879) (N)
- Scythris amphonicea* (Geyer, 1836) (N?)
- Scythris aspromontis* Jäckh, 1978 (S) (E)
- Scythris baldensis* Passerin d'Entrèves, 1979 (N) (E)
- Scythris bolognella* Jäckh, 1978 (N, S?) (E)
- Scythris carboniella* Jäckh, 1978 (N, S) (E)
- Scythris cistorum* (Millière, 1876) (N)
- Scythris clavella* (Zeller, 1855) (N?)
- Scythris constanti* Walsingham, 1898 (S)
- Scythris crassiuscula* (Herrich-Schäffer, 1855) (N, Sa?)
- Scythris crypta* Hannemann, 1961 (S)
- Scythris cuspidella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)
- Scythris derrai* Bengtsson, 1991 (Sa) (E)
- Scythris disparella* (Tengström, 1847) (N?)
- Scythris dissimilella* (Herrich-Schäffer, 1855) (N, S?)
- Scythris dissitella* (Zeller, 1847) (Si, Sa) (E)
- Scythris dorycniella* (Millière, 1861) (N?)
- Scythris fallacella* (Schläger, 1847) (N, S)
- Scythris flavilaterella* (Fuchs, 1886) (N, S)
- Scythris flaviventrella* (Herrich-Schäffer, 1851) (N)
- Scythris fuscoaenea* (Haworth, 1828) (N, S)
- Scythris glacialis* (Frey, 1870)
 - Scythris glacialis glacialis* (Frey, 1870) (N)
 - Scythris glacialis carnicheella* Jäckh, 1978 (N)
- Scythris gravatella* (Zeller, 1847) (N, S, Si?, Sa)
- Scythris heinemanni* (Möschler, 1869) (N)
- Scythris hornigii* (Zeller, 1855) (N)
- Scythris imperiella* Jäckh, 1978 (N)
- Scythris inertella* (Zeller, 1855) (S)
- Scythris inspersella* (Hübner, 1817) (N)
- Scythris lagunae* Jäckh, 1978 (N) (E)
- Scythris laminella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)
- Scythris limbella* (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa)
- Scythris mediella* (Constant, 1855) (Sa)
- Scythris mus* Walsingham, 1898 (Sa)
- Scythris nigrella* Jäckh, 1978 (N) (E)
- Scythris noricella* (Zeller, 1843) (N)
- Scythris obscurella* (Scopoli, 1763) (N, S)
- Scythris pascuella* (Zeller, 1855) (N, S, Si?)
- Scythris picaepennis* (Haworth, 1828) (N, S)

Scythris productella (Zeller, 1839) (N)
Scythris punctivittella (O.G. Costa, 1836) (N, S, Si)
Scythris ridiculella Caradja, 1920 (N)
Scythris sappadensis Bengtsson, 1992 (N) (E)
Scythris seliniella (Zeller, 1839) (N?)
Scythris siccella (Zeller, 1839) (N)
Scythris siculella Jäckh, 1977 (Si) (E)
Scythris speyeri (Heinemann, 1876) (N, S)
Scythris subseliniella (Heinemann, 1876) (N)
Scythris tabidella (Herrich-Schäffer, 1855) (N?)
Scythris tenuivittella (Stainton, 1867) (N, S, Sa)
Scythris tergestinella (Zeller, 1855) (N, S, Si?, Sa?)
Scythris tremalzoii Bengtsson, 1992 (N) (E)
Scythris tributella (Zeller, 1847) (N, S, Si, Sa)
Scythris triguttella (Duponchel, 1839) (N)
Scythris trinacriae Passerin d'Entrèves, 1984 (S, Si) (E)
Scythris villari Agenjo, 1971 (S)
Scythris vittella (O.G. Costa, [1836]) (N, S, Si, Sa)

Episcythris Amsel, 1939

Episcythris triangulella (Ragonot, 1874) (Si, Sa)

Enolmis Duponchel, 1845

Enolmis acanthella (Godart, 1824)
Enolmis acanthella acanthella (Godart, 1824) (N)
Enolmis agenjoi Passerin d'Entrèves, 1988 (N)

Eretmocera Walsingham, 1852

Eretmocera medinella (Staudinger, 1859) (Sa)

Blastobasidae

Blastobasis Zeller, 1855

Blastobasis anthophaga Staudinger, 1871 (Sa)
Blastobasis phycidella (Zeller, 1839) (N, S, Si, Sa)
Blastobasis roscidella (Zeller, 1847) (N, S, Si, Sa) (*)

Hypatopa Walsingham, 1907

Hypatopa binotella (Thunberg, 1794) (N)
Hypatopa inunctella (Zeller, 1839) (N, Si)

Note

Blastobasis roscidella: Amsel (1951) descrive una ssp. magna della Sardegna.
Hypatopa: Specie spesso citate sotto il nome generico *Holcocera* Clemens, 1863.

Stathmopodidae

Stathmopoda Herrich-Schäffer, 1853

Stathmopoda pedella (Linnaeus, 1761) (N, S, Si)

Neomariania Mariani, 1943

Neomariania partinicensis (Rebel, 1937) (Si)

Momphidae

***Mompha* (*Lophoptilus*)** Sircom, 1848

Mompha (*Lophoptilus*) *miscella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)

***Mompha* (*Cyphophora*)** Herrich-Schäffer, 1853

Mompha (*Cyphophora*) *idaei* (Zeller, 1839) (N, S)

***Mompha* (*Anybia*)** Stainton, 1854

Mompha (*Anybia*) *langiella* (Hübner, 1796) (N)

***Mompha* (*Psacaphora*)** Herrich-Schäffer, 1853

Mompha (*Psacaphora*) *locupletella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N)

Mompha (*Psacaphora*) *raschkiella* (Zeller, 1939) (N)

***Mompha* (*Mompha*)** (Hübner, 1825)

Mompha (*Mompha*) *conturbatella* (Hübner, 1819) (N, S)

Mompha (*Mompha*) *divisella* (Herrich-Schäffer, 1853) (N, S)

Mompha (*Mompha*) *epilobiella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)

Mompha (*Mompha*) *lacteella* (Stephens, 1834) (S)

Mompha (*Mompha*) *nodicolella* (Fuchs, 1902) (Si)

Mompha (*Mompha*) *ochraceella* (Curtis, 1839) (S)

Mompha (*Mompha*) *propinquella* (Stainton, 1851) (N)

Mompha (*Mompha*) *subbistrigella* (Haworth, 1928) (N, Si)

Cosmopterigidae

Pancalia Stephens, 1829

- Pancalia baldizzonella* Riedl, 1994 (S)
- Pancalia latreillella* Curtis, 1830 (N)
- Pancalia leuwenhoekella* (Linnaeus, 1761) (N, S, Si)

Vulcaniella Riedl, 1965

- Vulcaniella cognatella* Riedl, 1991 (S)
- Vulcaniella extremella* (Wocke, 1871) (N)
- Vulcaniella fiordalisa* (Petty, 1904) (N, Sa)
- Vulcaniella grabowiella* (Staudinger, 1859) (N, S, Sa)
- Vulcaniella pomposella* (Zeller, 1839) (Si)

Isidiella Riedl, 1965

- Isidiella divitella* (Constant, 1885) (Sa)
- Isidiella nickerlii* (Nickerl, 1964) (N)

Eteobalea Hodges, 1962

- Eteobalea albiapicella* (Duponchel, 1843) (N)
- Eteobalea alypella* (Klimesch, 1946) (N)
- Eteobalea anonymella* (Riedl, 1965) (N)
- Eteobalea beata* (Walsingham, 1907) (S)
- Eteobalea dohrnii* (Zeller, 1847) (Si, Sa)
- Eteobalea intermediella* (Riedl, 1966) (N, S, Si, Sa)
- Eteobalea isabellella* (Costa, 1836) (N, S, Si)
- Eteobalea serratella* (Treitschke, 1833) (N, S)
- Eteobalea siciliae* (Riedl, 1966) (Si)
- Eteobalea sumptuosella* (Lederer, 1855) (N)
- Eteobalea tririvella* (Staudinger, 1870) (N)

Stagmatophora Herrich-Schäffer, 1853

- Stagmatophora heydeniella* (Fischer von Röslerstamm, 1838) (N)

Coccidiphila Danilevsky, 1950

- Coccidiphila gerasimovi* Danilevsky, 1950 (*)
- Coccidiphila ledereriella* (Zeller, 1850) (Si)

Limnaecia Stainton, 1851

- Limnaecia phragmitella* Stainton, 1951 (Sa)

Pyroderces Herrich-Schäffer, 1853

Pyroderces argyrogrammus (Zeller, 1847) (N, S, Si, Sa)

Pyroderces brosi Riedl, 1969 (S) (*)

Pyroderces klimeschi Rebel, 1937 (N) (*)

Cosmopterix Hübner, [1825]

Cosmopterix coryphaea Walsingham, 1907 (N, Si)

Cosmopterix orichalcea Stainton, 1861 (N, S)

Cosmopterix pulchrimella Chambers, 1875 (N, S, Si, Sa)

Cosmopterix scribaiella Zeller, 1850 (N, S)

Cosmopterix zieglerella (Hübner, [1810]) (N)

Ascalenia Wocke, (1876) 1877

Ascalenia vanella (Frey, 1860) (Si)

Ascalenia vanelloides Gerasimov, 1930 (Si)

Sorhagenia Spuler, 1910

Sorhagenia lophyrella (Douglas, 1846) (N)

Sorhagenia rhamniella (Zeller, 1839) (N)

Gisilia Kasy, 1968

Gisilia stereodoxa (Meyrick, 1925) (Sa)

Note

Coccidiphila gerasimovi: Nella revisione del genere *Coccidiphila*, Traugott-Olsen (1986) la segnala d'Italia senza menzionare la località.

Pyroderces brosi: Descritta su esemplari di Fano, Torrette (Marche).

Pyroderces klimeschi: Specie nuova per la fauna italiana.

Holcopogonidae

Holcopogon Staudinger, 1880

Holcopogon bubulcellus (Staudinger, 1859) (N, S, Si, Sa)

Oecia Walsingham, 1897

Oecia oecophila (Staudinger, 1876) (Si)

Gelechiidae

Apatetris Staudinger, 1879

Apatetris sp. (N) (*)
Apatetris sp. (S, Si?) (E) (*)

Metanarsia Staudinger, 1871

Metanarsia modesta Staudinger, 1871 (S) (*)

Oecocecis Guenée, 1870

Oecocecis guyonella Guenée, 1870 (Si)

Caulastrocecis Chrétien, 1931

Caulastrocecis furfurella (Staudinger, 1871) (S)

Epidola Staudinger, 1859

Epidola barcinonella Millière, 1867 (Si)
Epidola nuraghella Hartig, 1939 (Si, Sa)

Paranarsia Ragonot, 1895

Paranarsia joannisiella Ragonot, 1895 (N, S)

Megacraspedus Zeller, 1839

Megacraspedus binotella (Duponchel, 1843) (N)
Megacraspedus dolosellus (Zeller, 1839) (N, S)
Megacraspedus imparellus (Fischer von Röslerstamm, 1843) (S)
Megacraspedus lanceolellus (Zeller, 1850) (N, S, Si)
Megacraspedus separatellus (Fischer von Röslerstamm, 1843) (Si)
Megacraspedus tristictus Walsingham, 1910 (N) (*)
Megacraspedus sp. (N, S) (*)
Megacraspedus sp. (N) (E) (*)

Aristotelia Hübner, 1825

Aristotelia brizella (Treitschke, 1833) (N, S) (*)
Aristotelia decoratella (Staudinger, 1880) (N, S, Si, Sa)
Aristotelia decurtella (Hübner, 1813) (N, S)
Aristotelia ericinella (Duponchel, 1838) (N, Sa)
Aristotelia heliacella (Herrich-Schäffer, 1854) (N)
Aristotelia staticella (Millière, 1875) (Sa)
Aristotelia subdecurtella (Stainton, 1858) (N, S, Si)

Aristotelia subericinella (Duponchel, 1843) (N, Si)

Chrysoesthia Hübner, 1825

Chrysoesthia aletris (Walsingham, 1919) (Si)

Chrysoesthia atriplicella (Amsel, 1939) (Sa)

Chrysoesthia drurella (Fabricius, 1775) (N, Si)

Chrysoesthia eppelsheimi (Staudinger, 1885) (Si)

Chrysoesthia sexguttella (Thunberg, 1794) (N, S, Si, Sa)

Xystophora Wocke, 1876

Xystophora carchariella (Zeller, 1839) (N)

Xystophora pulveratella (Herrich-Schäffer, 1854) (N)

Atremaea Staudinger, 1871

Atremaea lonchoptera Staudinger, 1871 (N)

Isophrictis Meyrick, 1917

Isophrictis anthemidella (Wocke, 1871) (N, S, Si, Sa)

Isophrictis invisella (Constant, 1885) (Si, Sa)

Isophrictis kefersteiniellus (Zeller, 1850) (N, S, Si, Sa)

Isophrictis lineatellus (Zeller, 1850) (N, S, Si, Sa)

Isophrictis meridionella (Herrich-Schäffer, 1854) (Sa) (*)

Isophrictis striatella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si)

Pyncostola Meyrick, 1917

Pyncostola bohemiella (Nickerl, 1864) (N)

Metzneria Zeller, 1839

Metzneria aestivella (Zeller, 1839) (N, S, Si, Sa)

Metzneria agraphella (Ragonot, 1895) (Sa)

Metzneria aprilella (Herrich-Schäffer, 1854) (N, S, Si)

Metzneria artificella (Herrich-Schäffer, 1861) (N) (*)

Metzneria diffusella Englert, 1974 (N) (*)

Metzneria intestinella (Mann, 1864) (S)

Metzneria lappella (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Metzneria littorella (Douglas, 1850) (S, Si)

Metzneria metzneriella (Stainton, 1851) (N, S, Si)

Metzneria neuropterella (Zeller, 1839) (N)

Metzneria paucipunctella (Zeller, 1839) (N, S)

Metzneria santolinella (Amsel, 1936) (N, Sa)

Metzneria subflavella Englert, 1974 (N) (*)

Metzneria torosulella (Rebel, 1893) (Sa)

Apodia Heinemann, 1870

Apodia bifractella (Duponchel, 1843) (N, S, Si, Sa)

Ptocheuusa Heinemann, 1870

Ptocheuusa abnormella (Herrich-Schäffer, 1854) (N, Si)

Ptocheuusa campicolella (Mann, 1857) (N, S, Si, Sa)

Ptocheuusa minimella (Rebel, 1936) (N, S, Sa)

Ptocheuusa paupella (Zeller, 1847) (N, S, Si, Sa)

Psammathocrita Meyrick, 1925

Psammathocrita osseella (Stainton, 1861) (N) (*)

Argolamprotes Benander, 1945

Argolamprotes micella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N)

Monochroa Heinemann, 1870

Monochroa conspersella (Herrich-Schäffer, 1854) (N, Si)

Monochroa cytisella (Curtis, 1837) (N, S, Si, Sa)

Monochroa dellabeffai (Rebel, 1932) (N)

Monochroa elongella (Heinemann, 1870) (N)

Monochroa ferrea (Frey, 1870) (N) (*)

Monochroa hornigi (Staudinger, 1883) (N, Sa)

Monochroa lucidella (Stephens, 1834) (N, S, Si)

Monochroa melagonella (Constant, 1895) (N) (*)

Monochroa nigromaculella (Millière, 1872) (S, Si, Sa)

Monochroa nomadella (Zeller, 1868) (N)

Monochroa scutatella (Müller-Rutz, 1920) (N) (*)

Monochroa sepicolella (Herrich-Schäffer, 1854) (N)

Monochroa servella (Zeller, 1839) (N, S)

Monochroa simplicella (Lienig & Zeller, 1846) (N) (*)

Monochroa tenebrella (Hübner, 1817) (N, S)

Monochroa sp. (N, S) (*)

Monochroa sp. (N) (E) (*)

Eulamprotes Bradley, 1971

Eulamprotes atrella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N)

Eulamprotes helotella (Staudinger, 1859) (N, Sa)

Eulamprotes libertinella (Zeller, 1872) (N)

Eulamprotes nigratella (Zeller, 1847) (N, S, Si, Sa) (*)

Eulamprotes ochricapilla (Rebel, 1903) (N)

Eulamprotes superbella (Zeller, 1839) (N)

Eulamprotes unicolorella (Duponchel, 1843) (N, S)
Eulamprotes wilkella (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)
Eulamprotes sp. (N) (*)

Deltophora Janse, 1950

Deltophora stictella (Rebel, 1927) (N)

Ornativalsa Gozmány, 1955

Ornativalsa heluanensis (Debski, 1913) (Si)
Ornativalsa plutelliformis (Staudinger, 1859) (N, S, Si, Sa)
Ornativalsa pseudotamaricella Sattler, 1967 (S) (*)
Ornativalsa tamariciella (Zeller, 1850) (N, S)

Gladialva Sattler, 1960

Gladialva rumicivorella (Millière, 1881) (N)

Bryotropa Heinemann, 1870

Bryotropa affinis (Haworth, 1828) (N, S, Sa)
Bryotropa basaltinella (Zeller, 1839) (N)
Bryotropa desertella (Douglas, 1850) (N, Si)
Bryotropa domestica (Haworth, 1828) (N, S, Si, Sa)
Bryotropa dryadella (Zeller, 1850) (S, Si, Sa)
Bryotropa figulella (Staudinger, 1859) (N, Si)
Bryotropa galbanella (Zeller, 1839) (N)
Bryotropa gallurella Amsel, 1952 (Sa) (E)
Bryotropa mulinoides Amsel, 1952 (Sa)
Bryotropa pallorella Amsel, 1952 (Sa) (E)
Bryotropa plebejella (Zeller, 1847) (N, S, Si, Sa)
Bryotropa saraella Amsel, 1952 (Sa)
Bryotropa senectella (Zeller, 1839) (N, S, Si)
Bryotropa similis (Stainton, 1854) (N)
Bryotropa tachyptilella (Rebel, 1916) (S) (*)
Bryotropa terrella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)
Bryotropa sp. (S) (*)

Recurvaria Haworth, 1828

Recurvaria leucatella (Clerck, 1759) (N, S, Si, Sa)
Recurvaria nanella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)

Coleotechnites Chambers, 1880

Coleotechnites piceaella (Kearfott, 1903) (N) (*)

Exoteleia Wallengren, 1881

Exoteleia dodecella (Linnaeus, 1758) (N, S)

Exoteleia succinctella (Zeller, 1872) (N)

Stenolechia Meyrick, 1894

Stenolechia gemmella (Linnaeus, 1758) (N)

Stenolechia nigrinotella (Zeller, 1847) (N, S, Si)

Stenolechia sp. (N) (*)

Parachronistis Meyrick, 1925

Parachronistis albiceps (Zeller, 1839) (N, S, Si)

Teleiodes Sattler, 1960

Teleiodes aenigma Sattler, 1983 (N)

Teleiodes alburnella (Zeller, 1839) (N, S)

Teleiodes angustipennis (Rebel, 1941) (S) (*)

Teleiodes brevivalva Huemer, 1992 (N) (E)

Teleiodes brucinella (Mann, 1872) (Si)

Teleiodes cisti (Stainton, 1869) (N, S, Sa)

Teleiodes decorella (Haworth, 1811) (N, S, Si, Sa)

Teleiodes decuriella (Mann, 1872) (N)

Teleiodes femoralis (Staudinger, 1876) (Si)

Teleiodes flavimaculella (Herrich-Schäffer, 1854) (N) (*)

Teleiodes fugacella (Zeller, 1839) (N)

Teleiodes fugitivella (Zeller, 1839) (N, Sa?)

Teleiodes gallica Huemer, 1992 (N) (*)

Teleiodes italica Huemer, 1992 (N) (E)

Teleiodes luculella (Hübner, 1813) (N, Sa)

Teleiodes myricariella (Frey, 1870) (N)

Teleiodes notatella (Hübner, 1813) (N)

Teleiodes paripunctella (Thunberg, 1794) (N, S, Si)

Teleiodes proximella (Hübner, 1796) (N)

Teleiodes saltuum (Zeller, 1878) (N)

Teleiodes scriptella (Hübner, 1796) (N, Si)

Teleiodes sequax (Haworth, 1828) (N, S)

Teleiodes wagae (Nowicki, 1860) (N)

Teleiodes sp. (N, S, Sa) (*)

Teleiopsis Sattler, 1960

Teleiopsis albifemorella (Hofmann, 1867) (N)

Teleiopsis bagriotella (Duponchel, 1840) (N, S)

Teleiopsis diffinis (Haworth, 1828) (N, S, Si, Sa)

Teleiopsis rosabella (Fologne, 1862) (N)

Teleiopsis terebinthinella (Herrich-Schäffer, 1856) (N)

Pseudotelphusa Janse, 1958

Pseudotelphusa scalella (Scopoli, 1763) (N, S)

Pseudotelphusa tessella (Linnaeus, 1758) (N, S)

Xenolechia Meyrick, 1895

Xenolechia aethiops (Humphreys & Westwood, 1845) (N, S, Sa)

Telphusa Chambers, 1872

Telphusa cistiflorella (Constant, 1890) (N, S, Sa)

Gelechia Hübner, 1825

Gelechia asinella (Hübner, 1796) (N)

Gelechia basipunctella Herrich-Schäffer, 1854 (N)

Gelechia dujardini (Huemer, 1991) (*)

Gelechia hippophaella (Schrank, 1802) (N)

Gelechia mediterranea Huemer, 1991 (Sa)

Gelechia nigra (Haworth, 1828) (N, S)

Gelechia rhombella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N)

Gelechia sabinella (Zeller, 1839)

Gelechia sabinella sabinella (Zeller, 1839) (N)

Gelechia sabinella corsella (Rebel, 1930) (Sa)

Gelechia scotinella Herrich-Schäffer, 1854 (N, S)

Gelechia senticetella (Staudinger, 1859) (N, Si)

Gelechia sororculella (Hübner, 1817) (N)

Gelechia turpella (Denis & Schiffermüller, 1775) (N, S)

Psoricoptera Stainton, 1854

Psoricoptera gibbosella (Zeller, 1839) (N) (*)

Mirificarma Gozmány, 1955

Mirificarma burdonella (Rebel, 1930) (Sa)

Mirificarma cytisella (Treitschke, 1833) (N)

Mirificarma eburnella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)

Mirificarma flavella (Duponchel, 1844) (N, S, Si, Sa)

Mirificarma interrupta (Curtis, 1827) (N)

Mirificarma lentiginosella (Zeller, 1839) (N, S)

Mirificarma maculatella (Hübner, 1796) (N)

Mirificarma monticolella (Rebel, 1931) (N) (*)

Mirificarma mulinella (Zeller, 1839) (N, S, Si, Sa)

Mirificarma ulicinella (Staudinger, 1859) (N)

Chionodes Hübner, 1825

Chionodes distinctella (Zeller, 1839) (N, S, Si, Sa)
Chionodes electella (Zeller, 1839) (N)
Chionodes fumatella (Douglas, 1850) (N)
Chionodes hayreddini Koçak, 1986 (N)
Chionodes holosericea (Herrich-Schäffer, 1854) (N)
Chionodes luctuella (Hübner, 1793) (N)
Chionodes lugubrella (Fabricius, 1794) (N)
Chionodes nebulosella (Heinemann, 1870) (N)
Chionodes perpetuella (Herrich-Schäffer, 1854) (N)
Chionodes praeclarella (Herrich-Schäffer, 1854) (N)
Chionodes tragicella (Heyden, 1865) (N)
Chionodes viduella (Fabricius, 1794) (N)

Aroga Busck, 1914

Aroga aristotelis (Millière, 1875) (N, Si)
Aroga flavicomella (Zeller, 1839) (N, Si)
Aroga pasuicola (Staudinger, 1871) (Sa) (*)
Aroga velocella (Duponchel, 1838) (N, S, Sa)

Filatima Busck, 1939

Filatima spurcella (Duponchel, 1843) (N)
Filatima tephritidella (Duponchel, 1844) (N)

Neofaculta Gozmány, 1955

Neofaculta ericetella (Geyer, 1832) (N, S, Si, Sa) (*)
Neofaculta infernella (Herrich-Schäffer, 1854) (N) (*)

Neofriseria Sattler, 1960

Neofriseria peliella (Treitschke, 1835) (N, Sa)
Neofriseria singula (Staudinger, 1867) (Si, Sa)

Prolita Leraut, 1993

Prolita sexpunctella (Fabricius, 1794) (N, S)
Prolita solutella (Zeller, 1839) (N, S)

Athrips Billberg, 1820

Athrips amoenella (Frey, 1882) (N)
Athrips mouffetella (Linnaeus, 1758) (N)
Athrips nigricostella (Duponchel, 1842) (N, S)

Athrips rancidella (Herrich-Schäffer, 1854) (N, S)

Gnorimoschema Busck, 1900

Gnorimoschema antiquum Povolný, 1966 (S, Si?)

Gnorimoschema epithymella (Staudinger, 1859)

Gnorimoschema epithymella epithymella (Staudinger, 1859) (N)

Gnorimoschema epithymella boernerii (Amsel, 1952) (Sa)

Gnorimoschema steueri Povolný, 1975 (N)

Gnorimoschema streliciella (Herrich-Schäffer, 1854)

Gnorimoschema streliciella hoefneri (Rebel, 1909) (N)

Gnorimoschema valesiella (Staudinger, 1877) (N)

Phthorimaea Meyrick, 1902

Phthorimaea operculella (Zeller, 1873) (N, S, Si)

Scrobipalpa Janse, 1951

Scrobipalpa acuminatella (Sircom, 1850) (N, Si)

Scrobipalpa artemisiella (Treitschke, 1833)

Scrobipalpa artemisiella artemisiella (Treitschke, 1833) (N, S, Si)

Scrobipalpa artemisiella oreocyrniella (Petty, 1904) (Sa)

Scrobipalpa atriplicella (Fischer von Röslerstamm, 1841) (N)

Scrobipalpa chrysanthemella (Hofmann, 1867) (N)

Scrobipalpa dagmaris Povolný, 1987 (N) (E)

Scrobipalpa ergasima (Meyrick, 1916) (S, Si)

Scrobipalpa feralis (Zeller, 1872) (N)

Scrobipalpa gallicella (Constant, 1885) (N) (*)

Scrobipalpa gallinella (Mann, 1872) (Si, Sa)

Scrobipalpa gregori Povolný, 1967 (S)

Scrobipalpa instabilella (Douglas, 1846) (N, Si, Sa)

Scrobipalpa monochromella (Constant, 1895) (S) (*)

Scrobipalpa murinella (Duponchel, 1843) (N)

Scrobipalpa obsoletella (Fischer von Röslerstamm, 1841) (N, S, Si, Sa)

Scrobipalpa ocellatella (Boyd, 1858) (N, S, Si, Sa)

Scrobipalpa pauperella (Heinemann, 1870) (N) (*)

Scrobipalpa perinii (Klimesch, 1950) (N)

Scrobipalpa phagnalella (Constant, 1895) (Sa)

Scrobipalpa proclivella (Fuchs, 1886) (N)

Scrobipalpa rebeli (Priessecker, 1914)

Scrobipalpa rebeli fuscella (Klimesch, 1938) (N)

Scrobipalpa salinella (Zeller, 1847) (N, S, Si, Sa)

Scrobipalpa samadensis (Pfaffenzeller, 1870) (N)

Scrobipalpa suaedella (Richardson, 1893)

Scrobipalpa suaedella suaedella (Richardson, 1893) (S)

Scrobipalpa suaedella flavidorsella (Amsel, 1951) (Sa)

Scrobipalpa suaedicola (Mabille, 1906) (Sa)

Scrobipalpa vasconiella (Rössler, 1877) (N, S, Sa)
Scrobipalpa sp. (Si) (*)

Scrobipalpula Povolný, 1964

Scrobipalpula diffluella (Frey, 1870) (N)
Scrobipalpula psilella (Herrich-Schäffer, 1854) (N, S, Si)
Scrobipalpula tussilaginis (Frey, 1867) (N, S)

Scrobipalopsis Povolný, 1967

Scrobipalopsis petasitis (Pfaffenzeller, 1866) (N)

Opacopsis Povolný, 1964

Opacopsis diminutella (Zeller, 1847) (Si)
Opacopsis inustella (Zeller, 1839) (N, S, Si)
Opacopsis promptella (Staudinger, 1859) (N, S, Si)

Ochrodia Povolný, 1966

Ochrodia subdiminutella (Stainton, 1867) (S)

Hedma Dumont, 1932

Hedma microcasis (Meyrick, 1929) (Sa)

Pogochaetia Staudinger, 1879

Pogochaetia solitaria Staudinger, 1879 (N)

Caryocolum Gregor & Povolný, 1954

Caryocolum alsinella (Zeller, 1868) (N)
Caryocolum amaurella (Hering, 1924) (N)
Caryocolum blandelloides Karsholt, 1981 (S, Sa)
Caryocolum blandulella (Tutt, 1887) (S)
Caryocolum bosalella (Rebel, 1936) (Sa)
Caryocolum cauligenella (Schmid, 1863) (N, Si?)
Caryocolum delphinatella (Constant, 1890) (N, S)
Caryocolum emarginatum Huemer, 1988 (N) (E)
Caryocolum fibigerium Huemer, 1988 (S, Si?)
Caryocolum gallagenellum Huemer, 1989 (S) (*)
Caryocolum huebneri (Haworth, 1828) (N, S)
Caryocolum interalbicella (Herrich-Schäffer, 1854) (N)
Caryocolum junctella (Douglas, 1851) (N)
Caryocolum laceratella (Zeller, 1868) (N)
Caryocolum leucomelanella (Zeller, 1839) (N)

Caryocolum leucothoracellum (Klimesch, 1953) (N)
Caryocolum marmoreum (Haworth, 1828) (N, Sa)
Caryocolum mucronatella (Chrétien, 1900) (N)
Caryocolum peregrinella (Herrich-Schäffer, 1854) (N)
Caryocolum petrophilum (Preissecker, 1914) (N)
Caryocolum proximum (Haworth, 1828) (N, S, Sa)
Caryocolum repentis Huemer & Luquet, 1992 (N, S)
Caryocolum saginella (Zeller, 1868) (N)
Caryocolum schleichi (Christoph, 1872)
 Caryocolum schleichi improvisella (Rebel, 1936) (N)
Caryocolum tischeriella (Zeller, 1839) (N)
Caryocolum trauniella (Zeller, 1868) (N)
Caryocolum vicinella (Douglas, 1851) (N, S)
Caryocolum viscariella (Stainton, 1855) (N, S)

Klimeschiopsis Povolný, 1967

Klimeschiopsis discontinuella (Rebel, 1899) (N)
Klimeschiopsis kiningerella (Duponchel, 1843) (N)

Cosmardia Povolný, 1965

Cosmardia moritzella (Hübner, 1814) (N)

Sattleria Povolný, 1965

Sattleria basistrigella Müller-Rutz, 1934 (N)
Sattleria izoardi Huemer & Sattler, 1992 (N) (*)
Sattleria melaleucella (Constant, 1865) (N, S)

Sophronia Hübner, 1825

Sophronia chilonella (Treitschke, 1833) (N)
Sophronia curonella Standfuss, 1884 (S) (E)
Sophronia exustellus (Zeller, 1847) (S, Si)
Sophronia grandii Hering, 1933 (N, S)
Sophronia humerella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N)
Sophronia illustrella (Hübner, 1796) (N)
Sophronia semicostella (Hübner, 1813) (N)
Sophronia sicariellus (Zeller, 1839) (N)

Stomopteryx Heinemann, 1870

Stomopteryx basalis (Staudinger, 1876) (N, Si)
Stomopteryx detersella (Zeller, 1847) (N, Si)
Stomopteryx flavipalpella Jäckh, 1959 (N)
Stomopteryx hungaricella Gozmány, 1957 (Sa) (*)
Stomopteryx remissella (Zeller, 1847) (N, S, Si)

Stomopteryx sp. (S) (*)

Syncopacma Meyrick, 1925

Syncopacma albifrontella (Heinemann, 1870) (N)
Syncopacma albipalpella (Herrich-Schäffer, 1854) (S, Si)
Syncopacma cinctella (Clerck, 1759) (N, S, Si)
Syncopacma cincticulella (Bruand, 1850) (N)
Syncopacma coronillella (Treitschke, 1833) (N, S, Si)
Syncopacma montanata Gozmány, 1957 (N) (*)
Syncopacma patruella (Mann, 1857) (N, S, Si)
Syncopacma polychromella (Rebel, 1902) (N, S, Si)
Syncopacma sangiella (Stainton, 1863) (N, S, Sa) (*)
Syncopacma suecicella (Wolff, 1958) (N, Sa) (*)
Syncopacma taeniolella (Zeller, 1839) (N, S)
Syncopacma wormiella (Wolff, 1958) (N) (*)

Aproaerema Durrant, 1897

Aproaerema anthyllidella (Hübner, 1813) (N, S, Si, Sa)

Iwaruna Gozmány, 1957

Iwaruna biguttella (Duponchel, 1843) (N, S, Sa)
Iwaruna psoralella (Millière, 1865) (N)

Anacampsis Curtis, 1827

Anacampsis blattariella (Hübner, 1796) (N)
Anacampsis hirsutella (Constant, 1884) (S)
Anacampsis obscurella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)
Anacampsis populella (Clerck, 1759) (N, S, Si)
Anacampsis scintillella (Fischer von Röslerstamm, 1839) (N, S, Si, Sa)
Anacampsis timidella (Wocke, 1887) (N, S, Sa)

Mesophleps Hübner, 1825

Mesophleps corsicella (Herrich-Schäffer, 1856) (N, S, Si, Sa)
Mesophleps oxycedrella (Millière, 1871) (Si, Sa)
Mesophleps silacella (Hübner, 1796) (N, S, Si, Sa)

Uncustriodonta Agenjo, 1952

Uncustriodonta trinotella (Herrich-Schäffer, 1856) (N, S, Si, Sa)

Anarsia Zeller, 1839

Anarsia lineatella (Zeller, 1839) (N, S, Si, Sa)

Anarsia spartiella (Schränk, 1802) (N, S, Si, Sa)
Anarsia sp. (N, S, Si) (*)

Hypatima Hübner, 1825

Hypatima rhomboidella (Linnaeus, 1758) (N)

Nothris Hübner, 1825

Nothris congressariella (Bruand, 1858) (N, S, Si, Sa)
Nothris lemniscella (Zeller, 1839) (N)
Nothris verbascella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)

Dichomeris Hübner, 1818

Dichomeris acuminatus (Staudinger, 1876) (N, S, Si, Sa)
Dichomeris alacella (Zeller, 1839) (N, S, Sa)
Dichomeris derasella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)
Dichomeris helianthemis (Walsingham, 1903) (Sa) (*)
Dichomeris juniperella (Linnaeus, 1761) (N, S)
Dichomeris lamprostoma (Zeller, 1847) (Si, Sa)
Dichomeris latipennella (Rebel, 1937) (N)
Dichomeris limbipunctella (Staudinger, 1859) (N, S, Sa)
Dichomeris limosella (Schläger, 1849) (N)
Dichomeris marginella (Fabricius, 1781) (N, S)
Dichomeris nitiellus (Constantini, 1923) (N) (E)
Dichomeris rasilella (Herrich-Schäffer, 1854) (N)
Dichomeris ustalella (Fabricius, 1794) (N, S) (*)

Anaspaltis Meyrick, 1925

Anaspaltis renigerella (Zeller, 1839) (N)

Brachmia Hübner, 1825

Brachmia albinervis Gerasimov, 1929 (N) (*)
Brachmia blandella (Fabricius, 1798) (N, S, Si)
Brachmia dimidiella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)
Brachmia procursella Rebel, 1903 (N)

Helcystogramma Zeller, 1877

Helcystogramma arulensis Rebel, 1929 (N)
Helcystogramma lutatella (Herrich-Schäffer, 1854) (N, S, Si)
Helcystogramma rufescens (Haworth, 1828) (N, S)
Helcystogramma triannulella (Herrich-Schäffer, 1854) (N, S, Sa)

Acompsia Hübner, 1818

Acompsia cinerella (Clerck, 1759) (N, S, Si, Sa)
Acompsia maculosella (Stainton, 1851) (N)
Acompsia minorella Rebel, 1899 (N, S)
Acompsia tripunctella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)

Telephila Meyrick, 1923

Telephila schmidtellus (Heyden, 1848) (N, Sa)

Palumbina Rondani, 1876

Palumbina guerinii (Stainton, 1857) (N, S, Si)

Thiotricha Meyrick, 1886

Thiotricha majorella Rebel, 1910 (N)
Thiotricha subocellea (Stephens, 1834) (N)

Pectinophora Busck, 1917

Pectinophora gossypiella (Saunders, 1843) (S, Si)

Pexicopia Common, 1958

Pexicopia malvella (Hübner, 1805) (N, S, Si, Sa)

Platyedra Meyrick, 1895

Platyedra subcinerea (Haworth, 1828) (N, S, Si, Sa)

Sitotroga Heinemann, 1870

Sitotroga cerealella (Olivier, 1789) (N, S, Si, Sa)
Sitotroga psacasta Meyrick, 1908 (Si)

Note

Apatetris sp.: Specie probabilmente nuova (Prov. Trento, Pietramurata; Piemonte, Almese).
Apatetris sp.: Specie probabilmente nuova (Romagna, Marina Romea).
Metanarsia modesta: Specie nuova per l'Italia.
Epidola: Lo status tassonomico di *Epidola grisea* Amsel, 1942 è incerto e perciò questo nome è escluso dalla lista.
Megacraspedus tristictus: Specie nuova per l'Italia.
Megacraspedus sp.: Specie probabilmente nuova (Liguria: Capo Mele; Latina: Monte Aurunci; Calabria: Sila Grande e Papasidero; Lazio, Monti di Tolfa; Lucania, Mt. Pollino).
Megacraspedus sp.: Specie non descritta (Prov. Bergamo: Passo San Marco).
Aristotelia brizella: Specie nuova per l'Italia.

Isophrictis meridionella: Specie nuova per l'Italia.
Metzneria artificella: Specie nuova per l'Italia.
Metzneria diffusella: Specie nuova per l'Italia.
Metzneria subflavella: Specie nuova per l'Italia.
Psammathocrita osseella: Specie nuova per l'Italia.
Monochroa ferrea: Specie nuova per l'Italia.
Monochroa melagonella: Specie collocata nel genere Stomopteryx Heinemann nei cataloghi più recenti (ad esempio, Leraut, in stampa), ignorando che Wolff (1958) la trasferì nel genere Monochroa Heinemann. La collocazione in questo genere è da preferire anche se essa non è congenere della specie tipo di Monochroa. Specie nuova per l'Italia.
Monochroa scutatella: Specie descritta come Xystophora scutatella Müller-Rutz, 1920. Sulla base dell'esame di quattro sintipo essa è stata recentemente combinata come Monochroa scutatella (Müller-Rutz, 1920). Un esemplare etichettato come "scutatella Poschiavo e.l. 10.vi.18 Th" è qui designato come lectotipo. Specie nuova per l'Italia.
Monochroa simplicella: Specie nuova per l'Italia.
Monochroa sp.: Entità incerta, affine a M. suffusella (Douglas, 1850). Ad essa vanno probabilmente riferiti esemplari dalla Lucania (Nova Siri) e dall'Emilia (Modena, San Pietro).
Monochroa sp.: Specie non descritta (Prov. Bolzano, Kalterersee).
Eulamprotes nigritlella: In un primo tempo Eulamprotes nigritlella (Zeller) fu erroneamente collocata nel genere Syncopacma Meyrick. Negli ultimi decenni è stata considerata sinonimo di E. atrella (Denis & Schiffermüller), ma è una specie distinta. Essa appartiene ad un gruppo di specie strettamente imparentate (che include anche atrella), ed è possibile che il materiale dall'Italia risulti effettivamente includere più di una specie. Poiché nigritlella, con località tipo in Sicilia (distinta da atrella), è il nome disponibile più antico nel gruppo, noi lo usiamo per tutte le popolazioni italiane.
Eulamprotes sp.: Specie non descritta, trovata in numerose località del nord Italia e nota anche dalla Turchia.
Ornativulva pseudotamaricella: Specie nuova per l'Italia.
Bryotropha: Lo status tassonomico di Bryotropha zannonicola Hartig, 1953 è incerto e perciò questo nome è escluso dalla lista.
Bryotropha tachyptilella: Specie nuova per l'Italia.
Bryotropha sp.: Specie probabilmente non descritta (Campania: Amalfi).
Coleotechnites piceaella: Specie nuova per l'Italia.
Stenolechia sp.: Specie inedita, forse riferibile ad un nuovo genere. (Prov. Bolzano: Montiggl; Prov. Verona: Monte).
Teleiodes angustipennis: Specie nuova per l'Italia.
Teleiodes flavimaculella: Specie nuova per l'Italia.
Teleiodes gallica: Specie nuova per l'Italia.
Teleiodes sp.: Specie probabilmente non descritta (Liguria: Andora-Cona; Prov. Reggio di Calabria: Aspromonte; Sardegna).
Gelechia dujardini: Specie nuova per l'Italia.
Psoricoptera gibbosella: Specie nuova per l'Italia.
Mirificarma monticolella: Specie nuova per l'Italia.
Aroga pasuicola: Specie nuova per l'Italia.
Neofaculta ericetella: Citata anche sotto il nome specifico betulae, per lapsus calami.
Neofaculta infernella: Citata anche sotto il nome specifico infernalis, per lapsus calami.
Scrobipalpa: Lo stato tassonomico di Lita calaritanella Amsel, 1952, L. halympiphaga Amsel, 1952, L. thymelaeae Amsel, 1939, L. pygmaeella Heinemann, 1870, L. trochilella

Heinemann, 1870 e *L. melanella* Heinemann, 1870 è incerto e perciò questi nomi sono esclusi dalla lista.

Scrobipalpa gallicella: Specie nuova per l'Italia.

Scrobipalpa monochromella: Specie nuova per l'Italia.

Scrobipalpa pauperella: Specie nuova per l'Italia.

Scrobipalpa sp.: Specie di incerta identità, non conspecifica di alcuna specie italiana del genere *Scrobipalpa* (Sicilia: Mt. Etna, Arso).

Caryocolum gallagenellum: Specie nuova per l'Italia.

Sattleria izoardi: Specie nuova per l'Italia.

Stomopteryx hungaricella: Specie nuova per l'Italia.

Stomopteryx sp.: Specie probabilmente non descritta, trovata in numerose località del sud Italia.

Syncopacma: Lo stato tassonomico di *Schuetzeia* [*Syncopacma*] *serratella* Amsel, 1952 è incerto e perciò questo nome è escluso dalla lista (Karlsholt & Huemer, in stampa).

Syncopacma montanata: Specie nuova per l'Italia.

Syncopacma sangiella: Specie nuova per l'Italia.

Syncopacma suecicella: Specie nuova per l'Italia.

Syncopacma wormiella: Specie nuova per l'Italia.

Anarsia sp.: Specie non decritta (Liguria: Andora-Conna; Prov. Latina: Monte Aurunci; Isole Eolie: Lipari).

Dichomeris helianthemis: Specie nuova per l'Italia.

Dichomeris ustalella: Specie citata anche sotto il nome *ustulella*, per lapsus calami.

Brachmia: La specie descritta come *Brachmia ternatella* Staudinger, 1859, appartiene ad altra famiglia.

Brachmia albinervis: Specie nuova per l'Italia.

Cossidae

Stygia Latreille, 1803

Stygia australis Latreille, 1803 (N) (*)

Stygioides Bruand, 1853

Stygioides colchicus (Herrich-Schäffer, 1851) (S?) (*)

Cossus Fabricius, 1793

Cossus cossus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Lamellocossus Daniel, 1956

Lamellocossus terebrum ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)

Parahypopta Daniel, 1961

Parahypopta caestrum (Hübner, 1908) (N, S, Si)

Dyspessa Hübner, 1820

Dyspessa aculeata Turati, 1909 (Si) (E)

Dyspessa ulula (Borkhausen, 1820) (N, S, Si)

Phragmataecia Newmann, 1850

Phragmataecia castaneae (Hübner, 1790) (S, Si, Sa)

Zeuzera Latreille, 1804

Zeuzera pyrina (Linnaeus, 1761) (N, S, Si, Sa)

Note

Stygia australis: Segnalato solo in Liguria e Alpi marittime.

Stygioides colchicus: Le segnalazioni di precedenti autori confermate da Daniel, 1954/55 per l'Italia centrale non sono accettate nella monografia di Freina & Witt, 1990. La distribuzione accertata è limitata alla Grecia.

Brachodidae

Brachodes Guenée, 1845

Brachodes appendiculata (Esper, 1779) (N)

Brachodes cassandrella (Staudinger, 1859) (N) (*)

Brachodes nana (Treitscke, 1834) (Si?)

Brachodes pumila (Ochsenheimer, 1808) (N, S)

Note

Brachodes cassandrella: Specie descritta dell'Andalusia e citata da Mariani, 1941-43 del Modenese.

Sesiidae

Tinthia Walker, [1865]

Tinthia tineiformis (Esper, [1789]) (N, S, Si)

Pennisetia Dehne, 1850

Pennisetia hylaeiformis (Laspeyres, 1801) (N, S)

Sesia Fabricius, 1775

Sesia apiformis (Clerck, 1759) (N, S, Si, Sa)
Sesia bembeciformis (Hübner, [1806]) (N)

Paranthrene Hübner, [1819]

Paranthrene insolita Le Cerf, 1914 (N) (*)
Paranthrene tabaniformis (Rottenburg, 1775) (N, S, Si)

Synanthedon Hübner, [1819]

Synanthedon andrenaeforme (Laspeyres, 1801) (N)
Synanthedon cephiforme (Ochsenheimer, 1808) (N, S) (*)
Synanthedon codeti (Oberthür, 1881) (Sa)
Synanthedon conopiforme (Esper, 1782) (Si)
Synanthedon culiciforme (Linnaeus, 1758) (N)
Synanthedon flaviventris (Staudinger, 1883) (N)
Synanthedon formicaeforme (Esper, 1783) (N, S)
Synanthedon melliniforme (Laspeyres, 1801) (N, S)
Synanthedon myopaforme (Borkhausen, 1789) (N)
Synanthedon polare (Staudinger, 1877) (N?)
Synanthedon scoliaeforme (Borkhausen, 1789) (N)
Synanthedon spheciforme ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N)
Synanthedon spuleri (Fuchs, 1908) (N, S, Si)
Synanthedon stomoxiforme (Hübner, 1790) (N)
Synanthedon tipuliforme (Clerck, 1759) (N)
Synanthedon typhiaeforme (Borkhausen, 1789)
 Synanthedon typhiaeforme typhiaeforme (Borkhausen, 1789) (N, S)
 Synanthedon typhiaeforme cruentatum Mann, 1859 (Si)
Synanthedon vespiforme (Linnaeus, 1761) (N, S, Si, Sa)

Bembecia Hübner, [1819]

Bembecia albanensis (Rebel, 1918) (N, S, Sa)
Bembecia himmighoffeni (Staudinger, 1866) (S)
Bembecia hymenopteriformis (Bellier, 1860) (Si)
Bembecia ichneumoniformis ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si)
Bembecia scopigera (Scopoli, 1763) (N)
Bembecia uroceriformis (Treitschke, 1834) (N, S, Si)

Pyropteron Newman, 1832

Pyropteron chrysidiforme (Esper, 1782) (N, S, Si, Sa)
Pyropteron siculum Le Cerf, 1922 (Si)

Synansphecica Capuse, 1973

Synansphecica affinis (Staudinger, 1856) (N, S, Si)

Synansphecchia doryliformis (Ochsenheimer, 1808) (N, S, Si)
Synansphecchia leucomelaena (Zeller, 1847) (N, S, Si)
Synansphecchia meriaeformis (Boisduval, 1840) (S, Si)
Synansphecchia muscaeformis (Esper, 1783) (N, S)
Synansphecchia triannuliformis (Freyer, 1845) (N, S, Si)

***Chamaesphecchia* Spuler, 1910**

Chamaesphecchia aerifrons (Zeller, 1847) (N, S, Si, Sa)
Chamaesphecchia annellata (Zeller, 1847) (N, S)
Chamaesphecchia anthraciformis (Rambur, 1832) (Sa)
Chamaesphecchia bibioniformis (Esper, 1800) (N)
Chamaesphecchia chalciformis (Esper, [1804]) (N)
Chamaesphecchia doleriformis (Herrich-Schäffer, 1846) (N, S)
Chamaesphecchia dumonti (Le Cerf, 1922) (N)
Chamaesphecchia empiformis (Esper, 1783) (N, S)
Chamaesphecchia euceraeformis (Ochsenheimer, 1816) (N, S)
Chamaesphecchia foeniformis (Herrich-Schäffer, 1846) (S, Si, Sa)
Chamaesphecchia leucopsiformis (Esper, 1800) (N)
Chamaesphecchia masariformis (Ochsenheimer, 1808) (S, Si)
Chamaesphecchia osmiaeformis (Herrich-Schäffer, 1848) (Si)
Chamaesphecchia palustris Kautz, 1927 (N)
Chamaesphecchia schmidtiformis (Freyer, 1836) (N)
Chamaesphecchia staudingeri (Failla-Tedaldi, 1890) (Si)
Chamaesphecchia tenthrediniformis ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N) (*)

Note

Paranthrene insolita: Si tratta di specie nuova per la fauna d'Italia, rinvenuta in Romagna dagli Autori.

Synanthedon cephiforme: Determinazione dubbia.

Chamaesphecchia tenthrediniformis: Reperti di incerta determinazione.

Heterogynidae

***Heterogynis* Rambur, 1837**

Heterogynis penella (Hübner, 1819) (N)
Heterogynis eremita Zilli, Cianchi, Racheli & Bullini, 1988 (S)

Zygaenidae

***Theresimima* Strand, 1917**

Theresimima ampelophaga (Bayle-Barelle, 1808) (N, S)

Rhagades Wallengren, 1863

Rhagades pruni ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N)

Adscita Retzius, 1783

Adscita albanica (Naufock, 1926) (N, S)
Adscita alpina (Alberti, 1937) (N, S, Si)
Adscita budensis (Speyer & Speyer, 1858) (N, S)
Adscita chloros (Hübner, 1818) (N, S, Si)
Adscita geryon (Hübner, [1813]) (N, S)
Adscita globulariae (Hübner, 1793) (N, S)
Adscita mannii (Lederer, 1852) (N, S, Si)
Adscita notata (Zeller, 1847) (N, S, Si)
Adscita statices (Linné, 1758) (N)
Adscita subsolana (Staudinger, 1862) (N, S)
Adscita tenuicornis (Zeller, 1847) (S, Si)

Aglaope Latreille, 1809

Aglaope infausta (Linné, 1767) (N) (*)

Zygaena Fabricius, 1775

Zygaena carniolica (Scopoli, 1763) (N, S, Si)
Zygaena charon (Hübner, 1796) (N, S, Si) (*)
Zygaena corsica Boisduval, [1828] (Sa) (E)
Zygaena cynarae (Esper, 1789) (N, S)
Zygaena ephialtes (Linné, 1767) (N, S)
Zygaena erythra (Hübner, [1806]) (N, S, Si)
Zygaena exulans (Reiner & Hohenwarth, 1792) (N, S)
Zygaena fausta (Linné, 1767) (N)
Zygaena filipendulae (Linné, 1758) (N, S, Si)
Zygaena hylaris Ochsenheimer, 1808 (N)
Zygaena lavandulae (Esper, 1783) (N)
Zygaena lonicerae (Scheven, 1777) (N, S)
Zygaena loti ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)
Zygaena minos ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S) (*)
Zygaena occitanica de Villers, 1789 (N)
Zygaena orana Duponchel, 1835 (Sa)
Zygaena osterodensis Reiss, 1921 (N) (*)
Zygaena oxytropis Boisduval, [1828] (N, S, Si) (E)
Zygaena punctum Ochsenheimer, 1808 (S, Si)
Zygaena purpuralis (Brünnich, 1763) (N, S, Si)
Zygaena rhadamanthus (Esper, [1793]) (N)
Zygaena romeo Duponchel, 1835 (N, S, Si)
Zygaena rubicunda (Hübner, [1817]) (S) (E)
Zygaena sarpedon (Hübner, 1790) (N)

Zygaena transalpina (Esper, [1781]) (N, S)
Zygaena trifolii (Esper, 1783) (Si)
Zygaena vesubiana Le Charles, 1933 (N) (E) (*)

Note

Aglaope infausta: Scoperta recentemente in val di Susa.
Zygaena charon: = *Z. viciae* [Denis & Schiffermüller], 1775 ssp. *charon*.
Zygaena minos: La nomenclatura di questa specie, precedentemente nota come *Z. diaphana* Staudinger, 1887 sarà probabilmente soggetta a ulteriori cambiamenti, poichè la tipificazione del nome di Denis & Schiffermüller, come operata recentemente, può risultare invalida.
Zygaena osterodensis: Prima che il nome di *Z. minos* venisse inaspettatamente neotipificato con un esemplare di *Z. diaphana*, questa specie era giustamente nota come *Z. minos*.
Zygaena vesubiana: = *Z. brizae* (Esper, 1800) ssp. *vesubiana*.

Limacodidae

Apoda Haworth, 1809

Apoda limacodes (Kufmagel, 1766) (N, S, Si)

Heterogenea Knoch, 1783

Heterogenea asella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)

Choreutidae

Anthophila Haworth, 1811

Anthophila fabriciana (Linnaeus, 1767) (N, S, Si, Sa)

Prochoreutis Diakonoff & Heppner, 1980

Prochoreutis holotoxa (Meyrick, 1903) (N)
Prochoreutis myllerana (Fabricius, 1794) (N, S, Si)
Prochoreutis stellaris (Zeller, 1847) (N, S, Si)

Tebenna Billberg, 1820

Tebenna bjerkandrella (Thunberg, 1784)
Tebenna bjerkandrella bjerkandrella (Thunberg, 1784) (N, S, Si, Sa)
Tebenna bjerkandrella pretiosana (Duponchel, 1842) (N, Si, Sa)
Tebenna micalis (Mann, 1857) (N, S, Sa)

Millieria Ragonot, 1874

Millieria dolosalis (Heydenreich, 1851) (N, S)

Choreutis Hübner, 1825

Choreutis diana (Hübner, 1822) (N, S)

Choreutis nemorana (Hübner, 1799) (N, S, Si, Sa)

Choreutis pariana (Clerck, 1759) (N, Si)

Tortricidae

Olindia Guenée, 1845

Olindia schumacherana (Fabricius, 1787) (N, S, Sa)

Isotrias Meyrick, 1895

Isotrias huemeri Trematerra, 1993 (S) (E)

Isotrias hybridana (Hübner, 1817) (N, S, Si)

Isotrias joannisana (Turati, 1921) (S) (E)

Isotrias martelliana Trematerra, 1990 (S) (E)

Isotrias rectifasciana (Haworth, 1811) (N, S)

Isotrias stramentana (Guenée, 1845) (N, S)

Phtheochroa Stephens, 1829

Phtheochroa drenovskyi (Rebel, 1916) (S)

Phtheochroa duponchelana (Duponchel, 1843) (Si)

Phtheochroa ingridae Huemer, 1990 (N) (E)

Phtheochroa inopiana (Haworth, 1811) (N, S)

Phtheochroa frigidana (Guenée, 1845) (N)

Phtheochroa pulvillana (Herrich-Schaeffer, 1851) (N)

Phtheochroa purana (Guenée, 1846) (N)

Phtheochroa rugosana (Hübner, 1799) (N)

Phtheochroa schreibersiana (Froelich, 1828) (N, S, Sa)

Phtheochroa simoniana (Staudinger, 1859) (*)

Phtheochroa sodaliana (Haworth, 1811) (N)

Phtheochroa vulneratana (Zetterstedt, 1839) (N)

Hysterophora Obraztsov, 1944

Hysterophora maculosana (Haworth, 1811) (N, S, Si, Sa)

Cochylimorpha Razowski, 1959

Cochylimorpha alternana (Stephens, 1834) (N, S)

Cochylimorpha decolorella (Zeller, 1839) (Si, Sa)

Cochylimorpha elongana (Fischer von Roeslerstamm, 1839) (N)

Cochylimorpha fucosa (Razowski, 1970) (S?)
Cochylimorpha hilarana (Herrich-Schaeffer, 1851) (N)
Cochylimorpha jucundana (Treitschke, 1835) (N, S)
Cochylimorpha meridiana (Staudinger, 1859) (N)
Cochylimorpha perfusana (Guenée, 1845) (N)
Cochylimorpha peucedana (Ragonot, 1889) (Si, Sa)
Cochylimorpha sparsana (Staudinger, 1879) (N, S)
Cochylimorpha straminea (Haworth, 1811) (N, S, Si, Sa)
Cochylimorpha tiraculana (Bassi & Scaramozzino, 1989) (N)
Cochylimorpha woliniana (Schleich, 1868) (N)

Phalonidia Le Marchand, 1933

Phalonidia affinitana (Douglas, 1846) (N, S?, Si)
Phalonidia albipalpana (Zeller, 1847) (N, S, Si)
Phalonidia alismata (Ragonot, 1883) (N)
Phalonidia contractana (Zeller, 1847) (N, S, Si, Sa)
Phalonidia curvistrigana (Stainton, 1859) (N, Si, Sa)
Phalonidia gilvicomana (Zeller, 1847) (N)
Phalonidia manniana (Fischer von Roeslerstamm, 1839) (N, S, Si, Sa)

Piercea Filipjev, 1940

Piercea minimana (Caradja, 1916) (N)
Piercea permixtana ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)
Piercea rubricana (Peyerimhoff, 1877) (N, S)
Piercea vectisana (Humphreys & Westwood, 1845) (N, Si)

Agapeta Hübner, 1822

Agapeta hamana (Linnaeus, 1758) (N, S)
Agapeta zoegana (Linnaeus, 1767) (N, S)

Fulvoclysia Obraztsov, 1943

Fulvoclysia nerminae Koçak, 1982 (N)

Eugnosta Hübner, 1825

Eugnosta magnificana (Rebel, 1914) (N, Si)

Prochlidonia Razowski, 1960

Prochlidonia amiantana (Hübner, 1799) (N, S)

Eupoecilia Stephens, 1829

Eupoecilia ambiguella (Hübner, 1796) (N, S, Si, Sa)

Eupoecilia angustana (Hübner, 1799) (N, S)
Eupoecilia sanguisorbana (Herrich-Schaeffer, 1856) (N)

Commophila Hübner, 1825

Commophila aeneana (Hübner, 1800) (*)

Aethes Billberg, 1820

Aethes ardezana (Mueller-Rutz, 1922) (N)
Aethes aurofasciana (Mann, 1855) (N)
Aethes bilbaensis (Roessler, 1877) (N, S, Si, Sa)
Aethes caucasica (Amsel, 1959) (N)
Aethes cnicana (Westwood, 1854) (N)
Aethes deaurana (Peyerimhoff, 1877) (N, Sa)
Aethes decimana ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N)
Aethes deutschiana (Zetterstedt, 1839) (N, S)
Aethes dilucidana (Stephens, 1852) (S, Si)
Aethes flagellana (Duponchel, 1836) (N, S, Si, Sa)
Aethes francillana (Fabricius, 1794) (N, S, Si, Sa)
Aethes hartmanniana (Clerck, 1759) (N, S)
Aethes kasyi Razowski, 1962 (S)
Aethes kindermanniana (Treitschke, 1830) (N, Sa)
Aethes languidana (Mann, 1855) (S, Sa)
Aethes margaritana (Haworth, 1811) (N, S, Sa)
Aethes margarotana (Duponchel, 1836) (N, S, Si)
Aethes mauritanica (Walsingham, 1898) (N, Sa)
Aethes moribundana (Staudinger, 1859) (N, S, Si)
Aethes piercei (Obraztsov, 1952) (N, S)
Aethes rubigana (Treitschke, 1830) (N, S)
Aethes rutilana (Hübner, 1817) (N, S)
Aethes sanguinana (Treitschke, 1830) (N, Si, Sa)
Aethes smeathmanniana (Fabricius, 1781) (N, S)
Aethes tesserana ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, Si, Sa)
Aethes tornella (Walsingham, 1898) (N, Si, Sa)
Aethes vicinana (Mann, 1859) (Si)
Aethes williana (Brahm, 1791) (N, S, Si, Sa)

Cochylidia Obraztsov, 1956

Cochylidia heydeniana (Herrich-Schaeffer, 1851) (N, S, Si)
Cochylidia implicitana (Wocke, 1856) (N)
Cochylidia moguntiana (Roessler, 1864) (N, S)
Cochylidia richteriana (Fischer von Roeslerstamm, 1837) (N)
Cochylidia rupicola (Curtis, 1834) (N, S, Sa)
Cochylidia subroseana (Haworth, 1811) (N)

Diceratura Djakonov, 1923

Diceratura ostrinana (Guenée, 1845) (N, S, Sa)
*Diceratura rhodograpt*a (Djakonov, 1929) (Sa)
Diceratura roseofasciana (Mann, 1855) (S, Si, Sa)

Cochylis Treitschke, 1830

Cochylis atricapitana (Stephens, 1852) (N, S, Si)
Cochylis dubitana (Hübner, 1799) (N, S, Sa)
Cochylis epilinana (Duponchel, 1842) (N, S, Si, Sa)
Cochylis flavicilliana (Westwood, 1854) (S, Si, Sa)
Cochylis hybridella (Hübner, 1813) (N, S, Si, Sa)
Cochylis molliculana Zeller, 1847 (N, S, Si)
Cochylis nana (Haworth, 1811) (N)
Cochylis pallidana Zeller, 1847 (N, Si, Sa)
Cochylis posterana Zeller, 1847 (N, S, Si, Sa)
Cochylis roseana (Haworth, 1811) (N, S, Si)
Cochylis salebrana (Mann, 1862) (S)

Cryptocochylis Razowski, 1960

Cryptocochylis conjunctana (Mann, 1864) (S)

Falseucaria Obraztsov & Swatschek, 1958

Falseucaria degreyana (McLachlan, 1869) (N)
Falseucaria ruficilliana (Haworth, 1811) (N, S, Si, Sa)

Spatalistis Meyrick, 1907

Spatalistis bifasciana (Hübner, 1787) (N)

Tortrix Linnaeus, 1758

Tortrix viridana Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)

Aleimma Hübner, 1825

Aleimma loeflingianum (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Acleris Hübner, 1825

Acleris abietana (Hübner, 1822) (N)
Acleris aspersana (Hübner, 1817) (N)
Acleris bergmanniana (Linnaeus, 1758) (N, S)
Acleris comariana (Lienig & Zeller, 1846) (N)
Acleris cristana ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N)
Acleris emargana (Fabricius, 1775) (N)

Acleris ferrugana ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Sa)
Acleris fimbriana (Thunberg, 1791) (N)
Acleris forsskaleana (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)
Acleris hastiana (Linnaeus, 1758) (N, S, Sa)
Acleris hippophaeana (Heyden, 1865) (N)
Acleris holmiana (Linnaeus, 1758) (N, S)
Acleris hyemana (Haworth, 1811) (N)
Acleris kochiella (Goeze, 1783) (N, S, Si, Sa)
Acleris lacordairana (Duponchel, 1836) (N)
Acleris laterana (Fabricius, 1794) (N, S)
Acleris lipsiana ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N)
Acleris literana (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
Acleris logiana (Clerck, 1759) (N, S, Si, Sa)
Acleris notana (Donovan, 1806) (N, S, Sa)
Acleris permutana (Duponchel, 1836) (N)
Acleris quercinana (Zeller, 1849) (N, S, Si, Sa)
Acleris rhombana ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Sa)
Acleris roscidana (Hübner, 1799) (N)
Acleris rufana ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N)
Acleris schalleriana (Linnaeus, 1761) (N, S, Si)
Acleris sparsana ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)
Acleris umbrana (Hübner, 1799) (N)
Acleris variegana ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)

Propiromorpha Obraztsov, 1955

Propiromorpha rhodophana (Herrich-Schaeffer, 1851) (N, S)

Xerocnephasia Leraut, 1979

Xerocnephasia rigana (Sodoffsky, 1829) (N)

Neosphaleroptera Réal, 1953

Neosphaleroptera nubilana (Hübner, 1799) (N, S, Si)

Euledereria Fernald, 1908

Euledereria alpicolana (Froelich, 1830) (N)

Doloploca Hübner, 1825

Doloploca punctulana ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N)

Oxypteron Staudinger, 1871

Oxypteron exiguanum (de La Harpe, 1860) (Si)
Oxypteron schawerdai (Rebel, 1936) (Sa)

Exapate Hübner, 1825

Exapate congelatella (Clerck, 1759) (N, Si)
Exapate duratella Heyden, 1864 (N)

Tortricodes Guenée, 1845

Tortricodes alternellus ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si)

Eana Billberg, 1820

Eana argentana (Clerck, 1759) (N, S)
Eana canescana (Guenée, 1845) (N)
Eana derivana (de La Harpe, 1858) (N)
Eana incanana (Stephens, 1852) (N, S, Si)
Eana italica (Obraztsov, 1950) (S)
Eana osseana (Scopoli, 1763) (N, S)
Eana penziana (Thunberg, 1791) (N, S, Si, Sa)
Eana penziana fiorana Razowski, 1959 (S)
Eana viardi (Réal, 1953) (N)

Archicnephasia Razowski, 1983

Archicnephasia hartigi Razowski, 1983 (S) (E)

Cnephasia Curtis, 1826

Cnephasia abrasana (Duponchel, 1843) (N, S)
Cnephasia alticolana (Herrich-Schaeffer, 1851) (N, Sa)
Cnephasia amseli (D. Lucas, 1942) (Si)
Cnephasia asseclana ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)
Cnephasia chrysanthæana (Duponchel, 1843) (N, S, Si, Sa)
Cnephasia communana (Herrich-Schaeffer, 1851) (N, S)
Cnephasia conspersana Douglas, 1846 (S)
Cnephasia cupressivorana (Staudinger, 1871) (N, S, Si, Sa)
Cnephasia daedaleana Razowski, 1983 (Sa) (E)
Cnephasia ecullyana Réal, 1951 (N, S, Si, Sa)
Cnephasia fragosana (Zeller, 1847) (N?, S?, Si, Sa)
Cnephasia genitalana Pierce & Metcalfe, 1922 (N, S)
Cnephasia gueneana (Duponchel, 1836) (N, Si, Sa)
Cnephasia heinemanni Obraztsov, 1956 (N, S, Si, Sa)
Cnephasia incertana Treitschke, 1835 (N, S, Si?, Sa)
Cnephasia longana Haworth, 1811 (N, S, Si, Sa)
Cnephasia pasiuana (Hübner, 1799) (N, S, Si)
Cnephasia pollinoana Trematerra, 1991 (S) (E)
Cnephasia sedana (Constant, 1884) (N, S)
Cnephasia stephensiana (Doubleday, 1849) (N, S, Si, Sa)

Cnephasia zangheriana Trematerra, 1991 (S) (E)

Sparganothis Hübner, 1825

Sparganothis pilleriana ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)

Eulia Hübner, 1825

Eulia ministrana (Linnaeus, 1758) (N, S)

Pseudargyrotoza Obraztsov, 1954

Pseudargyrotoza conwagana (Fabricius, 1775) (N, S, Si)

Batodes Guenée, 1845

Batodes angustiorana (Haworth, 1811) (N, S, Sa)

Batodes saturana (Turati, 1913) (Sa) (E)

Aneuxanthia Le Marchand, 1933

Aneuxanthia locupletana (Hübner, 1819) (Si, Sa)

Epagoge Hübner, 1825

Epagoge grotiana (Fabricius, 1781) (N, S, Si)

Periclepsis Bradley, 1977

Periclepsis cinctana ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)

Philedone Hübner, 1825

Philedone gerningana ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si)

Hastula Millière, 1857

Hastula hyerana Millière, 1858 (N, Si, Sa)

Pseudeulia Obraztsov, 1954

Pseudeulia asinana (Hübner, 1799) (N)

Capua Stephens, 1834

Capua vulgana (Froelich, 1828) (N, S)

Philedonides Obraztsov, 1954

Philedonides lunanus (Thunberg, 1784) (N)
Philedonides rhombicanus (Herrich-Schaeffer, 1851) (N, S)

Argyrotaenia Stephens, 1852

Argyrotaenia ljugiana (Thunberg, 1797) (N, S)

Archips Hübner, 1822

Archips betulanus (Hübner, 1787) (N)
Archips crataeganus (Hübner, 1799) (N)
Archips oporanus (Linnaeus, 1758) (N, Sa)
Archips podanus (Scopoli, 1763) (N, S, Sa)
Archips rosanus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
Archips xylosteanus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Choristoneura Lederer, 1859

Choristoneura diversana (Hübner, 1817) (N, S)
Choristoneura hebenstreitella (Müller, 1764) (N, S, Si)
Choristoneura lafauryana (Ragonot, 1875) (N)
Choristoneura murinana (Hübner, 1799) (N, S)

Tosirips Razowski, 1987

Tosirips magyarus Razowski, 1987 (N)

Ptycholomoides Obraztsov, 1954

Ptycholomoides aeriferanus Herrich-Schaeffer, 1851 (N)

Ptycholoma Stephens, 1829

Ptycholoma lecheanum (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)

Pandemis Hübner, 1825

Pandemis cerasana (Hübner, 1786) (N, S)
Pandemis cinnamomeana (Treitschke, 1830) (N, Si)
Pandemis corylana (Fabricius, 1794) (N, S, Si, Sa)
Pandemis dumetana (Treitschke, 1835) (N, S)
Pandemis heparana ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)

Syndemis Hübner, 1825

Syndemis musculana (Hübner, 1799) (N, S, Si)

Lozotaenia Stephens, 1829

Lozotaenia cupidinana (Staudinger, 1859) (Si)
Lozotaenia forsterana (Fabricius, 1781) (N)
Lozotaenia mabilliana (Ragonot, 1875) (N?, S, Si, Sa)
Lozotaenia retiana (Turati, 1913) (Sa) (E?)
Lozotaenia straminea (Schawerda, 1936) (Sa)

Cacoecimorpha Obraztsov, 1954

Cacoecimorpha pronubana (Hübner, 1799) (N, S, Si, Sa)

Aphelia (Zelotherses) Lederer, 1859

Aphelia (Zelotherses) amplana (Hübner, 1799) (N, Si, Sa)
Aphelia (Zelotherses) ochreana (Hübner, 1799) (N, S, Si, Sa)
Aphelia (Zelotherses) paleana (Hübner, 1793) (N)
Aphelia (Zelotherses) unitana (Hübner, 1799) (N)

Aphelia (Aphelia) Hübner, 1825

Aphelia (Aphelia) viburniana (Fabricius, 1787) (N)

Dichelia Guenée, 1845

Dichelia histrionana (Froelich, 1828) (N, S)

Clepsis Guenée, 1845

Clepsis consimilana (Hübner, 1817) (N, S, Si, Sa)
Clepsis dumicolana (Zeller, 1847) (N, S, Si, Sa)
Clepsis neglectana (Herrich-Schaeffer, 1851) (N)
Clepsis pallidana (Fabricius, 1776) (N, S)
Clepsis rogana (Guenée, 1845) (N)
Clepsis rolandiana (Linnaeus, 1758) (N, S)
Clepsis rurinana (Linnaeus, 1758) (N, S)
Clepsis senecionana (Hübner, 1819) (N, S, Si)
Clepsis siciliana (Ragonot, 1894) (N?, S?, Si)
Clepsis spectrana (Treitschke, 1830) (N, S)
Clepsis steineriana (Hübner, 1799) (N)
Clepsis unicolorana (Duponchel, 1835) (N, S)

Lozotaeniodes Obraztsov, 1954

Lozotaeniodes cupressanus (Duponchel, 1836) (N, S)

Adoxophyes Meyrick, 1881

Adoxophyes orana (Fischer von Roeslerstamm, 1834) (N, S)

Epichoristodes Diakonoff, 1960

Epichoristodes acerbellus (Walker, 1864) (N, S, Si, Sa)

Ramapesia Razowski, 1981

Ramapesia diffusana (Kennel, 1899) (Si)

Ramapesia gnomana (Clerck, 1759) (N, S, Si, Sa)

***Bactra* (*Bactra*)** Stephens, 1834

Bactra (*Bactra*) *furfurana* (Haworth, 1811) (N, S)

Bactra (*Bactra*) *lancealana* (Hübner, 1799) (N, S, Si, Sa)

Bactra (*Bactra*) *robustana* (Christoph, 1872) (N, S, Si, Sa)

Bactra (*Bactra*) *venosana* (Zeller, 1847) (N, S, Si, Sa)

***Bactra* (*Chiloides*)** Butler, 1881

Bactra (*Chiloides*) *baetrana* (Kennel, 1901) (S, Si)

Endothenia Stephens, 1852

Endothenia ericetana (Humphreys & Westwood, 1854) (N)

Endothenia gentianaeana (Hübner, 1799) (N, S, Si)

Endothenia lapideana (Herrich-Schaeffer, 1851) (N)

Endothenia marginana (Haworth, 1811) (N, S, Si, Sa)

Endothenia nigrocostona (Haworth, 1811) (N)

Endothenia oblongana (Haworth, 1811) (N, S, Si, Sa)

Endothenia quadrimaculana (Haworth, 1811) (N)

Endothenia sororiana (Herrich-Schaeffer, 1850) (N, Si)

Endothenia ustulana (Haworth, 1811) (N)

Eudemis Hübner, 1825

Eudemis porphyra (Hübner, 1799) (N, Si, Sa)

Eudemis profundana ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)

Aterpia Guenée, 1845

Aterpia anderreggana (Guenée, 1845) (N)

Aterpia circumfluxana (Christoph, 1881) (N)

Aterpia corticana ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N)

Selenodes Guenée, 1845

Selenodes karelica (Tengström, 1845) (N)

Pseudosciaphila Obratzsov, 1966

Pseudosciaphila branderiana (Linnaeus, 1758) (N, Si)

Metendothenia Diakonoff, 1973

Metendothenia atropunctana (Zetterstedt, 1840) (N, S)

Hedya Hübner, 1825

Hedya dimidiana (Clerck, 1759) (N, S)

Hedya dimidioalbana (Retzius, 1783) (N, S, Si, Sa)

Hedya ochroleucana (Froelich, 1828) (N, S)

Hedya pruniana (Hübner, 1799) (N, S, Si, Sa)

Hedya salicella (Linnaeus, 1758) (N, S, Sa)

Orthotaenia Stephens, 1829

Orthotaenia undulana ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)

Pseudohermenias Obratzsov, 1960

Pseudohermenias abietana (Fabricius, 1787) (N, S, Sa)

Piniphila Falkovitsh, 1962

Piniphila bifasciana (Haworth, 1811) (N, S)

Apotomis Hübner, 1825

Apotomis betuletana (Haworth, 1811) (N)

Apotomis capreana (Hübner, 1817) (N)

Apotomis infida Heinrich, 1926 (N)

Apotomis inundana ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N)

Apotomis lineana ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)

Apotomis sauciana (Froelich, 1828) (N, S, Si, Sa)

Apotomis semifasciana (Haworth, 1811) (N, S)

Apotomis sororculana (Zetterstedt, 1840) (N)

Apotomis turbidana Hübner, 1825 (N)

Cymolomia Lederer, 1859

Cymolomia hartigiana (Saxesen, 1840) (N, Si)

Argyroploce Hübner, 1825

Argyroploce arbutella (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Argyroploce noricana (Herrich-Schaeffer, 1854) (N)
Argyroploce roseomaculana (Herrich-Schaeffer, 1851) (S)

Pristerognatha Obraztsov, 1960

Pristerognatha penthinana (Guenée, 1845) (N, Si)

Stictea Guenée, 1845

Stictea mygindiana ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N)

Olethreutes Hübner, 1822

Olethreutes arcuellus (Clerck, 1759) (N, S, Si)
Olethreutes helveticana (Duponchel, 1845) (N)

Celypha Hübner, 1825

Celypha aurofasciana (Haworth, 1811) (N, S)
Celypha cespitana (Hübner, 1817) (N, S, Si, Sa)
Celypha doubledayana Barrett, 1872 (N, S)
Celypha flavipalpana (Herrich-Schaeffer, 1851) (N)
Celypha lacunana ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Sa)
Celypha rivulana (Scopoli, 1763) (N, S, Si, Sa)
Celypha rosaceana (Schlaeger, 1847) (N)
Celypha rufana (Scopoli, 1763) (N, S)
Celypha rurestrana (Duponchel, 1843) (N, S)
Celypha schaefferana Herrich-Schaeffer, 1851 (N)
Celypha schulziana (Fabricius, 1777) (N)
Celypha scoriana (Guenée, 1845) (N)
Celypha siderana (Treitschke, 1835) (N, S)
Celypha striana ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)
Celypha woodiana Barrett, 1882 (N)

Capricornia Obraztsov, 1960

Capricornia boisduvaliana (Duponchel, 1836) (N, Si)

Phiaris Hübner, 1825

Phiaris bipunctana (Fabricius, 1794) (N)
Phiaris metallicana (Hübner, 1799) (N)
Phiaris obsoletana (Zetterstedt, 1839) (N)
Phiaris olivana (Treitschke, 1830) (N)
Phiaris palustrana (Lienig & Zeller, 1846) (N)
Phiaris stibiana (Guenée, 1845) (N, S)
Phiaris turfosana (Herrich-Schaeffer, 1851) (N)
Phiaris umbrosana (Freyer, 1842) (N, S)

***Pelatea* Guenée, 1845**

Pelatea klugiana (Freyer, 1834) (N)

***Lobesia* Guenée, 1845**

Lobesia abscisana Doubleday, 1849 (N)
Lobesia artemisiana (Zeller, 1847) (N, S, Si, Sa)
Lobesia bicinctana (Duponchel, 1844) (N, S, Si)
Lobesia botrana ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)
Lobesia cinerariae (Nolcken, 1882) (N)
Lobesia euphorbiana (Freyer, 1842) (N, Si)
Lobesia indusiana (Zeller, 1847) (N, Si, Sa)
Lobesia limoniana (Millière, 1860) (N, Si)
Lobesia littoralis (Humphreys & Westwood, 1845) (N)
Lobesia occidentis Falkovitch, 1970 (Si)
Lobesia porrectana (Zeller, 1847) (N, Si, Sa)
Lobesia quaggana Mann, 1855 (S, Si, Sa)
Lobesia reliquana (Hübner, 1825) (N, S, Si, Sa?)

***Eriopsela* Guenée, 1845**

Eriopsela fenestrellensis Huemer, 1991 (N)
Eriopsela quadrana (Hübner, 1813) (N)

***Thiodia* Hübner, 1825**

Thiodia citrana (Hübner, 1799) (N, S, Si, Sa)
Thiodia hastana (Hübner, 1799) (N)
Thiodia lerneana (Treitschke, 1835) (N)
Thiodia major (Rebel, 1903) (N?, S, Si, Sa)
Thiodia trochilanus (Froelich, 1828) (N, S, Si)

***Rhopobota* Lederer, 1859**

Rhopobota myrtillana (Humphreys & Westwood, 1845) (N)
Rhopobota naevana (Hübner, 1817) (N, S, Si, Sa)
Rhopobota stagnana ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si)
Rhopobota ustomaculana (Curtis, 1831) (N)

***Spilonota* Stephens, 1829**

Spilonota ocellana ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)
Spilonota laricana (Heinemann, 1863) (N, S)

***Acroclita* Lederer, 1859**

Acroclita subsequana (Herrich-Schaeffer, 1851) (N)

Gibbifera Obraztsov, 1946

Gibbifera simplana (Fischer von Roeslerstamm, 1839) (N)

Epinotia Hübner, 1825

Epinotia abbreviana (Fabricius, 1794) (N, S, Si)
Epinotia bilunana (Haworth, 1811) (N)
Epinotia brunnichana (Linnaeus, 1767) (N)
Epinotia crenana (Hübner, 1817) (N)
Epinotia cruciana (Linnaeus, 1761) (N)
Epinotia dalmatana Rebel, 1891 (N)
Epinotia demarniana (Fischer von Roeslerstamm, 1839) (N, S, Si, Sa)
Epinotia festivana (Hübner, 1799) (N, S, Si, Sa)
Epinotia fraternana (Haworth, 1811) (N, S)
Epinotia granitana (Herrich-Schaeffer, 1851) (N)
Epinotia immundana (Fischer von Roeslerstamm, 1839) (N, S)
Epinotia kochiana Herrich-Schaeffer, 1851 (N)
Epinotia maculana (Fabricius, 1775) (N, S)
Epinotia mercuriana (Froelich, 1828) (N)
Epinotia nanana (Treitschke, 1835) (N, S)
Epinotia nemorivaga (Tengstroem, 1848) (N)
Epinotia nigricana (Herrich-Schaeffer, 1851) (N, S)
Epinotia nisella (Clerck, 1759) (N, S)
Epinotia pygmaeana (Hübner, 1799) (N)
Epinotia ramella (Linnaeus, 1758) (N)
Epinotia rhododendrana Herrich-Schaeffer, 1890 (N)
Epinotia rubiginosana (Herrich-Schaeffer, 1851) (N)
Epinotia signatana (Douglas, 1845) (S)
Epinotia solandriana (Linnaeus, 1758) (N)
Epinotia sordidana (Hübner, 1824) (N, Si)
Epinotia stroemiana (Fabricius, 1781) (N)
Epinotia subocellana (Donovan, 1806) (N, S)
Epinotia subsequana (Haworth, 1811) (N, S, Sa)
Epinotia subuculana Rebel, 1903 (N)
Epinotia tedella (Clerck, 1759) (N)
Epinotia tenerana ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si)
Epinotia tetraquetra (Haworth, 1811) (N, S)
Epinotia thapsiana (Zeller, 1847) (N, S, Si, Sa)
Epinotia ustulana (Hübner, 1814) (N)

Zeiraphera Treitschke, 1829

Zeiraphera griseana (Hübner, 1799) (N, Sa)
Zeiraphera isertana (Fabricius, 1794) (N, S, Sa)
Zeiraphera ratzeburgiana (Saxesen, 1840) (N)

Zeiraphera rufimitrana (Herrich & Schaeffer, 1851) (N)

Phaneta Stephens, 1852

Phaneta pauperana (Duponchel, 1842) (N, S)

Crociosema Zeller, 1847

Crociosema plebejanum Zeller, 1847 (N, S, Si, Sa)

Pelochrista Lederer, 1859

Pelochrista agrestana (Treitschke, 1830) (S, Si)

Pelochrista bleuseana (Oberthür, 1888) (S)

Pelochrista caecimaculana (Hübner, 1799) (N, S, Si)

Pelochrista decolorana (Freyer, 1842) (Si)

Pelochrista fulvostrigana (Constant, 1888) (Sa?)

Pelochrista fusculana (Zeller, 1847) (N, S, Si, Sa)

Pelochrista griseolana (Zeller, 1847) (Si)

Pelochrista hepatariana (Herrich-Schaeffer, 1851) (N, Si)

Pelochrista infidana (Hübner, 1824) (N)

Pelochrista mancipiana (Mann, 1855) (N, Si, Sa)

Pelochrista modicana (Zeller, 1847) (N, Si, Sa)

Pelochrista mollitana (Zeller, 1847) (N, S, Si, Sa)

Pelochrista sordicomana (Staudinger, 1859) (N)

Pelochrista subtiliana Jaeckh, 1960 (N)

Eucosma Hübner, 1823

Eucosma aemulana (Schlaeger, 1849) (N, S, Si)

Eucosma albidulana (Herrich-Schaeffer, 1851) (N, S)

Eucosma albuneana (Zeller, 1847) (N, Si, Sa)

Eucosma aspidiscana (Hübner, 1817) (N, S, Sa)

Eucosma balatonana (Osthelder, 1937) (S)

Eucosma campoliliana ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N)

Eucosma cana (Haworth, 1811) (N, S, Si, Sa)

Eucosma catoptrana (Rebel, 1903) (N, S)

Eucosma conformana (Mann, 1872) (S, Si)

Eucosma conterminana (Guenée, 1845) (N, S)

Eucosma fervidana (Zeller, 1847) (N, S, Si, Sa)

Eucosma flavispeculana Kuznetsov, 1964 (N)

Eucosma hohenwarthiana ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)

Eucosma individiosana (Kennel, 1901) (N, Si)

Eucosma jaceana (Herrich-Schaeffer, 1851) (N, S, Sa)

Eucosma lacteana (Treitschke, 1835) (N, S)

Eucosma latericiana Rebel, 1919 (N)

Eucosma lugubrana (Treitschke, 1830) (N, S, Si)

Eucosma metzneriana (Treitschke, 1830) (N, Si)

Eucosma mirificana (Peyerimhoff, 1876) (N)
Eucosma monstatana (Rebel, 1906) (N)
Eucosma obumbratana (Lienig & Zeller, 1846) (N, S)
Eucosma pupillana (Clerck, 1759) (N, S, Si)
Eucosma sardoensis (Rebel, 1935) (Sa) (E)
Eucosma scutana (Constant, 1893) (N, S, Si)
Eucosma tripoliana (Barrett, 1880) (N)
Eucosma wimmerana (Treitschke, 1835) (N, S, Si)

Gypsonoma Meyrick, 1895

Gypsonoma aceriana (Duponchel, 1843) (N, S, Si, Sa)
Gypsonoma dealbana (Froelich, 1828) (N, S, Sa)
Gypsonoma imparana Mueller-Rutz, 1914 (N)
Gypsonoma minutana (Hübner, 1799) (N, S, Si)
Gypsonoma nitidulana (Lienig & Zeller, 1846) (N)
Gypsonoma oppressana (Treitschke, 1835) (N, S)
Gypsonoma sociana (Haworth, 1811) (N, S)

Epiblema Hübner, 1925

Epiblema absconditana (de La Harpe, 1860) (Si) (E)
Epiblema chretieni Obraztsov, 1952 (N, Si)
Epiblema cnicicolana (Zeller, 1847) (N, Si)
Epiblema costipunctana Haworth, 1811 (N, S, Si, Sa?)
Epiblema foenella (Linnaeus, 1758) (N, S)
Epiblema fuchsiana (Roessler, 1877) (N)
Epiblema grandaevana (Zeller, 1846) (N)
Epiblema graphana (Treitschke, 1835) (N, S)
Epiblema hepaticana (Treitschke, 1835) (N, S)
Epiblema obscurana (Herrich-Schaeffer, 1851) (N)
Epiblema scutulana ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si)
Epiblema simploniana (Duponchel, 1835) (N, Si)
Epiblema sinuana ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N)
Epiblema sticticana (Fabricius, 1794) (N, S, Si)
Epiblema turbidana (Treitschke, 1835) (N, S, Sa)

Notocelia Hübner, 1825

Notocelia cynosbatella (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)
Notocelia incarnatana (Hübner, 1800) (N, S, Si, Sa)
Notocelia mediterranea (Obraztsov, 1952) (S, Si) (E)
Notocelia roborana ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)
Notocelia rosaecolana (Doubleday, 1850) (N)
Notocelia tetragonana (Stephens, 1834) (N)
Notocelia trimaculana (Haworth, 1811) (N, S, Si)
Notocelia uddmanniana (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Coccyx Treitschke, 1829

Coccyx mughiana (Zeller, 1868) (N)
Coccyx posticana (Zetterstedt, 1840) (N)
Coccyx tessulatana (Staudinger, 1871) (N, S, Si, Sa)
Coccyx turionella (Linnaeus, 1758) (N)

Retinia Guenée, 1845

Retinia resinella (Linnaeus, 1758) (N, S)

Rhyacionia Hübner, 1825

Rhyacionia buoliana ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)
Rhyacionia duplana (Hübner, 1813) (N)
Rhyacionia piniana (Herrich-Schaeffer, 1851) (N)
Rhyacionia pinicolana (Doubleday, 1849) (N)
Rhyacionia pinivorana (Lienig & Zeller, 1846) (N)

Clavigesta Obraztsov, 1946

Clavigesta sylvestrana (Curtis, 1850) (N, S)

Ancylis Hübner, 1825

Ancylis achatana ([Denis & Schiffermüllerr], 1775) (N, S, Sa)
Ancylis apicella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)
Ancylis badiana ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)
Ancylis comptana (Froelich, 1828) (N, S, Sa)
Ancylis geminana (Donovan, 1806) (N, S)
Ancylis laetana (Fabricius), 1775) (N, S)
Ancylis mitterbacheriana ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)
Ancylis myrtillana (Treitschke, 1830) (N)
Ancylis obtusana (Haworth, 1811) (N, S)
Ancylis paludana Barrett, 1886 (N)
Ancylis selenana (Guenée, 1845) (N, S)
Ancylis tineana (Hübner, 1799) (N, S)
Ancylis uncella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si)
Ancylis unculana (Haworth, 1811) (N, S, Si, Sa)
Ancylis unguicella (Linnaeus, 1758) (N, S)
Ancylis upupana (Treitschke, 1835) (N)

Eucosmomorpha Obraztsov, 1951

Eucosmomorpha albersana (Hübner, 1813) (N, Si)

Enarmonia Hübner, 1826

Enarmonia formosana (Scopoli, 1763) (N, S, Si, Sa)

Pseudophiaris Obraztsov, 1961

Pseudophiaris sappadana (Della Beffa & Rocca, 1937) (N)

Selania Stephens, 1834

Selania capparidana (Zeller, 1847) (N, Si, Sa)

Selania leplastriana (Curtis, 1831) (N, S, Si, Sa)

Selania malcolmae (Walsingham, 1903) (S, Si, Sa)

Selania resedana Obraztsov, 1959 (N)

Latronympha Meyrick, 1926

Latronympha strigana (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa)

Cydia Hübner, 1825

Cydia adenocarpi Ragonot, 1875 (N)

Cydia albipicta Sauter, 1968 (N)

Cydia amplana (Hübner, 1799) (N, S, Si, Sa)

Cydia andabatana (Wolff, 1957) (N)

Cydia aureolana Tengstroem, 1848 (N)

Cydia caecana (Schlaeger, 1847) (N, S)

Cydia compositella (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa)

Cydia coniferana (Saxesen, 1840) (N, S)

Cydia corollana (Hübner, 1823) (Sa)

Cydia coronillana (Lienig & Zeller, 1846) (N, S)

Cydia cosmophorana (Treitschke, 1835) (N)

Cydia cytisanthana Burmann & Proese, 1988 (N) (E)

Cydia derrai Proese, 1988 (Sa)

Cydia difficilana (Walsingham, 1900) (S, Sa)

Cydia discretana (Wocke, 1861) (N, S, Si)

Cydia duplicana (Zetterstedt, 1839) (N, S, Sa)

Cydia exquisitana (Rebel, 1889) (S)

Cydia fagiglandana (Zeller, 1841) (N, S, Si, Sa)

Cydia fissana (Froelich, 1828) (N, S, Si, Sa)

Cydia funebrana (Treitschke, 1835) (N, S, Si, Sa)

Cydia gemmiferana (Treitschke, 1835) (N, S, Si, Sa)

Cydia gilviciliana (Staudinger, 1859) (N?, S?, Sa)

Cydia ilipulana Walsingham, 1903 (N, S)

Cydia illutana (Herrich-Schaeffer, 1851) (N)

Cydia inquinatana Hübner, 1799 (N, Si)

Cydia internana (Guenée, 1845) (N, S)

Cydia interscindana (Moeschler, 1866) (N)

Cydia intexta Kuznetsov, 1962 (N)

Cydia janthinana (Duponchel, 1835) (N, S, Si, Sa)

Cydia jungiella (Linnaeus, 1761) (N, S)
Cydia larseni Rebel, 1903 (N)
Cydia lathyrana (Hübner, 1822) (N, S, Si)
Cydia leguminana (Zeller, 1846) (N)
Cydia lobarzewskii Nowicki, 1860 (N)
Cydia lunulana ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si)
Cydia medicaginis (Kuznetsov, 1962) (N)
Cydia microgrammana (Guenée, 1845) (N, S, Si, Sa)
Cydia milleniana (Adamczewski, 1967) (N)
Cydia molesta (Busck, 1916) (N, S, Si, Sa)
Cydia nebritana (Treitschke, 1830) (N, S, Sa)
Cydia orobana Treitschke, 1830 (N, S, Si)
Cydia oxytropidis (Martini, 1912) (N, S)
Cydia pactolana (Zeller, 1840) (N)
Cydia pallifrontana (Zeller, 1849) (N, S)
Cydia plumbiferana Staudinger, 1871 (N, S)
Cydia pomonella (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
Cydia pyrivora (Danilevskii, 1947) (N, Si, Sa)
Cydia rusticella (Clerk, 1759) (N, S, Si)
Cydia selenana Zeller, 1847 (N, S, Si, Sa)
Cydia semicinctana Kennel, 1901 (S)
Cydia servillana (Duponchel, 1836) (N)
Cydia sinana Felder, 1874 (N)
Cydia splendana (Hübner, 1799) (N, S, Si, Sa)
Cydia strobilella (Linnaeus, 1758) (N)
Cydia succedana ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)
Cydia tenebrosana (Duponchel, 1843) (N, S, Sa)
Cydia ulicetana (Haworth, 1811) (S)
Cydia zebeana (Saxesen, 1840) (N)

***Pammene (Eucelis)* Hübner, 1825**

Pammene (Eucelis) aurana (Fabricius, 1775) (N, S)
Pammene (Eucelis) gallicana Guenée, 1894 (N)

***Pammene (Pammene)* Hübner, 1825**

Pammene (Pammene) albuginana Guenée, 1845 (N, S)
Pammene (Pammene) amygdalana Duponchel, 1842 (N, S, Si, Sa)
Pammene (Pammene) argyrana (Hübner, 1799) (N, S)
Pammene (Pammene) aurita Razowski, 1991 (N, S)
Pammene (Pammene) blockiana Herrich-Schaeffer, 1851 (N)
Pammene (Pammene) clanculana Tengstroem, 1869 (N)
Pammene (Pammene) cytisana (Zeller, 1847) (N?, S?, Si, Sa)
Pammene (Pammene) fasciana (Linnaeus, 1761) (N, S, Si, Sa)
Pammene (Pammene) gallicolana Lienig & Zeller, 1846 (N, S)
Pammene (Pammene) germmana (Hübner, 1799) (N, S)
Pammene (Pammene) inquilina Fletcher, 1938 (N, S)

Pammene (Pammene) insulana (Guenée, 1845) (N)
Pammene (Pammene) juniperana (Millière, 1858) (N, S)
Pammene (Pammene) luedersiana Sorhagen, 1885 (N)
Pammene (Pammene) obscurana (Stephens, 1834) (N)
Pammene (Pammene) ochsenheimeriana (Lienig & Zeller, 1846) (N, S)
Pammene (Pammene) oxycedrana (Millière, 1876) (N)
Pammene (Pammene) populana (Fabricius, 1787) (N)
Pammene (Pammene) querceti Gozmány, 1957 (S)
Pammene (Pammene) regiana (Zeller, 1849) (N, S)
Pammene (Pammene) rhediella (Clerck, 1759) (N, S, Si)
Pammene (Pammene) spiniana (Duponchel, 1843) (N, S)
Pammene (Pammene) splendidulana (Guenée, 1845) (N, S)
Pammene (Pammene) trauniana ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)

Dichrorampha Guenée, 1845

Dichrorampha acuminatana (Lienig & Zeller, 1846) (N, S, Si, Sa)
Dichrorampha aeratana (Pierce & Metcalfe, 1915) (N, Si, Sa)
Dichrorampha agilana (Tengstroem, 1847) (N)
Dichrorampha alexandrae Passerin d'Entrèves, 1972 (N)
Dichrorampha alpigenana Heinemann, 1863 (N)
Dichrorampha alpinana (Treitschke, 1830) (N, S)
Dichrorampha baixerasana Trematerra, 1991 (S) (E)
Dichrorampha bugnionana (Duponchel, 1843) (N)
Dichrorampha cacaleana (Herrich-Schaeffer, 1851) (N)
Dichrorampha chavanneana de La Harpe, 1855 (N)
Dichrorampha consortana Stephens, 1852 (N)
Dichrorampha distinctana Heinemann, 1863 (N, S)
Dichrorampha eximia (Danilevsky, 1948) (S)
Dichrorampha flavidorsana Knaggs, 1867 (N, Si)
Dichrorampha forsteri Obraztsov, 1953 (N)
Dichrorampha gemellana (Zeller, 1847) (N, S, Si, Sa)
Dichrorampha gruneriana (Herrich-Schaeffer, 1851) (N, S)
Dichrorampha gueneana Obraztsov, 1953 (N)
Dichrorampha harpeana Frey, 1870 (N)
Dichrorampha heegerana (Duponchel, 1843) (N)
Dichrorampha incursana (Herrich-Schaeffer, 1851) (N)
Dichrorampha klimeschi Obraztsov, 1953 (N) (E)
Dichrorampha klimeschiana Toll, 1955 (Si)
Dichrorampha ligulana (Herrich-Schaeffer, 1851) (N)
Dichrorampha montanana (Duponchel, 1843) (N)
Dichrorampha nigrobrunneana (Toll, 1942) (N)
Dichrorampha petiverella (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)
Dichrorampha plumbagana (Treitschke, 1830) (N, S, Si)
Dichrorampha plumbana (Scopoli, 1763) (N, S, Sa)
Dichrorampha sedatana Busck, 1906 (S)
Dichrorampha senectana Guenée, 1845 (N)
Dichrorampha sequana (Hübner, 1799) (N, S)

Dichrorampha simpliciana Haworth, 1881 (N, S)
Dichrorampha thomanni Huemer, 1991 (N)

Strophedra Herrich-Schaeffer, 1854

Strophedra nitidana (Fabricius, 1794) (N, S)
Strophedra weirana (Douglas, 1850) (S)

Note

Phtheochroa simoniana: Specie citata di incerta località italiana.
Commophila aeneana: Specie citata di incerta località italiana.

Urodidae

Wockia Heinemann, 1870

Wockia asperipunctella (Bruand, 1851) (N)

Schreckensteiniidae

Schreckensteinia Hübner, 1825

Schreckensteinia festaliella (Hübner, 1819) (N, S)

Epermeniidae

Phaulernis Meyrick, 1895

Phaulernis dentella (Zeller, 1839) (N, S) (*)
Phaulernis fulviguttella (Zeller, 1839) (N)
Phaulernis rebeliella Gaedike, 1966 (N)
Phaulernis statariella (Heyden, 1863) (N)

Epermenia Hübner, [1825]

Epermenia aequidentella (Hofmann, 1867) (N, S, Si, Sa)
Epermenia chaerophyllella (Goeze, 1783) (N, Sa) (*)
Epermenia devotella (Heyden, 1863) (N)
Epermenia illigerella Hübner, [1813] (N)
Epermenia iniquella (Wocke, 1867) (N)
Epermenia insecurella (Stainton, 1849) (N)
Epermenia ochreomaculella (Millière, 1854) (N)
Epermenia pontificella Hübner, 1796 (N, S)
Epermenia profugella (Stainton, 1856) (N)

Epermenia scurella (Stainton, 1851) (N)
Epermenia strictella (Wocke, 1867) (N, Sa)

Ochromolopis Hübner, [1825]

Ochromolopis ictella Hübner, [1813] (N, S)
Ochromolopis staintonella (Millière, 1869) (N, S, Si, Sa)

Note

Phaulernis dentella: Solo un reperto da S. Marino.
Epermenia chaerophyllella: Solo dati di letteratura.

Alucitidae

Alucita Linnaeus, 1758

Alucita acutata Scholz & Jäckh, 1994 (S, Si, Sa)
Alucita bidentata Scholz & Jäckh, 1994 (N, S, Sa)
Alucita cancellata (Meyrick, 1908) (N, S)
Alucita cymatodactyla Zeller, 1852 (N, S)
Alucita desmodactyla Zeller, 1847 (N, S)
Alucita grammodactyla Zeller, 1841 (N?) (*)
Alucita hexadactyla (Linnaeus, 1758) (N, S, Sa)
Alucita huebneri Wallengren, 1859 (N, S, Sa)
Alucita iberica Scholz & Jäckh, 1994 (Si)
Alucita major (Rebel, 1905) (N, S, Si, Sa)
Alucita palodactyla Zeller, 1847 (N, S, Si, Sa)
Alucita tridentata Scholz & Jäckh, 1994 (S, Si)
Alucita zonodactyla Zeller, 1847 (N, S, Si)

Pterotopteryx Hannemann, 1959

Pterotopteryx dodecadactyla (Hübner, [1813]) (N, S)

Note

Alucita grammodactyla: Non ci sono dati certi per l'Italia ma la specie, molto probabilmente, è presente almeno al Nord.

Pterophoridae

Pterophorus Geoffroy, 1762

Pterophorus ischnodactylus (Treitschke, 1835) (N, S, Si)
Pterophorus pentadactylus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Merrifieldia Tutt, 1905

- Merrifieldia baliodactyla* (Zeller, 1841) (N, S)
- Merrifieldia leucodactyla* ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)
- Merrifieldia malacodactyla* (Zeller, 1847) (N, S, Si, Sa)
- Merrifieldia tridactyla* (Linnaeus, 1758) (N, S, Sa)
- Merrifieldia semiodactyla* (Mann, 1855) (Sa) (E) (*)

Wheeleria Tutt, 1905

- Wheeleria obsoleta* (Zeller, 1841) (S, Si, Sa)
- Wheeleria spilodactyla* (Curtis, 1827) (N, Sa)

Porritia Tutt, 1905

- Porritia galactodactyla* ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N)

Tabulaephorus Arenberger, 1993

- Tabulaephorus punctinervis* (Constant, 1885) (N, S, Si, Sa)

Calyciphora Kasy, 1960

- Calyciphora acarnella* (Walsingham, 1897) (Sa) (E) (*)
- Calyciphora adamas* (Constant, 1895) (N)
- Calyciphora nephelodactyla* (Eversmann, 1844) (N, S)
- Calyciphora xerodactyla* (Zeller, 1841) (N, S, Si)

Puerphorus Arenberger, 1990

- Puerphorus olbiadactylus* (Millière, 1859) (S, Si, Sa)

Gypsochares Meyrick, 1890

- Gypsochares baptodactylus* (Zeller, 1850) (N, S, Sa)

Pselnophorus Wallengren, 1881

- Pselnophorus heterodactylus* (Müller, 1764) (N, S)

Emmelina Tutt, 1905

- Emmelina argoteles* (Meyrick, 1922) (S)
- Emmelina monodactyla* (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Adaina Tutt, 1905

Adaina microdactyla (Hübner, [1813]) (N, S, Sa)

Hellinsia Tutt, 1905

Hellinsia carphodactyla (Hübner, [1813]) (N, S, Si)

Hellinsia didactylites (Ström, 1783) (N)

Hellinsia distincta (Herrich-Schäffer, 1855) (N, S, Si)

Hellinsia inulae (Zeller, 1852) (N, S, Si, Sa)

Hellinsia inulaevora (Gibeaux, 1989) (N)

Hellinsia lienigiana (Zeller, 1852) (N, S)

Hellinsia osteodactyla (Zeller, 1841) (N, S, Si, Sa)

Hellinsia pectodactyla (Staudinger, 1859) (Sa)

Hellinsia tephrodactyla (Hübner, [1813]) (N)

Oidaematophorus Wallengren, 1862

Oidaematophorus constanti (Ragonot, 1875) (Sa)

Oidaematophorus giganteus (Mann, 1855) (N, S, Si, Sa)

Oidaematophorus lithodactylus (Treitschke, 1833) (N, S, Si, Sa)

Oidaematophorus rogenhoferi (Mann, 1871) (N)

Stangeia Tutt, 1906

Stangeia siceliota (Zeller, 1847) (N, S, Si, Sa)

Geina Tutt, 1906

Geina didactyla (Linnaeus, 1758) (N)

Oxyptilus Zeller, 1841

Oxyptilus chrysodactylus ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si)

Oxyptilus ericetorum (Stainton, 1851) (N)

Oxyptilus parvidactylus (Haworth, 1811) (N, S, Si)

Oxyptilus pilosellae (Zeller, 1841) (N, S)

Crombrugghia Tutt, 1906

Crombrugghia distans (Zeller, 1847) (N, S, Si, Sa)

Crombrugghia kollari (Stainton, 1851) (N)

Crombrugghia laeta (Zeller, 1847) (N, S, Si, Sa)

Crombrugghia tristis (Zeller, 1847) (N, S, Si)

Procapperia Adamczewski, 1951

Procapperia maculata (Constant, 1865) (N)

Capperia Tutt, 1905

Capperia celeusi (Schmid, 1886) (N)
Capperia fusca (Hofmann, 1898) (S)
Capperia hellenica Adamczewski, 1951 (S)
Capperia maratonica Adamczewski, 1951 (S, Sa)
Capperia marginella (Zeller, 1847) (Si) (E)
Capperia polonica Adamczewski, 1951 (Sa)
Capperia zelleri Adamczewski, 1951 (Si) (E)

Stenoptilia Hübner, [1825]

Stenoptilia annadactyla Sutter, 1988 (N)
Stenoptilia arida (Zeller, 1847) (N, S, Si, Sa)
Stenoptilia bipunctidactyla (Scopoli, 1763) (N, S, Si, Sa)
Stenoptilia coprodactyla (Stainton, 1851) (N, S)
Stenoptilia graphodactyla (Treitschke, 1833) (N, S)
Stenoptilia gratiolae Gibeaux & Nel, 1990 (N)
Stenoptilia lutescens (Herrich-Schäffer, 1855) (S, Sa)
Stenoptilia pelidnodactyla (Stein, 1837) (N, S)
Stenoptilia pterodactyla (Linnaeus, 1761) (N, S, Si)
Stenoptilia stigmatodactyla (Zeller, 1852) (N, S, Si)
Stenoptilia zophodactyla (Duponchel, 1838) (N, S, Si, Sa)

Amblyptilia Hübner, [1825]

Amblyptilia acanthodactyla (Hübner, [1813]) (N, S, Si, Sa)
Amblyptilia punctidactyla (Haworth, 1811) (N, S)

Stenoptilodes Zimmermann, 1958

Stenoptilodes taprobanes (Felder & Rogenhofer, 1875) (S, Si)

Paraplatyptilia Bigot & Picard, 1986

Paraplatyptilia metzneri (Zeller, 1841) (N, S)

Platyptilia Hübner, [1825]

Platyptilia calodactyla ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)
Platyptilia farfarella Zeller, 1847 (N, Si)
Platyptilia megadactyla ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)
Platyptilia nemoralis Zeller, 1841 (N)
Platyptilia tesseradactyla (Linnaeus, 1761) (N, S, Si)

Gillmeria Tutt, 1905

Gillmeria pallidactyla (Haworth, 1811) (N)
Gillmeria tetradactyla (Linnaeus, 1761) (N)

Buszkoiana Kocak, 1981

Buszkoiana capnodactyla (Zeller, 1841) (S)

Marasmarcha Meyrick, 1886

Marasmarcha fauna (Millière, 1871) (N)

Marasmarcha lunaedactyla (Haworth, 1811) (N)

Marasmarcha oxydactyla (Staudinger, 1859) (N)

Cnaemidophorus Wallengren, 1862

Cnaemidophorus rhododactylus ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)

Agdistis Hübner, 1816

Agdistis adactyla Hübner, [1819] 1796 (N, Si)

Agdistis bennetii (Curtis, 1833) (N, S, Sa)

Agdistis frankeniae (Zeller, 1847) (S, Si, Sa)

Agdistis hartigi Arenberger, 1973 (Sa)

Agdistis heydeni (Zeller, 1852) (N, S, Si, Sa)

Agdistis melitensis Amsel, 1954 (S, Sa)

Agdistis meridionalis (Zeller, 1847) (N, S, Si, Sa)

Agdistis neglecta Arenberger, 1976 (S, Sa)

Agdistis paralia (Zeller, 1847) (Si, Sa)

Agdistis protai Arenberger, 1973 (S, Sa)

Agdistis satanas Millière, 1876 (N, S, Si, Sa)

Agdistis tamaricis (Zeller, 1847) (N, S, Si, Sa)

Note

Merrifieldia semiodactyla: Solo in Sardegna e Corsica.

Calyciphora acarnella: Solo in Sardegna e Corsica.

Carposinidae

Carposina Herrich-Schäffer, 1853

Carposina berberidella Herrich-Schäffer, 1853 (N)

Pyalidae

Hypotia Zeller, 1847

Hypotia corticalis ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, Si, Sa)

Hypotia infulalis (Lederer, 1858) (Sa?) (*)
Hypotia mavromoustakisi (Rebel, 1928) (Sa?) (*)

Mnesixena Meyrick, 1890

Mnesixena pectinalis (Herrich-Schäffer, 1838) (Si, Sa) (*)

Synaphe Hübner, 1825

Synaphe antennalis (Fabricius, 1794) (N)
Synaphe bombycalis ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 Synaphe bombycalis bombycalis ([Denis & Schiffermüller], 1775) (S)
Synaphe moldavica (Esper, 1794)
 Synaphe moldavica netricalis (Hübner, 1813) (N, S, Si)
Synaphe morbidalis (Guenée, 1849)
 Synaphe morbidalis isthmicalis (Lederer, 1858) (Sa)
Synaphe punctalis (Fabricius, 1775)
 Synaphe punctalis punctalis (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa)

Pyralis Linnaeus, 1758

Pyralis farinalis (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
Pyralis lienigialis (Zeller, 1843)
 Pyralis lienigialis lienigialis (Zeller, 1843) (N)
Pyralis regalis ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)

Aglossa Latreille, 1796

Aglossa caprealis (Hübner, 1809) (N, S, Si, Sa)
Aglossa pinguinalis (Linnaeus, 1758)
 Aglossa pinguinalis pinguinalis (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)
 Aglossa pinguinalis asiatica Erschoff, 1871 (Sa)
Aglossa signicostalis Staudinger, 1871 (N)

Stemmatophora Guenée, 1854

Stemmatophora combustalis (Fischer, 1842) (N, Si, Sa) (*)

Actenia Guenée, 1854

Actenia borgialis (Duponchel, 1833) (N, Si, Sa)
Actenia brunnealis (Treitschke, 1829) (N, S, Si, Sa)

Ulotricha Lederer, 1863

Ulotricha egregialis (Herrich-Schäffer, 1838) (N, Si, Sa)

Therapne Ragonot, 1890

Therapne fuscolimbalis (Ragonot, 1888) (Sa) (*)
Therapne obsoletalis (Mann, 1884) (N, Si, Sa) (*)

Pyralestes Turati, 1922

Pyralestes ragusai Turati, 1922 (Si)

Hypsopygia Hübner, 1825

Hypsopygia costalis (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa)

Herculia Walker, 1859

Herculia fulvocillialis (Duponchel, 1834)
Herculia fulvocillialis hartigialis (Mariani, 1937) (Si)
Herculia incarnatalis (Zeller, 1847) (N, S, Si, Sa)
Herculia rubidalis ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)

Orthopygia Ragonot, 1890

Orthopygia glaucinalis (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Endotricha Zeller, 1847

Endotricha flammealis ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)

Aphomia Hübner, 1825

Aphomia grisea Turati, 1913 (Sa) (*)
Aphomia sociella (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
Aphomia zelleri (Joannis, 1932) (N) (*)

Lamoria Walker, 1863

Lamoria anella ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Lamoria anella anella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si)
Lamoria anella insulana Schawerda, 1931 (Sa)
Lamoria ruficostella Ragonot, 1888 (Sa?) (*)

Paralipsa Butler, 1879

Paralipsa gularis (Zeller, 1877) (N, S, Si)

Corcyra Ragonot, 1885

Corcyra cephalonica (Stainton, 1866) (N, Si)

Achroia Hübner, 1819

Achroia grisella (Fabricius, 1794) (N, S, Si, Sa)

Galleria Fabricius, 1798

Galleria mellonella (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Lepidogma Meyrick, 1890

Lepidogma tamaricalis (Mann, 1873) (S, Sa) (*)

Cryptoblabes Zeller, 1848

Cryptoblabes bistriga (Haworth, 1811) (N)

Cryptoblabes gnidiella (Millière, 1867) (N, S, Si, Sa)

Cryptoblabes loxiella Ragonot, 1887 (N)

Trachonitis Zeller, 1848

Trachonitis cristella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N)

Salebriopsis Hannemann, 1965

Salebriopsis albicilla (Herrich-Schäffer, 1849) (N)

Elegia Ragonot, 1887

Elegia fallax (Staudinger, 1881) (N, Si)

Elegia similella (Zincken, 1818) (N, Si)

Ortholepis Ragonot, 1887

Ortholepis betulae (Goeze, 1778) (N)

Pyla Grote, 1887

Pyla fusca (Haworth, 1811) (N, S, Sa)

Pempeliella Caradja, 1916

Pempeliella cortella (Constant, 1884) (N, Sa)

Pempeliella dilutella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, Si, Sa)

Pempeliella italogallicella (Millière, 1883) (N)

Pempeliella ornatella ([Denis & Schiffermüller], 1775)

Pempeliella ornatella ornatella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si)

Pempeliella sororiella (Zeller, 1839)

Pempeliella sororiella sororiella (Zeller, 1839) (N, Si, Sa)

Catastia Hübner, 1825

Catastia marginea ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N)

Khorassania Amsel, 1951

Khorassania compositella (Treitschke, 1835)

Khorassania compositella compositella (Treitschke, 1835) (N, S, Si, Sa)

Sciota Hulst, 1888

Sciota adelphella (Fischer, 1836) (N, Sa)

Sciota coenulentella (Zeller, 1846) (Si, Sa) (*)

Sciota fumella (Eversmann, 1844) (N)

Sciota hartigi (Roesler, 1974) (S) (E)

Sciota hostilis (Stephens, 1834)

Sciota hostilis hostilis (Stephens, 1834) (N)

Sciota rhenella (Zincken, 1818)

Sciota rhenella rhenella (Zincken, 1818) (N)

Selagia Hübner, 1825

Selagia argyrella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)

Selagia spadicella (Hübner, 1796)

Selagia spadicella spadicella (Hübner, 1796) (N)

Pima Hulst, 1888

Pima boisduvaliella (Guenée, 1845) (N)

Etiella Zeller, 1839

Etiella zinckenella (Treitschke, 1832) (N, S, Si, Sa)

Denticera Amsel, 1961

Denticera divisella (Duponchel, 1842) (S, Si, Sa)

Oligochroa Ragonot, 1888

Oligochroa dionysia (Zeller, 1846) (S, Si)

Merulempista Roesler, 1967

Merulempista cingillella (Zeller, 1846)

Merulempista cingillella cingillella (Zeller, 1846) (N)

Merulempista cingillella hartigi Roesler, 1967 (S, Si)

Alophia Ragonot, 1893

Alophia combustella (Herrich-Schäffer, 1855) (N, Si, Sa)

Oncocera Stephens, 1829

Oncocera semirubella (Scopoli, 1763)

Oncocera semirubella mediterranea (Roesler, 1980) (N, S, Si, Sa)

Laodamia Ragonot, 1888

Laodamia faecella (Zeller, 1839) (N)

Pempelia Hübner, 1825

Pempelia albariella Zeller, 1839 (N, Si)

Pempelia alpigenella (Duponchel, 1836) (S) (*)

Pempelia brephiella (Staudinger, 1879) (S, Si, Sa)

Pempelia formosa (Haworth, 1811) (N, Si, Sa)

Pempelia genistella (Duponchel, 1836) (Sa)

Pempelia obductella Zeller, 1839 (N, S, Si)

Pempelia palumbella ([Denis & Schiffermüller], 1775)

Pempelia palumbella palumbella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)

Pempelia thymiella Zeller, 1846 (N, Si)

Pempelia turturella Zeller, 1848 (N) (*)

Psorosa Zeller, 1846

Psorosa dahliella (Treitschke, 1832) (N, S, Si, Sa)

Psorosa lacteomarginata (A. Costa, 1888) (Sa)

Psorosa mediterranea Amsel, 1953 (N, S, Si)

Psorosa nucleolella (Moeschler, 1866) (S, Si) (*)

Psorosa tergestella Ragonot, 1901 (N)

Dioryctria Zeller, 1846

Dioryctria abietella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)

Dioryctria mendacella (Staudinger, 1859) (N, S, Si)

Dioryctria pineae (Staudinger, 1859) (N, S, Si, Sa) (*)

Dioryctria schuetzeella Fuchs, 1899 (N) (*)

Dioryctria sylvestrella (Ratzeburg, 1840) (N, S, Si)

Phycita Curtis, 1828

Phycita kruegeri Turati, 1911 (S) (*)

Phycita metzneri (Zeller, 1846) (S, Si, Sa)

Phycita meliella (Mann, 1864) (N)

Phycita nephodeella Ragonot, 1887 (S)
Phycita poteriella (Zeller, 1846) (S, Si)
Phycita roborella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)

Hypochoalcia Hübner, 1825

Hypochoalcia ahenella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)
Hypochoalcia bruandella (Guenée, 1845) (N)
Hypochoalcia decorella (Hübner, 1810) (N)
Hypochoalcia fuliginella (Duponchel, 1836) (N)
Hypochoalcia ghilianii Staudinger, 1870 (N)
Hypochoalcia hepaticella Ragonot, 1887 (N) (*)
Hypochoalcia lignella (Hübner, 1796) (N)
Hypochoalcia longobardella Ragonot, 1887 (N) (*)
Hypochoalcia subrubiginella Ragonot, 1887 (N) (*)

Amphithrix Ragonot, 1893

Amphithrix sublineatella (Staudinger, 1859) (Si)

Epischnia Hübner, 1825

Epischnia ampliata Heinemann, 1864 (N)
Epischnia asteriscella (Millière, 1873) (N, Si)
Epischnia illotella Zeller, 1839 (N, S, Si, Sa)
Epischnia plumbella Ragonot, 1887 (Si)
Epischnia prodromella (Hübner, 1799) (N, S, Si)

Epischnopsis Amsel, 1954

Epischnopsis leucoloma (Herrich-Schäffer, 1849) (*)

Nephopterix Hübner, 1825

Nephopterix angustella (Hübner, 1796) (N)

Oxybia Rebel, 1901

Oxybia transversella (Duponchel, 1836) (S, Si, Sa)

Conobathra Meyrick, 1886

Conobathra repandana (Fabricius, 1798) (N, Sa)
Conobathra tumidana ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Conobathra tumidana tumidana ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si)
Conobathra tumidana sarda Roesler, 1987 (Sa) (E)

Trachycera Ragonot, 1893

Trachycera advenella (Zincken, 1818) (N, Sa)
Trachycera dulcella (Zeller, 1848) (N, Si)
Trachycera getuliella (Zerny, 1914) (Si) (*)
Trachycera legatalis (Hübner, 1825)
 Trachycera legatalis legatalis (Hübner, 1825) (N, Si)
Trachycera marmorea (Haworth, 1811)
 Trachycera marmorea marmorea (Haworth, 1811) (N, S, Sa)
Trachycera suavella (Zincken, 1818) (N, S, Si, Sa)

Acrobasis Zeller, 1839

Acrobasis bithynella Zeller, 1848 (*)
 Acrobasis bithynella oblitterella Staudinger, 1859 (N, Si, Sa)
Acrobasis centunculella (Mann, 1859) (N, Si)
Acrobasis consociella (Hübner, 1813)
 Acrobasis consociella consociella (Hübner, 1813) (N, S, Si)
 Acrobasis consociella nuragha Roesler, 1988 (Sa) (E)
Acrobasis glaucella Staudinger, 1859
 Acrobasis glaucella glaucella Staudinger, 1859 (N, S, Si, Sa)
Acrobasis obliqua (Zeller, 1847)
 Acrobasis obliqua clusinella Zeller, 1848 (N, S, Si, Sa)
Acrobasis obtusella (Hübner, 1796) (N, Sa)
Acrobasis porphyrella (Duponchel, 1836) (N, S, Sa)
Acrobasis romanella (Millière, 1872)
 Acrobasis romanella romanella (Millière, 1872) (N, S, Si, Sa)
Acrobasis sodalella Zeller, 1848 (N, S, Si)

Apomyelois Heinrich, 1956

Apomyelois ceratoniae (Zeller, 1839) (N, S, Si, Sa) (*)
Apomyelois ehrendorferi (Malicky & Roesler, 1970) (Sa) (E)

Glyptoteles Zeller, 1848

Glyptoteles leucacrinella Zeller, 1848 (N)

Episcythrastis Meyrick, 1937

Episcythrastis tabidella (Mann, 1864) (N, Sa)
Episcythrastis tetricella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N)

Eurhodope Hübner, 1825

Eurhodope cirrigerella (Zincken, 1818) (N, S, Si)
Eurhodope rosella (Scopoli, 1763) (N, S, Si)

Myelois Hübner, 1825

Myelois circumvoluta (Fourcroy, 1785) (N, S, Si, Sa)
Myelois cribratella Zeller, 1847 (Si, Sa)
Myelois multiflorella Ragonot, 1887 (Si)
Myelois umbratella (Treitschke, 1832) (Si)

Cremnophila Ragonot, 1893

Cremnophila flaviciliella (Herrich-Schäffer, 1855) (N)

Pterothrixidia Amsel, 1954

Pterothrixidia impurella (Duponchel, 1836) (N, Sa?)
Pterothrixidia rufella (Duponchel, 1836) (N, Sa)

Bradyrrhoa Zeller, 1848

Bradyrrhoa cantenerella (Duponchel, 1837) (S, Si, Sa)
Bradyrrhoa confiniella Zeller, 1848 (S, Si)
Bradyrrhoa gilveolella (Treitschke, 1832) (Si)
Bradyrrhoa luteola (La Harpe, 1860) (Si) (E)
Bradyrrhoa subflavella Ragonot, 1887 (S, Si)
Bradyrrhoa trapezella (Duponchel, 1836) (S, Si, Sa)

Asalebria Amsel, 1953

Asalebria florella (Mann, 1862)
Asalebria florella chiclanensis (Staudinger, 1870) (S, Sa)
Asalebria venustella (Ragonot, 1887) (Sa)

Megasis Guenée, 1845

Megasis rippertella (Zeller, 1839) (N, Si)

Isauria Ragonot, 1887

Isauria dilucidella (Duponchel, 1836) (N, S, Si, Sa)

Eucarphia Hübner, 1825

Eucarphia vinetella (Fabricius, 1787) (N)

Asartodes Ragonot, 1893

Asartodes aethiopella (Duponchel, 1836) (N, S)

Gymnancyla (Gymnancyla) Zeller, 1848

Gymnancyla (Gymnancyla) canella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N)

Gymnancyla (Spermatophthora) Lederer, 1852

Gymnancyla (Spermatophthora) hornigii (Lederer, 1852) (N)

Zophodia Hübner, 1825

Zophodia convolutella (Hübner, 1796) (N, S, Si, Sa)

Eccopisa Zeller, 1848

Eccopisa effractella Zeller, 1848 (N, S)

Metallostichodes Roesler, 1967

Metallostichodes nigrocyanea (Constant, 1865)

Metallostichodes nigrocyanea nigrocyanea (Constant, 1865) (S, Si, Sa)

Assara Walker, 1863

Assara terebrella (Zincken, 1818) (N)

Euzophera (Euzophera) Zeller, 1867

Euzophera (Euzophera) bigella (Zeller, 1848) (N, S, Si)

Euzophera (Euzophera) cinerosella (Zeller, 1839)

Euzophera (Euzophera) cinerosella cinerosella (Zeller, 1839) (N, Si)

Euzophera (Euzophera) lunulella (O.G. Costa, 1836)

Euzophera (Euzophera) lunulella lunulella (O.G. Costa, 1836) (S?, Si)

Euzophera (Euzophera) osseatella (Treitschke, 1832) (S, Si, Sa)

Euzophera (Euzophera) pinguis (Haworth, 1811)

Euzophera (Euzophera) pinguis pinguis (Haworth, 1811) (N, S, Si)

Euzophera (Euzophera) pinguis concolorella Ragonot, 1892 (Si)

Euzophera (Cymbalorissa) Gozmány, 1958

Euzophera (Cymbalorissa) fuliginosella (Heinemann, 1865) (N)

Euzopherodes Hampson, 1899

Euzopherodes lutisignella (Mann, 1869)

Euzopherodes lutisignella lutisignella (Mann, 1869) (Si)

Euzopherodes vapidella (Mann, 1857)

Euzopherodes vapidella vapidella (Mann, 1857) (Si, Sa)

Nyctegretis Zeller, 1848

Nyctegretis lineana (Scopoli, 1786) (N, S, Si, Sa)
Nyctegretis ruminella De La Harpe, 1860 (Si, Sa)
Nyctegretis triangulella Ragonot, 1901 (N)

***Ancylosis (Ancylosis)* Zeller, 1839**

Ancylosis (Ancylosis) cinnamonella (Duponchel, 1836)
Ancylosis (Ancylosis) cinnamonella cinnamonella (Duponchel, 1836) (N, S, Si, Sa)
Ancylosis (Ancylosis) imitella Hampson, 1901 (Si, Sa)
Ancylosis (Ancylosis) sareptella (Herrich-Schäffer, 1860)
Ancylosis (Ancylosis) sareptella sareptella (Herrich-Schäffer, 1860) (N, S, Si?)

***Ancylosis (Cabotia)* Ragonot, 1888**

Ancylosis (Cabotia) oblitella (Zeller, 1848) (N, S, Sa)

***Homoeosoma (Homoeosoma)* Curtis, 1833**

Homoeosoma (Homoeosoma) inustellum Ragonot, 1884 (N, Si)
Homoeosoma (Homoeosoma) nebulellum ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)
Homoeosoma (Homoeosoma) sinuellum (Fabricius, 1794)
Homoeosoma (Homoeosoma) sinuellum sinuellum (Fabricius, 1794) (N, S, Sa)

***Homoeosoma (Anhomoeosoma)* Roesler, 1965**

Homoeosoma (Anhomoeosoma) nimbellum (Duponchel, 1836) (N, S, Si, Sa)

***Phycitodes* Hampson, 1917**

Phycitodes albatella (Ragonot, 1887)
Phycitodes albatella pseudonimbella (Bentinck, 1937) (N, S, Si, Sa)
Phycitodes binaevella (Hübner, [1813])
Phycitodes binaevella binaevella (Hübner, [1813]) (N, S)
Phycitodes binaevella petrella (Herrich-Schäffer, 1849) (N)
Phycitodes binaevella sardiniella (Roesler, 1965) (Sa)
Phycitodes binaevella siciliella (Zerny, 1914) (Si)
Phycitodes carlinella (Heinemann, 1865)
Phycitodes carlinella arenicola (Chrétien, 1911) (N, S)
Phycitodes inquinatella (Ragonot, 1887)
Phycitodes inquinatella ravenella (Pierce, 1937) (N, S, Si, Sa)
Phycitodes lacteella (Rothschild, 1915)
Phycitodes lacteella delattini (Roesler, 1965) (S)
Phycitodes lacteella madoniella (Roesler, 1965) (Si)
Phycitodes lacteella santoruella (Roesler, 1965) (Sa)
Phycitodes saxicola (Vaughan, 1870)
Phycitodes saxicola saxicola (Vaughan, 1870) (N, S, Si, Sa)

***Vitula* Ragonot, 1887**

Vitula biviella (Zeller, 1848) (N, S)

Metallosticha Ragonot, 1901

Metallosticha argyrogrammos (Zeller, 1847) (Si)

Plodia Guenée, 1845

Plodia interpunctella (Hübner, [1813]) (N, S, Si, Sa)

Ephestia (Anagasta) Heinrich, 1956

Ephestia (Anagasta) kuehniella (Zeller, 1879) (N, S, Si, Sa)

Ephestia (Anagasta) welseriella (Zeller, 1848) (N, S, Si, Sa)

Ephestia (Ephestia) Guenée, 1845

Ephestia (Ephestia) disparella Ragonot, 1901 (N, S, Sa)

Ephestia (Ephestia) elutella (Hübner, 1796)

Ephestia (Ephestia) elutella elutella (Hübner, 1796) (N, S, Si)

Ephestia (Ephestia) elutella pterogrisella Roesler, 1965 (Sa)

Ephestia (Ephestia) parasitella (Staudinger, 1859)

Ephestia (Ephestia) parasitella unicolorella Staudinger, 1881 (N, S, Si, Sa)

Cadra Walker, 1864

Cadra abstersella (Zeller, 1847) (N, S, Si)

Cadra calidella (Guenée, 1845) (N, S, Si)

Cadra cautella (Walker, 1863) (N, S, Si, Sa)

Cadra figulilella (Gregson, 1871) (N, S, Si, Sa)

Cadra furcatella (Herrich-Schäffer, 1849)

Cadra furcatella afflatella (Mann, 1855) (N, S, Si, Sa)

Anerastia Hübner, 1825

Anerastia incarnata Staudinger, 1879 (Si) (*)

Anerastia lotella (Hübner, 1813) (N, S, Si)

Raphimetopus Hampson, 1918

Raphimetopus ablutella (Zeller, 1839) (N, Si)

Seleucia Ragonot, 1887

Seleucia pectinella (Chrétien, 1911) (Si)

Hypsotropa Zeller, 1848

Hypsotropa ichorella (Lederer, 1855) (Si?)
Hypsotropa limbella Zeller, 1848 (N, S)
Hypsotropa vulneratella (Zeller, 1847) (Si, Sa)

Saluria Ragonot, 1887

Saluria maculivittella Ragonot, 1887 (N?, Sa) (*)

Ematheudes Zeller, 1867

Ematheudes punctellus (Treitschke, 1833) (N, S, Si, Sa)
Ematheudes tunesiella Ragonot, 1892 (S) (*)

Postemmalocera Amsel, 1955

Postemmalocera palaeartella (Turati, 1917) (S, Si)

Fregenia Hartig, 1947

Fregenia prolai Hartig, 1947 (S) (E)

Note

Hypotia infulalis: Specie della regione mediterranea orientale. Il dato relativo alla Sardegna va probabilmente riferito alla specie sorella a distribuzione occidentale, *Hypotia staudingeralis* (Ragonot, 1891), che è nota, con certezza, della Spagna meridionale e dell'Africa nordoccidentale.

Hypotia mavromoustakisi: Si tratta di un taxon endemico di Cipro sicuramente assente in Sardegna. Il dato va riferito alla simile *Hypotia staudingeralis* (Ragonot, 1891).

Mnesixena pectinalis: Non era nota per la Sardegna, un esemplare raccolto nell'isola presso Siniscola, da W. Speidel è presso lo Staatliches Museum für Naturkunde di Karlsruhe (Germania).

Stemmatophora combustalis: Non era nota per l'Italia settentrionale, 2 esemplari cartellinati "Riviera dei Fiori, vii. 1969" sono presenti in coll. Speidel (Bonn, Germania).

Therapne fuscolimbalis: Non era nota per l'Italia settentrionale, ma secondo Pröse (Bamberg) (in litteris) è stata raccolta in Liguria, Val Nervia.

Therapne obsoletalis: Non era nota per la Sardegna o per l'Europa; 1 esemplare cartellinato "Südsardinien, Costa Rai, Monte Nai, Lagune, 20.vi.1984 LF, Dr. Grünwald" è conservato in coll. Speidel. La collocazione generica di questa specie è provvisoria.

Aphomia grisea: *Aphomia grisea* è, con molta probabilità, identica a *Aphomia sociella*.

Aphomia zelleri: È discutibile se questa specie sia specificamente diversa da *Aphomia unicolor* (Staudinger, 1879) descritta dalla Grecia.

Lamoria ruficostella: Gli esemplari di Sardegna descritti sotto questo nome rappresentano, probabilmente, forme di *Lamoria anella*.

Lepidogma tamaricalis: Non era nota per la Sardegna, ma vi sono alcuni esemplari in coll. Derra (Bamberg) dalla Sardegna così cartellinati: Musei, 120 m, 10.vii.74, 15.vii.74, 25.vii.74 e 19.viii.74, leg. F. Hartig. Uno di questi reperti è stato esaminato da Speidel.

Sciota coenulentella: Questa specie è data da Rebel, 1901 (Cat. Lep. pal. Faun., 2: 36) come presente in Italia senza ulteriori precisazioni.

Pempelia alpigenella: Non era nota per l'Italia. In coll. Speidel vi è 1 esemplare cartellinato "Italien, Abruzzes, M. dei Fiori, 3. vii. 77, Langer".

Pempelia turturella: Questa specie è stata descritta su un esemplare maschio raccolto da Mann in Toscana, presso Ardenza, 30 V.

Psorosa nucleolella: *Psorosa mediterranea* Amsel, 1953 secondo Amsel (1953 - Arkiv för Zoologi, 6 (16): 279) sostituisce, nella regione mediterranea occidentale, la specie simile orientale *Psorosa nucleolella*. Perciò tutti i dati italiani riferiti a *Psorosa nucleolella* potrebbero riferirsi a quella specie. È comunque opportuno considerare con cautela i dati riportati da questo autore finché il genere non sarà oggetto di revisione.

Dioryctria pineae: Non era nota per la Sardegna, 1 esemplare cartellinato "Sardegna, Umg. Lanusei, Bari Sardo, 5.-10. Juli 1981, leg. A. Biebinger" è conservato in coll. Speidel.

Dioryctria schuetzeella: Non era nota per l'Italia settentrionale. 1 esemplare cartellinato "Italien-Trentino, Pietramurata, 250 m, 22. vi. 67" è presente in coll. Speidel (Bonn).

Phycita kruegeri: Si tratta di un taxon discutibile probabilmente identico a *Phycita poteriella*.

Hypochalcia hepaticella: *Hypochalcia hepaticella* Ragonot, *H. longobardella* Ragonot e *H. subrubiginella* Ragonot sono state poste in sinonimia con *H. rubiginella* (Treitschke) da Hartig (1956 - Studi Trentini Sci. nat., 33: 96). *H. rubiginella* (Treitschke), comunque, è stata messa in sinonimia da Roesler (1968 - Nachrbl. bay. Ent., 17: 3) con *H. ahenella*, che rappresenta una specie diversa. Il nome più vecchio per la specie dall'Italia settentrionale è, probabilmente, *H. ghilianii* Staudinger, 1870 con i tre nomi di Ragonot come sinonimi più recenti, ma questa situazione va verificata con una revisione del genere.

Hypochalcia longobardella: *Hypochalcia hepaticella* Ragonot, *H. longobardella* Ragonot e *H. subrubiginella* Ragonot sono state poste in sinonimia con *H. rubiginella* (Treitschke) da Hartig (1956 - Studi Trentini Sci. nat., 33: 96). *H. rubiginella* (Treitschke), comunque, è stata messa in sinonimia da Roesler (1968 - Nachrbl. bay. Ent., 17: 3) con *H. ahenella*, che rappresenta una specie diversa. Il nome più vecchio per la specie dall'Italia settentrionale è, probabilmente, *H. ghilianii* Staudinger, 1870 con i tre nomi di Ragonot come sinonimi più recenti, ma questa situazione va verificata con una revisione del genere.

Hypochalcia subrubiginella: *Hypochalcia hepaticella* Ragonot, *H. longobardella* Ragonot e *H. subrubiginella* Ragonot sono state poste in sinonimia con *H. rubiginella* (Treitschke) da Hartig (1956 - Studi Trentini Sci. nat., 33: 96). *H. rubiginella* (Treitschke), comunque, è stata messa in sinonimia da Roesler (1968 - Nachrbl. bay. Ent., 17: 3) con *H. ahenella*, che rappresenta una specie diversa. Il nome più vecchio per la specie dall'Italia settentrionale è, probabilmente, *H. ghilianii* Staudinger, 1870 con i tre nomi di Ragonot come sinonimi più recenti, ma questa situazione va verificata con una revisione del genere.

Epischnopsis leucoloma: Questa specie è stata elencata da Mariani (1943) per l'Italia, senza indicazione di località.

Trachycera getuliella: *Trachycera getuliella* (Zerny) non viene citata in alcuna lista di Roesler. La collocazione generica e l'identità di questa specie restano dubbie e provvisorie. Secondo Zerny (1914) la specie è presente anche in Istria.

Acrobasis bithynella: Non era nota per l'Italia settentrionale. Alcuni esemplari dalla Riviera dei Fiori sono presenti in coll. Speidel (Bonn).

Apomyelois ceratoniae: Non era nota per la Sardegna. C'è 1 esemplare di questa specie piuttosto comune cartellinato "Sardegna, Siniscola, 23.-28. Juni 1981, leg. A. Biebinger" nella coll. Speidel (Bonn).

Anerastia incarnata: La posizione generica di questa specie è discutibile.

Saluria maculivittella: Non era nota per la penisola italiana o per la Sardegna. Alcuni reperti dalla "Sardegna, Umg. Lanusei, Bari Sardo, 5.-10. Juli 1981, leg. A. Biebinger" si trovano in coll. Speidel. La specie è molto simile a *Ematheudes punctella*. Un esemplare proveniente dalla Riviera dei Fiori, vii. 69 è identificato con incertezza.

Ematheudes tunesiella: La presenza in S senza ulteriore specifica è data da Hampson (1918 - Proc. zool. Soc. London, 1918: 114).

Crambidae

***Euchromius* Guenée, 1845**

Euchromius anapiellus (Zeller, 1847) (S, Si, Sa)
Euchromius bellus (Hübner, 1796) (N, S, Si, Sa)
Euchromius cambridgei (Zeller, 1867) (S, Sa)
Euchromius gozmanyi Bleszynski, 1961 (Si, Sa)
Euchromius gratiosellus (Caradja, 1910) (S)
Euchromius mouchai Bleszynski, 1961 (Si)
Euchromius ocellus (Haworth, 1811) (N, S, Si, Sa)
Euchromius ramburiellus (Duponchel, 1836) (N, S, Si, Sa)
Euchromius rayatellus (Amsel, 1949) (S)
Euchromius superbellus (Zeller, 1849) (N, S, Si, Sa)
Euchromius vinculellus (Zeller, 1847) (N, S, Si, Sa)

***Chilo* Zincken, 1817**

Chilo luteellus (Motschoulsky, 1866) (S, Sa)
Chilo phragmitellus (Hübner, [1805]) (N, S)
Chilo pulverosellus Ragonot, 1895 (S)

***Friedlanderia* Agnew, 1987**

Friedlanderia cicatricella (Hübner, [1824]) (N) (*)

***Pseudobissetia* Bleszynski, 1959**

Pseudobissetia terrestrella (Christoph, 1885) (S, Si)

***Thopeutis* Hübner, 1818**

Thopeutis galleriella (Ragonot, 1892) (Sa) (*)

***Calamotropha* Zeller, 1863**

Calamotropha aureliella (Fischer von Röslerstamm, 1834) (N)
Calamotropha fuscilineatella (Daniel Lucas, 1938) (Sa)
Calamotropha paludella (Hübner, [1824]) (N, S, Sa)

Chrysoteuchia Hübner, 1825

Chrysoteuchia culmella (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Crambus Fabricius, 1798

Crambus alienellus (Germar & Kaulfuss, 1817) (N)
Crambus ericellus (Hübner, [1813]) (N)
Crambus hamellus (Thunberg, 1788) (N, S)
Crambus heringiellus Herrich-Schäffer, [1848] (N, Si, Sa)
Crambus monochromellus Herrich-Schäffer, [1852] (N) (*)
Crambus pascuellus (Linnaeus, 1758) (N, S, Sa)
Crambus nemorellus (Hübner, [1813]) (N, S, Sa)
Crambus perlellus (Scopoli, 1763) (N, S, Sa)
Crambus pratellus (Linnaeus, 1758) (N, Sa)
Crambus scoticus (Westwood, 1849) (N, Sa)
Crambus silvellus (Hübner, [1813]) (N, Sa)

Angustalius Marion, 1954

Angustalius malacellus (Duponchel, 1836) (N, S, Si, Sa)

Agriphila Hübner, [1825]

Agriphila argentistrigella (Ragonot, 1888) (Si)
Agriphila biarmica (Tengström, 1865)
 Agriphila biarmica alpina Bleszynski, 1957 (N)
Agriphila brioniella (Zerny, 1914) (N, S, Si, Sa)
Agriphila cyrenaicella (Ragonot, 1887) (Si, Sa)
Agriphila dalmatinella (Hampson, 1900) (S)
Agriphila deliella (Hübner, [1813]) (N, S, Si, Sa)
Agriphila geniculea (Haworth, [1811]) (N, S, Si, Sa)
Agriphila inquinatella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)
Agriphila latistria (Haworth, [1811]) (N, S, Si, Sa)
 Agriphila latistria vallicolella (A. Costa, 1885) (Sa)
Agriphila paleatella (Zeller, 1847) (Si)
Agriphila poliella (Treitschke, 1832) (Si, Sa)
Agriphila selasella (Hübner, [1813]) (N, Si, Sa)
Agriphila straminella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)
Agriphila tersella (Lederer, 1855) (N, S, Si, Sa)
Agriphila tolli (Bleszynski, 1952) (N, S, Si)
Agriphila trabeatella (Herrich-Schäffer, [1848]) (S, Si, Sa)
Agriphila tristella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)

Catoptria Hübner, [1825]

Catoptria acutangulella (Herrich-Schäffer, [1847]) (N, Si?)
Catoptria combinella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N)

Catoptria conchella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)
Catoptria corsicella (Duponchel, 1836) (Sa)
Catoptria dimorphella (Staudinger, 1882) (Si)
Catoptria europaeica Bleszynski, 1964 (N, S)
Catoptria falsella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Sa)
 Catoptria falsella neutrella (Turati, 1911) (S, Si)
Catoptria fulgidella (Hübner, [1813]) (N)
Catoptria furcatella (Zetterstedt, 1840) (N)
Catoptria gozmanyi Bleszynski, 1956 (N)
Catoptria intermediella (Müller-Rutz, 1920) (N) (*)
Catoptria languidella (Zeller, 1863) (N, S)
Catoptria lithargyrella (Hübner, 1796) (N, S, Sa)
Catoptria luctiferella (Hübner, [1813]) (N, S)
 Catoptria luctiferella luctuella (Herrich-Schäffer, [1855]) (N)
Catoptria maculalis (Zetterstedt, 1840) (N)
Catoptria margaritella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N)
Catoptria myella (Hübner, 1796) (N, S)
Catoptria mytilella (Hübner, 1805) (N, S, Si)
Catoptria orobiella Huemer & Tarmann, 1993 (N)
Catoptria osthelderi (de Lattin, 1950) (N)
Catoptria permutatella (Herrich-Schäffer, [1848]) (N)
Catoptria petrificella (Hübner, 1796) (N)
Catoptria pinella (Linnaeus, 1758) (N, S, Sa)
 Catoptria pinella siciliella Bleszynski, 1964 (Si, Sa)
Catoptria pyramidella (Treitschke, 1832) (N)
Catoptria radiella (Hübner, [1813]) (N)
Catoptria spatulella (Turati, 1919) (N, S) (E)
Catoptria spatulelloides Bleszynski, 1964 (N, S) (E)
Catoptria specularis Hübner, [1825] (N)
Catoptria staudingeri (Zeller, 1863) (Si)
Catoptria verella (Zincken, 1817) (N)
Catoptria zermattensis (Frey, 1870) (N)
 Catoptria zermattensis muellerrutzi (Wehrli, 1924) (N)

Mesocrambus Bleszynski, 1957

Mesocrambus candiellus (Herrich-Schäffer, [1848]) (S, Si)
Mesocrambus tamsi Bleszynski, 1960 (Sa)

Metacrambus Bleszynski, 1957

Metacrambus carectellus (Zeller, 1847) (N, S, Si, Sa)
Metacrambus marabut Bleszynski, 1964 (Sa)
Metacrambus pallidellus (Duponchel, 1836) (S, Si, Sa)
Metacrambus salahinellus (Chrétien, 1917) (Sa)

Xanthocrambus Bleszynski, 1957

Xanthocrambus caducellus (Müller-Rutz, 1909) (N)
Xanthocrambus delicatellus (Zeller, 1863) (Si, Sa)
Xanthocrambus lucellus (Herrich-Schäffer, [1848]) (N)
Xanthocrambus saxonellus (Zincken, 1821) (N, S, Sa)

Chrysocrambus Bleszynski, 1957

Chrysocrambus brutiellus Bassi, 1985 (S) (E)
Chrysocrambus craterellus (Scopoli, 1763) (N, S)
Chrysocrambus linetellus (Fabricius, 1781) (N, S, Si, Sa)
Chrysocrambus sardiniellus (Turati, 1911) (Sa)

Thisanotia Hübner, [1825]

Thisanotia chrysonuchella (Scopoli, 1763) (N, S, Si)

Pediasia Hübner, [1825]

Pediasia aridella (Thunberg, 1788)
Pediasia aridella caradjella (Rebel, 1910) (N, S)
Pediasia contaminella (Hübner, 1796) (N, S, Si, Sa)
Pediasia desertella (Lederer, 1855) (Si)
Pediasia fascelinella (Hübner, [1813]) (N, S)
Pediasia luteella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)
Pediasia matricella (Treitschke, 1832) (N)
Pediasia pedriolella (Duponchel, 1836) (N)
Pediasia siculella (Duponchel, 1836) (S, Si)

Platytes Guenée, 1845

Platytes alpinella (Hübner, [1813]) (N, S)
Platytes cerussella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si)

Ancylolomia Hübner, [1825]

Ancylolomia disparella (Hübner, [1813]) (N, S, Si, Sa)
Ancylolomia inornata Staudinger, 1870 (S, Si)
Ancylolomia palpella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N)
Ancylolomia pectinatella (Zeller, 1847) (S, Si)
Ancylolomia tentaculella (Hübner, 1796) (N, S, Si, Sa)
Ancylolomia tripolitella Rebel, 1909 (Sa)

Talis Guenée, 1845

Talis quercella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, Sa)

Hyperlais Marion, 1959

Hyperlais argillacealis (Zeller, 1847) (Si)
Hyperlais dulcinalis (Treitschke, 1835) (N)
Hyperlais nemausalis (Duponchel, 1834) (S)

Cybalomia Lederer, 1863

Cybalomia lutosalis (Mann, 1862) (N, Sa)

Elophila Hübner, 1822

Elophila nympheata (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
Elophila rivulalis (Duponchel, 1831) (N, S, Si, Sa)

Acentria Stephens, 1829

Acentria ephemerella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (Sa)

Cataclysta Hübner, 1825

Cataclysta lemnata (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Parapoynx Hübner, 1825

Parapoynx fluctuosalis (Zeller, 1852) (Sa)
Parapoynx stratiotatum (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Nymphula Schrank, 1802

Nymphula stagnata (Donovan, 1806) (N, S, Si)

Schoenobius Duponchel, 1836

Schoenobius forficellus (Thunberg, 1794) (N)
Schoenobius gigantellus ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)

Donacaula Meyrick, 1890

Donacaula mucronella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si)

Scirpophaga Treitschke, 1832

Scirpophaga praelata (Scopoli, 1763) (N, S)

Evergestis Hübner, [1825] 1816

Evergestis aenealis ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si)
Evergestis africalis (Guenée, 1854) (Si)
Evergestis caesialis (Herrich-Schäffer, [1851]) (N)

Evergestis desertalis (Hübner, 1813) (Si)
Evergestis extimalis (Scopoli, 1763) (N, S, Sa) (*)
Evergestis forficalis (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)
Evergestis frumentalis (Linnaeus, 1761) (N, Sa)
Evergestis isatidalis (Duponchel, 1833) (S, Si, Sa)
Evergestis limbata (Linnaeus, 1767) (N, S, Si)
Evergestis mundalis (Guenée, 1854) (N, S)
Evergestis nomadalis (Lederer, 1871) (S?)
Evergestis orientalis (Eversmann, 1851) (Si?) (*)
Evergestis pallidata (Hufnagel, 1767) (N)
Evergestis politalis ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)
Evergestis segetalis (Herrich-Schäffer, [1851]) (N, S, Si)
Evergestis serratalis (Staudinger, 1870) (Si?)
Evergestis sophialis (Fabricius, 1787) (N, S)

Cornifrons Lederer, 1858

Cornifrons ulceratalis Lederer, 1858 (S, Si, Sa)

Orenaia Duponchel, [1845] 1844

Orenaia alpestralis (Fabricius, 1794) (N)
Orenaia helvetica Herrich-Schäffer, [1851] (N)
Orenaia lugubralis (Lederer, 1857) (N)
Orenaia rupestralis (Hübner, [1799]) (N)

Scoparia Haworth, 1811

Scoparia ambigualis (Treitschke, 1829)
 Scoparia ambigualis ambigualis (Treitschke, 1829) (N, S, Si)
Scoparia ancipitella (La Harpe, 1855) (N)
Scoparia basistrigalis Knaggs, 1866 (N)
Scoparia conicella (La Harpe, 1863) (S)
Scoparia ingrattella (Zeller, 1846)
 Scoparia ingrattella ingrattella (Zeller, 1846) (N, Sa)
 Scoparia ingrattella octavianella (Mann, 1859) (Si)
Scoparia luteolaris (Scopoli, 1763) (N)
Scoparia manifestella (Herrich-Schäffer, 1848)
 Scoparia manifestella manifestella (Herrich-Schäffer, 1848) (N)
 Scoparia manifestella italica Turati, 1919 (S)
Scoparia perplexella (Zeller, 1839) (*)
 Scoparia perplexella perplexella (Zeller, 1839) (N?, Sa)
Scoparia pyralella ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 Scoparia pyralella pyralella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si)
 Scoparia pyralella klimeschi Leraut, 1981 (Sa)
Scoparia staudingeralis (Mabille, 1869) (Sa)
Scoparia subfusca Haworth, 1811
 Scoparia subfusca subfusca Haworth, 1811 (S, Si)

Scoparia subfusca zelleri (Wocke, 1855) (N)

Gesneria Hübner, 1825

Gesneria centuriella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N)

Anarpia Chapman, 1912

Anarpia incertalis (Duponchel, 1833) (N, Si, Sa)

Dipleurina Chapman, 1912

Dipleurina lacustrata (Panzer, 1804) (N, Si, Sa)

Eudonia Billberg, 1820

Eudonia angustea (Curtis, 1827) (N, Si, Sa)

Eudonia delunella (Stainton, 1849) (N, Sa)

Eudonia laetella (Zeller, 1846) (N)

Eudonia lineola (Curtis, 1827) (Sa)

Eudonia mercurella (Linnaeus, 1758)

Eudonia mercurella mercurella (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Eudonia murana (Curtis, 1827)

Eudonia murana murana (Curtis, 1827) (N)

Eudonia murana derrai Leraut, 1982 (N)

Eudonia pallida (Curtis, 1827) (N)

Eudonia phaeoleuca (Zeller, 1846) (*)

Eudonia phaeoleuca phaeoleuca Zeller, 1846 (N)

Eudonia phaeoleuca brosi Leraut, 1982 (N)

Eudonia phaeoleuca fuscella (Turati, 1914) (N)

Eudonia petrophila (Standfuss, 1848)

Eudonia petrophila petrophila (Standfuss, 1848) (N)

Eudonia sudetica (Zeller, 1839) (N)

Eudonia truncicolella (Stainton, 1849) (N, Si)

Eudonia vallesialis (Duponchel, 1833)

Eudonia vallesialis vallesialis (Duponchel, 1833) (N)

Heliothela Guenée, 1854

Heliothela wulfeniana (Scopoli, 1763) (N, S, Si)

Udea Guenée, 1845

Udea accolalis (Zeller, 1867) (N)

Udea alpinalis ([Denis & Schiffermüller], 1775)

Udea alpinalis alpinalis ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N)

Udea austriacalis (Herrich-Schäffer, 1851) (N)

Udea bipunctalis (Herrich-Schäffer, 1851) (Si)

Udea carniolica Huemer & Tarmann, 1989 (N)
Udea cyanalis (La Harpe, 1855) (N)
Udea decrepitalis (Herrich-Schäffer, 1848) (N)
Udea elutalis ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N)
Udea ferrugalis (Hübner, 1796) (N, S, Si, Sa)
Udea fulvalis (Hübner, 1809) (N, Si)
Udea inquinatalis (Lienig & Zeller, 1846) (N)
Udea institalis (Hübner, 1819) (S, Si)
Udea lutealis (Hübner, 1809) (N)
Udea murinalis (Fischer, 1842) (N)
Udea nebulalis (Hübner, 1796) (N)
Udea numeralis (Hübner, 1796) (N, S, Si, Sa)
Udea olivalis ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N)
Udea prunalis ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N)
Udea rhododendronalis (Duponchel, 1834) (N)
Udea scorialis (Zeller, 1847) (Si)
Udea thalalis (Lucas, 1908) (Si) (*)
Udea uliginosalis (Stephens, 1834) (N)

Paracorsia Marion, 1959

Paracorsia repandalis ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, Sa)

Opsibotys Warren, 1890

Opsibotys fuscalis ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si)

Loxostege Hübner, 1825

Loxostege aeruginalis (Hübner, 1796) (N, Si)
Loxostege deliblatica Szent-Ivany & Uhrik-Meszaros, 1942 (N)
Loxostege manualis (Geyer, 1832)
 Loxostege manualis manualis (Geyer, 1832) (N)
Loxostege scutalis (Hübner, 1813)
Loxostege sticticalis (Linnaeus, 1761) (N, S, Si, Sa) (*)
Loxostege turbidalis (Treitschke, 1829) (N)
Loxostege virescalis (Guenée, 1854) (N)

Achyra Guenée, 1849

Achyra nudalis (Hübner, 1796) (N, S, Si, Sa)
Achyra ustrinalis (Christoph, 1876) (Sa)

Ecpyrrhorhoe Hübner, 1825

Ecpyrrhorhoe rubiginalis (Hübner, 1796) (N, Si, Sa)

Harpadispar Agenjo, 1952

Harpadispas diffusalis (Guenée, 1854) (N)

Meridiophila Marion, 1963

Meridiophila fascialis (Hübner, 1796) (N)

Pyrausta Schrank, 1802

Pyrausta aerealis (Hübner, 1793)

Pyrausta aerealis aerealis (Hübner, 1793) (N)

Pyrausta aerealis opacalis (Hübner, 1813) (N)

Pyrausta aurata (Scopoli, 1763) (N, S, Si, Sa)

Pyrausta castalis Treitschke, 1829 (N)

Pyrausta cingulata (Linnaeus, 1758) (N, S) (*)

Pyrausta coracinalis Leraut, 1982 (N)

Pyrausta despicata (Scopoli, 1763) (N, S, Si, Sa)

Pyrausta falcatalis Guenee, 1854 (N)

Pyrausta inciae Kocak, 1982 (Si) (*)

Pyrausta ledereri (Staudinger, 1870) (N)

Pyrausta limbopunctalis (Herrich-Schäffer, 1849)

Pyrausta limbopunctalis sardinialis (Guenée, 1854) (Sa) (E)

Pyrausta nigrata (Scopoli, 1763) (N, S, Si)

Pyrausta obfuscata (Scopoli, 1763) (N, S, Si)

Pyrausta ostrinalis (Hübner, 1796) (N) (*)

Pyrausta porphyralis ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N)

Pyrausta purpuralis (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)

Pyrausta rectefascialis Toll, 1936 (N) (*)

Pyrausta sanguinalis (Linnaeus, 1767) (N, S, Si, Sa)

Pyrausta virginalis Duponchel, 1833

Pyrausta virginalis virginalis Duponchel, 1833 (N, S, Si, Sa)

Uresiphita Hübner, 1825

Uresiphita gilvata (Fabricius, 1794) (N, S, Si, Sa)

Nascia Curtis, 1835

Nascia ciliaris (Hübner, 1796)

Nascia ciliaris ciliaris (Hübner, 1796) (N)

Sitochroa Hübner, 1825

Sitochroa palealis ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)

Sitochroa verticalis (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)

Perinephela Hübner, 1825

Perinephela lancealis ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N)

Phlyctaenia Hübner, 1825

Phlyctaenia coronata (Hufnagel, 1767)

Phlyctaenia coronata coronata (Hufnagel, 1767) (N, S)

Phlyctaenia coronata tectalis (Fuchs, 1903) (Si, Sa)

Phlyctaenia stachydalis (Germar, 1821) (N, S, Sa)

Algedonia Lederer, 1863

Algedonia luctualis (Hübner, 1793) (N)

Algedonia oberthuri (Turati, 1913)

Algedonia oberthuri oberthuri (Turati, 1913) (Sa) (E)

Algedonia terrealis (Treitschke, 1829)

Algedonia terrealis terrealis (Treitschke, 1829) (N, S, Si)

Sclerocona Meyrick, 1890

Sclerocona acutella (Eversmann, 1842) (N, S, Si)

Psammotis Hübner, 1825

Psammotis pulveralis (Hübner, 1796)

Psammotis pulveralis pulveralis (Hübner, 1796) (N, Sa)

Ostrinia Hübner, 1825

Ostrinia nubilalis (Hübner, 1796)

Ostrinia nubilalis nubilalis (Hübner, 1796) (N, S, Si, Sa)

Ostrinia palustralis (Hübner, 1796)

Ostrinia palustralis palustralis (Hübner, 1796) (N)

Ostrinia quadripunctalis ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N)

Ebulea Doubleday, 1849

Ebulea crocealis (Hübner, 1796) (N, Si)

Ebulea testacealis (Zeller, 1847) (N, Si, Sa)

Anania Hübner, 1823

Anania funebris (Stroem, 1768) (N, Si)

Anania verbascalis ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)

Eurrhynx Hübner, 1825

Eurrhynx hortulata (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)

Paratalanta Meyrick, 1890

Paratalanta hyalinalis (Hübner, 1796) (N, S, Si)

Paratalanta pandalis (Hübner, 1825) (N, Si)

Catharia Lederer, 1863

Catharia pyrenaealis (Duponchel, 1843) (N)

Metaxmeste Hübner, 1825

Metaxmeste cinerealis (Della Beffa, 1942) (N) (*)

Metaxmeste phrygialis (Hübner, 1796)

Metaxmeste phrygialis phrygialis (Hübner, 1796) (N)

Metaxmeste phrygialis aprutialis (Costantini, 1923) (S)

Metaxmeste schrankiana (Hochenwarth, 1785) (N, Sa?) (*)

Aporodes Guenée, 1854

Aporodes floralis (Hübner, 1809) (N, S, Si, Sa)

Cynaeda Hübner, 1825

Cynaeda dentalis ([Denis & Schiffermüller], 1775)

Cynaeda dentalis dilutalis Lattin, 1959 (N, Si, Sa)

Noctuelia Guenée, 1854

Noctuelia vespertalis (Herrich-Schäffer, 1851) (Si)

Tegostoma Zeller, 1847

Tegostoma comparalis (Hübner, 1796) (S, Si, Sa)

Epascestria Hübner, 1825

Epascestria pustulalis (Hübner, 1823)

Epascestria pustulalis pustulalis (Hübner, 1823) (S)

Ephelis Lederer, 1863

Ephelis cruentalis (Geyer, 1832) (S, Si)

Atralata Sylven, 1947

Atralata albofascialis (Treitschke, 1829) (N, Si)

Titanio Hübner, 1825

Titanio normalis (Hübner, 1796) (N, Si)

Eurrhysis Hübner, 1825

Eurrhysis guttularis (Herrich-Schäffer, 1848)

Eurrhysis guttularis guttularis (Herrich-Schäffer, 1848) (S, Si, Sa)

Eurrhysis pollinalis ([Denis & Schiffermüller], 1775)

Eurrhysis pollinalis pollinalis ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, Si)

Hellula Guenée, 1854

Hellula undalis (Fabricius, 1781) (N, Si, Sa)

Hydriris Meyrick, 1885

Hydriris ornatalis (Duponchel, 1833) (N, S, Si, Sa)

Arnia Guenée, 1849

Arnia nervosalis Guenée, 1849 (Si, Sa)

Pleuroptya Meyrick, 1890

Pleuroptya balteata (Fabricius, 1798) (N, Si)

Pleuroptya ruralis (Scopoli, 1763)

Pleuroptya ruralis ruralis (Scopoli, 1763) (N, S, Si, Sa)

Mecyna Doubleday, 1849

Mecyna asinalis (Hübner, 1819) (S, Si, Sa)

Mecyna flavalis ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si)

Mecyna lutealis (Duponchel, 1833)

Mecyna lutealis lutealis (Duponchel, 1833) (N, Si)

Mecyna trinalis ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, Si)

Agrotera Schrank, 1802

Agrotera nemoralis (Scopoli, 1763) (N, S, Si, Sa) (*)

Diasemia Hübner, 1825

Diasemia reticularis (Linnaeus, 1761) (N, S)

Diasemiopsis Munroe, 1957

Diasemiopsis ramburialis (Duponchel, 1834) (N, S, Si, Sa)

Duponchelia Zeller, 1847

Duponchelia fovealis Zeller, 1847 (N, S, Si, Sa)

Palpita Hübner, 1808

Palpita testalis (Fabricius, 1794) (N, Si) (*)

Palpita unionalis (Hübner, 1796) (N, S, Si, Sa)

Dolicharthria Stephens, 1834

Dolicharthria bruguieralis (Duponchel, 1833) (S, Si, Sa)

Dolicharthria concoloralis (Oberthür, 1876) (S?, Sa?) (*)

Dolicharthria punctalis ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)

Antigastra Lederer, 1863

Antigastra catalaunalis (Duponchel, 1833) (N, S, Si, Sa)

Metasia Guenée, 1854

Metasia carnealis (Treitschke, 1829) (N, Si)

Metasia corsicalis (Duponchel, 1833) (N, S, Si, Sa)

Metasia cyrnealis Schawerda, 1926

Metasia cyrnealis sardinica Hartig, 1952 (Sa)

Metasia olbienalis Guenée, 1854 (S, Si, Sa)

Metasia ophialis (Treitschke, 1829) (N, S, Si)

Metasia suppandalis (Hübner, 1823) (Si)

Nomophila Hübner, 1825

Nomophila noctuella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)

Note

Friedlanderia cicatricella: Questa specie è stata spesso attribuita al genere *Acigona* Hübner, [1825], ma questo nome generico viene oggi interpretato come riferibile ad un taxon dei Noctuidae.

Thopeutis galleriella: Non era nota per la Sardegna. 1 esemplare cartellinato "Sardegna, Porto Torres, Platamona Lido, 20. u. 21. Juni 1981, leg. A. Biebinger" è presente in coll. Speidel (Bonn).

Crambus monochromellus: Specie di dubbia validità.

Catoptria intermediella: Specie di dubbia validità.

Evergestis extimalis: Prota (1973 - Studi Sassaresi, sez. 3, Ann. Fac. Agr., Sassari, 21: 732) riporta la presenza di questa specie in Sardegna.

Evergestis orientalis: La segnalazione di questa specie dalla Sicilia è probabilmente dovuta ad una errata identificazione.

Scoparia perplexella: Leraut (1983: 190) segnala genericamente la presenza della specie in

"Italie" senza ulteriori precisazioni (probabilmente è presente in N).

Eudonia phaeoleuca: Lo stato di brosi è incerto.

Udea thalalis: *Udea thalalis* è probabilmente identica a *Udea numeralis*.

Loxostege sticticalis: Questa specie è stata segnalata per la Sardegna da Prota (1973 - Studi Sassaresi, sez. 3, Ann. Fac. Agr., Sassari, 21: 737).

Pyrausta cingulata: C'è la descrizione della forma *apenninalis* Costantini, 1923 proveniente dal Norditalia e dall'Italia centrale (Cimone e Badolo) che può essere distinta dalla sottospecie tipica così come dalla sottospecie *alt. vittalis* (La Harpe, 1864). Secondo questo autore si potrebbe trattare di due specie distinte.

Pyrausta inciae: Questo taxon è discutibile. Potrebbe trattarsi di una forma di *Pyrausta aurata*, ma potrebbe esserci anche una seconda specie. Non è disponibile alcuna revisione basata su materiale tipico. *P. inciae* è un nome sostitutivo per l'omonimo più recente *meridionalis* Staudinger, 1879.

Pyrausta ostrinalis: Nota dall'Alto Adige (Sonnenberghang presso Naturno) (Pröse, 1957 - Mitt. münch. ent. Ges., 47: 97); vi è anche 1 esemplare cartellinato "Vintschgau, Tauferer Hänge, 1 km W Laatsch, 950 m, 7.vii. 85, Michael Hassler" in coll. Speidel.

Pyrausta rectefascialis: Nota dall'Alto Adige (Sonnenberghang presso Naturno) (Pröse, 1957 - Mitt. münch. ent. Ges., 47: 97).

Metaxmeste cinerealis: È dubbio se questo taxon nominale rappresenti effettivamente una specie distinta.

Metaxmeste schrankiana: La presenza in Sa indicata in letteratura è dubbia.

Agrotera nemoralis: È indicata di Sardegna, Tempio (Amsel 1936 - Veröff. dt. Kolon. u. Übersee-Mus. Bremen, 1: 347). Un esemplare è stato raccolto in Sardegna, Siniscola, viii.1979 (W. Speidel) e un altro a Tempio, x.1970; entrambi sono conservati presso lo Staatliches Museum für Naturkunde di Karlsruhe (Germania).

Palpita testalis: *Palpita testalis* è stata raccolta in N. Il sinonimo più recente *Margaronia putrecens* Meyrick, 1934 (Exotic Microlepidoptera, 4: 543) è stato descritto da San Remo.

Dolicharthria concoloralis: Questa specie è stata trovata esclusivamente in Spagna meridionale e in Africa settentrionale. Gli esemplari raccolti in Sardegna e nell'Italia continentale con macchia discale giallastra non appartengono a questa specie.

Thyrididae

Thyris Hoffmannsegg, 1803

Thyris fenestrella (Scopoli, 1761) (*)

Thyris fenestrella fenestrella (Scopoli, 1761) (N, S)

Thyris fenestrella diaphana Staudinger, 1861 (S?, Si) (E)

Note

Thyris fenestrella: La specie è dotata di notevole variabilità, come dimostra l'elevato numero di sinonimi. Alcuni autori italiani reputano buona specie *Thyris nigra* (O. Bang-Haas, 1910) segnalata di varie regioni del Nord e Centro Italia. Le popolazioni della Sicilia (e, forse, di parte dell'Italia meridionale) sono considerate appartenenti ad una sottospecie endemica (*diaphana* Staudinger, 1861), da taluni autori riconosciuta come specie.

Lasiocampidae

Malacosoma Hübner, [1820]

- Malacosoma alpicolum* Staudinger, 1870 (N)
- Malacosoma castrensis* (Linnaeus, 1758) (N, S)
- Malacosoma franconicum* ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)
- Malacosoma neustrium* (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Trichiura Stephens, 1828

- Trichiura crataegi* (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)

Poecilocampa Stephens, 1828

- Poecilocampa alpina* (Frey & Wulschlegel, 1874)
- Poecilocampa alpina alpina* (Frey & Wulschlegel, 1874) (N)
- Poecilocampa alpina canensis* (Millière, 1876) (S, Si)
- Poecilocampa populi* (Linnaeus, 1758) (N, S)

Eriogaster Germar, 1810

- Eriogaster arbusculae* Freyer, 1849 (N)
- Eriogaster catax* (Linnaeus, 1758) (N, S)
- Eriogaster lanestris* (Linnaeus, 1758) (N, S)
- Eriogaster rimicola* ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si)

Lasiocampa Schrank, 1802

- Lasiocampa quercus* (Linnaeus, 1758)
- Lasiocampa quercus quercus* (Linnaeus, 1758) (N, S)
- Lasiocampa quercus sicula* (Staudinger, 1861) (Si) (E)
- Lasiocampa trifolii* ([Denis & Schiffermüller], 1775)
- Lasiocampa trifolii trifolii* ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)
- Lasiocampa trifolii cocles* (Geyer, [1831]) (Si, Sa)

Macrothylacia Rambur, 1866

- Macrothylacia rubi* (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)

Euthrix Meigen, 1830

- Euthrix potatoria* (Linnaeus, 1758) (N, S)

Cosmotriche Hübner, [1820]

Cosmotriche lunigera (Esper, 1784) (N)

Phyllodesma Hübner, [1820]

Phyllodesma ilicifolia (Linnaeus, 1758) (N)

Phyllodesma tremulifolia (Hübner, [1810]) (N, S, Si)

Gastropacha Ochsenheimer, 1810

Gastropacha populifolia (Esper, 1783) (N, S)

Gastropacha quercifolia (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Odonestis Germar, 1812

Odonestis pruni (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Dendrolimus Germar, 1812

Dendrolimus pini (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)

Pachypasa Walker, 1855

Pachypasa otus (Drury, 1773) (N?, S, Si) (*)

Note

Pachypasa otus: Con una certa probabilità la specie, usata in sericoltura prima dell'introduzione del baco da seta, non sarebbe autoctona in Italia. Ad eccezione di alcuni reperti della Toscana, tutte le segnalazioni certe provengono dalle regioni della Magna Grecia. Anche la principale pianta alimentare (*Cupressus sempervirens* Linnaeus) è stata introdotta in Italia dal Mediterraneo orientale.

Lemoniidae

Lemonia Hübner, [1820]

Lemonia dumii (Linnaeus, 1761) (N)

Lemonia taraxaci ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si)

Endromidae

Endromis Ochsenheimer, 1810

Endromis versicolora (Linnaeus, 1758) (N, S)

Sphingidae

Agrius Hübner, [1819]

Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Acherontia [Laspeyres], 1809

Acherontia atropos (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Sphinx Linnaeus, 1758

Sphinx ligustri Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)

Sphinx pinastri (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)

Marumba Moore, [1882]

Marumba quercus ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si)

Smerinthus Latreille, [1802]

Smerinthus ocellatus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Mimas Hübner, [1819]

Mimas tiliae (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)

Laothoe Fabricius, 1807

Laothoe populi (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Hemaris Dalman, 1816

Hemaris croatica (Esper, 1779) (N)

Hemaris fuciformis (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Hemaris tityus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)

Macroglossum Scopoli, 1777

Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Daphnis Hübner, [1819]

Daphnis nerii (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)

Proserpinus Hübner, [1819]

Proserpinus proserpinus (Pallas, 1772) (N, S, Si)

Hyles Hübner, [1819]

Hyles dahlia (Geyer, [1828]) (Sa)

Hyles euphorbiae (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)

Hyles gallii (Rottenburg, 1775) (N)

Hyles hippophaes (Esper, 1793) (N, S)

Hyles livornica (Esper, 1780) (N, S, Si, Sa)

Hyles nicaea (de Prunner, 1798) (N, S?, Sa)

Hyles vespertilio (Esper, 1780) (N, S)

Hippotion Hübner, [1819]

Hippotion celerio (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Deilephila [Laspeyres], 1809

Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Deilephila porcellus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Saturniidae

Saturnia Schrank, 1802

Saturnia pavonia (Linnaeus, 1761)

Saturnia pavonia ligurica Weismann, 1876 (N, S, Si, Sa)

Saturnia pyri ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)

Saturnia spini ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N) (*)

Perisomena Walker, 1855

Perisomena caecigena (Kupido, 1825) (N, S?) (*)

Antheraea Hübner, [1819]

Antheraea yamamai (Guérin-Méneville, 1861) (N) (*)

Samia Hübner, [1819]

Samia cynthia (Drury, 1773) (N, S) (*)

Aglia Ochsenheimer, 1810

Aglia tau (Linnaeus, 1758) (N, S)

Note

Saturnia spini: A meno che gli esemplari non portino cartellini di località falsi, sono noti alcuni reperti della specie per il Trentino.

Perisomena caecigena: Parrebbe che una vecchia citazione per l'Abruzzo, di per sé molto dubbia, sia stata ulteriormente fraintesa da autori non di lingua italiana, dando luogo ad una recente segnalazione per la Sicilia.

Antheraea yamamai: La specie venne introdotta in Europa nella seconda metà del secolo scorso allo scopo di sfruttarla per la produzione di seta.

Samia cynthia: La specie venne introdotta in Italia nel 1856 con lo scopo di sfruttarla per la produzione di seta. Vi è un certo disaccordo fra gli autori riguardo al nome subspecifico da utilizzare per il ceppo introdotto.

Brahmaeidae

Acanthobrahmaea Sauter, 1967

Bombycidae

Bombyx Linnaeus, 1758

Bombyx mori (Linnaeus, 1758) (N, S) (*)

Note

Bombyx mori: La specie venne introdotta in Europa intorno alla metà del sesto secolo.

Hesperiidae

Pyrgus Hübner, [1819]

Pyrgus accretus (Verity, 1925) (N)

Pyrgus alveus (Hübner, 1803) (N)

Pyrgus andromedae (Wallengren, 1853) (N)

Pyrgus armoricanus (Oberthür, 1910) (N, S, Si, Sa)

Pyrgus cacaliae (Rambur, 1839) (N)

Pyrgus carlinae (Rambur, 1839) (N)

Pyrgus carthami (Hübner, [1819]) (N, S)

Pyrgus centralitaliae (Verity, 1920) (S) (E)

Pyrgus cirsii (Rambur, 1839) (N)

Pyrgus foulquieri (Oberthür, 1910) (N)

Pyrgus malvae (Linné, 1758) (N)

Pyrgus malvoides (Elwes & Edwards, 1897) (N, S, Si)

Pyrgus onopordi (Rambur, 1839) (N, S)

Pyrgus picenus (Verity, 1920) (S) (E)

Pyrgus serratulae (Rambur, 1839) (N, S)
Pyrgus sidae (Esper, 1782) (N, S)
Pyrgus warrenensis (Verity, 1928) (N) (E)

Spialia Swinhoe, [1912]

Spialia orbifer (Hübner, 1823) (Si)
Spialia sertorius (Hoffmannsegg, 1804) (N, S)
Spialia therapne (Rambur, 1832) (Sa) (E)

Carcharodus Hübner, [1819]

Carcharodus alceae (Esper, 1780) (N, S, Si, Sa)
Carcharodus baeticus (Rambur, 1839) (N, S, Si)
Carcharodus flocciferus (Zeller, 1847) (N, S, Si, Sa)
Carcharodus lavatherae (Esper, 1780) (N, S)

Sloperia Tutt, [1906]

Sloperia proto (Ochsenheimer, 1808) (S, Si)

Erynnis Schrank, 1801

Erynnis tages (Linné, 1758) (N, S)

Heteropterus Duméril, 1806

Heteropterus morpheus (Pallas, 1771) (N, S)

Carterocephalus Lederer, 1852

Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771) (N)

Thymelicus Hübner, [1819]

Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775) (N, S, Si)
Thymelicus flavus (Brünnich, 1763) (N, S, Si)
Thymelicus lineolus (Ochsenheimer, 1808) (N, S, Si)

Hesperia Fabricius, 1763

Hesperia comma (Linné, 1758) (N, S, Si)

Ochlodes Scudder, 1852

Ochlodes venatus (Bremer & Grey, 1853) (N, S, Si)

Gegenes Hübner, [1819]

Gegenes nostrodamus (Fabricius, 1793) (N, S, Si)
Gegenes pumilio (Hoffmannsegg, 1804) (N, S, Si) (*)

Note

Gegenes pumilio: Larsen (Larsen T.B., 1982 - *Gegenes pumilio* Hoffmannsegg, 1804; a review with cytological evidence that two species are involved [Hesperiidae] - *Nota Lepid.* 5 (2-3): 103-110) ha verificato che esemplari provenienti da Nizza e da Algeri hanno un numero aploide di cromosomi $n=24$. Altri individui provenienti da Beirut, Adana e dallo Yemen posseggono $n=41$. Pertanto si è innanzi a due specie distinte. L'autore afferma che, al momento, non è possibile procedere ad una revisione nomenclatoriale basata su questa nuova suddivisione specifica poiché non è noto il numero cromosomico di esemplari provenienti da Napoli, terra tipica di *G. pumilio*.

Papilionidae

Papilio Linné, 1758

Papilio alexanor Esper, [1799] (N, S, Si) (M) (*)
Papilio hospiton Géné, 1839 (Sa) (E, M)
Papilio machaon Linné, 1758 (N, S, Si, Sa)

Iphiclides Hübner, [1819]

Iphiclides podalirius (Linné, 1758) (N, S, Si)

Parnassius Latreille, 1804

Parnassius apollo (Linné, 1758) (N, S, Si)
Parnassius mnemosyne (Linné, 1758) (N, S, Si)
Parnassius phoebus (Fabricius, 1793) (N)

Zerynthia Ochsenheimer, 1816

Zerynthia polyxena ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si)

Note

Papilio alexanor: Specie presente solo in un numero molto limitato di località delle Alpi occidentali. Si conoscono due catture di Calabria e una di Sicilia.

Pieridae

Aporia Hübner, [1819]

Aporia crataegi (Linné, 1758) (N, S, Si)

Pieris Schrank, 1801

Pieris brassicae (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)

Pieris bryoniae (Hübner, 1806) (N) (*)

Pieris callidice (Hübner, 1805) (N)

Pieris daplidice (Linné, 1758) (N, Sa) (*)

Pieris edusa (Fabricius, 1777) (N, S, Si) (*)

Pieris ergane (Hübner, 1828) (N, S)

Pieris mannii (Mayer, 1851) (N, S, Si, Sa)

Pieris napi (Linné, 1758) (N, S, Si)

Pieris rapae (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)

Euchloe Hübner, [1823]

Euchloe ausonia (Hübner, 1804) (N, S, Si) (*)

Euchloe bellezina (Boisduval, [1828]) (N) (E)

Euchloe crameri (Butler, 1869) (N) (*)

Euchloe insularis (Staudinger, 1861) (Sa) (E)

Euchloe simplonia (Freyer, 1829) (N) (E) (*)

Anthocharis Boisduval, Rambur & Graslin, [1833]

Anthocharis cardamines (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)

Anthocharis damone Boisduval, 1836 (S, Si)

Anthocharis euphenoides Staudinger, 1869 (N, S)

Colias Fabricius, 1807

Colias alfacariensis Berger, 1948 (N, S)

Colias crocea (Geoffroy, 1785) (N, S, Si, Sa)

Colias hyale (Linné, 1758) (N) (M)

Colias palaeno (Linné, 1761) (N) (M)

Colias phicomone (Esper, 1780) (N)

Gonepteryx Geyer, [1832]

Gonepteryx cleopatra (Linné, 1767) (N, S, Si, Sa)

Gonepteryx rhamni (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)

Leptidea Billberg, 1820

Leptidea sinapis (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)

Note

Pieris bryoniae: Nell'elenco non compare *Pieris flavescens* Müller, 1933 poiché recenti studi

elettroforetici sul DNA mitocondriale delle specie appartenenti al gruppo di *Pieris napi* hanno dimostrato la conspecificità di *bryoniae* e *flavescens*.

Pieris daplidice: Geiger & Scholl (Geiger W. & Scholl A., 1982 - *Pontia daplidice* in Südeuropa - eine Gruppe von zwei arten - Mitt. Schweiz ent. Ges. 55) hanno dimostrato che *daplidice* in realtà è un gruppo di due distinte specie. Wagener (Wagener P.S., 1988 - What are the valid names for the two genetically different taxa currently included within *Pontia daplidice* (Linnaeus, 1758)? - Nota Lepid. 11(1): 21-38) ha stabilito che alla specie occidentale si deve attribuire il nome di *daplidice*, mentre all'orientale quello di *edusa*.

Pieris edusa: Geiger & Scholl (Geiger W. & Scholl A., 1982 - *Pontia daplidice* in Südeuropa - eine Gruppe von zwei arten - Mitt. Schweiz ent. Ges. 55) hanno dimostrato che *daplidice* in realtà è un gruppo di due distinte specie. Wagener (Wagener P.S., 1988 - What are the valid names for the two genetically different taxa currently included within *Pontia daplidice* (Linnaeus, 1758)? - Nota Lepid. 11(1): 21-38) ha stabilito che alla specie occidentale si deve attribuire il nome di *daplidice*, mentre all'orientale quello di *edusa*.

Euchloe ausonia: *Euchloe ausonia*, *E. crameri*, *E. insularis* ed *E. simplonia* sono state separate sulla base della morfologia dei bruchi. (Strobino R., 1976 - *Euchloe insularis* Staudinger bona species, de Corse et Sardaigne. Etude comparative des espèces françaises du genre *Euchloe*. Entomops 38: 203-210; Back W., 1979 - Zur Biologie der europäischen und nordwestafrikanischen Populationen von *Euchloe ausonia* Hübner, 1804 - *Atalanta* 10(3): 225-243). Resta problematica una corretta assegnazione dei nomi *crameri*, *ausonia* e *simplonia* a causa di una non chiara definizione di *simplonia*.

Euchloe crameri: *Euchloe ausonia*, *E. crameri*, *E. insularis* ed *E. simplonia* sono state separate sulla base della morfologia dei bruchi. (Strobino R., 1976 - *Euchloe insularis* Staudinger bona species, de Corse et Sardaigne. Etude comparative des espèces françaises du genre *Euchloe*. Entomops 38: 203-210; Back W., 1979 - Zur Biologie der europäischen und nordwestafrikanischen Populationen von *Euchloe ausonia* Hübner, 1804 - *Atalanta* 10(3): 225-243). Resta problematica una corretta assegnazione dei nomi *crameri*, *ausonia* e *simplonia* a causa di una non chiara definizione di *simplonia*.

Euchloe simplonia: *Euchloe ausonia*, *E. crameri*, *E. insularis* ed *E. simplonia* sono state separate sulla base della morfologia dei bruchi. (Strobino R., 1976 - *Euchloe insularis* Staudinger bona species, de Corse et Sardaigne. Etude comparative des espèces françaises du genre *Euchloe*. Entomops 38: 203-210; Back W., 1979 - Zur Biologie der europäischen und nordwestafrikanischen Populationen von *Euchloe ausonia* Hübner, 1804 - *Atalanta* 10(3): 225-243). Resta problematica una corretta assegnazione dei nomi *crameri*, *ausonia* e *simplonia* a causa di una non chiara definizione di *simplonia*.

Riodinidae

Hamearis Hübner, [1819]

Hamearis lucina (Linné, 1758) (N, S, Si)

Lycaenidae

Lycaena Fabricius, 1807

Lycaena alciphron (Rottemburg, 1775) (N, S, Si)
Lycaena dispar (Haworth, 1803) (N, S) (M)
Lycaena eurydame (Hoffmannsegg, 1806) (N)
Lycaena hippothoe (Linné, 1761) (N)
Lycaena italica (Calberla, 1887) (S) (E)
Lycaena phlaeas (Linné, 1761) (N, S, Si, Sa)
Lycaena subalpina Speyer, 1851 (N)
Lycaena thersamon (Esper, 1784) (N, S)
Lycaena tityrus (Poda, 1761) (N, S)
Lycaena virgaureae (Linné, 1758) (N, S)

Thecla Fabricius, 1807

Thecla betulae (Linné, 1758) (N, S)
Thecla quercus (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)

Satyrium Scudder, 1876

Satyrium acaciae (Fabricius, 1787) (N, S)
Satyrium esculi (Hübner, 1804) (N)
Satyrium ilicis (Esper, 1779) (N, S, Si)
Satyrium pruni (Linné, 1758) (N) (M)
Satyrium spini ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)
Satyrium w-album (Knoch, 1782) (N, S, Si)

Callophrys Billberg, 1820

Callophrys rubi (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)

Leptotes Scudder, 1876

Leptotes pirithous (Linné, 1767) (N, S, Si, Sa)

Lampides Hübner, [1819]

Lampides boeticus (Linné, 1767) (N, S, Si, Sa)

Cupido Schrank, 1801

Cupido alcetas (Hoffmannsegg, 1804) (N, S)
Cupido argiades (Pallas, 1771) (N, S, Si)
Cupido minimus (Fuessli, 1775) (N, S, Si)
Cupido osiris (Meigen, 1829) (N, S)

Celastrina Tutt, 1906

Celastrina argiolus (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)

Pseudophilotes Beuret, 1958

Pseudophilotes barbagiae Prins & Poorten, 1982 (Sa) (E)

Pseudophilotes baton (Bergsträsser, 1779) (N, S, Si)

Pseudophilotes schiffermuelleri (Hemming, 1929) (N)

Scolitantides Hübner, [1823]

Scolitantides orion (Pallas, 1771) (N, S)

Glaucopsyche Scudder, 1872

Glaucopsyche alexis (Poda, 1761) (N, S, Si)

Glaucopsyche melanops (Boisduval, 1828) (N)

Maculinea van Eecke, 1915

Maculineaalcon ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N) (M)

Maculinea arion (Linné, 1758) (N, S)

Maculinea rebeli (Hirsche, 1904) (N, S)

Maculinea teleius (Bergsträsser, 1779) (N) (M)

Iolana Bethune-Baker, 1914

Iolana iolas (Ochsenheimer, 1816) (N, S)

Plebejus Kluk, 1802

Plebejus argus (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)

Plebejus trappi (Verity, 1927) (N) (E)

Lycaeides Hübner, [1819]

Lycaeides abetonica (Verity, 1910) (N, S) (*)

Lycaeides argyrognomon (Bergsträsser, 1779) (N, S)

Lycaeides corsica (Tutt, 1909) (Sa) (*)

Lycaeides idas (Linné, 1761) (N)

Aricia R.L. [?=Reichenbach], 1817

Aricia agestis ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si)

Aricia allous (Geyer, 1837) (N, S, Si)

Aricia cramera (Eschscholtz, 1821) (Sa)

Aricia nicias (Meigen, 1830) (N) (M)

Eumedonia Forster, 1938

Eumedonia eumedon (Esper, 1780) (N, S, Si)

Albulina Tutt, 1909

Albulina optilete (Knoch, 1781) (N) (M)
Albulina orbitulus (de Prunner, 1798) (N)

Agriades Hübner, [1819]

Agriades glandon (de Prunner, 1798) (N)

Cyaniris Dalman, 1816

Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775) (N, S, Si)

Polyommatus Latreille, 1804

Polyommatus amandus (Schneider, 1792) (N, S, Si)
Polyommatus bellargus (Rottemburg, 1775) (N, S, Si)
Polyommatus coridon (Poda, 1761) (N, S, Sa) (*)
Polyommatus damon ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)
Polyommatus daphnis ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si)
Polyommatus dolus (Hübner, 1823) (N) (E)
Polyommatus dorylas ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)
Polyommatus eros (Ochsenheimer, 1808) (N, S)
Polyommatus escheri (Hübner, 1823) (N, S)
Polyommatus exuberans (Verity, 1926) (N) (E, M)
Polyommatus galloi (Balletto & Toso, 1979) (S) (E)
Polyommatus hispanus (Herrich-Schäffer, 1852) (N, S)
Polyommatus humedasmae (Toso & Balletto, 1976) (N) (E, M)
Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) (N, S, Si, Sa)
Polyommatus ripartii (Freyer, 1830) (N)
Polyommatus thersites (Cantener, 1834) (N, S)
Polyommatus virgilius (Oberthür, 1910) (S) (E)

Note

Lycaeides abetonica: Le specie 001.0 e 003.0 sono rispettivamente la forma dell'Italia centro-meridionale e della Sardegna che sulla base della morfologia degli apparati copulatori maschili e femminili si devono ritenere specie distinte da *idas*.

Lycaeides corsica: Le specie 001.0 e 003.0 sono rispettivamente la forma dell'Italia centro-meridionale e della Sardegna che sulla base della morfologia degli apparati copulatori maschili e femminili si devono ritenere specie distinte da *idas*.

Polyommatus coridon: Leigheb, G. 1987 - Boll. Mus. reg. Sci. nat. Torino, 5(2): 449 - Figg. 1-2, ha descritto su esemplari provenienti da Seulo in Sardegna la ssp. *gennargentii*.

L'appartenenza di questo taxon a *coridon* appare dubbia poiché la colorazione della pagina superiore delle ali si avvicina molto di più a *Polyommatus caelestissimus* (Verity, 1921) della Spagna. La soluzione potrebbe venire da studi di elettroforesi enzimatica.

Nymphalidae

Nymphalis Kluk, 1780

Nymphalis antiopa (Linné, 1758) (N, S)

Nymphalis polychloros (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)

Inachis Hübner, [1817]

Inachis io (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)

Vanessa Fabricius, 1807

Vanessa atalanta (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)

Vanessa cardui (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)

Araschnia Hübner, [1819]

Araschnia levana (Linné, 1758) (N) (*)

Aglais Dalman, 1816

Aglais ichnusa (Hübner, 1824) (Sa) (E)

Aglais urticae (Linné, 1758) (N, S, Si)

Polygonia Hübner, [1819]

Polygonia c-album (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)

Polygonia egea (Cramer, 1775) (N, S, Si)

Argynnis Fabricius, 1807

Argynnis adippe ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si)

Argynnis aglaja (Linné, 1758) (N, S, Si)

Argynnis elisa Godart, 1823 (Sa) (E)

Argynnis niobe (Linné, 1758) (N, S, Si)

Argynnis pandora ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)

Argynnis paphia (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)

Issoria Hübner, [1819]

Issoria lathonia (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)

Brenthis Hübner, [1819]

Brenthis daphne ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si)

Brenthis hecate ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)
Brenthis ino (Rottemburg, 1775) (N, S)

Boloria Moore, [1905]

Boloria dia (Linné, 1767) (N, S)
Boloria eunomia (Esper, 1799) (N) (M)
Boloria euphrosyne (Linné, 1758) (N, S, Si)
Boloria graeca (Staudinger, 1870) (N) (*)
Boloria napaea (Hoffmannsegg, 1804) (N)
Boloria pales ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)
Boloria selene (Denis & Schiffermüller], 1775) (N)
Boloria thore (Hübner, 1803) (N)
Boloria titania (Esper, 1793) (N)

Melitaea Fabricius, 1807

Melitaea aetherie (Hübner, 1826) (S, Si) (M) (*)
Melitaea asteria (Freyer, 1828) (N) (E, M)
Melitaea athalia (Rottemburg, 1775) (N, S, Si)
Melitaea aurelia (Nickerl, 1850) (N, S)
Melitaea britomartis (Assmann, 1847) (N) (M)
Melitaea cinxia (Linné, 1758) (N, S, Si)
Melitaea deione (Duponchel, 1832) (N)
Melitaea diamina (Lang, 1789) (N, S)
Melitaea didyma (Esper, 1779) (N, S, Si)
Melitaea fascelis (Esper, 1794) (N, S)
Melitaea parthenoides (Keferstein, 1851) (N)
Melitaea phoebe (Goeze, 1779) (N, S, Si)
Melitaea varia (Meyer-Dür, 1851) (N, S)

Euphydryas Scudder, 1872

Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775) (N)
Euphydryas cynthia ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N)
Euphydryas glaciegenita (Verity, 1928) (N) (E)
Euphydryas provincialis (Boisduval, 1828) (N, S)
Euphydryas wolfensbergeri (Frey, 1880) (N) (E, M)

Charaxes Ochsenheimer, 1816

Charaxes jasius (Linné, 1766) (N, S, Si, Sa)

Apatura Fabricius, 1807

Apatura ilia ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)
Apatura iris (Linné, 1758) (N)

Limenitis Fabricius, 1807

Limenitis camilla (Linné, 1764) (N, S)

Limenitis populi (Linné, 1758) (N)

Limenitis reducta Staudinger, 1901 (N, S, Si, Sa)

Neptis Fabricius, 1807

Neptis rivularis (Scopoli, 1763) (N)

Neptis sappho (Pallas, 1771) (N) (*)

Note

Araschnia levana: Questa specie si è estinta in Italia intorno al 1935, per cause tutt'ora imprecisate. Recentemente è stata osservata sporadicamente nei dintorni di Tarvisio.

Boloria graeca: Specie presente solo in un numero molto limitato di località delle Alpi occidentali.

Melitaea aetherie: Specie presente solo in un numero molto limitato di località delle Alpi orientali.

Neptis sappho: Specie presente solo in un numero molto limitato di località dell'Italia nord-orientale.

Libytheidae

Libythea Fabricius, 1807

Libythea celtis (Laicharting, 1782) (N, S, Si, Sa)

Satyridae

Satyrus Latreille, 1810

Satyrus actaea (Esper, 1780) (N)

Satyrus ferula (Fabricius, 1793) (N, S)

Minois Hübner, [1819]

Minois dryas (Scopoli, 1763) (N)

Kanetisa Moore, [1893]

Kanetisa circe (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa)

Arethusana de Lesse, 1951

Arethusana arethusa [(Denis & Schiffermüller), 1775 (N)]

Hipparchia Fabricius, 1807

Hipparchia aristaeus (Bonelli, 1826) (Sa) (E)
Hipparchia ballettoi Kudrna, 1984 (S) (E)
Hipparchia blachieri (Fruhstorfer, 1908) (S, Si) (E)
Hipparchia fagi (Scopoli, 1763) (N, S, Si)
Hipparchia fidia (Linné, 1767) (N) (*)
Hipparchia hermione (Linné, 1764) (N, S, Si)
Hipparchia leighebi Kudrna, 1976 (Si) (E)
Hipparchia neomiris (Godart, 1822) (S, Sa) (E)
Hipparchia sbordonii Kudrna, 1984 (S) (E)
Hipparchia semele (Linné, 1758) (N, S, Si)
Hipparchia statilinus (Hufnagel, 1766) (N, S, Si)

Chazara Moore, [1893]

Chazara briseis (Linné, 1764) (N, S, Si)

Erebia Dalman, 1816

Erebia aethiopella (Hoffmannsegg, 1804) (N) (E)
Erebia aethiops (Esper, 1777) (N, S)
Erebia alberganus (de Prunner, 1798) (N, S) (E)
Erebia calcaria Lorkovic, 1949 (N) (E)
Erebia carmenta Fruhstorfer, 1907 (N, S) (*)
Erebia cassioides (Reiner & Hohenwarth, 1792) (N)
Erebia christi Rätzer, 1890 (N) (E, M)
Erebia epiphron (Knoch, 1783) (N, S)
Erebia eriphyle (Freyer, 1836) (N) (E)
Erebia euryale (Esper, 1805) (N, S)
Erebia flavofasciata Heyne, 1895 (N) (E, M)
Erebia gorge (Esper, 1805) (N, S)
Erebia ligea (Linné, 1758) (N, S)
Erebia manto ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N)
Erebia medusa ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)
Erebia melampus (Füssli, 1775) (N) (E)
Erebia meolans (de Prunner, 1798) (N, S)
Erebia mnestra (Esper, 1805) (N)
Erebia montana (de Prunner, 1798) (N, S) (E)
Erebia neoridas Boisduval, 1828 (N, S)
Erebia nivalis Lorkovic & De Lesse, 1954 (N) (E)
Erebia oeme (Hübner, [1804]) (N)
Erebia ottomana (Herrich-Schäffer, 1847) (N)
Erebia pandrose (Borkhausen, 1788) (N, S)
Erebia pharte (Esper, 1805) (N) (E)
Erebia pluto (de Prunner, 1798) (N, S) (E)
Erebia pronoe (Esper, 1780) (N)

Erebia scipio Boisduval, 1832 (N) (E)
Erebia styria (Godart, 1824) (N) (E)
Erebia styx (Freyer, 1834) (N) (E)
Erebia triaria (de Prunner, 1798) (N)
Erebia tyndarus (Esper, 1781) (N) (E)

Oeneis Hübner, [1819]

Oeneis glacialis (Moll, 1783) (N) (E)

Melanargia Meigen, 1828

Melanargia arge (Sulzer, 1776) (S, Si)
Melanargia galathea (Linné, 1758) (N, S, Si)
Melanargia occitanica (Esper, 1793) (N)
Melanargia pherusa (Boisduval, 1833) (Si) (E, M)
Melanargia russiae (Esper, 1784) (N, S, Si)

Maniola Schrank, 1801

Maniola jurtina (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)
Maniola nurag (Ghiliani, 1852) (Sa) (E, M)

Hyponephele Muschamp, 1915

Hyponephele lupina (O.G. Costa, 1836) (N, S, Si)
Hyponephele lycaon (Kühn, 1774) (N, S, Si)

Aphantopus Wallengren, [1819]

Aphantopus hyperantus (Linné, 1758) (N)

Pyronia Hübner, [1819]

Pyronia cecilia Vallantin, 1894 (N, S, Si, Sa)
Pyronia tithonus (Linné, 1771) (N, S, Sa)

Coenonympha Hübner, [1819]

Coenonympha arcania (Linné, 1761) (N, S)
Coenonympha corinna (Hübner, 1806) (Sa) (E)
Coenonympha darwiniana Staudinger, 1871 (N) (E)
Coenonympha dorus (Esper, 1782) (N, S)
Coenonympha elbana Staudinger, 1901 (S) (E)
Coenonympha gardetta (de Prunner, 1798) (N) (E)
Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788) (N, S)
Coenonympha oedippus (Fabricius, 1787) (N) (M)
Coenonympha pamphilus (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)

Coenonympha rhodopensis Elwes, 1900 (N, S)
Coenonympha tullia (Müller, 1764) (N)

Pararge Hübner, [1819]

Pararge aegeria (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)

Lasiommata Westwood, 1841

Lasiommata achine (Scopoli, 1763) (N)
Lasiommata maera (Linné, 1758) (N, S, Si)
Lasiommata megera (Linné, 1767) (N, S, Si)
Lasiommata petropolitana (Fabricius, 1787) (N, S)
Lasiommata tigelius (Bonelli, 1826) (Sa) (E)

Note

Hipparchia fidia: Specie presente solo in un numero molto limitato di località dell'Italia nord-occidentale.

Erebia carmentis: Recenti studi di elettroforesi enzimatica in corso di pubblicazione hanno dimostrato l'inesistenza della specie *neleus* (Freyer, 1833) sensu Warren (1981 - Supplement to Monograph of the genus *Erebia* - E.W. Classey) e la separazione in due distinte specie di cassioides: *carmentis* delle Alpi occidentali e degli Appennini e *cassioides* delle Alpi ed est del Passo dello Stelvio e delle Dolomiti.

Danaidae

Danaus Kluk, 1780

Danaus chrysippus (Linné, 1758) (S, Si, Sa) (*)

Note

Danaus chrysippus: È una specie migrante a distribuzione pan-paleotropicale, che ha, in Italia, colonie forse stabili a partire dagli anni intorno al 1990.

Drepanidae

Falcaria Haworth, 1809

Falcaria lacertinaria (Linnaeus, 1758) (N)

Watsonalla Minet, 1985

Watsonalla binaria (Hufnagel, 1767) (N, S, Si)
Watsonalla cultraria (Fabricius, 1775) (N, S, Si)

Watsonalla uncinula (Borkhausen, 1790) (N, S, Si, Sa)

Drepana Schrank, 1802

Drepana curvatula (Borkhausen, 1790) (N)

Drepana falcataria (Linnaeus, 1758) (N, S)

Sabra Bode, 1907

Sabra harpagula (Esper, 1786) (N, S, Si?)

Cilix Leach, [1815]

Cilix glaucata (Scopoli, 1763) (N, S, Si, Sa)

Thyatiridae

Thyatira Ochsenheimer, 1816

Thyatira batis (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Habrosyne Hübner, [1821]

Habrosyne pyritoides (Hufnagel, 1766) (N, S)

Tethea Ochsenheimer, 1816

Tethea ocularis (Linnaeus, 1767) (N, S, Si, Sa)

Tethea or (Goeze, 1781) (N, S)

Tetheella Werny, 1966

Tetheella fluctuosa (Hübner, [1803]) (N)

Ochropacha Wallengren, 1871

Ochropacha duplaris (Linnaeus, 1761) (N)

Cymatophorima Spuler, 1908

Cymatophorima diluta ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)

Achlya Billberg, 1820

Achlya flavicornis (Linnaeus, 1758) (N, S)

Polyploca Hübner, [1821]

Polyploca ridens (Fabricius, 1787) (N, S, Si)
Polyploca neoridens Parenzan, 1976 (S, Si)

Asphalia Hübner, [1821]

Asphalia ruficollis (Fabricius, 1787) (N)

Axiidae

Axia Hübner, [1821]

Axia margarita (Hübner, [1813]) (N)

Geometridae

Archiearis Hübner, [1823]

Archiearis notha (Hübner, [1803]) (N)
Archiearis parthenias (Linnaeus, 1761) (N)
Archiearis puella (Esper, 1786) (N)

Alsophila Hübner, [1825]

Alsophila aescularia ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)
Alsophila quadripunctaria (Esper, 1800) (N, S)

Myinodes Meyrick, 1892

Myinodes interpunctaria (Herrich-Schäffer, 1848) (S, Si)

Orthostixis Hübner, [1823]

Orthostixis cribraria (Hübner, [1799]) (S, Si)

Aplasta Hübner, [1823]

Aplasta ononaria (Fuessly, [1783]) (N, S, Si)

Pseudoterpna Hübner, [1823]

Pseudoterpna coronillaria (Hübner, [1817]) (N, S, Si, Sa)
Pseudoterpna corsicaria (Rambur, 1833) (Sa) (E)
Pseudoterpna pruinata (Hufnagel, 1767) (N, S)

Geometra Linnaeus, 1758

Geometra papilionaria Linnaeus, 1758 (N, S)

Comibaena Hübner, [1823]

Comibaena bajularia ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)

Antonechloris Raineri, 1994

Antonechloris sardinica (Schawerda, 1934) (Sa) (E)

Antonechloris smaragdaria (Fabricius, 1787) (N, S, Si)

Holoterpna Püngeler, 1900

Holoterpna pruinosa (Staudinger, 1897) (N)

Hemithea Duponchel, 1829

Hemithea aestivaria (Hübner, [1799]) (N, S, Si)

Chlorissa Stephens, 1831

Chlorissa cloraria (Hübner, [1813]) (N, S)

Chlorissa etruscaria (Zeller, 1849) (N, S, Si, Sa)

Chlorissa faustinata Millière, 1868 (Si)

Chlorissa viridata (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)

Microloxia Warren, 1893

Microloxia herbaria (Hübner, [1813]) (N, S, Si, Sa)

Bustilloxia Exposito, 1979

Bustilloxia menadiaria (Thierry-Mieg, 1893) (Sa)

Thalera Hübner, [1823]

Thalera fimbrialis (Scopoli, 1763) (N, S, Si)

Hemistola Warren, 1893

Hemistola biliosata (de Villers, 1789) (N, S, Si, Sa)

Jodis Hübner, [1823]

Jodis lactearia (Linnaeus, 1758) (N, S, Sa)

Jodis putata (Linnaeus, 1758) (N)

Eucrostes Hübner, [1823]

Eucrostes indigenata (de Villers, 1789) (S, Si, Sa)

Xenochlorodes Warren, 1897

Xenochlorodes beryllaria (Mann, 1853) (S, Si, Sa)

Cyclophora Hübner, 1822

Cyclophora albiocellaria (Hübner, 1789) (N, S, Si)

Cyclophora albipunctata (Hufnagel, 1767) (N)

Cyclophora annulata (Schulze, 1775) (N, S)

Cyclophora linearia (Hübner, [1799]) (N, S)

Cyclophora pendularia (Clerck, 1759) (N, S)

Cyclophora porata (Linnaeus, 1767) (N, S, Si, Sa)

Cyclophora punctaria (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Cyclophora puppillaria (Hübner, [1799]) (N, S, Si, Sa)

Cyclophora quercimontaria (Bastelberger, 1897) (N, S)

Cyclophora ruficiliaria (Herrich-Schäffer, [1855]) (N, S, Sa)

Cyclophora suppunctaria (Zeller, 1847) (N, S, Si, Sa)

Timandra Duponchel, 1829

Timandra griseata (W. Petersen, 1902) (N, S, Si, Sa)

Scopula Schrank, 1802

Scopula beckeraria (Lederer, 1853) (S)

Scopula caricaria (Reutti, [1853]) (N, S)

Scopula congruata (Zeller, 1847) (Si)

Scopula corrivalaria (Kretschmar, 1862) (N)

Scopula decolor (Staudinger, 1897) (S, Sa)

Scopula decorata ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)

Scopula emutaria (Hübner, [1809]) (N, S, Si, Sa)

Scopula floslactata (Haworth, 1809) (N)

Scopula imitaria (Hübner, [1799]) (N, S, Si, Sa)

Scopula immorata (Linnaeus, 1758) (N)

Scopula immutata (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)

Scopula incanata (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)

Scopula inustata (Herrich-Schäffer, [1844]) (S)

Scopula marginepunctata (Goeze, 1781) (N, S, Si, Sa)

Scopula minorata (Boisduval, 1833)

Scopula minorata ochroleucaria (Herrich-Schäffer, [1851]) (S, Si, Sa)

Scopula nemoraria (Hübner, [1799]) (N, S) (*)

Scopula nigropunctata (Hufnagel, 1767) (N, S, Si)

Scopula ornata (Scopoli, 1763) (N, S, Si, Sa)

Scopula rubiginata (Hufnagel, 1767) (N, S, Si)

Scopula submutata (Treitschke, 1828) (N, S, Si)
Scopula subpunctaria (Herrich-Schäffer, [1847]) (N, S)
Scopula ternata (Schrank, 1802) (N)
Scopula tessellaria (Boisduval, 1840) (N, S, Si)
Scopula turbidaria (Hübner, [1819]) (S, Si, Sa)
Scopula umbelaria (Hübner, [1813]) (N, S)
Scopula vigilata (Prout, 1913) (S, Si)
Scopula virgulata ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)

Glossotrophia Prout, 1913

Glossotrophia alba Hausmann, 1993 (S, Si)
Glossotrophia asellaria (Herrich-Schäffer, [1847]) (N, S, Si, Sa)
Glossotrophia confinaria (Herrich-Schäffer, [1847]) (N, S, Si, Sa)

Idaea Treitschke, 1825

Idaea albitorquata (Püngeler, 1908) (S, Si)
Idaea antiquaria (Herrich-Schäffer, [1847]) (N, S)
Idaea attenuaria (Rambur, 1833) (S, Si, Sa)
Idaea aureolaria ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)
Idaea aversata (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
Idaea belemiata (Millière, 1868) (N, Si)
Idaea biselata (Hufnagel, 1767) (N, S)
Idaea calunetaria (Staudinger, 1859) (N, Si)
Idaea camparia (Herrich-Schäffer, [1851]) (N, S, Si)
Idaea circuitaria (Hübner, [1819]) (N, S, Si, Sa)
Idaea consanguinaria (Lederer, 1853) (S, Si)
Idaea consolidata (Lederer, 1853) (S, Si)
Idaea contiguaria (Hübner, [1799]) (N, S)
Idaea degeneraria (Hübner, [1799]) (N, S, Si, Sa)
Idaea determinata (Staudinger, 1876) (S, Si)
Idaea deversaria (Herrich-Schäffer, [1847]) (N, S, Si, Sa)
Idaea dilutaria (Hübner, [1799]) (N, S, Si, Sa)
Idaea dimidiata (Hufnagel, 1767) (N, S, Si, Sa)
Idaea distinctaria (Boisduval, 1840) (N, S, Si, Sa)
Idaea efflorata (Zeller, 1849) (N, S, Si, Sa)
Idaea elongaria (Rambur, 1833) (N, S, Si, Sa)
Idaea emarginata (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa?) (*)
Idaea eugeniata (Millière, 1870) (N)
Idaea filicata (Hübner, [1799]) (N, S, Si, Sa)
Idaea flaveolaria (Hübner, [1809]) (N, S)
Idaea fuscovenosa (Goeze, 1781) (N, S, Si)
Idaea humiliata (Hufnagel, 1767) (N, S, Si, Sa)
Idaea infirmaria (Rambur, 1833) (N, S, Si, Sa)
Idaea inquinata (Scopoli, 1763) (N, S, Si, Sa)
Idaea laevigata (Scopoli, 1763) (N, S, Si, Sa)
Idaea litigiosaria (Boisduval, 1840) (N, S, Si, Sa)

Idaea longaria (Herrich-Schäffer, [1852]) (S, Si, Sa)
Idaea manicaria (Herrich-Schäffer, [1851]) (Sa)
Idaea mediaria (Hübner, [1819]) (N, S, Sa)
Idaea minuscularia (Ribbe, 1912) (S)
Idaea moniliata ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)
Idaea muricata (Hufnagel, 1767) (N, S)
Idaea nitidata (Herrich-Schäffer, 1861) (N)
Idaea obliquaria (Turati, 1913) (S, Sa) (E)
Idaea obsoletaria (Rambur, 1833) (N, S, Si, Sa)
Idaea ochrata (Scopoli, 1763) (N, S, Si, Sa)
Idaea ostrinaria (Hübner, [1813]) (N, S, Si, Sa)
Idaea pallidata ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si)
Idaea politata (Hübner [1793]) (N, S, Si, Sa)
Idaea predotaria (Hartig, 1951) (N, S, Sa)
Idaea rainerii Hausmann, 1994 (Si)
Idaea rhodogrammaria (Püngeler, 1913) (Sa)
Idaea rubraria (Staudinger, 1871) (N, S, Si, Sa)
Idaea rufaria (Hübner, [1799]) (N, S, Si)
Idaea rusticata ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa) (*)
Idaea sardonata (Homberg, 1912) (N?)
Idaea sericeata (Hübner, [1813]) (N, S, Sa)
Idaea serpentata (Hufnagel, 1767) (N, S, Si)
Idaea straminata (Borkhausen, 1794) (N, S, Si, Sa)
Idaea subrufaria (Staudinger, 1899) (S, Si)
Idaea subsericeata (Haworth, 1809) (N, S, Si, Sa)
Idaea sylvestraria (Hübner, [1799]) (N, S, Sa)
Idaea trigeminata (Haworth, 1809) (N, S, Si, Sa)
Idaea typicata (Guenée, 1857) (N, S)
Idaea vesubiata (Millière, 1873) (N)
Idaea virgularia (Hübner, [1799]) (N, S, Si, Sa)
Idaea vulpinaria (Herrich-Schäffer, [1851]) (N, S, Si, Sa)

Emmiltis Hübner, [1825]

Emmiltis pygmaearia (Hübner, [1809]) (N, S)

Cleta Duponchel, [1845]

Cleta filacearia (Herrich-Schäffer, [1847]) (S)
Cleta ramosaria (de Villers, 1789) (S?, Sa?) (*)

Rhodostrophia Hübner, [1823]

Rhodostrophia calabra (Petagna, 1787) (N, S, Si)
Rhodostrophia sicanaria (Zeller, 1852) (S, Si)
Rhodostrophia vibicaria (Clerck, 1759) (N, S, Si)

Rhodometra Meyrick, 1892

Rhodometra sacraria (Linnaeus, 1767) (N, S, Si, Sa)

Casilda Agenjo, 1952

Casilda antophilaria (Hübner, [1813]) (S)

Casilda consecraria (Staudinger, 1871) (Si, Sa)

Lythria Hübner, [1823]

Lythria cruentaria (Hufnagel, 1767) (N, S, Sa)

Lythria plumularia (Freyer, 1831) (N, S)

Lythria purpuraria (Linnaeus, 1758) (N, S)

Cataclysmes Hübner, [1825]

Cataclysmes dissimilata (Rambur, 1833) (Sa)

Cataclysmes rigata (Hübner, [1813]) (N, S, Si)

Phibalapteryx Stephens, 1829

Phibalapteryx virgata (Hufnagel, 1767) (N, S, Si)

Scotopteryx Hübner, [1825]

Scotopteryx bipunctaria ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si)

Scotopteryx chenopodiata (Linnaeus, 1758) (N, S)

Scotopteryx coarctaria ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)

Scotopteryx diniensis (Neuburger, 1906) (N, S)

Scotopteryx luridata (Hufnagel, 1767) (N, S)

Scotopteryx moeniata (Scopoli, 1763) (N, S)

Scotopteryx mucronata (Scopoli, 1763) (N, S)

Scotopteryx obvallaria (Mabille, 1867) (Sa) (E)

Scotopteryx proximaria (Rambur, 1833) (Sa)

Scotopteryx vicinaria (Duponchel, [1845]) (N)

Orthonama Hübner, [1825]

Orthonama obstipata (Fabricius, 1794) (N, S, Si, Sa)

Orthonama vittata (Borkhausen, 1794) (N)

Xanthorhoe Hübner, [1825]

Xanthorhoe biriviata (Borkhausen, 1794) (N, S)

Xanthorhoe conspectaria (Mann, 1859) (Si)

Xanthorhoe designata (Hufnagel, 1767) (N, S)

Xanthorhoe disjunctaria (La Harpe, 1860) (S, Si, Sa)

Xanthorhoe ferrugata (Clerck, 1759) (N)

Xanthorhoe fluctuata (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)
Xanthorhoe incursata (Hübner, [1813]) (N)
Xanthorhoe montanata ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Sa)
Xanthorhoe munitata (Hübner, [1809]) (N)
Xanthorhoe oxybiata (Millière, 1872) (N, S, Si, Sa)
Xanthorhoe quadrifasciata (Clerck, 1759) (N, S?, Si) (*)
Xanthorhoe spadicearia ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)
Xanthorhoe vidanoi Parenzan & Hausmann, 1993 (N, S, Si)

Catarhoe Herbulot, 1951

Catarhoe basochesiata (Duponchel, 1831) (N, S, Si, Sa)
Catarhoe cuculata (Hufnagel, 1767) (N, S)
Catarhoe permixtaria (Herrich-Schäffer, 1851) (N)
Catarhoe putridaria (Herrich-Schäffer, 1852)
Catarhoe putridaria bulgariata (Millière, 1868) (N, S, Si, Sa)
Catarhoe rubidata ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)

Epirrhoe Hübner, [1825]

Epirrhoe alternata (Müller, 1764) (N, S, Si)
Epirrhoe galiata ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si)
Epirrhoe hastulata (Hübner, [1813]) (N, S)
Epirrhoe latevittata (Turati, 1913) (Sa) (E)
Epirrhoe molluginata (Hübner, [1813]) (N, S)
Epirrhoe rivata (Hübner, [1813]) (N, S, Si)
Epirrhoe timozzaria (Constant, 1884) (Sa) (E)
Epirrhoe tristata (Linnaeus, 1758) (N, S)

Protorhoe Herbulot, 1951

Protorhoe unicata (Guenée, 1857) (Si)

Costaconvexa Agenjo, 1949

Costaconvexa polygrammata (Borkhausen, 1794) (N, S, Si, Sa)

Camptogramma Stephens, 1831

Camptogramma bilineatum (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)
Camptogramma bistrigatum (Treitschke, 1828) (Sa)

Entephria Hübner, [1825]

Entephria caesiata ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)
Entephria cyanata (Hübner, [1809]) (N, S)
Entephria flavata (Osthelder, 1929) (N)
Entephria flavicinctata (Hübner, [1813]) (N, S, Si)

Entephria infidaria (La Harpe, 1853) (N, S, Si)
Entephria nobiliaria (Herrich-Schäffer, 1852) (N, S)

Larentia Treitschke, 1825

Larentia clavaria (Haworth, 1809) (N, S, Si, Sa)
Larentia malvata (Rambur, 1832) (S, Si, Sa)

Anticlea Stephens, 1831

Anticlea badiata ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si)
Anticlea derivata ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si)

Mesoleuca Hübner, [1825]

Mesoleuca albicillata (Linnaeus, 1758) (N)

Pelurga Hübner, [1825]

Pelurga comitata (Linnaeus, 1758) (N)

Lampropteryx Stephens, 1831

Lampropteryx suffumata ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)

Cosmorhoe Hübner, [1825]

Cosmorhoe ocellata (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)

Nebula Bruand, [1846]

Nebula achromaria (La Harpe, 1852) (N, S)
Nebula ibericata (Staudinger, 1871) (Si)
Nebula nebulata (Treitschke, 1828) (N, S)
Nebula salicata (Hübner, 1799) (N, S, Si, Sa)
Nebula senectaria (Herrich-Schäffer, 1852) (S)
Nebula tophaceata ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)

Eulithis Hübner, [1821]

Eulithis mellinata (Fabricius, 1787) (N)
Eulithis populata (Linnaeus, 1758) (N, S)
Eulithis prunata (Linnaeus, 1758) (N, S)
Eulithis pyraliata ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)
Eulithis testata (Linnaeus, 1761) (N)

Ecliptopera Warren, 1894

Ecliptopera capitata (Herrich-Schäffer, 1839) (N)
Ecliptopera silaceata ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)

Chloroclysta Hübner, [1825]

Chloroclysta citrata (Linnaeus, 1761) (N)
Chloroclysta miata (Linnaeus, 1758) (N, S, Sa)
Chloroclysta siterata (Hufnagel, 1767) (N, S, Si, Sa)
Chloroclysta truncata (Hufnagel, 1767) (N, S)

Cidaria Treitschke, 1825

Cidaria fulvata (Forster, 1771) (N, S, Si)

Plemyria Hübner, [1825]

Plemyria rubiginata ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si)

Pennithera Viidalepp, 1980

Pennithera firmata (Hübner, [1822]) (N, S)

Thera Stephens, 1831

Thera britannica (Turner, 1925) (S)
Thera cembrae Kitt, 1912 (N)
Thera cognata (Thünberg, 1792) (N, S)
Thera cupressata (Geyer, [1831]) (N, S, Si, Sa)
Thera juniperata (Linnaeus, 1758) (N, S)
Thera obeliscata (Hübner, 1787) (N, S)
Thera stragulata (Hübner, [1809]) (N, S)
Thera variata ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)

Eustroma Hübner, [1825]

Eustroma reticulatum ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N)

Electrophaes Prout, 1923

Electrophaes corylata (Thünberg, 1792) (N)

Colostygia Hübner, [1825]

Colostygia aptata (Hübner, [1813]) (N, S, Si)
Colostygia aqueata (Hübner, [1813]) (N, S)
Colostygia austriacaria (Herrich-Schäffer, 1850) (N)
Colostygia kitschelti (Rebel, 1934) (N) (E)
Colostygia kollariaria (Herrich-Schäffer, 1848) (N)

Colostygia laetaria (La Harpe, 1853) (N)
Colostygia multistrigaria (Haworth, 1809) (N, S)
Colostygia olivata ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)
Colostygia pectinataria (Knoch, 1781) (N, S)
Colostygia tempestaria (Herrich-Schäffer, 1851) (N)
Colostygia turbata (Hübner, [1799]) (N)

Hydriomena Hübner, [1825]

Hydriomena furcata (Thunberg, 1784) (N, S)
Hydriomena impluviata ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)
Hydriomena ruberata (Freyer, 1831) (N)

Coenocalpe Hübner, [1825]

Coenocalpe lapidata (Hübner, [1809]) (N)

Horisme Hübner, [1825]

Horisme aemulata (Hübner, [1813]) (N)
Horisme aquata (Hübner, [1813]) (N)
Horisme calligraphata (Herrich-Schäffer, 1839) (N)
Horisme corticata (Treitschke, 1835) (N, S, Si)
Horisme exoletata (Herrich-Schäffer, 1839) (Si) (E)
Horisme predotai Bytinski-Salz, 1936 (Sa) (E)
Horisme radicularia (La Harpe, 1855) (N, S, Si, Sa)
Horisme tersata ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)
Horisme vitalbata ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)

Melanthia Duponchel, 1829

Melanthia alaudaria (Freyer, 1846) (N)
Melanthia procellata ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)

Pareulype Herbulot, 1951

Pareulype berberata ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)

Spargania Guenée, 1857

Spargania luctuata ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N)

Rheumaptera Hübner, 1822

Rheumaptera hastata (Linnaeus, 1758) (N)

Hydria Hübner, 1822

Hydria cervinalis (Scopoli, 1763) (N, S)
Hydria montivagata (Duponchel, 1830) (N)
Hydria undulata (Linnaeus, 1758) (N, S)

Triphosa Stephens, 1829

Triphosa dubitata (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)
Triphosa sabaudiata (Duponchel, 1830) (N, S)

Philereme Hübner, [1825]

Philereme transversata (Hufnagel, 1767) (N, S)
Philereme vetulata ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)

Euphyia Hübner, [1825]

Euphyia adumbraria (Herrich-Schäffer, 1851) (N, S)
Euphyia biangulata (Haworth, 1809) (N)
Euphyia cupreata (Herrich-Schäffer, 1839) (Si, Sa)
Euphyia frustata (Treitschke, 1828) (N, S, Si, Sa)
Euphyia mesembrina (Rebel, 1927) (N)
Euphyia scripturata (Hübner, [1799]) (N, S)
Euphyia unangulata (Haworth, 1809) (N, S?) (*)

Epirrita Hübner, 1822

Epirrita autumnata (Borkhausen, 1794) (N, S)
Epirrita christyi (Allen, 1906) (N, S)
Epirrita dilutata ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)

Operophtera Hübner, [1825]

Operophtera brumata (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)
Operophtera fagata (Scharfenberg, 1805) (N, S)

Solitanea Djakonov, 1924

Solitanea mariae (Stauder, 1921) (N, S) (E)

Perizoma Hübner, [1825]

Perizoma affinitatum (Stephens, 1831) (N, S)
Perizoma albulatum ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)
Perizoma alchemillatum (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)
Perizoma bifaciatum (Haworth, 1809) (N, S, Si, Sa)
Perizoma blandiatum ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N)
Perizoma didymatum (Linnaeus, 1758) (N, S)
Perizoma flavofasciatum (Thunberg, 1792) (N, S)

Perizoma hydratum (Treitschke, 1829) (N, S)
Perizoma incultrarium (Herrich-Schäffer, 1848) (N)
Perizoma lugdunarium (Herrich-Schäffer, 1855) (N, S)
Perizoma minoratum (Treitschke, 1828) (N, S)
Perizoma obsoletarium (Herrich-Schäffer, 1838) (N, S)
Perizoma parallelolineatum (Retzius, 1783) (N, S)
Perizoma sagittatum (Fabricius, 1787) (N)
Perizoma taeniatum (Stephens, 1831) (N)
Perizoma verberatum (Scopoli, 1763) (N, S)

Baptria Hübner, [1825]

Baptria tibiale (Esper, 1791) (N)

Eupithecia Curtis, 1825

Eupithecia abbreviata Stephens, 1831 (N, S, Si)
Eupithecia abietaria (Goeze, 1781) (N, S)
Eupithecia absinthiata (Clerck, 1759) (N, S, Si)
Eupithecia actaeata (Walderdorff, 1869) (N)
Eupithecia alliaria Staudinger, 1870 (N, S)
Eupithecia analoga Djakonov, 1926 (N, S)
Eupithecia assimilata Doubleday, 1856 (N, S)
Eupithecia breviculata (Donzel, 1837) (N, S, Si, Sa)
Eupithecia carpophagata Staudinger, 1871 (N, S)
Eupithecia cauchiata (Duponchel, 1830) (N, S)
Eupithecia centaureata ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)
Eupithecia cocciferata Millière, 1864 (N, S, Sa)
Eupithecia cretaceata (Packard, 1874) (N)
Eupithecia cucullaria (Rebel, 1901) (N, S)
Eupithecia denotata (Hübner, [1813]) (N, S)
Eupithecia distinctaria Herrich-Schäffer, 1848 (N, S)
Eupithecia dodoneata Guenée, 1857 (N, S, Si, Sa)
Eupithecia druentiata Dietze, 1902 (N, S)
Eupithecia egenaria Herrich-Schäffer, 1848 (N, S)
Eupithecia ericeata (Rambur, 1833) (N, S, Si, Sa)
Eupithecia exigua (Hübner, [1813]) (N)
Eupithecia expallidata Doubleday, 1856 (N, S)
Eupithecia extraversaria Herrich-Schäffer, 1852 (N, S)
Eupithecia extremata (Fabricius, 1787) (Si)
Eupithecia gemellata Herrich-Schäffer, 1861 (N, S, Si)
Eupithecia goossentiata Mabille, 1869 (N)
Eupithecia graphata (Treitschke, 1828) (N, S)
Eupithecia gratiosata Herrich-Schäffer, 1861 (N, S, Si, Sa)
Eupithecia gueneata Mabille, 1862 (N, S, Si)
Eupithecia haworthiata Doubleday, 1856 (N, S, Si, Sa)
Eupithecia icterata (de Villers, 1789) (N, S, Si)
Eupithecia immundata (Lienig & Zeller, 1846) (N)

Eupithecia impurata (Hübner, [1813]) (N, S, Si)
Eupithecia indigata (Hübner, [1813]) (N)
Eupithecia innotata (Hufnagel, 1767) (N, S, Sa)
Eupithecia insigniata (Hübner, [1790]) (N, S)
Eupithecia intricata (Zetterstedt, [1839]) (N, S)
Eupithecia inturbata (Hübner, [1817]) (N)
Eupithecia irriguata (Hübner, [1813]) (N, S, Si, Sa)
Eupithecia lanceata (Hübner, [1825]) (N)
Eupithecia laquaearia Herrich-Schäffer, 1848 (N, S, Si, Sa)
Eupithecia lariciata (Freyer, 1842) (N, S)
Eupithecia limbata Staudinger, 1879 (N?) (*)
Eupithecia liguriata Millière, 1884 (N, Si)
Eupithecia linariata ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si)
Eupithecia lithographata (Cristhoph, 1887) (Sa)
Eupithecia massiliata Millière, 1865 (S)
Eupithecia millefoliata Rössler, 1866 (S, Si, Sa)
Eupithecia nanata (Hübner, [1813]) (N, S)
Eupithecia ochridata Pinker, 1968 (N)
Eupithecia oxycedrata (Rambur, 1833) (S, Sa)
Eupithecia pantellata Millière, 1875 (Si)
Eupithecia pauxillaria Boisduval, 1840 (N, S, Si, Sa)
Eupithecia phoeniceata (Rambur, 1834) (S, Si)
Eupithecia pimpinellata (Hübner, [1813]) (N, S, Sa)
Eupithecia plumbeolata (Haworth, 1809) (N, S)
Eupithecia pulchellata (Stephens, 1831) (N, S)
Eupithecia pusillata ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)
Eupithecia pygmeata (Hübner, [1799]) (S)
Eupithecia pyreneata Mabille, 1871 (N, S)
Eupithecia santolinata Mabille, 1871 (Sa)
Eupithecia sardoa Dietze, 1918 (Sa)
Eupithecia satyrata (Hübner, [1813]) (N, S)
Eupithecia schiefereri Bohatsch, 1893 (N, S, Si)
Eupithecia scopariata (Rambur, 1833) (S, Sa)
Eupithecia selinata Herrich-Schäffer, 1861 (N, S)
Eupithecia semigraphata (Bruand, [1851]) (N, S, Si)
Eupithecia silenata (Assmann, 1848) (N)
Eupithecia silenicolata Mabille, 1867 (N, S)
Eupithecia simpliciata (Haworth, 1809) (N, S)
Eupithecia sinuosaria (Eversmann, 1848) (N)
Eupithecia spissilineata Mentzer, 1846 (S)
Eupithecia subfuscata (Haworth, 1809) (N, S)
Eupithecia subumbrata ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si)
Eupithecia succenturiata (Linnaeus, 1758) (N, Si)
Eupithecia tantillaria Boisduval, 1840 (N, S)
Eupithecia tenuiata (Hübner, [1813]) (N, S)
Eupithecia thalictрата Püngeler, 1902 (N)
Eupithecia tripunctaria Herrich-Schäffer, 1852 (N)
Eupithecia trisignaria Herrich-Schäffer, 1848 (N, S)

Eupithecia ultimaria Boisduval, 1840 (S)
Eupithecia undata (Freyer, 1840) (N, S)
Eupithecia unedonata Mabille, 1868 (S, Si, Sa)
Eupithecia valerianata (Hübner, [1813]) (N)
Eupithecia venosata (Fabricius, 1787) (N, S, Si, Sa)
Eupithecia veratraria Herrich-Schäffer, 1850 (N, S)
Eupithecia virgaureata Doubleday, 1861 (N, S)
Eupithecia vulgata (Haworth, 1809) (N, S)

Gymnoscelis Mabille, 1868

Gymnoscelis rufifasciata (Haworth, 1809) (N, S, Si, Sa)

Chloroclystis Hübner, [1825]

Chloroclystis v-ata (Haworth, 1809) (N, S)

Rhinoprora Warren, 1895

Rhinoprora chloerata (Mabille, 1870) (N, S)
Rhinoprora debiliata (Hübner, [1817]) (N, S)
Rhinoprora rectangulata (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)

Anticollix Prout, 1938

Anticollix sparsatus (Treitschke, 1828) (N, S)

Chesias Treitschke, 1825

Chesias legatella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)
Chesias rufata (Fabricius, 1775) (N, S, Sa)

Carsia Hübner, [1825]

Carsia sororiata (Hübner, [1813]) (N)

Aplocera Stephens, 1827

Aplocera corsalta (Schawerda, 1928) (Sa) (E)
Aplocera efformata (Guenée, 1857) (N, S, Si?) (*)
Aplocera lythoxylata (Hübner, [1799]) (N, S)
Aplocera plagiata (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
Aplocera praeformata (Hübner, [1826]) (N, S)
Aplocera simpliciata (Treitschke, 1835) (N)

Odezia Boisduval, 1840

Odezia atrata (Linnaeus, 1758) (N, S)

Schistostege Hübner, [1825]

Schistostege decussata ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)

Lithostege Hübner, [1825]

Lithostege duponchelli Prout, 1938 (S, Si)

Lithostege farinata (Hufnagel, 1767) (N, S)

Lithostege griseata ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)

Venusia Curtis, 1839

Venusia cambrica Curtis, 1839 (N)

Euchoeca Hübner, [1823]

Euchoeca nebulata (Scopoli, 1763) (N, S)

Asthena Hübner, [1825]

Asthena albulata (Hufnagel, 1767) (N, S)

Asthena anseraria (Herrich-Schäffer, 1855) (N, S)

Hydrelia Hübner, [1825]

Hydrelia flammeolaria (Hufnagel, 1767) (N, S, Si)

Hydrelia sylvata ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N)

Minoa Treitschke, 1825

Minoa murinata (Scopoli, 1763) (N, S, Si)

Lobophora Curtis, 1825

Lobophora halterata (Hufnagel, 1767) (N, S)

Trichopteryx Hübner, [1825]

Trichopteryx carpinata (Borkhausen, 1794) (N, S)

Trichopteryx polycommata ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N)

Epilobophora Inoue, 1943

Epilobophora sabinata (Geyer, [1831]) (N)

Pterapherapteryx Curtis, 1825

Pterapherapteryx sexalata (Retzius, 1783) (N)

Celonoptera Lederer, 1862

Celonoptera mirificaria Lederer, 1862 (N, S, Si)

Nothocasis Prout, 1937

Nothocasis sertata (Hübner, [1817]) (N, S)

Acasis Duponchel, [1845]

Acasis viretata (Hübner, [1799]) (N)

Abraxas Leach, [1815]

Abraxas grossulariatus (Linnaeus, 1758) (N, S)

Calospilos Hübner, [1825]

Calospilos pantarius (Linnaeus, 1767) (N, S, Si, Sa)

Calospilos sylvatus (Scopoli, 1763) (N)

Lomaspilis Hübner, [1825]

Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758) (N, S, Sa?) (*)

Ligdia Guenée, 1857

Ligdia adustata ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)

Stegania Guenée, 1844

Stegania cararia (Hübner, 1790) (N)

Stegania trimaculata (de Villers, 1789) (N, S, Si, Sa)

Semiothisa Hübner, 1818

Semiothisa aestimaria (Hübner, [1809]) (N, S, Si, Sa)

Semiothisa alternata ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)

Semiothisa artesiaria ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)

Semiothisa carbonaria (Clerck, 1759) (N)

Semiothisa clathrata (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)

Semiothisa glarearia (Brahm, 1791) (N, S, Si)

Semiothisa liturata (Clerck, 1759) (N, S)

Semiothisa notata (Linnaeus, 1758) (N, S)

Semiothisa rippertaria (Duponchel, 1830) (N, S, Si?) (*)

Semiothisa signaria (Hübner, [1809]) (N, S)

Bichroma Guppemberg, 1887

Bichroma famula (Esper, 1787) (N, S)

Isturgia Hübner, [1823]

Isturgia limbaria (Fabricius, 1775) (N)

Itame Hübner, [1823]

Itame brunneata (Thunberg, 1784) (N)

Itame messapiaria Sohn-Retel, 1929 (S) (E)

Itame sparsaria (Hübner, [1813]) (N, S)

Itame spodiaria Lefebvre, 1831 (S, Si)

Itame wauaria (Linnaeus, 1758) (N, S)

Tephрина Guenée, 1845

Tephрина arenacearia ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Sa)

Tephрина assimilaria (Rambur, 1833) (Sa) (E)

Tephрина murinaria ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si)

Enconista Lederer, 1853

Enconista miniosaria (Duponchel, 1829) (N?) (*)

Rhoptria Guenée, 1857

Rhoptria asperaria (Hübner, [1817]) (N, S, Si, Sa)

Pygmaena Boisduval, 1840

Pygmaena fusca (Thunberg, 1792) (N)

Cepphis Hübner, [1823]

Cepphis advenaria (Hübner, 1790) (N, S)

Petrophora Hübner, 1811

Petrophora binaevata (Mabille, 1869) (Sa) (E)

Petrophora chlorosata (Scopoli, 1763) (N, S, Sa)

Petrophora convergata (de Villers, 1789) (N)

Petrophora narbonea (Linnaeus, 1767) (N)

Plagodis Hübner, [1823]

Plagodis dolabraria (Linnaeus, 1767) (N, S, Si)
Plagodis pulveraria (Linnaeus, 1758) (N)

Pachycnemia Stephens, 1829

Pachycnemia hippocastanaria (Hübner, [1799]) (N, S, Si, Sa)

Sthanelia Boisduval, 1840

Sthanelia benesignata (Bellier, 1861) (Sa) (E)
Sthanelia tibiaria (Rambur, 1829) (N, S)

Opisthograptis Hübner, [1823]

Opisthograptis luteolata (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Epione Duponchel, 1829

Epione parallelaria ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N)
Epione repandaria (Hufnagel, 1767) (N, S, Sa)

Pseudopanthera Hübner, [1823]

Pseudopanthera macularia (Linnaeus, 1758) (N, S)

Hypoxystis Prout, 1915

Hypoxystis pluviana (Fabricius, 1787) (N)

Apeira Gistel, 1848

Apeira syringaria (Linnaeus, 1758) (N, S)

Artiora Meyrick, 1892

Artiora evonymaria ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N)

Ennomos Treitschke, 1825

Ennomos alniarius (Linnaeus, 1758) (N, S)
Ennomos autumnarius (Werneburg, 1859) (N)
Ennomos erosarius ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)
Ennomos fuscantarius (Haworth, 1809) (N, S)
Ennomos quercarius (Hübner, [1813]) (N, S, Si)
Ennomos quercinarius (Hufnagel, 1767) (N, S, Si)

Selenia Hübner, [1823]

Selenia dentaria (Fabricius, 1775) (N, S)
Selenia lunularia (Hübner, 1788) (N, S, Si)
Selenia tetralunaria (Hufnagel, 1767) (N, S, Si)

Odontopera Stephens, 1831

Odontopera bidentata (Clerck, 1759) (N, S)

Crocallis Treitschke, 1825

Crocallis auberti (Oberthur, 1883) (Si)
Crocallis boisduvalaria (Lucas, 1848) (S, Si)
Crocallis dardoinaria (Donzel, 1840) (Si, Sa)
Crocallis elinguararia (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)
Crocallis tusciaria (Borkhausen, 1793) (N, S, Si)

Ourapteryx Leach, 1814

Ourapteryx sambucaria (Linnaeus, 1758) (N, S)

Colotois Hübner, [1823]

Colotois pennaria (Linnaeus, 1761) (N, S, Si, Sa)

Angerona Duponchel, 1829

Angerona prunaria (Linnaeus, 1758) (N, S)

Apocheima Hübner, [1825]

Apocheima hispidaria ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)
Apocheima pilosaria ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si)

Lycia Hübner, [1825]

Lycia alpina (Sulzer, 1776) (N)
Lycia florentina (Stefanelli, 1882) (N, S)
Lycia graecaria (Staudinger, 1861) (N, S)
Lycia hirtaria (Clerck, 1759) (N, S, Sa)
Lycia isabellae (Harrison, 1914) (N)
Lycia lapponaria (Boisduval, 1840) (N)
Lycia pomonaria (Hübner, 1790) (N)

Biston Leach, [1815]

Biston betularius (Linnaeus, 1758) (N, S)
Biston stratarius (Hufnagel, 1767) (N, S, Si, Sa)

Apochima Agassiz, 1847

Apochima flabellaria (Heeger, 1838) (N, S, Si, Sa)

Chemerina Boisduval, 1840

Chemerina caliginearia (Rambur, 1833) (N, S, Si, Sa)

Agriopis Hübner, [1825]

Agriopis aurantiaria (Hübner, [1799]) (N, S, Sa)

Agriopis bajaria ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)

Agriopis leucophaearia ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)

Agriopis marginaria (Fabricius, 1776) (N, S, Si, Sa)

Erannis Hübner, [1825]

Erannis ankeraria (Staudinger, 1861) (S)

Erannis defoliaria (Clerck, 1759) (N, S, Si, Sa)

Crocota Hübner, [1823]

Crocota lutearia (Fabricius, 1794) (N, S)

Athroolopha Lederer, 1853

Athroolopha chrysitaria (Hübner, [1831]) (Si)

Athroolopha pennigeraria (Hübner, [1813]) (N, Si)

Eurranthis Hübner, [1823]

Eurranthis plummistaria (de Villers, 1789) (N)

Nychiodes Lederer, 1853

Nychiodes amygdalaria (Herrich-Schäffer, 1847) (S)

Nychiodes andalusiaria Millière, 1865 (Si)

Nychiodes obscuraria (de Villers, 1789) (N, S, Si)

Nychiodes ragusaria Millière, 1881 (S, Si)

Menophra Moore, 1887

Menophra abruptaria (Thunberg, 1792) (N, S, Si, Sa)

Menophra harterti (Rotschild, 1912) (Sa)

Menophra japygiaria (O. Costa, 1849) (N, S, Si, Sa) (E)

Menophra nyctemeraria (Geyer, [1831]) (N?, Si) (*)

Megalycinia Wehrli, 1939

Megalycinia serraria (A. Costa, 1881) (N, S, Si) (E)

Synopsia Hübner, [1825]

Synopsia sociaria (Hübner, [1799]) (N, S, Si, Sa)

Calamodes Guenée, 1857

Calamodes occitanaria (Duponchel, 1829) (N)

Calamodes subscudularia (Turati, 1919) (Si)

Ekboarmia Wehrli, 1943

Ekboarmia atlanticaria (Staudinger, 1859) (Sa)

Sardocyrnia Wehrli, 1943

Sardocyrnia bastelicaria (Bellier, 1862) (Sa)

Peribatodes Wehrli, 1943

Peribatodes dragone de Laever & Parenzan, 1985 (S)

Peribatodes ilicarius (Herrich-Schäffer, 1852) (N)

Peribatodes perversarius (Boisduval, 1840) (N)

Peribatodes rhomboidarius ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)

Peribatodes secundarius (Esper, 1794) (N, S, Sa)

Peribatodes umbrarius (Hübner, [1809]) (N, S, Si, Sa)

Selidosema Hübner, [1823]

Selidosema ambustarium (Hübner, [1831]) (S, Si)

Selidosema brunnearium (de Villers, 1789) (N, S, Si)

Selidosema parenzani Hausmann, 1993 (Si)

Selidosema plumarium ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si)

Selidosema taeniolarium (Hübner, [1813]) (N)

Cleora Curtis, 1825

Cleora cinctaria ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Sa)

Deileptenia Hübner, [1825]

Deileptenia ribeata (Clerck, 1759) (N)

Alcis Curtis, 1826

Alcis jubatus (Thunberg, 1788) (N)

Alcis maculatus (Staudinger, 1892) (N)
Alcis repandatus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)

Hypomecis Hübner, 1821

Hypomecis punctinalis (Scopoli, 1763) (N, S)
Hypomecis roboraria ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si?) (*)
Hypomecis viertlii (Bohatsch, 1883) (S)

Cleorodes Warren, 1894

Cleorodes lichenarius (Hufnagel, 1767) (N, S, Si, Sa)

Fagivorina Wehrli, 1943

Fagivorina arenaria (Hufnagel, 1767) (N, S, Si, Sa)

Ascotis Hübner, [1825]

Ascotis selenaria ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)

Ectropis Hübner, [1825]

Ectropis crepuscularia ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si)

Paradarisa Warren, 1894

Paradarisa consonaria (Hübner, [1799]) (N, S)

Parectropis Sato, 1980

Parectropis similaria (Hufnagel, 1767) (N, S)

Aethalura McDunnough, 1920

Aethalura punctulata ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)

Ematurga Lederer, 1853

Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Adactylotis Hübner, [1823]

Adactylotis contaminaria (Hübner, [1813]) (N, S, Si)

Tephronia Hübner, [1825]

Tephronia codetaria (Oberthür, 1881) (Si, Sa)

Tephronia cremiaria (Freyer, 1838) (N, S?) (*)
Tephronia oranaria (Staudinger, 1892) (N)
Tephronia sepiaria (Hufnagel, 1767) (N, S, Si, Sa)

Bupalus Leach, [1815]

Bupalus piniarius (Linnaeus, 1758) (N, S)

Cabera Treitschke, 1825

Cabera exanthemata (Scopoli, 1763) (N, S)
Cabera pusaria (Linnaeus, 1758) (N, S)

Lomographa Hübner, [1825]

Lomographa bimaculata (Fabricius, 1775) (N, S)
Lomographa distinctata (Herrich-Schäffer, 1839) (N?) (*)
Lomographa temerata ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)

Theria Hübner, [1825]

Theria primaria (Haworth, 1809) (N, S)
Theria rupicaprararia ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)

Campaea Lamarck, 1816

Campaea honoraria ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)
Campaea margaritata (Linnaeus, 1767) (N, S, Si, Sa)

Hylaea Hübner, 1822

Hylaea fasciaria (Linnaeus, 1758) (N, S)

Puengeleria Rougemont, 1903

Puengeleria capreolaria ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)

Odontognophos Wehrli, 1951

Odontognophos dumetatus (Treitschke, 1827) (N, S)

Gnophos Treitschke, 1825

Gnophos furvatus ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)
Gnophos obfuscatus ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)

Dicrognophos Wehrli, 1951

Dicrognophos perspersatus (Treitschke, 1827) (N?) (*)
Dicrognophos sartatus (Treitschke, 1827) (S, Si, Sa)

Charissa Curtis, 1826

Charissa bellieri Oberthür, 1913 (Sa) (E)
Charissa obscurata ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)
Charissa predotae (Schawerda, 1929) (Si)

Kemtroglyphos Wehrli, 1951

Kemtroglyphos ambiguatus (Duponchel, 1830) (N)
Kemtroglyphos onustarius (Herrich-Schäffer, 1852) (N, S, Si, Sa)

Costignophos Wehrli, 1951

Costignophos italohelveticus (Rezbanyai-Reser, 1986) (N)
Costignophos pullatus ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si)

Neognophina Wehrli, 1946

Neognophina supinaria (Mann, 1854) (S)

Rhopaloglyphos Wehrli, 1951

Rhopaloglyphos glaucinarius (Hübner, [1799]) (N, S, Si)

Euchroglyphos Wehrli, 1951

Euchroglyphos corsicus (Oberthür, 1913) (Sa) (E)
Euchroglyphos mucidarius (Hübner, [1799]) (N, S, Si, Sa)
Euchroglyphos variegatus (Duponchel, 1830) (N, S, Si)

Yezognophos Matsumura, 1927

Yezognophos andereggarius (La Harpe, 1852) (N)
Yezognophos dilucidarius ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N)
Yezognophos dognini (Thierry-Mieg, 1910) (N)
Yezognophos operarius (Hübner, [1813]) (N)
Yezognophos serotinus ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)
Yezognophos vittarius (Thunberg, 1788) (N)

Elophos Boisduval, 1840

Elophos caelibarius (Herrich-Schäffer, 1848) (N)
Elophos zellerarius (Freyer, 1836) (N)

Sciadia Hübner, 1822

Sciadia tenebraria (Esper, [1806]) (N)

Psodos Treitschke, 1827

Psodos quadrifaria (Sulzer, 1776) (N)

Glacies Millière, 1874

Glacies alpinata (Scopoli, 1763) (N)

Glacies alticolaria (Mann, 1853) (N)

Glacies baldensis (Wolfsberger, 1966) (N) (E)

Glacies bentelii (Rätzer, 1890) (N)

Glacies canaliculata (Hochenwarth, 1785) (N)

Glacies coracina (Esper, 1805) (N)

Glacies noricana (Wagner, 1898) (N?) (*)

Glacies perlinii (Turati, 1914) (N) (E)

Glacies spitzi (Rebel, 1906) (N)

Siona Duponchel, 1829

Siona lineata (Scopoli, 1763) (N, S, Si)

Chariaspilates Wehrli, 1953

Chariaspilates formosaria (Eversmann, 1837) (N)

Aspitates Treitschke, 1825

Aspitates gilvaria ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)

Semiaspilates Wehrli, 1953

Semiaspilates ochrearius (Rossi, 1794) (N, S, Si, Sa)

Dyscia Hübner, [1825]

Dyscia conspersaria (Fabricius, 1775) (N, S)

Dyscia lentiscaria (Donzel, 1837) (N)

Dyscia raunaria (Freyer, 1852) (N, S)

Dyscia sicanaria (Oberthür, 1923) (S, Si, Sa)

Perconia Hübner, [1823]

Perconia strigillaria (Hübner, 1787) (N, S, Si)

Onychora Meyrick, 1892

Onychora agaritharia (Dardoin, 1842) (N)

Compsoptera Blanchard, 1845

Compsoptera aemiliorum Raineri, 1994 (S, Sa) (*)

Compsoptera argentaria (Herrich-Schäffer, 1848) (Si)

Compsoptera jourdanaria (Serres, 1826) (Sa)

Compsoptera opacaria (Hübner, [1819]) (N, S, Sa)

Note

Scopula nemoraria: Citata delle Marche da Spada (1893).

Idaea emarginata: Citata di Bosa da Mola (1919).

Idaea rusticata: Segnalata delle Alpi Marittime da Mariani (1941).

Cleta ramosaria: Segnalazioni dubbie di Spada (1893) e Curò (1878-79) per le Marche, il Livornese e la Sardegna.

Xanthorhoe quadrifasciata: Citata del Napoletano da Achille Costa (1860).

Euphyia unangulata: Segnalata da Spada (1893) delle Marche.

Eupithecia limbata: Citata del Friuli Venezia Giulia da Carrara (1926-28).

Aplocera efformata: Segnalata da Mariani-Klimesch (1957).

Lomaspilis marginata: Citata di Bosa da Mola (1919).

Semiothisa rippertaria: Citata della Sicilia da Mariani (1941).

Enconista miniosaria: Segnalata genericamente dell'Italia Settentrionale da Mariani (1941).

Menophra nyctemeraria: Citata delle Alpi Marittime da Mariani (1941).

Hypomecis roboraria: Segnalata di Sicilia da Minà-Palumbo (1884).

Tephronia cremiaria: Segnalata di Toscana da Verity (1906).

Lomographa distinctata: Segnalata del Trentino da Mariani (1941).

Dicrognophos perspersatus: Segnalata del Piemonte da Mariani (1941).

Glacies noricana: Citata del Trentino da Mariani (1941).

Compsoptera aemiliorum: Per il S, segnalata solo dell'isola di Capraia.

Notodontidae

Phalera Hübner, [1819]

Phalera bucephala (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Phalera bucephaloides (Ochsenheimer, 1810) (N, S)

Cerura Schrank, 1802

Cerura erminea (Esper, 1783) (N, S)

Cerura vinula (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Furcula Lamarck, 1816

Furcula bicuspis (Borkhausen, 1790) (N, S)

Furcula bifida (Brahm, 1787) (N, S, Si, Sa)

Furcula furcula (Clerck, 1759) (N, S, Sa)

Stauropus Germar, 1812

Stauropus fagi (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Peridea Stephens, 1828

Peridea anceps (Goeze, 1781) (N, S, Si, Sa)

Notodonta Ochsenheimer, 1810

Notodonta dromedarius (Linnaeus, 1767) (N, S)

Notodonta torva (Hübner, [1809]) (N, S) (*)

Notodonta tritophus ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)

Notodonta ziczac (Linnaeus, 1758) (N, S, Sa)

Drymonia Hübner, [1819]

Drymonia dodonaea ([Denis & Schiffermüller], 1775)

Drymonia dodonaea albofasciata (Hartig, 1968) (N, S)

Drymonia melagona (Borkhausen, 1790) (N)

Drymonia querna ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si)

Drymonia ruficornis (Hufnagel, 1766) (N, S, Si)

Drymonia velitaris (Hufnagel, 1766) (N, S)

Paradrymonia Kiriakoff, 1967

Paradrymonia vittata (Staudinger, 1892)

Paradrymonia vittata streckfussi (Honrath, 1892) (N)

Dicranura Reichenbach, 1817

Dicranura ulmi ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)

Harpyia Ochsenheimer, 1810

Harpyia milhauseri (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa)

Pheosia Hübner, [1819]

Pheosia gnoma (Fabricius, 1777) (N)

Pheosia tremula (Clerck, 1759) (N, S)

Ptilophora Stephens, 1828

Ptilophora plumigera ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si)

Pterostoma Germar, 1812

Pterostoma palpina (Clerck, 1759) (N, S, Si, Sa)

Ptilodon Hübner, 1822

Ptilodon capucina (Linnaeus, 1758) (N, S)

Ptilodontella Kiriakoff, 1967

Ptilodontella cucullina ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si)

Leucodonta Staudinger, 1892

Leucodonta bicoloria ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N)

Odontosia Hübner, [1819]

Odontosia carmelita (Esper, 1798) (N)

Spatalia Hübner, [1819]

Spatalia argentina ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si)

Gluphisia Boisduval, 1829

Gluphisia crenata (Esper, 1785) (N, S)

Clostera Samouelle, 1819

Clostera anachoreta ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)

Clostera anastomosis (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)

Clostera curtula (Linnaeus, 1758) (N, S)

Clostera pigra (Hufnagel, 1766) (N, S)

Rhegmatophila Standfuss, 1888

Rhegmatophila ricchelloi Hartig, 1939 (Sa) (E)

Note

Notodonta torva: Eitschberger (1994. Atalanta, 25) ha scisso alcune popolazioni, anche italiane, come specie valida (*Notodonta tarburi* Eitschberger & Steiniger, 1981).

Thaumetopoeidae

Thaumetopoea Hübner, [1820]

Thaumetopoea processionea (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)

Traumatocampa Wallengren, 1871

Traumatocampa pityocampa ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si)

Lymantriidae

Calliteara Butler, 1881

Calliteara fascelina (Linnaeus, 1758) (N, S)

Calliteara pudibunda (Linnaeus, 1758) (N, S, Sa)

Pentophera Germar, 1812

Pentophera morio (Linnaeus, 1767) (N, S)

Orgyia Ochsenheimer, 1810

Orgyia antiqua (Linnaeus, 1758) (N, S)

Teia Walker, 1855

Teia corsica (Boisduval, 1834)

Teia corsica nupera (Turati, 1919) (S)

Teia dubia (Tauscher, 1806)

Teia dubia arcerii (Ragusa, 1923) (Si)

Teia recens (Hübner, [1819]) (N)

Teia rupestris (Rambur, 1832) (Sa)

Teia trigotephras (Boisduval, 1829) (N, S, Si) (*)

Laelia Stephens, 1828

Laelia coenosa (Hübner, [1808]) (N, S)

Lymantria Hübner, [1819]

Lymantria atlantica (Rambur, 1837) (Si, Sa)

Lymantria dispar (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Lymantria lapidicola (Herrich-Schäffer, 1851)

Lymantria lapidicola kruegeri (Turati, 1912) (Sa) (E)

Lymantria monacha (Linnaeus, 1758) (N, S)

Arctornis Germar, 1810

Arctornis l-nigrum (Müller, 1764) (N, S, Si)

Leucoma Hübner, 1822

Leucoma salicis (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)

Ocneria Hübner, [1819]

Ocneria ledereri (Millière, 1869) (S, Si)

Ocneria rubea ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si)

Parocneria Dyar, 1897

Parocneria detrita (Esper, 1785) (N)

Euproctis Hübner, [1819]

Euproctis chrysorrhoea (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Sphrageidus Maes, 1984

Sphrageidus similis (Fuessly, 1775) (N, S, Si, Sa)

Note

Teia trigotephras: Vi sono evidenze che sotto questo nome specifico siano accomunate più entità distinte.

Arctiidae

Nudaria Haworth, [1809]

Nudaria mundana (Linnaeus, 1761) (N, S)

Thumata Walker, 1866

Thumata senex (Hübner, [1808]) (N)

Paidia Hübner, [1819]

Paidia griseola Rothschild, 1933 (Si)

Paidia rica (Freyer, [1858]) (N)

Apaidia Hampson, 1900

Apaidia mesogona (Godart, [1824]) (Sa)

Apaidia rufeola (Rambur, 1832) (S, Sa)

Miltochrista Hübner, [1809]

Miltochrista miniata (Forster, 1771) (N, S)

Cybosia Hübner, [1819]

Cybosia mesomella (Linnaeus, 1758) (N, S)

Pelosia Hübner, [1819]

Pelosia muscerda (Hufnagel, 1766) (N, S, Sa)

Pelosia obtusa (Herrich-Schäffer, [1847]) (N, S)

Pelosia plumosa (Mabille, [1900]) (S)

Atolmis Hübner, [1819]

Atolmis rubricollis (Linnaeus, 1758) (N, S, Si?)

Lithosia Fabricius, 1798

Lithosia quadra (Linnaeus, 1758) (N, S, Sa)

Eilema Hübner, [1819]

Eilema caniola (Hübner, [1808]) (N, S, Si, Sa)

Eilema complana (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Eilema deplana (Esper, 1787) (N, S)

Eilema griseola (Hübner, [1803]) (N, S)

Eilema lurideola ([Zincken], 1817) (N, S)

Eilema lutarella (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)

Eilema palliatella (Scopoli, 1763) (N, S, Si, Sa)

Eilema pseudocomplana (Daniel, 1939) (N, S)

Eilema pygmaeola (Doubleday, 1847)

Eilema pygmaeola pallifrons (Zeller, 1847) (N, S, Si, Sa)

Eilema rungsi de Toulgoët, 1960 (S)

Eilema sororcula (Hufnagel, 1766) (N, S, Si, Sa)

Setema de Freina & Witt, 1984

Setema cereola (Hübner, [1803]) (N, S)

Setina Schrank, 1802

Setina alpestris Zeller, 1865 (N)

Setina aurita (Esper, 1787) (N)

Setina irrorella (Linnaeus, 1758)

Setina irrorella irrorella (Linnaeus, 1758) (N)

Setina irrorella mediterranea (Daniel, 1964) (S)

Setina roscida ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)

Coscinia Hübner, [1819]

Coscinia bifasciata (Rambur, 1832) (Sa)

Coscinia cribraria (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)

Coscinia libyssa (Püngeler, 1907)

Coscinia libyssa caligans Turati, 1907 (Si) (E)

Coscinia striata (Linnaeus, 1758) (N, S)

Utetheisa Hübner, [1819]

Utetheisa pulchella (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Ocnogyna Lederer, [1853]

Ocnogyna baetica (Rambur, 1836) (S, Si)

Ocnogyna corsica (Rambur, 1832)

Ocnogyna corsica sardoa Staudinger, 1870 (Sa)

Ocnogyna parasita (Hübner [1790]) (N)

Chelis Rambur, 1866

Chelis maculosa (Gerning, 1780)

Chelis maculosa stertzi (Schulz, 1902) (N, S)

Chelis simplonica (Boisduval, 1840) (N)

Watsonarctia de Freina & Witt, 1984

Watsonarctia deserta (Bartel, 1902) (N, S)

Phragmatobia Stephens, 1828

Phragmatobia caesarea (Goeze, 1781) (N, S)

Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Cymbalophora Rambur, 1866

Cymbalophora pudica (Esper, [1785]) (N, S, Si, Sa)

Cymbalophora rivularis (Ménétriés, 1832) (S)

Parasemia Hübner, [1820]

Parasemia plantaginis (Linnaeus, 1758) (N, S)

Grammia Rambur, 1866

Grammia quenseli (Paykull, 1791) (N)

Holoarctia Ferguson, 1984

Holoarctia cervini (Fallou, 1864) (N)

Spilosoma Curtis, 1825

Spilosoma lubricipedium (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Spilosoma luteum (Hufnagel, 1766) (N, S, Si, Sa)

Spilosoma urticae (Esper, 1789) (N, S, Si?) (*)

Hyphantria Harris, 1841

Hyphantria cunea (Drury, 1773) (N, S) (*)

Diaphora Stephens, 1827

Diaphora luctuosa (Hübner, [1831]) (N)

Diaphora mendica (Clerck, 1759) (N, S, Si)

Diaphora sordida (Hübner, [1803]) (N, S)

Rhyparia Hübner, [1820]

Rhyparia purpurata (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)

Diacrisia Hübner, [1819]

Diacrisia sannio (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)

Hyphoraia Hübner, [1820]

Hyphoraia aulica (Linnaeus, 1758) (N)

Hyphoraia testudinaria (Geoffroy, 1785) (N, S, Si)

Pericallia Hübner, [1820]

Pericallia matronula (Linnaeus, 1758) (N)

Arctia Schrank, 1802

Arctia caja (Linnaeus, 1758) (N, S)

Arctia fasciata (Esper, 1785) (N)

Arctia festiva (Hufnagel, 1766) (N, S, Si)

Arctia flavia (Fuessly, 1779) (N)

Arctia villica (Linnaeus, 1758)

Arctia villica angelica (Boisduval, 1829) (Si)

Arctia villica villica (Linnaeus, 1758) (N, S)

Callimorpha Latreille, 1809

Callimorpha dominula (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)

Euplagia Hübner, [1820]

Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) (N, S, Si)

Tyria Hübner, [1819]

Tyria jacobaeae (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Note

Spilosoma urticae: Spesso confusa con altre specie, la sua presenza in Sicilia è alquanto dubbia.

Hyphantria cunea: La specie, proveniente dal Nord America, è stata introdotta in Europa più di mezzo secolo fa; in Italia la sua comparsa risale al 1978.

Syntomidae

Syntomis Ochsenheimer, 1808

Syntomis kruegeri Ragusa, 1904 (N, S, Si)

Syntomis marjana Stauder, 1913 (N)

Syntomis phegea (Linnaeus, 1758) (N, S)

Syntomis ragazzii Turati, 1917 (S) (E)

Dysauxes Hübner, [1819]

Dysauxes ancilla (Linnaeus, 1767) (N, S)

Dysauxes famula (Freyer, 1836) (N, S, Si)

Dysauxes punctata (Fabricius, 1781) (N, S, Si)

Noctuidae

Orectis Lederer, 1857

Orectis massiliensis (Millière, [1864]) (N, S) (*)

Orectis proboscidata (Herrich-Schäffer, 1851) (N, S, Si) (*)

Trisaletes Tams, 1939

Trisaletes emortualis ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)

Paracolax Hübner, [1825]

Paracolax tristalis (Fabricius, 1794) (N, S, Si, Sa)

Idia Hübner, [1813]

Idia calvaria ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)

Simplicia Guenée, 1854

Simplicia rectalis (Eversmann, 1842) (N, S)

Nodaria Guenée, 1854

Nodaria nodosalis (Herrich-Schäffer, [1851]) (N, S, Si, Sa)

Macrochilo Hübner, [1825]

Macrochilo cribrumalis (Hübner [1793]) (N, S)

Zanclognatha Lederer, 1857

Zanclognatha lunalis (Scopoli, 1763) (N, S)

Zanclognatha tarsipennalis (Treitschke, 1835) (N, S)

Zanclognatha zelleralis (Wocke, 1850) (N, S, Si)

Pechipogo Hübner, [1825]

Pechipogo strigilata (Linné, 1758) (N, S)

Polypogon Schrank, 1802

Polypogon flavicrinalis/gigantea (Andreas, 1910) / Turati, 1911 (Sa) (*)

Polypogon gryphalis (Herrich-Schäffer, 1851) (N, S)

Polypogon plumigeralis/crinalis (Hübner, [1825]) / (Treitschke, 1829) (N, S, Si, Sa) (*)

Polypogon tentacularia (Linné, 1758) (N, S, Si)

Herminia Latreille, 1802

Herminia grisealis ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)

Herminia tarsicrinalis (Knoch, 1782) (N, S)

Hypertrocon Berio, 1989

Hypertrocon tenuialis (Rebel, 1899) (N, S)

Hypenodes Doubleday, 1850

Hypenodes kalchbergi Staudinger, 1876 (Si) (E)

Hyphenodes turfosalis (Wocke, 1850) (S, Si?, Sa)

Schrankia Hübner, [1825]

Schrankia costaestrigalis (Stephens, 1834) (N, S, Si, Sa)

Schrankia hartigi Berio, 1991 (Sa) (E) (*)

Schrankia taenialis (Hübner, [1809]) (Si, Sa)

Rhynchodontodes Warren, 1913

Rhynchodontodes antiqualis (Hübner, [1809]) (N, S, Si)

Hypena Schrank, 1802

Hypena crassalis (Fabricius, 1787) (N, S)

Hypena lividalis (Hübner [1796]) (N, S, Si, Sa)

Hypena obesalis Treitschke, 1829 (N, S, Si, Sa)

Hypena obsitalis (Hübner, [1813]) (N, S, Si, Sa)

Hypena palpalis (Hübner [1796]) (N, S, Si, Sa)

Hypena proboscidalis (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)

Hypena rostralis (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)

Phytometra Haworth, 1809

Phytometra sanctiflorentis (Boisduval, 1834) (S?)

Phytometra viridaria (Clerck, 1759) (N, S, Si, Sa)

Rivula Guenée, [1845]

Rivula sericealis (Scopoli, 1763) (N, S, Si, Sa)

Parascotia Hübner, [1825]

Parascotia fuliginaria (Linné, 1761) (N, S, Si, Sa)

Parascotia nisseni (Turati, 1905) (Si, Sa) (*)

Colobochyla Hübner, [1825]

Colobochyla salicalis ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)

Scoliopteryx Germar, 1810

Scoliopteryx libatrix (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)

Calyptra Ochsenheimer, 1816

Calyptra thalictri (Borkhausen, 1790) (N, S)

Catocala Schrank, 1802

Catocala conjuncta (Esper, [1787]) (N, S, Si, Sa)
Catocala conversa (Esper, [1787]) (N, S, Si, Sa)
Catocala dilecta (Hübner, [1808]) (N, S, Si, Sa)
Catocala diversa (Geyer, [1828]) (N, S, Si)
Catocala electa (Vieweg, 1790) (N, S, Si)
Catocala elocata (Esper, [1787]) (N, S, Si, Sa)
Catocala fraxini (Linné, 1758) (N, S)
Catocala fulminea (Scopoli, 1763) (N, S)
Catocala hymenaea ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S?)
Catocala lupina Herrich-Schäffer, [1851] (N, S)
Catocala nupta (Linné, 1767) (N, S)
Catocala nymphaea (Esper, [1787]) (N, S, Si, Sa)
Catocala nymphagoga (Esper, [1787]) (N, S, Si, Sa)
Catocala optata (Godart, 1824) (N)
Catocala promissa ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)
Catocala puerpera (Giorna, 1791) (N, S)
Catocala sponsa (Linné, 1767) (N, S, Si, Sa)

Minucia Moore, [1885]

Minucia lunaris ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)

Ophiusa Ochsenheimer, 1816

Ophiusa tirhaca (Cramer, 1777) (N, S, Si, Sa)

Clytie Hübner, [1823]

Clytie illunaris (Hübner, [1813]) (N, S, Si, Sa)

Dysgonia Hübner, [1823]

Dysgonia algira (Linné, 1767) (N, S, Si, Sa)
Dysgonia torrida (Guenée, 1852) (S, Si)

Grammodes Guenée, 1852

Grammodes bifasciata (Petagna, 1787) (N, S, Si, Sa)

Prodotis John, 1910

Prodotis stolidia (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa)

Drasteria Hübner, 1818

Drasteria cailino (Lefebvre, 1827) (N, S, Si)

Lygephila Billberg, 1820

Lygephila cracca ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)
Lygephila ludicra (Hübner [1790]) (N)
Lygephila lusoria (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)
Lygephila pastinum (Treitschke, 1826) (N, S)
Lygephila procax (Hübner, [1813]) (N, S, Si, Sa)
Lygephila viciae (Hübner, [1822]) (N, S, Si?, Sa)

Tathorhynchus Hampson, 1894

Tathorhynchus exsiccata (Lederer, 1855) (S, Si, Sa)

Apopestes Hübner, [1823]

Apopestes spectrum (Esper, [1787]) (N, S, Si, Sa)

Autophila (Autophila) Hübner, [1823]

Autophila (Autophila) dilucida (Hübner, [1808]) (N, S, Si, Sa)
Autophila (Autophila) hirsuta (Staudinger, 1870) (N)
Autophila (Autophila) limbata (Staudinger, 1871) (N?, S, Si)
Autophila (Autophila) rosea (Staudinger, 1888) (Si)

Autophila (Cheirophanes) Boursin, 1955

Autophila (Cheirophanes) cataphanes (Hübner, [1813]) (N, S, Si)

Exophila Guenée, 1841

Exophila rectangularis (Geyer, [1828]) (N)

Catephia Ochsenheimer, 1816

Catephia alchymista ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)

Aedia Hübner, [1823]

Aedia funesta (Esper, [1766]) (N, S)
Aedia leucomelas (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)

Tyta Billberg, 1820

Tyta luctuosa ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)

Callistege Hübner, [1823]

Callistege mi (Clerck, 1759) (N, S, Si)

Euclidia Ochsenheimer, 1816

Euclidia glyphica (Linné, 1758) (N, S, Si)

Gonospileia Hübner, [1823]

Gonospileia triquetra ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N)

Laspeyria Germar, 1810

Laspeyria flexula ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)

Zethes Rambur, 1833

Zethes insularis Rambur, 1833 (S, Si, Sa)

Eutelia Hübner, [1823]

Eutelia adulatrix (Hübner, [1813]) (N, S, Si, Sa)

Meganola Dyar, 1898

Meganola albula ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)

Meganola strigula ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si)

Meganola togetulalis (Hübner [1796]) (N, S, Si, Sa)

Nola Leach, [1815]

Nola aerugula (Hübner [1793]) (N, S, Si)

Nola chlamitulalis (Hübner, [1813]) (N, S, Si, Sa)

Nola cicatricalis (Treitschke, 1835) (N, S, Sa)

Nola confusalis (Herrich-Schäffer, 1847) (N, S, Si, Sa)

Nola cristatula (Hübner [1793]) (N, S, Sa)

Nola cucullatella (Linné, 1758) (N, S, Si)

Nola squalida Staudinger, 1871 (S, Si, Sa)

Nola subchlamydula Staudinger, 1871 (N, S, Sa)

Nola thymula Millière, 1867 (N)

Nycteola Hübner, 1822

Nycteola asiatica (Krulikowsky, 1904) (N, S, Sa)

Nycteola columbana (Turner, 1925) (N, S, Si, Sa)

Nycteola degenerana (Hübner, [1799]) (N, S, Si?, Sa?)

Nycteola revayana (Scopoli, 1772) (N, S, Si, Sa)

Nycteola siculana (Fuchs, 1899) (N, S, Si)

Earias Hübner, [1825]

Earias albovenosana Oberthür, 1917 (Si)
Earias clorana (Linné, 1761) (N, S, Si, Sa)
Earias insulana (Boisduval, 1833) (S, Si)
Earias vernana (Fabricius, 1787) (N, S, Si)

Bena Billberg, 1820

Bena prasinana (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)

Pseudoips Hübner, 1821

Pseudoips fagana (Fabricius, 1781) (N, S, Si, Sa)

Xanthodes Guenée, 1852

Xanthodes albago (Fabricius, 1794) (N, S, Si, Sa)

Panthea Hübner, [1820]

Panthea coenobita (Esper, 1785) (N)

Trichosea Grote, 1875

Trichosea ludifica (Linné, 1758) (N)

Colocasias Ochsenheimer, 1816

Colocasias coryli (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)

Diloba Boisduval, 1840

Diloba caeruleocephala (Linné, 1758) (N, S, Si)

Oxicesta Hübner, [1819]

Oxicesta geographica (Fabricius, 1787) (N)
Oxicesta nervosa (de Villers, 1789) (N)

Moma Hübner, [1820]

Moma alpium (Osbeck, 1778) (N, S)

Acronicta (Acronicta) Ochsenheimer, 1816

Acronicta (Acronicta) aceris (Linné, 1758) (N, S, Si)
Acronicta (Acronicta) leporina (Linné, 1758) (N, S)

***Acronicta (Triaena)* Hübner, 1818**

- Acronicta (Triaena) alni* (Linné, 1767) (N, S)
- Acronicta (Triaena) cuspis* (Hübner, [1813]) (N, S, Si, Sa)
- Acronicta (Triaena) psi* (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)
- Acronicta (Triaena) tridens* ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Sa)

***Acronicta (Subacronicta)* Kozhantshikov, 1950**

- Acronicta (Subacronicta) megacephala* ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si)

***Acronicta (Hyboma)* Hübner, [1820]**

- Acronicta (Hyboma) strigosa* ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N)

***Acronicta (Viminia)* Chapman, 1890**

- Acronicta (Viminia) auricoma* ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)
- Acronicta (Viminia) euphorbiae* ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)
- Acronicta (Viminia) menyanthidis* (Esper, [1789]) (N)
- Acronicta (Viminia) rumicis* (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)

***Craniophora* Snellen, 1867**

- Craniophora ligustri* ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)
- Craniophora pontica* (Staudinger, 1879) (S)

***Simyra* Ochsenheimer, 1816**

- Simyra albovenosa* (Goeze, 1781) (N, S, Si)
- Simyra nervosa* ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, Si)

***Cryphia (Cryphia)* Hübner, 1818**

- Cryphia (Cryphia) algae* (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa)
- Cryphia (Cryphia) fraudatricula* (Hübner, [1803]) (N, S)
- Cryphia (Cryphia) ochsi* Boursin, 1940 (N, S, Si, Sa)
- Cryphia (Cryphia) pallida* (Bethune-Baker, 1894) (N?, S, Sa)
- Cryphia (Cryphia) receptricula* (Hübner, [1803]) (N, S, Si)
- Cryphia (Cryphia) simulatricula* (Guenée, 1852) (N)

***Cryphia (Bryoleuca)* Hampson, 1908**

- Cryphia (Bryoleuca) ereptripula* (Treitschke, 1825) (N, S, Si?)
- Cryphia (Bryoleuca) raptricula* ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)
- Cryphia (Bryoleuca) rectilinea/ravula* (Warren, 1909) / (Hübner, [1813]) (N, S, Si, Sa) (*)
- Cryphia (Bryoleuca) petricolor* (Lederer, 1870) (N, S)

Cryphia (Bryoleuca) vandalusiae (Duponchel, 1842) (N, Sa?)

Cryphia (Bryophila) Treitschke, 1825

Cryphia (Bryophila) domestica (Hufnagel, 1766) (N, S, Si, Sa)

Cryphia (Bryopsis) Boursin, 1970

Cryphia (Bryopsis) muralis (Forster, 1771) (N, S, Si, Sa)

Bryonycta Boursin, 1955

Bryonycta pineti (Staudinger, 1859) (N)

Zebeeba Kirby, 1892

Zebeeba falsalis (Herrich-Schäffer, 1839) (N, S, Si, Sa)

Emmelia Hübner, [1821]

Emmelia trabealis (Scopoli, 1763) (N, S, Si, Sa)

Acontia Ochsenheimer, 1816

Acontia lucida (Hufnagel, 1766) (N, S, Si, Sa)

Acontia urania Frivaldsky, 1835 (Si?)

Pseudozarba Warren, 1914

Pseudozarba bipartita (Herrich-Schäffer, 1850) (S, Si, Sa)

Ozarba Walker, 1865

Ozarba moldavicola (Herrich-Schäffer, 1851) (S)

Phyllophila Guenée, 1852

Phyllophila oblitterata (Rambur, 1833) (N, S)

Protodeltote Ueda, 1984

Protodeltote pygarga (Hufnagel, 1766) (N, S, Si, Sa)

Deltote Reichenbach, 1817

Deltote bankiana (Fabricius, 1775) (N, S)

Deltote deceptor (Scopoli, 1763) (N, S?)

Deltote uncula (Clerck, 1759) (N, S)

Alvaradoia Agenjo, [1984]

Alvaradoia numerica (Boisduval, 1840) (Sa)

Coccidiphaga Spuler, 1907

Coccidiphaga scitula (Rambur, 1833) (S, Si, Sa)

Odice Hübner, [1823]

Odice arcuinna (Hübner [1790]) (N, S)

Odice jucunda (Hübner, [1813]) (N, S?)

Odice suava (Hübner, [1813]) (N, S, Si, Sa)

Calymma Hübner, [1823]

Calymma communimacula ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)

Eublemma Hübner, [1821]

Eublemma candidana (Fabricius, 1794) (N, S, Si, Sa)

Eublemma caprearum (Draudt, 1933) (S) (E) (*)

Eublemma elychrysi (Rambur, 1833) (N, S, Si, Sa)

Eublemma minutata (Fabricius, 1794) (N)

Eublemma ostrina (Hübner, [1808]) (N, S, Si, Sa)

Eublemma parva (Hübner, [1808]) (N, S, Si, Sa)

Eublemma porphyria (Freyer, 1845) (S?, Si?) (*)

Eublemma pura (Hübner, [1813]) (N, S?)

Eublemma purpurina ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si)

Eublemma respersa (Hübner [1790]) (N, S, Si, Sa)

Eublemma rosina (Hübner, [1803]) (N, S)

Eublemma viridula (Guenée, 1841) (N, S, Si, Sa)

Glossodice Berio, 1991

Glossodice polygramma (Duponchel, [1842]) (N, S)

Honeyania Berio, 1989

Honeyania ragusana (Freyer, 1844) (S, Si, Sa)

Rhypagla Nye, 1975

Rhypagla lacernaria (Hübner, [1813]) (N, S?)

Metachrostis Hübner, [1820]

Metachrostis dardouini (Boisduval, 1840) (N, S, Si)
Metachrostis velocior (Staudinger, 1892) (Si)
Metachrostis velox (Hübner, [1813]) (N, S, Si, Sa)

Abrostola Ochsenheimer, 1816

Abrostola agnorista Dufay, 1956 (N, S, Si)
Abrostola asclepiadis ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)
Abrostola trigemina (Wernerburg, 1864) (N, S, Si, Sa)
Abrostola triplasia (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)

Chrysodeixis Hübner, [1821]

Chrysodeixis chalcites (Esper, [1789]) (N, S, Si, Sa)

Trichoplusia McDunnough, 1944

Trichoplusia circumscripta (Freyer, 1831) (S, Si, Sa)
Trichoplusia ni (Hübner, [1803]) (N, S, Si, Sa)

Thysanoplusia Ichinosé, 1973

Thysanoplusia orichalcea (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa)

Daubeplusia Beck, 1991

Daubeplusia daubei (Boisduval, 1840) (N, S, Si, Sa)

Ctenoplusia Dufay, 1970

Ctenoplusia accentifera (Lefebvre, 1827) (N, S, Si, Sa)

Polychrysia Hübner, [1821]

Polychrysia moneta (Fabricius, 1787) (N, S?)

Panchrysia Hübner, [1821]

Panchrysia aurea (Hübner, [1803]) (N, S, Si)

Tetrargentia Beck, 1991

Tetrargentia v-argenteum (Esper, [1798]) (N)

Euchalcia Hübner, [1821]

Euchalcia bellieri (Kirby, 1900) (N)
Euchalcia italica (Staudinger, 1882) (N?, S) (E) (*)

Euchalcia modestoides Poole, 1989 (N, S)
Euchalcia siderifera (Eversmann, 1846) (S?) (*)
Euchalcia variabilis (Piller, 1783) (N, S)

Plusidia Butler, 1879

Plusidia cheiranthi (Tauscher, 1809) (N, S)

Lamprotes Reichenbach, 1817

Lamprotes c-aureum (Knoch, 1781) (N, S)

Diachrysia Hübner, [1821]

Diachrysia chrysitis (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)
Diachrysia chryson (Esper, [1789]) (N, S)
Diachrysia nadeja (Oberthür, 1880) (N, Si?)
Diachrysia tutti (Kostrowicki, 1961) (N?, S)
Diachrysia zosimi (Hübner, [1822]) (N) (M)

Macdunnoughia Kostrowicki, 1961

Macdunnoughia confusa (Stephens, 1850) (N, S, Si)

Autographa Hübner, [1821]

Autographa aemula ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N)
Autographa bractea ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)
Autographa gamma (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa) (*)
Autographa jota (Linné, 1758) (N, S, Sa)
Autographa pulchrina (Haworth, 1809) (N, S, Sa)

Cornutiplusia Kostrowicki, 1961

Cornutiplusia circumflexa (Linné, 1767) (S, Si)

Plusia Ochsenheimer, 1816

Plusia festucae (Linné, 1758) (N, S, Sa)
Plusia putnami (Grote, 1873) (N)

Syngrapha Hübner, [1821]

Syngrapha ain (Hochenwarth, 1785) (N)
Syngrapha devergens (Hübner, [1813]) (N)
Syngrapha hochenwarthi (Hochenwarth, 1785) (N)
Syngrapha interrogationis (Linné, 1758) (N, S)

Cucullia Schrank, 1802

Cucullia absynthii (Linné, 1761) (N, S)
Cucullia argentea (Hufnagel, 1766) (N)
Cucullia artemisiae (Hufnagel, 1766) (N, S)
Cucullia asteris ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N)
Cucullia blattariae (Esper, [1790]) (N, S, Si?) (*)
Cucullia calendulae Treitschke, 1835 (N, S, Si, Sa)
Cucullia campanulae Freyer, 1831 (N, S, Si?)
Cucullia caninae Rambur, 1833 (N, S, Si, Sa) (*)
Cucullia cemenelensis Boursin, 1923 (N)
Cucullia chamomillae ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)
Cucullia cineracea Freyer, 1842 (N)
Cucullia dracunculi (Hübner, [1813]) (N, S?, Si)
Cucullia formosa Rogenhofer, 1860 (N, S)
Cucullia gnaphalii (Hübner, [1813]) (N, S)
Cucullia hartigi Ronkay & Ronkay, 1987 (Sa) (E)
Cucullia lactucae ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si?, Sa?)
Cucullia lucifuga ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Sa)
Cucullia lychnitis Rambur, 1833 (N, S, Si, Sa)
Cucullia mixta Freyer, 1842 (N?, S?)
Cucullia prenanthis Boisduval, 1850 (N, S)
Cucullia santolinae Rambur, 1834 (N, S, Si, Sa?)
Cucullia santonici (Hübner, [1813]) (N, S)
Cucullia scrophulariae ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)
Cucullia scrophulariphaga Rambur, 1833 (Si?, Sa)
Cucullia tanacetii ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)
Cucullia thapsiphaga Treitschke, 1826 (N, S, Si, Sa)
Cucullia umbratica (Linné, 1758) (N, S, Si)
Cucullia verbasci (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)
Cucullia xeranthemi Boisduval, 1840 (N, S)

Calophasia Stephens, 1829

Calophasia almoravida de Graslin, 1863 (Si, Sa)
Calophasia hamifera Staudinger, 1863 (Si?)
Calophasia lunula (Hufnagel, 1766) (N, S, Si)
Calophasia opalina (Esper, [1794]) (N, S, Sa)
Calophasia platyptera (Esper, [1788]) (N, S, Si, Sa)

Omphalophana Hampson, 1906

Omphalophana anatolica (Lederer, 1857) (S, Si, Sa)
Omphalophana antirrhinii (Hübner, [1803]) (N, S, Si)
Omphalophana serrata (Treitschke, 1835) (S, Si, Sa)

Sympistis Hübner, [1823]

Sympistis funebris (Hübner, [1809]) (N)
Sympistis nigrita (Boisduval, 1840) (N)

Calliergis Hübner, [1821]

Calliergis ramosa (Esper, [1786]) (N, S)

Copiphana Hampson, 1906

Copiphana olivina (Herrich-Schäffer, 1852) (N, S)

Cleonymia Berio, 1966

Cleonymia baetica (Rambur, [1837]) (Si, Sa)

Serryvania Berio, 1980

Serryvania yvanii (Duponchel, 1833) (N)

Amephana Hampson, 1906

Amephana anarrhini (Duponchel, 1840) (N, Sa)

Trigonephra Berio, 1980

Trigonephra aurita (Fabricius, 1787) (N, S, Si, Sa)
Trigonephra dalmatica (Rebel, 1919) (Sa?)

Omia Hübner, [1821]

Omia banghaasi Stauder, 1930 (S) (*)
Omia cyclopea (de Graslin, 1837) (N, S)
Omia cymbalariae (Hübner, [1809]) (N, S)

Metopoceras (Metopoceras) Guenée, 1850

Metopoceras (Metopoceras) omar (Oberthür, 1887) (S, Si)

Metopoceras (Tritomoceras) Berio, 1980

Metopoceras (Tritomoceras) khalildja Oberthür, 1884 (Si)

Lamprosticta Hübner, [1820]

Lamprosticta culta ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)

Pyrois Hübner, [1820]

Pyrois cinnamomea (Goeze, 1781) (N, S, Sa)

Adpyramidcampa Beck, 1991

Adpyramidcampa effusa (Boisduval, [1828]) (N, S, Si, Sa)

Amphipyra Ochsenheimer, 1816

Amphipyra berbera Rungs, 1949 (N, S, Si?, Sa)

Amphipyra livida ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)

Amphipyra perflua (Fabricius, 1787) (N)

Amphipyra pyramidea (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)

Amphipyra tetra (Fabricius, 1787) (N, S, Si)

Amphipyra tragopoginis (Clerck, 1759) (N, S, Si, Sa)

Schinia Hübner, [1818]

Schinia cardui (Hübner [1790]) (N, S)

Schinia cognata (Freyer, 1833) (N?)

Schinia scutosa ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)

Heliothis Ochsenheimer, 1816

Heliothis incarnata Freyer, 1838 (N)

Heliothis maritima de Graslin, 1855 (N, Si?)

Heliothis nubigera Herrich-Schäffer, 1851 (N, S, Si, Sa)

Heliothis ononis ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S?, Si?)

Heliothis peltigera ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)

Heliothis viriplaca (Hufnagel, 1766) (N, S, Si)

Helicoverpa Hardwick, 1965

Helicoverpa armigera (Hübner, [1808]) (N, S, Si, Sa)

Pyrrhia Hübner, [1821]

Pyrrhia umbra (Hufnagel, 1766) (N, S, Si, Sa)

Periphanes (Hübner, [1821])

Periphanes delphinii (Linné, 1758) (N)

Panemeria Hübner, [1823]

Panemeria tenebrata (Scopoli, 1763) (N, S, Si)

Aegle Hübner, [1823]

Aegle agatha (Staudinger, 1861) (S)
Aegle kaekeritziana (Hübner, [1799]) (S, Si)
Aegle vespertalis Hübner, [1813] (N, S, Si, Sa)

Synthymia Hübner, [1823]

Synthymia fixa (Fabricius, 1787) (N, S, Si, Sa)

Pseudeustrotia Warren, 1913

Pseudeustrotia candidula ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)

Elaphria Hübner, [1818]

Elaphria venustula (Hübner [1790]) (N, S, Si?)

Haemerosia Boisduval, 1840

Haemerosia renalis (Hübner, [1813]) (N, S, Si)

Acosmetia Stephens, 1829

Acosmetia caliginosa (Hübner, [1813]) (N)

Stilbia Stephens, 1829

Stilbia anomala (Haworth, 1812) (S?)
Stilbia calberlae (Failla-Tedaldi, 1890) (Si)
Stilbia faillae Püngeler, 1891 (N, S, Si)

Epimecia Guenée, 1839

Epimecia ustula (Freyer, 1835) (N, S)

Caradrina Ochsenheimer, 1816

Caradrina morpheus (Hufnagel, 1766) (N, S, Si)

Platyperigea J.B. Smith, 1894

Platyperigea albina (Eversmann, 1848) (N, S) (*)
Platyperigea aspersa (Rambur, 1834) (N, S, Si, Sa)
Platyperigea germainii (Duponchel, 1835) (Si, Sa)
Platyperigea grisea (Eversmann, 1848) (N)
Platyperigea ingrata (Staudinger, 1897) (Si?)
Platyperigea kadenii (Freyer, 1836) (N, S, Si?, Sa)
Platyperigea montana (Bremer, 1861) (N, S) (*)
Platyperigea proxima (Rambur, [1837]) (Si)

Platyperigea terrea (Freyer, 1840) (N, Si, Sa)

Paradrina Boursin, 1937

Paradrina clavipalpis (Scopoli, 1763) (N, S, Si, Sa)

Paradrina flavirena (Guenée, 1852) (N, S, Si, Sa)

Paradrina fuscicornis (Rambur, 1832) (Sa)

Paradrina noctivaga (Bellier, 1863) (N, S, Si, Sa)

Paradrina selini (Boisduval, 1840) (N, S, Si, Sa)

Paradrina wulfschlegeli (Püngeler, 1903) (N)

Eremodrina Boursin, 1937

Eremodrina gilva (Donzel, 1837) (N, S)

Eremodrina vicina (Staudinger, 1870) (N, S)

Hoplodrina Boursin, 1937

Hoplodrina ambigua ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)

Hoplodrina blanda ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)

Hoplodrina octogenaria (Goeze, 1781) (N, S, Si, Sa)

Hoplodrina respersa ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si)

Hoplodrina superstes (Ochsenheimer, 1816) (N, S, Si)

Atypha Hübner, [1821]

Atypha pulmonaris (Esper, [1790]) (N, S, Si)

Spodoptera Guenée, 1852

Spodoptera cilium (Guenée, 1852) (S, Si, Sa?)

Spodoptera exigua (Hübner, [1808]) (N, S, Si, Sa)

Spodoptera littoralis (Boisduval, 1833) (N, S, Si, Sa)

Spodoptera ornithogalli (Guenée, 1852) (S) (*)

Sesamia Guenée, 1852

Sesamia cretica Lederer, 1857 (N, S, Si, Sa)

Sesamia nonagrioides (Lefebvre, 1827) (N, S, Si, Sa)

Pseudoxestia Boursin, 1953

Pseudoxestia apfelbecki (Rebel, 1901) (S, Si)

Chilodes Herrich-Schäffer, [1849]

Chilodes maritima (Tauscher, 1806) (N, S)

Athetis Hübner, [1821]

Athetis furvula (Hübner, [1808]) (N)

Athetis gluteosa (Treitschke, 1835) (N, S)

Athetis lepigone (Möschler, 1860) (N?) (*)

Hydrillula Tams, 1938

Hydrillula pallustris (Hübner, [1808]) (N, S)

Proxenus Herrich-Schäffer, 1850

Proxenus hospes (Freyer, 1831) (N, S, Si, Sa)

Dypterygia Stephens, 1829

Dypterygia scabriuscula (Linné, 1758) (N, S, Si)

Rusina Stephens, 1829

Rusina tristis (Retzius, 1783) (N, S, Si, Sa)

Anthracia Hübner, [1823]

Anthracia ephialtes (Hübner, [1822]) (S, Si, Sa)

Mormo Ochsenheimer, 1816

Mormo maura (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)

Polyphaenis Boisduval, 1840

Polyphaenis viridis (de Villers, 1789) (N, S, Si)

Polyphaenis xanthochloris Boisduval, 1840 (S, Si)

Thalpophila Hübner, [1820]

Thalpophila matura (Hufnagel, 1766) (N, S, Sa) (*)

Thalpophila vitalba (Freyer, 1834) (S, Si) (*)

Trachea Ochsenheimer, 1816

Trachea atriplicis (Linné, 1758) (N, S, Si)

Euplexia Stephens, 1829

Euplexia lucipara (Linné, 1758) (N, S, Si)

Phlogophora Treitschke, 1825

Phlogophora meticulosa (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa) (*)

Phlogophora scita (Hübner [1790]) (N)

Hyppa Duponchel, [1845]

Hyppa rectilinea (Esper, [1788]) (N)

Auchmis Hübner, [1821]

Auchmis detersa (Esper, [1787]) (N, S, Si)

Actinotia Hübner, [1821]

Actinotia polyodon (Clerck, 1759) (N)

Actinotia radiosa (Esper, [1804]) (N, S)

Cloantha Boisduval, Rambur & de Graslin, [1836]

Cloantha hyperici ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)

Calloplistria Hübner, [1821]

Calloplistria juvenina (Stoll, 1782) (N, S, Si, Sa)

Calloplistria latreillei (Duponchel, 1827) (N, S, Si, Sa)

Platysenta Grote, 1874

Platysenta viscosa (Freyer, 1831) (S, Si) (*)

Eucarta Lederer, 1857

Eucarta amethystina (Hübner, [1803]) (N, S)

Eucarta virgo (Treitschke, 1835) (N, S)

Ipimorpha Hübner, [1821]

Ipimorpha retusa (Linné, 1761) (N, S)

Ipimorpha subtusa ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)

Enargia Hübner, [1821]

Enargia abluta (Hübner, [1808]) (N)

Enargia paleacea (Esper, [1788]) (N, S?)

Parastichtis Hübner, [1821]

Parastichtis suspecta (Hübner, [1817]) (N, S)

Fissipunctia Beck, 1991

Fissipunctia ypsilon ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)

Mesogona Boisduval, 1840

Mesogona acetosellae ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si)

Mesogona oxalina (Hübner, [1803]) (N, S) (*)

Dicycla Guenée, 1852

Dicycla oo (Linné, 1758) (N, S, Si)

Cosmia (Cosmia) Ochsenheimer, 1816

Cosmia (Cosmia) affinis (Linné, 1767) (N, S)

Cosmia (Cosmia) confinis Herrich-Schäffer, [1849] (N)

Cosmia (Cosmia) diffinis (Linné, 1767) (N, S)

Cosmia (Cosmia) pyralina ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)

Cosmia (Calymnia) Hübner, [1821]

Cosmia (Calymnia) trapezina (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)

Atethmia Hübner, [1821]

Atethmia ambusta ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)

Atethmia centrargo (Haworth, 1809) (N)

Xanthia (Xanthia) Ochsenheimer, 1816

Xanthia (Xanthia) togata (Esper, [1788]) (N, S)

Xanthia (Cirrhia) Hübner, [1821]

Xanthia (Cirrhia) aurago ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si)

Xanthia (Cirrhia) citrargo (Linné, 1758) (N, S)

Xanthia (Cirrhia) cypreago (Hampson, 1906) (S, Si)

Xanthia (Cirrhia) gilvago ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)

Xanthia (Cirrhia) ictertia (Hufnagel, 1766) (N, S)

Xanthia (Cirrhia) ocellaris (Borkhausen, 1792) (N, S, Si)

Xanthia (Cirrhia) sulphurago ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si)

Agrochola (Agrochola) Hübner, [1821]

Agrochola (Agrochola) lychnidis ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)

Agrochola (Sunira) Franclemont, 1950

Agrochola (Sunira) circellaris (Hufnagel, 1766) (N, S, Sa)

Agrochola (Frivaldskyola) Ronkay, 1984

Agrochola (Frivaldskyola) mansueta (Herrich-Schäffer, 1850) (Si?)

Agrochola (Leptologia) Prout, 1901

Agrochola (Leptologia) lota (Clerck, 1759) (N, S, Sa)

Agrochola (Leptologia) blidaensis (Stertz, 1915) (S, Si, Sa)

Agrochola (Leptologia) macilenta (Hübner, [1809]) (N, S, Si)

Agrochola (Haemachola) Beck, 1991

Agrochola (Haemachola) haematidea (Duponchel, 1827) (N, S, Sa)

Agrochola (Anchoscelis) Guenée, 1839

Agrochola (Anchoscelis) helvola (Linné, 1758) (N, S, Si)

Agrochola (Anchoscelis) humilis ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)

Agrochola (Anchoscelis) nitida/pistacinoides ([Denis & Schiffermüller] 1775)/ (d'Aubuisson, 1867) (N, S, Si) (*)

Agrochola (Anchoscelis) orejoni Agenjo, 1951 (S)

Agrochola (Anchoscelis) prolai Berio, 1976 (S) (E)

Agrochola (Anchoscelis) wolfschlaegeri Boursin, 1953 (Si) (*)

Agrochola (Agrolitha) Berio, 1980

Agrochola (Agrolitha) litura (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)

Agrochola (Agrolitha) meridionalis (Staudinger, 1871) (N, S?, Si?)

Propenistra Berio, 1980

Propenistra laevis (Hübner, [1803]) (N, S?, Si?)

Omphaloscelis Hampson, 1906

Omphaloscelis lunosa (Haworth, 1809) (N)

Spudaea Snellen, 1867

Spudaea ruticilla (Esper, [1791]) (N, S, Si, Sa)

Eupsilia Hübner, [1821]

Eupsilia transversa (Hufnagel, 1766) (N, S, Sa)

Jodia Hübner, 1818

Jodia croceago ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)

Conistra (Conistra) Hübner, [1821]

Conistra (Conistra) intricata (Boisduval, 1829) (N?, Sa)

Conistra (Conistra) ligula (Esper, [1791]) (N, S, Si?) (*)

Conistra (Conistra) rubiginosa (Scopoli, 1763) (N, S, Si, Sa)

Conistra (Conistra) vaccinii (Linné, 1761) (N, S, Si)

Conistra (Conistra) veronicae (Hübner, [1813]) (N, S, Si)

Conistra (Peperina) Hreblay, 1992

Conistra (Peperina) torrida (Lederer, 1857) (N, S, Si) (*)

Conistra (Dasycampa) Guenée, 1837

Conistra (Dasycampa) erythrocephala ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)

Conistra (Dasycampa) rubiginea ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)

Conistra (Dasycampa) staudingeri (de Graslin, 1863) (N)

Conistra (Orrhodiella) Spuler, 1907

Conistra (Orrhodiella) ragusae (Failla-Tedaldi, 1890) (S, Si)

Orbona Hübner, [1821]

Orbona fragariae (Vieweg, 1790) (N, S)

Episema Ochsenheimer, 1816

Episema glaucina (Esper, 1789) (N, S, Si, Sa)

Episema grueneri Boisduval, [1837] (N?, S?, Si, Sa?)

Episema tersa ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N?, S, Si, Sa?)

Cleoceris Boisduval, [1836]

Cleoceris scoriacea (Esper, [1789]) (N, S)

Leucochlaena Hampson, 1906

Leucochlaena hispida (Geyer, [1832]) (N, S, Si, Sa)

Leucochlaena oditis (Hübner, [1822]) (N, S, Si, Sa)

Leucochlaena seposita (Turati, 1921) (S, Si)

Leucochlaena turatii (Schawerda, 1931) (Sa)

Ulochlaena Lederer, 1857

Ulochlaena hirta (Hübner [1813]) (N?, S, Si)

Brachionycha Hübner, [1819]

Brachionycha nubeculosa (Esper, 1785) (N)

Brachionycha sphinx (Hufnagel, 1766) (N, S)

Dasypolia Guenée, 1852

Dasypolia ferdinandi Rühl, 1892 (N)

Dasypolia templi (Thunberg, 1792) (N, S, Si)

Brachylomia Hampson, 1906

Brachylomia viminalis (Fabricius, 1777) (N, S)

Aporophyla Guenée, 1841

Aporophyla australis (Boisduval, 1829) (N, S, Si, Sa)

Aporophyla canescens (Duponchel, 1826) (N, S, Si, Sa)

Aporophyla chioleuca (Herrich-Schäffer, 1850) (S?, Si, Sa)

Aporophyla lueneburgensis (Freyer, 1848) (S?, Si?) (*)

Aporophyla lutulenta ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)

Aporophyla nigra (Haworth, 1809) (N, S, Si, Sa)

Lithomoia Hübner, [1821]

Lithomoia solidaginis (Hübner, [1803]) (N)

Litophane (Litophane) Hübner, [1821]

Litophane (Litophane) consocia (Borkhausen, 1792) (N, Si?)

Litophane (Litophane) furcifera (Hufnagel, 1766) (N, S)

Litophane (Litophane) hepatica (Clerck, 1759) (N, S)

Litophane (Litophane) ornitopus (Hufnagel, 1766) (N, S, Si, Sa)

Litophane (Litophane) semibrunnea (Haworth, 1809) (N, S, Si, Sa)

Litophane (Prolitha) Berio, 1980

Litophane (Prolitha) lapidea (Hübner, [1808]) (N, S)

Litophane (Prolitha) leautieri (Boisduval, [1829]) (N, Sa)

Litophane (Prolitha) merckii (Rambur, 1832) (N, S, Sa)

Scotochrosta Lederer, 1857

Scotochrosta pulla ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si)

Xylena Ochsenheimer, 1816

Xylena exsoleta (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)

Xylena vetusta (Hübner, [1813]) (N, S, Sa)

Evisa Reisser, 1930

Evisa schawerdae Reisser, 1930 (Sa)

Xylocampa Guenée, 1837

Xylocampa areola (Esper, [1789]) (N, S, Sa)

Xylocampa mustapha (Oberthür, 1920) (S, Si)

Meganephria Hübner, [1821]

Meganephria bimaculosa (Linné, 1767) (N, S)

Allophyes Tams, 1942

Allophyes corsica (Spuler, 1905) (S, Si, Sa)

Allophyes oxyacanthae (Linné, 1758) (N, S)

Rileyiana Moucha & Chvala, 1963

Rileyiana fovea (Treitschke, 1825) (N, S, Si?)

Valeria Stephens, 1829

Valeria jaspidea (de Villers, 1789) (N)

Valeria oleagina ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)

Dryobota Lederer, 1857

Dryobota labecula (Esper, [1788]) (N, S, Si, Sa)

Griposia Tams, 1939

Griposia aprilina (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa) (*)

Dichonia Hübner, [1821]

Dichonia aeruginea (Hübner, [1808]) (N, S, Si)

Dichonia convergens ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si)

Dryobotodes (Dryobotodes) Warren, 1911

Dryobotodes (Dryobotodes) carbonis (F. Wagner, 1931) (N, S, Si, Sa) (*)
Dryobotodes (Dryobotodes) eremita (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa)
Dryobotodes (Dryobotodes) monochroma (Esper, [1790]) (N, S, Si, Sa)
Dryobotodes (Dryobotodes) servadeii Parenzan, 1982 (S, Sa?)

***Dryobotodes (Dichonioxa)* Berio, 1980**

Dryobotodes (Dichonioxa) tenebrosa (Esper, [1813]) (N, S, Si, Sa)

***Antitype* Hübner, [1821]**

Antitype chi (Linné, 1758) (N, S, Si)
Antitype jonis (Lederer, 1865) (N?, S)
Antitype suda (Geyer, [1832]) (N, S)

***Ammoconia* Lederer, 1857**

Ammoconia caecimacula ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si)
Ammoconia senex (Geyer, [1828]) (N, S, Si)

***Ammopolia* Boursin, 1955**

Ammopolia witzenmanni (Standfuss, 1890) (S, Sa)

***Trigonophora* Hübner, [1821]**

Trigonophora flammea (Esper, [1785]) (N, S, Si, Sa)

***Polymixis (Polymixis)* Hübner, [1820]**

Polymixis (Polymixis) polymita (Linné, 1761) (N, S, Si)
Polymixis (Polymixis) xanthomista (Hübner, [1819]) (N, S, Si, Sa?)

***Polymixis (Serpmixis)* Beck, 1991**

Polymixis (Serpmixis) serpentina (Treitschke, 1825) (N, S)

***Polymixis (Propolymixis)* Berio, 1980**

Polymixis (Propolymixis) argillaceago (Hübner, [1822]) (N, S)

***Polymixis (Myxinia)* Berio, 1985**

Polymixis (Myxinia) flavicincta ([Denis & Schiffermüller], 1775) (S, Sa) (*)
Polymixis (Myxinia) rufocincta (Geyer, [1828]) (N, S, Si, Sa)
Polymixis (Myxinia) sublutea (Turati, 1909) (Si) (*)

Polymixis (Simplitype) Berio, 1980

Polymixis (Simplitype) dubia (Duponchel, [1836]) (N, S?, Si?)

Polymixis (Crypsedra) Warren, 1911

Polymixis (Crypsedra) gemmea (Treitschke, 1825) (N, S?) (*)

Polymixis (Eumichtis) Hübner, [1821]

Polymixis (Eumichtis) lichenea (Hübner, [1813]) (N, S, Si, Sa)

Blepharita Hampson, 1907

Blepharita satura ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Sa)

Mniotype Franclemont, 1941

Mniotype adusta (Esper, [1790]) (N, S, Sa)

Mniotype anilis (Boisduval, 1840) (N, S, Sa)

Mniotype solieri (Boisduval, 1840) (N, S, Si)

Mniotype spinosa (Chrétien, 1910) (S, Sa)

Mniotype sp. (S) (E) (*)

Apamea Ochsenheimer, 1816

Apamea anceps ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)

Apamea aquila Donzel, 1837 (N)

Apamea arabs (Oberthür, 1881) (Si) (*)

Apamea crenata (Hufnagel, 1766) (N, S)

Apamea epomidion (Haworth, 1809) (N, S, Sa)

Apamea furva ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Sa)

Apamea illyria Freyer, 1846 (N, S)

Apamea lateritia (Hufnagel, 1766) (N, S)

Apamea lithoxylaea ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)

Apamea maillardi (Geyer, [1834]) (N, S)

Apamea monoglypha (Hufnagel, 1766) (N, S, Si, Sa)

Apamea oblonga (Haworth, 1809) (N, S)

Apamea ophiogramma (Esper, [1794]) (N, S)

Apamea platinea (Treitschke, 1825) (N, S, Si)

Apamea remissa (Hübner, [1809]) (N, S, Sa)

Apamea rubrirena (Treitschke, 1825) (N, S)

Apamea scolopacina (Esper, [1788]) (N, S)

Apamea sicala (Turati, 1909) (S, Si)

Apamea sordens (Hufnagel, 1766) (N, S)

Apamea sublustris (Esper, [1788]) (N, S)

Apamea unanims (Hübner, [1813]) (N, S?, Sa)

Apamea zeta (Treitschke, 1825) (N, S)

Eremobina McDunnough, 1937

Eremobina pabulatricula (Brahm, 1791) (N)

Oligia Hübner, [1821]

Oligia dubia (Heydemann, 1942) (N)

Oligia fasciuncula (Haworth, 1809) (S?)

Oligia latruncula ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si)

Oligia strigilis (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)

Oligia versicolor (Borkhausen, 1792) (N, S)

Mesoligia Boursin, 1965

Mesoligia furuncula ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si)

Mesoligia literosa (Haworth, 1809) (N, S, Si)

Mesapamea Heinicke, 1959

Mesapamea didyma (Esper, 1788) (N, S, Sa)

Mesapamea remmi Rezbanyai-Reser, 1985 (N?, S) (*)

Mesapamea secalis (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)

Photedes Lederer, 1857

Photedes captiuncula (Treitschke, 1825) (N, S)

Eremobia Stephens, 1829

Eremobia ochroleuca ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si)

Luperina Boisduval, 1829

Luperina dumerilii (Duponchel, 1835) (N, S, Si, Sa)

Luperina irritaria/sohnretheli (A. Bangh-Haas, 1912) / (Draudt, 1931) (N, S, Si) (*)

Luperina kruegeri Turati, 1912 (N?, Sa) (E) (*)

Luperina nickerlii (Freyer, 1845) (N, S, Si)

Luperina pozzii Curò, 1883 (N, S?)

Luperina rubella (Duponchel, 1835) (N, S)

Luperina samni (Sohn-Rethel, 1929) (S) (E) (*)

Luperina siegeli Berio, [1986] (Sa) (E) (*)

Luperina testacea ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si)

Luperina tiberina (Sohn-Rethel, 1929) (S) (E) (*)

Luperina zollikoferi (Freyer, 1836) (N)

Luperina sp. (S) (E) (*)

Rhizedra Warren, 1911

Rhizedra lutosa (Hübner, [1803]) (N, S, Sa)

Pseudohadena Alphéraky, 1889

Pseudohadena chenopodiphaga (Rambur, 1832) (N, S, Si)

Pseudohadena halimi (Millière, 1877) (N, Si?)

Amphipoea Billberg, 1820

Amphipoea fucosa (Freyer, 1830) (N)

Amphipoea oculatea (Linné, 1761) (N, S)

Hydraecia Guenée, 1841

Hydraecia micacea (Esper, [1789]) (N, S)

Hydraecia osseola (Staudinger, 1882) (N, S, Sa) (M)

Hydraecia petasitis Doubleday, 1847 (N, S)

Gortyna Ochsenheimer, 1816

Gortyna borelii Pierret, 1837 (N, S?)

Gortyna flavago ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)

Gortyna puengeleri (Turati, 1909) (N, S, Si, Sa) (*)

Gortyna xanthenes Germar, [1842] (S, Si, Sa)

Calamia Hübner, [1821]

Calamia tridens (Hufnagel, 1766) (N, S)

Staurophora Reichenbach, 1817

Staurophora celsia (Linné, 1758) (N)

Celaena Stephens, 1829

Celaena leucostigma (Hübner, [1808]) (N, S, Sa)

Brithys Hübner, [1821]

Brithys crini (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa)

Nonagria Ochsenheimer, 1816

Nonagria typhae (Thunberg, 1784) (N, S, Si, Sa)

Phragmatiphila Hampson, 1908

Phragmatiphila insularis (Turati, 1913) (Sa) (*)
Phragmatiphila nexa (Hübner, [1808]) (N, S, Sa?) (*)

Archanara Walker, 1866

Archanara algae (Esper, [1789]) (N, S)
Archanara dissoluta (Treitschke, 1825) (N, S)
Archanara geminipuncta (Haworth, 1809) (N, S, Sa)
Archanara neurica (Hübner, [1808]) (N, S)
Archanara sparganii (Esper, [1790]) (N, S, Si, Sa)

Arenostola Hampson, 1910

Arenostola semicana (Esper, [1798]) (N)

Chortodes Tutt, 1897

Chortodes fluxa (Hübner, [1809]) (N, Si?, Sa?)
Chortodes minima (Haworth, 1809) (N, S, Si, Sa)
Chortodes morrisii (Morris, 1837) (N?)
Chortodes pygmina (Haworth, 1809) (N, S, Si, Sa)
Chortodes sohnretheli (Püngeler, 1907) (N, S, Si)

Oria Hübner, [1821]

Oria musculosa (Hübner, [1808]) (N, S, Si, Sa)

Charanyca Billberg, 1820

Charanyca trigrammica (Hufnagel, 1766) (N, S, Si)

Coenobia Stephens, 1850

Coenobia rufa (Haworth, 1809) (N, S)

Discestra Hampson, 1905

Discestra dianthi (Tauscher, 1809) (S)
Discestra melanopa (Thunberg, 1791) (N, S?)
Discestra microdon (Guenée, 1852) (N, S, Si)
Discestra pugnax (Hübner, [1824]) (N, S)
Discestra sodae (Rambur, 1829) (N?, Sa)
Discestra stigmosa (Christoph, 1887) (N, S)
Discestra trifolii (Hufnagel, 1766) (N, S, Si, Sa)

Cardepia Hampson, 1905

Cardepia hartigi (Parenzan, 1981) (S) (M)

Cardepija sociabilis (de Graslin, 1850) (Si, Sa)

Anarta Ochsenheimer, 1816

Anarta cordigera (Thunberg, 1788) (N)

Anarta myrtilli (Linné, 1761) (N, S)

Lacanobia (Lacanobia) Billberg, 1820

Lacanobia (Lacanobia) w-latinum (Hufnagel, 1766) (N, S, Si)

Lacanobia (Diataraxia) Hübner, [1821]

Lacanobia (Diataraxia) aliena (Hübner, [1809]) (N, S)

Lacanobia (Diataraxia) blenna (Hübner, [1824]) (N, S, Sa)

Lacanobia (Diataraxia) oleracea (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)

Lacanobia (Diataraxia) splendens (Hübner, [1808]) (N, S)

Lacanobia (Dianobia) Behounek, 1992

Lacanobia (Dianobia) contigua ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)

Lacanobia (Dianobia) suasa ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)

Lacanobia (Dianobia) thalassina (Hufnagel, 1766) (N, S)

Hada Billberg, 1820

Hada plebeja (Linné, 1761) (N, S, Sa?)

Hecatera Guenée, 1852

Hecatera bicolorata (Hufnagel, 1766) (N, S, Si, Sa)

Hecatera cappa (Hübner, [1809]) (N, S, Si, Sa)

Hecatera corsica (Rambur, 1832) (S?, Si, Sa)

Hecatera dysodea ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)

Anepia Hampson, 1918

Anepia irregularis (Hufnagel, 1766) (N, S?) (*)

Anepia perplexa ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)

Anepia sancta (Staudinger, 1859) (Sa)

Anepia silenae (Hübner, [1822]) (N, S, Si)

Anepia syriaca (Osthelder, 1933) (S, Si)

Hadena (Hadena) Schrank, 1802

Hadena (Hadena) albimacula (Borkhausen, 1792) (N, S, Si, Sa)

Hadena (Hadena) armeriae (Guenée, 1852) (S) (*)

Hadena (Hadena) behouneki de Freina, 1983 (Sa) (E)

Hadena (Hadena) bicruris (Hufnagel, 1766) (N, S, Si, Sa)
Hadena (Hadena) caesia ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)
Hadena (Hadena) clara (Staudinger, 1901) (N)
Hadena (Hadena) compta ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)
Hadena (Hadena) confusa (Hufnagel, 1766) (N, S, Si, Sa)
Hadena (Hadena) filograna (Esper, [1788]) (N, S, Si)
Hadena (Hadena) gueneei (Staudinger, 1901) (S)
Hadena (Hadena) luteago ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si)
Hadena (Hadena) luteocincta (Rambur, 1834) (N, S, Si, Sa)
Hadena (Hadena) magnolii (Boisduval, 1829) (N, S, Si)
Hadena (Hadena) vulcanica (Turati, 1907) (Si) (*)

Hadena (Pinkericola) Hacker, 1987

Hadena (Pinkericola) tephroleuca (Boisduval, 1833) (N)

Aneda Sukhareva, 1973

Aneda rivularis (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa)

Enterpia Guenée, 1850

Enterpia laudeti (Boisduval, 1840) (N, S?)

Sideridis Hübner, 1821

Sideridis lampra (Schawerda, 1913) (N, S)
Sideridis albicolon (Hübner, [1813]) (N, S, Si)

Heliophobus Boisduval, 1829

Heliophobus kitti (Schawerda, 1914) (N)
Heliophobus reticulata (Goeze, 1781) (N, S)

Conisania Hampson, 1905

Conisania poelli (Stertz, 1915) (N) (*)
Conisania renati (Oberthür, 1890) (N)

Melanchra Hübner, [1820]

Melanchra persicariae (Linné, 1761) (N, S, Sa) (*)

Ceramica Guenée, 1852

Ceramica pisi (Linné, 1758) (N, S)

Mamestra Ochsenheimer, 1816

Mamestra brassicae (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)

Papestra Sukhareva, 1973

Papestra biren (Goeze, 1781) (N, Sa?)

Polia Ochsenheimer, 1816

Polia bombycina (Hufnagel, 1766) (N, S)

Polia nebulosa (Hufnagel, 1766) (N, S, Si)

Polia serratilinea Ochsenheimer, 1816 (N, S)

Polia trimaculosa (Esper, [1788]) (N, S) (*)

Leucania Ochsenheimer, 1816

Leucania comma (Linné, 1761) (N, S)

Leucania joannisi Boursin & Rungs, 1952 (S, Sa)

Leucania obsoleta (Hübner, [1803]) (N, S, Si, Sa)

Leucania punctosa (Treitschke, 1825) (N?, S?, Si, Sa?) (*)

Leucania putrescens (Hübner, [1824]) (N, S, Si, Sa)

Leucania zaeae (Duponchel, 1827) (N, S, Si, Sa)

Mythimna Ochsenheimer, 1816

Mythimna turca (Linné, 1761) (N, S, Sa?)

Aletia (Aletia) Hübner, [1821]

Aletia (Aletia) albipuncta ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)

Aletia (Aletia) congrua (Hübner, [1817]) (N, S, Si, Sa)

Aletia (Aletia) conigera ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)

Aletia (Aletia) ferrago (Fabricius, 1787) (N, S, Si, Sa)

Aletia (Aletia) impura (Hübner, [1808]) (N, S, Sa)

Aletia (Aletia) l-album (Linné, 1767) (N, S, Si, Sa)

Aletia (Aletia) pallens (Linné, 1758) (N, S, Si?) (*)

Aletia (Aletia) pudorina ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si?)

Aletia (Aletia) straminea (Treitschke, 1825) (N, S, Si, Sa)

Aletia (Aletia) vitellina (Hübner, [1808]) (N, S, Si, Sa)

Aletia (Anapoma) Berio, 1980

Aletia (Anapoma) riparia (Rambur, 1829) (N, S, Si, Sa)

Sablia Sukhareva, 1973

Sablia anderreggi (Boisduval, 1840) (N, S)

Sablia prominens (Walker, 1856) (S, Si, Sa)

Sablia scirpi (Duponchel, 1836) (N, S, Si, Sa)
Sablia sicula (Treitschke, 1835) (N, S, Si, Sa)

Acantholeucania Rungs, 1953

Acantholeucania loreyi (Duponchel, 1827) (N, S, Si, Sa)

Senta Stephens, 1834

Senta flammea (Curtis, 1828) (N)

Pseudaletia Franclemont, 1951

Pseudaletia unipuncta (Haworth, 1809) (N, S, Si, Sa)

Orthosia Ochsenheimer, 1816

Orthosia cerasi (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa)
Orthosia cruda ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)
Orthosia gothica (Linné, 1766) (N, S, Si, Sa)
Orthosia gracilis ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)
Orthosia incerta (Hufnagel, 1766) (N, S, Si, Sa)
Orthosia miniosa ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)
Orthosia munda ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)
Orthosia opima (Hübner, [1809]) (N) (*)
Orthosia populeti (Fabricius, 1781) (N, S)
Orthosia rorida (Frivaldsky, 1835) (N, S, Sa)

Panolis Hübner, [1821]

Panolis flammea ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)

Egira Duponchel, 1845

Egira anatolica (M. Hering, 1933) (S)
Egira conspicularis (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)

Perigrapha Lederer, 1857

Perigrapha i-cinctum ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N)

Hyssia Guenée, 1852

Hyssia cavernosa (Eversmann, 1842) (N)

Cerapteryx Curtis, 1833

Cerapteryx graminis (Linné, 1758) (N, S)

Tholera Hübner, [1821]

Tholera cespitis ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si)

Tholera decimalis (Poda, 1761) (N, S, Si, Sa)

Pachetra Guenée, 1841

Pachetra sagittigera (Hufnagel, 1766) (N, S, Si, Sa)

Eriopygodes Hampson, 1905

Eriopygodes imbecilla (Fabricius, 1794) (N)

Lasionycta Aurivillius, 1892

Lasionycta calberlai (Staudinger, 1883) (N, S)

Lasionycta proxima (Hübner, [1809]) (N, S)

Peridroma Hübner, [1821]

Peridroma saucia (Hübner, [1808]) (N, S, Si, Sa)

Axylia Hübner, [1821]

Axylia putris (Linné, 1761) (N, S, Si)

Pseudochropleura Beck, 1991

Pseudochropleura flammata ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si)

Pseudochropleura musiva (Hübner, [1803]) (N, S)

Ochropleura Hübner, 1821

Ochropleura leucogaster (Freyer, [1831]) (N, S, Si, Sa)

Ochropleura plecta (Linné, 1761) (N, S, Si, Sa)

Diarsia Hübner, [1821]

Diarsia brunnea ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)

Diarsia dahlia (Hübner, [1813]) (N)

Diarsia florida (F. Schmidt, 1859) (N)

Diarsia mendica (Fabricius, 1775) (N, S) (*)

Diarsia rubi (Vieweg, 1790) (N, Si?)

Noctua Linné, 1758

Noctua pronuba (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)

Paranoctua Beck, Kobes & Ahola, 1993

Paranoctua comes Hübner, [1813] (N, S, Si, Sa)
Paranoctua interjecta Hübner, [1803] (N, S, Si, Sa)
Paranoctua interposita (Hübner, [1790]) (N, S)
Paranoctua orbona (Hufnagel, 1766) (N, S, Si, Sa)

Lampra Hübner, [1821]

Lampra fimbriata (Schreber, 1759) (N, S, Si, Sa)
Lampra tirrenica (Biebinger, Speidel & Hanigk, 1983) (N, S, Si, Sa)

Euschesis Hübner, [1821]

Euschesis janthe (Borkhausen, 1792) (N, S, Si, Sa)
Euschesis janthina ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)
Euschesis tertia (von Mentzer, Moberg & Fibiger, 1991) (S) (*)

Epilecta Hübner, [1821]

Epilecta linogrisea ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)

Violaphotia Beck, 1991

Violaphotia molothina (Esper, [1789]) (N?)

Paucgraphia Beck, 1991

Paucgraphia erythrina (Herrich-Schäffer, [1852]) (N, S, Sa)

Lycophotia Hübner, [1821]

Lycophotia porphyrea ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)

Chersotis Boisduval, 1840

Chersotis alpestris (Boisduval, [1837]) (N, S)
Chersotis anatolica (Draudt, 1936) (N, S) (*)
Chersotis andereggii (Boisduval, [1837]) (N, S?)
Chersotis cuprea ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)
Chersotis cyrnea (Spuler, 1908) (Sa?)
Chersotis elegans (Eversmann, 1837) (N?, S?) (*)
Chersotis fimbriola (Esper, [1803]) (N, Si)
Chersotis larixia (Guenée, 1852) (N) (*)
Chersotis margaritacea (de Villers, 1789) (N, S, Si, Sa?)
Chersotis multangula (Hübner, [1803]) (N, S, Si)
Chersotis ocellina ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S?)

Chersotis oreina Dufay, 1984 (N)
Chersotis rectangula ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si)

Rhyacia Hübner, [1821]

Rhyacia helvetina (Boisduval, 1833) (N, S)
Rhyacia lucipeta ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si)
Rhyacia simulans (Hufnagel, 1766) (N, S, Si, Sa)

Epipsilia Hübner, [1821]

Epipsilia cervantes (Reisser, 1935) (Si)
Epipsilia grisescens (Fabricius, 1794) (N, S)
Epipsilia latens (Hübner, [1809]) (N, S, Si?)

Standfussiana Boursin, 1946

Standfussiana dalmata (Staudinger, 1901) (N, S)
Standfussiana insulicola (Turati, 1919) (Sa)
Standfussiana lucerneae (Linné, 1758) (N, S) (*)
Standfussiana nictymera (Boisduval, 1834) (N?, S?) (*)
Standfussiana wiskotti (Standfuss, 1888) (N)

Paradiarsia McDunnough, [1929]

Paradiarsia glareosa (Esper, [1788]) (N) (*)
Paradiarsia punicea (Hübner, [1803]) (N)

Eurois Hübner, [1821]

Eurois occulta (Linné, 1758) (N, S)

Spaelotis Boisduval, 1840

Spaelotis clandestina (Harris, 1841) (N)
Spaelotis ravidia ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S?) (*)
Spaelotis senna (Freyer, [1829]) (N, S)

Opigena Boisduval, 1840

Opigena polygona ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)

Graphiphora Ochsenheimer, 1816

Graphiphora augur (Fabricius, 1775) (N, S?)

Eugnorisma (Metagnorisma) Varga & Ronkay, 1987

Eugnorisma (Metagnorisma) depuncta (Linné, 1761) (N, S, Si)

Anomogyna Staudinger, 1871

Anomogyna rhaetica (Staudinger, 1871) (N)

Anomogyna sincera (Herrich-Schäffer, 1851) (N)

Anomogyna speciosa (Hübner, [1813]) (N)

Pachnobia Guenée, 1852

Pachnobia alpicola (Zetterstedt, [1839]) (N)

Pachnobia lorezi (Staudinger, 1891) (N?)

Megasema Hübner, [1821]

Megasema ashworthii (Doubleday, 1855) (N, S, Si?) (*)

Megasema c-nigrum (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)

Megasema ditrapezium ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si)

Megasema triangulum (Hufnagel, 1766) (N, S)

Xestia Hübner, [1818]

Xestia agathina (Duponchel, 1827) (N, S)

Xestia baja ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)

Xestia castanea (Esper, [1798]) (N, S, Si)

Xestia cohaesa (Herrich-Schäffer, [1849]) (N?, S, Si, Sa)

Xestia collina (Boisduval, 1840) (N)

Xestia kermesina (Mabille, 1869) (Sa)

Xestia ochreago (Hübner, [1809]) (N, S)

Xestia rhomboidea (Herrich-Schäffer, 1851) (N, S, Si)

Xestia sexstrigata (Haworth, 1809) (N, Si?)

Xestia trifida (Fischer von Waldheim, 1820) (Sa?)

Xestia xanthographa ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)

Eugraphe Hübner, [1821]

Eugraphe sigma ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si?)

Coenophila Stephens, 1850

Coenophila jordani (Turati, 1912) (S, Sa)

Cerastis Ochsenheimer, 1816

Cerastis faceta (Treitschke, 1835) (N, S, Si, Sa)

Cerastis leucographa ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N)

Cerastis rubricosa ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)

Naenia Stephens, 1827

Naenia typica (Linné, 1758) (N, S)

Anaplectoides McDunnough, [1929]

Anaplectoides prasina ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N)

Protolampra McDunnough, [1929]

Protolampra sobrina (Duponchel, 1843) (N) (*)

Parexarnis Boursin, 1946

Parexarnis fugax (Treitschke, 1825) (N?)

Actebia Stephens, 1829

Actebia praecox (Linné, 1758) (N)

Euxoa (Pleonectopoda) Grote, 1873

Euxoa (Pleonectopoda) culminicola (Staudinger, 1870) (N, S?) (*)

Euxoa (Euxoa) Hübner, [1821]

Euxoa (Euxoa) aquilina ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa) (*)

Euxoa (Euxoa) birivia ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N)

Euxoa (Euxoa) conspicua (Hübner, [1827]) (N)

Euxoa (Euxoa) corsicola Corti, 1928 (Sa)

Euxoa (Euxoa) cos (Hübner [1824]) (N, S, Si) (*)

Euxoa (Euxoa) decora ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)

Euxoa (Euxoa) distinguenda (Lederer, 1857) (N, S?, Si) (*)

Euxoa (Euxoa) hastifera (Donzel, 1847) (N, S, Sa?) (*)

Euxoa (Euxoa) nigricans (Linné, 1761) (N, S, Si, Sa)

Euxoa (Euxoa) obelisca ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)

Euxoa (Euxoa) recussa (Hübner, [1817]) (N, S)

Euxoa (Euxoa) segnilis (Duponchel, 1836) (N, S, Si, Sa) (M)

Euxoa (Euxoa) temera (Hübner, [1808]) (N, S, Si, Sa)

Euxoa (Euxoa) tritici (Linné, 1761) (N, S, Si, Sa) (*)

Euxoa (Euxoa) vitta (Esper, [1789]) (N, S?, Sa?)

Dichagyris Lederer, 1857

Dichagyris candelisequa ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si)

Dichagyris renigera (Hübner, [1808]) (N, S?, Si?) (*)

Dichagyris vallesiaca (Boisduval, [1837]) (N)

Yigoga Nye, 1975

- Yigoga celsicola* (Bellier, 1859) (N, S?, Sa?) (*)
- Yigoga constanti* (Millière, 1860) (N)
- Yigoga forcipula* ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa?)
- Yigoga nigrescens* (Höfner, 1888) (N, S, Si)
- Yigoga signifera* ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)

Ledereragrotis Varga, 1991

- Ledereragrotis multifida* (Lederer, 1870) (N)

Cladocerotis Hampson, 1903

- Cladocerotis optabilis* (Boisduval, [1837]) (N, Si)

Agrotis Ochsenheimer, 1816

- Agrotis biconica* Kollar, 1844 (N, S, Si, Sa)
- Agrotis cinerea* ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)
- Agrotis clavis* (Hufnagel, 1766) (N, S, Si?)
- Agrotis crassa* (Hübner, [1803]) (N, S, Si, Sa)
- Agrotis endogaea* Boisduval, 1834 (Sa) (*)
- Agrotis exclamationis* (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)
- Agrotis fatidica* (Hübner, [1824]) (N, S)
- Agrotis herzogii* Rebel, 1911 (Sa)
- Agrotis ipsilon* (Hufnagel, 1766) (N, S, Si, Sa)
- Agrotis lata* Treitschke, 1835 (Si, Sa)
- Agrotis obesa* Boisduval, 1829 (N, S?)
- Agrotis predotai* Bytinski-Salz, 1937 (Sa) (E)
- Agrotis puta* (Hübner, [1803]) (N, S, Si, Sa)
- Agrotis schawerdai* Bytinski-Salz, 1937 (Sa)
- Agrotis segetum* ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)
- Agrotis simplonia* (Geyer, [1832]) (N, S)
- Agrotis syricola* Berio, 1936 (S, Si)
- Agrotis trux* (Hübner, [1824]) (N, S, Si, Sa)
- Agrotis turatii* Standfuss, 1888 (N)
- Agrotis vestigialis* (Hufnagel, 1766) (N, S?) (*)

Note

Orectis massiliensis: L'esame delle raffigurazioni della specie fornite da Millière in varie opere ed il confronto di materiale di *Orectis massiliensis* (Millière, [1864]) della Liguria occidentale con alcuni sintipi di *O. euprepiata* Dannehl, 1933, lasciano pochi dubbi sulla validità della sinonimia qui riportata.

Orectis proboscidata: La specie manifesta sull'Etna un fenomeno di criptismo legato al substrato e si presenta con individui melanici che furono considerati da Turati (1907. Naturalista sicil., 20) come appartenenti ad una nuova specie (*Orectis barteli*); gli esemplari

provenienti da altre zone della Sicilia corrispondono alla forma nominale.

Polypogon flavicrinalis/gigantea: *Herminia gigantea* Turati, 1911 viene comunemente considerato sinonimo di *Herminia flavicrinalis* Andreas, 1910, ma alcune differenze nei palpi indicherebbero la validità specifica del taxon descritto da Turati. Entrambe le entità risulterebbero pertanto presenti in Sardegna.

Polypogon plumigeralis/crinalis: Secondo alcuni autori (Fibiger & Hacker, 1991; Vives Moreno, 1994) i due nomi non si riferirebbero alla medesima specie, come ritenuto da lungo tempo, ma a due entità distinte; le popolazioni italiane necessitano quindi di una precisa attribuzione.

Schrankia hartigi: Specie di dubbia validità.

Parascotia nisseni: Con tutta probabilità la citazione di *Parascotia robiginosa* (Staudinger, 1892) per la Sardegna di Kapfer (1987. Ent. Z., 97) si riferisce a questa specie.

Eutelia: Per completezza va ricordata una citazione per la Sicilia di *Eutelia blandatrix* Hampson, 1912, da parte di Guenée (1852. Species général des Lépidoptères, 6), certamente dovuta a confusione sulla località di provenienza di *Eurhipia blandatrix* (nomen nudum) da parte di Boisduval (1840. Genera et Index methodicus europaeorum Lepidopterorum).

Cryphia (Bryoleuca) rectilinea/ravula: Si tratta di due elementi affini a gravitazione rispettivamente est- ed ovest-mediterranea; secondo Boursin (1952. Ztschr. f. Lepidopt., 2) in Italia sarebbe presente l'entità orientale, ma l'esatta attribuzione delle popolazioni italiane deve essere ancora definita con certezza.

Eublemma caprearum: Specie di dubbia validità.

Eublemma porphyria: È altamente probabile che le citazioni per l'Italia (e.g. Provera, 1978) vadano ricondotte alla congenere ostrina (Hübner, [1808]).

Euchalcia italica: Poiché è stata riscontrata una notevole variabilità nella morfologia degli apparati copulatori di *Euchalcia siderifera* (Eversmann, 1846) (Hacker, 1985. Neue ent. Nachr., 15), vi è la possibilità che *E. italica* (Staudinger, 1882) rientri nel campo di variazione di *E. siderifera* (Eversmann, 1846), con la quale in passato veniva posta in combinazione subspecifica. Vi è tuttavia una formale citazione di *siderifera* (s.str.) per l'Abruzzo (Dufay, 1968. Veröff. zool. Staatsamml. München, 12), basata però su un esemplare di dubbia provenienza (leg. Dannehl).

Euchalcia siderifera: cfr. nota 167.0.002.0.

Autographa gamma: Secondo alcuni autori si tratterebbe di un complesso di specie gemelle, con *Autographa messmeri* Schadewald, 1992 e *A. voelkeri* Schadewald, 1992, frammiste, la seconda delle quali segnalata per l'Italia settentrionale e per la Sardegna da Eitschberger (1992. Atalanta, 23).

Cucullia blattariae: *Cucullia caninae* Rambur, 1833 e *C. blattariae* (Esper, [1790]) sono due specie estremamente affini a gravitazione rispettivamente ovest- ed est-mediterranea, entrambe citate per quasi tutta l'Italia. L'esatta attribuzione delle popolazioni italiane va però ancora definita, dal momento che le opinioni degli specialisti sono spesso in disaccordo e senza l'osservazione delle larve gli adulti risultano pressoché indeterminabili. Vi è inoltre la concreta possibilità che più specie gemelle siano frammiste. Secondo Beck (1989. Atalanta, 19), la citazione di *Cucullia barthae* Boursin, 1933, per l'Abruzzo di Helbig (1940. Ent. Ztschr., Frankf. a M., 54) va riferita a *C. blattariae*.

Cucullia caninae: cfr. nota 176.0.005.0.

Omia banghaasi: La specie venne descritta su un solo esemplare raccolto sul M. Faito in Campania; in seguito l'entità venne ridescritta da Schawerda (1931. Mitt. Münchn. ent. Ges., 20) sulla base di esemplari provenienti dalla Spagna (Albarracin) che nulla hanno a che vedere con i caratteri indicati nella descrizione originale.

Platyperigea albina: A causa di numerose incertezze tassonomiche e zoogeografiche su

Platyperigea montana (Bremer, 1861) (= *cinerascens* Tengström, 1869) e *P. albina* (Eversmann, 1848) l'esatta attribuzione delle popolazioni italiane (e.g. *rougemonti* Spuler, 1908) va ancora definita con certezza (cfr. Hacker, 1989: 296).

Platyperigea montana: cfr. nota 208.0.001.0.

Spodoptera ornithogalli: Una larva matura di questa specie, propria dell'America centrale e settentrionale, è stata reperita in un supermercato di Roma agli inizi di novembre del 1992 in un casco di banane provenienti dal Costa Rica.

Athetis lepigone: Segnalata per il Piemonte da Berio (1951. Boll. Soc. ent. it., 81).

Thalpophila matura: Nonostante le consistenti differenze cromatiche, *Thalpophila vitalba* (Freyer, 1834) viene correntemente sinonimizzata con *T. matura* (Hufnagel, 1766) a causa dell'assenza di caratteri diagnostici negli apparati copulatori. In questa sede si propende per mantenere *vitalba* come buona specie in considerazione dell'andamento nettamente differente della banda antemediana delle ali anteriori e della macchia claviforme, indizio di differenze nella regolazione dello sviluppo che non possono essere trascurate. Lungo la penisola le due entità sembrano presentare una distribuzione nettamente parapatrica, con *matura* che si arresta verso sud nella Sila e *vitalba* diffusa dall'Aspromonte a tutta la Sicilia.

Thalpophila vitalba: cfr. nota 225.0.001.0.

Phlogophora meticulosa: Secondo alcuni autori vi sarebbe almeno un'altra specie gemella frammista, cioè *Phlogophora lamii* Schädewald, 1992, citata per l'Italia settentrionale da Eitschberger (1992. Atalanta, 23).

Platysenta viscosa: Parenzan & Porcelli (1993. Entomologica, 27) ribadiscono la validità specifica di *Platysenta europaea* (Parenzan, 1980) ma al momento non sono note differenze anatomiche o biologiche che ne giustifichino la separazione da *P. viscosa* (Freyer, 1831).

Mesogona oxalina: Mariani (1939. Mem. Soc. ent. it., 17) non indica la specie nel suo catalogo dei Lepidotteri siciliani, mentre correttamente segnala *Mesogona acetosellae* ([Denis & Schiffermüller], 1775), elemento assai comune e diffuso nell'isola; al contrario, Mariani (1941), nel catalogo dei Lepidotteri italiani, cita per la Sicilia solamente *oxalina*, il che dimostra come la segnalazione di quest'ultima specie per l'isola, ripresa in seguito da molti autori, derivi da un evidente errore tipografico.

Agrochola (Anchoscelis) nitida/pistacinoides: Una conclusione definitiva sulla conspecificità o meno dei due taxa va ancora raggiunta (cfr. Rezbanyai, 1983. Nota lepid., 6); tutte le popolazioni italiane appaiono riconducibili a *pistacinoides* (d'Aubuisson, 1867) (= *dujardini* Dufay, 1976), ma non si esclude la presenza di popolazioni di *nitida* ([Denis & Schiffermüller], 1775) nel settore nord-orientale.

Agrochola (Anchoscelis) wolfschlaegeri: La citazione di *Agrochola kindermannii* (Fischer von Röslerstamm, 1838) per la Sicilia, risalente a Ragusa (1893. Naturalista sicil., 13), ripresa in seguito da vari autori, va ricondotta a questa specie, la cui presenza nell'isola è stata confermata recentemente in seguito ad alcune catture effettuate sulle Madonie e sull'Etna (leg. Grillo).

Conistra (Conistra) ligula: Va notato che gli esemplari siciliani esaminati di *Conistra vaccinii* (Linné, 1761) presentano l'apice delle ali anteriori debolmente falcato, carattere normalmente considerato tipico di *C. ligula* (Esper, [1791]); pertanto, nonostante numerose citazioni, al momento non si può confermare la specie per l'isola.

Conistra (Peperina) torrida: Le citazioni di *Conistra daubei* (Duponchel, 1838) per l'Appennino centro-meridionale e per la Sicilia effettuate da Berio (1983. Ann. Mus. civ. St. nat. Genova, 84; 1985), riprese in seguito da alcuni autori, derivano da evidenti errori di determinazione per *C. torrida* (Lederer, 1857).

Episema: La determinazione delle specie appartenenti a questo genere è resa difficoltosa

dall'estrema variabilità fenotipica degli esemplari e dalle modeste differenze presenti a livello degli apparati copulatori. In seguito ad un lavoro di Boursin (1951. Ztschr. Wien. ent. Ges., 36), venne esclusa la presenza di *Episema tersa* ([Denis & Schiffermüller], 1775) in Italia; tuttavia, Hacker & Weigert (1986. Neue ent. Nachr., 19), Poole (1989) e Parenzan & Porcelli (1993. Entomologica, 27) hanno successivamente confermato la specie per la fauna italiana. Per quanto riguarda le segnalazioni di *E. grueneri* Boisduval, [1837], la situazione appare complessa sul piano tassonomico, dal momento che i presunti esemplari italiani del taxon si discostano alquanto da quelli iberici, ritenuti caratteristici della specie da tutti gli autori nonostante Boisduval (1840. Genera et Index methodicus europaeorum Lepidopterorum) avesse indicato nella Sicilia la località tipica di *grueneri*.

Leucochlaena: Poiché il gruppo necessita di una profonda revisione, vengono riportati i dati di distribuzione dei taxa nominali segnalati per la fauna italiana così come indicati nella letteratura.

Aporophyla lueneburgensis: Le segnalazioni di *Aporophyla lueneburgensis* (Freyer, 1838) in Italia centrale, meridionale ed in Sicilia (Krüger, 1906. Naturalista sicil., 18; Berio, 1985; Parenzan & Porcelli, 1993. Entomologica, 27) vanno riconsiderate criticamente, dal momento che la specie è un'entità vicariante ecologicamente di *Aporophyla lutulenta* ([Denis & Schiffermüller], 1775) nelle tipiche brughiere a *Calluna vulgaris* (Linné, 1753) Hull, 1808, dell'Europa atlantica. *Calluna vulgaris* è anche la pianta alimentare di *lueneburgensis* e risulta assente in Italia a sud dell'Umbria (cfr. Pignatti, 1982. Flora d'Italia, 2).

Allophytes: Un soddisfacente inquadramento tassonomico delle popolazioni di *Allophytes* gr. *oxyacanthae* (Linné, 1758) del bacino mediterraneo è reso complicato dall'esistenza, a livello dell'apparato copulatore maschile, di morfotipi nettamente differenziati, i quali possono manifestare variazione geografica di tipo clinale oppure dar luogo a zone di netta discontinuità. I clini morfologici nelle singole strutture sono, inoltre, incongruenti geograficamente fra loro. Una preliminare attribuzione delle popolazioni italiane, che non riprenda quella eccessivamente frammentatrice di Berio (1986. Frustula ent., n.s. 7/8) o quella oltremodo accorpante di Mazel (1991. Nota lepid., 14), viene proposta in questa sede.

Griposia aprilina: La citazione di *Griposia pinkeri* Kobes, 1973 per la Sardegna di Berio (1985) è dovuta ad un errore di determinazione per *G. aprilina* (Linné, 1758).

Dryobotodes (Dryobotodes) carbonis: A questa specie vanno riferite tutte le vecchie citazioni di *Dryobotodes cerris* (Boisduval, 1840) per l'Italia.

Polymixis (Myxinia) flavicincta: Nonostante le citazioni della specie per quasi tutta l'Italia, *Polymixis flavicincta* ([Denis & Schiffermüller], 1775) può al momento essere confermata esclusivamente per la Sardegna e per l'Isola di Montecristo (Zilli, 1994. Atalanta, 25).

Polymixis (Myxinia) sublutea: Dal momento che *Polymixis flavicincta* ([Denis & Schiffermüller], 1775) parrebbe essere assente dalla Sicilia, vi sono forti indizi che il nome *calvescens* Boisduval, 1840, usato per denotare popolazioni siciliane di *flavicincta*, si riferisca alla specie attualmente nota come *P. sublutea* (Turati, 1909) e che abbia pertanto priorità sul nome di Turati (Zilli, 1994. Atalanta, 25).

Polymixis (Crypsedra) gemmea: Non è noto sulla base di quali elementi Heinicke & Naumann (1981, 1980-1982), seguiti da Hacker (1989), indichino la specie per il Lazio.

Mniotype sp.: Berio (in stampa) descrive una nuova specie dell'Isola di Capraia che, in base alle figure del manoscritto, appare rientrare nel campo di variabilità di *Mniotype solieri* (Boisduval, 1840).

Apamea: Per completezza si riporta una enigmatica citazione per l'Italia di *Apamea ferrago* (Eversmann, 1837) di Warren (1911, in 1906-1914) (sub *terrago*).

Apamea arabs: Come già rettificato da Püngeler (1906. Dt. ent. Z. Iris, 19) e da Ragusa (1906.

Naturalista sicil., 18), la segnalazione di *Apamea polyglypha* (Staudinger, 1891) per la Sicilia di Krüger (1905. Naturalista sicil., 18) si riferisce a questa specie.

Mesapamea remmi: Data l'estrema rarità dei ritrovamenti, alcuni autori (e.g. Fibiger & Hacker, 1991) presumono che si tratti di individui ibridi fra le altre due specie di *Mesapamea* Heinicke, 1959; va tuttavia notato che le caratteristiche degli esemplari non appaiono intermedie.

Luperina irritaria/sohnretheli: La conspecificità di *Luperina sohnretheli* (Draudt, 1931) con *L. irritaria* (A. Bang-Haas, 1912), a lungo dibattuta, viene oggi generalmente accettata (e.g. Fibiger & Hacker, 1991).

Luperina kruegeri: Le segnalazioni di questa specie sarda in Italia settentrionale (Berio, 1951. Boll. Soc. ent. it., 81) sono dubbie.

Luperina samni: Specie di dubbia validità, probabilmente riconducibile a *Luperina rubella* (Duponchel, 1835).

Luperina siegeli: Specie di dubbia validità: si tratta probabilmente di una forma cromatica di *Luperina kruegeri* Turati, 1912, collegata con la forma tipica attraverso fenotipi di transizione.

Luperina tiberina: Specie poco nota: un primo esame di alcuni paratipi ne confermerebbe la validità.

Luperina sp.: Berio (in stampa) descrive una nuova specie dell'Isola di Capraia; in base all'esame di un paratipo non si notano sostanziali differenze rispetto a *Luperina irritaria* (A. Bang-Haas, 1912).

Gortyna: Berio (in verbis) manifestò l'intenzione di ribadire la validità tassonomica di *Gortyna fiorii* Berio, 1963 e di *G. galassii* Berio, 1963, mai riconosciute dagli autori successivi, e di enucleare ulteriori entità all'interno del genere sulla base di differenze nel pattern alare (e.g. *leucographa* Borkhausen, 1792 sensu Auct.). Al riguardo va osservato che *Gortyna fiorii* e *G. galassii*, entrambe note esclusivamente sugli olotipi (cfr. Berio, 1963. Boll. Soc. ent. it., 93), appaiono singoli esemplari varianti selezionati all'interno di serie di *G. borellii* Pierret, 1837 raccolte nella medesima località. La distinzione di altre entità di rango specifico all'interno di *G. borellii* appare altresì dubbia; tuttavia, per quanto riguarda *G. xanthenes* (Germar, [1842]), l'esistenza in Sardegna di popolazioni planiziarie e montane (*franciscae* Turati, 1913) morfologicamente ed ecologicamente differenziate indica fenomeni di divergenza evolutiva di una certa consistenza (cfr. Ippolito & Parenzan, 1978. Entomologica, 14).

Gortyna puengeleri: Alla specie vanno ricondotte le citazioni di *Gortyna moesiaca* Herrich-Schäffer, 1849 per l'Italia (e.g. Krüger. 1905 Naturalista sicil., 18; Kitschelt, 1925. Zusammenstellung der bisher in dem ehemaligen Gebiete von Südtirol beobachteten Großschmetterlinge).

Phragmatiphila insularis: Specie di dubbia validità, alternativamente considerata valida (e.g. Fibiger & Hacker, 1991) o sottospecie sardo-corsa di *P. nexa* (Hübner, [1808]) (e.g. Rungs, 1988).

Phragmatiphila nexa: cfr. nota 319.0.001.0.

Anepia irregularis: La segnalazione di Hacker (1992. Esperiana, 3) per l'Italia centrale si basa su materiale di dubbia provenienza (leg. Dannehl).

Hadena (Hadena) armeriae: La presenza della specie in Sicilia (Berio, 1985) va confermata, dal momento che esemplari così determinati dell'isola (det. Berio) sono risultati individui della f. *galactina* Turati, 1908 di *Hadena compta* ([Denis & Schiffermüller], 1775).

Hadena (Hadena) vulcanica: A questa specie vanno ricondotte le citazioni per la Sicilia di *Hadena melanochoea* (Staudinger, 1892) (e.g. Mariani, 1939. Mem. Soc. ent. it., 17) e quella, con riserva, di *H. clara* (Staudinger, 1901) (Boursin, 1959. Ztschr. Wien. ent. Ges., 44).

Conisania poelli: Specie di dubbia validità, probabilmente riconducibile a *Conisania leineri* (Freyer, 1836).

Melanchra persicariae: In seguito alla smentita di Minà-Palumbo & Failla-Tedaldi (1888. Naturalista sicil., 8: 202) di una loro precedente segnalazione (Minà-Palumbo & Failla-Tedaldi, 1888. Naturalista sicil., 8: 1), la specie va al momento esclusa dalla fauna siciliana.

Polia trimaculosa: Per la nomenclatura di questa specie si segue Vives Moreno (1994).

Leucania punctosa: Ad eccezione di un esemplare siciliano, tutti gli esemplari attribuiti a questa specie finora controllati sono risultati appartenere ad altri taxa.

Aletia (Aletia) pallens: Quasi tutti gli esemplari attribuiti a questa specie finora controllati sono risultati appartenere ad altri taxa.

Orthosia opima: L'esame del materiale del Parco Nazionale del Circeo (leg. Sbordonì & Forestiero) fra il quale sarebbe stata individuata la presente specie (cfr. Berio, 1985) ha permesso di reperire esclusivamente esemplari di *Agrochola lota* (Clerck, 1759), specie superficialmente simile ad *Orthosia opima* (Hübner, [1809]).

Diarsia mendica: Ragusa (1893. Naturalista sicil., 13: 47) mise in evidenza come la citazione della specie per la Sicilia di Minà-Palumbo & Failla-Tedaldi (1888. Naturalista sicil., 7: 271) derivasse da un errore di determinazione per *Stilbia faillae* Püngeler, 1891.

Euschesis tertia: In aggiunta ai dubbi già sollevati da Parenzan & Porcelli (1993. Entomologica, 27) su questa entità, la validità della specie andrebbe riesaminata alla luce del reperimento di esemplari di transizione con *Euschesis janthina* ([Denis & Schiffermüller], 1775) nell'Appennino centro-meridionale.

Chersotis anatolica: È stato dimostrato che *elegans* Eversmann, 1837 è il nome valido per la specie successivamente descritta come *grammiptera* Rambur, [1839], non nota per la fauna italiana (Dufay, 1981. Alexanor, 12; 1986. Nota lepid., 9). Le citazioni della specie per l'Italia si riferiscono perciò a *Chersotis anatolica* (Draudt, 1936), primo nome disponibile per *C. elegans* Auct. nec Eversmann, 1837. Nonostante il chiarimento, Fibiger (1993) confonde i nomi ed inverte, almeno relativamente all'Italia, le geonemie delle specie.

Chersotis elegans: cfr. nota 378.0.002.0.

Chersotis larixia: L'unica segnalazione della specie per l'Italia peninsulare (Provera, 1978) deriva da un errore di determinazione per *Chersotis anatolica* (Draudt, 1936).

Standfussiana lucerneae: In seguito all'elevazione a rango di specie delle popolazioni sardo-corse (insulicola Turati, 1919), la specie va esclusa dalla fauna della Sardegna (cfr. Fibiger, 1990).

Standfussiana nictymera: A causa della difficoltà di distinzione fra la specie e *Standfussiana dalmata* (Staudinger, 1901), non è possibile appurare l'esattezza delle numerose vecchie citazioni di *Standfussiana nictymera* (Boisduval, 1834) per l'Italia. Lo scarso materiale italiano disponibile di queste rare specie finora esaminato è risultato appartenere a *dalmata*.

Paradiarsia glareosa: Con tutta probabilità la citazione di "*Charadrina glareosa*" per la Sicilia di Zuccarello Patti (1845. Atti accad. Gioenia Catania, (2) 2) si riferisce a *Chersotis margaritacea* (de Villers, 1789).

Spaelotis ravidus: Non sembra che la segnalazione della specie per l'Italia centrale di Staudinger & Rebel (1901. Catalog der Lepidopteren des Palaeartischen Faunengebietes) sia stata successivamente convalidata da catture certe; Mariani (1941: 36) indica nuovamente la specie per l'Italia centrale, ma si confonde chiaramente con *Spaelotis senna* (Freyer, [1829]).

Megasema ashworthii: Formalmente la citazione di "*candelisequa* Hübner (*candelarum* Staudinger)" per la Sicilia di Mariani (1939. Mem. Soc. ent. it., 17) si riferisce a *Megasema ashworthii* (Doubleday, 1855); la specie non viene però indicata dell'isola da Mariani (1941).

Protolampra sobrina: Si conferma l'osservazione di Provera (1978) secondo la quale la citazione della specie per l'Italia centrale di Rostagno (1920. Boll. Soc. zool. it., 1) deriva da un errore di determinazione.

Euxoa (Pleonectopoda) culminicola: La citazione di Corti (1931, in Corti & Draudt, 1931-1938) per gli Appennini è basata su materiale di dubbia provenienza (leg. Dannehl).

Euxoa (Euxoa) aquilina: La specie è presente in Sardegna con popolazioni ben differenziate che sono state distinte come ssp. falleri Schawerda, 1927. Per completezza si deve ricordare qui un'improbabile segnalazione di falleri per la Sicilia come buona specie (Berio, 1990. Naturalista sicil., (4) 14).

Euxoa (Euxoa) cos: A questa specie vanno ricondotte alcune citazioni di *Euxoa cursoria* (Hufnagel, 1766) per l'Italia centrale (cfr. Provera, 1978).

Euxoa (Euxoa) distinguenda: All'autore non sono noti esemplari certi della specie per la penisola.

Euxoa (Euxoa) hastifera: La citazione della specie per la Sardegna (Siegel, 1989. Mem. Soc. ent. it., 67), ripresa da Fibiger (1990) e da Svendsen & Fibiger (1992) è dubbia: materiale così determinato della Sardegna (leg. Siegel) è risultato appartenere ad altri taxa.

Euxoa (Euxoa) tritici: Secondo alcuni autori si tratterebbe di più specie gemelle frammiste, fra le quali *Euxoa crypta* (Dadd, 1927).

Dichagyris renigera: Si nutrono serie perplessità sulla presenza, indicata da vari autori, di questa specie in Italia peninsulare ed in Sicilia. L'esame degli esemplari prescelti come tipi da Hartig per la descrizione, mai avvenuta, di *Ochropleura renigera castellanii* (nomen nudum) ha permesso di stabilire la loro appartenenza a *Yigoga forcipula* ([Denis & Schiffermüller], 1775).

Yigoga celsicola: Le segnalazioni di questa specie xeromontana per il Lazio (Dannehl, 1927. Lep. Rundsch., 1) ed al livello del mare per l'Isola di S. Pietro (Sardegna) (Prota, 1975. Boll. Soc. sarda Sci. nat., 15), riprese da Fibiger (1990) e da Svendsen & Fibiger (1992) sono con tutta probabilità dovute ad errori di determinazione con altre specie di *Yigoga* Nye, 1975 o, nel secondo caso, con *Agrotis schawerdai* Bytinski-Salz, 1937.

Agrotis endogaea: Come accertato da Svendsen & Fibiger (1992), a questa specie va riferita la citazione di *Agrotis haifae* Staudinger, 1897 per la Sardegna di Hacker (1989: 580).

Agrotis vestigialis: La segnalazione di Staudinger & Rebel (1901. Catalog der Lepidopteren des Palaearctischen Faunengebietes) per l'Italia centrale è stata ripresa da alcuni autori ma mai confermata.

Hymenoptera

Xyelidae

Xyela Dalman, 1819

Xyela alpigena (Strobl, 1895) (N)

Xyela curva Benson, 1938 (N, S)

Xyela graeca Stein, 1876 (N, S)

Xyela julii (Brébisson, 1818) (N)

Xyela obscura (Strobl, 1895) (N)

Pamphiliidae

Caenolyda Konow, 1897

Caenolyda binaghii C. Pesarini & F. Pesarini, 1976 (S) (E)
Caenolyda reticulata (Linnaeus, 1758) (N, S)

Acantholyda A. Costa, 1894

Acantholyda erythrocephala (Linnaeus, 1758) (N, S)
Acantholyda flaviceps (Retzius, 1783) (N)
Acantholyda hieroglyphica (Christ, 1791) (N, S)
Acantholyda laricis (Giraud, 1861) (N)
Acantholyda posticalis Matsumura, 1912 (N, S)
Acantholyda pumilionis (Giraud, 1861) (N)
Acantholyda serbica Vasic, 1962 (N?, S)

Cephalcia Panzer, 1805

Cephalcia abietis (Linnaeus, 1758) (N, S)
Cephalcia alashanica Gussakovskij, 1935 (N)
Cephalcia arvensis Panzer, 1805 (N)
Cephalcia fallenii (Dalman, 1823) (N)
Cephalcia hartigii (Bremer, 1849) (N)
Cephalcia lariciphila (Wachtl, 1898) (N)

Neurotoma Konow, 1897

Neurotoma fausta (Klug, 1808) (N, S)
Neurotoma mandibularis (Zaddach, 1865) (N)
Neurotoma nemoralis (Linnaeus, 1758) (N)
Neurotoma saltuum (Linnaeus, 1758) (N, S)

Pamphilius Latreille, 1802

Pamphilius alternans (O.G. Costa, 1859) (N, S)
Pamphilius aurantiacus (Giraud, 1857) (S)
Pamphilius balteatus (Fallén, 1808) (N)
Pamphilius betulae (Linnaeus, 1758) (N, S?)
Pamphilius festivus C. Pesarini & F. Pesarini, 1984 (N)
Pamphilius fumipennis (Curtis, 1831) (N)
Pamphilius gyllenhali (Dahlbom, 1835) (N)
Pamphilius histrio (Latreille, 1812) (N)
Pamphilius hortorum (Klug, 1808) (N)
Pamphilius ignymontiensis Lacourt, 1973 (N)
Pamphilius inanitus (De Villers, 1789) (N)
Pamphilius lethierryi Konow, 1887 (N)
Pamphilius pallipes (Zetterstedt, 1838) (N)
Pamphilius stramineipes (Hartig, 1837) (N)
Pamphilius sylvaticus (Linnaeus, 1758) (N, S)
Pamphilius vafer (Linnaeus, 1767) (N, S)

Pamphilius varius (Lepeletier, 1823) (N)

Onycholyda Takeuchi, 1938

Onycholyda kervillei (Konow, 1903) (N)

Megalodontidae

Megalodontes Latreille, 1802

Megalodontes cephalotes (Fabricius, 1781) (N, S)

Megalodontes flabellicornis (Germar, 1817) (N)

Megalodontes flavicornis (Klug, 1824) (N)

Megalodontes klugii (Leach, 1817) (N, S)

Megalodontes plagiocephalus (Fabricius, 1804) (N, S?)

Xiphydriidae

Xiphydria Latreille, 1802

Xiphydria camelus (Linnaeus, 1758) (N)

Xiphydria longicollis (Geoffroy, 1785) (N, S)

Xiphydria prolongata (Geoffroy, 1785) (N, S)

Konowia Brauns, 1884

Konowia megapolitana Brauns, 1884 (N)

Siricidae

Sirex Linnaeus, 1761

Sirex cyaneus Fabricius, 1781 (N)

Sirex juvencus (Linnaeus, 1758) (N, S)

Sirex noctilio Fabricius, 1793 (N)

Urocerus Geoffroy, 1762

Urocerus augur (Klug, 1803) (N, S?)

Urocerus fantoma (Fabricius, 1781) (N, S)

Urocerus franzinii C. Pesarini & F. Pesarini, 1977 (Sa)

Urocerus gigas (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Xeris A. Costa, 1894

Xeris spectrum (Linnaeus, 1758) (N, S)

Tremex Jurine, 1807

Tremex fuscicornis (Fabricius, 1787) (N, S?)

Orussidae

Orussus Latreille, 1796

Orussus abietinus (Scopoli, 1763) (N, S, Si)

Orussus moroi (Guiglia, 1946) (N)

Orussus taorminensis (Trautmann, 1922) (Si)

Orussus unicolor (Latreille, 1811) (N, S, Si)

Pseudoryssus Guiglia, 1954

Pseudoryssus emanuelis Guiglia, 1956 (N) (E)

Pseudoryssus henschii (Mocsáry, 1910) (S)

Cephidae

Hartigia Schiödte, 1838

Hartigia albomaculata (Stein, 1876) (Si)

Hartigia linearis (Schrank, 1781) (N, S, Sa)

Hartigia nigra (Harris, 1776) (N, S, Sa)

Hartigia xanthostoma (Eversmann, 1847) (S?) (*)

Janus Stephens, 1835

Janus compressus (Fabricius, 1793) (N, S, Sa)

Janus femoratus (Curtis, 1830) (N?, S)

Janus luteipes (Lepeletier, 1823) (N)

Syrista Konow, 1896

Syrista parreyssi (Spinola, 1843) (S)

Cephus Latreille, 1802

Cephus brachycercus Thomson, 1871 (N, S, Sa)

Cephus cultratus Eversmann, 1847 (N, S, Si)

Cephus fumipennis Eversmann, 1847 (*)

Cephus gracilis O. G. Costa, 1860 (N, S, Si)

Cephus infuscatus Thomson, 1871 (N, S?)

Cephus nigrinus Thomson, 1871 (N, S?)
Cephus pygmaeus Linnaeus, 1767 (N, S, Si, Sa) (*)
Cephus runcator Konow, 1896 (N, S)

Calameuta Konow, 1896

Calameuta filiformis (Eversmann, 1847) (N, S)
Calameuta haemorrhoidalis (Fabricius, 1781) (Si, Sa)
Calameuta pallipes (Klug, 1803) (N, S, Sa)
Calameuta punctatus (Klug, 1803) (N, S)

Monoplopus Konow, 1896

Monoplopus idolon (Rossi, 1794) (N, S, Si, Sa)
Monoplopus pygmaeus (Poda, 1761) (N, S, Si, Sa)

Trachelus Jurine, 1806

Trachelus flavicornis (Lucas, 1846) (Si)
Trachelus tabidus (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa)
Trachelus troglodyta (Fabricius, 1787) (N, S, Sa)

Note

Hartigia xanthostoma: Problematica citazione di A. Costa (1894), tutt'al più valida per la sola Basilicata.

Cephus fumipennis: Citato da A. Costa (1894) di varie regioni, ma forse confuso con altra entità.

Cephus pygmaeus: Alcuni autori adottano la grafia pygmeus, come originaria.

Monoplopus: Sinonimo di *Calameuta* Konow, per immotivato ma indiscriminatamente accettato parere di Benson (1946), qui si mantiene provvisoriamente autonomo.

Argidae

Arge Schrank, 1802

Arge berberidis Schrank, 1802 (N, S)
Arge ciliaris (Linnaeus, 1767) (N, S)
Arge clavicornis (Fabricius, 1781) (N)
Arge corusca (Zaddach, 1859) (N)
Arge cyanocrocea (Forster, 1771) (N, S, Si?)
Arge enodis (Linnaeus, 1767) (N, S)
Arge fuscipennis (Herrich Schaeffer, 1833) (N)
Arge fuscipes (Fallén, 1808) (N)
Arge gracilicornis (Klug, 1812) (N)
Arge melanochoa (Gmelin, 1790) (N, S, Si, Sa?)
Arge metallica (Klug, 1834) (N?)

Arge nigripes (Retzius, 1783) (N, S)
Arge ochropus (Gmelin, 1790) (N, S, Si, Sa) (*)
Arge pagana (Panzer, 1798) (N, S)
Arge pyrenaica (André, 1879) (N, Sa) (*)
Arge rustica (Linnaeus, 1758) (N, S, Si?)
Arge syriaca (Mocsàry, 1880) (N, S, Si) (*)
Arge tergestina (Kriechbaumer, 1876) (N)
Arge thoracica (Spinola, 1808) (N, S)
Arge ustulata (Linnaeus, 1758) (N, S, Si) (*)

***Sterictiphora* Billberg, 1820**

Sterictiphora angelicae (Panzer, 1799) (N)
Sterictiphora furcata (Villers, 1789) (N, S)
Sterictiphora geminata (Gmelin, 1790) (N, S)
Sterictiphora gastrica (Klug, 1812) (*)
Sterictiphora longicornis Chevin, 1982 (*)

***Aprosthem*a Konow, 1899**

*Aprosthem*a *austriacum* (Konow, 1892) (N)
*Aprosthem*a *axillare* (Zaddach, 1863) (N)
*Aprosthem*a *bifidum* (Klug, 1834) (N, S, Si)
*Aprosthem*a *cognatum* (O. G. Costa, 1858) (S) (*)
*Aprosthem*a *furcatum* (Villers, 1789) (N, S)
*Aprosthem*a *fusicorne* (Thomson, 1871) (N)
*Aprosthem*a *instratum* (Zaddach, 1859) (N, S)
*Aprosthem*a *konowi* (Mocsàry, 1891) (N)
*Aprosthem*a *melanurum* (Klug, 1812) (N, S) (*)
*Aprosthem*a *melanurum friesei* (Konow, 1895) (N)
*Aprosthem*a *tardum* (Klug, 1812) (N, S)

Note

Arge ochropus: L'unica citazione per l'Italia (Zombori, 1981) è verosimilmente da attribuire ad *A. fuscipes* Fallén, fino a tempi recenti ritenuta sinonimo di *clavicornis* Fabricius.
Arge pyrenaica: Sinonimo di *A. ochropus* Gmelin, secondo Chevin (1976).
Arge syriaca: Sinonimo di *A. cyanocrocea* Forster, secondo Benson (1968).
Arge ustulata: Secondo Zhelokhovtsev (1988) avrebbe per sinonimi *A. fuscipes* Fallén e *A. clavicornis* Fabricius, ma Viitasaari (1990) dimostra l'indipendenza delle tre entità.
Sterictiphora gastrica: Citata in generale d'Italia (Koch, 1988).
Sterictiphora longicornis: Citata in generale d'Italia (Koch, 1988).
*Aprosthem*a *cognatum*: Entità problematica, non più segnalata dopo A. Costa (1894), verosimilmente affine ad *A. melanurum* Klug.
*Aprosthem*a *melanurum*: Forse sinonimo di *A. brevicorne* Fallén e distinto da *A. friesei* (Viitasaari, 1990).

Cimbicidae

Zaraea Leach, 1817

- Zaraea aenea* (Klug, 1829) (N, S)
- Zaraea aurulenta* (Sichel, 1856) (N, S)
- Zaraea fasciata* (Linnaeus, 1758) (N)
- Zaraea lonicerae* (Linnaeus, 1758) (N, S)
- Zaraea mutica* (Thomson, 1871) (N)

Abia Leach, 1817

- Abia candens* Konow, 1887 (N)
- Abia fulgens* Zaddach, 1863 (N)
- Abia nitens* (Linnaeus, 1758) (N, S)
- Abia sericea* (Linnaeus, 1767) (N, S, Si, Sa?)

Palaeocimbex Semenov Tianshanskij, 1935

- Palaeocimbex quadrimaculatus* (O.F. Müller, 1766) (N, S)

Cimbex Olivier, 1790

- Cimbex connatus* (Schrank, 1776) (N, S)
- Cimbex fagi* Zaddach, 1863 (N)
- Cimbex femoratus* (Linnaeus, 1758) (N, S)
- Cimbex luteus* (Linnaeus, 1758) (N, S)

Trichiosoma Leach, 1817

- Trichiosoma lucorum* (Linnaeus, 1758) (N)
- Trichiosoma sorbi* Hartig, 1840 (N)
- Trichiosoma sylvaticum* Leach, 1817 (N)
- Trichiosoma tibiale* Stephens, 1835 (N)
- Trichiosoma vitellinae* (Linnaeus, 1761) (N)

Pseudoclavellaria Schulz, 1906

- Pseudoclavellaria amerinae* (Linnaeus, 1758) (N, S)

Corynis Thunberg, 1789

- Corynis crassicornis* (Rossi, 1790) (N, S, Si)
- Corynis italica* (Lepeletier, 1823) (N, S)
- Corynis obscura* (Fabricius, 1775) (N, S, Si)

Diprionidae

Monoctenus Dahlbom, 1835

Monoctenus juniperi (Linnaeus, 1758) (N, S)

Monoctenus obscuratus (Hartig, 1837) (N)

Microdiprion Enslin, 1917

Microdiprion pallipes (Fallén, 1808) (N)

Neodiprion Rohwer, 1918

Neodiprion sertifer (Geoffroy, 1785) (N, S)

Diprion Schrank, 1802

Diprion pini (Linnaeus, 1758) (N, S, Sa)

Diprion similis (Hartig, 1834) (N)

Gilpinia Benson, 1939

Gilpinia abieticola (Dalla Torre, 1894) (N)

Gilpinia frutetorum (Fabricius, 1793) (N, S)

Gilpinia hercyniae (Hartig, 1837) (N)

Gilpinia laricis (Jurine, 1807) (N)

Gilpinia pallida (Klug, 1812) (N)

Gilpinia polytoma (Hartig, 1834) (N, S)

Gilpinia socia (Klug, 1812) (N, S)

Gilpinia variegata (Hartig, 1834) (N, S)

Gilpinia virens (Klug, 1812) (N)

Macrodiprion Enslin, 1917

Macrodiprion nemorum (Fabricius, 1793) (N)

Tenthredinidae

Strongylogaster Dahlbom, 1835

Strongylogaster desbrochersi Konow, 1891 (Si)

Strongylogaster filicis (Klug, 1814) (N)

Strongylogaster lineata (Christ, 1791) (N, S, Sa)

Strongylogaster macula (Klug, 1814) (N, S)

Strongylogaster mixta (Klug, 1814) (N)

Strongylogaster xanthocera (Stephens, 1835) (S)

Strombocerina Malaise, 1942

Strombocerina delicatula (Fallén, 1808) (N, S)

Aneugmenus Hartig, 1837

Aneugmenus bibolinii Zombori, 1979 (Sa) (E)

Aneugmenus coronatus (Klug, 1814) (N, S)

Aneugmenus padi (Linnaeus, 1761) (N, S, Si, Sa)

Aneugmenus temporalis (Thomson, 1871) (N)

Birka Malaise, 1944

Birka cinereipes (Klug, 1814) (N, S)

Nesoselandria Rohwer, 1910

Nesoselandria morio (Fabricius, 1781) (N, S)

Selandria Leach, 1817

Selandria serva (Fabricius, 1793)

Selandria serva fuscitarsis Benson, 1954 (N) (E)

Selandria serva serva (Fabricius, 1793) (N, S)

Selandria sixii Vollenhoven, 1858 (N)

Brachytrops Haliday, 1839

Brachytrops flavens (Klug, 1814) (N)

Heptamelus Haliday, 1855

Heptamelus ochroleucus (Stephens, 1835) (N)

Dolerus Panzer, 1801

Dolerus aeneus Hartig, 1837 (N, S)

Dolerus aericeps Thomson, 1871 (N, S)

Dolerus alpinus Benson, 1947 (N)

Dolerus anthracinus (Klug, 1814) (N, S)

Dolerus anticus (Klug, 1814) (N)

Dolerus bimaculatus (Geoffroy, 1785) (N)

Dolerus coracinus (Klug, 1814) (N)

Dolerus cothurnatus Lepeletier, 1823 (N)

Dolerus docilus Benson, 1956 (N)

Dolerus eversmanni (Kirby, 1882) (N, S)

Dolerus ferrugatus Lepeletier, 1823 (N, S)

Dolerus frigidus Benson, 1965 (N)
Dolerus germanicus (Fabricius, 1775)
 Dolerus germanicus etruscus (Klug, 1814) (N, S, Si)
 Dolerus germanicus germanicus (Fabricius, 1775) (N)
Dolerus gessneri André, 1880 (N)
Dolerus gibbosus Hartig, 1837 (N, S)
Dolerus gonager (Fabricius, 1781) (N, S)
Dolerus haematodes (Schränk, 1781) (N, S)
Dolerus madidus (Klug, 1814) (N)
Dolerus megapterus Cameron, 1881 (N, S)
Dolerus melanopterus Konow, 1888 (N?) (*)
Dolerus niger (Linnaeus, 1767) (N, S)
Dolerus nigratus (Müller, 1776)
 Dolerus nigratus rufotorquatus A. Costa, 1864 (N, S)
Dolerus nitens Zaddach, 1859 (N)
Dolerus picipes (Klug, 1814) (N, S)
Dolerus planatus Hartig, 1837 (N)
Dolerus pratensis (Linnaeus, 1758) (N, S)
Dolerus pratorum (Fallén, 1808) (*)
Dolerus puncticollis Thomson, 1871 (N, S)
Dolerus romanus Benson, 1954 (N) (E)
Dolerus sanguinicollis (Klug, 1814) (N, S)
Dolerus taeniatus Zaddach, 1859 (N)
Dolerus triplicatus (Klug, 1814)
 Dolerus triplicatus steini Konow, 1885 (N, S, Si)
Dolerus uliginosus (Klug, 1814) (N?)
Dolerus vernalis Ermolenko, 1964 (N)
Dolerus vestigialis (Klug, 1814) (N, S)
Dolerus yukonensis (Norton, 1872) (N?)

Perineura Hartig, 1837

Perineura rubi (Panzer, 1805) (N)

Aglaostigma Kirby, 1882

Aglaostigma aucupariae (Klug, 1814) (N, S)
Aglaostigma discolor (Klug, 1814) (N)
Aglaostigma fulvipes (Scopoli, 1763) (N, S)
Aglaostigma pingue (Klug, 1814) (N)

Tenthredopsis O.G.Costa, 1859

Tenthredopsis austriaca Konow, 1890 (N, S)
Tenthredopsis coqueberti (Klug, 1814) (N)
Tenthredopsis corcyrensis (André, 1881) (S)
Tenthredopsis crassiuscula A. Costa, 1894 (S)
Tenthredopsis dubia Konow, 1890 (N, S)

Tenthredopsis excisa (Thomson, 1870) (N, S)
Tenthredopsis flavomaculata Cameron, 1881 (N?)
Tenthredopsis floricola O.G. Costa, 1859 (N, S)
Tenthredopsis friesei Konow, 1887 (N, S)
Tenthredopsis inornata Cameron, 1881 (N, S)
Tenthredopsis litterata (Geoffroy, 1785) (N, S)
Tenthredopsis nassata (Linnaeus, 1767) (N, S, Si?)
Tenthredopsis nebrodensis A. Costa, 1894 (N?, Si) (E)
Tenthredopsis palmata (Geoffroy, 1785) (N, S, Si?)
Tenthredopsis sordida (Klug, 1814) (N, S)
Tenthredopsis stigma (Fabricius, 1798) (N, S)
Tenthredopsis tessellata (Klug, 1814) (N, S)
Tenthredopsis thornleyi Konow, 1899 (S)
Tenthredopsis tischbeini (Mocsáry, 1876) (N)

***Rhogogaster* Konow, 1884**

Rhogogaster chambersi Benson, 1947 (N)
Rhogogaster dryas (Benson, 1943) (N)
Rhogogaster genistae Benson, 1949 (N)
Rhogogaster picta (Klug, 1814) (N, S)
Rhogogaster punctulata (Klug, 1814) (N, S)
Rhogogaster scalaris (Klug, 1814) (N)
Rhogogaster viridis (Linnaeus, 1758) (N, S)

***Tenthredo* Linnaeus, 1758**

Tenthredo albicornis Fabricius, 1781 (N, S)
Tenthredo albiventris (Mocsáry, 1880)
 Tenthredo albiventris picena F. Pesarini, 1989 (S) (E)
Tenthredo algoviensis Enslin, 1912 (N)
Tenthredo amoena Gravenhorst, 1807 (N, S)
Tenthredo arcuata Forster, 1771 (N, S?) (*)
Tenthredo atra Linnaeus, 1758 (N, S)
Tenthredo balteata Klug, 1814 (N, S)
Tenthredo bifasciata O.F. Müller, 1766
 Tenthredo bifasciata bifasciata O.F. Müller, 1766 (N, S, Si)
 Tenthredo bifasciata rossii (Panzer, 1805) (N, S)
 Tenthredo bifasciata violacea (André, 1881) (N)
Tenthredo bipunctula Klug, 1814 (N)
Tenthredo brevicornis (Konow, 1886) (N, S)
Tenthredo campestris Linnaeus, 1758 (N, S)
Tenthredo colon Klug, 1814 (N, S)
Tenthredo costata Klug, 1814 (N, S)
Tenthredo cunyi Konow, 1886 (N)
Tenthredo diana Benson, 1968 (N, S)
Tenthredo distinguenda Stein, 1885 (N, S, Si)
Tenthredo fagi Panzer, 1798 (N, S)

Tenthredo ferruginea Schrank, 1776 (N, S)
Tenthredo funerea (Palma, 1861) (E) (*)
Tenthredo ignobilis Klug, 1814 (N)
Tenthredo livida Linnaeus, 1758 (N, S, Si?)
Tenthredo maculata Geoffroy, 1762 (N, S)
Tenthredo mandibularis Fabricius, 1804 (N, S)
Tenthredo marginella Fabricius, 1793 (N, S)
Tenthredo meridiana Lepeletier, 1823 (*)
Tenthredo mesomela Linnaeus, 1758 (N, S)
Tenthredo mioceras Enslin, 1912 (N)
Tenthredo moniliata Klug, 1814 (N, S)
Tenthredo notha Klug, 1814 (N, S?)
Tenthredo obsoleta Klug, 1814 (N, S)
Tenthredo olivacea Klug, 1814 (N, S, Si?)
Tenthredo omissa Förster, 1844 (N, S)
Tenthredo procera Klug, 1814 (N)
Tenthredo propinqua Klug, 1814 (N)
Tenthredo pseudorossii Taeger, 1984 (N)
Tenthredo rubricoxis (Enslin, 1912) (N, S)
Tenthredo schaefferi Klug, 1814 (N, S)
Tenthredo scrophulariae Linnaeus, 1758 (N, S, Si)
Tenthredo segmentaria Fabricius, 1798 (N)
Tenthredo silensis O.G. Costa, 1859 (N, S)
Tenthredo solitaria Scopoli, 1763 (N, S)
Tenthredo temula Scopoli, 1763
 Tenthredo temula celtica Benson, 1953 (N, S)
 Tenthredo temula temula Scopoli, 1763 (N)
Tenthredo thompsoni (Curtis, 1839) (N, S)
Tenthredo trabeata Klug, 1814 (N, S)
Tenthredo umbrica Benson, 1959 (S) (E)
Tenthredo velox Fabricius, 1798 (Si?)
Tenthredo vespa Retzius, 1783 (N, S)
Tenthredo vespiformis Schrank, 1781 (N, S)
Tenthredo zona Klug, 1814 (N, S, Si?)
Tenthredo zonula Klug, 1814 (N, S)

Paratenthredo Taeger, 1991

Paratenthredo frauenfeldii (Giraud, 1857)
 Paratenthredo frauenfeldii frauenfeldii (Giraud, 1857) (N)
 Paratenthredo frauenfeldii montana (De Stefani, 1883) (N?, S, Si) (E)
Paratenthredo giraudi Taeger, 1991 (N)
Paratenthredo monozona (Kriechbaumer, 1869) (N)

Elinora Benson, 1946

Elinora koehleri (Klug, 1814) (N, S)

Sciapteryx Stephens, 1835

- Sciapteryx consobrina* (Klug, 1814) (N, S)
- Sciapteryx costalis* (Fabricius, 1775) (N, S?)
- Sciapteryx soror* Konow, 1890 (N)

Pachyprotasis Hartig, 1837

- Pachyprotasis antennata* (Klug, 1814) (N, S?)
- Pachyprotasis rapae* (Linnaeus, 1767) (N, S)
- Pachyprotasis simulans* (Klug, 1814) (N, S)
- Pachyprotasis variegata* (Fallén, 1808) (N)

Macrophya Dahlbom, 1835

- Macrophya albicincta* (Schrank, 1776) (N, S, Si)
- Macrophya albipuncta* (Fallén, 1808) (N, S)
- Macrophya alboannulata* O.G. Costa, 1859 (N, S, Si)
- Macrophya annulata* (Geoffroy, 1785) (N, S, Si)
- Macrophya blanda* (Fabricius, 1775) (N, S)
- Macrophya carinthiaca* (Klug, 1814) (N)
- Macrophya crassula* (Klug, 1814) (N, S)
- Macrophya diversipes* (Schrank, 1782) (N, S)
- Macrophya duodecimpunctata* (Linnaeus, 1758) (N, S)
- Macrophya erythrocnema* O.G. Costa, 1859 (N, S)
- Macrophya militaris* (Klug, 1814) (N, S)
- Macrophya montana* (Scopoli, 1763) (N, S, Si)
- Macrophya parvula* Konow, 1884 (N)
- Macrophya punctumalbum* (Linnaeus, 1767) (N, S, Si)
- Macrophya recognata* Zombori, 1979 (N)
- Macrophya ribis* (Schrank, 1781) (N, S, Si)
- Macrophya rufipes* (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)
- Macrophya rufopicta* Enslein, 1910 (N)
- Macrophya sanguinolenta* (Gmelin, 1790) (N, S)
- Macrophya superba* Tischbein, 1852 (N)
- Macrophya teutona* (Panzer, 1799) (N, Si?)

Eriocampa Hartig, 1837

- Eriocampa ovata* (Linnaeus, 1761) (N, S, Si)
- Eriocampa umbratica* (Klug, 1814) (N, S)

Siobla Cameron, 1877

- Siobla sturmi* (Klug, 1814) (N)

Harpiphorus Hartig, 1837

Harpiphorus lepidus (Klug, 1814) (N, S)

Empria Lepeletier, 1825

Empria alector Benson, 1938 (N)
Empria baltica Conde, 1937 (N)
Empria candidata (Fallén, 1807) (N?)
Empria excisa (Thomson, 1871) (N, S)
Empria gussakovskii Dovnar-Zapolskij, 1929
Empria gussakovskii alpina Benson, 1938 (N)
Empria hungarica (Konow, 1895) (N)
Empria immersa (Klug, 1814) (N)
Empria klugii (Stephens, 1835) (N, S)
Empria liturata (Gmelin, 1790) (N, S)
Empria longicornis (Thomson, 1871) (N, S)
Empria parvula (Konow, 1884) (N, S)
Empria pumila (Konow, 1896) (N)
Empria tirolensis Enslin, 1914 (N, S)
Empria tridens (Konow, 1896) (N)

Monosoma MacGillivray, 1908

Monosoma pulveratum (Retzius, 1783) (N, S)

Monostegia O.G. Costa, 1859

Monostegia abdominalis (Fabricius, 1798) (N, S)

Ametastegia A. Costa, 1882

Ametastegia albipes (Thomson, 1871) (N)
Ametastegia carpini (Hartig, 1837) (N, S)
Ametastegia equiseti (Fallén, 1808) (N, S)
Ametastegia glabrata (Fallén, 1808) (N, S, Sa)
Ametastegia lacteilabris (A. Costa, 1894) (N)
Ametastegia pallipes (Spinola, 1808) (N, S)
Ametastegia perla (Klug, 1814) (N)
Ametastegia tenera (Fallén, 1808) (N, Si)

Allantus Panzer, 1801

Allantus togatus Panzer, 1801 (N)
Allantus viennensis (Schränk, 1781) (N, S, Si)

Emphytus Klug, 1816

Emphytus balteatus (Klug, 1814) (N, S)
Emphytus basalis (Klug, 1814) (N, S)

Emphytus calceatus (Klug, 1814) (N, S, Sa)
Emphytus cinctus (Linnaeus, 1758) (N, S)
Emphytus cingulatus (Scopoli, 1763) (N, S, Si, Sa)
Emphytus coxalis (Klug, 1814) (*)
Emphytus didymus (Klug, 1814) (N, S, Sa)
Emphytus melanarius (Klug, 1814) (N, S)
Emphytus rufocinctus (Retzius, 1783) (N, S)
Emphytus truncatus (Klug, 1814) (N)
Emphytus xanthopygus (Klug, 1814) (N)

Taxonus Dahlbom, 1835

Taxonus agrorum (Fallén, 1808) (N, S)
Taxonus sticticus (Klug, 1814) (N)

Apethymus Benson, 1939

Apethymus filiformis (Klug, 1814) (N)
Apethymus serotinus (O.F. Müller, 1776) (N, S)
Apethymus ustus (Klug, 1814) (S)

Athalia Leach, 1817

Athalia bicolor Lepeletier, 1823 (N, S, Si?)
Athalia circularis (Klug, 1813) (N, S, Si, Sa)
Athalia cordata Lepeletier, 1823 (N, S, Sa)
Athalia cornubiae Benson, 1931 (N, S)
Athalia doderoi Zombori, 1979 (N)
Athalia glabricollis Thomson, 1870 (N, S, Si, Sa)
Athalia liberta (Klug, 1813) (N, S, Sa)
Athalia lugens (Klug, 1813) (N, S)
Athalia paradoxa Konow, 1886 (N)
Athalia rosae (Linnaeus, 1758) (N, S, Sa)
Athalia rufoscutellata Mocsáry, 1879 (N, S)
Athalia scutellariae Cameron, 1880 (N)

Hoplocampoides Enslin, 1914

Hoplocampoides xylostei (Giraud, 1873) (N?) (*)

Tomostethus Konow, 1886

Tomostethus melanopygius (O.G. Costa, 1859) (N, S, Si) (E)
Tomostethus nigrinus (Fabricius, 1804) (N, S)

Phymatocera Dahlbom, 1835

Phymatocera aterrima (Klug, 1814) (N, S)

Paracharactus MacGillivray, 1908

Paracharactus gracilicornis (Zaddach, 1859) (N)
Paracharactus hyalinus (Konow, 1886) (N, S)

Eurhadinoceraea Enslin, 1919

Eurhadinoceraea amauros Zombori, 1977 (N) (E)
Eurhadinoceraea fulviventris (Scopoli, 1763) (N)
Eurhadinoceraea ventralis (Panzer, 1799) (N, S)

Rhadinoceraea Konow, 1886

Rhadinoceraea micans (Klug, 1814) (N, S)
Rhadinoceraea nodicornis Konow, 1906 (N, S)
Rhadinoceraea reitteri Konow, 1890 (N)

Monophadnus Hartig, 1837

Monophadnus longicornis (Hartig, 1837) (N, S)
Monophadnus monticola (Hartig, 1837) (N, S)
Monophadnus pallescens (Gmelin, 1790) (N, S)
Monophadnus spinolae (Klug, 1814) (N, S)

Stethomostus Benson, 1952

Stethomostus fuliginosus (Schränk, 1781) (N, S)

Eutomostethus Enslin, 1914

Eutomostethus ephippium (Panzer, 1798) (N, S)
Eutomostethus gagathinus (Klug, 1814) (N, S, Si)
Eutomostethus luteiventris (Klug, 1814) (N, S)
Eutomostethus punctatus (Konow, 1887) (N)

Blennocampa Hartig, 1837

Blennocampa phyllocolpa Viitasaari & Vikberg, 1985 (N, S)

Ardis Konow, 1886

Ardis brunniventris (Hartig, 1837) (N?, S)
Ardis sulcata (Cameron, 1882) (N, S)

Monardis Enslin, 1914

Monardis plana (Klug, 1814) (N)

Periclista Konow, 1886

- Periclista albida* (Klug, 1814) (N, S)
- Periclista albiventris* (Klug, 1814) (N, S)
- Periclista lineolata* (Klug, 1814) (N, S)

Monophadnoides Ashmead, 1898

- Monophadnoides rubi* (Harris, 1845) (N, S)
- Monophadnoides ruficruris* (Brullé, 1832) (N, S)

Claremontia Rohwer, 1909

- Claremontia alternipes* (Klug, 1814) (N, S)
- Claremontia confusa* (Konow, 1886) (N, S, Sa)
- Claremontia tenuicornis* (Klug, 1814) (N, S?)
- Claremontia uncta* (Klug, 1814) (S?) (*)
- Claremontia waldheimii* (Gimmerthal, 1847) (N, S)

Pareophora Konow, 1886

- Pareophora pruni* (Linnaeus, 1758) (N, S)

Eupareophora Enslin, 1914

- Eupareophora monticola* (Thomson, 1870) (N?)

Cladardis Benson, 1952

- Cladardis bordonii* Zombori, 1976 (N) (E)
- Cladardis elongatula* (Klug, 1814) (N, S)

Halidamia Benson, 1952

- Halidamia affinis* (Fallén, 1807) (N, S, Sa)

Endelomyia Ashmead, 1898

- Endelomyia aethiops* (Fabricius, 1781) (N, S, Sa)

Caliroa O.G. Costa, 1859

- Caliroa annulipes* (Klug, 1814) (N, S)
- Caliroa cerasi* (Linnaeus, 1758) (N, S)
- Caliroa cinxia* (Klug, 1814) (N)
- Caliroa tremulae* Chevin, 1974 (N)
- Caliroa varipes* (Klug, 1814) (N, S)

Heterarthrus Stephens, 1835

Heterarthrus aceris (Kaltenbach, 1856) (N)
Heterarthrus fumipennis (Cameron, 1888) (N)
Heterarthrus leucomelus (Klug, 1814) (N?)
Heterarthrus microcephalus (Klug, 1814) (N, S)
Heterarthrus nemoratus (Fallén, 1808) (N?)
Heterarthrus ochropodus (Klug, 1814) (N)
Heterarthrus vagans (Fallén, 1808) (N, S)

Metallus Forbes, 1885

Metallus pumilus (Klug, 1814) (N, S)

Messa Leach, 1817

Messa hortulana (Klug, 1814) (N, Si)

Profenusa MacGillivray, 1914

Profenusa pygmaea (Klug, 1814) (N, S)

Scolioneura Konow, 1890

Scolioneura betuleti (Klug, 1814) (N)
Scolioneura tirolensis Enslin, 1914 (N)

Fenusa Leach, 1817

Fenusa dohrnii (Tischbein, 1846) (N, S)
Fenusa pusilla (Lepeletier, 1823) (N, S)
Fenusa ulmi Sundevall, 1844 (N, S)

Fenella Westwood, 1840

Fenella monilicornis Thomson, 1871 (N)
Fenella nigrita Westwood, 1840 (N, S)

Parna Benson, 1936

Parna tenella (Klug, 1814) (S)

Hinatara Benson, 1936

Hinatara recta (Thomson, 1871) (N?)

Silliana Malaise, 1949

Silliana lhommei (Hering, 1934) (S, Si, Sa)

Cladius Illiger, 1807

Cladius difformis (Panzer, 1799) (N, S)

Cladius pectinicornis (Geoffroy, 1785) (N, S?)

Priophorus Dahlbom, 1835

Priophorus morio (Lepeletier, 1835) (N, S)

Priophorus pallipes (Lepeletier, 1823) (N, S)

Trichiocampus Hartig, 1837

Trichiocampus pilicornis (Curtis, 1833) (N)

Trichiocampus rufipes (Lepeletier, 1823) (N, S?)

Trichiocampus ulmi (Linnaeus, 1758) (N) (*)

Trichiocampus viminalis (Fallén, 1808) (N, S)

Hoplocampa Hartig, 1837

Hoplocampa alpina (Zetterstedt, 1838) (N, S)

Hoplocampa ariae Benson, 1934 (S)

Hoplocampa brevis (Klug, 1814) (N, S, Si)

Hoplocampa chamaespili Masutti & Covassi, 1980 (N)

Hoplocampa chrysorrhoea (Klug, 1814) (N, S)

Hoplocampa crataegi (Klug, 1814) (N, S, Si, Sa)

Hoplocampa flava (Linnaeus, 1761) (N, S)

Hoplocampa minuta (Christ, 1791) (N, S)

Hoplocampa pectoralis Thomson, 1871 (N, S)

Hoplocampa plagiata (Klug, 1814) (N, S)

Hoplocampa rutilicornis (Klug, 1814) (N, S)

Hoplocampa testudinea (Klug, 1814) (N, S)

Hemichroa Stephens, 1835

Hemichroa australis (Lepeletier, 1823) (N)

Hemichroa crocea (Geoffroy, 1785) (N, S)

Platycampus Schiödte, 1839

Platycampus luridiventris (Fallén, 1808) (N)

Anoplonyx Marlatt, 1896

Anoplonyx destructor Benson, 1952 (N)

Anoplonyx ovatus (Zaddach, 1883) (N)

Anoplonyx pectoralis (Lepeletier, 1823) (N)

Dineura Dahlbom, 1835

Dineura stilata (Klug, 1814) (N)

Dineura virididorsata (Retzius, 1783) (N)

Mesoneura Hartig, 1837

Mesoneura opaca (Fabricius, 1775) (N)

Nematinus Rohwer, 1911

Nematinus fuscipennis (Lepeletier, 1823) (N, S)

Nematinus luteus (Panzer, 1805) (N, S)

Nematinus willigkiae (Stein, 1926) (N)

Pachynematus Konow, 1890

Pachynematus albipennis (Hartig, 1837) (N, S)

Pachynematus apicalis (Hartig, 1837) (N)

Pachynematus clitellatus (Lepeletier, 1823) (*)

Pachynematus imperfectus (Zaddach, 1875) (N)

Pachynematus montanus (Zaddach, 1882) (N)

Pachynematus nigerrimus Konow, 1904 (N)

Pachynematus nigriceps (Hartig, 1840) (N)

Pachynematus obductus (Hartig, 1837) (N)

Pachynematus rumicis (Linnaeus, 1758) (N)

Pachynematus scutellatus (Hartig, 1837) (N)

Pachynematus vagus (Fabricius, 1781) (N)

Pachynematus xanthocarpus (Hartig, 1840) (N)

Stauronematus Benson, 1953

Stauronematus compressicornis (Fabricius, 1804) (N, S) (*)

Pristiphora Latreille, 1810

Pristiphora abbreviata (Hartig, 1837) (N, S?)

Pristiphora abietina (Christ, 1791) (N, S)

Pristiphora albitibia (O.G. Costa, 1860) (S) (*)

Pristiphora ambigua (Fallén, 1808) (N) (*)

Pristiphora amphibola (Förster, 1854) (N)

Pristiphora biscalis (Förster, 1854) (N, S)

Pristiphora carinata (Hartig, 1837) (N)

Pristiphora compressa (Hartig, 1837) (N)

Pristiphora conjugata (Dahlbom, 1835) (N, S)

Pristiphora crassicornis (Hartig, 1837) (N)

Pristiphora denudata (Konow, 1904) (N) (*)
Pristiphora erichsonii (Hartig, 1837) (N)
Pristiphora friesei (Konow, 1904) (N)
Pristiphora fulvipes (Fallén, 1808) (N, S, Sa?) (*)
Pristiphora geniculata (Hartig, 1840) (N)
Pristiphora glaphyropus (Dalla Torre, 1882) (N)
Pristiphora laricis (Hartig, 1837) (N)
Pristiphora leucopodia (Hartig, 1837) (S?) (*)
Pristiphora maesta (Zaddach, 1875) (N)
Pristiphora melanocarpa (Hartig, 1840) (N)
Pristiphora mollis (Hartig, 1837) (N) (*)
Pristiphora monogyniae (Hartig, 1840) (N)
Pristiphora paedida (Konow, 1904) (S) (*)
Pristiphora pallidiventrif (Fallén, 1808) (N, S, Sa)
Pristiphora parva (Hartig, 1837) (N)
Pristiphora punctifrons (Thomson, 1871) (N, S)
Pristiphora quercus (Hartig, 1837) (N) (*)
Pristiphora ruficornis (Olivier, 1811) (N)
Pristiphora rufipes (Lepeletier, 1823) (N)
Pristiphora sardiniensis (A. Costa, 1886) (Sa) (*)
Pristiphora saxesenii (Hartig, 1837) (N)
Pristiphora staudingeri (Ruthe, 1859) (N) (*)
Pristiphora subbifida (Thomson, 1871) (N, S)
Pristiphora tetrica (Zaddach, 1882) (N)
Pristiphora thalictri (Kriechbaumer, 1884) (N, S)

Croesus Leach, 1817

Croesus latipes (Villaret, 1832) (N, S?)
Croesus septentrionalis (Linnaeus, 1758) (N, S, Sa)
Croesus varus (Villaret, 1832) (N)

Nematus Panzer, 1801

Nematus bergmanni Dahlbom, 1835 (N)
Nematus bipartitus Lepeletier, 1823 (N)
Nematus cadderensis Cameron, 1875 (N?)
Nematus caeruleocarpus Hartig, 1837 (N, S)
Nematus capreae (Linnaeus, 1758) (N, S?)
Nematus fagi Zaddach, 1882 (N)
Nematus ferrugineus Förster, 1854 (N)
Nematus fuscomaulatus Förster, 1854 (N)
Nematus hypoxanthus Förster, 1854 (N)
Nematus incompletus Förster, 1854 (N)
Nematus leucotrochus Hartig, 1837 (N)
Nematus lucidus (Panzer, 1801) (N, S)
Nematus melanaspis Hartig, 1840 (N)
Nematus melanocephalus Hartig, 1837 (N)

Nematus myosotidis (Fabricius, 1804) (N, S)
Nematus nigricornis Lepeletier, 1823 (N)
Nematus pavidus Lepeletier, 1823 (N, S?)
Nematus ribesii (Scopoli, 1763) (N)
Nematus salicis (Linnaeus, 1758) (N)
Nematus similator (Förster, 1854) (N)
Nematus sulcipes Hartig, 1837 (S?)
Nematus tibialis Newman, 1837 (N)
Nematus togatus Zaddach, 1882 (N?)
Nematus umbratus Thomson, 1871 (N)
Nematus viridescens Cameron, 1885 (N) (*)
Nematus viridis Stephens, 1835 (N)
Nematus viridissimus Möller, 1882 (N)
Nematus wahlbergi Thomson, 1871 (S)

Nepionema Benson, 1960

Nepionema helveticum Benson, 1960 (N)

Pontania O.G. Costa, 1859

Pontania bella (Zaddach, 1884) (N)
Pontania collactanea (Förster, 1854) (S)
Pontania dolichura (Thomson, 1871) (N?)
Pontania gallarum (Hartig, 1837) (N)
Pontania leucaspis (Tischbein, 1846) (N)
Pontania leucosticta (Hartig, 1837) (N)
Pontania montivaga Kopelke, 1991 (N)
Pontania pedunculi (Hartig, 1837) (N)
Pontania proxima (Lepeletier, 1823) (N, S?, Si?, Sa?)
Pontania purpureae (Cameron, 1884) (N)
Pontania reticulatae Malaise, 1920 (N)
Pontania retusae Benson, 1960 (N)
Pontania vesicator (Bremi, 1849) (N)
Pontania viminalis (Linnaeus, 1758) (N, S) (*)

Euura Newman, 1837

Euura amerinae (Linnaeus, 1758) (N)
Euura atra (Jurine, 1807) (N)
Euura mucronata (Hartig, 1840) (N, Si?)
Euura venusta (Zaddach, 1883) (N)

Amauronematus Konow, 1890

Amauronematus alpicola Konow, 1895 (N) (*)
Amauronematus amplus Konow, 1895 (N)
Amauronematus fallax (Lepeletier, 1823) (N)

Amauronematus histrio (Lepeletier, 1823) (N)
Amauronematus humeralis (Lepeletier, 1823) (N)
Amauronematus lateralis Konow, 1895 (N)
Amauronematus viduatus (Zetterstedt, 1838) (N)
Amauronematus vittatus (Lepeletier, 1823) (N)

***Pseudodineura* Konow, 1885**

Pseudodineura fuscula (Klug, 1814) (N, S)
Pseudodineura heringi (Enslin, 1921) (N)
Pseudodineura scaligera Zombori, 1978 (N)

Note

Dolerus melanopterus: L'unico dato di letteratura forse attribuibile a *D. melanopterus* riguarda un *Dolerus melanotus* Konow, taxon inesistente.

Dolerus pratorum: Riportato genericamente d'Italia, senza più precise indicazioni.

Tenthredopsis: Il genere *Tenthredopsis* attende da tempo uno studio critico approfondito. In base a revisioni tanto drastiche nelle conclusioni quanto sommariamente argomentate, delle specie elencate solo una mezza dozzina sarebbero da ritenersi valide, ciò che rappresenta sicuramente una eccessiva semplificazione dell'intricato problema. Pur non potendo esprimermi sulla validità o meno delle singole specie, ho ritenuto opportuno riportare tutti quei taxa la cui validità è accreditata, seppur parzialmente, nella letteratura recente.

Tenthredo arcuata: I molti dati geonemici, anche recenti, di *T. arcuata* andrebbero rivisti criticamente. La specie è sicuramente presente, comunque, lungo tutto l'arco alpino.

Tenthredo funerea: Specie di identità dubbia, mai più segnalata dai tempi della sua descrizione.

Tenthredo meridiana: Segnalata come italiana da Costa (1894) senza più precise indicazioni.

Emphytus coxalis: Citata da Enslin (1914) d'Italia senza ulteriori indicazioni.

Hoplocampoides xylostei: L'unico reperto italiano di *Hoplocampoides*, un esemplare maschio, non è attribuibile con certezza a *H. xylostei* in quanto di quest'ultima è nota solo la femmina.

Claremontia uncta: Specie nota genericamente d'Italia, senza più precise indicazioni. Il vecchio reperto di Berlese (1890) relativo alla Toscana (Firenze) potrebbe riferirsi a *C. tenuicornis* (Klug), specie con cui *C. uncta* è stata per lungo tempo confusa.

Trichiocampus ulmi: Verosimilmente confuso spesso con *T. rufipes* Lepeletier.

Pachynematus: *Pikonema* comprende specie accomunate da caratteri morfologici e dall'evolversi su conifere.

Pachynematus clitellatus: Zombori (1979) lo dà nuovo per l'Italia, senza poter indicare la località. Faggioli (1933) lo cita di Legnago (VR) come var. *trisignatus* Förster, che Viitasaari & Vikberg (1985) considerano specie a sé stante.

Stauronematus compressicornis: La sinonimia, oggi accettata, fu discussa, non senza validi argomenti, dallo stesso A. Costa (1894).

Pristiphora albitibia: La sinonimia, oggi a favore di *P. puncticeps* Thomson, fu controllata da A. Costa (1894) e riconosciuta da Lindqvist (1953).

Pristiphora ambigua: Sinonimo di *nigella* Förster, 1854, secondo Viitasaari & Vikberg (1985).

Pristiphora denudata: Sinonimo di *pallidiventris* Fallén, 1808, per Lacourt (1987).

Pristiphora fulvipes: Sinonimo di *vicina* Lepeletier, 1823, secondo Viitasaari & Vikberg (1985); è incerta la presenza in Sardegna per la sinonimia, dichiarata da A. Costa (1894), ma oggi

improponibile, con *P. alnivora* Hartig, 1840.

Pristiphora leucopodia: Presenza assai dubbia "nelle provincie napoletane" (A. Costa, 1894) (la larva vive su picea).

Pristiphora mollis: La sinonimia non è accolta da Muche (1974).

Pristiphora paedida: Sinonimo di *laricis* Hartig, 1837, per Koch (1989).

Pristiphora quercus: Sinonimo di *cincta* Newman, 1837, per Viitasaari & Vikberg (1985).

Pristiphora sardiniensis: Species inquirenda; la sinonimia con *glaphyropus* (Muche, 1974) non convince, se non altro perché la descrizione di A. Costa è riferita ad un maschio, mentre il maschio di *glaphyropus* è dato per "unbekannt". Si sovrappone qui inoltre il problema dell'identità di *P. oblita* A. Costa, 1894.

Pristiphora staudingeri: Articoalpina, legata a salici nani di ambienti boreali e altomontani, è stata citata in modo non credibile di Calabria, verosimilmente per la sinonimia, codificata da Enslin (1916), ma smentita da Lindqvist (1953), con *albitibia* O.G. Costa.

Croesus: Il "Nomenclator animalium generum et subgenerum", II (1929), ritiene valida la grafia *Craesus*.

Nematus viridescens: Sinonimo di *poecilonotus* Zaddach secondo Viitasaari & Vikberg (1985).

Nepionema: Zombori (1985) ascrive il genere alle Blennocampine; qui si reputa prudente mantenere l'originaria collocazione di Benson, suffragata da C. Pesarini & F. Pesarini (1988).

Pontania viminalis: Sotto il nome di *P. crassipes* Thomson Benes (1967) indicò genericamente d'Italia l'attualmente valida *P. herbaceae* Cameron, 1875, ma (in litteris) non seppe precisare alcun luogo.

Amauronematus alpicola: Sinonimo di *taeniatus* Lepeletier, 1823 secondo Viitasaari & Vikberg (1985).

Trigonalyidae

Pseudogonalos Schulz, 1906

Pseudogonalos hahnii (Spinola, 1840) (N)

Aulacidae

Aulacus Jurine, 1807

Aulacus striatus Jurine, 1807 (N)

Pristaulacus Kieffer, 1900

Pristaulacus chlapowskii Kieffer, 1900 (N)

Pristaulacus compressus (Spinola, 1808) (N, S)

Pristaulacus galitae (Gribodo, 1879) (S, Sa)

Pristaulacus gloriator (Fabricius, 1804) (N, S)

Gasteruptionidae

Gasteruption Latreille, 1796

Gasteruption assectator (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)
Gasteruption diversipes (Abeille, 1879) (N, S, Si, Sa)
Gasteruption erythrostomum (Dahlbom, 1844) (N, S, Si)
Gasteruption floreum (Szepligeti, 1903) (N, S)
Gasteruption forticorne Semenov, 1892 (N, S, Si)
Gasteruption frey (Tournier, 1877) (N, S)
Gasteruption goberti (Tournier, 1877) (N)
Gasteruption hastator (Fabricius, 1804) (N, S, Si, Sa)
Gasteruption jaculator (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
Gasteruption laticeps (Tournier, 1877) (N)
Gasteruption merceti (Kieffer, 1904) (N, S, Si, Sa)
Gasteruption minutum (Tournier, 1877) (N, S)
Gasteruption nigrescens Schletterer, 1885 (N, S)
Gasteruption opacum (Tournier, 1877) (N, S, Si, Sa)
Gasteruption paternum Schletterer, 1889 (N)
Gasteruption pedemontanum (Tournier, 1877) (N, S, Si, Sa)
Gasteruption subtile Thomson, 1883 (N)
Gasteruption tournieri Schletterer, 1885 (N, S)
Gasteruption undulatum (Abeille, 1879) (N, S, Sa)
Gasteruption variolosum (Abeille, 1879) (N, S, Si, Sa)

Evaniidae

Brachygaster Leach, 1815

Brachygaster minutus (Olivier, 1792) (N, S, Si)

Evania Fabricius, 1775

Evania appendigaster (Linnaeus, 1758) (Si)
Evania fuscipes Illiger, 1807 (N, S)

Zeuxevania Kieffer, 1902

Zeuxevania splendidula A. Costa, 1884 (S, Si, Sa)

Stephanidae

Stephanus Panzer, 1801

Stephanus serrator (Fabricius, 1798) (N, S, Si, Sa)

Megischus Brullé, 1846

Megischus athesinus (Biegeleben, 1929) (N) (*)
Megischus europaeus (Sichel, 1860) (Si)

Note

Megischus athesinus: *Megischus athesinus* Biegeleben potrebbe essere sinonimo di *M. europaeus* Sichel o di *M. anomalipes* Foerster. Non avendo esaminato il tipo della specie di Biegeleben non mi è stato possibile chiarire il suo reale valore sistematico.

Ichneumonidae

***Exeristes* Foerster, 1869**

Exeristes arundinis (Kriechbaumer, 1868) (N, S, Si)
Exeristes longiseta (Ratzeburg, 1844) (Si)
Exeristes roborator (Fabricius, 1793) (N, S, Si, Sa)
Exeristes ruficollis (Gravenhorst, 1829) (N)

***Afrephialtes* Benoit, 1953**

Afrephialtes cicatricosa (Ratzeburg, 1852) (S)

***Scambus* Hartig, 1838**

Scambus annulatus (Kiss, 1924) (N)
Scambus arundinator (Fabricius, 1804) (N, S, Sa)
Scambus brevicornis (Gravenhorst, 1829) (N, S, Sa)
Scambus brunneus (Brischke, 1880) (N)
Scambus buolianae (Hartig, 1838) (N, S)
Scambus calobatus (Gravenhorst, 1829) (N, S, Sa)
Scambus detritus (Holmgren, 1860) (N, S) (*)
Scambus elegans (Woldstedt, 1877) (N, S)
Scambus eucosmidarum (Perkins, 1957) (N)
Scambus gallicerator Kasparyan, 1974 (N)
Scambus nigricans (Thomson, 1877) (N)
Scambus phragmitidis (Perkins, 1957) (N)
Scambus planatus (Hartig, 1838) (N, S)
Scambus pomorum (Ratzeburg, 1848) (N, S)
Scambus sagax (Hartig, 1838) (N, Si)
Scambus strobilorum (Ratzeburg, 1852) (N)
Scambus vesicarius (Ratzeburg, 1844) (N)

***Acropimpla* Townes, 1960**

Acropimpla didyma (Gravenhorst, 1829) (*)
Acropimpla pictipes (Gravenhorst, 1829) (N)

Gregopimpla Momoi, 1965

Gregopimpla bernuthii (Hartig, 1838) (N)
Gregopimpla inquisitor (Scopoli, 1763) (N, S, Si)
Gregopimpla malacosomae (Seyrig, 1927) (Sa)

Iseropus Foerster, 1869

Iseropus stercorator (Fabricius, 1793) (N, S, Si, Sa)

Pseudopimpla Habermehl, 1917

Pseudopimpla pygidiator Seyrig, 1927 (N, S)

Liotryphon Ashmead, 1900

Liotryphon cercopithecus (A. Costa, 1855) (S, Sa)
Liotryphon crassisetus (Thomson, 1877) (N, S)
Liotryphon punctulatus (Ratzeburg, 1848) (N)
Liotryphon strobilellus (Linnaeus, 1758) (*)

Townesia Ozols, 1962

Townesia tenuiventris (Holmgren, 1860) (N)

Ephialtes Gravenhorst, 1829

Ephialtes manifestator (Linnaeus, 1758) (N, S, Sa)

Dolichomit Smith, 1877

Dolichomit *agnoscendus* (Roman, 1939) (N)
Dolichomit *imperator* (Kriechbaumer, 1854) (N, S, Si)
Dolichomit *kriechbaumeri* (Schulz, 1906) (N, S)
Dolichomit *mesocentrus* (Gravenhorst, 1829) (N, S)
Dolichomit *messor* (Gravenhorst, 1829) (N)
Dolichomit *mordator* (Aubert, 1965) (S)
Dolichomit *populneus* (Ratzeburg, 1848) (N)
Dolichomit *pterelas* (Say, 1829) (N)
Dolichomit *terebrans* (Ratzeburg, 1844) (N)
Dolichomit *tuberculatus* (Fourcroy, 1785) (N)

Paraperithous Haupt, 1954

Paraperithous gnathaulax (Thomson, 1877) (N)

Tromatobia Foerster, 1869

Tromatobia oculatoria (Fabricius, 1798) (N, S, Sa)
Tromatobia ornata (Gravenhorst, 1829) (N)
Tromatobia ovivora (Boheman, 1821) (N, Si)

Zaglyptus Foerster, 1869

Zaglyptus multicolor (Gravenhorst, 1829) (N, S)
Zaglyptus varipes (Gravenhorst, 1829) (N)

Clistopyga Gravenhorst, 1829

Clistopyga incitator (Fabricius, 1793) (N, S)

Dreisbachia Townes, 1962

Dreisbachia pictifrons (Thomson, 1877) (N)

Schizopyga Gravenhorst, 1829

Schizopyga circulator (Panzer, 1801) (N)
Schizopyga frigida Cresson, 1870 (N)
Schizopyga podagrica Gravenhorst, 1829 (N, S)

Acrodactyla Haliday, 1838

Acrodactyla degener Haliday, 1838 (*)
Acrodactyla quadrisculpta (Gravenhorst, 1820) (N)

Polysphincta Gravenhorst, 1829

Polysphincta carbonator (Gravenhorst, 1807) (*)
Polysphincta fatua (De Stefani, 1887) (Si) (*)
Polysphincta rufipes Gravenhorst, 1829 (N)
Polysphincta tuberosa Gravenhorst, 1829 (Sa)

Zatypota Foerster, 1869

Zatypota bohemani (Holmgren, 1860) (N)
Zatypota gracilis (Holmgren, 1860) (N)

Itoplectis Foerster, 1869

Itoplectis alternans (Gravenhorst, 1829) (N, S, Sa)
Itoplectis aterrima Jussila, 1965 (N)
Itoplectis clavicornis (Thomson, 1877) (N, S)
Itoplectis maculator (Fabricius, 1775)
 Itoplectis maculator maculator (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa)
 Itoplectis maculator cruentata (Rudow, 1883) (Si)

Itoplectis melanocephala (Gravenhorst, 1829) (N, S, Si)
Itoplectis tunetana (Schmiedeknecht, 1914) (N)

Apechthis Foerster, 1869

Apechthis capulifera (Kriechbaumer, 1887) (*)
Apechthis compunctor (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)
Apechthis quadridentata (Thomson, 1877) (N)
Apechthis rufata (Gmelin in Linnaeus, 1790) (N, S, Si)

Pimpla Fabricius, 1804

Pimpla aethiops Curtis, 1828 (N)
Pimpla apricaria A. Costa, 1884 (Sa)
Pimpla aquilonia Cresson, 1870 (N)
Pimpla arctica Zetterstedt, 1840 (N)
Pimpla cheloniae Giraud, 1869 (N)
Pimpla conmixta Kiss, 1929 (N)
Pimpla contemplator (O.F. Müller, 1776) (N, S)
Pimpla hypochondriaca (Retzius, 1783) (N, S, Si, Sa)
Pimpla illecebrator (Villers, 1789) (N, S)
Pimpla melanacrias Perkins, 1941 (N)
Pimpla moraguesi Schmiedeknecht, 1888 (Sa)
Pimpla sodalis Ruthe, 1859 (N)
Pimpla spuria Gravenhorst, 1829 (N, S, Si)
Pimpla turionellae (Linnaeus, 1758) (N, S, Sa)

Theronia Holmgren, 1859

Theronia atalantae (Poda, 1761) (N, S, Sa)

Delomerista Foerster, 1869

Delomerista laevis (Gravenhorst, 1829) (N)
Delomerista longicauda Kasparyan, 1973 (N)
Delomerista mandibularis (Gravenhorst, 1829) (N)
Delomerista pfankuchi (Brauns, 1905) (S)

Perithous Holmgren, 1859

Perithous albicinctus (Gravenhorst, 1829) (N)
Perithous divinator (Rossi, 1790) (N, S)
Perithous scurra (Panzer, 1804) (N, S)

Hybomischos Baltazar, 1961

Hybomischos septemcinctorius (Thunberg, 1822) (N)

Rhyssa Gravenhorst, 1829

Rhyssa persuasoria (Linnaeus, 1758) (N, S)

Rhyssella Rohwer, 1920

Rhyssella approximator (Fabricius, 1793) (N)

Rhyssella obliterata (Gravenhorst, 1829) (N)

Megarhyssa Ashmead, 1900

Megarhyssa emarginatoria (Thunberg, 1822) (*)

Megarhyssa gigas (Laxmann, 1770) (N)

Megarhyssa perlata (Christ, 1791) (N)

Megarhyssa superba (Schrank, 1781) (N)

Poemenia Holmgren, 1859

Poemenia brachyura Holmgren, 1860 (N)

Poemenia hectica (Gravenhorst, 1829) (N, S)

Deuteroxorides Viereck, 1914

Deuteroxorides elevator (Panzer, 1799) (N)

Neoxorides Clément, 1938

Neoxorides collaris (Gravenhorst, 1829) (N)

Neoxorides nitens (Gravenhorst, 1829) (N)

Sphinctus Gravenhorst, 1829

Sphinctus serotinus Gravenhorst, 1829 (N, S)

Phytodietus Gravenhorst, 1829

Phytodietus coryphaeus Gravenhorst, 1829 (N)

Phytodietus griseanae Kerrich, 1962 (N)

Phytodietus obscurus (Desvignes, 1856) (N)

Phytodietus polyzonias (Forster, 1771) (N, Sa)

Phytodietus rufipes Holmgren, 1860 (N)

Netelia (Paropheltes) Cameron, 1907

Netelia (Paropheltes) elevator Aubert, 1971 (S, Sa)

Netelia (Paropheltes) incognitor Delrio, 1971 (N, S, Sa)

Netelia (Paropheltes) ineditus (Kokujev, 1899) (N)

Netelia (Paropheltes) lineolatus (A. Costa, 1883) (S, Sa)

Netelia (Paropheltes) longipes (Brauns, 1889) (Sa)
Netelia (Paropheltes) millieratae (Kriechbaumer, 1897) (N, Sa)
Netelia (Paropheltes) ornatus (Vollenhoven, 1873) (Sa)
Netelia (Paropheltes) tarsata (Brieschke, 1880) (N)
Netelia (Paropheltes) thomsoni (Brauns, 1889)
 Netelia (Paropheltes) thomsoni rufa Aubert, 1968 (Sa)
 Netelia (Paropheltes) thomsoni thomsoni (Brauns, 1889) (N, Si)

***Netelia (Prosthodocis)* Enderlein, 1912**

Netelia (Prosthodocis) japonica (Uchida, 1928) (N, Sa)

***Netelia (Netelia)* Gray, 1860**

Netelia (Netelia) dilatata (Thomson, 1888) (N)
Netelia (Netelia) fulvator Delrio, 1971 (Sa)
Netelia (Netelia) fuscicarpus (Kokujev, 1899) (N, S, Sa)
Netelia (Netelia) fuscicornis (Holmgren, 1858) (N, S)
Netelia (Netelia) gracilipes (Thomson, 1888) (N)
Netelia (Netelia) infractor Delrio, 1971 (N)
Netelia (Netelia) melanura (Thomson, 1888) (N, Sa)
Netelia (Netelia) opacula (Thomson, 1888) (N)
Netelia (Netelia) paramelanura Tolkantz, 1981 (N)
Netelia (Netelia) praevalvator Delrio, 1971 (Sa)
Netelia (Netelia) silantjewi (Kokujev, 1899) (N)
Netelia (Netelia) testacea (Gravenhorst, 1829) (Sa)
Netelia (Netelia) vinulae (Scopoli, 1763) (N, Sa)

***Netelia (Bessobates)* Townes, Townes & Gupta, 1961**

Netelia (Bessobates) cristatus (Thomson, 1888) (N, Sa)
Netelia (Bessobates) latungula (Thomson, 1888) (N)
Netelia (Bessobates) virgatus (Fourcroy, 1785) (N)

***Eclytus* Holmgren, 1857**

Eclytus exornatus (Gravenhorst, 1829) (Sa)
Eclytus ornatus Holmgren, 1857 (*)

***Hercus* Townes, 1968**

Hercus fontinalis (Holmgren, 1857) (*)

***Thymaris* Foerster, 1869**

Thymaris fenestralis Morley, 1908 (N, S)
Thymaris tener (Gravenhorst, 1829) (N)

Oedemopsis Tschek, 1869

Oedemopsis scabriculus (Gravenhorst, 1829) (N)

Grypocentrus Ruthe, 1855

Grypocentrus albipes Ruthe, 1855 (N)

Grypocentrus cinctellus Ruthe, 1855 (N)

Polyblastus (Polyblastus) Hartig, 1837

Polyblastus (Polyblastus) cothurnatus (Gravenhorst, 1829) (N)

Polyblastus (Polyblastus) palaemon Schiödte, 1839 (*)

Polyblastus (Polyblastus) pinguis (Gravenhorst, 1820) (N)

Polyblastus (Polyblastus) subalpinus Holmgren, 1855 (N)

Polyblastus (Polyblastus) tener Habermehl, 1909 (N)

Polyblastus (Polyblastus) tuberculatus Teunissen, 1953 (N)

Polyblastus (Polyblastus) varitarsus (Gravenhorst, 1829) (N, Si)

Polyblastus (Polyblastus) wahlbergi Holmgren, 1855 (*)

Polyblastus (Labroctonus) Foerster, 1869

Polyblastus (Labroctonus) alternans Schiödte, 1839 (N)

Polyblastus (Labroctonus) pumilus Holmgren, 1855 (*)

Ctenochira Foerster, 1855

Ctenochira angulata (Thomson, 1883) (N, S)

Ctenochira arcuata (Holmgren, 1855) (N)

Ctenochira cavigena Kasparyan, 1976 (N)

Ctenochira flavicauda (Roman, 1912) (N)

Ctenochira gilvipes (Holmgren, 1855) (N)

Ctenochira marginata (Holmgren, 1855) (N)

Ctenochira pastoralis (Gravenhorst, 1829) (N)

Ctenochira pratensis (Gravenhorst, 1829) (N)

Ctenochira propinqua (Gravenhorst, 1829) (N, S)

Ctenochira sanguinatoria (Ratzeburg, 1852) (*)

Ctenochira sphaerocephala (Gravenhorst, 1829) (N)

Ctenochira taiga Kasparyan, 1972 (N)

Ctenochira xanthopyga (Holmgren, 1855) (N)

Erromenus Holmgren, 1855

Erromenus analis Brischke, 1871 (*)

Erromenus bibulus Kasparyan, 1973 (N)

Erromenus brunnicans (Gravenhorst, 1829) (N)

Erromenus calcator (O.F. Müller, 1776) (*)

Erromenus junior (Thunberg, 1822) (N, S)

Erromenus melanonotus (Gravenhorst, 1829) (N)
Erromenus plebejus (Woldstedt, 1877) (N, S)
Erromenus punctatus (Woldstedt, 1877) (N)
Erromenus zonarius (Gravenhorst, 1829) (N, S)

Neleges Foerster, 1869

Neleges proditor Gravenhorst, 1829 (N, S)

Otoblastus Foerster, 1869

Otoblastus luteomarginatus (Gravenhorst, 1829) (N, S, Sa)

Monoblastus Hartig, 1837

Monoblastus brachyacanthus (Gmelin, 1790) (N, S)
Monoblastus caudatus Hartig, 1837 (N)
Monoblastus discendens (Schmiedeknecht, 1912) (N)
Monoblastus fulvescens (Fonscolombe, 1849) (S)
Monoblastus marginellus (Gravenhorst, 1829) (N, S)

Ischyrocnemis Holmgren, 1856

Ischyrocnemis goesi Holmgren, 1856 (N)
Ischyrocnemis quadridens (Perkins, 1962) (N, S)

Boethus Foerster, 1869

Boethus thoracicus (Giraud, 1871) (N, S)

Dyspetes Foerster, 1869

Dyspetes arrogator Heinrich, 1949 (N, S)

Cosmoconus Foerster, 1869

Cosmoconus ceratophorus (Thomson, 1888) (N)
Cosmoconus elongator (Fabricius, 1775) (N, S)
Cosmoconus genalis (Strobl, 1903) (N)
Cosmoconus meridionator Aubert, 1963 (N)
Cosmoconus nigriventris Kasparyan, 1971 (N)

Tryphon (Tryphon) Fallén, 1813

Tryphon (Tryphon) abditus Kasparyan, 1969 (N)
Tryphon (Tryphon) atriceps Stephens, 1835 (N, S)
Tryphon (Tryphon) auricularis Thomson, 1883 (N)
Tryphon (Tryphon) nigripes Holmgren, 1855 (N)

Tryphon (Tryphon) psilosagator Aubert, 1966 (N, S)
Tryphon (Tryphon) rarus Kasparyan, 1969 (N)
Tryphon (Tryphon) relator (Thunberg, 1822) (N)
Tryphon (Tryphon) rutilator (Linnaeus, 1761) (N, S)
Tryphon (Tryphon) signator Gravenhorst, 1829 (N, S)
Tryphon (Tryphon) thomsoni Roman, 1939 (N, S)
Tryphon (Tryphon) trochanteratus Holmgren, 1855 (N)
Tryphon (Tryphon) zavreli Gregor, 1939 (S)

Tryphon (Stenocrotaphon) Kasparyan, 1969

Tryphon (Stenocrotaphon) obtusator (Thunberg, 1822) (N)
Tryphon (Stenocrotaphon) subsulcatus Holmgren, 1855 (S)

Tryphon (Symboethus) Foerster, 1869

Tryphon (Symboethus) bidentatus Stephens, 1835 (N, S)
Tryphon (Symboethus) compunctor Gravenhorst, 1829 (N)
Tryphon (Symboethus) duplicatus Heinrich, 1953 (N)

Kristotomus Mason, 1962

Kristotomus laetus (Gravenhorst, 1829) (N, S)
Kristotomus laticeps (Gravenhorst, 1829) (*)
Kristotomus pumilio (Holmgren, 1855) (N)
Kristotomus ridibundus (Gravenhorst, 1829) (N)
Kristotomus triangulatorius (Gravenhorst, 1829) (N, S)

Cycasis Townes in Townes, Momoi & Townes, 1965

Cycasis rubiginosa (Gravenhorst, 1829) (N)

Excavarus Davis, 1897

Excavarus apiarius (Gravenhorst, 1829) (N)

Exyston Schiödte, 1839

Exyston albicinctus (Gravenhorst, 1820) (N)
Exyston calcaratus Thomson, 1883 (N)
Exyston clementi (Kerrich, 1952) (N)
Exyston genalis Thomson, 1883 (N)
Exyston nigricornis Kasparyan, 1976 (N)
Exyston pratorum (Woldstedt, 1874) (N)
Exyston sponsorius (Fabricius, 1781) (N, S)
Exyston subnitidus (Gravenhorst, 1829) (N, S)

Smicroplectrus Thomson, 1883

Smicroplectrus quinquecinctus (Gravenhorst, 1820) (N, S)

Acrotomus Holmgren, 1855

Acrotomus lucidulus (Gravenhorst, 1829) (N)

Acrotomus succinctus (Gravenhorst, 1829) (N, S)

Exenterus Hartig, 1837

Exenterus abruptorius (Thunberg, 1822) (N)

Exenterus adspersus Hartig, 1838 (N)

Exenterus amictorius (Panzer, 1801) (N)

Exenterus ictericus (Gravenhorst, 1829) (N, S)

Exenterus oriolus Hartig, 1838 (*)

Eridolius Foerster, 1869

Eridolius alacer (Gravenhorst, 1829) (N)

Eridolius basalis (Stephens, 1835) (N)

Eridolius curtisii (Haliday, 1838) (N)

Eridolius dorsator (Thunberg, 1822) (N, S, Si) (*)

Eridolius flavomaculatus (Gravenhorst, 1829) (N)

Eridolius gnathoxanthus (Gravenhorst, 1829) (*)

Eridolius hofferi (Gregor, 1937) (N)

Eridolius pachysomus (Stephens, 1835) (*)

Eridolius pictus (Gravenhorst, 1829) (N, S)

Eridolius rufilabris (Holmgren, 1855) (N)

Euceros Gravenhorst, 1829

Euceros albitarsus Curtis, 1837 (N, S)

Euceros kiushuensis Uchida, 1958 (N)

Euceros pruinosis (Gravenhorst, 1829) (N)

Euceros serricornis (Haliday, 1838) (N)

Euceros superbus Kriechbaumer, 1888 (*)

Brachycyrtus Kriechbaumer, 1880

Brachycyrtus ornatus Kriechbaumer, 1880 (N, S)

Adelognathus Holmgren, 1855

Adelognathus brevis Kasparyan, 1986 (N)

Adelognathus chrysopygus (Gravenhorst, 1829) (N)

Adelognathus dorsalis (Gravenhorst, 1829) (N)

Adelognathus maculosus Kasparyan, 1990 (N)

Adelognathus pilosus Thomson, 1888 (N)

Adelognathus punctulatus Thomson, 1883 (N)

Ischnoceros Gravenhorst, 1829

Ischnoceros caligatus (Gravenhorst, 1829) (N, S)

Ischnoceros rusticus (Fourcroy, 1758) (N)

Odontocolon Cushman, 1942

Odontocolon appendiculatum (Gravenhorst, 1829) (*)

Odontocolon dentipes (Gmelin, 1790) (N)

Odontocolon geniculatus (Kriechbaumer, 1889) (N)

Odontocolon quercinus (Thomson, 1877) (N)

Odontocolon spinipes (Gravenhorst, 1829) (*)

Odontocolon thomsoni (Clément, 1938) (N)

Xorides (Xorides) Latreille, 1809

Xorides (Xorides) ater (Gravenhorst, 1829) (N)

Xorides (Xorides) baueri (Clément, 1938) (N)

Xorides (Xorides) csikii Clément, 1938 (N, S)

Xorides (Xorides) filiformis (Gravenhorst, 1829) (N)

Xorides (Xorides) fuligator (Thunberg, 1822) (N)

Xorides (Xorides) gracilicornis (Gravenhorst, 1829) (N)

Xorides (Xorides) indicatorius (Latreille, 1809) (N)

Xorides (Xorides) irrigator (Fabricius, 1793) (N)

Xorides (Xorides) minutus Clément, 1938 (N)

Xorides (Xorides) niger (Pfeffer, 1913) (N) (*)

Xorides (Xorides) praecatorius (Fabricius, 1793) (N, S)

Xorides (Xorides) securicornis (Holmgren, 1860) (N, S)

Xorides (Xorides) sepulcralis (Holmgren, 1860) (N)

Xorides (Gonophonus) Foerster, 1869

Xorides (Gonophonus) annulator (Fabricius, 1804) (N, Sa)

Xorides (Gonophonus) propinquus (Tschek, 1868) (N)

Xorides (Gonophonus) scaber (Gravenhorst, 1829) (N)

Xorides (Moerophora) Foerster, 1869

Xorides (Moerophora) rufipes (Gravenhorst, 1829) (N)

Agriotypus Curtis, 1832

Agriotypus armatus Curtis, 1832 (N)

Chirotica Foerster, 1869

Chirotica albobasalis Horstmann, 1983 (N, S, Si)
Chirotica decorator (Villers, 1789) (N)
Chirotica insignis (Gravenhorst, 1829) (N)
Chirotica italicator Aubert, 1982 (N, S)
Chirotica maculipennis (Gravenhorst, 1829) (N, Sa)
Chirotica meridionalis Horstmann, 1983 (Si)
Chirotica nigrithorax Horstmann, 1983 (Si)
Chirotica nigriventris Horstmann, 1983 (Sa)
Chirotica terebrator Horstmann, 1983 (Si)

Encrateola Foerster, 1869

Encrateola laevigata (Ratzeburg, 1848) (N)

Eudelus Foerster, 1869

Eudelus limbatus (Gravenhorst, 1829) (Sa)
Eudelus simillimus (Taschenberg, 1865) (N)

Acrolyta Foerster, 1869

Acrolyta distincta (Bridgman, 1883) (N)
Acrolyta nens (Hartig, 1838) (N)
Acrolyta rufocinctus (Gravenhorst, 1829) (N)

Diaglyptidea Viereck, 1913

Diaglyptidea conformis (Gmelin, 1790) (N)

Lysibia Foerster, 1869

Lysibia ceylonensis (Kerrich, 1956) (N)
Lysibia marginata (Bridgman, 1883) (S)
Lysibia nana (Gravenhorst, 1829) (N)
Lysibia tenax Townes, 1983 (N)

Obisiphaga Morley, 1907

Obisiphaga stenoptera (Marshall, 1868) (N, S)

Xiphulcus Townes, 1970

Xiphulcus floricolator (Gravenhorst, 1807) (N)

Hemiteles Gravenhorst, 1829

Hemiteles bipunctator (Thunberg, 1822) (N, S)
Hemiteles collinus A. Costa, 1885 (Sa) (*)

Hemiteles similis (Gmelin, 1790) (N, S)

Aclastus Foerster, 1869

Aclastus eugracilis Horstmann, 1980 (N)

Aclastus gracilis (Thomson, 1884) (N)

Aclastus micator (Gravenhorst, 1807) (N)

Aclastus solutus (Thomson, 1884) (N)

Polyaulon Foerster, 1869

Polyaulon paradoxum (Zetterstedt, 1838) (N)

Xenolytus Foerster, 1869

Xenolytus bitinctus (Gmelin, 1790) (N)

Dichrogaster Doumerc, 1855

Dichrogaster aestivalis (Gravenhorst, 1829) (N, Si)

Dichrogaster bischoffi (Schmiedeknecht, 1905) (N)

Dichrogaster longicaudata (Thomson, 1884) (N, S)

Dichrogaster modesta (Gravenhorst, 1829) (N)

Dichrogaster perlae (Doumerc, 1855) (N)

Dichrogaster schimitscheki (Fahringer, 1935) (N)

Gelis Thunberg, 1827

Gelis acarorum (Linnaeus, 1758) (N, Sa)

Gelis affinis (Magretti, 1884) (S)

Gelis agilis (Fabricius, 1775) (N)

Gelis anthracinus (Foerster, 1850) (N)

Gelis areator (Panzer, 1804) (N, S)

Gelis cabrerai (Duchaussoy, 1915) (N) (*)

Gelis carbonarius (De Stefani, 1884) (Si) (*)

Gelis carnifex (Foerster, 1850) (N)

Gelis caudator Horstmann, 1993 (S)

Gelis cautus (Foerster, 1850) (Sa)

Gelis cinctus (Linnaeus, 1758) (N, S)

Gelis circumcinctus (Foerster, 1850) (N)

Gelis corruptor (Foerster, 1850) (N)

Gelis cursitans (Fabricius, 1775) (N, S)

Gelis curvicauda Horstmann, 1993 (S)

Gelis cyanurus (Foerster, 1850) (N, S, Sa)

Gelis declivis (Foerster, 1850) (N)

Gelis distinctus (Foerster, 1850) (N, S)

Gelis faunus (Foerster, 1850) (N, S)

Gelis fortificator Aubert, 1970 (N, S)

Gelis fusca (Duchaussoy, 1915) (S)
Gelis gallicus Seyrig, 1928 (N)
Gelis gonatopinus (Thomson, 1884) (N)
Gelis ilicicolator Aubert, 1969 (N)
Gelis instabilis (Foerster, 1850) (N)
Gelis integer (Foerster, 1850) (N)
Gelis intermedius (Foerster, 1850) (N)
Gelis inustus (Gravenhorst, 1829) (N, S)
Gelis kiesenwetteri (Foerster, 1850) (N)
Gelis lichtensteini (Pfankuch, 1913) (Si)
Gelis longicauda (Thomson, 1884) (N)
Gelis longulus (Zetterstedt, 1838) (N)
Gelis melanocephalus (Schrank, 1781) (N)
Gelis melanogonus (Gravenhorst, 1829) (N)
Gelis micrurus (Foerster, 1850) (N)
Gelis monozonius (Gravenhorst, 1829)
 Gelis monozonius micator (Gravenhorst, 1829) (N)
Gelis neesi (Foerster, 1850) (N, S)
Gelis niger (Brieschke, 1878) (N)
Gelis nigrinus (Foerster, 1850) (S)
Gelis notabilis (Foerster, 1850) (N)
Gelis obscuripes Horstmann, 1986 (N)
Gelis ochraceus (Foerster, 1850) (N)
Gelis parvulus (Foerster, 1850) (N)
Gelis pedicularius (Fabricius, 1793) (N)
Gelis picipes (Gravenhorst, 1829) (N)
Gelis provincialis Horstmann, 1990 (N)
Gelis pulicarius (Gravenhorst, 1829) (N)
Gelis pumilus (Foerster, 1850) (N) (*)
Gelis pusillus (De Stefani, 1884) (Si) (*)
Gelis ragusae (De Stefani, 1884) (Si) (*)
Gelis riggii (De Stefani, 1884) (Si)
Gelis roboretanus (Cobelli, 1908) (N)
Gelis ruficeps (Rudow, 1914) (Si)
Gelis ruficornis (Retzius, 1783) (N)
Gelis semirufus (De Stefani, 1884) (N, Si)
Gelis separatus (Schmiedeknecht, 1906) (S, Si)
Gelis silvestri (Ashmead, 1905) (S)
Gelis speculator (Foerster, 1850) (N)
Gelis spurius (Foerster, 1850) (N)
Gelis steveni (Gravenhorst, 1829) (N)
Gelis terebrator (Ratzeburg, 1848) (N)
Gelis thomsoni (Schmiedeknecht, 1933) (S)
Gelis timidus (Foerster, 1850) (N)
Gelis vagans (Olivier, 1792) (Sa)
Gelis vicinus (Gravenhorst, 1829) (N, S)
Gelis vulnerans (Foerster, 1850) (N)
Gelis zonatus (Foerster, 1850) (N)

Catalytus Foerster, 1851

Catalytus mangeri (Gravenhorst, 1815) (N)

Brachypimpla Strobl, 1902

Brachypimpla brachyura Strobl, 1902 (N, S)

Mastrus Foerster, 1869

Mastrus deminuens (Hartig, 1838) (N)

Mastrus ridibundus (Gravenhorst, 1829) (N)

Mastrus rufulus (Thomson, 1884) (N)

Zoophthorus Foerster, 1869

Zoophthorus palpator (O.F. Müller, 1776) (N, S)

Isadelphus Foerster, 1869

Isadelphus armatus (Gravenhorst, 1829) (N)

Isadelphus inimicus (Gravenhorst, 1829) (N, S)

Mastrulus Horstmann, 1978

Mastrulus marshalli (Bridgman & Fitch, 1882) (N)

Helcostizus Foerster, 1869

Helcostizus restaurator (Fabricius, 1775) (N)

Rhembobius Foerster, 1869

Rhembobius perscrutator (Thunberg, 1822) (N)

Rhembobius quadrispinus (Gravenhorst, 1829) (N, S)

Ethelurgus Foerster, 1869

Ethelurgus bifrons (Gmelin, 1790) (N)

Ethelurgus vulnerator (Gravenhorst, 1829)

Ethelurgus vulnerator vulnerator (Gravenhorst, 1829) (N)

Lochetica Kriechbaumer, 1892

Lochetica westoni (Bridgman, 1880) (N)

Charitopes Foerster, 1869

Charitopes areolaris (Thomson, 1884) (N)
Charitopes clausus (Thomson, 1884) (N)
Charitopes gastricus (Holmgren, 1869) (N)
Charitopes leucobasis Townes, 1983 (N)
Charitopes macrurus (Thomson, 1884) (N)

Medophron Foerster, 1869

Medophron afflictor (Gravenhorst, 1829) (N)

Endasys Foerster, 1869

Endasys amoenus (Habermehl, 1912) (*)
Endasys brevis (Gravenhorst, 1829) (N)
Endasys cnemargus (Gravenhorst, 1829) (N, S)
Endasys erythrogaster (Gravenhorst, 1829) (N)
Endasys eurycerus (Thomson, 1895) (*)
Endasys euxestus (Speiser, 1908) (*)
Endasys microcellus Sawoniewicz & Luhman, 1992 (*)
Endasys parviventris (Gravenhorst, 1829) (*)
Endasys plagiator (Gravenhorst, 1829) (N)
Endasys praegracilis Sawoniewicz & Luhman, 1992 (N)
Endasys rugifacies Sawoniewicz & Luhman, 1992 (*)
Endasys senilis (Gmelin, 1790) (*)
Endasys stictogastris Sawoniewicz & Luhman, 1992 (*)
Endasys striatus (Kiss, 1924) (*)
Endasys thunbergi Sawoniewicz & Luhman, 1992 (S)
Endasys varipes (Gravenhorst, 1829) (*)

Glyphicnemis Foerster, 1869

Glyphicnemis atrata (Strobl, 1901) (N)
Glyphicnemis profligator (Fabricius, 1775) (N)
Glyphicnemis vagabunda (Gravenhorst, 1829) (N, S)

Bathythrix Foerster, 1869

Bathythrix aereus (Gravenhorst, 1829) (N)
Bathythrix argentatus (Gravenhorst, 1829) (N)
Bathythrix claviger (Taschenberg, 1865) (N)
Bathythrix collaris (Thomson, 1896) (N)
Bathythrix decipiens (Gravenhorst, 1829) (N)
Bathythrix fragilis (Gravenhorst, 1829) (N)
Bathythrix lamina (Thomson, 1884) (N)
Bathythrix linearis (Gravenhorst, 1829) (N)
Bathythrix maculatus (Hellen, 1957) (N)
Bathythrix montanus (Schmeideknecht, 1905) (N, S)

Bathythrix pellucidator (Gravenhorst, 1829) (N)
Bathythrix spheginus (Gravenhorst, 1829) (N)
Bathythrix strigosus (Thomson, 1884) (N)
Bathythrix tenuis (Gravenhorst, 1829) (N)
Bathythrix thomsoni (Kerrich, 1942) (N)

Sulcarius Townes, 1970

Sulcarius laevipleuris Horstmann, 1992 (N, Si)

Tropistes Gravenhorst, 1829

Tropistes falcatus (Thomson, 1884) (N)

Orthizema Foerster, 1869

Orthizema graviceps (Marshall, 1868) (N)
Orthizema pullator (Gravenhorst, 1829) (N)
Orthizema subannulatum (Bridgman, 1883) (N)

Gnotus Foerster, 1869

Gnotus chionops (Gravenhorst, 1829) (N)
Gnotus tenuipes (Gravenhorst, 1829) (N)

Stibeutes Foerster, 1850

Stibeutes atratus De Stefani, 1884 (Si) (*)
Stibeutes gravenhorsti Foerster, 1850 (N)
Stibeutes pedestrator Aubert, 1982 (S)

Theroscopus Foerster, 1850

Theroscopus esenbeckii (Gravenhorst, 1815) (N)
Theroscopus hemipteron (Riche, 1791) (N, S, Sa)
Theroscopus inaequalis Foerster, 1850 (N)
Theroscopus ochrogaster (Thomson, 1888) (S)
Theroscopus pedestris (Fabricius, 1775) (N)
Theroscopus rotundator Aubert, 1989 (*)
Theroscopus rufulus (Gmelin, 1790) (N)
Theroscopus striatus Horstmann, 1993 (S)

Megacara Townes, 1970

Megacara hortulanus (Gravenhorst, 1829) (N)
Megacara vagans (Gravenhorst, 1829) (N)

Phygadeuon Gravenhorst, 1829

Phygadeuon acutipennis Thomson, 1884 (N)
Phygadeuon atropos Kriechbaumer, 1892 (N)
Phygadeuon bilineatus (Gravenhorst, 1829) (*)
Phygadeuon bonelli (Gravenhorst, 1815) (N)
Phygadeuon cephalotes Gravenhorst, 1829 (N)
Phygadeuon chilosiae Horstmann, 1975 (*)
Phygadeuon detestator (Thunberg, 1822) (N)
Phygadeuon dubius (Gravenhorst, 1829) (N)
Phygadeuon dumetorum (Gravenhorst, 1829) (N)
Phygadeuon exiguus Gravenhorst, 1829 (N)
Phygadeuon fumator Gravenhorst, 1829 (N)
Phygadeuon geniculatus Kriechbaumer, 1892 (N)
Phygadeuon grossae Horstmann, 1981 (S)
Phygadeuon leucostigmus Gravenhorst, 1829 (N, Si)
Phygadeuon nanus (Gravenhorst, 1829) (N)
Phygadeuon ovatus Gravenhorst, 1829 (N)
Phygadeuon pegomyiae Habermehl, 1928 (N)
Phygadeuon punctipleuris Thomson, 1884 (N)
Phygadeuon ruficornis (Gravenhorst, 1829) (N)
Phygadeuon rugulosus (Gravenhorst, 1829) (N)
Phygadeuon stilpninus Thomson, 1888 (N)
Phygadeuon subspinosus (Gravenhorst, 1829) (N)
Phygadeuon subtilis Gravenhorst, 1829 (N)
Phygadeuon tergestinus Schmiedeknecht, 1905 (N)
Phygadeuon trichops Thomson, 1884 (N)
Phygadeuon troglodytes Gravenhorst, 1829 (N)
Phygadeuon variabilis Gravenhorst, 1829 (N)
Phygadeuon varicornis Thomson, 1885 (N, S)
Phygadeuon vexator (Thunberg, 1822) (N)

Ceratophygadeuon Viereck, 1924

Ceratophygadeuon anurus (Thomson, 1884) (N)
Ceratophygadeuon italicus Horstmann, 1979 (N)

Stilpnus (Polyrhembia) Foerster, 1869

Stilpnus (Polyrhembia) tenebricosus (Gravenhorst, 1829) (N)

Stilpnus (Stilpnus) Gravenhorst, 1829

Stilpnus (Stilpnus) blandus (Gravenhorst, 1829) (N)
Stilpnus (Stilpnus) gagates (Gravenhorst, 1807) (N)
Stilpnus (Stilpnus) pavoniae (Scopoli, 1763) (N)
Stilpnus (Stilpnus) subzonulus Foerster, 1876 (*)

Atractodes (Asyncrita) Foerster, 1876

Atractodes (Asyncrita) acuminator Roman, 1909 (N)
Atractodes (Asyncrita) ambiguus Ruthe, 1859 (N)
Atractodes (Asyncrita) angustipennis Foerster, 1876 (N)
Atractodes (Asyncrita) croceicornis Haliday, 1839 (N)
Atractodes (Asyncrita) cryptobius Foerster, 1876 (N)
Atractodes (Asyncrita) cultellator Haliday, 1839 (N)
Atractodes (Asyncrita) designatus (Foerster, 1876) (N)
Atractodes (Asyncrita) exilis Haliday, 1839 (N)
Atractodes (Asyncrita) exitialis Foerster, 1876
 Atractodes (Asyncrita) exitialis alpigena Foerster, 1876 (N)
 Atractodes (Asyncrita) exitialis exitialis Foerster, 1876 (N)
Atractodes (Asyncrita) genuinus Foerster, 1876 (N)
Atractodes (Asyncrita) mediatius Foerster, 1876 (N)
Atractodes (Asyncrita) picipes Holmgren, 1858 (N)

Atractodes (Atractodes) Gravenhorst, 1829

Atractodes (Atractodes) bicolor Gravenhorst, 1829 (N)
Atractodes (Atractodes) fumatus Haliday, 1839 (N)
Atractodes (Atractodes) gravidus Gravenhorst, 1829 (N)
Atractodes (Atractodes) pusillus Foerster, 1876 (N)

Atractodes (Cyclaulatractodes) Jussila, 1979

Atractodes (Cyclaulatractodes) oreophilus Foerster, 1876 (N)
Atractodes (Cyclaulatractodes) punctator Roman, 1909 (N)

Atractodes (Rugatractodes) Jussila, 1979

Atractodes (Rugatractodes) alpinus Foerster, 1876 (N)
Atractodes (Rugatractodes) fennoscandicus Jussila, 1979
 Atractodes (Rugatractodes) fennoscandicus remotus Jussila, 1979 (N)
Atractodes (Rugatractodes) pediophilus Foerster, 1876 (N)

Mesoleptus Gravenhorst, 1829

Mesoleptus laevigatus (Gravenhorst, 1820) (N, Si)
Mesoleptus marginatus (Thomson, 1884) (N)
Mesoleptus ripicola (Thomson, 1884) (S)
Mesoleptus scrutator (Haliday, 1839) (N)

Cremnodes Foerster, 1850

Cremnodes costalis Horstmann, 1992 (N)

Demopheles Foerster, 1869

Demopheles corruptor (Taschenberg, 1865) (N)

Parmortha Townes, 1962

Parmortha parvula (Gravenhorst, 1829) (S)

Cubocephalus Ratzeburg, 1848

Cubocephalus anatorius (Gravenhorst, 1829) (N)
Cubocephalus associator (Thunberg, 1822) (N)
Cubocephalus erythrinus (Gravenhorst, 1829) (N)
Cubocephalus insidiator (Gravenhorst, 1829) (N)
Cubocephalus lacteator (Gravenhorst, 1829) (N)
Cubocephalus nigriventris (Thomson, 1874) (N)
Cubocephalus pygmaeus (Habermehl, 1935) (N)
Cubocephalus sternocerus (Thomson, 1873) (N)

Echthrus Gravenhorst, 1829

Echthrus reluctator (Linnaeus, 1758) (N)

Oresbius Marshall, 1867

Oresbius arridens (Gravenhorst, 1829) (N)
Oresbius septentrionalis (Thomson, 1883) (N)

Polytribax Foerster, 1869

Polytribax arrogans (Gravenhorst, 1829) (N, S)
Polytribax curvus (Schränk, 1802) (N)
Polytribax perspicillator (Gravenhorst, 1807) (N)
Polytribax rufipes (Gravenhorst, 1829) (N, S)

Plectocryptus Thomson, 1874

Plectocryptus alpinus (Kriechbaumer, 1894) (N)
Plectocryptus digitatus (Gmelin, 1790) (Si)
Plectocryptus effeminatus (Gravenhorst, 1829) (*)
Plectocryptus pelinocheirus (Gravenhorst, 1829) (N)

Colocnema Foerster, 1869

Colocnema rufina (Gravenhorst, 1829) (N, S)

Giraudia Foerster, 1869

Giraudia grisescens (Gravenhorst, 1829) (N)
Giraudia gyratoria (Thunberg, 1822) (N)

Schenkia Foerster, 1869

Schenkia improba (Gravenhorst, 1829) (N)
Schenkia spinolae (Gravenhorst, 1829) (N)

Pleolophus Townnes, 1962

Pleolophus basizonus (Gravenhorst, 1829) (N)
Pleolophus brachypterus (Gravenhorst, 1815) (N)
Pleolophus micropterus (Gravenhorst, 1815) (N)
Pleolophus sericans (Gravenhorst, 1829) (N)
Pleolophus sperator (O.F. Müller, 1776) (N)

Aptesis Foerster, 1850

Aptesis alpicola (Habermehl, 1935) (N)
Aptesis assimilis (Gravenhorst, 1829) (N)
Aptesis cretatus (Gravenhorst, 1829) (N)
Aptesis femoralis (Thomson, 1883) (N)
Aptesis flagitator (Rossi, 1794) (S, Sa)
Aptesis jejunator (Gravenhorst, 1829) (N, S)
Aptesis nigrifula (Thomson, 1885) (N)
Aptesis nigrocinctus (Gravenhorst, 1815) (N)
Aptesis orbitalis (Thomson, 1883) (N)
Aptesis terminata (Gravenhorst, 1829) (N)

Listrocryptus Brauns, 1905

Listrocryptus spatulatus Brauns, 1905 (N)

Thrybius Townes, 1965

Thrybius praedator (Rossi, 1792) (S)

Agrothereutes Foerster, 1850

Agrothereutes abbreviatus (Fabricius, 1794) (N, S)
Agrothereutes adustus Gravenhorst, 1829 (N)
Agrothereutes albovinctus (Gravenhorst, 1829) (N)
Agrothereutes aterrimus (Gravenhorst, 1829) (N)
Agrothereutes bicolor (De Stefani, 1884) (Si) (*)
Agrothereutes fumipennis (Gravenhorst, 1829) (N)
Agrothereutes grossus (Gravenhorst, 1829) (N)
Agrothereutes hospes (Tschek, 1870) (N, S)
Agrothereutes magretti (Kriechbaumer, 1893) (N)
Agrothereutes pumilus (Kriechbaumer, 1899) (N)

Mesostenidea Viereck, 1914

Mesostenidea furax (Tschek, 1870) (N)

Gambrus Foerster, 1869

Gambrus incubitor (Linnaeus, 1758) (N)

Gambrus ornatus (Gravenhorst, 1829) (N, S)

Aritranis Foerster, 1869

Aritranis alpicola (Habermehl, 1935) (N)

Aritranis buccata (Tschek, 1872) (N)

Aritranis clementi (Habermehl, 1926) (N)

Aritranis confector (Gravenhorst, 1829) (N)

Aritranis femoralis (Gravenhorst, 1829) (N, S, Sa)

Aritranis fugitiva (Gravenhorst, 1829) (N)

Aritranis heliophilus (Tschek, 1870) (N, S, Sa)

Aritranis insectator (Tschek, 1870) (N)

Aritranis occisor (Gravenhorst, 1829) (N)

Aritranis odoriferator (Dufour & Perris, 1840) (N, S)

Aritranis pulcher (Thomson, 1873) (*)

Aritranis quadriguttata (Gravenhorst, 1829) (N, S, Sa)

Aritranis signatoria (Fabricius, 1793)

Aritranis signatoria mesoxantha (Thomson, 1873) (Sa)

Aritranis signatoria signatoria (Fabricius, 1793) (N)

Pycnocryptus Thomson, 1873

Pycnocryptus director (Thunberg, 1822) (N)

Pycnocryptus fuligipennis (A. Costa, 1885) (Sa) (*)

Pycnocryptus nigripes (Gravenhorst, 1829) (N, S, Sa)

Hidryta Foerster, 1869

Hidryta frater (Cresson, 1864) (N)

Hidryta sordida (Tschek, 1870) (N)

Idiolispa Foerster, 1869

Idiolispa analis (Gravenhorst, 1807) (N, S)

Idiolispa coarctata (Gravenhorst, 1829) (N)

Idiolispa obovata (Tschek, 1870) (N, S)

Trychosis Foerster, 1869

Trychosis atripes (Gravenhorst, 1829) (N, S)

Trychosis gradaria (Tschek, 1870) (N)

Trychosis ingrata (Tschek, 1870) (N, S)
Trychosis legator (Thunberg, 1822)
 Trychosis legator legator (Thunberg, 1822) (N, S)
 Trychosis legator plebeja (Tschek, 1870) (N, S, Sa)
Trychosis mesocastana (Tschek, 1870) (N, S)
Trychosis neglecta (Tschek, 1870) (N)
Trychosis priesneri van Rossem, 1971 (S)
Trychosis timenda van Rossem, 1989 (N)
Trychosis tristator (Tschek, 1870) (N, S)

Enclisis Townes, 1970

Enclisis vindex (Tschek, 1870) (N)

Ischnus Gravenhorst, 1829

Ischnus agitator (Olivier, 1792) (*)
Ischnus alternator (Gravenhorst, 1829) (N)
Ischnus inquisitorius (O.F. Müller, 1776)
 Ischnus inquisitorius inquisitorius (O.F. Müller, 1776) (N)
Ischnus migrator (Fabricius, 1775) (N, S, Sa)
Ischnus minutorius (Fabricius, 1804) (N, S, Sa)
Ischnus tunetanus Smits van Burgst, 1913 (N, Sa)

Caenocryptus Thomson, 1873

Caenocryptus quadrimaculatus (Gravenhorst, 1829) (N)

Nippocryptus Uchida, 1936

Nippocryptus vittatorius (Jurine, 1807) (N, S)

Buathra Cameron, 1903

Buathra divisoria (Tschek, 1872) (N)
Buathra laborator (Thunberg, 1822) (N, S)
Buathra tarsoleuca (Schrank, 1871) (N)

Cryptus Fabricius, 1804

Cryptus albatorius (Villiers, 1789) (N, S, Si)
Cryptus apparitorius (Villers, 1789) (N)
Cryptus armator Fabricius, 1804 (N, S)
Cryptus attentorius (Panzer, 1804) (N)
Cryptus bucculentus Tschek, 1870 (N, S)
Cryptus diana Gravenhorst, 1829
 Cryptus diana diana Gravenhorst, 1829 (N)
Cryptus genalis Tschek, 1872 (N)

Cryptus gracillimus De Stefani, 1894 (Si) (*)
Cryptus immitis Tschek, 1870 (N, Si)
Cryptus inculcator (Linnaeus, 1758) (N, S)
Cryptus lugubris Gravenhorst, 1829
 Cryptus lugubris lugubris Gravenhorst, 1829 (N)
Cryptus minator Gravenhorst, 1829 (N, S, Si)
Cryptus obscurus (Gmelin, 1790) (N, S, Sa)
Cryptus oriicus De Stefani, 1886 (Si) (*)
Cryptus pusillus De Stefani, 1894 (Si) (*)
Cryptus rudowi De Stefani, 1886 (Si) (*)
Cryptus spinosus Gravenhorst, 1829 (N, S, Si, Sa)
Cryptus spiralis (Fourcroy, 1785) (N, Sa)
Cryptus subspinosus Smits van Burgst, 1913 (Si, Sa)
Cryptus titubator (Thunberg, 1822) (N, S)
Cryptus triguttatus Gravenhorst, 1829 (N, S)
Cryptus tuberculatus Gravenhorst, 1829 (N, S)
Cryptus viduatorius Fabricius, 1804 (N, Si, Sa)

Xylophrurus Foerster, 1869

Xylophrurus apum (Thomson, 1873) (N)
Xylophrurus augustus (Dalman, 1823) (N, S, Sa)
Xylophrurus dentatus (Taschenberg, 1865) (N)
Xylophrurus lancifer (Gravenhorst, 1829) (N)

Myrmeleonostenus Uchida, 1936

Myrmeleonostenus italicus (Gravenhorst, 1829) (N, S, Si, Sa)

Meringopus Foerster, 1869

Meringopus calescens (Gravenhorst, 1829)
 Meringopus calescens calescens (Gravenhorst, 1829) (N)
Meringopus cyanator (Gravenhorst, 1829) (S)
Meringopus nigerrimus (Fonscolombe, 1850)
 Meringopus nigerrimus murorum (Tschek, 1872) (N)
Meringopus pseudonymus (Tschek, 1872) (N, S) (*)
Meringopus titillator (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
Meringopus turanus (Habermehl, 1918) (N, S)

Synechocryptus Schmiedeknecht, 1904

Synechocryptus mactator (Tschek, 1870) (Sa)

Mesostenus Gravenhorst, 1829

Mesostenus albinotatus Gravenhorst, 1829 (N, S)
Mesostenus cingulatellus A. Costa, 1886 (Sa) (*)

Mesostenus dentifer Thomson, 1897 (N)
Mesostenus funebris Gravenhorst, 1829 (N)
Mesostenus grammicus Gravenhorst, 1829 (N, S, Si, Sa)
Mesostenus transfugus Gravenhorst, 1829 (N, Sa)

Allophatnus Cameron, 1905

Allophatnus aetnensis (Rudow, 1883) (N, Si)

Listrognathus Tschek, 1870

Listrognathus compressicornis (Gravenhorst, 1829) (N)
Listrognathus helveticae (Horstmann, 1968) (N, S)
Listrognathus ligator (Gravenhorst, 1829) (N, S, Si)
Listrognathus mactator (Thunberg, 1822)
Listrognathus mactator mactator (Thunberg, 1822) (N, S)
Listrognathus mengersseni Schmiedeknecht, 1905 (N)
Listrognathus obnoxius (Gravenhorst, 1829) (N)
Listrognathus pubescens (Fonscolombe, 1850) (N)

Stenarella Szépligeti, 1916

Stenarella domator (Poda, 1761)
Stenarella domator cruentator (Klug, 1835) (Si)
Stenarella domator domator (Poda, 1761) (N, Si)

Picardiella Lichtenstein, 1920

Picardiella melanoleuca (Gravenhorst, 1829) (N, S)

Nematopodius Gravenhorst, 1829

Nematopodius formosus Gravenhorst, 1829 (N)

Acroricnus Ratzeburg, 1852

Acroricnus seductor (Scopoli, 1786) (N, S, Sa)
Acroricnus stylator (Thunberg, 1822) (N, S)

Schreineria Schreiner, 1905

Schreineria annulata (Brieschke, 1864) (N)
Schreineria hesperophanis (Picard, 1919) (S)
Schreineria populnea (Giraud, 1871) (N)

Latibulus Gistel, 1848

Latibulus argiolus (Rossi, 1790) (N, S, Si)

Sphecophaga Westwood, 1840

Sphecophaga vesparum (Curtis, 1828) (N)

Lycorina Holmgren, 1859

Lycorina triangulifera Holmgren, 1859 (Sa)

Stilbops Foerster, 1869

Stilbops limneriaeformis (Schmiedeknecht, 1888) (N)

Stilbops plementaschi Hensch, 1930 (N)

Stilbops ruficornis (Gravenhorst, 1829) (N, S)

Stilbops vetula (Gravenhorst, 1829) (N)

Neorhacodes Hedicke, 1922

Neorhacodes enslini (Ruschka, 1922) (N)

Teleutea Foerster, 1869

Teleutea brischkei (Holmgren, 1860) (N)

Apophua Morley, 1913

Apophua bipunctoria (Thunberg, 1822) (N, S)

Apophua cicatricosa (Ratzeburg, 1848) (N)

Apophua genalis (Moeller, 1883) (N)

Apophua suturalis (Morley, 1914)

Apophua suturalis italicator (Aubert, 1972) (N)

Glypta (Glypta) Gravenhorst, 1829

Glypta (Glypta) albanica Habermehl, 1926 (S)

Glypta (Glypta) bifoveolata Gravenhorst, 1829 (N)

Glypta (Glypta) exophthalmus Kriechbaumer, 1887 (N)

Glypta (Glypta) femorator (Desvignes, 1856) (N)

Glypta (Glypta) haesitator Gravenhorst, 1829 (N)

Glypta (Glypta) incisa Gravenhorst, 1829 (N)

Glypta (Glypta) longicauda Hartig, 1838 (N)

Glypta (Glypta) mensurator (Fabricius, 1775) (N, Sa)

Glypta (Glypta) microcera Thomson, 1889 (N)

Glypta (Glypta) nigricornis Thomson, 1889 (S)

Glypta (Glypta) parvicaudata Bridgman, 1889 (N)

Glypta (Glypta) pedata (Desvignes, 1856) (S)

Glypta (Glypta) resinanae Hartig, 1838 (N)

Glypta (Glypta) salsolicola Schmiedeknecht, 1907 (N)

Glypta (Glypta) sculpturata Gravenhorst, 1829 (N)
Glypta (Glypta) scutellaris Thomson, 1889 (*)
Glypta (Glypta) similis Bridgman, 1886 (N)
Glypta (Glypta) tenuicornis Thomson, 1889 (N)
Glypta (Glypta) teres Gravenhorst, 1829 (N)
Glypta (Glypta) trochanterata Bridgman, 1886 (S)
Glypta (Glypta) varicoxa Thomson, 1889 (N)
Glypta (Glypta) vulnerator Gravenhorst, 1829 (N, S)

***Glypta (Diblastomorpha)* Foerster, 1869**

Glypta (Diblastomorpha) cylindrator (Fabricius, 1787) (N, S)

***Glypta (Conoblasta)* Foerster, 1869**

Glypta (Conoblasta) caudata Thomson, 1889 (N, S)
Glypta (Conoblasta) ceratites (Gravenhorst, 1829) (N)
Glypta (Conoblasta) elongata Holmgren, 1860 (N)
Glypta (Conoblasta) extincta Ratzeburg, 1852 (N)
Glypta (Conoblasta) fronticornis Gravenhorst, 1829 (N)
Glypta (Conoblasta) heterocera Thomson, 1889 (N)
Glypta (Conoblasta) monoceros (Gravenhorst, 1829) (N)
Glypta (Conoblasta) subcornuta Gravenhorst, 1829 (N)
Glypta (Conoblasta) tegularis Thomson, 1889 (N)
Glypta (Conoblasta) woerzi Hedwig, 1952 (N)

***Lissonota (Lissonota)* Gravenhorst, 1829**

Lissonota (Lissonota) bistrigata Holmgren, 1860 (Sa)
Lissonota (Lissonota) elector Gravenhorst, 1829 (N)
Lissonota (Lissonota) freyi Hellen, 1915 (*)
Lissonota (Lissonota) impressifrons Thomson, 1889 (Sa)
Lissonota (Lissonota) impressor Gravenhorst, 1829 (N, S, Si)
Lissonota (Lissonota) pimplator (Zetterstedt, 1838) (S)
Lissonota (Lissonota) transversostriatus (Smits van Burgst, 1921) (N)

***Lissonota (Campocineta)* Schmiedeknecht, 1900**

Lissonota (Campocineta) admontensis Strobl, 1902 (N)
Lissonota (Campocineta) alpinistor Aubert, 1978 (N)
Lissonota (Campocineta) argiola Gravenhorst, 1829 (N)
Lissonota (Campocineta) bicincta Szépligeti, 1900
Lissonota (Campocineta) bicincta corsicator Aubert, 1972 (N)
Lissonota (Campocineta) bipartita A. Costa, 1886 (Sa)
Lissonota (Campocineta) bistrigata Holmgren, 1860 (Sa)
Lissonota (Campocineta) bivittata Gravenhorst, 1829 (N)
Lissonota (Campocineta) buccator (Thunberg, 1822) (N)
Lissonota (Campocineta) carbonaria Holmgren, 1860 (N)

Lissonota (Campocineta) clypealis Thomson, 1877 (N)
Lissonota (Campocineta) clypeator Gravenhorst, 1829 (N)
Lissonota (Campocineta) complicator Aubert, 1967 (N)
Lissonota (Campocineta) coracina (Gmelin, 1790) (N, Sa)
Lissonota (Campocineta) culiciformis Gravenhorst, 1829 (N)
Lissonota (Campocineta) deversor Gravenhorst, 1829 (N)
Lissonota (Campocineta) folii Thomson, 1877 (N)
Lissonota (Campocineta) fundator (Thunberg, 1822) (N, Sa)
Lissonota (Campocineta) funebris Habermehl, 1923 (N)
Lissonota (Campocineta) linearis Gravenhorst, 1829 (N)
Lissonota (Campocineta) maculata Brischke, 1864 (N)
Lissonota (Campocineta) nigridens Thomson, 1889 (N)
Lissonota (Campocineta) palpalis Thomson, 1889 (Sa)
Lissonota (Campocineta) proxima Fonscolombe, 1854 (N)
Lissonota (Campocineta) punctator Aubert, 1976 (N)
Lissonota (Campocineta) rufina A. Costa, 1886 (Sa)
Lissonota (Campocineta) rusticator (Thunberg, 1822) (Si)
Lissonota (Campocineta) sardanator Aubert, 1969 (Sa)
Lissonota (Campocineta) saturator (Thunberg, 1822) (N)
Lissonota (Campocineta) schmiedeknechti Smits van Burgst, 1914 (N)
Lissonota (Campocineta) silvatica Habermehl, 1918 (N)
Lissonota (Campocineta) sternalis A. Costa, 1886 (Sa)
Lissonota (Campocineta) variabilis Holmgren, 1860 (N)
Lissonota (Campocineta) versicolor Holmgren, 1860 (N)

***Lissonota (Loxonota)* Aubert, 1978**

Lissonota (Loxonota) flavovariegata (Lucas, 1894) (N, S)
Lissonota (Loxonota) histrio (Fabricius, 1798) (N, Si)
Lissonota (Loxonota) insignita Gravenhorst, 1829 (N, S, Si)
Lissonota (Loxonota) lineata Gravenhorst, 1829 (N, Sa)
Lissonota (Loxonota) mediterranea Seyrig, 1927 (Si)
Lissonota (Loxonota) perspicillata Gravenhorst, 1829 (N)

***Lissonota (Meniscus)* Schiödte, 1839**

Lissonota (Meniscus) catenator (Panzer, 1804) (N)

***Odinophora* Foerster, 1869**

Odinophora dorsalis (Gravenhorst, 1829) (N, S)
Odinophora graecator Aubert, 1978 (N)

***Alloplasta* Foerster, 1869**

Alloplasta grisea (Gravenhorst, 1829) (N)
Alloplasta piceator (Thunberg, 1822) (N, S)
Alloplasta plantaria (Gravenhorst, 1829) (N)

***Cryptopimpla* Taschenberg, 1863**

Cryptopimpla calceolata (Gravenhorst, 1829) (N)
Cryptopimpla caligata (Gravenhorst, 1829) (N, Si)
Cryptopimpla errabunda (Gravenhorst, 1829) (N)
Cryptopimpla helvetica Brauns, 1901 (N)

***Syzeuctus (Syzeuctus)* Foerster, 1869**

Syzeuctus (Syzeuctus) apicalis (Gravenhorst, 1829) (N)
Syzeuctus (Syzeuctus) exsculptus (Fonscolombe, 1854) (N, S)
Syzeuctus (Syzeuctus) fuscator (Panzer, 1809) (N, S, Si, Sa)
Syzeuctus (Syzeuctus) inaequalis (Fonscolombe, 1854) (N, S)
Syzeuctus (Syzeuctus) irrisorius (Rossi, 1794) (S)
Syzeuctus (Syzeuctus) luniger (Brauns, 1988) (N, Sa)
Syzeuctus (Syzeuctus) szilagysagiensis Kiss, 1926 (N)
Syzeuctus (Syzeuctus) tenuifasciatus Schmiedeknecht, 1900 (N, S)
Syzeuctus (Syzeuctus) tigris Seyrig, 1926 (S, Si)

***Syzeuctus (Diceratops)* Foerster, 1869**

Syzeuctus (Diceratops) bicornis (Gravenhorst, 1829) (N)

***Exetastes (Exetastes)* Gravenhorst, 1829**

Exetastes (Exetastes) adpressorius (Thunberg, 1822) (N, S, Si, Sa)
Exetastes (Exetastes) albiger Kriechbaumer, 1886 (S)
Exetastes (Exetastes) bilineatus Gravenhorst, 1829 (N, S)
Exetastes (Exetastes) calobatus Gravenhorst, 1829 (N, Sa)
Exetastes (Exetastes) crassus Gravenhorst, 1829 (N)
Exetastes (Exetastes) fornicator (Fabricius, 1781) (N)
Exetastes (Exetastes) geniculosus Holmgren, 1860 (N)
Exetastes (Exetastes) gracilicornis Gravenhorst, 1829 (N)
Exetastes (Exetastes) illusor Gravenhorst, 1829 (N, S)
Exetastes (Exetastes) laevigator (Villers, 1789) (N, S)
Exetastes (Exetastes) maurus Desvignes, 1856 (N)
Exetastes (Exetastes) nigripes Gravenhorst, 1829 (N)
Exetastes (Exetastes) robustus Gravenhorst, 1829 (N)

***Exetastes (Leptobatus)* Gravenhorst, 1829**

Exetastes (Leptobatus) degener (Gravenhorst, 1829) (N, S)
Exetastes (Leptobatus) rufipes (Gmelin, 1790) (N)
Exetastes (Leptobatus) ziegleri (Gravenhorst, 1829) (N)

***Banchopsis* Rudow, 1886**

Banchopsis crassicornis Rudow, 1886 (S, Si, Sa)

Banchus Fabricius, 1798

Banchus crefeldensis Ulbricht, 1916 (N)
Banchus dilatatorius (Thunberg, 1822) (N)
Banchus falcatorius (Fabricius, 1775) (N, S)
Banchus palpalis Ruthe, 1859 (N)
Banchus pictus Fabricius, 1798 (N, S, Sa)
Banchus volutatorius (Linnaeus, 1758) (N)
Banchus zonatus Rudow, 1883 (N, Si)

Ctenopelma Holmgren, 1855

Ctenopelma lucifer (Gravenhorst, 1829) (N)
Ctenopelma nigripennis (Gravenhorst, 1829) (N)
Ctenopelma xanthostigmum Holmgren, 1855 (N)

***Xenoschesis* (*Xenoschesis*)** Foerster, 1869

Xenoschesis (*Xenoschesis*) *fulvipes* (Gravenhorst, 1829) (N)
Xenoschesis (*Xenoschesis*) *nigricoxa* (Strobl, 1902) (N)

***Xenoschesis* (*Polycinetis*)** Foerster, 1869

Xenoschesis (*Polycinetis*) *resplendens* (Holmgren, 1855) (N)

Notopygus Holmgren, 1855

Notopygus bicarinatus Teunissen, 1953 (N)

Trematopygus Holmgren, 1855

Trematopygus dictator (Thunberg, 1822) (N)
Trematopygus vellicans (Gravenhorst, 1829) (N)

Glyptorhaestus Thomson, 1984

Glyptorhaestus punctulatus (Woldstedt, 1876) (N, S)

Rhorus Foerster, 1869

Rhorus chrysopus (Gmelin in Linnaeus, 1790) (N)
Rhorus exstirpatorius (Gravenhorst, 1829) (N)
Rhorus flavopictus (Strobl, 1903) (N)
Rhorus longicornis (Holmgren, 1856) (N, S)

Labrossyta Foerster, 1869

Labrossyta scotoptera (Gravenhorst, 1820) (N, S, Sa)

Syntactus Foerster, 1869

Syntactus delusor (Linnaeus, 1758) (N)

Pion Schiödte, 1838

Pion crassipes (Holmgren, 1855) (N)

Pion fortipes (Gravenhorst, 1829) (N, S)

Sympherta Foerster, 1869

Sympherta ambulator (Thunberg, 1822) (N)

Sympherta antilope (Gravenhorst, 1829) (N)

Sympherta canaliculata (Thomson, 1895) (N)

Sympherta foveolator (Holmgren, 1854) (N, S)

Sympherta fuscicornis (Gmelin in Linnaeus, 1790) (N, S)

Sympherta montana (Gravenhorst, 1829) (N)

Zaplethocornia Schmiedeknecht, 1913

Zaplethocornia filicornutor Aubert, 1976 (N)

Perilissus Holmgren, 1855

Perilissus buccinator Holmgren, 1855 (N)

Perilissus coxalis Thomson, 1883 (S)

Perilissus erythrocephalus Gravenhorst, 1829 (N)

Perilissus filicornis (Gravenhorst, 1820) (N)

Perilissus limitaris Gravenhorst, 1829 (N)

Perilissus lutescens Holmgren, 1855 (N)

Perilissus pallidus (Gravenhorst, 1829) (N)

Perilissus rufoniger (Gravenhorst, 1820) (N, S)

Perilissus sericeus (Gravenhorst, 1829) (N)

Perilissus spilonotus (Stephens, 1835) (N)

Perilissus tripunctor (Thunberg, 1822) (N)

Perilissus vollenhoveni Gribodo, 1880 (S)

Absyrtus Holmgren, 1859

Absyrtus vicinator (Thunberg, 1822) (N)

Opheltes Holmgren, 1859

Opheltes fuscipennis (Gravenhorst, 1829) (N, S)

Opheltes glaucopterus (Linnaeus, 1758) (N, S)

Priopoda Holmgren, 1855

- Priopoda apicaria* (Fourcroy, 1785) (N, S)
- Priopoda xanthopsana* (Gravenhorst, 1829) (N)
- Priopoda xanthopsanator* Aubert, 1969 (N)

Lathrolestes Foerster, 1869

- Lathrolestes citreus* (Brieschke, 1878) (N)
- Lathrolestes macropygus* (Holmgren, 1855) (N)
- Lathrolestes orbitalis* (Gravenhorst, 1829) (N)
- Lathrolestes pleuralis* (Thomson, 1883) (N, S)
- Lathrolestes verticalis* (Brieschke, 1871) (N)

Scolobates Gravenhorst, 1829

- Scolobates auriculatus* (Fabricius, 1804) (N, S)
- Scolobates nigripennis* Sichel, 1860 (N, S, Si)

Otlophorus Foerster, 1869

- Otlophorus italicus* (Gravenhorst, 1829) (N)

Azelus Foerster, 1869

- Azelus erythropalpus* (Gmelin, 1790) (N)

Lagarotis Foerster, 1869

- Lagarotis debitor* (Thunberg, 1822) (N)
- Lagarotis erythrocerus* (Gravenhorst, 1829) (N)
- Lagarotis semicaligatus* (Gravenhorst, 1820) (N)
- Lagarotis simulator* Heinrich, 1952 (N)

Barytarbes Foerster, 1869

- Barytarbes adpropinquator* (Gravenhorst, 1829) (N)
- Barytarbes laeviusculus* (Thomson, 1883) (N)
- Barytarbes segmentarius* (Fabricius, 1787) (N)
- Barytarbes superbus* (Schmiedeknecht, 1914) (N, S)

Alexeter Foerster, 1869

- Alexeter gracilentus* (Holmgren, 1855) (N)
- Alexeter multicolor* (Gravenhorst, 1829) (N)
- Alexeter nebulator* (Thunberg, 1822) (N)
- Alexeter niger* (Gravenhorst, 1829) (N)

Alexeter obscuricolor Heinrich, 1953 (N)
Alexeter sectator (Thunberg, 1822) (N)
Alexeter testaceus (Fabricius, 1798) (N)

Protarchus Foerster, 1869

Protarchus testatorius (Thunberg, 1822) (N)

Perispuda Foerster, 1869

Perispuda facialis (Gravenhorst, 1829) (N)

Lamachus Foerster, 1869

Lamachus australis (Schmiedeknecht, 1914) (N)
Lamachus coalitorius (Thunberg, 1822) (N, S)
Lamachus cruralis (Gravenhorst, 1829) (N)
Lamachus eques (Hartig, 1838) (N, S)
Lamachus frutetorum (Hartig, 1838) (S)
Lamachus virgultorum (Gravenhorst, 1829) (N)

Scopesis Foerster, 1869

Scopesis bicolor (Gravenhorst, 1829) (N)
Scopesis gesticulator (Thunberg, 1822) (N)
Scopesis macropus (Thomson, 1895) (N)
Scopesis politus (Holmgren, 1855) (N)

Himerta Foerster, 1869

Himerta defectiva (Gravenhorst, 1820) (N)

Rhinotorus Foerster, 1869

Rhinotorus atratus (Holmgren, 1855) (N)

Campodorus Foerster, 1869

Campodorus alticola (Holmgren, 1855) (N)
Campodorus dorsalis (Gravenhorst, 1829) (N)
Campodorus haematodes Gravenhorst, 1829 (S)
Campodorus hamulus (Gravenhorst, 1829) (N)
Campodorus intermedius (Gravenhorst, 1829) (N)
Campodorus variegatus (Jurine, 1807) (S)

Mesoleius Holmgren, 1855

Mesoleius aulicus (Gravenhorst, 1829) (N)

Mesoleius armillatorius (Gravenhorst, 1807) (N)
Mesoleius bisignatus A. Costa, 1888 (Sa) (*)
Mesoleius elongatus Brischke, 1871 (N)
Mesoleius infidus Woldstedt, 1876 (N)
Mesoleius leavigatus (Gravenhorst, 1820) (N)
Mesoleius tibialis Holmgren, 1855 (N) (*)
Mesoleius tricoloripes A. Costa, 1885 (Sa)

Hyperbatus Foerster, 1869

Hyperbatus sternoxanthus (Gravenhorst, 1829) (N)

Anoncus Townes, 1970

Anoncus femorator (Thomson, 1895) (N)
Anoncus sincerus (Holmgren, 1855) (N)

Synomelix Foerster, 1869

Synomelix albipes (Gravenhorst, 1829) (N)
Synomelix faciator Idar, 1983 (N)

Synodites Foerster, 1869

Synodites breviventris (Gravenhorst, 1829) (N)

Mesoleptidea Viereck, 1912

Mesoleptidea cingulata (Gravenhorst, 1829) (N)
Mesoleptidea prosoleuca (Gravenhorst, 1820) (N, S)
Mesoleptidea stalii (Holmgren, 1856) (N)

Gunomeria Schmiedeknecht, 1907

Gunomeria macrodactyla (Holmgren, 1855) (Sa)

Hadrodactylus Foerster, 1869

Hadrodactylus bidentulus Thomson, 1883 (N)
Hadrodactylus faciator (Thunberg, 1822) (*)
Hadrodactylus femoralis (Holmgren, 1855) (N)
Hadrodactylus flavifrontator (Thunberg, 1822) (N, S)
Hadrodactylus fugax (Gravenhorst, 1829) (N)
Hadrodactylus gracilipes (Thomson, 1883) (N)
Hadrodactylus gracilis (Stephens, 1835) (N)
Hadrodactylus lavatus Kriechbaumer, 1891 (N)
Hadrodactylus nigrifemur Thomson, 1883 (N)
Hadrodactylus tarsator Thomson, 1883 (*)

Hadrodactylus typhae (Fourcroy, 1785) (N)

Hypsantyx Pfankuch, 1906

Hypsantyx lituratorius (Linnaeus, 1761) (N)

Hypamblys Foerster, 1869

Hypamblys albopictus (Gravenhorst, 1829) (N)

Hypamblys brevisculus (Fonscolombe, 1849) (*)

Hypamblys brevisculus brevisulcus (Fonscolombe, 1849) (N)

Hypamblys brevisculus italicator (Aubert, 1976)

Phobetes Foerster, 1869

Phobetes atomator (O.F. Müller, 1776) (N)

Phobetes chrysostomus (Gravenhorst, 1820) (N)

Phobetes leptocerus (Gravenhorst, 1820) (N)

Euryproctus Holmgren, 1855

Euryproctus annulatus (Gravenhorst, 1829) (N)

Euryproctus bivinctus Holmgren, 1855 (N)

Euryproctus coxalis A. Costa, 1888 (Sa) (*)

Euryproctus geniculatus (Gravenhorst, 1829) (N)

Euryproctus mundus (Gravenhorst, 1820) (N)

Euryproctus nemoralis (Fourcroy, 1785) (N)

Euryproctus sexannulatus Kriechbaumer, 1891 (N)

Protohellwigia Brues, 1910

Protohellwigia obscura (Gravenhorst, 1823) (N)

Sinophorus Foerster, 1869

Sinophorus albidus (Gmelin, 1790) (N, Si)

Sinophorus crassifemur (Thomson, 1877) (S)

Sinophorus fuscicarpus (Thomson, 1887) (N)

Sinophorus geniculatus (Gravenhorst, 1829) (N)

Sinophorus juniperinus (Holmgren, 1855)

Sinophorus juniperinus alpinator Aubert, 1974 (N)

Sinophorus nigricoxa Sanborne, 1984 (N)

Sinophorus pectinatus Sanborne, 1984 (N)

Sinophorus pleuralis (Thomson, 1887) (N, Sa)

Sinophorus turionis (Ratzeburg, 1844) (N, S)

Sinophorus villosus Sanborne, 1984 (N)

Sinophorus xanthostomus (Gravenhorst, 1829) (N, S, Sa)

Campoplex Gravenhorst, 1829

Campoplex bilobus (Thomson, 1887) (N)
Campoplex borealis (Zetterstedt, 1838) (N)
Campoplex capitator Aubert, 1960 (N)
Campoplex cursitans (Holmgren, 1858) (S, Si)
Campoplex difformis (Gmelin, 1790) (N, S, Sa)
Campoplex elongator Aubert, 1960 (N)
Campoplex ensator (Gravenhorst, 1829) (N)
Campoplex excentricus (Bauer, 1937) (N)
Campoplex fanensis (Cecconi, 1924) (S) (*)
Campoplex gracilis Ratzeburg, 1848 (N)
Campoplex horstmanniator Aubert, 1977 (N)
Campoplex mutabilis (Holmgren, 1860) (N, S, Sa)
Campoplex occipitor Aubert, 1966 (N)
Campoplex punctatus Bridgman, 1886 (N)
Campoplex restrictor Aubert, 1960 (N)
Campoplex rufinator Aubert, 1969 (N)
Campoplex rufipes Gravenhorst, 1829 (N)
Campoplex spurius Gravenhorst, 1829 (N)
Campoplex striatus Horstmann, 1985 (N)

Phaetroctonus Foerster, 1869

Phaetroctonus moderator (Linnaeus, 1758) (S)
Phaetroctonus transfuga (Gravenhorst, 1829) (N)

Venturia Schrottky, 1902

Venturia canescens (Gravenhorst, 1829) (N, Si)

Casinaria Holmgren, 1859

Casinaria albipalpis (Gravenhorst, 1829) (N)
Casinaria krieckbaumeri A. Costa, 1884 (Sa) (*)
Casinaria mesozostus (Gravenhorst, 1829) (N)
Casinaria monticola Thomson, 1887 (N)
Casinaria orbitalis (Gravenhorst, 1829) (N, S, Si, Sa)
Casinaria rufimana (Gravenhorst, 1829) (N)
Casinaria scabra Thomson, 1887 (N)
Casinaria subglabra Thomson, 1887 (N)
Casinaria tenuiventris (Gravenhorst, 1829) (N, S)

Charops Holmgren, 1859

Charops cantator (De Geer, 1778) (N, S)

Delopia Cameron, 1903

Delopia aemula (Foerster, 1868) (N, Sa)
Delopia alticola (Gravenhorst, 1829) (Si)
Delopia americana (Ashmead, 1890) (N)
Delopia anceps (Holmgren, 1860) (N)
Delopia angustifrons (Foerster, 1868) (N)
Delopia bucculenta (Holmgren, 1860) (N, S)
Delopia calceata (Brauns, 1895) (S)
Delopia carinifrons (Holmgren, 1858) (N)
Delopia carpathica (Szépligeti, 1916) (N)
Delopia circumcincta (Foerster, 1868) (N)
Delopia circumspectans (Foerster, 1868) (N)
Delopia confusa (Foerster, 1868) (N)
Delopia contumax (Foerster, 1868) (N, S, Sa)
Delopia cultrator (Gravenhorst, 1829) (N, Sa)
Delopia disclusa (Foerster, 1868) (N, S)
Delopia erythrogaster (Foerster, 1868) (N, S)
Delopia falcator (Fabricius, 1775) (N, Si)
Delopia foersteri (Roman, 1942) (N, S)
Delopia habermehli (Kriechbaumer, 1898) (N)
Delopia heterocera (Foerster, 1868) (N, S)
Delopia humilis (Foerster, 1868) (N)
Delopia inermis (Foerster, 1868) (Si)
Delopia insignita (Foerster, 1868) (N, Si)
Delopia lamellator (Aubert, 1960) (S)
Delopia leptogaster (Holmgren, 1858) (N, S)
Delopia limnobia (Thomson, 1887) (N)
Delopia longiseta (Hinz, 1961) (S)
Delopia mactator (Foerster, 1868) (N)
Delopia myrtilla (Desvignes, 1856) (N)
Delopia nidulator (Fabricius, 1804) (N, S)
Delopia notabilis (Foerster, 1868) (N)
Delopia oblitterata (Holmgren, 1872) (N)
Delopia oxyacanthae (Boie, 1855) (N, S)
Delopia perditor (Foerster, 1868) (S)
Delopia petiolator (Fabricius, 1804) (N)
Delopia pineticola (Holmgren, 1872) (N)
Delopia polita (Foerster, 1868) (N, Sa)
Delopia pugillator (Linnaeus, 1758) (N, Sa)
Delopia pulmentariae (Hinz, 1963) (S)
Delopia remota (Foerster, 1868) (N)
Delopia rugifer (Foerster, 1868) (N)
Delopia semiflava (A. Costa, 1883) (Sa)
Delopia signator (Brauns, 1895) (N)
Delopia sobolicida (Foerster, 1868) (N)
Delopia spinipes (Thomson, 1887) (N)
Delopia stenogaster (Foerster, 1868) (N)
Delopia stygia (Foerster, 1868) (N, S)

Delopia stragifex (Foerster, 1868) (N, S)
Delopia subimpressa (Foerster, 1868) (N)
Delopia tenuis (Foerster, 1868) (N, S)
Delopia terebrator (Foerster, 1868) (N, S)
Delopia victor (Thunberg, 1822) (N)
Delopia vigilator (Foerster, 1868) (N)
Delopia xenocampta (Foerster, 1868) (N, S)

Cymodusa Holmgren, 1859

Cymodusa australis (Smiths van Burgst, 1912) (N)
Cymodusa exilis Holmgren, 1858 (*)
Cymodusa leucocera Holmgren, 1858 (*)

Xylophylax Kriechbaumer, 1878

Xylophylax lucida (Clément, 1924) (N)
Xylophylax megacephala (Gravenhorst, 1829) (N, S)
Xylophylax pectoralis (Kriechbaumer, 1890) (N)
Xylophylax rufocoxalis (Clément, 1924) (N)

Nemeritis Holmgren, 1860

Nemeritis macrocentrus (Gravenhorst, 1829) (N, S)
Nemeritis rufipes Bridgman, 1883 (N)

Bathyplectes Foerster, 1869

Bathyplectes anurus (Thomson, 1887)
Bathyplectes anurus contractus (Thomson, 1887) (N)
Bathyplectes anurus graecator (Aubert, 1970) (S)
Bathyplectes carthaginensis (Smits van Burgst, 1913) (N)
Bathyplectes curculionis (Thomson, 1887) (S)
Bathyplectes exiguus (Gravenhorst, 1829) (N)
Bathyplectes tibiator (Gravenhorst, 1820) (N)

Biolysia Schmiedeknecht, 1907

Biolysia algerica Smits van Burgst, 1913 (*)
Biolysia infernalis (Gravenhorst, 1820) (N)
Biolysia tristis (Gravenhorst, 1824) (N, S)

Campoletis Foerster, 1869

Campoletis crassicornis (Tschek, 1871) (S)
Campoletis dolosa (Gravenhorst, 1829) (N)
Campoletis excavata (Smits van Burgst, 1914) (N)
Campoletis holmgreni (Tschek, 1871) (N)

Campoletis meridionalis (Smits van Burgst, 1914) (N)
Campoletis multicinctus (Gravenhorst, 1829) (N, S)
Campoletis orbator (Gravenhorst, 1829) (N, S)
Campoletis raptor (Zetterstedt, 1838) (N)
Campoletis varians (Thomson, 1887) (N)
Campoletis viennensis (Gravenhorst, 1829) (S)
Campoletis zonatus (Gravenhorst, 1829) (Sa)

Meloboris Holmgren, 1859

Meloboris collector (Thunberg, 1822) (N)

Phobocampe Foerster, 1869

Phobocampe bicingulata (Gravenhorst, 1829) (N)
Phobocampe crassiuscula (Gravenhorst, 1829) (N)
Phobocampe lymantriae Gupta, 1983 (S)
Phobocampe tempestiva (Holmgren, 1860) (*)
Phobocampe uncinata (Gravenhorst, 1829) (N)

Tranosemella Horstmann, 1977

Tranosemella praerogator (Linnaeus, 1758) (N)

Enytus Cameron, 1905

Enytus montanus (Ashmead, 1890) (N)

Diadegma (Diadegma) Foerster, 1869

Diadegma (Diadegma) alpicola (Smits van Burgst, 1914) (N)
Diadegma (Diadegma) crassicornis (Gravenhorst, 1829) (S, Sa)
Diadegma (Diadegma) filiformator Aubert, 1971 (S)
Diadegma (Diadegma) grisescens (Gravenhorst, 1829) (Si, Sa)
Diadegma (Diadegma) velox (Holmgren, 1858) (Si)

Diadegma (Neoangitia) Horstmann, 1969

Diadegma (Neoangitia) albotibiale Horstmann, 1973 (N)
Diadegma (Neoangitia) glabriculum (Holmgren, 1859) (N)
Diadegma (Neoangitia) kyffhusanae Horstmann, 1973 (N)

Diadegma (Nythobia) Foerster, 1869

Diadegma (Nythobia) armillatum (Gravenhorst, 1829) (N, S, Sa)
Diadegma (Nythobia) chrysostictum (Gmelin, 1790) (N, S)
Diadegma (Nythobia) combinatum (Holmgren, 1860) (N)
Diadegma (Nythobia) dinianator Aubert, 1966 (N)

Diadegma (Nythobia) erucator (Zetterstedt, 1838) (N)
Diadegma (Nythobia) fenestrata (Holmgren, 1858) (N, S)
Diadegma (Nythobia) filiformator Aubert, 1971 (S)
Diadegma (Nythobia) flavotibiale Horstmann, 1973 (*)
Diadegma (Nythobia) gracillimum (Smits van Burgst, 1914) (N)
Diadegma (Nythobia) ledicolum Horstmann, 1969 (N)
Diadegma (Nythobia) majale (Gravenhorst, 1829) (N, Si)
Diadegma (Nythobia) tenuipes (Thomson, 1887) (N, S)
Diadegma (Nythobia) undulator Aubert, 1970 (N)

Hyposoter Foerster, 1869

Hyposoter didymator (Thunberg, 1822) (N, S)
Hyposoter ebeninus (Gravenhorst, 1829) (N, S, Sa)
Hyposoter notatus (Gravenhorst, 1829) (N, S, Sa)
Hyposoter rhodocerae (Rondani, 1877) (*)
Hyposoter vividus (Holmgren, 1860) (N)

Olesicampe Foerster, 1869

Olesicampe argentata (Gravenhorst, 1829) (S)
Olesicampe caedator (Gravenhorst, 1829) (N)
Olesicampe cavigena (Thomson, 1887) (N)
Olesicampe erythropyga (Holmgren, 1858) (Si)
Olesicampe flaveolata (De Stefani, 1894) (Si) (*)
Olesicampe longipes (Mueller, 1776) (N)
Olesicampe praecox Holmgren, 1858 (N, S) (*)
Olesicampe proterva (Brieschke, 1880) (N)
Olesicampe pubescens (Ratzeburg, 1844) (S)
Olesicampe sternella (Thomson, 1887) (N)

Lathrostizus Foerster, 1869

Lathrostizus flexicauda (Holmgren, 1858) (Si)

Eriborus Foerster, 1869

Eriborus braccatus (Gmelin, 1790) (N)
Eriborus dorsalis (Gravenhorst, 1829) (Sa)
Eriborus perfidus (Gravenhorst, 1829) (N)
Eriborus terebrans (Gravenhorst, 1829) (N, S)

Echthronomas Foerster, 1869

Echthronomas facialis (Thomson, 1887) (N)
Echthronomas quadrinotatus (Thomson, 1887) (N)

Chromoplex Horstmann, 1986

Chromoplex picticollis (Thomson, 1887) (*)

Pristomerus Curtis, 1836

Pristomerus africanus Aubert & Shaumar, 1978 (N)

Pristomerus armatus (Lucas, 1846) (N, S)

Pristomerus kasparyani Narolski, 1986 (S)

Pristomerus orbitalis Holmgren, 1858 (N, Si)

Pristomerus pallidus Thomson, 1890 (S, Si)

Pristomerus rufiabdominalis Uchida, 1928 (N)

Pristomerus sardous Dalla Torre, 1901 (Sa)

Pristomerus vulnerator (Panzer, 1799) (N, Si)

Dimophora Foerster, 1869

Dimophora evanialis (Gravenhorst, 1829) (N)

Dimophora nitens (Gravenhorst, 1829) (N)

Cremastus Gravenhorst, 1829

Cremastus bellicosus Gravenhorst, 1829 (Si)

Cremastus crassicornis Thomson, 1890 (N)

Cremastus geminus Gravenhorst, 1829 (N)

Cremastus infirmus Gravenhorst, 1829 (N)

Cremastus nasutor Aubert, 1974 (N)

Cremastus ornatus Szépligeti, 1900 (N)

Cremastus puberulus Szépligeti, 1900 (*)

Cremastus pungens Gravenhorst, 1829 (N)

Cremastus spectator Gravenhorst, 1829 (N, Si)

Temelucha Foerster, 1869

Temelucha arthroleuca (A. Costa, 1885) (Sa)

Temelucha caudata (Szépligeti, 1900) (N)

Temelucha confluens (Gravenhorst, 1829) (N, Si)

Temelucha decorata (Gravenhorst, 1829) (N, Si, Sa)

Temelucha genalis (Szépligeti, 1900) (Si)

Temelucha interruptor (Gravenhorst, 1829) (N, Si)

Temelucha pleurovittata A. Costa, 1883 (Si, Sa)

Temelucha subnasuta (Thomson, 1890) (N)

Eucremastus Szépligeti, 1905

Eucremastus manni (Tschek, 1871) (N)

Phrudus Foerster, 1869

Phrudus badensis Hilpert, 1987 (N)

Hybrizon Fallén, 1813

Hybrizon buccatus De Brébisson, 1825 (N)

Eurypterna Foerster, 1862

Eurypterna cremieri Romand, 1838 (*)

Allophroides Horstmann, 1971

Allophroides boops (Gravenhorst, 1829) (N)

Probles (Rugodiaparsis) Horstmann, 1971

Probles (Rugodiaparsis) crassipes (Thomson, 1889) (N)

Probles (Rugodiaparsis) ruficornis (Szépligeti, 1899) (N)

Probles (Microdiaparsis) Horstmann, 1971

Probles (Microdiaparsis) microcephalus (Gravenhorst, 1829) (N)

Probles (Microdiaparsis) neoversutus (Horstmann, 1967) (N)

Probles (Microdiaparsis) versutus (Holmgren, 1860) (N) (*)

Probles (Euporizon) Horstmann, 1971

Probles (Euporizon) exilis (Holmgren, 1860) (N)

Probles (Euporizon) extensor (Aubert, 1971) (N)

Probles (Euporizon) montanus Horstmann, 1971 (N)

Probles (Euporizon) nigriventris Horstmann, 1971 (N)

Probles (Euporizon) rufipes (Holmgren, 1858) (N)

Probles (Euporizon) tenuicornis Horstmann, 1981 (N)

Probles (Euporizon) truncorum (Holmgren, 1860) (N)

Probles (Rhynchoproble) Horstmann, 1971

Probles (Rhynchoproble) longisetosus (Hedwig, 1956) (N)

Probles (Probles) Foerster, 1869

Probles (Probles) brevivalvis Horstmann, 1971 (N)

Probles (Probles) erythrostomus (Gravenhorst, 1829) (N, S)

Probles (Probles) flavipes (Szépligeti, 1899) (N)

Barycnemis Foerster, 1869

Barycnemis alpina (Strobl, 1901) (N)

Barycnemis angustipennis (Holmgren, 1860) (N)
Barycnemis bellator (O.F. Müller, 1776) (N)
Barycnemis dissimilis (Gravenhorst, 1829) (N)
Barycnemis exhaustor (Fabricius, 1798) (N)
Barycnemis filicornis (Thomson, 1889) (N)
Barycnemis gravipes (Gravenhorst, 1829) (N)
Barycnemis guttulator (Thunberg, 1822) (N)
Barycnemis harpura (Schränk, 1802) (N)
Barycnemis punctifrons Horstmann, 1981 (N)

Tersilochus (Gonolochus) Foerster, 1869

Tersilochus (Gonolochus) caudatus (Holmgren, 1858) (N)
Tersilochus (Gonolochus) rugulosus Horstmann, 1981 (S)

Tersilochus (Pectinolochus) Aubert, 1960

Tersilochus (Pectinolochus) coeliodicola Silvestri, 1917 (S)
Tersilochus (Pectinolochus) striola Thomson, 1889 (N)

Tersilochus (Tersilochus) Holmgren, 1858

Tersilochus (Tersilochus) brevissimus Horstmann, 1981 (N)
Tersilochus (Tersilochus) curvator Horstmann, 1981 (N)
Tersilochus (Tersilochus) jocator Holmgren, 1858 (N, S)
Tersilochus (Tersilochus) longicaudatus Horstmann, 1971 (N)
Tersilochus (Tersilochus) microgaster (Szépligeti, 1899) (N)
Tersilochus (Tersilochus) obscurator Aubert, 1959 (N)
Tersilochus (Tersilochus) ruberi Horstmann, 1981 (S)
Tersilochus (Tersilochus) saltator (Fabricius, 1781) (N)
Tersilochus (Tersilochus) tripartitus Brieschke, 1880 (N)

Phradis Foerster, 1869

Phradis brevicornis Horstmann, 1971 (N)
Phradis brevis (Brieschke, 1880) (N)
Phradis minutus (Bridgman, 1889) (N)
Phradis monticola Szépligeti, 1899 (N)
Phradis nigrifrons (Gravenhorst, 1829) (Si)
Phradis punctipennis Horstmann, 1971 (N)
Phradis terebrator Horstmann, 1981 (N)
Phradis toreador Aubert, 1986 (*)

Heterocola (Heterocola) Foerster, 1869

Heterocola (Heterocola) linguarum (Haliday, 1838) (S)
Heterocola (Heterocola) proboscidalis (Thomson, 1889) (N)

Heterocola (Heterocoloides) Horstmann, 1971

Heterocola (Heterocoloides) punctulata (Szépligeti, 1899) (N)

Diaparsis (Diaparsis) Foerster, 1869

Diaparsis (Diaparsis) basalis Horstmann, 1981 (N)

Diaparsis (Diaparsis) carinifer (Thomson, 1889) (N, Sa)

Diaparsis (Diaparsis) multiplicator Aubert, 1969 (N, S)

Diaparsis (Diaparsis) temporalis Horstmann, 1979

Diaparsis (Diaparsis) temporalis temporalis Horstmann, 1979 (N, S)

Diaparsis (Pseudaneuclis) Horstmann, 1971

Diaparsis (Pseudaneuclis) rarus Horstmann, 1971 (N)

Aneuclis Foerster, 1869

Aneuclis incidens (Thomson, 1889) (N, S)

Aneuclis melanarius (Holmgren, 1860) (N, S, Si)

Aneuclis pusillus Masi, 1933 (S) (*)

Sathropterus Foerster, 1869

Sathropterus pumilus (Holmgren, 1860) (N)

Epistathmus Foerster, 1869

Epistathmus crassicornis Horstmann, 1971 (N)

Ophion Fabricius, 1798

Ophion andalusiacus Shestakov, 1926 (Si)

Ophion baueri Habermehl, 1930 (Si) (*)

Ophion brevicornis Morley, 1914 (N)

Ophion crassicornis Brock, 1982 (Si)

Ophion forticornis Morley, 1914 (Sa)

Ophion longigena Thomson, 1888 (N, Sa)

Ophion luteus (Linnaeus, 1758) (N, S, Sa)

Ophion minutus Kriechbaumer, 1879 (N, S, Sa)

Ophion mocsaryi Brauns, 1889 (N, S, Sa)

Ophion neglectus Habermehl, 1930 (Sa)

Ophion obscuratus Fabricius, 1804 (N, S, Si, Sa)

Ophion ocellaris Ulbricht, 1926 (N, S)

Ophion parvulus Kriechbaumer, 1879 (N, S)

Ophion perkinsi Brock, 1982 (S)

Ophion pteridis Kriechbaumer, 1879 (N, S, Si)

Ophion scutellaris Thomson, 1888 (S)

Ophion slaviceki Kriechbaumer, 1892 (S)
Ophion ventricosus Gravenhorst, 1829 (N, S, Si)

Hellwigiella Szépligeti, 1905

Hellwigiella dichromoptera (A. Costa, 1886) (Sa)

Eremotylus Foerster, 1869

Eremotylus curvinervis (Kriechbaumer, 1878) (S, Sa)
Eremotylus divisor (Aubert, 1980) (N)
Eremotylus marginatus (Jurine, 1807) (S)

Stauropoctonus Brauns, 1889

Stauropoctonus bombycivorus (Gravenhorst, 1829) (N)

Enicospilus Stephens, 1835

Enicospilus cerebrator Aubert, 1966 (N, S, Si)
Enicospilus combustus (Gravenhorst, 1829) (N)
Enicospilus cruciator Viktorov, 1957 (N, S)
Enicospilus inflexus (Ratzeburg, 1844) (N, S, Si)
Enicospilus ocellatus Shestakov, 1926 (N, S, Si, Sa)
Enicospilus ramidulops Scaramozzino, 1986 (N)
Enicospilus ramidulus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa) (*)
Enicospilus repentinus (Holmgren, 1858) (N, S)
Enicospilus tournieri (Vollenhoven, 1879) (N, S)
Enicospilus undulatus (Gravenhorst, 1829) (N, S, Si, Sa)
Enicospilus unicallosus (Vollenhoven, 1878) (Sa)

Cidaphus Foerster, 1869

Cidaphus alarius (Gravenhorst, 1829) (N)

Astiphromma Foerster, 1869

Astiphromma dorsale (Holmgren, 1858) (N)
Astiphromma strenuum (Holmgren, 1860) (N)
Astiphromma varipes (Holmgren, 1858) (N)

Mesochorus Gravenhorst, 1829

Mesochorus aciculatus Bridgman, 1881 (N)
Mesochorus confusus Holmgren, 1858 (N)
Mesochorus curvulus Thomson, 1885 (N)
Mesochorus declinans Habermehl, 1922 (N)
Mesochorus discitergus (Say, 1835) (N)

Mesochorus dispar Brischke, 1880 (N)
Mesochorus fulgurans Curtis, 1833 (N)
Mesochorus fuscicornis Brischke, 1880 (N)
Mesochorus giberius (Thunberg, 1822) (N)
Mesochorus globulator (Thunberg, 1822) (Si)
Mesochorus marginatus Thomson, 1885 (N)
Mesochorus nigripes Ratzeburg, 1852 (N)
Mesochorus picticrus Thomson, 1885 (N)
Mesochorus pictilis Holmgren, 1860 (N)
Mesochorus politus Gravenhorst, 1829 (N)
Mesochorus semirufus Holmgren, 1860 (N)
Mesochorus sylvarum Curtis, 1833 (N)
Mesochorus splendidulus Gravenhorst, 1829 (N)
Mesochorus stigmator (Thunberg, 1822) (N)
Mesochorus tachypus Holmgren, 1860 (N)
Mesochorus testaceus Gravenhorst, 1829 (N)
Mesochorus thoracicus Gravenhorst, 1829 (N)
Mesochorus velox Holmgren, 1829 (N)
Mesochorus vittator (Zetterstedt, 1838) (N)
Mesochorus vitticollis Holmgren, 1858 (N)

Stictopisthus Thomson, 1886

Stictopisthus macrocephalus (Strobl, 1904) (N)

Chorinaeus Holmgren, 1856

Chorinaeus australis Thomson, 1887 (N)
Chorinaeus cristator (Gravenhorst, 1829) (N)
Chorinaeus funebris (Gravenhorst, 1829) (N)

Trieces Townes, 1946

Trieces thuringiacus (Schmiedeknecht, 1925) (N)
Trieces tricarinatus (Holmgren, 1856) (N)

Metopius (Peltocarus) Thomson, 1887

Metopius (Peltocarus) croceicornis Thomson, 1887 (S, Si)
Metopius (Peltocarus) dentatus (Fabricius, 1779) (N, S, Si) (*)
Metopius (Peltocarus) laticinctus Clément, 1930 (S, Si)

Metopius (Metopius) Panzer, 1806

Metopius (Metopius) anxium Wesmael, 1849 (S)
Metopius (Metopius) vespoides (Scopoli, 1763) (S)

Metopius (Ceratopius) Clément, 1927

Metopius (Ceratopius) croaticus Clément, 1930 (N)
Metopius (Ceratopius) dissectorius (Panzer, 1805) (N, S, Sa)
Metopius (Ceratopius) erythropus Kriechbaumer, 1894 (Si)
Metopius (Ceratopius) fuscipennis Wesmael, 1849 (N)
Metopius (Ceratopius) mediterraneus Clément, 1930 (N, Si)

Metopius (Tylopius) Townes, 1959

Metopius (Tylopius) austriacus Clément, 1930 (N)
Metopius (Tylopius) pinatorius Brullé, 1846 (Si)

Triclistus Foerster, 1869

Triclistus albicinctus Thomson, 1887 (N)
Triclistus alpinator Aubert, 1969 (N)
Triclistus globulipes (Desvignes, 1856) (N)
Triclistus lativentris Thomson, 1887 (N)
Triclistus podagricus (Gravenhorst, 1829) (N)
Triclistus pubiventris Thomson, 1887 (N)
Triclistus pygmaeus (Cresson, 1864) (N)

Colpotrochia Holmgren, 1855

Colpotrochia cincta (Scopoli, 1763) (N, S, Si)

Periope Haliday, 1839

Periope auscultator Haliday, 1839 (N)

Spudaeus Gistel, 1848

Spudaeus scabra (Gravenhorst, 1829) (N, S)

Bremiella Dalla Torre, 1901

Bremiella pulchella (Kriechbaumer, 1890) (N)

Lapton Nees, 1816

Lapton femoralis Nees, 1816 (N)

Hypsicera Latreille, 1829

Hypsicera anglicus (Schmiedeknecht, 1925) (N)
Hypsicera curvator (Fabricius, 1793) (N, S)
Hypsicera femoralis (Goeffroy, 1785) (N)
Hypsicera flaviceps (Ratzeburg, 1852) (N)

Hypsicera subtilitor Aubert, 1969 (*)

Exochus Gravenhorst, 1829

Exochus coronatus Gravenhorst, 1829 (N, Sa)
Exochus erythronotus (Gravenhorst, 1820) (N, S, Si, Sa)
Exochus flavomarginatus Holmgren, 1856 (N)
Exochus gravipes (Gravenhorst, 1820) (N)
Exochus gravis Gravenhorst, 1829 (N)
Exochus humerator Aubert, 1960 (Si)
Exochus incidens Thomson, 1887 (N)
Exochus longicornis Thomson, 1887 (N)
Exochus lucidus Riggio & De Stefani, 1888 (Si) (*)
Exochus mitratus Gravenhorst, 1829 (N, S)
Exochus nigripalpis Thomson, 1887 (N)
Exochus notatus Holmgren, 1856 (N, S)
Exochus prosopius Gravenhorst, 1829 (N)
Exochus tibialis Holmgren, 1856 (N)

Anomalon Panzer, 1804

Anomalon cruentatum (Geoffroy, 1785) (N, S, Si, Sa)

Trichomma Wesmael, 1849

Trichomma enecator (Rossi, 1790) (N, S, Si)
Trichomma fulvidens (Wesmael, 1849) (N)
Trichomma intermedia Krieger, 1904 (N)
Trichomma occisor Habermehl, 1909 (S)

Habronyx Foerster, 1869

Habronyx heros (Wesmael, 1849) (S)

Aphanistes Foerster, 1869

Aphanistes ruficornis (Gravenhorst, 1829) (N)

Erigorgus Foerster, 1869

Erigorgus cerinops (Gravenhorst, 1829) (N, S)
Erigorgus fibulator (Gravenhorst, 1829) (N)
Erigorgus leucopus (Szépligeti, 1905) (Si)
Erigorgus melanobatus (Gravenhorst, 1829)
Erigorgus melanobatus melanops (Foerster, 1855) (N)
Erigorgus propugnator (Foerster, 1855) (N, S)

Gravenhorstia Boie, 1856

Gravenhorstia picta (Boie, 1856) (N)

Barylypa Foerster, 1869

Barylypa delictor (Thunberg, 1822) (N, S)

Barylypa insidiator Foerster, 1878 (N)

Barylypa pallida (Gravenhorst, 1829) (N, S)

Barylypa posticum (A. Costa, 1885) (Sa) (*)

Barylypa rubricator (Szépligeti, 1899) (N)

Barylypa secernendum (A. Costa, 1885) (Sa) (*)

Agrypon Foerster, 1860

Agrypon anomelas (Gravenhorst, 1829) (N)

Agrypon anxium (Wesmael, 1849) (N, S)

Agrypon canaliculatum (Ratzeburg, 1844) (N)

Agrypon clandestinum (Gravenhorst, 1829) (N, S, Si)

Agrypon delarvatum (Gravenhorst, 1829) (N)

Agrypon flaveolatum (Gravenhorst, 1807) (N)

Agrypon flexorium (Thunberg, 1822) (N, S, Si, Sa)

Agrypon gracilipes (Curtis, 1839) (N)

Agrypon hilare (Tosquinet, 1889) (S)

Agrypon interstitiale Schnee, 1989 (N)

Agrypon polyxenae (Szépligeti, 1899) (Si)

Agrypon rugifer (Thomson, 1895) (*)

Agrypon varitarsum (Wesmael, 1849) (N)

Therion Curtis, 1830

Therion brevicorne (Gravenhorst, 1829) (Si)

Therion circumflexum (Linnaeus, 1758) (N, Si, Sa)

Heteropelma Wesmael, 1849

Heteropelma amictum (Fabricius, 1775) (N, S)

Heteropelma calcator (Wesmael, 1849) (N)

Heteropelma capitatum (Desvignes, 1856) (N)

Coleocentrus Gravenhorst, 1829

Coleocentrus caligatus Gravenhorst, 1829 (N)

Coleocentrus excitator (Poda, 1761) (N)

Procinetus Foerster, 1869

Procinetus crudelis (Kriechbaumer, 1896) (Si)

Procinetus decimator (Gravenhorst, 1829) (N, S)

Procinetus notabilis (Desvignes, 1856) (N)

Mesoclistus Foerster, 1869

Mesoclistus casalei Scaramozzino, 1986 (N)

Mesoclistus rufipes (Gravenhorst, 1829) (N, S, Si)

Arotes Gravenhorst, 1829

Arotes albicinctus Gravenhorst, 1829 (N)

Acaenitus Latreille, 1809

Acaenitus dubitator (Panzer, 1801) (N, S)

Phaenolobus Foerster, 1869

Phaenolobus fraudator Bauer, 1961 (N)

Phaenolobus fulvicornis (Gravenhorst, 1829) (N, S, Si)

Phaenolobus nigripennis (Gravenhorst, 1829) (N)

Phaenolobus saltans (Gravenhorst, 1829) (N, Si)

Phaenolobus terebrator (Scopoli, 1763) (N, S)

Oxytorus Foerster, 1869

Oxytorus armatus Thomson, 1883 (N)

Oxytorus luridator (Gravenhorst, 1820) (N)

Hemiphanes Foerster, 1871

Hemiphanes hortense van Rossem, 1987 (N)

Hemiphanes inusitatum van Rossem, 1987 (N)

Hyperacmus Holmgren, 1856

Hyperacmus crassicornis (Gravenhorst, 1829) (N)

Fetialis van Rossem, 1990

Fetialis alacris van Rossem, 1990 (N)

Epitropus van Rossem, 1990

Epitropus insolitus van Rossem, 1990 (N)

Entypoma Foerster, 1869

Entypoma robustator Aubert, 1968 (N)

Entypoma robustum Foerster, 1871 (N)

Pantisarthrus Foerster, 1869

Pantisarthrus dispar van Rossem, 1980 (N)

Pantisarthrus gracilis van Rossem, 1987 (N)

Pantisarthrus luridus Foerster, 1871 (N)

Proclitus Haliday, 1838

Proclitus comes (Haliday in Curtis, 1838) (N)

Proclitus fulvicornis Foerster, 1871 (N)

Proclitus praetor (Haliday in Curtis, 1838) (N)

Dialipsis Foerster, 1869

Dialipsis exilis Foerster, 1871 (N)

Plectiscidea (Plectiscidea) Viereck, 1914

Plectiscidea (Plectiscidea) amicalis (Foerster, 1871) (N)

Plectiscidea (Plectiscidea) canaliculata (Foerster, 1871) (N)

Plectiscidea (Plectiscidea) collaris (Gravenhorst, 1829) (N)

Plectiscidea (Plectiscidea) conjuncta (Foerster, 1871) (N)

Plectiscidea (Plectiscidea) crassicornis (Foerster, 1871) (N)

Plectiscidea (Plectiscidea) indomita van Rossem, 1987 (N)

Plectiscidea (Plectiscidea) moerens (Foerster, 1871) (N)

Plectiscidea (Plectiscidea) nemorensis van Rossem, 1987 (N)

Plectiscidea (Plectiscidea) perfera van Rossem, 1988 (N)

Plectiscidea (Plectiscidea) tenuicornis (Foerster, 1871) (N)

Plectiscidea (Fugatrix) van Rossem, 1987

Plectiscidea (Fugatrix) communis (Foerster, 1871) (N)

Aperileptus Foerster, 1869

Aperileptus albipalpus (Gravenhorst, 1829) (N)

Aperileptus impurus Foerster, 1871 (N)

Aperileptus infuscatus Foerster, 1871 (N)

Laepserus Foerster, 1869

Laepserus dentifer (Thomson, 1888) (N) (*)

Laepserus flavipes (Foerster, 1871) (N)

Symplecis Foerster, 1869

Symplecis beaumontor Aubert, 1968 (N)
Symplecis bicingulata (Gravenhorst, 1829) (N) (*)
Symplecis paradoxa van Rossem, 1988 (N)

Catastenus Foerster, 1869

Catastenus femoralis Foerster, 1871 (N)

Eusterinx (Holomeristus) Foerster, 1869

Eusterinx (Holomeristus) refractaria van Rossem, 1982 (N)

Eusterinx (Catomicrus) Thomson, 1888

Eusterinx (Catomicrus) tartarea van Rossem, 1982 (N)

Eusterinx (Dallatorrea) Ashmead, 1902

Eusterinx (Dallatorrea) circaea van Rossem, 1982 (N)

Eusterinx (Divinatrix) van Rossem, 1987

Eusterinx (Divinatrix) inaequalis van Rossem, 1982 (N)

Eusterinx (Eusterinx) Foerster, 1869

Eusterinx (Eusterinx) argutula Foerster, 1871 (N)
Eusterinx (Eusterinx) obscurella Foerster, 1871 (N)
Eusterinx (Eusterinx) oligomera Foerster, 1871 (N)
Eusterinx (Eusterinx) pseudoligomera Gregor, 1941 (N)
Eusterinx (Eusterinx) subdola Foerster, 1871 (N)

Helictes Haliday, 1837

Helictes borealis (Holmgren, 1855) (N)
Helictes conspicuus (Foerster, 1871) (N)
Helictes erythrostomus (Gmelin, 1790) (N)
Helictes incongruens van Rossem, 1987 (N)

Megastylus Schiödte, 1839

Megastylus cruentator Schiödte, 1839 (N)
Megastylus flavopictus (Gravenhorst, 1829) (N)
Megastylus multicolor A. Costa, 1887 (S)

Allomacrus Foerster, 1869

Allomacrus arcticus (Holmgren, 1881) (N)

Cylloceria Schiödte, 1838

Cylloceria melancholica (Gravenhorst, 1820) (N)

Orthopelma Taschenberg, 1865

Orthopelma luteolator (Gravenhorst, 1829) (N, S)

Collyria Schiödte, 1839

Collyria calcitrator Gravenhorst, 1807 (N, S, Si, Sa)

Collyria orientator Aubert, 1976 (Si)

Orthocentrus Gravenhorst, 1829

Orthocentrus asper Gravenhorst, 1829 (N)

Orthocentrus attenuatus Holmgren, 1856 (N)

Orthocentrus frontator (Zetterstedt, 1838) (Sa)

Orthocentrus fulvipes Gravenhorst, 1829 (N)

Orthocentrus nigristerneus Rondani, 1887 (*)

Orthocentrus petiolaris Thomson, 1898 (N)

Orthocentrus spurius Gravenhorst, 1829 (N, S)

Picrostigeus Foester, 1869

Picrostigeus recticauda (Thomson, 1898) (N)

Stenomacrus Foester, 1869

Stenomacrus caudatus (Holmgren, 1856) (N)

Stenomacrus curvulus (Thomson, 1898) (N)

Stenomacrus intermedius (Holmgren, 1856) (N)

Stenomacrus merula (Gravenhorst, 1829) (N)

Stenomacrus ochripes (Holmgren, 1856) (N)

Stenomacrus pusillator Aubert, 1981 (N)

Stenomacrus vafer (Holmgren, 1856) (N)

Homotropus Foerster, 1869

Homotropus elegans (Gravenhorst, 1829) (N)

Homotropus nigrolineatus (Strobl, 1903) (N)

Homotropus pictus (Gravenhorst, 1829) (N)

Homotropus strigator (Fabricius, 1793) (N)

Xestopelta Dasch, 1964

Xestopelta gracillima (Schmiedeknecht, 1926) (N)

Enizemum Foerster, 1869

Enizemum ornatus (Gravenhorst, 1829) (N)
Enizemum schwarzi Diller, 1987 (N)

Syrphoctonus Foerster, 1869

Syrphoctonus biguttatus (Gravenhorst, 1829) (N)
Syrphoctonus cultiformis (Davis, 1897) (N)
Syrphoctonus fissorius (Gravenhorst, 1829) (N)
Syrphoctonus nigratarsus (Gravenhorst, 1829) (N, S)
Syrphoctonus pallipes (Gravenhorst, 1829) (N)
Syrphoctonus tarsatorius (Panzer, 1809) (N, Sa)

Phthorima Foerster, 1869

Phthorima compressa (Desvignes, 1854) (N)

Syrphophilus Dasch, 1964

Syrphophilus bizonarius (Gravenhorst, 1829) (N, S, Sa)
Syrphophilus dilleriator Aubert, 1976 (N)
Syrphophilus festatorius (A. Costa, 1888) (Si) (*)
Syrphophilus tricinctarius (Thunberg, 1822) (N)

Tymmophorus Schmeideknecht, 1913

Tymmophorus obscuripes (Holmgren, 1858) (N)
Tymmophorus rufiventris (Gravenhorst, 1829) (N)

Woldstedtius Carlson, 1979

Woldstedtius abdominator (Bridgman, 1886) (N)
Woldstedtius flavolineatus (Gravenhorst, 1829) (N)
Woldstedtius signatus (Gravenhorst, 1829) (N)

Diplazon Nees, 1818

Diplazon annulatus (Gravenhorst, 1829) (N, S)
Diplazon bidens (Fabricius, 1789) (*)
Diplazon laetatorius (Fabricius, 1781) (N, S, Si, Sa)
Diplazon pectoratorius (Thunberg, 1822) (N)
Diplazon tetragonus (Thunberg, 1822) (N, S)
Diplazon tetragonopsis Uchida, 1957 (N)
Diplazon tibiatorius (Thunberg, 1822) (N, S, Si, Sa)
Diplazon varicoxa (Thomson, 1890) (N)

Promethes Foerster, 1869

Promethes sulcator (Gravenhorst, 1829) (N)

Sussaba Cameron, 1909

Sussaba aciculata (Ruthe, 1859) (*)
Sussaba cognata (Holmgren, 1856) (N)
Sussaba dorsalis (Holmgren, 1856) (N)
Sussaba erigator (Fabricius, 1793) (N)
Sussaba flavipes (Lucas, 1846) (N, S, Sa)
Sussaba pulchella (Holmgren, 1856) (N)
Sussaba punctiventris (Thomson, 1890) (N)

Campocraspedon Uchida, 1957

Campocraspedon annulitarsis (Hedwig, 1938) (N)

Alomyia Panzer, 1806

Alomyia debellator (Fabricius, 1775)
Alomyia debellator debellator (Fabricius, 1775) (N)
Alomyia debellator nigra Gravenhorst, 1829 (N)
Alomyia debellator semiflava Stephens, 1835 (N)
Alomyia ripulator Bauer, 1966 (S)

Rhexidermus Foerster, 1869

Rhexidermus bicolorator Aubert, 1965 (N)
Rhexidermus nigricollis (Wesmael, 1844) (N)
Rhexidermus proximus (A. Costa, 1885) (Sa)
Rhexidermus ridibundus (A. Costa, 1885) (Sa)
Rhexidermus thoracicus (Gravenhorst, 1829) (N)
Rhexidermus truncator (Fabricius, 1798) (N)

Heterischnus Wesmael, 1859

Heterischnus pulex (O.F. Müller, 1776) (S)

Oronotus Wesmael, 1845

Oronotus binotatus (Gravenhorst, 1829) (N)
Oronotus thoracicus A. Costa, 1884 (Sa)

Hemichneumon Wesmael, 1857

Hemichneumon subdolus Wesmael, 1857 (S)

Trachyarus Thomson, 1891

Trachyarus corvinus Thomson, 1891 (N)

Dicaelotus Wesmael, 1845

Dicaelotus cameroni Bridgman, 1881 (N, Sa)

Dicaelotus inflexus Thomson, 1891 (N, S)

Dicaelotus longulator Aubert, 1983 (*)

Dicaelotus montanus (De Stefani, 1885) (N, Si, Sa)

Dicaelotus pictus (Schmeidechnecht, 1902) (N)

Dicaelotus pumilus (Gravenhorst, 1829) (Sa)

Dicaelotus pusillator (Gravenhorst, 1807) (N)

Dicaelotus resplendens Holmgren, 1890

Dicaelotus resplendens sardanator Aubert, 1969 (Sa)

Deloglyptus Foerster, 1869

Deloglyptus punctiventris (Thomson, 1891) (N)

Colpognathus Wesmael, 1845

Colpognathus celerator (Gravenhorst, 1807) (N)

Colpognathus divisus (Thomson, 1891) (N)

Colpognathus procerus (Gravenhorst, 1829) (N)

Centeterus Wesmael, 1845

Centeterus confector (Gravenhorst, 1829) (N)

Centeterus major Wesmael, 1844 (N)

Centeterus nigricornis Thomson, 1891 (N)

Centeterus rubiginosus (Gmelin, 1790) (N, S)

Herpestomus Wesmael, 1845

Herpestomus arridens (Gravenhorst, 1829) (N)

Herpestomus brunnicornis (Gravenhorst, 1829) (N)

Herpestomus phaeocerus Wesmael, 1844 (N)

Stenodontus Berthoumieu, 1896

Stenodontus biguttatus (Gravenhorst, 1829) (N)

Stenodontus marginellus (Gravenhorst, 1829) (N)

Stenodontus meridionator Aubert, 1959 (S)

Diadromus Wesmael, 1845

Diadromus albinotatus (Gravenhorst, 1829) (N)

Diadromus arrisor Wesmael, 1844 (N)
Diadromus collaris (Gravenhorst, 1829) (N)
Diadromus rubellus (Gravenhorst, 1829) (N)
Diadromus tenax Wesmael, 1844 (N)
Diadromus troglodytes (Gravenhorst, 1829) (N)
Diadromus varicolor Wesmael, 1844
Diadromus varicolor intermedius Wesmael, 1844 (N)

Oiorhinus Wesmael, 1844

Oiorhinus pallipalpis Wesmael, 1844 (N)

Aethecerus Wesmael, 1845

Aethecerus corcyriensis (Berthoumieu, 1901) (*)
Aethecerus erythrocerus (Gravenhorst, 1829) (*)
Aethecerus longior (Berthoumieu, 1896) (*)
Aethecerus longulus Wesmael, 1844 (N)
Aethecerus nitidus Wesmael, 1844 (N)
Aethecerus placidus Wesmael, 1844 (N)
Aethecerus porcellus Holmgren, 1890 (N)

Epitomus Foerster, 1869

Epitomus infuscatus (Gravenhorst, 1829) (N)

Mevesia Holmgren, 1889

Mevesia arguta (Wesmael, 1844) (N)

Phaeogenes Wesmael, 1845

Phaeogenes conciliator Wesmael, 1859 (*)
Phaeogenes coryphaeus (Wesmael, 1844) (N)
Phaeogenes heterogonus Holmgren, 1890 (N)
Phaeogenes impiger Wesmael, 1844 (N)
Phaeogenes melanogonos (Gmelin, 1790) (N)
Phaeogenes nigrident Wesmael, 1845 (N, S)
Phaeogenes planifrons Wesmael, 1844 (N, S)
Phaeogenes planipectus Holmgren, 1890 (N)
Phaeogenes semivulpinus (Gravenhorst, 1829) (N)
Phaeogenes socialis (Ratzeburg, 1852) (N)

Dirophanes Foerster, 1869

Dirophanes fulvitarsis (Wesmael, 1844) (N)
Dirophanes invisitor (Thunberg, 1822) (N, Sa)
Dirophanes maculicornis (Stephens, 1835) (N)

Dirophanes rusticatus Wesmael, 1844 (N)

Tycherus Foerster, 1869

Tycherus brunneus (Kiss, 1924) (*)
Tycherus capitosus (Holmgren, 1890) (N)
Tycherus dilleri Ranin, 1985 (N)
Tycherus nigrident (Wesmael, 1845) (N)
Tycherus ophthalmicus (Wesmael, 1844) (N)
Tycherus osculator (Thunberg, 1822) (N)
Tycherus parvitor Aubert, 1982 (N)
Tycherus vafer (Wesmael, 1844) (N)

Dilleritomus Aubert, 1979

Dilleritomus apertor Aubert, 1979 (N)
Dilleritomus filiformis (Strobl, 1901) (N)

Raninia Diller, 1985

Raninia genalis Diller, 1985 (N)

Apaelecticus Wesmael, 1844

Apaelecticus bellicosus Wesmael, 1844 (N, S)
Apaelecticus inimicus (Gravenhorst, 1820) (N, Sa)
Apaelecticus kriebbaumeri A. Costa, 1885 (Sa)
Apaelecticus sardous A. Costa, 1885 (Sa)

Linytus Cameron, 1903

Linytus exhortator (Fabricius, 1787) (N, Si)

Cyclolabus Heinrich, 1935

Cyclolabus nigricollis (Wesmael, 1844) (N)
Cyclolabus pactor (Wesmael, 1844) (N)

Pristicerops Heinrich, 1962

Pristicerops infractorius (Linnaeus, 1761) (N, Si)
Pristicerops laetepictus (A. Costa, 1863) (S)
Pristicerops larvator (Gravenhorst, 1829) (N)

Asthenolabus Heinrich, 1935

Asthenolabus italicator Aubert, 1960 (S)
Asthenolabus vitatorius (Gravenhorst, 1829) (N, S)

Platylabus Wesmael, 1844

Platylabus afer Kriechbaumer, 1884 (*)
Platylabus decipiens Wesmael, 1848 (Si)
Platylabus eurygaster Holmgren, 1871 (N)
Platylabus intermedius Holmgren, 1871 (N)
Platylabus opaculus Thomson, 1888 (N)
Platylabus pedatorius (Fabricius, 1793) (N, S)
Platylabus perexiguus Heinrich, 1973 (N)
Platylabus submarginatus Magretti, 1896 (N)
Platylabus tricingulatus (Gravenhorst, 1820) (N)
Platylabus vibratorius (Thunberg, 1822) (N)
Platylabus volubilis (Gravenhorst, 1829) (N)

Hypomecus Wesmael, 1844

Hypomecus quadriannulatus (Gravenhorst, 1829) (N)

Eurylabus Wesmael, 1844

Eurylabus larvatus (Christ, 1791) (N)
Eurylabus torvus Wesmael, 1844 (N)
Eurylabus tristis (Gravenhorst, 1829) (N)

Probolus Wesmael, 1844

Probolus alticola (Gravenhorst, 1820) (N)
Probolus concinnus Wesmael, 1853 (N, S)
Probolus culpatorius (Linnaeus, 1758) (N, S)

Goedartia Boie, 1841

Goedartia alboguttata (Gravenhorst, 1829) (N)

Listrodromus Wesmael, 1844

Listrodromus nycthemerus (Gravenhorst, 1820) (N)

Neotypus Foerster, 1869

Neotypus coreensis Uchida, 1930 (N, S)
Neotypus melanocephalus (Gmelin, 1790) (N)
Neotypus nobilitator (Gravenhorst, 1807) (N)

Anisobas Wesmael, 1844

Anisobas bulsanensis Smits van Burgst, 1914 (N)

Anisobas cingulatorius (Gravenhorst, 1820) (N)
Anisobas hostilis (Gravenhorst, 1820) (N, Sa)
Anisobas jugorum Heinrich, 1949 (N)

Lycaeniphilos Heinrich, 1933

Lycaeniphilos cephalotes (Kriechbaumer, 1882) (N)

Pseudoplatylabus Smits van Burgst, 1920

Pseudoplatylabus violentus (Gravenhorst, 1829) (N, Sa)

Cratichneumon Thomson, 1893

Cratichneumon corruscator (Linnaeus, 1758) (N)
Cratichneumon culex (O.F. Müller, 1776) (N, S)
Cratichneumon dissimilis (Gravenhorst, 1829) (*)
Cratichneumon externus Berthoumieu, 1895 (N, S, Si)
Cratichneumon fabricator (Fabricius, 1793) (N)
Cratichneumon infidus (Wesmael, 1848) (N)
Cratichneumon insignitus (A. Costa, 1883) (Sa)
Cratichneumon jocularis (Wesmael, 1848) (N)
Cratichneumon luteiventris (Gravenhorst, 1820) (N)
Cratichneumon semirufus (Gravenhorst, 1820) (N)
Cratichneumon rufifrons (Gravenhorst, 1829) (N)
Cratichneumon versator (Thunberg, 1822) (N)
Cratichneumon viator (Scopoli, 1763) (N, S, Sa) (*)
Cratichneumon vulpecula Kriechbaumer, 1875 (N)

Eristicus Wesmael, 1845

Eristicus clericus (Gravenhorst, 1829) (N)

Platylabops Heinrich, 1950

Platylabops apricus (Gravenhorst, 1820) (N)
Platylabops cornicula (Wesmael, 1855) (*)
Platylabops speciosa (Wesmael, 1844) (*)

Aoplus Tischbein, 1874

Aoplus altercator (Wesmael, 1855) (*)
Aoplus castaneus (Gravenhorst, 1820)
 Aoplus castaneus castaneus (Gravenhorst, 1820) (N)
 Aoplus castaneus styriacus Heinrich, 1951 (N)
 Aoplus castaneus ssp. (Si)
Aoplus defraudator (Wesmael, 1844) (N)
Aoplus lugubris Berthoumieu, 1896 (S)

Aoplus torpidus (Wesmael, 1857) (*)

Stenaoplus Heinrich, 1938

Stenaoplus pictus (Gravenhorst, 1829) (N)

Homotherus Foerster, 1869

Homotherus berthoumieui (Pic, 1899) (N)

Homotherus locutor (Thunberg, 1822) (N)

Homotherus magus (Wesmael, 1855) (Si)

Crypteffigies Heinrich, 1961

Crypteffigies albilarvatus (Gravenhorst, 1820) (N)

Crypteffigies pseudocryptus (Wesmael, 1857) (N)

Aculichneumon Heinrich, 1938

Aculichneumon lanius (Gravenhorst, 1829) (N)

Melanichneumon Thomson, 1893

Melanichneumon albipictus (Gravenhorst, 1820) (N)

Melanichneumon designatorius (Linnaeus, 1758) (N, S)

Melanichneumon glaucatorlops Heinrich, 1972 (*)

Melanichneumon leucomelanus (Tischbein, 1882) (*)

Virgichneumon Heinrich, 1977

Virgichneumon albolineatus (Gravenhorst, 1820) (N)

Virgichneumon albosignatus (Gravenhorst, 1829) (N)

Virgichneumon callicerus (Gravenhorst, 1820) (N, S)

Virgichneumon digrammus (Gravenhorst, 1820)

Virgichneumon digrammus digrammus (Gravenhorst, 1820) (N, S, Sa)

Virgichneumon digrammus meridionator Aubert, 1962 (S)

Virgichneumon dumeticola (Gravenhorst, 1829) (N, S)

Virgichneumon didymus (Gravenhorst, 1829) (N)

Virgichneumon extremator (Thunberg, 1822) (N)

Virgichneumon faunus (Gravenhorst, 1829) (N, S)

Virgichneumon monostagon (Gravenhorst, 1820) (N, Sa)

Virgichneumon tergenus (Gravenhorst, 1820) (N, S, Si)

Barichneumon Thomson, 1893

Barichneumon albicaudatus (Fonscolombe, 1847) (N)

Barichneumon analogus (Berthoumieu, 1894) (*)

Barichneumon anator (Fabricius, 1793) (N, S)

Barichneumon bilunulatus (Gravenhorst, 1829)
 Barichneumon bilunulatus bilunulatus (Gravenhorst, 1829) (N, Si)
 Barichneumon bilunulatus moraguesi (Kriechbaumer, 1894) (N)
Barichneumon chionomus (Wesmael, 1844) (N, Sa)
Barichneumon citrinops (Wesmael, 1857) (N)
Barichneumon comis (Wesmael, 1857) (*)
Barichneumon derogator (Wesmael, 1844) (N, Si)
Barichneumon fumipennis (Gravenhorst, 1829) (*)
Barichneumon gastoldi (A. Costa, 1885) (Sa)
Barichneumon obsoletorius (A. Costa, 1886) (Sa)
Barichneumon peregrinator (Linnaeus, 1758) (N, Sa)
Barichneumon perversus (Kriechbaumer, 1893) (N)
Barichneumon praeceptor (Thunberg, 1822) (N, Sa)
Barichneumon sedulus (Gravenhorst, 1829) (S, Si)
Barichneumon sexalbatatus (Gravenhorst, 1820) (N, Sa)

Stenobarichneumon Heinrich, 1962

Stenobarichneumon basiglyptus (Kriechbaumer, 1890) (N, Sa)
Stenobarichneumon citator (Thunberg, 1822) (N)

Rictichneumon Heinrich, 1962

Rictichneumon albanicus (Habermehl, 1926) (N)
Rictichneumon lautareti Hinz, 1984 (N)

Crytea Cameron, 1906

Crytea erythraea (Gravenhorst, 1820) (N)
Crytea sanguinator (Rossi, 1792) (S, Sa)

Vulgichneumon Heinrich, 1962

Vulgichneumon bimaculatus (Schrank, 1776) (S)
Vulgichneumon deceptor (Gravenhorst, 1829) (N)
Vulgichneumon suavis (Gravenhorst, 1820) (N)

Algathia Cameron, 1902

Algathia saturatoria (Linnaeus, 1758) (N, Sa)

Baranisobas Heinrich, 1970

Baranisobas ridibundus (Gravenhorst, 1829) (N)

Sycaonia Cameron, 1903

Sycaonia foersteri (Wesmael, 1848) (N)

Gareila Heinrich, 1980

Gareila nivata (Gravenhorst, 1820) (N)

Syspasis Townes in Townes, Momoi & Townes, 1965

Syspasis alboguttata (Gravenhorst, 1820) (N)

Syspasis helleri (Holmgren, 1878) (N)

Syspasis leucolomia (Gravenhorst, 1829) (N, S)

Syspasis lineator (Fabricius, 1781) (N)

Syspasis rufina (Gravenhorst, 1820) (N, Si, Sa)

Syspasis scutellator (Gravenhorst, 1829) (N, S, Si)

Ulesta Cameron, 1903

Ulesta perspicua (Wesmael, 1857) (N)

Lymantrichneumon Heinrich, 1968

Lymantrichneumon disparis (Poda, 1761)

Lymantrichneumon disparis disparis (Poda, 1761) (N, S, Sa)

Ichneumon Linnaeus, 1758

Ichneumon acuticornis Thomson, 1869 (N)

Ichneumon affector Tischbein, 1879

Ichneumon affector affector Tischbein, 1879 (N)

Ichneumon albicollis Wesmael, 1857

Ichneumon albicollis albicollis Wesmael, 1857 (N)

Ichneumon albicollis haemorrhoidicus Kriechbaumer, 1887 (Si)

Ichneumon albiger Wesmael, 1844

Ichneumon albiger albiger Wesmael, 1844 (N)

Ichneumon albiornatus Tischbein, 1879 (N)

Ichneumon alius Tischbein, 1875 (N)

Ichneumon alpestris Holmgren, 1864 (N)

Ichneumon alpinator Aubert, 1964 (N)

Ichneumon amphibolus Kriechbaumer, 1888 (N)

Ichneumon analis Gravenhorst, 1829 (N)

Ichneumon analisorius Heinrich, 1952 (N)

Ichneumon balteatus Wesmael, 1844 (N, S)

Ichneumon bucculentus Wesmael, 1844

Ichneumon bucculentus bucculentus Wesmael, 1844 (N, S)

Ichneumon caedator Gravenhorst, 1829 (N)

Ichneumon caloscelis Wesmael, 1844 (N)

Ichneumon cerebrosus Wesmael, 1859 (N)

Ichneumon cerinthius Gravenhorst, 1820 (N)

Ichneumon cessator O.F. Müller, 1776 (N, S)

Ichneumon computatorius O.F. Müller, 1776 (N)
Ichneumon confusor Gravenhorst, 1820 (N, S)
Ichneumon coniger Tischbein, 1876 (N, S)
Ichneumon delator Wesmael, 1844 (*)
Ichneumon dilleri Heinrich, 1980 (N)
Ichneumon emancipatus Wesmael, 1844 (N, S)
Ichneumon exilicornis Wesmael, 1857 (N)
Ichneumon extensorius Linnaeus, 1758
 Ichneumon extensorius extensorius Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)
 Ichneumon extensorius militaris Gravenhorst, 1820 (N)
Ichneumon factor Dalla Torre, 1902 (N)
Ichneumon formosus Gravenhorst, 1829
 Ichneumon formosus formosus Gravenhorst, 1829 (N)
 Ichneumon formosus microcephalus Stephens, 1825 (N)
Ichneumon freyi Kriechbaumer, 1880 (N)
Ichneumon gracilentus Wesmael, 1844 (N)
Ichneumon gracilicornis Gravenhorst, 1829 (N, S)
Ichneumon haematonotus Wesmael, 1859 (N)
Ichneumon haeselbarthi Heinrich, 1973 (N)
Ichneumon hexaleucus Kriechbaumer, 1899 (N)
Ichneumon ignobilis Wesmael, 1855 (N)
Ichneumon ingae Heinrich, 1980 (N)
Ichneumon inops Holmgren, 1880 (N)
Ichneumon insidiosus Wesmael, 1844
 Ichneumon insidiosus insidiosus Wesmael, 1844 (N)
Ichneumon jugicola Heinrich, 1949 (N)
Ichneumon languidus Wesmael, 1844 (N)
Ichneumon latrator Fabricius, 1781
 Ichneumon latrator latrator Fabricius, 1781 (N)
Ichneumon lautatorius Desvignes, 1856 (N)
Ichneumon levis Kriechbaumer, 1888 (N)
Ichneumon ligatorius Thunberg, 1822 (N)
Ichneumon luteipes Wesmael, 1855 (N, S)
Ichneumon melanobatus Gravenhorst, 1829 (N, Si)
Ichneumon melanosomus Wesmael, 1855 (N)
Ichneumon melanotis Holmgren, 1864 (N, S)
Ichneumon memorator Wesmael, 1844 (N)
Ichneumon minutorius Desvignes, 1856 (N)
Ichneumon molitorius Linnaeus, 1761 (N)
Ichneumon nigrantennator R. Bauer, 1985 (N)
Ichneumon nigroscutellatus Kriechbaumer, 1897
 Ichneumon nigroscutellatus nigroscutellatus Kriechbaumer, 1897 (N)
Ichneumon novemalbatus Kriechbaumer, 1875
 Ichneumon novemalbatus novemalbatus Kriechbaumer, 1875
Ichneumon occidentis Hilpert, 1992 (N)
Ichneumon phaeostigmus Wesmael, 1857 (N, S)
Ichneumon pictus E. Bauer, 1936 (N)
Ichneumon primatorius Forster, 1771 (N, S)

Ichneumon proletarius Wesmael, 1848
 Ichneumon proletarius proletarius Wesmael, 1848 (N, S, Si, Sa)
Ichneumon pygolissus Heinrich, 1951 (N)
Ichneumon quadrialbatus Gravenhorst, 1820 (N, Si)
Ichneumon quaesitorius Linnaeus, 1761 (N, S)
Ichneumon quinquealbatus Kriechbaumer, 1890 (N)
Ichneumon sarcitorius Linnaeus, 1758
 Ichneumon sarcitorius corsus Kriechbaumer, 1888 (Sa)
 Ichneumon sarcitorius sarcitorius Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)
Ichneumon saxifragator R. Bauer, 1985 (N)
Ichneumon sculpturatus Holmgren, 1864 (N)
Ichneumon seisensis Kriechbaumer, 1893 (N)
Ichneumon sexcinctus Gravenhorst, 1829 (*)
Ichneumon sculus Kriechbaumer, 1887 (Si)
Ichneumon silaceus Gravenhorst, 1829 (N)
Ichneumon simulans Tischbein, 1873 (N)
Ichneumon spurius Wesmael, 1848 (N)
Ichneumon stigmatorius Zetterstedt, 1838 (N)
Ichneumon stramentarius Gravenhorst, 1820
 Ichneumon stramentarius septentrionalis Holmgren, 1864 (S)
 Ichneumon stramentarius stramentarius Gravenhorst, 1820 (N)
Ichneumon stramentor Rasnitsyn, 1981 (N)
Ichneumon suspiciosus Wesmael, 1844 (N)
Ichneumon terminatorius Gravenhorst, 1820 (N, S, Si)
Ichneumon trialbatus Kriechbaumer, 1880 (N)
Ichneumon tuberculipes Wesmael, 1848 (N)
Ichneumon vafer Tischbein, 1876
 Ichneumon vafer vafer Tischbein, 1876 (N)
Ichneumon validicornis Holmgren, 1864 (N)
Ichneumon vulneratorius Zetterstedt, 1838
 Ichneumon vulneratorius revulnerator Heinrich, 1951 (N)
Ichneumon xanthorius Forster, 1771
 Ichneumon xanthorius quadrifasciatus Gravenhorst, 1829 (S)
 Ichneumon xanthorius xanthorius Forster, 1771 (N, S, Si, Sa)

Thyrateles Perkins, 1953

Thyrateles camelinus (Wesmael, 1844) (N)
Thyrateles haereticus (Wesmael, 1854) (N)

Spilothyrateles Heinrich, 1967

Spilothyrateles fabricii (Gravenhorst, 1829) (N)
Spilothyrateles illuminatorius (Gravenhorst, 1820) (N, S, Sa)
Spilothyrateles punctus (Gravenhorst, 1829) (N)

Stenichneumon Thomson, 1893

Stenichneumon clypeator (Thunberg, 1822) (*)
Stenichneumon culpator (Schränk, 1802)
 Stenichneumon culpator culpator (Schränk, 1802) (N, Si)
 Stenichneumon culpator adsentator (Tischbein, 1881) (N)
Stenichneumon leucocrepis (Wesmael, 1857) (*)
Stenichneumon militarius (Thunberg, 1822) (N)

Bureschias Heinrich, 1936

Bureschias subcylindricus (Gravenhorst, 1829) (S)

Patrocloides Heinrich, 1961

Patrocloides chalybeatus (Gravenhorst, 1829) (N)
Patrocloides diasemae (Tischbein, 1877) (N)
Patrocloides sputator (Fabricius, 1793) (N, S)

Pseudoamblyteles Heinrich, 1926

Pseudoamblyteles homocerus (Wesmael, 1854) (N, Si)

Ctenochares Foerster, 1869

Ctenochares bicolorus (Linnaeus, 1767) (S, Si)

Chasmias Ashmead, 1900

Chasmias lugens (Gravenhorst, 1829) (N, S)
Chasmias motatorius (Fabricius, 1775) (N, S)

Exephanes Wesmael, 1845

Exephanes clypeatus Berthoumieu, 1895 (*)
Exephanes ischioxanthus (Gravenhorst, 1829) (N, S)
Exephanes occupator (Gravenhorst, 1829) (Si)

Diphyus Kriechbaumer, 1890

Diphyus amatorius (O.F. Müller, 1776) (N)
Diphyus bicingulatus (Gravenhorst, 1829) (N)
Diphyus fossorius (Linnaeus, 1758) (N, S)
Diphyus kriebaumeri (Mocsáry, 1878) (N)
Diphyus luctatorius (Linnaeus, 1758) (N, Si, Sa)
Diphyus mercatorius (Fabricius, 1793)
 Diphyus mercatorius mercatorius (Fabricius, 1793) (N)
Diphyus palliatorius (Gravenhorst, 1829) (N, S, Si)
Diphyus polyxanthus (Kriechbaumer, 1869) (N)
Diphyus pseudomercator Heinrich, 1978

Diphyus pseudomercator pseudomercator Heinrich, 1978 (N)
Diphyus pulchellus (Christ, 1791) (N, S)
Diphyus ochromelas (Gmelin, 1790) (N)
Diphyus quadripunctorius (O.F. Müller, 1776) (N, Sa)
Diphyus raptorius (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
Diphyus septemguttatus (Gravenhorst, 1829) (N)
Diphyus sexzonatus (Rudow, 1888) (Si)
Diphyus trifasciatus (Gravenhorst, 1829) (N, Si, Sa)

Achaius Cameron, 1903

Achaius oratorius (Fabricius, 1793) (Si)

Limerodops Heinrich, 1949

Limerodops elongata (Brieschke, 1878) (N)
Limerodops subsericans (Gravenhorst, 1820) (N, S, Si)

Amblyteles Wesmael, 1844

Amblyteles armatorius (Forster, 1771) (N, S, Si, Sa)

Hepiopelmus Wesmael, 1844

Hepiopelmus melanogaster (Gmelin, 1790) (N)

Ctenichneumon Thomson, 1894

Ctenichneumon castigator (Fabricius, 1793) (N, S)
Ctenichneumon devyldei (Holmgren, 1871) (N)
Ctenichneumon divisorius (Gravenhorst, 1820) (N, S)
Ctenichneumon edictorius (Linnaeus, 1758) (N, S) (*)
Ctenichneumon funereus (Fourcroy, 1785) (N, Si)
Ctenichneumon inspector (Wesmael, 1844) (N)
Ctenichneumon melanocastanus (Gravenhorst, 1820) (N)
Ctenichneumon messorius (Gravenhorst, 1820) (N, Si)
Ctenichneumon nitens (Christ, 1791) (N, Si)
Ctenichneumon panzeri (Wesmael, 1844) (N, S, Si)
Ctenichneumon repentinus (Gravenhorst, 1820) (N)

Obtusodonta Heinrich, 1962

Obtusodonta equitatoria (Panzer, 1786) (N, Si)

Spilichneumon Thomson, 1894

Spilichneumon ammonius (Gravenhorst, 1820) (N)
Spilichneumon johansoni (Holmgren, 1871) (N)

Spilichneumon nigrifrons (Holmgren, 1878) (*)
Spilichneumon occisor (Fabricius, 1793) (N, S, Si)

Eutanyacra Cameron, 1903

Eutanyacra glaucatoria (Fabricius, 1793) (N, S, Si, Sa)
Eutanyacra picta (Scrank, 1776) (N, S, Sa)

Triptognathus Berthoumieu, 1904

Triptognathus atripes (Gravenhorst, 1820) (N, S, Si, Sa)
Triptognathus fumigator (Gravenhorst, 1829) (N, Si)
Triptognathus subalpinus Heinrich, 1949 (N)

Limerodes Wesmael, 1845

Limerodes arctiventris (Boie, 1841) (S)

Tricholabus Thomson, 1894

Tricholabus strigatorius (Gravenhorst, 1829) (N)

Hoplismenus Gravenhorst, 1829

Hoplismenus albifrons Gravenhorst, 1829 (N, S, Sa)
Hoplismenus bidentatus (Gmelin, 1790) (N, S, Si)
Hoplismenus bispinatorius (Thunberg, 1822) (N, Sa)
Hoplismenus lamprolabus Wesmael, 1857 (S)
Hoplismenus terrificus Wesmael, 1848 (N)
Hoplismenus tyrolensis (Clément, 1927) (N)

Zanthojoppa Cameron, 1901

Zanthojoppa lutea (Gravenhorst, 1829) (N)

Coelichneumon Thomson, 1893

Coelichneumon biguttulatus (Kriechbaumer, 1875) (N)
Coelichneumon calabrarius (A. Costa, 1863) (S, Sa)
Coelichneumon castaniventris (Gravenhorst, 1829) (S)
Coelichneumon comitator (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
Coelichneumon consimilis (Wesmael, 1844) (N)
Coelichneumon cretatus (Gravenhorst, 1820) (N)
Coelichneumon cyaniventris (Wesmael, 1859) (N)
Coelichneumon erythronotus (Rudow, 1888) (N, S, Si)
Coelichneumon fuscipes (Gmelin, 1790) (N)
Coelichneumon haemorrhoidalis (Gravenhorst, 1820) (N)
Coelichneumon lacrymator (Fonscolombe, 1847) (N)

Coelichneumon leucocerus (Gravenhorst, 1820) (N)
Coelichneumon madritinus (Berthoumieu, 1894) (N)
Coelichneumon microstictus (Gravenhorst, 1829) (N)
Coelichneumon moestus (Gravenhorst, 1829) (*)
Coelichneumon multicolor (Gmelin, 1790) (N)
Coelichneumon nigerrimus (Stephens, 1835) (N)
Coelichneumon nobilis (Wesmael, 1857) (N)
Coelichneumon rudis (Fonscolombe, 1847) (N, S)
Coelichneumon ruficauda (Wesmael, 1844) (N)
Coelichneumon serenus (Gravenhorst, 1829) (N, Si)
Coelichneumon sinister (Wesmael, 1848) (N)
Coelichneumon sugillatorius (Linnaeus, 1758) (N)
Coelichneumon truncatulus (Thomson, 1886) (N)
Coelichneumon urticarus (Holmgren, 1880) (*)
Coelichneumon validus (Berthoumieu, 1894) (*)

Protichneumon Thomson, 1893

Protichneumon fusorius (Linnaeus, 1761) (*)
Protichneumon fusorius fusorius (Linnaeus, 1761) (S, Si, Sa)
Protichneumon fusorius persicus Morley, 1915
Protichneumon pisorius (Linnaeus, 1758) (N, Si, Sa)
Protichneumon similatorius (Fabricius, 1798) (N)

Amblyjoppa Cameron, 1902

Amblyjoppa fuscipennis (Wesmael, 1844) (N, S, Si)
Amblyjoppa proteus (Christ, 1791) (N)

Catadelphus Wesmael, 1854

Catadelphus arrogator (Fabricius, 1781) (N)

Trogus Panzer, 1806

Trogus lapidator (Fabricius, 1787)
Trogus lapidator lapidator (Fabricius, 1787) (N, Si)
Trogus violaceus (Mocsáry, 1883) (N, Sa)

Callajoppa Cameron, 1903

Callajoppa cirrogaster (Schrank, 1781) (N, S)
Callajoppa exaltatoria (Panzer, 1804)
Callajoppa exaltatoria exaltatoria (Panzer, 1804) (N)

Note

Scambus detritus: È citata (N) anche una f. *nigricoxis* (Ulbricht, 1910).

Acropimpla didyma: Entità segnalata genericamente per l'Italia.
Liotryphon strobilellus: Entità segnalata genericamente per l'Italia.
Acrodactyla degener: Entità segnalata genericamente per l'Italia.
Polysphincta carbonator: Entità segnalata genericamente per l'Italia.
Polysphincta fatua: L'identità di questa specie è incerta. Il materiale tipico è perduto.
Apechthis capulifera: Entità segnalata genericamente per l'Italia.
Megarhyssa emarginatoria: Entità segnalata genericamente per l'Italia.
Eclytus ornatus: Entità segnalata genericamente per l'Italia.
Hercus fontinalis: Entità segnalata genericamente per l'Italia.
Polyblastus (Polyblastus) palaemon: Entità segnalata genericamente per l'Italia.
Polyblastus (Polyblastus) wahlbergi: Entità segnalata genericamente per l'Italia.
Polyblastus (Labroctonus) pumilus: Entità segnalata genericamente per l'Italia.
Ctenochira sanguinatoria: Entità segnalata genericamente per l'Italia.
Erromenus analis: Entità segnalata genericamente per l'Italia.
Erromenus calcator: Entità segnalata genericamente per l'Italia.
Ischyrocnemis: Il genere *Ischyrocnemis* veniva assegnato alla sottofamiglia Metopiinae, ma la presenza in *I. quadridens* (Perkins) di uova peduncolate pendenti singolarmente dall'ovopositore, mi permette di assegnare più correttamente il genere alla sottofamiglia Tryphoninae, tribù Tryphonini.
Kristotomus laticeps: Entità segnalata genericamente per l'Italia.
Exenterus oriolus: Entità segnalata genericamente per l'Italia.
Eridolius dorsator: Materiale italiano di questa specie è stato riferito sia alla "var." *dorsata* (Thunberg, 1822) (N, S, Si) che alla "var." *brevigena* (Thomson, 1883) (N, S) ed alla "var." *frigidus* (Holmgren, 1855).
Eridolius gnathoxanthus: Entità segnalata genericamente per l'Italia.
Eridolius pachysomus: Entità segnalata genericamente per l'Italia.
Euceros superbus: Entità segnalata genericamente per l'Italia.
Odontocolon appendiculatum: Entità segnalata genericamente per l'Italia.
Odontocolon spinipes: Entità segnalata genericamente per l'Italia.
Xorides (Xorides) niger: Materiale italiano è stato in parte riferito alla "var." *bicolor* Clément, 1938.
Hemiteles collinus: Specie di incerta identità.
Gelis cabrerai: Materiale italiano è stato in parte riferito alla "var." *nigripes* (Seyrig, 1926).
Gelis carbonarius: L'identità di questa specie è incerta. Il materiale tipico è perduto.
Gelis pumilus: L'identità di questa specie è incerta. Il materiale tipico è perduto.
Gelis pusillus: L'identità di questa specie è incerta. Il materiale tipico è perduto.
Gelis ragusae: L'identità di questa specie è incerta. Il materiale tipico è perduto.
Endasys amoenus: Entità segnalata genericamente per l'Italia.
Endasys eurycerus: Entità segnalata genericamente per l'Italia.
Endasys euxestus: Entità segnalata genericamente per l'Italia.
Endasys microcellus: Entità segnalata genericamente per l'Italia.
Endasys parviventris: Entità segnalata genericamente per l'Italia.
Endasys rugifacies: Entità segnalata genericamente per l'Italia.
Endasys senilis: Entità segnalata genericamente per l'Italia.
Endasys stictogastris: Entità segnalata genericamente per l'Italia.
Endasys striatus: Entità segnalata genericamente per l'Italia.
Endasys varipes: Entità segnalata genericamente per l'Italia.
Stibeutes atratus: L'identità di questa specie è incerta. Il materiale tipico è perduto.

Theroscopus rotundator: Entità segnalata genericamente per l'Italia.
Phygadeuon bilineatus: Entità segnalata genericamente per l'Italia.
Phygadeuon chilosiae: Entità segnalata genericamente per l'Italia.
Stilpnus (Stilpnus) subzonulus: Entità segnalata genericamente per l'Italia.
Plectocryptus effeminatus: Entità segnalata genericamente per l'Italia.
Agrothereutes bicolor: L'identità di questa specie è incerta. Il materiale tipico è perduto.
Aritranis pulcher: Entità segnalata genericamente per l'Italia.
Pycnocryptus fuligipennis: Specie di incerta identità.
Ischnus agitator: Entità segnalata genericamente per l'Italia.
Cryptus gracillimus: L'identità di questa specie è incerta. Il materiale tipico è perduto.
Cryptus oriicus: L'identità di questa specie è incerta. Il materiale tipico è perduto.
Cryptus pusillus: L'identità di questa specie è incerta. Il materiale tipico è perduto.
Cryptus rudowi: L'identità di questa specie è incerta. Il materiale tipico è perduto.
Meringopus pseudonymus: Il materiale dal S è riferito alla "forma" hellenicus (Schmiedeknecht, 1890).
Mesostenus cingulatellus: Specie di incerta identità.
Glypta (Glypta) scutellaris: Entità segnalata genericamente per l'Italia.
Lissonota (Lissonota) freyi: Entità segnalata genericamente per l'Italia.
Mesoleius bisignatus: Specie di incerta identità.
Mesoleius tibialis: Specie di incerta identità.
Hadrodactylus faciator: Entità segnalata genericamente per l'Italia.
Hadrodactylus tarsator: Entità segnalata genericamente per l'Italia.
Hypamblys brevisculus: Entità segnalata genericamente per l'Italia.
Euryproctus coxalis: Specie di incerta validità.
Campoplex fanensis: Specie di incerta validità.
Casinaria krieckbaumeri: Specie di incerta validità.
Cymodusa exilis: Entità segnalata genericamente per l'Italia.
Cymodusa leucocera: Entità segnalata genericamente per l'Italia.
Biolysia algerica: Entità segnalata genericamente per l'Italia.
Phobocampe tempestiva: Entità segnalata genericamente per l'Italia.
Diadegma (Nythobia) flavotibiale: Entità segnalata genericamente per l'Italia.
Hyposoter rhodocerae: Entità segnalata genericamente per l'Italia.
Olesicampe flaveolata: L'identità di questa specie è incerta. Il materiale tipico è perduto.
Olesicampe praecox: Il materiale dal S è riferito alla "forma" nigripes Aubert, 1971.
Chromoplex picticollis: Entità segnalata genericamente per l'Italia.
Cremastus puberulus: Entità segnalata genericamente per l'Italia.
Eurypterna cremieri: Entità segnalata genericamente per l'Italia.
Probles (Microdiaparsis) versutus: Il materiale italiano è stato parzialmente riferito alla "forma" brevicauda Horstmann, 1971.
Phradis toreador: Entità segnalata genericamente per l'Italia.
Aneuclis pusillus: Specie di incerta validità.
Ophion baueri: Specie di incerta validità.
Enicospilus ramidulus: Il materiale italiano è stato attribuito in parte alla "forma tipica" (N, S, Si), in parte alla "forma" merdarius (Gravenhorst, 1829) (N, Sa).
Metopius (Peltocarus) dentatus: Il materiale italiano dal S è stato in parte riferito alla "forma" flavipes Mocsáry in Gyorfi, 1953.
Hypsicera subtilitor: Entità segnalata genericamente per l'Italia.
Exochus lucidus: L'identità di questa specie è incerta. Il materiale tipico è perduto.

Barylypa posticum: Specie di incerta validità.
Barylypa secernendum: Specie di incerta validità.
Agrypon rugifer: Entità segnalata genericamente per l'Italia.
Laepserus dentifer: Il materiale italiano è stato parzialmente riferito alla "forma" crassulus" (Thomson, 1888).
Symplecis bicingulata: Il materiale italiano è stato riferito alla "forma" alpigena (Foerster, 1871).
Orthocentrus nigristernus: Entità segnalata genericamente per l'Italia.
Syrphophilus festatorius: Specie di incerta validità.
Diplazon bidens: Entità segnalata genericamente per l'Italia.
Sussaba aciculata: Entità segnalata genericamente per l'Italia.
Dicaelotus longulator: Entità segnalata genericamente per l'Italia.
Aethecerus corcyriensis: Entità segnalata genericamente per l'Italia.
Aethecerus erythrocerus: Entità segnalata genericamente per l'Italia.
Aethecerus longior: Entità segnalata genericamente per l'Italia.
Phaeogenes conciliator: Entità segnalata genericamente per l'Italia.
Tycherus brunneus: Entità segnalata genericamente per l'Italia.
Platylabus afer: Entità segnalata genericamente per l'Italia.
Cratichneumon dissimilis: Entità segnalata genericamente per l'Italia.
Cratichneumon viator: Il materiale sardo è riferito alla "var." aethiops (Gravenhorst, 1820).
Platylabops cornicula: Entità segnalata genericamente per l'Italia.
Platylabops speciosa: Entità segnalata genericamente per l'Italia.
Aoplus altercator: Entità segnalata genericamente per l'Italia.
Aoplus torpidus: Entità segnalata genericamente per l'Italia.
Melanichneumon glaucatoriops: Entità segnalata genericamente per l'Italia.
Melanichneumon leucomelanus: Entità segnalata genericamente per l'Italia.
Barichneumon analogus: Entità segnalata genericamente per l'Italia.
Barichneumon comis: Entità segnalata genericamente per l'Italia.
Barichneumon fumipennis: Entità segnalata genericamente per l'Italia.
Ichneumon: Le specie del genere *Ichneumon* sono state riordinate secondo la revisione di Hilpert (1992, Entomofauna, Suppl. 6: 1-389.).
Ichneumon delator: Entità segnalata genericamente per l'Italia.
Ichneumon sexcinctus: Entità segnalata genericamente per l'Italia.
Stenichneumon clypeator: Entità segnalata genericamente per l'Italia.
Stenichneumon leucocrepis: Entità segnalata genericamente per l'Italia.
Exephanes clypeatus: Entità segnalata genericamente per l'Italia.
Ctenichneumon edictorius: Il materiale dal N viene parzialmente riferito alla "var." amputatorius (Panzer, 1804).
Spilichneumon nigrifrons: Entità segnalata genericamente per l'Italia.
Coelichneumon moestus: Entità segnalata genericamente per l'Italia.
Coelichneumon urticarus: Entità segnalata genericamente per l'Italia.
Coelichneumon validus: Entità segnalata genericamente per l'Italia.
Protichneumon fusorius: Entità segnalata genericamente per l'Italia.

Braconidae

Chremylus Haliday, 1833

Chremylus elaphus Haliday, 1833 (N)

Dendrosoter Wesmael, 1838

Dendrosoter curtisii (Ratzeburg, 1848) (*)

Dendrosoter hartigii (Ratzeburg, 1848) (*)

Dendrosoter middendorffi (Ratzeburg, 1848) (S)

Dendrosoter protuberans (Nees von Esenbeck, 1834) (N, S, Si)

Dendrosotinus Telenga, 1941

Dendrosotinus ferrugineus (Marshall, 1888) (S, Si)

Dimeris Ruthe, 1854

Dimeris mira Ruthe, 1854 (N)

Doryctes Haliday, 1836

Doryctes heydenii Reinhard, 1865 (*)

Doryctes leucogaster (Nees von Esenbeck, 1834) (N, S, Sa)

Doryctes mutillator (Thunberg, 1822) (N)

Doryctes nobilis (Nees von Esenbeck, 1834) (*)

Doryctes pomarius Reinhard, 1865 (*)

Doryctes striatellus (Nees von Esenbeck, 1834) (N)

Doryctes undulatus (Ratzeburg, 1852) (*)

Ecphylus Foerster, 1862

Ecphylus caudatus Ruschka, 1916 (S)

Ecphylus hylesini (Ratzeburg, 1852) (*)

Ecphylus silesiacus Ratzeburg, 1848 (N, S, Si)

Eucorystoides Ashmead, 1900

Eucorystoides aciculatus (Reinhard, 1865) (*)

Hecabolus Curtis, 1834

Hecabolus sulcatus Curtis, 1834 (N)

Heterospilus Haliday, 1836

Heterospilus caesus (Nees von Esenbeck, 1834) (N)

Heterospilus corsicus (Marshall, 1888) (*)

Heterospilus flaviceps (Marshall, 1897) (N)

Heterospilus graeffei Fischer, 1960 (N)

Heterospilus incompletus (Ratzeburg, 1844) (*)
Heterospilus sicanus (Marshall, 1888) (Si)
Heterospilus tauricus Telenga, 1941 (N)

Monolexis Foerster, 1862

Monolexis atis Nixon, 1943
Monolexis fuscicornis Foerster, 1862 (N, S)

Ontsira Cameron, 1900

Ontsira antica (Wollaston, 1858) (N)
Ontsira ignea (Ratzeburg, 1852) (*)
Ontsira imperator (Haliday, 1836) (*)

Pambolus Haliday, 1836

Pambolus brevipennis (Kieffer, 1905) (N)
Pambolus halteratus (Kieffer, 1905) (Sa)
Pambolus pallipes (Foerster, 1862) (*)

Rhaconotus Ruthe, 1854

Rhaconotus aciculatus Ruthe, 1854 (N)

Rhoptrocentrus Marshall, 1897

Rhoptrocentrus piceus Marshall, 1897 (N, S)

Spathius Nees von Esenbeck, 1818

Spathius brevicaudis Ratzeburg, 1844 (N)
Spathius curvicaudis Ratzeburg, 1844 (*)
Spathius erythrocephalus Wesmael, 1838 (S, Si)
Spathius exarator (Linnaeus, 1758) (N)
Spathius lignarius (Ratzeburg, 1852) (*)
Spathius pedestris Wesmael, 1838 (*)
Spathius petiolatus (Spinola, 1808) (N)
Spathius phymatodis Fischer, 1966 (*)
Spathius radzayanus Ratzeburg, 1848 (*)
Spathius rubidus (Rossi, 1794) (N, S, Si)

Wachsmannia Szépligeti, 1900

Wachsmannia spathiiformis (Ratzeburg, 1848) (N)

Hormius Nees von Esenbeck, 1818

Hormius moniliatus (Nees von Esenbeck, 1812) (N, S)

Colastes Haliday, 1833

Colastes braconius Haliday, 1833 (N, S)

Rhysipolis Foerster, 1862

Rhysipolis decorator (Haliday, 1836) (N)

Rhysipolis funestus (Haliday, 1836) (N)

Rhysipolis hariolator (Haliday, 1836) (N)

Rhysipolis mediator (Haliday, 1836) (N)

Shawiana van Achterberg, 1983

Shawiana catenator (Haliday, 1836) (N)

Oncophanes Foerster, 1862

Oncophanes laevigatus (Ratzeburg, 1852) (N)

Oncophanes minutus Wesmael, 1838 (*)

Rhyssalus Haliday, 1833

Rhyssalus indagator Haliday, 1836 (*)

Aleiodes Wesmael, 1838

Aleiodes bicolor (Spinola, 1808) (N, S, Sa)

Aleiodes borealis Thomson, 1891 (S)

Aleiodes circumscriptus (Nees von Esenbeck, 1834) (N, S, Si, Sa)

Aleiodes coxalis (Spinola, 1808) (N)

Aleiodes cruentus (Nees von Esenbeck, 1834) (N)

Aleiodes dimidiatus (Spinola, 1808) (N, S)

Aleiodes dispar Curtis, 1834 (N)

Aleiodes ductor (Thunberg, 1822) (N, S, Si, Sa)

Aleiodes excavatus (Telenga, 1941) (N)

Aleiodes gasterator (Jurine, 1807) (N, S, Sa)

Aleiodes gastritor (Thunberg, 1822) (S)

Aleiodes grandis Giraud, 1857 (*)

Aleiodes halteratus Kieffer, 1905 (Sa)

Aleiodes miniatus (Herrich-Schaeffer, 1838) (Si)

Aleiodes modestus (Reinhard, 1863) (*)

Aleiodes nigricornis Wesmael, 1838 (*)

Aleiodes nobilis (Haliday, 1834) (N)

Aleiodes pallidator (Thunberg, 1822) (*)

Aleiodes praetor (Reinhard, 1863) (*)

Aleiodes procerus Wesmael, 1838 (*)

Aleiodes ruficornis (Herrich-Schaeffer, 1838) (S)
Aleiodes rugulosus (Nees von Esenbeck, 1812) (*)
Aleiodes signatus (Nees von Esenbeck, 1812) (N)
Aleiodes testaceus (Spinola, 1808) (N, S, Sa) (*)
Aleiodes testaceus (Telenga, 1941 nec Spinola 1808) (N)
Aleiodes tristis Wesmael, 1838 (N, S, Sa)
Aleiodes unipunctator (Thunberg, 1822) (N)
Aleiodes vittiger Wesmael, 1838 (*)
Aleiodes vollenhoveni Gribodo, 1881 (S) (*)

Clinocentrus Haliday, 1833

Clinocentrus cuncator Haliday, 1836 (N)
Clinocentrus exsertor (Nees von Esenbeck, 1811) (N)

Lysitermus Foester, 1862

Lysitermus suecicus (Hedqvist, 1957) (Sa)

Rogas Nees von Esenbeck, 1818

Rogas testaceus (Fabricius, 1798) (*)

Triraphis Ruthe, 1885

Triraphis tricolor (Wesmael, 1838) (N)

Atanycolus Foerster, 1862

Atanycolus denigrator (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)
Atanycolus initiator (Fabricius, 1793) (N)
Atanycolus neesi Marshall, 1897 (N)
Atanycolus sculpturatus (Thomson, 1892) (N)

Bracon (Bracon) Fabricius, 1804

Bracon (Bracon) aterrimus Ratzeburg, 1852 (*)
Bracon (Bracon) bicolorator Spinola, 1843 (Si)
Bracon (Bracon) bifasciatus Spinola, 1808 (N) (*)
Bracon (Bracon) celer Szépligeti, 1913 (N, S)
Bracon (Bracon) crocatus Schmiedeknecht, 1896 (N, Si)
Bracon (Bracon) erythrostictus Marshall, 1885 (N)
Bracon (Bracon) fasciatorior Shenefelt, 1978 (N)
Bracon (Bracon) flavipes Nees von Esenbeck, 1834 (N)
Bracon (Bracon) fulvipes Nees von Esenbeck, 1834 (N)
Bracon (Bracon) intercessor Nees von Esenbeck, 1834 (N, S)
Bracon (Bracon) kollari Rondani, 1871 (N)
Bracon (Bracon) laetus Wesmael, 1838 (Si)

Bracon (Bracon) luteator Spinola, 1808 (N, Si)
Bracon (Bracon) mariae Dalla Torre, 1898 (N, S)
Bracon (Bracon) minutator (Fabricius, 1798) (N, S, Sa) (*)
Bracon (Bracon) mixtus Szépligeti, 1901 (N)
Bracon (Bracon) nigratus Wesmael, 1838 (N)
Bracon (Bracon) nigripedator Nees von Esenbeck, 1834 (S, Sa)
Bracon (Bracon) ochropus (Nees von Esenbeck, 1834) (N, Sa)
Bracon (Bracon) pectoralis Wesmael, 1838 (N, Sa)
Bracon (Bracon) punctulator Nees von Esenbeck, 1834 (N)
Bracon (Bracon) pusillimus Fahringer, 1928 (*)
Bracon (Bracon) rimulator Nees von Esenbeck, 1834 (N)
Bracon (Bracon) rostrator Spinola, 1808 (N)
Bracon (Bracon) rubricator Spinola, 1808 (N)
Bracon (Bracon) rufipalpis Szépligeti, 1901 (Si)
Bracon (Bracon) scabriusculus Dalla Torre, 1898 (N)
Bracon (Bracon) scutellaris Wesmael, 1838 (*)
Bracon (Bracon) similatorius Shenefelt, 1978 (N)
Bracon (Bracon) spartiellae Rondani, 1877 (N)
Bracon (Bracon) subtilis Szépligeti, 1901 (N)
Bracon (Bracon) thuringiacus (Schmiedeknecht, 1896) (N)
Bracon (Bracon) unicinctus Spinola, 1808 (N) (*)
Bracon (Bracon) variegator Spinola, 1808 (N)
Bracon (Bracon) vitripennis Ratzeburg, 1852 (*)

***Bracon (Cyanopterobracon)* Tobias, 1957**

Bracon (Cyanopterobracon) mauritanicus (Schmiedeknecht, 1896) (S, Sa)
Bracon (Cyanopterobracon) uromelas A. Costa, 1882 (N, Sa)

***Bracon (Glabrobracon)* Fahringer, 1927**

Bracon (Glabrobracon) anthracinus (Nees von Esenbeck, 1834) (N)
Bracon (Glabrobracon) atrator (Nees von Esenbeck, 1834) (N)
Bracon (Glabrobracon) bipartitus Wesmael, 1838 (N)
Bracon (Glabrobracon) caudatus (Ratzeburg, 1848) (N)
Bracon (Glabrobracon) cingulator Szépligeti, 1901 (Sa)
Bracon (Glabrobracon) caudiger (Nees von Esenbeck, 1834) (*)
Bracon (Glabrobracon) colpophorus (Wesmael, 1838) (N)
Bracon (Glabrobracon) coniferarum Fahringer, 1928 (N)
Bracon (Glabrobracon) delusor (Spinola, 1808) (N, S)
Bracon (Glabrobracon) dichromus (Wesmael, 1838) (N)
Bracon (Glabrobracon) discoideus (Wesmael, 1838) (N, Sa)
Bracon (Glabrobracon) epitriptus Marshall, 1885 (N)
Bracon (Glabrobracon) glaphyrus (Marshall, 1897) (S)
Bracon (Glabrobracon) guttator (Panzer, 1805) (N)
Bracon (Glabrobracon) longirostris (Masi, 1933) (S)
Bracon (Glabrobracon) longulus (Thomson, 1892) (*)
Bracon (Glabrobracon) maculiger (Wesmael, 1838) (N, S, Si)

Bracon (Glabrobracon) obscurator Nees von Esenbeck, 1812 (N)
Bracon (Glabrobracon) osculator Nees von Esenbeck, 1812 (N)
Bracon (Glabrobracon) parvicornis Thomson, 1892 (*)
Bracon (Glabrobracon) peroculatus (Wesmael, 1838) (N)
Bracon (Glabrobracon) ratzeburgii (Dalla Torre, 1838) (*)
Bracon (Glabrobracon) terebella (Wesmael, 1838) (N)
Bracon (Glabrobracon) tschitscherini (Kokoujev, 1904) (Si)
Bracon (Glabrobracon) variator (Nees von Esenbeck, 1812) (N, S, Si)
Bracon (Glabrobracon) xanthogaster (Nees von Esenbeck, 1834) (S)
Bracon (Glabrobracon) zonites (Marshall, 1897) (N)

***Bracon (Habrobracon)* Ashmead, 1895**

Bracon (Habrobracon) brevicornis (Wesmael, 1838) (N, S, Si)
Bracon (Habrobracon) crassicornis (Thomson, 1892) (N, S)
Bracon (Habrobracon) genuensis (Marshall, 1897) (N, S)
Bracon (Habrobracon) hebetor (Say, 1836)
 Bracon (Habrobracon) hebetor hebetor (Say, 1836) (N, S, Si)
 Bracon (Habrobracon) hebetor tortricidarum Goidanich, 1934 (N, S)
Bracon (Habrobracon) labrator (Ratzeburg, 1844)
Bracon (Habrobracon) palpebrator (Ratzeburg, 1844) (Sa)
Bracon (Habrobracon) radialis Telenga, 1936 (N)
Bracon (Habrobracon) stabilis (Wesmael, 1838) (N)

***Bracon (Lucobracon)* Fahringer, 1927**

Bracon (Lucobracon) fortipes (Wesmael, 1838) (N, S, Sa)
Bracon (Lucobracon) grandiceps (Thomson, 1892) (N)
Bracon (Lucobracon) triangularis (Nees von Esenbeck, 1834) (N, S)
Bracon (Lucobracon) triaspis (Marshall, 1897) (N)

***Bracon (Orthobracon)* Fahringer, 1927**

Bracon (Orthobracon) breviusculus (Wesmael, 1838) (*)
Bracon (Orthobracon) crassungula (Thomson, 1892) (*)
Bracon (Orthobracon) erraticus (Wesmael, 1838) (N)
Bracon (Orthobracon) exhilarator (Nees von Esenbeck, 1834) (N)
Bracon (Orthobracon) fuscicoxis Wesmael, 1838 (N)
Bracon (Orthobracon) fuscipennis (Wesmael, 1838) (*)
Bracon (Orthobracon) guttiger Wesmael, 1838 (N)
Bracon (Orthobracon) hylobii (Ratzeburg, 1848) (*)
Bracon (Orthobracon) immutator (Nees von Esenbeck, 1834) (N)
Bracon (Orthobracon) laevigatissimus Dalla Torre, 1898 (*)
Bracon (Orthobracon) larvicida (Wesmael, 1838) (*)
Bracon (Orthobracon) longicollis (Wesmael, 1838) (N)
Bracon (Orthobracon) nigriventris (Wesmael, 1838) (*)
Bracon (Orthobracon) ochropus (Nees von Esenbeck, 1834) (*)
Bracon (Orthobracon) picticornis (Wesmael, 1838) (N)

Bracon (Orthobracon) praetermissus (Marshall, 1885) (N)
Bracon (Orthobracon) titubans (Wesmael, 1838) (*)
Bracon (Orthobracon) tornator (Marshall, 1885) (*)

Bracon (Rostrobracon) Tobias, 1957

Bracon (Rostrobracon) urinator (Fabricius, 1798) (N, S, Si, Sa)

Cyanopterus Haliday, 1835

Cyanopterus flavator (Fabricius, 1793)
Cyanopterus flavator flavator (Fabricius, 1793) (N, S, Si)
Cyanopterus flavator barcinonensis (Marshall, 1897) (Sa)

Pigeria van Achterberg, 1985

Pigeria piger (Wesmael, 1838) (N, Sa)

Coeloides Wesmael, 1838

Coeloides filiformis Ratzeburg, 1852 (N, S)
Coeloides melanotus Wesmael, 1838 (N, S)
Coeloides scolyticida Wesmael, 1838 (*)
Coeloides sordidator (Ratzeburg, 1844) (*)
Coeloides strobilorum (Ratzeburg, 1848) (*)
Coeloides subconcolor Russo, 1938 (S, Si)

Iphiaulax Foerster, 1862

Iphiaulax fastidiator (Fabricius, 1781)
Iphiaulax impostor Scopoli, 1763 (N, S, Si)
Iphiaulax incisorus Shenefelt, 1978 (Si)
Iphiaulax mactator (Klug, 1817) (N)
Iphiaulax multiarticulatus (Ratzeburg, 1852) (*)
Iphiaulax umbraculator (Nees von Esenbeck, 1834) (N)

Ipobracon Thomson, 1892

Ipobracon extricator (Nees von Esenbeck, 1834) (Si)
Ipobracon mimelus (Marshall, 1897) (N)
Ipobracon obscuripennis Thomson, 1892 (N, Sa)
Ipobracon rector Thunberg, 1822 (*)

Vipio Latreille, 1804

Vipio appellator (Nees von Esenbeck, 1834) (N, Sa)
Vipio deplanator (Nees von Esenbeck, 1834) (*)
Vipio frivaldszkyi Szépligeti, 1896 (S, Si)

Vipio humerator (A. Costa, 1884) (Si, Sa)
Vipio illusor (Klug, 1817) (N)
Vipio intermedius Szépligeti, 1896 (N)
Vipio irreptor (Klug, 1817) (Si) (*)
Vipio longicaudus (Boheman, 1853) (N, Sa)
Vipio marshalli Schmiedeknecht, 1896 (Si, Sa)
Vipio radiatulus Thomson, 1892 (N)
Vipio rimulosus Thomson, 1892 (N, S)
Vipio tentator (Rossi, 1790) (N, S, Si, Sa)
Vipio terrefactor (Villers, 1789) (N, S, Si, Sa)

Pseudovipio Szépligeti, 1896

Pseudovipio castrator (Fabricius, 1798) (N, S, Si, Sa)
Pseudovipio cuniculator (Rossi, 1792) (N, S, Sa)
Pseudovipio gracilis (Szépligeti, 1901) (*)
Pseudovipio inscriptor (Nees von Esenbeck, 1834) (N, Si)

Glyptomorpha Holmgren, 1868

Glyptomorpha desectus Bradley, 1919 (N, Sa)
Glyptomorpha pectoralis Brullé, 1832 (S, Sa)
Glyptomorpha sricula (Marshall, 1888) (Si)

Ademon Haliday, 1833

Ademon decrescens (Nees von Esenbeck, 1811) (Si)

Biosteres Foerster, 1862

Biosteres bicolor (Wesmael, 1835) (*)
Biosteres blandus (Haliday, 1837) (N)
Biosteres brevipalpis (Thomson, 1895) (N)
Biosteres carbonarius Nees von Esenbeck, 1834 (N, S, Sa)
Biosteres haemorrhoeus (Haliday, 1837) (N)
Biosteres rusticus Haliday, 1837 (N)
Biosteres scabriculus (Wesmael, 1835) (S)
Biosteres wesmaelii Haliday, 1837 (N)

Diachasma Foerster, 1862

Diachasma cephalotes Wesmael, 1835 (N, S)
Diachasma fulgidum (Haliday, 1837) (S)
Diachasma graeffei (Fischer, 1959) (N)
Diachasma rimulosa Marshall, 1897 (N)

Opius Wesmael, 1835

Opius aethiops Haliday, 1837 (N)
Opius ambiguus Wesmael, 1835 (S)
Opius analis Wesmael, 1835 (N)
Opius biroi Fischer, 1960 (N)
Opius caesus Haliday, 1837 (N)
Opius caricivora Fischer, 1964 (Si)
Opius carinatus Thomson, 1895 (N)
Opius caudatus Wesmael, 1835 (N)
Opius cingulatus Wesmael, 1835 (N, Si)
Opius comatus Wesmael, 1835 (N, S)
Opius concolor Szépligeti, 1910 (S, Si, Sa)
Opius coracinus Thomson, 1895 (Si)
Opius crassipes Wesmael, 1835 (N)
Opius depeculator (Foerster, 1862) (N, S)
Opius exiguus Wesmael, 1835 (N, S, Si)
Opius exilis Haliday, 1837 (S, Si)
Opius fallax Szépligeti, 1896 (*)
Opius ferrugator (Goureau, 1862) (*)
Opius filicornis Thomson, 1895 (*)
Opius funebris Wesmael, 1835 (*)
Opius fuscipennis Wesmael, 1835 (N)
Opius geniculatus Thomson, 1895 (N)
Opius ilicis Nixon, 1939 (*)
Opius impatientis Fischer, 1957 (N)
Opius instabilis Wesmael, 1835 (N)
Opius irregularis Wesmael, 1835 (N)
Opius levis Wesmael, 1835 (N)
Opius lonicerae Fischer, 1958 (S)
Opius lugens Haliday, 1837 (N, Si)
Opius maculipes Wesmael, 1835 (*)
Opius macrocerus Thomson, 1895 (N)
Opius magnicauda Fischer, 1958 (N)
Opius magnus Fischer, 1958 (S)
Opius meracus Fischer, 1960 (*)
Opius mirabilis Fischer, 1958 (*)
Opius neopendulus Fischer, 1989 (N)
Opius nigricoloratus Fischer, 1958 (*)
Opius nitidulator (Nees, 1834) (N)
Opius ocellatus Wesmael, 1835 (N, S)
Opius ochrogaster Wesmael, 1835 (N, S, Si)
Opius pallipes Wesmael, 1835 (N)
Opius pendulus Haliday, 1837 (N)
Opius phytobiae Fischer, 1959 (*)
Opius piceus Thomson, 1895 (S)
Opius propodealis Fischer, 1958 (*)
Opius pygmaeator (Nees von Esenbeck, 1834) (N)
Opius rudiformis Fischer, 1958 (N)
Opius ruficeps Wesmael, 1835 (N)

Opius rufipes Wesmael, 1835 (N)
Opius seebensteinensis Fischer, 1959 (S)
Opius similis Szépligeti, 1898 (N)
Opius spretus Haliday, 1837 (*)
Opius testaceus Wesmael, 1838 (N)
Opius tirolensis Fischer, 1958 (*)
Opius trisulcus Thomson, 1895 (*)
Opius variegatus Szépligeti, 1896 (S)

Eurytenus Foerster, 1862

Eurytenus abnormis (Wesmael, 1835) (*)

Alysia (Alysia) Latreille, 1804

Alysia (Alysia) cingulata Nees von Esenbeck, 1834 (*)
Alysia (Alysia) incongrua Nees von Esenbeck, 1834 (N)
Alysia (Alysia) lucia Haliday, 1838 (N)
Alysia (Alysia) lucidula Goureau, 1862 (*)
Alysia (Alysia) mandibulator (Nees von Esenbeck, 1814) (*)
Alysia (Alysia) manducator (Panzer, 1799) (*)
Alysia (Alysia) nitidulator Zetterstedt, 1838 (*)
Alysia (Alysia) picta Goureau, 1851 (*)
Alysia (Alysia) truncator (Nees von Esenbeck, 1814) (*)

Alysia (Anarcha) Foerster, 1862

Alysia (Anarcha) fuscipennis Haliday, 1838 (N)
Alysia (Anarcha) tipulae (Scopoli, 1764) (N)

Anisocyrtia Foerster, 1862

Anisocyrtia alpinicola van Achterberg, 1986 (N)

Aphaereta Foerster, 1862

Aphaereta major Thomson, 1895 (N)
Aphaereta minuta (Nees von Esenbeck, 1812) (N)

Aspilota Foerster, 1862

Aspilota costulata Thomson, 1895 (N)
Aspilota fuscicornis (Haliday, 1838) (N)
Aspilota globipes (Fischer, 1962) (N)

Dinotrema Foerster, 1862

Dinotrema concinna (Haliday, 1838) (S)

Dinotrema lineola Thomson, 1895 (S)
Dinotrema nervosa (Haliday, 1833) (N)
Dinotrema phoridarum Goidanich, 1936 (N)

Panerema Foerster, 1862

Panerema fulvicornis (Haliday, 1838) (N)

Chasmodon Haliday, 1838

Chasmodon apterus (Nees von Esenbeck, 1814) (*)

Dapsilarthra Foerster, 1862

Dapsilarthra apii (Curtis, 1826) (*)
Dapsilarthra tirolensis (Koenigsmann, 1972) (N)

Orthostigma Ratzeburg, 1844

Orthostigma laticeps Thomson, 1895 (*)
Orthostigma pumilum (Nees von Esenbeck, 1834) (N, S)

Pentapleura Foerster, 1862

Pentapleura pumilio (Nees von Esenbeck, 1814) (N)

Phaenocarpa Foerster, 1862

Phaenocarpa canaliculata Stelfox, 1941 (N)
Phaenocarpa conspurcator (Haliday, 1838) (*)
Phaenocarpa ruficeps (Nees von Esenbeck, 1814) (N)
Phaenocarpa venusta Marshall, 1898 (N)

Pseudopezomachus Mantero, 1905

Pseudopezomachus bituberculatus (Marshall, 1904) (N, S, Sa)

Symphanes Foerster, 1862

Symphanes aciculata Foerster, 1862 (*)

Synaldis Foerster, 1862

Synaldis concolor (Nees von Esenbeck, 1814) (N)
Synaldis globipes Fischer, 1962 (N)
Synaldis maxima Fischer, 1962 (N)
Synaldis nitidula (Masi, 1933) (S)
Synaldis sulcata Fischer, 1962 (N)

Tanycarpa Foerster, 1862

Tanycarpa gracilicornis (Nees von Esenbeck, 1814) (*)
Tanycarpa rufinotata (Haliday, 1838) (*)

Trachyusa Ruthe, 1854

Trachyusa aurora (Haliday, 1838) (N)
Trachyusa szepligetii Papp, 1967 (N)

Chorebus Haliday, 1833

Chorebus affinis (Nees von Esenbeck, 1814) (N)
Chorebus alecto (Morley, 1924) (*)
Chorebus ampliator (Nees von Esenbeck, 1834) (N)
Chorebus bathyzonus Marshall, 1895 (N)
Chorebus caesariatus Griffiths, 1966 (N)
Chorebus cyclops (Nixon, 1937) (N)
Chorebus dagda (Nixon, 1943) (*)
Chorebus fuscipennis (Nixon, 1937) (N)
Chorebus incertus (Goureau, 1851) (*)
Chorebus iridis Griffiths, 1968 (S)
Chorebus lateralis (Haliday, 1839) (*)
Chorebus leptogaster (Haliday, 1839) (N)
Chorebus limnicola (Nees von Esenbeck, 1814) (*)
Chorebus lychnidis Griffiths, 1967 (N)
Chorebus misellus (Marshall, 1895) (N)
Chorebus navicularis (Nees von Esenbeck, 1814) (N)
Chorebus oreoselini Griffiths, 1966 (S)
Chorebus petiolatus (Nees von Esenbeck, 1834) (N, S)
Chorebus punctus (Goureau, 1851) (*)
Chorebus rufipes (Nees von Esenbeck, 1814) (*)
Chorebus senilis (Nees von Esenbeck, 1814) (N)
Chorebus tamiris (Nixon, 1943) (*)
Chorebus tanis (Nixon, 1945) (Si)
Chorebus uliginosa (Haliday, 1839) (N)

Lepton Zetterstedt, 1838

Lepton elegans (Curtis, 1829) (N)
Lepton niger (Nees von Esenbeck, 1812) (N, Si)

Coelinus Nees von Esenbeck, 1818

Coelinus festus Goureau, 1851 (*)
Coelinus parvulus (Nees von Esenbeck, 1812) (N)
Coelinus viduus (Curtis, 1829) (N)

Coloneura Foerster, 1862

Coloneura siciliensis Griffiths, 1968 (Si)

Dacnusa Haliday, 1833

Dacnusa abdita Haliday, 1839 (N)
Dacnusa areolaris (Nees von Esenbeck, 1812) (N)
Dacnusa brevistigma (Tobias, 1962) (*)
Dacnusa gallarum (Ratzeburg, 1852) (*)
Dacnusa laevipectus Thomson, 1895 (N)
Dacnusa lateralis Haliday, 1839 (N)
Dacnusa maculata Goureau, 1851 (*)
Dacnusa maculipes Thomson, 1895 (N)
Dacnusa pubescens (Curtis, 1826) (N)

Exotela Foerster, 1862

Exotela gilvipes (Haliday, 1839) (*)

Grandia Goidanich, 1936

Grandia cynaraphyla (Ricchello, 1928) (S, Sa)

Polemochartus Schulz, 1911

Polemochartus melas Giraud, 1963 (*)

Heterolexis Foerster, 1862

Heterolexis boscoloi Fischer, 1993 (N)
Heterolexis latimana Fischer, 1993 (N)

Gnamptodon Haliday, 1837

Gnamptodon apheles van Achterberg, 1983 (N)
Gnamptodon decoris (Foerster, 1862) (N)
Gnamptodon erasmi van Achterberg, 1983 (N)
Gnamptodon georginae van Achterberg, 1983 (N)
Gnamptodon molestus van Achterberg, 1983 (N)
Gnamptodon pumilio (Nees von Esenbeck, 1834) (N)

Ichneutes Nees von Esenbeck, 1816

Ichneutes brevis Wesmael, 1835 (*)
Ichneutes levis Wesmael, 1835 (*)
Ichneutes reunitor Nees von Esenbeck, 1816 (*)

Proterops Wesmael, 1835

Proterops nigripennis Wesmael, 1835 (N, Si)

Mirax Haliday, 1833

Mirax dryochares Marshall, 1898 (N)

Mirax nanivorae Fischer, 1957 (N)

Mirax rufilabris Haliday, 1833 (N)

Aphidius Nees, 1819

Aphidius absinthii Marshall, 1896 (N, S)

Aphidius avenae Haliday, 1834 (N, S, Si)

Aphidius cingulatus Ruthe, 1859 (N, S)

Aphidius colemani Viereck, 1912 (N, S, Si)

Aphidius eadyi Starý, Gonzalez & Hall, 1980 (S)

Aphidius eglanteriae Haliday, 1834 (N?)

Aphidius ervi Haliday, 1834 (N, S, Si)

Aphidius funebris Mackauer, 1961 (N, S, Si)

Aphidius hortensis Marshall, 1896 (N)

Aphidius matricariae Haliday, 1834 (N, S, Si)

Aphidius microlophii Pennacchio & Tremblay, 1987 (N, S)

Aphidius rhopalosiphi De Stefani-Perez, 1902 (N, S, Si)

Aphidius rosae Haliday, 1834 (N, S, Si)

Aphidius salicis Haliday, 1834 (S)

Aphidius setiger (Mackauer, 1961) (N?)

Aphidius smithi Sharma & Subba Rao, 1959 (S)

Aphidius sonchi Marshall, 1896 (Si)

Aphidius sussi Pennacchio & Tremblay, 1989 (N)

Aphidius urticae Haliday, 1834 (N, S)

Aphidius uzbekistanicus Luzhetskii, 1960 (N, S)

Areopraon Mackauer, 1959

Areopraon lepelleyi (Waterston, 1926) (N)

Diaeretiella Starý, 1960

Diaeretiella rapae (M'Intosh, 1855) (N, S, Si)

Diaeretus Förster, 1862

Diaeretus leucopterus (Haliday, 1834) (S, Si)

Ephedrus Haliday, 1833

Ephedrus nacheri Quilis, 1934 (S)
Ephedrus niger Gautier, Bonnamour & Gaumont, 1929 (N, S, Si)
Ephedrus persicae Froggatt, 1904 (N, S, Si)
Ephedrus plagiator (Nees von Esenbeck, 1812) (N, S)

Lipolexis Förster, 1862

Lipolexis gracilis Förster, 1862 (N, S, Si)

Lysiphlebus Förster, 1862

Lysiphlebus ambiguus (Haliday, 1834) (N, S, Si)
Lysiphlebus confusus Tremblay & Eady, 1978 (N, S, Si)
Lysiphlebus dissolutus (Nees von Esenbeck, 1812) (N?)
Lysiphlebus fabarum (Marshall, 1896) (N, S, Si)
Lysiphlebus hispanus Starý, 1973 (S)
Lysiphlebus salicaphis (Fitch, 1855) (N)
Lysiphlebus testaceipes Cresson, 1880 (N, S, Si)
Lysiphlebus thelaxis Starý, 1961 (S, Si)

Monoctonia Starý, 1962

Monoctonia pistaciaecola Starý, 1962 (S, Si)
Monoctonia vesicarii Tremblay, 1993 (S)

Monoctonus Haliday, 1833

Monoctonus caricis (Haliday, 1833) (N?)
Monoctonus cerasi (Marshall, 1896) (N)

Pauesia Quilis, 1931

Pauesia abietis (Marshall, 1896) (N)
Pauesia alpina Starý, 1966 (N)
Pauesia goidanichi Starý, 1966 (N, S)
Pauesia jezoensis Watanabe, 1941 (S, Si)
Pauesia juniperorum (Starý, 1960) (N)
Pauesia laricis (Haliday, 1834) (N)
Pauesia media Starý, 1966 (N)
Pauesia montana Starý, 1966 (N)
Pauesia picta (Haliday, 1834) (S)
Pauesia pini (Haliday, 1834) (S, Si)
Pauesia rufiabdominalis Starý, 1966 (S)
Pauesia silana Tremblay, 1969 (S, Si)
Pauesia silvestris Starý, 1960 (N, S, Si)
Pauesia similis Starý, 1966 (N)
Pauesia unilachni (Gahan, 1926) (N, S, Si)

Praon Haliday, 1833

Praon abjectum (Haliday, 1833) (S?, Si)
Praon absinthii Bignell, 1894 (S?)
Praon barbatum Mackauer, 1967 (S)
Praon bicolor Mackauer, 1959 (S, Si)
Praon dorsale (Haliday, 1833) (S, Si)
Praon exsoletum (Nees von Esenbeck, 1812) (S)
Praon flavinode (Haliday, 1833) (N?)
Praon grossum Starý, 1971 (S)
Praon necans Mackauer, 1959 (N)
Praon volucre (Haliday, 1833) (N, S, Si)
Praon yomenae Takada, 1968 (N, S, Si)

Protaphidius Ashmead, 1900

Protaphidius wissmannii (Ratzeburg, 1848) (N)

Trioxys Haliday, 1833

*Trioxy*s *acalephae* (Marshall, 1896) (N, S, Si)
*Trioxy*s *angelicae* (Haliday, 1833) (N, S, Si)
*Trioxy*s *auctus* (Haliday, 1833) (N)
*Trioxy*s *brevicornis* (Haliday, 1833) (S)
*Trioxy*s *centaureae* (Haliday, 1833) (N)
*Trioxy*s *complanatus* Quilis, 1931 (S)
*Trioxy*s *curvicaudus* Mackauer, 1967 (S)
*Trioxy*s *falcatus* Mackauer, 1959 (N)
*Trioxy*s *heraclei* (Haliday, 1833) (N, S)
*Trioxy*s *pallidus* (Haliday, 1833) (N, S, Si)
*Trioxy*s *pannonicus* Starý, 1960 (S)
*Trioxy*s *tenuicaudus* Starý, 1978 (S)

Aspicolpus Wesmael, 1838

Aspicolpus carinator (Nees von Esenbeck, 1812) (N)

Aspigonus Wesmael, 1835

Aspigonus diversicornis Wesmael, 1835 (*)

Baeacis Foerster, 1878

Baeacis abietis (Ratzeburg, 1844) (N)
Baeacis dissimilis (Nees von Esenbeck, 1834)

Diospilus Haliday, 1833

Diospilus capito (Nees von Esenbeck, 1834) (N)
Diospilus ephippium (Nees von Esenbeck, 1834) (N)
Diospilus oleraceus Haliday, 1833 (N)

Foersteria Szépligeti, 1896

Foersteria puber (Haliday, 1835) (N)

Helcon Nees von Esenbeck, 1812

Helcon angustator Nees von Esenbeck, 1814 (*)
Helcon nunciator (Fabricius, 1793) (N)
Helcon tardator Nees von Esenbeck, 1812 (N)

Helconidea Viereck, 1914

Helconidea annulicornis Nees von Esenbeck, 1834 (N)
Helconidea dentator (Fabricius, 1804) (N)
Helconidea ruspator (Linnaeus, 1758) (*)

Schizoprymnus Foerster, 1862

Schizoprymnus ambiguus Nees von Esenbeck, 1816 (N)
Schizoprymnus gregori Snoflák, 1953 (S)
Schizoprymnus longiseta (Herrich-Schaeffer, 1838) (S)
Schizoprymnus obscurus (Nees von Esenbeck, 1816) (N)

Taphaeus Wesmael, 1835

Taphaeus affinis (Wesmael, 1835) (*)

Triaspis Haliday, 1835

Triaspis angustatus Herrich-Schaeffer, 1838 (N)
Triaspis brucivorus (Rondani, 1874) (*)
Triaspis caudatus (Nees von Esenbeck, 1813) (S)
Triaspis complanellae (Hartig, 1847) (*)
Triaspis flavipalpis (Wesmael, 1835) (*)
Triaspis floricola (Wesmael, 1835) (*)
Triaspis luteipes Thomson, 1874 (N)
Triaspis obscurellus (Nees von Esenbeck, 1816) (N)
Triaspis pallipes (Nees von Esenbeck, 1816) (*)
Triaspis sculpturaturus Szépligeti, 1898 (*)
Triaspis striatulus (Nees von Esenbeck, 1813) (*)
Triaspis tenthredinum (Hartig, 1847) (*)
Triaspis thoracicus (Curtis, 1860) (Si, Sa)

Wroughtonia Cameron, 1899

Wroughtonia spinator (Lepeletier & Audinet-Serville, 1827) (N)

Eubazus Nees von Esenbeck, 1814

Eubazus atricornis (Ratzeburg, 1848) (S)
Eubazus augustinus Ruthe, 1867 (N)
Eubazus cruentator Haliday, 1833 (N)
Eubazus curculionum (Hartig, 1847) (*)
Eubazus destitutus (Ratzeburg, 1848) (*)
Eubazus extensor (Linnaeus, 1758) (N, S, Sa)
Eubazus flavipes Haliday, 1835 (*)
Eubazus fuscipalpis (Wesmael, 1835) (N)
Eubazus interstitialis (Ratzeburg, 1844) (*)
Eubazus lepidus (Haliday, 1835) (N)
Eubazus longicaudis (Ratzeburg, 1844) (*)
Eubazus nigricoxis (Wesmael, 1835) (N)
Eubazus orchestidis (Rondani, 1877) (N)
Eubazus politus (Ratzeburg, 1852) (*)
Eubazus ruficoxis (Wesmael, 1835) (N)
Eubazus semirugosus (Nees von Esenbeck, 1816) (*)
Eubazus tibialis (Haliday, 1835) (N)

***Blacus* (*Blacus*)** Nees von Esenbeck, 1818

Blacus (*Blacus*) *bovistae* Haeselbarth, 1973 (N)
Blacus (*Blacus*) *brachialis* Rondani, 1876 (N) (*)
Blacus (*Blacus*) *errans* (Nees von Esenbeck, 1812) (N)
Blacus (*Blacus*) *exilis* (Nees von Esenbeck, 1812) (N)
Blacus (*Blacus*) *filicornis* Haeselbarth, 1973 (N)
Blacus (*Blacus*) *florus* Goureau, 1851 (*)
Blacus (*Blacus*) *fuscipes* Goureau, 1862 (*)
Blacus (*Blacus*) *hastatus* Haliday, 1835 (N)
Blacus (*Blacus*) *humilis* (Nees von Esenbeck, 1812) (N)
Blacus (*Blacus*) *instabilis* Ruthe, 1861 (N, S)
Blacus (*Blacus*) *maryi* Hellen, 1958 (N)
Blacus (*Blacus*) *nigricornis* Haeselbarth, 1973 (N)
Blacus (*Blacus*) *paganus* Haliday, 1835 (N)
Blacus (*Blacus*) *pappianus* Haeselbarth, 1973 (N)

***Blacus* (*Ganychorus*)** Haliday, 1835

Blacus (*Ganychorus*) *ambulans* Haliday, 1835 (N)
Blacus (*Ganychorus*) *armatulus* Ruthe, 1861 (N)
Blacus (*Ganychorus*) *conformis* Wesmael, 1835 (N)
Blacus (*Ganychorus*) *diversicornis* (Nees von Esenbeck, 1834) (N)
Blacus (*Ganychorus*) *macropterus* Haeselbarth, 1973 (N)
Blacus (*Ganychorus*) *maculipes* Wesmael, 1835 (N)

Blacus (Ganychorus) nitidus Haeselbarth, 1973 (N)
Blacus (Ganychorus) pallipes Haliday, 1835 (N)
Blacus (Ganychorus) ruficornis (Nees von Esenbeck, 1812) (N, S, Sa)

Blacus (Hysterobolus) Viereck, 1913

Blacus (Hysterobolus) varius Haeselbarth, 1973 (N)

Blacus (Tarpheion) Van Achterberg, 1976

Blacus (Tarpheion) achterbergi Haeselbarth, 1973 (N)

Allurus Foerster, 1862

Allurus muricatus (Haliday, 1833) (N, S)

Centistes (Centistes) Haliday, 1835

Centistes (Centistes) clavipes (Nees von Esenbeck, 1834) (N)
Centistes (Centistes) fuscipes (Nees von Esenbeck, 1834) (N)

Centistes (Syrrhizus) Forester, 1862

Centistes (Syrrhizus) distinguendus Sarra, 1929 (N)

Chrysopophthorus Goidanich, 1948

Chrysopophthorus hungaricus (Zilahi-Kiss, 1927) (N)

Dinocampus Foerster, 1862

Dinocampus coccinellae (Schrank, 1802) (N)

Leiophron Nees von Esenbeck, 1818

Leiophron brevicornis (Herrich - Schäffer, 1838) (N)
Leiophron orchesiae Curtis, 1833 (N)
Leiophron pallidistigma Curtis, 1833 (*)
Leiophron pallipes Curtis, 1833 (*)
Leiophron tuberculifer (Marshall, 1887) (*)

Loxocephalus Foerster, 1862

Loxocephalus niger (Fischer, 1957) (S)

Syntretus Foerster, 1862

Syntretus conterminus (Nees von Esenbeck, 1834) (N)

Cosmophorus Ratzeburg, 1848

Cosmophorus klugii Ratzeburg, 1848 (*)

Meteorus Haliday, 1839

Meteorus abdominator (Nees von Esenbeck, 1811) (*)
Meteorus abscissus Thomson, 1895 (N, S)
Meteorus affinis Wesmael, 1835 (N, Si)
Meteorus brevicauda Thomson, 1895 (N)
Meteorus cespitator (Thunberg, 1822) (*)
Meteorus cinctellus (Spinola, 1808) (N, S)
Meteorus colon (Haliday, 1835) (*)
Meteorus consimilis (Nees von Esenbeck, 1834) (N, Sa)
Meteorus corax Marshall, 1898 (N)
Meteorus dejeanus (Rondani, 1874) (S) (*)
Meteorus flaviceps (Ratzeburg, 1844) (*)
Meteorus gracilis Ratzeburg, 1852
Meteorus gyrator (Thunberg, 1822) (N, S)
Meteorus heliophilus Fischer, 1970 (N)
Meteorus ictericus (Nees von Esenbeck, 1812) (N, S)
Meteorus obfuscatus (Nees von Esenbeck, 1812) (*)
Meteorus obsoletus Wesmael, 1835 (Sa)
Meteorus pallidus (Nees von Esenbeck, 1812) (N)
Meteorus profligator (Haliday, 1835) (N)
Meteorus pulchricornis (Wesmael, 1835) (N, Si)
Meteorus rubens (Nees, 1812) (N, Sa)
Meteorus salicorniae Schmiedeknecht, 1897 (N)
Meteorus tabidus (Wesmael, 1835) (*)
Meteorus versicolor (Wesmael, 1835) (N, Sa)

ZeZe Curtis, 1832

ZeZe albiditarsis (Curtis, 1832) (N, S)
ZeZe caligatus (Haliday, 1835) (N)
ZeZe chlorophthalmus (Spinola, 1808) (N, Sa)

Microctonus Wesmael, 1835

Microctonus aethiops (Nees von Esenbeck, 1834) (N, S)
Microctonus brevicollis (Haliday, 1835) (N)
Microctonus cerealium (Haliday, 1835) (N, S)
Microctonus emmae Delucchi, 1952 (S)
Microctonus labilis Ruthe, 1856 (N)
Microctonus morimi (Ferrière, 1931) (N)
Microctonus pallidus (Rondani, 1874) (N)

Perilitus Nees von Esenbeck, 1818

Perilitus pallidipes (A. Costa, 1883) (Sa)

Perilitus rutilus (Nees von Esenbeck, 1812) (N)

Pygostolus Haliday, 1833

Pygostolus falcatus (Nees von Esenbeck, 1834) (N)

Pygostolus multiarticulatus (Ratzeburg, 1852) (N)

Pygostolus sticticus (Fabricius, 1798)

Townesilitus Haeselbarth & Loan, 1983

Townesilitus aemulus (Ruthe, 1856) (N)

Townesilitus bicolor (Wesmael, 1835) (N)

Townesilitus deceptor Wesmael, 1835 (N)

Wesmaelia Foerster, 1862

Wesmaelia pendula Foerster, 1862 (*)

Homolobus (Apatia) Enderlein, 1920

Homolobus (Apatia) truncator (Say, 1828) (N, S)

Homolobus (Chartolobus) Achterberg, 1979

Homolobus (Chartolobus) infumator (Lyle, 1914) (N, S, Sa)

Homolobus (Phylacter) Reinhard, 1863

Homolobus (Phylacter) annulicornis (Nees von Esenbeck, 1864) (N)

Homolobus (Phylacter) meridionalis van Achterberg, 1979 (S)

Charmon Haliday, 1833

Charmon cruentatus Haliday, 1833 (N)

Charmon extensor (Linnaeus, 1758) (N)

Acampsis Wesmael, 1835

Acampsis alternipes (Nees von Esenbeck, 1816) (*)

Sigalphus Latreille, 1802

Sigalphus irrorator (Fabricius, 1775) (N)

Lestricus Reinhard, 1866

Lestricus secalis (Linnaeus, 1758) (*)

Promachus Cresson, 1887

Promachus aartseni van Achterberg, 1994 (S)

Agathis Latreille, 1804

Agathis anglica Marshall, 1885 (N)
Agathis breviseta Nees von Esenbeck, 1814 (N)
Agathis glabricula Thomson, 1895 (N)
Agathis glaucoptera Nees von Esenbeck, 1834 (N)
Agathis griseifrons Thomson, 1895 (S)
Agathis malvacearum Latreille, 1805 (N, S, Sa)
Agathis meridionellae Fischer, 1957 (N)
Agathis nigra Nees von Esenbeck, 1814 (N, Si)
Agathis pedias Nixon, 1986 (Sa)
Agathis propinqua Kokuiev, 1895 (N)
Agathis pumila (Ratzeburg, 1844) (N)
Agathis rostrata Tobias, 1963 (N)
Agathis rufipalpis Nees von Esenbeck, 1814 (N, Sa)
Agathis semiaciculata Ivanov, 1899 (N, S)
Agathis syngenesiae Nees von Esenbeck, 1814 (N)
Agathis tibialis Nees von Esenbeck, 1814 (N)
Agathis timidus Nees von Esenbeck, 1814 (Sa)
Agathis umbellatarum Nees von Esenbeck, 1814 (Si, Sa)
Agathis varipes Thomson, 1895 (*)

Bassus Fabricius, 1804

Bassus calculator (Fabricius, 1798) (N)
Bassus cingulipes (Nees von Esenbeck, 1814) (N)
Bassus clausethalianus (Ratzeburg, 1844) (N)
Bassus conspicuus (Wesmael, 1837) (S)
Bassus dimidiator (Nees von Esenbeck, 1834) (N, S, Sa)
Bassus linguarius (Nees von Esenbeck, 1814) (N, S)
Bassus nugax (Reinhard, 1867) (S)
Bassus rufipes (Nees von Esenbeck, 1814) (Sa)
Bassus rugulosus (Nees von Esenbeck, 1834) (N)
Bassus tegularis (Thomson, 1895) (N)
Bassus timidulus (Nees von Esenbeck, 1814) (N, S, Sa)

Cremnops Foerster, 1862

Cremnops desertor (Linnaeus, 1758) (N)

Disophrys Foerster, 1862

Disophrys aegyptica Fahringer, 1937 (Si)
Disophrys caesa (Klug, 1835) (S, Si)

Earinus Wesmael, 1837

Earinus elator (Fabricius, 1804) (N)
Earinus thoracicus (Nees von Esenbeck, 1834) (N)

Macrocentrus Curtis, 1833

Macrocentrus ancylivorus Rohwer, 1923 (*)
Macrocentrus bicolor Curtis, 1833 (N, Sa)
Macrocentrus cingulum Reinhard in Brischke, 1882 (N, S)
Macrocentrus collaris (Spinola, 1808) (N, S)
Macrocentrus crassus Eady & Clark, 1964
Macrocentrus flavus Snellen von Vollenhoven, 1880 (N, Sa)
Macrocentrus gibber Eady & Clark, 1964 (N)
Macrocentrus infirmus (Nees von Esenbeck, 1834) (N)
Macrocentrus kurnakovi Tobias, 1976 (N)
Macrocentrus linearis (Nees von Esenbeck, 1812) (N, S)
Macrocentrus marginator (Nees von Esenbeck, 1812) (N, S)
Macrocentrus nidulator (Nees von Esenbeck, 1834) (N, Sa)
Macrocentrus nitidus (Wesmael, 1835) (N, S)
Macrocentrus resinellae (Linnaeus, 1758) (S)
Macrocentrus thoracicus (Nees von Esenbeck, 1812) (N, S, Sa)
Macrocentrus townesi van Achterberg & Haeselbarth, 1983 (N)

Hymenochaonia Dalla Torre, 1898

Hymenochaonia delicata (Cresson, 1872) (*)

Microtypus Ratzeburg, 1848

Microtypus wesmaelii Ratzeburg, 1848 (*)

Orgilus (Ischiolus) Hellén, 1958

Orgilus (Ischiolus) rugosus (Nees von Esenbeck, 1834) (N)

Orgilus (Orgilus) Haliday, 1833

Orgilus (Orgilus) achterbergi Taeger, 1989 (N)
Orgilus (Orgilus) anurus Thomson, 1895 (N)
Orgilus (Orgilus) brevicaudis Taeger, 1989 (N)
Orgilus (Orgilus) capeki Taeger, 1989 (N)
Orgilus (Orgilus) dubius Taeger, 1989 (N)
Orgilus (Orgilus) fischerianus Taeger, 1989 (N)

Orgilus (Orgilus) haeselbarthi Taeger, 1989 (N)
Orgilus (Orgilus) interjectus Taeger, 1989 (N)
Orgilus (Orgilus) laevigator (Nees von Esenbeck, 1812) (N)
Orgilus (Orgilus) minutus Szépligeti, 1898 (N)
Orgilus (Orgilus) moldavicus Tobias, 1986 (N)
Orgilus (Orgilus) obscurator (Nees von Esenbeck, 1812) (N)
Orgilus (Orgilus) patzaki Taeger, 1989 (N)
Orgilus (Orgilus) pimpinellae Niezabitowski, 1910 (N)
Orgilus (Orgilus) ponticus Tobias, 1986 (N)
Orgilus (Orgilus) punctulator Nees von Esenbeck, 1812 (N)
Orgilus (Orgilus) rubrator (Ratzeburg, 1852) (S)
Orgilus (Orgilus) rugosus (Nees von Esenbeck, 1834) (N)
Orgilus (Orgilus) similis Szépligeti, 1896 (N)
Orgilus (Orgilus) simillimus Taeger, 1989 (N)
Orgilus (Orgilus) thomsoni Taeger, 1989 (N)
Orgilus (Orgilus) tobiasi Taeger, 1989 (N)

Ascogaster Wesmael, 1835

Ascogaster abdinator (Dahlbom, 1833) (N)
Ascogaster annularis (Nees von Esenbeck, 1816) (N)
Ascogaster armata Wesmael, 1835 (N)
Ascogaster bidentula Wesmael, 1835 (N)
Ascogaster dentifer Tobias, 1976 (N)
Ascogaster grahami Huddleston, 1984 (S)
Ascogaster klugii (Nees von Esenbeck, 1816) (N)
Ascogaster quadridentata Wesmael, 1835 (N, S, Sa)
Ascogaster rufidens Wesmael, 1835 (*)
Ascogaster rufipes (Latreille, 1809) (N)
Ascogaster similis (Nees von Esenbeck, 1816) (N, S) (*)
Ascogaster varipes Wesmael, 1835 (N, S)

Chelonus Jurine, 1801

Chelonus annulatus (Nees von Esenbeck, 1816) (N)
Chelonus annulipes Wesmael, 1835 (N, S)
Chelonus bonellii (Nees von Esenbeck, 1816) (*)
Chelonus canescens Wesmael, 1835 (S)
Chelonus caradrinae Kokujev, 1914 (Sa)
Chelonus carbonator Marshall, 1885 (N)
Chelonus catulus Marshall, 1885 (N, S)
Chelonus erytrogaster Lucas, 1846 (S)
Chelonus fenestratus (Nees von Esenbeck, 1816) (N)
Chelonus gravenhorstii (Nees von Esenbeck, 1816) (S) (*)
Chelonus inanita (Linnaeus, 1767) (N, S)
Chelonus mutabilis (Nees von Esenbeck, 1816) (N, S)
Chelonus nigrinus Ratzeburg, 1844 (*)
Chelonus oculator (Fabricius, 1775) (N, S, Sa)

Chelonus pulchricornis Szépligeti, 1898 (*)
Chelonus pusillus Szépligeti, 1908 (N)
Chelonus pusio Marshall, 1885 (N)
Chelonus scabrator (Fabricius, 1793) (N)
Chelonus seticornis Thomson, 1891 (N)
Chelonus submuticus Wesmael, 1835

Microchelonus Szépligeti, 1908

Microchelonus contractus (Nees von Esenbeck, 1816) (N)
Microchelonus elaeaphilus (Silvestri, 1908) (S)
Microchelonus latrunculus (Marshall, 1885) (S)
Microchelonus lugubris (Wesmael, 1835) (N, S)
Microchelonus microphtalmus (Wesmael, 1838) (N)
Microchelonus minutus (A. Costa, 1884) (N, Sa)
Microchelonus rethusa Nees von Esenbeck, 1816 (N)
Microchelonus rimulosus (Thomson, 1874) (*)
Microchelonus risorius (Reinhard, 1867) (*)
Microchelonus sulcatus (Jurine, 1807) (S)

Phanerotoma Wesmael, 1838

Phanerotoma acuminata Szépligeti, 1908 (N, S)
Phanerotoma bouceki van Achterberg, 1990 (S)
Phanerotoma dentata (Panzer, 1805) (N, S, Sa)
Phanerotoma diversa (Walker, 1874) (*)
Phanerotoma fracta Kokujev, 1903 (N)
Phanerotoma ocularis Kohl, 1906 (N, S)
Phanerotoma planifrons (Nees von Esenbeck, 1816) (N, S)
Phanerotoma sardana Zettel, 1990 (Sa)
Phanerotoma soror van Achterberg, 1990 (N)
Phanerotoma tritoma (Marshall, 1898) (N)

Phanerotomella Szépligeti, 1900

Phanerotomella bisulcata (Herrich-Schaeffer, 1838) (N)
Phanerotomella rufa (Marshall, 1898) (N, Si)

Elasmosoma Ruthe, 1858

Elasmosoma berolinense Ruthe, 1858 (S)

Acaelius Haliday, 1834

Acaelius subfasciatus Haliday, 1833 (N)

Apanteles Foerster, 1862

Apanteles ater (Ratzeburg, 1852) (N)
Apanteles atreus Nixon, 1973 (N)
Apanteles brunnistigma Abdinbekova, 1969 (N)
Apanteles contaminatus (Haliday, 1834) (N)
Apanteles falcator (Ratzeburg, 1852) (S)
Apanteles galleriae Wilkinson, 1932 (N)
Apanteles hemara Nixon, 1965 (*)
Apanteles lacteus (Nees von Esenbeck, 1834) (N)
Apanteles obscurus (Nees von Esenbeck, 1834) (N, Si)
Apanteles pelopea Nixon, 1973 (*)
Apanteles picipes (Bouché, 1834) (*)
Apanteles validus (Thomson, 1895) (N)
Apanteles vindicius Nixon, 1965 (N)
Apanteles xanthostigmus (Haliday, 1834) (N, S, Sa)

Choeras Mason, 1981

Choeras dorsalis (Spinola, 1808) (N, Si, Sa)
Choeras parasitellae (Bouché, 1834) (N, S)
Choeras semele (Nixon, 1965) (Sa)

Cotesia Cameron, 1891

Cotesia affinis (Nees von Esenbeck, 1834) (N, S)
Cotesia ancilla (Nixon, 1974) (*)
Cotesia cajae (Bouché, 1834) (N)
Cotesia ferruginea (Marshall, 1885) (N)
Cotesia geryonis (Marshall, 1885) (N)
Cotesia glomerata (Linnaeus, 1758) (N, S)
Cotesia melanoscelus (Ratzeburg, 1844) (N, S, Si)
Cotesia memnon (Nixon, 1974) (N, Sa)
Cotesia ofella (Nixon, 1974) (*)
Cotesia ordinaria (Ratzeburg, 1844) (*)
Cotesia pilicornis (Thomson, 1895) (Sa)
Cotesia plutellae (Kurdjumov, 1912) (N, S)
Cotesia risilis (Nixon, 1974) (N)
Cotesia rubripes (Haliday, 1834) (N)
Cotesia ruficrus (Haliday, 1834) (N)
Cotesia salebrosa (Marshall, 1885) (N)
Cotesia scabriculus (Reinhard, 1880) (*)
Cotesia sessilis (Fourcroy, 1785) (N, S)
Cotesia spurius (Wesmael, 1837) (N)
Cotesia tetrica (Reinhard, 1880) (N)
Cotesia tibialis (Curtis, 1830) (N, S)
Cotesia vanessae (Reinhard, 1880) (N)
Cotesia vestalis (Haliday, 1834) (N)
Cotesia zygaenarum (Marshall, 1885) (N)

Deuterixys Mason, 1981

Deuterixys carbonaria (Wesmael, 1837) (*)

Diolcogaster Ashmead, 1900

Diolcogaster alvearia (Fabricius, 1798) (N)

Diolcogaster connexa (Nees von Esenbeck, 1834) (N)

Dolichogenidea Viereck, 1911

Dolichogenidea annularis (Haliday, 1834) (*)

Dolichogenidea benevolens (Papp, 1973) (*)

Dolichogenidea breviventris (Ratzeburg, 1848) (*)

Dolichogenidea cerialis (Nixon, 1976) (N)

Dolichogenidea dilecta (Haliday, 1834) (*)

Dolichogenidea emarginata (Nees von Esenbeck, 1834) (S, Sa)

Dolichogenidea ensiformis (Ratzeburg, 1844) (*)

Dolichogenidea erasmi (Nixon, 1972) (N)

Dolichogenidea evonymellae (Bouché, 1834) (*)

Dolichogenidea gagates (Nees von Esenbeck, 1834) (*)

Dolichogenidea imperator (Wilkinson, 1939) (N, Sa)

Dolichogenidea impura (Nees von Esenbeck, 1834) (N)

Dolichogenidea infima (Haliday, 1834) (N)

Dolichogenidea lacteicolor (Viereck, 1911) (N)

Dolichogenidea lacteipennis (Curtis, 1830) (Si)

Dolichogenidea laevigata (Ratzeburg, 1848) (S, Si)

Dolichogenidea litae (Nixon, 1972) (Sa)

Dolichogenidea longicauda (Wesmael, 1837) (N, S)

Dolichogenidea phaloniae (Wilkinson, 1940) (Sa)

Dolichogenidea punctiger (Wesmael, 1837) (N)

Dolichogenidea soikai (Nixon, 1972) (N)

Dolichogenidea ultor (Reinhard, 1880) (N, S)

Glyptapanteles Ashmead, 1905

Glyptapanteles compressiventris (Muesebeck, 1921) (Si)

Glyptapanteles fulvipes (Haliday, 1834) (N)

Glyptapanteles lateralis (Haliday, 1834) (N)

Glyptapanteles liparidis (Bouché, 1834) (*)

Glyptapanteles mygdonia (Nixon, 1973) (N)

Glyptapanteles nivalis (Papp, 1983) (N)

Glyptapanteles octonarius (Ratzeburg, 1852) (*)

Glyptapanteles pallipes (Reinhard, 1880) (*)

Glyptapanteles pinicola (Lyle, 1917) (N)

Glyptapanteles porthetriae (Muesebeck, 1928) (N, Si)

Glyptapanteles vitripennis (Curtis, 1830) (Si)

Iconella Mason, 1981

Iconella lacteoides (Nixon, 1965) (*)

Illidops Mason, 1981

Illidops sophrosine (Nixon, 1976) (*)

Lissogaster Bengtsson, 1926

Lissogaster alebion Nixon, 1968 (N)

Lissogaster alvearifex (Schrank, 1781) (N)

Lissogaster asramenes Nixon, 1968 (N)

Lissogaster auriculatus (Fabricius, 1804) (N)

Lissogaster eupolis Nixon, 1968 (N)

Lissogaster globatus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)

Lissogaster hospes Marshall, 1885 (S)

Lissogaster opheltes Nixon, 1968 (*)

Lissogaster rugulosus Nees von Esenbeck, 1834 (*)

Lissogaster stictica Ruthe, 1858 (N)

Lissogaster subcompletus Nees von Esenbeck, 1834 (N, S)

Lissogaster tibialis Nees von Esenbeck, 1834 (N, S)

Microgaster Latreille, 1804

Microgaster decens (Tobias, 1964) (*)

Microgaster deprimator (Fabricius, 1798) (N)

Microgaster mediator Haliday, 1834 (N)

Microgaster ocellatae (Bouché, 1834) (S, Si)

Microgaster ratzeburgii (Ruthe, 1860) (*)

Microgaster sofron (Nixon, 1970) (N)

Microgaster spectabilis (Haliday, 1834) (N, S)

Microgaster spinolae (Nees von Esenbeck, 1834) (*)

Microgaster stigmatica Ratzeburg, 1844 (*)

Microgaster tuberculata Bouche, 1834 (*)

Microgaster tuberculifer Wesmael, 1837 (N)

Microgaster vidua (Ruthe, 1860) (N, S)

Microgaster xanthopus (Ruthe, 1860) (N)

Pholetesor Mason, 1981

Pholetesor circumscriptus (Nees von Esenbeck, 1834) (N, S)

Pholetesor exiguus (Haliday, 1834) (N)

Pholetesor nanus (Reinhard, 1880) (N)

Pholetesor viminetorum (Wesmael, 1837) (N)

Protapanteles Ashmead, 1898

Protopanteles anchisiades (Nixon, 1973) (N)
Protopanteles immunis (Haliday, 1834) (N)
Protopanteles triangulator (Wesmael, 1837) (S)

Protomicroplitis Ashmead, 1898

Protomicroplitis meges Nixon, 1965 (*)

Rasivalva Mason, 1981

Rasivalva calceata (Haliday, 1834) (*)

Sathon Mason, 1981

Sathon falcatus (Nees von Esenbeck, 1834) (N)

Cardiochiles Nees von Esenbeck, 1818

Cardiochiles brachialis Rondani, 1874 (N)
Cardiochiles saltator (Fabricius, 1781) (N, S)

Note

Dendrosoter curtisii: Distribuzione italiana da precisare.
Dendrosoter hartigii: Distribuzione italiana da precisare.
Doryctes heydenii: Distribuzione italiana da precisare.
Doryctes nobilis: Distribuzione italiana da precisare.
Doryctes pomarius: Distribuzione italiana da precisare.
Doryctes undulatus: Distribuzione italiana da precisare.
Ecphylus hylesini: Distribuzione italiana da precisare.
Eucorystoides aciculatus: Distribuzione italiana da precisare.
Heterospilus corsicus: Distribuzione italiana da precisare.
Heterospilus incompletus: Distribuzione italiana da precisare.
Ontsira ignea: Distribuzione italiana da precisare.
Ontsira imperator: Distribuzione italiana da precisare.
Pambolus pallipes: Distribuzione italiana da precisare.
Spathius curvicaudis: Distribuzione italiana da precisare.
Spathius lignarius: Distribuzione italiana da precisare.
Spathius pedestris: Distribuzione italiana da precisare.
Spathius phymatodis: Distribuzione italiana da precisare.
Spathius radzayanus: Distribuzione italiana da precisare.
Oncophanes minutus: Distribuzione italiana da precisare.
Rhyssalus indagator: Distribuzione italiana da precisare.
Aleiodes grandis: Distribuzione italiana da precisare.
Aleiodes modestus: Distribuzione italiana da precisare.
Aleiodes nigricornis: Distribuzione italiana da precisare.
Aleiodes pallidator: Distribuzione italiana da precisare.
Aleiodes praetor: Distribuzione italiana da precisare.

Aleiodes procerus: Distribuzione italiana da precisare.

Aleiodes rugulosus: Distribuzione italiana da precisare.

Aleiodes testaceus: Recentemente van Achterberg (1991 - Zool. Verh. Leiden, 273: 1-102) ha proposto la sinonimia tra i generi *Aleiodes* Wesmael, 1838 ed *Heterogamus* Wesmael, 1838. Come conseguenza *Bracon testaceus* Spinola, 1808 e *Heterogamus testaceus* Telenga, 1941, specie in precedenza assegnate rispettivamente ai due generi, divenute coogeneriche hanno dato origine ad una omonimia. L'epiteto specifico proposto da Telenga, non avendo la priorità rispetto a quello di Spinola, non è più utilizzabile. Mancando delle necessarie conoscenze tassonomiche per poter risolvere il caso si preferisce lasciare la questione in sospeso.

Aleiodes vittiger: Distribuzione italiana da precisare.

Aleiodes vollenhoveni: Posizione sistematica non chiara.

Rogas testaceus: Distribuzione italiana da precisare.

Bracon (Bracon) aterrimus: Posizione sistematica non chiara.

Bracon (Bracon) bifasciatus: Posizione sistematica non chiara.

Bracon (Bracon) minutator: Posizione sistematica non chiara.

Bracon (Bracon) pusillimus: Distribuzione italiana da precisare.

Bracon (Bracon) scutellaris: Distribuzione italiana da precisare.

Bracon (Bracon) unicinctus: Posizione sistematica non chiara.

Bracon (Bracon) vitripennis: Distribuzione italiana da precisare.

Bracon (Glabrobracon) caudiger: Distribuzione italiana da precisare.

Bracon (Glabrobracon) longulus: Distribuzione italiana da precisare.

Bracon (Glabrobracon) parvicornis: Distribuzione italiana da precisare.

Bracon (Glabrobracon) ratzeburgii: Distribuzione italiana da precisare.

Bracon (Orthobracon) brevisculus: Distribuzione italiana da precisare.

Bracon (Orthobracon) crassungula: Distribuzione italiana da precisare.

Bracon (Orthobracon) fuscipennis: Distribuzione italiana da precisare.

Bracon (Orthobracon) hylobii: Distribuzione italiana da precisare.

Bracon (Orthobracon) laevigatissimus: Distribuzione italiana da precisare.

Bracon (Orthobracon) larvicida: Distribuzione italiana da precisare.

Bracon (Orthobracon) nigriventris: Distribuzione italiana da precisare.

Bracon (Orthobracon) ochropus: Distribuzione italiana da precisare.

Bracon (Orthobracon) titubans: Distribuzione italiana da precisare.

Bracon (Orthobracon) tornator: Distribuzione italiana da precisare.

Coeloides scolyticida: Distribuzione italiana da precisare.

Coeloides sordidator: Distribuzione italiana da precisare.

Coeloides strobilorum: Distribuzione italiana da precisare.

Iphiaulax multiarticulatus: Distribuzione italiana da precisare.

Ipobracon rector: Distribuzione italiana da precisare.

Vipio deplanator: Distribuzione italiana da precisare.

Vipio irreptor: Posizione sistematica non chiara.

Pseudovipio gracilis: Distribuzione italiana da precisare.

Biosteres bicolor: Distribuzione italiana da precisare.

Opius fallax: Distribuzione italiana da precisare.

Opius ferrugator: Posizione sistematica non chiara. Distribuzione italiana da precisare.

Opius filicornis: Distribuzione italiana da precisare.

Opius funebris: Distribuzione italiana da precisare.

Opius ilicis: Distribuzione italiana da precisare.

Opius maculipes: Distribuzione italiana da precisare.
Opius meracus: Distribuzione italiana da precisare.
Opius mirabilis: Distribuzione italiana da precisare.
Opius nigricoloratus: Distribuzione italiana da precisare.
Opius phytobiae: Distribuzione italiana da precisare.
Opius propodealis: Distribuzione italiana da precisare.
Opius spretus: Distribuzione italiana da precisare.
Opius tirolensis: Distribuzione italiana da precisare.
Opius trisulcus: Distribuzione italiana da precisare.
Eurytenus abnormis: Distribuzione italiana da precisare.
Alysia (Alysia) cingulata: Distribuzione italiana da precisare.
Alysia (Alysia) lucidula: Posizione sistematica non chiara. Distribuzione italiana da precisare.
Alysia (Alysia) mandibulator: Distribuzione italiana da precisare.
Alysia (Alysia) manducator: Distribuzione italiana da precisare.
Alysia (Alysia) nitidulator: Segnalazione dubbia.
Alysia (Alysia) picta: Distribuzione italiana da precisare.
Alysia (Alysia) truncator: Distribuzione italiana da precisare.
Chasmodon apterus: Distribuzione italiana da precisare.
Dapsilarthra apii: Distribuzione italiana da precisare.
Orthostigma laticeps: Distribuzione italiana da precisare.
Phaenocarpa conspurcator: Distribuzione italiana da precisare.
Symphanes aciculata: Distribuzione italiana da precisare.
Tanycarpa gracilicornis: Distribuzione italiana da precisare.
Tanycarpa rufinotata: Distribuzione italiana da precisare.
Chorebus alecto: Distribuzione italiana da precisare.
Chorebus dagda: Distribuzione italiana da precisare.
Chorebus incertus: Distribuzione italiana da precisare.
Chorebus lateralis: Distribuzione italiana da precisare.
Chorebus limnicola: Distribuzione italiana da precisare.
Chorebus punctus: Distribuzione italiana da precisare.
Chorebus rufipes: Distribuzione italiana da precisare.
Chorebus tamiris: Distribuzione italiana da precisare.
Coelinus festus: Distribuzione italiana da precisare.
Dacnusa brevistigma: Distribuzione italiana da precisare.
Dacnusa gallarum: Distribuzione italiana da precisare.
Dacnusa maculata: Distribuzione italiana da precisare.
Exotela gilvipes: Distribuzione italiana da precisare.
Polemochartus melas: Distribuzione italiana da precisare.
Ichneutes brevis: Distribuzione italiana da precisare.
Ichneutes levis: Distribuzione italiana da precisare.
Ichneutes reunitor: Distribuzione italiana da precisare.
Aspigonus diversicornis: Distribuzione italiana da precisare.
Helcon angustator: Distribuzione italiana da precisare.
Helconidea ruspator: Distribuzione italiana da precisare.
Taphaeus affinis: Distribuzione italiana da precisare.
Triaspis brucivorus: Distribuzione italiana da precisare.
Triaspis complanellae: Distribuzione italiana da precisare.
Triaspis flavipalpis: Distribuzione italiana da precisare.

Triaspis floricola: Distribuzione italiana da precisare.
Triaspis pallipes: Distribuzione italiana da precisare.
Triaspis sculpturatus: Distribuzione italiana da precisare.
Triaspis striatulus: Distribuzione italiana da precisare.
Triaspis tenthredinum: Distribuzione italiana da precisare.
Eubazus curculionum: Distribuzione italiana da precisare.
Eubazus destitutus: Distribuzione italiana da precisare.
Eubazus flavipes: Distribuzione italiana da precisare.
Eubazus interstitialis: Distribuzione italiana da precisare.
Eubazus longicaudis: Distribuzione italiana da precisare.
Eubazus politus: Distribuzione italiana da precisare.
Eubazus semirugosus: Distribuzione italiana da precisare.
Blacus (Blacus) brachialis: Posizione sistematica non chiara.
Blacus (Blacus) florus: Posizione sistematica non chiara. Distribuzione italiana da precisare.
Blacus (Blacus) fuscipes: Posizione sistematica non chiara. Distribuzione italiana da precisare.
Leiophron pallidistigma: Distribuzione italiana da precisare.
Leiophron pallipes: Distribuzione italiana da precisare.
Leiophron tuberculifer: Distribuzione italiana da precisare.
Cosmophorus klugii: Distribuzione italiana da precisare.
Meteorus abdominator: Distribuzione italiana da precisare.
Meteorus cespitator: Distribuzione italiana da precisare.
Meteorus colon: Distribuzione italiana da precisare.
Meteorus dejeanus: Distribuzione italiana da precisare.
Meteorus flaviceps: Distribuzione italiana da precisare.
Meteorus obfuscatus: Distribuzione italiana da precisare.
Meteorus tabidus: Distribuzione italiana da precisare.
Wesmaelia pendula: Distribuzione italiana da precisare.
Acampsis alternipes: Distribuzione italiana da precisare.
Lestricus secalis: Distribuzione italiana da precisare.
Agathis varipes: Distribuzione italiana da precisare.
Macrocentrus ancylivorus: Specie introdotta in Italia, pare senza successo, da Grandi (1933 - Italia agric., 70: 1077) per combattere il Lepidottero Tortricide Laspeyresia molesta Busck.
Hymenochaonia delicata: Specie introdotta, in Italia, pare senza successo da Grandi (1933 - Italia agric., 70: 1077) per combattere il Lepidottero Tortricide Laspeyresia molesta Busck.
Microtypus wesmaelii: Distribuzione italiana da precisare.
Ascogaster rufidens: Distribuzione italiana da precisare.
Ascogaster similis: Posizione sistematica non chiara.
Chelonus bonellii: Distribuzione italiana da precisare.
Chelonus gravenhorstii: Distribuzione italiana da precisare.
Chelonus nigrinus: Distribuzione italiana da precisare.
Chelonus pulchricornis: Distribuzione italiana da precisare.
Microchelonus rimulosus: Distribuzione italiana da precisare.
Microchelonus risorius: Distribuzione italiana da precisare.
Phanerotoma diversa: Distribuzione italiana da precisare.
Apanteles hemara: Distribuzione italiana da precisare.
Apanteles pelopea: Distribuzione italiana da precisare.
Apanteles picipes: Distribuzione italiana da precisare.

Cotesia ancilla: Distribuzione italiana da precisare.
Cotesia ofella: Distribuzione italiana da precisare.
Cotesia ordinaria: Distribuzione italiana da precisare.
Cotesia scabriculus: Distribuzione italiana da precisare.
Deuterixys carbonaria: Distribuzione italiana da precisare.
Dolichogenidea annularis: Distribuzione italiana da precisare.
Dolichogenidea benevolens: Distribuzione italiana da precisare.
Dolichogenidea breviventris: Distribuzione italiana da precisare.
Dolichogenidea dilecta: Distribuzione italiana da precisare.
Dolichogenidea ensiformis: Distribuzione italiana da precisare.
Dolichogenidea evonymellae: Distribuzione italiana da precisare.
Dolichogenidea gagates: Distribuzione italiana da precisare.
Glyptapanteles liparidis: Distribuzione italiana da precisare.
Glyptapanteles octonarius: Distribuzione italiana da precisare.
Glyptapanteles pallipes: Distribuzione italiana da precisare.
Iconella lacteoides: Distribuzione italiana da precisare.
Illidops sophrosine: Distribuzione italiana da precisare.
Lissogaster opheltes: Distribuzione italiana da precisare.
Lissogaster rugulosus: Distribuzione italiana da precisare.
Microgaster decens: Distribuzione italiana da precisare.
Microgaster ratzeburgii: Distribuzione italiana da precisare.
Microgaster spinolae: Distribuzione italiana da precisare.
Microgaster stigmatica: Posizione sistematica non chiara. Distribuzione italiana da precisare.
Microgaster tuberculata: Distribuzione italiana da precisare.
Protomicroplitis meges: Distribuzione italiana da precisare.
Rasivalva calceata: Distribuzione italiana da precisare.

Ibaliidae

Ibalia Latreille, 1802

Ibalia leucospoides (Hochenwarth, 1785) (N)
Ibalia rufipes Cresson, 1879
Ibalia rufipes drewseni Borries, 1891 (N)

Eucoilidae

Eucoila Westwood, 1835

Eucoila ciliaris (Zetterstedt, 1838) (N)
Eucoila circularis (Kieffer, 1901) (N)
Eucoila cubitalis (Hartig, 1841) (Si)
Eucoila insignis Giraud, 1860 (N)
Eucoila maculata (Hartig, 1840) (N)
Eucoila subnebulosa Giraud, 1860 (N)
Eucoila trichospila (Hartig, 1841) (N, Si)

Rhoptromeris Foerster, 1869

Rhoptromeris parvula (Thomson, 1861) (N)

Figitidae

Aspicera Dahlbom, 1842

Aspicera scutellata (Villers, 1789) (N, Si)

Aspicera tenuispina Kieffer, 1904 (N)

Callaspidia Dahlbom, 1842

Callaspidia areolata (Kieffer, 1901) (N)

Callaspidia brevifurca Kieffer, 1901 (N, S)

Callaspidia dufouri Giraud, 1860 (N, S)

Omalaspis Giraud, 1860

Omalaspis carinata Kieffer, 1901 (*)

Aegilips Walker, 1835

Aegilips nigricollis De Stefani, 1894 (Si)

Aegilips nitidula (Dalman, 1833) (N, Si)

Anacharis Dalman, 1823

Anacharis eucharoides (Dalman, 1818) (N)

Figites Latreille, 1802

Figites agnatus Masi, 1933 (S)

Figites nitens Hartig, 1843 (N)

Figites scutellaris (Rossi, 1794) (N, S)

Melanips Walker, 1835

Melanips opacus (Hartig, 1840) (Si)

Note

Omalaspis carinata: Specie segnalata per l'Italia da fonte attendibile, ma senza precisazione di località.

Cynipidae

Alloxysta Foerster, 1869

Alloxysta victrix (Westwood, 1833) (N)

Dilyta Foerster, 1869

Dilyta aphidicida (Rondani, 1848) (*)

Dilyta musti (Rondani, 1875) (*)

Andricus Hartig, 1840

Andricus adleri Mayr, 1880 (N)

Andricus aestivalis Giraud, 1859 (N)

Andricus albopunctatus (Schlechtendal, 1870) (Si)

Andricus beyerincki Trotter, 1899 (N)

Andricus burgundus Giraud, 1859 (Si)

Andricus caputmedusae (Hartig, 1843) (N)

Andricus cecconii Kieffer, 1901 (S)

Andricus circulans Mayr, 1870 (Si)

Andricus conglomeratus (Giraud, 1859) (N, Si)

Andricus conificus (Hartig, 1843) (N)

Andricus coriaceus Mayr, 1882 (Si)

Andricus coriarius (Hartig, 1843) (N, Si)

Andricus coronatus (Giraud, 1859) (N, Si)

Andricus corruptrix (Schlechtendal, 1870) (*)

Andricus crispator Tschek, 1871 (Si)

Andricus curator Hartig, 1840 (N, Si)

Andricus cydoniae Giraud, 1859 (N, Si)

Andricus dentimitratus (Balas, 1940) (*)

Andricus fecundator (Hartig, 1840) (N, Si)

Andricus galeatus (Giraud, 1859) (N, Si)

Andricus gallaeurnaeformis (Fonscolombe, 1832) (N)

Andricus gemmea (Giraud, 1859) (Si)

Andricus giardina De Stefani, 1897 (Si)

Andricus giraudi Wachtl, 1882 (N)

Andricus giraudianus Dalla Torre & Kieffer, 1910 (*)

Andricus glandium Giraud, 1859 (Si)

Andricus grossulariae Giraud, 1859 (N, Si)

Andricus hartigi (Hartig, 1843) (N, Si)

Andricus hystrix Trotter, 1897 (N)

Andricus infectorius (Hartig, 1843) (N)

Andricus inflator Hartig, 1840 (N, Si)

Andricus kollari (Hartig, 1843) (N, Si)

Andricus lignicola (Hartig, 1840) (N, Si)

Andricus longispina (Kieffer, 1900)

Andricus lucidus (Hartig, 1843)
 Andricus lucidus lucidus (Hartig, 1843) (N, Si)
 Andricus lucidus erinaceus Kieffer, 1900 (N)
Andricus luteicornis Kieffer, 1899 (Si)
Andricus mayri (Wachtl, 1879) (N, Si)
Andricus multiplicatus Giraud, 1859 (N, Si)
Andricus nudus Adler, 1881 (N)
Andricus ostrea (Hartig, 1840) (N, Si)
Andricus panteli Kieffer, 1896
 Andricus panteli fructum Trotter, 1899 (N)
Andricus polycerus (Giraud, 1859) (N, Si)
Andricus pseudococcus Kieffer, 1897 (Si)
Andricus pseudoinflator Tavares, 1901 (Si)
Andricus quercuscalicis (Burgsdorf, 1783) (N, S, Si)
Andricus quercusradicis (Fabricius, 1798) (Si)
Andricus quercusramuli (Linnaeus, 1761) (N)
Andricus quercustozae (Bosc, 1792) (N, S)
Andricus rhizomae (Hartig, 1843) (Si)
Andricus solitarius (Fonscolombe, 1832) (N, Si)
Andricus stefanii (Kieffer, 1897) (N, Si)
Andricus subterranea (Giraud, 1859) (Si)
Andricus testaceipes Hartig, 1840 (Si)
Andricus theophrastea (Trotter, 1902) (S, Si, Sa)
Andricus transversa (Kieffer, 1900) (Si)
Andricus trilineatus Hartig, 1840 (N, Si)
Andricus trinacriae (De Stefani, 1906) (Si)
Andricus trotteri Kieffer, 1898 (N)
Andricus truncicola (Giraud, 1859) (N)
Andricus zapellai Kieffer, 1901 (S)

Aphelonyx Mayr, 1881

Aphelonyx cerricola (Giraud, 1859) (N)

Aulacidea Ashmead, 1897

Aulacidea hieracii (Bouché, 1834) (N)

Aylax Hartig, 1840

Aylax hypochoeridis (Kieffer, 1887) (N, S, Si)
 Aylax latreillei (Kieffer, 1898) (N)
 Aylax minor Hartig, 1840 (N)
 Aylax picridis (Kruch, 1891) (*)
 Aylax rogenhoferi (Wachtl, 1880) (N)
 Aylax salviae (Giraud, 1859) (N)

Biorhiza Westwood, 1840

Biorhiza cecconiana (Kieffer, 1901) (N)
Biorhiza pallida (Olivier, 1791) (N, Si)

Callirhytis Foerster, 1869

Callirhytis glandium (Giraud, 1859) (Si)

Chilaspis Mayr, 1881

Chilaspis nitida (Giraud, 1859) (N)

Cynips Linnaeus, 1758

Cynips ambigua Trotter, 1899 (N)
Cynips amblycera Giraud, 1859 (N, Si)
Cynips argentea Hartig, 1843 (N, Si)
Cynips aries Giraud, 1859 (*)
Cynips bombycida Rondani, 1877 (*)
Cynips caliciformis Giraud, 1859 (N, Si)
Cynips cornifex (Hartig, 1843) (N)
Cynips disticha Hartig, 1840 (N)
Cynips divisa Hartig, 1840 (N, Si)
Cynips flosculi (Giraud, 1868) (N, Si)
Cynips gallaetinctoriae (Olivier, 1791) (N, Si)
Cynips glutinosa Giraud, 1859 (N, Si)
Cynips gracilicornis Kieffer, 1901 (S)
Cynips insana Westwood, 1837 (S)
Cynips kiefferi Cabrera, 1897 (Si)
Cynips korlevici Kieffer, 1902 (N)
Cynips longiventris Hartig, 1840 (*)
Cynips mediterranea Trotter, 1901 (S)
Cynips mitrata Mayr, 1870 (N)
Cynips pubescentis (Mayr, 1881) (N, Si)
Cynips quercus (Geoffroy, 1785) (N, Si)
Cynips quercusfolii Linnaeus, 1758 (N)
Cynips tergestensis Kieffer, 1905 (N)

Diastrophus Hartig, 1840

Diastrophus rubi (Bouché, 1834) (N)

Diplolepis Geoffroy, 1762

Diplolepis eglanteriae (Hartig, 1840) (N, S, Si)
Diplolepis mayri (Schlechtendal, 1877) (N)
Diplolepis rosae (Linnaeus, 1758) (N, Si)
Diplolepis rosarum (Giraud, 1859) (N)

Diplolepis spinosissimae (Giraud, 1859) (N)

Dryocosmus Giraud, 1859

Dryocosmus australis Mayr, 1882 (N, S)

Dryocosmus cerriphilus Giraud, 1859 (N, S)

Fioriella Kieffer, 1903

Fioriella marianii Kieffer, 1903 (S)

Liebelia Kieffer, 1903

Liebelia cavarai Kieffer, 1903 (Sa)

Liposthenes Foerster, 1869

Liposthenes glechomae (Linnaeus, 1758) (N)

Neuroterus Hartig, 1840

Neuroterus aggregatus (Wachtl, 1880) (N)

Neuroterus albipes (Schenck, 1863)

Neuroterus albipes albipes (Schenck, 1863) (N)

Neuroterus albipes reflexus Kieffer, 1900 (N)

Neuroterus aprilinus (Giraud, 1859) (N)

Neuroterus glandiformis (Giraud, 1859) (*)

Neuroterus lanuginosus Giraud, 1859 (Si)

Neuroterus macropterus (Hartig, 1843) (N)

Neuroterus minutulus Giraud, 1859 (N)

Neuroterus numismalis (Geoffroy, 1785) (N, Si)

Neuroterus quercusbaccarum (Linnaeus, 1758) (N, Si)

Neuroterus saliens (Kollar, 1857) (N, Si)

Neuroterus tricolor (Hartig, 1841) (N)

Pediaspis Tischbein, 1852

Pediaspis pseudoplatani (Mayer, 1779) (N)

Phanacis Foerster, 1860

Phanacis helminthiae (De Stefani, 1902) (Si)

Phanacis hypochoeridis (Kieffer, 1887) (S, Si)

Phanacis sonchi (De Stefani, 1900) (Si)

Phanacis urospermi (Kieffer, 1901) (S)

Plagiotrochus Mayr, 1881

Plagiotrochus kiefferianus Tavares, 1901 (*)
Plagiotrochus quercusilicis (Fabricius, 1798) (S)

Trigonaspis Hartig, 1840

Trigonaspis megaptera (Panzer, 1801) (N, Si)
Trigonaspis synaspis (Hartig, 1841) (N)

Xestophanes Foerster, 1869

Xestophanes potentillae (Retzius, 1783) (N)

Ceroptres Hartig, 1840

Ceroptres arator Hartig, 1841 (N)
Ceroptres cerri Mayr, 1872 (N, Si)

Periclistus Foerster, 1869

Periclistus brandtii (Ratzeburg, 1832) (N)

Saphonecrus Dalla Torre & Kieffer, 1910

Saphonecrus connatus (Hartig, 1840) (N)

Synergus Hartig, 1840

Synergus albipes Hartig, 1841 (N)
Synergus erythrostomus Hartig, 1841 (Si)
Synergus evanescens Mayr, 1872 (Si)
Synergus facialis Hartig, 1840 (Si)
Synergus flavipes Hartig, 1843 (N)
Synergus gallaepomiformis (Fonscolombe, 1832) (N, S, Si)
Synergus hayneanus Hartig, 1841 (N, Si)
Synergus nervosus Hartig, 1840 (N, Si)
Synergus orientalis Hartig, 1841 (N, Si)
Synergus pallicornis Hartig, 1841 (N, Si)
Synergus physoceras Hartig, 1843 (N)
Synergus reinhardi Mayr, 1872 (N, Si)
Synergus thaumacerus (Dalman, 1823) (*)
Synergus umbraculus (Olivier, 1791) (N, Si)
Synergus undulatus (Mayr, 1872) (N)
Synergus variabilis Mayr, 1872 (N, Si)

Synophrus Hartig, 1843

Synophrus politus Hartig, 1843 (N, Si)

Note

Dilyta aphidicida: Specie segnalata per l'Italia da fonte attendibile, ma senza precisazione di località.

Dilyta musti: Specie segnalata per l'Italia da fonte attendibile, ma senza precisazione di località.

Andricus corruptrix: Specie segnalata per l'Italia da fonte attendibile, ma senza precisazione di località.

Andricus dentimitratus: Specie segnalata per l'Italia da fonte attendibile, ma senza precisazione di località.

Andricus giraudianus: Specie segnalata per l'Italia da fonte attendibile, ma senza precisazione di località.

Aylax picridis: Specie segnalata per l'Italia da fonte attendibile, ma senza precisazione di località.

Cynips aries: Specie segnalata per l'Italia da fonte attendibile, ma senza precisazione di località.

Cynips bombycida: Specie segnalata per l'Italia da fonte attendibile, ma senza precisazione di località.

Cynips longiventris: Specie segnalata per l'Italia da fonte attendibile, ma senza precisazione di località.

Neuroterus glandiformis: Specie segnalata per l'Italia da fonte attendibile, ma senza precisazione di località.

Plagiotrochus kiefferianus: Specie segnalata per l'Italia da fonte attendibile, ma senza precisazione di località.

Synergus thaumacerus: Specie segnalata per l'Italia da fonte attendibile, ma senza precisazione di località.

Chalcididae

Dirhinus Dalman, 1818

Dirhinus hesperidum (Rossi, 1790) (N, S, Si, Sa)

Chalcis Fabricius, 1787

Chalcis biguttata (Spinola, 1808) (N, S, Si, Sa)

Chalcis sispes (Linnaeus, 1761) (N, S, Si)

Chalcis strigulosa A. Costa, 1882 (S)

Spilochalcis Thomson, 1876

Spilochalcis xanthostigma (Dalman, 1820) (N)

Brachymeria Westwood, 1829

Brachymeria coloradensis (Cresson, 1872) (S, Si)

Brachymeria femorata (Panzer, 1801) (N, S, Si, Sa)

Brachymeria flavipes (Panzer, 1793) (N, S, Si)
Brachymeria gribodiana Masi, 1950 (N)
Brachymeria inermis (Fonscolombe, 1840)
 Brachymeria inermis inermis (Fonscolombe, 1840) (N, S)
 Brachymeria inermis carbonaria Masi, 1950 (N)
Brachymeria intermedia (Nees, 1834) (N, S, Sa)
Brachymeria minuta (Linnaeus, 1767) (N, S, Si, Sa)
Brachymeria moerens (Ruschka, 1922) (N)
Brachymeria podagrica (Fabricius, 1787) (N, S, Si)
Brachymeria rugulosa (Foerster, 1859) (N, S)
Brachymeria secundaria (Ruschka, 1922) (N, S)
Brachymeria vicina (Walker, 1834) (N, S, Si)
Brachymeria vitripennis (Foerster, 1859) (S)

Phasgonophora Westwood, 1832

Phasgonophora conica (Fabricius, 1775) (S)

Belaspidia Masi, 1916

Belaspidia obscura Masi, 1916 (N)

Chirocera Latreille, 1827

Chirocera pectinicornis (Latreille, 1809) (N, Si, Sa)

Haltichella Spinola, 1811

Haltichella rufipes (Olivier, 1790) (N, S, Si)

Hockeria Walker, 1834

Hockeria bifasciata Walker, 1834 (N, S, Si)
Hockeria hockerioides (Boucek, 1952) (N, S)
Hockeria magna Boucek, 1951 (N)
Hockeria singularis Boucek, 1951 (Si)
Hockeria susterae Boucek, 1951 (N)
Hockeria unicolor Walker, 1834 (N, S)

Invreia Masi, 1927

Invreia benoisti (Steffan, 1948) (N)
Invreia festiva Steffan, 1962 (S)
Invreia frequens Masi, 1927 (N, S)
Invreia ligustica Masi, 1927 (N)
Invreia nigerrima Masi, 1927 (N, S)
Invreia nigripes (Fonscolombe, 1832) (N, S)
Invreia subaenea Masi, 1927 (N)

Invreia subarmata (Foerster, 1856) (S)

Lasiochalcidia Masi, 1927

Lasiochalcidia cincticornis (Walker, 1871) (S, Sa)

Lasiochalcidia dargelasii (Latreille, 1805) (N, S, Si)

Neochalcis Kirby, 1883

Neochalcis fertoni (Kieffer, 1899) (N, S)

Neochalcis hippotoides (Masi, 1916) (S)

Neochalcis osmicida (Saunders, 1873) (S)

Neophasgonophora Masi, 1942

Neophasgonophora bidens (Foerster, 1855) (*)

Note

Neophasgonophora bidens: Specie citata per l'Italia da fonte attendibile, ma senza precisazione di località.

Torymidae

Megastigmus Dalman, 1820

Megastigmus aculeatus (Swederus, 1795) (N, Si)

Megastigmus bipunctatus (Swederus, 1795) (N)

Megastigmus dorsalis (Fabricius, 1798) (S, Si)

Megastigmus pistaciae Walker, 1871 (N, S, Si, Sa)

Megastigmus stigmatizans (Fabricius, 1798) (N, S, Si)

Antistrophoplex Crawford, 1914

Antistrophoplex cothurnata (Masi, 1921) (N, S, Si)

Exopristus Ruschka, 1923

Exopristus trigonomerus (Masi, 1916) (N, S)

Glyphomerus Foerster, 1856

Glyphomerus stigma (Fabricius, 1793) (N, S)

Liodontomerus Gahan, 1914

Liodontomerus gregarius (Masi, 1943) (*)

Liodontomerus mayri (Wachtl, 1883) (N)
Liodontomerus papaveris (Foerster, 1856) (N, Si)
Liodontomerus regillus Steffan, 1962 (Si)
Liodontomerus terebrator (Masi, 1916) (N)

Melittotorymus Steffan, 1964

Melittotorymus gregalis Steffan, 1964 (Sa)

Monodontomerus Westwood, 1833

Monodontomerus aereus Walker, 1834 (N, S, Si, Sa)
Monodontomerus dentipes (Dalman, 1820) (Si)
Monodontomerus minor (Ratzeburg, 1848) (N)
Monodontomerus obscurus Westwood, 1833 (N, S, Si, Sa)
Monodontomerus obsoletus (Fabricius, 1798) (N, S, Si)
Monodontomerus strobili Mayr, 1874 (S)
Monodontomerus usticensis Riggio & De Stefani, 1888 (Si)
Monodontomerus vicicellae (Walker, 1847) (N)

Pseudotorymus Masi, 1922

Pseudotorymus apionis (Mayr, 1874) (N, S)
Pseudotorymus medicaginis (Mayr, 1874) (S)
Pseudotorymus papaveris (Thomson, 1876) (N, S)

Torymoides Walker, 1871

Torymoides dispar (Masi, 1916) (N, S)
Torymoides kiesenwetteri (Mayr, 1874) (N, S, Si)

Podagrion Spinola, 1811

Podagrion splendens Spinola, 1811 (N, S, Si)

Spalangia Latreille, 1805

Spalangia fuscipes Nees, 1834 (N)
Spalangia nigra Latreille, 1805 (N)

Diomorus Walker, 1834

Diomorus armatus (Boheman, 1834) (N, Si)
Diomorus calcaratus (Nees, 1834) (N)
Diomorus cupreus (Spinola, 1808) (N, S, Si)
Diomorus violaceus Kieffer, 1898 (Si)

Torymus Dalman, 1820

Torymus auratus (Geoffroy, 1785) (N, S, Si)
Torymus azureus Boheman, 1834 (N)
Torymus bedeguaris (Linnaeus, 1758) (N, S)
Torymus brachyurus Boheman, 1834 (N)
Torymus chloromerus (Walker, 1833) (N, S, Si)
Torymus cultriventris Ratzeburg, 1844 (S)
Torymus cyaneus Walker, 1847 (Si)
Torymus erucarum (Schrank, 1780) (N, S)
Torymus formosus (Walker, 1833) (N)
Torymus geranii (Walker, 1833) (N)
Torymus glechomae Mayr, 1874 (N)
Torymus heyeri Wachtl, 1883 (N)
Torymus impar Rondani, 1877 (N)
Torymus microstigma (Walker, 1833) (N, S)
Torymus nitens (Walker, 1833) (N, S, Si)
Torymus nobilis Boheman, 1834 (N)
Torymus phillyreae Ruschka, 1921 (N, S, Sa)
Torymus rubi (Schrank, 1781) (N, S)
Torymus ventralis (Fonscolombe, 1832) (N)

Note

Liodontomerus gregarius: Specie citata per l'Italia da fonte attendibile, ma senza precisazione di località.

Leucospididae

Leucospis Fabricius, 1775

Leucospis bifasciata Klug, 1814 (N, S, Si)
Leucospis biguetina Jurine, 1807 (N, S, Si)
Leucospis brevicauda Fabricius, 1804 (Si, Sa)
Leucospis dorsigera Fabricius, 1775 (N, S, Si, Sa)
Leucospis gigas Fabricius, 1793 (N, S, Si, Sa)
Leucospis intermedia Illiger, 1807 (N, S, Si, Sa)
Leucospis miniata Klug, 1834 (Si)

Perilampidae

Afroperilampus Risbec, 1956

Afroperilampus eximius (Masi, 1932) (N)

Fifirtiz Argaman, 1990

Fifirtiz minutalis (Steffan, 1952) (N, S)
Fifirtiz neglectus (Boucek, 1956) (N)

Ihrambek Argaman, 1990

Ihrambek chrysonotus (Foerster, 1859) (S)

Mivarhis Argaman, 1990

Mivarhis emarginatus (Thomson, 1875) (N)
Mivarhis lacunosus (Nikolskaja, 1952) (N, S)
Mivarhis laevifrons (Dalman, 1822) (N, S, Si)

Olarlar Argaman, 1990

Olarlar aeneus (Rossi, 1790) (N, S, Sa)
Olarlar italicus (Fabricius, 1804) (N, S)
Olarlar splendidus (Dalman, 1822) (N, S)

Perilampus Latreille, 1809

Perilampus cyaneus (Fabricius, 1798) (*)
Perilampus nitens Walker, 1834 (N)
Perilampus ruficornis (Fabricius, 1793) (S)
Perilampus violaceus (Panzer, 1804) (N, S, Si)

Pondoros Argaman, 1991

Pondoros tristis (Mayr, 1905) (N, S, Si)

Vaktaris Argaman, 1990

Vaktaris auratus (Panzer, 1798) (N, S, Si)

Note

Perilampus cyaneus: Specie citata per l'Italia da fonte attendibile, ma senza precisazione di località.

Tetracampidae

Platynochailus Westwood, 1837

Platynochailus cuprifrons (Nees, 1834) (Si)

Epiclerus Haliday, 1844

Epiclerus nomocera (Masi, 1934) (N)
Epiclerus panyas (Walker, 1839) (N)
Epiclerus temenus (Walker, 1839) (N)

Foersterella Dalla Torre, 1897

Foersterella erdoesi Boucek, 1958 (N)
Foersterella flavipes (Foerster, 1878) (N)

Eurytomidae

Eurytoma Illiger, 1807

Eurytoma aciculata Ratzeburg, 1848 (N)
Eurytoma aethiops Boheman, 1836 (N, S, Si)
Eurytoma aloisifilippi (Russo, 1939) (S, Si)
Eurytoma ampelodesmae Viggiani, 1967 (S)
Eurytoma appendigaster Swederus, 1795 (Si)
Eurytoma arctica Thomson, 1876 (Si)
Eurytoma atra (Walker, 1832) (N, Si)
Eurytoma atratula Dalla Torre, 1898 (Si)
Eurytoma brunniventris Ratzeburg, 1852 (N, S)
Eurytoma coluteae (Boucek, 1955) (N)
Eurytoma curculionum Mayr, 1878 (N, S)
Eurytoma curta Walker, 1832 (N, Si)
Eurytoma dentata Mayr, 1878 (N, S)
Eurytoma goidanichi Boucek, 1970 (N)
Eurytoma gyoerfii Erdős, 1957 (S)
Eurytoma juncea Rondani, 1880 (N)
Eurytoma laserpitii Mayr, 1878 (N)
Eurytoma martellii Domenichini, 1960 (N, S, Si)
Eurytoma mayri Ashmead, 1887 (N)
Eurytoma morio Boheman, 1836 (N, S, Si)
Eurytoma nigrita Boheman, 1835 (N)
Eurytoma nodularis Boheman, 1836 (N, S, Si, Sa)
Eurytoma obscura Boheman, 1835 (Si)
Eurytoma ononis Mayr, 1878 (N)
Eurytoma oophaga Silvestri, 1920 (S)
Eurytoma phanacidis Mayr, 1878 (N, S)
Eurytoma pistaciae Rondani, 1877 (N, Si)
Eurytoma platyptera (Walker, 1834) (N)
Eurytoma pulchella (De Stefani, 1897) (Si)
Eurytoma robusta Mayr, 1878 (N)
Eurytoma rosae Nees, 1834 (N, S, Si)
Eurytoma rubicola Giraud, 1866 (*)
Eurytoma rufipes Walker, 1832 (N)
Eurytoma salicis Walker, 1834 (N, Si)

Eurytoma steffani Claridge, 1959 (N)
Eurytoma strigifrons Thomson, 1876 (N, S, Si)
Eurytoma terebinthi Rondani, 1877 (N)
Eurytoma tibialis Boheman, 1836 (N)
Eurytoma tilicola Hedqvist, 1966 (N)
Eurytoma verticillata (Fabricius, 1798) (N, S, Si)
Eurytoma wachtli Mayr, 1878 (S)

Systole Walker, 1832

Systole albipennis Walker, 1832 (N, S)
Systole conspicua Erdös, 1951 (N)

Buresium Boucek, 1970

Buresium rufum Boucek, 1970 (S)

Sycophila Walker, 1871

Sycophila biguttata (Swederus, 1795) (N, S, Si)
Sycophila mellea (Curtis, 1831) (N, Si)
Sycophila stagnalis (Erdös, 1947) (N)
Sycophila submutica (Thomson, 1876) (N)

Tetramesa Walker, 1848

Tetramesa angustipennis (Walker, 1832) (Si)
Tetramesa brachypodii (Schlechtendal, 1891) (N)
Tetramesa fulvicollis (Walker, 1832) (N)
Tetramesa giraudi (Schlechtendal, 1891) (N)
Tetramesa hyalipennis (Walker, 1832) (N)
Tetramesa insolita (Walker, 1873) (*)
Tetramesa linearis (Walker, 1832) (N)
Tetramesa luteicollis (Walker, 1873) (N)
Tetramesa maderae (Walker, 1849) (S)
Tetramesa petiolata (Walker, 1832) (Si)
Tetramesa romana (Walker, 1873) (N, S)
Tetramesa russoi Viggiani, 1966 (S)
Tetramesa semilutea (Walker, 1873) (N)
Tetramesa stipae (De Stefani, 1902) (Si)
Tetramesa tritici (Fitch, 1859) (Si)

Archirileya Silvestri, 1920

Archirileya inopinata Silvestri, 1920 (S)

Note

Eurytoma rubicola: Specie citata per l'Italia da fonte attendibile, ma senza precisazione di località.

Tetramesa insolita: Specie descritta dell'Italia, senza precisazione di località.

Pteromalidae

***Asaphes* Walker, 1834**

Asaphes suspensus (Nees, 1834) (N)

Asaphes vulgaris Walker, 1834 (N, S, Si)

***Hyperimerus* Girault, 1917**

Hyperimerus pusillus (Walker, 1833) (N)

***Cea* Walker, 1837**

Cea pulicaris Walker, 1837 (N)

***Cerocephala* Westwood, 1832**

Cerocephala cornigera Westwood, 1832 (S, Si)

***Choetospila* Westwood, 1874**

Choetospila elegans Westwood, 1874 (N)

***Theocolax* Westwood, 1832**

Theocolax formiciformis Westwood, 1832 (N)

***Chrysolampus* Spinola, 1811**

Chrysolampus splendidulus (Spinola, 1811) (N, S)

Chrysolampus thenae (Walker, 1848) (N, Si)

***Cleonymus* Latreille, 1809**

Cleonymus brevis Boucek, 1972 (S)

Cleonymus depressus (Fabricius, 1798) (N, Si, Sa)

Cleonymus obscurus Walker, 1837 (N)

***Heydenia* Foerster, 1856**

Heydenia pretiosa Foerster, 1856 (S)

***Colotrechnus* Thomson, 1878**

Colotrechnus subcoeruleus Thomson, 1878 (N)

Dipara Walker, 1833

Dipara petiolata Walker, 1833 (N, Si)

Epicopterus Westwood, 1833

Epicopterus choreiformis Westwood, 1833 (*)

Epicopterus obscurus (Westwood, 1840) (Si)

Eunotus Walker, 1834

Eunotus cretaceus Walker, 1834 (*)

Moranila Cameron, 1883

Moranila californica (Howard, 1881) (N)

Scutellista Motschulsky, 1859

Scutellista cyanea Motschulsky, 1859 (S, Si, Sa)

Macromesus Walker, 1848

Macromesus amphiretus Walker, 1848 (S)

Ammeia Delucchi, 1962

Ammeia pulchella Delucchi, 1962 (N)

Callimerismus Graham, 1956

Callimerismus suecicus Graham, 1969 (N)

Cryptoprymna Foerster, 1856

Cryptoprymna atra (Walker, 1833) (N)

Cyrtogaster Walker, 1833

Cyrtogaster vulgaris Walker, 1833 (N)

Gastracanthus Westwood, 1833

Gastracanthus pulcherrimus Westwood, 1833 (S)

Gastrancistrus Westwood, 1833

Gastrancistrus acutus Walker, 1834 (N)
Gastrancistrus clavatus (Thomson, 1876) (N)
Gastrancistrus fuscicornis Walker, 1834 (Si)
Gastrancistrus hamillus Walker, 1848 (N)
Gastrancistrus speculifer Foerster, 1861 (N)
Gastrancistrus vagans Westwood, 1833 (N)

Glyphognathus Graham, 1956

Glyphognathus flammeus (Delucchi, 1953) (N)

Halticoptera Spinola, 1811

Halticoptera aenea (Walker, 1833) (N)
Halticoptera brevicornis Thomson, 1876 (N)
Halticoptera circulus (Walker, 1833) (N)
Halticoptera flavicornis (Spinola, 1808) (N)
Halticoptera patellana (Dalman, 1818) (N)

Lamprotatus Westwood, 1833

Lamprotatus gracilis (Foerster, 1861) (Si)
Lamprotatus pschorni Delucchi, 1953 (N)
Lamprotatus socium (Zetterstedt, 1838) (N)
Lamprotatus splendens Westwood, 1833 (S)

Macroglenes (Westwood, 1832)

Macroglenes chalybea (Haliday, 1833) (N)
Macroglenes varicornis (Haliday, 1833) (N)

Merismus Walker, 1833

Merismus megapterus Walker, 1833 (N)

Miscogaster Walker, 1833

Miscogaster elegans Walker, 1833 (N, S)
Miscogaster maculata Walker, 1833 (N)
Miscogaster rufipes Walker, 1833 (S)

Novitzkyanus Boucek, 1961

Novitzkyanus cryptogaster Boucek, 1961 (S)

Platygerrhus Thomson, 1878

Platygerrius affinis (Walker, 1836) (N, Sa)

Plutothrix Foerster, 1856

Plutothrix scenicus (Walker, 1836) (N)

Plutothrix trifasciatus Thomson, 1878 (N)

Rhcnocoelia Graham, 1956

Rhcnocoelia constans (Walker, 1836) (N)

Rhcnocoelia impar (Walker, 1833) (N)

Seladerma Walker, 1834

Seladerma alpestre (Ruschka, 1912) (N)

Seladerma geniculatum (Zetterstedt, 1838) (N)

Seladerma laetum Walker, 1834 (N)

Seladerma parviclava (Thomson, 1876) (N)

Semiotellus Westwood, 1839

Semiotellus diversus (Walker, 1834) (Si)

Semiotellus nigripes Vander Linden, 1887 (N)

Skeloceras Delucchi, 1953

Skeloceras cerebrosum Delucchi, 1955 (N)

Skeloceras socium (Zetterstedt, 1838) (N)

Sphaeripalpus Foerster, 1841

Sphaeripalpus laevis (Delucchi, 1953) (N)

Sphegigaster Spinola, 1811

Sphegigaster aculeata (Walker, 1833) (S, Si)

Sphegigaster mutica Thomson, 1878 (Si)

Sphegigaster nigricornis (Nees, 1834) (N, S)

Sphegigaster pallicornis (Spinola, 1808) (N, S)

Stictomischus Thomson, 1876

Stictomischus obscurus (Walker, 1833) (N)

Syntomopus Walker, 1833

Syntomopus incisus Thomson, 1878 (N)

Syntomopus incurvus Walker, 1833 (N)
Syntomopus oviceps Thomson, 1878 (Si)
Syntomopus pallipes Rudow, 1886 (Si)

Systasis Walker, 1834

Systasis encyrtoides Walker, 1834 (N, S)
Systasis parvula Thomson, 1876 (N)

Thinodytes Graham, 1956

Thinodytes cyzicus (Walker, 1839) (N)

Trigonoderus Westwood, 1832

Trigonoderus filatus Walker, 1836 (Si)

Anisopteromalus Ruschka, 1912

Anisopteromalus calandrae (Howard, 1881) (S)

Anogmus Foerster, 1856

Anogmus laricis Boucek, 1966 (*)
Anogmus piceae (Ruschka, 1922) (N)

Arthrolytus Thomson, 1878

Arthrolytus discoideus (Nees, 1834) (N)

Caenacis Foerster, 1856

Caenacis inflexa (Ratzeburg, 1848) (N)
Caenacis lauta (Walker, 1835) (N)

Caenocrepis Thomson, 1878

Caenocrepis arenicola (Thomson, 1878) (N)

Callitula Spinola, 1811

Callitula bicolor Spinola, 1811 (N)

Capellia Delucchi, 1958

Capellia cecidomyiae (Ratzeburg, 1844) (N)
Capellia orneus (Walker, 1839) (N)

Catolaccus Thomson, 1878

Catolaccus ater (Ratzeburg, 1852) (N, S)

Cecidostiba Thomson, 1878

Cecidostiba hilaris (Walker, 1836) (N)

Cecidostiba semifascia (Walker, 1835) (N)

Cheiropachus Westwood, 1828

Cheiropachus quadrum (Fabricius, 1787) (N, S, Si)

Coelopisthia Foerster, 1856

Coelopisthia extenta (Walker, 1835) (N)

Conomorium Masi, 1924

Conomorium patulum (Walker, 1835) (N, S)

Coruna Walker, 1833

Coruna clavata Walker, 1833 (N)

Cratomus Dalman, 1820

Cratomus megacephalus (Fabricius, 1793) (Si)

Cyclogastrella Bukovskij, 1938

Cyclogastrella clypealis Boucek, 1965 (N)

Cyclogastrella deplanata (Nees, 1834) (N)

Cyrtoptyx Delucchi, 1956

Cyrtoptyx latipes (Rondani, 1877) (N, S, Si)

Cyrtoptyx robustus (Masi, 1907) (N, S)

Dibrachys Foerster, 1856

Dibrachys affinis Masi, 1907 (N, S)

Dibrachys boarmiae (Walker, 1863) (N)

Dibrachys braconidis (Ferrière & Faure, 1925) (*)

Dibrachys cavus (Walker, 1835) (N, S, Si, Sa)

Dibrachys hians Boucek, 1965 (N, S)

Diglochis Foerster, 1856

Diglochis sylvicola (Walker, 1835) (Si)

Dinarmus Thomson, 1878

Dinarmus acutus Thomson, 1878 (N, S)

Dinotiscus Ghesquière, 1946

Dinotiscus aponius (Walker, 1848) (N)

Dinotiscus eupterus (Walker, 1836) (N)

Dinotiscus wichmanni Boucek, 1967 (N)

Dinotoides Boucek, 1957

Dinotoides tenebricus (Walker, 1834) (Sa)

Eulonchetron Graham, 1966

Eulonchetron giraulti (Peck, 1951) (N)

Eumacepolus Graham, 1957

Eumacepolus grahami Rosen, 1960 (S)

Euneura Walker, 1844

Euneura augarus Walker, 1844 (N)

Euneura lachni (Ashmead, 1887) (N)

Goidanichium Boucek, 1970

Goidanichium atrum Boucek, 1970 (N)

Gugolzia Delucchi & Steffan, 1956

Gugolzia harmolitae Delucchi & Steffan, 1956 (N, S)

Hemitrichus Thomson, 1878

Hemitrichus seniculus (Nees, 1834) (N)

Hobbya Delucchi, 1957

Hobbya stenotata (Ratzeburg, 1848) (N)

Homoporus Thomson, 1878

Homoporus apharetus (Walker, 1839) (N)
Homoporus febriculosus (Girault, 1917) (*)
Homoporus fulviventris (Walker, 1835) (N)
Homoporus laeviusculus Erdös, 1953 (N)
Homoporus luniger (Nees, 1834) (N, Sa)
Homoporus pulchripes Erdös, 1953 (N)
Homoporus sashegyensis Erdös, 1953 (N)
Homoporus semiluteus (Walker, 1872) (N)
Homoporus subniger (Walker, 1835) (N)

Ischyroptyx Delucchi, 1956

Ischyroptyx ligusticus (Masi, 1921) (N)

Kaleva Graham, 1957

Kaleva corynocera Graham, 1957 (N)

Leptomeraporus Graham, 1957

Leptomeraporus nicaee (Walker, 1839) (N)

Meraporus Walker, 1834

Meraporus graminicola Walker, 1834 (N)

Merisus Walker, 1835

Merisus splendidus Walker, 1834 (N, S)

Mesopolobus Westwood, 1833

Mesopolobus aequus (Walker, 1834) (N)
Mesopolobus amaenus (Walker, 1834) (N, S)
Mesopolobus clavicornis (Foerster, 1878) (N)
Mesopolobus diffinis (Walker, 1834) (N)
Mesopolobus fasciiventris Westwood, 1833 (N)
Mesopolobus flaviclavatus (Ferrière, 1952) (N)
Mesopolobus fuscipes (Walker, 1834) (N)
Mesopolobus jucundus (Walker, 1834) (N)
Mesopolobus laticornis (Walker, 1834) (N)
Mesopolobus maculicornis (Giraud, 1863) (Si)
Mesopolobus mediterraneus (Mayr, 1903) (S)
Mesopolobus morys (Walker, 1848) (N)
Mesopolobus nobilis (Walker, 1834) (N)
Mesopolobus subfumatus (Ratzeburg, 1852) (N)
Mesopolobus tibialis (Westwood, 1833) (N, S, Si)

Metacolus Foerster, 1856

Metacolus azureus (Ratzeburg, 1844) (N)
Metacolus unifasciatus Foerster, 1856 (N, S)

Metastenus Walker, 1834

Metastenus concinnus Walker, 1834 (N)

Mokrzeckia Mokrzecki, 1933

Mokrzeckia pini (Hartig, 1838) (N, Si)

Nasonia Ashmead, 1904

Nasonia vitripennis (Walker, 1836) (N)

Norbanus Walker, 1843

Norbanus cerasiops Masi, 1922 (N, S)
Norbanus giordanii (Ferrière, 1952) (N)
Norbanus meridionalis (Masi, 1922) (S)
Norbanus obscurus (Masi, 1922) (S)
Norbanus scabriculus (Nees, 1834) (N)
Norbanus tenuicornis Boucek, 1970 (N)

Oedaule Waterston, 1922

Oedaule italica (Masi, 1922) (S)

Oxysychus Delucchi, 1956

Oxysychus silvestrii (Masi, 1921) (S)

Pachycrepoideus Ashmead, 1904

Pachycrepoideus vindemiae (Rondani, 1875) (N, S)

Pachyneuron Walker, 1833

Pachyneuron aphidis (Bouché, 1834) (N)
Pachyneuron chilocori Domenichini, 1957 (N)
Pachyneuron coccorum (Linnaeus, 1758) (S)
Pachyneuron concolor (Foerster, 1841) (N, Si)
Pachyneuron formosum Walker, 1833 (N, S)
Pachyneuron grande Thomson, 1878 (N)
Pachyneuron groenlandicum (Holmgren, 1872) (N)
Pachyneuron solitarium (Hartig, 1838) (Si)

Pegopus Foerster, 1856

Pegopus inornatus (Walker, 1834) (N)

Peridesmia Foerster, 1856

Peridesmia breviventris (Walker, 1833) (N)

Peridesmia congrua (Walker, 1836) (N)

Perniphora Ruschka, 1923

Perniphora robusta Ruschka, 1923 (S)

Pseudocatolaccus Masi, 1908

Pseudocatolaccus nitescens (Walker, 1834) (N, S)

Psilocera Walker, 1833

Psilocera crassispina (Thomson, 1878) (N)

Psilocera obscura Walker, 1833 (N)

Pteromalus Swederus, 1795

Pteromalus albipennis Walker, 1835 (N)

Pteromalus bifoveolatus Foerster, 1861 (N, Si)

Pteromalus cardui (Erdős, 1953) (N)

Pteromalus chrysos Walker, 1836 (N, S)

Pteromalus crassinervis (Thomson, 1878) (N, S)

Pteromalus dispar (Curtis, 1827) (Si)

Pteromalus dolichurus (Thomson, 1878) (Si)

Pteromalus elatus Foerster, 1841 (N)

Pteromalus elevatus (Walker, 1834) (N)

Pteromalus fagi Ratzeburg, 1852 (Si)

Pteromalus fenomenalis Domenichini, 1958 (*)

Pteromalus flavipalpus Ratzeburg, 1844 (Si)

Pteromalus flaviscapus Rudow, 1886 (Si)

Pteromalus flaviventris Rudow, 1886 (Si)

Pteromalus fulgidus Foerster, 1841 (Si)

Pteromalus grandis Walker, 1835 (N)

Pteromalus jucundus Foerster, 1841 (Si)

Pteromalus larvarum Nees, 1834 (S, Si, Sa)

Pteromalus lazulinus Foerster, 1841 (Si)

Pteromalus lixi (Sarra, 1924) (*)

Pteromalus musaeus Walker, 1844 (Si)

Pteromalus myopites De Stefani, 1902 (Si)

Pteromalus nigriventris (Foerster, 1859) (Si)

Pteromalus ochroceus (Thomson, 1878) (Sa)
Pteromalus pallipes Spinola, 1808 (Si)
Pteromalus papaveris Foerster, 1841 (N)
Pteromalus pogonochoeri Ratzeburg, 1844 (Si)
Pteromalus puparum (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)
Pteromalus rondanii Dalla Torre, 1898 (N)
Pteromalus ruficornis Rudow, 1886 (Si)
Pteromalus sequester Walker, 1835 (N)
Pteromalus sphaegigaster De Stefani, 1886 (Si)
Pteromalus tibialis Nees, 1832 (Si)
Pteromalus ventricosus Foerster, 1841 (N)
Pteromalus venustus Walker, 1835 (N)

Rhaphitelus Walker, 1834

Rhaphitelus ladenbergii (Ratzeburg, 1844) (Si)
Rhaphitelus maculatus Walker, 1834 (N, S, Si, Sa)

Rhopalicus Foerster, 1856

Rhopalicus guttatus (Ratzeburg, 1844) (N)
Rhopalicus tutela (Walker, 1836) (N)

Roptrocerus Ratzeburg, 1848

Roptrocerus brevicornis Thomson, 1878 (N, S)
Roptrocerus mirus (Walker, 1834) (N)
Roptrocerus xylophagorum (Ratzeburg, 1844) (N, Si)

Schizonotus Ratzeburg, 1852

Schizonotus latus (Walker, 1833) (N, S)
Schizonotus sieboldi (Ratzeburg, 1852) (S)

Spilomalus Graham, 1956

Spilomalus quadrinota (Walker, 1835) (N, Sa)

Spintherus Thomson, 1878

Spintherus dubius (Nees, 1834) (N, Si)

Stenetra Masi, 1931

Stenetra ligustica Masi, 1931 (N)

Stenomalina Ghesquière, 1946

Stenomalina epistema (Walker, 1835) (N)
Stenomalina illudens (Walker, 1836) (N)
Stenomalina laticeps (Walker, 1848) (Si)
Stenomalina micans (Olivier, 1813) (N)
Stenomalina muscarum (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Stenoselma Delucchi, 1956

Stenoselma nigrum Delucchi, 1956 (N)

Stichocrepis Foerster, 1860

Stichocrepis armata Foerster, 1878 (N)

Synedrus Graham, 1956

Synedrus transiens (Walker, 1835) (N)

Trichomalopsis (Crawford, 1913)

Trichomalopsis arzoneae (Boucek, 1970) (N)
Trichomalopsis genalis (Graham, 1969) (S)
Trichomalopsis hemipterus (Walker, 1836) (N, S)
Trichomalopsis peregrinus (Graham, 1969) (N, Sa)

Trichomalus Thomson, 1878

Trichomalus acuminatus Delucchi & Graham, 1956 (Si)
Trichomalus apertus (Walker, 1835) (N)
Trichomalus bracteatus (Walker, 1835) (N)
Trichomalus campestris (Walker, 1834) (N)
Trichomalus cardui (Masi, 1953) (N)
Trichomalus fulvipes (Walker, 1836) (N)
Trichomalus helvipes (Walker, 1834) (N)
Trichomalus inops (Walker, 1835) (N)
Trichomalus inscitus (Walker, 1835) (Si)
Trichomalus lucidus (Walker, 1835) (N)
Trichomalus nanus (Walker, 1836) (N)
Trichomalus notabilis (Foerster, 1841) (N)
Trichomalus perfectus (Walker, 1835) (N)
Trichomalus posticus (Walker, 1834) (N)
Trichomalus rufinus (Walker, 1835) (N)

Tritneptis Girault, 1908

Tritneptis klugii Ratzeburg, 1844 (Si)
Tritneptis lophyrorum (Ruschka, 1915) (N)

Urolepis Walker, 1846

Urolepis maritima (Walker, 1834) (N)

Szelenyinus Boucek, 1974

Szelenyinus brevinervis Boucek, 1974 (N)

Note

Epicopterus choreiformis: Specie citata per l'Italia da fonte attendibile, ma senza precisazione di località.

Eunotus cretaceus: Specie citata per l'Italia da fonte attendibile, ma senza precisazione di località.

Anogmus laricis: Specie descritta dell'Italia, senza precisazione di località.

Dibrachys braconidis: Specie citata per l'Italia da fonte attendibile, ma senza precisazione di località.

Homoporus febriculosus: Specie citata per l'Italia da fonte attendibile, ma senza precisazione di località.

Pteromalus fenomenalis: Specie citata per l'Italia da fonte attendibile, ma senza precisazione di località.

Pteromalus lixi: Specie citata per l'Italia da fonte attendibile, ma senza precisazione di località.

Eupelmidae

Calosota Curtis, 1836

Calosota acron (Walker, 1848) (N, S)

Calosota vernalis Curtis, 1836 (N, S)

Calosota violascens Masi, 1922 (*)

Calosota viridis Masi, 1922 (N)

Chirolophus Haliday, 1862

Chirolophus incertus Masi, 1923 (S)

Chirolophus walkeri (Curtis, 1836) (S)

Eusandalum Ratzeburg, 1852

Eusandalum calabrum (Masi, 1941) (S)

Eusandalum coronatum (Thomson, 1876) (N)

Eusandalum inerme (Ratzeburg, 1848) (*)

Eusandalum merceti (Bolivar & Pieltain, 1926) (N)

Eusandalum walkeri (Curtis, 1836) (N)

Anastatus Motschulsky, 1859

Anastatus bifasciatus (Geoffroy, 1785) (N, S, Si, Sa)
Anastatus japonicus Ashmead, 1904 (Sa)
Anastatus oscar (Ruthe, 1859) (S)
Anastatus platycleidis (Sarrazin, 1934) (S)
Anastatus ruficaudus Ferrière, 1954 (N)
Anastatus sidereus (Erdős, 1957) (N, S)
Anastatus uromeni Ferrière, 1968 (Sa)

Brasema Cameron, 1884

Brasema cicadae (Girault, 1871) (S)

Calymmochilus Masi, 1919

Calymmochilus subnubilus (Walker, 1872) (S)

Eupelmus Dalman, 1820

Eupelmus aloysii Russo, 1939 (S)
Eupelmus annulatus Nees, 1834 (N)
Eupelmus atropurpureus Dalman, 1820 (S)
Eupelmus insulae Masi, 1919 (S)
Eupelmus linearis Foerster, 1860 (N)
Eupelmus popa Girault, 1917 (N, S)
Eupelmus synophri De Stefani, 1897 (Si)
Eupelmus testaceiventris (Motschulsky, 1863) (S)
Eupelmus urozonus Dalman, 1820 (N, S, Si)
Eupelmus vindex Erdős, 1955 (N)

Macroneura Walker, 1837

Macroneura muellneri (Ruschka, 1921) (N)
Macroneura vesicularis (Retzius, 1783) (N, S, Sa)

Merostenus Walker, 1837

Merostenus excavatus (Dalman, 1820) (N, S)

Note

Calosota violascens: Specie citata per l'Italia da fonte attendibile, ma senza precisazione di località.
Eusandalum inerme: Specie citata per l'Italia da fonte attendibile, ma senza precisazione di località.

Encyrtidae

Anagyrus Howard, 1896

Anagyrus bouceki Hoffer, 1953 (N)
Anagyrus fusciventris (Girault, 1915) (S)
Anagyrus longicornis Mercet, 1923 (Si)
Anagyrus pseudococci (Girault, 1915) (S, Si)
Anagyrus schoenherri (Westwood, 1837) (Si)
Anagyrus securicornis Domenichini, 1953 (N)

Asitus Erdös, 1955

Asitus phragmitis (Ferrière, 1955) (S)

Coccidoxenoides Girault, 1915

Coccidoxenoides peregrina (Timberlake, 1919) (S)

Cowperia Girault, 1919

Cowperia nigra (Masi, 1919) (N, S)

Dinocarsis Foerster, 1856

Dinocarsis hemiptera (Dalman, 1820) (N)

Ericydnus Walker, 1837

Ericydnus sipylus (Walker, 1837) (N)
Ericydnus strigosus (Nees, 1834) (N, S)
Ericydnus ventralis (Dalman, 1820) (N)

Leptomastidea Mercet, 1916

Leptomastidea abnormis (Girault, 1915) (N, S, Si)
Leptomastidea bifasciata (Mayr, 1876) (S)
Leptomastidea matritensis (Mercet, 1916) (N)

Leptomastix Foerster, 1856

Leptomastix dactylopii Howard, 1885 (S)
Leptomastix epona (Walker, 1844) (*)

Platyrhopus Erdös, 1955

Platyrhopus meridionalis (Ferrière, 1955) (S)

Ramalia Mercet, 1947

Ramalia intermedius (Mayr, 1876) (N)

Rhopus Foerster, 1856

Rhopus brachypterus (Mercet, 1918) (S)

Tetracnemoidea Howard, 1898

Tetracnemoidea brevicornis (Girault, 1915) (N, S)

Tetracnemoidea peregrina (Compère, 1939) (S)

Achalcerinys Girault, 1915

Achalcerinys lindus (Mercet, 1921) (S)

Adelencyrtus Ashmead, 1900

Adelencyrtus aulacaspidis (Brethes, 1914) (N, S)

Aenasioidea Girault, 1911

Aenasioidea hispanica Mercet, 1921 (N, S)

Ageniaspis Dahlbom, 1857

Ageniaspis fuscicollis (Dalman, 1820) (N, S)

Ageniaspis mayri Masi, 1909 (S)

Anicetus Howard, 1896

Anicetus italicus (Masi, 1917) (N)

Anthemus Howard, 1896

Anthemus evallaspidis Ferrière, 1965 (S, Si)

Anthemus leucaspidis Mercet, 1922 (*)

Baeocharis Mayr, 1876

Baeocharis pascuorum Mayr, 1876 (N)

Blastothrix Mayr, 1876

Blastothrix erythrostetha (Walker, 1847) (N)

Blastothrix sericea (Dalman, 1820) (N, S)

Bothriothorax Ratzeburg, 1844

Bothriothorax clavicornis (Dalman, 1820) (N)
Bothriothorax intermedius Claridge, 1964 (N)
Bothriothorax trichops Thomson, 1876 (S)

Boucekiella Hoffer, 1954

Boucekiella depressa Hoffer, 1954 (S)

Cerapterocerus Westwood, 1833

Cerapterocerus latevittatus A. Costa, 1882 (Sa)
Cerapterocerus mirabilis Westwood, 1833 (N, S, Sa)

Cerchysiella Girault, 1914

Cerchysiella laeviscutum (Thomson, 1876) (S)
Cerchysiella planiscutellum (Mercet, 1921) (N)

Cerchysius Westwood, 1832

Cerchysius subplanus (Dalman, 1820) (N, S, Sa)

Cheiloneurus Westwood, 1833

Cheiloneurus claviger Thomson, 1876 (N)
Cheiloneurus paralia (Walker, 1837) (N)

Choreia Westwood, 1833

Choreia inepta (Dalman, 1829) (N)
Choreia proserpinae De Stefani, 1884 (Si)

Coccidencyrtus Ashmead, 1900

Coccidencyrtus dynaspidioti Battaglia, 1989 (S)

Coelopencyrtus Timberlake, 1919

Coelopencyrtus ampelodesmae Viggiani, 1970 (S)
Coelopencyrtus porticensis Viggiani, 1970 (S)

Comperiella Howard, 1906

Comperiella lemniscata (Compère & Anecke, 1961) (S)

Copidosoma Ratzeburg, 1844

Copidosoma aretas (Walker, 1838) (S)

Copidosoma buyssoni Mayr, 1902 (Si)
Copidosoma dium (Walker, 1837) (N)
Copidosoma koehleri (Blanchard, 1940) (N) (*)
Copidosoma nanellae Silvestri, 1922 (S)
Copidosoma peticus (Walker, 1846) (N)
Copidosoma truncatellum (Dalman, 1820) (N, S)

Dicarnosis Mercet, 1921

Dicarnosis helena Hoffer, 1953 (N)

Discodes Foerster, 1856

Discodes aeneus (Dalman, 1820) (N, S, Si)
Discodes encopiformis (Walker, 1847) (N)
Discodes hemipterinus (De Stefani, 1897) (Si)
Discodes planicornis De Stefani, 1886 (Si)

Diversinervus Silvestri, 1915

Diversinervus elegans Silvestri, 1915 (S)

Echthroplexis Foerster, 1856

Echthroplexis puncticollis (Thomson, 1876) (N)

Encyrtus Latreille, 1809

Encyrtus aeneus De Stefani, 1886 (Si)
Encyrtus bicolor (Howard, 1881) (Si)
Encyrtus ceuthorhynchi Rondani, 1872 (N)
Encyrtus dasucurtoma De Stefani, 1897 (Si)
Encyrtus frontatus Mercet, 1921 (N)
Encyrtus infidus (Rossi, 1790) (N, S, Si, Sa)
Encyrtus lecaniorum (Mayr, 1876) (N, S, Sa)
Encyrtus sobrinus Masi, 1919 (S)

Epitetracnemus Girault, 1915

Epitetracnemus zetterstedtii (Westwood, 1837) (N)

Eugahania Mercet, 1926

Eugahania fumipennis (Ratzeburg, 1852) (N, S)

Eusemion Dahlbom, 1857

Eusemion cornigerum (Walker, 1838) (S)

Habrolepis Foerster, 1856

Habrolepis dalmanni (Westwood, 1837) (S, Si)
Habrolepis italicus Delucchi, 1965 (N)
Habrolepis rouxi Compère, 1936 (N)

Holcothorax Mayr, 1876

Holcothorax testaceipes (Ratzeburg, 1848) (N)

Homalotylus Mayr, 1876

Homalotylus flaminus (Dalman, 1820) (N, S)
Homalotylus nigricornis Mercet, 1921 (S)

Hoplopsis De Stefani, 1889

Hoplopsis minuta (Fabricius, 1793) (N, S, Si)

Isodromus Howard, 1887

Isodromus perpunctatus Masi, 1942 (*)

Mahencyrtus Masi, 1917

Mahencyrtus comara (Walker, 1837) (N)

Mayrencyrtus Hincks, 1944

Mayrencyrtus merceti Hoffer, 1977 (S)

Metaphycus Mercet, 1921

Metaphycus asterolecanii (Mercet, 1923) (S)
Metaphycus bartletti Annecke & Mynhardt, 1972 (S)
Metaphycus delucchi Viggiani, 1990 (S)
Metaphycus dispar (Mercet, 1921) (S)
Metaphycus flavus (Howard, 1881) (S, Si)
Metaphycus fulvifrons (Walker, 1838) (S)
Metaphycus helvolus (Compère, 1926) (S, Si)
Metaphycus hirtipennis (Mercet, 1921) (S)
Metaphycus insidiosus (Mercet, 1921) (S)
Metaphycus lounsburyi (Howard, 1898) (S) (*)
Metaphycus maculipennis (Timberlake, 1916) (S)
Metaphycus melanostomatus (Timberlake, 1916) (S)
Metaphycus puncticeps (Dalman, 1820) (S)
Metaphycus swirskii Annecke & Mynhardt, 1979 (S)

Mira Schellenberg, 1803

Mira mucora Schellenberg, 1803 (N, Si)

Oobius Trjapitzin, 1963

Oobius anomalus Guerrieri, Garonna & Viggiani, 1990 (N, S)

Oobius zahaikovitshi Trjapitzin, 1963 (S)

Ooencyrtus Ashmead, 1900

Ooencyrtus gonoceri Viggiani, 1971 (Si)

Ooencyrtus kuvanae (Howard, 1910) (N, S, Sa)

Ooencyrtus masii (Mercet, 1921) (S)

Ooencyrtus pityocampae (Mercet, 1921) (S)

Ooencyrtus tardus (Ratzeburg, 1844) (S)

Ooencyrtus telenomicida (Vassiliev, 1904) (*)

Ooencyrtus vinulae (Masi, 1911) (S)

Paralitomastix Mercet, 1921

Paralitomastix varicornis (Nees, 1834) (Si)

Paraphaenodiscus Girault, 1915

Paraphaenodiscus algiricus Ferriere, 1956 (Si)

Paraphaenodiscus bicolor Mercet, 1921 (N, Si, Sa)

Plagiomerus Crawford, 1910

Plagiomerus diaspidis Crawford, 1910 (*)

Platencyrtus Ferrière, 1955

Platencyrtus parkeri Ferrière, 1955 (S)

Prionomastix Mayr, 1876

Prionomastix morio (Dalman, 1820) (N)

Prionomitius Mayr, 1876

Prionomitius mitratus (Dalman, 1820) (N, Si)

Prionomitius tiliaris (Dalman, 1820) (N, Si)

Prochiloneurus Silvestri, 1915

Prochiloneurus aegyptiacus (Mercet, 1929) (S, Si)
Prochiloneurus bolivari Mercet, 1919 (S)
Prochiloneurus pulchellus Silvestri, 1915 (S)

Pseudaphycus Timberlake, 1916

Pseudaphycus austriacus Mercet, 1925 (N)

Psilophrys Mayr, 1876

Psilophrys parvulus Guerrieri & Viggiani, 1992 (S)
Psilophrys tenuicornis Graham, 1969 (N, S)

Psyllaephagus Ashmead, 1900

Psyllaephagus euphyllurae (Masi, 1911) (S, Si)
Psyllaephagus procerus (Mercet, 1921) (*)

Sceptrophorus Foerster, 1856

Sceptrophorus chalcostomus Dalman, 1820 (N)
Sceptrophorus cyanocephalus Dalman, 1820 (N)
Sceptrophorus ferrugineus (Nees, 1834) (N)
Sceptrophorus lunatus (Dalman, 1820) (N, S)
Sceptrophorus masii (Silvestri, 1919) (N, S)
Sceptrophorus sylvius (Dalman, 1820) (S, Sa)
Sceptrophorus tessellatus (Dalman, 1820) (N)
Sceptrophorus tricoloricornis (De Stefani, 1886) (N, Si)

Syrphophagus Ashmead, 1900

Syrphophagus aeruginosus (Dalman, 1820) (S)
Syrphophagus aphidivorus (Mayr, 1876) (Si)
Syrphophagus mamitus (Walker, 1837) (Si)

Trechnites Thomson, 1876

Trechnites psyllae (Ruschka, 1923) (N, Si)

Trichomasthus Thomson, 1876

Trichomasthus cyaneus (Dalman, 1820) (N)

Trjapitzinellus Viggiani, 1967

Trjapitzinellus semidaliphagus Viggiani, 1967 (S)

Tyndarichus Howard, 1910

Tyndarichus melanacis (Dalman, 1820) (N)
Tyndarichus scaurus (Walker, 1837) (N)

Zaomma Ashmead, 1900

Zaomma lambinus (Walker, 1838) (N, S)

Homalotyloidea Mercet, 1921

Homalotyloidea dahlbomii (Westwood, 1837) (S)

Lamennaisia Girault, 1922

Lamennaisia ambigua (Nees, 1834) (N)

Parablatticida Girault, 1915

Parablatticida brevicornis (Dalman, 1820) (N)

Note

Leptomastix epona: Specie citata per l'Italia da fonte attendibile, ma senza precisazione di località.

Anthemus leucaspidis: Specie citata per l'Italia da fonte attendibile, ma senza precisazione di località.

Copidosoma koehleri: Specie introdotta dal Giappone.

Isodromus perpunctatus: Specie citata per l'Italia da fonte attendibile, ma senza precisazione di località.

Metaphycus lounsburyi: Specie introdotta dagli USA.

Ooencyrtus telenomicida: Specie citata per l'Italia da fonte attendibile, ma senza precisazione di località.

Plagiomerus diaspidis: Specie citata per l'Italia da fonte attendibile, ma senza precisazione di località.

Psyllaephagus procerus: Specie citata per l'Italia da fonte attendibile, ma senza precisazione di località.

Eulophidae

Aulogymnus Foerster, 1851

Aulogymnus arsames (Walker, 1838) (N)
Aulogymnus gallarum (Linnaeus, 1761) (Sa)
Aulogymnus skianeuros (Ratzeburg, 1844) (N, Si)
Aulogymnus trilineatus (Mayr, 1877) (N, Sa)

Cirrospilus Westwood, 1832

Cirrospilus argei (Crawford, 1911) (N) (*)
Cirrospilus curvineurus Askew, 1965 (N)
Cirrospilus diallus Walker, 1838 (N, S, Si)
Cirrospilus elegantissimus Westwood, 1832 (N)
Cirrospilus lyncus Walker, 1838 (N)
Cirrospilus pictus (Nees, 1834) (N, S)
Cirrospilus pulcher Masi, 1911 (N, S, Sa)
Cirrospilus pulcherrimus (Mercet, 1916) (S, Si)
Cirrospilus staryi Boucek, 1959 (N)
Cirrospilus suaedaegallarum Viggiani, 1971 (S)
Cirrospilus variegatus (Masi, 1907) (N, S, Si)
Cirrospilus viticola (Rondani, 1876) (N, S, Si, Sa)
Cirrospilus vittatus Walker, 1838 (N, S, Si, Sa)

Cleolophus Mercet, 1924

Cleolophus autonomus Mercet, 1924 (N)

Colpoclypeus Lucchese, 1941

Colpoclypeus florus (Walker, 1839) (N, S)

Danuviella Erdös, 1958

Danuviella subplana Erdös, 1958 (N)

Dermatopelte Erdös & Novicky, 1951

Dermatopelte budensis Erdös & Novicky, 1951 (Sa)

Diaulinopsis Crawford, 1912

Diaulinopsis arenaria (Erdös, 1951) (N, S)

Dicladocerus Westwood, 1832

Dicladocerus euryalus (Haliday, 1843) (N)
Dicladocerus westwoodii Westwood, 1832 (N, S)

Diglyphus Walker, 1848

Diglyphus begini (Ashmead, 1904) (N) (*)
Diglyphus crassinervis Erdös, 1958 (N) (*)
Diglyphus isaea (Walker, 1838) (N, S, Si, Sa) (*)
Diglyphus minoeus (Walker, 1838) (N, S)
Diglyphus pachyneurus Graham, 1963 (N)
Diglyphus poppoea Walker, 1848 (N)

Elachertus Spinola, 1811

- Elachertus affinis* (Masi, 1911) (N, S)
- Elachertus artaeus* (Walker, 1839) (N)
- Elachertus charondas* (Walker, 1839) (N)
- Elachertus inunctus* (Nees, 1834) (N)
- Elachertus longipetiolus* Boucek, 1970 (N)

Eulophus O.F. Müller, 1764

- Eulophus abdominalis* Nees, 1834 (N)
- Eulophus aeneicoxa* (Thomson, 1878) (N, S)
- Eulophus larvarum* (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)
- Eulophus slovacus* Boucek, 1959 (S)
- Eulophus smerinthicida* Boucek, 1959 (N)
- Eulophus thespius* Walker, 1839 (N)

Euplectrus Westwood, 1832

- Euplectrus bicolor* (Swederus, 1795) (N, S, Si)
- Euplectrus flavipes* (Fonscolombe, 1832) (N)
- Euplectrus liparidis* Ferriere, 1941 (N)

Hemiptarsenus Westwood, 1833

- Hemiptarsenus dropion* (Walker, 1839) (S)
- Hemiptarsenus unguicellus* (Zetterstedt, 1838) (N)
- Hemiptarsenus waillesellae* Novicki, 1929 (S)
- Hemiptarsenus waterhousii* Westwood, 1833 (N)

Hyssopus Girault, 1916

- Hyssopus geniculatus* (Hartig, 1838) (S)
- Hyssopus nigrutilus* (Zetterstedt, 1838) (N)
- Hyssopus pallidus* (Askew, 1964) (*)

Microlycus Thomson, 1878

- Microlycus heterocerus* Thomson, 1878 (S)

Miotropis Thomson, 1878

- Miotropis unipuncta* (Nees, 1834) (N)

Necremnus Thomson, 1878

- Necremnus cosconius* (Walker, 1839) (N)

Necremnus folia (Walker, 1839) (N)
Necremnus leucarthros (Nees, 1834) (N, S)
Necremnus tidius (Walker, 1839) (N)

Platyplectrus Ferrière, 1941

Platyplectrus bouceki (Erdös, 1966) (N)
Platyplectrus laeviscuta (Thomson, 1878) (S)
Platyplectrus pannonica (Erdös, 1966) (N)

Pnigalio Schrank, 1802

Pnigalio agraulis (Walker, 1839) (N, S)
Pnigalio attis (Walker, 1839) (N)
Pnigalio longulus (Zetterstedt, 1838) (*)
Pnigalio pectinicornis (Linnaeus, 1758) (N)
Pnigalio soemius (Walker, 1839) (N, Sa)

Ratzeburgiola Erdös, 1958

Ratzeburgiola incompleta Boucek, 1970 (N, Si)

Rhcnopelte Foerster, 1878

Rhcnopelte crassicornis (Nees, 1834) (*)

Stenomesius Westwood, 1833

Stenomesius rufescens (Retzius, 1783) (N, S)

Sympiesis Foerster, 1856

Sympiesis acalle (Walker, 1848) (N, S)
Sympiesis angustipennis (Erdös, 1954) (*)
Sympiesis dolichogaster Ashmead, 1888 (N)
Sympiesis flavopicta Boucek, 1959 (N)
Sympiesis gordius (Walker, 1839) (N, S)
Sympiesis gregori Boucek, 1959 (N)
Sympiesis notata (Zetterstedt, 1833) (N)
Sympiesis punctifrons (Thomson, 1878) (N)
Sympiesis sericeicornis (Nees, 1834) (N, S, Sa)
Sympiesis viridula (Thomson, 1878) (N)
Sympiesis xanthostoma (Nees, 1834) (N)

Allocerastichus Masi, 1924

Allocerastichus doderi Masi, 1924 (N)

Astichus Foerster, 1856

Astichus arithmeticus (Foerster, 1851) (N)
Astichus longevittatus Masi, 1925 (S)
Astichus solutus Foerster, 1856 (Si)

Euderus Haliday, 1844

Euderus agrili Boucek, 1963 (N)
Euderus albitarsis (Zetterstedt, 1838) (N)
Euderus brevicornis Boucek, 1963 (N)
Euderus caudatus Thomson, 1878 (*)
Euderus salinus Erdös, 1951 (N)

Aceratoneuromyia Girault, 1917

Aceratoneuromyia evanescens (Ratzeburg, 1848) (N)
Aceratoneuromyia indica (Silvestri, 1910) (S) (*)
Aceratoneuromyia polita Graham, 1991 (N)

Anaprostocetus Graham, 1987

Anaprostocetus acuminatus (Ratzeburg, 1848) (N)

Apotetrastichus Graham, 1987

Apotetrastichus postmarginalis (Boucek, 1969) (N)

Aprostocetus Westwood, 1833

Aprostocetus abydenus (Walker, 1848) (N)
Aprostocetus aethiops (Zetterstedt, 1838) (N)
Aprostocetus amenon (Walker, 1839) (*)
Aprostocetus annulatus (Foerster, 1861) (N)
Aprostocetus arenarius (Erdös, 1954) (N)
Aprostocetus balasi (Erdös, 1954) (S)
Aprostocetus biorrhizae (Szelényi, 1941) (N, S)
Aprostocetus boreus (Delucchi, 1954) (*)
Aprostocetus bruzzonis (Masi, 1930) (N)
Aprostocetus calamarius Graham, 1961 (N)
Aprostocetus catius (Walker, 1839) (N)
Aprostocetus caudatus (Westwood, 1833) (N)
Aprostocetus cecidomyiarum (Bouché, 1834) (N)
Aprostocetus celtidis (Erdös, 1954) (*)
Aprostocetus ceroplastae (Girault, 1916) (N)
Aprostocetus citrinus (Foerster, 1841) (N)
Aprostocetus citripes (Thomson, 1878) (N)
Aprostocetus collega (Ratzeburg, 1844) (*)

Aprostocetus cracens Graham, 1987 (S)
Aprostocetus crino (Walker, 1838) (N, S)
Aprostocetus diplosidis Crawford, 1907 (S)
Aprostocetus elongatus (Foerster, 1841) (N, S)
Aprostocetus emesa (Walker, 1839) (N)
Aprostocetus epicharmus (Walker, 1839) (N, S)
Aprostocetus eriophyes (Taylor, 1909) (N)
Aprostocetus eupatorii Kurdjumov, 1913 (N)
Aprostocetus eurytus (Walker, 1838) (N, S)
Aprostocetus fabicola (Rondani, 1877) (*)
Aprostocetus flavifrons (Walker, 1849) (*)
Aprostocetus forsteri (Walker, 1847) (N, S)
Aprostocetus fulvipes (Foerster, 1878) (N)
Aprostocetus garganensis Graham, 1987 (S)
Aprostocetus gnomus Graham, 1987 (N)
Aprostocetus grandii (Domenichini, 1966) (N)
Aprostocetus gratus (Giraud, 1863) (N)
Aprostocetus hagenowii (Ratzeburg, 1852) (N, S, Si)
Aprostocetus invidus (Domenichini, 1966) (*)
Aprostocetus leucone (Walker, 1839) (N)
Aprostocetus longicauda (Thomson, 1878) (N)
Aprostocetus luteus (Ratzeburg, 1852) (N, S)
Aprostocetus lycidas (Walker, 1839) (N)
Aprostocetus mandanis (Walker, 1838) (N)
Aprostocetus meridionalis Graham, 1987 (N)
Aprostocetus metra (Walker, 1838) (*)
Aprostocetus micantulus (Thomson, 1878) (N)
Aprostocetus microscopicus (Rondani, 1877) (N)
Aprostocetus miridivorus (Domenichini, 1967) (N, S)
Aprostocetus mycerinus (Walker, 1839) (N)
Aprostocetus neglectus (Domenichini, 1957) (N, S)
Aprostocetus occidentalis Graham, 1987 (Sa)
Aprostocetus oreophilus (Foerster, 1861) (N)
Aprostocetus ovivorax (Silvestri, 1920) (N, S)
Aprostocetus pallipes (Dalman, 1820) (N)
Aprostocetus percaudatus (Silvestri, 1920) (N, S)
Aprostocetus pygmaeus (Zetterstedt, 1838) (N)
Aprostocetus rhipheus (Walker, 1839) (N)
Aprostocetus rubi Graham, 1987 (*)
Aprostocetus toddaliae (Risbec, 1958) (N) (*)
Aprostocetus westwoodi (Fonscolombe, 1840) (*)
Aprostocetus zosimus (Walker, 1839) (N)

***Baryscapus* Foerster, 1856**

Baryscapus agrilorum (Ratzeburg, 1844) (*)
Baryscapus berhidanus (Erdős, 1954) (S)
Baryscapus bruchivorus (Gahan, 1942) (Si)

Baryscapus ceroplastophilus (Domenichini, 1966) (N)
Baryscapus conwentziae Ferrière, 1959 (N)
Baryscapus daira (Walker, 1839) (N, Sa)
Baryscapus diaphantus (Walker, 1839) (S)
Baryscapus endemus (Walker, 1838) (N, Si)
Baryscapus endofiticus (Domenichini, 1956) (S)
Baryscapus erynniae (Domenichini, 1966) (S)
Baryscapus evonymellae (Bouché, 1834) (N)
Baryscapus galactopus (Ratzeburg, 1844) (N, S)
Baryscapus garganus (Domenichini, 1957) (S)
Baryscapus hylesini Graham, 1991 (N)
Baryscapus impeditus (Nees, 1834) (N)
Baryscapus irideus (Domenichini, 1967) (N)
Baryscapus nigroviolaceus (Nees, 1834) (N, S, Si)
Baryscapus pospelovi (Kurdjumov, 1912) (N) (*)
Baryscapus servadeii (Domenichini, 1966) (N, S)
Baryscapus szoecsi (Erdös, 1958) (S)
Baryscapus turionum (Hartig, 1838) (N)

***Crataepus* Foerster, 1878**

Crataepus marbis (Walker, 1839) (S)

***Holcotetrastichus* Graham, 1987**

Holcotetrastichus rhosaces (Walker, 1839) (N, S)

***Kolopterna* Graham, 1987**

Kolopterna quartensis Graham, 1987 (N)

***Melittobia* Westwood, 1848**

Melittobia acasta (Walker, 1839) (N)

***Minotetrastichus* Kostjukov, 1977**

Minotetrastichus ecus (Walker, 1838) (N, S, Si)
Minotetrastichus napomyzae (Domenichini, 1966) (S)
Minotetrastichus platanellus (Mercet, 1922) (N, S)

***Neotrichoporoides* Girault, 1913**

Neotrichoporoides cynodontis (Domenichini, 1967) (N, S)
Neotrichoporoides dispersus Graham, 1986 (*)
Neotrichoporoides mediterraneus Graham, 1986 (Sa)
Neotrichoporoides szelenyii (Erdös, 1951) (N, S)
Neotrichoporoides viridimaculatus (Fullaway, 1955) (N, S)

Oomyzus Rondani, 1870

Oomyzus gallerucae (Fonscolombe, 1832) (N, S)
Oomyzus incertus (Ratzeburg, 1844) (N)
Oomyzus sempronius (Erdös, 1954) (N)
Oomyzus sokolowskii (Kurdjumov, 1912) (N)

Pronotalia Gradwell, 1957

Pronotalia carlinarum (Szelényi & Erdös, 1951) (N, Sa)
Pronotalia fiorii (Domenichini, 1957) (S)

Puklina Graham, 1991

Puklina amblyteles Graham, 1991 (Sa)

Quadrastichodella Girault, 1913

Quadrastichodella nova Girault, 1922 (Sa) (*)

Quadrastichus Girault, 1913

Quadrastichus anysis (Walker, 1838) (*)
Quadrastichus artemisiphilus Graham, 1991 (Si)
Quadrastichus brevinervis (Zetterstedt, 1838) (*)
Quadrastichus citrinus (Thomson, 1878) (N)
Quadrastichus cryptorrhynchi (Domenichini, 1967) (S)
Quadrastichus pedicellaris (Thomson, 1878) (*)
Quadrastichus sajo (Szelényi, 1940) (N)
Quadrastichus vacuna (Walker, 1839) (N)

Sigmophora Rondani, 1867

Sigmophora brevicornis (Panzer, 1804) (N, S, Si, Sa)
Sigmophora italica Domenichini, 1967 (N)

Sphenolepis Nees, 1834

Sphenolepis pygmaea Nees, 1834 (N)

Tamarixia Mercet, 1924

Tamarixia leptothrix Graham, 1991 (N)
Tamarixia monesus (Walker, 1839) (N)
Tamarixia pronomus (Walker, 1839) (*)
Tamarixia pubescens (Nees, 1834) (*)
Tamarixia tremblayi (Domenichini, 1966) (S)

Tamarixia upis (Walker, 1839) (N, S)

Tetrastichomyia Girault, 1916

Tetrastichomyia clisiocampae (Ashmead, 1894) (N)

Tetrastichus Haliday, 1844

Tetrastichus atratulus (Nees, 1834) (*)
Tetrastichus cecidomyiae De Stefani, 1887 (Si) (*)
Tetrastichus coeruleus (Nees, 1834) (N)
Tetrastichus epilachnae (Giard, 1896) (N, S, Si)
Tetrastichus heeringi Delucchi, 1954 (*)
Tetrastichus hylotomarum (Bouché, 1834) (N)
Tetrastichus julis (Walker, 1839) (N, S)
Tetrastichus legionarius Giraud, 1863 (N, S)
Tetrastichus leocrates (Walker, 1839) (N)
Tetrastichus lyridice (Walker, 1839) (N) (*)
Tetrastichus miser (Nees, 1834) (N)
Tetrastichus murcia (Walker, 1839) (N, S)
Tetrastichus telon (Graham, 1961) (Si)
Tetrastichus ulmi Erdös, 1954 (N)

Thripastichus Graham, 1987

Thripastichus gentilei (Del Guercio, 1911) (N)

Achrysocharoides Girault, 1913

Achrysocharoides atys (Walker, 1839) (N)
Achrysocharoides nigricoxae (Delucchi, 1954) (*)
Achrysocharoides niveipes (Thomson, 1878) (S)
Achrysocharoides parvus (Delucchi, 1956) (Sa)
Achrysocharoides splendens (Delucchi, 1954) (*)
Achrysocharoides suprafolius (Askew & Ruse, 1974) (N)

Asecodes Foerster, 1856

Asecodes caterinae Viggiani, 1978 (Sa)
Asecodes galerucae Askew, 1978 (S)

Ceranisus Walker, 1842

Ceranisus menes (Walker, 1839) (*)

Chrysocharis Foerster, 1856

Chrysocharis ainsliei Crawford, 1912 (N) (*)

Chrysocharis amasis (Walker, 1839) (N)
Chrysocharis amyite (Walker, 1839) (N)
Chrysocharis argyropezae Graham, 1963 (N)
Chrysocharis cerris Erdös, 1961 (N)
Chrysocharis chilo (Walker, 1839) (N)
Chrysocharis crassiscapus (Thomson, 1878) (N)
Chrysocharis entedonoides (Walker, 1872) (N)
Chrysocharis gemma (Walker, 1839) (S, Si)
Chrysocharis laomedon (Walker, 1839) (N)
Chrysocharis laricinellae (Ratzeburg, 1848) (N)
Chrysocharis liriomyzae Delucchi, 1954 (N)
Chrysocharis loranthellae Erdös, 1954 (N)
Chrysocharis mediana Foerster, 1861 (N)
Chrysocharis nautius (Walker, 1846) (N)
Chrysocharis nephereus (Walker, 1839) (N, S)
Chrysocharis nitetis (Walker, 1839) (N)
Chrysocharis orbicularis (Nees, 1834) (N)
Chrysocharis pentheus (Walker, 1839) (N, S)
Chrysocharis phryne (Walker, 1839) (N)
Chrysocharis pilicoxa (Thomson, 1878) (N)
Chrysocharis polyzo (Walker, 1839) (N)
Chrysocharis prodice (Walker, 1839) (N)
Chrysocharis pubens Delucchi, 1954 (N)
Chrysocharis pubicornis (Zetterstedt, 1838) (N, S, Si)
Chrysocharis submutica Graham, 1963 (N)
Chrysocharis viridis (Nees, 1834) (N)

Chrysonotomyia Ashmead, 1904

Chrysonotomyia lanassa (Walker, 1839) (N)
Chrysonotomyia lyonetiae (Ferrière, 1952) (N)

Closterocerus Westwood, 1833

Closterocerus trifasciatus Westwood, 1833 (N, S)

Derostenus Westwood, 1833

Derostenus gemmeus Westwood, 1833 (N)

Entedon Dalman, 1820

Entedon crassiscapus Erdös, 1944 (*)
Entedon ergias Walker, 1839 (N)
Entedon euphorion Walker, 1839 (N)
Entedon insignis Erdös, 1944 (N)
Entedon lanceolatus Erdös, 1944 (N)
Entedon leucocnemis Erdös, 1944 (N)

Entedon loti Erdös, 1944 (N)
Entedon methion Walker, 1839 (N)
Entedon punctiscapus Thomson, 1878 (N)
Entedon tenuitarsus Thomson, 1878 (N)

Euderomphale Girault, 1916

Euderomphale bemisiae Viggiani, 1977 (Si)
Euderomphale chelidonii Erdös, 1966 (S)

Eugerium Graham, 1959

Eugerium isander (Walker, 1839) (N)

Holcopelte Foerster, 1856

Holcopelte obscura (Foerster, 1841) (*)

Horismenus Walker, 1843

Horismenus specularis (Erdös, 1954) (S)

Ionympha Graham, 1959

Ionympha carne (Walker, 1839) (N)

Mestocharis Foerster, 1878

Mestocharis bimaculatus (Dalman, 1820) (N)

Neochrysocharis Kurdjumov, 1912

Neochrysocharis albiscapus Erdös, 1954 (N, S)
Neochrysocharis chlorogaster (Erdös, 1966) (N)
Neochrysocharis clinias (Walker, 1838) (N)
Neochrysocharis formosa (Westwood, 1833) (N, S, Si)

Omphale Haliday, 1833

Omphale coilus (Walker, 1839) (N) (*)
Omphale salicis Haliday, 1833 (N)
Omphale varipes (Thomson, 1878) (N)

Pediobius Walker, 1846

Pediobius acantha (Walker, 1839) (N, S)
Pediobius alcaeus (Walker, 1839) (N, S)
Pediobius brachycerus (Thomson, 1878) (N)

Pediobius bruchicida (Rondani, 1872) (N, S)
Pediobius cassidae Erdös, 1958 (N, S)
Pediobius crassicornis (Thomson, 1878) (N)
Pediobius epeus (Walker, 1839) (N)
Pediobius epigonus (Walker, 1839) (N)
Pediobius epilachnae (Rohwer, 1921) (S)
Pediobius eubius (Walker, 1839) (N)
Pediobius facialis (Giraud, 1863) (Sa)
Pediobius foliorum (Geoffroy in Fourcroy, 1785) (N)
Pediobius italicus Boucek, 1963 (N)
Pediobius lysis (Walker, 1839) (Sa)
Pediobius nigritarsis (Thomson, 1878) (S)
Pediobius pyrgo (Walker, 1839) (N, S)
Pediobius rotundatus (Fonscolombe, 1832) (S)
Pediobius saulius (Walker, 1839) (N, S, Si)

Teleopteris Silvestri, 1914

Teleopteris delucchii Boucek, 1970 (N)
Teleopteris erxias (Walker, 1848) (N, S)

Note

Cirrospilus argei: Specie originariamente descritta fra i Tetrastichinae nel genere Winnemana.
Diglyphus begini: Specie determinata con riserva da Z. Boucek, probabilmente introdotta dal Nord America.

Diglyphus crassinervis: Specie determinata con riserva da Z. Boucek.

Diglyphus isaea: Specie autoctona allevata in laboratorio ed utilizzata in programmi di lotta biologica.

Hyssopus pallidus: Specie citata per l'Italia da fonte attendibile, ma senza precisazione di località.

Phygadeuon longulus: Specie citata per l'Italia da fonte attendibile, ma senza precisazione di località.

Rhichnospila crassicornis: Specie citata per l'Italia da fonte attendibile, ma senza precisazione di località.

Sympiesis angustipennis: Specie citata per l'Italia da fonte attendibile, ma senza precisazione di località.

Euderus caudatus: Specie citata per l'Italia da fonte attendibile, ma senza precisazione di località.

Aceratoneuromyia indica: Specie introdotta da Silvestri dall'Australia quale limitatore di *Ceratitis capitata*. Essa era stata precedentemente importata in Australia dall'India, sua patria d'origine. Non sono note segnalazioni recenti che ne confermino l'acclimatazione.

Aprostocetus amenon: Specie citata per l'Italia da fonte attendibile, ma senza precisazione di località.

Aprostocetus boreus: Specie citata per l'Italia da fonte attendibile, ma senza precisazione di località.

Aprostocetus celtidis: Specie citata per l'Italia da fonte attendibile, ma senza precisazione di località.

Aprostocetus collega: Specie citata per l'Italia da fonte attendibile, ma senza precisazione di località.

Aprostocetus fabicola: Specie descritta dell'Italia probabilmente della zona di Parma.

Aprostocetus flavifrons: Specie citata per l'Italia da fonte attendibile, ma senza precisazione di località.

Aprostocetus invidus: Specie citata per l'Italia da fonte attendibile, ma senza precisazione di località.

Aprostocetus metra: Specie citata per l'Italia da fonte attendibile, ma senza precisazione di località.

Aprostocetus rubi: Specie citata per l'Italia da fonte attendibile, ma senza precisazione di località.

Aprostocetus toddaliae: Il reperto richiede conferma.

Aprostocetus westwoodi: Specie citata per l'Italia da fonte attendibile, ma senza precisazione di località.

Baryscapus agrilorum: Il reperto richiede conferma.

Baryscapus pospelovi: Il reperto richiede conferma.

Neotrichoporoides dispersus: Specie citata per l'Italia da fonte attendibile, ma senza precisazione di località.

Quadrastichodella nova: Specie introdotta dall'Australia, associata alle piante di Eucalyptus.

Quadrastichus anysis: Specie citata per l'Italia da fonte attendibile, ma senza precisazione di località.

Quadrastichus brevinervis: Specie citata per l'Italia da fonte attendibile, ma senza precisazione di località.

Quadrastichus pedicellaris: Specie citata per l'Italia da fonte attendibile, ma senza precisazione di località.

Tamarixia pronomus: Specie citata per l'Italia da fonte attendibile, ma senza precisazione di località.

Tamarixia pubescens: Specie citata per l'Italia da fonte attendibile, ma senza precisazione di località.

Tetrastichus atratulus: Specie citata per l'Italia da fonte attendibile, ma senza precisazione di località.

Tetrastichus cecidomyiae: Specie inquirenda.

Tetrastichus heeringi: Specie citata per l'Italia da fonte attendibile, ma senza precisazione di località.

Tetrastichus lyridice: Il reperto richiede conferma.

Achrysocharoides nigricoxae: Specie citata per l'Italia da fonte attendibile, ma senza precisazione di località.

Achrysocharoides splendens: Specie citata per l'Italia da fonte attendibile, ma senza precisazione di località.

Ceraninus menes: Il reperto richiede conferma.

Chrysocharis ainsliei: Specie introdotta dalla regione Nearctica.

Entedon crassiscapus: Specie citata per l'Italia da fonte attendibile, ma senza precisazione di località.

Holcopelte obscura: Specie citata per l'Italia da fonte attendibile, ma senza precisazione di località.

Omphale coilus: Il reperto richiede conferma.

Elasmidae

Elasmus Westwood, 1833

Elasmus albipennis Thomson, 1878 (N, Sa)
Elasmus elongatus Ferrière, 1947 (N)
Elasmus flabellatus (Fonscolombe, 1832) (N, S, Si)
Elasmus giraudi Ferrière, 1947 (S)
Elasmus schmitti Ruschka, 1920 (N)
Elasmus steffani Viggiani, 1967 (S)
Elasmus unicolor (Rondani, 1877) (*)
Elasmus vibicellae Ferrière, 1947 (S)
Elasmus viridiceps Thomson, 1878 (N)

Note

Elasmus unicolor: Specie citata per l'Italia da fonte attendibile, ma senza precisazione di località.

Aphelinidae

Aphelinus Dalman, 1820

Aphelinus abdominalis (Dalman, 1820) (N, S)
Aphelinus asychis Walker, 1839 (N, S)
Aphelinus chaonia Walker, 1839 (N)
Aphelinus daucicola Kurdjumov, 1913 (N)
Aphelinus mali (Haldeman, 1851) (N)
Aphelinus meridionalis Kalina, 1977 (Si)
Aphelinus varipes (Foerster, 1841) (N)

Aphytis Howard, 1900

Aphytis acrenulatus Rosen & De Bach, 1976 (S)
Aphytis albidus (Westwood, 1837) (N, S)
Aphytis aonidiae (Mercet, 1911) (S)
Aphytis bovelli (Malenotti, 1918) (*)
Aphytis chilensis Howard, 1900 (N)
Aphytis chrysomphali (Mercet, 1912) (Si)
Aphytis diaspidis (Howard, 1881) (N) (*)
Aphytis libanicus (Traboulsi, 1967) (S)
Aphytis maculicornis (Masi, 1911) (S)
Aphytis melinus De Bach, 1959 (Si)
Aphytis proclia (Walker, 1839) (S)

Centrodora Foerster, 1878

Centrodora brevifuniculata Viggiani, 1972 (S)
Centrodora cicadae Silvestri, 1918 (S)
Centrodora italica Ferrière, 1968 (Sa)
Centrodora livens (Walker, 1851) (S)

Marietta Motschulsky, 1863

Marietta picta (André, 1877) (S)

Mesidiopsis Novicky, 1930

Mesidiopsis subflavescens (Westwood, 1837) (S, Si)

Ablerus Howard, 1894

Ablerus celsus (Walker, 1839) (S)
Ablerus clisiocampae (Ashmead, 1894) (N)
Ablerus perspicuosus (Girault, 1916) (N)
Ablerus pulcherrimus Mercet, 1923 (N, S)

Coccobius Ratzeburg, 1852

Coccobius testaceus (Masi, 1909) (N, S)
Coccobius viggianii (Jasnosh, 1974) (S)

Coccophagoides Girault, 1915

Coccophagoides moeris (Walker, 1839) (S, Sa)

Coccophagus Westwood, 1833

Coccophagus cowperi Girault, 1917 (S)
Coccophagus gurneyi Compere, 1929 (N)
Coccophagus insidiator (Dalman, 1825) (S)
Coccophagus lycimnia (Walker, 1839) (N, S)
Coccophagus matsuyamensis Ishihara, 1977 (*)
Coccophagus pulchellus Westwood, 1833 (S)
Coccophagus saissetiae Annerius & Mynhardt, 1979 (S)
Coccophagus scutellaris (Dalman, 1825) (N, S)
Coccophagus varius Silvestri, 1915 (S)

Encarsia Foerster, 1878

Encarsia agilior (Berlese, 1917) (*)
Encarsia aleurochitonis (Mercet, 1931) (S)
Encarsia aleuroilicis Viggiani, 1982 (S)
Encarsia aleurotubae Viggiani, 1982 (S)

Encarsia aspidioticola (Mercet, 1929) (S)
Encarsia asterobemisiae Viggiani & Mazzone, 1980 (S)
Encarsia berlesei (Howard, 1906) (N, S)
Encarsia citrina (Craw, 1891) (S, Si)
Encarsia coryli Viggiani, 1981 (S)
Encarsia dichroa (Mercet, 1930) (S, Si)
Encarsia ectophaga (Silvestri, 1935) (N) (*)
Encarsia elegans Masi, 1911 (S)
Encarsia elongatula Viggiani, 1987 (S)
Encarsia fasciata (Malenotti, 1917) (N, S)
Encarsia formosa Gahan, 1924 (S, Si)
Encarsia gautieri (Mercet, 1928) (S, Si)
Encarsia gigas (Tchumakova, 1957) (N, S)
Encarsia herndoni (Girault, 1935) (S, Si)
Encarsia inaron (Walker, 1839) (N, S)
Encarsia inquirenda (Silvestri, 1931) (S, Si)
Encarsia lahorensis (Howard, 1911) (N, S, Si)
Encarsia leucaspidis (Mercet, 1912) (N, S)
Encarsia longicornis Mercet, 1928 (S)
Encarsia lounsburyi (Berlese & Paoli, 1916) (S)
Encarsia lutea (Masi, 1919) (S, Si)
Encarsia margaritiventris (Mercet, 1931) (S)
Encarsia meritoria Gahan, 1927 (S, Si)
Encarsia olivina (Masi, 1911) (S, Si)
Encarsia pergandiella Howard, 1907 (S, Si)
Encarsia perniciosi Tower, 1913 (N, S, Si)
Encarsia pseudopartenopea Viggiani & Mazzone, 1980 (S?)
Encarsia silvestrii Viggiani & Mazzone, 1979 (S, Si)
Encarsia transvena (Timberlake, 1926) (S)
Encarsia tricolor Foerster, 1878 (N, S, Si)

***Euryischia* Riley, 1889**

Euryischia inopinata Masi, 1907 (S, Si)

***Pteroptrix* Westwood, 1833**

Pteroptrix bicolor (Howard, 1898) (S)
Pteroptrix dimidiata Westwood, 1833 (S)
Pteroptrix lauri (Mercet, 1911) (S)
Pteroptrix longiclava (Girault, 1915) (N, S)
Pteroptrix maritima Nikolskaja, 1952 (S)
Pteroptrix opaca Erdös, 1956 (S)
Pteroptrix orientalis (Silvestri, 1909) (S)
Pteroptrix smithi (Compère, 1956) (N) (*)

***Eretmocerus* Haldeman, 1850**

Eretmocerus corni Haldeman, 1850 (S)
Eretmocerus longicornis Viggiani & Battaglia, 1983 (S)
Eretmocerus mundus Mercet, 1931 (S)
Eretmocerus roseni Gerling, 1972 (Si)
Eretmocerus siphonini Viggiani & Battaglia, 1983 (S, Si)

Cales Howard, 1907

Cales noacki Howard, 1907 (N, S, Si)

Note

Aphytis boveli: Specie citata per l'Italia da fonte attendibile, ma senza precisazione di località.
Aphytis diaspidis: Specie introdotta dagli USA.
Coccophagus matsuyamensis: Specie citata per l'Italia da fonte attendibile, ma senza precisazione di località.
Encarsia agilior: Specie citata per l'Italia da fonte attendibile, ma senza precisazione di località.
Encarsia ectophaea: Specie introdotta dal Sud America.
Pteroptrix smithi: Specie introdotta dalla Cina.

Signiphoridae

Clytina Erdös, 1957

Clytina giraudi Erdös, 1957 (N)

Signiphora Ashmead, 1880

Signiphora merceti Malenotti, 1917 (N)

Thysanus Walker, 1840

Thysanus ater Haliday in Walker, 1840 (S)

Agaonidae

Blastophaga Gravenhorst, 1827

Blastophaga psenes (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)

Eupristina Saunders, 1883

Eupristina verticillata Waterston, 1921 (Si)

Odontofroggattia Ishii, 1934

Odontofroggattia galili Wiebes, 1980 (Si)

Philotrypesis Foerster, 1878

Philotrypesis caricae (Linnaeus, 1758) (S)

Eucharitidae

Eucharis Latreille, 1809

Eucharis adscendens (Fabricius, 1787) (N, S)

Stilbula Spinola, 1811

Stilbula cyniformis (Rossi, 1792) (N, S)

Philomides Haliday, 1862

Philomides paphius Haliday, 1862 (Si)

Thoracantha Latreille, 1825

Thoracantha bella Foerster, 1859 (Si)

Ormyridae

Ormyrus Westwood, 1832

Ormyrus badius De Stefani, 1897 (Si)

Ormyrus chrysidiformis (De Stefani, 1897) (Si)

Ormyrus fereniger (De Stefani, 1897) (Si)

Ormyrus gratiosus (Foerster, 1860) (N, S)

Ormyrus nitidulus (Fabricius, 1804) (N, Si)

Ormyrus orientalis Walker, 1871 (N, S)

Ormyrus papaveris (Perris, 1840) (N, S)

Ormyrus punctiger Westwood, 1832 (N, S, Si, Sa)

Trichogrammatidae

Aphelinoidea Girault, 1911

Aphelinoidea dolichoptera (Nowicki, 1934) (S)

Chaetostricha Haliday in Walker, 1851

Chaetostricha similis (Silvestri, 1917) (S)
Chaetostricha walkeri (Foerster, 1851) (S, Sa)

Epoligosita Girault, 1916

Epoligosita vera Viggiani, 1969 (S)

Lathromeris Foerster, 1856

Lathromeris cecidomyiiae Viggiani & Laudonia, 1994 (S)
Lathromeris scutellaris Foerster, 1856 (S)

Oligosita Walker, 1851

Oligosita acesstes (Walker, 1839) (N)
Oligosita anomala Viggiani, 1981 (Sa)
Oligosita krygeri Girault, 1929 (N)
Oligosita lutulenta Nowicki, 1940 (N)
Oligosita mediterranea Nowicki, 1935 (*)
Oligosita nowickii Viggiani, 1981 (S)
Oligosita pallida Kryger, 1918 (N, S)
Oligosita phaneropterae Viggiani, 1981 (S)
Oligosita servadeii Viggiani, 1982 (*)

Ophioneurus Ratzeburg, 1852

Ophioneurus longiclavatus Viggiani, 1974 (N)

Poropoea Foerster, 1851

Poropoea defilippii Silvestri, 1916 (S)
Poropoea stollwerckii Foerster, 1851 (S)

Soikiella Nowicki, 1934

Soikiella mongibelli Nowicki, 1934 (Si)

Trichogramma Westwood, 1833

Trichogramma cephalciae Hochmut & Martinek, 1963 (N)
Trichogramma dendrolimi Matsumura, 1926 (N, S)
Trichogramma embryophagum (Hartig, 1838) (N, S, Si)
Trichogramma evanescens Westwood, 1833 (N, S, Si)
Trichogramma minutum Riley, 1871 (S)
Trichogramma oleae Voegelé & Pointel, 1979 (S)
Trichogramma piceum Dyurich, 1987 (N)
Trichogramma semblidis (Aurivillius, 1897) (S)

Ufens Girault, 1911

Ufens foersteri (Kryger, 1918) (S)

Ufens minuta (Viggiani, 1989) (S)

Uscana Girault, 1911

Uscana spermophagi Viggiani, 1979 (S)

Note

Oligosita mediterranea: Specie citata per l'Italia da fonte attendibile, ma senza precisazione di località.

Oligosita servadeii: Specie citata per l'Italia da fonte attendibile, ma senza precisazione di località.

Mymaridae

Palaeomymar Meunier, 1901

Palaeomymar anomalum (Blood & Kruger, 1922) (S)

Alaptus Westwood, 1839

Alaptus fuscus Walker, 1846 (S)

Alaptus minimus Haliday, 1846 (S)

Alaptus pallidicornis Foerster, 1856 (S, Si)

Alaptus priesneri (Soyka, 1950) (S)

Anagrus Haliday, 1833

Anagrus atomus (Linnaeus, 1767) (N, S)

Anagrus breviphragma Soyka, 1956 (S)

Anagrus incarnatosimilis Soyka, 1955 (*)

Anagrus incarnatus Haliday, 1833 (N)

Anagrus mymaricornis (Bakkendorf, 1962) (*)

Anagrus silwoodensis Walker, 1979 (S)

Anagrus subfuscatus Foerster, 1847 (*)

Anagrus unilinearis Soyka, 1956 (*)

Anagrus ustulatus Haliday, 1833 (*)

Litus Haliday, 1833

Litus cynipseus Haliday, 1833 (N, S)

Stethynium Enock, 1909

Stethynium triclavatum Enock, 1909 (S)

Anaphes Haliday, 1833

Anaphes archettii Ghidini, 1945 (S)
Anaphes chrysomelae (Bakkendorf, 1960) (N, S)
Anaphes diana (Girault, 1911) (*)
Anaphes fabarius (Rondani, 1877) (N)
Anaphes flavipes (Foerster, 1841) (*)
Anaphes fuscipennis Haliday, 1833 (S)
Anaphes leptoceras Debauche, 1948 (Si)
Anaphes luna (Girault, 1914) (S)
Anaphes maialis Debauche, 1948 (S)
Anaphes nitens (Girault, 1931) (N)
Anaphes pannonica (Soyka, 1946) (N)
Anaphes stubaiensis (Soyka, 1949) (S)

Arescon Walker, 1846

Arescon iridescens (Enock, 1914) (S)

Camptoptera Foerster, 1856

Camptoptera aula Debauche, 1948 (S)
Camptoptera papaveris Foerster, 1856 (S)

Cleruchus Enock, 1909

Cleruchus subterraneus Viggiani, 1974 (N)

Erythmelus Enock, 1909

Erythmelus lygivorus Viggiani & Jesu, 1985 (S)
Erythmelus panis (Enock, 1909) (N, S)

Gonatocerus Nees, 1834

Gonatocerus ater Foerster, 1841 (S)
Gonatocerus cicadellae (Nikolskaja, 1951) (N)
Gonatocerus ovicenatus Leonard & Crosby, 1915 (S)
Gonatocerus pictus (Haliday, 1833) (S)
Gonatocerus terebrator (Foerster, 1847) (*)
Gonatocerus thyridea (Debauche, 1948) (*)
Gonatocerus tremulae (Bakkendorf, 1934) (*)
Gonatocerus vidanoi (Viggiani & Jesu, 1987) (N)

Mymar Curtis, 1829

Mymar taprobanicum Ward, 1875 (S)

Ooctonus Haliday, 1833

Ooctonus hemipterus Haliday, 1833 (N)

Ooctonus vulgatus Haliday, 1833 (N, S)

Polynema Haliday, 1833

Polynema gargarae Viggiani & Jesu, 1987 (N)

Polynema striaticorne Girault, 1911 (N)

Polynema synophropsis Viggiani & Jesu, 1992 (N)

Polynema woodi Hincks, 1950 (N)

Stephanodes Enock, 1909

Stephanodes similis (Foerster, 1847) (N, S)

Note

Anagrus incarnatosimilis: Specie citata per l'Italia da fonte attendibile, ma senza precisazione di località.

Anagrus mymaricornis: Specie citata per l'Italia da fonte attendibile, ma senza precisazione di località.

Anagrus subfuscatus: Specie citata per l'Italia da fonte attendibile, ma senza precisazione di località.

Anagrus unilinearis: Specie citata per l'Italia da fonte attendibile, ma senza precisazione di località.

Anagrus ustulatus: Specie citata per l'Italia da fonte attendibile, ma senza precisazione di località.

Anaphes diana: Specie citata per l'Italia da fonte attendibile, ma senza precisazione di località.

Anaphes flavipes: Specie citata per l'Italia da fonte attendibile, ma senza precisazione di località.

Gonatocerus terebrator: Specie citata per l'Italia da fonte attendibile, ma senza precisazione di località.

Gonatocerus thyridea: Specie citata per l'Italia da fonte attendibile, ma senza precisazione di località.

Gonatocerus tremulae: Specie citata per l'Italia da fonte attendibile, ma senza precisazione di località.

Chalcidoidea i.s.

Beatomus De Stefani, 1902

Beatomus lionatus De Stefani, 1902 (Si)

Proctotrupidae

Brachyserphus Hellén, 1941

Brachyserphus parvulus (Nees von Esenbeck, 1834) (N)

Codrus Panzer, 1801

Codrus niger Panzer, 1801 (N, S, Si)

Cryptoserphus Kieffer, 1907

Cryptoserphus aculeator (Haliday, 1839) (N)

Cryptoserphus dilatatus Townes, 1981 (N)

Cryptoserphus flavipes (Provancher, 1881) (N)

Cryptoserphus longitarsis (Thomson, 1858) (N)

Disogmus Foerster, 1856

Disogmus areolator (Haliday, 1839) (N)

Disogmus basalis (Thomson, 1858) (N)

Exallonyx Kieffer, 1904

Exallonyx ater Nees von Esenbeck, 1834 (N)

Exallonyx brevicornis (Haliday, 1839) (N)

Exallonyx confusus (Nixon, 1938) (N)

Exallonyx crenicornis (Nees von Esenbeck, 1834) (N, S)

Exallonyx formicarius (Kieffer, 1904) (N)

Exallonyx ligatus (Nees von Esenbeck, 1834) (N, S, Si, Sa)

Exallonyx longicornis (Nees von Esenbeck, 1834) (N)

Exallonyx nixoni Townes, 1981 (N)

Exallonyx pallidistigma Morley, 1922 (S)

Exallonyx quadriceps (Ashmead, 1893) (N)

Exallonyx subserratus Kieffer, 1908 (N)

Phaenoserphus Kieffer, 1908

Phaenoserphus borealis Hellén, 1941 (N)

Phaenoserphus fuscipes (Haliday, 1839) (N, S)

Phaenoserphus pallipes (Jurine, 1807) (N)

Phaenoserphus viator (Haliday, 1839) (N, S)

Phaneroserphus Pschorn-Walker, 1958

Phaneroserphus calcar (Haliday, 1839) (N)

Proctotrupes Latreille, 1796

Proctotrupes brachypterus (Schrank, 1780) (N)

Proctotrupes gravidator (Linnaeus, 1758) (N, Si)

Tretoserphus Townes, 1981

Tretoserphus foveolatus (Moeller, 1882) (N)

Heloridae

Helorus Latreille, 1802

Helorus anomalipes (Panzer, 1798) (N) (*)

Helorus nigripes Foerster, 1856 (N)

Helorus ruficornis Foerster, 1856 (N, S, Sa) (*)

Helorus striolatus Cameron, 1906 (N, S)

Note

Helorus anomalipes: Trattasi quasi sicuramente di un complesso di specie gemelle. Particolarmente differenziati risultano gli esemplari provenienti dalla Sardegna.

Helorus ruficornis: La sinonimia riportata, generalmente accettata, pare dubbia e probabilmente si tratta di due buone specie.

Diapriidae

Ismarus Haliday, 1835

Ismarus dorsiger (Curtis, 1831) (N)

Ismarus flavicornis (Thomson, 1858) (N)

Ismarus rugulosus Foerster, 1850 (N)

Acanopsilus Kieffer, 1908

Acanopsilus heterocerus (Haliday, 1857) (N, S)

Acanosema Kieffer, 1908

Acanosema nervosum (Thomson, 1859) (N)

Acanthopsilus Kieffer, 1908

Acanthopsilus zangherii Szabó, 1959 (N)

Aclista Foerster, 1856

Aclista acuta (Kieffer, 1909) (N, Sa)
Aclista alticollis (Thomson, 1859) (N, S)
Aclista arcuata (Kieffer, 1909) (N)
Aclista atriceps Kieffer, 1909 (N)
Aclista brachycera (Kieffer, 1910) (N)
Aclista brevicornis Kieffer, 1909 (N, S)
Aclista brevistilus Kieffer, 1909 (S)
Aclista doriai Kieffer, 1909 (S)
Aclista dubia (Kieffer, 1909) (N)
Aclista dubiosa (Kieffer, 1910) (N)
Aclista evanescens (Kieffer, 1910) (N, S)
Aclista filiformis (Kieffer, 1907) (N)
Aclista flavicornis (Kieffer, 1909) (N, S)
Aclista foersteri (Kieffer, 1910)
 Aclista foersteri foersteri (Kieffer, 1910) (N)
 Aclista foersteri abbreviata (Kieffer, 1910) (N)
Aclista fractinervis (Kieffer, 1910) (S)
Aclista fuscicornis (Kieffer, 1910) (N)
Aclista lanceolata Kieffer, 1909
 Aclista lanceolata pubescens Kieffer, 1909 (N)
 Aclista lanceolata fuscicornis Kieffer, 1909 (N)
 Aclista lanceolata longinervis Kieffer, 1909 (N)
Aclista longistilus Kieffer, 1909 (N)
Aclista manteroi (Kieffer, 1910) (N)
Aclista maura (Kieffer, 1910) (N)
Aclista monticola (Kieffer, 1910) (N)
Aclista parvula (Kieffer, 1910) (N)
Aclista rufifrons (Kieffer, 1910) (N)
Aclista seticornis (Kieffer, 1910) (N)
Aclista stigma Kieffer, 1909 (N)
Aclista striata Kieffer, 1909 (N)
Aclista striolata (Thomson, 1859) (N, Si)
Aclista sulcata Kieffer, 1909 (N)

***Acropiesta* Foerster, 1856**

Acropiesta filicornis Kieffer, 1909 (N)
Acropiesta macrocera (Thomson, 1859) (N)

***Aneuropria* Kieffer, 1911**

Aneuropria foersteri (Kieffer, 1910) (N, S)

***Anommatium* Foerster, 1856**

Anommatium ashmeadi Mayr, 1904 (N, S)

Belyta Jurine, 1807

Belyta abrupta Thomson, 1859 (N, Sa)
Belyta armata Kieffer, 1907 (S)
Belyta carinifrons (Kieffer, 1909) (N)
Belyta cataniensis Kieffer, 1909 (Si)
Belyta depressa Thomson, 1859 (N)
Belyta forticornis Cameron, 1887 (N)
Belyta fusciscapa Kieffer, 1909 (N)
Belyta insularis Kieffer, 1909 (S)
Belyta longifrons (Kieffer, 1909) (N)
Belyta quadridens Kieffer, 1909 (N)
Belyta quadrispinosa Kieffer, 1909 (N)
Belyta rugosicollis Kieffer, 1909 (N)
Belyta sanguinolenta Nees von Esenbeck, 1834 (N)
Belyta sricula Kieffer, 1909 (Si)
Belyta sulcigera (Kieffer, 1909) (N, S)
Belyta tenuicornis Kieffer, 1909 (N)
Belyta tripartita Kieffer, 1909 (N, S)
Belyta vanescens Kieffer, 1909 (S)
Belyta validicornis Thomson, 1859 (N)

Cinetus Jurine, 1807

Cinetus alpestris Kieffer, 1910 (N)
Cinetus angustatus Kieffer, 1910 (N)
Cinetus atriceps Kieffer, 1910 (N)
Cinetus brevipetiolatus Thomson, 1859 (N)
Cinetus ditomus (Kieffer, 1910) (N)
Cinetus excavatus Kieffer, 1910 (S)
Cinetus filicornis Thomson, 1858 (N)
Cinetus gracilicornis (Kieffer, 1910) (N)
Cinetus ilione Nixon, 1957 (N, S)
Cinetus iridipennis Lepelletier & Serville, 1825 (N, S)
Cinetus piceus Thomson, 1859 (N)
Cinetus transiens Nixon, 1957 (S)

Macrohynnis Foerster, 1856

Macrohynnis rufiventer Kieffer, 1908 (N)

Miota Foerster, 1856

Miota compressa (Thomson, 1859) (N, S)
Miota excavata Kieffer, 1910 (N)
Miota flavidicornis (Kieffer, 1910) (N)
Miota fungorum (Kieffer, 1910) (N, S)
Miota histrio (Kieffer, 1910) (N)

Miota macrocera (Kieffer, 1910) (N)
Miota monilicornis (Kieffer, 1910) (N)
Miota nitida (Kieffer, 1910) (N)
Miota perplexa (Kieffer, 1910) (N)
Miota polita (Thomson, 1859) (N)
Miota semirufa Kieffer, 1910 (N)

Opazon Haliday, 1857

Opazon princeps Nixon, 1957 (S)

Oxylabis Foerster, 1856

Oxylabis bisulca (Nees von Esenbeck, 1834) (N)
Oxylabis cameroni (Kieffer, 1909) (N)
Oxylabis haemorrhoidalis Kieffer, 1907 (N)
Oxylabis thomsoni Kieffer, 1916 (S)

Pantoclis Foerster, 1856

Pantoclis bidentata Kieffer, 1909
 Pantoclis bidentata bidentata Kieffer, 1909 (N, S)
Pantoclis brevistilus Kieffer, 1909
 Pantoclis brevistilus rufimanus Kieffer, 1909 (S)
Pantoclis crassinervis Kieffer, 1909 (N)
Pantoclis evanescens Kieffer, 1909 (N)
Pantoclis fulvicauda Kieffer, 1909 (N)
Pantoclis graeffei Kieffer, 1909 (N)
Pantoclis insignis Kieffer, 1909 (N)
Pantoclis lanceolata Kieffer, 1909 (N)
Pantoclis merope Nixon, 1957 (N)
Pantoclis microcera Kieffer, 1909
 Pantoclis microcera rufosignata Kieffer, 1909 (N)
Pantoclis nigriventris Kieffer, 1907
 Pantoclis nigriventris acuta Kieffer, 1909 (N, S)
 Pantoclis nigriventris obtusa Kieffer, 1909 (N)
 Pantoclis nigriventris fortidens Kieffer, 1909 (N)
Pantoclis rubrocincta Kieffer, 1909 (N)
Pantoclis scotica (Kieffer, 1909) (N)
Pantoclis similis (Thomson, 1859) (S)
Pantoclis sulcata (Thomson, 1859) (N)

Pantolyta Foerster, 1856

Pantolyta semirufa Kieffer, 1908 (N)

Pappia Szabó, 1974

Pappia puppii Szabó, 1974 (S)

Paroxylabis Kieffer, 1907

Paroxylabis spirifer Nixon, 1957 (S)

Psilomma Foerster, 1856

Psilomma dubia Kieffer, 1908 (N)

Rhynchopsilus Kieffer, 1908

Rhynchopsilus apterus Kieffer, 1908 (N)

Synacra Foerster, 1856

Synacra brevipennis Kieffer, 1910 (N, S)

Synacra flavistilus Kieffer, 1910 (N)

Synacra holconota Kieffer, 1910 (N)

Synacra sociabilis (Kieffer, 1904) (N)

Zygota Foerster, 1856

Zygota caecutiens (Kieffer, 1908) (N)

Zygota fossulata (Thomson, 1859) (N)

Zygota macroneura (Kieffer, 1909) (N)

Zygota microptera (Kieffer, 1908) (N)

Zygota microtoma (Kieffer, 1909) (N)

Zygota semirufa (Kieffer, 1909) (N)

Zygota spinosipes (Kieffer, 1908) (N)

Zygota striata (Kieffer, 1909)

Zygota striata striata (Kieffer, 1909) (N)

Zygota striata solarii (Kieffer, 1909) (N)

Aneurhynchus Westwood, 1832

Aneurhynchus filicornis Kieffer, 1911 (N)

Aneurhynchus galesiformis Westwood, 1832 (N)

Aneurhynchus gracilicornis Wall, 1971 (N)

Aneurhynchus isotomus Kieffer, 1911 (N)

Aneurhynchus micropterus Kieffer, 1911 (Sa)

Aneurhynchus nodicornis Marshall, 1867 (N, Si)

Aneurhynchus oviventris Thomson, 1858 (N)

Aneurhynchus pentatomus Thomson, 1858 (N)

Aneurhynchus ruficornis Thomson, 1859 (N)

Atomopria Kieffer, 1910

Atomopria fulvicornis Kieffer, 1911 (N)

Basalys Westwood, 1833

Basalys abrupta Thomson, 1858 (N, S)

Basalys bifoveata (Kieffer, 1911) (N)

Basalys collaris Kieffer, 1911 (N)

Basalys crassicornis Kieffer, 1911

Basalys crassicornis crassicornis Kieffer, 1911 (N)

Basalys crassicornis fulviclava Kieffer, 1911 (N)

Basalys cf. cymocles Nixon, 1980 (N)

Basalys erythropus Kieffer, 1911 (N, S)

Basalys exigua (Marshall, 1868) (N, S)

Basalys cf. formicarum (Kieffer, 1911) (N)

Basalys fulvicornis (Kieffer, 1911) (N)

Basalys fumipennis Westwood, 1833 (N)

Basalys helicicola (Kieffer, 1911) (N)

Basalys inaequalis (Kieffer, 1911) (N)

Basalys parva Thomson, 1859 (N)

Basalys cf. pedisequa (Kieffer, 1911) (N)

Basalys cf. rufocincta (Kieffer, 1911) (N)

Basalys rufosignata (Kieffer, 1911) (S)

Basalys stenoptera (Kieffer, 1911) (N)

Basalys stramineipes (Kieffer, 1911) (N)

Basalys tritoma Thomson, 1859 (N)

Cerapsilon Haliday, 1829

Cerapsilon sericeicornis (Spinola, 1808) (N)

Diapria Latreille, 1796

Diapria bina Kieffer, 1911 (N?, S?) (*)

Diapria conica (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa)

Entomacis Foerster, 1856

Entomacis biguttata (Kieffer, 1911) (S)

Entomacis bipunctata (Kieffer, 1911) (N)

Entomacis excisa (Kieffer, 1911) (N)

Entomacis laertes Nixon, 1980 (N)

Entomacis perplexa (Haliday, 1857) (N, S)

Entomacis subtruncata (Kieffer, 1909) (N)

Idiotypa Foerster, 1856

Idiotypa nigriceps Kieffer, 1911 (N)

Lepidopria Kieffer, 1911

Lepidopria pedestris Kieffer, 1911 (N)

Monelata Foerster, 1856

Monelata cincta (Haliday, 1857) (N, S)

Monelata solida (Thomson, 1859) (N)

Paramesius Westwood, 1832

Paramesius alpinus Kieffer, 1911 (N)

Paramesius brachypterus Thomson, 1859 (N)

Paramesius cameroni Kieffer, 1911

Paramesius cameroni apricans Kieffer, 1911 (N)

Paramesius pedestris Kieffer, 1911

Paramesius pedestris pedestris Kieffer, 1911 (S)

Paramesius pedestris luteipes Kieffer, 1911 (N)

Paramesius rufipes Fonscolombe, 1832 (N, S)

Paramesius vernus Kieffer, 1911 (S)

Paramesius westwoodi Fergusson, 1977 (N)

Plagiopria Huggert & Masner, 1983

Plagiopria passerai Huggert & Masner, 1983 (N, S)

Psilus Panzer, 1801

Psilus angulatus (Kieffer, 1906) (S)

Psilus cornutus Panzer, 1801 (N, S)

Psilus crassicornis (Kieffer, 1911) (N)

Psilus depressus (Kieffer, 1911) (N)

Psilus frontalis (Thomson, 1859) (N)

Psilus fuscipennis (Curtis, 1831) (N, S)

Psilus gestroi (Kieffer, 1911) (N, S)

Psilus gracilicornis (Kieffer, 1911) (N)

Psilus holopterus (Kieffer, 1911) (N)

Psilus integer (Kieffer, 1911) (Si)

Psilus kerteszi (Kieffer, 1911) (N, S)

Psilus mayeti (Kieffer, 1911) (N, S)

Psilus merceti (Kieffer, 1911) (N)

Psilus parvulus (Kieffer, 1911) (N)

Psilus ruficornis (Kieffer, 1911) (N)

Psilus rufitarsis (Kieffer, 1911) (N, S)

Psilus striatipennis (Kieffer, 1911) (N)

Psilus submonilis (Kieffer, 1911) (N)

Solenopsia Wasmann, 1899

Solenopsia imitatrix Wasmann, 1899 (N)

Spilomicrus Westwood, 1832

Spilomicrus annulicornis Kieffer, 1911 (N)

Spilomicrus antennatus (Jurine, 1807) (N, S)

Spilomicrus bipunctatus Kieffer, 1911

Spilomicrus bipunctatus bipunctatus Kieffer, 1911 (N)

Spilomicrus bipunctatus inchoatus Kieffer, 1911 (S)

Spilomicrus cursor Kieffer, 1911 (S)

Spilomicrus fuscipes Kieffer, 1911 (N)

Spilomicrus hemipterus Marshall, 1868 (N)

Spilomicrus integer Thomson, 1859 (N, S)

Spilomicrus niger (Kieffer, 1910) (N, S)

Spilomicrus pseudocursor Szabó, 1974 (S)

Spilomicrus rufitarsis Kieffer, 1911 (S)

Spilomicrus stigmatalis Westwood, 1831 (N)

Symphytopria Kieffer, 1910

Symphytopria facialis Kieffer, 1910 (S)

Symphytopria fulva Kieffer, 1910 (Si)

Symphytopria fusciceps Kieffer, 1910 (Sa)

Symphytopria nigroclavata Kieffer, 1910 (Sa)

Symphytopria trisulcata Kieffer, 1910 (N)

Symphytopria sp. (N) (*)

Tetramopria Wasmann, 1899

Tetramopria cf. *cincticollis* Wasmann, 1899 (S)

Trichopria Ashmead, 1893

Trichopria aequata (Thomson, 1859) (N, S, Si, Sa)

Trichopria atricornis Kieffer, 1911 (N, S)

Trichopria bifovea (Kieffer, 1912) (N)

Trichopria cameroni (Kieffer, 1909) (N)

Trichopria clavatipes (Kieffer, 1911) (N)

Trichopria cf. *compressa* (Thomson, 1859) (N)

Trichopria cf. *crassifemur* Nixon, 1980 (N)

Trichopria cursor (Kieffer, 1911) (Sa)

Trichopria cf. *elongata* Thomson, 1859 (N)

Trichopria erynniae (Kieffer, 1910) (N?, S)

Trichopria evanescens Kieffer, 1911 (N)

Trichopria inermis Kieffer, 1909 (N)

Trichopria longiclava (Masi, 1931) (N)

Trichopria longicornis (Thomson, 1859) (N, S)

Trichopria melanopa (Kieffer, 1907) (N)
Trichopria melanostola (Kieffer, 1907) (N)
Trichopria minima (Masi, 1931) (N)
Trichopria cf. miron Nixon, 1980 (N)
Trichopria cf. nigra (Nees von Esenbeck, 1834) (N)
Trichopria nigripes (Thomson, 1858) (N)
Trichopria oxygaster Masner, 1965 (N)
Trichopria cf. prema Nixon, 1980 (Si)
Trichopria sociabilis Masner, 1965 (N)
Trichopria tenuicornis (Thomson, 1859) (N)
Trichopria verticillata (Latreille, 1805) (N, S)
Trichopria wasmanni (Kieffer, 1911) (N, S)

Note

Aneuropria: Genere in Diapriinae secondo Johnson, 1992.

Belyta: Incl. subg. *Neobelyta* Hellén, 1964.

Diapria bina: Species inquirenda descritta genericamente di "Italia".

Psilus: Il genere *Coptera* Say, 1836 ha come specie-tipo una specie nearctica (*C. polita* Say, 1836). Non essendo ancora chiari i rapporti fra le specie nearctiche e le specie paleartiche attribuite a *Coptera*, il genere è qui trattato all'interno di *Psilus*, secondo la sistematica accettata da alcuni autori.

Symphytopria sp.: Raccolta sui Monti Berici.

Scelionidae

Amblyscelio Kieffer, 1913

Amblyscelio striaticeps Kieffer, 1913 (N)

Anteris Foerster, 1856

Anteris perplexus (Kieffer, 1908) (N)

Anteromorpha Dodd, 1913

Anteromorpha frequens Priesner, 1951 (N)

Apegus Foerster, 1856

Apegus araticeps Kieffer, 1913 (N)

Apegus brevicornis Kieffer, 1908 (N)

Apegus kerteszi Kieffer, 1908 (N)

Apegus longicornis Kieffer, 1908 (N)

Apegus minor Kieffer, 1913 (N)

Apegus reticulatus Kieffer, 1908 (Si)

Aradophagus Ashmead, 1893

Aradophagus brunneus (Masner & Huggert, 1979) (Si)

Aradophagus fasciatus Ashmead, 1893 (N)

Aradophagus microps Masner & Huggert, 1979 (Si)

Baeus Haliday, 1833

Baeus castaneus Kieffer, 1908 (N, S)

Baeus seminulum Haliday, 1833 (Si)

Baryconus Foerster, 1856

Baryconus europaeus (Kieffer, 1908) (S)

Baryconus graeffei (Kieffer, 1908) (N)

Baryconus punctatus (Kieffer, 1908) (S)

Baryconus rufipes Kieffer, 1908 (N)

Calliscelio Ashmead, 1893

Calliscelio mediterraneus (Kieffer, 1910) (N)

Calotelea Westwood, 1837

Calotelea sarrai Masner, 1976 (S, Si, Sa)

Embidobia Ashmead, 1895

Embidobia sicala Mineo & Maniglia, 1983 (Si)

Encyrtoscelio Dodd, 1914

Encyrtoscelio apterus (Szelényi, 1940) (N)

Encyrtoscelio cydni Caleca, 1995 (Sa)

Encyrtoscelio mediterraneus Caleca, 1995 (Si)

Encyrtoscelio turneri Waterston, 1927 (Si)

Gryon Haliday, 1833

Gryon artum (Kozlov, 1963) (Si)

Gryon bolivari (Giard, 1895) (N, S, Si, Sa)

Gryon bosellii Mineo & Szabó, 1978 (N, S, Si, Sa)

Gryon cydnoide (Priesner, 1951) (N, S, Si, Sa)

Gryon delucchii Mineo & Szabó, 1978 (Si)

Gryon exculptum (Foerster, 1861) (N, Si)

Gryon hospes (Kieffer, 1913) (N)

Gryon howardi (Morkreczki & Ogloblin, 1931) (N, S, Si, Sa)

Gryon hungaricum (Szabó, 1966) (Si)

Gryon kozlovi Mineo, 1990 (Si)
Gryon laraichii Mineo, 1979 (Si)
Gryon leptocorisae (Howard, 1885) (S, Si, Sa)
Gryon lymantriae (Masner, 1958) (Si)
Gryon misellum Haliday, 1833 (N, S, Si, Sa)
Gryon monspeliense (Picard, 1924) (N, Si)
Gryon muscaeforme (Nees von Esenbeck, 1834) (N, S, Si, Sa)
Gryon nicolai Mineo, 1979 (N)
Gryon pedestre (Kieffer, 1917) (N, Si)
Gryon rubrigaster (Szabó, 1966) (Si)
Gryon szaboi Mineo, 1992 (S, Si, Sa)

Holoteleia Kieffer, 1914

Holoteleia nigriceps (Kieffer, 1926) (N)

Hungarogryon Szabó, 1966

Hungarogryon moczari Szabó, 1966 (N, Si)

Idris Foerster, 1856

Idris aureonitens Szabó, 1965 (Si)
Idris flavicornis Foerster, 1856 (N, S)
Idris flavoclavatus (Kieffer, 1908) (N, S)
Idris lamelliscutellaris Szabó, 1965 (N, S)
Idris lucifugax (Kieffer, 1910) (N, S)
Idris meridionalis Masner, 1961 (S, Sa)
Idris nigroclavatus (Kieffer, 1908) (N)
Idris pedestris (Kieffer, 1908) (N, S)
Idris piceiventris (Kieffer, 1908) (N, S)
Idris priesneri Huggert, 1981 (N, S, Si)
Idris psammon Szabó, 1965 (N, Si)
Idris rufescens (Kieffer, 1908) (N, S, Si)
Idris semicastaneus (Kieffer, 1908) (N, Si)
Idris semiflavus (Kieffer, 1908) (N, S, Si)
Idris zonatus (Kieffer, 1910) (S, Si)

Macroteleia Westwood, 1835

Macroteleia bicolora Kieffer, 1908 (N)
Macroteleia graeffei Kieffer, 1908 (N)
Macroteleia nitida Kieffer, 1908 (N)
Macroteleia punctata (Kieffer, 1908) (N)

Mantibaria Kirby, 1900

Mantibaria seefelderiana (De Stefani-Perez, 1891) (N, S, Si)

Probaryconus Kieffer, 1908

Probaryconus spinosus (Kieffer, 1908) (N)

Scelio Latreille, 1805

Scelio elongatus Kieffer, 1908 (N, S)

Scelio longiventris Kieffer, 1908 (N)

Scelio vulgaris Kieffer, 1908 (N, Si)

Sparasion Latreille, 1802

Sparasion aeneus Kieffer, 1906 (N, Si)

Sparasion bicoronatus Kieffer, 1906

Sparasion bicoronatus bicoronatus Kieffer, 1906 (S, Sa)

Sparasion bicoronatus insularis Kieffer, 1913 (S)

Sparasion emarginatus Kieffer, 1906 (S)

Sparasion flavipes Kieffer, 1906 (N)

Sparasion frontalis Latreille, 1805 (N)

Sparasion glabricornis Kieffer, 1913

Sparasion glabricornis glabricornis Kieffer, 1913 (N)

Sparasion glabricornis viridellus Kieffer, 1913 (N)

Sparasion nigripes Kieffer, 1906 (*)

Sparasion nigripes nigripes Kieffer, 1906

Sparasion nigripes indivisus Kieffer, 1913 (N)

Sparasion nigripes tripartitus Kieffer, 1913 (N)

Sparasion pallidinervis A. Costa, 1884 (Sa)

Sparasion punctatissimus Kieffer, 1906

Sparasion punctatissimus punctatissimus Kieffer, 1906 (N)

Sparasion punctatissimus variitarsis Kieffer, 1913 (S)

Sparasion spinosipes Kieffer, 1906 (N, Si)

Sparasion sublaevis Kieffer, 1906 (N, Si)

Sparasion tibialis Nees von Esenbeck, 1834 (N)

Sparasion vicinus Kieffer, 1906 (N, Si)

Thoron Haliday, 1833

Thoron metallicus (Curtis, 1830) (N, S)

Tiphodytes Bradley, 1902

Tiphodytes gerriphagus (Marchal, 1900) (N, Si)

Triteleia Kieffer, 1906

Triteleia dubia (Kieffer, 1906) (N, S, Si, Sa)

Teleas Latreille, 1809

Teleas quinquespinosus Szabó, 1955 (N)

Teleas rugosus Kieffer, 1908 (N)

Teleas striatus Kieffer, 1906 (N)

Trimorus Foerster, 1856

Trimorus abbreviatus (Kieffer, 1908) (N)

Trimorus agilis (Kieffer, 1908) (N)

Trimorus basalis (Kieffer, 1908) (N)

Trimorus bohemicus Masner, 1962 (N)

Trimorus brevipennis (Kieffer, 1908) (N)

Trimorus elongatus (Kieffer, 1908) (N)

Trimorus gestroi (Kieffer, 1908) (N)

Trimorus incompletus (Kieffer, 1908) (N)

Trimorus leviceps Kieffer, 1908

Trimorus leviceps italicus (Kieffer, 1908) (N, S)

Trimorus medon (Walker, 1836) (Si)

Trimorus neutralis Bin, 1974 (N)

Trimorus nitidulus (Thomson, 1859) (N)

Trimorus pallidimanus (Kieffer, 1908) (N)

Trimorus quinquespinosus (Kieffer, 1908) (N)

Trimorus rostratus (Kieffer, 1908) (N)

Trimorus sectigena (Kieffer, 1908) (N)

Trimorus subsulcatus (Kieffer, 1908) (N)

Trimorus tuberculatus (Kieffer, 1908) (N)

Trimorus vernalis (Kieffer, 1908) (Si, Sa)

Trisacantha Ashmead, 1887

Trisacantha flavipes (Kieffer, 1908) (N)

Xenomerus Walker, 1836

Xenomerus canariensis Huggert, 1974 (N, S, Si, Sa)

Xenomerus ergenna Walker, 1836 (N, S)

Paratelenomus Dodd, 1914

Paratelenomus graeffei (Kieffer, 1917) (N, S)

Telenomus Haliday, 1833

Telenomus abbreviatus Huggert, 1983 (S)

Telenomus angustatus (Thomson, 1860) (N)

Telenomus bombycis (Mayr, 1879) (N, S, Sa)

Telenomus chloropus (Thomson, 1860) (N, S)

Telenomus chrysopae (Ashmead, 1893) (N, S, Si)
Telenomus coccivorus (Mayr, 1879) (N)
Telenomus depressus Szabó, 1975 (N, S)
Telenomus eumicrosomoides Huggert, 1983 (S)
Telenomus heteropterus (Haliday, 1833) (S)
Telenomus heydeni Mayr, 1879 (Si)
Telenomus hysteropteri Bin, 1975 (N)
Telenomus incisus Huggert, 1983 (S)
Telenomus laeviusculus (Ratzeburg, 1844) (*)
Telenomus lopicida Silvestri, 1932 (N, S, Si)
Telenomus maruzzae Mineo, 1978 (Si)
Telenomus mayri (Kieffer, 1879) (*)
Telenomus phalaenarum (Nees von Esenbeck, 1834) (N)
Telenomus pseudothus Szabó, 1978 (S)
Telenomus sacchii Ogloblin, 1930 (N, S)
Telenomus stenoceps Szabó, 1978 (N, S)
Telenomus terebrans (Ratzeburg, 1834) (N)
Telenomus truncatus (Nees von Esenbeck, 1834) (S)
Telenomus turkarkandas Szabó, 1981 (N, S, Si)
Telenomus viggianii Mineo, 1978 (Si)

Trissolcus Ashmead, 1893

Trissolcus alpestris (Kieffer, 1909) (N)
Trissolcus basalis (Wollaston, 1858) (N, S)
Trissolcus cultratus (Mayr, 1879) (N)
Trissolcus flavipes (Thomson, 1860) (S, Si)
Trissolcus manteroi (Kieffer, 1909) (N)
Trissolcus pentatoma (Rondani, 1874) (N)
Trissolcus rufiventris (Mayr, 1908) (S, Si)
Trissolcus semistriatus (Nees von Esenbeck, 1834) (N, Si)
Trissolcus simoni (Mayr, 1897) (N, S, Si)
Trissolcus vassilievi (Mayr, 1903) (Si)

Note

Sparasion nigripes: Specie segnalata per l'Italia da fonte attendibile, senza indicazione di località.

Telenomus laeviusculus: Specie segnalata per l'Italia da fonte attendibile, senza indicazione di località.

Telenomus mayri: Specie segnalata per l'Italia da fonte attendibile, senza indicazione di località.

Platygasteridae

Inostemma Haliday, 1833

Inostemma biroi (Szelényi, 1938) (N)
Inostemma boscii (Jurine, 1807) (N)
Inostemma favo Walker, 1838 (N)
Inostemma mediterranea (Kieffer, 1916) (Si)
Inostemma menippus Walker, 1835 (N)
Inostemma walkeri Kieffer, 1914 (N)

Isostasius Foerster, 1856

Isostasius punctiger (Nees von Esenbeck, 1834) (N)

Amitus Haldeman, 1850

Amitus aleurotubae Viggiani & Mazzone, 1982 (S)
Amitus minervae Silvestri, 1911 (S, Si)
Amitus rugosus Viggiani & Mazzone, 1982 (S)
Amitus spiniferus (Bréthes, 1914) (N, Si)
Amitus vesuvianus Viggiani & Mazzone, 1982 (S)

Amblyaspis Foerster, 1856

Amblyaspis tritici (Haliday, 1835) (N)

Gastrotrypes Brues, 1922

Gastrotrypes caudatus Brues, 1922 (S)
Gastrotrypes spatulatus Brues, 1922 (S)

Isocybus Foerster, 1856

Isocybus levis Kieffer, 1916 (N)
Isocybus luteicoxis Kieffer, 1916 (N)
Isocybus mediterraneus Kieffer, 1916 (N)
Isocybus pallidicornis (Thomson, 1859) (N)
Isocybus rufiventris Kieffer, 1916 (N)

Leptacis Foerster, 1856

Leptacis bitensis (Kieffer, 1916) (N)
Leptacis ozines (Walker, 1835) (N)
Leptacis tipulae (Kirby, 1798) (N)
Leptacis vernicola (Kieffer) (N)

Metanopedias Brues, 1910

Metanopedias lasiopterae (Kieffer, 1916) (N, S)

Piestopleura Foerster, 1856

Piestopleura flavimanus Kieffer, 1926 (N)

Platygaster Latreille, 1809

Platygaster canestrinii (Rondani, 1866) (*)
Platygaster cecconii Kieffer, 1913 (S)
Platygaster cecidomyiae Ratzeburg, 1852 (*)
Platygaster compressicornis (Thomson, 1859) (N)
Platygaster dryomyiae (Silvestri, 1921) (S)
Platygaster ericeti Rondani, 1877 (*)
Platygaster eryngii Kieffer, 1916 (N)
Platygaster evadne Walker, 1835 (N)
Platygaster generalii Rondani, 1877 (*)
Platygaster nigra Dalla Torre, 1898 (*)
Platygaster oecclus Walker, 1835 (N)
Platygaster plotinus Walker, 1835 (N)
Platygaster vestinus Walker, 1835 (N)
Platygaster zangherii Szelényi, 1969 (N)

Platystasius Nixon, 1937

Platystasius othus Nixon, 1937 (S)

Synopeas Foerster, 1856

Synopeas circinnans Kieffer, 1916 (*)
Synopeas convexus Thomson, 1859 (Si)
Synopeas decurvatus (Nees von Esenbeck, 1834) (N)
Synopeas ventralis (Westwood, 1833) (N)

Trichacis Foerster, 1856

Trichacis illusor Kieffer, 1916 (N)
Trichacis pisis (Walker, 1835) (N)

Note

Platygaster canestrinii: Specie segnalata per l'Italia da fonte attendibile, senza indicazione di località.

Platygaster cecidomyiae: Specie segnalata per l'Italia da fonte attendibile, senza indicazione di località.

Platygaster ericeti: Specie segnalata per l'Italia da fonte attendibile, senza indicazione di località.

Platygaster generalii: Specie segnalata per l'Italia da fonte attendibile, senza indicazione di località.

Platygaster nigra: Specie segnalata per l'Italia da fonte attendibile, senza indicazione di località.

Synopeas circinnans: Specie segnalata per l'Italia da fonte attendibile, senza indicazione di località.

Megaspilidae

Holophleps Kozlov, 1966

Holophleps brevigena Kozlov, 1966 (N)

Lagynodes Foerster, 1840

Lagynodes acuticornis (Kieffer, 1906) (N, S, Sa)

Lagynodes crassicornis Kieffer, 1906 (N)

Lagynodes occipitalis Kieffer, 1906 (S, Si, Sa)

Lagynodes pallidus (Boheman, 1832) (N, S)

Lagynodes thoracicus Kieffer, 1906 (S)

Typhlolagynodes Dessart, 1981

Typhlolagynodes phineus Dessart, 1981 (S)

Conostigmus Dahlbom, 1858

Conostigmus abdominalis (Boheman, 1832) (N)

Conostigmus basalis Kieffer, 1907 (N)

Conostigmus bipunctatus Kieffer, 1907 (N, S)

Conostigmus crassicornis (Boheman, 1832) (N, S, Si)

Conostigmus depressus Dessart, 1979 (N)

Conostigmus difformis (Boheman, 1832) (N)

Conostigmus divisifrons Kieffer, 1907 (N)

Conostigmus formiceti (Erichson, 1844) (N)

Conostigmus gestroi Kieffer, 1907 (N)

Conostigmus puncticeps (Thomson, 1858) (N)

Conostigmus rufipes (Nees von Esenbeck, 1834) (N)

Conostigmus rugiceps (Thomson, 1858) (N, S)

Conostigmus scutopunctatus Dessart, 1981 (N)

Conostigmus subspinosus Kieffer, 1907 (N, S)

Conostigmus triangularis (Thomson, 1858) (N)

Dendrocerus Ratzeburg, 1852

Dendrocerus aphidum (Rondani, 1877) (N)

Dendrocerus flavipes Kieffer, 1907 (N)

Dendrocerus halidayi (Curtis, 1829) (S, Si)

Dendrocerus punctipes (Boheman, 1832) (N)

Dendrocerus rectangularis (Kieffer, 1907) (N)

Dendrocerus solarii Kieffer, 1907 (N)

Megaspilus Westwood, 1829

Megaspilus dux (Curtis, 1829) (S)

Megaspilus striolatus (Thomson, 1858) (Sa)

Trichosteresis Foerster, 1856

Trichosteresis glabra (Boheman, 1832) (N, S)

Ceraphronidae

Aphanogmus Thomson, 1858

Aphanogmus abdominalis (Thomson, 1858) (N)

Aphanogmus claviger (Kieffer, 1907) (N, S, Si)

Aphanogmus crassiceps (Kieffer, 1907) (N, S)

Aphanogmus fulmeki Szelényi, 1940 (S, Si)

Aphanogmus fumipennis Thomson, 1858 (N, S)

Aphanogmus microneurus Kieffer, 1907 (N)

Aphanogmus monilicornis (Kieffer, 1907) (N, Sa)

Aphanogmus steinitzi Priesner, 1936 (S, Si)

Aphanogmus vicinus (Foerster, 1861) (N)

Ceraphron Jurine, 1807

Ceraphron atriceps Kieffer, 1907 (N)

Ceraphron bispinosus (Nees von Esenbeck, 1834) (N)

Ceraphron brevipennis Kieffer, 1907 (N, S)

Ceraphron cursor Kieffer, 1907 (N, S, Si)

Ceraphron humicola Masi, 1933 (S)

Ceraphron invreae Masi, 1933 (S)

Ceraphron longistriatus Dessart, 1972 (N)

Ceraphron pallipes (Thomson, 1858) (N)

Ceraphron pedes Foerster, 1861 (N, S)

Ceraphron pristomicrops Dessart, 1965 (N, S, Si)

Ceraphron serraticornis Kieffer, 1907 (N)

Ceraphron squamiger Kieffer, 1907 (N, S)

Ceraphron sulcatus Jurine, 1807 (N)

Ceraphron testaceipes Kieffer, 1904 (N)

Ceraphron tetraplastus Kieffer, 1907 (N)

Ceraphron thomsoni (Dalla Torre, 1890) (N, S, Si)

Ceraphron trissacantha Kieffer, 1907 (N)

Ceraphron xanthogaster Kieffer, 1907 (N)

Chrysididae

Cleptes Latreille, 1802

Cleptes aerosus Förster, 1853 (N)
Cleptes consimilis Buysson, 1887 (N, S, Si)
Cleptes ignitus (Fabricius, 1787) (*)
Cleptes nigritus Mercet, 1904 (N, S)
Cleptes nitidulus (Fabricius, 1793) (N, S)
Cleptes pallipes Lepeletier, 1806 (N, Sa)
Cleptes putoni Buysson, 1886 (N) (*)
Cleptes saussurei Mocsáry, 1889 (N) (*)
Cleptes semiauratus (Linnaeus, 1761) (N, S)
Cleptes semicyaneus Tournier, 1879 (N) (*)
Cleptes splendens (Fabricius, 1798) (N, S)

Elampus Spinola, 1804

Elampus ambiguus Dahlbom, 1854 (N)
Elampus bidens (Förster, 1853) (N, Si)
Elampus caeruleus Dahlbom, 1854 (N, S)
Elampus constrictus Förster, 1853 (S) (*)
Elampus putoni Buysson, 1892 (N) (*)
Elampus rufitarsis Tournier, 1879 (N?)
Elampus sanzii Gogorza, 1887 (N, S)
Elampus scutellaris Panzer, 1798 (N, S)
Elampus soror Mocsáry, 1889 (N)
Elampus spina Lepeletier, 1806 (N, S, Si, Sa)

Hedychridium Abeille, 1878

Hedychridium aereolum Buysson, 1893 (N, S)
Hedychridium aheneum (Dahlbom, 1854) (S) (*)
Hedychridium anale (Dahlbom, 1854) (*)
Hedychridium ardens (Coquebert, 1801) (*)
 Hedychridium ardens ardens (Coquebert, 1801) (N, S, Si, Sa)
 Hedychridium ardens homeopathicum Abeille, 1878 (N, S)
Hedychridium buyssoni Abeille, 1887 (N, S, Si)
Hedychridium chloropygum Buysson, 1888 (N, S, Sa)
Hedychridium coriaceum (Dahlbom, 1854) (N, S, Sa)
Hedychridium cupratum (Dahlbom, 1854) (N)
Hedychridium elegantulum Buysson, 1887
 Hedychridium elegantulum elegantulum Buysson, 1887 (N)
 Hedychridium elegantulum peloponnense Linsenmaier, 1968 (S)
Hedychridium etnaense Linsenmaier, 1968 (Si) (E)
Hedychridium femoratum (Dahlbom, 1854)
 Hedychridium femoratum femoratum (Dahlbom, 1854) (S?)
 Hedychridium femoratum gratiosum Abeille, 1878 (N, S)

Hedychridium flavipes (Eversmann, 1857) (N, S, Si, Sa)
Hedychridium incrassatum (Dahlbom, 1854) (Si)
Hedychridium infans Abeille, 1879 (N, S, Si, Sa)
Hedychridium integrum (Dahlbom, 1831) (N)
Hedychridium irregulare Linsenmaier, 1959 (N) (*)
Hedychridium jucundum Mocsáry, 1889 (N, S, Si, Sa)
Hedychridium krajniki Balthasar, 1946 (N, S)
Hedychridium lampas (Christ, 1791) (N, S)
Hedychridium mediocrum Linsenmaier, 1987 (N, S) (*)
Hedychridium monochroum Buysson, 1888 (N, S, Si)
Hedychridium moricei Buysson, 1904 (S)
Hedychridium palestinense Balthasar, 1953 (N)
Hedychridium reticulatum Abeille, 1879 (N, S, Sa)
Hedychridium rhodojanthinum Enslin, 1939 (Si) (*)
Hedychridium roseum (Rossi, 1790)
 Hedychridium roseum roseum (Rossi, 1790) (N, S, Si)
 Hedychridium roseum caputaureum Trautmann, 1919 (N, S?)
 Hedychridium roseum nanum Chevrier, 1870 (N, S)
Hedychridium sculpturatum (Abeille, 1877) (N, S, Si, Sa)
Hedychridium scutellare Tournier, 1878
 Hedychridium scutellare scutellare Tournier, 1878 (N, S, Si, Sa)
 Hedychridium scutellare sardiniense Linsenmaier, 1959 (Sa) (E)
Hedychridium subroseum Linsenmaier, 1959 (*)
 Hedychridium subroseum prochloropygum Linsenmaier, 1959 (S)
Hedychridium wolffi Linsenmaier, 1959 (Sa) (E)
Hedychridium zelleri (Dahlbom, 1845) (N)

***Hedychrum* Latreille, 1802**

Hedychrum chalybaeum Dahlbom, 1854 (Si ?)
Hedychrum gerstaeckeri Chevrier, 1869 (N, S, Si)
Hedychrum longicolle Abeille, 1877 (N, S, Si, Sa)
Hedychrum luculentum Förster, 1853 (N?, S?) (*)
Hedychrum niemelai Linsenmaier, 1959 (N, S, Si)
Hedychrum nobile (Scopoli, 1763)
 Hedychrum nobile nobile (Scopoli, 1763) (N, S, Si, Sa)
 Hedychrum nobile antigai Buysson, 1896 (S)
Hedychrum rufipes Buysson, 1893 (Sa)
Hedychrum rutilans Dahlbom, 1854 (N, S, Sa)
Hedychrum virens Dahlbom, 1854 (N)

***Holopyga* Dahlbom, 1845**

Holopyga amoenula Dahlbom, 1845 (*)
Holopyga austrialis Linsenmaier, 1959 (S) (*)
Holopyga chrysonota Förster, 1853 (N, S, Si, Sa)
Holopyga fervida (Fabricius, 1781) (N, S, Si, Sa)
Holopyga ignicollis Dahlbom, 1854 (N, S, Si, Sa)

Holopyga inflammata (Förster, 1853) (N, S, Sa)
Holopyga jurinei Chevrier, 1862 (N, S, Si, Sa)
Holopyga lucida (Lepeletier, 1806) (N, S)
Holopyga ovata Dahlbom, 1854 (*)
 Holopyga ovata ovata Dahlbom, 1854 (N, S, Si, Sa)
 Holopyga ovata proviridis Linsenmaier, 1959 (S)
Holopyga punctatissima Dahlbom, 1854 (*)
 Holopyga punctatissima reducta Linsenmaier, 1959 (S)
Holopyga sardoa Invrea, 1952 (Sa) (E)
Holopyga viridis (Guerin, 1842) (S?, Sa?)

Omalus Panzer, 1801

Omalus aeneus (Fabricius, 1787)
 Omalus aeneus aeneus (Fabricius, 1787) (N, S, Sa)
 Omalus aeneus chevrieri Tournier, 1877 (N, S)
 Omalus aeneus puncticollis Mocsáry, 1887 (N)
Omalus biaccinctus (Buysson, 1893) (N, S, Sa)
Omalus chlorosomus Lucas, 1840 (*)
 Omalus chlorosomus mallorcanus Linsenmaier, 1959 (S)

Philoctetes Abeille, 1879

Philoctetes deflexus Abeille, 1878 (Sa) (*)
Philoctetes omaloides Buysson, 1888 (N)
Philoctetes sculpticollis (Abeille, 1878) (N, S, Si)
Philoctetes truncatus (Dahlbom, 1831) (N)

Pseudomalus Ashmead, 1902

Pseudomalus auratus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
Pseudomalus bidentulus (Lepeletier, 1806) (N, S, Si?)
Pseudomalus bogdanovi (Radoszkowski, 1877) (N, S)
Pseudomalus helveticus (Linsenmaier, 1959) (N?) (*)
Pseudomalus punctulatus (Dahlbom, 1854) (N, S, Si, Sa)
Pseudomalus pusillus (Fabricius, 1804) (N, S, Si)
Pseudomalus triangulifer (Abeille, 1877) (N, S, Sa)
Pseudomalus violaceus (Scopoli, 1763) (N, S, Si)

Euchroeus Latreille, 1809

Euchroeus purpuratus (Fabricius, 1787) (N, S)

Chrysidea Bischoff, 1913

Chrysidea persica (Radoszkowski, 1881) (N, S, Si, Sa)
Chrysidea pumila Klug, 1845
 Chrysidea pumila pumila Klug, 1845 (Si?)

Chrysidea pumila disclusa Linsenmaier, 1959 (N, S, Si, Sa)

Chrysis Linnaeus, 1761

- Chrysis abdominata* Linsenmaier, 1959 (Sa) (*)
- Chrysis aestiva* Dahlbom, 1854 (N?, S?) (*)
- Chrysis analis* Spinola, 1808 (N, S, Si?)
- Chrysis angustifrons* Abeille, 1878 (N, S, Si)
- Chrysis angustula* Schenck, 1856 (N, S)
- Chrysis auriceps* Mader, 1936 (N, S, Si)
- Chrysis aurofacies* Trautmann, 1926 (S) (*)
- Chrysis aurotecta* Abeille, 1878
 - Chrysis aurotecta aurotecta* Abeille, 1878 (Si?, Sa)
 - Chrysis aurotecta continentalis* Linsenmaier, 1959 (N, S, Si)
- Chrysis berlandi* Linsenmaier, 1959 (N, Sa) (*)
- Chrysis bicolor* Lepeletier, 1806 (N, S, Si?, Sa)
- Chrysis bidentata* Linnaeus, 1767
 - Chrysis bidentata bidentata* Linnaeus, 1767 (N, S, Si, Sa)
 - Chrysis bidentata prominea* Linsenmaier, 1959 (Si)
 - Chrysis bidentata vareana* Linsenmaier, 1959 (N)
- Chrysis bihamata* Spinola, 1838 (Sa)
- Chrysis calimorpha* Mocsáry, 1882
 - Chrysis calimorpha calimorpha* Mocsáry, 1882 (N)
 - Chrysis calimorpha siziliana* Linsenmaier, 1959 (Si)
- Chrysis cerastes* Abeille, 1877 (N, S, Si, Sa)
- Chrysis chlorospila* Klug, 1845 (Si)
- Chrysis chrysoprasina* Förster, 1853 (N)
- Chrysis chrysostigma* Mocsáry, 1889 (N, S, Si)
- Chrysis cingulicornis* Förster, 1853 (N?, S, Si, Sa)
- Chrysis coeruleiventris* Abeille, 1878 (N, S)
- Chrysis comparata* Lepeletier, 1806 (N, S, Si, Sa)
- Chrysis comta* Förster, 1853 (N, S, Si, Sa)
- Chrysis consanguinea* Mocsáry, 1889 (Si)
- Chrysis corsica* Buysson, 1896 (Sa) (E) (*)
- Chrysis cortii* Linsenmaier, 1951 (N)
- Chrysis cuprata* Dahlbom, 1854 (N, Si)
- Chrysis cupratoides* Bohart, 1990 (S) (E)
- Chrysis cylindrica* Eversmann, 1857 (S)
- Chrysis daphnis* Mocsáry, 1889 (Si, Sa)
- Chrysis diacantha* Mocsáry, 1889 (N?)
- Chrysis elegans* Lepeletier, 1806 (N, S, Si, Sa?)
- Chrysis emarginatula* Spinola, 1808 (N)
- Chrysis equestris* Dahlbom, 1845 (N) (*)
- Chrysis exsulans* Dahlbom, 1854 (Si) (*)
- Chrysis fasciata* Olivier, 1790 (N, Sa)
- Chrysis frivaldskyi* Mocsáry, 1882 (N, S, Si)
- Chrysis fugax* Abeille, 1878 (Si)
- Chrysis fulgida* Linnaeus, 1761 (N, S)

Chrysis germari Wesmael, 1817
 Chrysis germari germari Wesmael , 1839 (N, S, Si, Sa)
 Chrysis germari intergermari Linsenmaier, 1959 (N?, Si)
Chrysis gracillima Förster, 1853
 Chrysis gracillima gracillima Förster, 1853 (N, S, Si)
 Chrysis gracillima styx Trautmann, 1926 (Si)
Chrysis graelsii Guerin, 1842 (S, Si, Sa)
Chrysis gribodoi Abeille, 1877 (N, S, Si, Sa)
Chrysis grohmanni Dahlbom, 1854
 Chrysis grohmanni grohmanni Dahlbom, 1854 (N, S, Si, Sa)
 Chrysis grohmanni subaequalis Linsenmaier, 1968 (Sa) (E)
Chrysis helleni Linsenmaier, 1959 (N, S)
Chrysis hydropica Abeille, 1878 (N, S)
Chrysis ignita Linnaeus, 1758
 Chrysis ignita ignita Linnaeus, 1761 (N, S, Si, Sa)
 Chrysis ignita bischoffi Linsenmaier, 1959 (Sa)
 Chrysis ignita impressa Schenck, 1856 (N)
 Chrysis ignita melaensis Linsenmaier, 1968 (Sa) (E)
 Chrysis ignita schencki Linsenmaier, 1968 (N)
Chrysis immaculata Buysson, 1898 (S) (*)
Chrysis inaequalis Dahlbom, 1845 (N, S, Si, Sa?)
Chrysis indigotea Dufour-Perris, 1840 (N, S)
Chrysis insperata Chevrier, 1870 (N, S) (*)
Chrysis integra Fabricius, 1787 (*)
 Chrysis integra integra Fabricius, 1787 (S?)
 Chrysis integra erythromelas Dahlbom, 1854 (N, S, Si, Sa)
 Chrysis integra sricula Abeille, 1878 (N?, Si, Sa)
Chrysis interjecta Buysson, 1895 (N, S, Sa)
Chrysis iris Christ, 1791 (N)
Chrysis jucunda Mocsáry, 1889 (N)
Chrysis lanceolata Linsenmaier, 1959 (N, S)
Chrysis leachii Schuckard, 1836 (N, S, Si?)
Chrysis longula Abeille, 1879 (N, S)
 Chrysis longula subcoriacea Linsenmaier, 1959 (N, S)
Chrysis lucida Linsenmaier, 1951 (N)
Chrysis lusitanica Bischoff, 1910 (N)
Chrysis maderi Linsenmaier, 1959 (N, S, Si, Sa)
Chrysis manicata Dahlbom, 1854 (Si?)
Chrysis marginata Mocsáry, 1889 (*)
 Chrysis marginata aliunda Linsenmaier, 1959 (N, S)
Chrysis mediata Linsenmaier, 1951
 Chrysis mediata clarinicolis Linsenmaier, 1951 (N, S)
 Chrysis mediata mediata Linsenmaier, 1951 (N, S)
 Chrysis mediata mediadentata Linsenmaier, 1951 (S)
Chrysis millenaris Mocsáry, 1897 (Si) (*)
Chrysis mixta Dahlbom, 1854 (N, Si?, Sa?)
Chrysis mysticalis Linsenmaier, 1959 (N, Sa)
Chrysis obtusidens Dufour-Perris, 1840 (N)

Chrysis paglianoi Strumia, 1992 (Sa) (E)
Chrysis perezii Mocsáry, 1889 (Si)
Chrysis phryne Abeille, 1878 (N, S, Si)
Chrysis provenceana Linsenmaier, 1959 (S) (*)
Chrysis pseudobrevitarsis Linsenmaier, 1951 (N)
Chrysis pseudogribodoi Linsenmaier, 1959 (Sa) (E)
Chrysis pulchella Spinola, 1808 (N, S, Si)
Chrysis pulcherrima Lepeletier, 1806 (*)
 Chrysis pulcherrima pulcherrima Lepeletier, 1806 (N, S)
 Chrysis pulcherrima similitudina Linsenmaier, 1959 (S)
 Chrysis pulcherrima fenestrata Abeille, 1877 (N?)
Chrysis pyrrhina Dahlbom, 1845
 Chrysis pyrrhina pyrrhina Dahlbom, 1845 (N, S, Si, Sa)
 Chrysis pyrrhina siciliaca Linsenmaier, 1959 (Si)
Chrysis ragusae De Stefani, 1888 (N, S, Si)
Chrysis ramburi Dahlbom, 1854 (N?)
Chrysis ruddii Shuckard, 1837
 Chrysis ruddii ruddii Shuckard, 1837 (N, S, Si?)
 Chrysis ruddii brevimarginata Linsenmaier, 1959 (Si)
Chrysis rufitarsis Brullè, 1833 (N, S)
Chrysis rutilans Olivier, 1790 (N, S)
Chrysis rutiliventris Abeille, 1879
 Chrysis rutiliventris rutiliventris Abeille, 1879 (N, S, Si)
 Chrysis rutiliventris vanlithi Linsenmaier, 1959 (N?)
Chrysis scutellaris Fabricius, 1794 (N, S, Si)
Chrysis semicincta Lepeletier, 1806 (*)
 Chrysis semicincta semicincta Lepeletier, 1806 (N)
 Chrysis semicincta tricolor Lucas, 1849 (Si)
Chrysis sexdentata Christ, 1791 (N, S, Si, Sa)
Chrysis simplonica Linsenmaier, 1951 (N) (*)
Chrysis splendidula Rossi, 1790 (N, S, Si, Sa)
Chrysis subsinuata Marquet, 1878 (N, S, Si, Sa)
Chrysis succincta Linnaeus, 1767 (*)
 Chrysis succincta succincta Linnaeus, 1767 (N?)
 Chrysis succincta succinctula Dahlbom, 1854 (N, S, Si, Sa)
Chrysis taczanovskii Radoszkowski, 1878 (S)
Chrysis tingitana Bischoff, 1935 (S) (*)
Chrysis valesiana Frey-Gessner, 1887 (N?)
Chrysis varidens Abeille, 1878 (S, Sa)
Chrysis viridissima Klug, 1845 (*)
 Chrysis viridissima fasciolata Klug, 1845
Chrysis viridula Linnaeus, 1761 (*)
 Chrysis viridula viridula Linnaeus, 1761 (N, S?, Si?)
 Chrysis viridula gemma Abeille, 1878

***Chrysura* Dahlbom, 1845**

Chrysura austriaca (Fabricius, 1804) (N, S, Si, Sa)

Chrysura candens (Germar, 1817) (N, S, Si, Sa?)
Chrysura cuprea (Rossi, 1790) (N, S, Si, Sa)
Chrysura dichroa (Dahlbom, 1854)
 Chrysura dichroa dichroa (Dahlbom, 1854) (N, S, Si, Sa)
 Chrysura dichroa socia (Dahlbom, 1854) (Si)
Chrysura dichropsis (Buysson, 1891) (N, S) (*)
Chrysura filiformis (Mocsáry, 1889) (S) (*)
Chrysura hirsuta (Gerstaecker, 1869) (N, S)
Chrysura hybrida (Lepeletier, 1806)
 Chrysura hybrida hybrida (Lepeletier, 1806) (N)
 Chrysura hybrida sardiniensis (Linsenmaier, 1959) (Sa) (E)
Chrysura ignifrons Brullé, 1833 (N, S) (*)
Chrysura isabella (Trautmann, 1926) (N)
Chrysura laodamia (Buysson, 1900) (N, S, Si)
Chrysura loevigata (Abeille, 1879) (N, S, Si)
Chrysura lydiae (Mocsáry, 1889)
 Chrysura lydiae allegata (Linsenmaier, 1968) (S)
Chrysura oraniensis (Lucas, 1849)
 Chrysura oraniensis porphyrea (Mocsáry, 1889) (S, Si)
Chrysura purpureifrons (Abeille, 1878) (N, S, Si)
Chrysura radians (Harris, 1776) (N, S, Sa)
Chrysura refulgens (Spinola, 1806) (N, S, Si, Sa)
Chrysura rufiventris (Dahlbom, 1854) (N, Si)
Chrysura simplex (Dahlbom, 1854) (N, S, Si)
Chrysura sulcata (Dahlbom, 1845) (S, Si, Sa)
Chrysura trimaculata (Förster, 1853) (N)
Chrysura varicornis Spinola, 1838 (S, Si)

Praestochrysis Linsenmaier, 1959

Praestochrysis lusca (Fabricius, 1804) (N?) (*)
Praestochrysis megerlei (Dahlbom, 1854) (N, S)

Pseudospinolia Linsenmaier, 1951

Pseudospinolia humboldti (Dahlbom, 1845) (Si, Sa)
Pseudospinolia incrassata (Spinola, 1838) (S, Sa)
Pseudospinolia neglecta (Schuckard, 1836) (N, S, Si)
Pseudospinolia uniformis (Dahlbom, 1854) (N, S, Si)

Spinolia Dahlbom, 1854

Spinolia lamprosoma (Förster, 1853) (N)
Spinolia unicolor (Dahlbom, 1831) (N)

Spintharina Semenov, 1892

Spintharina integerrima (Klug, 1845) (N?) (*)

Spintharina versicolor (Spinola, 1808) (N, S, Si, Sa)

Stilbum Spinola, 1806

Stilbum calens (Fabricius, 1781)

Stilbum calens calens (Fabricius, 1781) (N, S, Si, Sa)

Stilbum calens enslini Linsenmaier, 1951 (Si)

Stilbum cyanurum (Förster, 1771)

Stilbum cyanurum cyanurum (Förster, 1771) (N, S, Si, Sa)

Stilbum cyanurum siculum Tournier, 1878 (N, S, Si, Sa)

Trichrysis Lichtenstein, 1876

Trichrysis cyanea (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa?)

Parnopes Latreille, 1796

Parnopes grandior (Pallas, 1771) (N, S, Si, Sa?)

Parnopes unicolor Gribodo, 1879 (Sa) (*)

Note

Cleptes ignitus: Citata per l'Italia da fonti attendibili ma senza precisa indicazione della località.

Cleptes putoni: La specie è nuova per l'Italia.

Cleptes saussurei: Potrebbe anche essere una ssp. di 001.0.007.0.

Cleptes semicyaneus: La specie è nuova per l'Italia.

Elampus constrictus: Nei lavori di Móczár il nome di questa specie è scambiato con quello di 002.0.007.0.

Elampus putoni: La specie è nuova per l'Italia.

Hedychridium aheneum: La specie è nuova per l'Italia.

Hedychridium anale: Citata per l'Italia da fonti attendibili ma senza precisa indicazione della località.

Hedychridium ardens: La sottospecie homeopathicum è nuova per l'Italia. Probabilmente si tratta di una specie distinta.

Hedychridium irregulare: La specie è nuova per l'Italia.

Hedychridium mediocrum: La specie è nuova per l'Italia.

Hedychridium rhodoanthinum: La specie è nuova per l'Italia.

Hedychridium subroseum: La specie è nuova per l'Italia.

Hedychrum luculentum: Italia è località tipica ma senza precisa indicazione della località.

Holopyga amoenula: Secondo Linsenmaier questa specie non farebbe parte della fauna italiana e le vecchie citazioni si riferirebbero in realtà alla affine *Holopyga ovata*. La presenza in Italia non è tuttavia da escludere in quanto la specie è presente in Francia ed in Grecia.

Holopyga austriale: La specie è nuova per l'Italia.

Holopyga ovata: La sottospecie proviridis è nuova per l'Italia.

Holopyga punctatissima: La specie è nuova per l'Italia.

Omalus chlorosomus: La specie è nuova per l'Italia.

Philoctetes: Specie tradizionalmente incluse in *Omalus* Panzer, 1801.

Philoctetes deflexus: La specie è nuova per l'Italia.

Pseudomalus: Specie tradizionalmente incluse in *Omalus* Panzer, 1801.

Pseudomalus helveticus: Rara specie alpina, è stata trovata vicino al confine italiano per cui è probabile la sua presenza anche in Italia.

Chrysis abdominata: La specie è nuova per l'Italia.

Chrysis aestiva: Specie citata più volte per l'Italia dagli autori antichi e, recentemente, per la Corsica. Secondo Linsenmaier in Italia sarebbe sostituita dalle specie affini *mixta* e *maderi* a cui appartengono tutti gli esemplari italiani che ho potuto esaminare.

Chrysis aurofacies: La specie è nuova per l'Italia.

Chrysis berlandi: La specie è nuova per l'Italia.

Chrysis corsica: La specie è nuova per l'Italia.

Chrysis equestris: La specie è nuova per l'Italia.

Chrysis exsulans: Specie nordafricana è stata raccolta a Lampedusa da M. Arnone & M. Romano.

Chrysis immaculata: La specie è nuova per l'Italia: specie nordeuropea raccolta a Roma, potrebbe trattarsi di una introduzione accidentale.

Chrysis insperata: La specie è nuova per l'Italia.

Chrysis integra: *erythromelas* fu descritta da Dahlbom in base ad esemplari di Sicilia: secondo Linsenmaier non è possibile stabilire se è sinonimo di *integra integra* Fabricius o di *integra sicula* Abeille.

Chrysis marginata: Specie probabilmente introdotta dai Balcani, segnalata dell'Italia per la prima volta da Linsenmaier (1968). Ho raccolto i primi esemplari presso Pisa nella metà degli anni settanta. Presso l'Istituto di Entomologia di Bologna vi sono esemplari emiliani degli anni sessanta. È diventata una specie comune in vari ambienti di Toscana, Emilia, Veneto e Lazio. È difficile che una specie così vistosa non sia mai stata segnalata in precedenza.

Chrysis millenaris: La specie è nuova per l'Italia.

Chrysis provenceana: La specie è nuova per l'Italia.

Chrysis pulcherrima: La specie è nuova per l'Italia.

Chrysis semicincta: La ssp. *tricolor* è nota del Nordafrica e dell'isola di Pantelleria.

Chrysis simplonica: La specie è nuova per l'Italia.

Chrysis succincta: La popolazione di Sardegna appartiene verosimilmente ad una nuova specie o sottospecie.

Chrysis tingitana: La specie è nuova per l'Italia: conosciuta del Marocco, potrebbe trattarsi di una introduzione accidentale.

Chrysis viridissima: Citata per l'Italia da fonti attendibili ma senza precisa indicazione della località.

Chrysis viridula: v. *gemma* è citata per l'Italia da fonti attendibili ma senza precisa indicazione della località.

Chrysura: Specie tradizionalmente incluse in *Chrysis* Linnaeus, 1761.

Chrysura dichropsis: La specie è nuova per l'Italia.

Chrysura filiformis: La specie è nuova per l'Italia.

Chrysura ignifrons: La specie è nuova per l'Italia.

Praestochrysis lusca: Descritta da Fabricius di provenienza "Italia" e ridescritta da Mader come *occulta* di Lombardia. Potrebbe trattarsi di esemplari introdotti. È specie diffusa in estremo oriente ed Australia ed introdotta nelle Hawaii.

Spintharina integerrima: L'appartenenza alla fauna italiana è dubbia e necessita conferma.

Parnopes unicolor: Secondo G.L. Agnoli (com. pers.) si tratterebbe in realtà di una nuova sottospecie di *grandior* endemica della Sardegna.

Bethylidae

Bethylus Latreille, 1802

Bethylus coniceps (Kieffer, 1904) (N?, S)
Bethylus dubius (Kieffer, 1904) (N)
Bethylus fuscicornis (Jurine, 1807) (N, S)
Bethylus gestroi Kieffer, 1904 (S)
Bethylus mandibularis (Kieffer, 1904) (S)
Bethylus pilosus (Kieffer, 1904) (N)
Bethylus rufipes (Kieffer, 1904) (Si)

Goniozus Förster, 1856

Goniozus claripennis (Förster, 1851) (N, S, Sa)
Goniozus gallicola (Kieffer, 1905) (N, S, Si)
Goniozus gestroi (Kieffer, 1904) (Sa)
Goniozus punctatus Kieffer, 1905 (Si) (E)

Allepyris Kieffer, 1905

Allepyris ruficrus Kieffer, 1906 (N) (E)

Cephalonomia Westwood, 1833

Cephalonomia benoiti Guiglia, 1956 (N) (E)
Cephalonomia brevipennis Kieffer, 1906 (N)
Cephalonomia cursor Westwood, 1881 (S)
Cephalonomia gallicola (Ashmead, 1887) (N)
Cephalonomia hypobori Kieffer, 1919 (S)
Cephalonomia nigriventris Masi, 1933 (S) (E)
Cephalonomia pontina Cerruti, 1957 (S) (E)
Cephalonomia rufa Kieffer, 1906 (N)

Epyris Westwood, 1832

Epyris bilineatus Thomson, 1862 (S)
Epyris foveatus Kieffer, 1904 (N)
Epyris gaullei Kieffer, 1906 (Si)
Epyris minor Kieffer, 1906 (S)
Epyris niger Westwood, 1832 (N, S, Si)
Epyris sublevis Kieffer, 1904 (S, Sa)

Glenosema Kieffer, 1905

Glenosema merceti (Kieffer, 1906) (S, Sa)

Holepyris Kieffer, 1905

Holepyris bidentatus Kieffer, 1904 (Sa) (E)
Holepyris crenulatus Kieffer, 1906 (N, S)
Holepyris dubius Kieffer, 1904 (S) (E)
Holepyris erythroderes Marshall, 1906 (S)
Holepyris hyalinipennis Kieffer, 1904 (Sa) (E)
Holepyris inermis Kieffer, 1906 (S) (E)
Holepyris multidentatus Kieffer, 1911 (N)
Holepyris pedestris Kieffer, 1904 (S) (E)
Holepyris rufitarsis Kieffer, 1906 (Sa) (E)

Isobrachium Förster, 1856

Isobrachium caprae Masi, 1932 (S) (E)

Laelius Ashmead, 1893

Laelius anthrenivorus Trani, 1909 (S)
Laelius elisae Russo, 1938 (S) (E)
Laelius fulvipes Kieffer, 1906 (N)

Plastanoxus Kieffer, 1905

Plastanoxus laevis (Ashmead, 1893) (*)
Plastanoxus westwoodi (Kieffer, 1914) (S)

Rhabdepyris Kieffer, 1904

Rhabdepyris fuscipes Kieffer, 1906 (S?) (E)

Sclerodermus Latreille, 1809

Sclerodermus abdominalis Westwood, 1839 (N)
Sclerodermus brevicornis (Kieffer, 1906) (N, S, Si)
Sclerodermus cereicollis (Kieffer, 1904) (S)
Sclerodermus domesticus Klug, 1809 (N, Si)
Sclerodermus fonscolombei (Westwood, 1881) (N)
Sclerodermus fuscicornis (Westwood, 1839) (*)

Codorcas Nagy, 1972

Codorcas cursor (Kieffer, 1906) (S)

Heterocoelia Dahlbom, 1854

Heterocoelia carcelii (Westwood, 1874) (N)

Heterocoelia halidaii (Westwood, 1874) (*)
Heterocoelia halidaiella (Westwood, 1874) (*)
Heterocoelia hungarica (Kieffer, 1906) (N)
Heterocoelia levicollis (Kieffer, 1906) (Si) (E)
*Heterocoelia nagy*i (Móczár, 1969) (N, Si)
Heterocoelia ruficollis (Kieffer, 1906) (N)

Mesitius Spinola, 1851

Mesitius erythrothorax Marshall, 1906 (Sa) (E)
Mesitius ghilianii Spinola, 1851 (Si)
Mesitius rufithorax Westwood, 1874 (*)

Metrionotus Móczár, 1970

Metrionotus nigriceps (Kieffer, 1906) (Si) (E)
Metrionotus parvulus (Kieffer, 1906) (Si)

Sulcomesitius Móczár, 1970

Sulcomesitius haemorrhoidalis (Magretti, 1897) (*)

Anisobrachium Kieffer, 1905

Anisobrachium incertum Kieffer, 1906 (S) (E)

Dissomphalus Ashmead, 1893

Dissomphalus proximus (Kieffer, 1904) (Sa)

Parascleroderma Kieffer, 1904

Parascleroderma berlandi Maneval, 1930 (N)
Parascleroderma csnora Argaman, 1988 (N)
Parascleroderma fiturcata Argaman, 1988 (S) (E)
Parascleroderma fulviceps Kieffer, 1906 (Si) (E)
Parascleroderma hindola Argaman, 1988 (Sa)
Parascleroderma nigriceps Kieffer, 1904 (S) (E)
Parascleroderma norcasta Argaman, 1988 (N) (E)
Parascleroderma rugulosum Kieffer, 1906 (S)
Parascleroderma unicolor (Westwood, 1839) (Si)
Parascleroderma varlinda Argaman, 1988 (Si)

Pristocera Klug, 1808

Pristocera depressa (Fabricius, 1805) (S)
Pristocera masii Giordani Soika, 1933 (N) (E)

Pseudisobrachium Kieffer, 1904

Pseudisobrachium intermedium Kieffer, 1904 (Sa) (E)

Pseudisobrachium subcyaneum (Haliday, 1838) (N)

Psilobethylus Kieffer, 1906

Psilobethylus luteus Kieffer, 1906 (S) (E)

Note

Plastanoxus laevis: Citata d'Italia, senza indicazione di località.

Sclerodermus fuscicornis: Citata d'Italia, senza indicazione di località.

Heterocoelia halidaii: Citata d'Italia, senza indicazione di località.

Heterocoelia halidaiella: Citata d'Italia, senza indicazione di località.

Mesitius rufithorax: Citata d'Italia, senza indicazione di località.

Sulcomesitius haemorrhoidalis: Citata d'Italia, senza indicazione di località.

Dryinidae

Aphelopus Dalman, 1823

Aphelopus atratus (Dalman, 1823) (N, S)

Aphelopus camus Richards, 1939 (N, Sa)

Aphelopus melaleucus (Dalman, 1818) (N, S)

Aphelopus nigriceps Kieffer, 1905 (N)

Aphelopus querceus Olmi, 1984 (N)

Aphelopus serratus Richards, 1939 (N, S)

Lonchodryinus Kieffer, 1905

Lonchodryinus ruficornis (Dalman, 1818) (N, S)

Anteon Jurine, 1807

Anteon abdulnouri Olmi, 1987 (Si)

Anteon arcuatum Kieffer, 1905 (N)

Anteon ephippiger (Dalman, 1818) (N, S)

Anteon flavicorne (Dalman, 1818) (N)

Anteon fulviventre (Haliday, 1828) (N, S)

Anteon gaullei Kieffer, 1905 (N, S)

Anteon infectum (Haliday, 1837) (N, Sa)

Anteon jurineanum Latreille, 1809 (N)

Anteon pubicorne (Dalman, 1818) (N, S, Si)

Anteon reticulatum Kieffer, 1905 (N, S)

Anteon tripartitum Kieffer, 1905 (N)

Bocchus Ashmead, 1893

- Bocchus italicus* Olmi, 1984 (N)
- Bocchus paglianoi* Olmi, 1984 (S) (E)
- Bocchus scaramozzinoi* Olmi, 1984 (Sa)
- Bocchus umber* Olmi, 1984 (S) (E)

Dryinus Latreille, 1804

- Dryinus collaris* (Linnaeus, 1767) (N, S, Si)
- Dryinus corsicus* Marshall, 1874 (N)
- Dryinus gryps* (Reinhard, 1863) (N)
- Dryinus niger* Kieffer, 1904 (N, S)
- Dryinus sanderi* Olmi, 1984 (N)
- Dryinus tarraconensis* Marshall, 1868 (N, S, Si)

Echthrodelphax R. Perkins, 1903

- Echthrodelphax hortusensis* (Abdul-Nour, 1976) (N, S)
- Echthrodelphax italicus* Olmi, 1984 (N, S)

Haplogonatopus R. Perkins, 1905

- Haplogonatopus oratorius* (Westwood, 1833) (N, S)

Gonatopus Ljungh, 1810

- Gonatopus albifrons* Olmi, 1993 (N, S)
- Gonatopus albolineatus* Kieffer, 1905 (S, Si, Sa)
- Gonatopus atlanticus* Olmi, 1984 (S) (*)
- Gonatopus bicolor* (Haliday, 1828) (N)
- Gonatopus bilineatus* Kieffer, 1904 (S)
- Gonatopus camelinus* Kieffer, 1904 (S, Si)
- Gonatopus clavipes* (Thunberg, 1827) (N, S, Si)
- Gonatopus distinguendus* Kieffer, 1905 (N, S)
- Gonatopus doderoi* (Olmi & Currado, 1974) (Sa)
- Gonatopus dromedarius* (A. Costa, 1882) (N, S, Sa)
- Gonatopus felix* (Olmi, 1984) (Sa)
- Gonatopus focarilei* (Olmi, 1984) (S) (E)
- Gonatopus formicarius* Ljungh, 1810 (N, S)
- Gonatopus formicicolus* (Richards, 1939) (N)
- Gonatopus helleni* (Raatikainen, 1961) (N, S)
- Gonatopus lunatus* Klug, 1810 (N, S)
- Gonatopus lycius* Olmi, 1989 (S)
- Gonatopus pedestris* Dalman, 1818 (N)
- Gonatopus planiceps* Kieffer, 1904 (S)
- Gonatopus plumbeus* Olmi, 1984 (S)
- Gonatopus rosellae* (Currado & Olmi, 1974) (N) (E)

Gonatopus solidus (Haupt, 1938) (N)
Gonatopus spectrum (Vollenhoven, 1874) (N)
Gonatopus striatus Kieffer, 1905 (N, S)
Gonatopus unilineatus Kieffer, 1904 (Sa)

Note

Gonatopus atlanticus: Citata d'Italia solo dell'isola di Linosa.

Sclerogibbidae

Sclerogibba Riggio & De Stefani-Perez, 1888

Sclerogibba crassifemorata Riggio & De Stefani-Perez, 1888 (S, Si, Sa) (*)

Cryptobethylus Marshall, 1905

Cryptobethylus mancinii Masi, 1933 (S, Sa) (*)

Poggiana Argaman, 1993

Poggiana pilosella Argaman, 1993 (Sa) (E) (*)

Note

Sclerogibba crassifemorata: Citata per la Sicilia soltanto dell'isola di Ustica.

Cryptobethylus mancinii: Citata per l'Italia centro-meridionale solo dell'isola di Capraia.

Poggiana pilosella: Citata solo dell'isola di Molarotto.

Embolemidae

Embolemus Westwood, 1833

Embolemus ruddii Westwood, 1833 (N, S, Si)

Sapygidae

Polochrum Spinola, 1806

Polochrum repandum Spinola, 1806 (N, S)

Sapyga Latreille, 1796

Sapyga clavicornis (Linnaeus, 1758) (N, S)

Sapyga quinquepunctata (Fabricius, 1781) (N, S, Si, Sa)

Sapyga similis (Fabricius, 1793) (N, S)

Sapygina Costa, 1887

Sapygina decemguttata (Jurine, 1807) (N, S)

Tiphiidae

Meria Illiger, 1807

Meria caspica Radoszkowski, 1887 (Si)

Meria cylindrica (Fabricius, 1793) (N, S)

Meria dimidiata (Spinola, 1808) (N)

Meria dorsalis (Fabricius, 1804) (S)

Meria latifasciata (Palma, 1869) (S, Si)

Meria tripunctata (Rossi, 1790) (N, S, Si, Sa)

Meria volvulus (Fabricius, 1798) (S, Si)

Poecilotiphia Cameron, 1902

Poecilotiphia lacteipennis (Saunders, 1901) (Si)

Poecilotiphia roussellii (Guerin, 1838) (S, Si, Sa)

Ludita Nagy, 1967

Ludita fulvipennis (Smith, 1879) (*)

Ludita villosa (Fabricius, 1793) (N, S)

Tiphia Fabricius, 1775

Tiphia femorata Fabricius, 1775 (N, S, Si, Sa)

Tiphia minuta Vander Linden, 1827 (N, S)

Tiphia tournieri Dalla Torre, 1897 (N)

Tiphia unicolor Lepeletier, 1845 (N, S, Si)

Note

Ludita fulvipennis: Specie citata per l'Italia da fonte attendibile ma senza precisazione di località.

Methochidae

Methocha Latreille, 1804

Methocha articulata (Latreille, 1792) (N, S)

Scoliidae

Megascolia Betrem, 1928

Megascolia bidens (Linnaeus, 1767) (N, S, Si)

Megascolia flavifrons (Fabricius, 1775)

Megascolia flavifrons flavifrons (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa)

Megascolia flavifrons haemorrhoidalis (Fabricius, 1787) (N, S)

Scolia Fabricius, 1775

Scolia erythrocephala Fabricius, 1798

Scolia erythrocephala nigrescens Saussure & Sichel, 1864 (N, S, Si)

Scolia galbula (Pallas, 1771) (N, S, Si)

Scolia hirta (Schrank, 1781)

Scolia hirta hirta (Schrank, 1781) (N, S, Si, Sa)

Scolia hirta unifasciata Cyrillo, 1787 (N, S, Si, Sa)

Scolia hortorum Fabricius, 1787 (N, S, Si)

Scolia insubrica (Scopoli, 1786) (N, S, Si)

Scolia neglecta Cyrillo, 1787 (S, Si, Sa)

Scolia sexmaculata (Müller, 1766)

Scolia sexmaculata sexmaculata (Müller, 1766) (N, S, Si, Sa)

Scolia sexmaculata biguttata Fabricius, 1804 (N)

Colpa Dufour, 1841

Colpa interrupta (Fabricius, 1781) (N, S, Si, Sa)

Colpa quinquecincta (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa)

Campsomeriella Betrem, 1941

Campsomeriella thoracica (Fabricius, 1787) (S, Si)

Dasyscolia Bradley, 1951

Dasyscolia ciliata (Fabricius, 1787) (Si, Sa)

Mutillidae

Blakeius Ashmead, 1903

Blakeius bipunctata (Latreille, 1792) (N)

Blakeius chiesii (Spinola, 1838)

Blakeius chiesii chiesii (Spinola, 1838) (Sa)

Blakeius chiesii negrei (Suarez, 1958) (S, Si)

Blakeius chiesii iberica (Suarez, 1958) (S)
Blakeius leopoldina (Invrea, 1955) (Si, Sa)

Myrmilla Wesmael, 1851

Myrmilla calva (Villiers, 1789) (N, S, Si, Sa)
Myrmilla capitata (Lucas, 1846) (N, S, Si, Sa)
Myrmilla erythrocephala (Latreille, 1792)
 Myrmilla erythrocephala erythrocephala (Latreille, 1792) (N, S, Si, Sa)
 Myrmilla erythrocephala bison (Costa, 1888) (Si)
Myrmilla mutica André, 1903 (N)

Sigilla Skorikov, 1927

Sigilla dorsata (Fabricius, 1798) (N)
Sigilla excoriata (Lepeletier, 1845) (Sa)

Mutilla Linnaeus, 1758

Mutilla barbara Linnaeus, 1758 (Si)
Mutilla brutia Petagna, 1787 (N, S, Si, Sa)
Mutilla europaea Linnaeus, 1758
 Mutilla europaea europaea Linnaeus, 1758 (N, S)
 Mutilla europaea laevigata Sichel & Radoszkowski, 1870 (N)
 Mutilla europaea notomelas André, 1903 (N)
Mutilla ghilianii Spinola, 1843 (S, Si, Sa)
Mutilla marginata Baer, 1848
 Mutilla marginata marginata Baer, 1848 (N, Si)
 Mutilla marginata insueta Invrea, 1964 (N)
Mutilla marocana (Olivier, 1811) (S, Si)
Mutilla quinquemaculata Cyrillo, 1787 (N, S, Si, Sa)

Tropidotilla Bischoff, 1920

Tropidotilla grisescens (Lepeletier, 1845) (N, S, Si)
Tropidotilla litoralis (Petagna, 1786) (N, S, Si, Sa)

Artiotilla Invrea, 1950

Artiotilla biguttata (Costa, 1858) (N, S, Si)

Dentilla Lelej, 1980

Dentilla erronea (André, 1902) (S, Si)

Smicromyrme Thomson, 1870

Smicromyrme agusii (Costa, 1884) (Sa)

Smicromyrme ausonia Invrea, 1950
 Smicromyrme ausonia ausonia Invrea, 1950 (N, S, Si)
 Smicromyrme ausonia etrusca Invrea, 1950 (S)
 Smicromyrme ausonia esterina Pagliano, 1983 (S, Si)
Smicromyrme balianii Invrea, 1932 (N)
Smicromyrme cingulata (Costa, 1858) (S)
Smicromyrme fusculina Invrea, 1955 (Sa)
Smicromyrme halensis (Fabricius, 1787) (N)
Smicromyrme ingauna Invrea, 1958 (N, S)
Smicromyrme lampedusia Invrea, 1957 (Si)
Smicromyrme ligustica Invrea, 1951
 Smicromyrme ligustica ligustica Invrea, 1951 (N)
 Smicromyrme ligustica borgiana Invrea, 1951 (N)
 Smicromyrme ligustica myrtacea Invrea, 1951 (N)
Smicromyrme lucasii (Smith, 1855) (N, S, Sa)
Smicromyrme melanolepis (Costa, 1884) (Si, Sa)
Smicromyrme mendizabali Suarez, 1956 (Sa)
Smicromyrme partita (Klug, 1835)
 Smicromyrme partita partita (Klug, 1835) (N, S, Si)
 Smicromyrme partita fasciaticollis (Spinola, 1843) (Si)
Smicromyrme perisii (Sichel & Radoszkowski, 1869) (Sa)
Smicromyrme punctata (Latreille, 1792) (N, S, Si)
Smicromyrme pusilla (Klug, 1835) (N, S, Si, Sa)
Smicromyrme quadripunctata (Lepeletier, 1845) (N, S, Si)
Smicromyrme ruficollis (Fabricius, 1794)
 Smicromyrme ruficollis ruficollis (Fabricius, 1794) (N, S, Si)
 Smicromyrme ruficollis ceresae Invrea, 1952 (Sa)
Smicromyrme rufipes (Fabricius, 1787) (N, S)
Smicromyrme scutellaris (Latreille, 1792) (N, S)
Smicromyrme sericeipes (André, 1903) (N, S, Sa)
Smicromyrme sicana (De Stefani, 1887) (N, S, Si, Sa)
Smicromyrme subcomata (Wesmael, 1852) (N, S)
Smicromyrme suberrata Invrea, 1957
 Smicromyrme suberrata suberrata Invrea, 1957 (S)
 Smicromyrme suberrata opistomelas Invrea, 1950 (Sa)
Smicromyrme sulcisia Invrea, 1955 (Sa)
Smicromyrme trioma Invrea, 1955 (Sa)
Smicromyrme varinella Invrea, 1960 (N, S)
Smicromyrme viduata (Pallas, 1773) (N, S, Si, Sa)

Trogaspidia Ashmead, 1899

Trogaspidia catanensis (Rossi, 1792) (S, Si)

Dasylabris Radoszkowski, 1885

Dasylabris atrata (Linnaeus, 1767) (Si)
Dasylabris maura (Linnaeus, 1758)

Dasylabris maura maura (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)
Dasylabris maura carinulata (Dalla Torre, 1897) (Sa)

Stenomutilla André, 1896

Stenomutilla argentata (Villers, 1789) (N, S)
Stenomutilla collaris (Fabricius, 1787) (Si)
Stenomutilla hottentotta (Fabricius, 1804) (Si)

Cystomutilla André, 1896

Cystomutilla ruficeps (Smith, 1855) (N, S, Si, Sa)

Myrmosidae

Myrmosa Latreille, 1796

Myrmosa atra Panzer, 1801 (N, S, Si, Sa)

Paramyrmosa Saussure, 1880

Paramyrmosa brunnipes (Lepeletier, 1845) (N, S, Si, Sa)

Krombeinella Pate, 1947

Krombeinella beaumonti (Invrea, 1953) (Si)
Krombeinella longicollis (Tournier, 1889) (N, S)
Krombeinella thoracica (Fabricius, 1793) (N, S, Si, Sa)

Formicidae

Leptanilla Emery, 1870

Leptanilla doderoi Emery, 1915 (Sa) (E)
Leptanilla revelierei Emery, 1870
Leptanilla revelierei sardoa Emery, 1916 (Sa) (E)

Amblyopone Erichson, 1842

Amblyopone denticulatum (Roger, 1859) (N, S)
Amblyopone impressifrons (Emery, 1869) (N, S, Si)

Proceratium Roger, 1863

Proceratium algericum (Forel, 1899) (S, Si)
Proceratium melinum (Roger, 1860) (N)

Cryptopone Emery, 1892

Cryptopone ochraceum (Mayr, 1855)

Cryptopone ochraceum ochraceum (Mayr, 1855) (N, S, Si)

Cryptopone ochraceum siculum (Emery, 1909) (Si) (E)

Hypoponera Santschi, 1938

Hypoponera abeillei (André, 1881) (N, S)

Hypoponera eduardi (Forel, 1894) (N, S, Si)

Hypoponera punctatissima (Roger, 1859) (N)

Hypoponera ragusai (Emery, 1895) (Si)

Ponera Latreille, 1804

Ponera coarctata (Latreille, 1802) (N, S, Si, Sa)

Ponera sulcitana Stefani, 1969 (Sa) (*)

Manica Jurine, 1807

Manica rubida (Latreille, 1802) (N, S)

Myrmica Latreille, 1804

Myrmica hellenica Forel, 1913 (N)

Myrmica laurae (Emery, 1907) (S) (E)

Myrmica lobicornis Nylander, 1846

Myrmica lobicornis lobicornis Nylander, 1846 (N)

Myrmica lobicornis alpina Staerke, 1927 (N)

Myrmica lobicornis apennina Staerke, 1927 (N, S)

Myrmica rubra (Linné, 1758) (N, S)

Myrmica ruginodis Nylander, 1846 (N)

Myrmica rugulosa Nylander, 1848 (N)

Myrmica sabuleti Meinert, 1861

Myrmica sabuleti sabuleti Meinert, 1861 (N, S, Si, Sa)

Myrmica sabuleti lonae Finzi, 1926 (N)

Myrmica samnitica Mei, 1987 (S) (E)

Myrmica scabrinodis Nylander, 1846 (N, S, Si)

Myrmica schencki Emery, 1894 (N, S, Si)

Myrmica specioides Bondroit, 1918 (N, S) (*)

Myrmica striata Finzi, 1926 (N) (*)

Myrmica sulcinodis Nylander, 1846 (N, S, Si?)

Stenamma Westwood, 1840

Stenamma debile (Foerster, 1850) (N, S, Si)

Stenamma petiolatum Emery, 1897 (N, S, Si?)

Stenamma sardoum Emery, 1915 (Sa) (E)
Stenamma striatulum Emery, 1894 (N, S, Sa)

***Aphaenogaster (Aphaenogaster)* Mayr, 1853**

Aphaenogaster (Aphaenogaster) campana Emery, 1878 (S)
Aphaenogaster (Aphaenogaster) inermis Emery, 1908 (S)
Aphaenogaster (Aphaenogaster) ionia Emery, 1915 (N, S, Si)
Aphaenogaster (Aphaenogaster) picena Baroni Urbani, 1971 (S) (E)
Aphaenogaster (Aphaenogaster) sardoa Mayr, 1853 (Si, Sa)
Aphaenogaster (Aphaenogaster) semipolita (Nylander, 1856) (Si) (E)
Aphaenogaster (Aphaenogaster) senilis Mayr, 1853 (Sa)
Aphaenogaster (Aphaenogaster) spinosa Emery, 1878
 Aphaenogaster (Aphaenogaster) spinosa spinosa Emery, 1878 (N, S, Sa)
 Aphaenogaster (Aphaenogaster) spinosa etrusca Baroni Urbani, 1968 (S) (E)
 Aphaenogaster (Aphaenogaster) spinosa nitida Emery, 1895 (S, Sa)

***Aphaenogaster (Attomyrma)* Emery, 1915**

Aphaenogaster (Attomyrma) dulcineae Santschi, 1919 (N)
Aphaenogaster (Attomyrma) epirotes (Emery, 1895) (N)
Aphaenogaster (Attomyrma) gibbosa (Latreille, 1798)
 Aphaenogaster (Attomyrma) gibbosa gibbosa (Latreille, 1798) (N)
 Aphaenogaster (Attomyrma) gibbosa fiorii Emery, 1915 (Si, Sa) (E)
Aphaenogaster (Attomyrma) italica Emery, 1916 (N, S)
Aphaenogaster (Attomyrma) muelleriana Wolf, 1914 (N)
Aphaenogaster (Attomyrma) ovaticeps (Emery, 1898) (N)
Aphaenogaster (Attomyrma) pallida (Nylander, 1848) (S, Si)
Aphaenogaster (Attomyrma) sricula Emery, 1908 (Si)
Aphaenogaster (Attomyrma) splendida (Roger, 1859) (N, S, Si)
Aphaenogaster (Attomyrma) subterranea (Latreille, 1798)
 Aphaenogaster (Attomyrma) subterranea subterranea (Latreille, 1798) (N, S, Si, Sa)
 Aphaenogaster (Attomyrma) subterranea ichnusa Santschi, 1925 (Sa) (E)

***Messor* Forel, 1890**

Messor barbarus (Linné, 1767) (N)
Messor bouvieri Bondroit, 1918 (N, S?, Si)
Messor capitatus (Latreille, 1798) (N, S, Si, Sa)
Messor meridionalis (André, 1882) (N, S, Si, Sa) (*)
Messor minor (André, 1881)
 Messor minor minor (André, 1881) (S, Si, Sa)
 Messor minor calabricus Santschi, 1927 (S) (E)
 Messor minor capreensis Santschi, 1927 (S) (E)
Messor sanctus (Forel, 1905)
 Messor sanctus sanctus (Forel, 1905) (Si)
 Messor sanctus obscuriventris Karawajew, 1912 (Si)
Messor structor (Latreille, 1798) (N, S, Si, Sa)

Oxyopomyrmex André, 1881

Oxyopomyrmex santschii Forel, 1904 (S, Si)

Pheidole Westwood, 1841

Pheidole pallidula (Nylander, 1848) (N, S, Si, Sa)

Pheidole sinaitica Mayr, 1862 (Si)

Pheidole teneriffana Forel, 1893 (Si) (*)

Cremastogaster (Acrocoelia) Mayr, 1852

Cremastogaster (Acrocoelia) laestrygon Emery, 1869 (Si)

Cremastogaster (Acrocoelia) schmidtii (Mayr, 1852) (N)

Cremastogaster (Acrocoelia) scutellaris (Olivier, 1791) (N, S, Si, Sa)

Cremastogaster (Orthocrema) Santschi, 1918

Cremastogaster (Orthocrema) sordidula (Nylander, 1848)

Cremastogaster (Orthocrema) sordidula sordidula (Nylander, 1848) (N, S, Si)

Cremastogaster (Orthocrema) sordidula mayri (Mayr, 1853) (N)

Solenopsis (Diplorhoptrum) Mayr, 1855

Solenopsis (Diplorhoptrum) fugax (Latreille, 1798) (N, S, Si, Sa) (*)

Solenopsis (Diplorhoptrum) latro Forel, 1894

Solenopsis (Diplorhoptrum) latro msilana Forel, 1894 (Sa?)

Solenopsis (Diplorhoptrum) latro sicula Emery, 1915 (Si) (E)

Solenopsis (Diplorhoptrum) orbula Emery, 1875

Solenopsis (Diplorhoptrum) orbula orbula Emery, 1875 (S, Sa)

Solenopsis (Diplorhoptrum) orbula terniensis Forel, 1905 (Si)

Monomorium Mayr, 1855

Monomorium monomorium Bolton, 1987 (N, S, Si)

Monomorium pharaonis (Linné, 1758) (N, S) (*)

Monomorium sommieri Emery, 1908 (Si)

Monomorium subopacum (F. Smith, 1858) (S, Si, Sa)

Myrmecina Curtis, 1829

Myrmecina graminicola (Latreille, 1802) (N, S, Si, Sa)

Myrmecina sicula André, 1881 (Si) (E)

Cardiocondyla Emery, 1869

Cardiocondyla elegans Emery, 1869 (N, S)

Cardiocondyla nuda (Mayr, 1866) (*)
Cardiocondyla nuda nuda (Mayr, 1866) (S, Si, Sa)
Cardiocondyla nuda mauritanica Forel, 1890 (Si)

***Leptothorax (Leptothorax)* Mayr, 1855**

Leptothorax (Leptothorax) acervorum (Fabricius, 1793) (N, S)
Leptothorax (Leptothorax) gredleri Mayr, 1855 (N)
Leptothorax (Leptothorax) muscorum (Nylander, 1846) (N, S)

***Leptothorax (Temnothorax)* Mayr, 1861**

Leptothorax (Temnothorax) recedens (Nylander, 1856) (N, S, Si, Sa)
Leptothorax (Temnothorax) rogeri Emery, 1869 (N)

***Leptothorax (Myrafant)* M.R. Smith, 1950**

Leptothorax (Myrafant) affinis Mayr, 1855 (N, S)
Leptothorax (Myrafant) angustulus (Nylander, 1856) (N, S, Si)
Leptothorax (Myrafant) carinthiacus Bernard, 1957 (N)
Leptothorax (Myrafant) clypeatus (Mayr, 1853) (N, S)
Leptothorax (Myrafant) corticalis (Schenck, 1852) (N)
Leptothorax (Myrafant) exilis Emery, 1869
Leptothorax (Myrafant) exilis exilis Emery, 1869 (N, S, Si, Sa)
Leptothorax (Myrafant) exilis leviceps Emery, 1898 (N, S)
Leptothorax (Myrafant) exilis specularis Emery, 1898 (N, S, Sa)
Leptothorax (Myrafant) finzii Menozzi, 1924 (N) (E)
Leptothorax (Myrafant) flavicornis Emery, 1870 (N, S)
Leptothorax (Myrafant) interruptus (Schenck, 1852) (N, Si)
Leptothorax (Myrafant) italicus Consani, 1952 (N, S)
Leptothorax (Myrafant) kraussei Emery, 1915 (Si, Sa)
Leptothorax (Myrafant) laestrygon Santschi, 1931 (Si) (E)
Leptothorax (Myrafant) lagrecai Baroni Urbani, 1964 (Si) (E)
Leptothorax (Myrafant) lichtensteini Bondroit, 1918 (N, S)
Leptothorax (Myrafant) luteus Forel, 1874 (N, S, Si)
Leptothorax (Myrafant) massiliensis Bondroit, 1918 (S)
Leptothorax (Myrafant) melanocephalus Emery, 1870 (N)
Leptothorax (Myrafant) minozzii Santschi, 1932 (S) (E)
Leptothorax (Myrafant) niger Forel, 1894 (N)
Leptothorax (Myrafant) nigriceps Mayr, 1855 (N, S)
Leptothorax (Myrafant) nylanderi (Foerster, 1850) (N, S, Si, Sa)
Leptothorax (Myrafant) parvulus (Schenck, 1852) (N, S, Sa)
Leptothorax (Myrafant) racovitzai Bondroit, 1918 (N, S)
Leptothorax (Myrafant) rottenbergii (Emery, 1870) (N, S, Si)
Leptothorax (Myrafant) sardous Santschi, 1909 (Sa) (E)
Leptothorax (Myrafant) sordidulus Müller, 1923
Leptothorax (Myrafant) sordidulus sordidulus Müller, 1923 (N)
Leptothorax (Myrafant) sordidulus tergestinus Finzi, 1928 (N)

Leptothorax (Myrafant) tristis Bondroit, 1918 (N)
Leptothorax (Myrafant) tuberosum (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa)
Leptothorax (Myrafant) unifasciatus (Latreille, 1798) (N, S, Sa)

Doronomyrmex Kutter, 1945

Doronomyrmex pacis Kutter, 1945 (N)
Doronomyrmex kutteri Buschinger, 1965 (N)

Chalepoxenus Menozzi, 1922

Chalepoxenus insubricus Kutter, 1950 (N) (*)
Chalepoxenus muellerianus (Finzi, 1922) (N, S)
Chalepoxenus siciliensis Kutter, 1973 (Si) (E) (*)

Epimyrma Emery, 1915

Epimyrma corsica (Emery, 1895) (S)
Epimyrma kraussei Emery, 1915 (N, S, Sa)
Epimyrma ravouxii (André, 1896) (N, S, Sa)
Epimyrma stumperi Kutter, 1950 (N)

Formicoxenus Mayr, 1855

Formicoxenus nitidulus (Nylander, 1846) (N)

Harpagoxenus Forel, 1893

Harpagoxenus sublaevis (Nylander, 1848) (N)

Anergates Forel, 1874

Anergates atratulus (Schenck, 1852) (N)

Tetramorium Mayr, 1855

Tetramorium brevicorne Emery, 1916 (Sa) (E)
Tetramorium caespitum (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)
Tetramorium diomedaeum Emery, 1908 (S, Si)
Tetramorium impurum (Foerster, 1850) (N, S, Si?)
Tetramorium jugurtha Santschi, 1921 (Si)
Tetramorium kahenae Santschi, 1918 (Si) (*)
Tetramorium meridionale Emery, 1870 (N, S, Sa)
Tetramorium semilaeve André, 1881
Tetramorium semilaeve semilaeve André, 1881 (N, S, Si, Sa)
Tetramorium semilaeve liparaeum Santschi, 1927 (Si) (E)
Tetramorium semilaeve punctatum Santschi, 1927 (Si) (E)
Tetramorium semilaeve siciliense Santschi, 1927 (Si)

Tetramorium semilaeve italicum Menozzi, 1932 (S) (E)

Strongylognathus Mayr, 1853

Strongylognathus alboini Finzi, 1924 (N)

Strongylognathus cecconii Emery, 1908 (S) (E)

Strongylognathus destefanii Emery, 1895 (Si) (E)

Strongylognathus emeryi Menozzi, 1921 (S) (E)

Strongylognathus huberi Forel, 1874 (N)

Strongylognathus italicus Finzi, 1924 (S) (E)

Strongylognathus pisarskii Poldi, 1993 (S) (E)

Strongylognathus testaceus (Schenck, 1852) (N, S, Sa)

Smithistruma Brown, 1948

Smithistruma baudueri (Emery, 1875) (N, S, Si, Sa)

Smithistruma tenuipilis (Emery, 1915) (N, S, Sa)

Trichoscapa Emery, 1869

Trichoscapa membranifera (Emery, 1869) (S, Si, Sa)

Epitritus Emery, 1869

Epitritus argiolus Emery, 1869 (N, S, Si, Sa)

Dolichoderus Lund, 1831

Dolichoderus quadripunctatus (Linné, 1771) (N, S)

Liometopum Mayr, 1861

Liometopum microcephalum (Panzer, 1798) (N, S, Si)

***Tapinoma* (*Tapinoma*)** Foerster, 1850

Tapinoma (*Tapinoma*) *ambiguum* Emery, 1925 (N, S?)

Tapinoma (*Tapinoma*) *erraticum* (Latreille, 1798) (N, S)

Tapinoma (*Tapinoma*) *nigerrimum* (Nylander, 1856) (N, S, Si)

Tapinoma (*Tapinoma*) *simrothi* Krausse, 1911 (Si, Sa)

***Tapinoma* (*Micromyrma*)** Dufour, 1857

Tapinoma (*Micromyrma*) *pygmaeum* (Dufour, 1857) (N)

Bothriomyrmex Emery, 1869

Bothriomyrmex adriacus Santschi, 1922 (N)

Bothriomyrmex costae Emery, 1869 (S) (*)
Bothriomyrmex gibbus Soudek, 1924 (N)
Bothriomyrmex liguricus Emery, 1925 (N, S) (E)
Bothriomyrmex menozzii Emery, 1925 (N, S)
Bothriomyrmex siculus Emery, 1925 (Si) (E)

Linepithema Mayr, 1866

Linepithema humile (Mayr, 1868) (N, S, Si, Sa) (*)

Plagiolepis (Plagiolepis) Mayr, 1861

Plagiolepis (Plagiolepis) obscuriscapa Santschi, 1923 (N) (*)
Plagiolepis (Plagiolepis) pygmaea (Latreille, 1798) (N, S, Si, Sa)
Plagiolepis (Plagiolepis) schmitzii (Forel, 1895) (Si)
Plagiolepis (Plagiolepis) vindobonensis Lomnicki, 1925 (N, S)

Plagiolepis (Paraplagiolepis) Faber, 1969

Plagiolepis (Paraplagiolepis) xene Staercke, 1936 (N, S, Si)

Lepisiota Santschi, 1926

Lepisiota frauenfeldi (Mayr, 1855) (S, Si)
Lepisiota nigra Emery, 1893 (S, Si)

Camponotus (Camponotus) Mayr, 1861

Camponotus (Camponotus) herculeanus (Linné, 1758) (N, S)
Camponotus (Camponotus) ligniperda (Latreille, 1802) (N, S, Si)
Camponotus (Camponotus) vagus (Scopoli, 1763) (N, S, Si, Sa)

Camponotus (Tanaemyrmex) Ashmead, 1905

Camponotus (Tanaemyrmex) aethiops (Latreille, 1798) (N, S, Si, Sa)
Camponotus (Tanaemyrmex) barbaricus Emery, 1904 (Si)
Camponotus (Tanaemyrmex) marginatus (Latreille, 1798) (N, S, Si, Sa)
Camponotus (Tanaemyrmex) nylanderi Emery, 1921 (S, Si)
Camponotus (Tanaemyrmex) pilicornis (Roger, 1859)
Camponotus (Tanaemyrmex) pilicornis siculus Emery, 1908 (Si) (E)
Camponotus (Tanaemyrmex) sylvaticus (Olivier, 1791) (N)
Camponotus (Tanaemyrmex) universitatis Forel, 1890 (S)

Camponotus (Myrmosericus) Forel, 1912

Camponotus (Myrmosericus) cruentatus (Latreille, 1802) (N)
Camponotus (Myrmosericus) micans (Nylander, 1856) (S, Si)

Camponotus (Myrmentoma) Forel, 1912

- Camponotus (Myrmentoma) dalmaticus* (Nylander, 1848) (N, S)
- Camponotus (Myrmentoma) fallax* (Nylander, 1856) (N, S, Sa)
- Camponotus (Myrmentoma) gestroi* Emery, 1878 (S, Si, Sa)
- Camponotus (Myrmentoma) lateralis* (Olivier, 1791) (N, S, Si, Sa)
- Camponotus (Myrmentoma) piceus* (Leach, 1825) (*)
- Camponotus (Myrmentoma) piceus piceus* (Leach, 1825) (N, S, Si, Sa)
- Camponotus (Myrmentoma) piceus spissinodis* Forel, 1894 (Si)
- Camponotus (Myrmentoma) sichelii* Mayr, 1866
- Camponotus (Myrmentoma) sichelii ruber* Karawajew, 1912 (Si)
- Camponotus (Myrmentoma) tergestinus* Müller, 1922 (N)

Camponotus (Colobopsis) Mayr, 1861

- Camponotus (Colobopsis) truncatus* (Spinola, 1808) (N, S, Si, Sa)

Prenolepis Mayr, 1861

- Prenolepis nitens* (Mayr, 1852) (N)

Lasius (Lasius) Fabricius, 1804

- Lasius (Lasius) alienus* (Foerster, 1850) (N, S, Si, Sa) (*)
- Lasius (Lasius) brunneus* (Latreille, 1798) (N, S, Si, Sa)
- Lasius (Lasius) emarginatus* (Olivier, 1791) (N, S, Si, Sa)
- Lasius (Lasius) lasioides* (Emery, 1869) (S)
- Lasius (Lasius) niger* (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)
- Lasius (Lasius) platythorax* Seifert, 1991 (N)
- Lasius (Lasius) turcicus* Santschi, 1921 (N)

Lasius (Austrolasius) Faber, 1967

- Lasius (Austrolasius) carniolicus* Mayr, 1861 (N, S)

Lasius (Cautolasius) Wilson, 1955

- Lasius (Cautolasius) flavus* (Fabricius, 1781) (N, S, Si, Sa)
- Lasius (Cautolasius) myops* (Forel, 1894) (N, S, Si)

Lasius (Chthonolasius) Ruzsky, 1913

- Lasius (Chthonolasius) bicornis* (Foerster, 1850) (N, S, Sa)
- Lasius (Chthonolasius) citrinus* Emery, 1922 (N, S, Sa) (*)
- Lasius (Chthonolasius) distinguendus* Emery, 1916 (N, S)
- Lasius (Chthonolasius) meridionalis* (Bondroit, 1919) (N)
- Lasius (Chthonolasius) mixtus* (Nylander, 1846) (N, S)
- Lasius (Chthonolasius) rabaudi* (Bondroit, 1917) (N, S)

Lasius (Chthonolasius) umbratus (Nylander, 1846) (N, S)

***Lasius (Dendrolasius)* Ruzsky, 1913**

Lasius (Dendrolasius) fuliginosus (Latreille, 1798) (N, S, Si)

***Formica (Formica)* Linné, 1758**

Formica (Formica) aquilonia Yarrow, 1955 (N)

Formica (Formica) lugubris Zetterstedt, 1840 (N, S, Si, Sa)

Formica (Formica) nigricans Emery, 1909 (N, S) (*)

Formica (Formica) polyctena Foerster, 1850 (N)

Formica (Formica) pratensis Retzius, 1783 (N)

Formica (Formica) rufa Linné, 1758 (N)

Formica (Formica) truncorum Fabricius, 1804 (N)

***Formica (Coptoformica)* Müller, 1923**

Formica (Coptoformica) exsecta Nylander, 1846

Formica (Coptoformica) exsecta exsecta Nylander, 1846 (N)

Formica (Coptoformica) exsecta etrusca Emery, 1909 (N, S)

Formica (Coptoformica) foreli Emery, 1909 (N)

Formica (Coptoformica) pressilabris Nylander, 1846 (N)

***Formica (Raptiformica)* Forel, 1913**

Formica (Raptiformica) sanguinea Latreille, 1798 (N, S, Si)

***Formica (Serviformica)* Forel, 1913**

Formica (Serviformica) cinerea Mayr, 1853

Formica (Serviformica) cinerea cinerea Mayr, 1853 (N, S)

Formica (Serviformica) cinerea fuscocinerea Forel, 1874 (N)

Formica (Serviformica) cinerea italica Finzi, 1928 (S) (E)

Formica (Serviformica) cinereorufibarbis Forel, 1874 (N) (*)

Formica (Serviformica) cunicularia Latreille, 1798 (N, S, Si, Sa)

Formica (Serviformica) fusca Linné, 1758 (N, S, Sa)

Formica (Serviformica) gagates Latreille, 1798 (N, S)

Formica (Serviformica) lefrancoisi Bondroit, 1918 (S)

Formica (Serviformica) lemani Bondroit, 1917 (N, S)

Formica (Serviformica) pyrenaea Bondroit, 1918 (N)

Formica (Serviformica) rufibarbis Fabricius, 1793 (N, S, Sa)

Formica (Serviformica) selysi Bondroit, 1918 (N)

Formica (Serviformica) subrufoides Forel, 1913 (N) (*)

Formica (Serviformica) transcaucasica Nasonow, 1899 (N, S)

***Polyergus* Latreille, 1805**

Polyergus rufescens (Latreille, 1798) (N, S)

Cataglyphis Foerster, 1850

Cataglyphis italica (Emery, 1906) (S) (E)

Note

Ponera sulcitana: Specie dubbia, descritta come *Ponera*: forse attribuibile ad *Hypoponera* in base ai disegni nel testo.

Myrmica: La sinonimia del genere *Sifolinia* Emery con il genere *Myrmica* Latreille non trova adesione unanime.

Myrmica specioides: Specie la cui validità è stata riproposta solo di recente.

Myrmica striata: Taxon di valore non ben certo.

Messor meridionalis: Specie a posizione tassonomica non ancora ben chiarita.

Pheidole: La collocazione di questa sinonimia suscita perplessità.

Pheidole teneriffana: Specie diffusa al sud del Mare Mediterraneo, a tendenza invasiva: osservata in Italia (Sicilia) in tempi recentissimi.

Solenopsis (Diplorhoptrum) fugax: Taxon verosimilmente comprendente più specie.

Monomorium pharaonis: Specie cosmopolita, segnalata in Italia all'inizio del secolo nelle città portuali, di recente anche nella valle padana.

Cardiocondyla nuda: Specie verosimilmente originaria dell'area indopacifica, a tendenza cosmopolita.

Leptothorax (Temnothorax): Sottogenere di validità perlomeno controversa.

Chalepoxenus insubricus: Forse sinonimo di *Ch. muellerianus*?

Chalepoxenus siciliensis: Specie alquanto variabile: sinonimo di *Ch. muellerianus*?

Tetramorium kahenae: Attribuzione probabile per esemplari di Lampedusa.

Bothriomyrmex costae: Taxon di valore assai dubbio.

Linepithema humile: Verosimilmente originaria del Brasile, questa specie cosmopolita sta invadendo - senza antagonisti - le zone a clima invernale mite.

Plagiolepis (Plagiolepis) obscuriscapa: Taxon di valore dubbio.

Camponotus (Myrmentoma) piceus: La validità della subsp. *spissinodis* resta da confermare.

Lasius (Lasius) alienus: Taxon secondo qualche autore comprendente più specie.

Lasius (Chthonolasius) citrinus: Soluzione che attende opportune conferme.

Formica (Formica) nigricans: Specie di valore assai controverso.

Formica (Serviformica) cinereorufibarbis: Specie di valore dubbio.

Formica (Serviformica) subrufoides: Specie di valore dubbio.

Eumenidae

Raphiglossa S.S. Saunders, 1850

Raphiglossa eumenoides S.S. Saunders, 1850

Raphiglossa eumenoides eumenoides S.S. Saunders, 1850 (S?)

Psiliglossa S.S. Saunders, 1852

Psiliglossa odyneroides (S.S. Saunders, 1850)
Psiliglossa odyneroides odyneroides (S.S. Saunders, 1850) (Si)

Discoelius Latreille, 1809

Discoelius dufourii Lepeletier, 1841 (N)
Discoelius zonalis (Panzer, 1801) (N)

Tropidodynerus Blüthgen, 1939

Tropidodynerus flavus (Lepeletier, 1841)
Tropidodynerus flavus destefani (André, 1883) (Si)
Tropidodynerus interruptus (Brullé, 1832)
Tropidodynerus interruptus interruptus (Brullé, 1832) (N, S)
Tropidodynerus interruptus tricolor Blüthgen, 1956 (S)

Paragymnomerus Blüthgen, 1938

Paragymnomerus spiricornis (Spinola, 1808) (N)

Odynerus (Odynerus) Latreille, 1802

Odynerus (Odynerus) alpinus Schulthess, 1897 (N, Si)
Odynerus (Odynerus) cruralis Saussure, 1856 (N)
Odynerus (Odynerus) femoratus Saussure, 1856 (Si, Sa)
Odynerus (Odynerus) melanocephalus (Gmelin, 1790) (N, S, Si, Sa)
Odynerus (Odynerus) poecilus Saussure, 1856 (N, S)
Odynerus (Odynerus) rotundigaster Saussure, 1853
Odynerus (Odynerus) rotundigaster rotundigaster Saussure, 1853 (S, Si)
Odynerus (Odynerus) rotundigaster extimus (Blüthgen, 1955) (Si)
Odynerus (Odynerus) rotundigaster burlinii Giordani Soika, 1976 (Si)
Odynerus (Odynerus) spinipes (Linnaeus, 1758)
Odynerus (Odynerus) spinipes spinipes (Linnaeus, 1758) (N, S)

Odynerus (Allogymnomerus) Blüthgen, 1951

Odynerus (Allogymnomerus) consobrinus Dufour, 1839 (*)
Odynerus (Allogymnomerus) consobrinus consobrinus Dufour, 1839 (N)

Odynerus (Spinicoxa) Blüthgen, 1938

Odynerus (Spinicoxa) albopictus Saussure, 1856
Odynerus (Spinicoxa) albopictus calcaratus (Morawitz, 1885) (S, Si)
Odynerus (Spinicoxa) antigai Dusmet, 1903 (Sa)
Odynerus (Spinicoxa) reniformis (Gmelin, 1790)
Odynerus (Spinicoxa) reniformis reniformis (Gmelin, 1790) (N, S, Sa)
Odynerus (Spinicoxa) wilhelmi Dusmet, 1917 (Sa)

Gymnomerus Blüthgen, 1938

Gymnomerus laevipes (Shuckard, 1837)

Gymnomerus laevipes laevipes (Shuckard, 1837) (N, S)

Hemipterochilus Ferton, 1909

Hemipterochilus bembeciformis (Morawitz, 1867)

Hemipterochilus bembeciformis terricola (Mocsáry, 1883) (N, S, Sa)

Hemipterochilus bembeciformis circensis Giordani Soika, 1942 (S)

Pterocheilus Klug, 1805

Pterocheilus albopictus Kriechbaumer, 1869 (S)

Pterocheilus hellenicus Morawitz, 1885 (*)

Pterocheilus hellenicus hellenicus Morawitz, 1885 (S?)

Pterocheilus phaleratus (Panzer, 1797)

Pterocheilus phaleratus phaleratus (Panzer, 1797) (N, S)

Pterocheilus phaleratus chevrieranus Saussure, 1856 (S)

Alastor Lepeletier, 1841

Alastor atropos Lepeletier, 1841 (N, S, Si, Sa)

Alastor biegelebeni Giordani Soika, 1942

Alastor biegelebeni biegelebeni Giordani Soika, 1942 (N)

Alastorynerus Blüthgen, 1938

Alastorynerus perezii (Berland, 1927) (N, S)

Pseudomicrodynerus Blüthgen, 1938

Pseudomicrodynerus parvulus (Herrich-Schaeffer, 1838) (N, S)

Microdynerus Thomson, 1874

Microdynerus appenninicus Giordani Soika, 1960 (S, Si)

Microdynerus exilis (Herrich-Schaeffer, 1839) (N, S)

Microdynerus longicollis Morawitz, 1895

Microdynerus longicollis longicollis Morawitz, 1895 (N)

Microdynerus longicollis sicanus Blüthgen, 1964 (Si)

Microdynerus mirandus (Giordani Soika, 1947) (Si)

Microdynerus nugdunensis (Saussure, 1855)

Microdynerus nugdunensis nugdunensis (Saussure, 1855) (N, S, Sa)

Microdynerus nugdunensis sicilis Blüthgen, 1964 (Si)

Microdynerus tauromenitatus Blüthgen, 1955 (S, Si)

Microdynerus timidus (Saussure, 1856) (N, S)

Leptochilus (Euleptochilus) Blüthgen, 1943

- Leptochilus (Euleptochilus) duplicatus* (Klug, 1835)
- Leptochilus (Euleptochilus) duplicatus duplicatus* (Klug, 1835) (N, S)
- Leptochilus (Euleptochilus) duplicatus xanthochromus* Giordani Soika, 1986 (Sa)
- Leptochilus (Euleptochilus) limbiferus* (Morawitz, 1867) (N, S)

Leptochilus (Lionotulus) Blüthgen, 1938

- Leptochilus (Lionotulus) alpestris* (Saussure, 1855)
- Leptochilus (Lionotulus) alpestris alpestris* (Saussure, 1855) (N, S)
- Leptochilus (Lionotulus) alpestris trinacriae* (André, 1883) (Si)
- Leptochilus (Lionotulus) crassipunctatus* (Maidl, 1922) (N)
- Leptochilus (Lionotulus) josephi* Giordani Soika, 1947 (N)
- Leptochilus (Lionotulus) membranaceus* (Morawitz, 1867)
- Leptochilus (Lionotulus) membranaceus membranaceus* (Morawitz, 1867) (S)
- Leptochilus (Lionotulus) tarsatus* (Saussure, 1855) (N, S, Si)
- Leptochilus (Lionotulus) torretassoi* (Giordani Soika, 1938)
- Leptochilus (Lionotulus) torretassoi venerensis* Blüthgen, 1964 (Si)

Leptochilus (Neoleptochilus) Blüthgen, 1961

- Leptochilus (Neoleptochilus) medanae* (Gribodo, 1886) (Si, Sa)
- Leptochilus (Neoleptochilus) regulus* (Saussure, 1855) (N, S, Si, Sa)

Tachyancistrocerus Giordani Soika, 1952

- Tachyancistrocerus rhodensis* (Saussure, 1855) (Si)

Eustenancistrocerus Blüthgen, 1938

- Eustenancistrocerus blanchardianus* (Saussure, 1855) (N, Si, Sa)

Stenodynerus Saussure, 1863

- Stenodynerus bluethgeni* van der Vecht, 1971 (N, S, Si)
- Stenodynerus chevrieranus* (Saussure, 1855) (N, S)
- Stenodynerus clypeopictus* (Kostylev, 1940) (N)
- Stenodynerus dentisquama* (Thomson, 1870) (N)
- Stenodynerus fastidiosissimus* (Saussure, 1855)
- Stenodynerus fastidiosissimus fastidiosissimus* (Saussure, 1855) (N, S, Si, Sa)
- Stenodynerus fastidiosissimus difficilis* (Morawitz, 1867) (S, Si)
- Stenodynerus fastidiosissimus laborans* (A. Costa, 1882) (Sa)
- Stenodynerus laticinctus* (Schulthess, 1897)
- Stenodynerus laticinctus laticinctus* (Schulthess, 1897) (N)
- Stenodynerus orenburgensis* (André, 1884) (N)
- Stenodynerus picticrus* (Thomson, 1874) (N)
- Stenodynerus punctifrons* (Thomson, 1874) (N)

Stenodynerus steckianus (Schulthess, 1897) (N, S)
Stenodynerus xanthomelas (Herrich-Schaeffer, 1839) (N)

***Antepipona* Saussure, 1855**

Antepipona deflenda (Saunders, 1853)
Antepipona deflenda lepeletieri (Blüthgen, 1961) (N, S, Si, Sa)
Antepipona doursii (Saussure, 1855) (Sa)
Antepipona orbitalis (Herrich-Schaeffer, 1839)
Antepipona orbitalis orbitalis (Herrich-Schaeffer, 1839) (N, S)

***Parodontodynerus* Blüthgen, 1938**

Parodontodynerus ephippium (Klug, 1817)
Parodontodynerus ephippium ephippium (Klug, 1817) (N, S, Si, Sa)

***Allodynerus* Blüthgen, 1938**

Allodynerus delphinalis (Giraud, 1866)
Allodynerus delphinalis delphinalis (Giraud, 1866) (N, S)
Allodynerus delphinalis sardous Blüthgen, 1953 (Sa)
Allodynerus floricola (Saussure, 1853)
Allodynerus floricola floricola (Saussure, 1853) (N, S)
Allodynerus rossii (Lepelletier, 1841) (N, S)

***Pseudepipona (Pseudepipona)* Saussure, 1856**

Pseudepipona (Pseudepipona) lativentris (Saussure, 1855)
Pseudepipona (Pseudepipona) lativentris lativentris (Saussure, 1855) (N, S, Si)
Pseudepipona (Pseudepipona) tripunctata (Fabricius, 1787) (Si)

***Pseudepipona (Deuterepipona)* Blüthgen, 1951**

Pseudepipona (Deuterepipona) inexpectata (Blüthgen, 1955) (Si)

***Euodynerus (Euodynerus)* Dalla Torre, 1904**

Euodynerus (Euodynerus) curictensis Blüthgen, 1940 (N, S, Si)
Euodynerus (Euodynerus) dantici (Rossi, 1790)
Euodynerus (Euodynerus) dantici dantici (Rossi, 1790) (N, S, Si, Sa)
Euodynerus (Euodynerus) dantici poggii Giordani Soika, 1986 (S)
Euodynerus (Euodynerus) disconotatus (Lichtenstein, 1884)
Euodynerus (Euodynerus) disconotatus disconotatus (Lichtenstein, 1884) (N, S, Si, Sa)
Euodynerus (Euodynerus) fastidiosus (Saussure, 1853)
Euodynerus (Euodynerus) fastidiosus fastidiosus (Saussure, 1853) (S, Si)
Euodynerus (Euodynerus) variegatus (Fabricius, 1793)
Euodynerus (Euodynerus) variegatus variegatus (Fabricius, 1793) (S, Si)

Euodynerus (Pareuodynerus) Blüthgen, 1938

Euodynerus (Pareuodynerus) bidentiformis (Giordani Soika, 1942) (Sa)

Euodynerus (Pareuodynerus) notatus (Jurine, 1807)

Euodynerus (Pareuodynerus) notatus notatus (Jurine, 1807) (N)

Euodynerus (Pareuodynerus) notatus pubescens (Thomson, 1870) (N)

Euodynerus (Pareuodynerus) posticus (Herrich-Schaeffer, 1841)

Euodynerus (Pareuodynerus) posticus posticus (Herrich-Schaeffer, 1841) (N, S, Si)

Euodynerus (Pareuodynerus) quadrifasciatus (Fabricius, 1793)

Euodynerus (Pareuodynerus) quadrifasciatus quadrifasciatus (Fabricius, 1793) (N, S)

Euodynerus (Pareuodynerus) quadrifasciatus simplex (Fabricius, 1793) (N, S)

Euodynerus (Syneuodynerus) Blüthgen, 1951

Euodynerus (Syneuodynerus) egregius (Herrich-Schaeffer, 1839)

Euodynerus (Syneuodynerus) egregius egregius (Herrich-Schaeffer, 1839) (N, S, Si, Sa)

Euodynerus (Syneuodynerus) egregius unimaculatus (Maidl, 1922) (S)

Chlorodynerus Blüthgen, 1951

Chlorodynerus ypsilon (Kostylev, 1929) (S?) (*)

Rhynchium Spinola, 1806

Rhynchium oculatum (Fabricius, 1781)

Rhynchium oculatum oculatum (Fabricius, 1781) (N, S, Si, Sa)

Ancistrocerus Wesmael, 1836

Ancistrocerus antilope (Panzer, 1798) (N, S)

Ancistrocerus auctus (Fabricius, 1793)

Ancistrocerus auctus auctus (Fabricius, 1793) (N, S, Sa)

Ancistrocerus biphaleratus (Saussure, 1852)

Ancistrocerus biphaleratus triphaleratus (Saussure, 1855) (S, Si, Sa)

Ancistrocerus claripennis Thomson, 1874

Ancistrocerus claripennis claripennis Thomson, 1874 (N, S)

Ancistrocerus gazella (Panzer, 1798) (N, S, Si, Sa)

Ancistrocerus ichneumonideus (Ratzeburg, 1844) (N)

Ancistrocerus liliae Giordani Soika, 1952

Ancistrocerus liliae sardous Giordani Soika, 1979 (Sa)

Ancistrocerus longispinosus (Saussure, 1855)

Ancistrocerus longispinosus longispinosus (Saussure, 1855) (N, S, Si)

Ancistrocerus longispinosus gazelloides Guiglia, 1943 (Sa)

Ancistrocerus nigricornis (Curtis, 1791) (N, S, Si)

Ancistrocerus oviventris (Wesmael, 1836)

Ancistrocerus oviventris oviventris (Wesmael, 1836) (N, S, Si)

Ancistrocerus oviventris sculus Blüthgen, 1955 (S, Si)
Ancistrocerus parietinus (Linnaeus, 1761) (N, S)
Ancistrocerus parietum (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
Ancistrocerus scoticus (Curtis, 1826)
Ancistrocerus scoticus scoticus (Curtis, 1826) (N)
Ancistrocerus trifasciatus (Müller, 1776)
Ancistrocerus trifasciatus trifasciatus (Müller, 1776) (N, S)

Symmorphus Wesmael, 1836

Symmorphus allobrogus (Saussure, 1855) (N)
Symmorphus bifasciatus (Linnaeus, 1761) (N, S)
Symmorphus connexus (Curtis, 1826) (N)
Symmorphus crassicornis (Panzer, 1798)
Symmorphus crassicornis crassicornis (Panzer, 1798) (N, S)
Symmorphus declivis Harttig, 1932 (S)
Symmorphus gracilis (Brullé, 1832) (N, S)
Symmorphus murarius (Linnaeus, 1758)
Symmorphus murarius murarius (Linnaeus, 1758) (N)

Pareumenes (Nortonia) Saussure, 1869

Pareumenes (Nortonia) laminata (Kriechbaumer, 1879)
Pareumenes (Nortonia) laminata laminata (Kriechbaumer, 1879) (S)

Eumenes Latreille, 1802

Eumenes aemilianus Guiglia, 1951
Eumenes coarctatus (Linnaeus, 1758)
Eumenes coarctatus coarctatus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
Eumenes coarctatus corsicus Gusenleitner, 1972 (Sa)
Eumenes coarctatus maroccanus Gusenleitner, 1972 (Si)
Eumenes coarctatus nuragicus Giordani Soika, 1986 (Sa)
Eumenes coronatus (Panzer, 1799)
Eumenes coronatus coronatus (Panzer, 1799) (N, S)
Eumenes cyrenaicus Blüthgen, 1938
Eumenes cyrenaicus pseudogermanicus Blüthgen, 1938 (Si, Sa)
Eumenes dubius Saussure, 1852
Eumenes dubius dubius Saussure, 1852 (N, S, Si, Sa)
Eumenes lunulatus Fabricius, 1804
Eumenes lunulatus lunulatus Fabricius, 1804 (N, S, Si, Sa)
Eumenes lunulatus tenebricosus Gusenleitner, 1972 (Si)
Eumenes mediterraneus Kriechbaumer, 1879
Eumenes mediterraneus mediterraneus Kriechbaumer, 1879 (N, S, Si, Sa)
Eumenes papillarius (Christ, 1791)
Eumenes papillarius papillarius (Christ, 1791) (N, S)
Eumenes pedunculatus (Panzer, 1799)
Eumenes pedunculatus pedunculatus (Panzer, 1799) (N, S)

Eumenes pomiformis (Fabricius, 1781)
 Eumenes pomiformis pomiformis (Fabricius, 1781) (N, S, Si)
Eumenes punctaticlypeus Giordani Soika, 1943 (S)
Eumenes subpomiformis Blüthgen, 1938
 Eumenes subpomiformis subpomiformis Blüthgen, 1938 (N, S, Si)
Eumenes sareptanus André, 1884
 Eumenes sareptanus insolatus Müller, 1923 (N)
Eumenes sardous Guiglia, 1951 (Sa)

Delta Saussure, 1855

Delta unguiculatum (Villers, 1789)
 Delta unguiculatum unguiculatum (Villers, 1789) (N, S, Si)

Ischnogasteroides Magretti, 1884

Ischnogasteroides picteti (Saussure, 1852) (N) (*)

Katamenes Meade-Waldo, 1910

Katamenes algirus Schulz, 1905 (S, Si)
Katamenes arbustorum (Panzer, 1799)
 Katamenes arbustorum arbustorum (Panzer, 1799) (N, S, Si)
 Katamenes arbustorum soikai Borsato, 1993 (Sa)
 Katamenes arbustorum burlinii (Giordani Soika, 1949) (N)

Note

Odynerus (Allogymnomerus) consobrinus: E' specie nota con certezza solo per l'Africa settentrionale. Dubbia è la citazione per l'Italia.

Pterocheilus hellenicus: Segnalazione effettuata da A. Costa nel 1888, vi sono dubbi sulla reale presenza in Italia.

Chlorodynerus ypsilon: Un esemplare etichettato Is. del Giglio, nella Collezione Museo Civico di Storia Naturale di Genova. La determinazione è esatta ma esistono dubbi sulla località.

Ischnogasteroides picteti: Segnalato dal Piemonte in base ad un vecchio esemplare della collezione Sichel. Si dubita sia realmente presente in Italia.

Masaridae

Celonites Latreille, 1802

Celonites abbreviatus (Villers, 1789) (N, S)

Jugurtia Saussure, 1854

Jugurtia dispar (Dufour, 1851) (S?) (*)

Note

Jugurtia dispar: Segnalata da Erlandsson nel 1974, ma è assolutamente improbabile la presenza di questa specie in Italia.

Vespidae

Sulcopolistes Blüthgen, 1937

Sulcopolistes atrimandibularis (Zimmermann, 1930) (N, S, Si)

Sulcopolistes semenowi (Morawitz, 1889) (N, S)

Sulcopolistes sulcifer (Zimmerman, 1930) (N, S, Si)

Polistes Latreille, 1802

Polistes associus Kohl, 1898 (N, S, Si)

Polistes biglumis (Linnaeus, 1758)

Polistes biglumis bimaculatus (Geoffroy in Fourcroy, 1785) (N, S, Si)

Polistes bischoffi Weyrauch, 1937 (N, S, Sa)

Polistes dominulus (Christ, 1791) (N, S, Si, Sa)

Polistes gallicus (Linnaeus, 1767) (N, S, Si, Sa)

Polistes nimpha (Christ, 1791) (N, S, Si, Sa)

Vespa Linnaeus, 1758

Vespa crabro Linnaeus, 1758

Vespa crabro crabro Linnaeus, 1758 (N, S, Si)

Vespa orientalis Linnaeus, 1771

Vespa orientalis orientalis Linnaeus, 1771 (S, Si)

Vespula (Vespula) Thomson, 1869

Vespula (Vespula) rufa (Linnaeus, 1758)

Vespula (Vespula) rufa rufa (Linnaeus, 1758) (N, S)

Vespula (Vespula) austriaca (Panzer, 1799) (N)

Vespula (Paravespula) Blüthgen, 1937

Vespula (Paravespula) germanica (Fabricius, 1793) (N, S, Si, Sa)

Vespula (Paravespula) vulgaris (Linnaeus, 1758) (N, S)

Dolichovespula Rohwer, 1916

Dolichovespula adulterina (du Buysson, 1904) (N)

Dolichovespula media (Retzius, 1783) (N, S)

Dolichovespula norwegica (Fabricius, 1781)

Dolichovespula norwegica norwegica (Fabricius, 1781) (N, Sa)

Dolichovespula omissa (Bischoff, 1931) (N)
Dolichovespula saxonica (Fabricius, 1793)
Dolichovespula saxonica saxonica (Fabricius, 1793) (N)
Dolichovespula sylvestris (Scopoli, 1763)

Pompilidae

Caliadurgus Pate, 1946

Caliadurgus fasciatellus (Spinola, 1808)
Caliadurgus fasciatellus fasciatellus (Spinola, 1808) (N, S)
Caliadurgus fasciatellus gyllenhali (Dahlbom, 1843) (N)

Cryptocheilus Panzer, 1806

Cryptocheilus alternatus (Lepeletier, 1845) (N, S)
Cryptocheilus confinis Haupt, 1927 (N, S)
Cryptocheilus dimidiatipennis (A. Costa, 1886) (S, Si)
Cryptocheilus discolor (Fabricius, 1793) (S, Si)
Cryptocheilus egregius (Lepeletier, 1845) (N, S, Si, Sa)
Cryptocheilus elegans (Spinola, 1806)
Cryptocheilus elegans elegans (Spinola, 1806) (N, S, Si, Sa)
Cryptocheilus elegans tripunctatus (Spinola, 1808) (N, S)
Cryptocheilus fabricii (Van der Linden, 1827) (N)
Cryptocheilus fallax Priesner, 1965 (N)
Cryptocheilus freygessneri (Kohl, 1883) (N)
Cryptocheilus fulvicollis (A. Costa, 1874) (S, Sa)
Cryptocheilus guttulatus (A. Costa, 1886) (N, Si)
Cryptocheilus ichneumonoides (A. Costa, 1874) (N, S)
Cryptocheilus infumatus (Palma, 1869) (Si, Sa)
Cryptocheilus juncoi Wahis, 1986 (Sa)
Cryptocheilus notatus (Rossi, 1792) (N, S)
Cryptocheilus octomaculatus (Rossi, 1790) (N, S, Si)
Cryptocheilus perezi (Saunders, 1901) (Si)
Cryptocheilus richardsi Móczár, 1953 (N, Si)
Cryptocheilus rubellus (Eversmann, 1846) (S, Sa)
Cryptocheilus unicolor (Fabricius, 1804) (Si)
Cryptocheilus variabilis (Rossi, 1790) (N, S, Si)
Cryptocheilus variegatus (Fabricius, 1776) (N)
Cryptocheilus versicolor (Scopoli, 1763) (N, S, Si, Sa)

Cyphononyx Dahlbom, 1845

Cyphononyx croceicornis (Erichson, 1844) (Si, Sa)

Dipogon Fox, 1897

Dipogon bifasciatus (Geoffroy, 1785) (N, S, Sa)
Dipogon monticolus Wahis, 1972 (N)
Dipogon subintermedius (Magretti, 1886) (N, S)
Dipogon variegatus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

***Priocnemis* Schioedte, 1837**

Priocnemis abdominalis Dahlbom, 1845 (Sa)
Priocnemis agilis (Shuckard, 1837) (N)
Priocnemis bellieri Sichel, 1860 (N, S, Si, Sa)
Priocnemis consimilis A. Costa, 1858 (N)
Priocnemis cordivalvata Haupt, 1927 (N, S)
Priocnemis coriacea Dahlbom, 1843 (N)
Priocnemis diversa Junco, 1947 (N)
Priocnemis enslini Haupt, 1927 (N)
Priocnemis exaltata (Fabricius, 1775) (N, S, Si)
Priocnemis faillai De Stefani, 1886 (Si)
Priocnemis fallax Verhoeff, 1922 (N, S, Si)
Priocnemis fastigiata Haupt, 1935 (N, S)
Priocnemis fennica Haupt, 1927 (N, S)
Priocnemis gracilis Haupt, 1927 (N)
Priocnemis hankoi Móczár, 1944 (N)
Priocnemis hyalinata (Fabricius, 1793) (N, S, Si)
Priocnemis langobardica Wolf, 1960 (N, S)
Priocnemis melanogaster Wolf, 1963 (S)
Priocnemis melanosoma Kohl, 1880 (N, S)
Priocnemis minuta (Vander Linden, 1827) (N, S, Si)
Priocnemis minutalis Wahis, 1979 (N)
Priocnemis opaca (Pérez, 1890) (Sa)
Priocnemis parvula Dahlbom, 1845 (N, S)
Priocnemis perraudini Wolf, 1978 (Sa)
Priocnemis perturbator (Harris, 1780) (N, S, Si)
Priocnemis propinqua (Lepeletier, 1845) (N, S, Si, Sa)
Priocnemis pumila Haupt, 1936 (N, S)
Priocnemis pumiloides Wolf, 1963 (*)
Priocnemis pusilla (Schioedte, 1837)
 Priocnemis pusilla pusilla (Schioedte, 1837) (N, S, Si)
 Priocnemis pusilla cottica Wolf, 1962 (N)
Priocnemis rufozonata A. Costa, 1883 (N, S)
Priocnemis schioedtei Haupt, 1927
 Priocnemis schioedtei schioedtei Haupt, 1927 (N)
 Priocnemis schioedtei nigricans Gussakovskij, 1935 (N)
Priocnemis sulci Balthasar, 1943 (N)
Priocnemis susterai Haupt, 1927 (N)
Priocnemis vachali Ferton, 1897 (Sa)
Priocnemis vulgaris (Dufour, 1841) (N, S)
Priocnemis wolffi Wahis, 1986 (N)

Auplopus Spinola, 1841

- Auplopus albifrons* (Dalman, 1823)
 - Auplopus albifrons albifrons* (Dalman, 1823) (N, S, Si)
 - Auplopus albifrons obscurus* Priesner, 1967 (N)
- Auplopus carbonarius* (Scopoli, 1763) (N, S, Si, Sa)
- Auplopus ichnusus* Wolf, 1960 (Sa)
- Auplopus rectus* (Haupt, 1927) (N, S, Si, Sa)

Poecilagenia Haupt, 1927

- Poecilagenia rubricans* (Lepeletier, 1845) (N, S)
- Poecilagenia sculpturata* (Kohl, 1898) (N)

Agenioideus Ashmead, 1902

- Agenioideus apicalis* (Vander Linden, 1827) (N, S, Si, Sa)
- Agenioideus ciliatus* (Lepeletier, 1845) (N, Si, Sa)
- Agenioideus cinctellus* (Spinola, 1808) (N, S, Sa)
- Agenioideus dichrous* (Brullé, 1840) (S, Si, Sa)
- Agenioideus fascinubecula* Wolf, 1986 (Sa)
- Agenioideus nubecula* (A. Costa, 1881)
 - Agenioideus nubecula nubecula* (A. Costa, 1874) (N, S, Si, Sa)
 - Agenioideus nubecula tristis* (Priesner, 1965) (N)
- Agenioideus sericeus* (Vander Linden, 1827) (N, S, Sa)
- Agenioideus usurarius* (Tournier, 1889) (N, S, Sa)

Amblyellus Day, 1981

- Amblyellus hasdrubal* (Kohl, 1894) (N, S)

Anoplius Dufour, 1834

- Anoplius alpinobalticus* Wolf, 1965 (N)
- Anoplius caviventris* (Aurivillius, 1907) (N, S, Sa)
- Anoplius concinnus* (Dahlbom, 1845) (N, S, Sa)
- Anoplius infuscatus* (Vander Linden, 1827) (N, S, Si, Sa)
- Anoplius nigerrimus* (Scopoli, 1763) (N, S, Sa)
- Anoplius piliventris* (Morawitz, 1889) (*)
- Anoplius samariensis* (Pallas, 1771) (N, S, Si, Sa)
- Anoplius viaticus* (Linnaeus, 1758)
 - Anoplius viaticus viaticus* (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
 - Anoplius viaticus paganus* (Dahlbom, 1843) (N, S, Si)

Anospilus Haupt, 1929

- Anospilus orbitalis* (A. Costa, 1863) (N, S, Si, Sa)
- Anospilus sardus* Priesner, 1962 (Sa)

Aporinellus Banks, 1912

Aporinellus moestus (Klug, 1834) (S, Si)

Aporinellus sexmaculatus (Spinola, 1805) (N, S, Si, Sa)

Arachnospila Kincaid, 1900

Arachnospila abnormis (Dahlbom, 1842) (N)

Arachnospila alpivaga (Kohl, 1888) (N, S)

Arachnospila anceps (Wesmael, 1851)

Arachnospila anceps anceps (Wesmael, 1851) (N, S, Si)

Arachnospila anceps cyrna (Wolf, 1965) (Sa)

Arachnospila anceps peninsulana (Wolf, 1966) (N, S)

Arachnospila ausa (Tournier, 1890) (N)

Arachnospila colpostoma (Kohl, 1886) (N)

Arachnospila conjungens (Kohl, 1898) (*)

Arachnospila consobrina (Dahlbom, 1843)

Arachnospila consobrina alpina (Wolf, 1965) (S)

Arachnospila consobrina sicala (Wolf, 1966) (Si)

Arachnospila esau (Kohl, 1886) (Sa)

Arachnospila fumipennis (Zetterstedt, 1838) (N, S)

Arachnospila fuscomarginata (Thomson, 1870) (N, S, Si)

Arachnospila holomelas (A. Costa, 1882) (Sa)

Arachnospila minutula (Dahlbom, 1842)

Arachnospila minutula minutula (Dahlbom, 1842) (N, S, Si)

Arachnospila minutula apenninusurata Wolf, 1970 (N)

Arachnospila nivalabnormis (Wolf, 1964) (N)

Arachnospila opinata (Tournier, 1890) (N)

Arachnospila pseudabnormis (Wolf, 1965) (N, S)

Arachnospila rufa (Haupt, 1927) (N)

Arachnospila silvana (Kohl, 1886) (N, S)

Arachnospila sogdiana (Morawitz, 1893) (N, S)

Arachnospila spissa (Schioedte, 1837)

Arachnospila spissa spissa (Schioedte, 1837) (N, S, Sa)

Arachnospila spissa apennina Wolf, 1970 (N)

Arachnospila trivialis (Dahlbom, 1843)

Arachnospila trivialis trivialis (Dahlbom, 1843) (N, S)

Arachnospila trivialis insubrica (Wolf, 1965) (N)

Arachnospila tyrrhena Wahis, 1982 (Sa) (E)

Arachnospila usurata (Blüthgen, 1957) (N)

Arachnospila wesmaeli (Thomson, 1870) (S)

Arachnotheutes Haupt, 1927

Arachnotheutes rufithorax (A. Costa, 1882) (S, Si)

Batozonellus Arnold, 1937

Batozonellus lacerticida (Pallas, 1771) (N, S, Si, Sa)

Dicyrtomellus Gussakovskij, 1935

Dicyrtomellus argenteus Wahis, 1982 (N, S, Si, Sa)

Entomobora Gistel, 1857

Entomobora crassitarsis (A. Costa, 1874) (N, S, Si, Sa)

Entomobora itinerator (Lepeletier, 1845) (Si)

Entomobora plicata (A. Costa, 1883) (N, Sa)

Entomobora vomeriventrtris (A. Costa, 1881) (S)

Episyron Schioedte, 1837

Episyron albonotatum (Vander Linden, 1827) (N, S, Si, Sa)

Episyron arrogans (Smith, 1873) (N, S)

Episyron candiotus Wahis, 1966 (N)

Episyron coccineipes (Saunders, 1901) (Sa)

Episyron funerarius (Tournier, 1890) (N)

Episyron gallicus (Tournier, 1890) (N, S)

Episyron rufipes (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Evagetes Lepeletier, 1845

Evagetes crassicornis (Shuckard, 1835) (N, S)

Evagetes dubius (Vander Linden, 1827) (N, S, Si, Sa)

Evagetes elongatus (Lepeletier, 1845) (N, S, Si)

Evagetes gibbulus (Lepeletier, 1845) (N)

Evagetes littoralis (Wesmael, 1851) (N)

Evagetes nasobema Wolf, 1970 (Si)

Evagetes pectinipes (Linnaeus, 1758)

Evagetes pectinipes pectinipes (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)

Evagetes pectinipes mediterraneus Wolf, 1970 (S, Sa)

Evagetes proximus (Dahlbom, 1843) (N)

Evagetes sahlbergi (Morawitz, 1893) (N)

Evagetes sculus (Lepeletier, 1845) (N, S, Si, Sa)

Evagetes subglaber (Haupt, 1941) (*)

Evagetes subnudus (Haupt, 1942) (N)

Evagetes trispinosus (Kohl, 1886) (N, S, Sa)

Evagetes tumidosus (Tournier, 1890) (N)

Nanoclavelia Priesner, 1948

Nanoclavelia leucoptera (Dahlbom, 1845) (N, S)

Pompilus Fabricius, 1798

Pompilus cinereus (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa)

Tachyagetes Haupt, 1930

Tachyagetes aegyptiacus (Priesner, 1955)

Tachyagetes aegyptiacus aegyptiacus (Priesner, 1955) (S, Si)

Tachyagetes aegyptiacus sardous Wolf, 1986 (Sa)

Tachyagetes filicornis (Tournier, 1889) (N, S, Si)

Tachyagetes funebris Priesner, 1965 (S)

Tachyagetes leucocnemis Haupt, 1930

Tachyagetes leucocnemis leucocnemis Haupt, 1930 (S)

Tachyagetes leucocnemis sardocorsus Wolf, 1988 (Sa)

Tachyagetes linsenmaieri Wolf, 1988 (Sa)

Tachyagetes maculatus Nouvel & Ribaut, 1959 (S)

Tachyagetes niger (Haupt, 1930) (Si)

Telostegus A. Costa, 1887

Telostegus inermis (Brullé, 1832) (N, S, Si)

Aporus Spinola, 1808

Aporus bicolor Spinola, 1808

Aporus bicolor bicolor Spinola, 1808 (N, S, Si, Sa)

Aporus bicolor hirtipennis (Saunders, 1901) (Si)

Aporus planiceps (Latreille, 1809) (N, S)

Aporus unicolor Spinola, 1808 (N, S, Si, Sa)

Microphadnus Cameron, 1904

Microphadnus pumilus (A. Costa, 1882) (Si, Sa)

Homonotus Dahlbom, 1844

Homonotus sanguinolentus (Fabricius, 1793) (N, S, Si)

Eoferreola Arnold, 1935

Eoferreola manticata (Pallas, 1771) (N, S, Si)

Eoferreola rhombica (Christ, 1791) (N, S, Si)

Ferreola Lepeletier, 1845

Ferreola diffinis (Lepeletier, 1845) (N, S, Si, Sa)

Ceropales Latreille, 1796

Ceropales albicinctus (Rossi, 1790) (N, S, Si)
Ceropales bipartitus Haupt, 1962
 Ceropales bipartitus mediterraneus Moczár, 1978 (Sa)
 Ceropales bipartitus occidentalis Moczár, 1987 (Si)
Ceropales cribratus A. Costa, 1881 (N, S, Si, Sa)
Ceropales helveticus Tournier, 1889 (N, S, Si)
Ceropales maculatus (Fabricius, 1775) (N, Si, Sa)
Ceropales perligerus (A. Costa, 1882) (Sa)
Ceropales pygmaeus Kohl, 1880 (N, S, Sa)
Ceropales variegatus (Fabricius, 1798) (N, S, Si)

Note

Priocnemis pumiloides: Specie citata per l'Italia da fonti attendibili ma senza precisazione di località.

Anoplius piliventris: Specie citata per l'Italia da fonti attendibili ma senza precisazione di località.

Arachnospila conjungens: Specie citata per l'Italia da fonti attendibili ma senza precisazione di località.

Evagetes subglaber: Specie citata per l'Italia da fonti attendibili ma senza precisazione di località.

Sphecidae

Ampulex Jurine, 1807

Ampulex fasciata Jurine, 1807 (N, S)

Dolichurus Latreille, 1809

Dolichurus bicolor Lepeletier, 1845 (N)
Dolichurus corniculus (Spinola, 1808) (N, S, Si, Sa)
Dolichurus haemorrhous A. Costa, 1886 (S, Si, Sa)

Chilosphex Menke, 1976

Chilosphex argyrius (Brullé, 1833) (N, S, Si)

Isodontia Patton, 1881

Isodontia mexicana (Saussure, 1867) (N, S)
Isodontia paludosa (Rossi, 1790) (N, S, Si)
Isodontia splendidula (A. Costa, 1858) (N, S, Si)

Palmodes Kohl, 1890

Palmodes occitanicus (Lepeletier & Serville, 1825) (N, S, Si, Sa)

Palmodes strigulosus (A. Costa, 1858) (S, Si)

Prionyx Van der Linden, 1827

Prionyx kirbii (Van der Linden, 1827) (N, S, Si, Sa)

Prionyx lividocinctus (A. Costa, 1858) (N, S, Si, Sa)

Prionyx subfuscatus (Dahlbom, 1845) (N, S, Si, Sa)

Prionyx viduatus (Christ, 1791) (Si)

Sphex Linnaeus, 1758

Sphex afer Lepeletier, 1845

Sphex afer afer Lepeletier, 1845 (Sa)

Sphex afer sordidus Dahlbom, 1845 (N, S)

Sphex flavipennis Fabricius, 1793 (N, S, Si, Sa)

Sphex pruinosus Germar, 1817 (S)

Sphex rufocinctus Brullé, 1833 (N, S, Si, Sa)

Ammophila Kirby, 1798

Ammophila campestris Latreille, 1809 (N, S, Sa)

Ammophila heydeni Dahlbom, 1845

Ammophila heydeni heydeni Dahlbom, 1845 (N, S, Si, Sa)

Ammophila heydeni rubriventris A. Costa, 1864 (S, Si, Sa)

Ammophila hungarica Mocsáry, 1883 (S, Si)

Ammophila pubescens Curtis, 1829 (N, S)

Ammophila sabulosa (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Ammophila terminata Smith, 1856

Ammophila terminata mocsaryi Frivaldsky, 1876 (N, S, Si)

Hoplammophila de Beaumont, 1960

Hoplammophila armata (Illiger, 1807) (N, S, Si)

Hoplammophila clypeata (Mocsáry, 1883) (N, S)

Podalonia Fernald, 1927

Podalonia affinis (Kirby, 1798) (N, S, Si)

Podalonia alpina (Kohl, 1888) (N)

Podalonia fera (Lepeletier, 1845) (S, Si, Sa)

Podalonia hirsuta (Scopoli, 1763)

Podalonia hirsuta hirsuta (Scopoli, 1763) (N, S, Si)

Podalonia hirsuta mervensis (Radoszkowski, 1887) (Sa)

Podalonia tydei (Le Guillou, 1841)

Podalonia tydei tydei (Le Guillou, 1841) (N, S, Si, Sa)

Podalonia tydei senilis (Dahlbom, 1843) (N, S)

Chalybion (Chalybion) Dahlbom, 1843

Chalybion (Chalybion) flebile (Lepeletier, 1845) (Si, Sa)
Chalybion (Chalybion) ommissum (Kohl, 1889) (N)

Chalybion (Hemichalybion) Kohl, 1918

Chalybion (Hemichalybion) femoratum (Fabricius, 1781) (N, S, Si)

Sceliphron Klug, 1801

Sceliphron caementarium (Drury, 1773) (S)
Sceliphron destillatorium (Illiger, 1807) (N, S, Si, Sa)
Sceliphron madraspatanum (Fabricius, 1781)
Sceliphron madraspatanum tubifex (Latreille, 1809) (N, S, Si, Sa)
Sceliphron spirifex (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Astata Latreille, 1796

Astata affinis Van der Linden, 1829 (S)
Astata apostata Mercet, 1910 (S)
Astata boops (Schrank, 1781)
Astata boops boops (Schrank, 1781) (N, S, Si, Sa)
Astata boops picea A. Costa, 1867 (Sa)
Astata cobosi Giner Marí, 1945 (N)
Astata costae A. Costa, 1867 (N, S, Si)
Astata gallica de Beaumont, 1942 (S, Sa)
Astata graeca de Beaumont, 1965 (S)
Astata kashmirensis Nurse, 1909 (N, S, Si, Sa)
Astata minor (Kohl, 1885) (N, S)
Astata rufipes Mocsáry, 1883
Astata rufipes rufipes Mocsáry, 1883 (N, S)
Astata rufipes massiliensis (Morice, 1902) (N)
Astata sicula (Kohl, 1883) (Si)

Dryudella Spinola, 1843

Dryudella femoralis (Mocsáry, 1877) (N, S)
Dryudella freygessneri (Carl, 1920) (N, Si)
Dryudella stigma (Panzer, 1809) (N)
Dryudella tricolor (Van der Linden, 1829) (N, S, Si, Sa)

Dinetus Panzer, 1806

Dinetus pictus (Fabricius, 1793) (N, S, Si, Sa)

Mellinus Fabricius, 1790

Mellinus arvensis (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Alysson Panzer, 1806

Alysson costai de Beaumont , 1953 (N, S, Si)
Alysson ratzeburgi (Dahlbom, 1843) (N, S)
Alysson spinosus (Panzer, 1801) (N, S)
Alysson tricolor Lepeletier & Serville, 1825 (N, S)

Didineis Wesmael, 1852

Didineis crassicornis Handlirsch, 1888 (N)
Didineis lunicornis (Fabricius, 1798) (N)
Didineis wuestneii Handlirsch, 1888 (N)

Brachystegus A. Costa, 1859

Brachystegus scalaris (Illiger, 1807) (N, S)

Nysson Latreille, 1802

Nysson dimidiatus Jurine, 1807 (N, S, Si)
Nysson fulvipes A. Costa, 1859 (N, S, Sa)
Nysson ganglbaueri Kohl, 1912 (N)
Nysson interruptus (Fabricius, 1798) (N, S)
Nysson maculosus (Gmelin, 1790) (N, S, Si)
Nysson niger Chevrier, 1868 (N)
Nysson quadriguttatus Spinola, 1808 (N)
Nysson spinosus (Foerster, 1771) (N, S)
Nysson tridens Gerstaecker, 1867 (N, S)
Nysson trimaculatus (Rossi, 1790) (N, S, Si)
Nysson variabilis Chevrier, 1867 (S, Si)

Synnevrus A. Costa, 1859

Synnevrus decemmaculatus (Spinola, 1808) (N, S)
Synnevrus epeoliformis (Smith, 1856) (S)
Synnevrus militaris (Gerstaecker, 1867) (S)
Synnevrus monachus Mercet, 1909 (S)

Ammatomus A. Costa, 1859

Ammatomus coarctatus (Spinola, 1808) (N, S, Si, Sa)
Ammatomus rogenhoferi (Handlirsch, 1888) (S)

Argogorytes Ashmead, 1899

Argogorytes fargeii (Shuckard, 1837) (N, S)
Argogorytes hispanicus (Mercet, 1906) (N, Si)

Argogorytes mystaceus (Linnaeus, 1761) (N, S, Si, Sa)

Gorytes Latreille, 1804

Gorytes albidulus (Lepeletier, 1832) (N, S)
Gorytes laticinctus (Lepeletier, 1832) (N, S, Si, Sa)
Gorytes planifrons (Wesmael, 1852) (N)
Gorytes pleuripunctatus (A. Costa, 1859) (N, S)
Gorytes procrustes Handlirsch, 1888 (N, S, Sa)
Gorytes quadrifasciatus (Fabricius, 1804) (N, S)
Gorytes quinquecinctus (Fabricius, 1793) (N, S)
Gorytes quinquefasciatus (Panzer, 1798) (N, S, Si, Sa)
Gorytes schlettereri Handlirsch, 1893 (N)
Gorytes sulcifrons (A. Costa, 1869) (N, S, Si, Sa)

Harpactus Shuckard, 1837

Harpactus affinis (Spinola, 1808) (N, S, Si)
Harpactus annulatus Eversmann, 1849 (S)
Harpactus consanguineus (Handlirsch, 1888) (N, S, Si)
Harpactus elegans (Lepeletier, 1832)
 Harpactus elegans elegans (Lepeletier, 1832) (N, S, Sa)
 Harpactus elegans siculus (de Beaumont, 1968) (Si) (E)
Harpactus exiguus (Handlirsch, 1888) (N, S, Si)
Harpactus fertoni (Handlirsch, 1910) (N, Sa)
Harpactus formosus (Jurine, 1807) (N, S, Si, Sa)
Harpactus laevis (Latreille, 1792) (N, S, Si, Sa)
Harpactus leucurus (A. Costa, 1884) (Sa) (E)
Harpactus lunatus (Dahlbom, 1832) (N, Si)
Harpactus moravicus (Snoflak, 1943) (N, S)
Harpactus niger (A. Costa, 1858) (S)
Harpactus pulchellus (A. Costa, 1859) (S, Si)
Harpactus quadrisignatus (Palma, 1869) (N, Si)
Harpactus tauricus Radoszkowski, 1884 (N, S)
Harpactus tumidus (Panzer, 1801) (N, S)

Hoplisoides Gribodo, 1884

Hoplisoides craverii (A. Costa, 1869) (N, S)
Hoplisoides latifrons (Spinola, 1808) (N, S, Si)
Hoplisoides punctuosus (Eversmann, 1849) (N, S, Si)

Lestiphorus Lepeletier, 1832

Lestiphorus bicinctus (Rossi, 1794) (N, S, Si)
Lestiphorus bilunulatus A. Costa, 1869 (N)

Oryttus Spinola, 1836

Oryttus concinnus (Rossi, 1790) (N, S, Sa)

Psammaecius Lepeletier, 1832

Psammaecius punctulatus (Van der Linden, 1829) (N, S, Si, Sa)

Sphecius Dahlbom, 1845

Sphecius antennatus (Klug, 1845) (S, Si)

Sphecius conicus (Germar, 1817) (N) (*)

Sphecius nigricornis (Dufour, 1838) (N, S, Si)

Bembicinus A. Costa, 1859

Bembicinus hungaricus (Frivaldsky, 1876) (N, S, Si, Sa)

Bembicinus meridionalis A. Costa, 1859 (S, Si)

Bembicinus tridens (Fabricius, 1781)

Bembicinus tridens tridens (Fabricius, 1781) (N, S, Si, Sa)

Bembicinus tridens insulanus de Beaumont, 1954 (Sa) (E)

Stizoides Guérin, 1844

Stizoides crassicornis (Fabricius, 1787) (S)

Stizoides tridentatus (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa)

Stizus Latreille, 1802

Stizus fasciatus (Fabricius, 1781) (N, S, Sa)

Stizus hispanicus Mocsáry, 1883 (Si)

Stizus ruficornis (Foerster, 1771) (N, S, Si)

Stizus rufipes (Fabricius, 1804) (Si)

Bembix Fabricius, 1775

Bembix bicolor Radoszkowski, 1877 (S)

Bembix bidentata Van der Linden, 1829 (N, S, Si, Sa)

Bembix flavescens Smith, 1856

Bembix flavescens bolivari Handlirsch, 1893 (S, Si)

Bembix geneana A. Costa, 1867 (Sa) (E)

Bembix oculata Panzer, 1801 (N, S, Si, Sa)

Bembix olivacea Fabricius, 1787 (N, S, Si, Sa)

Bembix rostrata (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Bembix sinuata Panzer, 1804 (S, Si)

Bembix tarsata Latreille, 1809 (N, S, Si)

Bembix zonata Klug, 1835 (N?, S?) (*)

Belomicrus A. Costa, 1871

Belomicrus italicus A. Costa, 1871 (N, S)

Oxybelus Latreille, 1796

Oxybelus andalusiacus Spinola, 1843 (Si, Sa)

Oxybelus argentatus Curtis, 1833

Oxybelus argentatus argentatus Curtis, 1833 (N)

Oxybelus argentatus debeaumonti Verhoeff, 1948 (N)

Oxybelus bipunctatus Olivier, 1811 (N, S, Si)

Oxybelus diphyllus (A. Costa, 1882) (Sa) (E)

Oxybelus dissectus Dahlbom, 1845 (N, S, Si, Sa)

Oxybelus haemorrhoidalis Olivier, 1812 (N, S, Si, Sa)

Oxybelus lamellatus Olivier, 1811 (Si, Sa)

Oxybelus latidens Gerstaecker, 1867 (N)

Oxybelus latro Olivier, 1811 (N, S, Si)

Oxybelus lineatus (Fabricius, 1787) (N)

Oxybelus mandibularis Dahlbom, 1845 (N, S, Si)

Oxybelus mucronatus (Fabricius, 1793) (N, S, Si, Sa)

Oxybelus quatuordecimnotatus Jurine, 1807 (N, S, Si, Sa)

Oxybelus subspinosus Klug, 1835 (N, S, Si)

Oxybelus trispinosus (Fabricius, 1787) (N, S, Sa)

Oxybelus uniglumis (Linnaeus, 1758) (N, S)

Oxybelus variegatus Wesmael, 1852 (N, S, Si, Sa)

Crabro Fabricius, 1775

Crabro alpinus Imhoff, 1863 (N)

Crabro cribrarius (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)

Crabro peltarius (Schreber, 1784) (N, S, Si)

Crabro peltatus Fabricius, 1793 (N, S)

Crabro pugillator (A. Costa, 1871) (S)

Crabro scutellatus (Scheven, 1781) (N)

Crossocerus Lepeletier & Brullé, 1834

Crossocerus acanthophorus (Kohl, 1892) (N, S, Si)

Crossocerus annulipes (Lepeletier & Brullé, 1834) (N, S)

Crossocerus assimilis (Smith, 1856) (N, S)

Crossocerus barbipes (Dahlbom, 1845) (N)

Crossocerus binotatus Lepeletier & Brullé, 1834 (N, S)

Crossocerus capitosus (Shuckard, 1837) (N, S)

Crossocerus cetratus (Shuckard, 1837) (N)

Crossocerus cinxius (Dahlbom, 1838) (N)

Crossocerus congener (Dahlbom, 1845) (N)

Crossocerus denticrus Herrich-Schaeffer, 1841 (N, S)

Crossocerus dimidiatus (Fabricius, 1781) (N, S)

Crossocerus distinguendus (Morawitz, 1866) (N, S)

Crossocerus elongatulus (Van der Linden, 1829)
 Crossocerus elongatulus elongatulus (Van der Linden, 1829) (N, S, Si)
 Crossocerus elongatulus trinacrius de Beaumont, 1964 (Si)
Crossocerus exiguus (Van der Linden, 1829) (N, S)
Crossocerus heydeni Kohl, 1880 (N)
Crossocerus italicus de Beaumont, 1964 (S) (E)
Crossocerus leucostoma (Linnaeus, 1758) (N, S)
Crossocerus megacephalus (Rossi, 1790) (N, S, Si)
Crossocerus nigritus (Lepeletier & Brullé, 1834) (N, S)
Crossocerus ovalis Lepeletier & Brullé, 1834 (N, S)
Crossocerus palmipes (Linnaeus, 1867) (N, S)
Crossocerus podagricus (Van der Linden, 1829) (N, S)
Crossocerus quadrimaculatus (Fabricius, 1793) (N, S, Si, Sa)
Crossocerus tarsatus (Shuckard, 1837) (N, S, Si, Sa)
Crossocerus vagabundus (Panzer, 1798) (N, S)
Crossocerus varus Lepeletier & Brullé, 1835 (N, S, Si)
Crossocerus walkeri (Shuckard, 1837) (N)
Crossocerus wesmaeli (Van der Linden, 1829) (N, S, Si)

***Ectemnius* Dahlbom, 1845**

Ectemnius borealis (Zetterstedt, 1838) (N, S)
Ectemnius cavifrons (Thomson, 1870) (N, S)
Ectemnius cephalotes (Olivier, 1792) (N, S, Si)
Ectemnius confinis (Walker, 1871) (N, S, Si, Sa)
Ectemnius continuus (Fabricius, 1804) (N, S, Si, Sa)
Ectemnius crassicornis (Spinola, 1808) (N, S, Si)
Ectemnius dives (Lepeletier & Brullé, 1834) (N, S)
Ectemnius fossorius (Linnaeus, 1758) (N)
Ectemnius guttatus (Van der Linden, 1829) (N, S)
Ectemnius hypsae (De Stefani, 1884) (N, S, Si)
Ectemnius krieckbaumeri (Kohl, 1879) (N, S)
Ectemnius lapidarius (Panzer, 1804) (N, S, Si)
Ectemnius lituratus (Panzer, 1804) (N, S, Si)
Ectemnius massiliensis (Kohl, 1883) (S)
Ectemnius meridionalis (A. Costa, 1871) (N, S, Si, Sa)
Ectemnius nigritarsus (Herrich-Schaeffer, 1841) (N, Sa)
Ectemnius rubicola (Dufour & Perris, 1840) (N, S, Si)
Ectemnius ruficornis (Zetterstedt, 1838) (N, S)
Ectemnius rugifer (Dahlbom, 1845) (N, S)
Ectemnius schlettereri (Kohl, 1888) (N, S, Si)
Ectemnius sexcinctus (Fabricius, 1775) (N, S, Sa)
Ectemnius spinipes (Morawitz, 1866) (N)

***Entomognathus* Dahlbom, 1844**

Entomognathus brevis (Van der Linden, 1829) (N, S, Si, Sa)
Entomognathus dentifer (Noskiewicz, 1929) (N, Sa)

Entomognathus schmiedknechtii (Kohl, 1905) (S)

Lestica Billberg, 1820

Lestica alata (Panzer, 1797) (N)

Lestica clypeata (Schreber, 1759) (N, S, Si, Sa)

Lestica subterranea (Fabricius, 1775) (N, S)

Lindenius Lepeletier & Brullé, 1834

Lindenius albilabris (Fabricius, 1793) (N, S)

Lindenius laevis A. Costa, 1871 (N, S)

Lindenius major de Beaumont, 1956 (N)

Lindenius melinopus (Kohl, 1915) (N)

Lindenius mesopleuralis (Morawitz, 1890)

Lindenius mesopleuralis mesopleuralis (Morawitz, 1890) (N, S, Si)

Lindenius mesopleuralis mediterraneus (Kohl, 1815) (N)

Lindenius panzeri (Van der Linden, 1829) (N, S, Si)

Lindenius pygmaeus (Rossi, 1794)

Lindenius pygmaeus pygmaeus (Rossi, 1794) (N, S, Si, Sa)

Lindenius pygmaeus armatus (Van der Linden, 1829) (N, S, Si)

Lindenius subaeneus Lepeletier & Brullé, 1834 (N, S)

Rhopalum Stephens, 1829

Rhopalum clavipes (Linnaeus, 1758) (N, S)

Rhopalum coarctatum (Scopoli, 1793) (N, S)

Rhopalum gracile Wesmael, 1852 (N, S, Sa)

Tracheliodes Morawitz, 1866

Tracheliodes curvitaris (Herrich-Schaefer, 1841) (N, S, Si)

Tracheliodes quinquenotatus (Jurine, 1807) (N, S, Si, Sa)

Philanthus Fabricius, 1790

Philanthus coarctatus Spinola, 1838

Philanthus coarctatus sculus Giordani Soika, 1944 (S, Si) (E)

Philanthus coronatus (Thunberg, 1784) (N, S, Sa)

Philanthus triangulum (Fabricius, 1775)

Philanthus triangulum triangulum (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa)

Philanthus triangulum abdelkader Lepeletier, 1845 (Si)

Philanthus triangulum diadema (Fabricius, 1781) (Sa)

Philanthus venustus (Rossi, 1790) (N, S, Si, Sa)

Cerceris Latreille, 1802

Cerceris albofasciata (Rossi, 1790) (N, S)

Cerceris arenaria (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
Cerceris bicincta Klug, 1835 (N, S)
Cerceris bucculata A. Costa, 1860 (S, Si)
Cerceris bupresticida Dufour, 1841 (N, S, Si)
Cerceris circularis (Fabricius, 1804)
 Cerceris circularis dacica Schletterer, 1887 (N, S, Sa)
Cerceris eryngii Marquet, 1875 (N, S)
Cerceris fimbriata (Rossi, 1790) (N, S, Si)
Cerceris flavicornis Brullé, 1833 (N, S, Si, Sa)
Cerceris flavilabris (Fabricius, 1793)
 Cerceris flavilabris flavilabris (Fabricius, 1793) (N, S, Sa)
 Cerceris flavilabris insularis (Smith, 1856) (Si)
Cerceris interrupta (Panzer, 1799) (N, S, Si)
Cerceris lunata A. Costa, 1869
 Cerceris lunata lunata A. Costa, 1869 (N, S, Si)
 Cerceris lunata funerea A. Costa, 1869 (N, S, Si)
Cerceris maculata Radoszkowski, 1877 (S)
Cerceris media Klug, 1835 (N, S, Si)
Cerceris odontophora Schletterer, 1887 (Si)
Cerceris quadricincta (Panzer, 1799)
 Cerceris quadricincta quadricincta (Panzer, 1799) (N, S, Si)
 Cerceris quadricincta corsica de Beaumont, 1952 (Sa)
Cerceris quadrifasciata (Panzer, 1799) (N, S)
Cerceris quinquefasciata (Rossi, 1792) (N, S, Si)
Cerceris rubida (Jurine, 1807) (N, S, Si, Sa)
Cerceris ruficornis (Fabricius, 1793)
 Cerceris ruficornis ruficornis (Fabricius, 1793) (N, S)
 Cerceris ruficornis laminifera A. Costa, 1869 (N, S)
 Cerceris ruficornis costai de Beaumont, 1950 (S)
Cerceris rybyensis (Linnaeus, 1771)
 Cerceris rybyensis rybyensis (Linnaeus, 1771) (N, S, Si)
 Cerceris rybyensis fertoni de Beaumont, 1952 (Sa)
Cerceris sabulosa (Panzer, 1799)
 Cerceris sabulosa sabulosa (Panzer, 1799) (N, S, Si, Sa)
 Cerceris sabulosa algerica (Thunberg, 1815) (Si)
Cerceris specularis A. Costa, 1869 (N, S, Si, Sa)
Cerceris stratiotes Schletterer, 1887 (N, S)
Cerceris tenuivittata Dufour, 1849 (N, S)
Cerceris tuberculata (Villers, 1789) (N, S, Si, Sa)

Larra Fabricius, 1793

Larra anathema (Rossi, 1790) (N, S, Si, Sa)

Liris Fabricius, 1804

Liris atratus (Spinola, 1805) (N, Si, Sa)
Liris haemorrhoidalis (Fabricius, 1804) (Si)

Liris niger (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa)
Liris praetermissus (Richards, 1928) (S, Si, Sa)

Prosopigastra A. Costa, 1867

Prosopigastra orientalis de Beaumont, 1947 (S)
Prosopigastra punctatissima A. Costa, 1867 (S, Si)

Tachysphex Kohl, 1883

Tachysphex brullii (Smith, 1856) (N, S, Si)
Tachysphex consocius Kohl, 1892 (N, S, Si)
Tachysphex coriaceus (A. Costa, 1867) (N, S)
Tachysphex costae (De Stefani, 1881) (N, S, Si, Sa)
Tachysphex erythropus (Spinola, 1838) (S, Si)
Tachysphex fugax (Radoszkowski, 1877) (N, S, Sa)
Tachysphex fulvitaris (A. Costa, 1867)
 Tachysphex fulvitaris fulvitaris (A. Costa, 1867) (N, S, Si, Sa)
 Tachysphex fulvitaris erythrogaster (A. Costa, 1882) (Sa)
Tachysphex helveticus Kohl, 1885 (N, S)
Tachysphex incertus (Radoszkowski, 1877)
 Tachysphex incertus incertus (Radoszkowski, 1877) (N, S, Si, Sa)
 Tachysphex incertus rufiventralis Ferton, 1905 (Sa)
Tachysphex julliani Kohl, 1883 (S)
Tachysphex mediterraneus Kohl, 1883 (N, S, Si, Sa)
Tachysphex nitidior de Beaumont, 1940 (N, S, Si, Sa)
Tachysphex nitidus (Spinola, 1805) (N, S, Si, Sa)
Tachysphex obscuripennis (Schenck, 1857)
 Tachysphex obscuripennis obscuripennis (Schenck, 1857) (N, S, Si, Sa)
 Tachysphex obscuripennis gibbus Kohl, 1885 (N, S, Sa)
Tachysphex panzeri (Van der Linden, 1829)
 Tachysphex panzeri panzeri (Van der Linden, 1829) (N, S, Si, Sa)
 Tachysphex panzeri rufiventris (Spinola, 1838) (Sa)
Tachysphex plicosus (A. Costa, 1867) (N, S, Si)
Tachysphex pompiliformis (Panzer, 1804) (N, S, Si)
Tachysphex psammobius (Kohl, 1880) (N, S, Si)
Tachysphex tarsinus (Lepeletier, 1845) (N, S, Si, Sa)
Tachysphex unicolor (Panzer, 1809) (N, S, Si)

Tachytes Panzer, 1806

Tachytes etruscus (Rossi, 1790) (N, S, Si, Sa)
Tachytes europaeus Kohl, 1884 (N, S, Si, Sa)
Tachytes freygessneri Kohl, 1881 (N, S, Si, Sa)
Tachytes obsoletus (Rossi, 1792) (N, S, Si, Sa)
Tachytes procerus A. Costa, 1882 (Sa)

Palarus Latreille, 1803

Palarus variegatus (Fabricius, 1781) (N, S)

Miscophus Jurine, 1807

Miscophus ater Lepeletier, 1845 (N, S)

Miscophus bicolor Jurine, 1807 (N, S)

Miscophus concolor Dahlbom, 1844 (N, S, Sa)

Miscophus eatoni Saunders, 1903 (N)

Miscophus helveticus Kohl, 1883

Miscophus helveticus helveticus Kohl, 1883 (N, S, Si)

Miscophus helveticus rubriventris Fertton, 1896 (N, S, Si, Sa)

Miscophus niger Dahlbom, 1844 (N, S, Si, Sa)

Miscophus pretiosus Kohl, 1884 (N, Si)

Miscophus spurius (Dahlbom, 1832) (N, S, Si)

Nitela Latreille, 1809

Nitela borealis Valkeila, 1974 (N, S)

Nitela fallax Kohl, 1884 (N, S)

Nitela spinola Latreille, 1809 (N, S, Sa)

Solierella Spinola, 1851

Solierella compedita (Piccioli, 1869) (N, S, Si, Sa)

Solierella seabrai Andrade, 1950

Solierella seabrai seabrai Andrade, 1950 (S)

Solierella seabrai corsa de Beaumont, 1964 (Sa)

Pison Jurine, 1808

Pison atrum (Spinola, 1808) (N, S, Si, Sa)

Pison fasciatum (Radoszkowski, 1876) (N?, S?) (*)

Trypoxylon Latreille, 1796

Trypoxylon attenuatum Smith, 1851 (N, S, Si, Sa)

Trypoxylon beaumonti Antropov, 1991 (N, S, Si)

Trypoxylon clavicerum Lepeletier & Serville, 1825 (N, S, Si, Sa)

Trypoxylon deceptorium Antropov, 1991 (N, S, Sa)

Trypoxylon figulus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)

Trypoxylon kolazyi Kohl, 1893 (N, S)

Trypoxylon latilobatum Antropov, 1991 (N, S)

Trypoxylon medium de Beaumont, 1945 (N, S)

Trypoxylon minus de Beaumont, 1945 (N, S, Si, Sa)

Trypoxylon scutatum Chevrier, 1867 (N, S, Si, Sa)

Trypoxylon syriacum Mercet, 1906 (S)

Mimesa Shuckard, 1837

- Mimesa bicolor* (Jurine, 1807) (N, S)
- Mimesa bruxellensis* Bondroit, 1934 (N)
- Mimesa crassipes* A. Costa, 1871 (N, S, Sa)
- Mimesa equestris* (Fabricius, 1804) (N, Sa)
- Mimesa grandii* Maidl, 1933
 - Mimesa grandii grandii* Maidl, 1933 (N, S, Si)
 - Mimesa grandii sciaphila* (Arcidiacono, 1965) (Si)
- Mimesa lutaria* (Fabricius, 1787) (N)
- Mimesa nigrita* Eversmann, 1849 (N, S)

Mimumesa Malloch, 1933

- Mimumesa atratina* (Morawitz, 1891) (N, S)
- Mimumesa dahlbomi* (Wesmael, 1852) (N, S)
- Mimumesa littoralis* (Bondroit, 1934) (N)
- Mimumesa unicolor* (Van der Linden, 1829) (N, S, Si)

Psen Latreille, 1796

- Psen ater* (Olivier, 1792) (N, S)
- Psen exaratus* (Eversmann, 1849) (N)

Psenulus Kohl, 1896

- Psenulus concolor* (Dahlbom, 1843) (N, S)
- Psenulus fuscipennis* (Dahlbom, 1843) (N, S)
- Psenulus laevigatus* (Schenck, 1857) (N, S)
- Psenulus pallipes* (Panzer, 1798) (N, S, Si, Sa)
- Psenulus schencki* (Tournier, 1889) (N, S, Si)

Diodontus Curtis, 1834

- Diodontus friesei* Kohl, 1901 (N, S)
- Diodontus handlirschi* Kohl, 1888 (N)
- Diodontus insidiosus* Spooner, 1938 (N, S)
- Diodontus luperus* Shuckard, 1837 (N, S, Si)
- Diodontus minutus* (Fabricius, 1793) (N, S, Si, Sa)
- Diodontus tristis* (Van der Linden, 1829) (N, S)

Passaloecus Shuckard, 1837

- Passaloecus borealis* Dahlbom, 1844 (N)
- Passaloecus brevilabris* Wolf, 1938 (N, S)
- Passaloecus corniger* Shuckard, 1837 (N, S)
- Passaloecus eremita* Kohl, 1893 (N, S)
- Passaloecus gracilis* (Curtis, 1834) (N, S, Si, Sa)

Passaloecus insignis (Van der Linden, 1829) (N, S)
Passaloecus pictus Ribaut, 1952 (N, S)
Passaloecus ribauti Merisuo, 1974 (S)
Passaloecus singularis Dahlbom, 1844 (N, S, Si)
Passaloecus turionum Dahlbom, 1844 (N, S)
Passaloecus vandeli Ribaut, 1952 (N, S)

Pemphredon Latreille, 1796

Pemphredon austriaca (Kohl, 1888) (N, S, Sa)
Pemphredon beaumonti Hellén, 1955 (N) (*)
Pemphredon coracina Valkeila, 1972 (N) (*)
Pemphredon inornata Say, 1824 (N, S, Si)
Pemphredon lethifera (Shuckard, 1837) (N, S, Si, Sa)
Pemphredon lugens Dahlbom, 1842 (N, Si)
Pemphredon lugubris (Fabricius, 1793) (N, S, Sa)
Pemphredon montana Dahlbom, 1845 (N)
Pemphredon morio Van der Linden, 1829 (N, S)
Pemphredon nescia Merisuo, 1972 (N)
Pemphredon podagrica Chevrier, 1870 (N)
Pemphredon rugifera Dahlbom, 1844 (N, S, Si, Sa)

Polemistus Saussure, 1892

Polemistus abnormis (Kohl, 1888) (N)

Spilomena Shuckard, 1838

Spilomena beata Blüthgen, 1953 (N)
Spilomena curruca (Dahlbom, 1843) (N)
Spilomena mocsaryi Kohl, 1898 (N, S, Si, Sa)
Spilomena punctatissima Blüthgen, 1953 (N)
Spilomena troglodytes (Van der Linden, 1829) (N, S, Sa)

Stigmus Panzer, 1804

Stigmus pendulus Panzer, 1804 (N, S)
Stigmus solskyi Morawitz, 1864 (N, S)

Ammoplanus Giraud, 1869

Ammoplanus bischoffi Maréchal, 1938 (N?) (*)
Ammoplanus handlirschi Gussakovskij, 1931 (N, S)
Ammoplanus marathroicus (De Stefani, 1887) (Si)
Ammoplanus wesmaeli Giraud, 1869 (N, S, Si)

Note

Sphecius conicus: Presenza da confermare.
Bembix zonata: Presenza da confermare.
Pison fasciatum: Presenza da confermare.
Pemphredon beaumonti: Presenza da confermare.
Pemphredon coracina: Presenza da confermare.
Ammoplanus bischoffi: Presenza da confermare.

Colletidae

Hylaeus Fabricius, 1793

Hylaeus absolutus (Gribodo, 1894) (Si)
Hylaeus adriaticus (Warncke, 1972) (N)
Hylaeus alpinus (Morawitz, 1867) (N)
Hylaeus ambigua Foerster, 1871 (N)
Hylaeus angustatus (Schenck, 1859) (N, S, Si)
Hylaeus annularis (Kirby, 1802) (N, S, Si)
Hylaeus annulatus (Linnaeus, 1758) (N, S)
Hylaeus bifasciatus (Jurine, 1807) (N, S, Si)
Hylaeus bisinuatus Foerster, 1871 (N, S)
Hylaeus brachycephalus (Morawitz, 1868) (N)
Hylaeus brevicornis Nylander, 1852 (N, S, Si, Sa)
Hylaeus clypearis (Schenck, 1853) (N, S, Si, Sa)
Hylaeus communis Nylander, 1852
 Hylaeus communis communis Nylander, 1852 (N, S, Si, Sa)
 Hylaeus communis deceptorius (Benoist, 1959) (Sa)
Hylaeus confusus Nylander, 1852 (N, S)
Hylaeus cornutus Curtis, 1831 (N, S, Si, Sa)
Hylaeus crassanus (Warncke, 1972) (N)
Hylaeus difformis (Eversmann, 1852) (N, S)
Hylaeus diplonymus (Schulz, 1906) (N, S, Si, Sa)
Hylaeus duckei (Alfken, 1904) (N, S)
Hylaeus euryscapus Foerster, 1871
 Hylaeus euryscapus euryscapus Foerster, 1871 (N, S, Sa)
 Hylaeus euryscapus spilotus Foerster, 1871 (N)
Hylaeus gibbus Saunders, 1850 (N, S, Si)
Hylaeus glacialis Morawitz, 1872 (N)
Hylaeus gracilicornis (Morawitz, 1867) (N, S, Sa)
Hylaeus gredleri Foerster, 1871 (N, S, Si)
Hylaeus hyalinatus Smith, 1842
 Hylaeus hyalinatus hyalinatus Smith, 1842 (N, S, Sa)
 Hylaeus hyalinatus montebovensis (Pittioni, 1950) (S)
Hylaeus hyperpunctatus (Strand, 1909)
 Hylaeus hyperpunctatus hyperpunctatus (Strand, 1909) (Si, Sa)
 Hylaeus hyperpunctatus subhyalinatus (Pittioni, 1950) (Sa)
 Hylaeus hyperpunctatus helenae (Pittioni, 1950) (N)
Hylaeus imparilis Foerster, 1871 (N, S, Si, Sa)

Hylaeus incompletus (Alfken, 1936) (N)
Hylaeus leptcephalus (Morawitz, 1871) (N, S)
Hylaeus lineolatus (Schenck, 1859) (N, S)
Hylaeus meridionalis Foerster, 1871 (N)
Hylaeus nigrinus (Fabricius, 1798) (N, S)
Hylaeus nivaliformis Dathe, 1977 (N)
Hylaeus nivalis (Morawitz, 1867) (N)
Hylaeus niveofasciatus (Dours, 1872) (Si)
Hylaeus pectoralis Foerster, 1871 (N)
Hylaeus pfankuchi (Alfken, 1919) (N)
Hylaeus pictipes Nylander, 1852 (N, S, Si, Sa)
Hylaeus pictus (Smith, 1853) (N, Si)
Hylaeus punctatus (Brullé, 1832) (N, S, Si, Sa)
Hylaeus punctulatus Smith, 1842 (N, S)
Hylaeus punctus Foerster, 1871 (N)
Hylaeus signatus (Panzer, 1798) (N, S, Sa)
Hylaeus sinuatus (Schenck, 1853)
 Hylaeus sinuatus sinuatus (Schenck, 1853) (N, S, Si)
 Hylaeus sinuatus gribodoi (Vachal, 1895) (S)
Hylaeus soror (Pérez, 1903) (N, S, Si, Sa)
Hylaeus styriacus Foerster, 1871 (N, S)
Hylaeus trinotatus (Pérez, 1895) (S)
Hylaeus tyrolensis Foerster, 1871 (N, S)
Hylaeus variegatus (Fabricius, 1798)
 Hylaeus variegatus variegatus (Fabricius, 1798) (N, S, Si, Sa)
 Hylaeus variegatus analis (Fabricius, 1804) (S)
 Hylaeus variegatus coriaceus (Pérez, 1895) (S)

Colletes Latreille, 1802

Colletes abeillei Pérez, 1903 (S, Si)
Colletes acutus Pérez, 1903 (Si)
Colletes albomaculatus (Lucas, 1849) (S, Si)
Colletes carinatus Radoszkowski, 1891 (N)
Colletes caspicus Morawitz, 1874
 Colletes caspicus balticus Alfken, 1912 (N)
 Colletes caspicus maidli Noskiewicz, 1936 (N, S, Si, Sa)
Colletes cunicularius (Linnaeus, 1761) (N, S)
Colletes daviesanus Smith, 1846
 Colletes daviesanus daviesanus Smith, 1846 (N, S)
 Colletes daviesanus tuberculatus Morawitz, 1894 (Si)
Colletes dimidiatus Brullé, 1840
 Colletes dimidiatus canescens Smith, 1853 (N, S)
 Colletes dimidiatus nigricans Gistel, 1857 (N, S, Si)
 Colletes dimidiatus eous Morice, 1904 (S)
 Colletes dimidiatus siciliensis Noskiewicz, 1959 (N, S, Si)
 Colletes dimidiatus tyrrhenicus Warncke, 1978 (Sa)
Colletes floralis Eversmann, 1852 (N)

Colletes fodiens (Geoffroy, 1765) (N, S)
Colletes ligatus Erichson, 1855
 Colletes ligatus hylaeiformis Eversmann, 1852 (S)
Colletes marginatus Smith, 1846 (N, S, Sa)
Colletes mlokoszewiczi Radoszkowski, 1891 (N, S, Si)
Colletes similis Schenck, 1853 (N, S, Si, Sa)
Colletes succinctus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)

Andrenidae

Andrena Fabricius, 1775

Andrena abbreviata Dours, 1873
 Andrena abbreviata osychniuki Warncke, 1973 (S)
Andrena aeneiventris Morawitz, 1872 (N, S, Si)
Andrena aerinifrons Dours, 1873 (Si)
Andrena agilissima (Scopoli, 1770)
 Andrena agilissima agilissima (Scopoli, 1770) (N, S, Si, Sa)
 Andrena agilissima italica Warncke, 1968 (S, Si)
Andrena agnata Warncke, 1968 (S, Si)
Andrena albopunctata (Rossi, 1792)
 Andrena albopunctata albopunctata (Rossi, 1792) (N, S, Si, Sa)
 Andrena albopunctata funebris Panzer, 1798 (Si)
Andrena alfkenella Perkins, 1914 (N, S)
Andrena angustior (Kirby, 1802)
 Andrena angustior angustior (Kirby, 1802) (N)
Andrena apicata Smith, 1847 (N, S, Si)
Andrena argentata Smith, 1884 (N)
Andrena assimilis Radoszkowski, 1876
 Andrena assimilis assimilis Radoszkowski, 1876 (N)
 Andrena assimilis gallica Schmiedeknecht, 1883 (N)
Andrena barbilabris (Kirby, 1802) (N, S)
Andrena bicarinata Morawitz, 1876 (N)
Andrena bicolor Fabricius, 1775 (N, S, Si)
Andrena bicolorata (Rossi, 1790) (N, S, Si, Sa)
Andrena bimaculata (Kirby, 1802)
 Andrena bimaculata bimaculata (Kirby, 1802) (N, S, Sa)
 Andrena bimaculata aulica Morawitz, 1876 (N)
Andrena bisulcata Morawitz, 1878 (S)
Andrena carbonaria (Linnaeus, 1767) (N, S, Si, Sa)
Andrena chrysopus Pérez, 1903 (N)
Andrena chrysopyga Schenck, 1853 (N, S, Si)
Andrena chrysosceles (Kirby, 1802) (N, S, Si)
Andrena cineraria (Linnaeus, 1758)
 Andrena cineraria cineraria (Linnaeus, 1758) (N, S)
 Andrena cineraria danuvia Stoeckhert, 1950 (S)
Andrena cinerea Brullé, 1832 (N, S, Sa)

Andrena clypeata Brullé, 1832 (N, S)
Andrena clypella Strand, 1921
 Andrena clypella hasitata Warncke, 1973 (S, Sa)
Andrena coitana (Kirby, 1802) (N)
Andrena colletiformis Morawitz, 1874 (N, S, Si, Sa)
Andrena combaella Warncke, 1966 (S)
Andrena combinata (Christ, 1791) (N, S, Si, Sa)
Andrena compta Lepeletier, 1841 (Sa)
Andrena congruens Schmiedeknecht, 1883 (N, S, Sa)
Andrena creberrima Pérez, 1895 (S)
Andrena curvungula Thomson, 1870 (N)
Andrena decipiens Schenck, 1859 (N, S, Si)
Andrena denticulata (Kirby, 1802) (N, S)
Andrena distinguenda Schenck, 1871 (N, S)
Andrena djelfensis Pérez, 1895 (S)
Andrena dorsalis Brullé, 1832 (S)
Andrena dorsata (Kirby, 1802)
 Andrena dorsata dorsata (Kirby, 1802) (N, S, Si)
 Andrena dorsata propinqua Schenck, 1853 (N, S, Si)
Andrena elegans Giraud, 1864 (N)
Andrena enslinella Stoeckhert, 1924 (N)
Andrena fabrella Pérez, 1903 (S)
Andrena falsifica Perkins, 1915 (N)
Andrena ferox Smith, 1847 (N, S)
Andrena ferrugineicrus Dours, 1872 (S, Si, Sa)
Andrena fimbriata Brullé, 1832 (N, S, Si)
Andrena flavipes Panzer, 1799
 Andrena flavipes flavipes Panzer, 1799 (N, S, Si, Sa)
 Andrena flavipes puber Erichson, 1835 (N)
 Andrena flavipes alexandrina Warncke, 1966 (N, Si)
Andrena florea Fabricius, 1793 (N, S, Si)
Andrena florentina Magretti, 1883 (N, S, Si)
Andrena floricola Eversmann, 1852 (N, S)
Andrena forsterella Warncke, 1968 (S, Si)
Andrena fucata Smith, 1847 (N)
Andrena fuliginata Pérez, 1895 (Si)
Andrena fulva (Müller, 1766) (N, S)
Andrena fulvago (Christ, 1791) (N, S, Si)
Andrena fulvata Stoeckhert, 1930 (N, S)
Andrena fulvida Schenck, 1853 (S)
Andrena fulvitarsis Brullé, 1832 (N, S, Si)
Andrena fumida Pérez, 1895 (S, Si)
Andrena fuscipes (Kirby, 1802) (N)
Andrena fuscosa Erichson, 1835
 Andrena fuscosa fuscosa Erichson, 1835 (S, Si)
 Andrena fuscosa rutila Spinola, 1838 (N, S, Si)
Andrena granulosa Pérez, 1902 (N)
Andrena gravida Imhoff, 1832 (S, Si)

Andrena haemorrhoea (Fabricius, 1781) (N, S)
Andrena hattorfiana (Fabricius, 1775) (N, S, Si)
Andrena hedikae Jaeger, 1934 (S)
Andrena helvola (Linnaeus, 1758) (N)
Andrena hesperia Smith, 1853 (N, S, Si, Sa)
Andrena humilis Imhoff, 1832 (N, S, Si)
Andrena hypopolia Schmiedeknecht, 1883 (N, S, Si, Sa)
Andrena impunctata Pérez, 1895 (N, S, Si)
Andrena intermedia Thomson, 1870 (N, Sa)
Andrena italiana Pittioni, 1950 (N)
Andrena jacobi Perkins, 1921 (N)
Andrena kamarti Schmiedeknecht, 1900 (Si)
Andrena korleviciana Friese, 1887 (N)
Andrena krieckbaumeri Schmiedeknecht, 1883 (Si)
Andrena labialis (Kirby, 1802) (N, S, Si)
Andrena labiata Fabricius, 1781 (N, S, Si)
Andrena lagopus Latreille, 1809 (N, S, Si)
Andrena lathyri Alfken, 1899 (N, S, Si)
Andrena lepida Schenck, 1859
 Andrena lepida lepida Schenck, 1859 (S, Si, Sa)
 Andrena lepida ardens Pérez, 1895 (Sa)
Andrena leucorhina Morawitz, 1876 (S)
Andrena limata Smith, 1853 (N, S, Si)
Andrena limbata Eversmann, 1852 (N, S, Si)
Andrena livens Pérez, 1895
 Andrena livens livens Pérez, 1895 (N, S, Si)
 Andrena livens gruenwaldti Warncke, 1968 (Si)
Andrena maculipes Morawitz, 1876 (N)
Andrena marginata Fabricius, 1776 (N, S, Si)
Andrena migiella Dours, 1873 (S, Si, Sa)
Andrena minutula (Kirby, 1802) (N, S, Sa)
Andrena minutuloides Perkins, 1914 (N, S, Sa)
Andrena mitis Schmiedeknecht, 1883 (N, Si)
Andrena mocsaryi Schmiedeknecht, 1883 (*)
Andrena morio Brullé, 1832
 Andrena morio morio Brullé, 1832 (N, S, Si, Sa)
 Andrena morio lugubris Erichson, 1849 (S, Si, Sa)
Andrena mucida Kriechbaumer, 1873 (N, S, Si)
Andrena nana (Kirby, 1802) (N, S, Si, Sa)
Andrena nanula Nylander, 1848 (N)
Andrena nasuta Giraud, 1863 (S)
Andrena nigriceps (Kirby, 1802) (N)
Andrena nigroaenea (Kirby, 1802)
 Andrena nigroaenea nigroaenea (Kirby, 1802) (N, S, Si, Sa)
 Andrena nigroaenea nigrosericea Dours, 1872 (Si)
Andrena nigroolivacea Dours, 1873 (N, S, Sa)
Andrena nitida (Müller, 1776) (N, S, Si, Sa)
Andrena nitidiuscula Schenck, 1853 (N, S)

Andrena niveata Friese, 1887
 Andrena niveata haloga Warncke, 1980 (S)
Andrena nobilis Morawitz, 1873 (Sa)
Andrena numida Lepeletier, 1841
 Andrena numida numida Lepeletier, 1841 (N, S, Sa)
 Andrena numida syracusa Strand, 1921 (Si)
Andrena nuptialis Pérez, 1902 (Sa)
Andrena nycthemera Imhoff, 1866 (N)
Andrena oblita Warncke, 1968 (S)
Andrena ocreata (Christ, 1791) (N, S)
Andrena orbitalis Morawitz, 1871 (Si)
Andrena ovatula (Kirby, 1802) (N, S, Si, Sa)
Andrena pallitarsis Pérez, 1903 (N)
Andrena pandellei Pérez, 1895 (N)
Andrena parviceps Kriechbaumer, 1873 (N)
Andrena passerina Warncke, 1974 (Si)
Andrena paucisquama Noskiewicz, 1924 (N)
Andrena pellucens Pérez, 1895 (N)
Andrena pillichii Noskiewicz, 1939 (N)
Andrena polita Smith, 1847 (S)
Andrena potentillae Panzer, 1809 (N, S)
Andrena praecox (Scopoli, 1763) (N)
Andrena proxima (Kirby, 1802) (N, S, Si)
Andrena puella Alfken, 1938 (Sa) (E)
Andrena pusilla Pérez, 1903 (N, S)
Andrena ranunculi Schmiedeknecht, 1884 (N, S)
Andrena rhyssonota Pérez, 1895 (Si)
Andrena rogenhoferi Morawitz, 1872 (N)
Andrena rosae Panzer, 1801 (N)
Andrena rotundata Pérez, 1895
 Andrena rotundata diomedia Warncke, 1975 (Sa)
Andrena ruficrus Nylander, 1848 (N)
Andrena rufizona Imhoff, 1834 (N)
Andrena rufula Schmiedeknecht, 1883 (S)
Andrena rugulosa Stoeckhert, 1935 (N)
Andrena sardoa Lepeletier, 1841 (Si, Sa)
Andrena savignyi Spinola, 1838 (S)
Andrena saxonica Stoeckhert, 1935 (N, S)
Andrena schencki Morawitz, 1866 (N, S, Si)
Andrena schmiedeknechti Magretti, 1883 (N, S)
Andrena schulzi Strand, 1921
 Andrena schulzi schulzi Strand, 1921 (S, Si)
 Andrena schulzi alba Warncke, 1968 (S)
Andrena scita Eversmann, 1852 (S, Si)
Andrena semilaevis Pérez, 1903 (N)
Andrena seminuda Friese, 1896 (S, Si)
Andrena senecionis Pérez, 1895 (N, S, Si)
Andrena sericata Imhoff, 1866 (N)

Andrena siciliana Warncke, 1980 (Si)
Andrena similis Smith, 1849 (N, S, Si)
Andrena simonferugella Noskiewicz, 1939 (N)
Andrena simontornyella Noskiewicz, 1930 (N, S)
Andrena spreta Pérez, 1895
 Andrena spreta spreta Pérez, 1895 (N, S, Sa)
 Andrena spreta pusilla Pérez, 1903 (N, S, Sa)
Andrena subopaca Nylander, 1848 (N, S)
Andrena symphyti Schmiedeknecht, 1883 (N, S)
Andrena taraxaci Giraud, 1861
 Andrena taraxaci taraxaci Giraud, 1861 (N, S, Si)
 Andrena taraxaci stabiana Morice, 1889 (N, S, Si)
Andrena tarsata Nylander, 1848 (N)
Andrena tenuistriata Pérez, 1895 (S, Si)
Andrena thoracica (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa)
Andrena tibialis Kirby, 1802 (N, S)
Andrena trimmerana (Kirby, 1802) (N, S, Si)
Andrena truncatilabris Morawitz, 1878 (N, S, Si)
Andrena tscheki Morawitz, 1872 (N)
Andrena vaga Panzer, 1799 (N)
Andrena variabilis Smith, 1853 (N, S, Si, Sa)
Andrena varians (Rossi, 1792) (N)
Andrena ventralis Imhoff, 1832 (N)
Andrena ventricosa Dours, 1873 (N, S, Si)
Andrena verticalis Pérez, 1895 (Si)
Andrena vetula Lepeletier, 1841
 Andrena vetula vetula Lepeletier, 1841 (S, Si, Sa)
 Andrena vetula tyrrhena Alfken, 1938 (Sa)
Andrena viridescens Viereck, 1916 (N)
Andrena vulpecula Kriechbaumer, 1873 (N, S, Sa)
Andrena wilkella (Kirby, 1802) (N, S, Si)

Melitturga Latreille, 1809

Melitturga caudata Pérez, 1879 (N, S)
Melitturga clavicornis (Latreille, 1806) (N, S)

Camptopoeum Spinola, 1843

Camptopoeum friesei Mocsáry, 1894 (N, S, Si)
Camptopoeum frontale (Fabricius, 1804) (N)
Camptopoeum nasutus (Spinola, 1838) (N, S, Si)
Camptopoeum siculum Giordani Soika, 1944 (Si)

Panurginus Nylander, 1848

Panurginus montanus Giraud, 1861 (N)

***Panurgus* Panzer, 1806**

- Panurgus banksianus* (Kirby, 1802) (N, S)
- Panurgus calcaratus* (Scopoli, 1763) (N, S, Si, Sa)
- Panurgus canescens* Latreille, 1811 (N, S, Si, Sa)
- Panurgus dentipes* Latreille, 1811
 - Panurgus dentipes dentipes* Latreille, 1811 (N)
 - Panurgus dentipes sculus* Morawitz, 1871 (S)
 - Panurgus dentipes pici* Pérez, 1895 (Si)
- Panurgus soikai* Pittioni, 1950 (S)

Note

Andrena mocsaryi: Specie citata per l'Italia da fonti attendibili ma senza precisazione di località.

Halictidae

***Halictus* Latreille, 1804**

- Halictus alfenellus* Strand, 1909 (Si)
- Halictus asperulus* Pérez, 1895 (N, S, Si)
- Halictus brunnescens* (Eversmann, 1852) (N, S, Si, Sa)
- Halictus carinthiacus* Blüthgen, 1936 (N)
- Halictus cochlearitarsis* (Dours, 1872) (N, S, Si)
- Halictus confusus* Smith, 1853
 - Halictus confusus alpinus* Alfken, 1907 (N)
 - Halictus confusus perkinsi* Blüthgen, 1926 (N, S)
- Halictus constantinensis* Strand, 1910 (Si)
- Halictus crenicornis* Blüthgen, 1923 (N)
- Halictus eurygnathus* Blüthgen, 1931 (N, S, Si)
- Halictus fulvipes* (Klug, 1817) (N, S, Si, Sa)
- Halictus gavaricus* Pérez, 1903 (N)
- Halictus gemmeus* Dours, 1872 (N, S, Si, Sa)
- Halictus gruenwaldti* Ebmer, 1975 (N, S, Si)
- Halictus kessleri* Bramson, 1879 (N, S, Sa)
- Halictus langobardicus* Blüthgen, 1944 (N, S, Si)
- Halictus leucaheneus* Ebmer, 1972
 - Halictus leucaheneus arenosus* Ebmer, 1976 (S)
- Halictus maculatus* Smith, 1848 (N, S, Si)
- Halictus mediterraneus* Strand, 1909 (S, Si)
- Halictus nitidus* (Schenck, 1853) (N, Si)
- Halictus patellatus* Morawitz, 1873
 - Halictus patellatus taorminicus* Strand, 1921 (N, S, Si)
- Halictus pollinosus* Sichel, 1860
 - Halictus pollinosus pollinosus* Sichel, 1860 (N, S, Si, Sa)
 - Halictus pollinosus cariniventris* Morawitz, 1876 (S)

Halictus pseudotetrazonius Strand, 1921 (Si)
Halictus quadricinctus (Fabricius, 1776) (N, S, Si, Sa)
Halictus resurgens Nurse, 1903 (N)
Halictus rubicundus (Christ, 1791) (N, S, Si)
Halictus rufipes (Fabricius, 1793) (Sa)
Halictus sajo Blüthgen, 1923 (N, S)
Halictus scabiosae (Rossi, 1790) (N, S, Si, Sa)
Halictus seladonius (Fabricius, 1794) (N, S, Si)
Halictus sexcinctus (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa)
Halictus simplex Blüthgen, 1923 (N, S)
Halictus smaragdulus Vachal, 1895 (N, S, Si, Sa)
Halictus subauratus (Rossi, 1792)
 Halictus subauratus subauratus (Rossi, 1792) (N, S, Si, Sa)
 Halictus subauratus corsus Blüthgen, 1933 (Sa)
Halictus tectus Radoszkowski, 1875 (N, S)
Halictus tetrazonius (Klug, 1817) (N, S, Sa)
Halictus tumulorum (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)
Halictus vestitus Lepeletier, 1841 (N, S, Si, Sa)

***Lasioglossum* Curtis, 1833**

Lasioglossum aegyptiellum (Strand, 1909) (S, Sa)
Lasioglossum aeratum (Kirby, 1802) (N, S, Sa)
Lasioglossum aglyphum (Pérez, 1895) (Si)
Lasioglossum albipes (Fabricius, 1781) (N, S, Si)
Lasioglossum albocinctum (Lucas, 1846) (N, S, Si, Sa)
Lasioglossum albovirens (Pérez, 1895) (Sa)
Lasioglossum alpigenum (Dalla Torre, 1877) (N)
Lasioglossum angusticeps (Perkins, 1895) (S)
Lasioglossum bavaricum (Blüthgen, 1930) (N)
Lasioglossum bimaculatum (Dours, 1872)
 Lasioglossum bimaculatum bimaculatum (Dours, 1872) (N, S, Si, Sa)
 Lasioglossum bimaculatum hispanicum (Blüthgen, 1931) (N)
Lasioglossum bluethgeni Ebmer, 1971 (N)
Lasioglossum brevicorne (Schenck, 1868) (N, S, Sa)
Lasioglossum buccale (Pérez, 1903) (N, S, Si)
Lasioglossum calceatum (Scopoli, 1763) (N, S, Si, Sa)
Lasioglossum callizonium (Pérez, 1895) (Si, Sa)
Lasioglossum clypeare (Schenck, 1853) (*)
Lasioglossum convexiusculum (Schenck, 1853) (N, S)
Lasioglossum corvinum (Morawitz, 1878) (N, S, Si, Sa)
Lasioglossum costulatum (Kriechbaumer, 1873) (N, S)
Lasioglossum crassepunctatum (Blüthgen, 1923) (N, S, Si)
Lasioglossum cristula (Pérez, 1895) (N)
Lasioglossum cupromicans (Pérez, 1903) (N, S)
Lasioglossum discum (Smith, 1853)
 Lasioglossum discum discum (Smith, 1853) (N, S, Si, Sa)
 Lasioglossum discum fertoni (Vachal, 1895) (N, S, Si)

Lasioglossum duckei (Alfken, 1909) (N)
Lasioglossum elegans (Lepeletier, 1841) (N, S)
Lasioglossum euboense (Strand, 1909) (N)
Lasioglossum euxinicum Ebmer, 1972
 Lasioglossum euxinicum atlas Ebmer, 1981 (S)
Lasioglossum fratellum (Pérez, 1903) (N, S)
Lasioglossum fulvicorne (Kirby, 1802) (N, S, Si)
Lasioglossum glabriusculum (Morawitz, 1872) (N, S, Si)
Lasioglossum griseolum (Morawitz, 1872) (N, S, Si, Sa)
Lasioglossum immunitum (Vachal, 1895)
 Lasioglossum immunitum sillatum (Warncke, 1982) (Si, Sa)
Lasioglossum intermedium (Schenck, 1868) (N, S, Sa)
Lasioglossum interruptum (Panzer, 1798)
 Lasioglossum interruptum interruptum (Panzer, 1798) (N, S, Si)
 Lasioglossum interruptum opacum (Pérez, 1895) (N, S, Si, Sa)
Lasioglossum kussariense (Blüthgen, 1925) (N, Si)
Lasioglossum laeve (Kirby, 1802) (N, S, Si)
Lasioglossum laevidorsum (Blüthgen, 1923)
 Lasioglossum laevidorsum troodicum (Blüthgen, 1937) (S)
Lasioglossum laevigatum (Kirby, 1802) (N, S, Si)
Lasioglossum laterale (Brullé, 1832) (N, S)
Lasioglossum laticeps (Schenck, 1868) (N, S, Si)
Lasioglossum lativentre (Schenck, 1853) (N, S, Si, Sa)
Lasioglossum leucopus (Kirby, 1802) (N, S)
Lasioglossum leucozonium (Schränk, 1781)
 Lasioglossum leucozonium leucozonium (Schränk, 1781) (N, S, Si, Sa)
 Lasioglossum leucozonium cedri Ebmer, 1976 (Sa)
Lasioglossum limbellum (Morawitz, 1876)
 Lasioglossum limbellum ventrale (Pérez, 1903) (N, S, Si, Sa)
Lasioglossum lineare (Schenck, 1868) (N, S)
Lasioglossum lissonotum (Noskiewicz, 1925) (N)
Lasioglossum littorale (Blüthgen, 1924) (N, S, Si, Sa)
Lasioglossum lucidulum (Schenck, 1861) (N, S, Si)
Lasioglossum majus (Nylander, 1852) (N, S, Si)
Lasioglossum malachurum (Kirby, 1802) (N, S, Si, Sa)
Lasioglossum mandibulare (Morawitz, 1866) (S, Sa)
Lasioglossum marginatum (Brullé, 1832) (N, S)
Lasioglossum marginellum (Schenck, 1853) (N, S)
Lasioglossum mediterraneum (Blüthgen, 1926) (S)
Lasioglossum mesosclerum (Pérez, 1903) (N)
Lasioglossum minutissimum (Kirby, 1802) (N, S, Si, Sa)
Lasioglossum minutulum (Schenck, 1853) (S)
Lasioglossum morio (Fabricius, 1793) (N, S, Si)
Lasioglossum nigripes (Lepeletier, 1841) (N, S, Si, Sa)
Lasioglossum nitidiusculum (Kirby, 1802)
 Lasioglossum nitidiusculum nitidiusculum (Kirby, 1802) (N, S, Si)
 Lasioglossum nitidiusculum pseudocombinatum (Blüthgen, 1921) (Sa)
Lasioglossum nitidulum (Fabricius, 1804)

Lasioglossum nitidulum nitidulum (Fabricius, 1804) (N, S, Si)
Lasioglossum nitidulum fudakowskii (Noskiewicz, 1925) (N, S)
Lasioglossum nitidulum sardinium Ebmer, 1978 (Sa)
Lasioglossum pallens (Brullé, 1832) (N, S, Si)
Lasioglossum parvulum (Schenck, 1853) (N, S, Si, Sa)
Lasioglossum pauperatum (Brullé, 1832) (N, S, Si, Sa)
Lasioglossum pauxillum (Schenck, 1853) (N, S, Si, Sa)
Lasioglossum perclavipes (Blüthgen, 1934) (S, Sa)
Lasioglossum peregrinum (Blüthgen, 1923) (N)
Lasioglossum podolicum (Noskiewicz, 1924) (Si)
Lasioglossum politum (Schenck, 1853) (N, S, Si)
Lasioglossum prasinum (Smith, 1848) (N, S, Sa)
Lasioglossum punctatissimum (Schenck, 1853) (N, S, Si)
Lasioglossum puncticolle (Morawitz, 1872) (N, S, Si, Sa)
Lasioglossum pygmaeum (Schenck, 1853) (N, S)
Lasioglossum quadrinotatum (Schenck, 1861) (N, S)
Lasioglossum quadrinotatum (Kirby, 1802) (N, S, Si)
Lasioglossum quadrisignatum (Schenck, 1853) (N, S)
Lasioglossum rufitarse (Zetterstedt, 1838) (N, S)
Lasioglossum semilucens (Alfken, 1914) (N, S)
Lasioglossum setulellum (Strand, 1909) (Si)
Lasioglossum sexnotatum (Nylander, 1852) (N)
Lasioglossum sexnotatum (Kirby, 1802) (N, S, Si, Sa)
Lasioglossum sexstrigatum (Schenck, 1868) (N)
Lasioglossum smeathmanellum (Kirby, 1802) (N, S, Si)
Lasioglossum soror (Saunders, 1901) (N, S)
Lasioglossum sphaecodimorphum (Vachal, 1892) (Si)
Lasioglossum strictifrons (Vachal, 1895) (Sa)
Lasioglossum subfasciatum (Imhoff, 1832) (N, S)
Lasioglossum subfulvicorne (Blüthgen, 1934)
Lasioglossum subfulvicorne austriacum Ebmer, 1974 (N)
Lasioglossum subhirtum (Lepelletier, 1841) (N, Si, Sa)
Lasioglossum tarsatum (Schenck, 1868) (S)
Lasioglossum transitorium (Schenck, 1868)
Lasioglossum transitorium planulum (Pérez, 1903) (N, S, Si, Sa)
Lasioglossum tricinatum (Schenck, 1874) (N, S, Si)
Lasioglossum truncaticolle (Morawitz, 1878) (N, S, Si)
Lasioglossum villosulum (Kirby, 1802) (N, S, Si, Sa)
Lasioglossum xanthopus (Kirby, 1802) (N, S, Si)
Lasioglossum zonulum (Smith, 1848) (N, S)

Nomioides Schenck, 1867

Nomioides facilis (Smith, 1853) (N, S, Si)
Nomioides minutissimus (Rossi, 1790) (N, S, Si, Sa)
Nomioides variegatus (Olivier, 1789) (N, S, Si, Sa)

Sphecodes Latreille, 1804

Sphecodes albilabris (Fabricius, 1793)
 Sphecodes albilabris albilabris (Fabricius, 1793) (N, S, Si, Sa)
 Sphecodes albilabris rubripes Spinola, 1838 (Sa)
Sphecodes alternatus Smith, 1853 (N, S, Si, Sa)
Sphecodes cephalotes Meyer, 1920 (Si)
Sphecodes crassus Thomson, 1870 (N, S)
Sphecodes cristatus Hagens, 1882 (N, S, Sa)
Sphecodes croaticus Meyer, 1922 (N, S)
Sphecodes ephippius (Linnaeus, 1767) (N, S)
Sphecodes ferruginatus Hagens, 1882 (N, S)
Sphecodes geofrellus (Kirby, 1802) (N, S)
Sphecodes gibbus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
Sphecodes hyalinatus Hagens, 1882 (N)
Sphecodes longulus Hagens, 1882 (N, S, Si)
Sphecodes majalis Pérez, 1903 (N, S)
Sphecodes marginatus Hagens, 1882 (N, S, Si, Sa)
Sphecodes miniatus Hagens, 1882 (N, S, Sa)
Sphecodes monilicornis (Kirby, 1802) (N, S, Si, Sa)
Sphecodes niger Sichel, 1865 (N, S)
Sphecodes olivieri Lepelletier & Serville, 1825 (Sa)
Sphecodes pellucidus Smith, 1845 (N, S, Si)
Sphecodes puncticeps Thomson, 1870 (N, S, Si, Sa)
Sphecodes reticulatus Thomson, 1870 (N, S, Si)
Sphecodes rubicundus Hagens, 1875 (S, Si)
Sphecodes rufescens Hagens, 1875 (N)
Sphecodes ruficrus (Erichson, 1835)
 Sphecodes ruficrus ruficrus (Erichson, 1835) (N)
 Sphecodes ruficrus hispanicus Wesmael, 1835 (Si)
Sphecodes rufiventris (Panzer, 1798) (N, S)
Sphecodes scabricollis Wesmael, 1835 (N, S)
Sphecodes schenckii Hagens, 1882 (N, S, Si)
Sphecodes spinulosus Hagens, 1875 (N, S, Si)
Sphecodes zangherii Noskiewicz, 1931 (N, S)

***Pseudapis* Kirby, 1900**

Pseudapis diversipes (Latreille, 1806) (N, S, Si, Sa)
Pseudapis monstrosa (A. Costa, 1861) (S, Si)
Pseudapis unidentata (Olivier, 1811)
 Pseudapis unidentata unidentata (Olivier, 1811) (N, S, Si)
 Pseudapis unidentata albocincta (Lucas, 1846) (Sa)
Pseudapis valga (Gerstaecker, 1872) (Sa)

***Dufourea* Lepelletier, 1841**

Dufourea alpina Morawitz, 1865 (N)
Dufourea dentiventris (Nylander, 1848) (N, S)

Dufourea inermis (Nylander, 1848) (N, S)
Dufourea minuta Lepeletier, 1841 (Sa)
Dufourea paradoxa (Morawitz, 1868) (N)
Dufourea vulgaris Schenck, 1861 (N, S)

Rhophitoides Schenck, 1859

Rhophitoides canus (Eversmann, 1852) (N)

Rophites Spinola, 1808

Rophites algirus Pérez, 1895
Rophites algirus trispinosus Pérez, 1903 (N, S)
Rophites quinquespinosus Spinola, 1808 (N)

Systropha Illiger, 1806

Systropha curvicornis (Scopoli, 1770) (N, S)

Note

Lasioglossum clypeare: Specie citata per l'Italia da fonti attendibili ma senza precisazione di località.

Melittidae

Melitta Kirby, 1802

Melitta dimidiata Morawitz, 1876 (N, S)
Melitta haemorrhoidalis (Fabricius, 1775) (N, S)
Melitta leporina (Panzer, 1799) (N, S)
Melitta nigricans Alfken, 1905 (N)
Melitta tricineta Kirby, 1802 (N, S)

Dasypoda Latreille, 1802

Dasypoda altercator (Harris, 1780) (N, S, Si, Sa)
Dasypoda argentata Panzer, 1809 (N, S)
Dasypoda cingulata Erichson, 1835 (N)
Dasypoda pyriformis Radoszkowski, 1887 (N)
Dasypoda suripes (Christ, 1791) (Si)
Dasypoda visnaga (Rossi, 1790) (N, S, Si)

Macropis Panzer, 1809

Macropis europaea Warncke, 1973 (N, S)
Macropis frivaldskyi Mocsáry, 1878 (N)

Macropis fulvipes (Fabricius, 1804) (N, S)

Megachilidae

Lithurge Latreille, 1825

Lithurge chrysurus Fonscolombe, 1834

Lithurge chrysurus chrysurus Fonscolombe, 1834 (N, S, Si, Sa)

Lithurge chrysurus sculus (Pérez, 1897) (Si)

Lithurge cornutus (Fabricius, 1787)

Lithurge cornutus cornutus (Fabricius, 1787) (N, S)

Lithurge cornutus fuscipennis (Lepeletier, 1841) (N, S)

Chalicodoma Lepeletier, 1841

Chalicodoma albocristata (Smith, 1853) (N, S, Si)

Chalicodoma apennina (Benoist, 1940) (S)

Chalicodoma ericetorum (Lepeletier, 1841)

Chalicodoma ericetorum ericetorum (Lepeletier, 1841) (N, S, Si)

Chalicodoma ericetorum oraniensis Zanden, 1989 (N)

Chalicodoma lefebvrei (Lepeletier, 1841)

Chalicodoma lefebvrei lefebvrei (Lepeletier, 1841) (N, S, Si, Sa)

Chalicodoma lefebvrei tristis (Friese, 1899) (N, S)

Chalicodoma manicata (Giraud, 1861) (N)

Chalicodoma nigrita (Radoszkowski, 1876) (N, S, Si)

Chalicodoma parietina (Geoffroy, 1785)

Chalicodoma parietina parietina (Geoffroy, 1785) (N, S, Si, Sa)

Chalicodoma parietina nestorea (Brullé, 1832) (S)

Chalicodoma perezii Lichtenstein, 1879 (Sa)

Chalicodoma pyrenaica (Lepeletier, 1841)

Chalicodoma pyrenaica pyrenaica (Lepeletier, 1841) (N, S, Si)

Chalicodoma pyrenaica alpina Morawitz, 1872 (N)

Chalicodoma sicula (Rossi, 1792) (S, Si, Sa)

Creightonella Cockerell, 1908

Creightonella albisecta (Klug, 1817) (N, S, Si, Sa)

Megachile Latreille, 1802

Megachile alpicola Alfken, 1924 (N)

Megachile analis Nylander, 1852 (N, S)

Megachile apicalis Spinola, 1808 (N, S, Si, Sa)

Megachile argentata (Fabricius, 1793) (N, S, Si, Sa)

Megachile atlantica Benoist, 1934 (Si)

Megachile atratula Rebmann, 1968 (N, S, Sa)

Megachile bombycina Radoszkowski, 1874 (S)

Megachile centuncularis (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
Megachile circumcincta (Kirby, 1802)
 Megachile circumcincta circumcincta (Kirby, 1802) (N, S)
 Megachile circumcincta etnaensis Zanden, 1989 (Si)
Megachile deceptor Pérez, 1890 (N, S)
Megachile fertoni Pérez, 1895 (Sa)
Megachile flabellipes Pérez, 1895 (N, S)
Megachile fulvescens Smith, 1853 (Si)
Megachile genalis Morawitz, 1880
 Megachile genalis genalis Morawitz, 1880 (N, S)
 Megachile genalis buyssoni Pérez, 1890 (S)
Megachile giraudi Gerstaecker, 1869 (N)
Megachile gratiosa Gerstaecker, 1857 (N)
Megachile grisea (Fabricius, 1794) (*)
Megachile intermixta Gerstaecker, 1869 (Si)
Megachile lagopoda (Linnaeus, 1761) (N, S, Si, Sa)
Megachile leachella Curtis, 1828 (N, S, Si, Sa)
Megachile leucomalla Gerstaecker, 1869 (N, S)
Megachile ligniseca (Kirby, 1802) (N)
Megachile maritima (Kirby, 1802) (N, S, Si)
Megachile melanopyga A. Costa, 1863 (N, S, Si, Sa)
Megachile nigriventris Schenck, 1868 (N, S)
Megachile octosignata Nylander, 1852 (N, S)
Megachile picicornis Morawitz, 1878 (S, Si, Sa)
Megachile pilicrus Morawitz, 1878 (N, S)
Megachile pilidens Alfken, 1923 (N, S, Si, Sa)
Megachile pugillatoria Costa, 1863 (S)
Megachile punctatissima Spinola, 1806 (N)
Megachile pyrenaea Pérez, 1890 (N)
Megachile rotundata (Fabricius, 1787) (N, S, Si, Sa)
Megachile rubrimana Morawitz, 1894 (N, S)
Megachile schmiedeknechti A. Costa, 1884 (S, Sa)
Megachile variscopa Pérez, 1895 (N, S, Sa)
Megachile versicolor Smith, 1844 (N, S, Sa)
Megachile villipes Morawitz, 1875 (S)
Megachile willughbiella (Kirby, 1802) (N, S)

Coelioxys Latreille, 1809

Coelioxys acanthura (Illiger, 1806) (N, S, Si)
Coelioxys afra Lepeletier, 1841 (N, S, Si, Sa)
Coelioxys argentea Lepeletier, 1841 (N, S)
Coelioxys aurolimbata Foerster, 1853 (N, S, Si)
Coelioxys brevis Eversmann, 1852 (N, S, Si, Sa)
Coelioxys caudata Spinola, 1838 (N)
Coelioxys conoidea (Illiger, 1806) (N, S, Sa)
Coelioxys elongata Lepeletier, 1841 (N, S)
Coelioxys erythrura Spinola, 1838 (Si)

Coelioxys foersteri Morawitz, 1872 (Si)
Coelioxys haemorrhoea Foerster, 1853 (N, S, Si)
Coelioxys inermis (Kirby, 1802) (N, S, Si, Sa)
Coelioxys mandibularis Nylander, 1848 (N, S)
Coelioxys obtusa Pérez, 1884 (S, Si)
Coelioxys polycentris Foerster, 1853 (N)
Coelioxys quadridentata (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)
Coelioxys rufescens Lepeletier & Serville, 1825 (N, S)
Coelioxys rufocaudata Smith, 1854 (N, S, Si, Sa)

Chelostoma Latreille, 1809

Chelostoma appendiculatum (Morawitz, 1871) (N, S, Si)
Chelostoma bidenticulatum (A. Costa, 1863) (S)
Chelostoma campanularum (Kirby, 1802) (N, S, Si)
Chelostoma distinctum (Stoeckhert, 1929) (N, S)
Chelostoma emarginatum (Nylander, 1856) (N, S)
Chelostoma florissomne (Linnaeus, 1758) (N, S)
Chelostoma foveolatum (Morawitz, 1868) (N, S)
Chelostoma grande (Nylander, 1852) (N)
Chelostoma handlirschi Schletterer, 1889 (S)
Chelostoma mocsaryi Schletterer, 1889 (N, S)
Chelostoma rapunculi (Lepeletier, 1841) (N, S, Si)

Heriades Spinola, 1808

Heriades crenulata Nylander, 1856 (N, S, Si, Sa)
Heriades rubicola Pérez, 1890 (N, S, Sa)
Heriades sinuata Spinola, 1808 (N)
Heriades truncorum (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Anthocopa Latreille & Serville, 1825

Anthocopa andrenoides (Spinola, 1808) (N, S, Si, Sa)
Anthocopa bidentata (Morawitz, 1876) (N, S)
Anthocopa bisulca (Gerstaecker, 1869) (N, S, Si)
Anthocopa cristatula Zanden, 1990 (N, S, Si)
Anthocopa croatica (Friese, 1893) (N, S)
Anthocopa dalmatica (Morawitz, 1872) (N, Sa)
Anthocopa erythrogastra (Ferton, 1905) (N, Sa)
Anthocopa ligurica (Morawitz, 1868) (N, S, Si, Sa)
Anthocopa papaveris (Latreille, 1799) (N, Si, Sa)
Anthocopa perezi (Ferton, 1895) (N)
Anthocopa rugidorsis (Pérez, 1895) (S, Sa)
Anthocopa scutellaris (Morawitz, 1868) (N, S)
Anthocopa serrilabris (Morawitz, 1875)
Anthocopa serrilabris quadridentata (Pérez, 1879) (N, Si)
Anthocopa spinulosa (Kirby, 1802) (N, S, Si)

Anthocopa tergestensis (Ducke, 1897) (N, S)

Anthocopa villosa (Schenck, 1853) (N, S)

Hoplitis Klug, 1807

Hoplitis acuticornis (Dufour & Perris, 1840) (N, S, Si, Sa)

Hoplitis adunca (Panzer, 1798) (N, S, Si, Sa)

Hoplitis annulata (Latreille, 1811)

Hoplitis annulata annulata (Latreille, 1811) (Si)

Hoplitis annulata cretica (Warncke, 1991) (N, S, Si, Sa)

Hoplitis anthocopoides (Schenck, 1853) (N, S, Si)

Hoplitis benoisti (Alfken, 1935) (N, S, Si, Sa)

Hoplitis bihamata (A. Costa, 1885) (S, Sa)

Hoplitis brachypogon (Pérez, 1879) (N)

Hoplitis campanularis (Morawitz, 1878) (S)

Hoplitis claviventris (Thomson, 1872) (N, S)

Hoplitis curvipes (Morawitz, 1871) (S, Si)

Hoplitis fertoni (Pérez, 1891) (Si)

Hoplitis grandiscapa (Pérez, 1895) (Sa)

Hoplitis insularis (Schmiedeknecht, 1886) (Si, Sa)

Hoplitis jheringi (Ducke, 1898) (N)

Hoplitis laevifrons (Morawitz, 1872) (N)

Hoplitis lepeletieri (Pérez, 1879) (N, S)

Hoplitis leucomelana (Kirby, 1802) (N, S, Si, Sa)

Hoplitis loti (Morawitz, 1867) (N, S)

Hoplitis manicata (Morice, 1901) (S)

Hoplitis marchali (Pérez, 1902) (N)

Hoplitis melanura (Morawitz, 1872) (S)

Hoplitis mitis (Nylander, 1852) (N, S)

Hoplitis mucidoides Zanden, 1990 (N, Si)

Hoplitis pallicornis (Friese, 1895) (N)

Hoplitis praestans (Morawitz, 1894) (N, S)

Hoplitis ravouxii (Pérez, 1902) (N, S, Sa)

Hoplitis rufohirta (Latreille, 1811) (N, S, Si, Sa)

Hoplitis submanicata Zanden, 1984 (N)

Hoplitis tenuispina (Alfken, 1937) (N)

Hoplitis tridentata (Dufour & Perris, 1840) (N, S)

Hoplitis tuberculata (Nylander, 1848) (N)

Osmia Panzer, 1806

Osmia alfkeni Ducke, 1900 (Sa)

Osmia argyropyga Pérez, 1879 (N)

Osmia aurulenta (Panzer, 1799)

Osmia aurulenta aurulenta (Panzer, 1799) (N, S, Si, Sa)

Osmia aurulenta meridionalis Gribodo, 1894 (N, Si)

Osmia balearica Schmiedeknecht, 1885 (Si)

Osmia bicolor (Schrank, 1781) (N, Si)

Osmia brevicornis (Fabricius, 1798) (N, S)
Osmia caerulescens (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
Osmia cephalotes Morawitz, 1871
 Osmia cephalotes cephalotes Morawitz, 1871 (N, S, Si)
 Osmia cephalotes longiceps Morawitz, 1876 (N)
Osmia cerinthidis Morawitz, 1876
 Osmia cerinthidis cerinthidis Morawitz, 1876 (N)
 Osmia cerinthidis crassicypeata Peters, 1978 (Si)
Osmia cornuta (Latreille, 1805) (N, S, Si)
Osmia cyanoxantha Pérez, 1879 (S, Si)
Osmia dimidiata Morawitz, 1871
 Osmia dimidiata dimidiata Morawitz, 1871 (Si, Sa)
 Osmia dimidiata rossica Friese, 1887 (Si)
Osmia dives Mocsáry, 1877 (S, Sa)
Osmia emarginata Lepeletier, 1841 (N, Sa)
Osmia ferruginea Latreille, 1811 (Si, Sa)
Osmia fulviventris (Panzer, 1798) (N, S, Si, Sa)
Osmia gallarum Spinola, 1808 (N, S, Si)
Osmia inermis (Zetterstedt, 1838) (N)
Osmia kohli DUCKE, 1900 (Si)
Osmia labialis Pérez, 1878 (N, S)
Osmia latreillei (Spinola, 1806) (N, S, Si, Sa)
Osmia leaiana (Kirby, 1802) (N, S, Si)
Osmia melanogaster Spinola, 1808 (N, S, Si)
Osmia mustelina Gerstaecker, 1869
 Osmia mustelina mustelina Gerstaecker, 1869 (N, S)
 Osmia mustelina umbrosa Peters, 1978 (Si)
Osmia nana Morawitz, 1873 (N, S, Si)
Osmia niveocincta Pérez, 1897 (S, Sa)
Osmia notata (Fabricius, 1804) (N, S, Si, Sa)
Osmia parietina Curtis, 1828 (N, S)
Osmia rufa (Linnaeus, 1758)
 Osmia rufa rufa (Linnaeus, 1758) (N, S, Sa)
 Osmia rufa cornigera (Rossi, 1790) (N, S, Si)
 Osmia rufa fracticornis Pérez, 1895 (Si, Sa)
Osmia saxicola DUCKE, 1899 (N, S)
Osmia signata Erichson, 1835
 Osmia signata signata Erichson, 1835 (N, S, Si, Sa)
 Osmia signata laticincta Pérez, 1879 (Si)
Osmia submicans Morawitz, 1866 (N, S, Si, Sa)
Osmia teunissenii Zanden, 1981 (N)
Osmia tricornis Latreille, 1811 (N, S, Si, Sa)
Osmia tunensis (Fabricius, 1787) (Si)
Osmia uncinata Gerstaecker, 1869 (N)
Osmia ventralis (Panzer, 1798) (N)
Osmia versicolor Latreille, 1811
 Osmia versicolor versicolor Latreille, 1811 (N, S, Si)
 Osmia versicolor corrusca Erichson, 1835 (Si)

Osmia viridana Morawitz, 1873

Osmia viridana viridana Morawitz, 1873 (N, S)

Osmia viridana mulleolus Zanden, 1984 (N, S)

Osmia xanthomelana (Kirby, 1802) (N, S)

Protosmia Ducke, 1900

Protosmia exenterata (Pérez, 1895) (Si)

Protosmia glutinosa (Giraud, 1871) (N)

Protosmia minutula (Pérez, 1896) (Si)

Protosmia sicula (Dalla Torre & Friese, 1895) (Si)

Protosmia tiftensis (Morawitz, 1876) (Si)

Dioxys Lepeletier & Serville, 1825

Dioxys cincta (Jurine, 1807) (N, S, Si)

Dioxys moesta A. Costa, 1883 (Si, Sa)

Dioxys pumila Gerstaecker, 1869

Dioxys pumila varipes De Stefani, 1887 (Si)

Dioxys tridentata (Nylander, 1848) (N, S, Sa)

Anthidiellum Cockerell, 1904

Anthidiellum strigatum (Panzer, 1805)

Anthidiellum strigatum strigatum (Panzer, 1805) (N, S, Si)

Anthidiellum strigatum contractum (Latreille, 1809) (N, S)

Anthidiellum strigatum luteum (Friese, 1897) (N, Si)

Anthidium Fabricius, 1804

Anthidium cingulatum Latreille, 1809 (N, S, Si, Sa)

Anthidium diadema Latreille, 1809

Anthidium diadema diadema Latreille, 1809 (N, S, Si)

Anthidium diadema obscurum Friese, 1898 (Si)

Anthidium florentinum (Fabricius, 1775) (N, S, Si)

Anthidium loti Perris, 1852 (N, S, Si)

Anthidium manicatum (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Anthidium montanum Morawitz, 1864 (N)

Anthidium oblongatum (Illiger, 1806) (N, S, Si)

Anthidium punctatum Latreille, 1809 (N, S, Si)

Anthidium septemspinosum Lepeletier, 1841 (S)

Anthidium taeniatum Latreille, 1809 (N, S, Si)

Exanthidium Pasteels, 1969

Exanthidium eximium (Giraud, 1863) (N)

Icteranthidium Michener, 1948

Icteranthidium cimbiciforme (Smith, 1854) (Si)
Icteranthidium grohmanni (Spinola, 1838) (N, S, Si)
Icteranthidium laterale (Latreille, 1809) (N)

***Pseudoanthidium* Friese, 1898**

Pseudoanthidium alpinum (Morawitz, 1874)
Pseudoanthidium alpinum gregoriense Nobile, 1989 (Si)
Pseudoanthidium lituratum (Panzer, 1801) (N, S, Si, Sa)
Pseudoanthidium melanurum (Klug, 1832) (S, Si, Sa)
Pseudoanthidium reticulatum (Mocsáry, 1884)
Pseudoanthidium reticulatum reticulatum (Mocsáry, 1884) (N)
Pseudoanthidium reticulatum mocsaryi (Friese, 1897) (N, S)

***Rhodanthidium* Isensee, 1927**

Rhodanthidium septemdentatum (Latreille, 1809) (N, S, Si, Sa)
Rhodanthidium siculum (Spinola, 1838) (Si)
Rhodanthidium sticticum (Fabricius, 1787) (Si)

***Stelis* Panzer, 1806**

Stelis annulata (Lepeletier, 1841) (S)
Stelis breviscula (Nylander, 1848) (N, S, Si, Sa)
Stelis minuta Lepeletier & Serville, 1825 (N)
Stelis nasuta (Latreille, 1809) (N, S, Si, Sa)
Stelis odontopyga Noskiewicz, 1925 (N)
Stelis ornatula (Klug, 1807) (N, S)
Stelis phaeoptera (Kirby, 1802) (N, S)
Stelis punctulatissima (Kirby, 1802) (N, S)
Stelis sexsignata A. Costa, 1858 (*)
Stelis signata (Latreille, 1809) (N, S, Si)

***Trachusa* Panzer, 1804**

Trachusa byssina (Panzer, 1798) (N, S)
Trachusa interruptum (Fabricius, 1781) (N, S, Si, Sa)

***Trianthidium* Mavromoustakis, 1958**

Trianthidium caturigense (Giraud, 1863) (N)

Note

Megachile grisea: Specie citata per l'Italia da fonti attendibili ma senza precisazione di località.
Stelis sexsignata: Specie citata per l'Italia da fonti attendibili ma senza precisazione di località.

Anthophoridae

Amegilla Friese, 1897

Amegilla albigena (Lepeletier, 1841) (N, S, Si, Sa)
Amegilla fasciata (Fabricius, 1775) (N)
Amegilla garrula (Rossi, 1790) (N, S, Si, Sa)
Amegilla ochroleuca (Pérez, 1879) (N, S)
Amegilla quadrifasciata (Villers, 1789) (N, S, Si, Sa)
Amegilla salviae (Morawitz, 1876) (S, Si)
Amegilla savignyi (Lepeletier, 1841) (N, S, Si, Sa)
Amegilla velocissima (Fedtschenko, 1875) (Si)

Ammobates Latreille, 1809

Ammobates muticus Spinola, 1843 (N, S, Si)
Ammobates oraniensis (Lepeletier, 1841) (Si)
Ammobates punctatus (Fabricius, 1804) (N, S, Si)
Ammobates rufiventris Latreille, 1809 (Si)
Ammobates similis Mocsáry, 1894 (N)
Ammobates vinctus Gerstaecker, 1869 (N)

Ammobatoides Radoszkowski, 1868

Ammobatoides abdominalis (Eversmann, 1852) (N, S)

Anthophora Latreille, 1803

Anthophora agama Radoszkowski, 1869 (S, Si)
Anthophora atroalba Lepeletier, 1841 (N, S, Si)
Anthophora balneorum Lepeletier, 1841 (N, Si, Sa)
Anthophora belieri Dours, 1869 (Si)
Anthophora biciliata Lepeletier, 1841 (N, S, Si)
Anthophora bimaculata (Panzer, 1798) (N, S, Si)
Anthophora canescens Brullé, 1832 (N, S, Si, Sa)
Anthophora crassipes Lepeletier, 1841 (N, S, Si)
Anthophora dispar Lepeletier, 1841 (N, S, Si, Sa)
Anthophora dufourii Lepeletier, 1841 (N, Si)
Anthophora femorata (Olivier, 1789) (N)
Anthophora fulvipes Eversmann, 1846 (Si)
Anthophora fulvitarsis Brullé, 1832 (N, Si)
Anthophora fulvodimidiata Dours, 1869 (N, Si)
Anthophora furcata (Panzer, 1798) (N, S, Si)
Anthophora laevigata Spinola, 1808 (N)
Anthophora larvata Giraud, 1863 (N)
Anthophora plagiata (Illiger, 1806) (N, S)

Anthophora plumipes (Pallas, 1772) (N, S, Si, Sa)
Anthophora podagra Lepeletier, 1841 (S, Si)
Anthophora pruinosa Smith, 1854 (Si)
Anthophora pubescens (Fabricius, 1781) (N, S)
Anthophora quadricolor (Erichson, 1840) (Si)
Anthophora quadrimaculata (Panzer, 1798) (N)
Anthophora retusa (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
Anthophora robusta (Klug, 1845) (S)
Anthophora salviae (Panzer, 1804) (N, S, Si, Sa)
Anthophora senescens Lepeletier, 1841 (N, S)
Anthophora sicheli Radoszkowski, 1868 (Sa)
Anthophora subterranea Germar, 1826 (N, S, Si, Sa)
Anthophora uniciliata Sichel, 1860 (Si)

Biastes Panzer, 1806

Biastes brevicornis (Panzer, 1798) (N, Si)
Biastes emarginatus (Schenck, 1853) (N)

Epeoloides Giraud, 1863

Epeoloides coecutiens (Fabricius, 1775) (N)

Epeolus Latreille, 1802

Epeolus alpinus Friese (N)
Epeolus compar Alfken, 1937 (Sa)
Epeolus cruciger (Panzer, 1799) (N, S)
Epeolus julliani Pérez, 1884 (N, S)
Epeolus siculus Giordani Soika, 1944 (Si)
Epeolus variegatus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Eucera Scopoli, 1770

Eucera algira Brullé, 1840 (S, Si, Sa)
Eucera aterrima Friese, 1895 (Si)
Eucera bidentata Pérez, 1887 (S)
Eucera caspica Morawitz, 1873 (N, S, Si)
Eucera chrysopyga Pérez, 1879 (N)
Eucera cinerea Lepeletier, 1841 (N, S)
Eucera clypeata Erichson, 1835 (N, S)
Eucera dalmatica Lepeletier, 1841 (S, Si, Sa)
Eucera decepatrix Smith, 1879 (*)
Eucera digitata Friese, 1895 (Si)
Eucera eucnemidea Dours, 1873 (N, S, Si, Sa)
Eucera grisea Fabricius, 1793 (S, Si, Sa)
Eucera hispaliensis Pérez, 1902 (S)
Eucera hispana Lepeletier, 1841 (N, Si)

Eucera interrupta Baer, 1850 (N, S, Si)
Eucera longicornis (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
Eucera nigrifacies Lepeletier, 1841 (N, S, Si, Sa)
Eucera nigripes Klug, 1845 (S)
Eucera nitidiventris Mocsáry, 1879 (N, S, Si)
Eucera notata Lepeletier, 1841 (Si, Sa)
Eucera numida Lepeletier, 1841
 Eucera numida numida Lepeletier, 1841 (N, S, Si, Sa)
 Eucera numida clarior Tkalcu, 1977 (N, S)
Eucera oraniensis Lepeletier, 1841 (S, Si, Sa)
Eucera parvicornis Mocsáry, 1878 (N)
Eucera parvula Friese, 1895 (S)
Eucera pollinosa Smith, 1854 (N, S)
Eucera seminuda Brullé, 1832 (N, Si)
Eucera similis Lepeletier, 1841 (N, S, Si)
Eucera sogdiana Morawitz, 1875 (Si)
Eucera trivittata Brullé, 1832 (Si)
Eucera tuberculata (Fabricius, 1793) (N, S, Si, Sa)

***Eupavlovskia* Popov, 1955**

Eupavlovskia funeraria (Smith, 1854) (S, Si)
Eupavlovskia grandii (Hedicke, 1935) (N)
Eupavlovskia obscura (Friese, 1895)
 Eupavlovskia obscura obscura (Friese, 1895) (N, S, Si)
 Eupavlovskia obscura simulatrix Lieftinck, 1969 (Si)

***Habropoda* Smith, 1854**

Habropoda tarsata (Spinola, 1838) (N, S, Si)
Habropoda zonatula (Smith, 1854) (S, Si)

***Melecta* Latreille, 1802**

Melecta aegyptiaca Radoszkowski, 1876 (S, Si)
Melecta albifrons (Foerster, 1771)
 Melecta albifrons nigra Spinola, 1806 (N, S, Si, Sa)
 Melecta albifrons albovaria Erichson, 1840 (N, S)
Melecta duodecimmaculata (Rossi, 1790) (S, Si)
Melecta festiva Lieftinck, 1980 (N)
Melecta grandis Lepeletier, 1841 (N, Si)
Melecta italica Radoszkowski, 1876 (N, S, Si, Sa)
Melecta leucorhyncha Gribodo, 1893
 Melecta leucorhyncha taormina Strand, 1919 (N, S, Si, Sa)
Melecta luctuosa (Scopoli, 1770)
 Melecta luctuosa luctuosa (Scopoli, 1770) (N, S, Si)
 Melecta luctuosa meridionalis Gribodo, 1893 (N)

Nomada Scopoli, 1770

- Nomada agrestis* Fabricius, 1787 (Si)
Nomada alboguttata Herrich-Schaeffer, 1839 (N)
Nomada argentata Herrich-Schaeffer, 1839 (N, S)
Nomada armata Herrich-Schaeffer, 1839 (N, S, Si)
Nomada atroscutellaris Strand, 1921 (N)
Nomada baccata Smith, 1844 (N)
Nomada baldiniana Benzi, 1892 (N)
Nomada basalis Herrich-Schaeffer, 1839 (N, S, Si)
Nomada beaumonti Schwarz, 1967 (N, Si)
Nomada bifasciata Olivier, 1811
 Nomada bifasciata lepeletieri Pérez, 1884 (N, S)
Nomada bifida Thomson, 1872 (N, S)
Nomada bispinosa Mocsáry, 1883 (N)
Nomada blepharipes Schmiedeknecht, 1882 (N)
Nomada bluethgeni Stoeckert, 1943 (N, S)
Nomada braunsiana Schmiedeknecht, 1882 (N, S)
Nomada carnifex Mocsáry, 1883 (N, S, Si)
Nomada castellana Dusmet, 1913 (N, S, Si)
Nomada chrysopyga Morawitz, 1872 (N, S, Si)
Nomada concolor Schmiedeknecht, 1882 (N, S, Si)
Nomada confinis Schmiedeknecht, 1882 (N)
Nomada conjungens Herrich-Schaeffer, 1839 (N, S)
Nomada connectens Pérez, 1884 (N, Si)
Nomada corcyraea Schmiedeknecht, 1882 (N)
Nomada cruenta Schmiedeknecht, 1882 (Si)
Nomada dira Schmiedeknecht, 1882 (S, Si)
Nomada discrepans Schmiedeknecht, 1882 (N, S, Si)
Nomada distinguenda Morawitz, 1874 (N, S, Si, Sa)
Nomada emarginata Morawitz, 1878 (N, Si)
Nomada erythrocephala Morawitz, 1870 (S)
Nomada fabriciana (Linnaeus, 1767) (N, Si)
Nomada facilis Schwarz, 1967 (N, S)
Nomada femoralis Morawitz, 1869 (N, S, Si, Sa)
Nomada ferghanica Morawitz, 1875 (S)
Nomada ferruginata (Linnaeus, 1767) (N, S, Si)
Nomada flava Panzer, 1798 (N, S)
Nomada flavoguttata (Kirby, 1802) (N, S, Si)
Nomada flavomaculata Lucas, 1846 (N)
Nomada flavopicta (Kirby, 1802)
 Nomada flavopicta flavopicta (Kirby, 1802) (N, S)
 Nomada flavopicta miranda Schmiedeknecht, 1882 (N)
Nomada fraudassacula (Pittioni, 1950) (N)
Nomada fucata Panzer, 1798 (N, S, Si, Sa)
Nomada fulvicornis Fabricius, 1793 (N, S, Si, Sa)
Nomada furva Panzer, 1798
 Nomada furva furva Panzer, 1798 (N, S, Si)

Nomada furva nigricans Pérez, 1882 (N)
Nomada furvoides Stoeckert, 1944 (N)
Nomada fuscicornis Nylander, 1848 (N, S, Si)
Nomada glaucopis Pérez, 1890 (N, Sa)
Nomada goodeniana (Kirby, 1802) (N, S)
Nomada gransassoi Schwarz, 1986 (S)
Nomada gribodoi Schmiedeknecht, 1882 (*)
Nomada guttulata Schenck, 1859 (N, S, Si)
Nomada hillana (Kirby, 1802) (N)
Nomada hungarica Dalla Torre & Friese, 1894 (N)
Nomada illustris Schmiedeknecht, 1882 (N, S)
Nomada imperialis Schmiedeknecht, 1882 (N)
Nomada incisa Schmiedeknecht, 1882 (Si)
Nomada insignipes Schmiedeknecht, 1882
 Nomada insignipes insignipes Schmiedeknecht, 1882 (Si)
 Nomada insignipes leucosticta Pérez, 1884 (Si)
Nomada integra Brullé, 1832
 Nomada integra integra Brullé, 1832 (N, S, Si)
 Nomada integra nigra Schwarz, 1967 (N)
Nomada italica Dalla Torre & Friese, 1894 (N)
Nomada jacobaeae Panzer, 1799 (N)
Nomada julliani Schmiedeknecht, 1882 (Si)
Nomada kohli Schmiedeknecht, 1882 (N, S, Si, Sa)
Nomada lagrecai Nobile, 1990 (Si)
Nomada lathburiana (Kirby, 1802) (N)
Nomada leucophthalma (Kirby, 1802) (N)
Nomada lineola Panzer, 1798
 Nomada lineola lineola Panzer, 1798 (N, S)
 Nomada lineola cornigera (Kirby, 1802) (N, S)
Nomada linsenmaieri Schwarz, 1974 (N, Si)
Nomada litigiosa Gribodo, 1893 (Si)
Nomada maculicornis Pérez, 1884 (S, Si)
Nomada marshamella (Kirby, 1802) (N, S, Si, Sa)
Nomada mauritanica Lepeletier, 1841
 Nomada mauritanica mauritanica Lepeletier, 1841 (Si, Sa)
 Nomada mauritanica manni Morawitz, 1871 (S, Si, Sa)
Nomada melathoracica Imhoff, 1834 (N)
Nomada mephisto Schmiedeknecht, 1882 (Sa)
Nomada mocsaryi Schmiedeknecht, 1882 (N)
Nomada mutabilis Morawitz, 1870 (N)
Nomada mutica Morawitz, 1872 (N, S)
Nomada nausicaa Schmiedeknecht, 1882 (*)
Nomada nigroflavida Gribodo, 1894 (Si)
Nomada nigrovaria Pérez, 1895 (N, S)
Nomada nobilis Herrich-Schaeffer, 1839 (N, S, Si)
Nomada pallispinosa Schwarz, 1967 (N)
Nomada panurgina Morawitz, 1869 (Si)
Nomada panzeri Lepeletier, 1841 (N, S, Si)

Nomada piccioliana Magretti, 1883 (N, S)
Nomada pleurosticta Herrich-Schaeffer, 1839 (Si)
Nomada propinqua Schmiedeknecht, 1882 (N)
Nomada rhenana Morawitz, 1872 (N, S, Si)
Nomada robertjeotiana Panzer, 1799 (N)
Nomada rubiginosa Pérez, 1884 (Si)
Nomada ruficornis (Linnaeus, 1758) (N, S)
Nomada rufipes Fabricius, 1793 (N)
Nomada rufoabdominalis Schwarz, 1963 (N, S)
Nomada rugithorax Pérez, 1902 (S, Sa)
Nomada sanguinea Smith, 1854 (S)
Nomada sexfasciata Panzer, 1799 (N, S, Si, Sa)
Nomada sheppardana (Kirby, 1802)
 Nomada sheppardana sheppardana (Kirby, 1802) (N)
 Nomada sheppardana minuscula Noskiewicz, 1930 (N, S, Si)
Nomada siciliensis Dalla Torre & Friese, 1894 (Si)
Nomada sricula Schwarz, 1974 (Si)
Nomada signata Jurine, 1807 (N, S, Si)
Nomada similis Morawitz, 1872 (N, S, Si)
Nomada stigma Fabricius, 1804 (N, S, Si)
Nomada striata Fabricius, 1793 (N, S, Si, Sa)
Nomada succincta Panzer, 1798 (N, S, Si, Sa)
Nomada symphyti Stoeckert, 1930 (N)
Nomada thersites Schmiedeknecht, 1882 (Si)
Nomada tridentirostris Dours, 1873 (N, S, Si, Sa)
Nomada unispinosa Schwarz, 1981 (N)
Nomada verna Schmiedeknecht, 1882 (N, Si)
Nomada villosa Thomson, 1870 (N)
Nomada zonata Panzer, 1798 (N)

***Pasites* Jurine, 1807**

Pasites maculatus Jurine, 1807 (N, S, Si)

***Tarsalia* Morawitz, 1895**

Tarsalia ancyliformis Popov, 1935
 Tarsalia ancyliformis mediterranea Pittioni, 1950 (Sa)

***Tetralonia* Spinola, 1838**

Tetralonia acutangula Morawitz, 1878
 Tetralonia acutangula dufouri (Pérez, 1879) (N, S)
Tetralonia alticincta (Lepeletier, 1841) (N, S)
Tetralonia dentata (Klug, 1835)
 Tetralonia dentata dentata (Klug, 1835) (N, S, Si, Sa)
 Tetralonia dentata graja (Eversmann, 1852) (N, S, Sa)
 Tetralonia dentata fusciscopa Hedicke, 1933 (N, S)

Tetralonia dentata fulviscopa Hedicke, 1933 (Si)
Tetralonia fulvescens Giraud, 1863 (Si)
Tetralonia grohmanni Spinola, 1838 (S, Si)
Tetralonia hungarica (Friese, 1895) (N)
Tetralonia julliani (Pérez, 1879) (Si)
Tetralonia macroglossa (Illiger, 1806)
 Tetralonia macroglossa macroglossa (Illiger, 1806) (N, S, Si)
 Tetralonia macroglossa xanthopyga Alfken, 1937 (N)
Tetralonia mediterranea (Friese, 1895) (Si)
Tetralonia nana Morawitz, 1873 (N)
Tetralonia nigrifacies (Dours, 1873) (S)
Tetralonia pollinosa (Lepeletier, 1841) (N)
Tetralonia ruficollis (Brullé, 1832) (N, S, Si)
Tetralonia salicariae (Lepeletier, 1841) (N, S)
Tetralonia tricincta (Erichson, 1835) (N, S)
Tetralonia vicina Morawitz, 1876
 Tetralonia vicina scabiosae Mocsáry, 1879 (N, S)

***Thyreus* Panzer, 1806**

Thyreus affinis (Morawitz, 1873) (N, S, Si, Sa)
Thyreus hirtus (Beaumont, 1939) (S)
Thyreus histrionicus (Illiger, 1806) (N, S, Si, Sa)
Thyreus orbatulus (Lepeletier, 1841) (N)
Thyreus ramosus (Lepeletier, 1841) (N, S, Si, Sa)
Thyreus scutellaris (Fabricius, 1781) (N, S)
Thyreus tricuspis (Pérez, 1883) (Si)
Thyreus truncatus (Pérez, 1884) (N, S, Si)

***Triepeolus* Robertson, 1901**

Triepeolus tristis (Smith, 1854) (N)

Note

Eucera deceptrix: Specie citata per l'Italia da fonti attendibili ma senza precisazione di località.
Nomada gribodoi: Specie citata per l'Italia da fonti attendibili ma senza precisazione di località.
Nomada nausicaa: Specie citata per l'Italia da fonti attendibili ma senza precisazione di località.

Apidae

***Xylocopa* Latreille, 1802**

Xylocopa iris (Christ, 1791) (N, S, Si, Sa)
Xylocopa valga Gerstaecker, 1872 (N, S, Si)
Xylocopa violacea (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Ceratina Latreille, 1802

Ceratina acuta (Friese, 1896) (S, Sa)
Ceratina callosa (Fabricius, 1794) (N, S, Si, Sa)
Ceratina chalcites Latreille, 1809 (N, S, Si)
Ceratina chalybea Chevrier, 1872 (N, S, Si)
Ceratina cucurbitina (Rossi, 1792) (N, S, Si, Sa)
Ceratina cyanea (Kirby, 1802) (N, S, Si, Sa)
Ceratina dallatorreana Friese, 1896 (N, S, Sa)
Ceratina dentiventris Gerstaecker, 1869 (N, S, Si, Sa)
Ceratina gravidula Gerstaecker, 1869 (N, S)
Ceratina loewi Gerstaecker, 1869 (N)
Ceratina nigrolabiata Friese, 1896 (N, S, Sa)
Ceratina parvula Smith, 1854 (S, Si, Sa)
Ceratina saundersi Daly, 1983 (Sa)

Bombus Latreille, 1802

Bombus alpinus (Linnaeus, 1758) (N)
Bombus argillaceus (Scopoli, 1763) (N)
Bombus cognatus Stephens, 1846 (N)
Bombus confusus Schenck, 1859 (N)
Bombus gerstaeckeri Morawitz, 1882 (N, S)
Bombus hortorum (Linnaeus, 1761) (N, S, Si, Sa)
Bombus humilis Illiger, 1806
 Bombus humilis humilis Illiger, 1806 (N, S, Si)
 Bombus humilis tristis Seidl, 1837 (N)
 Bombus humilis appeninus Vogt, 1909 (N, S)
 Bombus humilis rufoaurantiacus Reinig, 1970 (S)
 Bombus humilis quasimuscorum Vogt, 1909 (N)
Bombus hypnorum (Linnaeus, 1758) (N)
Bombus lapidarius (Linnaeus, 1758)
 Bombus lapidarius lapidarius (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)
 Bombus lapidarius decipiens Pérez, 1879 (S)
Bombus lapponicus (Fabricius, 1793) (N, S)
Bombus lucorum (Linnaeus, 1761)
 Bombus lucorum lucorum (Linnaeus, 1761) (N, S, Sa)
 Bombus lucorum aritzoensis Krueger, 1951 (Sa)
Bombus mendax Gerstaecker, 1869 (N)
Bombus mesomelas Gerstaecker, 1869 (N, S)
Bombus monticola Smith, 1849
 Bombus monticola hypsophilus Skorikov, 1912 (N)
 Bombus monticola konradini Reinig, 1965 (S)
Bombus mucidus Gerstaecker, 1869 (N, S)
Bombus muscorum (Fabricius, 1793) (N, S)
Bombus pascuorum (Scopoli, 1763)
 Bombus pascuorum pascuorum (Scopoli, 1763) (N, S, Si)

Bombus pascuorum floralis (Gmelin, 1790) (N)
Bombus pascuorum intermedius Vogt, 1909 (N)
Bombus pascuorum melleofacies Vogt, 1909 (S)
Bombus pascuorum siciliensis Tkalcu, 1977 (Si)
Bombus pratorum (Linnaeus, 1761) (N, S, Si)
Bombus pyreneus Pérez, 1879 (N)
Bombus ruderarius (Müller, 1776)
 Bombus ruderarius ruderarius (Müller, 1776) (N, S)
 Bombus ruderarius montanus Lepeletier, 1836 (Si)
Bombus ruderatus (Fabricius, 1775)
 Bombus ruderatus ruderatus (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa)
 Bombus ruderatus eurynotus Dalla Torre, 1882 (N, S)
 Bombus ruderatus sardiniensis Tournier, 1890 (Sa)
 Bombus ruderatus atrocorticulatus Vogt, 1909 (N, S, Si)
 Bombus ruderatus sculus Friese, 1909 (Si)
Bombus sicheli Radoszkowski, 1859
 Bombus sicheli alticola Kriechbaumer, 1873 (N, S)
Bombus soroeensis (Fabricius, 1776)
 Bombus soroeensis soroeensis (Fabricius, 1776) (N, S)
 Bombus soroeensis proteus Gerstaecker, 1869 (N, S)
Bombus subterraneus (Linnaeus, 1758)
 Bombus subterraneus subterraneus (Linnaeus, 1758) (N, S)
 Bombus subterraneus latreillellus (Kirby, 1802) (N, S)
Bombus sylvarum (Linnaeus, 1761)
 Bombus sylvarum rogenhofferi Dalla Torre, 1882 (N, Si)
 Bombus sylvarum distinctus Vogt, 1909 (N, S)
Bombus terrestris (Linnaeus, 1758)
 Bombus terrestris terrestris (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
 Bombus terrestris ferrugineus Schmiedeknecht, 1878 (S)
 Bombus terrestris sassaricus Tournier, 1890 (Sa)
 Bombus terrestris calabricus Krueger, 1958 (S, Si)
Bombus veteranus (Fabricius, 1793) (N)
Bombus wurfleini Radoszkowski, 1859
 Bombus wurfleini mastrucatus Gerstaecker, 1869 (N, S)

***Psithyrus* Lepeletier, 1832**

Psithyrus barbutellus (Kirby, 1802) (N, S, Si, Sa)
Psithyrus bohemicus (Seidl, 1837) (N, S)
Psithyrus campestris (Panzer, 1801) (N, S, Si)
Psithyrus flavidus (Eversmann, 1852)
 Psithyrus flavidus alpium Richards, 1928 (N)
Psithyrus maxillosus (Klug, 1817)
 Psithyrus maxillosus maxillosus (Klug, 1817) (N, S, Si, Sa)
 Psithyrus maxillosus unicolor Kriechbaumer, 1870 (N)
 Psithyrus maxillosus nigricollis Kriechbaumer, 1870 (N)
 Psithyrus maxillosus italicus Gruette, 1940 (S)
Psithyrus norvegicus Sparre Schneider, 1918 (N)

Psithyrus quadricolor Lepeletier, 1832
 Psithyrus quadricolor globosus Eversmann, 1852 (N)
 Psithyrus quadricolor meridionalis Richards, 1928 (N)
Psithyrus rupestris (Fabricius, 1793)
 Psithyrus rupestris rupestris (Fabricius, 1793) (N, S, Si)
 Psithyrus rupestris sicularis Reinig, 1931 (S)
Psithyrus sylvestris Lepeletier, 1832 (N, S)
Psithyrus vestalis (Fourcroy, 1785)
 Psithyrus vestalis vestalis (Fourcroy, 1785) (N, S, Si, Sa)
 Psithyrus vestalis sorgonensis Strand, 1917 (Sa)

Apis Linnaeus, 1758

Apis mellifera Linnaeus, 1758

Tardigrada

Stygarctidae

Mesostygarctus Renaud-Mornant, 1979

Mesostygarctus intermedius Renaud-Mornant, 1979 (3, 4, 5)

Parastygarctus Renaud-Debyser, 1965

Parastygarctus biungulatus Morone De Lucia, Grimaldi de Zio & D'Addabbo Gallo, 1984 (5)

Parastygarctus sterreri Renaud-Mornant, 1970 (3, 4, 5)

Stygarctus Schulz, 1951

Stygarctus bradypus Schulz, 1951 (4, 5)

Neoarctus de Zio Grimaldi, D'Addabbo Gallo & Morone De Lucia, 1992

Neoarctus primigenius Grimaldi de Zio, D'Addabbo Gallo & Morone De Lucia, 1992 (3)

Neostygarctus Grimaldi de Zio, D'Addabbo Gallo & Morone De Lucia, 1982

Neostygarctus acanthophorus Grimaldi de Zio, D'Addabbo Gallo & Morone De Lucia, 1982
(3, 5)

Halechiniscidae

Archechiniscus Schulz, 1953

Archechiniscus minutus Grimaldi de Zio & D'Addabbo Gallo, 1987 (3, 5)

Florarctus Delamare Deboutteville & Renaud-Mornant, 1965

Florarctus cinctus Renaud-Mornant, 1976 (3, 5)

Florarctus hulingsi Renaud-Mornant, 1976 (3, 4, 5)

Wingstrandarctus Kristensen, 1984

Wingstrandarctus corallinus Kristensen, 1984 (3)

Wingstrandarctus intermedius (Renaud-Mornant, 1967) (5)

Chrysoarctus Renaud-Mornant, 1984

Chrysoarctus flabellatus (Grimaldi de Zio, D'Addabbo Gallo, Morone De Lucia, Vaccarella & Grimaldi, 1982) (3, 5)

Halechiniscus Richters, 1908

Halechiniscus greveni Renaud-Mornant & Deroux, 1976 (3, 5)

Halechiniscus guiteli Richters, 1908 (3)

Halechiniscus macrocephalus Grimaldi de Zio, D'Addabbo Gallo & Morone De Lucia, 1988 (3)

Halechiniscus paratuleari Grimaldi de Zio, D'Addabbo Gallo & Morone De Lucia, 1988 (3)

Halechiniscus perfectus Schulz, 1955 (3, 4, 5)

Halechiniscus remanei Schulz, 1955 (3, 4, 5)

Halechiniscus subterraneus Renaud-Mornant, 1959 (3, 5)

Halechiniscus tuleari Renaud-Mornant, 1979 (5)

Orzeliscus Du Bois-Reymond Marcus, 1952

Orzeliscus belopus Du Bois-Reymond Marcus, 1952 (3, 4, 5)

Angursa Pollock, 1979

Angursa bicuspis Renaud-Mornant, 1981

Angursa bicuspis abyssalis Renaud-Mornant, 1981 (3, 5)

Paratanarctus D'Addabbo Gallo, Grimaldi de Zio, Morone De Lucia & Troccoli, 1992

Paratanarctus kristenseni D'Addabbo Gallo, Grimaldi de Zio, Morone De Lucia & Troccoli, 1992 (3)

Raiarctus Renaud-Mornant, 1981

Raiarctus variabilis D'Addabbo Gallo, Grimaldi de Zio & Morone De Lucia, 1986 (3, 5)

Styraconyx Thulin, 1926

Styraconyx craticulus (Pollock, 1983) (3, 5)
Styraconyx kristenseni Renaud-Mornant, 1981
 Styraconyx kristenseni kristenseni Renaud-Mornant, 1981 (3, 4, 5)
Styraconyx nanoqsunguak Kristensen & Higgins, 1984 (3)
Styraconyx paulae Robotti, 1971 (5)
Styraconyx qivitoq Kristensen & Higgins, 1984 (3)
Styraconyx sardiniae D'Addabbo Gallo, Morone De Lucia & Grimaldi de Zio, 1989 (3, 5)
Styraconyx testudo D'Addabbo Gallo, Grimaldi de Zio & Morone De Lucia, 1984 (3)
Styraconyx tyrrhenus D'Addabbo Gallo, Morone De Lucia & Grimaldi de Zio, 1989 (3)

Tholoarctus Kristensen & Renaud-Mornant, 1983

Tholoarctus natans Kristensen & Renaud-Mornant, 1983
 Tholoarctus natans pedunculatus D'Addabbo Gallo, Grimaldi de Zio, Morone De Lucia & Troccoli, 1992 (3, 5)

Actinarctus Schulz, 1935

Actinarctus neretinus Grimaldi de Zio, D'Addabbo Gallo, Morone De Lucia, Vaccarella & Grimaldi, 1982 (5)
 Actinarctus physophorus Grimaldi de Zio, D'Addabbo Gallo, Morone De Lucia, Vaccarella & Grimaldi, 1982 (3, 5)

Tanarctus Renaud-Debyser, 1959

Tanarctus gracilis Renaud-Mornant, 1980 (5)
 Tanarctus longisetosus Grimaldi de Zio, D'Addabbo Gallo, Morone De Lucia, Vaccarella & Grimaldi, 1982 (3, 5)
 Tanarctus ramazzottii Renaud-Mornant, 1975 (3, 5)
 Tanarctus tauricus Renaud-Debyser, 1959 (4, 5)

Batillipedidae

Batillipes Richters, 1909

Batillipes adriaticus Grimaldi de Zio, Morone De Lucia, D'Addabbo Gallo & Grimaldi, 1979 (3, 4, 5)
 Batillipes annulatus de Zio, 1962 (4, 5)
 Batillipes carnonensis Fize, 1957 (3, 5)
 Batillipes dicrocercus Pollock, 1970 (3, 4, 5)
 Batillipes littoralis Renaud-Debyser, 1959
 Batillipes littoralis littoralis Renaud-Debyser, 1959 (3, 5)
 Batillipes marcelli Morone De Lucia, D'Addabbo Gallo & Grimaldi de Zio, 1988 (3)
 Batillipes mirus Richters, 1909 (3, 4, 5) (*)
 Batillipes pennaki Marcus, 1946 (3, 4, 5)
 Batillipes phreaticus Renaud-Debyser, 1959 (3, 5)

Batillipes similis Schulz, 1955 (3, 4, 5)

Note

Batillipes mirus: Molte segnalazioni della specie *Batillipes mirus* dovrebbero essere verificate e confermate.

Echiniscoididae

Anisonyches Pollock, 1975

Anisonyches diakidius Pollock, 1975 (3, 5)

Echiniscoides Plate, 1889

Echiniscoides bruni D'Addabbo Gallo, Grimaldi de Zio, Morone De Lucia & Troccoli, 1992 (3)

Echiniscoides sigismundi (M. Schultze, 1865) (*)

Echiniscoides sigismundi sigismundi (M. Schultze, 1865) (3, 4, 5)

Echiniscoides sigismundi mediterranicus Kristensen & Hallas, 1980 (3, 4)

Note

Echiniscoides sigismundi: Molte segnalazioni della specie *E. sigismundi* dovrebbero essere verificate e confermate.

Carphanidae

Carphania Binda, 1978

Carphania fluviatilis Binda, 1978 (Si) (E, M)

Echiniscidae

Parechiniscus Cuénot, 1926

Parechiniscus chitonides Cuénot, 1926 (N, S, Si?)

Hypechiniscus Thulin, 1928

Hypechiniscus gladiator (Murray, 1905) (N) (*)

Hypechiniscus papillifer (Robotti, 1972) (N) (E)

Pseudechiniscus Thulin, 1911

Pseudechiniscus facettalis Petersen, 1951 (N, S)
Pseudechiniscus juanitae Barros, 1939 (N, S)
Pseudechiniscus novaezeelandiae (Richters, 1908) (N)
Pseudechiniscus pseudoconifer Ramazzotti, 1943 (N, S, Si?)
Pseudechiniscus ramazzottii Maucci, 1952 (N)
Pseudechiniscus scortecii Franceschi, 1952 (N)
Pseudechiniscus suillus (Ehrenberg, 1853) (N, S?, Sa)
Pseudechiniscus victor (Ehrenberg, 1853) (N)

Cornechiniscus Maucci & Ramazzotti, 1981

Cornechiniscus cornutus (Richters, 1906) (N)
Cornechiniscus holmeni (Petersen, 1951) (N)
Cornechiniscus lobatus (Ramazzotti, 1943) (N, S, Si?)

Testechiniscus Kristensen, 1987

Testechiniscus spitsbergensis (Scourfield, 1897) (N, S)

Echiniscus Schultze, 1840

Echiniscus apuanus M. Bertolani, 1946 (S) (E, M)
Echiniscus arcangelii Maucci, 1974 (N) (E)
Echiniscus arctomys Ehrenberg, 1853 (N)
Echiniscus bisetosus Heinis, 1908 (N, S, Si, Sa) (*)
Echiniscus blumi Richters, 1903 (N, S, Si, Sa)
Echiniscus canadensis Murray, 1910 (N, S, Si, Sa)
Echiniscus capillatus Ramazzotti, 1956 (N)
Echiniscus carsicus Mihelcic, 1966 (N) (E)
Echiniscus carusoi Pilato, 1972 (Si)
Echiniscus diploglyptus Durante Pasa & Maucci, 1975 (N) (E)
Echiniscus granulatus (Doyère, 1840) (N, S, Si?)
Echiniscus heterospinosus Maucci, 1954 (N)
Echiniscus inocellatus Mihelcic, 1964 (N)
Echiniscus kerguelensis Richters, 1904 (N)
Echiniscus mediantus Marcus, 1930 (N, S, Si, Sa) (*)
Echiniscus merokensis Richters, 1904 (N, S, Si, Sa)
Echiniscus militaris Murray, 1911 (N, S)
Echiniscus nobilis Mihelcic, 1967 (N) (E)
Echiniscus ohionnae Richters, 1903 (N)
Echiniscus perviridis Ramazzotti, 1959 (N)
Echiniscus phocae Du Bois-Reymond Marcus, 1944 (N)
Echiniscus postojnensis Mihelcic, 1967 (N)
Echiniscus quadrispinosus Richters, 1902 (N, S, Si, Sa)
Echiniscus ramazzottii Binda & Pilato, 1969 (Si) (E) (*)
Echiniscus simba Marcus, 1928 (N, Sa)
Echiniscus spiniger Richters, 1904 (S, Sa)
Echiniscus spinulosus (Doyère, 1840) (N, S?, Sa)

Echiniscus testudo (Doyère, 1840) (N, S, Si, Sa)
Echiniscus trisetosus Cuénot, 1932 (N, S, Si, Sa) (*)
Echiniscus wendti Richters, 1903 (N)

***Bryodelphax* Thulin, 1928**

Bryodelphax amphoterus (Durante Pasa & Maucci, 1975) (N, S)
Bryodelphax parvulus Thulin, 1928 (N, S?, Sa)
Bryodelphax tatrensis (Weglarska, 1959) (N, S, Si, Sa) (*)
Bryodelphax weglarskae (Pilato, 1972) (Si) (E)

Note

Hypechiniscus gladiator: Per l'Italia è nota soltanto la forma *exarmatus* (Murray, 1907).
Echiniscus bisetosus: Potrebbe essere sinonimo di *E. blumi*.
Echiniscus mediantus: Potrebbe essere sinonimo di *E. blumi*.
Echiniscus ramazzottii: La citazione di questa specie per l'Argentina richiede di essere confermata.
Echiniscus trisetosus: Potrebbe essere sinonimo di *E. blumi*.
Bryodelphax tatrensis: La citazione di *E. bigranulatus* per la Sicilia da parte di Arcidiacono (1964) si riferisce invece a *Bryodelphax tatrensis*.

Macrobiotidae

***Macrobiotus* Schultze, 1834**

Macrobiotus areolatus Murray, 1907 (N, S, Si, Sa)
Macrobiotus arguei Pilato & Sperlinga, 1975 (Sa) (E)
Macrobiotus crenulatus Richters, 1904 (N)
Macrobiotus csotiensis Iharos, 1966 (N?, Si, Sa)
Macrobiotus diffusus Binda & Pilato, 1987 (Si)
Macrobiotus echinogenitus Richters, 1904 (N, S, Si?)
Macrobiotus furciger Murray, 1907 (N) (*)
Macrobiotus grandis Richters, 1911 (N)
Macrobiotus harmsworthi Murray, 1907 (N, S, Si, Sa)
Macrobiotus hibernicus Murray, 1911 (N)
Macrobiotus hufelandi Schultze, 1833 (N, S, Si, Sa)
Macrobiotus hyperonyx Maucci, 1982 (N) (E)
Macrobiotus islandicus Richters, 1904 (N, S, Si?)
Macrobiotus lazzaroi Maucci, 1986 (N, Sa)
Macrobiotus macrocalix Bertolani & Rebecchi, 1993 (N)
Macrobiotus montanus Murray, 1910 (N)
Macrobiotus nuragicus Pilato & Sperlinga, 1975 (N?, S?, Sa)
Macrobiotus pallarii Maucci, 1954 (N, S, Si?)
Macrobiotus persimilis Binda & Pilato, 1972 (N, S, Si?)
Macrobiotus pilatoi Binda & Rebecchi, 1992 (N?, Si?)
Macrobiotus pseudofurcatus Pilato, 1972 (Si) (E)

Macrobiotus pseudohufelandi Iharos, 1966 (N, S, Si, Sa)
Macrobiotus richtersi Murray, 1911 (N, S, Si, Sa)
Macrobiotus sandrae Bertolani & Rebecchi, 1993 (N, S)
Macrobiotus sapiens Binda & Pilato, 1984 (Si)
Macrobiotus spectabilis Thulin, 1928 (N)
Macrobiotus tenuis Binda & Pilato, 1972 (N?, Si?)
Macrobiotus terminalis Bertolani & Rebecchi, 1993 (S)

Minibiotus Schuster, 1980

Minibiotus furcatus (Ehrenberg, 1859) (N?, Si?)
Minibiotus intermedius (Plate, 1888) (N, S, Si, Sa)
Minibiotus pustulatus (Ramazzotti, 1959) (N) (E)
Minibiotus weinerorum (Dastych, 1984) (Si) (*)

Murrayon Bertolani & Pilato, 1988

Murrayon hastatus (Murray, 1907) (N)
Murrayon nocentinae (Ramazzotti, 1961) (N) (E)
Murrayon pullari (Murray, 1907) (N?, Si, Sa)

Richtersius Pilato & Binda, 1987

Richtersius coronifer (Richters, 1903) (N, S, Si, Sa)

Macroversum Pilato & Catanzaro, 1988

Macroversum mirum Pilato & Catanzaro, 1988 (Si) (E, M)

Dactylobiotus Schuster, 1980

Dactylobiotus ambiguus (Murray, 1907) (N)
Dactylobiotus dispar (Murray, 1907) (N, S, Si?)
Dactylobiotus haplonyx Maucci, 1980 (N, S)
Dactylobiotus parthenogeneticus Bertolani, 1981 (N, S?, Sa)
Dactylobiotus selenicus Bertolani, 1981 (N, S)

Pseudodiphascon Ramazzotti, 1965

Pseudodiphascon inflexum (Arcidiacono, 1964) (Si) (E, M)

Note

Macrobiotus furciger: La citazione di questa specie, assai probabilmente, si riferisce invece a *Macrobiotus pilatoi* Binda e Rebecchi, 1992.

Minibiotus weinerorum: Il dato è inedito.

Eohypsibiidae

Amphibolus Bertolani, 1981

Amphibolus volubilis (Durante Pasa & Maucci, 1975) (N, Sa)

Amphibolus weglarskae (Dastych, 1972) (N, S, Si, Sa)

Eohypsibius Kristensen, 1982

Eohypsibius nadiae Kristensen, 1982 (N, S)

Calohypsibiidae

Calohypsibius Thulin, 1928

Calohypsibius caelatus Marcus, 1928 (N)

Calohypsibius ornatus (Richters, 1900) (N, S)

Calohypsibius verrucosus (Richters, 1900) (N)

Parhexapodibius Pilato, 1969

Parhexapodibius lagrecai (Binda & Pilato, 1969) (Si) (E)

Parhexapodibius pilatoi (Bernard, 1977) (N, S)

Parhexapodibius ramazzottii Manicardi & Bertolani, 1987 (N) (E)

Hexapodibius Pilato, 1969

Hexapodibius micronyx Pilato, 1969 (S, Si)

Hexapodibius pseudomicronyx Robotti, 1972 (N, S)

Necopinatidae

Necopinatum Pilato, 1971

Necopinatum mirabile Pilato, 1971 (S, Si)

Hypsibiidae

Microhypsibius Thulin, 1928

Microhypsibius truncatus Thulin, 1928 (N)

Doryphoribius Pilato, 1969

Doryphoribius doryphorus (Binda & Pilato, 1969) (N?, Si, Sa)
Doryphoribius flavus (Iharos, 1966) (N, S)
Doryphoribius macrodon Binda, Pilato & Dastych, 1980 (N?, S, Si, Sa)
Doryphoribius pilatoi Bertolani, 1983 (S) (E)
Doryphoribius zappalai Pilato, 1971 (Si, Sa)

Isohypsibius Thulin, 1928

Isohypsibius annulatus (Murray, 1905) (N) (*)
Isohypsibius arbiter Binda, 1980 (N, S)
Isohypsibius austriacus (Iharos, 1966) (N?, S, Si?)
Isohypsibius baldii (Ramazzotti, 1945) (N) (E)
Isohypsibius basalovoi (Durante & Maucci, 1972) (N)
Isohypsibius dastychi Pilato, Bertolani & Binda, 1982 (N?, Si, Sa)
Isohypsibius deconincki Pilato, 1971 (N, S, Si, Sa)
Isohypsibius elegans Binda & Pilato, 1971 (N, S, Si, Sa)
Isohypsibius franzi (Mihelcic, 1949) (N)
Isohypsibius gracilis (Iharos, 1966) (N)
Isohypsibius granulifer Thulin, 1928 (N, S, Si?)
Isohypsibius kristenseni Pilato, Catanzaro & Binda, 1989 (Si) (E, M)
Isohypsibius latiunguis (Iharos, 1964) (N)
Isohypsibius longiunguis Pilato, 1974 (N, S, Si?)
Isohypsibius lunulatus (Iharos, 1966) (N, S, Si, Sa)
Isohypsibius macrodactylus (Maucci, 1978) (S)
Isohypsibius marcellinoi Binda & Pilato, 1971 (N, S, Si?)
Isohypsibius marii Bertolani, 1981 (N) (E)
Isohypsibius monoicus Bertolani, 1981 (N, S, Si?)
Isohypsibius nodosus (Murray, 1907) (N?, Si?)
Isohypsibius papillifer (Murray, 1905) (N, S)
Isohypsibius pappi (Iharos, 1966) (N, S, Si, Sa)
Isohypsibius prosostomus Thulin, 1928 (N, S, Si?)
Isohypsibius reticulatus Pilato, 1973 (N, S, Si?)
Isohypsibius ronsisvallei Binda & Pilato, 1969 (N, S, Si, Sa)
Isohypsibius sattleri (Richters, 1902) (N, S, Si, Sa)
Isohypsibius schaudinni (Richters, 1909) (N)
Isohypsibius silvicola (Iharos, 1966) (Si)
Isohypsibius tetradactyloides (Richters, 1907) (N?, S, Si?)
Isohypsibius tuberculatus (Plate, 1888) (N, S)
Isohypsibius tubereticulatus Pilato & Catanzaro, 1989 (Si) (E, M)
Isohypsibius undulatus Thulin, 1928 (N)
Isohypsibius verae Pilato & Catanzaro, 1989 (Si) (E, M)
Isohypsibius verrucosus (Della Valle, 1915) (S) (E)

Pseudobiotus Nelson, 1980

Pseudobiotus augusti (Murray, 1907) (N, S, Si?)
Pseudobiotus matici (Pilato, 1971) (Si) (E, M)
Pseudobiotus megalonyx (Thulin, 1928) (N, S)

Thulinia Bertolani, 1981

Thulinia ruffoi Bertolani, 1981 (N, S, Si, Sa)

Thulinia stephaniae (Pilato, 1974) (S, Si)

Eremobiotus Biserov, 1992

Eremobiotus alicatai (Binda, 1969) (N, S, Si?)

Mixibius Pilato, 1992

Mixibius saracenus (Pilato, 1973) (N, S, Si?)

Hypsibius Ehrenberg, 1848

Hypsibius antarcticus (Richters, 1904) (N) (*)

Hypsibius calcaratus Bartoš, 1935 (N)

Hypsibius conifer Mihelcic, 1938 (Si)

Hypsibius convergens (Urbanowicz, 1925) (N, S, Si, Sa)

Hypsibius dujardini (Doyère, 1840) (N, S, Si, Sa)

Hypsibius microps Thulin, 1928 (N, S, Si?)

Hypsibius pallidus Thulin, 1911 (N, S, Si?)

Hypsibius pedrottii Bertolani, Manicardi & Gibertoni, 1987 (S) (E)

Hypsibius ragonesei Binda & Pilato, 1985 (Si) (E)

Hypsibius scabropygus Cuénot, 1929 (N, S?, Sa)

Ramazzottius Binda & Pilato, 1986

Ramazzottius oberhaeuseri (Doyère, 1840) (N, S, Si, Sa)

Ramazzottius thulini Pilato, 1971 (S) (E) (*)

Ramazzottius tribulosus Bertolani & Rebecchi, 1988 (N) (E)

Mesocrista Pilato, 1987

Mesocrista spitzbergensis (Richters, 1903) (N)

Platicrista Pilato, 1987

Platicrista angustata (Murray, 1905) (N, S, Si?)

Itaquascon Barros, 1939

Itaquascon bartosi Weglarska, 1959 (N)

Itaquascon placophorum Maucci, 1972 (N) (E)

Itaquascon trinacriae Arcidiacono, 1962 (N, S, Si, Sa)

Diphascon Plate, 1889

Diphascon aculeatum (Maucci, 1952) (S) (E)
Diphascon belgicae Richters, 1911 (N, S, Si?)
Diphascon brevipes (Marcus, 1936) (N, S, Si?)
Diphascon bullatum Murray, 1905 (N)
Diphascon carolae Binda & Pilato, 1969 (Si) (E)
Diphascon chilense Plate, 1888 (N, S, Si?)
Diphascon clavatum (Bartoš, 1935) (N)
Diphascon granifer Greven, 1972 (N, S)
Diphascon higginsi Binda, 1971 (N, S?, Sa)
Diphascon iltisi (Schuster & Grigarick, 1965) (S)
Diphascon marcuzzii (Mihelcic, 1971) (N) (E)
Diphascon nobilei (Binda, 1969) (N, S, Si?)
Diphascon oculatum Murray, 1906 (N)
Diphascon ongulense (Morikawa, 1962) (N)
Diphascon patanei Binda & Pilato, 1971 (N, S, Si, Sa)
Diphascon pingue (Marcus, 1936) (N, S, Si, Sa)
Diphascon prorsirostre Thulin, 1928 (N, S)
Diphascon ramazzottii (Robotti, 1970) (N)
Diphascon recamieri Richters, 1911 (N, Si)
Diphascon scoticum Murray, 1905 (N, S, Si?)

***Hebesuncus* Pilato, 1987**

Hebesuncus conjungens (Thulin, 1911) (N)

Note

Isohypsibius annulatus: Per l'Italia è nota soltanto la forma minor (Ramazzotti, 1945).

Hypsibius antarcticus: La diagnosi relativa a questa specie potrebbe essere errata e quindi la specie potrebbe non essere presente in Italia.

Ramazzottius thulini: Potrebbe essere sinonimo di *R. oberhaeuseri*.

Milnesiidae

***Milnesium* Doyère, 1840**

Milnesium tardigradum Doyère, 1840 (N, S, Si?)

Phoronidea

Phoronidae

***Phoronis* Wright, 1856**

Phoronis hippocrepia Wright, 1856 (3) (*)
Phoronis muelleri Selys-Longchamps, 1903 (3, 4) (*)
Phoronis psammophila Cori, 1889 (3, 5) (*)

Note

Phoronis: Le larve di *Phoronis* sono state spesso citate sotto il nome generico *Actinotrocha* Müller, 1846.

Phoronis hippocrepia: La larva di questa specie è nota sotto il nome di *Actinotrocha hippocrepia* Silén, 1954.

Phoronis muelleri: La larva di questa specie è nota sotto il nome di *Actinotrocha branchiata* Müller, 1846 (=brownei Selys-Longchamps, 1907 =B Ikeda, 1901 =D Ikeda, 1901).

Phoronis psammophila: La larva di questa specie è nota sotto il nome di *Actinotrocha sabatieri* Roule, 1896 (=metschnikoffi Selys-Longchamps, 1907 =wilsoni Selys-Longchamps, 1907 =hatscheki Selys-Longchamps, 1907 =ashworthi Selys-Longchamps, 1907).

Bryozoa

Fredericellidae

Fredericella Gervais, 1836

Fredericella sultana (Blumenbach, 1779) (N, S)

Plumatellidae

Plumatella Lamarck, 1816

Plumatella casmiana Oka, 1907 (S)
Plumatella emarginata Allman, 1844 (N, S, Sa)
Plumatella fruticosa Allman, 1844 (N, S)
Plumatella fungosa (Pallas, 1768) (S, Sa)
Plumatella repens (Linnaeus, 1758) (N, S, Sa)

Hyalinella Jullien, 1885

Hyalinella punctata (Hancock, 1850) (N, S) (*)

Note

Hyalinella punctata: Presenza in S (Lago Trasimeno) segnalata da M.I. Taticchi (non pubbl.).

Lophopodidae

Lophopus Dumortier, 1835

Lophopus crystallinus (Pallas, 1768) (S)

Cristatellidae

Cristatella Cuvier, 1798

Cristatella mucedo Cuvier, 1798 (N, S)

Benedeniporidae

Benedenipora Pergens, 1889

Benedenipora catenata Pergens, 1889 (3) (E)

Benedenipora delicatula D'Hondt & Geraci, 1975 (3) (E)

Paludicellidae

Paludicella Gervais, 1836

Paludicella articulata (Ehrenberg, 1831) (N, S, Sa)

Alcyonidiidae

Alcyonidium Lamouroux, 1813

Alcyonidium cellarioides Calvet, 1900 (3)

Alcyonidium mamillatum Alder, 1857 (3)

Alcyonidium polyoum (Hassall, 1841) (3, 4) (*)

Note

Alcyonidium polyoum: Linneo descrisse due specie diverse col nome *Alcyonium gelatinosum*: una nel 1761, incrostante, quasi mai citata con questo nome e ridescritta nel 1841 da Hassall come *Sarcochitum polyoum*, e un'altra nel 1767, arborescente (= *Alcyonidium diaphanum* (Hudson, 1778)). D'Hondt (diversi lavori e com. pers.) ritiene più opportuno mantenere, per la specie incrostante, il nome *polyoum*, sotto il quale essa è stata quasi sempre citata a partire dal 1841, per evitare la confusione con la specie arborescente quasi sempre indicata come *A. gelatinosum* (Linnaeus, 1767). Thorpe & Winston (1984. On the identity of *Alcyonidium gelatinosum* (Linnaeus, 1761) (Bryozoa: Ctenostomata). J. Nat. Hist., 18: 853-860), al contrario, attribuiscono il nome *A. gelatinosum* (Linnaeus, 1761) alla specie incrostante e *A. diaphanum* (Hudson, 1778) a quella eretta. La presenza di quest'ultima specie nelle acque italiane non può comunque essere esclusa, dato che alcune citazioni di *A. gelatinosum*

(Linnaeus) non riportano l'anno della descrizione originale né descrivono gli esemplari rinvenuti. In base a recenti studi in elettroforesi, comunque, *A. polyoum* è da considerarsi un complesso superspecifico (D'Hondt & Goyffon, 1991. Etude d'un cas de spéciation en cours chez les Bryozoaires: la population de la superspecies *Alcyonidium polyoum* (Hassall, 1841) d'Angle (Pays des Galles). Cah. Biol. mar., 32: 487-502).

Clavoporidae

Metalcyonidium D'Hondt, 1976

Metalcyonidium gautieri D'Hondt, 1976 (5)

Arachnidiidae

***Arachnoidea* (*Arachnoidella*)** D'Hondt, 1983

Arachnoidea (*Arachnoidella*) *annosciae* D'Hondt & Geraci, 1976 (3)

Nolella Gosse, 1855

Nolella dilatata (Hincks, 1860) (3, 4) (*)

Nolella gigantea (Busk, 1856) (3, 4, 5) (*)

Note

Nolella dilatata: Presenza in 4 segnalata da C. Chimenz (non pubbl.).

Nolella gigantea: La sinonimia con *N. stipata* è probabile, ma non certa (D'Hondt, 1983).

Victorellidae

Bulbella Braem, 1951

Bulbella abscondita Braem, 1951 (4)

Victorella Saville Kent, 1870

Victorella muelleri (Kraepelin, 1887) (3, 4)

Victorella pavida Saville Kent, 1870 (3, 4) (*)

Note

Victorella pavida: Specie tipica di ambienti lagunari, di difficile determinazione e spesso confusa con *V. muelleri*. Segnalata anche nel lago Trasimeno da M.I. Taticchi (non pubbl.).

Vesiculariidae

Amathia Lamouroux, 1812

- Amathia lendigera* (Linnaeus, 1761) (3, 4, 5)
- Amathia pruvoti* Calvet, 1911 (3, 4, 5?)
- Amathia semiconvoluta* Lamouroux, 1824 (3, 4, 5) (*)

Bowerbankia Farre, 1837

- Bowerbankia gracilis* Leidy, 1855 (3, 4, 5)
- Bowerbankia gracillima* (Hincks, 1877) (3, 4)
- Bowerbankia imbricata* (Adams, 1798) (3, 4, 5)
- Bowerbankia pustulosa* (Ellis & Solander, 1786) (3, 4, 5)

Zoobothryon Ehrenberg, 1829

- Zoobothryon verticillatum* (Delle Chiaje, 1822) (3, 4, 5)

Note

Amathia semiconvoluta: Presenza in 3 e 5 segnalata rispettivamente da M. Gristina e A. Rosso (non pubbl.).

Buskiidae

Buskia Alder, 1856

- Buskia nitens* Alder, 1857 (3)
- Buskia socialis* Hincks, 1887 (3, 4)

Triticellidae

Triticella Dalyell, 1848

- Triticella flava* Dalyell, 1848 (4)

Triticellopsis Gautier, 1961

- Triticellopsis tissieri* Gautier, 1961 (3)

Valkeriidae

Valkeria Fleming, 1823

Valkeria tuberosa Heller, 1867 (3, 4, 5)
Valkeria uva (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Mimosellidae

Mimosella Hincks, 1851

Mimosella gracilis Hincks, 1851 (3, 4, 5)
Mimosella verticillata (Heller, 1867) (3, 4, 5)

Lobiancoporidae

Lobiancopora Pergens, 1889

Lobiancopora hyalina Pergens, 1889 (3)

Pherusellidae

Pherusella Soule, 1951

Pherusella tubulosa (Ellis & Solander, 1786) (3, 4, 5)

Aeteidae

Aetea Lamouroux, 1812

Aetea anguina (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)
Aetea lepadiformis Waters, 1906 (3, 4)
Aetea sica (Couch, 1844) (3, 4, 5)
Aetea truncata (Landsborough, 1852) (3, 4, 5)

Scrupariidae

Scruparia Oken, 1815

Scruparia ambigua (D'Orbigny, 1841) (3, 4, 5)
Scruparia chelata (Linnaeus, 1758) (3)

Membraniporidae

Membranipora Blainville, 1830

Membranipora membranacea (Linnaeus, 1767) (3, 4)

Conopeum Gray, 1848

Conopeum seurati (Canu, 1928) (3, 4, 5)

Electridae

Electra Lamouroux, 1816

Electra monostachys (Busk, 1854) (3, 4)

Electra pilosa (Linnaeus, 1767) (3, 4, 5)

Electra posidoniae Gautier, 1954 (3, 4, 5)

Electra tenella (Hincks, 1880) (5)

Electra verticillata (Ellis & Solander, 1786) (3, 5) (*)

Pyripora D'Orbigny, 1852

Pyripora catenularia (Fleming, 1828) (4)

Tendra Nordmann, 1839

Tendra zostericola (Nordmann, 1839) (4)

Note

Electra verticillata: Presenza in 5 segnalata da M. Gristina (non pubbl.).

Flustridae

Chartella Gray, 1848

Chartella papyrea (Pallas, 1766) (3, 5?)

Chartella tenella (Hincks, 1887) (3, 5?) (*)

Hincksinoflustra Bobin & Prenant, 1961

Hincksinoflustra octodon (Busk, 1852) (3?, 5)

Securiflustra Silén, 1941

Securiflustra securifrons (Pallas, 1766) (3, 4)

Hincksina Norman, 1903

Hincksina flustroides (Hincks, 1877) (*)

Hincksina flustroides flustroides (Hincks, 1877) (3, 5)

Gregarinidra Barroso, 1948

Gregarinidra gregaria (Heller, 1867) (3, 4, 5)

Note

Chartella tenella: Presenza in 5 segnalata da A. Rosso (tesi di dottorato, non pubbl.).

Hincksina flustroides: La distribuzione geografica qui indicata per la sottospecie nominale include anche le frequenti citazioni che fanno riferimento alla specie in quanto tale, senza specificazione di sottospecie: pertanto, la sottospecie nominale potrebbe avere una distribuzione più ristretta rispetto a quella indicata.

Calloporidae

Callopora Gray, 1848

Callopora dumerilii (Audouin & Savigny, 1826) (3, 4, 5)

Callopora lineata (Linnaeus, 1767) (3, 4, 5)

Aplousina Canu & Bassler, 1927

Aplousina capriensis (Waters, 1898) (3)

Crassimarginatella Canu, 1900

Crassimarginatella crassimarginata (Hincks, 1880) (3, 5?)

Crassimarginatella maderensis (Waters, 1898) (3, 4, 5)

Crassimarginatella solidula (Hincks, 1860) (3)

Copidozoum Harmer, 1926

Copidozoum exiguum (Barroso, 1920) (5)

Copidozoum planum (Hincks, 1880) (3, 4, 5) (*)

Copidozoum tenuirostre (Hincks, 1880) (3, 4, 5)

Ellisina Norman, 1903

Ellisina gautieri Fernandez Pulpeiro & Reverter Gil, 1993 (3)

Parellisina Osburn, 1940

Parellisina curvirostris (Hincks, 1861) (3, 4, 5) (*)

Amphiblestrum Gray, 1848

Amphiblestrum lyrulatum (Calvet, 1907) (3, 5)

Note

Copidozoum planum: Presenza in 4 segnalata da C. Chimenz (non pubbl.).

Parellisina curvirostris: Presenza in 4 segnalata da C. Chimenz (non pubbl.).

Chaperiidae

Chaperia Willey, 1900

Chaperia annulus (Manzoni, 1870) (3)

Onychocellidae

Onychocella Jullien, 1881

Onychocella marioni Jullien, 1881 (3, 4, 5)

Onychocella vibraculifera Neviani, 1895 (3, 5)

Setosellinidae

Setosellina Calvet, 1906

Setosellina capriensis (Waters, 1926) (3, 5)

Microporidae

Micropora Gray, 1848

Micropora coriacea (Johnston, 1847) (3, 4, 5)

Calpensia Jullien, 1888

Calpensia nobilis (Esper, 1796) (3, 4, 5)

Coronellina Prenant & Bobin, 1966

Coronellina fagei (Gautier, 1962) (3?, 5)

Rosseliana Jullien, 1888

Rosseliana rosselii (Audouin & Savigny, 1826) (3, 4)

Mollia Lamouroux, 1821

Mollia circumcincta (Heller, 1867) (3?, 4, 5)

Mollia multijuncta (Waters, 1879) (3) (*)

Mollia patellaria (Moll, 1803) (3, 4, 5)

Note

Mollia multijuncta: Inserita nella fauna italiana grazie alla segnalazione di C. Chimenz (non pubbl.).

Setosellidae

Setosella Hincks, 1887

Setosella cavernicola Harmelin, 1977 (3?, 5)

Setosella vulnerata (Busk, 1860) (3, 4, 5)

Chlidoniidae

Chlidonia Lamouroux, 1824

Chlidonia pyriformis (Bertoloni, 1810) (3, 4, 5)

Cellariidae

Cellaria Ellis & Solander, 1786

Cellaria fistulosa (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Cellaria normani Hastings, 1946 (3)

Cellaria salicornioides Lamouroux, 1816 (3, 4, 5)

Cellaria sinuosa (Hassall, 1840) (3)

Scrupocellariidae

Caberea Lamouroux, 1816

Caberea boryi (Audouin & Savigny, 1826) (3, 4, 5)

Scrupocellaria Van Beneden, 1845

Scrupocellaria bertholleti (Audouin & Savigny, 1826) (3, 4, 5)

Scrupocellaria delilii (Audouin & Savigny, 1826) (3, 4, 5) (*)

Scrupocellaria incurvata Waters, 1896 (3, 5?)
Scrupocellaria macrorhyncha Gautier, 1962 (3, 5?)
Scrupocellaria maderensis Busk, 1860 (3, 5) (*)
Scrupocellaria reptans (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)
Scrupocellaria scrupea Busk, 1852 (3, 4, 5)
Scrupocellaria scruposa (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Tricellaria Fleming, 1828

Tricellaria inopinata D'Hondt & Occhipinti Ambrogi, 1985 (4) (E)

Note

Scrupocellaria delilii: Presenza in 4 segnalata da C. Chimenz (non pubbl.).
Scrupocellaria maderensis: Presenza in 5 segnalata da A. Rosso (tesi di dottorato, non pubbl.).

Epistomiidae

Epistomia Fleming, 1828

Epistomia bursaria (Linnaeus, 1758) (3)

Synnotum Pieper, 1881

Synnotum aegyptiacum (Audouin & Savigny, 1826) (3, 4, 5?)

Bicellariidae

Bicellariella Levinsen, 1909

Bicellariella ciliata (Linnaeus, 1758) (3)

Beaniidae

Beania Johnston, 1840

Beania hirtissima (Heller, 1867) (*)
 Beania hirtissima hirtissima (Heller, 1867) (3, 4, 5)
 Beania hirtissima cylindrica (Hincks, 1886) (3, 4, 5?)
Beania magellanica (Busk, 1852) (3, 4, 5)
Beania mirabilis Johnston, 1840 (3, 4, 5)
Beania robusta (Hincks, 1881) (3, 4, 5)

Note

Beania hirtissima: La distribuzione geografica qui indicata per la sottospecie nominale include anche le frequenti citazioni che fanno riferimento alla specie in quanto tale, senza specificazione di sottospecie: pertanto, la sottospecie nominale potrebbe avere una distribuzione più ristretta rispetto a quella indicata.

Bugulidae

Bugula Oken, 1815

- Bugula aperta* Hincks, 1886 (3, 4) (E)
- Bugula avicularia* (Linnaeus, 1758) (3, 4)
- Bugula calathus* Norman, 1868
 - Bugula calathus calathus* Norman, 1868 (3, 4)
 - Bugula calathus minor* Ryland, 1962 (3)
- Bugula flabellata* (Thompson in Gray, 1848) (3, 4, 5)
- Bugula fulva* Ryland, 1960 (3, 4, 5)
- Bugula gautieri* Ryland, 1961 (3)
- Bugula germanae* Calvet, 1902 (3)
- Bugula gracilis* Busk, 1858 (4)
- Bugula neritina* (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)
- Bugula plumosa* (Pallas, 1766) (3, 4)
- Bugula simplex* Hincks, 1886 (3, 4, 5)
- Bugula spicata* Hincks, 1886 (3, 4)
- Bugula stolonifera* Ryland, 1960 (3, 4, 5)
- Bugula turbinata* Alder, 1857 (3, 4, 5)

Cribrilinidae

Cribrilina Gray, 1848

- Cribrilina punctata* (Hassall, 1841) (3, 5?)

Collarina Jullien, 1886

- Collarina balzaci* (Audouin & Savigny, 1826) (3, 4, 5)

Puellina (Puellina) Jullien, 1886

- Puellina (Puellina) gattyae* (Landsborough, 1852) (3, 4, 5)
- Puellina (Puellina) setosa* (Waters, 1899) (3, 5)

Puellina (Cribrilaria) Canu & Bassler, 1928

- Puellina (Cribrilaria) hincksi* (Friedl, 1917) (3, 5)
- Puellina (Cribrilaria) innominata* (Couch, 1844) (3, 4, 5)

Puellina (Cribrilaria) radiata (Moll, 1803) (3, 4, 5)

Puellina (Cribrilaria) venusta (Canu & Bassler, 1925) (3, 5?)

Puellina (Glabrilaria) Bishop & Househam, 1987

Puellina (Glabrilaria) pedunculata Gautier, 1956 (3, 5)

Figularia Jullien, 1886

Figularia figularis (Johnston, 1847) (3, 4, 5)

Membraniporella Smitt, 1873

Membraniporella nitida (Johnston, 1838) (3, 5)

Andrioporidae

Distansescharella D'Orbigny, 1853

Distansescharella seguenzai Cipolla, 1921 (5) (*)

Note

Distansescharella seguenzai: Inserita nella fauna italiana grazie alla segnalazione di A. Rosso (non pubbl.).

Umbonulidae

Umbonula Hincks, 1880

Umbonula ovicellata Hastings, 1944 (3, 4, 5)

Hippopleurifera Canu & Bassler, 1925

Hippopleurifera pulchra (Manzoni, 1870) (3, 5)

Exochellidae

Escharoides Milne-Edwards, 1836

Escharoides coccinea (Abildgaard, 1806) (3, 4, 5)

Escharoides mamillata (Wood, 1844) (3, 5)

Adeonidae

Adeonellopsis Mac Gillivray, 1886

Adeonellopsis distoma (Busk, 1858) (3, 5)

Reptadeonella Busk, 1884

Reptadeonella violacea (Johnston, 1847) (3, 4, 5)

Watersiporidae

Watersipora Neviani, 1895

Watersipora complanata (Norman, 1864) (3, 4, 5)

Watersipora subovoidea (D'Orbigny, 1852) (3, 4, 5)

Cryptosulidae

Cryptosula Canu & Bassler, 1925

Cryptosula pallasiana (Moll, 1803) (3, 4, 5)

Hippoporinidae

Hippoporina Neviani, 1895

Hippoporina pertusa (Esper, 1796) (3, 4, 5) (*)

Hippoporella Canu, 1917

Hippoporella hippopus (Smitt, 1868) (5)

Pentapora Fisher, 1807

Pentapora fascialis (Pallas, 1766) (*)

Pentapora fascialis fascialis (Pallas, 1766) (3, 4, 5)

Pentapora fascialis foliacea (Ellis & Solander, 1786) (3, 4, 5?)

Pentapora ottomulleriana (Moll, 1803) (3, 4, 5)

Note

Hippoporina pertusa: Presenza in 5 segnalata da A. Rosso (tesi di dottorato, non pubbl.).

Pentapora: Specie tradizionalmente attribuite a Hippodiplosia Canu, 1916.

Pentapora fascialis: Alle due sottospecie viene a volte riconosciuto rango specifico.

Hippopodinidae

Cheiloporina Canu & Bassler, 1927

Cheiloporina circumcincta (Neviani, 1896) (3, 5?)

Hippaliosina Canu, 1919

Hippaliosina depressa (Busk, 1854) (3, 4, 5) (*)

Hippomenella Canu & Bassler, 1917

Hippomenella mucronelliformis (Waters, 1899) (3, 5)

Note

Hippaliosina depressa: Presenza in 5 segnalata da A. Rosso (non pubbl.).

Smittinidae

Smittina Norman, 1903

Smittina cervicornis (Pallas, 1766) (3, 4, 5)

Smittina crystallina (Norman, 1867) (3) (*)

Smittina landsborovii (Johnston, 1847) (3, 5)

Prenantia Gautier, 1962

Prenantia cheilostoma (Manzoni, 1869) (3, 5) (*)

Prenantia inerma (Calvet, 1906) (3, 4, 5?) (*)

Smittoidea Osburn, 1952

Smittoidea marmorea (Hincks, 1877) (3, 5)

Smittoidea ophidiana (Waters, 1879) (3, 5?)

Smittoidea reticulata (Mac Gillivray, 1842) (3, 4, 5)

Parasmittina Osburn, 1952

Parasmittina raigii (Audouin & Savigny, 1826) (3, 4)

Parasmittina trispinosa (Johnston, 1838) (3, 4)

Parasmittina tropica (Waters, 1909) (3, 4, 5) (*)

Porella Gray, 1848

Porella concinna (Busk, 1854) (*)
 Porella concinna concinna (Busk, 1854) (3, 4)
 Porella concinna tubulata Calvet, 1927 (3, 5?)
Porella minuta (Norman, 1868) (3, 5)
Porella tubulata (Busk, 1861) (3, 5?)

***Palmicellaria* Alder, 1864**

Palmicellaria cf. aviculifera Canu & Bassler, 1928 (3, 5) (*)
Palmicellaria elegans Alder, 1864 (3, 5) (*)

Note

Smittina crystallina: Inserita nella fauna italiana grazie alla segnalazione di A. Rosso (non pubbl.).

Prenantia cheilostoma: Presenza in 5 segnalata da A. Rosso (tesi di dottorato, non pubbl.).

Prenantia inerma: Presenza in 4 segnalata da C. Chimenz (non pubbl.).

Parasmittina tropica: Zabala (1986) considera *P. rouvillei* come una forma astogenetica di *P. tropica*.

Porella concinna: La distribuzione geografica qui indicata per la sottospecie nominale include anche le frequenti citazioni che fanno riferimento alla specie in quanto tale, senza specificazione di sottospecie: pertanto, la sottospecie nominale potrebbe avere una distribuzione più ristretta rispetto a quella indicata.

Palmicellaria cf. aviculifera: Inserita nella fauna italiana grazie alla segnalazione di A. Rosso (tesi di dottorato non pubbl.).

Palmicellaria elegans: Presenza in 5 segnalata da A. Rosso (tesi di dottorato, non pubbl.).

Escharellidae

***Escharella* Gray, 1848**

Escharella octodentata (Hincks, 1880) (3, 4, 5?) (*)
Escharella rylandi Geraci, 1974 (3)
Escharella variolosa (Johnston, 1838) (3, 4, 5)
Escharella ventricosa (Hassall, 1842) (3, 4, 5)

***Hemicyclopora* Norman, 1894**

Hemicyclopora multispinata (Norman, 1909) (3, 5) (*)

Note

Escharella octodentata: Presenza in 4 segnalata da C. Chimenz (non pubbl.).

Hemicyclopora multispinata: Presenza in 5 segnalata da A. Rosso (tesi di dottorato, non pubbl.).

Phylactellidae

Phylactella Hincks, 1879

Phylactella cf. labrosa (Busk, 1854) (3, 5) (*)

Note

Phylactella cf. labrosa: Presenza in 5 segnalai da A. Rosso (tesi di dottorato, non pubbl.).

Schizoporellidae

Arthropoma Levinsen, 1909

Arthropoma ceciliae (Audouin & Savigny, 1826) (3, 4, 5) (*)

Schizoporella Hincks, 1877

Schizoporella dunkeri (Reuss, 1848) (3, 4) (*)

Schizoporella errata (Waters, 1878) (3, 4, 5)

Schizoporella longirostris Hincks, 1886 (3, 4, 5)

Schizoporella magnifica (Hincks, 1886) (3, 4, 5)

Schizoporella mutabilis Calvet, 1927 (3)

Schizoporella neptuni (Jullien, 1882) (5)

Schizoporella unicornis (Johnston in Wood, 1844) (3, 4, 5)

Schizobrachiella Canu & Bassler, 1920

Schizobrachiella sanguinea (Norman, 1868) (3, 4, 5)

Schizomavella Canu & Bassler, 1917

Schizomavella arrogata (Waters, 1879) (3, 5)

Schizomavella auriculata (Hassall, 1842) (*)

Schizomavella auriculata asymetrica (Calvet, 1927) (3)

Schizomavella auriculata auriculata (Hassall, 1842) (3, 4, 5)

Schizomavella auriculata cuspidata (Hincks, 1880) (3, 5?)

Schizomavella auriculata hirsuta (Calvet, 1927) (3)

Schizomavella auriculata leontiniensis (Waters, 1878) (3, 5?)

Schizomavella discoidea (Busk, 1859) (3, 4, 5)

Schizomavella hastata (Hincks, 1862) (3, 4, 5)

Schizomavella linearis (Hassall, 1841) (*)

Schizomavella linearis linearis (Hassall, 1841) (3, 4, 5)

Schizomavella linearis crucifera (Norman, 1869) (3)

Schizomavella mamillata (Hincks, 1880) (3, 5) (*)

Schizomavella marsupifera (Busk, 1884) (3?, 4)

Schizomavella monoecensis (Calvet, 1927) (3, 5) (*)
Schizomavella rudis (Manzoni, 1869) (3, 5) (*)

Metroperiella Canu & Bassler, 1917

Metroperiella lepralioides (Calvet, 1903) (3, 5) (*)

Cribellopora Gautier, 1957

Cribellopora trichotoma (Waters, 1918) (3, 5)

Escharina Milne-Edwards, 1836

Escharina dutertrei (Audouin & Savigny, 1826) (3, 4, 5)
Escharina hyndmanni (Johnston, 1847) (3, 5)
Escharina johnstoni (Quelch, 1884) (3) (*)
Escharina vulgaris (Moll, 1803) (3, 4, 5)

Buffonellaria Canu & Bassler, 1917

Buffonellaria divergens (Smitt, 1873) (3)

Calyptotheca Harmer, 1957

Calyptotheca rugosa Hayward, 1974 (5) (*)

Note

Arthropoma cecilii: Presenza in 5 segnalata da A. Rosso (tesi di dottorato, non pubbl.).

Schizoporella dunkeri: Presenza in 4 segnalata da C. Chimenz (non pubbl.).

Schizomavella auriculata: La distribuzione geografica qui indicata per la sottospecie nominale include anche le frequenti citazioni che fanno riferimento alla specie in quanto tale, senza specificazione di sottospecie: pertanto, la sottospecie nominale potrebbe avere una distribuzione più ristretta rispetto a quella indicata.

Schizomavella linearis: La distribuzione geografica qui indicata per la sottospecie nominale include anche le frequenti citazioni che fanno riferimento alla specie in quanto tale, senza specificazione di sottospecie: pertanto, la sottospecie nominale potrebbe avere una distribuzione più ristretta rispetto a quella indicata.

Schizomavella mamillata: Presenza in 5 segnalata da A. Rosso (tesi di dottorato, non pubbl.).

Schizomavella monoecensis: Presenza in 5 segnalata da A. Rosso (tesi di dottorato, non pubbl.).

Schizomavella rudis: Presenza in 5 segnalata da A. Rosso (tesi di dottorato, non pubbl.).

Metroperiella lepralioides: Sinonimia con *C. montferrandii* probabile, ma non certa (Hayward, 1974; Zabala, 1986).

Escharina johnstoni: Inserita nella fauna italiana grazie alla segnalazione di A. Rosso (non pubbl.).

Calyptotheca rugosa: Inserita nella fauna italiana grazie alla segnalazione di A. Rosso (tesi di dottorato, non pubbl.).

Cleidochasmatidae

Cleidochasmidra Unsal & D'Hondt, 1979

Cleidochasmidra canakkalense Unsal & D'Hondt, 1979 (5)

Characodoma Maplestone, 1900

Characodoma bifurcatum (Waters, 1918) (3, 4) (E)

Hippopodinella Barroso, 1924

Hippopodinella kirchenpaueri (Heller, 1867) (*)

Hippopodinella kirchenpaueri kirchenpaueri (Heller, 1867) (3, 4, 5)

Hippopodinella kirchenpaueri tregoubovii Gautier, 1952 (3, 4, 5?)

Hippopodinella lata (Busk, 1856) (3, 4, 5) (*)

Note

Hippopodinella kirchenpaueri: La distribuzione geografica qui indicata per la sottospecie nominale include anche le frequenti citazioni che fanno riferimento alla specie in quanto tale, senza specificazione di sottospecie: pertanto, la sottospecie nominale potrebbe avere una distribuzione più ristretta rispetto a quella indicata.

Hippopodinella lata: Presenza in 4 segnalata da C. Chimenz (non pubbl.).

Microporellidae

Microporella Hincks, 1877

Microporella ciliata (Pallas, 1766) (3, 4, 5)

Microporella marsupiata (Busk, 1860) (3, 4, 5)

Microporella umbracula (Audouin & Savigny, 1826) (3)

Fenestrulina Jullien, 1888

Fenestrulina joannae (Calvet, 1902) (3, 4, 5)

Fenestrulina malusii (Audouin & Savigny, 1826) (3, 4, 5)

Diporula Hincks, 1879

Diporula verrucosa (Peach, 1868) (3, 5?)

Chorizoporidae

Chorizopora Hincks, 1879

Chorizopora brongniartii (Audouin & Savigny, 1826) (3, 4, 5)

Tessaradomidae

Tessaradoma Norman, 1869

Tessaradoma boreale (Busk, 1860) (3)

Hippothoidae

Hippothoa Lamouroux, 1821

Hippothoa divaricata Lamouroux, 1821 (3, 4)

Hippothoa flagellum Manzoni, 1870 (3, 4)

Haplopoma Levinsen, 1909

Haplopoma bimucronatum (Moll, 1803) (*)

Haplopoma bimucronatum bimucronatum (Moll, 1803) (3, 4, 5)

Haplopoma bimucronatum occiduum (Waters, 1879) (3, 5)

Haplopoma graniferum (Johnston, 1847) (*)

Haplopoma graniferum carinatum (Calvet, 1902) (3)

Haplopoma graniferum graniferum (Johnston, 1847) (3, 5)

Haplopoma impressum (Audouin & Savigny, 1826) (3, 4, 5)

Haplopoma sciaphilum Silén & Harmelin, 1976 (3?, 4, 5)

Trypostega Levinsen, 1909

Trypostega claviculata (Hincks, 1884) (3, 5)

Trypostega venusta (Norman, 1864) (3)

Note

Haplopoma bimucronatum: La distribuzione geografica qui indicata per la sottospecie nominale include anche le frequenti citazioni che fanno riferimento alla specie in quanto tale, senza specificazione di sottospecie: pertanto, la sottospecie nominale potrebbe avere una distribuzione più ristretta rispetto a quella indicata. Presenza di *H. b. occiduum* in 5 segnalata da A. Rosso (tesi di dottorato, non pubbl.).

Haplopoma graniferum: La distribuzione geografica qui indicata per la sottospecie nominale include anche le frequenti citazioni che fanno riferimento alla specie in quanto tale, senza specificazione di sottospecie: pertanto, la sottospecie nominale potrebbe avere una distribuzione più ristretta rispetto a quella indicata.

Adeonellidae

Adeonella Busk, 1884

Adeonella calveti Canu & Bassler, 1930 (3, 5) (*)

Adeonella polystomella (Reuss, 1847) (3, 4)

Note

Adeonella calveti: Presenza in 5 segnalata da A. Rosso (tesi di dottorato, non pubbl.).

Savignyellidae

Savignyella Levinsen, 1909

Savignyella lafontii (Audouin & Savigny, 1826) (3, 4, 5)

Phidoloporidae

Reteporella Busk, 1884

Reteporella elegans Harmelin, 1976 (3?, 5) (*)

Reteporella sparteli (Calvet, 1906) (5)

Rhynchozoon Hincks, 1895

Rhynchozoon bispinosum (Johnston, 1847) (3, 4)

Rhynchozoon neapolitanum Gautier, 1962 (3, 5?)

Rhynchozoon pseudodigitatum Zabala & Maluquer, 1988 (3)

Rhynchozoon sp. 1 sensu Hayward, 1974 (4) (*)

Rhynchozoon sp. 2 sensu Hayward, 1974 (3) (*)

Brodiella Utley & Bullivant, 1972

Brodiella armata (Hincks, 1861) (3, 5)

Dentiporella Barroso, 1927

Dentiporella sardonica (Waters, 1879) (3, 4, 5?)

Schizotheca Hincks, 1877

Schizotheca fissa (Busk, 1856) (3, 4, 5?)

Schizotheca serratimargo (Hincks, 1886) (3?, 4, 5)

Schizoretepora Gregory, 1893

Schizoretepora imperati (Busk, 1884) (3, 4, 5) (*)

Schizoretepora longisetae (Canu & Bassler, 1928) (3)

Schizoretepora solanderia (Risso, 1826) (3, 5) (*)

Hippellozoon Canu & Bassler, 1917

Hippellozoon mediterraneum (Waters, 1894) (3, 5) (*)

Sertella Jullien, 1903

Sertella aporosa (Waters, 1894) (3)

Sertella complanata (Waters, 1894) (3, 5?)

Sertella couchii (Hincks, 1878) (*)

Sertella couchii biaviculata (Waters, 1894) (3, 5)

Sertella couchii couchii (Hincks, 1878) (3, 4, 5)

Sertella harmeri Hass, 1948 (3) (E)

Sertella mediterranea (Smitt, 1867) (3)

Sertella septentrionalis Harmer, 1933 (3, 4, 5)

Note

Reteporella elegans: Inserita nella fauna italiana grazie alla segnalazione di A. Rosso (non pubbl.).

Rhynchozoon sp. 1: Inserita nella fauna italiana grazie alla segnalazione di C. Chimenz (non pubbl.). Vedi anche la nota relativa alla specie seguente.

Rhynchozoon sp. 2: Questa specie e la precedente sono state descritte e figurate da Hayward (1974), che ha preferito non assegnare loro un nome data la confusione esistente tra le specie mediterranee del genere. Esse sono state successivamente citate da vari autori, sempre con il loro nome provvisorio.

Schizoretepora imperati: Presenza in 3 e in 5 segnalata da A. Rosso (tesi di dottorato, non pubbl.).

Schizoretepora solanderia: Presenza in 5 segnalata da A. Rosso (tesi di dottorato, non pubbl.).

Hippellozoon mediterraneum: Presenza in 5 segnalata da A. Rosso (tesi di dottorato, non pubbl.).

Sertella: Specie tradizionalmente attribuite a *Retepora* Lamarck, 1801.

Sertella couchii: La distribuzione geografica qui indicata per la sottospecie nominale include anche le frequenti citazioni che fanno riferimento alla specie in quanto tale, senza specificazione di sottospecie: pertanto, la sottospecie nominale potrebbe avere una distribuzione più ristretta rispetto a quella indicata.

Jaculinidae

Jaculina Jullien & Calvet, 1903

Jaculina parallelata (Waters, 1895) (3, 5)
Jaculina tessellata (Hayward, 1979) (5)

Margarettidae

Margaretta Gray, 1848

Margaretta cereoides (Ellis & Solander, 1786) (3, 4, 5)

Celleporidae

Cellepora Linnaeus, 1767

Cellepora pumicosa (Pallas, 1766) (3, 4, 5)

Celleporina Gray, 1848

Celleporina decipiens Hayward, 1976 (5)
Celleporina globulosa (D'Orbigny, 1852) (3, 4, 5)
Celleporina hassallii (Johnston, 1847) (*)
 Celleporina hassallii hassallii (Johnston, 1847) (3, 4, 5)
 Celleporina hassallii tubulosa (Hincks, 1880) (3, 5)
Celleporina lucida (Hincks, 1880) (3, 4, 5)

Lagenipora Hincks, 1877

Lagenipora lepralioides (Norman, 1868) (3, 5) (*)

Cigclisula Canu & Bassler, 1927

Cigclisula turrita (Smitt, 1873) (3?, 4, 5?) (*)

Buchneria Harmer, 1957

Buchneria fayalensis (Waters, 1888) (3)

Buskea Heller, 1867

Buskea dichotoma (Hincks, 1862) (3)
Buskea nitida Heller, 1867 (3, 4, 5) (*)

Omalosecosa Canu & Bassler, 1925

Omalosecosa ramulosa (Linnaeus, 1767) (3, 4, 5) (*)

Turbicellepora Ryland, 1963

Turbicellepora avicularis (Hincks, 1860) (3, 4, 5)
Turbicellepora coronopus (Wood, 1844) (3, 4, 5)
Turbicellepora coronopusoida (Calvet, 1931) (3, 5)
Turbicellepora crenulata Hayward, 1978 (3)
Turbicellepora magnicostata (Barroso, 1919) (3, 4, 5)
Turbicellepora torquata Hayward, 1978 (3, 4) (E) (*)
Turbicellepora tubigera (Busk, 1859) (3, 4)

Note

Celleporina hassallii: La distribuzione geografica qui indicata per la sottospecie nominale include anche le frequenti citazioni che fanno riferimento alla specie in quanto tale, senza specificazione di sottospecie: pertanto, la sottospecie nominale potrebbe avere una distribuzione più ristretta rispetto a quella indicata.

Lagenipora lepralioides: Presenza in 5 segnalata da A. Rosso (tesi di dottorato, non pubbl.).

Cigclisula turrita: Inserita nella fauna italiana grazie alla segnalazione di C. Chimenz (non pubbl.).

Buskea nitida: Presenza in 5 segnalata da A. Rosso (tesi di dottorato, non pubbl.).

Omalosecosa ramulosa: Presenza in 5 segnalata da A. Rosso (tesi di dottorato, non pubbl.).

Turbicellepora torquata: Presenza in 4 segnalata da C. Chimenz (non pubbl.).

Crepidacanthidae

Crepidacantha Levinsen, 1909

Crepidacantha poissonii (Audouin & Savigny, 1826) (4)

Myriaporidae

Myriapora Blainville, 1830

Myriapora truncata (Pallas, 1766) (3, 4, 5)

Crisiidae

Filicrisia D'Orbigny, 1853

Filicrisia geniculata (Milne Edwards, 1838) (3, 4, 5)

Crisia Lamouroux, 1813

Crisia denticulata (Lamarck, 1816) (3, 4, 5)

Crisia eburnea (Linnaeus, 1758) (3, 5?)

Crisia fistulosa Heller, 1867 (3, 4, 5)

Crisia occidentalis Trask, 1857 (3, 5) (*)
Crisia ramosa Harmer, 1891 (3, 5?)
Crisia sigmoidea Waters, 1916 (3, 5)

Note

Crisia occidentalis: Presenza in 5 segnalata da A. Rosso (tesi di dottorato, non pubbl.).

Oncousoeciidae

Stomatopora Brown, 1825

Stomatopora gingrina Jullien, 1882 (3?, 5)

Diaperoeciidae

Annectocyma Hayward & Ryland, 1985

Annectocyma indistincta (Canu & Bassler, 1929) (3, 5) (*)
Annectocyma major (Johnston, 1847) (3, 4, 5)
Annectocyma tubulosa (Busk, 1875) (3, 5)

Entalophoroecia Harmelin, 1976

Entalophoroecia deflexa (Couch, 1842) (3, 4, 5)
Entalophoroecia gracilis Harmelin, 1976 (3, 5)
Entalophoroecia robusta Harmelin, 1976 (3)

Note

Annectocyma: Specie tradizionalmente attribuite a *Diaperoecia* Canu, 1918.

Annectocyma indistincta: Presenza in 5 segnalata da A. Rosso (tesi di dottorato, non pubbl.).

Diastoporidae

Eurystrotos Hayward & Ryland, 1985

Eurystrotos compacta (Norman, 1866) (3, 4, 5?)

Plagioecia Canu, 1918

Plagioecia dorsalis (Waters, 1879) (3, 4)
Plagioecia inoedificata (Jullien, 1882) (3?, 4, 5)
Plagioecia patina (Lamarck, 1816) (3, 4, 5)
Plagioecia platydiscus Harmelin, 1976 (3, 5)

Plagioecia sarniensis (Norman, 1864) (3, 4, 5)

Diplosolen Canu, 1918

Diplosolen obelia (Johnston, 1838) (3, 4, 5)

Liripora Mac Gillivray, 1887

Liripora amphorae (Harmelin, 1976) (3, 4)

Cardioecia Canu & Bassler, 1922

Cardioecia watersi (O'Donoghue & de Watteville, 1939) (3, 4, 5?)

Mecynoeciidae

Mecynoecia Canu, 1918

Mecynoecia delicatula (Busk, 1875) (3, 5)

Fron diporidae

Fron dipora Link, 1807

Fron dipora verrucosa (Lamouroux, 1821) (3, 4, 5) (*)

Note

Fron dipora verrucosa: Presenza in 5 segnalata da A. Rosso (tesi di dottorato, non pubbl.).

Terviidae

Tervia Jullien, 1882

Tervia irregularis (Meneghini, 1844) (3, 4, 5)

Tubuliporidae

Tubulipora Lamarck, 1816

Tubulipora aperta Harmer, 1898 (3)

Tubulipora hemiphragmata Harmelin, 1976 (3)

Tubulipora liliacea (Pallas, 1766) (3, 5)

Tubulipora notomale (Busk, 1875) (3, 5) (*)

Tubulipora plumosa Harmer, 1898 (3, 5)

Tubulipora ziczac Harmelin, 1976 (3)

Idmidronea Canu & Bassler, 1920

Idmidronea atlantica (Forbes in Johnston, 1847) (3, 4, 5)

Idmidronea coerulea Harmelin, 1976 (3, 5) (*)

Platonea Canu & Bassler, 1920

Platonea stoechas Harmelin, 1976 (3, 4, 5)

Note

Tubulipora notomale: Presenza in 5 segnalata da A. Rosso (tesi di dottorato, non pubbl.).

Idmidronea coerulea: Presenza in 5 segnalata da A. Rosso (tesi di dottorato, non pubbl.).

Lichenoporidae

Lichenopora Defrance, 1823

Lichenopora mediterranea Blainville, 1834 (4)

Lichenopora radiata (Audouin & Savigny, 1826) (3, 4, 5)

Disporella Gray, 1848

Disporella hispida (Fleming, 1828) (3, 4, 5)

Horneridae

Hornera Lamouroux, 1821

Hornera frondiculata Lamouroux, 1821 (3, 4, 5)

Hornera lichenoides (Linnaeus, 1758) (3?, 5) (*)

Note

Hornera lichenoides: Inserita nella fauna italiana grazie alla segnalazione di A. Rosso (tesi di dottorato, non pubbl.).

Brachiopoda

Craniidae

Neocrania Lee & Brunton, 1986

Neocrania anomala (O.F. Müller, 1776) (3, 5) (*)

Note

Neocrania: Il genere *Neocrania* è stato creato per le specie attuali del genere *Crania* che, dunque, comprende solo le specie fossili.

Neocrania anomala: Specie ridescritta nel Mar Mediterraneo come *Neocrania turbinata* da Brunton (1988).

Terebratulidae

Gryphus Megerle von Mühlfeld, 1811

Gryphus vitreus (Born, 1778) (3, 5)

Cancellothyrididae

Terebratulina d'Orbigny, 1847

Terebratulina retusa (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Megathyrididae

Argyrotheca Dall, 1900

Argyrotheca cistellula (Searles-Wood, 1841) (3, 4, 5)

Argyrotheca cordata (Risso, 1826) (3, 4, 5)

Argyrotheca cuneata (Risso, 1826) (3, 4, 5)

Megathiris d'Orbigny, 1847

Megathiris detruncata (Gmelin, 1790) (3, 4, 5)

Platidiidae

Platidia O.G. Costa, 1852

Platidia anomioides (Scacchi & Philippi, 1844) (3)

Platidia davidsoni (Eudes-Deslongchamps, 1855) (3)

Krausinidae

***Megerlia* King, 1850**

Megerlia monstrosa (Sacchi, 1883) (3)

Megerlia truncata (Linnaeus, 1767) (3, 4) (*)

Note

Megerlia truncata: Specie ridescritta nel Mar Mediterraneo come *Pantellaria monstrosa* (diversa da *Megerlia echinata*) da Llompart (1988) e come *Megerlia monstrosa* (=M. *echinata*) da Brunton (1989).

Thecideidae

***Lacazella* Munier-Chalmas, 1881**

Lacazella mediterranea (Risso, 1826)

Chaetognatha

Heterokrohniidae

***Heterokrohnia* Ritter-Zahony, 1911**

Heterokrohnia palpifera Casanova, 1986 (3)

Spadellidae

***Spadella* Langerhans, 1880**

Spadella birostrata Casanova, 1987 (3)

Spadella cephaloptera Busch, 1851 (3, 4, 5) (*)

Spadella ledoyeri Casanova, 1986 (3) (*)

Spadella musculosa Doncaster, 1903 (3) (*)

Spadella profunda Doncaster, 1903 (3) (*)

Note

Spadella cephaloptera: A nord della Corsica.

Spadella ledoyeri: Costa provenzale e nord della Corsica.

Spadella musculosa: Specie dubbia.

Spadella profunda: Specie dubbia.

Pterosagittidae

Pterosagitta A. Costa, 1869

Pterosagitta draco Krohn, 1853 (3, 4, 5) (*)

Note

Pterosagitta draco: Prevalentemente nel settore occidentale del Mediterraneo.

Krohnittidae

Krohnitta Ritter-Zahony, 1911

Krohnitta subtilis (Grassi, 1881) (3, 4, 5)

Sagittidae

Sagitta Quoy & Gaimard, 1827

Sagitta bipunctata Quoy & Gaimard, 1827 (3, 4, 5)

Sagitta enflata Grassi, 1881 (3, 4, 5)

Sagitta hexaptera d'Orbigny, 1836 (3, 4, 5)

Sagitta lyra Krohn, 1853 (3, 4)

Sagitta megalophthalma Dallot & Ducret, 1969 (3)

Sagitta minima Grassi, 1881 (3, 4, 5)

Sagitta neodecipiens Tokioka, 1959 (3, 4, 5)

Sagitta serratodentata Krohn, 1883

Sagitta serratodentata atlantica Tokioka, 1939 (3, 4, 5)

Sagitta setosa J. Müller, 1847 (3, 4, 5) (*)

Sagitta tasmanica J.M. Thomson, 1947 (3)

Note

Sagitta setosa: Segnalata anche nella Laguna veneta.

Echinodermata

Crinoidea

Antedonidae

Antedon A.H. Clark, 1811

Antedon mediterranea Lamarck, 1816 (3, 4, 5)

Leptometra A.H. Clark, 1908

Leptometra phalangium (J. Müller, 1841) (3, 4, 5)

Holothurioidea

Holothuriidae

Holothuria Linneus, 1767

Holothuria forskali Delle Chiaje, 1823 (3, 4, 5)

Holothuria helleri Marenzeller, 1878 (3, 4, 5)

Holothuria impatiens (Forsskål, 1775) (3, 4, 5)

Holothuria mammata Grube, 1840 (3, 4, 5)

Holothuria polii Delle Chiaje, 1823 (3, 4, 5)

Holothuria sanctori Delle Chiaje, 1823 (3, 5)

Holothuria tubulosa Gmelin, 1788 (3, 4, 5)

Stichopodidae

Stichopus Brandt, 1835

Stichopus regalis (Cuvier, 1817) (3, 4, 5)

Synallactidae

Mesothuria Ludwig, 1894

Mesothuria intestinalis (Asc. Rathke, 1867) (3, 4, 5)

Pseudostichopus Théel, 1882

Pseudostichopus occultatus Marenzeller, 1893 (3, 4, 5)

Cucumariidae

Trachythyone Studer, 1876

Trachythyone elongata (Düben Koren, 1844) (3, 4, 5)

Trachythyone tergestina (M. Sars, 1857) (3, 4, 5)

Pseudocnus Panning, 1949

- Pseudocnus grubei* (Panning, 1962) (3, 4, 5)
- Pseudocnus koellikeri* (Panning, 1962) (3, 5)
- Pseudocnus syracusanus* (Panning, 1962) (3, 4, 5)

Paracucumaria W. Thomson, 1840

- Paracucumaria hyndmani* (W. Thomson, 1840) (3, 4)

Stereoderma Ayres, 1851

- Stereoderma kirschbergi* (Heller, 1868) (3, 4, 5)

Ocnus Forbes, 1841

- Ocnus planci* (Panning, 1962) (3, 4, 5)

Pseudothyone Panning, 1949

- Pseudothyone sculponea* Cherbonnier, 1958 (3, 4, 5)

Thyone Oken, 1815

- Thyone cherbonnieri* Reys, 1960 (3, 4)
- Thyone fusus* (O. F. Müller, 1788) (3, 4)
- Thyone gadeana* Perrier, 1902 (3)

Havelockia Pearson, 1903

- Havelockia inermis* (Heller, 1868) (3, 4, 5)

Phyllophoridae

Phyllophorus Grube, 1840

- Phyllophorus granulatus* (Grube, 1840) (3, 5)
- Phyllophorus urna* Grube, 1840 (3, 4, 5)

Neocucumis Deichmann, 1944

- Neocucumis marioni* (Marenzeller, 1878) (4)

Synaptidae

Leptosynapta Verrill, 1867

Leptosynapta inhaerens (O.F. Müller, 1776) (3)

Leptosynapta makrankyra (Ludwig, 1898) (3)

Leptosynapta minuta (Becher, 1906) (3)

Labidoplax Oestergren, 1898

Labidoplax digitata (Montagu, 1815) (3, 4, 5)

Labidoplax thomsoni (Hérath, 1865) (3, 4, 5)

Chiridotidae

Trochodota Ludwig, 1892

Trochodota furcipraedita Salvini-Plawen, 1972 (3)

Trochodota venusta (Semon, 1887) (3)

Molpadiidae

Molpadia Cuvier, 1817

Molpadia musculus Risso, 1826 (3)

Caudinidae

Hedingia Deichmann, 1938

Hedingia mediterranea (Bartolini-Baldelli, 1914) (3)

Asteroidea

Luidiidae

Luidia Forbes, 1839

Luidia ciliaris (Philippi, 1837) (3, 4, 5)

Luidia sarsi (Düben Koren, 1846) (3, 4, 5)

Astropectinidae

Astropecten Gray, 1840

Astropecten aranciatus (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)
Astropecten bispinosus (Otto, 1823) (3, 4, 5)
Astropecten irregularis (Pennant, 1777)
 Astropecten irregularis pentacanthus (Delle Chiaje, 1825) (3, 4, 5)
Astropecten jonstoni (Delle Chiaje, 1825) (3, 4, 5)
Astropecten platyacanthus (Philippi, 1837) (3, 4, 5)
Astropecten spinulosus (Philippi, 1837) (3, 4, 5)

Tethyaster Sladen, 1889

Tethyaster subinermis (Philippi, 1837) (3, 4, 5)

Odontasteridae

Odontaster Marenzeller, 1891

Odontaster mediterraneus Marenzeller, 1891 (3, 4)

Chaetasteridae

Chaetaster Müller-Troschel, 1842

Chaetaster longipes (Retzius, 1805) (3, 4, 5)

Goniasteridae

Ceramaster Perrier, 1881

Ceramaster grenadensis (Perrier, 1881) (3)

Peltaster Müller-Troschel, 1842

Peltaster placenta (Müller-Troschel, 1842) (3, 4, 5)

Ophidiasteridae

Ophidiaster L. Agassiz, 1835

Ophidiaster ophidianus (Lamarck, 1816) (3)

Hacelia Gray, 1840

Hacelia attenuata (Gray, 1840) (3, 4, 5)

Asterinidae

Asterina Nardo, 1834

Asterina gibbosa (Pennant, 1777) (3, 4, 5)

Asterina pancerii (Gasco, 1870) (3)

Allopatiria Verrill, 1913

Allopatiria ocellifera (Gray, 1847) (5)

Anseropoda Nardo, 1834

Anseropoda lobiancoi (Ludwig, 1897) (3)

Anseropoda placenta (Pennant, 1777) (3, 4, 5)

Poraniidae

Marginaster Perrier, 1881

Marginaster capreensis (Gasco, 1876) (3)

Echinasteridae

Echinaster Müller-Troschel, 1840

Echinaster sepositus (Retzius, 1783) (3, 4, 5)

Asteriidae

Coscinasterias Verrill, 1867

Coscinasterias tenuispina (Lamarck, 1816) (3, 4, 5)

Marthasterias Jullien, 1878

Marthasterias glacialis (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Sclerasterias Perrier, 1891

Sclerasterias neglecta (Perrier, 1891) (3, 4, 5)

Sclerasterias richardi (Perrier, 1882) (3)

Brisingidae

Brisingella Fisher, 1917

Brisingella coronata (G.O. Sars, 1871) (3, 4, 5)

Ophiuroidea

Gorgonocephalidae

Astrospartus Döderlein, 1911

Astrospartus mediterraneus (Risso, 1826) (3, 4, 5)

Ophiomyxidae

Ophiomyxa Müller-Troschel, 1840

Ophiomyxa pentagona (Lamarck, 1816) (3, 4, 5)

Ophiacanthidae

Ophiacantha Müller-Troschel, 1842

Ophiacantha setosa (Retzius, 1805) (3, 4, 5)

Amphiuridae

Amphiura Forbes, 1842

Amphiura apicula Cherbonnier, 1957 (3)

Amphiura brachiata (Montagu, 1804) (3)

Amphiura cherbonnieri Guille, 1972 (3)

Amphiura chiajei Forbes, 1843 (3, 4, 5)

Amphiura delamarei Cherbonnier, 1958 (3)

Amphiura filiformis (O. F. Müller, 1776) (3, 4, 5)

Amphiura mediterranea Lyman, 1882 (3, 4, 5)

Amphipholis Ljungmann, 1866

Amphipholis squamata (Delle Chiaje, 1828) (3, 4, 5)

Amphilepididae

Amphilepis Ljungmann, 1864

Amphilepis norvegica Ljungmann, 1864 (3)

Ophiactidae

Ophiactis Lütken, 1856

Ophiactis balli (W. Thomson, 1840) (5)

Ophiactis savignyi (Müller-Troschel, 1842) (5)

Ophiactis virens (M. Sars, 1857) (3, 5)

Ophiothricidae

Ophiothrix Müller-Troschel, 1842

Ophiothrix fragilis (Abildgaard, 1789) (3, 4, 5)

Ophiocomidae

Ophiopsila Forbes, 1843

Ophiopsila annulosa (M. Sars, 1857) (3)

Ophiopsila aranea Forbes, 1843 (3, 4, 5)

Ophiopsila guineensis Koehl, 1914 (3)

Ophiocomina Koehler, 1921

Ophiocomina nigra (Abildgaard, 1789) (5)

Ophiodermatidae

Ophioderma Müller-Troschel, 1842

Ophioderma longicaudum (Retzius, 1805) (3, 4, 5)

Ophioconis Lütken, 1869

Ophioconis forbesi (Heller, 1863) (3, 4, 5)

Cryptopelta H.L. Clark, 1909

Cryptopelta brevispina (Ludwig, 1880) (3)

Ophiuridae

Ophiura Lamarck, 1816

Ophiura albida Forbes, 1839 (3, 4, 5)

Ophiura carnea (Lütken, 1859) (3)

Ophiura grubei Heller, 1863 (3, 4)

Ophiura ophiura (Linnaeus, 1816) (3, 4, 5)

Ophiocten Marenzeller, 1893

Ophiocten abyssicolum (Marenzeller, 1893) (3)

Echinoidea

Cidaridae

Cidaris Leske, 1778

Cidaris cidaris (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Stylocidaris Mortensen, 1909

Stylocidaris affinis (Philippi, 1845) (3, 5)

Diadematidae

Centrostephanus Peters, 1855

Centrostephanus longispinus (Philippi, 1845) (3, 5)

Arbaciidae

Arbacia Gray, 1835

Arbacia lixula (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Arbaciella Mortensen, 1910

Arbaciella elegans Mortensen, 1910 (5)

Temnopleuridae

Genocidaris A. Agassiz, 1869

Genocidaris maculata A. Agassiz, 1869 (3, 5)

Toxopneustidae

Sphaerechinus Desor, 1856

Sphaerechinus granularis (Lamarck, 1816) (3, 4, 5)

Echinidae

Echinus Linnaeus, 1758

Echinus acutus Lamarck, 1816 (3, 4, 5)

Echinus melo Lamarck, 1816 (3, 4, 5)

Psammechinus L. Agassiz, 1846

Psammechinus microtuberculatus (Blainville, 1825) (3, 4, 5)

Paracentrotus Mortensen, 1903

Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816) (3, 4, 5)

Neolampadidae

Neolampas A. Agassiz, 1869

Neolampas rostellata A. Agassiz, 1869 (3)

Fibulariidae

Echinocyamus Phelsum, 1774

Echinocyamus pusillus (O. F. Müller, 1776) (3, 4, 5)

Spatangidae

Spatangus Gray, 1825

Spatangus inermis Mortensen, 1913 (3)

Spatangus purpureus (O. F. Müller, 1776) (3, 4, 5)

Loveniidae

Echinocardium Gray, 1825

Echinocardium cordatum (Pennant, 1777) (3, 4, 5)

Echinocardium fenauxi Péquignat, 1963 (3)

Echinocardium flavescens (O. F. Müller, 1776) (3)

Echinocardium mediterraneum (Forbes, 1844) (3)

Echinocardium mortensenii Thiéry, 1909 (3)

Schizasteridae

Schizaster L. Agassiz, 1836

Schizaster canaliferus (Lamarck, 1816) (3, 4, 5)

Hemiasteridae

Hemiaster Lovén, 1871

Hemiaster expergitus Lovén, 1871 (3)

Brissidae

Brissopsis L. Agassiz, 1840

Brissopsis atlantica Mortensen, 1907

Brissopsis atlantica mediterranea Mortensen, 1913 (3)

Brissopsis lyrifera (Forbes, 1841) (3, 5)

Brissus Gray, 1825

Brissus unicolor (Leske, 1778) (3, 4, 5)

Plagiobrissus Pomel, 1883

Plagiobrissus costai (Gasco, 1876) (3, 5)

Hemichordata

Pterobranchia

Rhabdopleurida

Rhabdopleuridae

Rabdopleura Allman, 1869

Rabdopleura normani Allman, 1869 (*)

Note

Rabdopleura normani: Specie non ancora segnalata per le acque italiane.

Enteropneusta

Enteropneusta

Harrimaniidae

Saccoglossus Schimkewitsch, 1892

Saccoglossus mereschkowski (Wagner, 1885) (3, 4)

Spengelidae

Glandiceps Spengel, 1891

Glandiceps talaboti (Marion, 1876) (*)

Note

Glandiceps talaboti: Specie non ancora segnalata per le acque italiane, dove però la sua presenza è probabile.

Ptychoderidae

Balanoglossus Delle Chiaje, 1829

Balanoglossus clavigerus Delle Chiaje, 1829 (3, 4, 5)

Glossobalanus Spengel, 1901

Glossobalanus minutus (Kowalevsky, 1866) (3, 4)

Chordata

Appendicularia

Oikopleuridae

Oikopleura Fol, 1872

Oikopleura albicans (Leuckart, 1854) (3, 4, 5)

Oikopleura dioica Fol, 1872 (3, 4, 5)

Oikopleura fusiformis Fol, 1872 (3, 4, 5)

Oikopleura gracilis Lohmann, 1896 (3)

Oikopleura intermedia Lohmann, 1896 (3, 5)

Oikopleura longicauda (Vogt, 1854) (3, 4, 5)

Oikopleura lophocerca (Gegenbaur, 1855) (3, 4, 5)

Oikopleura parva Lohmann, 1896 (3)

Oikopleura villafrancae Fénaux, 1991 (3)

Megalocercus Chun, 1887

Megalocercus abyssorum Chun, 1887 (3, 4, 5)

Stegosoma Chun, 1888

Stegosoma magnum (Langerhans, 1880) (3, 4)

Folia Lohmann, 1892

Folia gracilis Lohmann, 1892 (3)

Pelagopleura Lohmann, 1896

Pelagopleura haranti Vernières, 1934 (3)

Fritillariidae

Fritillaria Quoy & Gaimard, 1834

- Fritillaria aequatorialis* Lohmann, 1896 (3)
- Fritillaria borealis* Lohmann, 1896
 - Fritillaria borealis sargassi* Lohmann, 1896 (3)
- Fritillaria charybdae* Lohmann, 1899 (3)
- Fritillaria fagei* Fénaux, 1961 (3)
- Fritillaria fraudax* Lohmann, 1896 (3)
- Fritillaria gracilis* Lohmann, 1896 (3)
- Fritillaria haplostoma* Fol, 1872 (3, 4)
- Fritillaria messanensis* Lohmann, 1899 (3, 5)
- Fritillaria pellucida* Busch, 1851
 - Fritillaria pellucida typica* Busch, 1851 (3, 4, 5)
- Fritillaria tenella* Lohmann, 1896 (3)
- Fritillaria urticans* Fol, 1872 (3)
- Fritillaria venusta* Lohmann, 1896 (3)

Tectillaria Lohmann, 1896

- Tectillaria fertilis* Lohmann, 1896 (3)

Appendicularia Fol, 1874

- Appendicularia sricula* Fol, 1874 (3, 4, 5)
- Appendicularia tregouboffi* Fénaux, 1960 (3)

Kowalewskaiidae

Kowalevskia Fol, 1872

- Kowalevskia oceanica* Lohmann, 1899 (3)
- Kowalevskia tenuis* Fol, 1872 (3, 4)

Ascidacea

Polycitoridae

Archiascidia Julin, 1904

- Archiascidia neapolitana* Julin, 1904 (3)

Clavelina Savigny, 1816

- Clavelina dellavallei* (Zirpolo, 1925) (3, 4, 5)
- Clavelina lepadiformis* (O.F. Müller, 1776) (3, 4, 5)

Clavelina phlegraea Salfi, 1929 (3)
Clavelina sabbadini Brunetti, 1987 (4)

Eudistoma Caullery, 1909

Eudistoma costai (Della Valle, 1877) (3, 4, 5)
Eudistoma mucosum (Drasche, 1883) (4, 5)
Eudistoma planum Pérès, 1949 (5)
Eudistoma plumbeum (Della Valle, 1877) (3, 5)

Cystodytes Drasche, 1883

Cystodytes dellechiaiei (Della Valle, 1877) (3, 4, 5)
Cystodytes durus Drasche, 1883 (4)

Distaplia Della Valle, 1881

Distaplia magnilarva Della Valle, 1881 (3, 4, 5)
Distaplia stylifera (Kowalewsky, 1874) (5)

Polyclinidae

Polycitor Renier, 1788

Polycitor adriaticus (Drasche, 1883) (4, 5)
Polycitor crystallinus Renier, 1804 (3, 4, 5)

Pseudodistoma Michaelsen, 1924

Pseudodistoma cyrnusense Pérès, 1925 (4, 5)

Aplidium Savigny, 1816

Aplidium argus (Milne-Edwards, 1841) (4)
Aplidium asperum Drasche, 1883 (4)
Aplidium coeruleum Lahille, 1890 (5)
Aplidium conicum (Olivi, 1792) (3, 4, 5)
Aplidium densum (Giard, 1872) (4, 5)
Aplidium elegans (Giard, 1872) (3, 4, 5)
Aplidium fuscum Drasche, 1883 (3, 4, 5)
Aplidium gibbulosum (Savigny, 1816) (3)
Aplidium haouarianum (Pérès, 1956) (4, 5)
Aplidium hyalinum (Pérès, 1956) (4, 5)
Aplidium lobatum Savigny, 1816 (5)
Aplidium mediterraneum (Hartmeyer, 1909) (3, 5)
Aplidium nordmanni (Milne-Edwards, 1841) (3, 4, 5)
Aplidium pellucidum Drasche, 1883 (4)

Aplidium proliferum (Milne-Edwards, 1841) (3, 4, 5)
Aplidium pseudolobatum (Pérès, 1956) (5)
Aplidium punctum (Giard, 1873) (4)
Aplidium turbinatum (Savigny, 1816) (3, 4, 5)

Polyclinella Harant, 1930

Polyclinella azemai Harant, 1930 (4, 5)

Polyclinum Savigny, 1816

Polyclinum aurantium Milne-Edwards, 1841 (3, 5)

Didemnidae

Trididemnum Della Valle, 1881

Trididemnum cereum (Giard, 1872) (3, 4, 5)
Trididemnum inarmatum (Drasche, 1883) (3, 4, 5)

Didemnum Savigny, 1816

Didemnum coccineum (Drasche, 1883) (4)
Didemnum commune (Della Valle, 1877) (3, 4)
Didemnum coriaceum (Drasche, 1883) (3, 4)
Didemnum drachi Lafargue, 1975 (4)
Didemnum fulgens (Milne-Edwards, 1841) (3, 4, 5)
Didemnum granulosum (Drasche, 1833) (3, 4, 5)
Didemnum lahillei Hartmeyer, 1909 (3, 4, 5)
Didemnum maculosum (Milne-Edwards, 1841) (3, 4, 5)
Didemnum pseudofulgens Médioni, 1970 (4)
Didemnum protectum (Daumezon, 1909) (4)

Polysyncraton Nott, 1892

Polysyncraton bilobatum Lafargue, 1968 (4)
Polysyncraton canetense Brément, 1913 (4)
Polysyncraton haranti (Pérès, 1956) (5)
Polysyncraton lacazei (Giard, 1872) (4, 5)

Lissoclinum Verril, 1871

Lissoclinum perforatum (Giard, 1872) (3, 4, 5)
Lissoclinum weigelei Lafargue, 1968 (4)

Diplosoma Macdonald, 1859

Diplosoma carnosum Drasche, 1883 (4)
Diplosoma listerianum (Milne-Edwards, 1841) (3, 4, 5)
Diplosoma spongiforme (Giard, 1872) (3, 4)

Cionidae

Rhopalaea Philippi, 1843

Rhopalaea hartmeyer (Salfi, 1927) (3, 5)
Rhopalaea neapolitana Philippi, 1843 (3, 4, 5)

Diazona Savigny, 1816

Diazona violacea (Savigny, 1816) (3, 4)

Corellidae

Ciona Fleming, 1822

Ciona intestinalis (Linnaeus, 1767) (3, 4, 5)
Ciona roulei Lahille, 1887 (4)

Corella Alder & Hancock, 1870

Corella parallelogramma (O.F. Müller, 1776) (4)

Rhodosoma Ehrenberg, 1828

Rhodosoma turcicum (Savigny, 1816) (3, 4, 5)

Perophoridae

Perophora Wiegmann, 1835

Perophora listeri Wiegmann, 1835 (3, 4, 5)
Perophora viridis Verrill, 1871 (3, 4)

Ecteinascidia Herdman, 1880

Ecteinascidia herdmani (Lahille, 1890) (3)
Ecteinascidia turbinata Herdman, 1880 (5)

Asciidiidae

Ascidrella Roule, 1883

Ascidrella aspersa (O.F. Müller, 1776) (3, 4, 5)

Ascidrella scabra (O.F. Müller, 1776) (3, 4, 5)

Ascidia Linnaeus, 1767

Ascidia colleta C. Monniot & F. Monniot, 1970 (4)

Ascidia conchilega O.F. Müller, 1776 (3, 4)

Ascidia involuta Heller, 1875 (4)

Ascidia malaca (Traustedt, 1883) (3, 4)

Ascidia mentula O.F. Müller, 1776 (3, 4, 5)

Ascidia muricata Heller, 1874 (3, 4)

Ascidia salvatoris (Traustedt, 1885) (3)

Ascidia virginea O.F. Müller, 1776 (3, 4, 5)

Phallusia Savigny, 1816

Phallusia fumigata (Grube, 1864) (3, 4, 5)

Phallusia ingeria Traustedt, 1883 (3, 4, 5)

Phallusia mammillata (Cuvier, 1815) (3, 4, 5)

Styelidae

Botryllus Gaertner, 1774

Botryllus schlosseri (Pallas, 1776) (3, 4, 5)

Botrylloides M. Edwards, 1841

Botrylloides leachi (Savigny, 1816) (3, 4, 5)

Distomus Gaertner, 1774

Distomus variolosus Gaertner, 1774 (3, 4, 5)

Polyandrocarpa Michaelsen, 1904

Polyandrocarpa zorritensis (Van Name, 1931) (3)

Polycarpa Heller, 1877

Polycarpa discoidea Heller, 1877 (4)

Polycarpa gracilis Heller, 1877 (3, 4, 5)

Polycarpa mamillaris (Gaertner, 1774) (4)

Polycarpa pomaria (Savigny, 1816) (3, 4, 5)

Polycarpa rustica (Linnaeus, 1767) (4)

Polycarpa sabulosa Heller, 1877 (4)

Styela Fleming, 1822

Styela adriatica F. Monniot & C. Monniot, 1974 (4)

Styela canopus (Savigny, 1816) (3, 4, 5)

Styela plicata (Lesueur, 1823) (3, 4, 5)

Pyuridae

Heterostigma Ärnäck, 1924

Heterostigma gonochorica F. Monniot, 1965 (5)

Microcosmus Heller, 1877

Microcosmus exasperatus Heller, 1878 (3, 4, 5)

Microcosmus polymorphus Heller, 1877 (3, 4, 5)

Microcosmus sabatieri Roule, 1885 (3, 4, 5)

Microcosmus savignyi C. Monniot, 1962 (3, 4, 5)

Microcosmus vulgaris Heller, 1877 (3, 4, 5)

Pyura Molina, 1782

Pyura dura (Heller, 1877) (3, 4, 5)

Pyura microcosmus (Savigny, 1816) (3, 4, 5)

Pyura squamulosa (Alder, 1863) (3, 4, 5)

Halocynthia Verrill, 1879

Halocynthia papillosa (Linnaeus, 1767) (3, 4, 5)

Molgulidae

Eugyra Alder & Hancock, 1870

Eugyra arenosa (Alder & Hancock, 1848) (4, 5)

Molgula Forbes, 1848

Molgula appendiculata Heller, 1877 (3, 4, 5)

Molgula euprocta Drasche, 1884 (4)

Molgula helleri Drasche, 1884 (4)

Molgula impura Heller, 1877 (3, 4, 5)

Molgula manhattensis (De Kay, 1841) (4)

Molgula occulta Kupffer, 1875 (3, 4, 5)

Molgula rheophila (Pérès, 1956) (5)
Molgula socialis Alder, 1848 (4, 5)

Thaliacea

Pyrosomidae

Pyrosoma Péron, 1804

Pyrosoma atlanticum Péron, 1804 (3, 5)

Salpidae

Salpa Forsskål, 1775

Salpa fusiformis Cuvier, 1804 (3, 4, 5)
Salpa maxima Forsskål, 1775 (3, 4, 5)

Thetys Tilesius, 1802

Thetys vagina Tilesius, 1802 (3)

Iasis Metcalf, 1918

Iasis zonaria (Pallas, 1774) (3)

Pegaea Savigny, 1816

Pegaea confoederata (Forsskål, 1775)
Pegaea confoederata confoederata (Forsskål, 1775) (3)
Pegaea confoederata bicaudata Quoy & Gaimard, 1834 (3)

Cyclosalpa de Blainville, 1816

Cyclosalpa affinis (Chamisso, 1819) (3)
Cyclosalpa pinnata (Forsskål, 1775) (3)
Cyclosalpa polae Sigl, 1912 (3)
Cyclosalpa virgula (Vogt, 1854) (3)

Thalia Forsskal, 1775

Thalia democratica (Forsskål, 1775) (3, 5)
Thalia orientalis Tokioka, 1937 (3, 5)

Ihleia Metcalf, 1918

Ihlea punctata (Forsskål, 1775) (3)

Brooksia Metcalf, 1918

Brooksia rostrata (Traustedt, 1893) (4)

Doliolidae

Doliolum Quoy & Gaimard, 1834

Doliolum denticulatum Quoy & Gaimard, 1834 (3, 5)

Doliolum nationalis Borgert, 1893 (3, 4, 5)

Doliopsis Vogt, 1852

Doliopsis rubescens Vogt, 1852 (3)

Dolioletta Borgert, 1901

Dolioletta gegenbauri Uljanin, 1884 (3, 5)

Dolioletta mirabilis (Korotneff, 1891) (3)

Doliolina Borgert, 1901

Doliolina muelleri (Krohn, 1852)

Doliolina muelleri muelleri (Krohn, 1852) (3, 5)

Doliolina muelleri krohni Borgert, 1894 (3, 5)

Leptocardia

Branchiostomidae

Branchiostoma O.G. Costa, 1834

Branchiostoma lanceolatum (Pallas, 1774) (3, 4, 5)



CHECKLIST DELLE SPECIE DELLA FAUNA ITALIANA

Versione 1.0

PARTE III - VERTEBRATI

Agnatha

Myxiniformes

Myxinidae

Myxine Linnaeus, 1758

Myxine glutinosa Linnaeus, 1758 (4?, 5) (*)

Note

Myxine glutinosa: Presenze possibili nel Canale di Sicilia e a Sud della Sardegna. La presenza in Adriatico richiede conferma.

Petromyzontiformes

Petromyzontidae

Lampetra Bonnaterre, 1788

Lampetra fluviatilis (Linnaeus, 1758) (3, 4?)

Lampetra planeri (Bloch, 1784) (N, S)

Lethenteron Creaser & Hubbs, 1922

Lethenteron zanandreae (Vladykov, 1955) (N) (E) (*)

Petromyzon Linnaeus, 1758

Petromyzon marinus Linnaeus, 1758 (3, 4, 5)

Note

Lethenteron zanandreae: Tradizionalmente assegnata al genere *Lampetra*; l'attribuzione *Lethenteron* è considerata con riserva (Holcik, 1986 p. 238).

Chondrichthyes

Chimaeriformes

Chimaeridae

Chimaera Linnaeus, 1758

Chimaera monstrosa Linnaeus, 1758 (3, 4, 5)

Hexanchiformes

Hexanchidae

Heptranchias Rafinesque, 1810

Heptranchias perlo (Bonnaterre, 1788) (3, 4, 5)

Hexanchus Rafinesque, 1810

Hexanchus griseus (Bonnaterre, 1788) (3, 4, 5)

Hexanchus nakamurai Teng, 1962 (3?, 4?, 5?) (*)

Note

Hexanchus nakamurai: Taniuchi & Tachikawa (1991) pongono in sinonimia vitulus con nakamurai; la presenza in Mediterraneo è documentata da un solo esemplare del Museo della Specola (Firenze).

Lamniformes

Odontaspididae

Carcharias Rafinesque, 1810

Carcharias taurus (Rafinesque, 1810) (3, 4, 5) (*)

Odontaspis Agassiz, 1838

Odontaspis ferox (Risso, 1810) (3, 4, 5)

Note

Carcharias taurus: Il genere *Carcharias* è stato di recente rivalutato (ICZN, 1987).

Lamnidae

Alopias Rafinesque, 1809

Alopias superciliosus (Lowe, 1840) (5)

Alopias vulpinus (Bonnaterre, 1788) (3, 4, 5)

Carcharodon Smith A., 1838

Carcharodon carcharias (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Cetorhinus Blainville 1816

Cetorhinus maximus (Gunnerus, 1765) (3, 4, 5)

Isurus Rafinesque, 1810

Isurus oxyrinchus Rafinesque, 1810 (3, 4, 5)

Lamna Cuvier, 1817

Lamna nasus (Bonnaterre, 1788) (3, 4, 5)

Scyliorhinidae

Galeus Rafinesque, 1810

Galeus melastomus Rafinesque, 1810 (3, 4, 5)

Scyliorhinus Blainville, 1816

Scyliorhinus canicula (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Scyliorhinus stellaris (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Carcharhinidae

Carcharhinus Blainville, 1816

Carcharhinus brachyurus Günther, 1870 (3, 5) (*)

Carcharhinus brevipinna (Müller & Henle, 1839) (3, 4, 5)

Carcharhinus limbatus (Valenciennes, 1841) (3?, 5?) (*)

Carcharhinus melanopterus (Quoy & Gaimard, 1824) (3?, 5?) (*)

Carcharhinus obscurus (Lesueur, 1851) (5)

Carcharhinus plumbeus (Nardo, 1827) (3, 4, 5)

Galeorhinus Blainville, 1816

Galeorhinus galeo (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Mustelus Linck, 1790

Mustelus asterias Cloquet, 1821 (3, 4, 5)
Mustelus mustelus (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)
Mustelus punctulatus Risso, 1826 (3, 4, 5)

Prionace Cantor, 1849

Prionace glauca (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Rhizoprionodon Whitley, 1929

Rhizoprionodon acutus (Rüppell, 1835) (3?, 5) (*)

Note

Carcharhinus brachyurus: La specie non è riportata da Whitehead et al. (1984), ma la presenza è confermata.

Carcharhinus limbatus: Mancano precise indicazioni di cattura.

Carcharhinus melanopterus: Mancano precise indicazioni di cattura.

Rhizoprionodon acutus: Una sola segnalazione certa presso Taranto.

Sphyrnidae

Sphyrna Rafinesque, 1810

Sphyrna lewini (Griffith & Smith, 1834) (3?)
Sphyrna mokarran (Rüppell, 1837) (3)
Sphyrna tudes (Valenciennes, 1822) (3?, 4, 5?) (*)
Sphyrna zygaena (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Note

Sphyrna tudes: Occasionale in Mediterraneo.

Squaliformes

Squalidae

Centrophorus Müller & Henle, 1837

Centrophorus granulosus (Schneider, 1801) (3, 4, 5)
Centrophorus uyato (Rafinesque, 1788) (3, 5) (*)

Centroscymnus Bocage & Capello, 1864

Centroscymnus coelolepis Bocage & Capello, 1864 (3, 5)

Dalatias Rafinesque, 1810

Dalatias licha (Bonnaterre, 1788) (3, 4?, 5)

Echinorhinus Blainville, 1816

Echinorhinus brucus (Bonnaterre, 1788) (3, 4?, 5)

Etmopterus Rafinesque, 1810

Etmopterus spinax (Linnaeus, 1758) (3, 4?, 5)

Oxynotus Rafinesque, 1810

Oxynotus centrina (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Somniosus Lesueur, 1818

Somniosus rostratus (Risso, 1826) (3, 4?, 5)

Squalus (Linnaeus, 1758)

Squalus acanthias Linnaeus, 1758 (3, 4, 5)

Squalus blainvillei (Risso, 1826) (3, 4, 5)

Note

Centrophorus uyato: Per la specie esistono problemi di inquadramento sistematico: potrebbe essere attribuita a specie indeterminata del genere *Squalus* (Munoz-Chapuli & Ramos, 1989) oppure si potrebbe trattare di esemplari giovani di *Centrophorus granulosus*.

Squatinaidae

Squatina (Duméril, 1806)

Squatina aculeata Cuvier, 1829 (3, 4, 5)

Squatina oculata Bonaparte, 1840 (3, 4, 5)

Squatina squatina (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Rajiformes

Torpedinidae

Torpedo Houttuyn, 1764

Torpedo marmorata Risso, 1758 (3, 4, 5)
Torpedo nobiliana Bonaparte, 1835 (3, 4, 5)
Torpedo torpedo (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Rhinobatidae

Rhinobatos Linck, 1790

Rhinobatos cemiculus Geoffroy Saint-Hilaire, 1817 (3, 4?, 5)
Rhinobatos rhinobatos (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Rajidae

Raja Linnaeus, 1758

Raja alba Lacépède, 1803 (3, 4, 5)
Raja asterias Delaroche, 1809 (3, 4, 5)
Raja batis Linnaeus, 1758 (3, 4, 5)
Raja brachyura Lafont, 1873 (3, 5)
Raja circularis Couch, 1838 (3, 4, 5)
Raja clavata Linnaeus, 1758 (3, 4, 5)
Raja fullonica Linnaeus, 1758 (3, 4, 5)
Raja melitensis Clark, 1926 (3, 5) (*)
Raja miraletus Linnaeus, 1758 (3, 4, 5)
Raja montagui Fowler, 1910 (3, 4, 5)
Raja naevus Müller & Henle, 1841 (3, 4, 5)
Raja oxyrhynchus Linnaeus, 1758 (3, 4, 5)
Raja polystigma Regan, 1923 (3, 4, 5)
Raja radula Delaroche, 1809 (3, 4, 5)
Raja rondeleti Bougis, 1959 (3)
Raja undulata Lacépède, 1802 (3, 4, 5)

Note

Raja melitensis: Rara in acque italiane.

Dasyatidae

Dasyatis Rafinesque, 1810

Dasyatis centroura (Mitchill, 1815) (3, 4, 5)

Dasyatis pastinaca (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)
Dasyatis tortonesei Capapé, 1977 (3, 4, 5) (*)
Dasyatis violacea (Bonaparte, 1832) (3, 4, 5)

Gymnura van Hasselt, 1823

Gymnura altavela (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Note

Dasyatis tortonesei: La specie richiede conferma. Secondo Seret & Mc Eachran (1986) sarebbe sinonimo di *D. pastinaca*.

Myliobatididae

Myliobatis Cuvier, 1816

Myliobatis aquila (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Pteromylaeus Garman, 1913

Pteromylaeus bovinus (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817) (3, 4, 5)

Rhinoptera Cuvier, 1829

Rhinoptera marginata (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817) (3?, 4?, 5?) (*)

Note

Rhinoptera marginata: E' dubbia la presenza nelle acque italiane.

Mobulidae

Mobula Rafinesque, 1810

Mobula mobular (Bonnaterre, 1788) (3, 4, 5)

Osteichthyes

Acipenseriformes

Acipenseridae

***Acipenser* Linnaeus, 1758**

Acipenser naccarii Bonaparte, 1836 (4) (E) (*)

Acipenser sturio Linnaeus, 1758 (3, 4, 5)

Acipenser transmontanus Richardson, 1836 (N) (*)

***Huso* Brandt, 1869**

Huso huso (Linnaeus, 1758) (4) (M) (*)

Note

Acipenser naccarii: Endemica nell'areale dell'Alto Adriatico.

Acipenser transmontanus: Introdotta dall'America settentrionale negli anni '80 per scopo d'allevamento.

Huso huso: Rara in Adriatico e nell'areale Padano-Veneto; forse estinta nell'areale in questione.

Notacanthiformes

Halosauridae

***Halosaurus* Johnson, 1863**

Halosaurus oweni Johnson, 1863 (3)

Notacanthidae

***Notacanthus* Bloch, 1788**

Notacanthus bonapartei Risso, 1840 (3, 5)

***Polyacanthonotus* Bleeker, 1874**

Polyacanthonotus rissoanus (Filippi & Verany, 1859) (3)

Anguilliformes

Anguillidae

***Anguilla* (Shaw, 1803)**

Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Xenocoagridae

Chlopsis Rafinesque, 1810

Chlopsis bicolor Rafinesque, 1810 (3, 4?, 5)

Muraenidae

Anarchias Jordan & Starks, 1906

Anarchias euryurus Lea, 1913 (3)

Gymnothorax Bloch, 1795

Gymnothorax unicolor (Delaroche, 1809) (3, 4, 5)

Muraena Linnaeus, 1758

Muraena helena Linnaeus, 1758 (3, 4, 5)

Nemichthyidae

Nemichthys Richardson, 1848

Nemichthys scolopaceus Richardson, 1848 (3)

Synaphobranchidae

Dysomma Alcock, 1889

Dysomma brevirostre (Facciolà, 1887) (3)

Ophichthyidae

Apterichthus Duméril, 1806

Apterichthus caecus (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Apterichthus anguiformis (Peters, 1877) (3, 4?, 5)

Dalophis Rafinesque, 1810

Dalophis imberbis (Delaroche, 1809) (3, 4, 5)

Echelus Rafinesque, 1810

Echelus myrus (Linnaeus, 1758) (3, 4?, 5)

Ophichthus Ahl, 1789

Ophichthus ophis Linnaeus, 1758 (3?) (*)

Ophichthus rufus (Rafinesque, 1810) (3, 4?, 5)

Ophisurus Lacépède, 1800

Ophisurus serpens (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Note

Ophichthus ophis: La segnalazione a Nizza richiede conferma.

Nettastomatidae

Facciolella Whitley, 1938

Facciolella oxyrhyncha (Bellotti, 1883) (3)

Nettastoma Rafinesque, 1810

Nettastoma melanurum Rafinesque, 1810 (3, 5)

Congridae

Ariosoma Swainson, 1838

Ariosoma balearicum (Delaroche, 1809) (3, 4, 5)

Conger Oken, 1817

Conger conger (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Cynoponticus Costa, 1846

Cynoponticus ferox Costa, 1846 (3)

Gnathophis Kaup, 1860

Gnathophis mystax (Delaroche, 1809) (3, 4, 5)

Clupeiformes

Clupeidae

Alosa Linck, 1790

Alosa fallax (Lacépède, 1803) (3, 4) (*)

Alosa alosa (Linnaeus, 1758) (3) (*)

Sardina Antipa, 1906

Sardina pilchardus (Walbaum, 1792) (3, 4, 5) (*)

Sardinella Valenciennes, 1847

Sardinella aurita Valenciennes, 1847 (3, 4, 5)

Sardinella maderensis (Lowe, 1841) (3, 5) (*)

Sprattus Girgensohn 1846

Sprattus sprattus (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5) (*)

Note

Alosa fallax: Tradizionalmente distinte in Italia due subspp. di validità dubbia: f. lacustris Fatio, 1870, stanziata nei laghi subalpini e introdotta nei laghi dell'Italia centrale, e f. nilotica (Geoffroy Saint-Hilaire, 1808), migratrice.

Alosa alosa: La presenza in Mar Ligure e Sardegna richiede conferma.

Sardina pilchardus: In acque italiane sarebbe presente la subsp. p. sardina (Risso, 1826), di dubbia validità.

Sardinella maderensis: Solo a Sud della Sardegna e della Sicilia.

Sprattus sprattus: In acque italiane sarebbe presente la subsp. s. phalericus (Risso, 1826), di dubbia validità.

Engraulididae

Engraulis Cuvier, 1817

Engraulis encrasicolus (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Cypriniformes

Cyprinidae

Abramis Cuvier, 1817

Abramis brama (Linnaeus, 1758) (N, S) (*)

Alburnus Heckel, 1843

Alburnus albidus (Costa, 1838) (S) (E)

Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) (*)

Alburnus alburnus alborella (De Filippi, 1844) (N, S) (E)

Barbus Cuvier, 1817

Barbus meridionalis Risso, 1826 (N, S)

Barbus plebejus (Bonaparte, 1839) (N, S)

Carassius Jarocki, 1822

Carassius auratus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si) (*)

Carassius carassius (Linnaeus, 1758) (N, S, Si) (*)

Chondrostoma Agassiz, 1835

Chondrostoma genei (Bonaparte, 1839) (N, S) (E)

Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) (N) (*)

Chondrostoma soetta Bonaparte, 1840 (N, S) (E) (*)

Ctenopharyngodon Steindachner, 1866

Ctenopharyngodon idellus (Valenciennes, 1844) (N) (*)

Cyprinus Linnaeus, 1758

Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa) (*)

Gobio Cuvier, 1817

Gobio gobio (Linnaeus, 1758) (N)

Hypophthalmichthys Bleeker, 1860

Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844) (N) (*)

Hypophthalmichthys nobilis (Richardson, 1836) (N) (*)

Leuciscus Cuvier, 1817

Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa) (*)

Leuciscus lapacinus Stefani, Serra, Loffredo & Fossa, 1987 (N) (E) (*)
Leuciscus lucumonis Bianco, 1982 (S) (E) (*)
Leuciscus souffia Risso, 1826 (N, S)

Pachychilon Steindachner, 1866

Pachychilon pictum (Heckel & Kner, 1858) (S) (*)

Phoxinus Agassiz, 1835

Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) (N)

Pseudorasbora Bleeker, 1860

Pseudorasbora parva (Schlegel, 1842) (N) (*)

Rhodeus Agassiz, 1835

Rhodeus sericeus (Pallas, 1776) (N) (*)

Rutilus Rafinesque, 1820

Rutilus erythrophthalmus Zerunian, 1982 (N, S) (E) (*)
Rutilus pigus (Lacépède, 1804) (N)
Rutilus rubilio (Bonaparte, 1837) (N, S, Si) (E) (*)
Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) (N, S) (*)

Scardinius Bonaparte, 1837

Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa) (*)

Tinca Cuvier, 1817)

Tinca tinca (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa) (*)

Note

Abramis brama: Introdotta dall'Europa centrale negli anni '70-'80; acclimatata nel Lago di Fimon e altrove.

Alburnus alburnus: Dall'areale Padano-Veneto introdotta e acclimatata nell'Italia centrale e meridionale.

Carassius auratus: Introdotta in epoca non precisabile, prima del 1850, e molto diffusa in tempi recenti.

Carassius carassius: Introdotta in epoca non precisabile, prima del 1850, e molto diffusa in tempi recenti.

Chondrostoma nasus: Segnalata nell'Isonzo a partire dal 1991.

Chondrostoma soetta: Introdotta dall'areale Padano-Veneto nell'Arno a partire dagli anni '80.

Ctenopharyngodon idellus: Originaria del bacino dell'Amur; introdotta dall'Europa orientale

negli anni '80; non acclimatata.

Cyprinus carpio: Introdotta dall'Europa orientale da molti secoli nel Nord e nel Centro e di recente nel Sud e nelle isole.

Hypophthalmichthys molitrix: Originaria del bacino dell'Amur; introdotta dall'Europa orientale negli anni '80; non acclimatata.

Hypophthalmichthys nobilis: Originaria del bacino dell'Amur; introdotta dall'Europa orientale negli anni '80; non acclimatata.

Leuciscus cephalus: Introdotta in Sicilia e Sardegna in anni recenti.

Leuciscus lapacinus: La validità della specie, endemica nel Lago di Santa Croce (Belluno), richiede conferma.

Leuciscus lucumonis: La validità della specie, endemica nell'Italia centrale, richiede conferma.

Pachychilon pictum: Originaria della Penisola Balcanica e segnalata nel 1991 come acclimatata nel Serchio.

Pseudorasbora parva: Originaria dell'Asia orientale; introdotta dall'Europa orientale nel bacino del Po e acclimatata a partire dalla fine degli anni '80.

Rhodeus sericeus: Introdotta dall'Europa orientale e acclimatata dalla fine degli anni '80 nel bacino dell'Adige.

Rutilus erythrophthalmus: Endemica nell'areale Padano-Veneto; introdotta e acclimatata in Italia centrale in anni recenti.

Rutilus rubilio: Endemica in Italia centrale; introdotta e acclimatata in anni recenti in Romagna e in Sicilia.

Rutilus rutilus: Introdotta in anni recenti nell'areale Padano-Veneto e in Toscana; acclimatazione dubbia.

Scardinius erythrophthalmus: Introdotta e acclimatata nelle isole in anni recenti.

Tinca tinca: Introdotta e acclimatata nelle isole in anni recenti.

Homalopteridae

Orthrias Jordan & Fowler, 1903

Orthrias barbatulus (Linnaeus, 1758) (N)

Cobitidae

Cobitis Linnaeus, 1758

Cobitis taenia Linnaeus 1758 (N, S, Si, Sa) (*)

Sabanejewia Vladykov, 1929

Sabanejewia larvata (De Filippi, 1859) (N, S) (E) (*)

Note

Cobitis taenia: Introdotta e acclimatata in anni recenti dall'Italia centro-settentrionale al Sud e

nelle isole.

Sabanejewia larvata: Endemica nell'areale Padano-Veneto; introdotta e acclimatata in Italia centrale.

Siluriformes

Ictaluridae

Ictalurus Rafinesque, 1820

Ictalurus melas (Rafinesque, 1820) (N, S, Si, Sa) (*)

Ictalurus nebulosus (Lesueur, 1819) (N) (*)

Ictalurus punctatus (Rafinesque, 1818) (N) (*)

Note

Ictalurus melas: Originaria del Nord America; introdotta e acclimatata nel Nord Italia agli inizi del secolo e successivamente altrove.

Ictalurus nebulosus: Originaria del Nord America; recentemente segnalata in acque del Piemonte.

Ictalurus punctatus: Originaria del Nord America; segnalata a partire dalla fine degli anni '80 nel Po.

Siluridae

Silurus Linnaeus, 1758

Silurus glanis Linnaeus, 1758 (N, S) (*)

Note

Silurus glanis: Introdotta dall'Europa centro-orientale a partire dagli anni '70; acclimatato in Po e successivamente in altre acque del Nord e del Centro.

Salmoniformes

Esocidae

Esox Linnaeus, 1758

Esox lucius Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa) (*)

Note

Esox lucius: Introdotta e acclimatata in anni recenti nelle isole.

Argentinidae

Argentina Linnaeus, 1758

Argentina sphyraena Linnaeus, 1758 (3, 4, 5)

Glossanodon Guichenot, 1867

Glossanodon leioglossus (Valenciennes, 1848) (3, 5)

Bathylagidae

Microstoma Cuvier, 1817

Microstoma microstoma (Risso, 1810) (3)

Nansenia Jordan & Evermann, 1896

Nansenia oblita (Facciola, 1887) (3)

Alepocephalidae

Alepocephalus Risso, 1820

Alepocephalus rostratus Risso, 1820 (3)

Salmonidae

Coregonus Linnaeus, 1758

Coregonus lavaretus (Linnaeus, 1758) (N, S) (*)

Coregonus oxyrhynchus (Linnaeus, 1758) (N) (*)

Oncorhynchus Suckley, 1862

Oncorhynchus kisutch (Walbaum, 1792) (N) (*)

Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) (N, S, Si, Sa) (*)

Salmo Linnaeus, 1758

Salmo carpio Linnaeus, 1758 (N) (*)

Salmo fibreni Zerunian & Gandolfi, 1989 (S) (E, M) (*)
Salmo [trutta] macrostigma Duméril, 1858 (S, Si, Sa) (M) (*)
Salmo [trutta] marmoratus (Cuvier, 1817) (N) (E) (*)
Salmo [trutta] trutta Linnaeus, 1758 (3, 4, 5) (*)

Salvelinus Richardson, 1836

Salvelinus alpinus (Linnaeus, 1758) (N)
Salvelinus fontinalis (Mitchill, 1815) (N) (*)

Thymallus Cuvier, 1829

Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758) (N) (*)

Note

Coregonus lavaretus: Introdotta dalla Svizzera; diffusa e acclimatata nei laghi prealpini nel secolo scorso e più di recente nei laghi dell'Italia centrale.
Coregonus oxyrhynchus: Introdotta dalla Svizzera; acclimatata alla fine degli anni '60 nel Lago Maggiore e successivamente nel Lago di Como.
Oncorhynchus kisutch: Introdotta dal Nord America nel Lago di Garda negli anni '60; probabilmente non acclimatata; presente in allevamenti.
Oncorhynchus mykiss: Introdotta dal Nord America a partire dagli ultimi decenni del secolo scorso; diffusa ovunque per scopi di pesca sportiva; non acclimatata, è attualmente rara in ambienti naturali, ma è molto diffusa negli allevamenti.
Salmo carpio: Endemica nel Lago di Garda; in notevole contrazione, richiede adeguata protezione.
Salmo fibreni: Endemica nel Lago di Posta Fibreno; richiede urgenti azioni di protezione.
Salmo [trutta] macrostigma: Ridotta a piccole popolazioni frammentate e spesso ibridate con la forma nominale; richiede azioni di recupero e protezione.
Salmo [trutta] marmoratus: Endemica nell'areale Padano-Veneto e in Slovenia; le popolazioni sono spesso ibridate con la forma nominale.
Salmo [trutta] trutta: Probabilmente indigena solo nell'areale Padano-Veneto e in Italia centrale sul versante Nord-Adriatico; altrove introdotta in anni recenti; le popolazioni italiane sono fortemente ibridate con ceppi d'allevamento di origine nordeuropea.
Salvelinus fontinalis: Introdotta dal Nord America a partire dai primi decenni di questo secolo; acclimatata nell'areale Padano-Veneto.
Thymallus thymallus: Indigena negli affluenti alpini del Po e nell'areale Veneto; introdotta e acclimatata in acque dei due versanti appenninici; le popolazioni italiane sono spesso ibridate con ceppi d'allevamento di origine nordeuropea.

Stomiiformes

Gonostomatidae

Cyclothone Goode & Bean, 1883

Cyclothone braueri Jespersen & Tåning, 1926 (3, 4, 5)
Cyclothone pygmaea Jespersen & Tåning, 1926 (3, 4?, 5)

Gonostoma Rafinesque, 1810

Gonostoma denudatum Rafinesque, 1810 (3, 4?, 5)

Sternoptychidae

Argyropelecus Cocco, 1829

Argyropelecus hemigymnus Cocco, 1829 (3, 4, 5)

Maurolicus Cocco, 1838

Maurolicus muelleri (Gmelin, 1789) (3, 4, 5)

Valencienellus Jordan & Evermann, 1896

Valencienellus tripunctulatus (Esmark, 1871) (3, 4?) (*)

Note

Valencienellus tripunctulatus: Rara in Mediterraneo.

Photichthyidae

Ichthyococcus Bonaparte, 1840

Ichthyococcus ovatus Cocco, 1838 (3, 4, 5)

Vinciguerrria (Jordan & Williams, 1895)

Vinciguerrria attenuata (Cocco, 1838) (3, 4?, 5)

Vinciguerrria poweriae (Cocco, 1838) (3, 4?, 5)

Chauliodontidae

Chauliodus Schneider, 1801

Chauliodus sloani Schneider, 1801 (3, 4, 5)

Stomiidae

Stomias Cuvier, 1817

Stomias boa (Risso, 1810)

Stomias boa boa (Risso, 1810) (3, 4, 5)

Astronesthidae

Borostomias Regan, 1908

Borostomias antarcticus (Lönnberg, 1905) (3)

Melanostomiidae

Bathophilus Giglioli, 1884

Bathophilus nigerrimus Giglioli, 1884 (3, 5)

Aulopiformes

Aulopodidae

Aulopus Cloquet, 1816

Aulopus filamentosus (Boch, 1792) (3, 5)

Chlorophthalmidae

Bathypterois Günther, 1878

Bathypterois dubius Vaillant, 1888 (3) (*)

Bathypterois mediterraneus Bauchot, 1962 (3, 5)

Chlorophthalmus Bonaparte, 1840

Chlorophthalmus agassizii Bonaparte, 1840 (3, 4, 5)

Note

Bathypterois dubius: Un'unica segnalazione in acque della Sicilia.

Synodontidae

Synodus Scopoli 1777

Synodus saurus (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Paralepididae

Lestidiops Hubbs, 1916

Lestidiops jayakari (Boulenger, 1889) (3, 5) (*)

Lestidiops sphyrenoides (Risso, 1820) (3, 5) (*)

Notolepis Dollo, 1908

Notolepis rissoi (Bonaparte, 1840) (3, 5) (*)

Paralepis Cuvier, 1817

Paralepis coregonoides Risso, 1820

Paralepis coregonoides coregonoides (Risso, 1820) (3, 5)

Paralepis speciosa Bellotti, 1878 (3, 5?)

Sudis Rafinesque, 1810

Sudis hyalina Rafinesque, 1810 (3, 5)

Note

Lestidiops jayakari: In Italia sarebbe presente la subsp. j. pseudosphyraenoides (Ege, 1918), di dubbia validità.

Lestidiops sphyrenoides: La specie è di dubbia validità.

Notolepis rissoi: La specie dovrebbe essere assegnata ad altro genere non descritto.

Evermannellidae

Evermannella Fowler, 1901

Evermannella balbo (Risso, 1820) (3, 5)

Alepisauridae

Alepisaurus Lowe, 1833

Alepisaurus ferox Lowe, 1833 (3)

Myctophiformes

Myctophidae

Benthosema Goode & Bean, 1896

Benthosema glaciale (Reinhardt, 1837) (3, 5)

Ceratoscopelus Günther, 1864

Ceratoscopelus maderensis (Lowe, 1839) (3, 5)

Diaphus Eigenmann & Eigenmann, 1890

Diaphus holti Tåning, 1918 (3, 5)

Diaphus metopoclampus (Cocco, 1829) (3)

Diaphus rafinesquei (Cocco, 1838) (3, 4, 5)

Electrona Goode & Bean, 1896

Electrona rissoi (Cocco, 1829) (3, 5)

Gonichthys Gistel, 1850

Gonichthys coccoi (Cocco, 1829) (5)

Hygophum Bolin, 1939

Hygophum benoiti (Cocco, 1838) (3, 5)

Hygophum hygomii (Lütken, 1892) (3, 5)

Lampanyctus Bonaparte, 1840

Lampanyctus crocodilus (Risso, 1810) (3, 4, 5)

Lampanyctus pusillus (Johnson, 1890) (3, 5)

Lobianchia Gatti, 1903

Lobianchia dofleini (Zugmayer, 1911) (3, 4, 5)

Lobianchia gemellarii (Cocco, 1838) (3)

Myctophum Rafinesque, 1810

Myctophum punctatum Rafinesque, 1810 (3, 4, 5)

Notoscopelus Günther, 1864

Notoscopelus bolini Nafpaktitis, 1975 (3, 5)

Notoscopelus elongatus (Costa, 1844) (3)

Symbolophorus Bolin & Wisner, 1959

Symbolophorus veranyi (Moreau, 1888) (3, 5)

Gadiformes

Moridae

Eretmophorus Giglioli, 1889

Eretmophorus kleinenbergi Giglioli, 1889 (3)

Gadella Lowe, 1843

Gadella maraldi (Risso, 1810) (3, 4, 5)

Lepidion Swainson, 1838

Lepidion lepidion (Risso, 1810) (3)

Mora Risso, 1826

Mora moro (Risso, 1810) (3, 5)

Physiculus Kaup, 1858

Physiculus dalwigki Kaup, 1858 (3, 5?)

Rhynchogadus Tortonese, 1948

Rhynchogadus hepaticus (Facciola, 1884) (3)

Gadidae

Antonogadus Wheeler, 1969

Antonogadus megalokynodon (Kolombatovic, 1894) (3, 4, 5)

Gadiculus Guichenot, 1850

Gadiculus argenteus Guichenot, 1850

Gadiculus argenteus argenteus Guichenot, 1850 (3, 4, 5)

Gaidropsarus Rafinesque, 1810

Gaidropsarus mediterraneus (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Gaidropsarus vulgaris (Cloquet, 1824) (3, 4, 5)

Lota Cuvier, 1929

Lota lota (Linnaeus, 1758) (N)

Merlangius Geoffroy E. L., 1767

Merlangius merlangus (Linnaeus, 1758) (*)

Merlangius merlangus merlangus (Linnaeus, 1758) (3?)

Merlangius merlangus euxinus (Nordmann, 1840) (4)

Micromesistius Gill, 1864

Micromesistius poutassou (Risso, 1826) (3, 4, 5)

Molva Lesueur, 1819

Molva dipterygia (Pennant, 1784)

Molva dipterygia macrophthalma (Rafinesque, 1810) (3, 4, 5)

Molva molva (Linnaeus, 1758) (3)

Phycis Artedi, 1792

Phycis blennioides (Brünnich, 1768) (3, 4, 5)

Phycis phycis (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Trisopterus Rafinesque, 1814

Trisopterus luscus (Linnaeus, 1758) (3, 4?, 5)

Trisopterus minutus (Linnaeus, 1758)

Trisopterus minutus capelanus (Lacépède, 1800) (3, 4, 5)

Note

Merlangius merlangus: La presenza in Mediterraneo della subsp. nominale richiede conferma.

Merlucciidae

Merluccius Rafinesque, 1810

Merluccius merluccius (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Macrouridae

Chalinura Goode & Bean, 1883

Chalinura mediterranea Giglioli, 1893 (3)

Coelorhynchus Giorna, 1809

Coelorhynchus coelorhynchus (Risso, 1810)

Coelorhynchus coelorhynchus coelorhynchus (Risso, 1810) (3, 4, 5)

Coelorhynchus occa (Goode & Bean, 1886) (3)

Coryphaenoides Gunnerus, 1765

Coryphaenoides guentheri (Vaillant, 1888) (3, 5)

Hymenocephalus Giglioli, 1884

Hymenocephalus italicus Giglioli, 1884 (3, 5)

Nezumia Jordan, 1904

Nezumia aequalis (Günther, 1878) (3, 5)

Nezumia sclerorhynchus (Valenciennes, 1838) (3, 5)

Trachyrhynchus Giorna, 1809

Trachyrhynchus trachyrhynchus (Risso, 1810) (3, 5)

Ophidiiformes

Ophidiidae

Benthocometes Goode & Bean, 1886

Benthocometes robustus (Goode & Bean, 1886) (3, 5) (*)

Ophidion Linnaeus, 1758

Ophidion barbatum Linnaeus, 1758 (3, 4, 5)

Ophidion rochei Müller, 1845 (3, 4, 5)

Parophidion Tortonese, 1954

Parophidion vassali (Risso, 1810) (3, 4, 5)

Note

Benthocometes robustus: Rara in Mediterraneo.

Bythitidae

Bellottia Giglioli, 1883

Bellottia apoda Giglioli, 1883 (3)

Cataetyx Günther, 1887

Cataetyx alleni (Byrne, 1906) (3)

Cataetyx laticeps Koefoed, 1927 (3)

Oligopus Risso, 1810

Oligopus ater Risso, 1810 (3, 4, 5)

Carapidae

Carapus Rafinesque, 1810

Carapus acus (Brünnich, 1768) (3, 4, 5)

Echiodon Thompson, 1837

Echiodon dentatus (Cuvier, 1829) (3, 4, 5)

Batrachoidiformes

Batrachoididae

Halobatrachus Ogilby, 1908

Halobatrachus didactylus (Schneider, 1801) (3, 4, 5)

Lophiiformes

Lophiidae

Lophius Linnaeus, 1758

Lophius budegassa Spinola, 1807 (3, 4, 5)

Lophius piscatorius Linnaeus, 1758 (3, 4, 5)

Gobiesociformes

Gobiesocidae

Apletodon Briggs, 1955

Apletodon dentatus (Facciola, 1887)

Apletodon dentatus dentatus (Facciola, 1887) (3)

Diplecogaster Fraser-Brunner, 1938

Diplecogaster bimaculata (Bonnaterre, 1788)

Diplecogaster bimaculata bimaculata (Bonnaterre, 1788) (3, 4, 5)

Gouania Nardo, 1833

Gouania wildenowi (Risso, 1810) (3, 4, 5)

Lepadogaster Goüan, 1770

Lepadogaster candollei Risso, 1810 (3, 4, 5)

Lepadogaster lepadogaster (Bonnaterre, 1788)

Lepadogaster lepadogaster lepadogaster (Bonnaterre, 1788) (3, 4, 5)

Opeatogenys Briggs, 1955

Opeatogenys gracilis (Canestrini, 1864) (3, 4, 5)

Cyprinodontiformes

Exocoetidae

Cheilopogon Lowe, 1840

Cheilopogon heterurus (Rafinesque, 1810)

Cheilopogon heterurus heterurus (Rafinesque, 1810) (3, 4, 5)

Exocoetus Linnaeus, 1758

Exocoetus obtusirostris Günther, 1866 (3)
Exocoetus volitans Linnaeus, 1758 (3)

Hirundichthys Breder, 1928

Hirundichthys rondeleti (Valenciennes, 1846) (3, 4, 5)

Belonidae

Belone Cuvier, 1816

Belone belone (Linnaeus, 1758)
Belone belone gracilis Lowe, 1839 (3, 4, 5)
Belone svetovidovi Collette & Parin, 1970 (3, 5)

Tylosurus Cocco, 1833

Tylosurus acus (Lacépède, 1803)
Tylosurus acus imperialis (Rafinesque, 1810) (3, 5)

Scomberesocidae

Scomberesox Lacépède, 1803

Scomberesox saurus (Walbaum, 1792)
Scomberesox saurus saurus (Walbaum, 1792) (3, 4?, 5)

Cyprinodontidae

Aphanius Nardo, 1827

Aphanius fasciatus Nardo, 1827 (3, 4, 5)

Poeciliidae

Gambusia Poey, 1854

Gambusia holbrooki Girard, 1859 (N, S, Si, Sa) (*)

Note

Gambusia holbrooki: Introdotta dal Nord America per la lotta antianofelica negli anni '30 e acclimatata.

Atheriniformes

Atherinidae

Atherina Linnaeus, 1758

Atherina boyeri Risso 1810 (3, 4, 5)

Atherina hepsetus Linnaeus, 1758 (3, 4, 5)

Odonthestes (Evermann & Kendall, 1906)

Odonthestes bonariensis (Valenciennes 1835) (S) (*)

Note

Odonthestes bonariensis: Introdotta dal Sud America negli anni '60 e acclimatata nel Lago di Nemi.

Lampriformes

Lampridae

Lampris Retzius, 1799

Lampris guttatus (Brünnich, 1788) (3, 5)

Lophotidae

Lophotus Giorna, 1809

Lophotus lacepedei Giorna, 1809 (3, 5)

Trachypteridae

Trachypterus Goüan, 1770

Trachypterus trachypterus (Gmelin, 1789) (3, 5)

Zu Walters & Fitch, 1960

Zu cristatus (Bonelli, 1820) (3, 5)

Regalecidae

Regalecus Ascanius, 1772

Regalecus glesne Ascanius, 1772 (3, 5)

Beryciformes

Trachichthyidae

Hoplostethus Cuvier, 1829

Hoplostethus mediterraneus Cuvier, 1829 (3, 4, 5)

Berycidae

Beryx Cuvier, 1829

Beryx decadactylus Cuvier, 1829 (3)

Zeiformes

Zeidae

Zeus Linnaeus, 1758

Zeus faber Linnaeus, 1758 (3, 4, 5)

Caproidae

Capros Lacépède, 1802

Capros aper (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Gasterosteiformes

Gasterosteidae

Gasterosteus Linnaeus, 1758

Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758 (N, S, Sa)

Syngnathiformes

Macrorhamphosidae

Macrorhamphosus Lacépède, 1803

Macrorhamphosus scolopax (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Syngnathidae

Hippocampus Rafinesque, 1810

Hippocampus hippocampus (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Hippocampus ramulosus Leach, 1814 (3, 4, 5)

Nerophis Rafinesque, 1810

Nerophis maculatus Rafinesque, 1810 (3, 4, 5?)

Nerophis ophidion (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Syngnathus Linnaeus, 1758

Syngnathus abaster Risso, 1826 (3, 4, 5)

Syngnathus acus Linnaeus, 1758 (3, 4, 5)

Syngnathus phlegon Risso, 1826 (3, 5)

Syngnathus taenionotus Canestrini, 1871 (4)

Syngnathus tenuirostris Rathke, 1837 (3, 4)

Syngnathus typhle Linnaeus, 1758 (3, 4, 5)

Dactylopteriformes

Dactylopteridae

Dactylopterus Lacépède, 1801

Dactylopterus volitans (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Scorpaeniformes

Scorpaenidae

Helicolenus Goode & Bean, 1896

Helicolenus dactylopterus (Delaroche, 1809)

Helicolenus dactylopterus dactylopterus (Delaroche, 1809) (3, 4, 5)

Pontinus Poey, 1860

Pontinus kuhli (Bowdich, 1825) (5) (*)

Scorpaena Linnaeus, 1758

Scorpaena elongata Cadenat, 1943 (3, 4?, 5)

Scorpaena loppei Cadenat, 1943 (3, 5?)

Scorpaena maderensis Valenciennes, 1833 (3, 5)

Scorpaena notata Rafinesque, 1810 (3, 4, 5)

Scorpaena porcus Linnaeus, 1758 (3, 4, 5)

Scorpaena scrofa Linnaeus, 1758 (3, 4, 5)

Scorpaenodes Bleeker, 1857

Scorpaenodes arenai Torchio, 1962 (3) (*)

Note

Pontinus kuhli: Rara in Mediterraneo; unica segnalazione al largo della Sicilia.

Scorpaenodes arenai: Segnalata solo nello Stretto di Messina

Triglidae

Aspitrigla Fowler, 1925

Aspitrigla cuculus (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Aspitrigla obscura (Linnaeus, 1764) (3, 4, 5)

Eutrigla Fraser-Brunner, 1938

Eutrigla gurnardus (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Lepidotrigla Günther, 1860

Lepidotrigla cavillone (Lacépède, 1801) (3, 4, 5)

Lepidotrigla dieuzeidei Audouin, 1971 (3, 4, 5)

Peristedion Lacépède, 1801

Peristedion cataphractum (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Trigla Linnaeus, 1758

Trigla lucerna Linnaeus, 1758 (3, 4, 5)

Trigla lyra Linnaeus, 1758 (3, 4, 5)

Trigloporus Smith J. L. B., 1934

Trigloporus lastoviza (Brünnich, 1768) (3, 4, 5)

Cottidae

Cottus Linnaeus, 1758

Cottus gobio Linnaeus, 1758 (N, S)

Taurulus Gratzianov, 1907

Taurulus bubalis (Euphrasen, 1796) (3) (*)

Note

Taurulus bubalis: Limitatamente alla costa occidentale della Liguria.

Cyclopteridae

Paraliparis Collett, 1869

Paraliparis leptochirus (Tortonese, 1960) (3)

Perciformes

Percichthyidae

Dicentrarchus Gill, 1860

Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Dicentrarchus punctatus (Bloch, 1792) (3, 4?, 5)

Synagrops Günther, 1887

Synagrops japonicus Steindachner & Doderlein, 1884 (3) (*)

Note

Synagrops japonicus: Un unico esemplare segnalato nel Golfo di Genova.

Serranidae

Anthias Bloch, 1792

Anthias anthias (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Callanthias Lowe, 1839

Callanthias ruber (Rafinesque, 1810) (3, 4, 5)

Epinephelus Bloch, 1793

Epinephelus aeneus (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817) (3, 5)

Epinephelus alexandrinus (Valenciennes, 1828) (3, 5)

Epinephelus caninus (Valenciennes, 1843) (5)

Epinephelus guaza (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Mycteroperca Gill, 1862

Mycteroperca rubra (Bloch, 1793) (3, 4, 5)

Polyprion Oken, 1817

Polyprion americanus (Schneider, 1801) (3, 4, 5)

Serranus Cuvier, 1817

Serranus cabrilla (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Serranus hepatus (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Serranus scriba (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Centrarchidae

Lepomis Rafinesque, 1819

Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758) (N, S) (*)

Micropterus (Lacépède, 1802)

Micropterus salmoides Lacépède, 1802 (N, S) (*)

Note

Lepomis gibbosus: Introdotta dal Nord America e acclimatata agli inizi di questo secolo.

Micropterus salmoides: Introdotta dal Nord America e acclimatata a partire dagli anni '30.

Percidae

Gymnocephalus Bloch, 1793

Gymnocephalus cernuus Linnaeus, 1758 (N) (*)

Perca Linnaeus, 1758

Perca fluviatilis Linnaeus, 1758 (N, S)

Stizostedion Linnaeus, 1758

Stizostedion lucioperca (Linnaeus, 1758) (N, S) (*)

Note

Gymnocephalus cernuus: Introdotta dall'Europa orientale negli anni '80; segnalata in Veneto; acclimatazione dubbia.

Stizostedion lucioperca: Prime introduzioni dall'Europa centrale e orientale, con scarso successo, alla fine del secolo scorso; recentemente introdotta e acclimatata nei principali bacini dell'Italia continentale.

Apogonidae

Apogon Lacépède, 1801

Apogon imberbis (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Epigonus Rafinesque, 1810

Epigonus constanciae (Giglioli, 1880) (3, 5)

Epigonus denticulatus Dieuzeide, 1950 (3, 5)

Epigonus telescopus (Risso, 1810) (3, 4?, 5)

Microichthys Rüppell, 1852

Microichthys coccoi Rüppell, 1852 (3?, 5)

Microichthys sanzoi Spartà, 1950 (5)

Priacanthidae

Priacanthus Oken, 1817

Priacanthus arenatus Cuvier, 1829 (3) (*)

Note

Priacanthus arenatus: Unica segnalazione nel Golfo di Cagliari.

Pomatomidae

Pomatomus Lacépède, 1802

Pomatomus saltator (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Echeneididae

Echeneis Linnaeus, 1758

Echeneis naucrates Linnaeus, 1758 (3, 4, 5)

Remora Gill, 1863

Remora australis (Bennett, 1840) (3) (*)

Remora brachyptera (Lowe, 1839) (3, 5)

Remora osteochir (Cuvier, 1829) (3, 4, 5)

Remora remora (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Note

Remora australis: Presenza dubbia in Mediterraneo.

Carangidae

Alectis Rafinesque, 1815

Alectis alexandrinus (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817) (5) (*)

Campogramma Regan, 1903

Campogramma glaycos (Lacépède, 1801) (3, 4, 5)

Caranx Lacépède, 1801

Caranx crysos (Mitchill, 1815) (3, 5)
Caranx hippos (Linnaeus, 1766) (3, 5)
Caranx rhonchus Geoffroy Saint-Hilaire, 1817 (5)

Elagatis Bennett, 1840

Elagatis bipinnulata (Quoy & Gaimard, 1824) (3?) (*)

Lichia Cuvier, 1817

Lichia amia (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Naucrates Rafinesque, 1810

Naucrates ductor (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Pseudocaranx Bleeker, 1863

Pseudocaranx dentex (Schneider, 1801) (3, 5)

Seriola Cuvier, 1817

Seriola dumerili (Risso, 1810) (3, 4, 5)

Trachinotus Lacépède, 1801

Trachinotus ovatus (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Trachurus Rafinesque, 1810

Trachurus mediterraneus (Steindachner, 1868) (3, 4, 5)
Trachurus picturatus (Bowdich, 1825) (3)
Trachurus trachurus (Linnaeus, 1758)

Note

Alectis alexandrinus: Nel Canale di Sicilia.

Elagatis bipinnulata: Tropicale; alcuni esemplari segnalati al largo di Genova nel secolo scorso.

Coryphaenidae

Coryphaena Linnaeus, 1758

Coryphaena equiselis Linnaeus, 1758 (3)
Coryphaena hippurus Linnaeus, 1758 (3, 4, 5)

Leiognathidae

Leiognathus Lacépède, 1803

Leiognathus klunzingeri (Steindachner, 1898) (5) (*)

Note

Leiognathus klunzingeri: Segnalata a Lampedusa.

Bramidae

Brama Schneider, 1801

Brama brama (Bonnaterre, 1788) (3, 5)

Lobotidae

Lobotes Cuvier, 1829

Lobotes surinamensis (Bloch, 1790) (3)

Haemulidae

Pomadasys Lacépède, 1802

Pomadasys stridens (Forsskål, 1775) (3) (*)

Note

Pomadasys stridens: Segnalata a Savona.

Sparidae

Boops Cuvier, 1814

Boops boops (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Dentex Cuvier, 1814

Dentex dentex (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Dentex gibbosus (Rafinesque, 1810) (3, 4, 5)

Dentex macrophthalmus (Bloch, 1791) (3, 4, 5)

Diplodus Rafinesque, 1810

Diplodus annularis (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Diplodus cervinus (Lowe, 1841) (3)

Diplodus puntazzo (Cetti, 1777) (3, 4, 5)

Diplodus sargus (Linnaeus, 1758)

Diplodus sargus sargus (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Diplodus vulgaris (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817) (3, 4, 5)

Lithognathus Swainson, 1839

Lithognathus mormyrus (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Oblada Cuvier, 1829

Oblada melanura (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Pagellus Valenciennes, 1830

Pagellus acarne (Risso, 1826) (3, 4, 5)

Pagellus bogaraveo (Brünnich, 1768) (3, 4, 5)

Pagellus erythrinus (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Pagrus Cuvier, 1817

Pagrus auriga (Valenciennes, 1843) (3, 4, 5)

Pagrus caeruleostictus (Valenciennes, 1830) (3, 5)

Pagrus pagrus (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Sarpa Bonaparte, 1831

Sarpa salpa (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Sparus Linnaeus, 1758

Sparus auratus Linnaeus, 1758 (3, 4, 5)

SpondylIOSoma Cantor, 1849

SpondylIOSoma cantharus (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Centracanthidae

Centracanthus Rafinesque, 1810

Centracanthus cirrus Rafinesque, 1810 (3, 5)

Spicara Rafinesque, 1810

Spicara flexuosa Rafinesque, 1810 (3, 4, 5)

Spicara maena (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Spicara smaris (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Sciaenidae

Argyrosomus de la Pylaie, 1835

Argyrosomus regius (Asso, 1801) (3, 4, 5)

Sciaena Linnaeus, 1758

Sciaena umbra Linnaeus, 1758 (3, 4, 5)

Umbrina Cuvier, 1817

Umbrina canariensis Valenciennes, 1843 (3)

Umbrina cirrosa (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Umbrina ronchus Valenciennes, 1843 (3)

Mullidae

Mullus Linnaeus, 1758

Mullus barbatus Linnaeus, 1758 (3, 4, 5)

Mullus surmuletus Linnaeus, 1758 (3, 4, 5)

Kyphosidae

Kyphosus Lacépède, 1801

Kyphosus sectator (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Pomacentridae

Chromis Cuvier, 1814

Chromis chromis (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Cepolidae

Cepola Linnaeus, 1764

Cepola macrophthalma Linnaeus, 1758 (3, 4, 5)

Mugilidae

Chelon Röse, 1793

Chelon labrosus (Risso, 1826) (3, 4, 5)

Liza Jordan & Swain, 1884

Liza aurata (Risso, 1810) (3, 4, 5)

Liza ramada (Risso, 1826) (3, 4, 5)

Liza saliens (Risso, 1810) (3, 4, 5)

Mugil Linnaeus, 1758

Mugil cephalus Linnaeus, 1758 (3, 4, 5)

Oedalechilus Fowler, 1904

Oedalechilus labeo (Cuvier, 1829) (3, 4, 5)

Sphyraenidae

Sphyraena Schneider, 1801

Sphyraena sphyraena (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Labridae

Acantholabrus Valenciennes, 1839

Acantholabrus palloni (Risso, 1810) (3, 4, 5)

Coris Lacépède, 1801

Coris julis (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Ctenolabrus Valenciennes, 1839

Ctenolabrus rupestris (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Labrus Linnaeus, 1758

Labrus bergylta Ascanius 1767 (3) (*)

Labrus bimaculatus Linnaeus, 1758 (3, 4, 5)

Labrus merula Linnaeus, 1758 (3, 4, 5)

Labrus viridis Linnaeus, 1758 (3, 4, 5)

Lappanella Jordan, 1891

Lappanella fasciata (Cocco, 1833) (3, 4, 5)

Symphodus Rafinesque, 1810

Symphodus cinereus (Bonnaterre, 1788)

Symphodus cinereus cinereus (Bonnaterre, 1788) (3, 4, 5)

Symphodus doderleini Jordan, 1891 (3, 4, 5)

Symphodus mediterraneus (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Symphodus melanocercus (Risso, 1810) (3, 4, 5)

Symphodus melops (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Symphodus ocellatus (Forsskål, 1775)

Symphodus ocellatus bertini (Pras, 1961) (3)

Symphodus ocellatus ocellatus (Forsskål, 1775) (3, 4, 5)

Symphodus roissali (Risso, 1810) (3, 4, 5)

Symphodus rostratus (Bloch, 1797) (3, 4, 5)

Symphodus tinca (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Thalassoma Swainson, 1839

Thalassoma pavo (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Xyrichthys Cuvier, 1814

Xyrichthys novacula (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Note

Labrus bergylta: Segnalata nello Stretto di Messina.

Scaridae

Sparisoma Swainson, 1839

Sparisoma cretense (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Zoarcidae

Melanostigma Günther, 1881

Melanostigma atlanticum Koefoed, 1952 (3)

Anarhichadidae

Anarhichas Linnaeus, 1758

Anarhichas lupus Linnaeus, 1758

Anarhichas lupus lupus Linnaeus, 1758 (3)

Trachinidae

Echiichthys Bleeker, 1861

Echiichthys vipera (Cuvier, 1829) (3, 4, 5)

Trachinus Linnaeus, 1758

Trachinus araneus Cuvier, 1829 (3, 4, 5)

Trachinus draco Linnaeus, 1758 (3, 4, 5)

Trachinus radiatus Cuvier, 1829 (3, 4, 5)

Uranoscopidae

Uranoscopus Linnaeus, 1758

Uranoscopus scaber Linnaeus, 1758 (3, 4, 5)

Tripterygiidae

Trypterigion Risso, 1826

Trypterigion delaisi Cadenat & Blache, 1971

Trypterigion delaisi xanthosoma Zander & Heymer, 1971 (3, 4)

Trypterigion melanurus Guichenot, 1850 (*)

Trypterigion melanurus melanurus Guichenot, 1850 (3)

Trypterigion melanurus minor Kolombatovic, 1904 (3, 4, 5)

Trypterigion tripteronotus (Risso, 1810) (3, 4, 5)

Note

Trypterigion melanurus: In Sardegna e Sicilia m. melanurus; lungo la costa tirrenica dell'Italia centrale m. minor.

Clinidae

Clinitrachus Swainson, 1839

Clinitrachus argentatus (Risso, 1810) (3, 4, 5)

Blenniidae

Aidablennius Whitley, 1947

Aidablennius sphynx (Valenciennes, 1836) (3, 4, 5)

Blennius Linnaeus, 1758

Blennius ocellaris Linnaeus, 1758 (3, 4, 5)

Coryphoblennius Normann, 1943

Coryphoblennius galerita (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Hypleurochilus Gill, 1861

Hypleurochilus bananensis (Poll, 1959) (3)

Lipophrys Gill, 1896

Lipophrys adriaticus (Steindachner & Kolombatovic, 1883) (4)

Lipophrys basiliscus (Valenciennes, 1836) (3, 4, 5)

Lipophrys canevai (Vinciguerra, 1880) (3, 4, 5)

Lipophrys dalmatinus (Steindachner & Kolombatovic, 1883) (3, 4, 5?)

Lipophrys fluviatilis (Asso, 1801) (N, S, Si, Sa)

Lipophrys nigriceps (Vinciguerra, 1883)

Lipophrys nigriceps nigriceps (Vinciguerra, 1883) (3, 4)

Lipophrys pavo (Risso, 1810) (3, 4, 5)

Lipophrys trigloides (Valenciennes, 1836) (3, 4, 5)

Parablennius Ribeiro, 1915

Parablennius gattorugine (Brünnich, 1768) (3, 4, 5)

Parablennius incognitus (Bath, 1968) (3, 4, 5)

Parablennius pilicornis (Cuvier, 1929) (3)

Parablennius rouxi (Cocco, 1883) (3, 4, 5?)

Parablennius sanguinolentus (Pallas, 1811) (3, 4, 5)
Parablennius tentacularis (Brünnich, 1768) (3, 4, 5)
Parablennius zvonimiri (Kolombatovic, 1892) (3, 4, 5)

Scartella Jordan, 1886

Scartella cristata (Linnaeus, 1758) (3)

Ammodytidae

Gymnammodytes Duncker & Mohr, 1935

Gymnammodytes cicereus (Rafinesque, 1810) (3, 4, 5)

Callionymidae

Callionymus Linnaeus, 1758

Callionymus fasciatus Valenciennes, 1837 (3, 4, 5)
Callionymus lyra Linnaeus, 1758 (3, 4, 5)
Callionymus maculatus Rafinesque, 1810 (3, 4, 5)
Callionymus pusillus Delaroche, 1809 (3, 4, 5)
Callionymus risso Lesueur, 1814 (3, 4, 5)

Synchiropus Gill, 1859

Synchiropus phaeton Günther, 1861 (3, 4, 5)

Gobiidae

Aphia Risso, 1826

Aphia minuta (Risso, 1810) (3, 4, 5)

Buenia Iljin, 1930

Buenia affinis Iljin, 1930 (3)

Chromogobius de Buen, 1930

Chromogobius quadrivittatus (Steindachner, 1873) (3, 4, 5)
Chromogobius zebratus (Kolombatovic, 1891) (*)
Chromogobius zebratus levanticus Miller, 1971 (3)
Chromogobius zebratus zebratus (Kolombatovic, 1891) (4)

Crystallogobius Gill, 1864

Crystallogobius linearis (von Düben, 1845) (3, 4, 5)

Deltentosteus Gill, 1864

Deltentosteus colonianus (Risso, 1826) (3, 4, 5)

Deltentosteus quadrimaculatus (Valenciennes, 1837) (3, 4, 5)

Gobius Linnaeus, 1758

Gobius ater Bellotti, 1888 (3)

Gobius auratus Risso, 1810 (3, 4, 5)

Gobius bucchichi Steindachner, 1870 (3, 4, 5)

Gobius cobitis Pallas, 1811 (3, 4, 5)

Gobius cruentatus Gmelin, 1789 (3, 4, 5)

Gobius fallax Sarato, 1889 (3, 4)

Gobius geniporus Valenciennes, 1837 (3, 4, 5)

Gobius luteus Kolombatovic, 1891 (3, 4) (*)

Gobius niger Linnaeus, 1758

Gobius niger jozo Linnaeus, 1758 (3, 4, 5)

Gobius paganellus Linnaeus, 1758 (3, 4, 5)

Gobius roulei de Buen, 1928 (3)

Gobius vittatus Vinciguerra, 1883 (3, 4, 5?)

Gobiusculus Duncker, 1928

Gobiusculus flavescens (Fabricius, 1779) (3, 4) (*)

Knipowitschia Ilijn, 1927

Knipowitschia caucasica (Kawrajsky, 1916) (4) (*)

Knipowitschia panizzae (Verga, 1841) (3, 4) (E)

Knipowitschia punctatissima (Canestrini, 1864) (N) (E)

Lesuerigobius Whitley, 1950

Lesuerigobius friesi (Malm, 1874) (3, 4, 5)

Lesuerigobius suerii (Risso, 1810) (3, 4, 5)

Millerigobius Bath, 1973

Millerigobius macrocephalus (Kolombatovic, 1891) (3, 4)

Odondebuenia de Buen, 1930

Odondebuenia balearica (Pellegrin & Fage, 1907) (4, 5)

Padogobius Berg, 1932

Padogobius martensii (Günther, 1861) (N, S) (E) (*)

Padogobius nigricans (Canestrini, 1867) (S) (E) (*)

Pomatoschistus Gill, 1864

Pomatoschistus bathi Miller, 1982 (3, 4)

Pomatoschistus canestrini (Ninni, 1883) (N, S) (E) (*)

Pomatoschistus kneri (Steindachner, 1861) (3, 4) (*)

Pomatoschistus marmoratus (Risso, 1810) (3, 4, 5)

Pomatoschistus microps (Kroyer, 1838) (3, 4?)

Pomatoschistus minutus (Pallas, 1770)

Pomatoschistus minutus elongatus (Canestrini, 1861) (3, 4)

Pomatoschistus norvegicus (Collett, 1903) (3) (*)

Pomatoschistus pictus (Malm, 1865)

Pomatoschistus pictus adriaticus Miller, 1973 (4)

Pomatoschistus quagga (Heckel, 1840) (3, 4, 5)

Pomatoschistus tortonesei Miller, 1968 (5)

Pseudaphia Iljin, 1930

Pseudaphia ferrerii (de Buen O. & Fage, 1908) (3, 4, 5)

Speleogobius Zander & Jelinek, 1976

Speleogobius trigloides Zander & Jelinek, 1976 (4) (*)

Thorogobius Miller, 1969

Thorogobius ephippiatus (Lowe, 1839) (3, 4, 5)

Zebrus de Buen, 1930

Zebrus zebrus (Risso, 1826) (3, 4, 5)

Zosterisessor Whitley, 1935

Zosterisessor ophiocephalus (Pallas 1811) (3, 4, 5)

Note

Chromogobius zebratus: La presenza della subsp. *levanticus* è ritenuta probabile.

Gobius luteus: Confusa con *auratus*; la specie richiede conferma.

Gobiusculus flavescens: Presente in Atlantico orientale; le segnalazioni in acque italiane sono di validità molto dubbia.

Knipowitschia caucasica: La segnalazione nella Laguna di Venezia non è stata mai confermata ed è pertanto di dubbia validità.

Padogobius martensii: Endemica nelle acque interne del versante dell'alto Adriatico; introdotta in Italia centrale.

Padogobius nigricans: Endemica nel versante tirrenico dell'Italia centrale.

Pomatoschistus canestrini: Una popolazione introdotta in acque estuariali del Golfo di Taranto.

Pomatoschistus kneri: Segnalata nell'isola del Giglio.

Pomatoschistus norvegicus: La reale presenza in Mediterraneo è dubbia.

Speleogobius trigloides: In grotte marine della costa dell'Istria.

Gempylidae

Ruvettus Cocco, 1833

Ruvettus pretiosus Cocco, 1829 (3, 4, 5)

Trichiuridae

Lepidopus Goüan, 1770

Lepidopus caudatus (Euphrasen, 1788) (3, 4, 5)

Trichiurus Linnaeus, 1758

Trichiurus lepturus Linnaeus, 1758 (3?, 4?, 5)

Scombridae

Acanthocybium Gill, 1863

Acanthocybium solandri (Cuvier, 1832) (3) (*)

Auxis Cuvier, 1829

Auxis rochei (Risso, 1810) (3, 4, 5)

Euthynnus Jordan & Gilbert, 1883

Euthynnus alletteratus (Rafinesque, 1810) (3, 4, 5)

Katsuwonus Kishinouye, 1915

Katsuwonus pelamis (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Orcynopsis Gill, 1863

Orcynopsis unicolor (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817) (3, 4, 5) (*)

Sarda Cuvier, 1829

Sarda sarda (Bloch, 1793) (3, 4, 5)

Scomber Linnaeus, 1758

Scomber japonicus Houttuyn, 1782 (3, 4, 5)

Scomber scombrus Linnaeus, 1758 (3, 4, 5)

Scomberomorus Lacépède, 1801

Scomberomorus tritor (Cuvier, 1831) (3) (*)

Thunnus South, 1845

Thunnus alalunga Bonnaterre, 1788 (3, 4, 5)

Thunnus thynnus (Linnaeus, 1758)

Thunnus thynnus thynnus (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Note

Acanthocybium solandri: Segnalazione di un esemplare presso Palermo.

Orcynopsis unicolor: Presenze sporadiche.

Scomberomorus tritor: Rara in Mediterraneo; segnalazioni a Nizza e Palermo.

Xiphiidae

Xiphias Linnaeus, 1758

Xiphias gladius Linnaeus, 1758 (3, 4, 5)

Luvaridae

Luvarus Rafinesque, 1810

Luvarus imperialis Rafinesque, 1810 (3, 4, 5)

Istiophoridae

Istiophorus Lacépède, 1801

Istiophorus albicans (Latreille, 1804) (3, 5?)

Makaira Lacépède, 1802

Makaira indica (Cuvier, 1832) (3) (*)

Tetrapturus Rafinesque, 1810

Tetrapturus albidus Poey, 1860 (3, 5)

Tetrapturus belone Rafinesque, 1810 (3, 4, 5)

Tetrapturus georgei Lowe, 1840 (3, 5)

Note

Makaira indica: Rara in Mediterraneo; una segnalazione a Genova.

Centrolophidae

Centrolophus Lacépède, 1803

Centrolophus niger (Gmelin, 1789) (3, 4, 5)

Schedophilus Cocco, 1839

Schedophilus medusophagus Cocco, 1839 (3, 5)

Schedophilus ovalis (Cuvier, 1833) (3, 4, 5)

Nomeidae

Cubiceps Lowe, 1843

Cubiceps gracilis Lowe, 1843 (3, 5)

Tetragonuridae

Tetragonurus Risso, 1810

Tetragonurus cuvieri Risso, 1810 (3)

Stromateidae

Stromateus Linnaeus, 1758

Stromateus fiatola Linnaeus, 1758 (3, 5)

Pleuronectiformes

Citharidae

Citharus Röse, 1783

Citharus linguatula (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Bothidae

Arnoglossus Bleeker, 1872

Arnoglossus imperialis (Rafinesque, 1810) (3)

Arnoglossus kessleri Schmidt P., 1915 (3, 4, 5)

Arnoglossus laterna (Walbaum, 1792) (3, 4, 5)

Arnoglossus rueppelli (Cocco, 1844) (3, 4, 5)

Arnoglossus thori Kyle, 1913 (3, 4, 5)

Bothus Rafinesque, 1810

Bothus podas (Delaroche, 1809)

Bothus podas podas (Delaroche, 1809) (3, 4, 5)

Lepidorhombus Günther, 1862

Lepidorhombus bosci (Risso, 1810) (3, 4, 5)

Lepidorhombus whiffiagonis (Walbaum, 1792) (3, 4, 5)

Phrynorhombus Günther, 1829

Phrynorhombus regius (Bonnaterre, 1788) (3, 4, 5)

Psetta Swainson, 1839

Psetta maxima (Linnaeus, 1758)

Psetta maxima maxima (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Scophthalmus Rafinesque, 1810

Scophthalmus rhombus (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Pleuronectidae

Platichthys Girard, 1856

Platichthys flesus (Linnaeus, 1758)

Platichthys flesus flesus (Linnaeus, 1758) (3)
Platichthys flesus luscus (Pallas, 1811) (4)

Cynoglossidae

Symphurus Rafinesque, 1810

Symphurus ligulatus (Cocco, 1844) (3, 5)
Symphurus nigrescens Rafinesque, 1810 (3, 4, 5)

Soleidae

Bathysolea Roule, 1916

Bathysolea profundicula (Vaillant, 1888) (3)

Buglossidium Chabanaud, 1930

Buglossidium luteum (Risso, 1810) (3, 4, 5)

Microchirus Bonaparte, 1833

Microchirus ocellatus (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)
Microchirus variegatus (Donovan, 1808) (3, 4, 5)

Monochirus Rafinesque, 1814

Monochirus hispidus Rafinesque, 1814 (3, 4, 5)

Solea Quensel, 1906

Solea aegyptiaca Chabanaud, 1927 (4)
Solea impar Bennett, 1831 (3, 4, 5)
Solea kleini Bonaparte, 1833 (3, 4, 5)
Solea lascaris (Risso, 1810) (3, 4, 5)
Solea nasuta Pallas, 1811) (3, 4)
Solea vulgaris Quensel, 1806 (3, 4, 5)

Tetraodontiformes

Balistidae

Balistes Linnaeus, 1758

Balistes carolinensis Gmelin, 1789 (3, 4, 5)

Stephanolepis Gill, 1862

Stephanolepis diaspros Fraser-Brunner, 1940 (5)

Tetraodontidae

Lagocephalus Swainson, 1839

Lagocephalus lagocephalus (Linnaeus, 1758) (3, 5)

Sphoeroides Lacépède, 1798

Sphoeroides cutaneus Günther, 1870 (3, 4, 5)

Diodontidae

Diodon Linnaeus, 1758

Diodon hystrix Linnaeus, 1758 (4?, 5) (*)

Note

Diodon hystrix: Le presenze richiedono conferma.

Molidae

Mola Koelreuter, 1770

Mola mola (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5)

Ranzania Nardo, 1840

Ranzania laevis (Pennant, 1776) (3, 4, 5)

Amphibia

Urodela

Salamandridae

Euproctus Gené, 1839

Euproctus platycephalus (Gravenhorst, 1829) (Sa) (E)

Salamandra Laurenti, 1768

Salamandra atra Laurenti, 1768

Salamandra atra atra Laurenti, 1768 (N)

Salamandra atra aurorae Trevisan, 1982 (N) (E)

Salamandra lanzai Nascetti, Andreone, Capula & Bullini, 1988 (N)

Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) (*)

Salamandra salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) (N)

Salamandra salamandra gigliolii Eiselt & Lanza, 1956 (N, S) (E)

Salamandrina Fitzinger, 1826

Salamandrina terdigitata (Lacépède, 1788) (N, S) (E)

Triturus Rafinesque, 1815

Triturus alpestris (Laurenti, 1768)

Triturus alpestris alpestris (Laurenti, 1768) (N)

Triturus alpestris apuanus (Bonaparte, 1839) (N, S) (E)

Triturus alpestris inexpectatus Dubois & Breuil, 1983 (S) (E)

Triturus carnifex (Laurenti, 1768) (N, S)

Triturus italicus (Peracca, 1898) (S) (E)

Triturus vulgaris (Linnaeus, 1758)

Triturus vulgaris vulgaris (Linnaeus, 1758) (N)

Triturus vulgaris meridionalis (Boulenger, 1882) (N, S)

Note

Salamandra salamandra: Presenza in Sicilia da confermare.

Plethodontidae

Speleomantes Dubois, 1984

Speleomantes ambrosii (Lanza, 1955) (N, S) (E)

Speleomantes flavus (Stefani, 1969) (Sa) (E)

Speleomantes genei (Temminck & Schlegel, 1838) (Sa) (E)

Speleomantes imperialis (Stefani, 1969) (Sa) (E)

Speleomantes italicus (Dunn, 1923) (N, S) (E)

Speleomantes strinatii (Aellen, 1958) (N, S) (*)

Speleomantes supramontis (Lanza, Nascetti & Bullini, 1986) (Sa) (E)

Note

Speleomantes: Le specie di questo genere sono tradizionalmente attribuite a Geotriton Bonaparte, 1832 o a Hydromantes Gistel, 1848, ambedue sinonimi di Triturus Rafinesque, 1815; talora al genere affine americano Hydromantoides Lanza & Vanni, 1981.

Speleomantes strinatii: Le sono ascrivibili le seguenti quattro "sottospecie", tutte di dubbia validità (tra parentesi è indicata solo la provenienza del materiale tipico): s. strinatii (Aellen, 1958) (Alpes-Maritimes; Francia SE); s. argentatus (Stefani, 1969) (Val Varatella; Savona); s. bonzanoi (Bruno & Bologna, 1973) (valli dei torrenti Prino, Impero e San Pietro e alta Valle del Torrente Arroscia; Liguria W); s. ligusticus (Stefani, 1969) (dintorni di Genova).

Proteidae

Proteus Laurenti, 1768

Proteus anguinus Laurenti, 1768 (N)

Anura

Discoglossidae

Bombina Oken, 1816

Bombina pachypus (Bonaparte, 1838) (N, S) (E) (*)

Bombina variegata (Linnaeus, 1758)

Bombina variegata variegata (Linnaeus, 1758) (N)

Discoglossus Otth, 1837

Discoglossus pictus Otth, 1837

Discoglossus pictus pictus Otth, 1837 (Si) (E)

Discoglossus sardus Tschudi, 1837 (S, Sa) (*)

Note

Bombina pachypus: Presenza in Sicilia da confermare.

Discoglossus sardus: Oltre che in Sardegna, la specie è presente solo in due isole dell'Arcipelago Toscano (Giglio e Montecristo) e in un'unica località peninsulare (isola fossile del Monte Argentario).

Pelobatidae

Pelobates Wagler, 1830

Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) (*)
Pelobates fuscus insubricus Cornalia, 1873 (N) (E, M)

Note

Pelobates fuscus: Sottospecie probabilmente non valida.

Pelodytidae

Pelodytes Bonaparte, 1838

Pelodytes punctatus (Daudin, 1802) (N) (M)

Buфонidae

Bufo Laurenti, 1768

Bufo bufo (Linnaeus, 1758) (*)
Bufo bufo bufo (Linnaeus, 1758) (N, S?)
Bufo bufo spinosus Daudin, 1803 (N?, S, Si)
Bufo viridis Laurenti, 1768 (*)
Bufo viridis viridis Laurenti, 1768 (N, S, Si, Sa)

Note

Bufo bufo: Sottospecie di validità incerta.

Bufo viridis: Secondo Hemmer, Kadel & Kadel (1981) (Amphibia-Reptilia, 2 (3): 217-230) i Bufo viridis della Sardegna appartengono probabilmente alla subsp. v. balearicus Boettger, 1890, la cui validità è però estremamente dubbia.

Hylidae

Hyla Laurenti, 1768

Hyla arborea (Linnaeus, 1758)
Hyla arborea arborea (Linnaeus, 1758) (N)
Hyla meridionalis Boettger, 1874 (N)
Hyla sarda (De Betta, 1853) (S, Sa) (*)
Hyla species inquirenda (N, S, Si) (E) (*)

Note

Hyla sarda: Nell'Italia S presente solo in due isole dell'Arcipelago Toscano: Elba e Capraia.

Hyla species inquirenda: In corso di stampa (Nascetti, Lanza & Bullini, 1994).

Ranidae

Rana Linnaeus, 1758

- Rana arvalis* Nilsson, 1758 (*)
 - Rana arvalis wolterstorffi* Fejérváry, 1919 (N?)
- Rana catesbeiana* Shaw, 1802 (N, S) (*)
- Rana dalmatina* Bonaparte, 1840 (N, S)
- Rana italica* Dubois, 1987 (N, S) (E)
- Rana latastei* Boulenger, 1879 (N) (E, M) (*)
- Rana lessonae* Camerano, 1882 (*)
 - Rana lessonae lessonae* Camerano, 1882 (N)
 - Rana lessonae subsp.inquirenda* (N, S) (E)
 - Rana lessonae subsp.inquirenda* (S?, Si) (E)
- Rana perezi* Seoane, 1885 (N?) (*)
- Rana ridibunda* Pallas, 1771 (N) (*)
- Rana temporaria* Linnaeus, 1758
 - Rana temporaria temporaria* Linnaeus, 1758 (N, S)

Note

Rana arvalis: Citata del Fiumano e dell'Istria; sembra mancare entro gli attuali confini politici dell'Italia.

Rana catesbeiana: Specie acclimatata, originaria dell'America settentrionale.

Rana latastei: Praticamente endemica, dato che è presente solo in limitate zone del Canton Ticino e della Slovenia confinanti con l'Italia, nonché in qualche stazione isolata della Croazia (Istria).

Rana lessonae: Acclimatata in Sardegna. L'areale delle sue subspp. è da precisare. Il suo ibrido con *Rana ridibunda* Pallas, 1771 corrisponde alla *Rana esculenta* Linnaeus, 1758.

Rana perezi: Presente nel Nizzardo e possibilmente nella Liguria W e nel Piemonte SW.

Rana ridibunda: Le popolazioni dell'Italia NW derivano da acclimatazione di esemplari provenienti dall'Albania centrale.

Reptilia

Testudines

Bataguridae

Mauremys Gray, 1869

- Mauremys caspica* (Gmelin, 1774) (*)
 - Mauremys caspica caspica* (Gmelin, 1774) (N, S)

Mauremys caspica rivulata (Valenciennes, 1833) (N, S)
Mauremys leprosa (Schweigger, 1812) (N, S) (*)

Note

Mauremys caspica: Introdotta dall'Europa E (subsp. rivulata) e possibilmente anche dall'Asia SW (subsp. caspica e subsp. rivulata); la sua reale acclimatazione in Italia è da dimostrare.
Mauremys leprosa: Introdotta dalla Penisola Iberica e possibilmente anche dall'Africa NW; la sua reale acclimatazione in Italia è da dimostrare.

Emydidae

Emys Duméril A., 1806

Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa) (*)

Trachemys Agassiz, 1857

Trachemys scripta (Schoepff, 1792) (*)
Trachemys scripta elegans (Wied, 1839) (N, S)
Trachemys scripta troostii (Holbrook, 1836) (N, S)

Note

Emys orbicularis: Sembra che la specie sia rappresentata da varie sottospecie attualmente in corso di definizione.
Trachemys scripta: Introdotta dagli Stati Uniti d'America; la sua reale acclimatazione in Italia è da dimostrare; la subsp. di gran lunga più frequentemente importata, e di conseguenza liberata, è la elegans.

Testudinidae

Testudo Linnaeus, 1758

Testudo graeca Linnaeus, 1758 (M) (*)
Testudo graeca graeca Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)
Testudo graeca iberica Pallas, 1814 (N, S, Si, Sa)
Testudo hermanni Gmelin, 1789 (M) (*)
Testudo hermanni hermanni Gmelin, 1789 (N, S, Si, Sa)
Testudo hermanni boettgeri Mojsisovics, 1889 (N, S, Si, Sa)
Testudo marginata Schoepff, 1792 (N, S, Si?, Sa) (M) (*)

Note

Testudo graeca: Specie importata in Italia fin dall'antichità, sia dalla porzione occidentale (subsp. graeca) sia da quella orientale del suo areale (subsp. iberica) e presente quasi ovunque

in stato di semi-domesticità, talora con possibilità di riprodursi. Inselvaticita e acclimatata in Sardegna, ove è forse presente solo la subsp. *graeca*, e probabilmente in Sicilia e in qualche località dell'Italia peninsulare. Le due subsp. meritano verosimilmente di essere riportate a rango di buone specie.

Testudo hermanni: Apparentemente è questa l'unica *Testudo* autoctona italiana, almeno per quanto attiene alla Sicilia, alla Sardegna e ad alcune zone costiere dell'estrema Italia NE, della Liguria e dell'Italia peninsulare. Comunque anche questa specie è stata importata in Italia sin dall'antichità, sia dalla porzione occidentale (subsp. *hermanni*) sia da quella orientale (subsp. *boettgeri*) del suo areale, ed è presente quasi ovunque in stato di semi-domesticità, spesso con possibilità di riprodursi. In certe zone è presente in seguito a inselvaticimento seguito da acclimatazione.

Testudo marginata: Specie endemica della Grecia e dell'Albania, importata in Italia sin dall'antichità e stabilmente naturalizzatasi in Sardegna e quasi di sicuro in qualche altra località del nostro Paese, ad esempio a Tombolo (Livorno); quasi ovunque presente in stato di semi-domesticità, talora con possibilità di riprodursi.

Cheloniidae

Caretta Rafinesque, 1814

Caretta caretta (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5) (M) (*)

Chelonia Brongniart, 1800

Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5) (M) (*)

Eretmochelys Fitzinger, 1843

Eretmochelys imbricata (Linnaeus, 1766) (5?) (M) (*)

Lepidochelys Fitzinger, 1843

Lepidochelys kempii (Garman, 1880) (5) (M) (*)

Note

Caretta caretta: Questa è l'unica testuggine marina che si riproduce, pur se saltuariamente, in tratti costieri politicamente italiani, per esempio all'Isolotto dei Conigli presso Lampedusa.

Chelonia mydas: Catturata nei nostri mari solo eccezionalmente.

Eretmochelys imbricata: Non se ne conoscono catture avvenute in acque italiane, ma ne sono note per l'Egeo.

Lepidochelys kempii: Solo un individuo sarebbe stato catturato nel Mediterraneo, presso Malta.

Dermochelyidae

Dermochelys Blainville, 1816

Dermochelys coriacea (Vandelli, 1761) (3, 4, 5) (M) (*)

Note

Dermochelys coriacea: Sono del tutto prive di fondamento le notizie riguardanti la sua riproduzione, in epoca relativamente recente, lungo le coste meridionali della Sicilia.

Squamata

Gekkonidae

Cyrtopodion Fitzinger, 1843

Cyrtopodion kotschy (Steindachner, 1870) (*)

Cyrtopodion kotschy bibroni Beutler & Gruber, 1977 (S)

Hemidactylus Oken, 1817

Hemidactylus turcicus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Phyllodactylus Gray, 1830

Phyllodactylus europaeus Gené, 1939 (N, S, Sa)

Tarentola Gray, 1825

Tarentola mauritanica (Linnaeus, 1758)

Tarentola mauritanica mauritanica (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Note

Cyrtopodion kotschy: Specie prima d'ora nota solo della Puglia, ove la sua presenza sarebbe da attribuire, secondo alcuni Autori, a trasporto involontario da parte dell'uomo e susseguente naturalizzazione; di recente è stata scoperta in Basilicata, presso Matera (Lanza et al., in preparazione).

Chamaeleonidae

Chamaeleo Laurenti, 1768

Chamaeleo chamaeleon (Linnaeus, 1758) (*)

Chamaeleo chamaeleon chamaeleon (Linnaeus, 1785) (S?, Si?)

Note

Chamaeleo chamaeleon: Specie importata sin dall'antichità in Italia, dall'Africa N e/o dall'Asia SW; benché più volte citata per la Sicilia e, di recente, per la Puglia (Salento), è tuttavia dubbio che vi si sia acclimatata, ciò che invece sembra essersi avverato a Malta.

Anguidae

Anguis Linnaeus, 1758

Anguis fragilis Linnaeus, 1758 (*)

Anguis fragilis fragilis Linnaeus, 1758 (N, S)

Ophisaurus Daudin, 1803

Ophisaurus apodus (Pallas, 1775) (N?) (*)

Note

Anguis fragilis: La sua asserita presenza in Sicilia è da considerare priva di fondamento.

Ophisaurus apodus: Benché presente in Istria, sembra che debba essere esclusa la sua presenza come specie autoctona in provincia di Trieste, unica zona politicamente italiana per la quale esistono citazioni. Importata e probabilmente acclimatata nel Bosco di Pannowitz, presso Gorizia ma in territorio politicamente della Slovenia.

Lacertidae

Algyroides Bibron & Bory, 1833

Algyroides fitzingeri (Wiegmann, 1834) (Sa) (E)

Algyroides nigropunctatus (Duméril & Bibron, 1839) (N)

Archaeolacerta Mertens, 1921

Archaeolacerta bedriagae (Camerano, 1885) (*)

Archaeolacerta bedriagae paessleri (Mertens,) 1927) (Sa) (E)

Archaeolacerta bedriagae sardoa (Peracca, 1903) (Sa) (E)

Archaeolacerta horvathi (Méhely, 1904) (N)

Lacerta Linnaeus, 1758

Lacerta agilis Linnaeus, 1758

Lacerta agilis agilis Linnaeus, 1758 (N)

Lacerta trilineata Bedriaga, 1886 (N?) (*)

Lacerta viridis (Laurenti, 1768) (N, S, Si) (*)

Podarcis Wagler, 1830

- Podarcis filfolensis* (Bedriaga, 1876) (*)
- Podarcis filfolensis laurentiimuelleri* (Fejérváry, 1924) (Si) (E)
- Podarcis melisellensis* (Braun, 1877)
- Podarcis melisellensis fiumana* (Werner, 1891) (N)
- Podarcis muralis* (Laurenti, 1768) (N, S) (*)
- Podarcis sicula* (Rafinesque, 1810) (N, S, Si, Sa) (*)
- Podarcis tiliguerta* (Gmelin, 1789)
- Podarcis tiliguerta tiliguerta* (Gmelin, 1789) (Sa)
- Podarcis tiliguerta ranzii* (Lanza, 1967) (Sa) (E)
- Podarcis tiliguerta toro* (Mertens, 1932) (Sa) (E)
- Podarcis wagleriana* Gistel, 1868 (Si) (E) (*)

Timon Tschudi, 1836

- Timon lepidus* (Daudin, 1802)
- Timon lepidus lepidus* (Daudin, 1802) (N)

Psammodromus Fitzinger, 1826

- Psammodromus algirus* (Linnaeus, 1758) (Si) (M) (*)

Zootoca Wagler, 1830

- Zootoca vivipara* Jacquin, 1787
- Zootoca vivipara vivipara* Jacquin, 1787 (N)

Note

Archaeolacerta bedriagae: Per le località di provenienza del materiale tipico delle "sottospecie" di *A. bedriagae* e di quelle, citate in nota, di *Lacerta viridis*, di *Podarcis muralis*, e di *Podarcis sicula* si vedano Mertens & Wermuth (1960) e Böhme (1984; 1986) per i taxa descritti prima del 1900, Lanza & Corti (1993) per i restanti. Una *A. bedriagae* subsp.? è presente nell'estrema Sardegna SE (Monte dei Sette Fratelli).

Lacerta trilineata: Specie presente in Istria, forse con la subsp. *trilineata*, ma sinora non segnalata di località politicamente italiane.

Lacerta viridis: Vedi nota 385.0 001.0 Sono ascrivibili a *L. viridis* le seguenti "sottospecie", per lo più non valide o di dubbia validità: *v. chloronota* Rafinesque, 1810; *v. fejervaryi* Vasváry, 1926; *v. chloroprimea* Taddei, 1950; *v. chlorosecunda* Taddei, 1950; *v. cisalpina* Taddei, 1950; *v. italica* Taddei, 1950; *v. udicarsica* Taddei, 1950; *v. tiberina* Taddei, 1950.

Podarcis filfolensis: Presente solo nelle Isole Pelagie (Lampione e Linosa).

Podarcis muralis: Vedi nota 385.0 001.0 Sono ascrivibili a *P. muralis* le seguenti "sottospecie", in parte sicuramente non valide o di dubbia validità: *m. nigriventris* Bonaparte, 1836; *m. porphyrea* (Dehne, 1856); *m. brueggemanni* (Bedriaga, 1879); *m. insulanica* (Bedriaga, 1881); *m. maculiventris* (Werner, 1891); *m. borromeica* (Mertens, 1932); *m. vinciguerrai* (Mertens, 1932); *m. baldasseronii* (Taddei, 1949); *m. colosii* (Taddei, 1949); *m. apenninica* (Taddei, 1949); *m. muellerlorenzi* (Taddei, 1949); *m. tinettoi* (Taddei, 1949); *m.*

paulinii (Taddei, 1952); m. marcuccii (Lanza, 1956); m. beccarii (Lanza, 1958).

Podarcis sicula: Vedi nota 385.0 001.0 Sono ascrivibili a *P. sicula* le seguenti "sottospecie", in parte sicuramente non valide o di dubbia validità, talora apparentemente sinonimi di taxa già descritti in precedenza [per esempio: s. campana (Taddei, 1949) =s. neapolitana (Bedriaga, 1874)]; s. acrolampra (Costa, 1828); s. campestris De Betta, 1857; s. cettii (Cara, 1872); s. coerulea (Eimer, 1872); s. elegans (Eimer, 1874); s. neapolitana (Bedriaga, 1874); s. latastei (Bedriaga, 1879); s. coeruleocoerulescens (Eimer, 1881); s. gallensis (Eimer, 1881); s. monaconensis (Eimer, 1881); s. multifasciata (Spada, 1892); s. sanctistephani (Mertens, 1926); s. mertensi (Wettstein, 1931); s. tyrrhenica (Mertens, 1932); s. medemi (Mertens, 1942); s. calabra (Taddei, 1949); s. calabresiae (Taddei, 1949); s. campana (Taddei, 1949); s. caporiacoi (Taddei, 1949); s. cerbolensis (Taddei, 1949); s. ciclopica (Taddei, 1949); s. joachinimurati (Taddei, 1949); s. oristanensis (Taddei, 1949); s. roberti (Taddei, 1949); s. sanctinicolai (Taddei, 1949); s. scorteccii (Taddei, 1949); s. strombolensis (Taddei, 1949); s. ventotenensis (Taddei, 1949); s. patrizii (Lanza, 1952); s. liscabiancae (Mertens, 1952); s. trischittai (Mertens, 1952); s. taurinica (Taddei, 1953); s. zangherii (Taddei, 1953); s. salfi (Lanza, 1954); s. massinei (Mertens, 1961); s. pasquinii (Lanza, 1967); s. lanzai (Mertens, 1967); s. palmarolae (Mertens, 1967); s. paulae (Lanza, Adriani & Romiti, 1971); s. klemmeri (Lanza & Capolongo, 1972); s. amparoae Capolongo, 1979; s. aemiliani Capolongo, 1984. *Podarcis wagleriana*: Le subsp. valide sono forse soltanto due: w. wagleriana Gistel, 1868 [=w. catanensis (Taddei, 1949), descritta come *sicula catanensis* ("a Catania e Siracusa"); =w. marettimensis (Klemmer, 1956) (Isola di Marettimo; Egadi)] e w. raffonei (Mertens, 1952) (I. I. Strombolicchio, presso Stromboli; Eolie) [=w. alvearioi (Mertens, 1955), descritta come *sicula alvearioi* (I. I. Faraglione Pollara, presso Salina; Eolie); =w. antoninoi (Mertens, 1955) (Isola di Vulcano; Eolie); =w. cucchiara Di Palma, 1980, descritta come *sicula cucchiara* (Faraglione La Canna, presso Filicudi; Eolie)]. Probabilmente la subsp. raffonei merita di essere elevata a rango di specie.

Psammmodromus algirus: Presente solo sull'Isolotto dei Conigli presso Lampedusa (Isole Pelagie).

Scincidae

Chalcides Laurenti, 1768

Chalcides chalcides (Linnaeus, 1758) (E)

Chalcides chalcides chalcides (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)

Chalcides chalcides vittatus (Leuckart, 1828) (Sa)

Chalcides ocellatus (Forsskål, 1775) (*)

Chalcides ocellatus tiligugu (Gmelin, 1789) (Si, Sa)

Chalcides striatus (Cuvier, 1829) (N)

Note

Chalcides ocellatus: *C. ocellatus zavattarii* Lanza, 1954 (Lampedusa e I. I. dei Conigli) corrisponde quasi di sicuro a una forma ibrida fra *C. o. ocellatus* e *C. o. tiligugu*; *C. o. linosae* Boulenger, 1920 (I. I. Linosa; Pelagie) è probabilmente sinonimo di *C. o. tiligugu*.

Colubridae

Coluber Linnaeus, 1758

- Coluber gemonensis* (Laurenti, 1768) (N)
- Coluber hippocrepis* Linnaeus, 1758 (Si) (*)
- Coluber najadum* (Eichwald, 1831) (*)
- Coluber najadum dahlui* (Schinz, 1826) (N?)
- Coluber viridiflavus* Lacépède, 1789 (N, S, Si, Sa)

Coronella Laurenti, 1768

- Coronella austriaca* Laurenti,) 1768 (N, S, Si)
- Coronella girondica* (Daudin, 1803) (N, S)

Elaphe Fitzinger, 1833

- Elaphe longissima* (Laurenti, 1768)
- Elaphe longissima longissima* (Laurenti, 1768) (N, S)
- Elaphe longissima romana* (Suckow, 1798) (S, Si) (E)
- Elaphe quatuorlineata* (Lacépède, 1789)
- Elaphe quatuorlineata quatuorlineata* (Lacépède, 1789) (N, S, Si)
- Elaphe scalaris* (Schinz, 1822) (N)
- Elaphe situla* (Linnaeus, 1758) (S, Si)

Macroprotodon Guichenot, 1850

- Macroprotodon cucullatus* Geoffroy, 1827 (*)
- Macroprotodon cucullatus mauritanicus* Guichenot, 1850 (Si)

Malpolon Fitzinger, 1826

- Malpolon monspessulanus* (Hermann, 1804) (*)
- Malpolon monspessulanus monspessulanus* (Hermann, 1804) (N)
- Malpolon monspessulanus insignitus* (Geoffroy, 1827) (N, Si)

Natrix Laurenti, 1768

- Natrix maura* (Linnaeus, 1758) (N, Sa)
- Natrix natrix* (Linnaeus, 1758) (*)
- Natrix natrix natrix* Linnaeus,) 1758 (N)
- Natrix natrix calabra* Vanni & Lanza, in Lanza, 1983 (S) (E)
- Natrix natrix cetti* Gené, 1839 (Sa)
- Natrix natrix helvetica* (Lacépède, 1789) (N, S)
- Natrix natrix sicula* (Cuvier, 1829) (Si) (E)
- Natrix tessellata* (Laurenti, 1768) (N, S)

***Telescopus* Wagler, 1830**

Telescopus fallax (Fleischmann, 1831)

Telescopus fallax fallax (Fleischmann, 1831) (N)

Note

Coluber: Genere polifiletico; la corretta attribuzione generica delle specie ad esso comunemente attribuite è ancora in parte incerta. Comunque, sembra che *C. hippocrepis* vada attribuito al genere *Hemorrhois* Boie, 1826, mentre *C. gemonensis* e *C. viridiflavus* andrebbero ascritti al genere *Hierophis* Fitzinger, 1843; ancora non affrontato il problema relativo all'attribuzione generica del *C. najadum*.

Coluber hippocrepis: Per la Sicilia è noto solo di Pantelleria, la cui popolazione è stata attribuita alla subsp. endemica, probabilmente non valida, *C. hippocrepis nigrescens* Cattaneo, 1985.

Coluber najadum: Specie presente in Istria, ma sinora non segnalata di località politicamente italiane.

Macroprotodon cucullatus: Conosciuto solo di Lampedusa (Isole Pelagie).

Malpolon monspessulanus: Per la Sicilia è noto solo di Lampedusa (Isole Pelagie).

Natrix natrix: Probabilmente buona specie.

Viperidae

***Vipera* Laurenti, 1768**

Vipera ammodytes (Linnaeus, 1758)

Vipera ammodytes ammodytes (Linnaeus, 1758) (N)

Vipera aspis (Linnaeus, 1758)

Vipera aspis aspis (Linnaeus, 1758) (N)

Vipera aspis atra Meisner, 1820 (N)

Vipera aspis francisciredi Laurenti, 1768 (N, S)

Vipera aspis hugyi Schinz, 1833 (S, Si)

Vipera berus (Linnaeus, 1758)

Vipera berus berus (Linnaeus, 1758) (N)

Vipera ursinii (Bonaparte, 1835)

Vipera ursinii ursinii (Bonaparte, 1835) (S)

Aves

Gaviiformes

Gaviidae

***Gavia* Forster, 1788**

Gavia adamsii (Gray, 1859) (N, S)
Gavia arctica (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)
Gavia immer (Brünnich, 1764) (N, S)
Gavia stellata (Pontoppidan, 1763) (N, S)

Podicipediformes

Podicipedidae

Tachybaptus Reichenbach, 1853

Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) (N, S, Si, Sa)

Podiceps Latham, 1787

Podiceps auritus (Linnaeus, 1758) (N, S)
Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
Podiceps grisegena (Boddaert, 1783) (N, S)
Podiceps nigricollis (Brehm C. L., 1831) (N, S, Si, Sa)

Procellariiformes

Diomedeidae

Diomedea Linnaeus, 1758

Diomedea exulans Linnaeus, 1758 (Si)

Procellariidae

Fulmarus Stephens, 1826

Fulmarus glacialis (Linnaeus, 1761) (N)

Daption Stephens, 1826

Daption capense (Linnaeus, 1758) (Si)

Bulweria Bonaparte, 1843

Bulweria fallax Jouanin, 1955 (N)
Bulweria bulwerii (Jardin & Selby, 1828) (N)

Calonectris Scopoli, 1769

Calonectris diomedea (Scopoli, 1769) (N, S, Si, Sa)

Puffinus Brisson, 1760

Puffinus assimilis Gould, 1838 (N, S, Sa)

Puffinus gravis (O'Reilly, 1818) (Sa)

Puffinus griseus (Gmelin, 1789) (N, S, Si)

Puffinus puffinus (Brünnich, 1764) (N, S, Si, Sa)

Hydrobatidae

Oceanites Keyserling & Blasius, 1840

Oceanites oceanicus (Kuhl, 1820) (Sa)

Hydrobates Boie, 1822

Hydrobates pelagicus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Oceanodroma Reichenbach, 1852

Oceanodroma leucorhoa (Vieillot, 1817) (N, S, Si, Sa)

Pelecaniformes

Sulidae

Sula Brisson, 1760

Sula bassana (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Phalacrocoracidae

Phalacrocorax Brisson, 1760

Phalacrocorax aristotelis (Linnaeus, 1761) (N, S, Si, Sa)

Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Phalacrocorax pygmaeus (Pallas, 1773) (N, S) (*)

Note

Phalacrocorax pygmaeus: Non più segnalata come nidificante dal 1981.

Pelecanidae

Pelecanus Linnaeus, 1758

Pelecanus crispus Bruch, 1832 (S)

Pelecanus onocrotalus Linnaeus, 1758 (N, S)

Ciconiiformes

Ardeidae

Botaurus Stephens, 1819

Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758) (N, S, Sa)

Ixobrychus Billberg, 1828

Ixobrychus eurhythmus (Swinhoe, 1873) (N)

Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766) (N, S, Si, Sa)

Nycticorax Forster T., 1817

Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Ardeola Boie, 1822

Ardeola ralloides (Scopoli, 1769) (N, S, Si, Sa)

Bubulcus Bonaparte, 1855

Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Egretta Forster T., 1817

Egretta alba (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) (N, S, Si, Sa)

Egretta gularis (Bosc, 1792) (N, S, Si, Sa) (*)

Ardea Linnaeus, 1758

Ardea cinerea Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)

Ardea purpurea Linnaeus, 1766 (N, S, Si, Sa)

Note

Egretta gularis: Soggetti di provenienza non naturale nella penisola e in Sardegna.

Ciconiidae

Ciconia Brisson, 1760

Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Threskiornithidae

Plegadis Kaup, 1829

Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766) (N, S, Si, Sa)

Platalea Linnaeus, 1758

Platalea leucorodia Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)

Phoenicopteriformes

Phoenicopteridae

Phoenicopus Linnaeus, 1758

Phoenicopus ruber Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa) (*)

Note

Phoenicopus ruber: Tentativi di nidificazione in Sardegna nel periodo 1975-82.

Anseriformes

Anatidae

Cygnus Bechstein, 1803

Cygnus columbianus (Ord, 1815) (N, S)

Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758) (N, S)

Cygnus olor (Gmelin, 1789) (N, S)

Anser Brisson, 1760

Anser albifrons (Scopoli, 1769) (N, S)
Anser anser (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
Anser brachyrhynchus Baillon, 1833 (N, S)
Anser caerulescens (Linnaeus, 1758) (N)
Anser erythropus (Linnaeus, 1758) (N, S)
Anser fabalis (Latham, 1787) (N, S)

Branta Scopoli, 1769

Branta bernicla (Linnaeus, 1758) (N)
Branta canadensis (Linnaeus, 1758) (N, S)
Branta leucopsis (Bechstein, 1803) (N)
Branta ruficollis (Pallas, 1764) (N, S)

Tadorna Boie, 1822

Tadorna ferruginea (Pallas, 1764) (N, S)
Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Aix Boie, 1828

Aix galericulata (Linnaeus, 1758) (N)

Anas Linnaeus, 1758

Anas acuta Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)
Anas americana Gmelin, 1789 (N, S)
Anas clypeata Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)
Anas crecca Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)
Anas discors Linnaeus, 1766 (N)
Anas formosa Georgi, 1775 (N)
Anas penelope Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)
Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)
Anas querquedula Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)
Anas strepera Linnaeus, 1758 (N, S)

Marmaronetta Reichenbach, 1852

Marmaronetta angustirostris (Ménétriés, 1832) (N, S, Si, Sa)

Netta Kaups, 1824

Netta rufina (Pallas, 1773) (N, S, Si, Sa)

Aythya Boie, 1822

Aythya ferina (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
Aythya fuligula (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
Aythya marila (Linnaeus, 1761) (N, S, Si, Sa)
Aythya nyroca (Güldenstädt, 1770) (N, S, Si, Sa)

Somateria Leach, 1819

Somateria mollissima (Linnaeus, 1758) (N, S)
Somateria spectabilis (Linnaeus, 1758) (N)

Histrionicus Lesson, 1828

Histrionicus histrionicus (Linnaeus, 1758) (N, S)

Clangula Leach, 1819

Clangula hyemalis (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Melanitta Boie, 1822

Melanitta fusca (Linnaeus, 1758) (N, S, Sa)
Melanitta nigra (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)

Bucephala Baird, 1858

Bucephala clangula (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Mergus Linnaeus, 1758

Mergus albellus Linnaeus, 1758 (N, S)
Mergus merganser Linnaeus, 1758 (N, S)
Mergus serrator Linnaeus, 1758 (N, S)

Oxyura Bonaparte, 1828

Oxyura jamaicensis (Gmelin, 1789) (S, Sa)
Oxyura leucocephala (Scopoli, 1769) (N, S, Si, Sa) (*)

Note

Oxyura leucocephala: Probabilmente estinta come nidificante in Sardegna dal 1976.

Accipitriformes

Accipitridae

Pernis Cuvier, 1816

Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Elanus Savigny, 1809

Elanus caeruleus (Desfontaines, 1789) (N, S)

Milvus Lacépède, 1799

Milvus migrans (Boddaert, 1783) (N, S, Si, Sa)

Milvus milvus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Haliaeetus Savigny, 1809

Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa) (*)

Gypaetus Storr, 1874

Gypaetus barbatus (Linnaeus, 1758) (N, S, Sa) (*)

Neophron Savigny, 1809

Neophron percnopterus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Gyps Savigny, 1809

Gyps fulvus (Hablizl, 1783) (N, S, Si, Sa)

Aegypius Savigny, 1809

Aegypius monachus (Linnaeus, 1766) (N, S, Sa) (*)

Circaetus Vieillot, 1816

Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) (N, S, Si, Sa)

Circus Lacépède, 1799

Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) (N, S, Si, Sa) (*)

Circus macrourus (Gmelin, 1771) (N, S, Si, Sa)

Circus pygargus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Accipiter Brisson, 1760

Accipiter brevipes (Severtzov, 1850) (S)
Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Buteo Lacépède 1799

Buteo buteo (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
Buteo lagopus (Pontoppidan, 1763) (N, S)
Buteo rufinus (Cretzschmar, 1827) (N, S, Si, Sa)

Aquila Brisson 1760

Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa) (*)
Aquila clanga Pallas, 1811 (N, S, Si)
Aquila heliaca Savigny, 1809 (N, S, Si)
Aquila pomarina Brehm C. L., 1831 (N, S, Si, Sa)
Aquila rapax (Temminck, 1828) (N, S, Sa)

Hieraaetus Kaup, 1844

Hieraaetus fasciatus (Vieillot, 1822) (S, Si, Sa) (*)
Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788) (N, S, Si, Sa)

Note

Haliaeetus albicilla: Estinta come stanziale nidificante in Sardegna dal 1956.
Gypaetus barbatus: Estinta come nidificante in Sardegna dal 1965 circa.
Aegypius monachus: Estinta come nidificante in Sardegna dal 1961 circa.
Circus cyaneus: Estinta come nidificante in Padania negli anni '50.
Aquila chrysaetos: Lo status di migratore è riferito agli immaturi erratici.
Hieraaetus fasciatus: Come 454.0.001.0.

Pandionidae

Pandion Savigny, 1809

Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa) (*)

Note

Pandion haliaetus: Estinta come nidificante in Sardegna nel periodo 1965-68.

Falconiformes

Falconidae

Falco Linnaeus, 1758

Falco biarmicus Temminck, 1825 (N, S, Si, Sa) (*)
Falco cherrug Gray, 1834 (N, S, Si, Sa)
Falco columbarius Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)
Falco eleonora G  n  , 1834 (N, S, Si, Sa)
Falco naumanni Fleischer, 1818 (N, S, Si, Sa)
Falco pelegrinoides Temminck, 1829 (N, S, Si, Sa)
Falco peregrinus Tunstall, 1771 (N, S, Si, Sa) (*)
Falco subbuteo Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)
Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)
Falco vespertinus Linnaeus, 1766 (N, S, Si, Sa)

Note

Falco biarmicus: Come 454.0.001.0., ma anche adulti.
Falco peregrinus: Come 457.0.001.0.

Galliformes

Tetraonidae

Bonasa Stephens, 1819

Bonasa bonasia (Linnaeus, 1758) (N)

Lagopus Brisson, 1760

Lagopus mutus (Montin, 1776) (N)

Tetrao Linnaeus, 1758

Tetrao tetrix Linnaeus, 1758 (N)
Tetrao urogallus Linnaeus, 1758 (N)

Phasianidae

Colinus Goldfuss, 1820

Colinus virginianus (Linnaeus, 1758) (N) (*)

Alectoris Kaup, 1829

Alectoris barbara (Bonnaterre, 1790) (Sa)

Alectoris graeca (Meisner, 1804) (N, S, Si) (*)
Alectoris rufa (Linnaeus, 1758) (N, S) (*)

Francolinus Stephens, 1819

Francolinus francolinus (Linnaeus, 1766) (S) (*)

Perdix Brisson, 1760

Perdix perdix (Linnaeus, 1758) (N, S) (*)

Coturnix Bonnaterre, 1791

Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Phasianus Linnaeus, 1758

Phasianus colchicus Linnaeus, 1758 (N, S)

Note

Colinus virginianus: Naturalizzata.

Alectoris graeca: Ripopolamenti con popolazioni alloctone.

Alectoris rufa: Ripopolamenti con popolazioni alloctone.

Francolinus francolinus: Estinta come nidificante in Sicilia nel 1870; riacclimatata in Toscana.

Perdix perdix: Ripopolamenti con popolazioni alloctone.

Gruiformes

Rallidae

Rallus Linnaeus, 1758

Rallus aquaticus Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)

Porzana Vieillot 1816

Porzana parva (Scopoli, 1769) (N, S, Si, Sa)

Porzana porzana (Linnaeus, 1766) (N, S, Si, Sa)

Porzana pusilla (Pallas, 1776) (N, S, Si, Sa)

Crex Bechstein, 1803

Crex crex (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Gallinula Brisson, 1760

Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Porphyryla Blyth, 1852

Porphyryla alleni (Thomson, 1842) (N, S, Si)

Porphyrio Brisson 1760

Porphyrio porphyrio (Linnaeus, 1758) (N, Si, Sa) (*)

Fulica Linnaeus, 1758

Fulica atra Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)

Fulica cristata Gmelin, 1789 (Si, Sa)

Note

Porphyrio porphyrio: Estinta in Sicilia.

Turnicidae

Turnix Bonnaterre, 1791

Turnix sylvatica (Desfontaines, 1787) (Si) (*)

Note

Turnix sylvatica: Estinta come nidificante stanziale in Sicilia nel 1920 circa.

Gruidae

Grus Pallas, 1766

Grus grus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa) (*)

Anthropoides Vieillot, 1816

Anthropoides virgo (Linnaeus, 1758) (S, Si)

Note

Grus grus: Estinta come nidificante in Veneto nel 1909 circa.

Otididae

Tetrax Forster, 1817

Tetrax tetrax (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa) (*)

Chlamydotis Lesson, 1838

Chlamydotis undulata (Jacquin, 1784) (N, S, Si)

Otis Linnaeus, 1758

Otis tarda Linnaeus, 1758 (N, S, Si)

Note

Tetrax tetrax: Estinta come nidificante al Nord e in Sicilia attorno al 1960.

Charadriiformes

Haematopodidae

Haematopus Linnaeus, 1758

Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)

Recurvirostridae

Himantopus Brisson, 1760

Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Recurvirostra Linnaeus, 1758

Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)

Burhinidae

Burhinus Illiger, 1811

Burhinus oediconemus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Glareolidae

Cursorius Latham, 1790

Cursorius cursor (Latham, 1787) (N?, S?, Si?, Sa?)

Glareola Brisson, 1760

Glareola nordmanni Nordmann, 1842 (N, S, Si)

Glareola pratincola (Linnaeus, 1766) (N, S, Si, Sa)

Charadriidae

Charadrius Linnaeus, 1758

Charadrius alexandrinus Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)

Charadrius asiaticus Pallas, 1773 (S, Si)

Charadrius dubius Scopoli, 1786 (N, S, Si, Sa)

Charadrius hiaticula Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)

Charadrius morinellus Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)

Pluvialis Brisson, 1760

Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Pluvialis dominica (Muller P. L. S., 1776) (N, S, Si)

Pluvialis squatarola (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Hoplopterus Bonaparte, 1831

Hoplopterus spinosus (Linnaeus, 1758) (N)

Chettusia Bonaparte, 1841

Chettusia gregaria (Pallas, 1771) (N?, S?, Si)

Chettusia leucura (Lichtenstein, 1823) (Si)

Vanellus Brisson, 1760

Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Scolopacidae

Calidris Anonymus , 1804

Calidris alba (Pallas, 1756) (N, S, Si, Sa)

Calidris alpina (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Calidris canutus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763) (N, S, Si, Sa)

Calidris maritima (Brünnich, 1764) (N?, S?, Sa?)

Calidris melanotos (Vieillot, 1819) (N, Si)

Calidris minuta (Leisler, 1812) (N, S, Si, Sa)

Calidris temminckii (Leisler, 1812) (N, S, Si, Sa)

Limicola Koch, 1816

Limicola falcinellus (Pontoppidan, 1763) (N, S, Si, Sa)

Tryngites Cabanis, 1856

Tryngites subruficollis (Vieillot, 1819) (S, Si)

Philomachus Anonymus , 1804

Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Lymnocyptes Boie, 1826

Lymnocyptes minimus (Brunnich, 1746) (N, S, Si, Sa)

Gallinago Brisson, 1760

Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Gallinago media (Latham, 1787) (N, S, Si, Sa)

Limnodromus Wien, 1833

Limnodromus scolopaceus (Say, 1823) (S)

Scolopax Linnaeus, 1758

Scolopax rusticola Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)

Limosa Brisson, 1760

Limosa lapponica (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Limosa limosa (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Numenius Brisson, 1760

Numenius arquata (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Numenius phaeopus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Numenius tenuirostris Vieillot, 1817 (N, S, Si, Sa)

Bartramia Lesson, 1831

Bartramia longicauda (Bechstein, 1812) (N, S, Si)

Tringa Linnaeus, 1758

Tringa erythropus (Pallas, 1746) (N, S, Si, Sa)
Tringa flavipes (Gmelin, 1789) (S, Sa)
Tringa glareola Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)
Tringa nebularia (Gunnerus, 1767) (N, S, Si, Sa)
Tringa ochropus Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)
Tringa stagnatilis (Bechstein, 1803) (N, S, Si, Sa)
Tringa totanus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Xenus Kaup, 1829

Xenus cinereus (Güldenstädt, 1774) (N?, S?, Si?, Sa?)

Actitis Illiger, 1811

Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
Actitis macularia (Linnaeus, 1766) (N)

Arenaria Brisson, 1760

Arenaria interpres (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Phalaropus Brisson, 1760

Phalaropus fulicarius (Linnaeus, 1758) (N?, S, Si, Sa)
Phalaropus lobatus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
Phalaropus tricolor (Vieillot, 1819) (N)

Stercorariidae

Stercorarius Brisson, 1760

Stercorarius longicaudus Vieillot, 1819 (N?, S?, Si, Sa?)
Stercorarius parasiticus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
Stercorarius pomarinus (Temminck, 1815) (N, S, Si, Sa)
Stercorarius skua (Brünnich, 1764) (N?, S?, Si?, Sa?)

Laridae

Larus Linnaeus, 1758

Larus argentatus Pontoppidan, 1763 (N, S?, Si?, Sa?)
Larus audouinii Payraudeau, 1826 (N, S, Si, Sa)
Larus cachinnans Pallas, 1811 (N, S, Si, Sa)

Larus canus Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)
Larus fuscus Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)
Larus genei Breme, 1839 (N, S, Si, Sa)
Larus glaucoides Meyer, 1822 (N)
Larus hyperboreus Gunnerus, 1767 (N, S, Sa)
Larus ichthyaetus Pallas, 1773 (Sa)
Larus marinus Linnaeus, 1758 (N?, S?, Si?, Sa?)
Larus melanocephalus Temminck, 1820 (N, S, Si, Sa)
Larus minutus Pallas, 1776 (N, S, Si, Sa)
Larus ridibundus Linnaeus, 1766 (N, S, Si, Sa)
Larus sabini Sabine, 1818 (N)

Rhodostethia MacGillivray, 1824

Rhodostethia rosea (MacGillivray, 1824) (Sa)

Rissa Stephens 1826

Rissa tridactyla (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Pagophila Kaup, 1829

Pagophila eburnea (Phipps, 1774) (N)

Sternidae

Gelochelidon Brehm, 1830

Gelochelidon nilotica (Gmelin, 1789) (N, S, Si, Sa)

Sterna Linnaeus, 1758

Sterna albifrons Pallas, 1764 (N, S, Si, Sa)
Sterna bengalensis Lesson, 1831 (S, Si)
Sterna caspia Pallas, 1770 (N, S, Si, Sa)
Sterna dougallii Montagu, 1813 (S, Si, Sa)
Sterna fuscata Linnaeus, 1776 (N, S)
Sterna hirundo Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)
Sterna paradisaea Pontoppidan, 1763 (N, S, Si, Sa)
Sterna sandvicensis Latham, 1878 (N, S, Si, Sa)

Chlidonias Rafinesque, 1822

Chlidonias hybridus (Pallas, 1811) (N, S, Si, Sa)
Chlidonias leucopterus (Temminck, 1815) (N, S, Si, Sa)
Chlidonias niger (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Alcidae

Uria Brisson, 1760

Uria aalge (Pontoppidan, 1763) (N?, S?, Si?, Sa?)

Alca Linnaeus, 1758

Alca torda Linnaeus, 1758 (N, S, Si?, Sa)

Alle Link, 1807

Alle alle (Linnaeus, 1758) (N, S)

Fratercula Brisson, 1760

Fratercula arctica (Linnaeus, 1758) (N?, S?, Si?, Sa)

Pteroclidiformes

Pteroclididae

Pterocles Temminck, 1815

Pterocles alchata (Linnaeus, 1766) (N, S, Si, Sa)

Pterocles senegallus (Linnaeus, 1771) (Si)

Syrrhaptes Illiger, 1811

Syrrhaptes paradoxus (Pallas, 1773) (N, S)

Columbiformes

Columbidae

Columba Linnaeus, 1758

Columba livia Gmelin, 1789 (N, S, Si, Sa)

Columba oenas Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)

Columba palumbus Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)

Streptopelia Bonaparte, 1855

Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838) (N, S, Si, Sa)

Streptopelia orientalis (Latham, 1790) (N)

Streptopelia senegalensis Linnaeus, 1766 (Si)

Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Cuculiformes

Cuculidae

Clamator Kaup, 1829

Clamator glandarius (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Cuculus Linnaeus, 1758

Cuculus canorus Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)

Coccyzus Vieillot, 1816

Coccyzus americanus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)

Coccyzus erythrophthalmus (Wilson, 1811) (N, S)

Strigiformes

Tytonidae

Tyto Billberg, 1828

Tyto alba (Scopoli, 1769) (N, S, Si, Sa)

Strigidae

Otus Pennant, 1769

Otus scops (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Bubo Duméril, 1806

Bubo bubo (Linnaeus, 1758) (N, S)

Glaucidium Boie, 1826

Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758) (N)

Athene Boie, 1822

Athene noctua (Scopoli, 1769) (N, S, Si, Sa)

Strix Linnaeus, 1758

Strix aluco Linnaeus, 1758 (N, S, Si)

Strix uralensis Pallas, 1771 (N)

Asio Schaeffer, 1779

Asio flammeus (Pontoppidan, 1763) (N, S, Si, Sa)

Asio otus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Aegolius Kaup, 1829

Aegolius funereus (Linnaeus, 1758) (N)

Caprimulgiformes

Caprimulgidae

Caprimulgus Linnaeus, 1758

Caprimulgus aegyptius Lichtenstein, 1823 (N, S, Si, Sa)

Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)

Caprimulgus ruficollis Temminck, 1820 (Si)

Apodiformes

Apodidae

Apus Scopoli, 1777

Apus affinis (Gray G. E., 1830) (N, S)

Apus apus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Apus melba (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Apus pallidus (Shelley, 1870) (N, S, Si, Sa)

Coraciiformes

Alcedinidae

Alcedo Linnaeus, 1758

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Meropidae

Merops Linnaeus, 1758

Merops apiaster Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)

Merops superciliosus Linnaeus, 1766 (S, Si, Sa)

Coraciidae

Coracias Linnaeus, 1758

Coracias garrulus Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)

Upupidae

Upupa Linnaeus, 1758

Upupa epops Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)

Piciformes

Picidae

Jynx Linnaeus, 1758

Jynx torquilla Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)

Picus Linnaeus, 1758

Picus canus Gmelin, 1788 (N)

Picus viridis Linnaeus, 1758 (N, S, Si)

Dryocopus Boie, 1826

Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)

Picoides Lacépède, 1799

- Picoides leucotos* (Bechstein, 1803) (S)
- Picoides major* (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
- Picoides medius* (Linnaeus, 1758) (S)
- Picoides minor* (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)
- Picoides tridactylus* (Linnaeus, 1758) (N)

Passeriformes

Alaudidae

Ammomanes Cabanis, 1851

- Ammomanes cincturus* (Gould, 1812) (S, Si)

Alaemon Keyserling & Blasius, 1840

- Alaemon alaudipes* (Desfontaines, 1748) (S)

Chersophilus Sharpe, 1890

- Chersophilus duponti* (Vieillot, 1820) (S?)

Melanocorypha Boie, 1828

- Melanocorypha bimaculata* Ménétriés, 1832 (S, Si)
- Melanocorypha calandra* (Linnaeus, 1766) (N, S, Si, Sa)
- Melanocorypha leucoptera* Pallas, 1811 (N, S, Si, Sa)
- Melanocorypha yeltonensis* Forster, 1768 (N, Si)

Calandrella Kaup, 1829

- Calandrella brachydactyla* (Leisler, 1814) (N, S, Si, Sa)
- Calandrella rufescens* (Vieillot, 1820) (S, Si)

Galerida Boie, 1828

- Galerida cristata* (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Lullula Kaup, 1829

- Lullula arborea* (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Alauda Linnaeus, 1758

Alauda arvensis Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)

Eremophila Boie, 1828

Eremophila alpestris (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa?)

Hirundinidae

Riparia Forster T. I. M., 1817

Riparia riparia (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Ptyonoprogne Reichenbach, 1850

Ptyonoprogne rupestris (Scopoli, 1769) (N, S, Si, Sa)

Hirundo Linnaeus, 1758

Hirundo daurica Linnaeus, 1771 (N, S, Si?, Sa)

Hirundo rustica Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)

Delichon Horsfeld e Mootre, 1854

Delichon urbica (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Motacillidae

Anthus Bechstein, 1805

Anthus campestris Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)

Anthus cervinus Pallas, 1811 (N, S, Si, Sa?)

Anthus novaeseelandiae Bechstein, 1805 (N, S, Si?, Sa?)

Anthus pratensis Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)

Anthus rubescens Tunstall, 1771 (N)

Anthus spinoletta Linnaeus, 1758 (N, S, Si?, Sa)

Anthus trivialis Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)

Motacilla Linnaeus, 1758

Motacilla alba Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)

Motacilla cinerea Tunstall, 1771 (N, S, Si, Sa)

Motacilla citreola Pallas, 1776 (N, S, Si)

Motacilla flava Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)

Icteridae

Dolichonyx Swainson, 1827

Dolichonyx oryzivorus (Linnaeus, 1758) (S)

Bombycillidae

Bombycilla Vieillot, 1808

Bombycilla garrulus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si?, Sa?)

Cinclidae

Cinclus Borkhausen, 1797

Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)

Troglodytidae

Troglodytes Vieillot, 1807

Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Prunellidae

Prunella Vieillot, 1816

Prunella collaris (Scopoli, 1769) (N, S, Si, Sa)

Prunella modularis Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)

Prunella montanella Pallas, 1770 (N)

Turdidae

Cercotrichas Boie, 1831

Cercotrichas galactotes (Temminck, 1820) (S, Si, Sa)

Erithacus Cuvier 1800

Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Luscinia Forster T., 1817

Luscinia calliope Pallas, 1776 (N, S)
Luscinia luscinia Linnaeus, 1758 (N, S, Si?, Sa?)
Luscinia megarhynchos Brehm, 1831 (N, S, Si, Sa)
Luscinia svecica Linnaeus, 1758 (N, S?, Si, Sa)

Tarsiger Hodgson, 1845

Tarsiger cyanurus Pallas, 1773 (N, S?)

Phoenicurus Forster T., 1817

Phoenicurus moussieri Olphe-Galliard, 1852 (S)
Phoenicurus ochrurus Gmelin, 1789 (N, S, Si, Sa)
Phoenicurus phoenicurus Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)

Saxicola Bechstein, 1803

Saxicola rubetra Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)
Saxicola torquata Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)

Oenanthe Vieillot, 1816

Oenanthe deserti Temminck, 1825 (S?, Si?, Sa?)
Oenanthe hispanica Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)
Oenanthe isabellina Temminck, 1829 (Si)
Oenanthe leucura Gmelin, 1789 (N?, S?, Si?, Sa?)
Oenanthe oenanthe Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)
Oenanthe pleschanka Lepechin, 1770 (N, S, Si, Sa)

Monticola Boie, 1822

Monticola saxatilis Linnaeus, 1766 (N, S, Si, Sa?)
Monticola solitarius Linnaeus, 1758 (N?, S, Si, Sa)

Zoothera Vigors, 1832

Zoothera dauma Latham, 1790 (N, S)
Zoothera sibirica Pallas, 1776 (N, S)

Catharus Bonaparte, 1850

Catharus minimus (Lafresnaye, 1848) (S)
Catharus ustulatus Nuttall, 1840 (N)

Turdus Linnaeus, 1758

Turdus iliacus Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)

Turdus merula Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)
Turdus naumanni Temminck, 1820 (N, S, Si, Sa?)
Turdus obscurus Gmelin, 1789 (N, S, Si?, Sa)
Turdus philomelos Brehm, 1831 (N, S, Si, Sa)
Turdus pilaris Linnaeus, 1758 (N, S, Si?, Sa)
Turdus ruficollis Pallas, 1776 (N, S)
Turdus torquatus Linnaeus, 1758 (N, S, Si?, Sa?)
Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)

Sylviidae

Cettia Bonaparte, 1834

Cettia cetti (Temminck, 1820) (N, S, Si, Sa)

Cisticola Kaup, 1929

Cisticola juncidis (Rafinesque, 1810) (N, S, Si, Sa)

Locustella Kaup, 1929

Locustella luscinioides (Savi, 1824) (N, S, Si?, Sa)
Locustella naevia (Boddaert, 1783) (N?, S?, Si, Sa)

Acrocephalus Naumann J.A. & Naumann J.F., 1811

Acrocephalus arundinaceus Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)
Acrocephalus dumetorum Blyth, 1849 (S)
Acrocephalus melanopogon (Temminck, 1823) (N, S, Si, Sa)
Acrocephalus paludicola Vieillot, 1817 (N?, S?, Si?, Sa?)
Acrocephalus palustris Bechstein, 1798 (N, S, Si, Sa)
Acrocephalus schoenobaenus Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)
Acrocephalus scirpaceus Hermann, 1804 (N, S, Si, Sa)

Hippolais Conrad von Baldenstein 1827

Hippolais icterina Vieillot, 1817 (N?, S, Si, Sa)
Hippolais olivetorum Strickland, 1837 (S)
Hippolais pallida (Hemprich & Ehrenberg, 1833) (N, S, Si, Sa?)
Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817) (N, S, Si, Sa)

Sylvia Scopoli, 1769

Sylvia atricapilla Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)
Sylvia borin Boddaert, 1783 (N, S, Si, Sa)
Sylvia cantillans Pallas, 1784 (N, S, Si, Sa)
Sylvia communis Latham, 1787 (N, S, Si, Sa)

Sylvia conspicillata Temminck, 1820 (N?, S, Si, Sa)
Sylvia curruca Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)
Sylvia hortensis (Gmelin, 1789) (N, S, Si, Sa)
Sylvia melanocephala Gmelin, 1789 (N, S, Si, Sa)
Sylvia nana (Hemprich & Ehrenberg, 1833) (Si)
Sylvia nisia Bechstein, 1795 (N, S, Si, Sa)
Sylvia rueppellii Temminck, 1820 (N, S, Si?)
Sylvia sarda Temminck, 1830 (N?, S, Si, Sa)
Sylvia undata (Boddaert, 1783) (N, S, Si, Sa)

***Phylloscopus* Boie, 1826**

Phylloscopus bonelli Vieillot, 1819 (N, S, Si, Sa)
Phylloscopus borealis (Blasius, 1858) (N, S)
Phylloscopus collybita Vieillot, 1817 (N, S, Si, Sa)
Phylloscopus fuscatus Blyth, 1842 (N, S)
Phylloscopus inornatus Blyth, 1842 (N, S, Si?, Sa?)
Phylloscopus sibilatrix Bechstein, 1793 (N, S, Si, Sa)
Phylloscopus trochilus Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)

***Regulus* Cuvier, 1800**

Regulus ignicapillus Temminck, 1820 (N, S, Si, Sa)
Regulus regulus Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)

Muscicapidae

***Muscicapa* Brisson 1760**

Muscicapa striata Pallas, 1764 (N, S, Si, Sa)

***Ficedula* Brisson, 1760**

Ficedula albicollis Temminck, 1815 (N, S, Si, Sa)
Ficedula hypoleuca Pallas, 1764 (N?, S?, Si, Sa)
Ficedula parva Bechstein, 1794 (N, S, Si, Sa)
Ficedula semitorquata (Homeyer E., 1885) (N?, S?, Si, Sa?)

Timaliidae

***Panurus* Koch, 1816**

Panurus biarmicus Linnaeus, 1758 (N, Sa)

Aegithalidae

Aegithalos Hermann, 1804

Aegithalos caudatus Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa?)

Paridae

Parus Linnaeus, 1758

Parus ater Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)

Parus caeruleus Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)

Parus cristatus Linnaeus, 1758 (N)

Parus lugubris Temminck, 1820 (N, S, Si, Sa?)

Parus major Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)

Parus montanus Conrad, 1827 (N, S)

Parus palustris Linnaeus, 1758 (N, S, Si)

Sittidae

Sitta Linnaeus, 1758

Sitta europaea Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa?)

Tichodromadidae

Tichodroma Linnaeus, 1766

Tichodroma muraria Linnaeus, 1766 (N, S, Si?, Sa)

Certhiidae

Certhia Linnaeus, 1758

Certhia brachydactyla Brehm, 1820 (N, S, Si, Sa?)

Certhia familiaris Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa?)

Remizidae

Remiz Jarocki, 1819

Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)

Oriolidae

Oriolus Linnaeus, 1766

Oriolus oriolus Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)

Laniidae

Lanius Linnaeus, 1758

Lanius collurio Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)

Lanius excubitor Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa?)

Lanius minor Gmelin, 1788 (N, S, Si, Sa)

Lanius senator Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)

Corvidae

Garrulus Brisson, 1760

Garrulus glandarius Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)

Pica Brisson, 1760

Pica pica (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Nucifraga Brisson, 1760

Nucifraga caryocatactes (Linnaeus, 1758) (N)

Pyrrhonorax Tunstall, 1771

Pyrrhonorax graculus (Linnaeus, 1758) (N, S)

Pyrrhonorax pyrrhonorax (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Corvus Linnaeus, 1758

Corvus corax Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)

Corvus corone Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)

Corvus frugilegus Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa?)

Corvus monedula Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)

Sturnidae

Sturnus Linnaeus, 1758

Sturnus roseus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
Sturnus unicolor Temminck, 1820 (Si, Sa)
Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)

Passeridae

Passer Brisson, 1760

Passer domesticus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
Passer hispaniolensis (Temminck, 1820) (S?, Si, Sa)
Passer montanus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Petronia Kaup, 1829

Petronia petronia (Linnaeus, 1766) (N, S, Si, Sa)

Montifringilla Brehm, 1828

Montifringilla nivalis (Linnaeus, 1766) (N, S)

Fringillidae

Fringilla Linnaeus, 1758

Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)
Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758 (N, S)

Serinus Koch, 1816

Serinus citrinella (Pallas, 1764) (N, S, Sa)
Serinus serinus (Linnaeus, 1766) (N, S, Si, Sa)

Carduelis Brisson, 1760

Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
Carduelis chloris (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
Carduelis flammea (Linnaeus, 1758) (N, S?)
Carduelis flavirostris (Linnaeus, 1758) (N?, S?)
Carduelis spinus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Loxia Linnaeus, 1758

Loxia curvirostra Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)
Loxia leucoptera Gmelin, 1789 (N, S)

Loxia pytyopsittacus Borkhausen, 1793 (N, S?, Si?)

Bucanetes Cabanis, 1851

Bucanetes githagineus (Lichtenstein, 1823) (Si)

Carpodacus Kaup, 1829

Carpodacus erythrinus (Pallas, 1770) (N)

Pinicola Vieillot, 1808

Pinicola enucleator (Linnaeus, 1758) (N)

Pyrrhula Brisson, 1760

Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758) (N, S)

Coccothraustes Brisson, 1760

Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Emberizidae

Zonotrichia Swainson, 1832

Zonotrichia iliaca (Merrem, 1786) (N)

Calcarius Bechstein, 1802

Calcarius lapponicus (Linnaeus, 1758) (N, S)

Plectrophenax Stejneger, 1882

Plectrophenax nivalis (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Emberiza Linnaeus, 1758

Emberiza aureola Pallas, 1766 (N, S, Si?, Sa?)

Emberiza bruniceps Brandt, 1841 (N, S)

Emberiza caesia Cretzschmar, 1826 (N, S)

Emberiza cia Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa?)

Emberiza cioides Brandt, 1843 (N)

Emberiza cirrus Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)

Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 (N, S, Si)

Emberiza hortulana Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)

Emberiza leucocephalos Gmelin, 1771 (N, S, Si?, Sa?)

Emberiza melanocephala Scopoli, 1769 (N?, S?)
Emberiza pusilla Pallas, 1766 (N, S, Si?, Sa?)
Emberiza rustica Pallas, 1766 (N, S, Si?, Sa?)
Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Miliaria Brehm, 1831

Miliaria calandra (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Mammalia

Insectivora

Erinaceidae

Erinaceus Linnaeus, 1758

Erinaceus concolor Martin, 1838 (N)
Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)

Soricidae

Sorex Linnaeus, 1758

Sorex alpinus Schinz, 1837 (N)
Sorex araneus Linnaeus, 1758 (N, S)
Sorex minutus Linnaeus, 1766 (N, S)
Sorex samniticus Altobello, 1926 (N, S) (E)

Neomys Kaup, 1829

Neomys anomalus Cabrera, 1907 (N, S)
Neomys fodiens (Pennant, 1771) (N, S)

Suncus Ehrenberg, 1833

Suncus etruscus (Savi, 1822) (N, S, Si, Sa)

Crocidura Wagler, 1832

Crocidura leucodon (Hermann, 1780) (N, S)
Crocidura russula (Hermann, 1780) (*)
Crocidura russula ichnusae Festa, 1912 (Sa) (E)
Crocidura russula cossyrensis Contoli in Contoli et al., 1989 (Si) (E)

Crocidura sicula Miller, 1901 (Si) (E) (*)
Crocidura suaveolens (Pallas, 1811) (N, S)

Note

Crocidura russula: Endemica dell'Isola di Pantelleria.
Crocidura sicula: Presente anche nelle Isole Maltesi.

Talpidae

Talpa Linnaeus, 1758

Talpa caeca Savi, 1822 (N, S)
Talpa europaea Linnaeus, 1758 (N, S)
Talpa romana Thomas, 1902 (S) (E) (*)

Note

Talpa romana: Vecchi reperti in Sicilia non più confermati da dati recenti.

Chiroptera

Rhinolophidae

Rhinolophus Lacépède, 1799

Rhinolophus blasii Peters, 1866 (N) (*)
Rhinolophus euryale Blasius, 1853 (N, S, Si, Sa)
Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) (N, S, Si, Sa)
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) (N, S, Si, Sa)
Rhinolophus mehelyi Matschie, 1901 (S, Sa) (*)

Note

Rhinolophus blasii: La presenza a Sud, in Sicilia e in Sardegna risulta incerta.
Rhinolophus mehelyi: La presenza in Sicilia richiede conferma.

Vespertilionidae

Myotis Kaup, 1829

Myotis bechsteini (Leisler in Kuhl, 1818) (N, S)
Myotis blythi (Tomes, 1857) (*)
Myotis blythi oxygnathus (Monticelli, 1885) (N, S, Si)

Myotis blythi punicus Felten, 1977 (Sa)
Myotis brandti (Eversmann, 1845) (N) (*)
Myotis capaccinii (Bonaparte, 1837) (N, S, Si, Sa)
Myotis dasycneme (Boie, 1825) (N)
Myotis daubentoni (Leisler in Kuhl, 1819) (N, S, Si, Sa)
Myotis emarginatus (Geoffroy E., 1806) (N, S, Si, Sa)
Myotis myotis (Borkhausen, 1797) (N, S, Si, Sa)
Myotis mystacinus (Leisler in Kuhl, 1819) (N, S, Si, Sa) (*)
Myotis nattereri (Kuhl, 1818) (N, S, Si)

Pipistrellus Kaup, 1829

Pipistrellus kuhli (Natterer in Kuhl, 1819) (N, S, Si, Sa)
Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839) (N, S)
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) (N, S, Si, Sa)

Nyctalus Bowdich, 1825

Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) (N, S, Si)
Nyctalus leisleri (Kuhl, 1818) (N, S)
Nyctalus noctula (Schreber, 1774) (N, S) (*)

Hypsugo Kolenati, 1856

Hypsugo savii (Bonaparte, 1837) (N, S, Si, Sa)

Eptesicus Rafinesque, 1820

Eptesicus nilssoni (Keyserling & Blasius, 1839) (N)
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) (N, S, Si, Sa)

Vespertilio Linnaeus, 1758

Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 (N)

Barbastella Gray, 1821

Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) (N, S, Si, Sa)

Plecotus Geoffroy E., 1818

Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) (N, S, Sa)
Plecotus austriacus (Fischer, 1829) (N, S)

Miniopterus Bonaparte, 1837

Miniopterus schreibersi (Natterer in Kuhl, 1819) (S, Si, Sa)

Note

Myotis blythi: Secondo alcuni autori in Sardegna la subsp. presente sarebbe *omari* (Thomas, 1906), propria anche del Vicino e Medio Oriente.

Myotis brandti: Distribuzione indicativa, potendo essere confusa con *M. mystacinus*.

Myotis mystacinus: Distribuzione indicativa, potendo essere confusa con *M. brandti*.

Nyctalus noctula: La presenza in Sicilia e Sardegna è incerta.

Molossidae

Tadarida Rafinesque, 1814

Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814) (N, S, Si, Sa)

Lagomorpha

Leporidae

Oryctolagus Lilljeborg, 1874

Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Lepus Linnaeus, 1758

Lepus europaeus Pallas, 1778 (N, S, Si, Sa) (*)

Lepus europaeus corsicanus de Winton, 1898 (S, Si) (E, M)

Lepus timidus Linnaeus, 1758 (N)

Lepus capensis Linnaeus, 1758

Lepus capensis mediterraneus Wagner, 1758 (Sa) (E)

Sylvilagus Gray, 1867

Sylvilagus floridanus (Allen J. A., 1890) (N, S) (*)

Note

Lepus europaeus: Introdotta in Sardegna a scopo venatorio. Il taxon *corsicanus* è presente anche in Corsica. In Italia peninsulare, Sicilia e Sardegna sono state introdotte, con i ripopolamenti, lepri appartenenti a molte sottospecie, spesso mai determinate o a ceppi ibridi che a loro volta si sono ibridati con le lepri autoctone. Allo stato attuale, pertanto, non è possibile tracciare uno schema a livello sottospecifico, fatta eccezione per *corsicanus* che sembra ben differenziata dalle altre forme introdotte.

Sylvilagus floridanus: Introdotta a scopo venatorio dal Nord America a partire dagli anni '70 circa.

Rodentia

Sciuridae

Sciurus Linnaeus, 1758

Sciurus carolinensis Gmelin, 1788 (N, S) (*)

Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 (N, S)

Marmota Blumenbach, 1779

Marmota marmota (Linnaeus, 1758) (N)

Note

Sciurus carolinensis: Introdotta dal Nord America nel 1947.

Gliridae

Eliomys Wagner, 1840

Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766) (*)

Eliomys quercinus liparensis Kahmamm, 1960 (Si) (E, M)

Eliomys quercinus dichrurus (Rafinesque, 1814) (N, S, Si)

Eliomys quercinus sardus Barrett-Hamilton, 1901 (Sa) (E, M)

Dryomys Thomas, 1906

Dryomys nitedula (Pallas, 1779) (N, S)

Myoxus Zimmermann, 1780

Myoxus glis (Linnaeus, 1766) (N, S, Si, Sa)

Muscardinus Kaup, 1829

Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)

Note

Eliomys quercinus: Alcune popolazioni di questa specie mostrano corredi cromosomici variabili con $2n=48-54$. La subsp. *liparensis* è endemica dell'isola di Lipari.

Microtidae

Clethrionomys Tilesius, 1850

Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780) (N, S)

Arvicola Lacépède, 1799

Arvicola terrestris (Linnaeus, 1758) (N, S) (*)

Microtus Schrank, 1798

Microtus agrestis (Linnaeus, 1761) (N)

Microtus arvalis (Pallas, 1779) (N)

Microtus multiplex (Fatio, 1905) (N, S)

Microtus savii (de Selys Longchamps, 1838) (N, S, Si) (E)

Microtus subterraneus (de Selys Longchamps, 1836) (N)

Chionomys Miller, 1908

Chionomys nivalis (Martins, 1842) (N, S)

Ondatra Link, 1795

Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1758) (N) (*)

Note

Arvicola terrestris: Vecchi reperti in Sicilia non più confermati da dati recenti.

Ondatra zibethicus: Introdotta dal Nord America per lo sfruttamento della pelliccia intorno agli anni '40.

Muridae

Apodemus Kaup, 1829

Apodemus agrarius (Pallas, 1771) (N)

Apodemus alpicola Heinrich, 1952 (N)

Apodemus flavicollis (Melchior, 1834) (N, S)

Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Micromys Dehne, 1841

Micromys minutus (Pallas, 1771) (N)

Rattus Fischer, 1803

Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) (N, S, Si, Sa)

Rattus rattus (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Mus Linnaeus, 1758

Mus domesticus Schwarz & Schwarz, 1943 (N, S, Si, Sa) (*)

Note

Mus domesticus: Alcune popolazioni di questa specie mostrano corredi cromosomici variabili con $2n=22-40$.

Hystriidae

Hystrix Linnaeus, 1758

Hystrix cristata Linnaeus, 1758 (N, S, Si)

Myocastoridae

Myocastor Kerr, 1792

Myocastor coypus (Molina, 1782) (N, S, Si) (*)

Note

Myocastor coypus: Introdotta dal Sud America negli anni '40 per lo sfruttamento della pelliccia.

Carnivora

Canidae

Canis Linnaeus, 1758

Canis aureus Linnaeus, 1758 (N)

Canis lupus Linnaeus, 1758 (N, S) (M)

Vulpes Frisch, 1775

Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Ursidae

Ursus Linnaeus, 1758

Ursus arctos Linnaeus, 1758

Ursus arctos arctos Linnaeus, 1758 (N) (M)

Ursus arctos marsicanus Altobello, 1921 (S) (E, M)

Mustelidae

Meles Brisson, 1762

Meles meles (Linnaeus, 1758) (N, S)

Mustela Linnaeus, 1758

Mustela erminea Linnaeus, 1758 (N)

Mustela nivalis Linnaeus, 1766 (*)

Mustela nivalis boccamela Bechstein, 1800 (Sa)

Mustela nivalis minuta Pomel, 1853 (N)

Mustela nivalis nivalis Linnaeus, 1766 (N, S, Si)

Mustela putorius Linnaeus, 1758 (N, S) (*)

Mustela vison Schreber, 1777 (N, S) (*)

Lutra Brisson, 1762

Lutra lutra (Linnaeus, 1758) (N, S) (M)

Martes Pinel, 1792

Martes foina (Erxleben, 1777) (N, S)

Martes martes (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)

Note

Mustela nivalis: Per la subsp. boccamela esistono segnalazioni, da confermare, per la Penisola e la Sicilia.

Mustela putorius: In Sicilia e Sardegna è presente una forma introdotta domestica rinselvaticata di origine incerta.

Mustela vison: Introdotta dal Nord America per lo sfruttamento della pelliccia.

Viverridae

Genetta Cuvier G., 1816

Genetta genetta (Linnaeus, 1758) (N) (*)

Herpestes Illiger, 1811

Herpestes edwardsii (Geoffroy E., 1818) (S) (*)

Note

Genetta genetta: Presenza occasionale nel settore nord-occidentale.

Herpestes edwardsii: Introdotta dall'Asia negli anni '50; la presenza attuale richiede conferma.

Felidae

Felis Linnaeus, 1758

Felis silvestris Schreber, 1777

Felis silvestris lybica Forster, 1780 (Sa)

Felis silvestris silvestris Schreber, 1777 (N, S, Si)

Lynx Kerr, 1792

Lynx lynx (Linnaeus, 1758) (N) (*)

Note

Lynx lynx: Probabilmente estinta in Italia nei primi decenni del secolo, ha recentemente ricolonizzato l'arco alpino, proveniente dagli Stati confinanti.

Phocidae

Monachus Fleming, 1822

Monachus monachus (Hermann, 1779) (S, Sa) (M)

Cetacea

Balaenidae

Eubalaena Gray, 1864

Eubalaena glacialis (Müller, 1776) (5) (*)

Note

Eubalaena glacialis: L'unico dato riguarda uno spiaggiamento presso Taranto nel 1877; attualmente estinta nell'areale dell'Atlantico nord-orientale.

Balaenopteridae

Balaenoptera Lacépède, 1804

Balaenoptera acutorostrata Lacépède, 1804 (3, 4, 5) (*)

Balaenoptera musculus (Linnaeus, 1758) (5) (*)

Balaenoptera physalus (Linnaeus, 1758) (3, 4, 5) (M)

Note

Balaenoptera acutorostrata: Molto rara in Mediterraneo.

Balaenoptera musculus: Solo un'antica segnalazione.

Physeteridae

Physeter Linnaeus, 1758

Physeter catodon Linnaeus, 1758 (3, 4, 5)

Kogia Gray, 1846

Kogia simus (Owen, 1866) (3) (*)

Note

Kogia simus: Un solo spiaggiamento recente in Toscana.

Ziphiidae

Ziphius Cuvier, 1832

Ziphius cavirostris Cuvier G., 1832 (3, 5)

Delphinidae

Tursiops Gervais, 1855

Tursiops truncatus (Montagu, 1821) (3, 4, 5)

Stenella Gray, 1866

Stenella coeruleoalba (Meyen, 1833) (3, 4, 5)

Delphinus Linnaeus, 1758

Delphinus delphis Linnaeus, 1758 (3, 4, 5) (*)

Grampus Gray, 1828

Grampus griseus (Cuvier G., 1812) (3, 4, 5)

Pseudorca Reinhardt, 1862

Pseudorca crassidens (Owen, 1846) (3, 4, 5) (*)

Orcinus Fitzinger, 1860

Orcinus orca (Linnaeus, 1758) (3, 5) (*)

Globicephala Lesson, 1828

Globicephala melaena (Traill, 1809) (3, 5)

Steno Gray, 1846

Steno bredanensis (Lesson, 1828) (3, 5) (*)

Note

Delphinus delphis: Un tempo più diffusa, attualmente molto rara.

Pseudorca crassidens: Molto rara; la presenza nel Mar Adriatico richiede conferma.

Orcinus orca: Molto rara.

Steno bredanensis: La presenza nel Mar Tirreno richiede conferma.

Artiodactyla

Suidae

Sus Linnaeus, 1758

Sus scrofa Linnaeus, 1758 (*)

Sus scrofa meridionalis Forsyth Major, 1882 (Sa) (E)

Sus scrofa scrofa Linnaeus, 1758 (N, S, Si)

Note

Sus scrofa: La subsp. *scrofa* è stata introdotta in Sicilia per scopi venatori negli anni '80; la subsp. *meridionalis* sembrerebbe di origine domestica e successivamente inselvatichita.

Cervidae

Cervus Linnaeus, 1758

- Cervus elaphus* Linnaeus, 1758 (*)
- Cervus elaphus corsicanus* Erxleben, 1777 (Sa) (E, M)
- Cervus elaphus elaphus* Linnaeus, 1758 (N, S)

Dama Frisch, 1775

- Dama dama* (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa) (*)

Capreolus Gray, 1821

- Capreolus capreolus* (Linnaeus, 1758) (*)
- Capreolus capreolus capreolus* (Linnaeus, 1758) (N)
- Capreolus capreolus italicus* Festa, 1925 (S) (E, M)

Note

Cervus elaphus: La subsp. *corsicanus* è presente anche in Corsica; la subsp. *elaphus* è stata reintrodotta in varie aree della penisola. Alcuni autori considerano per l'Italia peninsulare la subsp. *hippelaphus*, qui considerata come sinonimo di *elaphus*.

Dama dama: Introdotta in Sicilia per scopi venatori negli anni '80; recentemente reintrodotta in Sardegna a seguito dell'estinzione avvenuta alla fine degli anni '60.

Capreolus capreolus: La subsp. *capreolus* è stata reintrodotta in varie aree della penisola. Alcuni autori considerano per l'Italia peninsulare la subsp. *transsylvanicus*, qui considerata come sinonimo di *capreolus*.

Bovidae

Ovis Linnaeus, 1758

- Ovis orientalis* Gmelin, 1774 (*)
- Ovis orientalis musimon* (Pallas, 1811) (N, S, Si, Sa) (E)

Capra Linnaeus, 1758

- Capra hircus* Linnaeus, 1758 (S) (*)
- Capra ibex* Linnaeus, 1758 (*)
- Capra ibex ibex* Linnaeus, 1758 (N) (E)

Rupicapra de Blainville, 1816

- Rupicapra pyrenaica* Bonaparte, 1845
- Rupicapra pyrenaica ornata* Neumann, 1899 (S) (E, M)

Rupicapra rupicapra (Linnaeus, 1758) (N)

Note

Ovis orientalis: Endemica in Sardegna; introdotta in Italia peninsulare e in Sicilia (isola di Levanzo).

Capra hircus: Presente nell'Isola di Montecristo.

Capra ibex: Attualmente reintrodotta su tutto l'arco alpino.