

Levende *Nassarius reticulatus* en *Lunatia nitida* van de kustvisserij.

Eind 1993 kreeg ik bij 2 gelegenheden materiaal van kustvissers. Daarin zaten o.a. fuikhorens.

1. November 1993, gevestigd 7 km ter hoogte van Middelkerke ongeveer 100 m diep bij hoog tij. Zowat 50 *Nassarius reticulatus* naast ongeveer 100 *Lunatia nitida*. De schelpjes waren uit de "schudder" gevallen in de kookkuip van grijze garnaal.
2. December 1993, Oostende Bank, 18 m diep bij hoog water. Een 25-tal exemplaren *Nassarius reticulatus* uit "kluts" van vooral gewone zwemkrabben, wijting en jonge platvis.

Het grootste deel van de *Nassarius reticulatus* hadden een dunne (= groeiende ??) lip. Deze dunne lip is niet gebonden aan een bepaalde afmeting. Ze komt zowel voor bij de grootste als bij de kleinste exemplaren.

In vergelijking met de glanzende tepelhorens op het strand van De Haan (opsputtingen mei '92) zijn de exemplaren van voor Middelkerke gemiddeld groter en vertonen ze vrijwel allemaal een roestbruine kleur.

R. Vanwalleghem
Aartshertoginnestraat 54
8400 Oostende